

蕉窓雜話

四編

全

和書門			
二	四	九	三
六	七	三	六
五	九	函	號
册	架		類

內閣文庫			
九	二	和	
五	四	書	
函	九		
七	三		
架	六		
	册		
	號		
	類		

內閣文庫		
番號	和	24936
冊數	5	(4)
函號	195	324

新獻 十三




Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



© Kodak, 2007 TM: Kodak





蕉窓雜話四編

東郭和田先生燕語

門人筆



淺草文庫

町田久成獻納之章

蛭會石鉄粉辰砂禹餘糧牡蛎ナト何レモ皆鎮墜ノ水氣ヲ

利スルモノ也サレバ各其得タル處ノ能アリテ少ツ、ノ

違ハアレバ至テ細密ナル處マテハ盡ク論シ分カタシ意

ヲ以テ迎へ見ルヘシ全体ハ何レモ皆氣ヲ鎮墜スル故水

氣モサハキ水氣サハケル故氣モ鎮墜スルノ道理ニテ兩

方持テ合ニナルコト故何レヨリ云モ同シクノヤウナレバ

ヤハリ氣モ鎮ツイニ水氣モサハクノ能アリ癡狂ノ人ニ

蕉窓雜話

四

辰砂ヲ用ルモ古來ヨリノ色赤キモノ故心ニ入テ心氣ヲ
鎮ムルナト、云ヘリ畢竟心トハ胸ナリ其胸ノムレヤク
レヤトレタル處ノ疼飲宿水ヲ下ヘサシテ墜下スルヲ最
スルトキ勢アルニ因テ也又古來ヨリ疼心竅ニ迷フナト
ト説テ疼飲宿水ノベツタリト心ノ竅ノ上ヘ塞カル故ニ
狂妄スルヲ云ヘリナルホト六ツカレク云時ハ左様ノ
モノ也何レ此疼ノ迷タルハ胸膈ヘサレテ火ノ亢ルヲ甚
レキニ因テ也コノ故ニ或ハ血蒂ニテ上ヘヌキ取モアリ
又紫圓ヲタ、ミカケテ用イ下ヘヌクモアリ又大腸ノ方
ヘヌカヌメ小水ノ方ヘヤワラカニ引テ取ト云ニ成テハ

辰砂鉄粉金汁ナトヲ用ル也兎角胸ヲ利スレバ心下和
ラキ心下和ラケハ胸膈モ利スルモノ也右ノ症ナトハ根
元氣結ニ因テ宿水ノ聚タルモノニテ氣利スレハ宿水モ
サハケ宿水サハケレハ氣モ自然ト利シテ兩方持合ニ成
リ也故ニ藥モ同ク氣ヲ利スル能アレハ宿水ヲサハキ宿
水ヲサハク能アレハ氣モ利スルモノニテ只各其物々ニ
少ツ、アンハイアリテ色々ノキ、場アルモノナリ
胸膈クツロガサレバ心下ハスカズト云フ常々心得ベキ
トニテ治術ヲナスモノ、為ニハ法然ノ一枚起請モ同然
ト知ルベシ

喘症ナドモ至テ辛キモノカ至テ甘キモノナレバ通ルモ
ノ也トウガラシナドヲ用ルコトモアリ又烟草ナドニテ通
ルコトモアルモノ也サレバ只一旦通ルバカリニテハ何ノ
益ニモ成ザルモノ也白ミモ少シアルヤウニテヌメノト
光リテ乾燥シタル舌ハ附ヲ行處也今一段ニメベニ色ナ
ルアリ黄ナルモアリサレバ黄ナルニハ得テハ藥汁ニテ
染タルアリウガイサセテ見ルベシ高貴ノ人タリ凡カマ
ワズウガイサセテトクト見ルコト也又上一遍ハゲテ其下
ヤハリサシクトシタル舌ニ石羔ノ行場アルアリ附子ノ
行場アルアリ又四物類ノ行場アルモアリ

水腫ノ甚入組タル症ニハ味丸ナド用テ居ルニ始終用ツ
メルモノト申ニテ切カヘ子バナラヌモノトアリ此處甚
具合モノ也畢竟ハ味丸ナドヲ用ツメテオルハタトヘバ
相撲ノヤグラニ取組テツリヒタル如シサレバムサトオ
トシテハ向ヨリ其拍子ヲ付ケコムヘキ勢アルモノハ十
分ニツリ上タル上ニテオトサ子バナラヌコト也右ハ味丸
ナドニテ十分心下モスキ下部へ腫多ク成タル處ニテ分
心氣飲ニ製附子ヲ加タルナドニ切カユルハ段々小水ノ
通シヨク成リテ腫モ取レルモノ也然レ此症ヲ患ル人ニ
ハ多ク下元ノ氣虚脱ノ候アルモノ也下元極虚ノハ兎角

救カタキモノユヘヨク意ヲ用テ診察スベシ
 腹脹ノ病人鳩尾ノ處ヘツキシマルナキモノハ自身ハ
 満ナルヤウニ思モノ也腹脹甚シキモノニ至テハ自身ハ
 満タルト思ニ外ヨリ見テ満ス自身満ズト思ニ外ヨリ見
 テハ満ルナド云ハナキモノ也輕症ニ於テハアリモシ
 ツベキナリ
 四通散ニ吳茱萸桑白皮ト組時ハ胸膈ヘ飲ナトノ聚ルニ
 用ユルナリ
 分心氣飲ハ古來云通り心氣ニ與ルニテ鬼角ムシヤク
 シヤト物案ニナトツヨクノ爵結スル症ニ用ル藥也

破故帛ハ腎膀胱ノ間へ行タ藥也利水ノ功モアルモノ也
 赤小豆忍冬ナド組合タル藥ヲ飲ム中雞肉猪肉ノ類ヲ食
 メハ趣意モトルナリ
 地膚子ハ脾胃ヲスカシテ利水スルノ功アリ此等ハ本役
 者ニハアラス總ノ此類瞿麥ナドモ皆大抵同ノ功能ノモ
 ノ也其中車前子ナドハ少シ外ニワサアリテ鬼角目中ノ
 火氣ヲ利スル功ナドアルナリ
 下血ヲ患ルハ屢ニメ色青黄白或青黄ニメ土色ヲ兼又ハ
 少シ黄ハミヲ持ナト呼吸短促ニ少シ面部手足ナトニ
 毛腫アルノ症ハヤハリ黄胖ノ中ニテ下血スルノ一症ア

ルモノナリ是全ク脾胃ノ湿ニ因ル也故ニ鉄粉劑ヲ用
 テヨシ近年マテハヤハリ黄胖藥ノ鉄粉劑ヲ用タリ大黃
 ナトソ用カタキハ本事方ニ云々スル處ノ藥ヲ用ヘシ即
 三聖丸是也近來又別ニ一奇方ヲ得テ用ルニ屢奇効ヲ奏
 ス其方釜底墨大鉄粉中茯苓小已上三味糊ニテ丸レ毎夜
 一匙目或ニ二匙目ツル用隨症ノ方ヲ服用スレハ日ナラス
 ノ下血止也
 下血ノ症ニ苜蓿四苓ニ附子ヲ加タルヲ用ルハ下焦湿熱
 アリテ虚候ヲ兼タルモノ也三黃湯ヲ用ルハ腸胃ノ實火
 也四君子湯ニ黃芪白扁豆ヲ加タルヲ用ルハ腸風下血ニ

テ是ハ腸胃中ニ水飲ヲ畜テ其ヨリ血分ニ變動付モノ也
 又真武湯ナド用ルハ胃中及下焦ヘツタリト正面ニ虚寒
 アルモノ也是ハ一ト通りノ下血ノコトヲ云ナレトモ若クア
 ルモノニテモ用ベキ候アレハヤハリ用テヨキナリ
 日野屋何某ナルモノ大吐血ヲ患フ諸醫犀角地黄湯類ヲ
 用テ間々朝鮮參ヲ兼服セシムルコト懸レサレトモ其血出ル
 ト益盛也予以テ實火也トノ麥門冬湯加黃連石羔方ヲ處
 レ一貼ニ用ル處ノ石羔ノ重サ廿九錢ナルヲ連進スルコ
 ト三貼ニノ頓ニ愈ユ初メハ任脉水分及鳩尾ニモ少々動悸
 アリ然レ出血止テ翌日ハ直ニ歩行スルコトモ成リ彼動悸

モシツマリタリ此等ノ動ハ同ク任脉ニ見レテモ眞ノ壺
候ヨリ出ル動トハ根ノカラ違イ畢竟急ニ走リタル寸暴
ニ動ノ付ト同ヤウナルモノ也實火ヨリ出ル血ハ血ノホ
ドハシルト云モノニテ其ホドハシルホドハ又湧ヤウナ
ルモノ歟ト思ハル也大ニ脱血シナカラ直ニ達者付處
ナド考ヘ見ルヘキ也

暴ニ大吐血ノ其血止ザルモノ或氣絶シタルモノ否ラサ
ルモノ俱ニ鳩尾ノ穴ニ灸スベシ其灸大サ中指頭許ニシ
數百壯灸スレバ其閉塞シタルトコロ開テ血モヨク止モ
ノ也予數々試テ奇効ヲ得タル也サレバ其病人既ニ悶

絶ノガツハリト口ヲ開テイル如キ難症ハ格別ノ也
痘ニサ、湯ヲスルハナク可也サリナガラ湯ヲカケ
レハヨクカセルモノユヘ隨分湯ハシテモヨシ

三消渴ノ名古來ヨリ云フナレバ其中チ上消渴トハ云カ
タキニ似タリ是ハ是非凡中下ヨリスル也膏梁厚味ニ
因テ胃中實火ヲ畜メ消渴スルモノハ中消也腎元虚敗ソ
虚火妄動スルニ因テ消渴スルモノハ下消也畢竟此中下
ノ火氣炎上シテ心肺ノ部ヲ熏灼スルナレハ別ニ上消ノ
名ハ入ザル也其下消ノ症ハ兎角下部ヘカララ付テ熱
ヲ解スルヤウニスベシ

持病ニ喘ヲ患ルモノ四逆散ニ麦門石羔ヲ加テ用ルアリ
麻杏甘石湯ヲ用ルアリ又麻杏甘石テハ治セ又強キ喘ア
リコレヲ治スルハ自製シ喘ノ一方ナリ
喘ニ抑肝散加芍藥ヲ用ル手段アリ
喘ノ一方ヲ用ベキ處モ其時合ニヨリテハ桂苓木甘ニテ
佳下モナリ此等ハ皆ベツタリトユルモノナリ
小柴胡加三味ヲ咳嗽方ハ肝部ヘブモニカ、ル藥也此症
兩脇心下ヲサカル故其ニテドウセキ入テ胃中宿滯伏火
上兩方相持ニ成テ上心肺ヲ熏蒸メ咳嗽スルノ意也火ア
レハ必水ヲ引上ルモノ故何レ咳嗽ハ皆水氣ヲ兼ル也

虛火炎上ニ付テノ咳嗽モ同ク水飲ヲ兼ルモノナリ
火氣ノ變動スル處ノ尤ヨク知ル、ハ支飲也肩ニテ息ヲ
レテスウノトゼリツキ肺部ヨリ中脘邊マテモコヅミ
聚テアルモノナドハ醫ニ脉ヲ見セルトテ手ヲ出ス指子
ニ氣分改レハ乍チ息ノキル、如クナリテ暫時モタヘカ
タキ容子ニ成モノ也カヤウナル寸其脉ヲ直ニハ見ヌモ
ノ也氣息格別ニ動メアル故也其時ハ暫ク待合セテ病人
ニモ必何ニモ隔意ニ思ル、トナカレ心ヲ用ラル、ト氣
息動ノ宜カラズ先々トクト氣ヲオサメラレヨナト、ア
リベカ、リニ云キカス時ハヤレ湯ニテモ飲マメツレヨ

サテノ、レユツナキヲニテアリレナト、云ホトソモノ
也サヤウアル時ハ今暫外ノハナレナトレテ居テトクト
病人ノ氣分オサマリテヨリサア見テモヨキカト云ヤウ
ニ心易ク云テ診察スレハ何コトナク其地場ノ處見ユル
モノ也大抵カヤウノ趣ニテ火氣ノ變動スル處ヲ考知ヘ
レ息ノゼリツクナトハ勿論水飲ニ因リナレト水必徒然
トメ聚ルモノニ非氣動スレハ火隨テ逆スル故水飲モ亦
同ク動スル也コノ症ナトハ下女丁稚ゾトノ茶ニテモコ
ホスカ何ニテモ氣ニ入ヌアリテ少し怒ル心アル時ハ
乍チクワノ、トメ變動スルモノ也總テ心下脹下ナトヘ

動氣ヲ持ハ氣ト水火トニテ拘牽シテ相扇ク故也氣逆ス
レハ火ヲ生シ火ニテ水ヲ引上水聚レハ又其ヘ火ヲカモ
ノ扇キ立ル故動築スルナリ

支飲類ノ症ニ牢弦革ナドノ脉出ルハ大惡症ナリ

総メ痢疾ニ初ヨリ後重ノナキモノハ用心スヘレ後重ア
ルハ大抵皆實症也サレトモ是ニモ亦虚ニ屬スルモアリ一
概ニハ云カタル爛腸ノ痢湿熱ノ痢ナト云フハ強テ分ラズ
トヨキト也症ニ因テハ血劑ヲ立カケ用子ハナラヌモノ
ハアル也後重ハ多皆症ニ因リ也實人ノ後重強キモノハ
下劑ニテ且毒ヲヌキテヨレ然レト下劑ノ止メアリ

ハイ甚巧者ノ入リニテ何分實事ノ上ニアラサレハ分リ
カタシ兎角下劑ノ不及シタルハ苦シカラス過用シテハ
害アリ若過スレハ後ニハ止ル期ナキヤウニ成モノナリ
大抵一通ノ症ハ兎角腰湯ヲノ畏ミ廻シテ汗ヲ取レハコ
レニテ邪氣ヌケルモノ也虚實症凡ニ青菜ヲタ、キタル
コトキ物ヲ下スハ甚惡症也黒色ノ便ヲ下スモ惡症也
脚氣中ハ勿論脚氣后ニテモ痢疾ヲ受タルハ甚惡症也元
來脚氣ト云モノハ内ノ不メクリヨリ出ルヲ以テ其處へ
痢ナト受テハ惡キ道理也痢疾ハ初メニ蕩滌スヘキ症カ
ズノ、アリトハ云ヘ凡得テハ蕩滌スマシキヲ疏滌スル

モ人也氣ヲ付ヘシ虚ナル處ヲ蕩滌スレハ其アト何分カ
タ付カタクナリテ甚惡キモナリハ此症ナリハ
痢疾ノ鮮血ヲ下スモ亦多ク黄連ナトヲ用ル也サレ
凡又中ニハ此症ニ附子ヲ用子ハナク又下アリ隨分診察
ヲ細密ニスヘキナリニテ此糸合甚入用ノナリ
痢疾赤白ニ因テ氣血ヲ分以テハアラス赤白凡各寒熱
虚實ヲ分テ療ズルニ赤赤未モノニ寒アリ熱アリ虚アリ
實アリ一概ニ云ベカラス白キモノモ同例ナリ
痢疾ニ傷寒論ハ桃花湯ヲ真武湯夫煎湯ニテ方キ並用ル
ルアリ其外對症ノ藥ヲ煎汁ニシテ用ルモヨキナリ

闘牛兒ハ數々痢疾ニ試タレ凡餘リ効ナキモノ也

撰列ニツ屋村木屋何某年五十五去年痢ヲ患テ一粒金丹ヲ服ス爾後今に至テ腸胎ヲ下テ日ニ七八行或五六行也一醫コレヲ診ツ謂ラカ淡藥ノ毒未ダ盡ス因テ藥ヲ投スルモ二十貼許ホレ凡寸効ナレ故ニ病客其醫ヲ信セスノ治ヲ予ニ請フ予コレヲ診ル云是果メ藥毒ノ盡サルモノニアラス必固有ノ疝ノ動スルカ為ス所也然モ年高メ疝動スルモノ多ハ是腎家衰弱ニ因テ也ト故ニ處スルニ真武湯加甘艸ヲ以テスレハ數日ニ疝ノ拘挛セルモノ緩クナレリ此真武ノ附子ナトハ疝ヲウコガセルトニ成

リ甘艸ニテ緩ムル也予私ニ按スルニ此人ノ患シ痢ナトハ天行ノ痢ニテハナクメヤハリ疝ニ因レトニテアリレニヤ實ニ天行ノ痢ニテアリレナラハ邪去テ痢調ヘハアトサツハリトスルハツ也又年至高メ疝ニ因テ腸垢ヲ下ト過多ナルモノハ時ノエ合ニ因テ必死ノ症アリ六十以上ニ至テ此症アルモノハ多ハ死スルモノ也是皆腎氣衰弱スルヲ甚ヲ以テ也此等ハ皆一通リ積滯ノ毒ヲ下スモノナトハ違テヤハリ大腸ノ方ヘ疝ノツキカ、ルニ因テ腸胎ヲカモレ湧セルモノト見ユ故ニ此症ノ虛シタルナト弥下メイヨノワクモノ也故ニ痢後ノ腸垢モ又ヤ

ハリ痢ヲ患ル中ニ疏滌スルニモ其下劑ノヤノカケニア
 ル下也長ク疏滌スルハイツマテモ下ルアリ埃アンハイ
 大事ノ處也又此真武ヲ用ル症モ其時ノユ合ニ因リ甘州
 浮心ナト用ル場モアル下ナリ
 年高キ人ニ三年モ下利赤白裏急後重スルモノアリ是脾
 腎手弱クナリタルニヨリ疝動レタチテ此症ヲナス也コ
 レヲ名ツケテミル寸ハ疝痢凡云ベキモノ也又痢瀉ト云
 モノハツフ々々立タルモノヲ下スト云説アリ是ハ拘夕
 ル也ヤハリ甘州浮心湯ナドヲ用ル水瀉ニモ疝ニ因ル
 モノ多アルナリ

十枣湯ノ下痢公上ニシテ強キユヘ其へ熱ヲカモ
 ノナル處ノ下利也格別ノ便ハ下ラヌモノ也ヤハリ一通
 ノ便ニテ下リヤウハ色々アルベシ大柴胡甘中浮心ナト
 ノ下利モ理合ハ同下也瘧序ノ下利ハ合病熱ノ自下利ト
 同下也次ハ柴胡ノ下利也其瘧序ノ下利ハ其マノヲキテ
 モ治スレ凡唯九日十日己上ノ下利ハ少陰凡云カダキモ
 ノ下利極悪症ナリ
 桃葉スリテ水ヲ入トロリトキテ飲メバヨク蛇虫ヲ
 下スモノ也又イヌタテノ字様ノ点アルモノハ以テ用ルモ
 同ニ能アリ此ニツハ家傳ニテ屢試タル下也蓼ヲ用ル

ハモト或農家ノ人シセシトニテ或人大腹痛セシ時衆醫
 手ヲ束テ碎シタレヲ其農人ユレヲ用タレハ蛇虫ヲ吐下
 ヲ愈タリ
 某門ノ坊官菅谷何某ノ男年十一乙卯秋八月廿一日中飯
 ヲ食ノ後後苑ニ出テ生柿二箇ヲ採食ノ後一時許ニ暴
 ニ大吐大下ヲ催シ明且ニ至ルマテ吐瀉スルト凡十六七
 行四支厥冷肘膝ヲ過キ然レハ爪甲ハ色ヲ失ワス跌陽太
 谿ノ脈既ニ絶シ眼胞ノ肉脱メ青色ヲ見シ寸口ノ脈細糸
 ノ如ク屋漏ニ似タリ然ノ右手ノ脈ハコレヲ尤手ニ比ス
 ルニ稍精神アルカ如シ舌色微シク白ヲ帶テ乾渴ス變症

此人如レト云ヘ凡其腹候ハ未ダ虚極ヲ極メザル處アリ
 腹形脊ニ付元頗ル谷ノ如レト云ヘ凡心下不容冗ヨリ臍
 邊ニ至リテ猶囊裏ニ薇菜ヲ畏タルヲ按カ如ハ状アリ先
 生其家ニ至ラレレハ廿二日ノ晩方ナリ衆醫俱ニ議メ初
 ニハ附子理中ヲ用ユサレ凡嘔不止因テ前方中ニ於テ附
 去リ陳皮桂ヲ加ヘタルヲ用後又熊參ヲ用ユ是ニ至テ嘔
 氣猶止スレテ總テ穀食ヲ絶ス予謂ク彼精神ノ未ダ脱セ
 ガル處及腹候舌候等彼此發病ヨリノ吐瀉ノ多處ト段付
 ノ遲キ處ナドノ引合サル處アリテ成症ニアラス又初ニ
 觀望シタル處モ何トナクヒレアリ是必蛇虫ノ變動セル

モ也ト時三諸醫予が至方ヲ問フ因テ理中安蛇湯ヲ示
シ一醫ヲメヒヲ執ラシメ藥汁ノ外ハ斷ノ湯水ヲ用ル
ナカラシム右廿六日夜中前方ヲ用ユルコト一度大便モ
二度飯ノ湯小茶碗ニテ少々廿七日曉飯ノ湯一度少ツ
ニ盃前夜中暫時ヅ、眠リヲ催ス是ヨリノ日ニスラフ
ト全快セリ此病人ナドハ右体數醫ヨリ集テイルノニ
テ只藥ヲ大口ニカブト飲セテ大ニ吐スレハ是ハ云テ轉
方スルヤウニ成レ故後ニハ手段盡タル也是俗ニ云山船
頭ト云類也故予ハ右ノ藥ノ用イカタ取アツカキ等ハ
素人也トテ實ニ口ヲヌラスト云ホドノトニテ錢ノマワ

リホドツ、飲セタリ總ノ嘔吐甚シキ病人ニ藥ヲ用ニハ
皆此意得アルベキト也全体吐スル故渴ス渴ノ飲メバ水
飲タ々ヘテ又吐ス且其水飲ノタ々ヘシニテ火ヲ生ズル
故吐タルアトニテ益飲タガル也故此症湯水ヲ禁ズルヲ
第一トスルナリ
半身不遂症ナドスベテ手足ノ廢レ用ラレザル者ニ肝心
ノ見處アリ不治ノ症ハ肩ノツガイノ處指ヲ入ル、ハカ
リクイ違ヒハツレテアルモノ也是其經絡初ヨリ虛ノア
ル人ハヤハリ初ヨリハツレテアルモノナリ左モナキ人
ハ段々後ニ成テヨリハナレルモノ也是モ必腰ノツカイ

ノ環跳ノ穴ノ辺ニテハヅレテアルモノ也手ノ合谷ノ處
ノ肉ノヲチルナドハヤハリ其枝ニテ肩ノツガイノ具合
本ニナル也癩疾ノ人ナドモ魚腹合谷ニ肉ヲチルモノ
也又其中風ノ姿ニナリテアル病人ノ其拳ヲクイ入ホド
カタク握リツメテアルハ不治ノ症也夫ヲ仰ニ打コロバ
シテ見ルニコケル時チヨツト其手ヲアケルモノナレハ
ベツタリト十分ニ下へ仰臥スル時ハ直ニ本ノ如クニギ
リツメルモノ也是不治ト知ベシ
老人卒ニ昏倒シタルモノ強緊革ナド、云脉出ルモ惡症
也戴陽スルモ惡症ナリ

老人中風ノ姿ナドヲ見シテアルモノニテモ全体血燥ノ
アリテ心下腹下ノ痞鞭率急ニ因テ手足言語等ノ具合惡
キモノナド其心下腹下ノ引ハリヲヨク氣ヲ付テ診へハ
痰ニ動ヲ持タルモノアル也其動ハ引ハリノ緩ミテ後ニ
浮立テ上へ見ル、モノ也是ニ一通ノ疏通劑ナト用テハ
治セス若任脉ニ動ノ付タルモノナラハ芫湯類ヲ用ユ
レバヨクユルモノ也此等ハツ子ニ心得テヨクツ、下
寧ニ診候ノ其的實ヲ得ベキナリ

俗間ニテ卒中風ト称スル症心下急縮スルコト甚シキモノ
ニハ治スベキモツアリ心下及臍下モ又々テ脉洪大強緊

ナドヲ見シ面戴陽スルモノハ不治也両方凡疝病因ハ同
ク腹中ノ癖物ヨリスルコトナル凡疝下元ノ虚甚シキモノハ
治セザルナリ
一老婆卒然トメ爵シ頗ル言語ニ懶ク且嘔吐然シ凡疝中風
半身不遂ナドノ症ニハアラズ門人某生投スルニ六味温
膽湯ヲ以テ又五味異功散ヲ以テ病症猶依然タリ又一醫
投ズルニ石劑ヲ以テス病家石蒸ノ用ルニ合セザルヲ怪
テ敢テコレヲ服セズ其醫明日至リコレヲ診フ云ズテニ
解熱セリ是全ク石劑ノ効アル處也ト因テ改テ補中益氣
ヲ用レ凡疝終ニ効ヲ得ズ故ニ其家族遑遑トメ予ヲ招キ其

治ヲ請フ予即往テ具ニ其状ヲ問ヒ詳ニコレヲ診スルニ
其人從來積癖アリ且性酒ヲ嗜ム初メ其腹部ヲ診候スル
ニ任脉動悸アルニ似タリ因テ子細ニコレヲ候ヘハ左脉
三行ノ動ヲ激メ任脉ヘウツレルモノ也又丁寧反復ノ候
フニ左ノ小腹ニ於テ固ヨリ痞塊アリテコレヨリノ左脉
下及胸中ヘ衝テ為ス所也是ヲ以テ其人多啗飲アリ因テ
處スルニ柴胡姜桂湯加吳茱萸茯苓ヲ以テス服スルコト三
日ニメヨク言語レ酒食ヲ思フ然レ家族皆飲酒ノ病ニ害
アラントヲ愁レテ取テ與ヘス予妨ストメ是ヲ少々アタ
ヘシム彼六味温膽湯ハ心胸中ノミノコトヲ主タルノ方也

五味異功散及補中益氣ハモトヨリ用ユルニ當ラス四逆散ハ季急強キ方ヲユルムルヲ主トスルユヘ右ノ場ヘ用ヒス姜桂湯ハ苗飲強キ方ヲ疏通スルヲ主トスル藥ナルニヨリ右ノ處ヘ用ヒテ効アルモノナリ
 羌活防風トトハ先風邪上部ニアツマリテ手足ナトモタルクナリナトスルニ用ユルハヨクスカスモノ也然ルニ又外邪ノヲニテモナキ思ノ外ナル處ヘ用タルヲアリ然レ氏此等ノモノハ何レニ皆肝風ヲスカスモノ也故ニ東垣ノ外陽散火湯ナトモ肝風ヲスカスノ藥也ト心得ヘシ千金等ノ書ニモ用テ肝風ヲスカシタル處アリ内經ニ風

ハ百病ノ長ト云又風ハ能行テレハノ、変スナト云ヘルモ皆是肝木ノ風ヲサシタルモノニテ手足痺曳ナトスルノ症是也故ニ三生散愈風湯ナトモ實ノ風邪ヲ治スルトハ思ヘカラスコレヲ用テ實々ノ風病ヲ治スルト思ハ非也今其方論ヲ取スノ唯其藥方ヲ取り用テ以テ上部ノ疼飲ヲサハクモノニスル也藥ニ何ノ藥ハ用スト云ニハアラズ只ヨク融通シテ活用スル處ニ於テ具合アルマテ也又中風ノ預防ノ法モ古來アリフレシ通りノヲニテハユカヌト也是ハ只痴ヲホトヨクアレラウト房欲ヲ慎ムトノニアルト也夕ト七肝風イカホト九リテモ腎氣

實シタル人ハ取カヘシ出キルモノ也総ノ病ノ土臺ハ肝
 ヨリ起ルコトナレトモ性命ノ根底ハ腎氣ニアルト知
 ルヘシ
 家方土骨皮散ハ痛風ノ藥也モト大和國或俗家ノ傳方也
 其處ヨリ痛風藥トテ大ニ世ニヒロマル也此方ハトカク
 走注ノ痛モノニ用テヨシ又關節ニ付タル毒ヲヨクオカ
 テル藥ナリ
 發汗後及吐下ノ後ニ多ク水飲ヲ蓄ル下アリ是ハ全体外
 邪入ヲオカス時ハ一身中ノ水氣ヲ動カスユヘ惡寒モ發
 熱モ皆此水氣ノ變動ニ因テ然ル下也コレニ因テ藥劑的

中ノ其邪氣アチヨク皮膚汗口ヘサレテ漏出レハ其水氣
 ノ動シタルモノモ邪ト厄ニ漏出ル也吐下ノ取モ道理
 ハ同下也然ニ若其藥的當セヌ汗ニ成ハナリテモ只汗
 ノミ取レテ邪氣アチヨク解セサレハ其アトニテ必水氣
 ヲ蓄ル也是唯汗ヲ出スハカリニテ邪氣ニカラミタル水
 毒サツハリトヌケヌ故此本ヲオシテ見レハ悉ク皆其人
 ノ脾胃ニ惡キ所アルカ又ハ今一尋惡キハ脾胃腎厄ニ云分
 アルト云人ニアルモノナリ
 心ハ血ヲ生シ肝ハ血ヲ藏スト云モ徒然ノ下ニアラス産
 後脫血甚キニ多瘧ヲ發スルモノアリ瘧ハ肝經ノ病ニア

ラスヤ又墮胎ノ後ニモ多此症アルモノ也下總ノ國佐久
 羅ト云處ニハ取分テ此瘰癧多ト也其國ノ官醫中里忠庵
 ノ傳ニ此症ニ敗毒散ニフウトウカツラヲ合半ニ用テ
 奇効アリト也フウトウカツラハ藥店ニアリ防已通草ナ
 トノ如キモノニテ黒ミアル是也右ノ國ニテハチヨトシ
 タル瘰癧ニテモ得テハ瘰癧ヲ發スルト也又同人ノ話ニ瘰癧
 ノ不治ハトカク頰車ノ處ヲタルカルモノニテメツタニ
 ナデサスラセルモノト也此說ヲ聞テ後一人瘰癧アリテ
 詩タルニ其說ノ如シ是肝氣ウスクナリ肝瘰癧云ヘキモ
 ノナル欵右詩タル病人ハ小キ血瘤ノ如キモノ出テアリ

シカ不図ノコケテ其瘤ヲ打サキシヨリ大ニ破血メヤウ
 ヤクヤキ金ヲアテ、血ハ止リタレ凡アトニテ瘰癧ヲ發シ
 終ニ死タリ脉ハ尤リテ根ノナキ脉ニテアリシナリ

富永町佐野屋何某ノ妻往歲春二月年四十五ニメ跛ヲ患
 フ其人固ヨリ左臍傍ニ當テ灰吹ホトメモノニツアリ疫
 熱ノ中ニ不圖メ右ノ塊物一ヲ吐出ス其物ハヤハリ瘀血
 ノ塊リニテ麻索ヲ組タル如キモノ也瓦釘ニテツ、キテ
 見タルニキシ付テ通りカタク強ク引ケハキツチヤリト
 切レルモノ也扱其人ノ腹ヲミレハ塊物只一ニ成リテ四
 支厥冷肘膝ヲ過キ脉絶シタレ凡神氣ハタシカ也イカヤ

ウニシテ診シテモ脉ハ手ニ應セス生死ヲ決スヘキヤウ
ナカリシ故蠟燭ニ火ヲ點ノ目サキヘツキツケマハユキ
ヤト云ヘハ九ハナレト云トクト望テイル中何ニトカキ
ツトシタル處アリ猶トクト考ヘ見ルニ右ノ吐物アル前
ヨリ黒便ヲ下セリ其時分病家ノ人ノコゲタル便ヲシタ
リト云シヲ實ニ燥屎トノミ思イヨク改メ見サリシユヘ
吐物アルマテ畜血ノトヲ知ラス右体手オクシニ成レリ
扱其便ヲヨクノ吟味シテ見ルニ黒色漆ノ如キモノ也
因テ斷ノ桃核兼氣ヲ用一醫茯苓四逆ヲ用ント云シカ予
カ桃核ト云ヲ聞テ以ノ外ノトナリトノ先ヘ送歸レリ右

ノ藥ヲ夜中ニ三貼用シカハ明且ニ至テ厥愈右手ノ脉出
跌陽ノ脉モ應シ総身發熱ノ汗ヲ出シ其ヨリ三日許ニノ
黒便モ大概サハテ七日許ノ時又塊物一本ヲ吐出シ腹裏
既ニ固有ノ塊ヲ失ス此時ハ四厥セス然レイマテ左手ノ
脉出ズサマノ調理ノ段々カヲ付後ニハ少ツノ歩行モ
ナルヤウニ成レカ片始終 左脉出ス何分トクト安心ノ
ナラサル様子ニテ有シユヘイカニモノ脉ノ出ルヤウニト
思フ中木屋町へ出養生ノ居タルカ六月ニ至テソロノト総
身浮腫ノ後終ニ成レタリ此等ハ惜ムヘキノイタリナリ
黒便漆ノ如キモノ紙ニヒタレテ見レハ血ニ染也又水ヲ

入カキマセレハ血色分ルモノナリ
 総ノ内ヨリ血ヲ出スハイツレトコゾへ皮傷レ穴アキテ
 其ヨリ出スルトハ見ヘタリ然レ月經ナトノ血ハ別ニ
 傷レ付テ出レ云レス此等ノ處至妙ニメ云カタキ處也又
 咳ノ血ノ出ルナトハ何ニモセヨ肺血也然ルニ肺ノ主ル
 鼻ヨリ出ズノ口ヨリ出是モアチナモノ也故ニワリ合コ
 トモ云ベクレテ又云ベカラザルアンバイアルモノ也
 一通リ時令ノ風邪中ニモ間ニハ脱漏ノ症アリテ桂枝加
 附子ナト用ベキモノアリ
 総ノ熱氣アル症ニテ其熱ノサメギハ甚ヨスギルモノハ

得テ多ハ瘡ニ成モノ也

疫中嘔吐止ザルモノ大柴胡ナド用ベキ症候アリテ用ユ
 レ凡マハリ嘔吐スルモノハ多クハ胸中ニ畜飲アリテ其
 へ熱ヲシメコムユへ熱モ解セズノ嘔スルモノ也是ニハ
 小半夏加茯苓或ハ其方ニ生姜ヲ加ヘ用ユレバ大ニ汗出
 テ解熱スルモノ也又下利アルモノニマハリ大柴胡ナド
 フ用子ハナラヌ場合アリ見ワケカタキモノ也此症ヲ油
 断スレバ畜血スル也彼傷寒論ニ説タル處ノ畜血ノ症ト
 ハ具合違ヘ凡脉モ何ヤラフワ々トシテ知レカタキモ
 ノ也此脉ノアンバイナドニテ傷寒論ニモ太陽トオキタ

ル欵也
 腸風下血ハ鮮血ヲ下スモノヲ云也腸風藏毒ト云ハ便血
 ノヤウナル者ニテ痢便ノ如キ毒色甚シキモノヲ下スラ
 云也外科ニ云藏毒モ右ノ症ニ因リ本ツイテ名ヲ立シモ
 ノ也其外科ニ云藏毒ハ肛門ノ邊ノ腫ヲ云畢竟痔ノヤウ
 ナル者也痔漏ノ甚シキニ至テハ其管背ニマテ通テアル
 アリ肛門ノ邊蓮房ノ如ク成タルアリ足ノ方マテ管ノ届
 クモアリ脱候甚ニ至テハ死スルモノナリ
 脱肛ヲ收ルニハ先荷葉ニテ蒸シ置テ病人ヲマシテ急
 ニ入ベシユルノトシテハ入具合惡シ隨分ヨク荷葉十

トニテ蒸シ温メ和ラゲテ其後ニ油薬ヲ付置ベシトテダ
 マシテ麻油ヲヌリ能ク体ノ向キヲ見合テ手ニテ脱肛ヲ
 持チ其持タル指ノ向フト前トニテカヘノニ根ノ方ヨ
 リタクリコムヤウニノ勢ニ乗メ急ニラシコミジツト手
 ノウラニテオサヘテラレハ内ヨリ出ントノ突ク勢アリ
 後内ニテ轉スル氣味合アツテ勢止ム其時ニ手ヲハナシ
 凡ニ時ハカリモ動作ヲ禁スベシ右ノ通ニモ入ル時ニ
 ハ必大ニ痛テ難義ガルモノナレ凡カマワスノ隨分手早
 クオシ入ベシ初ニ翻花ノアル時ハ其形甚仰山ニ見ユル
 モノナリ

予カ知識ノ醫ニ脱肛ノ持病アリテ時々發シテ甚苦惱ス
ル人アリ或時東都ニ下ル途中ニテ數日駕ニノリシニヨ
リ大ニ宿病ヲ發シ苦痛スルヲ甚シト云凡羈旅中ニテ諸
事不便ナル故終ニ施スベキノ術ニ盡キテ甘草一味ヲ刺
タルヲ主從ノ一介許モミクタキ節ヒテ鍋ニテ煎シ其濃
キ汁ニテ脱肛ヲ洗其滓ヲ袋ニ入テ蒸テ黄昏ヨリ夜半ニ
至リレカハ其痛頓ニ失レタリト也

轉胞胞字此時ハフノ音ニナリテ小便袋ノト也即膀胱是
ナリ内經ニ胞之兩絡繚疾ストアリ先胞ノヒツクリカヘ
ル凡云ベキトナレ凡其處ハ知レヌト也此症ト小便閉ト

云トハヤハリ同ト也其中小便淋瀝ナトハ別ニ淋瀝ニテ
稱スベキト也五苓散ナト用ル症モ轉胞ト別ト云ニテハ
ナレ畢竟轉胞スレハ閉々レハ轉胞スルノ道理ニテ只虛
實ノ分アルマデ也イヨリハ轉胞スルト云ニ至レハ小腹
大ニ突起スルモノニテ先多ハ痛マヌモノ也其痛ムモノ
ハ多ハ一通ノ淋瀝ノ症ニアルモノ也又小便閉ニモ小腹
突起セヌモアルモノ也又疫邪及内傷病ニテモシテ不ク
チニ成シ處ニテ轉胞スルモノアル也是ハ甚キ惡症ニテ
腎中ノ水火凡ニ已ニ絶スル凡云ベキモノト知ベシ若シ
是ヲ一通ノトノ如ク思ト未ダ大ニ誤ルベシヨクノ診

候ヲ詳ニスベキ也總ノ轉胞人症ハ古來多ハ八味丸
 ヲ用ルトニメアルナレモ是モ一定ナレモセラレス畢竟
 其脉膜ヲ詳ニメ用ベキ也或老人平生甚多房家ニテア
 リレカ轉胞病ヲ患フ一醫頻ニ八味丸料ヲ用レモ消滴モ
 通セス延テ數日ヲ経テ痛苦ホニ極リ予ニ治ヲ求ム予
 即柴胡姜桂湯加吳茱萸茯苓ヲ用頓ニ愈ルトヲ得是醫
 初ニ其多房家ナルトヲ聞殊ニ老人ムトナレハ先何カナ
 レニ下元ノ虛ニ目ヲ付ケル故大ニ惑テ治ヲ誤ル也此病
 人ナトハ右体老後ニ及フマテ多房ナルハヤハリ根元ノ
 腎氣人ニスクレテ強キ處アルモノニテ全ク下元ノ薄キ

ニ拘リタル病ニアラス唯左股下拘挛ノ動悸アリ是ヘリ
 レテ水飲ヲシメ上ルニ因テ右ノ症ヲナレタル也又總ノ
 此症ニハ蒸レ葉ヲ用テ甚奇効アリ其法ハ先乾荷葉ヲ細
 ニ剉ニ布袋ノ長一尺許徑四五寸許ナルヲ二ツ製シ其中
 ヘ右ノ荷葉ヲ入口ヲ又イフササテ鍋ニ入水ニテ随分ヨ
 ク煮テ外ニ袋ノ長サ幅ヨリハ少シ大ナル板ヲ二枚設テ
 キ右ノ袋ヲ取出レ板ニノセハサマシホリテ用ユ初ニハ
 甚熱スルユヘ衣服ノ上ヨリ蒸レ次第ニ衣ヲウスクシ後
 ニハ直ニ肌ヘソケテ蒸也冷レハ今六ツニ取カヘテ段々
 ムス中ニハツミテ小便ニ立シト云レ必立スヘカラスヤ

ハリ其マノヲラスベシ立テワキヘ行時ハ少モ通セス是
 大事ノ心得也其尿塊一旦ニハ取レスモノニテ輕キハ七
 日位重キハ廿日ホトモツ、ケテムス中ニ少ツ、其塊消
 スル也是予カ新手段ニテ毎々奇驗ヲ得レ處ナリ
 米ナトフム時フミ誤テ會陰ヲ打上ケテ小水滲滴モ通セ
 ス只血ナト少ツ、出ル症先桃挾承氣湯ナト用テ佳シ若
 其ニテ治セズンハ大黃附子湯ヲ用ベシ此附子ヲ用ル
 進藤玄之數試タル處也一貼ニ附子ニ雙目許ニ用レハ
 早速通利スルモノ也血ノ止ル處マテ用テヨシ又症ニ因
 テハ味ヲ用ユルモアリ

世ニ膿淋ト云モノ其全体ヲトクト考ルニ二種アリ一ハ
 固有ノ症ニテカラミツケラレテ下焦不メタリニナリ塞
 ルニ因テ膿ヲナシテ通ズルモノ也是ハ症ノ取アツカイ
 ラシテヨキモノ也一ハ彼肉蝕痔瘻因テナルモノ也内蝕
 瘻ハ少水ノ出ル道タドレイタケ云也コレニ因テナル
 モノハ下通ノ淋ヲ取アツカイニメカ治セヌモノ也症ニ
 ヨルモノニモハ味丸料ヲ製附入ニメ用テ治スルモアリ
 是ハ下焦ノ手薄クナル處ヨリ痛ヲ動スルモノナリ
 虎杖湯ハ久淋ヲ患テ陰莖末ニタタボクノ出キルト云ホ
 ドノ處ヘキクモノト見ユ此方甜葶藶ヲ用ルナリ

紫金丹ヲ用ルニ咽喉腐爛甚ノ散藥ニ用テモ飲ガタキ
 モクニハ先茶碗ニ塩ヲ入水ニカキタテ、其中ハ藥ヲ入
 ヲクマゼテ用ユレバヨク通ルモノナリ
 宜露風ハ解熱クバカリニテハユカズ婦人ニ多キモノ
 也此症充房欲ヲ慎ムベシ先大抵ハ甘露飲ニ犀角ヲ加タ
 ルヲ用テヨキモノ也其方枇杷葉茵陳麥門石斛サレテ用
 タルナリ又右對症ノ藥ニ含葉ヲ兼用スルモ佳也是予ガ
 自製スル處也其方乾茄子根ニ支齒斷ヲ堅固ニス石榴皮
 五分當歸五分乾芋五分犀角三分上ヲ涼フス甘草二分水
 煎メ含ム或飲テモヨシ石榴皮ハ兎角客主人ガ穴ノアタ

リヨリ頰車ノ邊ノ前ノ方マテノコニ用テ妙アルモノ也
 粉毒ニテ口開カサルモノニ此物ヲ主劑ニ加ヘ用テ暫時
 ニ開ク毎々實驗ヲ經タル處ナリ

落架風ニ醫王ヲ用ルモ両股ヲスカスニ回テ參朮耆ナド
 ノ胃中ヘキイテ來テ舊ノ如クカ、ル也兎角胃中ノ氣薄
 ク成ルニ因テハツレ氣滿レバカ、ルアンバイナリ

對口疽一名腦疽ト云對口瘰ノ名ハナキ也此瘡大抵ハ死
 スルモノニアラズ背ニ發スルモノトハワケ違也兎角老
 婆ニヨク出ルモノナレ思ノ外ムサト死セズ穴アキ腐
 肉ニ成テ取レル也畢竟疽トハ名ケガタキヤウナルモノ

ニテ全体ハ陽腫也サレバ此ニ限ラズ疽ノ字モ處ニヨリ
テ廣ク用ルト見ヘテ療疽ナドモ全体ハ陽ニ屬シタル
モノ也對口疽モ大抵ハ三物湯ナドニテアシラウテヨシ
其上ハ脉症ヲ照ノイカヤウニ變ニ應メ療治スベシ
流注毒ナドモヨク其虛實ヲ分テ療治スベシ此等ニモ膿
癭トテオシテ見ルニ膿ヲ持タルハコツホリト落イル處
アリカヤウナルハ知易シ是ノ見ヘヌハ知カタキ也流注
毒ヲ散ラスニハ外科正宗ノ琥珀膏ヲ法ノ如ニ用ユレ
バ甚効アルナリ

紅絲瘡ハ治セヌモノ、ヤウニ古ヨリ云ヘルニ因リ世上
ニテ此症ヲ見レバ何カナシニ甚恐ヲナセ居是ハイカ、
レテヤ古人モ不治トセレハ大ナル誤也世上ニ疔ニシ
紅絲アルモノト疔ニアラスノ紅絲ノアルトヲ辨セズタ
トイ疔ニテモ紅絲ヲ引タルハ反テ治レ易キモノニテ實
ノ惡疔ハ紅絲一ハナラヌモノ也是レバノ試タル處也
予カ兄公ナドハ此症ヲバ甚易ク取アツカヘリ是モ皆肝
火亢ル人ニアル者ナリ
懸癰ナドニモ一概ニ針ノナラヌト云ニテ公ナシ此瘡ヲ
發スル處ハ皮甚薄ノ尿道ニサワレバ尿漏テ止ザル故ニ
針スルヲキラウ也タトイ針セズニ自然ト破ルモノ

也得テハ自破タルニモ尿ノ漏ルハアルモノ也別ニ此
 症ナレハ針ノナラヌト云ワケニテハナキ下也
 外科正宗ナトニモ動脈アル腫物ニハ針ヲ入テ勿レト云
 ヘリナルホト切破テハ決ノ害アリ此ノ如キハ皆血瘤也
 又血瘤ノ自然ト皮ノスレ破タルハ翻花ノアルモノ也不
 巧者ナル醫ハ此ヲ見テ真ノ翻花瘡トテサワクモノ也
 筋瘤肉瘤血瘤ハ必コレヲ切ベカラズ粉脂瘤膿瘤ハ切テ
 苦シカラヌモノ也何レニコブ類ナレハ流注トハ是非其
 形違モノ也粉脂瘤ハ兔角内ニテ袋ニ成テアルモノ也
 蕎麦ノ功能ハ全体先胃中ヲスカスモノ也胃中スク時ハ

則心下ナドモスクモノ也此能ハ河漏麩ヲ食ノモ知ベシ
 又久腹痛ノ病人ニ蕎麦ヲ食餌トサセル人モアル由是ハ
 一ヲ知テニヲ知ラサル見識凡云ベシナルホト疏通ニ宜
 シキ人症ナラハ此モノナドヲ食ルモ佳也若附劑ナト用
 ル症ニ一概ニ蕎麦ヲ食セルハ大ナル誤ト云ベシ扱此蕎
 麦ハ只胃中ヲスカスバカリニアラズメアヂニ面白キ切
 能アルモノニテヨク肝部ヲスカスモノ也便毒ナトノ所
 謂潰膿セヌ容子ニ見ユルモノニ芎黄散ニ蕎麦ヲ組テ用
 レハ甚アヂヨク下ル也此症ニハ只芎黄バカリ用テハア
 ンバイヨク下ラス故ニ此具合ヲトクト考ヘ見ルニ胃中

ヨリノ心下胸中及両腋章門通ヨリノ小腹ツケ根ノアタ
リヲスカスモノト見ユル也又便毒ニテ潰膿ノ勢ハ見ヘ
ナカラジリノト引コムモノアリ是ハ一通リ内托ノ劑
ガド用レハナラノト引込モノ也此場合ニ至テ家方三物
湯ヲ用レバ思ノ外ヨク浮立ツトアリ若此症ニノ陽氣ウ
スキモヤウ見ヘバヤハリ三物湯ニ附子ヲ加ヘテ用ユベ
シ若又右ノ藥ナドヲアヒルホト用テモ浮立テウニモセ
ズ然ラバトテ一向ニ消シモヒ子疝トカク引込ム勢アル
者ハ別段ニ引ノキテ治ヲ施スベシカヤウナル症毎々ア
ルトユヘ予トクトユ夫スルニ固有ノ疝ニテシメ付ル故

十分ニハルコトアタワズムジリノト引込モノ也此症ハ
必其方ノ腹底ノ疝ヲオセハ手モサヘラレヌホドヒツハ
リ痛ムモノ也コレニ因テ四逆散ヲ用テ見合ニ附子ヲ加
ヘ或又附子マデコ及ハザルニハヤハリツ子ノ加減ニテ
アレラウニ甚奇効アリ此藥ヲ用レバ疝ノレノコミユル
ムユヘ十分ニハリ出ス下出キル也讚別丸龜ノ吳服所何
某右ノ症ニテ諸醫効ナカリシガ此取アツカイニテ早速
治シタリ其外治驗數多シ芎黃加蕎麥ヲ用ユルハ初ヨリ
ノ所詮潰膿ニナラヌト見テスルコト也其外ノ手段ハ潰膿
ノ勢見ヘナガラ引コムヤウニ見ユルヲ取アツカウモノ也

芎黄ニ蕎麦ヲ加タル方ヲ近來天刑病カ、リノモノニ用
 エルニ面白キキ、場アリ此ノモト或傳書中ヨリ出タリ
 蕎麦ノ効アルモノト見ユ
 便毒ナドモ初ニハ肉食サセテ苦シカラス魚口ト便毒ト
 ヲ左右ニ分チシハ拘リ也是ハ両方ニ同症ナリ
 嗅ギ藥ヲスル時水ヲ含ハ藥氣ヲ腹ヘヤラヌ為トテスル
 一也今一ツニハ口ヲ損セヌヤウニト也然レ是ハタワケ
 タルニテヤハリ腹ヘモ行キ口モタハレテ大ニ臆眩ス
 ルモノナリ
 嗅藥ハ先丸藥ト同道理也只ザウサナル故用ニタキモノ

便毒

也是モヤハリ内ヨリ療スル一ニ成也一概ニ廢存スベキ
 ニハアラザレハ大抵ハ丸藥ニテスムモノノ何レモ皆用
 ル前ノ海火大事ト心得ベシ
 食塩ハヨク咽喉ヲヒラクモノ也故ニ食ノツマルトキ先
 塩ケニテ咽ヲシメシテ置テ後ニ食スレバ通ズルモノ也
 一人結毒ニテ咽喉腐爛シタルカ兎角飲食ニ咽ヲ通ル
 具合惡シトテ藥ニマテ塩ヲ入テ飲タルアリ此人全体
 血燥ツヨキニヨリ主方ハ四物湯ニ桔梗湯ヲ合シ知柏忍
 通羚羊ヲ加ヘタルニ紫金散ヲ兼用シテ愈ルヲ得タリ
 全体毒氣アル人ノ体ニ發シモノナドアル時分ニハ茸類

ナドハ食スルヲ禁スベシ當時發動ノナキニハ食ノモ
 苦レカラズ
 癩瘡結毒ノ症ニ粉劑ヲ用暝眩シタルアトニテ口ノ開カ
 スヤウニ成ルモノアリ甚レキモノハ飲食言語ヲモ妨ケ
 テ至テ困リシモノ也前方吉野屋何某ナル者是ヲ患テ甚
 苦惱セリ種々藥餌スレテ治セズノ後終ニ歿ニ至レリ又
 祇園町ノ舞妓癩瘡ヲ患ルアリ予化毒丸ヲ投ス此モ暝眩
 ノ後牙関緊閉ヲ致シ後段々虚候ヲ見シ終ニ死シタリ其
 後周防岩國ノ一商此症ヲ患ルヲ已ニ五年ナルアツテ治
 ヲ予ニ求此時不圖思付一方ヲ投ス服スルヲ六十日許ニ

ノ愈ヘテ口開テ舊ノ如キヲ得タリ其ヨリ已來數試ニ奇
 驗ヲ得今ヲ以テ見レハ先ノ二人ハ隣ベキヲ也兎角此處
 ヘキク者ハ石榴皮ナリ症候ニ隨テ四逆散其外ノ主劑ニ
 倍加ナトニメ用ベシ此症ハ下地ヨリ肝部ヘカモレ合セ
 タル處ノ熱ヘ粉毒ノゴテ付テ成ルモノ也故ニ石榴皮ハ
 其熱ヲサバキ峻ニ肝部ヲユルムルアンハイアリテ牙関
 近處ノ筋ヲヨクユルムルモノ也兎角此暝眩中ニ多熱毒
 ヲ畜ヘゴテ付テ引ハルモノ故全体ハ緊閉セヌ先ヘ廻ツ
 テ彼暝眩メ口内腐爛メアル中ヨリ用テ佳シ又此物平生
 食メ見テモ其酸味頗車ノ違ヘコタユル者也故ニ未ダ試

スト云へ庄落架夙ノクセアル人ニ多用タラハ其患ヲ免
ン又貫衆石榴皮ト組タルハ右ノ場處ナトニ痛モアルト
云處工用ルコトナラン貫衆ハトカク咽喉中ノトニ用タル
コト多シ然ハ此牙關ノ處ノ或ハユルミスギ或チバムハ畢
竟瘕瘕ノ症ノ左ユルメハ右チバミ右ユルミタルニ左ノ
チバムモアルト同道理ニテ緩急庄ニ同ク肝経ニ歸ス是
濕毒ハ固ヨリ肝経ヘカハルヲ以テ也又粉毒ニテ口中腐
爛スル者ニ石榴皮松脂等分煎服ノ奇効アリ
粉劑ヲ用ル前ノ手アテハ上ニ述ル如ク兔角泻火ヲ肝要
トスヘシ畢竟打撲ノ症ノ取アツカイニ先水ヲ泻メ後酒

ヲ服セシムルト同トニテ何レモ先泻火スルヲ第一ニ心
得ヘシ打撲ノ症モ初ニ水療治ヲレテヲケハ其アト餘リ
腫ヌモノ也格別ノ大傷ニハ未試庄輕症ニ於テハ數経験
アリ其法別ニ記

或人ノ處ニ秘藏セル庭木ノ松ツ上ノ方ニクサリソ入シ
ヲ見テ妙薬ナリトテ其處ヘ水銀ヲ入タルモノアリ其ヨ
リ十年許ニシテ其松ノ根ノ處ヘ穴アキテ右ノ水銀流シ出
ホトナク松モ枯タルカ其枯木ノ中ニ水銀ノ通シ穴アリ
シト也實ニ恐ベキモノナリ

梅毒肺部へ聚リテ哮喘アルモノ其状常ト異也全体此症

得テハ難治ニ至ルモノ也又産后暴喘モ甚悪症也是ニ
 ハ灸ノ十ニメ六七ハタスカルモノアリ其灸別ニ傳アリ
 此灸ヲ梅毒ノ喘ニ移メヌベキ工夫アレハ未試處也
 梅毒ノ關節ニ聚テ脚ノカハムナトハ一通リニテハ行ヌ
 モハニテアガナレテイアリ兎角關節ヲ疏通セ子ハナ
 丸下也症ニ因テ茯苓建中加味ノ方ヲ用ルモアリ
 結毒ナトアリテ血燥セルモノニ先潤燥ノヲヨリスルハ
 譬ハ種子ヲ耕トハ先地面ヲナラズヤウナルモノ也
 又毒アツテ血燥セルナトハ大根ナトノ煮ヘ損レタル如
 キモノニテ急々ニハユカメトト知入レ

梅毒結毒ノ症龍腦真珠丸白丸子五寶丹ナトニテ効ナキ
 ニ用ルニ紫金丹ヲ以テス大抵一日三十粒許ツ、兩度服
 スヘレ一僧久年ノ結毒ニテ會厭ノ上ニ赤小豆許ノ穴ア
 リ且舌本突起ノ愈サルニ紫金丹ヲ用漸々ニ平快セリ先
 此丸ハ何ヨリモ咽喉腐爛ノ症ニ用テ奇ナリ
 一人孤獨ノ者ナリレカ初梅毒ヲ患フ然ハ格別ノ劇症ニ
 モアラス久ノ後癩ヲ發レ人ニ對スレハ限ナク笑テ止ス
 是足牽縮レ目閉明ヲ蓋ルニハアラス只毒ノ残レルニテ
 目ヲフサク也コレヲ見ントスルニ開カカタレ舌本ハ具
 合悪ノ言語爽ナラス抑肝散ニ麦門石膏ヲ加タルヲ用レ

カ餘リクジケカタキニヨリ紫圓ヲ用テ下ヲ得タルニ初
ハ快ニ似タレ下ニ随テ及テ其足率急スルヲ甚多ナリ
テ立テ能ス然レ下全ク弱リタル症候ハナレ只イヨ
目ヲフサクユヘ先下劑ヲ止メテ悠長ノ治法ヲナシヤハ
リ前ノ湯劑ニ白丸子ヲ兼用シテ一日ニ三粒ツ、二度用
ユ舌ユルミモノ云テ自由ニナリ笑テモ段々ウスク目モ
ハツキリトアキ足モ獨歩スルヲナリ出シタリ是肝氣ト
全体ノ毒氣ト下ニユルミタルヲ以テナリ
扱毒ナトニ反鼻ヲ用ルヲアレ下今一イキノモノ也予昔
多用試タレ下サレテ奇効ナカリレ故今用ヒス是ヨリハ

家用ノ羚羊角ハ別ニ奇効アルモノ也毒ハ筋骨ニ付タル
ヲ治シ或沈痼ノアル毒又ハ骨腫ノ魚ノ骨ノ腫タルモノ
ノ如キ者トニ妙ニキクモノ也近年マテハ鹿角ノ黒ヤキ
ヲ多用タリ又白ヤキノ角石モ用タレ下今用ル羚羊ホト
ノ効ナレ羚羊ハ格別ノ効アルモノナリ
結毒眼ニ入レ者ホホニ粉劑ヲ用ルニハ兔角前方ニ黃連
解毒湯ナトヲトクト用テ其火ヲ置テ用ヘレ左様セ
サレハ粉ヲ用シアトニテ火勢ニテ毒コゲ休テ甚惡レ東
洞家ニテハ粉ヲ用シアトニテ下劑ヲ用ユル下也トク
ノ、教ラレタリ故ニ後方ト云モノアリ然レ下アトニテ

下シテハ具合宜カフス先淳火シテ置テ後ニ粉劑ヲ用ル
 汰佳トス淳火スルニハ兎角黃連解毒ノ下也此症ノ火毒
 ハ別段ニ甚シキ者故土茯苓劑ヲ用ルニモ粉劑ヲ用ル
 モ隨分トヨク淳火ノ置テ其後ニテ用テ火勢ノユル
 シ期ヲ知ルニハ小水ノ清濁ニ氣ヲ付ヘシ且日ニ日清
 之疾モ又濁ルモ故幾時モ以テテヨク清ミ切タラハ
 其處ニテ用テ又淳火スルニハ症ニ因テ入參敗毒散合
 黃連解毒湯加石羔方ヲ用ルモヨシ此ハ其場ヲ見ハカラ
 ウテ何レニモスヘシ且又ハ其病ノ入參ノ劑ニテハ
 結毒ニ因テ向ニカテ驚ニ成テモハ柔他入参リ見テハ

隨分明ナルヤ收ニ見テ目ノ昏赤ナルモノハ向ニ音
 聲ノ啞シタルモノトハ不治也其中大ナル聲ノ言フハ
 聞ユル由云位ナルハ絶房サセテ且夕取アツカヘハ愈ル
 アリト云々
 結毒眼ニ入テ瞳入缺タカハ打付テ粉劑ヲ用テ下也外
 藥ノミニテハ行支モノ也粉劑ヲホク且久兼用レハ復圓
 満ニ成モ从也然レ毒深キハ圓満ニ得復セズ不緊
 小京ナルモアリサレハ已ニ神水ノ流散シタルモノハ治
 也又モ余ナリハニテ只盡キテ下出ルニハ限行代モ
 星目ハ星ノ大小ハニ隨分テハ愈ルモノ也其中小未方

公早速愈レ在太ナル星ハ當分凶成テアル未レ在此モ
 後ニハ愈ルモノニテ只遅キマテ也此症ニハ別ニ外ヨリ
 モ取テツカイアリ
 総メ目ハ外日湯冷スハ先惡キ因也鉢ニ湯ヲ入其中
 熟艾ヲ入テレボリ土テハ目ヲ蒸ニ又浸メハ以ボリテ蒸
 時ニ甚佳モノ也又生ノ青木葉ヲ直ニ火ニテアテテ少眼胞
 ノ上ヨリアタ、ムルモ甚佳モノニテレカモ其アトモ燥
 則モレヨク解熱スル功アルモノ也水ヲテ目ヲ冷メハ
 上ニテクワツノ、トメ燥テ惡キモノナク言クハ
 雀目ハ總テ肝脾ヲカ、ルモノ也此症ニ平胃散ヲ用ルモ

ヤハリ咳嗽ニ小紫胡加減ヲ用ル場合ト同道理ニテ只火
 フオモニ畜ルト水ヲオモニ畜ルトノ違也雀目ニ木一味
 用ルモ同シ道理也目ハ五藏ノ精華トアリテ五藏ヘカ、
 ルハ勿論ナレ在取分テハ肝脾腎ト組合トナリ
 雀目又ハ晝モ目ニ何事モナクノ只見ヘノミ惡キモノニ
 唐白朮末一升ヲ用テ盡メ毎々奇驗ヲ得ルトアリ是胃中
 ノ水飲ヲサハクユヘナリ
 肝實ノ眼ニハ大柴胡ヲ用ヘシ
 眼疾ヲ患ル人ニ灸ノ奇効得ルト多キモノ也眼科ニテハ
 多ク灸ヲ禁スレ在是ハ一概ニ拘リタルモノ也ヨクノ、

其時宜合ヲ考ヘテ灸スベシ眼中青黄ハリテ見ヘアシク
 終ニ盲ニ至ルモノアリコレハ黄風雀目ニハアラスヤハ
 リ内障眼也此症ニハ明目湯ヲ本製ニメツ子ノ劑ホトニ
 合セ用テ奇驗ヲ得ルノ數多シ黄風雀目ト云ハ千里ノ
 ノ如ク白睛中ニシボカ、リテ黄ニナルモノ也シボノカ
 カルカ此症ノ的候也黄風雀目ト肝虚雀目トハ書モ見ヘ
 惡キモノニテ畢竟キツト雀目ト云ヘキモノニテモナシ
 黄風ノ方ハ治スレハ肝虚ノ方ハドチヲヨリ見テモ烏睛
 白睛腫人凡ニ少モ云分ナキ如シ故ニイカホト上手ノ眼
 科ニテモ病人ヨリ云サレハ其惡キヲ知ラス是ハアキ

メクラ也サレハ死スルモノニハアラス只其目ノ病ハ不
 治也青管バ又別ノ下ニテ目ノ惡キヲ外ヨリモ見ユルモ
 ノ也黄風ノ方ハ虚候ニテハ味丸モ用又明目湯ニテモヨ
 シ又唐白朮末ヲ主劑ニ兼用スルモヨシ此症ナトニ明目
 湯ヲ用ルカコトキハ一通リ眼科ノスル手段也ハ味丸ヲ
 用ルニ至テハ黒フ人手段ト云モノナリ
 何某ナル者風眼ヲ患兩方凡ニ痛甚シ或眼科術ヲ盡セハ
 治セズ予涼膈散加羔ヲ主劑トメ備急圓ヲ多用イ病勢餘
 ホトユルミテ後ハ丸藥ヲ停メ久シク前湯ヲ服セシメテ
 全治セリ風眼ハ全ク肝風亢極スルノ最甚シキモノ也雷

頭風モ同根ノ症也スヘテ外來ノ邪ニテハナキモノ也
 結毒眼ニ入テ瞳人半月ノ如ク缺ルモアリカヤウナルハ
 物ヲ見ルニ其形盡ク半月ノ如ク見ユルモノナリ
 眼科柚木太淳ノ父或人ノ目ヲ療治シタルニ希有ナル症
 アリ其症衆醫皆以テソコヒ也ト云シヲクイノ立シ也ト
 テ烏晴白睛ノサカイヨリ鯛ノ骨ヲホリ出シテ愈タリ其
 後ニ右ノ病人ヤウノ思出シタルニハルカ已前ニ鯛ノ
 料理ヲスル時目ノ中イサノハトシテシキリニ痛シヲ手
 ニテツヨクスリテラキニトアリ定テ此時入シモノナラ
 ント云ントナリ

眼病ノ秘灸諸眼ニ妙也カ
 ヲ失フモノモ治スルヲアリ試験ノ方也其灸法會厭ノヲ
 クニ鼻ニ通ル穴アリ此穴ノ上廉ニ灸ス○此ノ如ク穴ヨ
 リ頭部ノ方ノカドヘスル也毎日七壯ツレテヨシ
 小瘡ハ初ニ先發表スヘシ荆防九文加石ナトヲ用テヨシ
 カセクチニ蒸湯ニ入ヘシ小山忠兵衛ノ蒸湯ナト効アル
 方ナリ輕症ハ只逐不散シタル切ニテ佳キモノナリ
 硫黄ハ先外ヨリ付レハ出モ入ヲ内ヘオシヨミカワカス
 モノナリ内ヘ飲テハアチニ虚寒ヲ温ムル能アルト見
 エテニ氣丹來樓丹ナト用テアリ

杉浦翁ノ話ニ或人夜中ニ手水鉢ノ邊ニテ物ヲ吐出シ
 朝コレヲ見レバ小玉百目餘アルニ似タリヨクハ
 ハ皆ヘイサラバサラ也ナルホド前夜吐シタル寸バ
 々ト堅キモノノヲチル音シタリト也又或人膝ヨリ
 サバインノ如キモノ出タリ先生又曰中西氏ノ齒
 斷ヨリ形ハ鋸ニ似テ骨ノ如キモノ出タルヲアリ
 提肩散ナト肩ノ痛ニ用テ餘リキカヌモノ也川芎
 ナトモ尺頭痛ニ用テハ同クキカヌ古人ト云ヘ
 尺分ケヲモ立スノ枝葉ニ取付キタル下數多シ
 ヲクワケノ立シト立サルトヲ考用ヘシワケ
 立シ藥ハ用テ妙用アルモノ也

杉浦ノ翁ノ傳ニ耳痛ニ用テ百發百中ノ奇方
 白花ノアザミノ根ヲ生ニテスリ其汁ヲシ
 タンデ入テ妙用アリト也鼠毒ニアタリ
 タル入ハ滿身チラシク赤點又ハ疣瘡出キ
 ルモノ也ト外大ニ如シク古方中ニハ
 鼠毒ノ症ニ昆布ヲ湯ニ漬メ疵ヲムシ
 又食用サセテ甚ク奇効アリトハ
 薩州ノ留守居樺山何某ナリ此人右足
 痛アキテ十五年騎馬歩行凡ニ十丁ニ
 モ至ヒガ甚足麻痺ニ用ラレズ六月
 上旬ヨリ予ニ治ヲ求ム予トクニ診察
 大柴胡湯又用ユレ時ニ病人ニツカラ
 云是ヨリ先巴遂大黃ナド數ク用ユレ

凡初ハ下リテニ三日ニ至レバ下ラズ何分大黃ナレハ下
ル下ナレト云ハルヲカマワズ凡タリトカク大黃入リ藥
ハ不兼知ニテアリシカ凡色々ニ利害ヲ説ク強テ本方ヲ
用ル中同月中旬ニ至ルテ風邪ニ感シ熱アル由云コセル
故行テ見レハ熱氣ハ強ケレ凡風邪ノ容子ニハアラス初
ヨリ是ニ至テモ右大柴胡ニテ一日一二行ツ下利アリ
ニ日ヲ終テ後大ニ腹痛ノ古キ雜巾ノ如キモノヲ下スト
夥モワカメヲカタメタルゴクク長ハ九寸ツハモアリ
中々容易ニ切レス凡十四五日許引ツハケテ右ノ糞物ヲ
夥ク下レテサツハリト解熱シ痛ニ止テ足ノ麻痺スルコ
ト

ヲ忘タリヤカテ其近日ニ暑天ヲレノキ惟子ノ着カヘラ
四ツ持セテ初テ北野ノ代ニ往來凡步行シ午時ニ歸リ
テ又直ニ東福寺へ行テ暮方ニ歸テ又夜中細川屋鋪マテ
行ケリ是ヨリノ實ニ十五年來ノ苦惱ヲ免レ八月ニ交替
レ後琉球勢ニ行シカ彼ノ地ヨリモタヘズ書簡ナドサレ
コセリ今用ル處ノアワモリヲ入ル陶器ナドハ其人ヨリ
贈レルナリ

平日口中ニ臭氣甚シキモノ大抵丈夫ナレバ大黃石羔ノ
類ニテ下メ取ルベシ
予カ姪猶林昌嚴話ニ寛政乙卯ノ春一諸侯ノ大坂屋鋪ニ

テ役人トモ争論ノアリテ五十三歳ニナル者ヲ双傷セ
ルガ其疵背ヨリ左乳ノ上ヘツキ通シタルモノニテ疵口
ヨリ呼吸漏タルヲ昌巖至リテスイ收シカバ息モ出ザル
ヤウニナリ漸々狭クシテ疵口モトクトラサマリ糸ヲモ
ヌキスツルホドニ成テヨリ喘氣甚クナリシヲ麻杏甘石
湯ヲ用テ喘氣モ餘ホドヤウラギタリ然ルニ初疵ヲ受タ
ル左ノ方ノ肩ヨリカイナヨコハラニマデモ悉ク皆指ニ
テオセバ袋ノ中ニ砂ヲ入タルヲオスコトクシヤキクト
鳴レリサレレビルハモナクノ手モ自由ニ用フレ只
指ノ下ダケハツマミテモシヤギノト云マテニテ右邊ノ

何トモナシモトツキ疵ノナル故自然胸中ニ瘀血ノ殘
シモノカトテ便秘モアリシユヘ四物湯ニ大黃紅花藤木
ヲ加ヘ用タレバヤカテジヤキ付テ止テ平快セリト也
予コレヲ考ルニ自然肺葉ニキツツキテ肺氣肌肉ヘ分布
得セザルニヨリ血ムラナト出キテ瘀血ノタマリ且肺家
傷ヲ受タルユヘ喘ナトモ出タルモノナラン歟何ニモセ
ヨ餘ホドノ奇症ナリ

松原才治即ト云レハ東洞老人及東洋ナトノ師ニ今其ア
ト若狭ノ住ト成リシカ先達テ已ニ没故セリ其松原家ノ
流義ニ龜胸龜背ノ類及スベテ痿躄ナトノイカヤウニシ

モ其病動カヌモノニ用ル薬アリ龜背丸ト名ク其方大黃
一味ヲセシメウルシニテ丸シ其ヤワヲカナル中ニ一日
ニ一匙目許或ハ一晝夜ニ二匙目許ツ、最服用ハ夜分ニ
スルヲ佳トス此薬ヲ用レバ満身赤クナリ或腫テ大熱ヲ
發ス此瞑眩ニ因テ病動也即其アトヲ見ハカラウテ對症
ノ薬ニナラスベシ先一瞑眩サセテバラシク丸薬ヲハ引
テ他ノ薬ノミ用ベシ
白丸子ハ手丈夫ナル人ニハ三粒ツ、一日ニ三度モ用ヘ
シ手弱キ人ニハ二粒ツ、一日ニ二度位用ヘシ格別手強
ク用テハ及テアシ、コレヲ用レバ多ハ下利アリ葛粉ニ

テ衣ヲカケルニハ何ン遍モ厚クカケテ佳カケテハ又ウ
ルヲレテガケルナリコレヲ用テ若齒ノウクナト云モノ
ハ先休セテ後用ユベシ
水ニ溺レタル人ニ枯礬ヲ用ルハ吐ヲ取ルノ手段也
江州何某候メ侍醫中里忠庵ノ話ニ其國ノ人金井某ノ小
兒或時後苑ニ遊テ天南星ノ實ヲ採食シ大ニ瞑眩ノ呼吸
ヲツキツメ黒涎ヲ吐キ言フ能スメ只ギクノト云ヘル
ヲ見テモリシテアリシ若黨モ已カ罪也トテ同ク採食ノ
大ニ苦惱セリ時ニ忠庵工夫メ生姜汁ヲ灌ギシカハ兩人
ト頓ニ醒タリト也姜汁ノ中假リニ天花粉ヲ入シトナリ

白鳥ヲ食スレハ大ニ齒ヲ損スルモノ也野猪肉ヲ食スル
 モ亦然リスヘテ肉類ヲ多食スレハ熱ヲ生スルモノ也
 船ニエフテ水ヲ吐キナトスルヲ船注ト云此注字ハ水注
 ノ注ニテ水ヲ吐處ヨリ取レモノ也只船ニエフタルハ船
 暈也全体ハ水ヲ吐ヌモノヲ船注トハ云カタキモノ也
 巴豆ニマケル人ハ漆ニハ危ホトニマケス漆ニマケル人
 ハ巴豆ニハ危ホトマケヌモノ也コレ猶雷ヲ強ク畏ル、
 人ハ地震ニハ餘リ畏レズ地震ヲ強ク畏ル、人ハ雷ニハ
 餘リ畏レサルカ如シ
 総メ人ハ十九二十九三十九四十九ナト、云處ニテ用心

スヘレ兎角九字ノ付タル處ハ大關係ナリ

一富商ノ母年病ヲ得テ寒熱羸瘦不食思慮舒暢セズ理氣
 湯加柴ヲ用イ出養生ヲス、メテ段々論說ノ移性變氣サ
 セタルニヨリ心志ハ餘ホド舒達セリ扱其人初ヨリ痔ア
 リトテ未ダ予ガ治ニナラザルヤキ一醫其痔ヲ療スルノ
 方劑ヲ處シタレ凡其瘡ヲ見セザルユヘ醫モ其イヨ々々
 痔ナルヤ否ヲ知ラズ今ニ至テ依然タリト也予色々氣ヲ
 付ケ見ルニ兎角結毒ノ候アリ故ニ朝戲半分ノマウニシ
 此病人ハカサカキ也是ニテハ追付鼻モクヅレンナド、
 云又痔アレバ其隣ユヘ定テ陰門ヘモタバレナド付ベシ

ナド、餘處ナガラニタツヌレ所初ノ内ハ只笑マフニ
其實ヲ云ズ段々説ク内少シハ其ハシ々々ヲ明スニ至ル
故ニイヨ々々梅毒ナリシヲ察シタリ且時々下血スル
アリテ身中少ク黄色アルニヨリ一日三度ツ、鉄丸ヲ
用イ其一度ノ中へ白丸子一粒ツ、ヲマジへ服セシメテ
漸々ニ起臥モ自由ニナリ満身ニバラ々々ト毒ヲフキ出
シタリ

一 貴人若君年既ニ九歳ナレ所從來多病ニテ其平日ノ状
三四歳ノ兒ノナストコロノ如シ然レ皮甲錯レ胸前突起
ノ既ニ龜胸ノ形アリ且小便頻數ニノ連夜尿床ノ患アリ

故ニ侍女ヲシテカワル々々寐スモコレヲ防ガシムト
云へ所少シク隙アルナハヤガテ遺失セラル諸醫下元ノ
薄キユヘトメ八味丸ナドヲ用上イヘ所寸効ナレ予診視
スルニ頗毒候アリ因テ馬明湯ヲ進ムレハ數月ニメ小水
頻ナルモノ遠クナリ遺失ノ患全愈へ龜胸漸ク以テ平ナ
ルニオモムケリ
結毒アル人得テハ胸痛ヲ患アルヲ多シ去ナカラ是ニハ
只敗毒類ノ藥ヲ用タルノミニテハ兎角ホトヨク治セヌ
モノ也此症多クハ心下腹下ノ拘挛ニテ毒ヲシメコムト
強キ故毒氣結聚ノ痛ヲ發スル也故ニ其腹候ヲ詳ニメ四

逆散合甘艸乾姜湯等ノ藥ヲ用テ心下脹下ユルム時ハ立
ニ痛ヲ忌レ胸膈面部ナドハ疹子ノ如キモノ發スル也此
等ノ處肝ヲユルムルヲ先トスルナリ
病人ノ肩カイナヨリ腕ナドヲ或サスリ或ツマミテ見ル
トハ皮膚肌肉ノシマリアンハイヲ知ンカ為也精ク見覺
ルレハ木抵是ニテモヨク虚實ノ分ルモノ也又全体ニ毒
アルモノナトハ其人ニヨリテ腕ノ内ツラニ隱々トノ黒
赤テモナク紫ニテモナキ斑點ノ如キモノアルアリ是
ハ胸ナトニモアルモノ也又天庭ノ毒色ナトモ見ヘ易キ
者ハ黄色ナルニテモナケレハ黄ハミタル如ク光ルテモ

ナケレハ光ル如ク燥クテモナクハ燥タルヤウニ見ヘテ
何トナク色悪キモノ也サレハ又高貴ノ人ナトハ皮膚雪
白ナルニモヤハリ其白キ中ニ毒色ノ見ユルアリ毒ノ見
ヘカタキニ至テハ其診イ甚骨ヲルハモノ也トカク病人
ハ先望タル處ニテ大概其容子ヲ察スヘシ即四診ノ第一
也然ルヲ先脈ヨリメワリ付ントスルハ僻下也望ヨリ始
メテ脈腹ニ終ルヘシ切ト云ハ脈ヲ切ニスルトニテ腹診
モ其中ニコモレリト心得テヨレ
腋臭ヲ一旦防ニハ朝々湯ヲテ下地ヲヨク洗テ蜜陀僧末
ヲスリコメハ當分ノ防ニハ成モノ也此症煎湯ヲ用テハ

角ナド用ニハコヤノ道理ヲヨク辨フベキ也世醫只毒
アルニハ犀角ナド用テ其毒ヲ解スルトホカク思ハ上ヌ
ハリト云ベシ毒ア出ル必以ルヘサレテ水氣ア以マリ其
水氣ニ因テ毒イ自々解スルコト能ハス故
ニ犀角ナド又以テ其水氣ノ胸膈ヘレマリタル處ヲスカ
レサハ次バ毒氣ニ自然ニ解スル也コレニ因テ毒氣ナク
メ唯水氣ハカクノ處ヘモ羚羊角犀角ナドハ用ル也宋
元ノ時分ヨリノ癩症ニ直ニ羚羊犀角ナドヲ用タルモア
リ毒ハ有無ニ拘ハラズ是ヲ以テモ知ベシ總ノノ藥能
ヲ弁ズルニモ種々ニ用タル處ヲ錯綜シ見テ其本ツク處

ヲ會得スベキ也先何レモ角類ハ專ラ胸中ヘ行クモノ
ニテ今一ニハ家用羚羊ナドハ末ニモ走リテ手足ノ骨節
ニ毒ヲシメタル處ヲサバクノ能アル也梅毒ナドハイタ
ニハ下部ニアリテモ必心下ノ容子違テアルモノナリ天
庭ノアタリニ黯色アルヲ相家ニテハ病色ト云也是ハ思
慮鬱結スル人ニアルモノニテ鬱結開ク時ハ其色自消ス
ルナリ

七骨皮ハヨク關節ヲ疏通スルニハ解毒ノ一ニ効アル也
家用ノ羚羊角ハ結毒ノ骨腫ヲ治シ并ニ頭部ノムク々々
ト高クナリタルヲ以テモ治ス同類相求ノ意ニテ先骨ニ

入タル毒ヲ主治シ其傍胸膈ノ飲ヲモヨクサバクノ能アリ何レ此類ハ草根木皮ノ及ザル處ヲ治スルモノト心得ベシ
 大抵四十歳許前後ノ處ニテ肩背臂肘ナト痛ノ患アル者ナリ此症ニ外科正宗ナトニハ苾硝劑ヲ用タル處アリ此等ノ了簡ハ今一イキ面白カラヌト也ヤハリ脉腹ニ本ツケテ方ヲ處スヘシ
 家方三物湯ハモト攝州山田ノ或俗家ノ癰藥也其近邊癰ヲ患フルモノ醫ニ求メズモ皆此藥ヲ用ユ故ニ其家此方ヲ以テ大ニ富ラナス是ヲ以テ甚其藥方ヲ秘メ世ニ傳ス

必子カイ立チヨリノ家來ノ最謹慎ナルヲ撰テ製藥ヲ主ラシム即其家來自ラ山ニ上テ藥ヲ採リ極細製ニノ布袋ニ入上ラ封ノ病家ニ與ヘ其煎シ滓ヲモトヘカヘサシムモシ又病家ニテ開キ見テモ極細製ユヘ知レズ其製藥ノ役ヲヨク務シモノニハ田畑ヲ取ラセテ妻子カケテ四五口モ安樂ニ暮ラサシム其家來ノ中一人大病ヲ患ヘ予ガ凡公ノ療治ニテ全快ヲ得テ殊ニ其恩義ヲ思フアリコレヨリ前凡公色々ノ此癰藥ノ方ヲ得ンコトヲ欲スレモ未ダコレヲ得ズ然ルニ右ノ病人段々全快シタルニツケテ何コトニテナリモ活命ノ恩ヲ謝シタキ由ヲ云ヘルニヨリ

テ右ノ藥方ヲ望シニ此男謹慎家ニテ段々右ノ家法ノワ
 ケ合凡ヲ云何分他へ傳へガタク既自身スラ主家ヲ退テ
 ヨリハ調令メ世ニヒロムルヲ成ラスコレガ為ニ別ニ田
 畑ヲ分テヤスク世ヲ渡ルヲ得然ルヲ他ニ傳テハ主家
 へ對シ大ニ道ニ背キレカラハトテ今此恩ヲ蒙リテコレ
 ヲ傳へザルモ義ニ於テ缺ルヲアリトテ其藥方ヲ書付テ
 ワザトオトシテ拾ハセタリ是即今用ル處ノ三物湯也此
 藥全体癰ニ用ルニハ半紙ニツ切ニシ其帛ニ圓クナルホ
 トノ大劑ニ調合シ水五合入煎メニ合半ニ至リ一日二貼
 ホドツ、用ユ若煎汁多メノニカヌルモノニハヨク煎シ

ツメテ用ユ初ヨリコレヲ用レハ多或ヤキカ子ナドセズ
 ノ始終此藥一方ニテ大抵ハスム也コレヲ用レハ暫時ニ
 高ク焮腫ノ蜂窠ノ如ク穴アキテ水出ル也潰爛ニ至ルト
 キニハ腐肉トロ々々ナシテ取レテ生肉上ル也此藥肉ヲ
 通シ血分ヲ通ズルト見ユ畢竟疏通ノ劑ナルユヘヨク内
 托スルト見ユ實ニ靈方也其藥ノ尋常ナルヲ以テコレヲ
 輕視スベカラズ先切用ノ著キヲハ瘰癧ナドニ用テ甚効
 アリ又飯タキノ女ナドノ指ノサキノイタムニ用ユレバ
 ワヅカ二三貼モ用ル中ニブツ、リト腫上ル也故ニ風毒
 流注ノ未ダ潰ザルモノニ用レハ消スベキハ消シ潰ユベ

キハ潰ユ此症未々膿ヲ成ザル者消散サセタク思ニハ内
此藥ヲ服メ外ヨリハ外科正宗ノ琥珀膏ヲ貼メヨレ此膏
ハ酒及大蒜ノヲモニキクモノト見ユ外々ノ藥味ト大蒜
ト等分ホドニメスリ合セ酒ニテトロ々トトキ火ニテ
少シアタメテ腫物ノ上ヘヌリ付テモニ紙ヲ蓋ニメラ
ケバヨク散ルモノ也三物湯ハ風毒骨節疼痛ノ動カヌニ
モ用ユ又婦人肝氣高キモノナド小兒ニ乳ヲカマレテ其
アト乳房ノ處切マハリ裂ナドノ愈ザルモノニモ用ユ火
氣強キニハ大黃ヲ加フ此等ハ皆ヤハリ常ニ調合スル處
ノ大劑ニ用ル也風毒ノ陰腫ニテ色ノ付ヌハ得テハ

痰腫カト思モノナリ

風毒ニ牽牛ノ入劑ヲ用ルハコシ付テカムガ如クニ痛ニ
用ル也勿論壯實ノ人ニアラザレバ用ベカラズ

総ノ解毒ノ藥ト云フニ付テ心得ヘキナリ先諸藥物ハ
本ヨリニテ凡天地間ノ物皆其レノニ天性ノ能アル中
間ニ又格別ノ能ニテ或相好シ或相惡ミ相剋スルナトア
リ俗ニモ云漆千石ニ蟹ノ足一本ナトノ如ク多クノ漆ノ
中ヘ少シ蟹ヲ入テモ其漆ハ水ノヤウニナリ又南星半夏
ノ毒ニアタリ甚瞑眩スル者ニ生姜ノ絞リ汁ヲ飲スレハ
頓ニ治シ又金ノ灰吹ヲスルニ逢砂少ヲ入レハ其ニテ金

ヲ抱キレノテ散ラサス油ニ香ヲ留ムルニ何ニモノカ入
 レハ留リ入サレハ煮ニ隨テ香ノ失セルト云ヤウニ外ノ
 物ニテレテ出キス外ノ處ヘツカウテ其功ナク只其物ニ
 限テ別ニ相制スル處アルモノハ直ニサレツケテ蟹ハ漆
 毒ヲ解ストナリ生薑ハ南星半夏ノ毒ヲ解ストナリ凡
 心得テヨシ此等ハ格別ノ功能ニテ畢竟天性ノ別方也故
 ニ彼諸毒ヲ解スナト云ヘルモノト一例ヲ以テハ云カ
 タシ然ラ一概ニ心得ルハ水フタノ又々又醫ト云モノ也
 先一角犀角ナトヲ只解毒ノモノトスルカ如キ醫事ニ於
 テ甚害アルト也此物ナト麻疹及小瘡ノ内攻等症ニ用タ

ル處ニテハ只解毒トノミ云ハナシテモスメ凡脚氣水腫
 ナトニ至テハ解毒トハカリハ云カタシ故ニ世醫此症ナ
 トニハ餘リ用ス又間ニ用ル人ハ脚氣ハ水毒ヲ解スルナ
 ト、云處ヘラレ付ルナリナルホド水氣ノ聚テ崇ラナ
 スナレハ其ヲサシテ毒ト云ヘハ毒ノマウトルモノナレ
 凡脚氣モ水腫モ停飲モ同ク水ノ崇リニテ別ニ一毒アル
 ニハアラス畢竟ワケナレニ此等ノ物ヲ只解毒ノトトハ
 カリスル故右体ニワザセマクナリテ用場モ不自由ニナ
 ルナリ故ニ醫事ニ害アリトハ云也右ノ一物ハ專ラ胸膈
 心肺ノ間ヲ峻ニスカスノ能アル故脚氣ナトノ胸膈ニ多

ク飲ヲ畜タル處ヲモ利シ其他ヲレマワレテハ解毒ニモ
 成モノニテ全ク毒ノ有無ニ拘リ用ルニハ非ス總ノ胸
 膈ヲ峻ニスカスモノハ何レモ皆推マワレテ解毒ノ功ア
 ルモノナリ升レトモ其物々ニテ性ニ異同アリカラニ優
 劣アル故一角犀角ナトハ石羔大黃麻黃枳榔ナトノゴト
 ナ草根木皮ノヲヨバザル處へ行也又甘草ハ諸藥ノ毒ヲ
 解スルト云モ此物ヨク心下ヲユルメル故ナリ甘艸ノヨ
 ク諸腫物ノ痛ヲ止ムルモヨクユルムルノ能アルヲ以テ
 ナリ又龍腦麝香丁香草撥胡椒木香薄荷藜香香薷ナトノ
 如キモ同ク香竈ノ物ニテ皆胸膈ヲスカシヒラクモノ故

ヲレマワレテハ何モ解毒ノ功アリ其中龍麝ハ最スルト
 ク草拔コレニ次キ木薄藿薹ハ又其次ナリ如此解セサレ
 ハ解毒ノ一ツサレツカユル處アリ予往年或醫生ト一角犀
 角ヲ始トシテ其他諸毒ヲ解スルト云藥品ヲ論シタルニ
 其生説ヲ張テ實ニ解毒スルモノ也ト云ヘリ故予敗毒散
 フ示レテ此方中ニヨク毒ヲ敗ルノ品アリヤト問シカハ
 答ユル一能サリキ総ノ解毒ノ一此方意ナトヲ以テ會得
 スベシ羌活獨活前胡柴胡桔梗枳壳茯苓薄荷川芎甘草人
 參生姜一トノツキツケ毒ヲ敗ルヘキモノナクメ敗毒ヲ以
 命名シタルモノハ只ヨク胸膈ヲスカシ開クヲ以テ故也

