



D. O. M.  
POSITIONES ANATOMICÆ  
ET  
CHIRURGICÆ.



EX ANATOMIA.



U O debilior partis textura, ed in illâ facilior humorum stasis. Textus cellularis inertia & laxitate multa foveri mala nemo nescit: Nemineris ergo quodd intestinum Rectum, Anus, eisque vicinæ tot morbis infestentur. Argumento est partium illarum expositio Anatomica.

ULTIMUM intestinorum, à fine coli procedens, Rectum appellant; quod posterius cum osse sacro & coccyge, anterius cum vesicæ collo in viris connectitur; in feminis vero, vaginae uteri tam firmiter inhæret, ut fibra unâ intricata videantur.

RECTI situs in pelvi, & ingens pinguedinis ambientis copia, huic intestino commodissimam tenendis fascibus sensim aggrestis aream præbent.

C R A S S I O R I B U S Rectum extruitur membranis, quarum interior rugosæ, multis foraminibus & lacunis pertusæ, incubit nervosa glandulis referta. Fibris carneis validioribus conflatur tercia: hanc cingit communis Peritonæi membrana, cui substernitur puerior pinguedo.

AD summum coccigis coarctatur intestinum Rectum. Ejus finem claudunt fibræ annulares, quibuscum coëunt musculi levatores. Fibris annularibus extremis, sphincterem efformantibus, accedit musculus peculiaris, sphincteris cutanei nomine: hic suâ contractione extremitatem intestini in rugosum orificium, Podicem dictum, desinentis, unâ cum sphinctere propriè dicto occludit.

LEVATORUM Ani, in intestinum Rectum utrinquè appellentur, fibræ contractæ, ejus extremitatem dilatando, Podicis seu Ani prolapsi obstant. Sphincteribus vero exitus faciem impeditur, usquedum pro voluntatis imperio, tum diaphragmatis tum muscularorum abdominalium contractione, resistentia vincatur.

INNUMERIS partes illæ irrigantur vasis. Externa ab hypogastricis procedunt; interna à Mesaraicis; eaque sibi inoculantur: exinde pathologice veniunt animadversiones. Quis sit, harumce partium consensus cum genitalibus, in utroque sexu, ex Anatomie fatis liquet.

### EX CHIRURGIA.

**I**NFINITIS propemodum affectibus laedi possunt Ani, partiumque circumstantium functiones: hæmorrhoidibus, tenesmo, inflammationibus, tumoribus, Ulceribus & Fistulis illas depravari haud priorsùs insolitus. De Fistulis acturi, alios affectus consultò omittimus.

FISTULÆ nomine vulgo donantur ulcera quæ Anum, sive partes intestino Recto propinquas devastant: ulcus Podici confine, altum, sinuofum, callosum, & angustiori, ut plurimum, ore terminatum, jure ac merito Fistulam dicimus.

Nec à causâ, nec à figurâ tantum, sed etiam à diverso quo desinunt modo, disparitatem mutuantur Ani Fistulæ. Quæ extus occlusæ Rectum perfodiunt, cæcæ & internæ dicuntur; Quæ illæ so intestino intrâ cutem ad Podicis oras perreptant, cæcæ & externæ; si demum utrinquè patentes, cutem simul & Rectum pertingant, complectæ; Aliæ vero incompletæ nuncupantur.

UNICO quadam ductu, aliæ pluribus mæandris instructæ, longè latèque partes depascunt; & ad vesicam, aut ad uterum, etiamque ad os sacrum, quandoquæ divagantur.

**A B S C E S S U S**, Fistularum Ani semper origo, præcipue si puris exitus naturæ soli committatur, sive serius artis auxilio concilietur; sive tandem inepit secentur, vel incaute tractentur suppura Ani apostemata.

NE abscessum sequatur **Fistula**, ex præcedenti positione concludimus. 1º. Abscessum Ani, etiam si minor sit puris collectio citè incidentum, & quidem sectionibus tunc non parcendum. 2º. In ipsa met apostematis sectione, si Rectum jam à pure denudatum aut erosum dignoscatur, illuc instituendam, sicut & in Fistula, operationem. 3º. Providendum ne carnes succrescant, nisi vividæ & firmiores, cicatricis solidæ videantur indicia.

IN Fistulam exteriorem si ritè immittatur stilus, & digito in Anum intruso sentiatur immediate, Fistulam completam esse haud dubium; sin minùs incompletam.

**C O G N I T U** difficilior cæca & interna: huic explorandæ stilus inutilis; tumore externo ut plurimum manifestam se præbet, quo presso pus intùs effunditur. Absente tumore, ex pruritu interno, & effluxu purulento, antè aut post alvi exonerationem, pro materiæ sede, hujus Fistulae signum: certissimum verò & indubitatum, si Fistula orificio turunda occluso, puris fiat collectio fenisibus obvia.

**F I S T U L A** anfractus serpere, vesicam, vaginam, aut uterum depasci, ossa carie affici, vasa exedi, denotant purulentæ materiæ copia, color subniger aut cruentus, & dolores versus partem affectam.

PRO Fistularum Aoi sede, causis, naturâ, & mæandris, diversa prognostis.

ALTIORIBUS & cancrofis palliativa tantum curatio competit.

VETUSTIORES, aut quæ fluxui hæmorrhoidali succedunt, per operationem non insanabiles; dum modò humores, ope Fonticuli, in alium locum divertantur.

**L I G A T U R A** & Causticum Fistularum Ani infida præsidia: certior sectio. Profperi curationis eventus spes minùs in angusto, si pro re natâ, præmissa fuerint generalia remedia. Alvis, paucis antè sectionem horis exhaurienda; proximè autem antè operacionem urinam emittas ægeri.

**S**i lue venereâ , scorbuticâ vel alia quâcunque coinqumentus humores , ulquedum virus arceatur , sectioni sit mora.

**HÆMORRAGIAM** , si quæ operationem subsequatur , facilè fistis rectè instituta firmior vulneris deligatio.

**LINAMENTIS** carptis impletatur vulnus ; & toto ferè curationis tempore in intestinum demittatur Turunda , ad digitii figuram primum confecta , sensim minuenda ; tum demum Fasciola linteas , quam vocant Ellychnium.

**R E M E D I A** suppurationi , ulceris deterioni & conglutinationi promovendis accommodata , linamentis carptis , Turundæ , & Ellychnio superimponantur.

**C A T E R I S** aliud paribus , tenuissima , fâtem primis diebus , instituenda vietûs ratio.

*Has positiones, DEO JUVANTE, & praeside M. ROBERTO FRANCISCO RUFFEL, Artium & Chirurgiae Magistro, Pro-Demonstratore Regio, tueri conabitur LUDOVICUS-JOSEPHUS DE LA ROCHE, Cameraceus & Artium Liberalium Magister.*

### P A R I S I S ,

### IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.:

*Dic lunæ 23<sup>a</sup>. Novembris à sesqui-secundâ post meridiennâ ad septimam. Anno Domini 1750.*

### P R O A C T U P U B L I C O.

Typis DELAGUETTE Regiae Chirurg. Academix  
Typographi 1750.