

Glaser,
Botanisches
Taschenwörterbuch.

Preis 5 Mark.

Bot. Dict

HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM.

G 46

Bought

LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM

HARVARD UNIVERSITY.

BOUGHT.



26 / 10 11

5

Shapiro
12/1

TASCHENWÖRTERBUCH
FÜR
BOTANIKER.





TASCHENWÖRTERBUCH
FÜR
BOTANIKER
UND

ALLE FREUNDE DER BOTANIK

ENTHALTEND DIE

BOTANISCHE NOMENKLATUR, TERMINOLOGIE UND LITTERATUR

NEBST

EINEM ALPHABETISCHEN VERZEICHNISSE


ALLER WICHTIGEN ZIER-, TREIBHAUS- UND KULTURPFLANZEN,
SOWIE DERJENIGEN DER HEIMISCHEN FLORA.

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. **L. GLASER.**



LEIPZIG
T. O. WEIGEL.
1885.



Vorwort.

Das vorliegende Taschenwörterbuch sucht dem längstgefühlten Bedürfnis eines kurzen Ratgebers über die mancherlei, sich immer mehr steigernden Schwierigkeiten des botanischen Studiums entgegen zu kommen. — In dem ersten Teile will es das Verständnis lateinisch geschriebener Deskriptionstexte, lateinischer Büchertitel u. Druckorte und dasjenige der botanischen Terminologie vermitteln, indem es ein Wörterbuch der neulateinischen Kunstausdrücke vielfach griechischen Ursprungs und aller derjenigen wissenschaftlichen und geographischen Lateinworte giebt, welche gewöhnliche lateinische Wörterbücher für klassische Autoren nicht zu enthalten pflegen. — Im zweiten Teile wird die Nomenklatur der Pflanzengattungen nicht nur unserer einheimischen, sondern auch aller eingeführten Nutz- und Ziergewächse der Landwirtschaft und Gartenzucht, der Zimmer- und Gewächshausgärtnerei in möglichster Vollständigkeit etymologisch behandelt, um das Verständnis aller eingeführten Namen zu vermitteln und dadurch deren Behalten zu erleichtern, zugleich mit Andeutung richtig accentuierter Aussprache, in welcher Hinsicht in unzähligen Fällen so vielfach gefehlt wird. Von den Pflanzengattungen wird jedesmal ausser der Worterklärung auch die übliche deutsche, sowie meist auch französische und englische Benennung angeführt, die wissenschaftliche Stellung in dem natürlichen, wie Linné'schen System angedeutet, die Synonyme und betreffenden Autoren angegeben und die wichtigsten Arten der Gattung mit Bezeichnung des Vaterlandes beispielsweise beigefügt. — Die dritte Ab-

teilung giebt sodann die populären und trivialen Deutschnamen der wichtigsten einheimischen und die volkstümlichen Fremdnamen der exotischen merkantil- und technisch-wichtigen Pflanzen oder ihrer Produkte nach ihrer wissenschaftlichen Benennung an, um über dergleichen Namen, wie sie uns in der Litteratur, in Reisebeschreibungen und Zeitschriften oder der Tageslitteratur begegnen, rasche Auskunft zu erteilen. — In dem vierten oder letzten Abschnitt wird sodann die Gesamtlitteratur der Botanik in kurzen und bündigen Anmerkungen über die wichtigsten Autoren und deren Werke mitgeteilt, so dass insbesondere ein Verständnis der den Pflanzennamen gewöhnlich beigefügten Autorenabkürzungen vermittelt wird.

Wir glauben insbesondere Studierenden oder Anfängern, aber auch Lehrern der Botanik mit unserm kurzen Taschenbuche willkommen zu sein, sowie auch Freunden der Gewächse bei ihren Besuchen von Gärten, Gewächshäusern und Ausstellungen einen Dienst zu leisten, indem wir ihnen ein handliches, über alles Gewünschte schnell unterrichtendes Vademecum in die Hand geben, das denn auch namentlich praktischen Gärtnern zum Verstehen der Namen, wie zu richtiger Aussprache sowohl als Orthographie derselben verhelfen wird.

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichnis.

I. Terminologie und Pflanzenbeschreibung (Deskription) . . .	1
II. Etymologische Nomenklatur (Wortklärung der Pflanzen- namen).	
A. Lateinamen	59
Übersicht der nicht näher ausgeführten Synonyme des Buches	371
B. Deutsch-, Trivial- und Fremdnamen der technischen, merkantilen und besonders wichtigen sonstigen Pflan- zen und ihrer Produkte nach wissenschaftlicher Be- nennung	380
III. Botanische Litteratur.	
a. Die Autoren nebst Personalien und wichtigsten Werken	407
b. Geographische Botanik oder die Autoren und botani- schen Werke nach den Ländern alphabetisch zu- sammengestellt	455
c. Spezialbotanik oder botanische Monographien, Dissert- ationen und andere Spezialschriften nach dem In- halt alphabetisch geordnet	458
d. Nomenklatur und Wörterbücher der Botanik	477
e. Botanische Litteratur und Geschichte	478
IV. Die wichtigsten essbaren und giftigen Schwämme.	
a. Essbare	479
b. Giftige	480
V. Übersicht des von Bartling und Bischoff verbesserten de Can- dolle'schen Systems (nach Leunis-Frank's Synopsis des Pflanzenreichs).	
A. Plantae vasculares, Gefäßpflanzen	481
A. Phanerogamae L., Phanerogamen oder Samen- pflanzen	481
I. Kl. Dicotyledonæae Juss.	481
II. Kl. Monocotyledonæae Juss.	484
B. Cryptogamae L. (Acotyledonæae Juss.) Krypto- gamen oder Sporenpflanzen	485
III. Kl. Cryptogamae vasculares, Gefäß- kryptogamen	485
B. Plantae cellulares, Zellenpflanzen	485
IV. Kl. Cryptogamae cellulares, Zellenkryp- togamen	485

Zeichen und Abkürzungen.

† giftig.
 24 perennirend oder ausdauernd.
 5 Bäume, 5 Sträucher, 5 Halbsträucher.
 (••) zweijährig, (•) einjährig (annuell).

3, 4, 5, 6 etc. März, April, Mai, Juni etc.
 ♂ Zwitter (Hermaphrodit).
 ♂ mas (männlich), ♀ femina (weiblich).

a int. = a intensivum, verstärkendes (nicht verneinendes) a.
 a priv. = a privativum, verneinendes a.
 adj. = Adjectivum, adv. = Adverbium.
 a. e. = ad exemplum, zum Beispiel.
 aut. = autoris, eines Autoren (Verfassers).
 autt. = autorum, der Autoren (Verfasser).
 B. = Baum.
 ben. = benannt.
 betr. = betreffend.
 Bstr. = Baumstrauch.
 coll. = Collectivum od. Sammelnamen (z. B. arborëtum).
 comp. = Compositum od. zusammengesetztes Wort.
 dem. od. dim. = Deminutivum (Dimin.-), Verkleinerungsform.
 det. = Deteriorativum, Verschlechterungs- od. Verringerungsform (z. B. alsinastrum).
 ds. = derselbe, dss. = dieselben.
 e. g. = exempli gratia, zum Beispiel.
 eig. = eigentlich.
 etc. = etcetera, und so weiter.
 f. = filius, Sohn (L. f. = Linné filius, Linné Sohn).
 flor. = flores, Blüten (Thee).
 fl. pl. = flore pleno, mit gefüllter Blume.
 fol. = folia, Blätter od. Thee.
 foss. = fossil, als Versteinerung (Petrefakt).
 geb. = gebaut, d. i. angepflanzt, auch gebildet!
 gem. = gemein.
 gr. = griechisch.
 g. n. = genus novum, neues od.

neugebildetes Geschlechts- oder Gattungswort.
 herb. = herbarium, Pflanzen- od. Kräutersammlung.
 Hort. = Hortorum, der Gärten.
 Hortul. = Hortulanorum, der Gärtner.
 Hstr. = Halbstrauch.
 i. q. = id quod, dasselbe wie (od. was).
 j. = jetzt.
 lat. = lateinisch, latin. = latinisiert, d. i. in lateinische Form gebracht.
 loc. = locativum, Behälternamen (z. B. pomarium).
 m. = mit, m. v. v. = mit Varietäten.
 n. = nach.
 n. pr. = nomen proprium, Eigennamen.
 obs. = obsoletus, obsolet, d. i. abgenutzt, nicht mehr gebräuchlich.
 Off. = officinarum, der Offizinen oder Apotheken.
 s. = siehe, s. = seit, s. g. = so genannt, s. eb. = siehe eben, s. v. = siehe vorher, s. d. = siehe diesen.
 schr. = schrieb.
 sc. = scilicet, nämlich.
 st. = statt, anstatt.
 Str. = Strauch.
 syn. (od. nur s.) = synonym, d. i. mitnamig, gleichbedeutend.
 u. a. m. = und andere mehr.
 v. od. var. = Varietät (Spielart).
 v. v. = Varietäten.
 v. = vorher, und v. = von.
 vgl. = vergleiche.
 w. = weiss.
 z. B. = zum Beispiel.

I. Terminologie und Pflanzenbeschreibung (Deskription).

Der Bogen über den Vokalen kennzeichnet die Kürze, der Strich die Länge (Betönung) derselben.

- abbreviatus** abbreviert, abgekürzt.
abietinus tannenartig (v. abies, -ëtis Tanne).
abortivus fehlgeschlagen, zu früh geboren.
abortus das Fehlschlagen, die Verkümmernung.
abrupte adv., -tus abgebrochen, unterbrochen.
abschasicus von Abschasien am Kaukasus.
absorptio die Aufsaugung, das „Absorbieren“.
abstemius enthaltsam, nüchtern.
acanthophyllus stachelblättrig, akanthusblättrig.
acarifer, -fëra etc. milbentragend (acärus M.).
acaulis stiel- od. stengellos.
accessorius hinzukommend (z. B. gemma Neben- od. Beiknospe).
accommodatio Anpassung, das „Accommodieren“.
acephälus kopflos (*á* u. *κεφαλή*).
acerbus herb, bitter.
acerosus (a. e. folium) nadel- od. linienförmig, steif.
acervatus gehäuft, **acervus** Haufen.
acetabulum Bechergefäß.
Acetosa u. **Acetosella** L. Sauerampfer (v. acëtum Essig).
achenium Achene (Achäne), Schliessfrucht.
acicularis nadelförmig (acus, dem. acicüla).
acidulus säuerlich, **acídus** sauer, **acidum** Säure.
acidum hydrocyanicum Blausäure.
acinaciformis säbelförmig (acinäces, -is kurzer Säbel).
acinum od. -us Beere (v. Trauben u. a.).
- acladödes** zweiglos (*á* u. *κλαδώδης*; zweigig).
Acotylëae (-ledones) Juss. Samensappenlose.
Acramphibryae Endl. Endumspross.
Acrantheae Endl. Spitzblüter. [ser.
Aeroblastae Spitzkeimer (d. s. Monocotylen).
Aerobryae Endl. Endsprosser.
acrocarpus spitzfrüchtig.
acropetalus (z. B. Blütenentw. Frank) an der Spitze kronblättrig.
actinomorphus strahlig gebildet (*ἀκτις*, -ίρος; Strahl, *μορφή* Gestalt).
aculeatus stachelig, **aculéus** Stachel.
acümen, -inis Spitze, **acuminatus** zugespitzt.
acutiuseculus etwas spitz, **acütus** scharf, spitz.
adauctus vermehrt.
adhaerens sich anhängend, anhängend.
adiposus fettig, fettartig (adeps, -ipis).
adligans anhaftend, -ntes (sc. radicëes) Klammerwurzeln.
adnascens anwachsend (v. adnascor).
adnatus angewachsen.
adossiert, mit d. Rücken angelehnt (fr. dos Rücken), z. B. adoss. Vorblatt b. Monocotylen, Schwen-dener.
adpressus angedrückt.
adscendens aufsteigend.
adpersus bestreut, bespritzt.
adstringens zusammenziehend.
adulterinus unächt, auch: ver-schwägert.
adultus herangewachsen.
adumbratio Schattenriss, Skizze.
adunens hakenförmig gekrümmt.

- adustus brandig, angebrannt.
adventitius (a. e. gemma) hinzugekommen, unwesentlich (z. B. Adventivknospe).
Adventiv- (in Zusammens.) s. eb., z. B. Spross, -Wurzel etc.
adversalis gegenübergestellt, gegenständig.
adversaria, -orum Conceptbuch, Kladder od. sog. Schmierbuch.
adversarius Gegner.
aenëus ebern, kupferbronzig (Kummer).
aequalis, -ia gleichförmig, alle Blüten gleich (bei Compositen).
aequans gleichkommend, gleichgross.
aequidistans in gleichem Abstand.
aequivöcus zweideutig, z. B. generatio aequivöca Urzeugung, Urbildung.
aequorëus zum Meer gehörig.
Aërogämae Jess. Luftblütler i. q. Phanerogämae L.
aeruginëus (-nosus) spangrün (aerugo Grünspan).
aestivalis sommerlich, im Sommer.
aestivatio Knospenlage, i. q. praefloratio, Art der Blume vor d. Aufbrechen (z. B. imbricata gefaltet, valvata klappig etc.).
aestuans lodernd, glühend, auch: schwankend.
affinis verwandt, **affinitas** Verwandtschaft.
affixus auf- od. angeheftet.
agämus ehelos, ohne Blüten.
agathöcus (-öcus) guthäusig, schön wohnend (*ἀγαθός* u. *οἶκος*).
Aggregation = Anhäufung, Zusammengesellung.
aggregatus gehäuft, zusammengestellt etc.
agrarius u. **agrestis** auf Äckern.
agrostographia Gräserkunde.
aizoides dem ewiglebenden Aizöon ähnlich.
alabastrum Blütenknospe.
alae Flügel (an Papilionaceenblüten).
alatus geflügelt (sc. caulis od. petiöus, mit Rand- od. Blatthäuten versehen).
albellus weisslich (albus w.).
albensis an der Elbe (Albis) zu Hause.
albidus weisslich, weiss (i. q. albus).
albūmen, -inis Eiweiss, d: Innere von Samen etc.
albumum Splint, Jung- od. Neuholz.
aleicornis elennhörnig, wie ein Elenngeweih.
aleurites mehlig (*ἀλευρίτης* v. *ἀλευρον* Mehl).
aleuron, -rum Kleber im Samen (s. eb.)
alexeterius (*ἀλεξήτιρος*) zum Helfen od. Abwehren geschickt.
Algeria Algier, **algeriensis** aus Algerien.
algidus kalt.
alicastrum (det. v. *alica*) Spelt- od. Kraftmehl.
alliäcus lauchartig (v. *allium* Lauch).
alnicöla Erlenwohner, an od. bei Erlen wachsend.
alpestris u. **alpīnus** auf den Alpen wohnend.
alpigenus auf d. Alpen erzeugt.
alsaticus elsässer, im Elsass zu Hause.
altaicus vom Gebirg Altaï (Innerasien).
alternus abwechselnd, „alternierend“, *folia alterna* abwechselnd gestellte Blätter.
alternatim, adv. abwechselnd bez. der Stellung.
alternatio Abwechslung (s. eb.) z. B. im Stand der Blätter.
alternativa (sc. *perforatio*) Halbedeckung der Schuppenlage (im Durchschnitt einer Knospe).
alterniflorus wechselblütig, d. Blüt. in abwechselnder Stellung.
alternifolius mit wechselständigen Blättern.
altilis gemästet, mastig.
aluminosus Alaun betreffend (alumen, -inis).
alutacëus sammtledern, ledergelb (*alūta*).
alutipes sammtlederfüssig, weichtielig.
alveolatus grubig, **alveölus** Mulde, Trog etc.
amärus bitter.
ambianensis von Amiens (Ambianum).
ambigiūus zweideutig, unbeständig.
amblyonëmus stumpffadig (*ἀμβλύνης* stumpf, *νήμα* Faden, Staubfaden).
amblypterus stumpfflüglig (s. eb., *ἄτερον* Flügel).

- amboinensis** von Amboina (Molukken).
- amentacëus** kätzchentragend, kätzchenartig.
- amentum** (Bot.) Kätzchenblüte.
- amethysteus, -stinus** amethystfarbig, veilchenblau.
- Angano-Burejensis** am Amurfluss u. Burejagebirge zu Hause.
- amoeboides** amöboid i. q. amoebus.
- amoebus** gestaltwechselnd (z. B. Protoplasma).
- amoenitates** Annehmlichkeiten, Belustigungen.
- amoenus** lieblich, angenehm.
- amorphozöa** Ohnformtiere (*ἀμορφῶν* Tier).
- Amphibrÿa** Endl. Umsprosser.
- Amphicarpanthtëae** Rehb. Ringsfruchtblüter (Compositen).
- amphigastria** „umbauchige“ kleine Nebenblätter der Jungermännchen.
- amplexicaulis** stengelumfassend
- amplissimus** sehr beträchtlich, überaus gross etc.
- amplus** weitläufig, gross.
- ampulla** Flasche, Büchse, **-cëus** flaschenfrüchtig.
- Amstelodamum, -sterodama** Amsterdam.
- amygdalinus** mandelartig, wie d. Mandelbaum.
- amylum** Stärkemehl.
- anabioticus** (a. e. planta) wieder-auflebend (*ἀναβιώω*).
- anagramma** Anagramm d. i. Buchstabenversetzung eines Wortes.
- analecta, -orum** Auflese, Brosamen.
- analepticus** erfrischend (*ἀναληπιτικός*).
- analogia** Analogie, Ähnlichkeit, **-logus** „analog“ d. i. übereinstimmend etc.
- anaphytosis** Pflanzen-Verjüngung.
- anastomosis** „Anastomose“, Zusammenmündung zweier Gefässe.
- anatomia** „Anatomie“, Zergliederung etc., **-micus** „anatomisch“, Zergliederung betr.
- anatröpus** gegenläufig, z. B. ovulum anatröpum rückläufige Samenknospe, mit Abwärtsrichtung der Mikropyle od. des Keimmundes.
- anceps, -cipitis** (sc. caulis) zweischneidig.
- andicöla** die Anden bewohnend.
- androecium** Staubblatt - Inbegriff einer Blüte (*ἀνδρῶν, -ρῶος* Mann, d. i. Staubgefäss, und *οικίον* Häuschen).
- androgynus** mannweibig (männl. u. weibl. Organe d. Blüte verwachs., s. eb. u. *γυνή* Weib).
- anfractuösus** mit Krümmungen versehen.
- anfractus** krummer Weg, Biegung, Umgang.
- angiocarpus** hüllfrüchtig (*ἀγγεῖον* Gefäss, u. *καρπός* Frucht).
- Angiospermae** L. Hüllfrüchtige, Decksamige.
- Anglia** England, **anglicus** englisch.
- angulatus** eckig, kantig, **angulus** Ecke, Winkel.
- anguliger** Ecken führend.
- angulisans** Ecken od. Kanten bildend.
- angustifolius** schmalblättrig, **angustus** eng, schmal.
- animadversio** Bemerkung.
- anisolobus** ungleichlappig (*ἀνισός* u. *λοβός*).
- annosus** hochbejahrt.
- annuus** vorjährig, sprossend.
- annulus** Ringschicht (an Mooskapseln, um Farnsporangien etc.).
- annuus** einjährig, annuell.
- anomäus** (*ἀνώμαλος*) ungleich, unregelmässig, „anomal“.
- Anophÿta** Endl. Übererdigwachsende.
- antarcticus** südpolarisch, „antarktisch“.
- antecedens** vorhergehend.
- antennatus** fühlertörmig (antenna Fühlhorn d. Insekten).
- antennifer** Fühler führend.
- anthëla** (*ἀνθηλίη*) Spirre der Binsen.
- anthelminticus** gegen Würmer gebraucht (*ἀντι* u. *ελμινς, -ρῶος* Wurm).
- anthëma** Blüte (*ἀνθημα* i. q. *ἀνθος*).
- anthëra** (*ἀνθηρόα*) Staubbeutel, „Anthere“.
- antheridium** männl. Organ, ähnlich Antheren (bei Algen etc.).
- anthësis** Blütenbefruchtung.
- anthocyanum** Blattröt (*κυανός* eig. dunkelblau).
- anthodium** Blütenkorb, gemeins. Kelch der Compositen (v. *ἀνθώδης* blumengleich).

- anthologia** Blütensammlung, Blumenlese, „Anthologie“.
- antholysis** Blütenauflösung (Krankheit od. Ausartung).
- anthophyta** Blütenpflanzen, i. q. Phanerogamae.
- anthoplerosis** (ἀνθώσεσις) Blütenfüllung.
- anthoxanthinum** Blattgelb, i. q. xanthophyllum.
- anthracophilus** Kohlenliebhaber (ἀνθραξίς, -ος).
- antiades** drüsen- od. mandelartig (ἀντιάδης, -δος).
- anticus** vorderer.
- antiklin**, der Oberfläche entgegengesetzt od. rechtwinklig darauf (Sachs).
- antidysentericus** gegen die Ruhr od. Dysenterie.
- antipoda**, fem. Antipodin od. Gegenfüßlerin, **Antipodes** Antipoden (in der Südsee).
- antipyreticus** feuererstickend (ἀντιπυρ).
- antiquior** älter, der Ältere.
- antiscorbuticus** gegen den Skorbut wirksam.
- antitropus** von einander gewendet, gegenüberläufig.
- apertura** Oeffnung, **apertus** offen.
- apetalus** kronblattlos, ohne Blumenblätter (petalum, πέταλον Kron- od. Blumenbl.).
- apex**, -icis Spitze, **apiculus** Spitzchen.
- aphaea** (ἀφάκη i. q. φακή) Vogelwicke, Linse.
- aphanes** (ἀφανής) unsichtbar, übersehen etc.
- aphrodisiacum** Geschlechtsreizmittel (Aphrodite = Venus).
- Aphyllae** DC. (Cryptogamae) Blattlose Kryptogamen.
- apicalis** spitzig, spitzmützig.
- apiculatus** mit Spitzchen versehen.
- apifer**, -era etc. bienentragend (apis u. fero).
- apifolius** sellerieblättrig (v. Apium).
- aponinus** müssig, unthätig (ἀπονοσία).
- apophysis** Schwellung od. Ansatz unter dem Moosbüschchen.
- apothecia** Keimfrüchte der Flechten, „Apothecien“, d. s. kugl. od. schüsself. Erhebungen, Sporenlager.
- appendix** Anhang, Anhängsel.
- applanatus** geebnet, verflacht.
- approximatus** genähert, nahe zusammen.
- apricus** sonnig, sonnig stehend.
- Apulus** (Appulus) apulisch, aus Apulien (in Unteritalien).
- Aquaticeae** Endl. Wasserkräuter (-quirle).
- aquaticus**, -tilis in od. an Wasser wachsend.
- aquigenus** im Wasser erzeugt.
- aquilegifolius** ackeileblättrig (Aquila).
- aquilinus** adlerartig (aquila Adler).
- Aquisgranum** Aachen.
- arachnoideus** spinnenähnlich.
- aranifer**, -era etc. Spinnen tragend (arana).
- arboratum** Baumpflanzung.
- arboricus** baumartig.
- arbusculus** kleines Bäumchen.
- arbuscus** Baumgarten.
- arcenum** Geheimnis, Geheimmittel.
- archegonia** Fruchtansätze, weibl. Organe der Moose etc. mit Eizellen.
- archispermus** nackt- od. ursamig (v. ἀρχομαι fange an, daher Erz- oder Ur-).
- arete**, adv. eng, dicht beisammen, **articus** enger etc.
- articus** Polar-, **antarcticus** Südpolar- (v. ἀρκτος Bären-Sternbild).
- aretos** i. q. articus, s. eb.
- arenatus** gebogen, bogenförmig.
- arduennensis** in den Ardennen zu Hause.
- Arelatum** Arles, Arelat (Südfrankreich).
- arenarius**, -nosus im Sand wachsend.
- areolae** kleine Flächen zwischen den Rissen der Flechten etc. (dem. v. arca Fläche, das „Areal“).
- areolatus** gefäelt, s. eb.
- Argentorum** Strassburg.
- argillaceus** aus Thon od. Lehm, lehmig.
- argunensis** vom Fluss Argun (Nebenfluss d. Amur).
- argute**, adv. scharf, spitz, **-tus** spitzig, zierlich, listig u. dgl.
- argyraceus** silberweiss.
- argyrophyllum** silberblättrig.
- aridus** trocken, dürr.
- arietinus** widderartig (aries, -etis Widder).

- arillus** (oft fleischiger) Samenmantel.
Ariminum Rimini (Italien).
arista Granne, **-atus** gegrannt.
armeniæcus aprikosenartig.
arucillaris armbandartig, **-atus** mit Armband geschmückt.
armoricus aus Armorika (Bretagne).
Arovium Aarau.
arcuatus, s. *arcuatus*.
arrhizus wurzellos (*ἄ* u. *ῥίζα*).
Artikularegumente (Mikösch) = Knospenhüllen aus bleibenden Blattresten.
articulatus gliedert, **-culus** Glied.
arundinæcus rohr- od. schilffartig.
arvensis auf Ackerfeld (*arvum*).
arvernus aus der Auvergne (Südfrankr.).
arvonius arvonisch (Arvonia das Land um Caernarvon im Fürstent. Wales).
ascalonicus aus Askalon (Palästina).
ascidium Blattschlauch, **ascus** Schlauch, **asci** Schläuche der Pilzsporen.
asæus zeichenlos (*ἄ* u. *σῆμα*), auch: ohne Fahne (Papilionaceen).
asper, **-era** etc. rauh, scharf.
Asperifoliae L. Rauhblättrige.
asprellus rauhschuppig (Kummer).
assereulus Pfählehen (dem. v. *asser* Pfahl, Balken etc.).
assimilatio Verähnlichung, Aneignung.
assurgens aufsteigend, sich aufrichtend.
asthmaticus Asthma heilend, gegen Brustkrampf.
astragologia Monographie der Traganthe.
Astylæ Jess. (sc. *Apetalæe*) Griffellose.
atacta botanica botanische Neuigkeiten, noch nicht Berührtes.
ater, **-tra** etc. schwarz, **atro-** in compos.
Atlas, **-ntis** Atlasgebirge (Nordafrika).
atomarius, **-atus** mit Atomen bestreut.
atrauentarius Dinte betr. (*atramentum*).
atröpa (sc. *ovula*) geradläufige Samenbläschen i. q. *orthotröpa*, vgl. *anatröpa*.
atrophia Auszehrung aus Nahrungsmangel, „Atrophie“.
atropurpureus schwarz- od. dunkelpurpurrot.
atrovireus schwarzgrün.
attenuatus verdünnt, verschmälert.
aucuparius zum Vogelfang dienend.
aurantiacus orange- od. pomeranzengelb od. rot.
aurelianus aus Orleans.
aurëus golden, goldgelb.
auricömus goldhaarig.
auricula Öhrchen (dem. v. *auris* Ohr).
auricularis, **-atus** Öhrchen führend, geöhrt.
auriscalpium Ohrlöffel.
austerus herb, von scharfem Geschmack.
australasiens südasiatisch.
australis südlich.
austriacus österreichisch, **Austria** Östreich.
austro- in comp. süd-, z. B. *austro-occidentalis* südwestlich.
autumnalis herbstlich, **autumnus** Herbst.
auxanometron (-um) Wachstumsmesser (*αὐξάνουα* u. *μετρον* Mass).
Auxosporeu (z. B. Diatomeen) Wachstumssporen od. = junge s. eb.
avenacëus haferartig.
Avento Avignon.
avenius aderlos (a u. *vena* Ader, „Vene“).
avernensis aus der Auvergne (Frankreich).
aversus abgewandt.
axillis zur Achse gehörig.
axilla Achsel, Blattachsel.
axillaris achselständig, in d. Blattachsen stehend.
axiomaticus abschätzend, z. B. Forstbeschreibung.
axis Achse, Mittellinie.
azurëus himmelblau, azur- od. lasurblau.
bacca Beere, **-atus** Beeren tragend, zu Beeren geformt.
baccifer, **-era** etc. beerentragend.
bacilli Fadenbakterien s. sogl.
bacteria Bakterie, freilebende, elliptische, bewegliche Zelle (*Βακτηρία* Stab etc.).
bactrianus aus Baktrien (Turkestan).
badius kastanienbraun, schön braun.

- badĭpus** Braunfuss.
baeticus bätisch, vom Fluss Baetis = Guadalquivir in Andalusien.
baldensis von Baldo (in Südtirol).
Balsamiflūae Juss. Balsamflussbäume.
balticus baltisch, vom baltischen Meer (Ostsee).
banaticus aus dem Banat (Südungarn).
barbadensis von Barbados (Antillen).
barbatus gebartet, bärtig.
barbulatus etwas bärtig, mit Bärtchen.
basidia Sporenstützchen od. -Stielchen. Zellen, welche an der Spitze Sporen abstrühen.
Basila (-lea) Basel.
basipetal (z. B. Blütenentw. Frank) an der Blumenbasis stehendes Kronblatt.
basis (a. e. folii) Grund, Wurzel.
Batabis = Patavia Passau.
batavus holländisch, od. von Batavia auf der Insel Java.
bavaricus bairisch (Bavaria Baiern).
bellidiflorus, -folius masliebchenblütig, -blättrig (Bellis, -idis).
berolinensis berliner, **Berolinum** Berlin.
betulifolius birkenblättrig.
Betulin = Birkenkorkzellenstoff (das Weisse etc.).
betulinus an Birken wachsend.
bicolor, -oris zweifarbig.
Bicornes Endl. Zweihörnige (Antherenzweihörn.).
bicornis zweihörnig.
bidens, -dentatus zweizahnig.
biennis zweijährig.
bifariam adv., **bifarius** zweifach, doppelt.
bifidus zweiteilig, -spaltig.
biflorus, -folius zweiblütig, -blättrig.
biforatus zweimal durchbohrt.
biformis doppelt gestaltet.
bifrons zweistirnig, Doppelgesicht.
bigeminus zweimal doppelt.
bijugus zweijochig, mit 2 Fiederpaaren.
bilabiatus zweilippig.
bilobus zweilappig.
bilocularis zweifächerig.
бина, -ni etc. zu zweien.
biovulatus mit zwei Eichen oder Samenknospen.
bipartitus in zwei Teile geteilt, zweiteilig.
bipinnatus doppelt gefiedert.
biplicatus doppelt gefaltet.
bipontinus von Zweibrücken.
bipunctatus doppeltpunktirt.
bisaceatus mit zwei Säcken.
bisectatus mit zwei Buckelschilden.
bisentellatus mit zwei Buckelschildchen.
biserratus doppeltesägt.
bistortus zweimal gedreht.
bisuleatus zweifurchig.
bituminosus asphaltartig, „bituminös“.
bivalvis zweiklappig.
bivulus zweisegelig (velum), ringfransig (Kummer).
blandus gewinnend, sich einschmeichelnd etc.
Blattspur-Stränge = Gefässbündel an der Basis der Blätter den Stamm hinab.
blesensis von Blois (an d. Loire).
Blust = Blütenstellung.
bogoriensis von Buitenzorg (auf Java).
bogotensis von Bogota (Südamerika).
boicus bojisch, bairisch (Bojer = Baier, Bayer).
bolaris bolusartig (Bolus od. Bol = Thonerde).
boloniensis Boulogner.
bonariensis von Buenos-Ayres (Südamerika).
Bononia Bologna u. Boulogne.
bononiensis von Bologna od. Boulogne.
boppardensis von Boppard (am Rhein).
borbonicus von der Insel Bourbon (j. Réunion).
boreali-orientalis nordöstlich.
borealis nördlich, nordisch (in comp. boreali- s. eb.).
Borstenkranz, zu Pappus werden der Kelch der Einzelblüte bei Compositen.
borysthenicus am Fluss Dnjepr (Borysthenes).
bostryx Schraubel, d. i. Trugdolde, deren Scheinachse immer auf derselben Seite ansetzt.
botanice, Gen. -es Botanik (*βοτανική* sc. *τέχνη*).
botanicus botanisch.
botanosophia Pflanzenkunde.

botryapius traubenbirmartig ($\beta\acute{o}\tau\alpha\pi\acute{\iota}\omicron\upsilon\varsigma$ und $\acute{\alpha}\tau\iota\omicron\nu$).

botryoides traubenähnlich.

botrytis (bess. -trytis) traubig.

bottnicus bottnisch, vom bottnischen Meerbusen.

brachiatus ästig, mit Ästen od. Armen.

brachium Ast, Arm (fr. branche).

brachypetalus mit kurzen Kronblättern.

bractea Bractee, d. i. Deck- od. Hochblatt um die Blumen herum.

bracteatus deckblättrig.

bracteola Deckblättchen.

bractescens Deckblätter treibend.

brigantiacus von Briançon od. auch von Bregenz am Bodensee (Brigantium).

britannicus britisch und Bretagner.

brumalis winterlich (v. bruma, contrahiert aus brevissima dies kürzester Tag).

brunnæus braun, dunkelbraun.

Brutknospen, mehrzellige linsenförm. Organe der Fortpflanzung (z. B. bei Marchantia).

Brutzellen der Kryptogamen (vegetative Fortpfl.).

Brutzwiebeln (in den Blattachsen).

bryoides knotenmoosartig (Bryum, gr. $\beta\rho\acute{\upsilon}\acute{\iota}\omicron\nu$).

bryologia Mooskunde, -logicus „bryologisch“.

bryophyta Moosgewächse.

bucca der Backen, die Backe.

bufonius die Kröten betr.

bulbifer, -fera etc. zwiebeltragend.

bulbiger zwiebel- od. knollenführend.

bulbillus Knospenzwiebel (in den Achseln etc.).

bulbosus zwiebelig, knollig.

bulbo-tuber Knollenzwiebel.

bulbus Zwiebel, „Bölle“.

bullä Buckel, Blase, -acæus u. -atus blasenförmig.

bumelia ($\beta\omicron\nu\nu\mu\eta\lambda\acute{\iota}\alpha$) eine Eschenart.

Burdegala (-digala) Bordeaux.

bursa Börse, Geldtasche.

bursarius börsen- od. taschenförmig.

butibacensis Butzbacher, v. Butzbach (Hess.-Darmst.).

butyraceus butterartig, **butyrus** Butter.

butyrosus butterig.

byssacæus flachs- od. seidenfaserig.

byssus ($\beta\acute{\iota}\sigma\sigma\omicron\varsigma$) Flachs, Seide, Baumwolle etc.

byssisædus mit Byssus od. Fasern festsitzend.

byzantinus von Byzanz (Constantinopel).

cabulicus von Kabul in Afghanistan.

cacumen, -inis Gipfel, Spitze.

cadæus hinfällig, leicht abfallend.

caelatus gefäfelt (v. caelo ciseliere, caelum Meissel etc.).

caerulescens bläulich.

caerulæus himmelblau, blau.

caesius blaugrün, blaugrau.

caespes, -itis Rasen (auch cespes).

caespitosus in oder wie Rasen wachsend.

cajanensis von Cayenne.

Calamariae Endl. Schaftfarne.

calamarius halmartig, Halm- (calamus betr.).

calaminaris auf Galmeiboden wachsend.

calamistra Kräuseleisen (hohl wie ein Halm, calamus).

calamitosus unheilbringend.

calamus Halm, Rohr.

calathidium Blütenkörbchen, Korbblütchen.

calathium ($\kappa\alpha\lambda\acute{\alpha}\theta\iota\omicron\nu$) Blütenkorb.

caläthus ($\kappa\alpha\lambda\acute{\alpha}\theta\omicron\varsigma$) Korb.

calcar Sporn, -ratus gespornt, -ræus spornig.

calceolus kleiner Schuh, -latus schuhförmig.

calcæus Schuh, Halbstiefel (v. calx, -cis Ferse).

calcæus kalkig, von Kalk (calx, -cis Kalkstein).

caliculatus kelchförmig, bekelcht (calix, -icis u. caliculus Kelch etc.).

callochræus schönhäutig, -farbig, aber auch schwielenhäutig (calium und $\chi\omicron\upsilon\acute{\iota}\alpha$).

callosus schwielig.

calophyllus schönblättrig.

calycanthema in eine Krone verwandelter Kelch (z. B. Primel).

Calycanthae Rchb. Kelchblütige.

Calycifloræ Endl. Kelchblütler.

calycinus kelchartig, den Kelch betr. (calyx, -ycis Blumenkelch).

calycularis mit einem Hüllkelch versehen.

calyculatus mit Hüllkelch (kleinem Kelch) versehen.

calycūlus Aussen- od. Hüllkelch, kleiner Kelch.
calyptra Haube od. Mütze der Moosblüten.
calyptrogēnum „calyptrogene“ d. i. haubenbildende Wurzelschicht (Janczewski¹⁾) (*καλύπτρα* und *γένω*).
calystāchys Hüllenähre (*καλύπτω*, *στάχυς*).
calyx, -ycis Kelch, Blumenkelch.
Cambiform = Cambiumbildungsgewebe.
cambium Bildungssaft, Zellbildungsstoff unter der Rinde.
cambricus „cambrisch“ (Cambria oder Cumbria, das Fürstentum Wales und Cumberland).
campylospermus krummsamig, mit einwärts hohlem Endosperm (z. B. Doldenfrüchte).
campylotrōpum (sc. ovulum) krummläufiges Sameneichen.
canaliculatus mit Kanälchen versehen, gestreift.
canalicus (sc. hortus) gräf. Canal'scher Garten in Prag.
cancellatus gegittert, gitterartig.
candicans weisswerdend od. -aussehend.
candidus blendendweiss.
canescens ergrauend, grau aussehend.
caninus den Hund betr., Hunds-
canabinus hanfartig, -blättrig.
cannobrunneus zimmtbraun.
cantrabrigiensis von Cambridge (Cantabrigia).
Canthium Kent (engl. Grafschaft).
canus grau.
capensis vom Cap (der guten Hoffnung).
caperatus gekräuselt, gerunzelt (v. capero e. g. frontem).
capillaris haarartig, **capillus** Kopfhhaar.
capillitium Fadengewebe.
capitatus kopfig, kopfförmig (caput, -itis).
capitulum Köpfchen (dem. caput, -itis).
capreolatus gestützt, rankend (s. sogl.).

1) Dessen Spitzenwachstum d. Phanerogamen (in Annales d. Sciences nat.).

capreolus Stiel- od. Astranke.
capronianus (fr. capron) wie Ananaserdbeere schmeckend od. riechend.
capsella Kapselchen (dem. capsula, Kapsel).
cardiophyllus herzblättrig.
carentanus kärnthisch, **Carentum** Kärnten.
caribaeus caraïbisch (Caraïben od. Cariben, die Eingeborenen des nördl. Südamerika's).
caricinus riet- od. seggenartig (von Carex, -ycis).
carina Kiel, Schiffchen, -atus gekielt (bei Schmetterlingsblüten).
carinthiacus kärnthisch, i. q. carentanus.
cariosus morsch, faul, angefressen od. -gestossen.
caripensis von Caripe, dem Land der Caripunas in Nordbrasilien.
carnicus und **carniolicus** aus Krain (Carniöla).
carnosus fleischig (von caro, -rnis Fleisch).
carolinianus von Carolina (Nordamerika).
carpellum „Carpell“ od. Fruchtblatt.
Carpiden (Schwendener) Fruchtteile (z. B. Stellung ders.).
Carpoböli 'DC. Fruchtschneller (Pilze).
carpologia Fruchtkunde.
carpophörum Fruchtträger oder -halter (z. B. der Doldenfrüchte).
carptus gerupft.
cartilaginēus knorpelig.
carthusianus Karthäuser.
caruncula Keimwulstchen, -atus damit versehen.
carvifolius kümmelblättrig.
caryophyllēus (aceus) nelkenbraun od. -rot.
caryopsis „Caryopse“, „Nussgleiche“, Schal-, Haut- od. Grasfrucht.
caseolaris käschenfrüchtig.
cassine zimmetartige (*κασσία* Zimetrinde).
cassubicus cassubisch, Cassuben, ein slavisches Volk in Pommern.
Catalauni Chalons.
catalecta, -orum Auswahl.
catalepticus starrsüchtig.
catalōgus Katalog, Verzeichnis.

cataphractus gepanzert.
catenulatus in Kettchen geformt.
caharticus reinigend, abführend (v. *καθαίρω*).
catinus Napf, Schüssel etc.
caudatus geschwänzt, schwanzartig (cauda).
caudex, -icis Stock, Schaft, Stamm.
caulialatus flügelstenglig, m. breit-häutigem Stengel.
cauliculus Stengelchen der Keimlinge.
cauliflorus am Stengel od. Stamm blühend.
caulinus (v. *caulis*) am Stengel befindlich.
cauloma Stengelgebilde (z. B. -Stacheln, Delbrouck).
cavus hohl.
cellula Zelle, **cellularis** aus Zellen gebildet, z. B. cellulares Zellenkryptogamen.
cellulosis „Cellulose“, d. i. Zellenfaserstoff.
cenisius vom Mont Cenis.
Centifolia Hundertblättrige Rose.
Centraleylinder, z. B. der Wurzelgefäße.
centralis „central“, den Mittelpunkt bildend.
Centrospermeae Jess. (sc. Dianthiflorae) Spornsamige.
centuria „Centurie“, das Hundert.
cepeaeifolius (bess. *cepaief.*) sedumblättrig (v. *κηπάια* Tripmadam).
ceraceus wachsartig, -gelb.
cerasifer, -era kirschentragend.
Cerealia „Cerealien“, Getreide (v. Ceres, der Ackerbau-Göttin).
cerens wachsern (v. *cera* Wachs).
cerinus wachsgelb (s. eb.).
cerodes (*κηρόδης*) wachsartig, -gelb.
cernuus nickend, geneigt.
cerussatus bleiweiss.
cerussa das Bleiweiss.
Cervicaria Halskrautblume (*cervix*, -icis).
cespes, -itis (*caespes*) Rasen.
cespitosus (*caesp.*) wie Rasen od. darin wachsend.
cestricus von Chester (Pennsylvanien).
chalaza Knospengrund, s. g. Hagelfleck (im ovulum).
chalconicus aus Chalcedon (Kleinasien).

chalepensis von Haleb (Aleppo) in Syrien.
chalybeiformis stahlhart (*χάλυψ*, -βος).
chalybeius stählern (s. eb.).
chamae- in compos. (*χαμαι* adv.) Erd- (klein, niedrig).
chamaerëpes (*χαμαίης*) auf der Erde kriechend.
charta Papierblatt, Karte.
chiloënsis von der Insel Chiloë bei Chili.
chionaeus (-nëus) schneeig, -weiss (*χιών* und *χιονέος*).
chius, -ia „chisch“, von der Insel Chios.
chloraenus grünspitzig (*χλωρός* und *αιχρόος*).
chloranthia Verlaubung einer Blüte (eine Ausartung).
chloranthus grünblumig.
Chloris, -idis **protogaea** vorweltliche Flora.
chlorophyllum „Chlorophyll“, Blattgrün.
chlorosis „Chlorose“, d. i. Bleichsucht der Blätter.
chloroticus bleichsüchtig, kein Blattgrün ausbildend.
chordorrhizus fadenwurzelig (chorda Saite etc.).
chrysanthus goldgelbbütig.
chrysentërus gelbfleischig (*χρύτερον* Eingeweide).
chryso- in compos. Gold- (*χρυσός*).
chrysorrhoeus goldflüssig, -fliessenlassend.
chrysoctictus (-os, -on) goldpunktiert.
chthonoplastes von Thon bildend (*χθών*, -όρος und *πλαστής*).
chymus (*χυμός*) Speisebrei, Flüssigkeit, „Chymus“.
cibarius als Speise dienend, **cibus** Speise.
cicatricula Nárbenchen, Keimmund des Sameneis.
cicatrix, -icis Blattnarbe (nach dem Abfallen).
ciliaris wimperig, -atus gewimpert.
Cilien = Wimperchen der Schwärmsporen.
cimicinus wanzenartig (v. *cimex*, -icis).
cincinnus Wickel, d. i. Verzweigung, deren Scheinachse bald links, bald rechts ansetzt.

cinctus gegürtet, umzingelt.
cineréus aschgrau (cinis, -eris Asche).
cingens umgürtend, umzingelnd.
cinnabarinus zinnoberrot.
cinnamomēus zimmetfarbig.
circellaris gitter- od. rostförmig (fr. grillé).
circinalis, -atus zirkelrund, schneckenförmig gerollt.
circinans in einen Zirkel sich rundend.
Circinantia (sc. Chlorophyta) i. q. Filices, s. eb.
circinus Zirkel.
circumnatio Umherbewegung der Vegetationsspitzen (Ch. Darwin).
circumscissus ringschnittig.
cirrhatus gerankt, **cirrhosus** rankig.
cirrus Ranke.
clandestinus heimlich, versteckt.
clarns mons Clermont (Frankreich).
clathratus gegittert, gitterartig.
claudens schiessend, zudrückend.
Claudiopölis Klausenburg.
clava Keule, **-atus** keulig, keulenförmig.
claviger, -ëra keulenführend.
clavicula Ranke, Wickelgabel, **-atus** mit solchen Wickelgabeln vers.
clavipes nagelfüssig, keulenstielig (clava u. clavus u. pes Fuss, Stiel).
clavis Schlüssel.
clavus Nagel.
cleistogamus verschlossenblütig¹⁾ (*κλειστός* u. *γάμος* Ehe etc.).
claudrum Antherenschloss (z. B. b. Orchideen).
closterium Gespinnst (*κλωστήριον*, *-ήριον* Spinner, Spindel).
clypeolus kleiner Schild, **-atus** damit versehen.
clypēus Schild, **-atus** schildförmig.
coadunatus vereinigt (z. B. antherae).
coetaneus gleichzeitig (nämlich Blätter u. Blüten).
coalitus vereinigt.
coarctatus zusammengeengt, -gepresst.
coccifer, -ëra Scharlachbeeren od. Cochenillen tragend.
coccinēus scharlachrot.
cochleatus muschelförmig gewunden.

coelestinus himmelblau.
coenanthium Blütenkuchen (*κοινός* gemeinsam).
cognitus bekannt.
colaerens zusammenhängend.
coliformis kunkel- od. spinnrockenförmig (cölus).
collectio „Collection“, Sammlung (ungleichartiger Pfl.).
collincola Hügelbewohner.
collinitus beschmiert.
collinus auf Hügeln wachsend.
collum Wurzelhals.
coloniensis Kölner (Augusta Colonia Köln).
coloratus „coloriert“, gefärbt.
columbarius, -bīnus Tauben betr.
columella Mittelsäulchen (in Mooskapseln).
Columnelliferae (sc. Dianthiflorae) Jess. Säulenträger (zu Gruinales).
columna „Columnne“, d. i. Griffel od. Befruchtungssäule, in einer Mittelsäule mit dem Griffel verwachsene Staubfäden.
Columniferae Endl. „Columnen“- od. Säulenträger.
coma (gr. *κόμη*) Haarschopf.
comedens aufzehrend (comedo verzehre).
comestible fr. essbar.
comitialis „Comitien“ od. Wahlversammlungen betr., Reigen (Kummer).
commentarium(-us) „Commentar“, Tagebuch etc.
commentatio Überlegung, Tagebuchsverzeichnis.
commissura Naht, „Commissur“.
communis gemein, „commun“, gemeinsam.
commutatus vertauscht, verwechselt.
comosus schopfig, haarbuschartig.
compactus zusammengedrängt, „kompakt“, derb (Kummer).
compilatio Zusammenplünderung, „Compilation“.
complanatus flach zusammengedrückt.
complectens umfassend, in sich begreifend.
completus vollständig, „complet“.
Compositae Adans. Vereins- od. Korbblütl.

1) Sich nicht öffnende Blüte!

- compressus** zusammengedrückt.
comptus (comtus) geschmückt, schmuck anzusehen.
concauus „concau“, hohl.
concentricus „concentrisch“, um einen gemeinsamen Mittelpunkt herum.
conceptacula Brutbecherchen (d. Lebermoose etc.).
conceptio Empfängnis (bei Blütenbefruchtung).
conciuus gehörig gefügt, abgemessen, zierlich etc.
concolor gleichfarbig, einfarbig.
condensatus „condensiert“, verdichtet.
conduplicatus verdoppelt.
Concubrica Coimbra (Portugal).
confertus (e. g. flos) gefüllt (v. confercio).
confervoides wasserfadenartig.
confinis angrenzend, verwandt.
confluens zusammenfließend.
Confluentes Coblenz.
confocal d. i. mit gleichem od. gemeins. Brennpunkt (z. B. Parabel, Sachs).
confragosus holperig, uneben.
confusus „confus“, verwirrt, wechselt etc.
congener, -era verwandt.
congestus zusammengestellt, gehäuft.
conglobatus zusammengeballt, geknäuelt.
conglomeratus zusammengehäuft, „Conglomerat“.
conglutinator zusammengeklebt (gluten, -inis).
congregatus zusammengesellt, rasisig (Kummer).
conicus „conisch“, kegelförmig (conus).
conidiae „Conidien“, d. s. sekundäre Sporen der Keimschläuche bei Kryptogamen.
conifer, -era zapfentragend, „Conifere“.
Coniferae DC., Coniferen od. Zapfenträger.
coni lupuli Hopfenzapfen (conus Kegel, Zapfen).
conigenus zapfenartig, einen Zapfen bildend.
Coniomycetes Fr. Staupilze (ζορία u. μύκης, -ήτος).
conjugatio i. q. copulatio Vereinigung zweier Zellen od. Zweige zu einer od. einem.
conjugatus zusammengejocht, vereinigt.
connatus zusammengewachsen, verbunden.
connectivum „Connectiv“, d. i. Mittel- od. Zwischenband d. Antherenfächer, eine Fortsetzung d. Staubfadens.
connivens zusammenneigend.
conocarpus kegelfruchtig.
conopeus (-opseus) fliegenartig (v. Conops Stechfliege).
conopilus Kegelhut (conus, pilus).
consistens sitzenbleibend.
consolidus sehr fest, hart, innen erfüllt (nicht hohl).
conspectus Überblick.
conspicuus beträchtlich, ansehnlich.
constans beständig.
Constante, sich gleichbleibende Zahl, z. B. der Temperatur od. Wärmegrade.
constrictus zusammengebunden, -gefesselt.
contiguus anstossend, angedrückt (Kummer).
contortus zusammengedreht, -gewunden.
contractus zusammengezogen.
contrayerva span. Gegengift.
controversus bestritten, streitig.
conus Kegel, Fruchtzapfen, Zapfenfrucht.
convallatus unwallt, umgeben.
convexus „convex“, erhaben, gewölbt.
convolutus zusammengewunden.
convolvulus sich zusammenwindend (Winde).
coprophilus kothliebend (κόπρος).
copulatio Vereinigung zweier Zellen, Zweige etc.
coracanus Raben betr.? (corax), wahrsch. von Korakan (z. B. indisches Kammgras).
coracensis aus Koräa (China).
coranicus koranisch, den Koran d. Muhamedaner betr.
coreulum Herzchen (dem. cor, -dis).
cordatus herzförmig.
coriaceus (-rius) lederartig (corium Leder).
coriifolius lederblättrig.

- coriophorus** Wanzen tragend (v. *κόρις*, -ιος).
- Cornophytæ** Endl. Stock- oder Achsenpflanzen (*κόμοσ* u. *φυτόν*).
- cornëus** hörnern, hörnartig.
- corniculatus** mit einem Hörnchen versehen.
- cornucopie** Füllhorn (cornu, copia Fülle).
- cornucopioides** füllhornähnlich.
- cornütus** gehört.
- cornuviensis** aus Cornwales.
- corolla** Blumenkrone.
- Corollifloræ** DC. Kron- od. Ganzblumige.
- corolliflorus** mit Krone blühend.
- corona** Kranz od. Nebenkronen innerhalb der Blumenkrone.
- corona staminëa** die Staubgefäße tragende Nebenkronen (z. B. bei Apocynen, Asclepiaden etc.).
- Coronariæ** Endl. Kronlilien.
- coronarius** eine Nebenkronen führend.
- coronula** i. q. paracorolla Nebenkronen.
- corpuseula** Embryosäckchen der Gymnospermen.
- corrugatus** voller Runzeln, **corrûgus** dsgl.
- cortex**, -icis Rinde.
- corticalis** auf Rinden wachsend.
- corticëus** (-cosus) rinden- od. korkartig.
- cortina** Vorhang, Manchette am Strunk d. Pilze, auch Kessel.
- coruscus** schwankend, zitternd (-cans desgl.).
- corvinus** Raben betr. (corvus).
- Corymbifloræ** DC. Ebensträussler (Compositen).
- corymbosus** doldentraubig, ebensträussig.
- corymbus** Doldentraube, Ebenstrauß.
- coryphaeus** „Koryphæ“, Haupt (in Zusamm.).
- costa** Rippe, costa media Mittel- od. Hauptrippe.
- cotylëdon** Samenlappen, -dönes Keimblätter.
- cöus** coisch, von der (griech.) Insel Kos (*Κῶς*).
- cracoviensis** Krakauer.
- crassinervius** dicknervig, -aderig.
- crassipes** Dickfuß, dickstielig.
- crateriformis** becherförmig.
- cremocarpium** Hängfrüchtchen (b. Dolden).
- crenatus** (-nulatus) gekerbt, fein gekerbt.
- crepidifolius** pippaublättrig (Crepis Pippau).
- crepitans** klappernd, rasselnd.
- cresecentia** Wachstum, das Gewachsene, die „Crescenz“.
- crinitus** behaart, langhaarig (v. crinis Haupthaar).
- crispatio** Kräuselung, Kräuselerkrankheit.
- crispus** kraus, -pulus kräuselig, etwas kraus.
- crista** Kamm, -atus gekämmt, kammartig.
- crithmifolius** bacillenblättrig (s. Crithmum).
- crocatu**, -rëus safrangelb (v. Crocus).
- cruciatus** gekreuzt, kreuzförmig.
- crucibulum** Tiegel (Kummer, Pilze).
- crucifer** u. **cruciger**, -ëra kreuztragend, -führend.
- Crucifloræ** DC. (-floræ Rehb.) Kreuzblütler.
- cruentus** blutig, blutrot.
- crura** **stigmatis** Narbenschkel.
- crypta** „Krypte“, Erdgruft (v. *κρυπτόν* verborgen).
- cryptogamus** verborgenblühend, „Kryptogame“ (s. eb. u. *γάμος*; Ehe, d. h. Blüte).
- Crystallöide**, Krystallkörperchen aus Protein in Zellen.
- cubensis** von Cuba (Westindien).
- cuculi** des Kuckuks (sc. flos).
- cucullatus** kappenförmig (cucullus Kappe, Kapuze).
- culmis** in compos. halmig (v. culmus Halm).
- cultratus** messerförmig (v. cultrum Messer).
- Cumbria** (Cambria) Cumberland, Fürst. Wales.
- cuneatus** keilförmig zugespitzt.
- cuneifolius** keilblättrig (cunëus Keil).
- cuneiformis** keilförmig.
- cuprarius** kupferig, **cuprëus** kupferfarbig.
- cupula** Becherchen, Schüsselchen (z. B. der Eichel).
- Cupulifloræ** Rehb. Becherfrüchtler.
- curassavicus** aus Curaçao (holländ. Insel in Westindien).

- curavit** hat besorgt od. herausgegeben.
- Curia** Chur in Graubünden.
- curtipendulus** kurzherabhängend.
- curtus** kurz, gestutzt etc., **-tilus** etwas gestutzt.
- curvatus** gekrümmt, **curvus** krumm.
- cuspidatus** gespitzt, spitzig.
- cuticula** Oberhäutchen (dem. cutis Haut) z. B. Pollenhaut, oberste Epidermhaut.
- cuticularis** häutig, rindig (Kummer).
- cyanus** in compos. von *κύανος*. Bohne.
- cyathiformis** becherförmig (*κύαθος*).
- Cybele** (Cybèle) Cybele od. Ceres, Naturgöttin.
- cyclisch** d. i. im Kreise geordnet (z. B. Blüten).
- cyclösis** Kreisbewegung (des Milchsafts).
- eyclus** (*κύκλος*) Blattwirbel, spirali-ger Blattumgang.
- eyma** Trugdolde, - *globosa* kugelige, - *plana* schirmartige, - *unipara* Wickel.
- cymiger** u. **cymosus** trugdoldig, m. seitensprossiger Verzweigung.
- Cynarocephalae** Juss. Distelköpfige.
- cyphelle** fr. Becherchen (- des lichenens).
- cystocarpia** Blasenfruchtform (*κύστις* u. *καρπίς*).
- cytoblastus** „Cytoblast“ d. i. Zellkern (*κύτις*: Hülle, *βλαστός*: Keim).
- Daboecius** Daboek's (Namen eines irischen Heiligen).
- Dacia** Dacien (Rumänien, Wallachei u. Siebenbürgen).
- dactylifer** datteltragend, fingerführend.
- dactylus** Dattel, Finger.
- daedalus** künstlich, schön (*δαίδαλος*).
- dahuricus** daurisch, von d. daurischen Gebirge im östl. Nordasien.
- danicus** dänisch (Dania Dänemark).
- dasyarpus** rauhfrüchtig (*δασύς*: rauh, *ζοτή*: zottig).
- dasycladus** rauhästig, -zweigig (s. eb.).
- dasyphyllus** rauhblättrig (s. v.).
- davuricus** i. q. dahuricus.
- dealbatus** ausgeweist, überweist.
- debilis** schwächlich.
- decandrus** zehnmännig, m. 10 Staubgefässen (*δέκα* u. *ανήρ*, *-δρος*).
- decapetalus** m. zehn Kronblättern (*δέκα* u. *πέταλον*).
- decaus**, **-adis** Zahl Zehn, ein Zehend, eine „Dekade“.
- deciduus** abfällig, leicht abfallend.
- decipiens** täuschend, wie Rasen aussehend u. dgl.
- declinatus** gebeugt, geneigt.
- decolorans** abfärbend, abschliessend.
- decoloratus** entfärbt.
- decompositus** auseinandergestellt, getrennt.
- decorus** anständig, zierlich.
- decumanus** aus d. Zehntland, d. i. Südwestdeutschland, von d. Römern *agri Decumates* gen.
- decumbens** niederliegend.
- decurrens** hinablaufend (z. B. Blätter am Stengel d. Disteln etc.).
- decursivus** herablaufend.
- decussatus** ins Kreuz gestellt od. abgeteilt, „decussiert“ (z. B. Blattpaare).
- deflexus** herabgebogen.
- defloratus** verblüht, abgeblüht.
- deformatio** Entstellung, Missbildung.
- deformis** entstellt, hässlich.
- defossus** eingegraben, vergraben (v. *defodio*).
- degeneratio** „Degeneration“, Ausartung.
- deglyptus** abgeschält (v. *deglübo*).
- dehiscencia** das Aufspringen der Trockenfrüchte.
- delicatus** „delikat“, fein, köstlich, zärtlich.
- delicia**, **-orum** (*deliciae*, *-arum*) Ergötzen, Ergötzlichkeiten.
- deliciosus** köstlich, wohlschmeckend etc.
- deliquescens** zerfliesslich.
- deltoides** deltaförmig, dreieckig (*Δέλτα* u. *εἰδομαί* gleiche).
- demersus** untergetaucht, unter Wasser wachsend.
- demissus** herabhängend, niedrig etc.
- demum** endlich, zuletzt, später.
- dendriticus** „dendritisch“, wie Dendriten d. i. Bäumchenzeichnung.
- dendrologia** „Dendrologie“ d. i. Baumkunde.
- dendrologicus** Baumkunde betr.

- dendron in compos. -Baum (*δέρυ-δουρ*).
- denigratus** geschwärzt.
- densiflorus** dicht od. gedrängt blühend.
- dentatus** gezähnt, gezähnel.
- denticulatus** mit Zähnchen, feingezähnel.
- denudatus** entblösst, bloss, kahl.
- depauperatus** beraubt, armgemacht, armbliätig.
- dependens** ab- od. herabhängend.
- depluens** abtröpfelnd.
- depressus** niedergedrückt, platt.
- dermatogēnos** „Dermatogen“, d. i. Oberhautstoff, die Epidermis erzeugender.
- descendens** „Descendent“, Abkömmling.
- deserta**, -orum Wüste.
- destillatorius** Tropfen sammelnd.
- destitutus** beraubt, entbehrend.
- determinate** entschieden, bestimmt, durchaus.
- determinatio** das Bestimmen (z. B. der Pflanzen).
- detonsus** beschoren.
- deustus** angebrannt.
- devonicus** „devonisch“ (Gebirg in Cornwall u. Devonshire betr.).
- Dextrin** = Stärkekummi.
- dextrorsum** rechtsum, rechtsherum.
- diacanthus** zweistachelig, -dornig.
- diachenium** zweisamiges Schliessfrüchtchen (b. Dolden).
- diagramma** Zeichnung, Durchschnittbild, Grundriss.
- Dialypetalae** DC. Getrenntkronblättrige.
- diamētrus** „Diameter“, Durchmesser.
- Diandria** L. Zweimännige.
- diaphānus** durchscheinend, durchsichtig.
- diaphoreticus** (*διαφορητικός*) verteilend, schweisstreibend.
- Diastase** = stickstoffhalt. Zellenkörper, der das Zerfallen der Stärke in Weingeist u. Kohlensäure bewirkt.
- diatrētus** gedrechselt? (Kummer), durchbohrt (*τορτός*).
- dichasialis** „dichasial“, Halbierungs- (Wylder, z. B. Verzweigung).
- dichasium** dopp. Seitensprossung, üb. d. Gipfelsprosse hinaus (*διζύω* zerteile etc.).
- dichogamae** m. Wechsel- od. gegen- seit. Zwitterbefruchtgt.
- Dichotonie** = Gabelung eines Triebes (*διχός* dopp., *τομή* Schnitt).
- dichotōmus** zweiteilig, gabelig.
- dichrōus** zweifarbig (*διχρόος*).
- dichlinus** zweilagerig, getrennten Geschlechts (*ζλήνη* Bett), (die Blüten- geschlechter auf demselben Stock beisammen od. auf zweierlei auseinander, monöcisch od. diöcisch!).
- dicoecus** zweikörnig od. -kernig.
- dieranotrichus** doppelspitz- od. gabelzahnhaarig (*διζουρή*; zweiköpfig, *τοίχος*, *τοίχος* Haar).
- didymus** (*δίδυμος*) doppelt, Zwill- ling.
- differenziert** = unterschieden, in verschiedene Teile auseinandergehend etc.
- diffusus** aufgeteilt, zerspaltet.
- diffusio** „Diffusion“ d. i. gleich- mässige Verteilung von Flüssig- keiten in einander.
- diffusus** (e. g. *caulis*) ausgebreitet, auseinander-.
- digestus** verteilt, durcheinander- gerührt, „digeriert“ (v. *digero*).
- digitalis** Fingerhut.
- digitaliformis** fingerhutförmig.
- digitatus** gefingert, in Finger ge- teilt (*digitus*).
- digitellus** wie Fingerchen geformt (dem. *digitus*).
- Dignität** = mathematischer Wert.
- digynus** zweiförmig, m. zwei Griffeln od. Narben (*δι* u. *γυνή* Weib, Bot. Griffel etc.).
- dilatatus** erweitert, ausgedehnt, (in d. Zeit) verspätet.
- dilutus** verwaschen, verdünnt, ver- blasst.
- dimer** = zweigliedrig, -reihig (*μέ- γος* Stück).
- dimidiatus** in zwei Teile get., hal- biert.
- dimorphismus** Zweierleibildung der- selben Art; dimorphe Blüten d. s. mit grossen u. mit kleinen Griffeln.
- dioecus** (-oicus) (*διούκος*) zwei- häusig = d. Blütengeschlechter auf zweierlei Stöcken auseinander.
- diosmōsis** „Diosmose“, d. i. Durch- schwitzen von Flüssigkeit durch trennende Haut (*διωμωτός* v. *διώ- θω*).

dipetälus zweikronblättrig (*δίπετα-
λον* Kron- od. Blumenblatt).
diphyllus zweiblättrig, m. 2 Laub-
 blättern (*δίφυλλον*).
Diplecolobæe DC. Zweikuchen-
 lappige (Cruciferen).
discoidens scheibenförmig (discus,
δίσκος u. *επίδομα* gleiche).
Discanthæ Endl. Scheibenblütler.
discolor verschiedenfarbig, bunt.
Discomycetes Fr. (-phori DC.) Schei-
 benpilze.
discretus (v. discerno) unterschieden.
discus (*δίσκος*) Scheibe, z. B. bei
 Radiaten, Rebenblütern od. Dis-
 canthæ = Scheibenblütern.
disepälus (sc. calyx) zweizipflig.
dispar ungleich, unähnlich, ver-
 schieden, ungleich gross.
dispersus zweisamig (*σπέρμα*
 Samen).
dispersus zerstreut, ausgebreitet
 (v. dispergo).
dispositio „Disposition“, Anord-
 nung, Verteilung.
dissectus zerschnitten (v. dissecō).
disseminatus ausgesät, ausgestreut
 (semen, -inis Samen).
dissepimentum Scheidewand (z. B.
 im Fruchtknoten).
dissertatio „Dissertation“, Ab-
 handlung.
dissiliens aufspringend.
dissitiflorus entferntblühend (dissit-
 us abgelegene etc.).
distachyos zweijährig (*στάχυς*, -νος
 Ähre).
distans auseinanderstehend, ent-
 fernt.
distentus ausgedehnt, auseinander-
 gezerrt etc.
distichos (-us) zweizeilig (*στάχος*
 Zeile, Reihe).
distincte (-us) deutlich getrennt,
 unterschieden.
diurnus über Tag blühend (dies).
ditio, -onis Botmässigkeit, Gebiet.
divaricatus ausgespreizt.
divergentia „Divergenz“, Abstand
 zweier aufeinanderfolgender Blät-
 ter etc.
diversidens ungleichzählig, ver-
 schieden-.
Diviona Dijon (in Burgund).
divionensis von Dijon.
divulsus auseinandergezerrt (di-
 vello).

Dodecandria L. Zwölfmännige.
podrantalıs zu Dreiviertel.
dolabratus axtförmig.
dolabriformis axtförmig, -petälus
 -kronblättrig.
Donianus Don's, des Botanikers,
 nicht d. Flusses Don.
Doppelachäne (z. B. bei Dolden-
 fruchten).
dorsalis (v. dorsum) auf d. Rücken
 befestigt, „dorsal“.
drasticus „drastisch“, wirksam,
 kräftig (*δραστικός* v. *δράω* handle
 etc.).
drupa Steinfrucht, -obst.
Drupacæe DC. Steinfrüchtige
 (-obst).
drupacens steinfrüchtig, steinobst-
 artig.
drymeus (v. *δρυμός*) in Gehölz
 wachsend.
dryophilus eichen- od. waldliebend
 (*δρῦς*, -ίος Eiche).
Duacni Douai (in Flandern).
dubius zweifelhaft, unbestimmt.
duinensis von Duino am Golf v.
 Triest.
dulcamarus süßbitterlich, bitter-
 süß.
humilis in Gebüsch wachsend
 (v. dumus).
dumetum Dorngebüsch, -hecke.
dumosus voller Gestrüppe.
duplex, -icis doppelt, **duplicatus**
 verdoppelt.
duramen Kernholz.
durinus hölzern (*δούρειος* od. -οιος).
durisculus etwas hart (dem. durus).
dysentericus die Ruhr od. „Dysen-
 terie“ betr.
Eblana Dublin.
ebracteatus ohne Deckblatt.
Ebrodunum Yverdon (Schweiz).
elburneus von Elfenbein, elfenbein-
 weiss.
echinatus stachelig (*ἐχίνος* Igel).
echinosporus stachelsporig, -samig.
eclöge, Plur. -gae Auswahl, Aus-
 lese.
edentulus zahnlos, ohne Zähnen.
Edina Edinburg, **edinensis** Edin-
 burger.
editio Ausgabe, **editus** herausge-
 geben.
eductio Auferziehung, Überführung.
edulis essbar.

efflorescentia das Aufblühen, die Blütezeit, Ausblühung od. „Efflorescenz“ (v. Salzen).
effusus ausgebreitet, locker, auseinander.
egensis von Ega (Stadt am Amazonenstrom).
eläter Schleuder, Spiralband (Schleuderzelle der Mooskapseln).
elätior (v. elatus) höher, etwas hoch.
elegantior (-ius) besonders elegant od. fein.
elenchus (ἐλέγχος) Beweisführung, Inhaltsverzeichnis.
eleutherogynae freiweibige, mit freiem Fruchtknoten.
eleutheropetalae mit freien (unverwachsenen) Kronblättern i. q. Dialypetalae DC.
ellipticus elliptisch, langrund.
elödes (ἐλωδής von ἐλος) sumpfig, in Sumpf wachsend.
elongatus verlängert, langgestreckt.
elytroides flügeldeckähnlich (ἐλυττοῦ Futteral, Flügeldecke d. Käfer etc.).
emarcidus welk, kraftlos.
emarginatus ausgerandet.
embryon der „Embryo“ od. Keimling, der Keim im Innern eines Eis od. Samens.
emendatus verbessert, „emendiert“.
emergentia (sc. folia) Hervorragungen i. q. Tentakeln, „Emergenzen“.
emerus zahm, gebaut.
emeticus (ἐμετικὸς) brecheneneremmens hervorragend. [gend.
Emodus (Imaus) **Mons Himalaya** Gebirge.
emulsio „Emulsion“, Auswaschung.
enantioblastae Endl. Gegensprosser (ἐναντίον gegenüber).
encephalus im Kopfe befindlich, hirnartig.
enchiridion Handbuch, Heft (ἐγγεῖοιδιον von ἐν in und χεῖρ Hand).
encyclopaedia „Encyklopädie“, Inbegriff der Wissenschaften.
endemius (gr. ἐνδημιός) „endemisch“, einheimisch, einem Lande eigen.
endocarpium Beerenhaut, (oft verholzte) Innenfruchthaut.
endodermis Korkinnenhaut.
endogēnus von innen wachsend, „Endogen“ DC.

endophyta Innenschmarotzer, -, gewächse“.
endorrhizae (sc. Monocotylae) scheidenwurzlige Monocotylen.
endosmōsis „Endosmose“, das Eindringen von Flüssigkeit durch trennende Haut.
endospermium „Endosperm“, Eiweiss od. innere Kernmasse.
endosporium Innenhaut der Mikrosporen (Rhizocarpeen).
endostomium Mund od. Öffnung der inneren Eihaut.
endothecium innere Schicht der Antherenhaut.
Energie = Kraftanstrengung, z. B. des Auswachsens (Vöchting).
enervius nervenlos, ohne Adern od. Äderchen.
enneaphyllus neunblättrig, m. 9 Laubblättern.
enōdis knotenlos, astlos, glatt.
Ensatae Endl. etc. Schwertelgewächse (ensis Schwert).
ensiformis schwertförmig.
entomologia „Entomologie“, d. i. Insektenkunde (ἐντομολογία Insekt).
enumeratio Aufzählung.
ephemerus „ephemer“, nur einen Tag dauernd (ἐπὶ αὐτῆς ἡμέρας Tag).
epiblastēma = terminale (an der Spitze befindliche) Antheridien u. Archegonien, Celakowski.
epiblēma Wurzeloberhaut (ἐπιβλήμα Decke).
epicarpium Fruchtoberhaut (bei Gräsern etc.), Fruchtaufsatz, öfter ablösbar.
epichilum Oberlippe (ἐπί u. χεῖλος Lippe, Lefze).
epichnōsis oberflächlich mit Wolle bedeckt (ἐπιχρῶσις).
epierisis Auswahl, Beurteilung, weitere Kritik.
epidendron (-um) auf Bäumen befindlich.
epidermis Oberhaut, oberste Hautschicht.
epigaeus (-ēus) auf od. über d. Erde wachsend od. kriechend (z. B. Cottyledonen).
epigyna (sc. insertio) obenständige Einfügung od. Stellung d. Blüten-teile auf dem Stempel od. Fruchtknoten).
Epilinum auf Lein schmarotzend, s. g. Flachsseide.

epimeliae (ἐπιμέλεια) Studien.
 epipetalus „epipetal“, auf der Blumenkrone stehend (z. B. Staubgefäße, Celakowski).
 epiphyllus auf Laub wachsend (e. g. flos).
 epiphytus auf Pflanzen schmarotzend.
 epipsilus oben kahl od. nackt (ψιλός).
 epiroticus „epirotisch“, aus Epirus (Nordwestgriechenland).
 epistaminia Juss. mit oberständigen Staubfäden.
 epithelium zarte Oberhaut (ohne Spaltöffn.), „Epithel“.
 Epithymum auf Thymian schmarotzend.
 epizoothia auf Tieren wachsend. Pilze (ἐπιζώον Tier u. ὠφέλομαι dränge mich auf).
 equitans reitend, auf ein. Stengel gegenübertretend (z. B. bractea).
 erectusculus ziemlich od. fast aufrecht.
 erectus aufrecht. [recht.]
 ergoté fr. mit Sporen versehen (seigle = s. g. Mutterkorn).
 ericaeus auf Heiden vorkommend.
 ericetum Waldheideplatz.
 erinaceus (herinac.) Igel, igelartig, stachlig.
 eriocarpus wollfrüchtig (ἔριον).
 eriophorus Wolle tragend. [Wolle].
 eriostemon saubfadewollig (στῆμων lat. stamen Staubfaden).
 ermineus hermelinartig (ermineä Hermelin).
 erous ausgenagt.
 erraticus umherirrend (z. B. erratischer Block in d. Geologie).
 erucaeformis (bess. erucif. -) rauken- od. raupenförmig.
 erythraeus am roten Meer wachsend (mare erythraeum, gr. ἔρυθραίων).
 erythrocarpus rotfrüchtig.
 erythrophyllum Blattrot i. q. anthocyānum.
 erythrophyllus rotblättrig.
 erythropus rotfüßig, -stielig.
 escharoides (ἐσχάρωδης) schorfartig, grindig.
 esculentus essbar.
 eskius (e. g. Festuca eskia) ausser Schatten wachsend (e od. ex, σκία Schatten).
 esulus (neulat. dem. esus gegessen) essbar.

esurientium der Hungernden od. Hungrigen.
 étiolées (sc. feuilles) „etioliert“, bleichsüchtig.
 Etiolin i. q. xanthophyllum „Blattgelb“, beim s. g. Vergeilen der Bleichstoff.
 etruscus etruskisch, aus Etrurien (Toskana).
 etymologia „Etymologie“, d. i. Kunde von der Bedeutung der Wörter.
 euganeus euganeisch (Gegend v. Padua in Venetien).
 eumorphus wohlgestaltet, schöngebildet.
 evernius gutwachsend, wohlgewachsen (ἐδεονής von ἐδεονέω gedeihe etc.).
 evolutio „Evolution“, Aufwicklung.
 evolutus aufgewickelt, entwirrt.
 evolvens aufwickelnd, eine s. g. „Evolvente“ bildend.
 exalbuminosus ohne Eiweiss (Albumen).
 exanthema (ἐξάνθημα) „Exanthem“, d. i. Ausschlag, Aussatz.
 exanthematicus wie Aussatz aussehend.
 excelsior, -sus höher, hoch.
 Excentrität d. i. Abstand der Ellipsenbrennpunkte von der Mitte.
 excipuliformis trichterförmig.
 excipulum Hülle (der Pilze etc.), Auffanggefäß, Trichter.
 excisus ausgeschnitten.
 excoriatus enthäutet, geschunden (corium Haut, Leder).
 excorticatus entrindet (cortex, -icis).
 excretio Ausscheidung.
 excursorius zu Excursionen (Ausflügen) bestimmt.
 exhibens darstellend, von sich gebend.
 exiguus klein, winzig, gering.
 exilis dünn, mager, niedrig.
 exine = äussere Haut des Pollenkorns.
 exogenus aussen wachsend, „Exogen“ DC.
 exoniensis von Exonia, d. i. Exeter (engl. Südküste).
 exorrhizae (sc. Dicotyledones) nackt- od. freiwurzlige D.

exosmōsis „Exosmose“, d. i. Herausdringen von Flüssigkeit durch trennende Haut.

exostomium Mund od. Öffnung d. äusseren Eihaut.

exothecium äussere Antheren-Hautschicht.

exoticus „exotisch“, d. i. aus fremden Ländern stammend.

Expansionskraft, Ausdehnungs- od. Spannkraft (Pfeffer, periodische Reizbewegung).

expansus ausgedehnt, ausgebreitet.

explanatus ausgebreitet, deutlich.

expositio Auseinandersetzung, -tus auseinandergesetzt.

exscāpus schaft- od. stengellos.

exsertus herausgestreckt.

exsiccat ausgetrocknet.

exstipulatus ohne Nebenblatt, nacktachselig, -winklig.

exsucens saftlos, ausgetrocknet.

extensus ausgedehnt, weitläufig.

exterior äusserer, **extimus** äusserster, ganz aussen.

extinctorius auslöschend, zerstörend.

extra-axillaris ausserblattwinklig (z. B. Ranke, Warming).

exuviatus abgehäutet, als Balg abgestreift.

Eystettensis von Eichstädt (Bayern).

fabacēus, -arius bohnenartig.

faciōla Buchenbewohner, an od. bei solchen wachsend.

falcatus, -arius sichelförmig (falx, -cis Sichel).

falcifolius sichelblättrig.

fallax, -acis trügerisch, täuschend.

farcinimentum Füllsel, Wurst.

fartus (fartus) vollgestopft (v. farcio).

farina Mehl, -acēus, -osus mehlig.

farnesianus farnesisch, v. Palast der Farnese in Florenz.

fasciatio Verbänderung, d. i. Verbreiterung der Stammgebilde.

fasciatus gebändert (fascia Band, Binde).

fascicularis, -atus bündelförmig.

fasciūlus Bündel, Büschel, „Fascikel“, i. q. glomerūlus.

fastibilis widerlich.

fastidiosus ekelerregend, verdriesslich.

fastigiatus gegipfelt, flachgipfelig, ebensträussig.

fastuosus prächtig, prachtvoll, stolz etc.

fatūsus weissagend, Wetter verkündigend, auch auffällig, albern (Kummer: fad).

faux, -cis Schlund.

Faventia Stadt Faenza (in der Romagna).

febrilis fieberartig, -heilend (febris Fieber).

febrifugus Fieber vertreibend.

febrūsus reinigend.

fecundus (foec-) fruchtbar, ergiebig.

Federgranne = Schwanz auf Schliessfrüchten.

Federkrone, z. B. am Kelchrand der Baldrianfrüchte.

femina Weib, -nēus, -nīnus weiblich.

fenestratus gefenstert, durchbrochen.

fennicus finnisch, aus Finnland.

fenum (foenum) Heu.

ferax, -cis fruchttragend, Ertrag liefernd.

ferinus Wild betr. (ferina Wildpret).

fermentum „Ferment“, Gärungserreger, Hefe.

ferox, -ocis wild, kriegerisch abwehrt, stark bestachelt.

ferruginēus rostfarbig, -gelb.

ferrugo, -inis Eisenrost.

fertilis fruchtbar.

ferus wild.

fibrillae Wurzelfasern od. -zasern.

fibrillosus u. **fibrosus** faserig (fībra Faser).

fibro-vasalis Fasergefässe od. Gefässbündel betr.

ficarius feigenknollig (fīcus Feige).

ficifolius feigenblättrig.

ficoidēs feigenartig.

filamentum Faden, Staubfaden.

filicaulis fadenstenglig (filum Faden).

filiculosus wie kleines Farnkraut (filiculus dem. v. filix, -cis Farn).

filifolius fadenblättrig.

filiformis fadenförmig.

filipendūlus an Fäden hängend (z. B. Knollen an Wurzelfäden).

filopes (st. filipes) fadenfüssig, -stielig.

Filtrationswiderstand des Protoplasmas, wodurch der Wasser-

- druck oder Turgor der Zellen bewirkt wird.
- filtrum** „Filter“, fr. filtre Seihe, Durchschlag.
- fimbria** Franse, -atus gefranst.
- fimicōla** Dung- od. Mistbewohner (finum od. -us Mist).
- fimiputris** dungfaul.
- fissus** gespalten.
- fistūla** „Fistel“, Röhre, -osus röhrenförmig.
- flabelliformis** fächer- od. fächerförmig.
- flabellum** Fächer, Wedel, flabellus fächerlig.
- flaccidus** od. flaccus welk, schlapp, flatternd.
- fladnizensis** von den Fladnitzer Alpen (in Kärnthen).
- flagelliformis** peitschenförmig.
- flagellum** Geißel, Peitsche, Schössling od. Ausläufer.
- flammūla** (dem. flamma) Flämmchen.
- flexilis** biegsam, gebogen.
- flexipes** schlangenförmig (Kummer).
- flexuosus** hin- und hergebogen.
- floccidus**, -cosus flockig, flockenfaserig.
- floccus** Flocke, Wollenfaser, Wolle.
- Flōra** eig. Göttin der Blumen u. Blüten, in d. Botanik = Pflanzeninbegriff.
- florescentia** „Florescenz“, d. i. Blütenbildung, das Aufblühen.
- florēus** blumig, blumenreich.
- floribundus**, -ridus blumig, reichblühend etc.
- florifer**, -ger, -ēra blüentragend.
- florilegium** Blumenlese.
- Florūla** (dem. Flora) kleine Flora.
- flos**, -ōris Blume, Blüte, flores = Thee.
- flosculus** Blümchen, -losus m. kleinen Blütchen vers.
- flos compositus** zusammengesetzte Blume, Blütenkorb.
- Flughaare**, z. B. Pappel- u. Weidenwolle.
- fluitans** flutend, auf fließ. Wasser aufliegend od. darin vorwärtstrebend.
- Fluminensis** (sc. Flora, Fl. Flum.) von Rio-Janeiro.
- fluvialis**, -aticus im Fluss wachsend.
- focus** Brennpunkt, z. B. der Ellipsen, Parabeln etc.
- foecundatio** Befruchtung.
- foecundus** (fecundus) fruchtbar.
- foeminēus** (fem.-) weiblich.
- foeniculacēus** fenchelartig.
- foenum** Heu, foenum graecum, s. d. Nomenklatur.
- foetens**, -tidus übelriechend, stinkend.
- foliacēus** blatt- od. laubartig.
- foliatus** beblättert, blattführend.
- foliolum** Teilblättchen eines zusammengesetzten (gefiederten etc.) Blatts.
- foliosus** blattreich, blättrig, folium (*φύλλον*) Laubblatt.
- folliculus** Balgfrucht d. i. aus einem an d. Bauchnaht aufspringenden Fruchtblatt bestehend.
- follicularis** balgfrüchtig.
- fomentarius** Zunder liefernd.
- fongus** (fr.) lat. fungus Schwamm, Pilz.
- fontānus** in Quellen zu finden, aus solchen stammend (fons, -tis).
- fontigēnus** in Quellen erzeugt.
- forcipatus** zangenförmig (forceps, -ipis).
- formatio** „Formation“, Bildung (Gesteinschicht etc.).
- formosianus** von d. Insel Formosa bei China).
- formosus** schöngeformt, stattlich etc., -issimus besonders stattlich.
- fornicatus** mit Bogenwölbungen od. Schüppchen.
- fornix**, -icis Bogen, Wölbung, -ices Schüppchen od. Klappen.
- fovēa** (dem. -veōla) Grube, Honigrube (Grübchen).
- foveolatus** mit Grübchen versehen.
- foveosus** grubig, mit Honigruben.
- fovilla** feuchter Polleninhalte, Befruchtungsstoff.
- fragifer**, -ēra Erdbeeren tragend (fragum).
- fragilis** zerbrechlich, gebrechlich.
- fragmentum** „Fragment“ d. i. Bruchstück.
- fragrans** (sc. odor) duftend, davon **Fragaria** Erdbeere.
- Francofurtum** Frankfurt.
- francoicus** aus Franken.
- frangulus** zerbrechlich.
- fraternus** brüderlich, verwandt.
- fraxinēus** eschenartig, von Esche.
- fribergensis** von Freiberg (in Sachsen).

friburgensis von Freiburg.
frigidus kalt, im Kalten wachsend.
fritillarius brettspielartig.
fritillus Würfelbecher und Brettspiel (-um Schachbrett).
frondescentia Belaubung.
frondosus laubblättrig (frons, -dis Laub).
frons, -tis Stirne, „Fronte“.
frutescentia Fruchtbildung.
fructigenus auf Früchten sich erzeugend.
fructus fr. fruit Frucht.
frugilegium Fruchtlese, Fruchtsammlung.
frustraneus vergeblich, umsonst (bei Compositen die unfruchtbar. Strahlenblüten).
frustulatus zerstückelt (frustum Bissen, Bisschen).
frutescens strauchartig, einen Strauch bildend.
frutex, -icis Strauch.
fruticans strauchartig wachsend, strauchbildend.
fruticetum Gesträuch, Gebüsch.
fruticosus, -culosus strauch-, etwas strauchartig.
fuscophyllus schminkblättrig.
fucatus geschminkt, nnecht.
fuciflorus hummelblütig, mit Blüten wie Hummeln.
fucoides (-deus) tangartig, fucus (gr. *φύκος*) Meertang.
fulcrum Stütze, Stützblatt.
fulgens, -gidus glänzend, leuchtend, strahlend.
fuliginæus russig, ruffarbig (fuligo, -inis Russ).
fuliginoides russähnlich, -artig.
fuliginosus russig, ruffarbig.
fullonum (Gen. Pl. v. fullō) der Walker od. Tuchbereiter.
fulvus rot- od. braungelb.
fumosus rauchig, rauchgrau.
funalis strickartig (funis Strick, Seil).
fundamentum „Fundament“, Grundlage.
fungosus schwammartig (fungus Schwamm, Pilz).
funiculus(dem. funis)Strang, Nabelstrang, Träger des Samens.
funifer, -era strickführend.
furax, -cis diebisch, verstorhen.
furea Gabel, -catus gabelig.
furellatus in Gabelchen geteilt.

furfura Kleien, -acæus kleienartig.
furvus finster, dunkel, schwarz.
fuscescens braunwerdend.
fusco-ater braunschwarz.
fuscus dunkelbraun, braun.
fusiformis spindelförmig (fusus).
fusipes spindelfüssig, -stielig.
fuscus, -i Spindel, -fusus, -a (in compos.) fließend, fliegend oder wallend, lagernd od. hingestreckt.

Gaada Gouda (Holland).
galbanus grüngelb, bräunlichgelb.
galbulus Beerenzapfen (z. B. Wachholder-, Thuja- etc.).
galeatus behelmt, mit Helm versehen.
galericulatus mit e. Helmchen od. Häubchen versehen.
galërus Mütze, Kappe, Haube etc.
galioides labkrautähnlich (Galium).
galli (Gen. v. gallus) des Hahnen.
gamalensis von Gamala (am See Genezareth).
gambosus hufförmig (ital. gamba, fr. jambe, gr. *καμπή*).
gamopetalus ganzkronig, m. verwachs. Krone.
Gandavum fr. Gand Gent, **gandavensis** Genter.
garganicus vom Monte Gargano (Süditalien).
Gasteromycetes Fr. Bauchpilze (*γαστήρ* u. *μύκης*, -ήτος).
gazophylacium Schatzkammer (*γάζα* u. *φυλάκειον* od. -ίον Wacht).
Gebenna Cevennengebirge (Südfrank.).
Gedännum Danzig.
Gegenfüßlerinnen = Zellen b. d. Embryobildung, Gegensatz zu d. Synergiden (Strasburger).
Gelatin = Gallert, fr. gelée.
gelatinosus gallert- od. geléeartig.
gelidus eiskalt.
gelinum Tanggallert, Gelin (v. gelo erstarre).
geminus doppelt, Zwilling.
gemma Auge, Knospe, -atus damit versehen.
gemmifer knospentragend, mit Augensprossen.
gemonensis glemanisch, von Gleman od. Gemonia in Friaul.

Genabŭm Orleans.

Genēva fr. Genève Genf, **-vensis** Genfer.

generatio „Generation“, Zeugung, Entstehung.

Generationswechsel (bei Pilzen z. B. Getreiderost, erst als Berberizenrost).

genianthus bartblütig (v. *γένειον* Kinnbart).

geniculatus gekniet, kniegelenkig.

genitale (Pl. -lia) Geschlechtsteil.

gentilis aus edlem Geschlecht, fein, verwandt (Kummer).

genŭinus ein- od. angeboren, echt, natürlich.

genus, -ŕis Geschlecht, Gattung, Sippe.

-genus, -čna etc. adj. verb. in comp. erzeugt (v. *γένω*).

Geotropismus = Streben d. Pfl. nach d. Erdmittelpunkt (positiver der Wurzeln, negativer des Stengels.)

germen, -inis Fruchtknoten.

germinans keimend.

germinatio Keimung, das Keimen.

gibbosus bucklig, höckerig (gibbus Buckel).

gigantēus riesenhaft, „gigantisch“ (*γίγαντειός*).

gigartinus mit Weinbeerkernen (F. W. Riemer, Lexik.), m. Weinbeeren versehen (*γίγατον*).

gigno erzeuge, bringe hervor.

gilvus isabell- od. fahlgelb, hell-, erbsengelb.

Gissa Giessen (Univers.), **-ensis** Giessener.

glaber, -bra glatt, **-berrimus** sehr glatt.

glabratus geklätet, kahl.

glacialis eisig, um Eis od. Gletscher herum wachsend.

glandŭlae „Glandeln“, Drüsen.

glandulosus drüsig, drüsenführend.

glans, -ndis Eichel, Kernfrucht.

glastifolius glas- od. waidblättrig.

glaucescens blau- od. grau grünlich.

glaucŭpus blaugraufüssig, -gestielt.

glaucus (*γλαυκος*) blaugrün, grau-grün.

Gliederhŭlse (-schote) lomentum, aus abgesetzten Gliedern gebildete.

Globoŭd = rundliches Körperchen in den Proteinkörnern des Klebermehls.

globosus kugelig (globus).

globŭlus Kügelchen.

globulifer, -era Kügelchen tragend.

-glochŭn od. **-chis** (Gen. -idis) Spitze (gr. *γλωχίν* od. *-χίς*).

glomeratus knäuelig, geknäuel.

glomerŭlus kleiner Knäuel od. Büschel i. q. fasciŭlus.

glossoides (gr. *γλωσσείδης* od. *-ώδης*) zungenähnlich.

Glottia Glasgow, **-ttiamus** von Glasgow.

gluma Spelze, Spreublatt, Kelchschuppe der Gräser.

glumaceus spreu- od. spelzartig, **-cēae** „Glumaceen“ d. s. Gräser u. Halbgräser.

glumella, Blütenspelzchen.

gluten, -inis Leim, Kleber.

glutinosus klebrig, schmierig (s. e. b.).

glyciarŭus süssnüssig (*γλυκύς* u. *ζάουον*).

glyciŭsmus süssduftend (*ὄσμη*) Duft.

glyciŭphyllus süssholzblättrig (abgk. v. *Glycirrhiza* u. *γύλλον*).

Glykose = Süss- od. Zuckerstoff.

gongylŭdes rübenrund, kohlrabenförmig (*γογγύλος* rund).

gonidia „Gonidien“, d. s. Grünzellen der Thallus-Mittelschicht b. Algen u. Flechten (v. *γονή* Samen, *εἶδομαι* gleiche).

gracilentus u. **gracilis** dünn, schlank, zierlich.

gramen, -inis Gras, **graminēus** grasartig.

Graminēae DC. Grasgewächse.

graminifolius grasblättrig.

granatus mit Kernen gefüllt (granum Korn etc.).

grandiceps grossköpfig.

grandiflorus grossblütig, **-folius** grossblättrig.

granifer korn- od. kerntragend.

granulatus gekörnelt, mit Körnchen versehen.

granulŭs Stärkemehl (i. q. fari-nosis).

granulum (dem. granum) Körnchen.

gratissimus (Superl. v. *gratus* angenehm) äusserst angenehm.

graveolens starkriechend.

grosse, -us grob, dick u. stark.

grossificatio Schwängerung, das Dickwerden.

grossularius einer kleinen, unreifen Feige gleich.

- Grinales** Endl. Storchschnäbler (grus, -is Kranich etc.).
grumosus hügelig, klumpig, voller Knollen.
grundständige Blüte, z. B. Zeitlose.
Gryphia (Gryphiswalda) Greifsguestphalius westfälisch. [walde. gummifer, -era gummitragend. gummosus gummiartig. guttatus getropfelt, gedüpfelt. guttifer, -era harzsaffhaltig. gymnoblastae (sc. Acotyledones) Nacktkeimer. gymnocarpus nacktfüchtig. **Gynomycetes** Rchb. Nacktpilze (μύκης Pilz). gymnospermus nachtsamig. **gynnostomus** nacktmündig. **gynaecium** Stempelgesamtheit (γυναικεῖον Weiberstube). **gynandreae, -dria** L. Weibermännige (γυνή, ἀνήρ, -ῥος). **gynostemium** Befruchtungssäule gynandrischer Pflanzen. **gyrans** sich im Kreis herumdrehend. **gyroflexus** in einen Kreis herumgebogen.
- habēna** Riemen, Zügel.
habitus Haltung, Aussehen, „Habitus“.
hadiensis aus Hedschas (Hedjas) in Arabien.
Hafnia (Haunia, Havnia) Kopenhagen.
hafniensis Kopenhagener.
HagaComitum Gravenhagen (Haag).
Hala Halle, -lensis von Halle, Hallenser.
Halbfächer (z. B. Mohnkapsel) mit Halbscheidewänden.
halepensis von Halep (Aleppo) in Syrien.
halicacabus judenkirschartig.
halicensis galizisch, von Halicz (Galizien).
hamatus hakig, hakenförmig.
Hammonia Hamburg.
hamulatus hakenförmig.
hamulus (dem. hamus) Häkchen.
hereynianus vom Harzgebirge.
Hessia Hessen, — **inferior** Niederhassläcus hessisch. [hessen. **hastatus, -ilis** spießförmig, -blättrig od. -früchtig.
hastifolius spießblättrig.
- Haube** (z. B. Wurzel-) = oberste Schicht etc.
Hauffrucht, z. B. Anona u. Magnolia.
haunanensis von Havannah.
Haunia (Havnia) Kopenhagen s. Hafnia.
haustellaris trinkgefäßartig.
haustoria Saugwarzen¹⁾ (z. B. der hederacēus epheuartig. [Cuscuta].
heleonastes Sumpfbewohner (ἔλος, -εος u. νῆστος).
helicoidēa (sc. cyma unipāra) eine schneckenartig gekrümmte Schraubel.
heliocopus sonnenwendig, nach d. Sonne sehend (ἥλιος u. σκοπεῖν).
heliotropismus (H. Müller) das Wenden nach der Sonne (positiver) und von d. Sonne weg (negativer).
helleborine die Niesswurzartige (ἑλλεβορινός, -ή).
helmstädiensis von Helmstädt (Prov. Hannover).
helobiae Endl. etc. Sumpfbewohner (ἔλος, -εος).
helveticus aus Helvetien, Schweizer.
helvölus (dem. helvus) bleichrot, rötlichschimmernd.
hemisphaericus halbkuglig (ἡμι u. σφαιῖον).
hemitrichus zur Hälfte behaart.
hepaticologia Lebermooskunde.
Hepaticae Juss. (-ci Rchb.) Lebermoose.
hepaticus Leber betr. (ἥπαρ, -ατος).
heptangulus siebenneckig, -kantig.
Heptandria L. Siebenmännige.
heptaphyllus siebenblättrig.
herbacēus krautartig (herba Kraut).
herbarium Kräuter- od. Pflanzensammlung.
hereogamia Hindernis- od. Zaunche (ἔροχος Zaun) d. i. durch Stellung der Geschlechtsteile gehinderte Selbstbefruchtung einer Blüte.
hereynianus vom hereynischen od. Harzwald.
hermaphroditus Zwitter (näml. zugl. m. männlichen u. weibl. Geschlechtsteilen).
 (Hermes = Mercur, Aphrodite = Venus.)

1) nicht Hausterien (z. B. Druckf. in Schillings Grundriss, 13. Ausg.).

- hermeticus** „hermetisch“ (n. Hermes Trismegistus) gänzlich abgeschlossen.
- herpeticus** (ἑρπητικὸς) kriechend, zum Kriechen geschaffen.
- herrenhusanus** von Herrenhausen b. Hannover.
- heterodromus** die Richtung od. Stellung wechselnd.
- heteromallus** auf einer Seite wollig (ἑτερομούλλος).
- heteromerici** (sc. Lichenes) Flechten mit mehrschichtigem Lager.
- heterophyllus** verschiedenblättrig, mehrerlei Blätter führend.
- heterospermus** verschiedensamig.
- heterosporae** verschieden- d. i. gross- u. kleinsporige (z. B. Bärlappe).
- heterostylia** verschiedengrosse Griffel u. Staubgefässe zur Verhütung der Selbstbestäubung.
- etruscus** u. **Hetruria** s. etruscus u. Etruria (j. Toskana).
- hexagynus** sechsweibig, -griffelig, -narbig.
- Hexandria** L. Kl. d. „Sechsmännigen“.
- hexastichos** (-us), -on (-um) sechszeilig, -reihig.
- hians** klaffend, aufgesperrt (hio klaffe).
- hibernaculum** Winterquartier, Wintergestalt einjähriger Kräuter.
- Hibernia** Hibernien od. Irland, -nicus irisch.
- hibernus** winterlich.
- hiemalis** winterlich (v. hiems, -mis W.).
- hieracioides** habichtskrautähnlich (Hieracium).
- hierobotanicon** Buch der heiligen Kräuter (ἑροβοτανική d. heil. Kr.).
- hierochunticus** (-tinus) aus Jericho (Palästina).
- Hierosolyma** Jerusalem.
- hilum** Nabel.
- Hippocastanum** Rosskastanie (ἵππος, καστανόν).
- hircinus**, -cosus bocksartig.
- hirculus** (dem. hircus) Böckchen.
- hirsutus** rauhhaarig, struppig.
- hirtaeformis** borstenförmig.
- hirtus** rauhhaarig.
- hispanicus** (-anus) spanisch, **Hispania** Spanien.
- hispidus** rauhhaarig.
- hissatus** aufgehisst (fr. hisser, ital. issare hissen, d. i. aufziehen, näml. d. Flagge).
- Holeraceae** (Olerac.) L. Gemüsekräuter (olus, -ëris).
- Holmia** Stockholm.
- hololenus** ganz weiss (ὁλόος, λευκός).
- holosericeus** ganz seiden, sammetartig (σηρικὸς).
- holosteus** ganz knöchern, knochenhart (ὀστεὸς knöchern).
- Holsatia** Holstein, -saticus holsteinisch.
- homodromia** Gleichläufigkeit, die Richtung od. Seite beibehaltende Stellung (ὁμοὸς u. ὁδὸμος Lauf).
- homoeomericus** (sc. Lichen) mit einschichtigem Lager.
- homonemus** im Wald zusammen wachsend, zusamm. weidend (νέμος, -εος Wald, Weide).
- hondensis** von d. Stadt Honda am Magdalenenfluss (Südamerika).
- hordeaceus** gerstenartig (Hordeum).
- hordeisticus** gerstenzeilig.
- hornus** heurig, diesjährig.
- horrïdus** zottig, struppig.
- hortensis** in Gärten wachsend.
- hortulanus** Gärtner.
- hospitor** (-ari) „hospitiere“, nehme als Gast teil.
- hospitus** fremd, Gast.
- humifusus** auf die Erde hingegossen,
- humilis** niedrig. [-gestreckt.
- humus** Damm- od. Gartenerde, Humusboden.
- Hungaria** Ungarn, -ricus ungarisch.
- hyalinus** gläsern, von Glas (βάλλι).
- hibernaculum** s. hibern.
- hybridatio** Bastardbefruchtung.
- hybridus** unecht, Bastard.
- hydnoïdes** stachelpilzähnlich (Hydnum).
- Hydrogen** = Wasserstoff (v. γένω erzeuge).
- hydrogramma** Wellenstrich.
- Hydrocaryes** Lk. Wassernussgewächse.
- hydrophorus** wasserhaltig, wässrig.
- Hydrophyta** Endl. Wassergewächse (Algen).
- hydropiper** Wasserpfeffer.
- hydrotropismus** Pflanzenbewegung im Wasser.
- hygrometricus** (-metrus) Feuchtigk. anzeigend, wetterprophetisch (ύγρός u. μετρώω messe).

- hygrophilus** Feuchtigkeit od. Nässe liebend.
- hymenium** Keimhaut der Pilze (*ὄμιον*, *-ένος*), nämll. die Sporen tragende, von Basidien gebildete Fruchthaut.
- hymenodon** Hautzahn (*ὄμιον* u. *ὄδων*).
- Hymenomycetes** Fr. Hautpilze.
- Hyperbel** = Kegelschnittcurve parallel der Kegellachse.
- hyperboræus** nordisch, im Land d. Hyperboræer.
- hyphen** (v. *ὑφή* Gewebe) verzweigt. Fadengewebe od. fadenförm. aneinandergedrehte Zellen d. Pilze.
- Hyphomycetes** Fr. Fadenpilze.
- hypnoides** astmoosähnlich (Hypnum etc.).
- hypochilum** Unterlippe (*ὑπὸ* u. *χειλος*).
- hypocotylus** unter den Cotyledonen befindlich.
- hypocateriformis** teller- od. untertassenförmig.
- hypogæus** unterirdig (*ὑπόγειος* v. *ὑπὸ* u. *γῆ* Erde).
- hypoglottis** (Geschwulst) unter d. Zunge (*γλωττίτα*).
- hypogynus** unterstemplig, mit unterständigem Stempel.
- hypoleucus** unten weiss.
- hypopetalus** unterkronblättrig, mit unterständigen Kronblättern.
- hypoplegæus** unter Buchen wachsend (*φηγῶς* lat. *fagus*).
- hypophyllus** unter Laub befindlich.
- hypostaminea** Juss. mit unterständigen Staubfäden.
- hypothallus** verfilztes Sporenfadengewebe der Pilze etc., „Unterthallus“.
- hypothëus** unten schwefelgelb (*ὑψίον* od. *ψείον* Schwefel).
- hypsipetes** hochfüssig, -stielig (*ὑψι* hoch u. *pes* Fuss).
- hyrcæus** aus Hyrkanien (am Kaspiischen Meer).
- hystrix** igelstachelig (*ὑστρίξ* Stachelborste).
- jaculiformis** spieß- od. pfeilförmig.
- Iberia** Iberien (s. sogl.) od. Armenien (südl. v. Kaukasus).
- ibericus** iberisch, **Ibërus** Ebro in Spanien (Iberien).
- ichoratus** rötlichgelb (v. *ἰχώρ* blutähnliche Flüssigkeit).
- icônes** (v. *εἰκῶν*, *-όνος*) Abbildungen.
- Icosandria** L. Kl. d. Zwanzigmännigen (XII. Kl.).
- ieterinus** gelbsüchtig (v. *ἰκτερός* Gelbsucht).
- idaeus** vom Berg Ida (auf Creta).
- jemenicus** von Jemen (Yemen) in Arabien.
- jenensis** von Jena.
- igniarius** zu Feuer dienend, Feuer betr.
- iguanëus** Iguane od. Leguane betr. (iguana Leguan, eine Baumeidechse).
- illegitimus** „illegitim“, ungesetzlich, z. B. Befruchtung durch d. Blütheile derselben dimorphen Blütenform (Darwin).
- illustratio** „Illustration“, Erklärung mit Abbildungen.
- ilvensis** von d. Insel Ilva (Elba).
- Imaus Mons** (Emodus) Himalaya, **Imaus Seythicus** Tschiansan od. Muztagh (Innerasien).
- imbecillis** u. **-us**, fr. imbecille schwach, kraftlos.
- imberbis** bartlos (in u. barba).
- imbibitio** „Imbibition“, Einsaugung (z. B. der Zellhaut).
- imbricatus** (v. *imbrex*, *-icis*) wie mit Ziegeln bedeckt, hohlziegelartig.
- immersus** eingetaucht.
- impensus** darauf verwendet, **-sa** Kosten, **-sis** auf Kosten.
- imperialis** kaiserlich.
- impressus** eingedrückt.
- impubes** nicht mannbar, unbehaart.
- imus** unterster.
- inaequalis** ungleich.
- incæus** ganz grau, altersgrau.
- incarnatus** fleischrot, schön rot, „incarnat“.
- inchoatus** angefangen, versucht.
- incisus** eingeschnitten.
- inclinatus** geneigt, gebückt.
- inclusus** eingeschlossen.
- incôla** Bewohner.
- incomparabilis** unvergleichlich.
- incompletus** unvollständig.
- inconspicuus** unansehnlich.
- inconstans** unbeständig.
- incrustatus** „inkrustiert“, als Krustenüberzug.
- incubaeus** zum Brüten aufsitzend.

incurvus eingekrümmt, krumm.
index, -icis Anzeiger, Inhaltsverzeichnis.
indigēna, -nus Eingeborner, einheimisch.
indivīsus ungeteilt.
indumentum Überzug, Bekleidung.
indusium Schleierchen der Sporangien (b. Farnen).
inebrians berauschend.
inermis unbewaffnet, stachellos.
infectorius färbend, zum Färben dienend.
inferior unterer, niederer, auch geringer.
inferus unten befindlich, unterer.
infestans feindlich, bewaffnet.
infestus feindlich, bewaffnet.
infimus unterster.
inflātus aufgeblasen.
inflexus einwärtsgebogen.
inflorescentia „Inflorescenz“, Blütenstand.
infractus geknickt, umgebrochen.
infundibuliformis trichterförmig.
infusum Aufguss, **infusorium** Aufgusstierchen.
ingricus ingrisc, aus Ingermannland (um St. Petersburg).
initiale Anfangspunkt (z. B. d. Wurzelkörpers).
inodorus geruchlos.
inornatus ungeschmückt.
inquilinus Einmieter, Insasse.
inquinans schmutzend, -natus beschmutzt.
inseulptus eingegraben, eingepägt.
insertio Einfügung, **insertus**, eingefügt, inseriert“.
insidens aufsitzend.
insititius zum Pfropfen gebraucht, **insitus** gepfropft.
instructus versehen, eingerichtet, „instruiert“.
insubriens insubrisch (Insübres, Volk der Umgegend v. Mailand).
insuētus ungewohnt, ungewöhnlich.
insulsus unschmackhaft, abgeschmackt, „ungesalzen“.
intēger, -gra unverletzt, ganz.
integerrimus ganz unverletzt, vollkommen ganz.
integrifolius ganzblättrig.
integumentum Ei- od. Samenhülle.
intercalaris eingeschaltet, z. B. intercalares Wachstum des Blütenbodens (Schwendener).

intercellulare Zwischenzellenraum.
intermedius mittlerer.
interne (-nus) innerlich, innerer.
internodium Stengelglied zwischen je zwei Knoten, Zwischenknoten-glied.
interponiert (Schwendener) dazwischengestellt (z. B. Quirle).
interrupte (-tus) unterbrochen.
intestinalis eingeweid- od. darmartig.
intextus ein- od. zwischengewoben.
intimus innerster.
intina „Intine“ d. i. Innenhaut des Pollenkorns.
intra innerhalb.
intricatus in einander gewirrt, verworren.
introrsum einwärts.
intrusus (v. intrudo) eingedrungen, hineingestossen.
intubus Endivie (v. tubus Röhre, -röhriger Stengel!).
intus inwendig, im Innern.
intussusceptio Wachsen der Zellohaut einwärts, Zunahme nach innen etc.
Intybus s. intybus.
inulēus alantartig (v. Inula s. Nomenkl.).
Inulin = Schleimmehl des Alants (s. eb.).
innloides alantähnlich.
inundatus überschwemmt.
inversus umgewandt, umgekehrt.
involvecellum Hüllchen, Hüllblättchen (b. Dolden etc.).
involveratus mit Hüllblättern versehen.
involverum Hülle (b. Dolden u. a. m.).
irrigatus gewässert, gewellt, m. Wellenzeichnung.
irriguus bewässert.
isagoge (ἰσαγωγὴ) Einleitung.
isatideus waidähnlich, -artig (Isätis Waid).
Ischaemon (-um) blutstillend (ἰσχωῖ hemme, αἷμα Blut).
isenacensis von Eisenach, Eisenacher.
islaēus „isisch“, der Göttin Isis heilig.
isoliert = abgetrennt, abgesondert.
isosporus gleichsporig (z. B. Farne) (ἴσος u. σπορά).
isthmus Schlund, Hals.
Iteoidæe Bisch. Weidengehölze.

- iteoides** weidenähnlich (v. *ἰτέα* Weide, Wiete).
- jubatus** mähenartig (v. *jubae*, -arum Mähne).
- juga** Rippen, Riefen d. Doldenfrüchte, - *primaria* Haupt-, - *secundaria* Nebenrippen.
- juglandëus** wallnussartig (v. *Juglans*, -ndis).
- jugum** Joch, Blattpaar (bei Fiederblättern).
- julacëus** vielfuss-, kätzchenartig (v. *Julus* g. *ἰούλος*).
- julifer**, -ëra Kätzchen tragend.
- Juifloræ** Endl. Kätzchenblütige.
- juncacëus** binsenartig (v. *Juncus*).
- Juncaginëæ** Juss. Binsengewächse.
- juncëus** aus od. voll Binsen, -ëinus binsenartig.
- Juvavum** (Juvavia) Salzburg.
- juxta** nach, gemäss.
- Juxta**position (Schwendener) Darnebenstellung od. Anschluss (z. B. bei Sprossungen).
- Kali** „Kali“ od. Laugensalz (in d. Chemie die alkalische Hauptbase!).
- karstënis** vom Karstgebirge in Krain od. Illyrien.
- kermesinus** karmoisinrot.
- kewensis** (sc. hortus) von Kew bei London.
- Kilia** Kiel, -iënsis Kieler.
- Krönchen** auf den Sporenknöspchen der Chara (s. Nom.).
- labellum** (dem. v. *labrum*) „Labell“ d. i. Lippchen (Lippe), bei den Orchideen inneres, längeres Perigonblatt!
- labiatum** (v. *labium*) gelippt, mit Lippen versehen, z. B. bei d. „Labiaten“.
- Labiatifloræ** DC. Lippenblütler.
- labrum**, i. q. *labium* Lippe, Lefze.
- laca** Lack, Gummilack, Gummiharz.
- laccifer** Gummiharz tragend od. liefernd.
- lacer**, -ëra zerrissen, zerschlitzt, struppig (Kummer).
- lacinia** Zipfel, Fetzen, -niatus zipfelig, zerfetzt.
- lac**, -ctis Milch, Milchsaft.
- lacrymabundus** thränend (*lacryma* Thräne).
- lacrymans** thränend, weinend, Feucht. ausschwitzend.
- lactarius** Milchner, Milch ausgebend (näml. Pilz).
- lactëus** milchsaftig, milchweiss, wie Milch.
- lacuna** Lache, Grube etc.
- lacunae aëreæ** Luftlücken des Zellgewebes.
- lacunosus** zellig, grubig, m. Grübchen versehen.
- lacustris** (v. *lacus*) an od. in Teichen od. Lachen wachsend.
- ladanifer**, -ëra myrrhentragend (s. sogl.).
- Ladanium** Gummi od. wohlriechendes Cistharz vom Strauch *λίθος* (bei Luther „Myrrhe“).
- laevigatus** geglättet.
- laevis** glatt.
- lagenarius** flaschenförmig (*lagëna*).
- lamellæ** „Lamellen“, blattart. Platten od. Strahlen der Blätterpilze.
- lamina** Blech, Blatt, Spreite des Blatts.
- lamina petali** Platte des Kronblatts.
- lamina prolifera** Keimschicht der Pilze.
- Laminartegmente** (Mikosch) d. s. Blattspreitenhüllen.
- lamprophyllus** glanzblättrig (*λαμπρός, φύλλοι*).
- lamprospermus** glanzsamig (s. eb.).
- lanatus** mit Wolle bewachsen (*lana*).
- lanceolatus** lanzettförmig.
- lanceifolius** lanzenblättrig (*lancëa*).
- lanestris** wollig (*lana*).
- lanëus** wollen, von Wolle.
- lanosus** wollig, voller Wolle.
- lanuginëus** wollflaumig, -nosus desgl. (s. sogl.).
- lanugo**, -inis Milchhaar, Wollenflaum, Wollbehaarung.
- lapathifolius** ampferblättrig (*Lapathum*).
- lappacëus** klettenartig (*Lappa*, s. Nom.).
- lasiocarpus** zottenfrüchtig, mit rauhaariger Fr.
- lasius** (*λασιός*) rauh, zottig.
- latëbra** Schlupfwinkel, Versteck.
- lateral** = seitlich (*latus*, -ëris Seite).
- lateritius** ziegelrot (*later*, -ëris Ziegel).
- latex**, -icis Narbenfeuchtigkeit.
- lathyroides** kicher- od. platterbsenähnlich (*Lathyrus* s. Nom.).

- laurinus** lorbeerartig (laurus).
laxiflorus weit-, offen-, schlaff blütig.
laxus „lax“, schlaff, weit, offen etc.
Lebenseinheit (Vöchting) = jed. selbständ. Pflanzengebilde, d. h. das für sich zu leben vermag.
lecus Zwiebelscheibe (*λεκος*; Napf etc.).
legitimus gesetzlich, „legitim“, z. B. Befruchtung, näml. durch dimorphe Blüten Teile (Darwin).
legūmen Hülse, Hülsenfrucht.
legumen biloculare Doppelhülse.
leguminosus hülsenartig, -früchtig, z. B. „Leguminosen“ d. s. Hülsenfrüchte.
leianthus glattblumig (*λείθος* glatt, schlicht, kahl etc.).
Leida Leyden.
leiocarpus glattfrüchtig.
leio-stachyos (-us) glattährig.
Leitbündel (Russow) d. i. zuerst aus d. Cambium sich bildendes.
lemnacens wasserlinsenartig (Lemna).
lendiger, -era Nisse od. Gnitten (Läuseeier) führend.
lens, -dis Nisse od. Gnitte der Laus, Läuseei.
lens, -tis Linse.
lenticellae Linsenhöckerchen od. Korkwarzen d. Rinde.
lenticularis Linschen od. Linsen betr.
lentiginosus sommerfleckig, -sprossig.
lentigo, -inis Sommersprosse.
Lentiscus Mastixbaum (v. *lentesco* bin klebrig).
lentus langsam, zäh.
Leodium Lüttich.
leontinus aus dem Leontinischen (bei Isola in Tyrol).
lepetitii Le Petit betr. (n. pr.).
lepides (*λεπίς*, -ιδος) Schuppen.
lepidocarpus schuppenfrüchtig.
lepidotus schuppig, schülferig.
lepidus niedlich, artig, hübsch etc.
lepodinus rindenzerstörend (*λέπος* u. *δειρος* schrecklich etc.).
leporinus Hasen betr. (*lepus*, -ōris).
leprosus aussätzig (lepra Aussatz etc.).
leptocephalus dünnköpfig (*λεφαλή*).
leptocladus fein- od. dünnstengelig (*λεπτός* Trieb etc.).
leptophyllus dünn- od. feinblättrig.
leucanthus weissblütig, -blumig.
leucocarpus weissfrüchtig.
leucoconius weisstäubig (*λευκόν* Staub).
Leucoglochium Weissspitze (*γλῶχιν* od. -ίς).
leucomelas weiss und schwarz.
leuconeurus weissnervig.
leucosorius weisskapselig, m. weissen Fruchthäufchen (*λευκός*; Haufe od. auch *σορός*; Gefäss).
leucostachys weissährig.
levulosus „Levulose“ d. i. Schleimzucker.
libanensis vom Libanon-Gebirge.
liber, -bri Bast.
libriforinum „Libriform“, Bastfaserstoff.
Liburnia Liburnien (Bosnien u. Norddalmatien).
Liburnum Livorno u. Libourne bei Bordeaux.
liburnus, -nīcus liburnisch, aus Liburnien (s. v.).
lichen, -ēnis (*λεχίτης*, -ήρος) Flechte.
lichenosus flechtenartig.
Liesch d. s. getrocknete Blätter zum Dichten der Fässer (z. B. von Sparganium, s. Nom.).
ligericus von der Loire (Ligēris).
Lignin = Holzfaserstoff (v. *lignum*).
lignosus holzig.
ligula (dem. v. *lingua*) Blatthäutchen, häut. Ansatz der Grasblätter am Halm.
ligulatus m. Blatthäutchen vers. od. auch wie ein Zünglein geformt (sc. *flos*) (s. sogl.).
liguliflorus zungenblütig (z. B. Strahlblütchen d. Compositen).
ligusticus, -gurinus ligurisch, aus Ligurien (d. Gebiet um Genua).
liliifolius lilienblättrig.
limacinus Wegschnecken betr. (*limax*, -ācis).
limacis Gen. v. *limax* (s. eb.) (gr. *λείμαξ*, -αξος).
limbatus gerandet, gesäumt (*limbus*).
limnobius im Sumpf od. Teiche lebend.
limonius limonfarbig, orangegelb.
limosus schlammig, **limus** Schlamm, Kot.
linacēus leinartig, **linum** Lein.
linariifolius leinkrautblättrig (Linaria).

- linearis** „lineal“ oder linienförmig (linēa).
- lineatifolius** linirtblättrig, m. durch Linien bezeichneten Blättern.
- linguiformis** zungenförmig.
- linicōla** (-us) Lein bewohnend, unter Lein wachsend.
- linifolius** leinblättrig, fachsblättrig.
- linoides** lein- od. fachsähnlich.
- lintearius** leinwandartig (lintēum Leintuch).
- lippizensis** von Lippiza im österr. Littoral.
- lipsicus, -siensis** Leipziger (Lipsia Leipzig).
- liquaminosus** saftig (liquamen, -inis).
- Liquiritia** Lakritzensaft.
- lithanthrax** Steinkohle (λίθραξ u. ἄνθραξ).
- lithuanicus** aus Litthauen.
- litigiosus** streitig, voller Streit.
- littoralis** (litoralis) am Strand, an der Seeküste.
- littoreus** (litor.) desgl. (v. littus od. litus, -ōris).
- lividus** bleifarbig, bläulich, blass.
- livonicus** livländisch (Livonia Livland).
- lobus** (in compos.) -lappig (lobus gr. λοβός Hautlappen).
- locumentum** Fach, Gefach.
- loenlaris** (in compos.) -fächerig.
- locūli** (dem. v. loci) Fächer, z. B. der Frucht, loculi antherae Antherenfächer.
- loculicida** (sc. dehiscentia) fachteiliges (Aufspringen d. Frucht).
- locupletissimus** am reichsten, reichlichsten.
- locusta** Heuschrecke, aber auch Ährchen der Gräser.
- locūlulae** Unterschüppchen bei Graspelzen.
- loliaceus** lolchartig (Lolium, s. Nom.).
- Lomentaceae** DC. Gliederschotige Cruciferen.
- lomentum** Gliederhülse od. -Schote.
- Londinium** London, **Londinium Gothorum** Lund in Schweden (Gothland).
- longaevus** hochbetagt, altersgrau.
- longirostris** langschnäblig.
- longisiliquis** langschotig.
- longitudinalis** in die Länge gerechnet.
- lorēus** riemenförmig (lorum Riemen).
- lorica** Panzerchen (v. Diatomeen), -catus gepanzert.
- lubricus** schlüpfrig.
- lucens, -cidus** schimmernd, hellleuchtend (lux, -cis Licht).
- lucifugus** lichtscheu (s. eb. und fugio fliehe).
- luens, -i** Hain.
- Lufthöhlen** innerh. d. Gewebes (z. B. bei Fluviales).
- Luftspalten** in Oberhautzellen.
- Luftwurzeln** (z. B. bei Pandanus, Philodendron etc.).
- Lugdunum** Lyon, **Lugd. Batavorum** (batavum) Leyden (Holland).
- lugens** trauernd.
- lumbricalis** regenwurmformig (lumbricus).
- lumen, -inis** Licht, Weite od. innerer Durchmesser z. B. innerer, freier Raum einer Zelle.
- lunaris, -rius** d. Mond betr., mondformig.
- lundensis** von Lund in Schweden.
- lupuliformis** hopfenförmig.
- lupulinus** Hopfen betr., hopfenartig sich schlingend.
- Lupulus** (sc. Humulus) Hopfen (s. d. Nomenkl.).
- luridus** blass, fahl, leichenfarbig, schmutziggelb.
- lusaticus** Lausitzer (Lusatia Lausitz).
- luteolus** (dem. lutēus) lehmgelblich (v. lütum Lehm od. auch v. lütum Gilbkraut od. Wau), goldgelblich.
- luteseus** gelblich.
- lutetianus** Pariser (Lutetia Parisiorum Paris, eig. Schmutz- od. Lehmstadt der Pariser).
- lutēus** gelblich, lehmgelb (v. lütum Lehm), goldgelb (v. lütum Wau, Gilbkraut).
- luxurians** üppig, schwelgend, wuchernd, fruchtbar.
- lycensis** von Lyck in Ostpreussen.
- lycopifolius** wolfsfußblättrig (Lycopus).
- lyratifolius** leier- od. lyrablättrig, -ratus leierförmig.
- maceratio** Mürb- od. Weichmachung, „Maceration“ (v. macer mager etc.).
- macis** Muskatblüte, Samenmantel der Muskatnuss.

- macranthus** gross- od. langblütig (*μαζρός* gross, lang).
- macrocarpus** gross- od. langfrüchtig.
- macrophyllus** grosslaubig.
- macropus** gross- od. langfüssig, -gestielt.
- macrorrhizus** (-os, -on) langwurzlig (*ῥίζα*).
- macrosiphon** langröhrig (*σῆφων* Röhre).
- macrospora** Gross- od. Langsporen (der Wasserfarne, werden von d. Mikrosporen befruchtet).
- macrosporangia** Grosssporenbehälter (i. d. Sporocarpn der Rhizocarpen).
- macrostachyos** gross- od. langährig.
- macula** „Makel“, Flecken, -atus fleckig.
- madaspatanus** nicht etwa kahlhäutig oder Fell kühlend (v. *μαδαρός* u. *σιάτος* Fell), sond. i. q. maderaspatensis (s. sogl.).
- maderaspatensis** von Madras (Ostindien).
- maesiacus** (moesiacus) aus Mösien (j. Bulgarien etc.).
- maglia** (Solanum m.) Masche od. Netzaug (ital.), fr. maille.
- majusculus** etwas gross, grösser (als die andern Buchstaben).
- malachius** malvenrötlich.
- malacophyllus** malvenblättrig, weichlaubig (*μαλακός* weich).
- mamilla** Kernwarze.
- mamma** Brust, -warze, -mosus voller Zitzen.
- Manchette** (Manschette) (bei Pilzen) = Kragenhaut unterh. d. Hutes um den Strunk.
- mantius** von Mantes (in Frankr., Depart. Seine u. Oise), „mantisch“ (Mössl.-Rchb.), nicht v. mantica Beutel.
- mantissa** Ergänzung, Nachtrag, „Mantisse“ (Mathem.).
- manuale** Handbuch.
- marantinus** marantartig (Maranta, s. Nom.).
- marasmus** das Verwelken, Schwinden (d. Altersschwäche etc.).
- marcescens** welkend, -cidus welk.
- margaritaceus** perlfarbig, perlmutterig (v. margarita Perle, Perlmuschel).
- marifolius** marumblättrig (Marum, s. Nom.).
- marinus** am od. vom Meer, an od. von der See.
- maritimus** am Meer wachsend.
- maritus** Ehemann, Männchen.
- mas-**, -culus Mann, Männchen, -culinus männlich.
- massa pollinis** Pollenmasse.
- Massilia** Marseille, -liensis Marseiller.
- mastoides** brustartig, -warzig.
- matronalis** matronenhaft, Matronen betr.
- maturus** reif, zeitig, -ritas Reife.
- matutinus** morgendlich, früher scheinend.
- meatus intercellulares** Zellenzwischengänge.
- median** = mittler, z. B. Mediane = senkr. Mittelebene.
- medicamen**, -inis Heilmittel i. q. **medicamentum** „Medikament“.
- medicus** ärztlich, „medizinisch“, aber auch medisch, aus Medien.
- mediocris** mittelmässig.
- Mediolanum** Mailand, ital. Milano.
- mediterraneus** mittelländisch, -meerisch.
- medulla** Mark.
- mega(lo)politanus** Mechel- od. Mecklenburger, von Megapolis, d. i. Mechilen- od. Mecklenburg.
- mega(lo)potamicus** von Rio Grande del Norte (dem grossen Fluss aus d. Norden) in Nordamerika.
- megastachyos** lang- od. grossährig.
- melaenus** schwarz (v. *μέλας*, -λαϊνα).
- melananthus** schwarzblühend.
- melanochaetus** (-os) schwarzborstig (*χαιτή*).
- melanolomus** schwarz gesäumt, -bärtig (*λίμα* Saum etc.).
- melanophloeus** schwarzsplintig (*γλοιός* Bast, Splint etc.).
- melanöpus** schwarzfüssig, -gestielt.
- Melanosinapis** Schwarzsenf.
- melanospermus** schwarzsamig.
- meletemata** fleissige Arbeiten od. Studien (*μελέτημα*).
- melinoides** (bess. mellin-) honiggelb (mel, -llis Honig).
- melitensis** von Melite od. Malta.
- mellëus** honigartig, -gelb.
- mellifer**, -ëra honigführend, -haltend.
- melocarpus** melonenfrüchtig.

- membrana** „Membrane“ d. i. Haut, -nacëus häutig.
- memphticus** von Memphis (Ägypten).
- mephticus** „mephtisch“, mephtisch schädlich. Ausdünstung.
- merenchyma** krummflächiges Parenchym od. Mark.
- mericarpium** Teilfrüchtchen (der Doldenpfl.) (*μέρος* Stück etc.).
- merismaticus** sich aufteilend (s. sogl.).
- meristēma** „Meristemschicht“ (bei Wurzelbildung, Janczewski) d. i. noch junges, bildungsfähiges Ur- od. Teilungsgewebe (v. *μερίσω* teile).
- mesenteriformis** gekröseförmig (*μεσεντέριον*).
- mesenterium** Gekröse, Mitteldarm (*μέσος* u. *έντερον*).
- mesocarpium** mittlere (fleischige) Fruchthaut, Fruchtmittelschicht.
- mesophyllum** Laubmittelschicht, Blattmark.
- metachrous** farbwechselnd (*χρόα* Farbe etc.).
- Metamorphose** = Verwandlung (*μεταμορφωσις*).
- metaspermus** nachsamig¹⁾ (Gegensatz zu archi- od. gymnospermus ur- od. nacktsamig).
- Metis** Metz, -tensis Metz, von Metz.
- metropolitanus** von der Hauptstadt (metropölis).
- metulifer** (-erus, -era) zackenführend (metula dem. meta = Pyramide od. Spitzsäule).
- micacëus** glimmerartig (mica).
- micans** schimmernd, glänzend (mico).
- migranthus** kleinblumig (*μικρός, άνθος*).
- microcarpus** kleinfrüchtig.
- Micromycëtes** „Kleinpilze“, d. i. mikroskopische etc.
- micropetalus** klein Kronblättrig.
- microphyllus** kleinblättrig, -laubig.
- micropyle** „Mikropyle“, d. i. Knospenmund od. enger Eingang in d. Samenknope für den Pollenschlauch.
- microrrhizus** kleinwurzellig.
- microsōma** „Kleinkörperchen“ od. Plasmakörnchen (Strasburger).
- microspermus** kleinsamig.
- microspōra** Kleinspore (z. B. Equisetaceen, — befruchten die Makrosporen, s. d.).
- microsporangia** Kleinsporenbahälter (*άγγειον*).
- microstachyos** (-us) kleinährig.
- Milano** ital. Mailand (s. Mediolanum).
- Milchzellen** (David, 1872).
- miliacëus** hirsenartig (Miliun, s. Nom.).
- militaris** „militärisch“, soldatisch.
- millefolius** tausendblättrig.
- millegranus** tausendkörnig (grännum).
- miniatus** mennigrot (minium Mennig).
- minus** (Superl. v. minor Compar. kleiner) kleinst.
- mirabilis** wunderbar.
- Missnia** (Misnia) Meissen, Helvetia Missniae sächsische Schweiz.
- mitis** sanft.
- mixtus** gemischt, **mixtura** „Mixtur“, Mischung.
- modicus** mässig.
- modificatio** Beschränkung, „Modifikation“.
- modiolus** (dem. modius Mass) Mässchen od. Mäschen.
- Moenus** Main.
- moesiacus** (maes.-) aus Mösien (Bulgarien etc.).
- Moguntia** Mainz.
- moldavicus** aus der Moldau (Rumänien).
- Moleküle** = kleinste Masseteilchen.
- Molekularstruktur** (Pfeffer) = Anordnung der Moleküle.
- mollis** weich, **mollissimus** sehr od. ganz weich.
- Mollugo** Weichkraut, -klette.
- molluscus** weich.
- molybdinus** molybdän- od. bleiartig.
- monacensis** münchener, **Monacum** München.
- monanthos** einblütig, -blumig.
- Monadelphia** L. Einbrüderige (XVI. Kl.).
- Monandria** L. Einmännige (I. Kl.).
- monile** Halskette, Rosenkranz, -liformis rosenkranzförmig.

1) S. Engler, Antherenbild. d. Metaspermen in Pringsheim's Jahrb. 1875.

monilifer rosenkranztragend.
monocarpus ein- od. einzelfrüchtig.
Monochlamydeae DC. Einhüllige, Perigonblütige.
Monoclinia L. Einlagerige, Zwitterblumen.
Monocotylaeae Einsamenlappige.
Monocelia L. Einhäusige (XXI. Kl.).
monoecus einhäusig (*μονός. οἶκος*) d. i. mit getrennten Geschlechtern auf demselben Stock.
monographia „Monographie“, Einzelbeschreibung.
Monogynia L. Einweibige.
monomerus aus einem Stück bestehend (z. B. Stempel etc.).
monophyllus einblättrig, m. e i n e m Laubblatt.
monopodium Einzelfussstück, d. h. für alle Äste Fuss bleibender Haupttrieb.
monostachyos, -on einährig (*στᾶχυς*; Ähre).
monspeleäus st. monspeliensis, aber auch: am Berg Pelion (mons Pelius) zu Hause, *Dianthus monsp.* Rehb.: „Vorgebirgsnelke“ (mons bonae spei Cap der guten Hoffnung).
monspeliensis von Montpellier (Mons Puellarum).
monspeulanus desgl.
monstrositas „Monstrosität“ (s. sogl.).
monstruosus (-struosus) „monströs“, d. i. ungeheuerlich, missgebildet (monstrum).
montanus „montan“, auf Bergen wachsend.
moravicus mährisch, aus Mähren (Moravia).
morbillosus kränkelnd (morbillus dem. morbus).
morio schwarzbraun.
morphologia Gestaltungslehre (*μορφῆ*).
morphologischer Ort (Vöchting) d. i. Entfernung von dem entsprech. Ende der Lebensinheit (Organbildung).
morphonomia Gestaltungsregel.
morsus Biss.
Mosa Maasfluss.
moschatellinus etwas nach Moschus riechend.
moschatus moschusartig, n. Moschus riechend.

Mosella Mosel.
mosquensis Moskauer (Moschia od. Moscovia Moskau).
mucedo (v. mucus) Rotz.
mucidus schimmelig (v. mucor).
mucilaginosus schleimig (v. mucilago, -inis).
mucilago Schleim, Rotz (i. q. mucus).
mucinum „Mucin“, ausziehbarer Klebstoff.
mucor Schimmel, Kalm.
mucosus rotzig (v. mucus).
mucronatus zugespitzt, spitzig (mucro Dolch etc.).
mucosus, -i Rotz.
muldavius an der Moldau (Muldavia), Fluss in Böhmen, zu Hause.
multicaulis vielstengelig.
multifidus vielspaltig.
multiflorus vielblütig, -blunig.
multilocularis vielfächerig.
multiramis vielästig, -zweigig.
multoties oft- od. vielfach.
munis befestigend, schützend.
muralis auf od. an Mauern wachsend.
muricatus (fr. muriqué) purpurfarbig, aber auch stachelschneckenartig, reichstachelig (Kummer) (v. murex, -icis Purpur od. Stachelschnecke).
murinaceus mäusegrau.
murinus Mäuse betr., mäusegrau (mus, -ris Maus).
murorum der Mauern (murus).
Muscardine = durch Schimmelpilze verurs. Krankh. d. Seidenraupen.
muscarius auf Fliegen bez. (musca Fliege).
muscerda Mäusedreck.
Musci Juss. Moose.
musciola Moosbewohner (muscus Moos).
muscifer, -era Fliegen tragend (v. musca), aber auch moostragend (v. muscus).
muscigenus im Moos erzeugt.
Muscineae Bisch. Moosartige.
muscipula Fliegenfalle (musca u. capio).
muscoideus moosartig (muscus u. εἶδουα gleiche).
muscologia Mooskunde.
mucosus moosig.
muscoviensis (sc. hortus) des Fürsten Pückler-Muskau.
muscus Moos.

- mutabilis** veränderlich.
muticus unbewehrt, grannenlos.
mutilatus (-tilus) verstümmelt.
Mutina Modena, **-nensis** modenesisch.
mycelium „Mycel“, d. i. Pilzfaserewebe, zur Ernährung dienender Pilzunterteil (v. *μύκης* u. *ελύω* wickle etc.).
Mycetes Spr. Pilze (*μύκης*, -ητος).
myioides fliegenartig (*μυία* Fliege).
myodes (*μυώδης* v. *μῦς*, -όν Maus) mausähnlich.
myrepticus zum Balsamkochen dienend (*μυροεπικόπος*).
myrrha „Myrrhe“, Balsamharz (*μύρρα*).
myrsinites myrtenblättrig.
myrtilloides heidelbeerartig (*Myrtillus*).
mytilinus muschelförmig (*Mytilus* Miesmuschel).
myurus Mäuseschwanz (*μῦς*, -υός u. *οὐρά*).
Myxogasteres Fr. Schleimbalgpilze.
Myxomycetes Wallr. Schleimpilze.
Nagel d. i. der schmale, stielförm. Unterteil eines Kronblatts.
Nannetes (Nannetes) Nantes an der Loire.
Nanna Zwergin u. Mutterschwester (*νάνη*).
nanus zwerghaft, ein Zwerg (*νάνος* od. *νάνος*).
napaeus (*ναπαίος*) in Waldschluchten wachsend.
napiformis steck- od. kohlrübenförmig (*Napus*, s. Nom.).
napo-brassica Steckrübenkohl.
narbonensis von Narbonne (Südfrankreich).
narcoticus narkotisch, betäubend giftig (v. *ναρκόω* lähme etc.).
nascens, -ntis wachsend (v. *nascor* entstehe etc.).
Nassovia Nassau.
natans schwimmend.
naucinus (naucus) gering, schlicht.
nauseosus brechen- od. ekelerregend (*nausea* Übelkeit).
navicula (dem. *navis*) Schiffchen.
nebrodensis vom Nebrodigebirge (Sicilien).
nebularis, -losus nebelig, nebelgrau, düster, auch duftig.
- Necessaria** L. (sc. *Polygamia* XIX, Kl. 3) „Notwendige“ (d. Randblütchen fruchtbar, daher notwendig).
nectarium Honiggefäß, -behälter.
neglectus vernachlässigt, übersehen.
nematodes (*νηματώδης*) fadenförmig.
Nematophycæe Ag. Fadenalgen.
nemausensis von Nimes (Nemausus) in Südfrankreich.
nemolapathum Waldampfer (*νέμος*, -εος Waldweide).
nemophilus Hain od. Wald liebend.
nemoralis, -rensis, -rosus, -reus im Hain od. Wald wachsend (*nemus*, -ōris).
nemus, -ōris Hain, Wald.
Nenuphar nicht essbar (*Nuphar*, s. Nom.).
neomarchicus Neumärker, aus d. Neumark (*νέος* neu).
neomexicanus von Neumexiko.
neomontanus von Neuberg (Steiermark).
nepalensis von Nepal (Nepaul) am Himalaya.
Nereis „Nereide“, Meernymphe, Meer- od. Seeflora.
neratio Geäder, Berippung.
nervus „Nerv“, Ader, Rippe (eines Blatts).
neubergensis i. q. *neomontanus* Neuburger.
nicaeensis von Nizza (franz. Oberitalien).
Nieer (Nicus), -cri Neckar.
nidorosus qualmig.
Nidrosia Drontheim (am Nidfluss in Norwegen).
nidulans nistend, wie ein Nest aussehend.
nidulus (dem. *nidus*) Nestchen.
nidus avis Vogelnest.
nigrescens schwarz werdend, ins Schwarze ziehend.
nigricans schwärzlich.
niloticus am Nil zu Hause.
niskiensi Neisser, *Niskia* Fluss Neisse.
nisus das Aufstreben, Emporwachsen.
nitens (v. *nitéo*) glänzend, -tidus desgl.
nitriensis von Neutra (*Nitria*) in Ungarn.

nivalis in oder um Schnee wachsend (s. sogl.).

Niveau = Wasserhöhe, z. B. Niveau-Differenz, d. i. Höhenunterschied.

nivēus schneeweiss (nix, -ivis Schnee).

nixus i. q. nixus das Emporklimmen etc.

nobilis edel, vornehm etc.

noctiflorus nachts blühend.

nocturnus nächtlich.

nodiflorus knotenblütig.

nodosus knotig, **nodus** Knoten.

noli tangere wolle nicht anrühren, „rühr' mich nicht an!“

nomenclatio (-tura) Namengebung, „Nomenklatur“.

nonscriptus unbeschrieben, unbezeichnet.

Noricum, jetzt Salzburg, Steiermark und Östreich.

Norimbergia Nürnberg.

normal = regelrecht (v. norma Norm, Richtschnur etc.).

norvegicus norwegisch.

nothus (νοθός) unecht, Bastard.

Notorrhizæ DC. Rückenwurzler (d. Samen beim Aufgehen).

Novboracum (Neoboracum) New-York, **-boracensis** New-Yorker.

Noviomagus Nymwegen.

novitiae, -arum Neuigkeiten.

nubilus neblig, wolkig, trüb, düster.

Nucamentacæe DC. Nüsschencruciferen (s. sogl.).

nucamentacæus nussartig (nucamentum Nusschötchen).

Nucellargewebeeines Eichens (Strasburger).

Nucellarhöker (Strasburger) einer Kernzelle.

nucistæ (sc. olæum) Muskatnussöl.

nucleolus (dem. nucléus) Kernkörperchen in d. Zelle, „Nüsschen“ in dem Zellkern.

nucleus Samenkern, Zellkern.

Nuculiferae Endl. Nüsschenträger (Asperifolien).

nudicaulis nacktstenglig (nudus blos, nackt).

nudiflorus nachtblütig (ohne Laub am Stock).

numerous zahlreich.

numidicus numidisch (Numidien, j. Algerien).

nutans nickend, gebeugt.

nutatio Neigungsbewegung¹⁾, die beim Wachsen sich äussernde während eines Tags nach oben od. unten (nicht seitwärts).

nux, -cis Nuss.

nyctitropismus Schlafbewegung d. Pfl.

nympheoides (-phoides) teich- od. seerosenähnlich.

obcordatus verkehrt herzförmig.

obdiplostemon (Schwendener) „doppelfadig“ (διδύμοις u. στειμωτοί).

obesus geschwollen, feist, dickgefressen.

oblique, -quus schräg, schief, seitwärts.

oblongus länglich, **oblongum** längl. Rechteck.

obolus Münze, Pfennig, „Obol“.

obovatus verkehrt eiförmig.

obscurus dunkel.

obsoleto (-tus) abgenutzt, gemein, veraltet, nicht mehr gebräuchlich.

obtusangulus stumpfeckig, -kantig.

obtusifolius stumpfblättrig.

obtusiusculus etwas abgestumpft.

obtusus abgestumpft.

occidentalis abendländisch.

ocellatus mit Äuglein versehen.

ochotensis von Ochotsk, am ochotischen Meerbusen zu Hause.

ochra Ocher, Ocker, **-racæus** ocker-gelb.

ochrea (ocræa) Tute, häut. Gelenkscheide (z. B. des Knöterichs).

ochroleucus gelblichweiss, blass-gelb.

Octandria L. Achtmännige (VIII. Kl.)

octoni, -nae etc. zu acht, je acht.

octopetalus achtkronblättrig.

odontalgicus zahnschmerzstillend (ὀδοντις, -όντος u. ἄλγος Schmerz).

odoratus wohlriechend, -ratissimus überaus w.

odorus riechend, von Geruch (besond. in compor. z. B. citriodorus).

oelandicus von d. Insel Oeland (Schweden).

Oelcanäle der Doldenfrüchte.

Oenipontanus Innsbrucker (Oenus Inn).

1) S. Pfeffer, d. period. Bewegung d. Blattorgane, Lpz. 1875.

- officinalis** „offizinell“, in Apotheken gebräuchlich.
- oleifer**, -ëra etc. ölgebend, -tragend (olëum).
- oleifolius** olivenblättrig (Olea Ölbaum, Olive).
- Oleracëae** Endl. Gemüsegew. (s. sogl.).
- oleracëus** als Gemüse benutzt (olus, -ëris).
- olïdus** übelriechend.
- oligocarpus** wenigfrüchtig (ὀλίγος wenig etc.).
- olitorius** vom Küchengärtner (olïtor) benutzt.
- ollarius** topfartig, -förmig (olla Topf).
- onomatologïa** Namenkunde (ὄνομα, -ατος).
- onotïcus** mit Eselsohren (ὄνος u. οὐς, ὠτός).
- oocarpus** eifrüchtig (ὠόν Ei, καρπός).
- oogonium** „Eibildungszelle“, Zelle m. Protoplasmaballen.
- oospöra** Dauerspore, d. i. durch ein Spermatozoid befruchtetes Ei des Oogoniums (s. eb.).
- opäcus** dunkel, schattig, glanzlos, unscheinbar.
- operculum** Deckel (v. operio bedecke).
- opifer**, -ëra hülfreich, Hülfе bringend.
- opipärus** herrlich, prächtig (ops, öpis Kraft etc., päro bereite).
- opponiert** = gegenüber (z. B. dem Vorblatt).
- oppositifolius** mit gegenständigen od. entgegengestellten Blättern (s. sogl.).
- oppositus** entgegengestellt, gegenüberstehend.
- Optimum** (der Temperatur) = bester, geeignetster Grad.
- opulifolius** schneeballblättrig (Opülus, s. Nom.).
- opuntius** opuntisch, von Opus, -untis, Stadt in Lokris.
- opuseulum** Werkchen (dem. opus).
- orbicularis**, -atus kreisrund.
- orbis** (sc. terrarum) Erdkreis, Erdenrund.
- orchidëus** orchisartig, wie Knabenkraut.
- oreädes** (z. B. Collybia or.) „Oreaden“, bergbewohnende Nymphen.
- orgyialis** eine Klafter messend (ὄργυιά).
- orientalis** morgenländisch.
- origanifolius** dosten- od. majoranblättrig (Origänum, s. Nom.).
- orthocëras** geradhörnig (ὄρθος, κέρας).
- orthogonal** (z. B. Trajectionen, Sachs) rechtwinklige (Durchsetzungen).
- orthospermus** geradsamig (bei Dol-den).
- orthospörium** Geradsamen (σπορά od. σπόρος).
- osmotïcus** „osmotisch“, die Diösmose betr. (s. d.).
- ossëus** knöchern, beinern, knochenod. beinhart (os, -sis).
- ossificatus** verknöchert.
- ossifragus** knochenbrechend, aber auch: bei Knochenbruch angewendet.
- ostreatus** wie eine Auster (ostrëa) geformt, zweischalig, aber auch rauh, hart.
- otia botanïca** bot. Früchte der Musse (otium).
- ovalis**, -atus „oval“, eirund.
- ovarium** Eierstock.
- ovinus** das Schaf betr. (ovis).
- ovirensis** von den Ovîr- (Obîr-) Alpen in Kärnthen.
- ovïlum** (dem. ovum) Eichen, Eilein, Samenei.
- owariensis** von Oware (Westafrika).
- Oxonïa** (-nium) Oxford.
- oxyacanthus** weissdornartig (Oxyacantha, s. Nom.).
- Oxygen** (fr. oxygène) Sauerstoff (ὄξυς u. γένω erzeuge).
- oxyglottis** spitzzungig (γλωττα i. q. γλώσσα).
- oxyptërus** spitzflüglig (πτερόν).
- pabulum** Futter, Nahrung.
- pacifïcus** friedlich, vom stillen Ozean.
- Padus** Fluss Po.
- pagänus** ländlich, bäurisch, auch heidnisch (pāgus Dorf).
- pagïna** Seite im Buch.
- pagus** Dorf, Gau.
- palaeontologïa** Petrefaktenkunde (παλαιός alt, ὄν, ὄντος Wesen).
- palarïa** (sc. radix) Pfahlwurzel (pālus, -i).
- Palatinatus** die Pfalz, **P. electoralis** d. Churpfalz.

palatinus Pfälzer, aus d. Rheinpfalz, palatinisch.
palatum Gaumen, den Mundeingang versperrender Wulst.
paleaceus spelz- od. spreuartig, (palæa Spreublatt).
palæae Klappen der Grasblüten.
pallens bleich, **pallescens** bleichwerdend.
pallidus blass, bleich.
palliolatus m. Kopfhülle vers. (palliolum).
Pallisadengewebe (richt. Palissaden-) der Blätter (Godlewski) (v. fr. palissade, lat. palus, Pfahlwerk).
Palmaceæ Bartl. Palmen.
palmaris handgross (v. palma flache Hand).
palmatifidus handspaltig, handfingerig.
palmatus handförmig, palmblättrig (s. v.).
palmensis von Palma (auf Majorka).
paludosus, -lustris sumpfig, in Sumpf wachsend.
panacæe (fr.) = Universalmittel (πανάκη; Alles heilend).
panaché (fr.) „panachiert“ d. i. buntstreifig.
panduriformis mandolinenförmig (πανδοῦρα dreisaitiges Instrument).
panica Rispe, **panicus** rispig.
panicula (dem. panica) Rispschen, Rispe, **-culatus** in Rispen blühend.
Pannonia „Pannonien“ od. Ungarn, **-nicus** ungarisch.
pannosus zerlumpt, lumpig (pannus Tuch etc.).
panoruitanus von Palermo (Panormus).
pantherinus pantherfleckig.
pantothrix ganz haarspaltig — nämlich alle Blätter.
Papia Pavia.
Papilionacæe L. Schmetterlingsblütige.
papilla Brustwarze, **-atus, -osus** warzig.
papposus m. Haar- od. Federkrone (Pappus) versehen.
pappus Haar- od. Federkrone (z. B. auf d. Samen d. Compositen).
papyracæus papierartig.
papyrifera, **-era** papiergebend.
papyrinus papierartig.
par, -es, -ia gleich u. ein Paar.

Parabel = Kegelschnittcurve parallel der Seitenhöhe.
paracorolla Nebenkronen (innerh. der Hauptkronen).
paradisiacus im Paradies wachsend.
paradoxus sonderbar, gegen die Regel.
paragramma ähnliche Wortbildung, auch Wortfälschung, Seitenstück zu einem Wort.
Parameter (Mathem.) = parallel der Directrix od. Richtlinie in d. Brennpunkt einer Parabel die Achse senkrecht schneidende Linie.
paraphysis Zell- od. Saftfaden zwischen den Sporenschläuchen der Pilze (v. φύσα Blase).
parasiticus „parasitisch“, schmartzend d. i. mitspeisend.
parasitus „Parasit“ d. i. Schmarotzer (παράσιτος; Mitesser).
parastemon Nebenfaden (στήμων lat. stamen, Staubfaden).
parastichon Schrägzeile (bei d. Blattstellung).
parenchyma „Parenchym“, Würfelzellgewebe (παρά, ἐν u. γυνός; „Chymus“, s. d.).
parenthesis Einschaltung s. g. „Parenthese“ (ἔσεις d. Setzen etc.).
parergon (παράργον) Nebenwerk, Anhang.
parietalis, -tinus an Wänden od. Mauern wachsend (paries, -ētis).
Parietales Endl. Wandfrüchtige.
parularius wie ein kleiner Schild (dem. parma).
paronymus nach einem andern Wort ähnlich gebildet (παρώνυμος).
Parthenogenese (parthenogenesis od. -gennesis) jungfräuliche Zeugung, d. i. ohne vorausg. Befruchtung (παρθένος Jungfr. u. γένεσις od. γέννησις Erzeugung).
partialis teilweise, zum Teil, „partial“.
partitus geteilt (v. partio teile).
parviflorus kleinblütig, **-folius** -blättrig.
paschalis zur Zeit des Paschafestes (Ostern).
pascua, -orum Weide, Weideplatz.
pascuus auf Weiden, zur Weide dienlich.
Passavia (i. q. Bojodurum) Passau.

- passim** zerstreut, überallhin verbreitet.
- Patavia** Padua u. Passau (Patavium).
- Patavina** (sc. Provincia) d. paduanische Gebiet.
- patens** offenstehend, ausgebreitet.
- pateraeformis** (bess. -riformis) schalen- od. schüsselförmig.
- pathologia** „Pathologie“ d. i. Krankheitslehre (πάθος Leiden etc.).
- Patientia** (sc. Rumex) „Geduldskraut“, s. g. englischer Spinat.
- patulus** offen, offenstehend, ausgebreitet.
- pauciflorus** wenigblumig, -blühend.
- paucistaminus** m. wenigen Staubgefässen.
- Pazowa** Passau (vgl. Passavia u. Patavia).
- pebrina** „Pebrine“ d. i. Bakterienkrankheit der Seidenraupe.
- pecten**, -inis Kamm, -tinatus kammförmig.
- pectōsis** „Pectose“, Pflanzengallert, -gelée (πηκτός geronnen).
- pedalis** einen Fuss messend (pes, -edis).
- pedatus** mit Fuss versehen, gestielt.
- Pedemontium** Piemont, -montanus piemontesisch.
- pediades** flach, eben (πεδιάς, -άδος Fuss-, πεδίον Feld etc.).
- pedica** Schlinge.
- pedicellus** Stielchen, Blütenstiel, -latus mit Blütenstiel versehen.
- pediculus** Füsschen (dem. pes, -dis) auch: Laus — wegen d. Form!).
- pediformis** fussförmig.
- pedunculus** Blütenstiel, -laris, -latus mit solchem versehen.
- pelisserianus** pelisserianisch, von Pelisseri.
- pellicula** Häutchen, Fellchen (dem. pellis).
- pellitus** m. Pelz bekleidet (pellis Fell etc.).
- pellucidus** durchscheinend (per u. lucidus).
- peloria** das Regelmässigwerden sonst unregelm. Blumen (πέλωρ, -ος Ungeheuer etc.).
- peltatus** schildförmig (pelta, πέλιτη kleiner, leichter Schild).
- peltiger**, -era Schildträger, -führer.
- pelviformis** schüssel- od. beckenförmig (pelvis).
- pendens** (v. pendeo) hängend.
- pendulinus** pendelartig, -dulus herabhängend, Hänge- (z. B. Esche).
- penicillatus** (v. penicillum) pinsel-pennisula Halbinsel. [förmig.
- penitior** eingehender.
- pennatifidus** fiederspaltig (s. sogl.).
- pennatus** gefiedert (v. penna Feder).
- pennatulus** etwas od. nahezu gefiedert.
- pentacrinus** fünfliienartig (πέντα u. ζώνιον, in der Zoologie Pentacrinus).
- pentactinus** fünfstrahlig (ἀκτιν Strahl).
- pentacyclius** in fünf Kreisen bestehend (κύκλος).
- pentalobus** fünfklappig (λοβός).
- pentamerus** fünfteilig (μέρος Stück etc.).
- Pentandria** L. Fünfmännige (V. Kl.).
- pentandrus** fünfmännig (ἀνδρ, -ύδρος Mann, in d. Bot. Staubgefäss).
- pentapetalus** fünfkrönblättrig (πέταλον lat. petalum).
- pentaphyllus** fünflaubblättrig (φύλλον Laubblatt).
- peperitis** od. -tus pfefferartig (s. piperitis).
- peploides** wolfsmilchähnlich (Pep-lus, s. Nom.).
- pepo**, -onis Pflume, Melone, Kürbis od. Gurke.
- Peponiferae** Endl. Kürbisfrüchtige, Pfebentträger.
- peponium** Kürbisfrucht (s. eb.).
- Pepsin** = Verdauungs- Erregstoff d. Magens (πέψις u. πέπτω koche etc.).
- peregrinus** fremd, ausländisch, eingewandert.
- perennis** „perennierend“, ausdauernd (per u. annus Jahr).
- perfoliatus** m. (vom Stiel) durchwachsenen Blättern.
- perforatio** Durchbohrung (z. B. der Holzgefässe).
- perforatus** durchbohrt, -stochen.
- pergamenus** „pergamenisch“, v. Pergamum in Kleinasien.
- perianthium** eig. „Blütenhülle“ (περί herum, ἄνθος) Überbleibsel der v. Moossporen durchbrochenen Archegonien, ähnl. einem häutigen Kelch!

- periblēma** Aussenrinde, -hülle (d. Rinde) (*βλήμα* v. *βάλλω* werfe).
- pericarpium** „Perikarp“, Fruchthülle, -gehäuse (*καρπός*).
- perichaetium** Haarhülle um die Archegonien der Moose (*χαίτη* langes Haar).
- perikline Wandrichtung** (Sachs) = in ähnl. Sinn, wie die Oberfläche, gekrümmt.
- periclinium** Hüllkelch der Compositen (*κλίση* Lager, Bett).
- periderma** äussere Hautschicht der Borke od. Rinde.
- peridiolum** umhätetetes Staubkügeln d. Pilze (s. sogl.).
- peridium** Sporenhülle der Flechten u. Pilze.
- perigonium** „Perigon“, Blütenhülle.
- Perigynia** Juss. Umweibige, d. Stempel umständig (nicht ober- od. unter-).
- perigynus** (sc. flos) m. um den Stempel herum gestellten Blüten teilen.
- periodicitas** „Periodizität“, d. Wiederkehren in Perioden.
- Peripetalia** Juss. Umkronblättrige.
- periphericus** „peripherisch“, am Umfang befindlich.
- perispermium** „das Perisperm“ od. Zellgewebe um den Eikern herum, äuss. Sameneiweiss.
- Peristaminia** Juss. m. umständig. Staubfäden.
- peristomium** „Peristom“, Mundbesatz d. Moosfrüchte (*στόμα* Mund).
- perithaecium** flaschenförm. Fruchthehalter d. Pilze (*περιθήκη* Mütze u. dgl.).
- perlatus** mit Perlen (perla) besetzt, **per-latus** sehr weit od. breit.
- permicus** „permisch“, v. d. Stadt Perm am Ural.
- permollis** sehr weich (per- in comp. sehr).
- peronatus** gestiefelt (pero, -ōnis Stiefel).
- perpensus** genau erwogen (v. *perpendo* betrachte), auch i. q. suspensus aufgehängt.
- perpetuus** immerwährend.
- perpusillus** sehr klein, winzig (s. vorh.).
- persicarius** pflirschartig (*persica* Pflirsich).
- persicifolius** pflirsichblättrig.
- persistens** festsitzend, stehenbleibend.
- personatus** (sc. flos) maskenförmig, m. geschloss. Gaumen etc. (persona Maske).
- Personatae** Endl. Maskenblumige.
- pertusus** durchstossen, -bohrt, -brochen.
- perilae** Knospenschuppen, eig. Säckchen (dem. *pēra* Sack).
- pervius** durchbohrt, offen, durchzupassieren.
- Petalanthae** Endl. Kronblütige, Primelblütige.
- petaloides** kronblattähnlich.
- petalum** (*πέταλον*) Kron- od. Blumenblatt.
- petiginōsus** räumig, flechtig, **petigo**, -inis Räude.
- petiolatus** m. Blattstiel vers. (**petiolus** Blattstiel. [tiolus]).
- petraeus** auf Felsen wachsend (*πετραίος*).
- petrefactus** versteinert, in Stein verwandelt (*πέτρα* u. *facio*).
- Petropōlis** St. Petersburg, **-politānus** Petersburger.
- petricosus** u. **petrosus** felsig, steinig.
- peucedanifolius** haarstrangblättrig.
- phaea** Linse, Linsenfrucht, -gericht.
- phacorrhizus** linsenwurzlig, m. Linsenknollen an d. Wurzeln.
- phaenogāmus** deutlich od. sichtbar blühend.
- phänologisch** = die Erscheinungs- od. Blütezeit betr. (v. *φαίνομαι* erscheine).
- Phänologie** = Blütenerscheinungskunde.
- phaeus** (gr. *φαῖος*) rot- od. schwarzbraun.
- phagedanicus** (*φαγεδανικός*) krebsartig um sich greifend.
- phalangerifer** (v. *phalangium* Weberknecht) W. tragend.
- phalaroides** glanzgrasähnlich (Phalaris s. Nom.).
- phaleratus** m. Kopf- od. Brustschmuck geziert (phalerae, gr. *φάλαρα*).
- phaneranthērus** m. deutlichen Antheren (*φανερὸς* sichtbar etc.).
- Phanerogāmae**, L., Phanerogamen“ d. i. deutlich blühende Pfl.

- pharmaceutes** (φαρμακευτήης) Arzneibereiter, „Pharmazeut“.
- pharmacognosia** Arzneiwaarenkunde (φάρμακον u. γνώσις Kenntnis etc.).
- Phasen** = Erscheinungsformen (z. B. Mondphasen) (φάσις v. φαίνω etc.).
- phellēma** „Phellem“ d. i. Korkschicht (φελλός Kork).
- phelloderma** (Sanio) Korkrindenschicht, „Korkhaut“.
- phellogēnon** (-um) „Phellogen“, Korkstoff (γένω erzeuge).
- Phelloidschicht** = korkartige, nicht eig. Korkschicht.
- Phellos** (φελλός) Korkeiche (s. Nom.).
- philaea** erdliebende (φιλή u. αία Erde).
- philonōtis** nassliebend, gern an feuchten Orten (ποτίς d. Nass, die Nässe).
- phlebophōrus** Adern tragend, adrig (φλέψ, -βος, lat. vena u. φορός).
- phleoides** lieschgrasähnlich (Phlēm, s. Nom.).
- phloēma** „Phloēm“, Bast- od. Rindenstoff, Bastteil des Cambiums od. Gefässbündels (v. φλοιός Borke, Rinde, Bast).
- phlomoīdes** dochtkraut-, wolkrautähnlich (φλομίς od. -μος Woll- od. Kerzenkraut).
- phoeniceus** purpurrot (gr. φοινί-ζεος).
- phoeniceus** (od. -ius) phoenizisch (φοινικικός).
- phrygius** phrygisch, aus Phrygien (in Kleinasien).
- Phycēa** Wallr. Algen od. Tange.
- phycochrōma** „Phycochrom“, d. i. Farbstoff der Algen od. Tange.
- phycologia** Tang- od. Algenkunde (φύκος lat. fucus Tang).
- Phycomyces** de By Algenpilze (Pilzalgen).
- phyllicifolius** heidenmyrtenblättrig, immergrün-blättrig.
- phylloblastae** Rehb. Blattkeimer (= Dikotylen).
- phyllocladium** Blattzweig, blattgleicher Zweig (κλαδός Ast etc.).
- phylloodium** Blattstielblatt, d. i. ein blattartig erweiterter Blattstiel (φυλλώδης).
- phyllōma** Laubgewebe, Blattgebilde (z. B. Phyllonstacheln, Delbrouck, Blütenphyllome, Schwendener).
- phyllomania** Laubsucht (μανία „Manie“, Sucht).
- phyllophilus** Laubfreund.
- phyllotaxis** Blattstellung, -ordnung.
- phyllum** (in compos.) Laubblatt (φύλλον).
- phylogenetis** Gattungs- od. Zunftbildung betr. (φυλή od. φύλον Stamm etc.).
- physiologia** „Physiologie“, Naturlehre (v. φύσις, -ιος Natur, λόγος kundig).
- physiotypia** Gestaltungslehre der Natur (τυπή „Type“, Schlag etc.).
- phytanthozōa** Blumentiere (φυτόν, Pflanze, ζῷον).
- phytobasanos** Pflanzenuntersuchung (βασάνος Probe).
- phytologia** Pflanzenkunde (φυτόν, λόγος kundig od. λόγος Kunde).
- phytozōa** Pflanzentiere (ζῷον Tier).
- picaceus** Elster od. auch Specht betr. (pica Elster, picus Specht).
- picēus** Pech od. Teer liefernd (pix, -icis Pech, Teer), pechschwarz.
- piciferus** pechtragend.
- picreus** bitter (v. πικρός).
- picridis** des Bitterkrauts (Gen. v. Picris, s. Nom.).
- Pictavis** Poitiers.
- pictus** bemalt, farbenstreifig od. -fleckig.
- pileatus** (v. pilēus) mit Hut versehen.
- pilifer** (v. pilus) Haare tragend.
- pili stigmatis** Narbenhaare.
- piloselloides** mäuseohrähnlich (Pilosella, s. Nom.).
- pilosus** etwas behaart (s. sogl.).
- pilosus** behaart, haarig (v. pilus).
- pilula** (dem. pila Ball) Pille.
- pilularis** Pillen betr. (s. eb.).
- pilulifer** Pillen tragend (s. v.).
- pilus** Haar (gr. πῖλος).
- pimpinellifolius** pimpinellblättrig.
- pinastrum** (deter. v. pinus) Tanne, Fichte.
- pinetum** (collect. v. pinus) Tannenschlag, -wald.
- pinēus** tannen, an od. auf Tannen wachsend.
- pinicōla** Tannen od. Fichten bewohnend, an od. unter Tannen.
- pinna** Feder, -natus gefiedert.

- pinnatifidus** fiederspaltig.
piperatus gepfeffert, nach Pfeffer schmeckend.
piperitis (-itus) pfefferartig (περιπέριτης).
pisiferus erbsentragend.
pisiformis erbsenförmig (pisum).
pisocarpus erbsenfrüchtig (πίσος u. καρπός).
pistillaris pistill- od. keulenförmig.
pistillum „Pistill“, Stempel, Mörserkeule.
pityreus kleienartig, schorfig (πίτυρος).
placenta Samenleiste (i. q. spermophorum).
Placencia Piacenza (am Po).
placide (-dus) sanft, gefällig, allmählich, nach u. nach.
plaga Gegend, Distrikt.
planus breitflüchtig.
planiculmis plattalmig, flach- od. plattstenglig.
planiglumis flachspelzig.
planisiliquus flach- od. plattschotig.
planiscelus ziemlich platt od. flach.
planta Pflanze, Fusssohle.
plantaginæus wegerichartig (Plantago, s. Nom.).
plantatio Pflanzung, „Plantage“.
planus platt, flach, eben.
plasma Bildungs- od. Zellenurstoff (πλάσμα, -τος).
Plasmamembran od. -Haut, Abgrenzung gegen den Zellstoff (Pfeffer).
plasmodium = bewegl. Plasmamasse (b. Schleimpilzen, z. B. Lohblüte).
plasmolytischer Zustand, d. i. wenn sich das Plasma von der Zellwand zurückgezogen.
platanifolius platanenblättrig.
platanoides platanenähnlich.
plantantherus m. breiten Staubbeuteln vers.
platanensis vom La Plata-Strom.
Platte = d. breite Teil eines Cruciferen-Kronblatts.
platyacanthus breिटdornig (πλατύς breit, ἀκανθα Dorn).
platycaurus breitfrüchtig, **-phyllus** breitblättr., **-spermus** breitsamig.
platystigma Breitnarbe.
plenus (sc. flos) voll, gefüllt.
pleroma „Plerom“, d. i. Centralcylinder d. Wurzel.
- pleuranthæ** Seitenblütige (Gräser) (πλευρά Seite).
pleurocarpi (sc. musci) Seitenfrüchtige (Moose).
Pleurorrhizæe (sc. Cruciferae) DC. seitenwurzelnende (d. Samen beim Aufgehen).
plexipes flechtfüssig, -stielig (v. plecto, -xus).
plica Falte, **-catus** gefaltet.
plicatilis faltig. [artig.
plumarius, -mosus federig, federplumbæus bleiern, bleifarbig.
plunula Flaum- od. Blattfederchen d. Samenkeims.
pluvialis Regen betr., **pluvius** desgl.
podagrarius Podagra od. Fussgicht heilend.
podetium Fussgestell, Stiel d. Pilzapotheccien.
podium das die Gabeläste tragende Stengelstück.
-podium (in compos.) Fuss, Stiel (πόδιον).
podolicus podolisch, aus Podolien (Südrussland).
polifolius poleiblättrig.
poliотrichus grauhaarig (πολιός u. θρίς, τρίχος).
politus „poliert“, verfeinert, fein.
polius (πολιός) grau.
pollen, -inis Samen- od. Blütenstaub, „Pollen“.
pollicaris daumendick (v. pollex, -icis).
pollinarium Pollenmasse, **-inium** desgl. bei Orchideen.
Pollveria (sc. Pirus) Bollweiler (Kreis Gebweiler in Ober-Elsass).
polonicus polnisch, aus Polen.
Polyadelphia L. Vielbrüderige (XVIII. Kl.).
polyanthemos (-us) vielblütig, -blumig (πολύς u. ἄνθεμος).
Polycarpicæe Endl. Vielfrüchtler.
polycarpus viel- od. mehrfrüchtig (z. B. gynæceum).
polycladia Vielverästelung, Astwucherung (πλατός Ast, Zweig).
polyclonos vielzweigig (πλῶν, -ωνός Trieb etc.).
polydactylos, -on (-us, -um) vielfingerig.
polyedrisches Parenchym = aus vielfäch. Zellen bestehendes, polyedrische Areolen (Sachs) = Polyederflächlein; Polyeder (Mathem.)

= Vielflächer, d. i. Körper mit vielen Flächen (*ἔδρα* Sitz etc.).
Polygamia L. Vielehige (XXIII. Kl.) u. Syngenes. „Vielblütblumige“.
polygonalis „polygonal“ d. i. vieleckig, -kantig.
polygrammus vielstreifig, vielmals gestrichelt (*γράμμα* Strich etc.).
polygynus vielweibig, -griffelig etc. (*γυνή* Weib, Bot. Stempel).
polymērus aus mehreren Stücken bestehend (*μέρος* Stück, Teil etc.).
polymorphus vielgestaltig (*μορφή* Gestalt etc.).
Polypetala Juss. Vielkronblättrige (*πέταλον*).
polyphyllus vielblättrig, dicht beblättert (*φύλλον* Laubblatt).
polyrrhizus vielwurzellig (*ρίζα* Wurzel).
polyspermus vielsamig (*σπέρμα*).
polystachyos (-us) vielährig (*στάχυς*, -ος Ähre).
Pomaceae Rehb. Apfelfrüchtler.
Pomariae Lindl. ebenso.
pomarium Obstgarten.
Pomerano-Rugius pommerisch-rügenger (Rugia Insel Rügen).
pomeridianus (st. postmer.-) nachmittägig.
pomifer, -era apfelobsttragend (pomum).
Pomōna Göttin des Obstes.
Pomponius (-ianus) pomponisch (röm. Familie), aber auch prunkend (fr. pompon Zierrat).
pomum (fr. pomme) Apfel, **poma aurantiorum** Pomeranzen.
ponticus pontisch, von Pontus am schwarzen Meer.
popinalis in Küchen gebraucht (popina).
populinus an Pappeln wachsend (Populus, s. Nom.).
populneus die Pappel betr.
porcinus Schweine betr. (porcus, -i).
porosus „porös“, voller Poren od. Löcher.
porphyrius porphyr- od. purpurfarbig.
porrectus ausgestreckt (v. porrigo strecke aus etc.).
porreus lauchartig (Porrum, s. Nom.).
porrifolius lauchblättrig (s. eb.).
portatilis tragbar, leicht mitzunehmen.

portentosus abenteuerlich (portentum Wunder etc.).
portulacoides portulakähnlich (Portulaca, s. Nom.).
porus (πόρος) Durchgang, „Pore“.
posoniensis Posener, aus Posen (Posonia).
posthūmus nach dem Tod herausgegeben od. zur Welt gekommen.
postice (-us) hinten, hinterer.
Potamicae Juss. Fluss- od. Laichkräuter.
praealtus sehr hoch.
praecipue besonders, vornehmlich.
praecox frühzeitig, vor der Zeit.
praefloratio Blütenknospen-Anlage.
praefoliatio Blattknospen-Anlage, Knospenblatt-Deckung.
praelongus langgestreckt.
praemorsus vorn abgebissen (v. mordeo beisse).
praesertim zumal, besonders.
praestans, -tissimus vorzüglich, vorzüglichster.
prasinus (πράσινος) lauchgrün (Prasum in comp. Lauch).
-prasum in compos. Lauch (πράσον).
pratensis, -torum auf Wiesen wachsend (pratium).
precatorius zum Beten dienend (zu Rosenkranzperlen gebr.).
prehensilis anfassend, sich windend.
preanthoides hasenkohlähnlich (Prenanthes, s. Nom.).
Primanblüten (z. B. Amaryllideen) hintenumlaufige Erstlingsblüten (Schwendener).
primarius „primär“, Erstling, auch vornehm.
primitiae, -arum Erstlingsarbeiten, Anfänge.
primordialis (sc. utriculus) Primordialschlauch, erste innere Zellschicht, erstanfänglicher.
Principes Endl. Edelbäume (Palmen).
prismaticeus „prismatisch“, säulen-, ecksäulenförmig (z. B. Gefäße od. Zellen).
proboscideus rüsselartig (πρόβοςσις, -ίδος Rüssel).
procambium Zellschicht, aus der d. Gefäßbündel hervorgehen.
procērus von hohem Wuchs, vornehm.
procumbens niederliegend.

- procurrens** hinlaufend, sich erstreckend.
- prodigiosus** wunderbar, **prodigium** Wunder.
- prodrōmus** Vorläufer, Vorrede, Einleitung.
- productus** vor- od. in die Länge gezogen, auch „produziert“ od. hervorgebracht, z. B. „Produkt“.
- proles**, -is Brut, Nachkommenschaft, Sprössling.
- prolifer**, -ēra sprösslingtragend (s. eb.).
- prolificatio** Sprossung, d. Hervorbringen v. Sprösslingen.
- prolusio** Vorspiel, Einleitung.
- prominens** vorragend, hervorstehend.
- promptuarium** Speisekammer (v. promo hole herbei).
- promulgatus** „promulgiert“, bekannt gemacht etc.
- promycelium** Keimschlauch, Sporidie, aus welcher das eig. Mycel des Ährenbrands hervorgeht.
- propago**, -inis Ableger, Spross.
- propagulum** kleiner Ableger od. Spross (s. eb.).
- prope** nahe bei.
- propinquus** nahe, verwandt.
- proponticus** vom Marmarameer (Propontis).
- prosenchyma**, „Prosenchym“, Faser- od. Streckzellen Gewebe.
- prosenthesis** Zusatz bei wiederholter Blattstellung.
- prostratus** niedergestreckt, dahinkriechend.
- Proteïnkörner** od. Klebermehl (v. dem formwechselnden Gott Proteus abgeleitet).
- protandrae** Pfl. m. vorherreifenden Staubbeutel (zur Verhütung der Selbstbestäubung, z. B. bei Campanula Medium).
- prothallium**, -allus Vorkeim (i. q. pro-embryo) aus den Farnsporen.
- protogaens** vorweltlich (πρωτος; erster, γαίη Erde).
- protogenitus** zuerst erzeugt, Urzeugter (s. eb. u. genitus v. gigno).
- protogynae** (sc. plantae) m. vorherreifenden Stempeln zur Verhütung d. Selbstbefrucht. (z. B. bei Magnolien u. Aristolochia).
- protonēma** Vorkeim beim Generationswechsel d. Moose (νημα Faden).
- Protophyta** Endl. Urpflanzen (πρωϕυτωνος, φυτόν).
- protoplasma** Zellengrund- od. Ursprungsstoff (s. plasma).
- prototypus** von erster od. ursprüngl. Bildung (πρωτότυπος).
- proventitius** vorhergehend, **-titiae gemmae** Proventivknospen (d. i. nicht entwick. Anfangs-).
- provincialis** „provencer“, aus der Provence.
- pruina** Reif, Duft, **-nosus** bereift, duftig.
- prunulum** (dem. prunum) Pfläumchen.
- pruriens** juckend, Jucken erregend.
- pruthenicus** (-tenicus) preussisch.
- psamma** (ψάμμα) Sand, Mulm.
- Pseudo-** od. Pseud- in compos. falsch, trügerisch (ψευδος; Lug, Trug).
- psilocarpus** nackt- od. kahlfrüchtig (ohne Pappus) (ψιλος; kahl etc.).
- psilophyllus** kahl- od. nacktblättrig.
- psittacinus** papageigrün, -farbig (Psittacus).
- psoralæus** krätzig, schäbig (ψωραλλος).
- psyllophorus** flohtragend (ψύλλα od. -λλος; Floh).
- ptarmicus** Niesen (πταρμιος) erregend.
- pteridographia** Farnkunde, **-iens** dazu gehörig (πτερογίς, -ίδος u. γράφω beschreibe).
- pteris** in compos. Farn, eig. Flügel od. Wedel (πτερον).
- pteroecarpus** flügelfrüchtig, Flügel- frucht.
- puber** (od. -es), -ēris mannbar, erwachsen.
- pubes**, -is Flaum, Behaarung, eig. Mannbarkeit.
- pubescens** weich- od. flaumhaarig.
- pubescentia** „Pubescenz“, weiche Behaarung.
- pudicus** verschämt.
- pudorinus** verschämt, schamröthlich.
- pugillaris**, -ium Schreibtäfelchen.
- pugillus** Heft.
- pulehellus** (-cellus) schön (dem. pulcher).
- pulicaris**, -rius Flöhe betr. (pulex, -icis).

pullus dunkel- od. schwarzbraun.
pulpa Fruchtbrei.
pulveraceus staubig, pulverig.
pulvinatus polster- od. kissenartig (v. *pulvinus*).
pumilus niedrig, niedlich, klein.
punctatus punktiert, gedüpfelt.
pungens stechend (*pungo*, *püpügi*, *punctum*, 3.).
punicæus granatrof (v. *Punicea* Granatbaum).
punicus punisch, phönizisch, carthagisch.
pustula „Pustel“, Bläschen, **-atus** m. Pusteln, pockig.
putāmen Stein d. Steinfrucht, Kernstein od. -Schale.
puteanus (-*tanæus* Kummer?) in Gruben od. Brunnen vorkommend (*putæus*).
putridus angefault, morsch.
Pyrenidae Tul., Pykniden“, Fruchtformen mancher Pilze (v. *πυρρός* dick, dicht).
pynocephalus dick- od. dichtköpfig (s. eb. *κεφαλή*).
pygmaeus (*πυγμαίος*) zwerge- od. „pygmäenhaft“.
pyramidalis pyramidenförmig.
pyrena „Pyrene“, Steinfruchtkern, z. B. bei Rubiaceen (*πυροῖν*, *-ῖνος*).
pyrenaicus, **-aicus** pyrenäisch, von den Pyrenäen.
Pyrenomycetes Fr. Kernpilze (s. v.).
pyriodorus von Birngeruch (*pyrus* u. *odorus*).
pyrogalus feuermilchig, m. feuergelber Milch (*πῦρ*, *-ος* u. *γάλα*).
pyrotechnicus „pyrotechnisch“, z. Feuerwerk gehörig.
pyxidaris, **-arius** büchsenartig (*πυξίς*, *-ιδος*).
pyxidatus mit Büchsen besetzt.

quadratus „quadratisch“, viereckig.
quadrialatus vierflügelig (*quadri-* in comp. u. *alatus* geflügelt).
quadriangularis, **-atus** viereckig, -kantig (*angulus* Eck, Winkel).
quadrifariam, **-ius** vierfach (adv. u. adj.).
quadrifidus vierspaltig.
quadrifolius vierblättrig.
quadrijugis (-*us*) vierjochig, -paarig.
quadrilocularis vierfächerig (*loculus* dem. *locus*).

quadriquetter, **-tra** vierschneidig.
quadrus viereckig, Viereck.
quatenus wie weit, inwiefern, in Betracht dass.
quater viermal.
quaternellus, **-ternus** vierfältig.
quercetum (collect. v. *quercus*) Eichenwald, -schlag.
quercæus eichen, von Eichenholz.
quercifolius eichenblättrig.
quercinus die Eiche betr., zur Eiche gehörig.
quernus, **-næus** wie eben.
quinatus zu fünfgen gestellt, fünf-fach.
quinduensis vom Berg Quindu (Neugranada).
quini, **-ae** zu fünf, je fünf.
quinologia Quinoakunde (*Quinoa*, s. Nom.).
quinquecornis fünfhörnig.
quinquedentatus fünfzählig.
quinquefidus fünfspaltig, -teilig.
quinquefolius fünfblättrig.
quinquepartitus fünfteilig, in fünf Teile geteilt.
quinquevulnerus fünfmarbig (*vulnus*, *-ëris* Wunde).
Quirl (*Wirtel verticillus*) Astkreis um einen Stamm herum (z. B. Fichte).
quisqualis ungewiss was für (*quis?* *qualis?* wer? was für einer?).
quisquillæ Schmutz, Unrat, Auswurf.
quisquiliaris in od. auf Schmutz etc. wachsend.
quot wie viele.
quotannis jährlich, alljährlich.
quoties wie oft, wie vielmals.

rablensis aus dem Raiblthal in Kärnten.
racemosus traubig, traubenartig (*racemus* Tr.), gipfelsprossig mit innerem Hauptstamm.
racemus Traube u. Traubenkamm.
radialis in Radien od. Strahlen gestellt, z. B. radiale Wände (Sachs) d. s. aus der Wachstumsachse rechtwinklig auf d. Oberfläche gestellte.
radians strahlend.
Radiatae Juss. Strahlcompositen.
radiatus gestrahlt, strahlblütig („Radiaten“ bei d. Compositen).

- radicalis** aus der Wurzel, die W. betr.
radicans wurzelnd, wurzelschlagend.
radicellae Nebenwurzeln (dem. radix, -icis).
radicosus wurzelartig, wurzelreich.
radicula Würzelchen od. Schnäbelchen des Samenkeimes (aus dem sich d. Wurzel bildet).
radius Strahl, z. B. Blütenchen im Umkreis der Compositen.
radix, -icis Wurzel.
radula Raspel.
raeborrhizus schweifwurzlig (*ῥαυβὸς* geschweift).
Rajolen (Rijolen) = Bodenarbeit des Schichtwechselfs.
ramalis ästig, -**mealis** auf Ästen wachsend.
ramentaceus schabselig, spänig (ramentum).
ramentum Ausschlagschuppe, Schabsel, Späne.
ramens an Ästen befindlich.
ramiger, -**ura** Äste führend, geweihästig.
ramosus, -**sissimus** ästig, sehr verästelt.
ramuli Ästchen, Zweige (dem. ramus Ast).
ranae des Frosches, **ranarius** unter Fröschen vorhanden.
rangiferinus (st. ramiger ferinus) Wild-Astmoos betr.
rapa Rübe, -**ceus** rübenförmig, -artig.
raphe (*ῥαφή*) Naht, mit dem Samenstiel langwegs verwachsene Samenhaut.
raphida (sc. crystalli) Nadelkry-stalle, Nadeln (*ῥαφίς*, -ίδος).
rapum (i. q. rapa) Rübe.
rapunculoides rapunzelartig.
rarior, -**issimus** seltner, seltenster, **rarus** „rar“ etc.
ratisbonensis Regensburger (Ratisbōna R.).
ratumagensis von Rouen (Ratumä-gus od. Rotoni).
ravidus u. **ravus** graugelb.
receptaculis fruchtbodenständig.
receptaculum Fruchtboden.
receptio von aussen aufgenommene od. „Receptions“-Bewegung d. Blätter (Pfeffer).
reciprocus wiederkehrend, (Gram-matik) rückbezüglich.
- reecisus** zurückgeschnitten (v. re-scindo).
reclinatus zurückgeneigt, nieder-gebeugt.
recte richtig, **rectius** richtiger, -**tus** gerade, aufrecht.
recurvatus (-vus) zurückgekrümmt, krumm.
recutitus beschnitten (v. cutis Haut).
redivivus wiederauflebend, -auf-gelebt.
redolens Geruch verbreitend.
reflexus zurückgebogen.
refulgens zurückstrahlend, wider-scheinend.
regalis u. **regillus** königlich, prächt-ig.
Regina Regensburg.
Regiomontium Königsberg.
regius königlich.
regularis „regulär“, regelmässig.
relativ = im Verhältnis, verhält-nismässig.
reliquiae Überbleibsel, Nachlass.
religiosus „religiös“, heilig.
Reini, -**menses** Rheims, Rheimer.
remotus entfernt, auseinander.
remontante fr. (z. B. Rose) wieder-holt blühende.
renifolius nierenblättrig (rēn, -nis Niere).
repandus geschweift, ausgeschweift.
repens u. **reptans** kriechend.
repertorium (fr. répertoire) Re-gister, Liste, „Repertoire“.
Reservestoff, -**nahrung** = zur Er-nährung in der Pfl. abgelagerter.
resinosus harzsaftführend (v. resina Harz).
resorbieren = aufsaugen.
resorptio „Resorption“, Aufsau-gung v. Flüss.
resupinatum (sc. folium) unterst zu oberst gekehrt.
resupinus zurückliegend, -geneigt, verkehrt.
reticulatus netzförmig, -**culum** Fischnetz (v. rēte, retis Netz).
retinaculum Halter (v. retineo).
retroflexus zurückgebogen.
retrorsum rückwärts.
retusus stumpf, abgestumpft.
revisio „Revision“, Durchsicht.
rhachis (*ῥάχις*, -εως Rückgrat etc.) Blatthauptrippe, Spindel eines Fiederblatts.

Raethia „Rhätien“ (j. Tirol u. Graubünden).
rhamnoides kreuzdornähnlich (Rhamnus, s. Nom.).
rhenanus rheinisch, **Rhenus** Rhein.
rhipaeus (ῥιπαῖος) od. **riphaeus** rhipäisch od. uralisch, von d. rhipäischen Gebirge (Ural).
Rhizanthëae Endl. Wurzelblütler.
rhizinae Hautfasern der Flechten.
Rhizocarpëae Batsch Wurzelfrüchtler.
rhizoides wurzelähnlich, -artig, z. B. Rhizoïden = am Vorkeim der Chara sich bildende Wurzelbärtchen.
rhizōma (ῥιζωμα) „Rhizom“, Wurzelstock.
rhizomorphus wurzelartig gebildet.
rhizophōrus wurzeltragend.
rhizotomīcum (ῥιζοτομικόν) Buch üb. Wurzelgräberei od. -Schneiderei.
rhodo- in comp. Rosen- (ῥόδον).
rhodopolium (Gen. Pl.) der Rosenverkäufer (v. ῥοδοπωλῆς).
rhoeadifolius möhnblättrig (Rhoeas, -ädīs, s. Nom.).
rhoifolius sumachblättrig (v. Rhus, -ois, s. Nom.).
rhombëus rhombisch, rautenförmig.
rhomboidalis rhomboidisch, langrautenförmig.
rhytidospermus runzelsamig (ῥυτίδος, -ιδος).
rietas Rachen, aufgesperrter Mund.
Riefen = Rippchen der Doldenfrüchte (juga).
rigens starr, steif (rigeo, -ëre starren, steifsein).
rigidulus etwas starr od. steif (s. eb.).
rigidus starr, steif (s. v.).
riguus bewässert.
Rillen (vallecūlae) zwischen d. Riefen d. Doldenfrüchte.
rima Ritze, Riss, **-mosus** rissig, voller Ritzen.
rimosipes rissfüßig, -stielig (s. eb.).
ringens mundaufsperrend, rachenförmig (v. ringor, 3.).
ripaei montes s. rhipaeus.
riparius am Ufer wachsend (ripa).
rivalis an Bächen wachsend (rivus).
riviniānus Rivini's (n. pr.).
rivularis an kleinen Bächen wachsend.

rivulosus rinnig, rissig, rinnselig (s. sogl.).
rivulus (dem. rivus) Bächlein, kleiner Bach.
robertianus Roberts od. Rupprechts.
robiginosus rostig, rostfarbig (robigō, -inis).
robur, -ōris Kraft, Steineiche.
robustus „robust“, stark, kräftig gebaut (s. eb.).
Röhrenblüten (flores tubulosi) bei Compositen (Disteln etc.).
ros, -ris Tau, Reif, Duft.
rosaceus, -sëus rosenartig.
rosëidus betaut, bereift, beduftet.
roseöla (dem. rosa) Röschen.
Rosette = Röschen, rosenförm. Rundverzierung.
Rosiflorae Endl. Rosenblütige.
Rossia Russland, — **meridionalis** Südrussland.
rossicus russisch.
rosmarinifolius rosmarinblättrig.
rostellatus m. einem Schnäbelchen versehen (s. sogl.).
rostellum (dem. v. rostrum) Schnäbelchen, Pollinentäschchen der Orchideen.
rostratus (v. rostrum) geschnäbelt.
rosula (dem. rosa) kleine Rosette, Blätterrosette etc.
Rotation = Drehung, Radbewegung.
rotatus radförmig (v. roto drehe um, rota Rad).
rothianus (rothigūus s. Rothii) nach Roth benannt.
rothomagensis (roto- u. rodomensis) von Rouen, vgl. ratumagensis.
rotundatus gerundet.
rotundifolius rundblättrig (rotundus rund).
rubellus (dem. ruber) rötlich.
rubens errötend, gerötet, rötlich, rot (v. rubëo).
ruber, -bra etc. rot, **-berrimus** grell rot.
rubescens errötend, gerötet (rubesco werde rot).
rubicundus rötlichgelb, hochgelb.
rubifolius brombeerblättrig (v. Rubus, s. Nom.).
rubiformis brombeerförmig, -warzig (Kummer).
rubiginosus i. q. robiginosus rostfarbig (rubigo, -inis).
rubigo, -inis Rost, Rostfarbe.

- rubioides** brombeerähnlich (Rubus, s. Nom.).
- rubrica** Rötel, **-eatus** mit Rötel bezeichnet, „rubriziert“.
- rubrifolius** rotblättrig (ruber, -bri).
- ruderalis** auf Schutt wachsend (rudus, -ëris).
- rudimentär** = nur erste, rohe Anfänge zeigend.
- rudimentum** „Rudiment“, erster (roher) Anfang (s. sogl.).
- rudis**, -e roh.
- rufescens** rötlich werdend, ins Rote spielend.
- rufidulus** lichtrot, hell- od. hochrot.
- rufinervis** rotnervig, -aderig.
- rufulus** (dem. rufus) fuchs- od. hellrot.
- rugä** Runzel, **-gatus**, **-gosus** gerunzelt, runzelig.
- Rugia** Insel Rügen.
- rugula** Runzelchen, **-gulosus** etwas runzelig.
- rumelicus** rumelisch, aus Rumelien (Türkei).
- runcina** Hobel, Schrotsäge, **-natus** schrotsägenförmig.
- rupestris** auf Felsen wachsend.
- rupicolus**, -a auf Felsen wohnend (rupes, -is).
- ruralis** ländlich, bäuerisch, im Feld wachsend (rus, -ris).
- rusticanus**, **-icus** ländlich, bäuerisch.
- rutaceus** rautenartig, -blättrig (Ruta, s. Nom.).
- rutaefolius** (bess. -tifolius) rautenblättrig.
- ruthenicus** ruthenisch, aus Rotrussland.
- rutulus** rötlich, rotgelb.
- sabandus** savoyer, aus Savoyen.
- sabulosus** sandig, **sabulum** Sand.
- saccatus** (v. saccus) sackförmig.
- saccharinus** Zucker betr., **saccharum** Zucker.
- saccharosis** „Saccharose“, Rohrzucker.
- saccifer**, **-ëra** sacktragend (nicht etwa zuckertragend, was saccharifer!)¹⁾
- saepiarius** an Zäunen wachsend (saepes, -is Zaun).
- sagittalis**, **-arius**, **-atus** pfeilartig, -förmig.
- sagittifolius** pfeilblättrig (sagitta).
- salicetum** (collect. v. salix, -icis) Weidengehölze.
- salicifolius** weidenblättrig (s. eb.).
- salicinus** Weiden betr., unter solchen wachsend (s. v.).
- salignus** wie Weiden aussehend, auch von Weidenholz.
- salinus** salzig, an od. bei Salinen wachsend.
- salisburgensis** Salzburger.
- salsus** salzig, scharf, beissend.
- salutaris** heilkräftig (salus, -ütis Heil etc.).
- samara** Flügelfrucht.
- sambucinus** hollunderartig riechend, -ähnlich (Sambucus, s. Nom.).
- sanguinalis**, **-nëus** blutrot (sanguis, -inis).
- sanies**, -ei Jauche, **-niosus** jauchig, fließend.
- sapidus** schmackhaft.
- sapinëus** tannenartig (z. B. so riechend).
- saponaceus** seifig, seifenartig (sapo, -önis).
- saracenicus** aus d. Lande der Saracenen (Morgenland).
- sarcocarpium** Fruchtfleisch, -hülle (σάρξ, -zos Fleisch, καρπός Frucht).
- sarcoïdes** fleischähnlich, -rot (s. eb., εἶδομαι gleiche).
- sardëus** (σάρδωος) sardinisch, von d. Insel Sardinien.
- Sarmatia** Land der Sarmaten (j. Polen u. Russland).
- Sarmentacëae** Rchb. Zaukenlilien (sogl.).
- sarmentosus** rankentreibend, **sarmentum** Schössling, Ranke.
- sarnicus**, **-niensis** von Guernsey (e. normännische Insel).
- sativus** gesäet, gebaut, als Saat wachsend.
- saturate** (-us) gesättigt (von Farben).
- saxatilis** auf Felsen wachsend (saxus, -i).
- saxifragus** Felsen brechend od. zerbröckelnd (frango zerbreche).
- saxosus** felsig, steinig, voller Steine od. Felsen.
- scabellus** (dem. scaber) rüdig, schäbig.

1) S. z. B. Jürgens, etymol. Fremdwörterbuch, 1878.

scaber, -bra etc. rauh, **-berrimus** sehr rauh anzufühlen.
scabiosus schäbig, grindig (scabies, -ei Schorf etc.).
scabriusculus etwas rauh (anzufühlen).
scalariformis leiterförmig (scalae, -arum Leiter).
scandens kletternd, klimmend (scando steige).
scandicus skandinavisch, schwedisch.
Scania Schonen (Südschweden).
scapifer schaft-, stiel- od. stengeltragend (scapus).
scapiflorus schaftblütig, -blumig.
scapiformis schaftförmig.
scapus Schaft, Stiel, Stengel.
scariosus rasseldürr (fr. scarieux).
scaturiginus Felsquell bewohnend (scaturigo, -inis).
seaurus klumpfüßig.
sceleratus verbrecherisch, giftig (scelero v. scelus, -ëris).
schedula Zettel, Blatt.
Scheibe (discus) == bei Radiaten die innere Partie der Blütenchen.
Scheinfrucht (z. B. Maulbeere) == d. Samen einschliessende Fleischmasse als Fruchtstand (Perigonblätter etc.).
Schistocarpi spaltfrüchtige Laubmoose.
schizocarpium Spaltfrucht ($\sigma\chi\iota\zeta\omega$ spalte etc.).
Schlauchgefäße (z. B. in den Blättern u. Stengeln der Monocotylen).
Schleuderzellen (elatères), z. B. der Mooskapseln.
scholium ($\sigma\chi\omicron\lambda\iota\omicron\nu$) Erläuterung etc.
sciagraphia Schattenriss ($\sigma\chi\acute{\alpha}$), Umriss.
scissus geschlitzt, spaltig, faserig (v. scindo, 3.).
scitamen, -inis Geißel, Peitsche, **-minosus** peitschentreibend.
Scitamineae DC. Bananengewächse.
Schwärmsporen = freiumher schwimmende (z. B. d. Algen).
sciuroides eichhornähnlich, **-schwänzig** (sciurus).
sclerenchyma hartes Parenchym ($\sigma\chi\lambda\eta\rho\acute{o}\varsigma$ hart), z. B. Sclerenchymascheiden bei Carex-Rhizomen.
sclerophyllus hartblättrig.

sclerotium hartfleischige Missbildung (z. B. beim Mutterkorn), Dauermycel des Sclerotium Clavus (Claviceps).
scobiformis sägmehlförmig (scobs, -bis).
scopulus Felsklippe, Bergkuppe.
scorodonius knoblauchartig ($\sigma\sigma\acute{o}\rho\omicron\delta\omicron\nu$).
scorpioides skorpionähnlich, **-schwänzig**.
Scorpionschwanz (cincinnus) gekrümmte Wickel.
scoticus schottisch.
scrobiculatus mit Grübchen vers. (dem. scrobs, -bis Grube).
scrophularius skrofelig, Skrofeln heilend, eig. schweinsartig (scrofa od. -pha, dem. -phula Schwein).
scruposus voll spitzer Steinchen od. Hindernisse, ebenso **-pulosus** skrupulös.
scutatus (v. scutum) schildförmig, wie ein Langschild.
scutellatus (v. scutellum dem. scutum) schildförmig, wie ein Schildchen.
sebacëus talgig, talgartig (sebum Talg, Unschlitt).
sebifer, -ëra Talg führend (s. eb.).
secalinus korn- od. roggensartig (Secale, s. Nom.).
secernierendes Organ (Reinke) == absonderndes (s. sogl.).
secretio Ausscheidung, Absonderung (v. secerno, 3.).
secretum Absonderungsprodukt, z. B. Milch etc.
secundiflorus einseitig blühend (secundus v. sequor folge, nämli. dem Wind, mit dems. mich abwendend 1).
secundus folgender, zweiter, aber auch: einseitwendig, mit dem Wind weggewandt.
securiger, -ëra beilführend (secüris Beil).
Sedinum Stettin, **-nensis** Stettiner.
seges, -ëtis Saat, Saatafeld, **-tum** der Saaten.
segetalis unter Saaten wachsend.

1) Nicht (n. Jürgens) zweitblütig (v. secundus zweiter, eig. folgender)! — vielmehr nach einer Seite gewendet.

segmentum „Segment“, Abschnitt, Teil, Glied.
Segregatae L. Sonderblüt. Compositen (Bl. m. besond. Kelchen).
seguinus schierlingsartig (fr. cigue, lat. cicuta).
Sesusio Susa (Oberital.), **-siensis** von Susa.
Selbstbestäubung u. Fremdbestäub. (durch andre Individuen).
selectus auserlesen, auserwählt.
semecarpicus fahnenfrüchtig ($\sigma\eta\mu\alpha$ Zeichen, Fahne, $\alpha\alpha\theta\iota\delta\varsigma$).
semen, -inis Samen.
semestris sechsmonatlich, ein „Semester“ od. Halbjahr dauernd (v. sex u. mensis Monat).
semiapertus halboffen (semi-, in comp. halb).
semidecandrus halbzehn- d. i. fünf-männig, st. zehn nur fünf Staubgefäße zählend.
semidecurrens halberablaufend.
semiliber, -bera halbfrei.
semiovatus halbberirnd.
semipectinatus halbgekämmt od. -kammförmig.
semipedalis einen halben Schuh messend.
semperflorens immerblühend, **-vi-reus** -grünend.
sempervivus immerlebend.
senescens alternd, greisenhaft.
seni, -nae zu sechs, je sechs.
senilis greisenhaft, den Greis betr. (senex, -nis).
senticosus dornbuschig (v. sentis).
sepalum Kelchblatt, -zipfel.
separatus „separat“, abgesondert, getrennt.
sepiarius (i. q. saepiarius) an Zäunen wachsend (sepes, -is, Pl. -ium).
sepiumentum Umzäunung.
sepium Gen. Pl. v. sepes Zaun.
septentrionalis nordisch (Septentrio Norden od. Nordwind).
septicidus (sc. dehiscencia) wandteilendes Aufspringen (septum Wand u. caedo zerschneide).
septicus ($\sigma\eta\pi\iota\kappa\omicron\varsigma$) fäulnisregernd.
septius auf faulen Stoffen wachsend ($\sigma\eta\pi\iota\kappa\omicron\varsigma$ verfault).
sericanus serisch, aus d. Lande d. Serer (Ostasien).
serialis in Reihen stehend (series).

sericeus seidenartig.
series, -ei „Serie“, Reihe, Kette.
serifluus blut- od. molkenflüssig (serum Blutwasser etc.).
-seris in compos. -Salat ($\sigma\acute{\epsilon}\rho\iota\varsigma$, $-i\delta\theta\omicron\varsigma$).
serotinus spät im Jahr, spätzeitig, -reif.
serpyllaceus quendelartig (Serpylum, s. Nom.).
serraturae Sägezähne, **serratus** gesägt (serra Säge).
serre fr. Gewächshaus.
sertum od. Pl. **-ta** Blumengewinde, Guirlande.
sesquipedalis anderthalb Schuh lang.
sesquiertius dritthalb = $2\frac{1}{2}$.
sessiliflorus sitzblütig, mit sitzenden Blüten.
sessilifolius sitzblättrig, m. sitz. Laubblättern.
sessilis sitzend, d. i. ungestielt.
seta Borste, **-acæus** borstenförmig, **-arius** Borsten enthaltend.
setiger, -era borstenführend (s. eb.).
setosus borstig, m. Borsten besetzt.
seusanus von der Save (Sau) in Ungarn.
sexangularis sechseckig, -kantig.
sexuelle Fortpflanzung = geschlechtliche, d. i. durch Sporen oder Samenverschmelzung der Pollen- u. Eizellen.
sexus Geschlecht.
siccus trocken, dürr.
siculus sicilianisch.
Siebröhren = Gefäße mit siebförmig durchbrochenen Zwischenwänden.
siifolius merkblättrig (Sium, s. Nom.).
Silesia Schlesien, **-siæus** schlesisch.
silex, -icis Kiesel, **-catus** verkieselt, **-catum** „Silikat“, verkieselter Körper.
siliceus kieselartig, -hart.
silicula Schötchen, **-losus** Schötchen tragend.
Siliculosae L. Schötchen-Cruciferen.
siliqua Schote, -quosus Schoten tragend.
Siliquosae L. Schoten-Cruciferen.
siluricus silurisch (v. Silures, brit. Volk im Fürstentum Wales, Grossbritannien).

- silvaticus**, -**vestris** im Wald wachsend.
- simplex**, -**icis** einfach.
- simplicifolius** m. einfachen (unge-
teilten) Blättern.
- simplicissimus** äusserst od. ganz
einfach.
- simultan** = plötzlich, zusammen,
auf einmal, z. B. simultane Zellen-
scheidung, Simultankirche etc.
(simultaneus von simul adv. zu-
gleich).
- sinensis** i. q. chinensis sinesisch
(chinesisch).
- sinicus** i. q. sinensis (s. eb.).
- sinister**, -**stra** linker, linksge-
wandter.
- sinistrorsum** linksherum.
- sinuatus** buchtig, ausgebuchtet,
buchtblättrig (sinus).
- siphonanthus** Röhren- od. Pfeifen-
blume (*σίφων* etc.).
- Siphonocaulae** Bisch. Röhrensteng-
lige (Armleuchter).
- Sirmium** Stadt in Slavonien.
- sitophilus** weizenliebend (*σίτος*).
- situla** Eimer, -**larius** eimerförmig.
- situs**, -**us** Lage, Zustand.
- smegmadermus** schmier- od. seifen-
schalig (*σμηγμα* d. Schmierer,
δέσμα Haut etc.).
- soboles** Stocksprossen.
- sobolifer** (-**erus**, **-era**) sprossentrei-
bend, sprossend.
- sobrius** mässig, trocken (Kummer).
- sociatus** zusammengesellt, gesellig.
- solidus** dicht, „solid“, nicht hohl.
- solisaequus** der Sonne folgend.
- solitarius** einsam, einzelstehend.
- soloniensis**, -**onius** (sc. **ager**) Gebiet
von Solona in Kärnten od. d. d.
Solonische Geb. in Latium.
- solstitialis** sommerlich, zur Zeit
der Sommerwende od. sommerl.
Sonnenwende, eig. des Sonnen-
stillstands (sol u. sisto, -stiti, 3.).
- somnifer**, -**era** schlafbringend, -er-
regend (sominus).
- sonorus** tönend, schallend, rasselnd
(von sonus Ton).
- Soredien** = zu ein. Gruppe verein-
sich lostrennende Gonidien d.
Flechten.
- sorius** sorisch, aus Soria, e. Provinz
v. Altcastilien.
- sororius** schwesterlich, geschwister-
lich.
- sorosis** Scheinbeere, z. B. Ananas,
Maulbeere, Anhäufung (v. *σορός*
Haufen).
- Sortiment** = Sammlung gleicharti-
ger Pflanzen.
- sorus**, -**ri** Sporen- od. Fruchthäuf-
chen d. Farne (s. eb.).
- spadicæus** kolbig (v. *spadix*, -**icis**),
aber auch braunrot, dattelfarbig.
- spadiceo-grisæus** braungrau (Kum-
mer).
- spadix**, -**icis** (*σπάδιξ*, -**ιος**) Palm-
fruchtweig, Blütenkolben, aber
auch dattelfarbig (s. v.).
- sparsiflorus** locker-, zerstreublü-
hend.
- sparsus** zerstreut (v. *spargo*, -**rsi** 3.).
- spartæus** pfriemengrasartig (spar-
tum, *σπάριον*).
- spätha** Blütenscheide (*σπάθη* Spa-
ten, Spatel).
- spathacæus** scheidenförmig.
- spathulatus** spatel- od. spatel-
förmig.
- spathulifolius** spatelblättrig.
- species** Spezies, Art, -**ialis** artlich,
besonderer, „spezieller“.
- specificus** artlich eigen, eigentüm-
lich, „spezifisch“.
- specimen**, -**inis** Muster, Artbeispiel,
Probe.
- speciosus** wohlgestaltet, sehr
schön etc.
- spectabilis** beträchtlich, ansehnlich,
prächtig.
- spectans** dahin zielend, betreffend.
- speculum** Spiegel.
- spelta** Spelt, Spelz.
- spermatium**, Pl. -**tia** Sporen d. Pilze
in s. g. Spermogonien (s. hern.).
- spermatophyta** Samenpflanzen i. q.
Phanerogamæ (*σπέρμα*, -**ατος** S.
u. *φυτόν*).
- spermatozoida** = bewegl. Körper-
chen aus d. Antheridien, welche
die Eizellen der Oogonien be-
fruchten u. die Oosporen hervor-
bringen (z. B. Chara etc.).
- spermogonium** „Spermogon“,
Fruchtform mancher Pilze (*σπέρ-
μα* u. *γόνοσ* Zeugungsorgan).
- spermophorum** (*σπερμόφορον*)
Samenträger, -leiste.
- sphacelatus** bündel- od. fackelartig
(*σφακέλος*).
- sphaericus** kugelförmig, „sphä-
risch“ (v. *σφαίρα* K.).

- sphaeroidëus** ein „Sphäroid“ bildend, kugelförmig.
sphaerocarpus kugelfruchtig.
sphaerocephalus kugelköpfig.
spica Ähre, -**catus** ährig, ährenförmig.
spicilegium Ährenlese (spica u. lëgo).
spicula (dem. spica) Ährchen, -**culosus** mit Ährchen.
spiculum Spiesschen, Pfeilchen.
spina Dorn, -**nosus** dornig, -**nosissimus** äusserst dornig.
spinescens etwas dornig.
spinulosus m. Dörnchen besetzt (spinula dem. v. spina).
Spira Speyer (Rheinpfalz).
spiralia (sc. vasa) Spiralfässer.
spiralis schraubenförmig (spira, gr. *σπείρα* Windung, „Spirale“).
spiranthes schraubenblütig.
spissus dicht gedrängt, langsam, -weilig, zäh (Kummer).
splendens, -**didus** glänzend, ins Auge fallend.
spontanëus freiwillig, von selbst.
sponte nascens frei od. wild wachsend.
spörae Sporen, Keimkörnchen (*σπόρος* Saat v. *σπείρω* säe).
sporangium „Sporangie“, d. i. Sporenbehälter (v. *ἀγγείον*), Keimfrucht d. Kryptogamen.
Sporenknöschen der Armleuchter (Chara, s. Nom.).
sporidium eine Art Spore, sekundäre Spore b. Kryptogamen.
sporocarpium (i. q. sporangium) Keimfrucht.
sporogonium, durch Befrucht. gebild. Embryo in Moosarchegonien (Mooskapseln).
Sporophyta Sporenpflanzen, i. q. Cryptogamae L.
Spreite = breite Blattfläche (lamina).
spretus verachtet, verworfen (v. sperno, spreui, 3.).
spumarius (v. spuma) schaumartig, wie Schaum aussehend.
spumosos schäumend, schwammig (Kummer).
spurius unecht, unehelich, Bastard etc.
squalens, -**lidus** schmutzig, besond. schmutziggelb.
squama Schuppe, Deckblatt d. Cyperaceenblüten.
- squamae** Niederblätter.
squamarius, -**atus**, -**osus** schuppig (s. eb.).
squamulae hypogynae Schüppchen unter d. Stempel.
squamulosus mit Schüppchen besetzt, schuppig.
squarrosus sparrig, steifästig, -**ruulosus** etwas sparrig.
stabularis in Ställen vorkommend (stabulum).
stagnalis, -**ninus** im Sumpf wachsend (stagnum).
stamen, -**inis** Staubgefäss, -blatt, -faden.
staminëus staubfadenartig, an Stelle d. Staubf. z. B. corona staminëa d. Staubf. tragende Krone.
staminodium in ein Blatt verwand. Staubgefäss.
stegocarpus Dach- od. Deckfrucht, Hagebutte (*στέγη* Decke, *καρπός*).
stellaris, -**atus** sternförmig (stella Stern).
Stempelpolster der Doldenblüten.
stenantherus eng- od. schmalbeutlig, mit engen Antheren (*στενός* eng etc.).
stenolobus schmal- od. dünnschotig (*λοβός* Hülse etc.).
stenopetalus dünnkronblättrig.
stenophyllus dünnblättrig, -laubig.
stereoides (-ōdes) (*στερεώδης*) fest, dicht.
sterilis „steril“, unfruchtbar.
stictus (*σικτός* v. *στίζω*) gestichelt, punktiert.
stigma, -**ätis** (*σίγμα* v. *στίζω*) Narbe, Stich etc.
stigmatōdes (*σιγματώδης*) narbenartig, -ähnlich.
stilus (styulus) (*στίλος*) Griffel, Pistill, Säule etc.
stimuli Brennhaare, -borsten.
stipes, -**itis** Stengel, Stamm, Stock, Strunk, Stiel, Stange etc.
stipitarius auf Stengeln stehend od. wohnend.
stipitatus gestielt, gestengelt (s. v.).
stipticus (v. *στιπτός* zusammengedrückt etc.) herb, zusammenziehend.
stipulae eig. Stützchen, Bot. Nebenblätter, Knospenschuppen.
stipularis, -**atus** achsel- od. nebenblättrig (s. eb.).

- Stipulartegmente** (Mikosch) Achsel-
 blattthüllen der Knospen.
- stirps**, -pis Stamm, Baum, Pflanze,
 Staude etc.
- stolo**, -ōnis Ausläufer, Wurzel-
 schössling etc.
- stolonifer**, -ēra Ausläufer treibend.
- stoloniflorus** mit blütentragenden
 Schösslingen.
- stomāta** Spaltöffnungen (*στόμα*,
 -ατος Mund).
- Strahl** (radius) bei d. Compositen
 = äusserer Kreis d. Blütenchen.
- stramineus** strohartig, von Stroh,
 strohgelb.
- strata** Schichten, - annua Jahres-
 ringe (d. Stämme).
- strēpens** rauschend (strēpo).
- stria** Streif, Strieme, -atus gestreift,
 riefig.
- strietus** straff, steif, aufrecht etc.
 (v. stringo ziehe an).
- stridulus** knarrend, klappernd (v.
 stridēo).
- strigiceps** striegelköpfig, -haarig
 (striga Strich, Streif etc.).
- strigilis** Striegel, Rosskamm, Schab-
 eisen (s. eb.).
- strigillarius**, -losus gestrichelt, mit
 Stricheln (v. strigilla dem. striga,
 s. v.).
- strigosus** mager, dürr.
- Strobilacēae** Rchb. Zapfen - Coni-
 feren.
- strobilacēus** (v. strobilus) zapfen-
 artig.
- strobilus** Fruchtzapfen, Tannen-
 zapfen (*στροβίλος* Kreisel etc.).
- stroma** (*στρομα* Lager) fleischiges
 Frucht-Lager der Pilze.
- strophioła** Anhang des Nabelstrangs.
- structura** „Struktur“, Gefüge, Bau
 (v. struo, 3.).
- struma** Drüse, Kropf, -arius dageg.
 angewandt.
- strumosus** drüsig angeschwollen.
- Stützblatt**, oft ungewandelt in ein
 Dorn.
- stupa** (stuppa, gr. *σύπη* od. *σύπ-
 ηη*) Werg.
- stylopodium** Griffelfuss, -polster,
 -postament (s. sogl.).
- stylus** (*στυλος*) od. **stilus** Griffel,
 Pistill od. Stempelsäule od. -faden.
- styraciflūus** storaxausschwitzend,
 Storax fließenlassend.
- suaveolens** wohlriechend.
- suavis**, -iter, adv. angenehm, lieb-
 lich etc.
- sub-** in compos. etwas-, fast- (s.
 sogl.).
- subacaulis** fast stengellos.
- subaequalis** fast od. ziemlich gleich.
- subalatus** etwas geflügelt.
- subalpinus** subalpinisch, an den
 Voralpen, um d. Alpen herum.
- subdecandrus** fast oder gewöhnlich
 zehnmännig.
- subdölus** heimlich, trügerisch (i. q.
 ambigius).
- suberectus** fast aufrecht.
- Suberin** = Korkstoff (s. sogl.).
- suberosus** (v. suber, -ēris Kork)
 korkig, K. hervorbringend.
- subinde** unmittelbar darauf, auch
 wiederholentlich.
- subintēger**, -ēgra fast od. ziemlich
 vollständig, - ganz.
- Sublabiāe** krummlippige Labiaten.
- subliquescens** beinahe zerfliessend.
- submaeulatus** etwas fleckig, etwas
 bunt.
- submarinus** unterseeisch, -meerisch.
- submersus** untergetaucht.
- subnullus** so gut wie keiner.
- subpilosus** etwas behaart.
- subregularis** ziemlich od. fast regel-
 mässig.
- subrotundus** rundlich, fast rund.
- subsessilis** fast sitzend.
- subsolitaris** fast einzeln.
- subsquamosus** vorübergehend
 schuppig.
- substantivum** „Substantiv“, Ding-
 od. Hauptwort.
- Substrat** = Unterlage, Boden od.
 Grund.
- subterraneum** unterirdische Höhle,
 fr. souterrain.
- subterraneus** unterirdisch, unter
 d. Erde befindlich.
- subtilis** eig. feingewebt (v. tela),
 fein, dünn, zart etc.
- subtortus** etwas gewunden.
- subtus** unten, unterseits.
- subūla** Pfrieme, -atus pfriemen-
 förmig.
- suburbanus** nahe bei der Stadt
 wachsend.
- succedanēus** Wachssaft hervor-
 bringend (succus u. edo gebe aus).
- succedanus** (v. succēdo folge nach)
 allmählich, z. B. succedane Zel-
 lenscheide.

- succinctus** umgürtet, gerüstet, auch abgekürzt.
- succinifer**, -era bernsteintragend, -gebend (s. sogl.).
- succinum** Bernstein, Harz (v. succus Saft).
- succisus** unten abgeschnitten (v. succido, 3.).
- Succulentae** Bartl. Saft- od. Fettpfl.
- succulentus** saftig, saftreich, succus Saft.
- sudeticus** auf den Sudeten zu Hause.
- suecicus** schwedisch, in Schweden (Suecia) zu Hause.
- Suessonia** Soissons (Frankr.).
- suffocatus** erstickt.
- suffrutices** Halbsträucher (v. frutex, -icis Strauch).
- suffruticosus** fast oder halb strauchartig.
- sulcatus** gefurcht, **suleus** Furche.
- suleus** in comp. -furchig, -zackig.
- sulfureus** (-phureus) schwefelgelb.
- summus** oberster, höchster.
- superbus** stolz, prächtig.
- Superflua** L. Überflüssige (XIX, 2.) (Rand-u. Scheibenblüth. frucht.).
- superne** obenher, oberhalb, -seits.
- superponiert** (Schwendener) übereinander gestellt (z. B. Quirl).
- superus** oberer.
- supinus** niederliegend, flach ausgebreitet, rückwärts gebogen.
- supradecompositus** vielfach zusammengesetzt, vielfach auseinandergestellt.
- surreatus** gesprosst, sprossig od. zweigig (surreus).
- surreulus** (dem. surreus) Zweiglein, Moosstengel.
- sursum** aufwärts, in d. Höhe.
- susceptus** unternommen.
- susianus** susanisch, von Susa (in Piemont od. in Persien).
- suspectus** verdächtig, beargwohnt, für giftig gehalten.
- suspensus** hängend, aufgehängt.
- sutura** „Sutur“, Verbindungsnaht (z. B. d. Hülsen).
- syconium** Feigenfrucht (v. *σῦζον* Feige).
- syllabus** Zusammenfassung (v. *σὺλλ-λάβω*).
- sylloge** Sammlung (gr. *σὺλλογή*).
- sylvanus**, -vaticus, -vestris (silv.-) im Wald zu Hause.
- syböläe**, -arum Beiträge (*συμβολή* v. *συμβάλλω*).
- symmetricus** „symmetrisch“, gleichmässig, z. B. corolla, zwar unregelm., aber linke u. rechte Hälfte gleich!
- sympagentera** (sc. Pourretia) m. zusammengefügt, Beuteln (v. *συμπήγνυμι* u. *ἐντερον* Blase etc.).
- Symphysogynae** A. Rich. verwachsenweibige (v. *συμφύω*).
- sympodium** wiederholender Spross, d. i. jeder Gabel-Ast wieder Fussstück einer neuen Gabel.
- Synandrae** (A. Braun) m. verwachs. Staubbeutel, i. q. Synanthereae.
- Synanthereae** Rich., s. eb. (*ἀνθήρα* Staubbeutel).
- synanthia** Blütenverwachsung (*σύν* u. *ἀνθή*) bei zusammengewachs. Blumen.
- syncarpia** (-ium) Früchteverwachsung, z. B. Brombeere (*σύν* u. *καρπός*).
- synergidae** „Synergiden“ (Strasburger) d. s. Ei-Gehülfinnen bei Embryozellenbildung.
- Syngenesia** L. (XIX. Kl.) Verwachsbeutlige, Kl. d. „Syngenesisten“.
- synonymus** (*συνώνυμος*) „synonym“, d. i. mitnamig, gleichbedeutend.
- synophthia** Knospenverwachsung (*ὄφθαλμός* Auge etc.).
- synopticus** dabei erblickt (*σύνοπτος* Begleiter).
- synopsis** „Synopsis“, d. i. Überblick (*σύνοψις*).
- synopticus** „synoptisch“, übersichtlich.
- Sympetäläe** Rehb. Ganzblumige, m. verwachs. Blumenblättern od. ganzer (verwachs.) Blumenkrone.
- syntagma** (Pfeffer) Zusammenhäufung, s. tagma.
- syphiliticus** „syphilitisch“, gegen d. venerische Krankh. od. Lustseuche angew.
- syriacus** (-ricus) syrisch, aus Syrien.
- System** (systema, -ätis, gr. *σύστημα*, -ατος) wissenschaftl. Zusammenstellung.
- tabernaemontanus** von Bergzabern (Rheinpfalz).
- tabulae** Tafeln, Figurentafeln.

- taediger**, -ëra fackeltragend (taeda Kienholz etc.).
- tagma** (Pfeffer) (gr. *τάγμα* v. *τάσσω*) geordneter Haufen etc.
- tangential**, als Kreis berührende Gerade.
- tanguticus** tungusisch (nördl. Innerasien).
- Tannin** = Gerbstoff, -säure.
- tardiflorus** spätblühend (tarde langsam, spät).
- tartareus** den Tartarus (die Unterwelt) betr., auch Weinstein betr. (cremor tartari).
- tartaricus** (tataricus) tartarisch, aus der Tartarei.
- Tasmania** „Tasmanien“, Van-Diemensland.
- tauricus** taurisch, vom Gebirg Taurus in Kleinasien od. aus Taurien (Tauris, Halbinsel Krim).
- tectorum** der Dächer (tectum Dach).
- tegens**, -ntis deckend, schützend (v. *tēgo*, 3.).
- tegmen**, -inis Samenhaut (s. eb.).
- tegumentum** Knospendecke (s. v.).
- tegumen**, -inis Decke, Hülle (s. v.).
- tēla** (e. g. cellulosa) Gewebe, z. B. Zellgewebe.
- temulentus**, -mulus betäubend.
- tenacissimus** überaus zäh od. hartnäckig (s. sogl.).
- tenax**, -acis zäh, hartnäckig.
- tenellus** (dem. tener, -ëra etc.) äusserst zart.
- tentaculum** „Tentakel“, Tastorgan, Fangarm.
- tentaculatus** mit Tentakeln versehen (s. eb.).
- tentāmen**, -inis Versuch (v. *tento*).
- tenuiflorus**, -folius dünnblütig, -blättrig.
- tennis**, -issimus dünn, äusserst dünn od. schmal.
- tephroleucus** grauweiss (*τεφρός* aschgrau, *λευκός* weiss).
- teratologia** Wunder- od. Erscheinungslehre, Missbildungslehre (*τέρας*, -ατος Zeichen etc.).
- tēres**, -ëtis gedreht, stielrund.
- teretifolius** stielblättrig, drehrund- od. walzenblättrig.
- teretiuseulus** fast stielrund, etwas walzenförmig (s. v.).
- Tergeste** Triest.
- terglioviensis** vom Terglou (in den julischen Alpen).
- terminalis** gipfelständig, endbildend (terminus Ende, Ziel).
- Terminologie** = Kunstsprache (terminus Ausdruck, eig. Begriffsbegrenzung).
- ternatus** gedreit, zu drei beisammen, dreizählig.
- terni**, -nae zu dreien, je drei.
- terrestris** (v. terra) auf der Erde
- terrëus** ebenso (terra). [wachsend]
- tersus** geglättet, glatt (v. *tëro* reibe).
- testa** Schale, äussere Samenhaut.
- testiculatus** mit Testikeln od. Hoden versehen.
- tetanicus** an Halsstarre (*τέτανος* Spannung etc.) leidend, gegen solche angewandt.
- tëter**, -tra hässlich, -**terrëmus** äusserst hässlich.
- tetrachocarpia** Vierlingsfrüchte (*τέτραχα* in vier Teile geteilt).
- tetrades** (i. q. basidia) Sporenstützen (*τετραδες*, -άδος d. Zahl 4).
- Tetradynamia** L. XV. Kl. „Viermächtige (unter 6 Staubfäden 4 grössere).
- teträgonus** viereckig, -kantig (*γῶνος* Eck etc.).
- teträhit** (te trahit dich täuscht?) vierblättrig in die Runde (*τέτρα* vier u. *ἴτις* Umgang etc.).
- teträlix** (*τετραέλιξ*) vierdrätzig, viermal gewunden (*ἑλίξ*, -νος v. *ἐλίσσω* wickle etc.).
- Tetrandria** L. von **tetrandrus** viermännig, mit 4 Staubgefässen (*ἀνήρ*, -ῖδος Mann, Staubgefäss).
- tetragnus** vierweibig, m. 4 Stempeln (*γυνή* Weib etc.).
- tetrapetalus** vierkronblättrig.
- tetraphyllus** vierblättrig, m. 4 Laubblättern.
- tetraptërus** vierflüglig, -federig (*πτερόν*).
- tetraquëter** (-trus), -tra vierkantig.
- tetraspermus** vierksamig.
- tetraspörae** Teilungs-, Vierteilungssporen (bei Florideen).
- texānus** texanisch, aus Texas (Nordamerika).
- textilis** gewebt, -le Textil, Zeug, Tuch etc.
- textura** „Textur“, Gewebe, Gefüge.
- Thalamiflorae** DC. Bodenblütige.
- thalämus** (*θάλαμος*) Blumen- od. Fruchtboden, eig. Gemach.

- thalassicus** meerisch, am Meer wach. (*θάλασσα*).
- thaliānus** nach dem Botaniker Thal benannt.
- thallōma** (Schwendener) Lager- od. Thallusgewebe (s. sogl.).
- Thallophyta** Endl. Lagerpflanzen.
- thallus** (*θάλλος*) Lager (besond. Flechten-), Spross etc.
- thapsiformis** kerzenförmig, wie Wollkraut (*Thapsus*, s. Nom.).
- thēca** (*θήκη*) Behälter, Büchse, Sporenkapsel etc.
- thējogālus** schwefelmilchig (*θήγιον* od. *θειον* Schwefel, *γάλα* Milch).
- Thelypteris** weiblicher Farn (*θήλυς* weibl., *πτερίς*).
- thermalis** in Thermen (d. s. Warmquellen) wachsend.
- thermicus** „thermisch“, Wärme betr. (*θερμός*; heiss).
- thesaurus** (*θησαυρός*) Schatz, Magazin.
- thesis** „These“, Satz, Behauptung.
- thurifer**, -era weihrauchtragend (thus, -ris).
- thuringiacus** Thüringer.
- thus**, -ris Weihrauch (der Bursera- ceen).
- Thyllen-Bildung** (Horvath) = Sack- od. Beutelstoff-Bildg. (*θύλλις* od. *θύλαξ*).
- thymiflorus** thymianblütig.
- thyrsiflorus** strausblütig (*θύσος* „Thyrus“ etc.).
- thyrsoides** straussähnlich, -artig.
- thyrsus**, -i Strauss, unwickelter Stab, „Thyrus“ (*θύσος*).
- thibetānus** (tib.-) aus Thibet (Tibet) (Hochasien).
- tigillaris** latten- od. balkenförmig (tigillum).
- tiglium** (sc. Croton) tiglich (n. einer molukkischen Insel benannt).
- Tigürum** Zürich.
- tinctorius**, -torum zum Färben dienend, der Färber.
- tingens** (v. tingo) färbend, benetzend.
- tingitanus** von Tanager (Tingis) in Marokko (Tingitania), nicht tunesisch (Mössl. u. Rechb.)¹⁾, was tunganus!
- titubans** taumelnd, schwankend (Kummer).
- togularis** bekleidet (Kummer) (dem. tago).
- tomentosus** filzig, **tomentum** Filz.
- tonicus** „tonisch“, d. i. anspannend, stärkend (*τόνος*; Sehne, Kraft).
- tonsurans** „Tonsur“ hervorbringend, schädelkühlend.
- topiarius** zur Kunstgärtnerei gehörend (*τοπιεῖον* od. *τοπήριον* Tau); opus topiarium Plin. beschnittenes Heckenwerk.
- torminalis** Kolik od. Bauchgrimmen betr. (tormīna, -um Schneiden im Leib).
- Tornācus** (-cum) Tournay in Belgien.
- tornatus** gedrechselt (v. torno).
- torpens** träg, matt, starr (v. torpeo, 2.).
- tortilis** gedreht, gewunden (s. sogl.).
- tortuosus** voller Windungen, **tortus** gedreht, gewunden (v. torqueo, 2.).
- torulosus** wulstig (torulus dem. torus Polster etc.).
- tōrus**, -i Polster, Bett, Blütenpolster, Fruchtboden.
- torvus** finster, dunkelbraun.
- toxicarius** giftig (v. *τοξικόν* eig. Pfeilgift).
- trabēs** an Balken vorkommend (trabes, -is).
- trachēae** „Tracheen“, geschloss. od. Luftfasern, -röhren.
- tracheidae** (Möller) tracheenähnl. Holzgefäße.
- trachyodon** Rauhzahn (*τραχύς*, *ὄδων*).
- trachyphyllus** rauhblättrig.
- tractatus** „Traktat“ (fr. traité), Abhandlung.
- tragānus** bocksartig, von Bockseruch (gr. *τάγος* Bock).
- tragōdes** (gr. *τραγοειδής*) bocksartig.
- Trajectum** Utrecht (Holland).
- Transsylvania** Siebenbürgen.
- transversalis**, -sus quer, z. B. transversale Wände cylindrischer Gefäße (Sachs).
- transpiratio** „Transspiration“, Ausdünstung (v. fr. transpirer).
- tremulus** zitternd (v. tremo zittere).
- trevericus** Trierer.
- Trevirorum** (sc. Augusta) Trier.
- triacanthus** dreidornig (*ἀκανθα* Dorn).

1) bei Scorzonera tingitāna!

triangularis, -gulus dreieckig, -kantig (v. tres, comp. tri-).
tribus Zunft, Unterfamilie.
trichōdes (-choides) haarig, -artig, -ähnlich (τριχυδης).
trichophyllus haarblättrig (τριφυλλος) Haar, φύλλον Laub).
trichospermus haarsamig, -früchtig.
trichotōmus mit gestutzten Haaren (τριχέω).
trichrōmus dreifarbig.
Tricoceae Endl. (s. sogl.).
tricoceus dreikörnig (τρικκος; Korn, Kern).
tricolōr dreifarbig.
tricornis dreihörnig (cornu Horn).
tricosus streitsüchtig, hadernnd (v. tricos hadres).
tricuspidatus (-pis) dreispitzig.
tridactylites dreifingerig (τριδακτυλος; Finger).
tridens, -ntis Dreizehn, -zack.
tridentatus dreizähmig.
trifidus dreiteilig, -spaltig.
triflorus dreiblütig, -foliatus, -folius dreiblättrig.
trigūnis dreispelzig.
trigōnus dreieckig, -kantig (τριγωνος; Eck etc.).
trilinguis dreisprachig, in 3 Sprachen ausgedr. [-hülsig].
trilobus (τριλοβος) dreilappig,
trimērus (τριμερης) dreigliedrig, -teilig.
trimestris dreimonatlich.
trimorphismus Dreierbildung (m. läng., mittl. u. kürz. Griffeln).
trinervius dreinervig, -aderig.
tripartitus in drei Teile geteilt.
triphyllus dreiblättrig, mit dreifachen Laubblättern.
triplex, -icis dreifach, -fältig.
triptēris dreiflügelig, -wedelig.
triquēter (-trus), -tra dreieckig, -kantig, -schneidig.
Trispalae Bartl. Dreikelchblättrige.
tristis „trist“, traurig.
trisulcus dreifurchig, -zackig, -spitzig (sulcus eig. Furche).
trivalvis dreilappig (valvae Thürflügel).
trivialis „trivial“, gemein (v. trivium Scheideweg).
tropicus „tropisch“, zwischen den Wendekreisen (Tropen) zu Hause.
truncatus verstümmelt, gestutzt (v. truncus Stumpf etc.).

tuber, -ēris Knolle, -berosus knollig.
tuberculosus voller „Tuberkeln“ (tuberculus dem. v. tuber).
tuberculus „Tuberkel“, Knoten, Höker, Warze (s. eb.).
Tubiflorae Bartl. Röhrenblumige.
tubi pollinis Pollenschläuche.
tubulosus voller Röhrechen, **tubulus** dem. **tubus** Röhre.
Tulipifera L. Tulpenträgerin (-baum).
Tüpfel = feine, schiefe Spalten der Holzgefäße.
tunetānus tunesisch, von Tunis (Tunes, -ētis).
tunica Hemd, Hautschale (bei Zwiebeln).
tunicatus hautschalig, überkleidet (Kummer).
turbīnatus gewirbelt, kreiselförmig (v. turbo, -inis).
turfosus turfig, auf Torf wachsend.
turgescēter Zustand (de Vries) s. turgor (v. turgesco schwelle an).
Turgescenz = Zellenspannung, Anschwellung.
turgidus angeschwollen, gedunsen, strotzend.
turgor der strotzende Inhalt.
Turicum Zürich.
turio, -ōnis Stockknospe, -sprosse, z. B. turiones asparagi Spargelsprossen.
Turōnes Tours (an der Loire).
turrītus getürmt, turmförmig.
Tute (ochrēa) = häut. Scheide üb. den Knöchelgelenken.
typhīnus rohrkolbenartig, -ähnlich (Typha, s. Nom.).
typicus „typisch“, n. einem Bild gemacht, von bestimmt. Schlag (v. τύπος „Typus“, Figur, Bild, Schlag).
uberior, -berrimus reichlicher, sehr reichlich.
ucranicus ukrainisch, aus der Ukraine (Südrussl.).
udus feucht, nass.
uliginosus im Nassen wachsend.
ulmarius ulmenartig, -blättrig.
ulmifolius ulmenblättrig.
umbella Schirm, Dolde, -aris, -atus doldenartig, schirmförmig.
Umbellatae u. **Umbelliferae** Doldenblütige.
Umbelliflorae DC. Schirmblütler.

umbellula Döldchen, Teil einer zusammenges. Dolde.
umbilicalis nabelförmig, umbilicus Nabel.
umbraculifer, -*era* sonnenschirmtragend (s. sogl.).
umbraculum Sonnenschirm (v. umbra Schatten).
umbraticus schattig, schattenliebend.
umbrinus umbrafarbig, -braun (umbra brauner Farbstoff).
umbrosus schattig.
uncinalis, -*atus* hakenförmig gekrümmt.
uncus, -*i* Haken, **uncus**, -*a* hakig.
undulatus wellenförmig, auf- u. abgebogen.
undulosus wellig (v. undula dem. unda Welle).
unguicularis fingernagelartig (unguiculus).
unguis Nagel, Klaue.
unicus einzig, **unicum** d. Einzige seiner Art.
uniflorus, -*folius* einblütig, -blättrig.
uniformis einförmig (forma).
uniglumis einspelzig (gluma).
unijugum (sc. folium) einjochig, -paarig (b. Fiederblättern).
unilabiae (sc. Labiatae) Einlipper (labium).
unilocularis einfächerig (loculus).
unipara (sc. cyma) einseitig gekrümmte Trugdolde, s. g. Wickel.
uniserialis einreihig (series, -*ei*).
universalis gänzlich, allgemein.
upsaliensis von Upsala in Schweden.
uragogus urintreibend (*ουραγός*; Urinleiter).
urbānus städtisch, um Städte herum wachsend.
urbicarius, -*bicus* desgl. (urbs, -*bis*).
urceolaris, -*atus* krug- od. schlauchförmig, mit Schläuchen vers. (urceolus).
urens brennend (v. uro, 3.).
Urneristem (Sachs) s. Meristem.
ursi, -*sinus* Bären- (ursus).
usitatissimus überall gebräuchlich.
usneoides bartflechtenähnlich (Usnea, s. Nom.).
ussuriensis am Ussuri (Nebenfluss des Amur) zu Hause.
ustulatus angebrannt (näml. so aussehend).

utilis nützlich, gebräuchlich (utor, -*ti*, 3.).
utriculatus, -*losus* schlauchartig, bauchig.
utriculus Schlauch, Schlauch- od. Hautfrucht, -*primordialis* „Primordialschlauch, d. i. im Anfang sich bildender.
utriformis schlauch- od. sackförmig (uter, -*tris*).
utrinque v. beiden Seiten, an beiden Enden.
uva crispa Stachel- od. Rauhebeere, eig. krause Weinbeere.
uvarius traubenartig, weintrauben-
uvidus feucht, nass. [(uva).

vaccinus die Kuh betr., kuhfarbig (vacca).
vademecum „Geh' mit mir“, Taschenbuch.
vagina Scheide, -*atus* mit Scheide versehen.
Vaginaltegmente (Mikosch) = Scheidenhüllen.
vaginula (dem. vagīna) Scheidchen am Grund der zerrissenen Moos-Archegonien.
valentinus von Valencia (Spanien) od. v. Valence (Frankr.) (Valentia), auch Valentin's.
valesiacus Walliser, im Canton Wallis z. Hause.
valleculae (dem. valles od. -*lis*) Thälchen od. Rillen zwischen d. Rippen der Doldenfrüchte.
vallicula Thälchen (dem. vallis, s. eb.).
vallis (od. -*es*) Thal, **vallum** Wall, Damm.
valvae Thürflügel, Klappen, -*atus* klappig.
valvativa (sc. vernatio) klappenart. Knospenblattlage.
valvula (dem. valva) Kläppchen,
valvulus i. q. vallicula, s. d.
vaporarius Dampf, Dunst, Wärme betr. (Kummer: Loh-).
variabilis veränderlich.
Variable = wechselnde Wertzahl.
variatio „Variation“, Abänderung, Schwankung od. Variationsbewegung d. Blätter (Pfeffer¹⁾).

1) Dessen „period. Bewegungen d. Blattorgane“, Leipzig 1875.

- variecolor** buntfarbig.
variegatus buntscheckig, -streifig.
variētas „Varietät“, Spielart, Abart, Veränderung.
variōla Pocke, Blatter, -laris blatterartig.
varius mannigfaltig, bunt, verschieden.
varsoviensis Warschauer, v. W. (Varsovia).
vas, -āsis, Pl. -sa Gefäß.
Vasculares DC. Gefäß - Kryptogamen.
vascularis (s. sogl.) mit Gefäßen versehen, **planta v.** Gefäßpflanze.
vasculum (dem. vas) Gefäßchen.
Vegetationsconstante (H. Hoffmann) = Wärmemengenzahl für d. Vegetation.
Vegetationscurve (Askenasy) = d. i. der Beobachtungen üb. die Vegetationspunkte.
Vegetationskegel (-punkte) = Enden od. jüngste Spitzen, von wo weiteres Wachstum ausgeht.
Vegetationsphasen (Askenasy) s. Phasen.
vegetative Fortpflanzung = ungeschlechtliche durch Sprosssteile.
vegētus gesund, munter.
vegliensis von Veglia (e. Insel d. ungar. Litorals).
vehēmens, -menter adv. heftig, stürmisch etc.
velatus verhüllt, bedeckt (vēlum Segel, Vorhang od. vēlo verhülle).
vellēus fehlerh. st. **vellerēus** wollen, wie ein Vliess (vellus, -ēris).
vēlum (fr. voile) Segel, Vorhang, Hautring am Strunk der Pilze.
velutinus sammetartig (fr. velouté v. velours Sammet).
relutipes Sammetfuß, -stiel (s. eb.).
vēna „Vene“, Blutader, Ader.
Venēris (Gen. v. Venus) Göttin der Schönheit etc.
venetīcus venetianisch, v. Venedig (Venetia).
venētus venetisch, Veneter (Volk der Venēti), aber auch: seefarbig, bläulich.
venosus aderig, nervig (v. vena).
ventosus windig, auch veränderlich (ventus Wind).
ventricosus bauchig (v. venter, -tris Bauch).
verecundus sittsam, schamhaft.
- vēris** (Gen. v. vēr) des Frühlings.
vermicularis wurmförmig, wie Würmchen (vermis dem. vermīculus).
vernaeūlus vaterländisch, inländisch, einheimisch (v. verna Inländer etc.).
vernalis im Frühling blühend (vēr, -ris).
vernatio Knospenlage eines (noch nicht entwickelten) Blatts (v. verno mache Frühling).
verniciflūsus Firniß träufelnd (vernix, -icis).
vernix, -icis Firniß.
vernus frühlingszeitig etc. (v. vēr, -ris).
Verodūnum (Verdun Frankr.).
verrūca Warze, -cosus warzig.
versicolor, -ōris schillernd, bunt, verschied. gefärbt.
versiflorus bunt- od. wechselblütig (m. wechselnd. Farben blühend).
versus (Praep.) gegen, (Part.) gewendet, umgekehrt.
verticalis scheidel- od. senkrecht, z. B. Vertikalebene, -zeile etc.
verticillaris, -atus quirl- od. wirtelförmig.
verticillum (-us) Quirl, Wirtel.
vērus wahr, echt.
vescūlus (dem. vescus) niedlich, zart.
vescus essbar (v. vescor, -ci sich nähren).
vesīca Blase, -carius blasenartig, blasig.
vesiculosus blasig (s. eb.).
vesiculosus voller Bläschen.
vespertinus abendlich (vespera „Vesper“, Abend).
vestitus bekleidet (vestio, 4.).
Viadrus (Viadūa) Oderfluss (auch Odēra).
vialis an od. auf Wegen wachsend.
viarius desgl. (via Weg).
vibratilis zitterig (v. vībro „vibriere“, zittere).
viciaefolius wickenblättrig (Vicia, s. Nom.).
victorialis zum Sieg verhelfend.
Vienna Wien u. Vienne (Südfrankr.), -nensis Wiener u. Vienner.
viētus welk.
villicaulis m. zottigem Stengel (villus zottiges Haar).
villosus zottig, haarig (s. eb.).
Vimära Weimar.

viminalis, -nëus zum Flechten dienend (vinen, -inis).
Vindelicia das heutige Schwaben.
Vindellicorum (sc. Augusta) Augsburg.
Vindobona Wien, -nensis Wiener.
vinealis in Wingerten wachsend (vinea Weinberg etc.).
vinifer, -ëra weintragend, -gebend (vïnum W.).
Viniferae Juss. Weinträgerinnen (-palmen).
violacëus veilchenblau, violett.
violascens veilchenbläulich, violett werdend.
virens, -rescens grünend, grün werdend (virëo 2.).
virescentia Vergrünung von Blüten.
virga Rute, Streif, -atus rutenförmig, gestreift.
virginianus, -ïeus virginisch, aus Virginien (Nordamer.).
viridarium Lustgarten (s. sogl.).
viridis grün, **viridiflorus** grünblütig.
virusus giftig (v. virus indecl. Geifer, Giftschleim).
virusanus giftig (s. eb.).
viscarius klebrig, leimartig (viscum Leim).
viscidulus etwas klebrig.
viscosus voller Leim, kiebrig (s. v.).
Vistula (Wisla) Weichsel.
Visurgis Weser.
Viteberga Wittenberg.
vitellarius, -ïnus ei- od. dottergelb (vitellus Eigelb od. -dotter).
viticula (dem. v. vitis) Weinstöcklein; viticulæ vitis Geringel der Weinstockranken.
Vitiensis (sc. Flora) von den Fidchi-Inseln (Australocean).
vitifolius wein- od. rebenblättrig (Vitis, s. Nom.).
visigënus (-ginëus) weinstock- od. rebenartig (γενός adj. verb. v. γένω erzeuge).
vitalis zäh, zum Binden geeignet (v. viëo binde).
vitis Rebe, Weinstock.
vitreus glasartig.
vitta Strieme, Streif, -atus striemig, gestreift.
vittae Striemen (der Doldenfrüchte).
viviparus lebendig gebärend, spross treibend (vïvus u. pärio, 3. gebäre etc.).

Vochinensis von den Vocheiner Alpen (Oberkärnthen).
vogesiäcus von den Vogesen, aus dem Wasgau.
volëmus die hohle Hand ausfüllend.
volgo-uralensis von den Wolga-Uralländern.
volubilis windend (v. volvo, 3. winde etc.).
volüeris Fem. v. volücer geflügelt.
volümen, -ïnis „Volumen“, Umfang, Band.
volva Tasche, Hülle, -acëus hüllenod. scheidartig.
vomicus brechenerregend (v. vomo, 3.).
vomitörïus zum Erbrechen dienend (s. eb.).
Vorblatt z. B. achselständiger Blüten (A. Braun).
Vorkeim (protonëma) = bei Generationswechsel sich bildender (z. B. bei Chara).
Wratislava (Wratislava) Breslau.
vulgaris, -atus „vulgär“, gemein, gewöhnlich (v. vulgo mache gemein od. vulgus Volk).
vulnerans verwundend (vulnëro, 1.).
vulnerarius bei Wunden gebr. (vulnus, -ëris).
vulpinus den Fuchs betr. (vulpes, -is).

Winterknospe = üb. Winter auf d. Wassergrund liegende Samenknospe der Hydrocharideen etc.
Wirtel (Quirl, verticillus), wirtelige Stellung = rings um einen Stamm im Kreise herum.
Wurzelspitze mit Wurzelhaube bei Wasserlinsen.

xanthophyllum Blattgelb, auch Anthonanthin genannt = im Herbst zersetztes Chlorophyll.
xenia „Xenien“, Fremdgaben, Gastgeschenke (gr. ξένιον v. ξένος fremd).
xerampelinus (ξηραμπελίνος) trockenweinlaubfarbig, hochrotgefärbt (ξηρός trocken).
xerophilus das Trockne liebend (s. eb.).
xestripetälus axt- od. beilblättrig, m. axt- od. beilförm. Kronblättern (ξέστορον od. ξύστορον) i. q. dolabripetälus (doläbra).

- xylēma** „Xylem“ = Holz- od. Splintstoff, Holzteil des Cambiums od. Gefässbündels.
- xylīnus** von Holz od. Baumwolle (ξύλον).
- xylogēnum** „Xylogen“ = Verholzungsstoff der Zellen.
- xylophyllus** holzblättrig.
- yuceoides** yukka- od. palmilienähnlich (Yucca, s. Nom.).
- zeylanicus** von d. Insel Ceylon.
- ziziānus** nach dem Botaniker Ziz benannt.
- zonalis** gürtelig, d. Zone betr. (ζώνη Gürtel, „Zone“).
- zonatus** gegürtelt, mit Kreisbogen gezeichnet.
- zoospōrae** „Zoosporen“ = bewegliche od. Schwärmsporen.
- zosteraefolius** seegrasblättrig.
- Zungenblüten** bei Compositen (flores ligulati).
- zygomorphia** (Schwendener) = „Jochbildung“, d. i. links u. rechts in gleichgeneigten Reihen, in übereinstimmendem Anschluss an d. vorhergehenden (s. hern.).
- Zygomorphe** Blüten (Schwendener) = d. Netzwerk der sich kreuzenden Parastichen ist symmetrisch, wie die beiderseit. Fischschuppenreihen (z. B. das Androecium der Ranunculaceen u. Lecythideen) (ζυγός Joch u. μορφή Bildung, Gestalt).
- zygospōrae** zwei durch Conjugation vereinte Sporen (ζυγός Joch, σπορά).
- zymotīcus** „zymotisch“, gärungserregend (ζύμη Sauerteig).

II. Etymologische Nomenklatur (Wortklärung der Pflanzennamen).

A. Lateinnamen.

- Abacosa** Alfid. (Leguminosen, XVII. 4) Heckenwicke, fr. vesce de haie, e. hedge-vetch (v. abäcus Säulendeckplatte — wegen d. Samenform!), z. B. *A. dumetorum* Alfid. (*Vicia* d. L.).
- Abasicarpon** Andr. (zu *Arabis*) Rchb. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Stielschotige“ Gänsekresse (*α* priv., *βάσις* u. *καρπός* — nicht unmittelbar aufsitz. Schote, diese besond. gestielt!), z. B. *A. verna* R. Br., *arenosa* Scop.
- 1) **Abela** Salisb. (Coniferen, XXI. 9) Abel's Zapfenbaum. 2) **Abelia** R. Br. (Caprifoliaceen, V. 1) „Abelie“, z. B. *floribunda* Deesn., *chinensis* R. Br. (u. Clarke Abel, 1816 Reise in China mit Lord Amherst, † 1826).
- Abelmoschus** Grah. (sc. *Hibiscus*) L. (Malvaceen, XVI. 8) Bisam-Eibisch od. -Malve, fr. mauve-musquée od. abelmosc, e. abelmusk, musk-seed (-rose) (v. abélir verschönern, altfr. schmücken, u. moschus Bisam, Wtst.: arab. habbl Samen u. el-mosk Bisam), z. B. *A. tetraphyllos* Grah. (Indien) s. g. „Jute“, Bastfaser-Eibisch.
- Abies** (-ëtis) Tourn. (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) Fichte od. Tanne, fr. pin, sapin, sapinette, e. pine-tree od. fir (Föhre) (altröm. Name derselben abies), z. B. *Pinus Abies* L. = *Abies excelsa* DC. Rich. s. Picëa Mill. Rottanne od. gem. Fichte, fr. sapin-rouge (- de Norvège), e. common spruce m. v. v.; *A. pectinata* DC. Lam. (Pin. Picëa L.) Edel- od. Weissanne (Ab. alba Mill.), fr. sapin blanc od. épicea, e. combe-like-leaved Silver-Fir; *A. alba* Mchx. (*Picea alba* Lk., *A. canadensis* Mill.) Weissfichte Vilm., amerik. Schimmelfichte, fr. sapinette od. pesse blanche, e. white sprucefir; *A. nigra* Desf. Schwarzf. (*A. Mariana* Wagh., *denticulata* Poir. etc.); *A. rubra* Poir. (Pinus r. Lamb., Picëa r. Lk.) Rotfichte, fr. sapinette rouge, e. redsprucefir (rote Sprossen-F.) m. v. *coerulea* Hort., u. a.
- Abietinae** Carr. (-tinëae Rich. DC.): *Tsuga*, *Pseudo-Tsuga*, *Keteleeria*, *Abies*, *Picëa*, *Larix*, *Pseudo-Larix*, *Cedrus*, *Pinus* = echte Tannen.
- Abröma** L., W. (Büttneriaceen R. Br. V. 1) Cacao-Malve, fr. abrome (*α* ohne, *βρώμα* Speise — Gegensatz zu Theobröma Chokolade!), z. B. *A. fastuosum* Jacq. (*Theobroma augusta* L. s. *fastuosa* Jacq.) (Philippinen).
- Abronia** Juss., Lam. (Nyctagineen, V. 1) „Zarthülle“, californ. Primel Dietr. (v. *ἀβρόος* zart, elegant etc.), z. B. *A. fragrans* Nutt., *umbellata* Lam. (*Tricrätus admirabilis* l'Hér.).
- Abrotänum** (sc. *Artemisia*) L. (Compositen Anthemideen, XIX. 2) Eberreis, Stabwurz, Gartheil O. W., fr. aurone od. abrotone, citronade

- (-nelle) „Citronenkraut“, e. southern-wood (gr. ἄβροόταρον „Eber-
raute“, v. ἄβροδός zart, niedrig — bez. d. Blätt., Wtst.).
- Abrus L.** (Leguminos. od. Papilionaceen, XVII. 4) Kranzerbse, Pater-
nosterstrauch, fr. conduri, liane bon Dieu, pois-de-badeau, pois
rouges d'Amérique, e. bead's-tree (v. ἄβροδός zart etc.), z. B. A. pre-
catorius L. (Glycine Abrus autt.).
- Absinthium** (sc. Artemisia) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Wermut,
fr. absinthe, e. worm-wood (gr. ἀψίνθιον v. ἀ priv. u. ψίνθος
Vergnügen — bitter. Geschmack, Wtst., nach d. Fluss Absus in Palä-
stina, Plin.), syn. Absinthium vulgare Fl. Wett.
- Abutilon** Adans. (sc. Sida) L. (Malvaceen, XVI. 8) Schmuck- od. Schön-
malve Rmpl., Sammetpappel, (-malve), fr. abutilon alt. Name für
Malve, v. ἄ nicht, βροδός Rind u. τίλος Durchfall-?), z. B. Zier. A.
megapotamicum A. St. Hil., A. hybridum Lemoini (Winterzier.), viti-
folium Presl. (Chili), vexillarium E. Morr. m. v. marmoratum; insigne
Planch. u. a.
- 1) **Acacia** Neck. (zu Mimosa) Rchb. (Mimoseen, XXIII. 1) Akazie (wahre),
fr. cassie, acacia des Jardiniers (gr. ἀκακία v. ἀκή Dorn, i. q. ἀκανθα
Dornbaum), z. B. (Stuben) A. grandis, Farnesiana, lophantha, m.
Blattphyllodien: armata R. Br., cordifolia Sw., etc. 2) **Acacia** germa-
nica G. Fr. (Amygdalaceen, XII. 1) Schlehdorn = Prunus spinosa L.
- 1) **Acalypha** L. (Euphorbiaceen, XXI. 4) Brennkraut (ἄ pr., καλός schön,
ἀφή Berührung), z. B. A. indica L. (Mercurialis zeylanica Herm.),
(Gärten) A. Wilkesiana Seem. (tricolor Hort.). 2) **Acalypha** Mappa
W. (Ricinus M.-L., Folium Mappae Rumph.) Tischtuch-Ricinus, fr.
ricinelle (Molukken). — Acalyphaceae Kltz. Grck. (-phēae zu Ruta-
ceae Rchb.).
- Acantholimon** Boiss. (Plumbagineen, V. 6) Dornnelkengras (ἀκανθα u.
λεϊμών Wiese), z. B. Zier. A. venustum Boiss. (Statice v. Fenzl),
glumaceum s. Armeriopsis u. Staticopsis.
- Acanthus** T. (Acanthaceen od. Rhinanthac. XIV. 2) Stachel-Bärenklau,
Bartsch, wälsche Bärenklau, G. Fr., fr. acanthe, branche, branc-ur-
sine, pied-d'ours, e. brook-ursine (gr. ἀκανθος Dorn), z. B. Zier.
A. mollis L., e. soft bear's-breech, grandifolius Hort., fr. grande
berce, etc. — Acanthaceae R. Br.
- Acer** (-cris) L. (Aceraceen od. Sapindaceen, XXIII. 1) Ahorn, fr. érable,
e. maple-tree (v. d. celt. ac Spitze? od. lat. acer, -cris stark? od. ἄ int.
u. ζέρας Horn, wesh. Neutrum! — ungewiss), z. B. A. campestre L.
Masholder, fr. érable, e. water-elder, whitten-tree, Zier. A. poly-
morphum Zucc., e. japanese Maple, m. v. dissectum, v. roseo-mar-
ginatum Hort.; A. platanoides L. Spitzahorn, s. g. Lönne (Lenne),
fr. main découpée, m. v. v. dissectum, laciniatum s. crispum; A.
monspessulanum L. Ahorn v. Montpellier, etc. — Acēra Juss. Endl.,
-raceae Grck., -rinēae DC. Ahornbäume (Ord. Malpighinae Bartl.).
- Acēras** R. Br. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) „Ohnhorn“, Ohnsporn-
Orche (ἄ pr. u. ζέρας Horn), z. B. A. anthropophōra R. Br.
- 1) **Acetosa** u. **Acetosella** (sc. Rumex) L. (Polygonaceen, VI. 3) Sauer- u.
Spitzampfer, fr. oseille des jardins (ordinaire), e. sorrel, und fr. réne-
bré, e. spear-sorrel (v. acetum Essig). 2) **Acetosella** (sc. Oxälis) L.
(Oxalideen, X. 4) Sauerklee, fr. pain-du-coucou, alléluia, e. wood-
sorrel. 3) **Acetosa** (sect. Rumex) Rchb. zweihäus. Ampfer XXI. 6),
z. B. R. Acetosella L., scutosa L. (Schildampfer) etc.
- Achania** Sw. (Malvaceen, XVI. 8) Tuten- od. Dütenmalve (v. ἀχάνεια
weite Oeffnung, Wtst. v. ἀχανής nicht gähnend — Blüten zusamen-
gedreht!), z. B. A. mollis Ait. (Malvaviscus m. autt.), A. Malvaviscus
Ait. Sw. (Malvaviscus arborēus Cav.).

- Achillēa** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Schafgarbe, fr. achillé, herbe à la coupure, e. nose-bleed (Plin.: Achilles heilte damit den von ihm verwundeten Telephus; Andere n. Chirons Sohn Achilles, Myth.), z. B. A. Millefolium L. „Tausendblatt“, fr. mille-feuille, e. milfoil.
- Achimēnes** R. Br. Vahl (Gesneriaceen, XIV. 2) Achimenes (Leunis st. Achaemēnis „Achaemenide“ — altpers. Name, Plin.: bernsteinähnl. Kraut Indiens), z. B. (Warmh.) cupreata R. Br. (Hängpfl.), patens Benth., longi- u. grandiflora DC., etc.
- 1) **Achras** L., Wallr. (Styracineen od. Sapotaceen, VI. 1) Sapotillbaum, Breiapfel Dietr., fr. sapotier (gr. ἄζωος Mispel, Wurgbirne), z. B. A. Sapōta L. 2) **Achras** (sc. Pirus) Gärtn. (Pomaceen, XII. 4) Holzod. Feldbirnbaum, fr. poirier commun, e. common pear-tree m. v. v. (z. B. fl. pleno Hort.), syn. Pirus L. (Pyraster Bkh.) communis L.
- Achyranthes** L. (Amarantaceen, V. 1) „Spreublume“, fr. cadelari (v. ἄχρουν Spreu, ἄσθη Bl.), z. B. A. Verschaffelti Lem. (Iresine Herbstii Hook.), capituliflora Coll. (Pfaffia s. Brandesia puberula Mart.), lanata Mill. s. villosa Forsk. (Amarantus ind. Pluk.) syn. Illecōbrum lanatum L.
- Achyrophorus** Gärtn. D. Don (zu Hypochoeris) Rchb. (Compos. Cichoreen, XIX. 1) Hachelkopf, „Spreutträger“ (s. eb. u. φοοός tragend — nämll. d. Fruchtboden), z. B. radicans Scop. (Hypochoeris r. L.), auch s. Seriōla u. Porcellites Cass.
- Acianthus** R. Br. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Spitzenblume“, Borstenpunkt (ἀκίς, -ίδος Spitze — d. äuss. Blütenblättch. begrannt!) s. Epipactis Poir.
- Acinēta** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Steiflippe“ (ἀκίνητος unbeweglich etc.), z. B. Barkeri Paxt., chrysantha Ldl. (Amer.) etc.
- Acinōs** Mnch. (Labiaten, XIV. 1) Basilien-Thymian, e. wild basil (gr. ἄκινος i. q. ὠκισμον lat. Ocimum, Basilienkr.), A. thymoides Mnch. = Calamintha Acinos Clairv. (Thymus Ac. L.).
- Aemella** Pers. Rich. (sc. Spilanthes s. Verbesina) L. (Compos. Anthemid. od. Heliantheen, XIX. 3) „Scharfblatt“, s. g. ABC-Pflanze, Kaublatt W. (dim. v. ἀκμή Schärfe — zwergh. Pfl. m. Blätt. v. stechend. Geschmack).
- Aenīda** L. (Chenopodiaceen, XXII. 6) Hanf- od. „Nesselgänsefuß“, s. g. virgin. Hanf, fr. bangué (ἄ pr. u. κνίδη Brennessel — wie Br., sticht aber nicht), Zier. A. cannabina Murr.
- Aeonitum** T. (Ranunculaceen, XIII. 3) Sturm- od. Eisenhut, fr. aconit u. napel, fleur-en-casque, e. monk's-hood, aconite, wolf's-bane (v. ἐν ἀκόνας auf Felsen, ἀκονίτον Theophr.), z. B. Stoerkianum Rchb., fr. chaperon de moine, char de Vénus, etc.
- Acōrus** L. (Acoraceen od. Aroideen, VI. 1) Kalmus (gr. ἄκωρος ungeschmückt, od. v. ἄκος Heilung), A. Calāmus L., fr. acoré, roseau aromatique od. odorant, e. sweet-flag od. -rush, spicewort, Gartenpfl. A. graminēus Ait. var. variegatus Hort.
- Acotylēae** Grck., Acotyledonēae Juss. DC. „Acotylen“ d. i. Samenlappenlose (Kryptogamen L.) (ἄ pr. u. κοτύλη s. κότυλος eig. Höhlung, Knochenpfanne, Becher etc.).
- Acramphibrya** Endl. „Endumsprosser“ Endl. (ἄκρῳ Ende, ἀμφὶ um, βρω sprosse).
- Acranthēae** Endl. „Spitzblüter“ (Gräser) (s. eb. u. ἄσθη Blüte).
- Acroblastae** Rchb. „Spitzkeimer“ (s. v., βλάστη Keim, Trieb).
- Acrobrya** Endl. „Endsprosser“ Endl. (ἄκρον Ende, βρω sprosse).
- Acroclinium** Hook. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Immortelle, fr. immortelle, e. everlasting-flower (v. ἄκρῳ Spitze, κλίω neige — vor d. Aufgehen geneigte Spitze!), z. B. Gärt. A. roseum Hook., s. Gnaphalium T.

- Acrocomia** Mart. (Palmen, XXI. 6) „Gipfelbusch“ (s. eb. u. *ζόμη* lat. coma Haarschopf etc. — Blütenbüschel!), z. B. A. sclerocarpa Mart. „Hartnuss“, etc. s. Cocos L.
- Acrorychia** Forst. (Rutaceen, VIII. 1) „Spitznäglein“ (s. v. u. *ὄρνυξ*, -γοζ Nagel, Klaue — an d. Kronzipfeln!), z. B. A. laevis Forst. (Neucaled.) s. Lawsonia Acrorychia L.
- Acropëra** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) Lippensack (s. v. u. *πίροα* lat. përa Sack, etc.), z. B. Loddigesii Lindl. (Maxillaria galeata Ldl.).
- Acrophyllum** Benth. (Cunoniaceen, X. 1) „Endblatt“ (s. v. u. *φύλλον* Laubblatt) syn. Calycômis Don u. Weimannia Cunn., z. B. A. venosum Benth.
- Acroptëris** Sm. Lk. (Farne, XXIV. 1) „Spitzfarn“ (s. v., *πτερίς* Farn v. *πτερόν* Feder — Früchtchen an d. Spitze der Fiedern!).
- Acrostichum** L. (Farne od. Polypodiaceen, XXIV. 1) Zeilenfarn, „Spitzreihe“ (*ἄκρον* Spitze od. Anfang, *σίγος* Zeile, „Akrostichon“, Vers mit Anfangsbuchstaben — so unterseits d. Wedel!) Zier. A. alcornone L. (Platynerium grande, Neusüdwaes), A. crinitum L. (Antill.) etc. — Acrostichaceae Mett.
- Actaea** L. (Ranunculaceen od. Papaveraceen, XIII. 1) Giftföhre, A. spicata L. s. g. Christophskraut, Schwarz- od. Wolfskraut, fr. actée od. herbe de St. Christophe, e. herb-Christopher od. spiked baneberry (gr. *ἀκταίος* am Ufer, *ἀκταία* eig. Hollunder — Fruchtähnlichkeit!).
- Actinidia** Max. Lindl. (Dilleniaceen, XIII. 1) Strahlennarbe, eig. „Strahlgleiche“ (v. *ἀκτίν*, -ίρος Strahl, *ἰσοῦμαι* gleiche — Narbe strahlig!), z. B. Zier. A. Kolomikta Maxim. (Mandschur. Str.).
- Actinocyclus** Klotzsch (Rhodoraceen, X. 1) „Strahlenkreis“ (s. eb. u. *κύκλος* lat. cyclus Kreis etc. — bez. d. fünfrüs. Narbe!), z. B. A. secundus Kl. (Piröla sec. L.).
- Ada** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Edle“ (v. adal althochdeutsch „edel“ geb. weibl. Name, Fem. v. Ado, wie Adela von Adelo!).
- Adamia** Wall. (Saxifragaceen, X. 2) „Adamie“, z. B. (Winterbl.) versicolor Fort. (China) s. Hydrangea (n. d. uralt. landw. Schriftstellern Adami I u. II, Paxton: n. Dr. med. John Adam in Calcutta).
- Adansonia** L. (Malvaceen, XVI. 8) Affenbrodbaum, Riesenbaum Dietr., A. digitata L., fr. pain de singe, calebassier du Sénégal, e. monkey's-bread (n. d. Natf. Mich. Adanson aus Aix, s. d. Aut.).
- 1) **Adëlia** L. (Euphorbiaceen, XXII. 13) „Versteckfrucht“ (*ἀ* pr. u. *δηλόζ* sichtbar — Fruchtteile kaum bemerkbar!), z. B. A. ricinella L., fr. ricinelle „kleiner Wunderbaum“. 2) **Adelia** P. Br. Mchx. (Jasmineen, XXII. 2), z. B. acuminata Mchx. s. Forestiera Poir. (Borya W.).
- Adenandra** W. (Rutaceen Diosmeen, V. 1) „Drüsenanthere“ (v. *ἀδὴν*, -ίρος Drüse, *ἀνήρ*, -δος Mann, Bot. Staubbeutel — Drüse an d. Antherenspitze!), z. B. fragrans R. u. S. (Diosma fr. Bot. M.), umbellata W. (Diosma cistoides Lam., Hartogia uniflora Berg.) m. v. multiflora.
- Adenanthëra** L. (Mimoseen, X. 1) „Drüsenanthere“, Korallenerbse (s. eb. u. *ανθήρα* Staubbeutel — diese mit Drüsen), z. B. A. pavonina L. Korallen- od. Kondorilholz, s. g. Bastard-Pfauenschwanz.
- Adenocalymna** Mart. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Drüsenhülle“, -kelch Rmpl. (s. v. u. *κόλυμα* od. -μυα Hülle i. q. calyx), z. B. Zierkletterstr. A. nitidum Mart. (Brasil.), comosum Mart. etc.
- 1) **Adenocarpus** DC. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) Drüsenhülle, „-frucht“ (s. v. u. *καρπός* Frucht — Hüls. m. Drüsen), z. B. Zier. A. wolgensis Spr. (Calophäca wolgarica Fisch., Cytisus w. L. f., Colutea w. Lam.), foliolosus DC. etc. 2) **Adenocarpus** Don (Compos.) (d. warz. Achenien m. zwei spitzhök. Flügeln!).

- Adenophōra** Fisch. (Campanulaceen, V. 1) Schellenblume, Drüsenglocke Leun., fr. cloche glandulée, e. glandulous bell-flower (s. v. u. *φορός* tragend — näml. a. d. Bas. d. Griffels!), z. B. Zier. liliifolia Ledeb. s. Campanula lil. L.
- Adenostyles** Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Drüsengriffel“, Pestwurz (s. v. u. *στύλος* od. *-ις* Griffel — lange Griffelnarben m. warz. Drüsen!), z. B. alpina Cass. Alpendost Leun. = *Cacalia alpina* L.
- Adiantum** L. (Polypodiaceen od. Farne, XXIV. 1) Krull- od. Haarfarn, s. g. Frauenhaar, fr. adiante, capillaire, e. lady's hair, maiden — (v. *ἀδιαντός* trocken, n. Plinius beim Eintauchen nicht nass werdend!), z. B. Stubenf. A. capillus Venēris L., e. Venus-hair, A. rubellum Moore, pedatum L. canad. Frauenh., e. pedate-maiden-hair, A. peruvianum u. a.
- Adlumia** Raf. (Fumariaceen, XVII. 2) „Zünd-Erdrauch“ (lat. ad u. lumen, fr. allumer anzünden), z. B. Spalier- u. Mauerpfl. A. cirrhosa DC. rankender E., fr. fume-terre grimpante, e. tendrilled Adlumia s. Corydalis fungosa Vent. (Fumaria f. Ait.).
- 1) **Adōnis** L. (Ranunculac. XIII. 7) Teufelsauge, Blutströpfchen, fr. adonide, oeil de faisan „Fasanenauge“, e. pheasant's od. bird's-eye, „Vogelauge“ (n. Adonis, Liebl. d. Venus, aus dess. Blut die Blume entsprang, Myth.), z. B. Topf. A. vernalis L. Berg- od. Frühlings-A., fr. adonide printanière, e. spring-ph.-eye, Gärt. aestivalis L. Sommer-A. s. g. braune Magd, fr. oeil-de-phaisan, e. summer-ph.-eye, Saat autumnalis L. 2) **Adōnis** Rabh. (sc. Mycena) (Pilze, XXIV. 4) schöner Helmpilz Rabh.
- Adoxa** L. (Araliaceen, VIII. 4) Moschus- od. Bisamkraut, A. Moschattellina L. (*αδοξός* unberühmt — unscheinb. Blüten!).
- Aechmea** Rz. Pv. (Bromeliaceen, VI. 1) „Blütenspitz“-Ananas (v. *αἴχμη*) Lanzenspitze — Zipfel d. Blüten!), z. B. A. Veitchii Morr., fulgens R. P., miniata discolor Hort., s. Chevalliera Beer.
- Aecidium** Pers. (Pilze, XXIV. 4) Rostpilz, Becherrost (v. *αἰκίζω* miss-handle? od. Paxton: *αἰκίω* Rad u. *εἶδομαι* gleiche? — unsicher!), z. B. A. berberidis P., Berberizen-Rost (— eine Generation von Uredo s. Puccinia graminis, s. d.).
- 1) **Aegilops** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) Knopper- od. Ziegenbart-Eiche, fr. chêne à grosses cupules (gr. *αἰγίλω* v. *αἶγ-, γος* Ziege, *ἄψ* Aussehn). 2) **Aegilops** L. (Gräser, XXIII. 1) Walch, s. g. wilder Weizen, fr. coquioule, Dünnschwanzgras „Ziegenbart“, s. Rhabdoclōa P. B.
- Aegopodium** L. Umbelliferen, V. 2) „Geisfuss“, Geier, Giersch, fr. pied-de-chèvre, e. goat-wort (s. eb. u. *πόδιον* lat. podium Fusssocke, Fussgestell), z. B. Zier. A. Podagraria L. v. fol. varieg. Hort. s. Seséli Aegopodium Scop.
- Aërides** Sw. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Luft“-Orche, fr. fleur de Pair (v. *ἀἴρ-, ἔρος* Luft — treibt Luftwurzeln!), z. B. macrostachya Spr. (Epidendron m. Thou., Beclaria m. A. Rich.). — Ähnlich Aëranthus Lindl. u. Aërobium Spr. = Angraecum Thouars.
- Aeschynanthus** Jack (Bignoniac. od. Cyrtandraceen, XIV. 2) Scham- od. Sinnblume, fr. sensitive, e. shame-flower (v. *αἰσχύνωμαι* schäme mich od. Wtst. *αἰσχύρω* verunstalte u. *ἄριστος* — sonderb. Blütenform!), z. B. grandiflorus Spr. (Incarvillea gr. Spr., Bignonia gr. Thb.), Hängpfl. Boschianus Jack.
- Aescūlus** L. (Sapindaceen od. Hippocastaneen, VII. 1) Rosskastanie, Sperwe O. W., fr. maron d'Inde, e. horse-chest-nut (v. esca Speise — wie lucus a non lucendo), z. B. A. Hippocastanum L., fr. la hippocastane, e. (s. eb.); Zier. A. rubicunda Lois. (carnēa Lindl., rosca Hort.) = Aesc. Hippoc. var. rubicunda Schub.; A. Pavia L. s.

- Pavia Boerh., *A. macrocarpa* Hort. m. v. v. coccinea u. marginata Hort.; *A. macrostachya* Mchx., *A. glabra* W., *A. pallida* W., *A. flava* DC. (*Pavia lutea* Poir.), *A. humilis* Lodd. Zwerg-K., fr. chincapin (Amer.) u. a.
- Aethalium** Lk. (Schimmelpilze XXIV. 4) Russpilz od. Russling, Salbenschwamm, s. g. Lohblüte (v. *αἰθαλίον* hitzig, od. *αἰθαλοῦ* od. *-λή* Russ!), *A. flavum* s. *septicum*, fr. fleur de tan, e. tan-flower, = *Fuligo* Hall.
- Aethionema** R. Br. (Siliculosen, XV. 1) „Dürrfaden“, Steinkresse, fr. aethionème (*αἶθος*, -εο: Hitze etc., *ρήμα* Faden — Staubfäd. wie versengt!), z. B. *saxatile* R. Br. (*Thlaspi sax.* L.), Zier. *cordifolium* DC., fr. aeth. à feuilles de Coris.
- Aethiopsis** Barr. (sc. *Salvia* L. (Labiaten, II. 1) äthiopische od. syrische Salbei (gr. *Αἰθιοπίς*: Äthiopierin), z. B. *A. laciniata* Barr. = *Horminum syriacum* Moris.
- Aethusa** L. (Umbelliferen, V. 2) Gleisse, Hundspetersilje, Gartenschierling, fr. persil des fous, petite ciguë, e. dog's-parsley, *A. Cynapium* L. (v. *αἶθω* brenne etc. Part. Fem.).
- Agallocha** (sc. *Excoecaria* L. (Euphorbiac. XXII. 3) Blendebaum (*Arbor excoecans* Rumph.), Paradies-Aloesholz, fr. calembac (-bouc od. -part) (v. d. arab. aghaludjy geb.) syn. *Agallochum praestantissimum* u. *secundum* Rumph. (*Aquilaria ovata* L.).
- Agalmia** Blum. (Bignoniac. XIV. 2) „Waldschmuckbaum“ (*ἀγαμία* Prachtstück, *ἴλη* Wald), *A. staminea* Bl., s. *Trichospora* u. *Trichospermum* Blum.
- Aganota pulchra** autt. = *Andromeda floribunda* Bot. Mag. (*ἀγανός* lieblich).
- Agapanthus** l'Hér. (Liliaceen VI. 1) „Liebesblume“, Schmucklilie, fr. agapanthe, e. african lily (*αγάπη* Liebe, *ἄνθος* Bl.), z. B. Zier. *A. umbellatus* l'Hér. s. g. blaue Tuberosen, fr. ag. en-ombelle od. bleue, e. umbellate od. blue african lily, s. *Crinum* L. u. *Maulhia* Thb.
- Agaricus** L. (Pilze, XXIV. 4) Blätterschwamm, fr. agaric, e. agarick (mush-room) (gr. *αγαρικόν* Diosc.), z. B. *A. muscarius* L. Fliegenschw., fr. ag.-de-mouche, e. toad-stool, *A. quercinus* L., fr. chênier u. fausse orange, *A. speciosus* L., fr. orange, *A. pratensis* L., fr. macaron des prés, *A. integer* L., fr. roumonet, *A. campestris* L., fr. champignon, u. a. m.
- 1) **Agarista** Don (Ericaceen, X. 1) Torfheide (*Agarista*, gr. Frauennamen, Wst. v. *ἀγά* sehr, *ἄριστος* d. beste) = *Andromeda* L. 2) **Agarista** DC. (Compos. Tageteen, XIX. 2), z. B. *maritima* DC. (Südcaliforn.) = *Leptosyne maritima* Asa Gray.
- Agathaea** (-thēa) Cass. (Compos. Astereen, XIX. 2) Cap-Aster, Schön- od. Himmelsblume (v. *ἀγαθός* herrlich, Wst. v. *ἀγαθός*, -ιδός Knäuel? — Blütenknäuel!), z. B. Topf. *A. amelloides* DC. s. *coelestis* Cass., s. *Cineraria amelloides* L.
- Agathophytum** Moq. (Chenopodiaceen, V. 2) Gutkraut, Gut-Heinrichkr., *A. Bonus Henricus* Moq., fr. bon Henri (s. eb. u. *γυτὸν* Pflanze — analog *Bonus Henricus*) syn. *Chenopodium* B. H. L. u. *Blitum* B. H. C. A. Mey.
- Agathosma** W. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Gutgeruch“, Duftraute (s. v. u. *ὄσμη* Duft etc.), z. B. *A. hirtum* u. *barbatum* Spr., s. *Bucco*, *Hartogia* u. *Macrotylis* Bartl.
- Agave** L. (Amaryllideen od. Bromeliaceen, VI. 1) Baum- od. Wunderaloe (*Ἀγανή* Herrliche od. Erlauchte, Tochter d. Cadmus v. Theben, Myth.), z. B. *A. americana* L. m. v. *marginata* Hort., *Gilbeyii* Hort., filifera, fr. lin d'Amérique, u. a.
- 1) **Ageratum** L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) Leberbalsam, Bastardhanf Dietr., fr. agérate, eupatoire de Dioscoride od. bleue u. Célestine, e. blue maudlin (gr. *ἀγρίρατος* nicht alternd — bekommt keinen w.

- Pappus!), z. B. Zier. A. coelestinum Sims od. coerulcum Desf. var. (Coelestina coerulea Cass.) u. A. mexicanum Vilm. v. coelest. nanum Hort. (Zwergform), fr. Célestine naine, e. dwarfsky-coloured-maudlin.
- 2) **Ageratum** (sc. Achillēa) L. (Comp. Anthemid. XIX. 2) Gewürzgarbe Mössl. Rehb., Balsamgarbe, fr. eupatoire de Mésué.
- Aggregatae** Endl. Rehb. Bartl. Ord. d. Gehäuftblütigen od. Häufelblütler Rehb. (aggregatus zusammengesellt).
- Agnostus** Cunn. (Proteaceen, IV. 1) Fremd-Silberbaum (ἀγνωστός unbekannt), z. B. Gewächsh. sinuatus Cunn. u. integrifolius ds., s. Stenocarpus R. Br.
- Agrāphis** Lk. (Lilaceen, VI. 1) „Unbezeichnete“, Hasenglöckchen Grck., Bastardhyazinthe, fr. hyacinthe bâtarde (Bastard v. Hyacinthus u. Scilla) (ἀγροαφίς, lat. non scriptus unbeschrieb., d. i. ohne Zeichen auf d. Kronbl.), z. B. Zier. A. cernuus Rehb. Hoffm. m. v. v. (Hyacinthus belgicus Hort. s. cernuus L., Scilla non scripta Bot. Mag., Endymion non scr. Grck.), A. nutans Lam. s. coerulēa Hort., s. Hyacinthus non scr. L.
- Agrimonia** T. (Rosaceen, XI. 2) Odermennig, Leberklette, fr. aigremoine, e. agrimony (n. Einigen eig. Argemonia v. ἄργεμα Augenkrankheit, wohl v. ἄργος Acker, μονή Wohnort).
- Agropyrum** G. (zu Triticum L.) (Gramineen, III. 2) „Ackerweizen“, Quecke, fr. chiendent „Hundszahn“ od. panic rampant, e. quitch-grass „Queckengras“ (s. v. u. πυρός Weizen), z. B. A. repens, caninum etc.
- Agrostemma** L. (Sileneen, X. 4) „Ackerkranz“, Kornrade, fr. fausse nielle („Nigelle“) od. nielle des blés, gerzeau u. coquelourde, e. corn-rose, cockle, corn-bottle (s. v. u. στέμμα Kranz, Krone — Nebenkronen um d. Schlund d. Krone!), A. Githago L., Zier. A. Coeli-rosa L., fr. coquel. Rose du ciel, e. rose of heaven „Himmelsröschen“, A. flos Jovis L., fr. coquel. fleur de Jupiter, e. Jove's flower, s. g. Bergrade (Lychnis coronaria alpina Barr.).
- Agrostidēae** Kth. Strauss- od. Windhalmgräser, s. sogl.
- Agrostis** L. (Gramineen, III. 2) Straussgras, fr. agrostide od. éternue (gr. ἄγρωστις), z. B. Zier. A. capillaris Hort. s. nebulosa Boiss., fr. a. capillaire od. nébuleuse, e. common bent-grass, wild A. spica venti L. Windhalm, fr. éternue éventée (Apēra Spica venti P. B.), A. alba L. v. stolonifera E. Mey, s. g. Fioringras, fr. terre-nue, A. canina L. u. vulgaris With. (stolonifera L.).
- Ajacis** (sc. Delphinium) L. (Ranunculac. XIII. 3) Garten-Rittersporn (grosser R.) (d. Kronmittellappen mit dem gr. ΑΙΑ bezeichn., Vergil's Eklogen).
- Aigeiros** Dub. (zu Populus L.) (Salicaceen, XXII. 7) Schwarzpappeln (gr. αἰγειρός Schwarzpappel).
- Ailantus** (nicht -thus) Desf. (Terebinthaceen od. Xanthoxylen, XXIII. 1) Götzen- od. Götterbaum, persischer Sumach, japanischer Firmisbaum (n. d. molukk. ailanto „Himmelsb.“) Zier. A. glandulosa W. (procēra Salisb.), fr. ailanthe du Japon (Vernis -), e. ailanto, s. Rhus sinense Elly s. cacodendron Ehrh., „Unglücksbaum“.
- Aira** W. (Gramineen, III. 2) Schmiele, Schmelengras, fr. erbin, canche, e. bulrush (Wtst. v. αἶρω nehme weg — näml. d. Leben!), z. B. Zier. A. pulchella W. (elegans Gaudin, Avena eleg. M. K.), fr. canche élégante od. délicate, e. nice corn-grass.
- Aitonia** L. f. (Rutac. od. Meliaceen, XVI. 4) „Aitonsstrauch“ (s. d. Aut.) A. capensis Thb. (Zierstr.) = Cotyledon fol. linear. Burm.
- Αἰζοιδēae** Rehb. Spr. (zu Ord. Succulentae Bartl.) s. sogl.
- 1) **Αἰζῶον** L. (sc. Saxifraga) Jacq. (Saxifragaceen, X. 2) „ewiglebender“ od. kleiner Steinbrech (ἀεῖζωο; ewiglebend). 2) **Αἰζῶον** Jacq. (Ficoi-Glaser, Botan. Wörterbuch.

- deen Juss. Aizoideen Spr. XII. 4) Immergrün Dietr., e. ayegreen, z. B. *hispanicum* L. = *Aizonia* Tausch. 3) *Aizōon* (sc. *Sedum*) L. (*Crassulaceen*, X. 5) s. *Aiz. peregrinum* Rchb.
- Ajūga** L. (Labiaten, XIV. 1) Untermäulchen, Günsel, fr. bugle, herbe de St. Laurent, e. bugle (α priv. u. $\zeta\upsilon\gamma\omicron\nu$ lat. *jugum* Joch — näml. Obermaul, welches fehlt! Leunis u. K. König: v. $\acute{\alpha}\gamma\upsilon\iota\omicron\varsigma$ gliederschwach — geg. Gicht!? Wtst. u. K. König: st. abīga v. abīgo treibe ab — ?), z. B. *genevensis* L. (*Bugula montana* Riv.), fr. bugle de Genève, e. Genevian b., reptans L., fr. petite consoude.
- Akebia** Decsn. (Menispermac., XXI. 6) „Akebie“ (n. d. japan. Nam. d. Pfl. akebi), z. B. *Zierschlingpfl.* A. *quinata* Thb. (Japan).
- Alaternus** T. (sc. *Rhamnus*) L. (subg. v. *Rhamnus* Mill.) (*Rhamnaceen*, V. 1) Alaternbaum, immergrüner Wegdorn, fr. nerprun alaterne, A. *latifolius* (*Phylīca elatior* Bauh.) (Südeur.) (v. *alterno* wechse ab — näml. Blattstellung, Wtst.).
- Albersia** Kth. (*Amarantaceen*, XXI. 5) Wegfuchsschwanz Seub., „Albersie“ Grck. (n. J. Chr. Albers, Med.-Rat in Berlin, g. 1795) A. *Blitum* Kth. = *Amarantus Blitum* L. (*Euxölus viridis* Moq.).
- Albüca** L. (-cēa Rchb.) (*Amaryllideen* od. *Liliac.* VI. 1) „Weisslilie“, Stiftblume (v. *albus* weiss), z. B. *nutans* Rchb. (*Ornithogālum* n. L.) Zier. A. *major* Dryand., *cornuta* Desf. u. a.
- 1) **Aleanna** (Alk.-) Rumph. Tausch. (Boragineen, V. 1) „Alkana“ od. Rotwurz, e. *alcanna-root* (arab. N.), A. *tinctoria* L. 2) **Alkana** spinosa G. = *Lawsonia spin.* L. (*Lythrarieen*, VIII. 1). 3) **Ale-** Munt. (*Berberideen*, VI. 1) = *Prinos verticillatus* L. (*Aquifolium* fol. *decidūus* Duham.).
- 1) **Alcēa** (sc. *Malva*) L. (*Malvac.* XVI. 8) spitzblättr. Malve Grck. s. g. Siegmarswurz. 2) **Alcēa** L. (zu *Althaea* Rchb.) Zier. A. *rosēa* L. Stockrose, grosse Gartenmalve, fr. mauve de jardin, *passerose* (rose tremière od. d'outre mer), e. rose-mallow u. hollihock (holy-oak), s. *Althaea sinensis* Cav. (v. $\acute{\alpha}\lambda\chi\eta$) Wehr, Hülfe). 3) **Alcēa** L. (*Malvac.* XVI. 8) Heil-M., z. B. *rosēa* L. u. *ficifolia* L.
- Alchemilla** T. (*Rosaceen*, Dryadeen, IV. 1) Sinau, Frauenmantel, fr. mantelet des dames, alchimille, e. lady's mantle, alchimilla, auch Löwenfuss, fr. *léontopétalon* „Löwenblatt“, Bärenfuss Vilm. (v. d. arabisch. Namen d. Pfl. *alkemelyeh*, nicht v. *Alchemie*!).
- Aldrovanda** Mont. (bess. -dia Grck.) (*Droseraceen*, V. 5) Blasenfaden, A. *vesiculosa* L. (*Lentiscūla palustris indica* Pluk.) (n. Ulyss. *Aldrovandi*, s. d. Aut.) s. *Drosera* L. (*Drosophyllum* Lk.).
- Alectorolōphus** Hall. (*Rhinanthaceen*, XIV. 2) „Hahnenkamm“, s. g. Klapper, fr. *galinette*, e. cock's-comb (-weed) (v. $\acute{\alpha}\lambda\acute{\epsilon}\zeta\tau\omega\omicron$ Hahn, $\lambda\omicron\phi\omicron\varsigma$ Kamm, Schopf), z. B. *major* Rchb. u. *minor* Wimm. Grab., s. *Rhinanthus Crista Galli* L. (var. a u. b).
- Alētris** L. (*Liliaceen* od. *Smilaceen*, VI. 1) Mehlilie, „Müllerin“, Runzelblume D. ($\acute{\alpha}\lambda\epsilon\tau\omicron\iota\varsigma$ v. $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\iota\alpha\omicron$ Mehl — mehliges Überzug!), z. B. Zier. *capensis* L. (*Veltheimia* c. *Réd.* s. *viridifolia* Jacq.), *japonica* (*Funkia lancifolia* Spr.), A. *fragrans* L. (*Dracaena* fr. *Gawl.*), *Rotheana* (*Drac.* R.) (moderne Blattpfl.), A. *Uvaria* L. (*Tritōma* Uv. Ker) u. a.
- Aleurites** Forst. (*Euphorbiac.* XXI. 9) „Mehlbaum“ (v. $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\upsilon\sigma\iota\tau\eta\varsigma$ von Weizenmehl etc. — B. wie mit Mehl bedeckt!), z. B. *laccifera* Gummilackbaum = *Croton laccifera* L. (*Halecus terrestris* Rumph.), A. *mouccana* W. (*Jatropha* mol. Sw.) u. a.
- Algae** Juss. DC. Klasse der Algen, *Algīnae* Bartl. Ord. d. Algen (Wtst. v. *allīgo* fessele, umbinde).
- Algarobia** (-ba) DC. (*Mimoseen*, XXIII. 1) Johannisbrod-Mimose od. Algarobenbaum (v. d. span. *algarrobo* Johannisbrod), z. B. A. *juliflōra* W.

- Alhagi** T. Desv. (sc. Hedysärum) L. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) Mannaklee, persisches od. Juden-Manna, türk. Süssklee, wilder Honig, fr. manne d'Alagi (- en grain, - de Perse) (arab. Name dafür!). — Alhagēae DC.
- Alhenna** Walt. (Lythrarieen, VIII. 1) echte Alkana, „Alhenna“ der Türken = *Lawsonia inermis* L.
- 1) **Alisma** L. (Alismaceen od. Helobien, VI. 4) Froschlöffel, A. Plantāgo L., fr. alisme, plantain d'eau, flûteau, e. frog-spoon, water-plantain, A. natans L. (*Damasonium repens* Vaill.), fr. flûteau d'eau, pain de grenouille (n. d. celt. alis Wasser, Paxton). 2) **Alisma** pratorum Columm. = *Primula veris* L. — Alismacēae Rich. DC. (Ordn. Helobiae Bartl.).
- Alkana** s. Alc.-
- Alkekengi** Feuill. Dill. (sc. Physālis) L. (Solaneen, V. 1) Judenkirsche, Schlutte, fr. coqueret, e. alkekengi od. winter-cherry (arab. i. q. lat. *Halicacābi*, sc. bacca). A. virginiana Feuill. (*Physalis pubescens* L.), A. bonariense repens Dill. (*Physalis viscosa* L.).
- Allamanda** L., W. (Apocynaceen, V. 1) brasilian. Hundswürger (nach d. Prof. Fr. Allamand in Leyden). A. cathartica L. (*Orelia grandiflora* Aubl., *Apocynum scandens* Plum.) = Aloë *Dracaena* Lam.
- Allantodia** R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Wurst“ od. Puddingfarn (v. ἀλλήλας, -ντος; Knoblauchswurst, mit *Allium* — bez. d. Sori!), z. B. A. tenēra, australis etc. R. Br.
- Alliaria** Trag., Ad., R. Br. (sc. Erysimum) L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Knoblauchshederich“, „Lauchkraut“, Rampen M. Rehb., fr. alliaire, herbe aux aulx „Lauchkr.“ (Pl. v. ail, lat. allium), e. hedge-mustard „Heckensenf“, A. officinalis Andrz. (s. sogl. *Allium*).
- Allium** L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Lauch, Zwiebellauch, fr. ail, e. leek, garlic (gr. ἀγλίδιον, lat. allium, n. Paxton v. d. celt. all, d. i. brennend. Geschmacks!), z. B. fistulosum L. Winterzwiebel, A. Cepa Sommerzwiebel, A. sativum L. Knoblauch, fr. ail, e. buck-rams od. ramson (-sen), A. Porrum L. Porré, fr. porreau, e. porret, Zier. A. ursinum L. „Bärenlauch“, fr. ail d'ours, e. bear's-garlick, A. nigrum L., fr. ail noir, e. black-garlick, A. azurēum Ledeb. s. caerulēum Pall., fr. ail azuré, e. bluish-garlick, A. fragrans Vent. „Vanillelauch“, A. Moly L. Goldl. u. a.
- Alloplectus** Mart. DC. (nicht AlopI.-) (Gesneriac., XIV. 2) „Umeinandergeflochtene“, Urnenröhre Rmpl. (v. ἀλλήλων; wechselseitig u. πλεκ-τὸς; geflochten — Staubfäden einander umschlingend!), z. B. Gewächsh. A. Schlimii Pl. u. Lind., speciosus u. capitatus Hook. etc.
- Allosorus** Bernh. (nicht -urus autt.!) (Farne, XXIV. 1) Roll- od. Krullfarn (ἀλλὸς anderer, σάρος Haufen — nämll. Sporenbhälter, diese erst rund, dann linearisch, Wtst.).
- Alnaster** Spach (Betulaceen, XXI. 4) Grünerle, A. viridis Spach (*Alnus* v. Grck.) (deter. *Alnus*).
- Alnus** T. (Betulaceen, XXI. 4) Erle, Eller, fr. aulne, guerne od. vergne, e. alder (-tree) u. aller, z. B. A. glutinosa G. Schwarzerle (*Betula Alnus* L. var. glutinosa L.) m. v. v., z. B. laciniata Ait., auch Else Vilm., A. incana W., Grau- od. Weisserle (*Betula Alnus* L. var. b, incana L.), A. serrulata W., undulata W., cordifolia Lodd. (cordata Tenore) etc.
- Aloë** L. (Liliaceen, VI. 1) Aloë, fr. aloë (-ès), e. aloes (a. d. arab. alloeh, hebr. halal, d. i. glänzend und bitter), z. B. picta DC., ferox DC., variegata L. etc.
- Aloëxylon** Lour. (Cassieen, X. 1) Bitter- od. „Aloëholz“ (s. eb. u. ξύλον Holz), z. B. A. Agallochum Lour.
- Alōna** Lindl. (Solaneen, V. 1) Glocken-Nachtschatten, A. coelestis Ldl. (Anagramm v. *Nolana*, v. nola „Glöckchen“).

- Alonsōa (-zoa)** Rz. Pv. (Scrophularineen, XIV. 2) Halbkrone, Nesselblatt (n. Alonso od. -zo Zanonī, peruan. Bot. schr. in Fl. Peruv.), z. B. Topf A. Warscewiczii Reg. (compacta Hort.) u. incisifolia R. P., s. Hemimēris urticifolia W. (Celsia u., Hemitōmus u. Desf.).
- Alopecūrus** L., W. (Gräser, III. 2) Fuchsschwanzgras, Wiesenfuchsschwanz, fr. queue de renard, e. fox-tail (ἀλώπιγξ, -εξος Fuchs, οὐρά Schwanz), z. B. pratensis L., agrestis L., „Acker“-F., fr. chiendent, queue de rat.
- Aloysia** Ortega (Verbenaceen, II. 1 od. XIV. 2) Citronenstrauch, s. g. „Citronengeruch“, A. s. Lippia citriodōra Pers. (n. d. Königin Marie Louise v. Spanien, † 1819), s. Verbēna triphyllos l'Hér.
- Alpinia** L. (Amomeen, I. 1) Galgant, A. Galanga Sw., fr. cachibou, e. galangal (-lingal) (n. d. Prof. Prosper Alpinus in Padua, s. d. Aut.).
- 1) **Alsinastrum** (sc. Elatine) L. (Elatineen, VIII. 4) quirliger Tännel Grck. (deter. Alsine, Wtst. Alsine u. ἄστροον Stern od. Bild. 2) A. (sc. Anachāris) Babingt. (Elatineen, VIII. 4), s. g. Wasserpest = Elodēa canadensis Mchx.
- 1) **Alsine** Wahlb., L. (Caryophylleen od. Alsinaceen, X. 3) Miere, fr. morgeline, e. alsine od. alcine (v. ἄλσος Hain? — wahrsch. v. ἄλς Salz, Alsine marīna Sm. Salzmiere). 2) **Alsine** (sc. Stellaria) Hoffm. mierenart. Sternkraut, s. Larbrea aquatīca St. Hil. — Alsinēae Rchb. Bartl., -nacēae DC. (zu Ord. Caryophyllīnāe Bartl.).
- Alsodia** P. Th. (-dēa Spr.) (Violaceen Alsidineen, V. 1) „Blattbusch“-Veilchen (ἀλωδής blättrig, buschig), z. B. A. Piparea P. Th. (Piparea dentata Aubl.), sessilis Spr. (Pentalōba s. Lour.), arborēa P. Th. — Alsidinēae (sc. Violaēae) Rchb.
- Alsophila** R. Br. (Baumfarne, XXIV. 1) „Hainfarn“ (ἄλσος Hain, φίλος Freund), z. B. australis Lab., martinicensis Sieber, medullaris R. Br.
- Alstroemēria** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Alstroemer's“-Lilie, fr. Alstroemère, fleur de Incas „Inkasblume“ (n. d. schwed. Baron A. Alstroemer, † 1794), z. B. Zier. A. peregrīna L. Inkaslilie, psittacīna Lehm., plantaginēa Mart. (Anden v. Peru).
- Altagāna** l'Hér. (sc. Robinia) Pall. (Leguminos. Galeegen, XVII. 4) Sand-Robinie, daurischer Erbsenbaum, s. Caragāna Alt. Poir. u. macrophylla Lam. (n. d. Altaī-Gebirge ben.).
- Alternanthēra** Forsk. (Amarantaceen, XXI. 5) „Antherenwechsel“-Fuchsschwanz (v. alterno „alterniere“ od. wechse ab, ἀνθῆρα Staubbeutel — abwechs. fruchtbare u. sterile Antheren!), z. B. Blatt-Zierpfl. A. amoena Hort., spathulata Ch. Lem., amabilis Hort., s. Telanthēra Reg.
- Althaea** L. (Malvaceen, XVI. 8) Eibisch, fr. althée od. gummauve, e. marsh-mallow (v. ἀλθαίω od. ἀλθῆω helfe, heile), z. B. officinalis L., Zier. A. (Alcēa) rosēa Cav. Stockrose, -malve, Rosenpappel, fr. rose-tremière, e. holly-hock, A. sinensis Cav. Zwerg-Stockrose, fr. rose trem. de la Chine, e. dwarf-hollyhock.
- Altingia** Noronha (Coniferen, XXI. 9) „Altingie“ (n. d. deutsch. Bot. Alting, Paxton), z. B. A. excelsa Pers. (Araucaria excelsa Hort.), s. Lignum Papuanum Rumph.
- Alyssum** T. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) Schild- od. Steinkraut, fr. alisson (à pr. u. λύσσα Wut-beschwichtigende Kraft¹⁾, od. viell. bess. v. ἀλύσσων traurig), z. B. Zier. A. saxatile L., s. g. Goldkörbchen, fr. goujon saxatile, corbeille d'or, e. rock-mad-wort.
- Amanita** W. (Pilze, XXIV. 4) Wulstpilz, -scheide, Manschettenpilz Kummer, Fliegenpilz, A. muscaria W. (Agaricus musc. L.), fr. tue-

1) G. Frank's Kräuter-Lex.: Alyssum Berufswant, in Häus. aufgeh. u. Menschen u. Vieh um den Hals geg. Behexung! D. V.

mouche, e. toad-stool „Krötenstuhl“ (Helm. u. Rabh.: nach d. Berg Amanus in Cilicien).

Amarantaceae R. Br., DC., **-anthi** Juss., **-anthēae** (sc. Aizoidēae) Rchb., s. sogl.

Amarantus T. (nicht -thus!) (Amarantaceen, XXI. 5) „Amarant“, Fuchsschwanz, Tausendschön, fr. amarante, fleur de jalousie (- d'amour) u. brède, e. amaranth, flower-amour, life-everlasting (gr. ἀμάραντος: unverwelklich v. ἀ priv. u. μαράνω welke), z. B. Zier. tricolor L. s. g. Papageifeder, e. prince's-feather, caudatus L. Fuchsschwanz, speciosus Sims, sanguineus L., cruentus L., u. a. m.

Amaryllidēae R. Br. (Narcissēae Rchb.) zu Ord. Ensatae Bartl. DC. Narzissenschwertel, s. sogl.

Amaryllis Herb., L. (Amaryllideen, VI. 1) Narzissen- od. Schönlilie, fr. amarylles (altgriech. Frauen-Name, Wtst. schöne Nymphe!), z. B. Zier. (Cap) A. Belladonna L. Belladonna-Lilie Rnpl. m. v. v. (z. B. rosea, spectabilis, bicolor etc.), fr. Bella d'automne, e. Belladonna-lily, formosissima L. schöner Ritterstern od. s. g. Jakobsllilie, fr. am. lis de St. Jacques, reine de beauté, e. very-nice Amaryllis (s. Sprekalia form. Heist.); A. sarniensis L. Jersey-L., fr. lis du Japon, u. a. m.

Amberbōa DC. Lam. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Bisam-“ od. „Moschuschblume“ (zu Centaurēa Rchb.) (v. ambra wohlriech. Seeprodukt u. βοῖ) Gebet, Anruf d. Götter, Wtst. fr. amberboi Bisamblume). A. s. Centaurēa moschata L. (suaveolens W.), s. Cyanastrum Cass. „unechte Cyane“!

Ambrīna Spach (Chenopodiaceen, V. 2) „Ambrakraut“, A. ambrosioides Sp., s. Chenopodium ambros. L. (s. eb.).

Ambrosia L. (Composit. Ambrosiaceen, XIX. 5) Traubenkraut (nicht n. d. Götterspeise Ambrosia. sond. nach St. Ambrosius, Herausg. v. Basilius' Hexameri (libri VI), Paris 1721—30). — Ambrosiaceae Lk. Rchb. Spitzkletten Leun. (nicht Götterbrodgewächse!).

Amelanchier Medic. (zu Pyrus Aronia Rchb.) (Pomaceen, XII. 4) Felsenbirne, od. -mispel, Quantel O. W. (α int. μήλορ Apfel od. Birne, ἄγγω würge — Wurgbirne!), z. B. Zier. A. vulgaris Mnch. (Aronia rotundifolia Pers., Mespilus s. Pyrus Amelanchier L., W.), fr. néffier à feuilles rondes, amélanches, e. common Am.; A. ovalis DC. (Aronia ov. Pers.), A. Botryapium DC. „Traubenbirne“ (Mespilus canadensis).

Amelia Alfld. (Hypopytyaceen Kltzsch., X. 1) „Übersehene“ (ἀμελής; vernachlässigt etc.), z. B. media u. minor Alfld., s. Pyrola media Sw. u. minor L.

1) **Amellus** W. (Compos. Astereen, XIX. 2) Mella-Aster (an d. Ufern d. arkad. Flusses Mella, Paxton), z. B. lychnitis L. (Verbesina asteroides L.), fr. oeil du Christ, e. amellus-star-wort. 2) **Am.** (sc. Aster) L. Virgil's Aster, Berg-, s. Aster acris Leyss. (in Virgil's Georgika, lib. IV, beschrieben). 3) **Am.** (sc. Calca) R. Br. „Schönroute“.

Amentaceae Bartl. Ord. d. Kätzchenträger (v. amentum Kätzchen, vgl. Terminologie).

Amethystēa L., W. (Labiaten od. Solaneen, II. 1) „Amethystblume“, Bläuling D. (ἀμέθυστος bl. Edelstein, Amethyst), z. B. caerulea L. sibir. Bl. Rchb. s. Lycopus amethystinus Steven.

Amherstia Wall. (Legum. Cäsalpiniene, X. 1) „Amherstie“ (z. Ehr. d. Countess Amherst u. der. Tocht. Lady Sarah Amherst), z. B. Warmh. A. nobilis Wall. (Südin.) s. g. Thoca.

Amicia Hb. Bpl. Kth. (Legum. Hedysareen, XVII. 4) „Amicie“ (n. d. ital. Naturf. u. Mikrosk. J. B. Amici, Erf. d. achromat. Mikr. 1812), z. B. Gewächsh. A. Zygomeris DC. (planta pulcherrima Schlechtendal).

Ammadenia Rupr. (Alsineeen, X. 3) „Sand-Sattkraut“ (ἄμμος Sand,

- ἄδος* (Sättigung), z. B. *peploides* Rupr. = *Alsine* (Honckenya) *peploides* Wlhb. u. Ehrh.
- Ammi** T. (Umbelliferen, V. 2) Steifstrahl, e. amney, bishop's-weed, bull-wort (v. *ἄμιμος* Sand), z. B. *majus* L. = *Libanotis* u. *Bunium*.
- Ammobium** R. Br. (Comp. Senecionideen, XIX. 2) Sand-Immortelle (s. v. u. *βιώ* lebe), z. B. *Zier. alatum* R. Br. (Neuholl.), fr. A. *ailé*, e. winged A.
- Ammophila** Host (Gramineen, III. 2) Sandhalm, -rohr, Helmgras O. W. (s. v. u. *φίλος* Freund), z. B. *arenaria* Lk. s. *Psamma* u. *Arundo* ar. L.
- Ammysine** Pursh (Ericaceen, X. 1) „Sandmyrte“ (s. v. u. *μυσίνη*, Myrte), z. B. *buxifolia* Bot. Reg. = *Ledum buxif.* Ait. (*Leiophyllum* b. Ell.).
- Amomēae** Rich. (Ord. Scitamineae Bartl.) Bananen, Gewürze Leun., s. sogl.
- 1) **Amomum** L. (Scitamineen Amomeen, I. 1) Gewürzllilie, Ingwer, fr. amome, e. amomum (arab. hamama, nicht *á* pr. u. *μῶμος* Schande etc.), z. B. A. Zingiber L. gem. Ingwer (Ostind.), A. Malaguetta Paradieskorn-Ingwer (A. granum paradisi L.), fr. *poivron d'Afrique* (Madagask., Guin.) s. g. Cardamome, fr. auch manigette (malaguetta).
- 2) **Am.** (sc. Sison) L. (Umbelliferen, V. 2) Gewürz-Sison, fr. berle aromatique = *Sium* s. *Seséli* Am. Roth u. Scop.
- Amorpha** Duh., L. (Legumin. Galegeen Rchb. XVII. 4) Unformstrauch, „Ungestalt“ Vilm., Bastard-Indigo (*á* priv. u. *μοοφή* Gestalt — näml. d. Blüte nicht als Schmetterl.-Bl. kenntlich!), z. B. *Zierstr. A. fruticosa* L. m. v. *Lewisii* Lodd., *glabra* Desf., *nana* Nutt. (*microphylla* Pursh), *fragrans* Sweet u. a.
- Amorphophallus** Blum. (Araceen, XXI. 1) „Unformpfahl“ (s. v. u. *φαλλός* Pfahl, männl. Glied), z. B. *Warmh. A. campanulatus* Decsn. (*Arum* c. *Roxb.* d. i. *Glocken-Aron*) (Ostind.).
- Ampelidēae** DC., -**dacēae** Hb. Bpl. Kth., Grck. (Ord. Ampelidēae Bartl.) Rebengewächse (v. *ἀμπελίζ*, -*ίδος* Weinstock).
- Ampeloprasum** (sc. *Allium*) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Sommer- od. Rebenlauch, breitblättr. wilder Lauch, All. *Ampelopr. Kit.* = *Allium rotundum* L. (*ἀμπελος* Weinstock, *πράσον* Lauch).
- Ampelopsis** Mchx. (Ampelideen od. Vitaceen, V. 1) Wildrebe, Rebling O. W., Zaun- od. Jungfernrebe, fr. *vigne-vierge*, e. *virgin-wine*, *virginian creeper*, *Zier. A. hederacēa* Mchx. (*quinquefolia* R. Sch. (s. v. u. *ῥυμ* Aussehn), s. *Hedera quinquef. L.* (*Vitis hederacēa* W., *Cissus hed. Pers.*), *A. bipinnata* Mchx. (*Vitis arborēa* W., *Cissus stans Pers.*), *cordata* Mchx. herzblättr. Wildrebe, fr. *vigne-vierge à feuilles en coeur*, u. a.
- Amphibr̄ya** Endl. „Umsprosser“ (*ἀμφί* um, herum, *βρώ* keime, sprosse).
- Amphicarpanthēae** (sc. *Compositae*) Rchb. „Ringsfruchtblütige“ (XIX. 4. L.).
- Amsonia** Walt. (Apocyneen, V. 1) „Amsonie“, fr. *Amsonie* (n. d. Bot. Charl. Amson, Reis. in Amerika), z. B. *A. virginiana* Walt. (*Apocynum* v. Pluk.) = *Tabernaemontana Amsonia* L., *Zier. A. salicifolia* Pursh (*Tabernaemont. elliptica* Thb.), fr. A. à *feuilles de saule*, e. willow-leaved A.
- Amygdalacēae** Rchb., -**lēae** Bartl. (zu Ord. Rosiflorae Bisch.), s. hern.
- Amygdalopsis** Carr. (Amygdalaceen, XII. 1) „Mandelgleiche“ (*Amygdälus* u. *ῥυμ* Aussehn), z. B. *Zier. A. Lindleyi* Carr., s. *Prunus triloba* Lindl.
- Amygdälus** L. (Rosac. Amygdaleen, XII. 1) Mandelbaum, fr. amygdalé od. amandier, e. amond-tree (gr. *ἀμυγδάλη* Mandel v. *ἀμύσσω* zerhöhle — Furchen im Stein, Wst. syrisch ah-mygdala d. i. schöner Baum), z. B. *A. communis* L., *Zier. A. nana* L. (*Prunus inermis*

- Gmel.) m. v. georgica DC. (aus Georgien), communis L. var. fl. pleno Hort., v. pendula Hort. etc., A. sibirica Pall. (Persica vulgaris Mill.), Gartenobst A. Persica L. Pflirsich, fr. pêcheur commun, e. peach-tree, Zier. Persica L. m. v. v., z. B. fl. plen. Hort., camelliaeflora Fort. etc.
- Amyridæe** R. Br., Endl. Salben- od. Myrrhenbäume (zu Terebinthacæe Rehb.), s. sogl.
- Amýris** L. (Terebinthac. Amyrideen, VIII. 1) Myrrhe, Balsambaum (-strauch) fr. amyride, e. myrrh (*á* int. *μύρον* Balsam od. Myrrhensaft), z. B. A. balsamifera L., elemifera L. etc., s. Icica Aubl.
- Anabasæe** Bunge, s. Anabasis L. sogl.
- Anabasis** L. (Chenopodiace., V. 2) Kalistrauch (*ἀναβάσις* d. Aufsteigen, gr. i. q. lat. Equisetum), z. B. A. aphylla L. = Salsöla articulata Cav. s. baccifera Gm. (Kali baccif. Buxb.).
- 1) **Anacampseros** Ehrh. (sc. Portulacæa) L. (Portulacaceen, XI. 1) Liebeskraut (gr. *ἀνακἀμψεως* Liebe zurückbring. Kraut, v. *ἀνακἀμπτω* u. *ἔρωσ*), z. B. A. arachnoides Sims, s. Ruelingia ar. Haw. (Talinum Anac. W.). 2) **Anac.** (sc. Sedum) L. (Corniculat. Sedeen, X. 5) rundblättr. Mauerpfeffer, s. g. Wundkraut, s. Sedum rotundifolium Lam. u. Sedum Aizöon L. (Anacampseros flore flavo Amm.). 3) **Anac.** orientale T. = Crassula crenata Desf. oriental. Liebeskraut.
- Anacamptis** Rich. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) Pyramiden- od. Straussorche, Hundswurz Leun. (v. *ἀνακἀμπτω* biege in d. Höhe — bez. d. Pollenmasse, Wtst.) = Orchis pyramidalis L.
- Anacardium** Roxb. (Terebinthac. Anacardiaceen, XXIII. 2) Herznuss- od. Nierenbaum, fr. anacardier, e. kidney-nut-tree (v. *ἀνά* nach oben, *καρδία* Herz — in d. Höhe gebog. Herz- od. Nierenfrucht!), z. B. A. orientale L. Malaccanuss od. echte Acajou, fr. acajou, pomme sauvage od. noix-de-marais, s. Semecarpus Anacardium L. f.
- Anachãris** Rich. (Hydrocharideen, XXII. 8) s. g. Wasserpest (v. *ἀνά* durch, *χαίρις* Freude od. v. *ἀναχαίρω* freue mich darin — durchwuchert d. Wasser, Wtst. anas Ente u. *χαίρω*?). A. Alsinastrum Bab. auch Wasserthymian, s. Elodã canadensis Rich. (Tropperara pestifera autt.).
- Anacyclus** Pers. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Kreis“- od. „Ringelblume“ (Ringblume Grck.), deutscher Bertram Leun. (v. *ἀνακυκλόω* drehe im Kreis herum, Wtst. st. Ananthocyclus — Blüth. im Umkreis unfruchtbar!), z. B. geb. A. officinarum Hayne, Zier. A. radiatus L. = Anthemis purpurea Hort. etc., s. Santolina u. Anthemis L.
- Anaectochilus** Sm. Lindl. (Anoect.- Blum.) (Orchideen Neottieen, XX. 1) „Offenlippe“, s. Anoectochilus.
- Anagallis** T. (Primulaceen, V. 1) Gauchheil, eig. Kucks- (Kukuks-) Heil Mej., Ackerzier, fr. mouron, miroir du temps „Wetterspiegel“, e. brook-lime (v. *ἀγγάλλω* schmücke, n. Paxton v. *αναγελάω* lache auf — vertreibe d. Melancholie, daher — Gauchheil!), z. B. A. arvensis L. Kolmar O. W., Zier. A. collina Schousb., fr. mouron à grandes fleurs.
- Anagýris** T. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Zirkelhülsenbaum“, Stinkb. (-strauch Lauche), fr. bois-puant u. fève de trèfle, e. stinking bean (-trefoil) (v. *ἀνά* rückwärts, *γῆρος* Ring etc. — Hülsenform!), z. B. A. foetida L. (griech. Inseln), latifolia Brouss. (Bactyrilobium l. Dietr.).
- Anamirta** Colebr. (Menispermaceen, XXII. 6) „An“- od. Scheinmyrte (v. *ἀνά* u. *μύρτος* an, gleichsam Myrte), z. B. A. Cocculus Wight = Menispermum Cocculus L. Kokkelsstrauch.
- Ananassa** Thb. (Bromeliaceen, VI. 1) Ananas (v. d. brasil. Nam. nanas od. anana) = Bromelia Ananas L. (Ananas aculeatus Trew), z. B. A. sativa Lindl. Gartenbeet-A., e. pine-apple (Südünd.).

- Anarrhînum** Desf. (Scrophularineen, XIV. 2) Lochschlund-Löwenmaul, fr. muflet, gueule de lion, e. lions-mouth (v. ἀνά auf, δόν, -νος Nase, Rüssel, u. Paxton á priv. od. Wtst. ἀνευ ohne — einer Schnauze nicht gleichend!), z. B. bellidifolium W. (Linaria odorata Dodart, Dodartia Mill.).
- Anastatica** L. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Auferstehungskraut“ (v. ἀναστατός wiederauflebend — d. eingetrockn. Kraut bei Feuchtigk.), A. hierochuntica L., s. g. Jerichorose, fr. jérose.
- Anchüsa** L. (Boragineen, V. 1) Ochsenzunge, Zier. O. W., fr. langue de boeuf, buglosse u. orcanette, e. bugloss, ox-tongue, orchanet u. bullace (gr. ἄγγουσα od. ἔγγουσα Schminkwurz), z. B. Zier. A. sempervirens L., fr. buglosse toujours verte, e. evergreen-oxentongue, A. italica Retz., geb. A. tinctoria L. rote O., fr. alcannette (alkunet) „Alkannawurzel“ (s. Alcanna!), e. alkanet.
- Andreaea** Ehrh. Spr. (Moose, XXIV. 2) Steinmoos (n. d. Apoth. Andreaë, s. d. Aut.), z. B. alpina Hedw., rupestris ds. etc., s. Lichenastrum Dill. u. Jungermannia rup. L. — Andreaeaceae DC.
- Andrewsia** Spr. (Gentianeen, V. 1) Andrews-Enzian (n. d. Pfl.-Maler Andrews, s. d. Aut.), z. B. verna Spr. u. autumnalis Spr. = Centaurella verna Mchx. u. C. autumnalis Pursh (paniculata Mchx.).
- Andromēda** L. (Ericaceen, X. 1) Torf- od. Rosmarinheide, Gränke O. W., fr. Andromède (n. der von Perseus befreiten Jungfrau Andromeda, Myth.), z. B. polifolia L., fr. A. à feuilles répliées, A. calyculata L. (Chamaedaphne c. Mnch. Buxb.), Zier. A. floribunda Bot. M. (Leucothoë fl. D. Don) u. speciosa Mchx. (Zenobia sp. D. Don).
- Andropōgon** W. (Gramineen, XXIII. 1) „Männerbart“, Bartgras, fr. barbon, e. beard-grass (v. ἀνήρ, -νόος Mann, πάγων Bart), z. B. Zier. A. formosus Hort., argentēus DC. u. a.
- Androsäce** T. (Primulaceen, V. 1) „Mannschild“, fr. androsace u. androselle, e. man's-shield (s. eb. u. σάκος, -εος Schild), z. B. Zier. A. villosa L., fr. A. velue, e. shaggy sea-navel-wort, lactea L., lanuginosa Wall.
- Androsaemum** All., G. (sc. Hypericum) L. (subgen. v. Hyp. Lauche) (Hypericineen, XVIII. 2) „Männerblut“, Bluthheil, Grundheil, fr. toute-saine, e. tutsan (gr. ἀνδρῶσαιμον, s. v. u. αίμα Blut), Zier. A. vulgare G. s. officinale All. s. bacciferum Lam., echtes Konradskraut, offizinelles Mannsblut Vilm.
- Anecochilus** fehlerh. st. Anoectochilus!
- Anemagrostis** Trin. (Gräser, III. 2) „Windhalm“ ἄνεμος; Wind, ἄγρωστι; Feld- od. Ackergras = Agrostis (Apēra P.B.) spica venti L.
- Anemia** (Anemia) Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Nackt-Mondraute, -Rispenfarn (v. ἀνείμων kleiderlos), z. B. Warmh. adiantifolia Sw.
- Anemōne** L. (Ranunculaceen, XIII. 6) Windröschen, fr. u. e. anémone, fr. auch fleur aux dames, passe-fleur („Pascha“- od. Osterbl.), e. wind-flower (v. ἄνεμος Wind), z. B. A. nemorosa L., fr. paquette (Osterbl.) od. sylvie, e. limon, pash-rose (pass-) „Osterbl.“, Zier. nemorosa var. alba u. rubra plena Hort., e. double-grove-wind-flower, A. fulgens Gray, fr. briotte (fleischf. Samnit), pavonina DC. (hortensis Hort.), coronaria L. m. v. v. Blumisten-Anemone Rmpl., A. japonica S. Z. m. v. Honorine Jobert, fr. a. du Japon, e. Japanese-w.-fl. u. a. m.
- Anēthum** L. (Umbelliferen, V. 2) Dill, fr. anet, e. dill (gr. ἀνήθον jon. ἀνησον i. q. ἄρισον Anis, Paxton v. ἄνω adv. hinauf, θέω renne — aufschieß. Wachstum? Wtst. auch αἴθω brenne! — unsicher!).
- Angelica** L. (Umbelliferen, V. 2) „Engelwurz“, Brust-Seub., fr. angélique, e. herb-gerard, ling-wort (long-) (v. ἄγγελος lat. angēlus Engel, davon d. Eigennam. Angelika!).

- Angelōnia** Hb. Bpl. Kth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Angelonie“ (in Caracas, Südamer. angelon), z. B. Gewächsh. A. salicariaefolia Hb. (Caracas), hirta Cham., procumbens Mart. (Schelveria arguta Nees).
- Angianthus** Wendl. (Compos. Leontopodieen Cass., XIX. 2) „Gefäss“- od. Urnenblume (*ἄγγιον* dem. *ἄγγος* Gefäss — jed. Blüth. in besond. Kelch!), z. B. tomentosus W. = Cassinia tom. R. Br.
- Angiospermae (mia)** L. „Hüll“- od. „Decksamige“ (s. eb. u. *σπέρμα* Samen).
- Angophōra** Cav. (Myrtaceen, XII. 4) „Urnenrätgerin“, -myrte (*ἄγγος* s. v., *γορὸς* tragend — verholzter Kelch als Fruchthülle!), z. B. Decorat. A. albicans, florida u. buxifolia, s. Metrosidēros G.
- Angraecum** (-grēcum) P. Thouars (Orchideen Vandeen, XX. 1) Angrek- od. Angrek-O. (v. d. malay. angrek od. angrec), z. B. sesquipedalis P. Th. „Anderthalb“-Schuhsporn, s. g. Bourbonthee od. Faamblätter Leun.
- Anguīna** Mehx. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Schlangengurke (anguis Schl.), A. sinensis Mehx. = Cucumis anguinus L. (Trichosanthes ang. L.).
- Angulōa** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Anguloe“ (n. d. span. Nat. Franz. de Angulo), z. B. superba Hb. Bp., grandiflōra Kth., Clowesii Ldl., Rueckeri u. Hohenlohi Ldl. (Südamer.).
- Anguria** Hb. Bpl. (sc. Cucumis) L. (Cucurbitac., XXI. 2) Arada-Gurke (*ἄγγουρίον* eine Art Melone), z. B. rosca u. umbrosa Hb. Bpl. Stachelgurke (Cuc. echinatus Herm.).
- Anigosanthus** Röd. (**Anoegos.**-, **Anigozanthus**) Lab. (Amaryllideen od. Hämodoraceen, VI. 1) Röhrenschwertel, „Spalthilie“ (v. *ἀνοίγω* öffne, spalte, *ἀνοδος* Wst. v. *ἀνέγω* erhebe — auf hohem Schaft!), z. B. Zier. pulcherrimus Hook. (Neuholl.), coccineus H. P., cruentus Ldl. etc. s. Schwaegrichenia Spr.
- 1) **Anisum** G. (sc. Pimpinella) L. (Umbelliferen, V. 2) „Anis“-Pimpernelle, fr. u. e. anis, e. aniseed (gr. *ἄνισον* i. q. *ἀνήθον* lat. anethum, arab. anysum, Anis u. Dill), s. Anisum vulgare G. 2) **Anisum stellatum** Mat. Med. (Magnolieen od. Illicieen, XIII. 7) Stern-Anis, s. Illicium anisatum L.
- Annona** L. s. Anona Adans.
- Annularia** Sternb. (foss. Equisetaceen, XXIV. 1) „Ring“-Schafthalm (v. annulus Ring).
- Anoetochilus** Blum. (Orchideen Neottieen, XX. 1) „Offenlippe“, s. Anaetoch.- (*ἀνοικτός* geöffnet, *χείλος* Lippe — Form des Labells!).
- Anomathēca** Ker (Irideen, III. 1) „Wunderkapsel“ (*ἀνομόδος* sonderbar, *θήκη* Behälter — d. Kaps. öffnet sich nur an der Spitze), z. B. Stuben A. cruenta Lindl. u. juncēa Ker; s. Anomaza excisa Laws., Gladöulus Andrz., Anigozanthus Lab.
- Anōna** Adans. Kth. Spr. (Anonaceen, XIII. 6) Flaschenbaum, Flaschen-, Rahm-, Schuppenapfel Dietr., fr. assimine (-nier) u. ateira, corrossolier u. sappadille (Paxton von menona, Wst. manoa, seinem Nam. in Banda oriental!), z. B. muricata u. squamata L. (Ind. etc.), s. Porcelia Pers. — Anonacēae Rich. DC., -nēae Rchb., -ōnae Juss. (zu Ord. Trisepälāe Bartl.).
- Anophŷta** DC. Endl. Gefässlose, eig. „Obergewächse“, Übererdige (*ἀνωφύτων* Gewächs über der Erde).
- Anoptērus** Lab. (Ribesiaceen od. Gentianeen, V. 1) „Emporflügel“ (*ἄνω* hinauf, *πίτερον* Flügel — Samenspitze geflügelt!), z. B. glandulosus Lab. (Baum, Neuholl.).
- 1) **Antennaria** R. Br. (zu Gnaphalium Rchb.) (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Fühlerpappus“, Katzenpfötchen, fr. antennaire, pied-de-chat, e. chast-weed (v. antenna Antenne od. Fühlhorn eines Insekts — bez. d. Pappus!), z. B. dioeca R. Br. (Gnaphalium dioecum L.)

- m. v. tomentosa, Zier. margaritacéa R. Br. (Gnaph. marg. L.), fr. ant. perlée, immortelle blanche (- de Virginie), e. pearly-antennaria.
- 2) **Antennaria** Lk. Spr. (Schimmelpilze) „Fühler-Schimmel“.
- Anthadenia** Van Houtte (Personaten Sesameen, XIV. 2) „Blumendrüse“ (*ἀνθος* u. *ἀδύνη*, -έρος Drüse etc. — Blütendecke zehnstrahlig!). A. sesamoides Van Houtte.
- Anthēmis** L. (Comp. Anthemideen) XIX. 2) Kamille Vilm. Hundskamille, Hermel O. W., Gillen (Schilling, 13. Ausg.), fr. camomille (— romaine, — fétide), e. camomil od. mathes (*ἀνθεμίς* v. *ἀνθεμόν* i. q. *ἀνθος*, Wtst. *ἀνθος* u. *ἡμύς* halb — alle Strahlenblüth. s. g. Halbblüten!), z. B. Zier. A. nobilis L. römische K., fr. cam. romaine, s. Ormenis nobilis J. Gay; A. artemisiaefolia W. (Chrysanthēnum indīcum Curt.) s. g. Winteraster, u. a.
- Anthericum** L. (Liliaceen, VI. 1) Zaunblume, -lilie, Graslilie, Spinnenkraut, Silling O. W., nicht Grasnelke Leun. (was Dianthus Caryophyllus L.!), fr. phalangère, herbe à l'arraignée, e. spider-wort (v. *ἀνθεοίξ*, -ίος Halm — Halmart. Schaft! Wtst. v. *ἀνθερόν*; blumenreich (?), vielm. *ἀνθηρόν* blühend!).
- Anthistiria** W. (Anthest.-Spr.) (Gramineen, XXIII. 1) „Steifhalmgras“ (v. *ἀνθίστιριμι* widerstehe od. bess. v. *ἀνθη* u. *στειρός* steif, straff — steife Halme), z. B. A. glauca W., s. Heteropogon Pers. (zu Andropogon) Rchb. — Anthistiriē Anders.
- Anthoceros** E. Bot. (Lebermoose, XXIV. 2) „Blumenhorn“, Nadel- od. Hörnerschorf, Rosetten-Leberm., Fruchthorn (*ἀνθος* u. *κέρος* od. -ας Horn — hornförm. Blüenträger!), z. B. laevis L. u. punctatus Hoffm.
- Antholyza** L. (Irideen, III. 1) Rachenlilie Rchb., Steinblume D. (s. v. u. *λίσσα* Wut — aufgeriss. Rachen!), z. B. Zier. fimbriata Klatt (Babiana f. Bak.).
- 1) **Anthoxanthum** L. (Gräser, II. 2) Ruchgras, eig. „Blütengelb“, fr. flouve (s. v., *ξανθός* gelb — Staubbeutel gelb!), A. odoratum L. gem. R., A. aculeatum L. f. = Cynopsis acul. Ait. stachl. Scheidenähre. 2) A. (sc. Rumex) Murr. i. q. Rumex maritimus L. (acutus Poll.) goldgelber Ampfer Grak.
- 1) **Anthriscus** Pers. (Umbelliferen, V. 2) Kerbel, Klettenkerbel, fr. cerfeuil, e. bastard-parsley „Bastard-Petersilje“ (gr. *ἀνθρισκος* oder -θουσζον), z. B. A. Cerefolium L. Garten-Kerbel, A. vulgaris Pers., fr. céroflé. 2) A. (sc. Torilis) L. (Umbellif. V. 2) Wald-Borstdolde.
- Anthurium** Sm., Schott (Araceen, IV. 1) „Blütenschweif“ Leun., Schwanz- oder Zipfelblume (*ἀνθος* u. *οὐρά* Schwanz — Blumenscheiden mit Schwanzzipfel!), z. B. Warnh. A. Scherzerianum Schott, leuconeurum Lem., rubrinervium Kth. (äquat. Anden).
- Anthyllis** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Wundklee, Wollblume D., Ive O. W. (v. *ἀνθος* u. *ἰούλος* Milchhaar — flaumige Hüllblätter!), A. Vulneraria L.
- Antiäris** Leschen. (Artocarpeen, IV. 2) „Pfeilgift“ od. Antscharbaum, Upasbaum, fr. bohon-upas (*ἀντί* für, gegen, *ἄρις* Pfeilspitze — lief. Gift für d. Pfeilspitzen d. Malayen), A. toxicaria Leschen.
- Antidesma** L., P. Br. (Urticac. od. Stilagineen, V. 1 od. XXII. 5) Strickrindenbaum, Bitterstrauch D., s. g. Giftstiller (-mischer), A. alexiteria L. „Abwehrstrauch“ (*ἀντί* gegen, *δέσμα* od. -μός Fessel, Band — weg. d. Gebrauchs d. Rinde).
- Antirrhinum** T. (Scrophularineen, XIV. 2) Löwenmaul, fr. muflet (-flieger), gueule de lion, mufte de veau, e. lion's-mouth, snap-dragon (v. *ἀντί* gleich od. ähnl., *ῥίον*, -ρος Nase — Blumenform!), z. B. Zier. A. majus L. m. v. v., z. B. Däumling od. Tom Pouce, gross. od. welscher Dorant (Orant) Vilm. — Antirrhinēae DC.

- Apargia** Scop. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Löwenzahn, „Apargie“ (v. ἀπό fern, ἀργία Feier etc.? — ungewiss!), z. B. A. hirta Hoffm. (Colobium h. Roth).
- Aparine** T., Mnch. (sc. Galium) L. (Rubiaceen, IV. 1) Klebkraut, Kletten = Labkr., s. g. Bettlersläuse G. Frank, fr. grippe od. rièble (rèble), grateron, e. cleaver, goose-grass (gr. ἀλαρίνη v. ἀλαίρω ergreife — hängt sich an!).
- Apëra** Ad. (Gräser, III. 2) Windhalm, A. spica venti Ad., fr. épi du vent od. éternue éventée, e. addle-oats? (v. ἀπύρος od. -ής nicht verstümmelt — bez. d. zweiten Blütchenansatzes!).
- Apetälæ** Raj. Juss. Kl. der Kron- od. Blumenblattlosen (ἀ priv., πέταλον lat. petalum Kronblatt).
- Aphæca** Presl (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) Grossehr-Wicke, fr. lisette (v. ἀ pr. u. γάκη Linse — unechte Linse!), A. vulgaris Presl, s. Orëbus Aphæca Döll.
- Aphænes** L. (sc. Alchemilla) Leers (Rosac. Dryadeen, IV. 1) Feld-Sinau Grck., A. arvensis L., fr. brise des Anglais (v. ἀφανής unscheinbar), s. Alchemilla arvensis Scop.
- Aphelandra** R. Br. (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Einzellen-Anthere“ (ἀγε-λής einfach, ἀρήφ. -ιδος Mann, Staubbeutel), z. B. Warmh. u. Stube A. variegata Morel, aurantiaca Nees, Liboniana Hort. Lind. etc., s. Ruellia u. Justicia.
- Aphyllæ** (sc. Cryptogamæ) DC. Blattlose Kryptogamen (ἀ pr. u. φύλλον Laubblatt).
- Apicra** W. (Liliaceen Aloideen, VI. 1) „Ohnbitter“-Aloe (ἀπικρος nicht bitter), z. B. A. viscosa (Aloë v. L.).
- 1) **Apios** Boerh. Pursh (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Birnwurz“-Süßbohne, Erdbirne (-nuss), Knollenwicke D. (v. ἀπιον Birne, — essb. birnf. Wurzelknollen), A. tuberosa Pursh, fr. apios tubéreux, e. tuberous-rooted Apios, s. Glycine Apios L. 2) **Apios** (sc. Euphorbia) L. (Euphorbiac., XI. 3 od. XXI. 1) Birn-Wolfsmilch, fr. appios od. fausse angélique „Erdmaus“-Euphorbia Wolff.¹⁾
- Apium** Hoffm., L. (Umbelliferen, V. 2) „Eppich“ od. Sellerie, fr. célerie od. esprault, e. celery (selery) (v. d. celt. apon Wasser, Paxton, od. ἀπιον Birne, od. st. apiacum „Eppich“ v. apis Biene? — ungewiss!), A. graveolens L., fr. persil des marais „Wassereppich“ Wolff¹⁾, s. Sium Apium Roth, Sesëli graveolens Scop. u. Apium Celeri G.
- Aplüda** L. (Gräser, XXIII. 1) „Spreugras“, Stumpfgr. D. (ἀπλουδα Spreu, Plinius: Gras m. klein. dünn. Halm, v. ἀπλοῖς einfach etc.), z. B. A. mutica L. etc.; A. gigantëa Spr. = Calamüna g. P. B., s. auch Andropögon.
- Apocynæe** Juss. R. Br. DC. Rchb. (zu Contortae Rchb.), -nacëae R. Br., Grck. Hundswürgerartige, fr. apocynées.
- Apocynum** L. (Apocynen, V. 1) Hundswürger, -kohl, -wolle D., fr. apocyn u. cynangue, étrangle-chien, e. dog-bane (gr. ἀπόκυνιον Hundetod v. ἀπό weg, ab u. ζώνω, ζίνος Hund), z. B. androsaemifolium L. Mückenwürger od. Fliegenfalle, fr. a. gobe-mouche, e. tutsan-leaved apocynum.
- Aponogëtum** (-on) Thb. (Piperaceen od. Alismaceen, VII. 3 od. XI. 3) „Wasserkraut“ (v. d. celt. apon Wasser u. γέτω Verbaladj. v. γέτω erzeuge), z. B. Zier. A. monostachyum L. (Saururus natans L. f.), distachyum Thb. etc.
- Aposëris** Neck. (zu Hyosëris Rchb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Drahtstengel (-, Endivie¹⁾), Sengel O. W., Schweinesalat Seub. (ἀπό

1) S. das neue Franz.-deutsche etc. Wörterbuch v. Dr. H. Leng u. Dr. O. L. B. Wolff, Weimar, Paris u. Strassb. 1836 (Neue Aufl. Wolff).

weg, ohne, *σέλις* Salat — keine ord. geniessb. Blätter), z. B. foetida Neck. (Hyosceris f. Rehb., Lapsana f. W.).

Aquatīcae Endl. Kl. d. Wasserkrauter od. -quirle (-sterne).

Aquifoliaceae DC. Rehb. Grek. (zu Sapotaceae Rehb., Ord. Tricoccae Bartl.), s. sogl.

1) **Aquifolium** (sc. Plex) L. (Aquifoliaceen, IV. 4) Stechpalme, -eiche, eig. „Wasserblatt“ (— weg. d. Glanzes!) (aqua u. folium, Wtst. st. acuifolium v. acus Spitze — Stachelblatt!), fr. laurier épineux, houx, épine verte, e. holly-tree. 2) **Aquifolium** foliis deciduis Duham., s. Prinos verticillatus L. (Sapotac., IV. 1) (Str. Virgin.).

Aquilaria Lamb. (Thymeläen od. Aquilarien, X. 1) Adler- od. Aloëholz D., fr. aquilaire, bois de calambac, e. eagle's-wood (v. aquila Adler), z. B. ovata L., malaccensis, fr. calambour grünl. Adlerh.

Aquilegia L. (Ranunculac., XIII. 5) Agley od. Ackelei, eig. „Wasser-sammlerin“, fr. ancolie, fleur de parfait amour, e. columbine (v. aquila? wahrsch. v. aqua u. lëgo sammle — Wassertropfen in d. Blattwinkeln, latinis. Ackelei Mej.), z. B. Zier. A. vulgaris L. Frauenschuh od. Pantöffelchen, s. g. Narrenkappe Vilm., fr. aiglantine od. colombine, A. anemonoides W. (Isopyrum anem. Hort.), A. sibirica Lam. v. fl. pl., A. Skinneri Hook., chrysantha Gray, canadensis L., etc.

Arabis L. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) Gänsekresse, -kraut Seub., Gonne O. W., fr. arabette, e. wallress (*Ἀραβ.*, -βος Araber, Wtst. viell. veränd. st. Iberis — ?), z. B. Zier. alpina L. (verna Hort.), fr. ar. printanière, corbeille d'argent, tourette, e. rocky-wall-cress, A. arenosa Scop., fr. ar. de sable, e. sandy-w.-cr.

Aracacha esculenta DC. (Umbelliferen, V. 2) „Arakatscha“ (südamer. Culturpfl. — vaterländisch!).

Araceae Grek. i. q. Aroidēae Juss. DC. Arongewächse, s. Arum.

Arachis L. (Cisalpinieen, X. 1 od. XVII. 4) Erdeichel (-nuss), A. hypogaea L. (Südamer.), fr. arachide, pistache de terre (pois de terre), e. ground-nut (v. ἄ priv. ῥάχις Grat, Dorn, gr. ἀράχιδρα eine Hülsenfrucht, Fr. Riemer's Lex.).

Aracium Monn. Neck. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schüsselbl.“ (?), A. paludosum Neck. (Hieracium p. L., Crepis p. Mch.) (schwerl. v. ἄρακι i. q. γιάλη Schale etc., sond. Wtst. nur d. veränd. Hieracium!).

Aralia L. (Araliaceen, V. 5) Doldeneppich, fr. aralie (v. d. canadischen Namen), z. B. papyrifera Hook. Reispapierpfl. Leun. (China), edulis Zucc. Beeren- od. Bergangelika Leun., spinosa L. (japonica Hort.) Angelikabaum, fr. Angélique épineuse, e. Angelica-tree, Stuben A. Sieboldii Hort. (japonica Thb.), elegantissima Hort. (Neucaledon.) etc. — Araliaceae DC.

Araucaria Rz. Pv., Juss. (Coniferen, XXI. 9) Schuppen- od. Chilitanne Vilm., Schmucktanne (n. Arauca, dem Lande der Araukaner im südl. Chili), z. B. Zier. A. imbricata Pv. echte Sch., „Ziegel“-Araukarie, A. excelsa Ait., s. g. Norfolkfichte, brasiliensis Pv., Gewächsh. A. Bidwillii Hook. u. a.

Arbutus L. (Ericaceen, X. 1) Sandbeere, Meerkirsche, Erdbeerbaum, fr. arbouse (-bousier), e. strawberry-tree (n. d. celt. ar raul, but Busch, od. d. celt. arboise Herbbeerenbusch, Paxton), z. B. unedo L. u. uva ursi L., fr. cracra, bousserolle, raisin d'ours; s. Arctostaphylos Adans.

Archangelica Hoffm. (sc. Angelica) L. (Umbelliferen, V. 2) „Erzengelwurz“, fr. archangélique (vgl. Angelica) (v. ἀρχάγγελος Haupt- od. Erzengel — hervorheb. ihr. Heilkraft!).

Arctium L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Klette, fr. glouteron, e. bur, burdock (hardock) (v. ἀρκτείο; vom Bären — stachel. Köpfe!), z. B. A. Bardanum L., fr. bardane, u. a.

- Arctocālyx** Fenzl (Gesneriaceen, XIV. 2) „Klettenkelch“ (*ἄρτος* Bär, *καλύξ* Kelch), z. B. Endlicherianus Van Houtt.
- Arctostaphylos** Adans. (Ericaceen, X. 1) „Bärentraube“, Grante O. W., fr. raisin d'ours, e. bear-berry (s. eb. u. *σταφυλή* Weintraube), z. B. *A. uva ursi* Spr. s. *officinalis* Wimm. Grab. = *Arbutus* u. u. L.
- Arctotis** L. (Compos. Calendulac. od. Arctoideen, XIX. 4) „Bärenohr“ (s. v., *ὄτις*, *ὄτις* Ohr), z. B. *calendulaea* L. var. *tristis* etc.
- Ardisia** Sw. W. (Myrsineen od. Sapotaceen, V. 1) „Pfeilspitzkrone“, Spitz- od. Spitzenblume (v. *ἀοδὴς* Pfeilspitze — bez. d. Kronzipfel!), z. B. *Stuben crenulata* u. *mollis* s. *villosa* Sw., *excelsa* W. (*Angullaria bahamensis* G.). — *Ardisiaceae* Juss. (Ord. Myrsinēae Bartl.).
- Arēca** L. (Palmen, XXI. 8) Betelnusspalme, Catechu- od. Pinangnuss-P., fr. arec (-quēr) (n. d. malabarisch. Nam. arec, ganz jung *perynga*, Paxton), z. B. *oleracea* L. Kohlpalme, fr. *palmiste franc*, *chou-palmiste*, e. *cabbage-tree*, *Gewächsh. A. alba* Bory (Ins. Bourbon), *rubra* Bor. (Mascarenen), *Catechu* L. (Ostind.) u. a. — *Arecinae* Mart.
- Arenaria** L. (Alsineen, X. 3) „Sandkraut“, fr. *sabline* od. *sablonnière*, e. *sand-wort* (*arēna* Sand).
- Arenga** Lab. (Palmac. Phoenicieen, XXI. 8) „Arenge“-Palme (*areng*, d. vaterl. Name!), z. B. *saccharifera* Spr. (*Gomutus saccharifer* autt.) echte Zucker- od. *Gamouti-P.*, s. g. *Sagueer*, *Weinpalme*, s. *Borassus*.
- Arethusa** Sw. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Arethuse“, Runzelbart D. (*Arethusa*, die in eine Quelle verwand. Nympe der *Diana*, *Myth.*), z. B. *Warmh. A. capensis* L., *bulbosa* L., etc.
- Aretia** W. (Primulaceen, V. 1) *Alpen-Mannsschild* (n. Bened. Aretius, Prof. in Bern, † 1574), *A. helvetica* L. (*Diapensia* h. Jacq.), s. *Androsæce alpina* Lam.
- Argania** Schousb. (Sapotaceen, V. 1) marokkan. Eisenholz, *A. Sideroxylon* Schousb. (v. *argan*, d. marokk. Nam.), s. *Sideroxylon spinosum* L. u. *Elaeodendron Argan* Retz (*Rhamnus siculus* L.).
- Argemone** T. (Papaveraceen, XIII. 1) Sand- od. Stachelmohn, fr. *argémone*, *pavot épineux*, e. *prickly-poppy*, s. *Papaver spinosum* Bauh., *Zier. A. grandiflora* Sweet (gr. *ἀργεμώνη* v. *ἀργεμα* Stopfen auf d. Auge — wogeg. *gebr.*!).
- Aria** Crantz (sect. Sorbus Host) (Pomaceen, XII. 3) *Mehlbaum* (-beere, -birne), fr. *viorne*, e. *mealy-tree* (v. *Arien* in Persien), z. B. *A. latifolia* Pers. s. *Crataegus A. L.*, *Pirus A. Ehrh.*, *A. intermedia* Pers. (*Crat. Ar. β. suecica* L.), *alpina* W. (*Pirus alp.*) u. *hybrida* L. (*Crat. Ar. β. fennica*).
- Arisarum** T. (Aroideen, XXI. 9) kleiner *Aron* (gr. *Ἀρίσαρον*, eine *Aronart*), *A. vulgare* Targ. Tozz. = *Arum Arisarum* L. s. *serpentinum* Barr., *A. potamogetonifolium* Bocc. = *Ambrosinia Bassii* L.
- Arisēma** Benth. (nicht -aema Mart.) (Aroideen, XXI. 1) *Flecken-Aron*, „*Aron*“-„*Zeichen*“ (*Arum* u. *σήμα* *Zeichen* etc.), z. B. *Zier. A. prae-cox* de Vries (Jap.) u. *rings* Schott.
- Aristēa** (-aea) Ait. Ker (Irideen, III. 1) „*Grannen*“-*Schwertel*, *Borstentilie* D. (v. *arista* *Granne* — so zugespitzte Blätt.), z. B. *cyanea* W. (*Ixia* s. *Moraea africana* Hort.), *angolensis* Bak. (Nied.-Guin.).
- Aristolochia** L. (Aristolochieen, XX. 3) *Osterluzey*, *Heberblume* Rmpl., *Hohlwurz*, fr. *poire à putin*, *aristoloche*, e. *aristolochy*, *birth-wort*, „*Geburtswurz*“, auch *sarrasine* (gr. *ἀριστολογία* *Kraut zur Beförd. d. Geburt*, *λοχεία*), z. B. *Zier. A. Siphon* l'Hér. (*macrophylla* Lam.) gem. *Heberbl.*, *Pfeifenstrauch*, -*kopfstr.* (Nordamer.), *tomentosa* Sims (daselbst), *sempervirens* L. s. *Pistolochia cretica* Moris. — *Aristolochiae* Juss., -*icæ* Bartl. Ord. d. *Osterluzeygew.*, -*iacæ* Grck.
- 1) **Aristotelēa** W. (Tiliaceen, XI. 1) *Aristotelesstr.*, *chilenischer Jasmin*,

A. macqui l'Hér. (glandulosa Rz. Pav.) echter. 2) *Aristotelia* Lour. (Orchid. XX. 1), z. B. spiralis (Neottia sinens.). 3) *Aristotelia* l'Hér. (Ribesiace.). 4) *Aristotelia* Ad. (Compos.) (n. d. griechischen Philosophen Aristoteles, † 322 v. Chr.).

Armeniäca T. (sc. Prunus) L. (Juss. subgen. v. Prunus) (Amygdalac. od. Drupaceen, XII. 1) Aprikosenbaum, fr. abricotier, e. apricot (-cock) -tree (n. d. Lande Armenien, arab. alberkuk, span. orient. barcock etc., Mej.), z. B. A. vulgaris Lam. (epirotica Fl. Wett.) n. v. v., brigantiäca Vill. Aprik. v. Briançon, tomentosa Thb. etc.

1) **Armeria** W. (Plumbagineen, V. 5) Gras- od. Sandnelke, Nelkengras, Pinke O. W., fr. gazon d'Espagne (v. d. celt. ar nahe u. mor Meer), z. B. A. vulgaris W. (maritima Mill., pubescens DC.), e. common sea-lavender, s. Statice Arm. L. 2) **Armeria** (sc. Silēne) L. (Silenac., X. 3) Garten-Silene, Klebbuschnelke, s. g. Morgenröschchen, fr. Silēne à bouquets, e. Lobel's Catchfly od. Fleabane „Fliegengift“. 3) **A.** (sc. Dianthus) L. (Caryophyllen, X. 2) rauhe od. Büschelnelke Grck., M.-Rchb.

Armeriopsis Boiss. (Plumbagineen, V. 5) „Nelkengrasgleiche“ (zu Statice L.) (s. eb. u. ὄψις Aussehen).

Armillaria DC. (Pilze, XXIV. 4) „Armband“ od. Ringpilz (armilla Armband, Manschette), z. B. melléa Honiggelbling, s. g. Hallimasch Kumm. (essb.) etc.

1) **Armoracia** Fl. Wett. (sc. Cochlearia) L. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) Meerrettig (Mähr-, Mer-), Kreen O. W. (s. Armeria od. v. Armoricum Bretagne), A. rusticana Fl. Wett. s. sativa Hell., fr. raifort-sauvage, moutarde des Allemands, grand raifort, e. horse-radish, russ. chren. 2) **Armoracia** Bl. u. Fing., F. W. Mey (zu Nasturtium R. Br.) (Crucifer. Siliquos. XV. 2), z. B. amphibia F. W. M., austriäca Bl. Fing.

Arnica L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) Wolverlei (Wohlverleih), fr. arnique, plantain de montagne. A. montana L. (v. ἀρνίον Lämmchen od. ἀρνάκι; Lammpezl — weg. d. Blätt., Paxton).

Arnosëris G., Bernh. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Lämmersalat“, Lammkraut Grck. (ἀρνός Gen. v. ἀρνών Widder, σέρις Salat), s. Hyoseris L.

Aroidëae DC. (Aracëae Grck.) Bartl. Ord. d. Arongew., fr. aroides (εἶδομαι gleiche).

1) **Aronia** Pers. (zu Pirus Rchb.) (Pomaceen, XII. 4) Felsenbirne, -mispel Leun., Schwarzbirne Rmpl., Bastard-Eberesche (Abänd. d. Worts Aria, s. d.), z. B. wild u. Zier. A. rotundifolia Pers. (Amelanchier vulg. Mch.), Sorbus Amelanchier Crantz, s. Aronia K. Koch), arbutifolia Pers. (floribunda Spach, Pirus florib. Lindl. Mespilus arbutifol. var. melanocarpa Mch.), grandifolia Spach (Pirus gr. Lindl.), pirifolia Pers. (Crataegus p. Lam. s. serrata Poir.) etc. 2) **Aronia** (sc. Crataegus) Bosc. Aronia-Dorn (Mespilus Aronia W.).

Arrhenatherum P. B. (zu Holcus Rchb.) (Gräser, III. 2) Glatt- oder Wiesenhafer, A. elatius P. B., fr. ray-gras de France „franz. Ray-gras“, e. french reed-grass, auch fr. avoine élevée (Avena elatior L.) u. faux-fromental (fromental) „falscher Weizen“ s. Holcus avenaceus Scop. (v. ἀρρην männlich u. ἀθήρ Speize, Hachel- — näm. an d. männl. Blüthen! Wst.).

Artemisia L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Beifuss¹⁾, fr. armoise, herbe de Diane (n. d. Göttin Artemis od. Diana, als Lucina Göttin der Geburt, — zur Beförd. früher Mannbarkeit angewandt), e.

1) Nach Schmitthenners deutsch. Etymologie: pipôsz dazu gestossen, also „Gewürz“, v. pôszan stossen; aus pôsz später „Fuss“!

mug-wort, moth- od. worm-wort, z. B. *A. glacialis* L. Gletscher-B., fr. g n pi, *A. campestris* L., fr. armoise des champs „Feld“-B., *A. vulgaris* L., fr. auch herbe de St. Jean; Zier. *A. Stelleriana* Bess., argent a Ait., annua L., gracilis Hort. (procra W.), Abrotanum L. u. Absinthium L. (s. d.) u. salina W. — Artemisi ae DC. Less.

Arthrolobium Desv. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) „Glied“- od. „Gelenkh lse“ (*      * Glied etc., *      * dem. *     * H lse etc.), z. B. *scorpioides* Desv. s. Ornith opus scorp. L.

Artocarpus L. (Urticaceen Artocarpeen, XXI. 1) „Brotfruchtbaum“, fr. artocarpe u. jaquier (*     * Brot, *     * Frucht), z. B. *A. incisa* L., integrifolia (Warmh.) imperialis; s. Rademachia incisa etc. Thb. — Artocarp ae Bartl. DC. (zu Ord. Urticinae Bartl.).

Arum L. (Aroideen od. Callaceen, XXI. 9) Aron, Aronswurz Seub., Dutenkolbe, Zehrwurz Leun., Zahnkraut Rmpl., fr. arum, gouet, pi de de veau, pain de li vre, chou-poivre, e. aron, wake-Robin, cuckoo-pintle „Kukukszapfen“, calves-foot, fever-root, s guine (gr. *    *, v. *    *, lat. aro ackere, zeuge?), z. B. *A. maculatum* L. Pfaffenkind, deutscher Ingwer Leun., *A. dracunculus* L. „Drachenzwurz“, fr. gouet serpenteire, e. snake- od. hare-mint, *A. crinitum* Ait., fr. gouet chevelu, italicum Mill. etc.

Aruncus (sc. Spiraea) L. (Rosaceen Spir aceen, XII. 4) Geisbart, Berg-Geiswedel, Johanniswedel etc.), fr. barbe-de-ch vre (- de bouc), e. goat's-beard (lat. aruncus Geisbart).

Arundinaria Mchx. (Gramineen, III. 2) Ludolphsrohr, fr. arundinaire, e. reed-grass (-plant) (v. arundo, -inis Schilfrohr), z. B. Blattpfl. *A. falcata* Nees (Bambusa s. Arundinacea falc. Hort.) „Sichelbambus“, s. Ludolphia W.

Arundo P. B. (Gramineen, III. 2) Schilfrohr, fr. roseau od. canne, e. reed, z. B. Zier. *A. Donax* L. (*Donax arundinacea* P. B.) m. v. variegata Hort., fr. roseau des jardins, canne de Provence, e. large-leaved reed; mauretania Desf., fr. roseau d'Alg rie.

Asa foetida K mpf. (nicht Assa!) (sc. Ferula) L. (Umbelliferen, V. 2) Stinkasant, Teufelsdreck = Steckenkraut, e. benjamin (v. *    * Ekel).

Asarea Lindl. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Fleischlose“, Magerorchis (*      * fleischlos), z. B. Warmh. *speciosa* Ldl. (*Serapias gavilu* Pav.).

Asarin ae R. Br. (zu Aristolochi ae Rchb.), s. sogl.  sarum.

Asarum L. (Aristolochieen Asarineen, XI. 1) Haselwurz, eig. Asarwurz Mej., fr. asare, calavet, oreille d'homme,  chalotte,  chaloinne, nard-sauvage,  pi sauvage, rondelle etc., e. hazel-wort, wild spike-nard, assaraback (-bacca), cabarick (*     * astlos) *A. europaeum* L., s. Hypocistis Beckm.

Ascalonium (sc. Allium) L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Schalottenzwiebel, fr. ascalonite, e. eschalot od. scallion (v. Askalon in Pal stina).

Asclepiad ae R. Br., Rchb. -**dae ae** Grck. (zu Ord. Contortae Bartl.), s. sogl. Asclepias.

Asclepias L. (Asclepiadeen, V. 2) Seidenpflanze, Schwalbenwurz, fr. ascl piade, dompte-venin, herbe de St. Laurent, fleur   mouche, e. swallow-wort, milk-weed (n. *        * od. Aeskulap, d. Gott d.  rzte), z. B. Zier. *A. syriaca* L., fr. ascl. de Syrie, herbe   la ouate (-   coton) „Wattenkr.“, e. virginian sw.-w. od. milk-w., tuberosa L., curassavica L., e. blood-flower, incarnata L., fr. couleur de chair, e. incarnate sw.-w., carnosa L. (*Hoya carn.* R. Br.).

Ascobolus Pers. Nees (Pilze, XXIV. 4) „Schlauchschneller“ (*    * u. *    * Wurf — d. Sporenschl uche springen auf u. werfen d. Sporen umher), z. B. *furfuraceus* Pers., s. Peziza.

Ascoph ra Tod., Nees (Pilze, XXIV. 4) „Schlauchtr ger“, fr. ascophore

- (s. eb. u. *φορός* tragend), z. B. Mucēdo Schimmel. — Ascophōri (zu Hymenomyces) Corda.
- 1) **Ascyron** (sc. Hypericum) L. (Hypericineen, XIII. 2 od. XVIII. 4) „Männerblut“, fr. ascyre (v. *ἄσχυρον* i. q. *ἀνδρῶσαιμον* Manns- od. Männerblut, Wtst. i. q. *Hypericum perforatum* L. — d. Blütenknospen geben zerdrückt blutroten Saft von sich! n. Paxton: *ἀ* priv. u. *σχυρός* od. *σχυρός* hart — also weich anzufühlen!) s. *Androsæmum* (s. d.). 2) **Ascyrum** L. (sect. v. *Hypericum*), z. B. *Crux Andree* L. „Andreaskreuz“.
- Asimīna** Adans. (Anonaceen, XIII. 6) Flaschenbaum, Papau (canad. Name) (Etym. umbek.), z. B. *A. triloba* Dun. nordamer. Papau s. *Anōna* tr. L. (*Uvaria* tr. Torr. Gr., *Orchidocarpum arietinum* Mchx. u. *Porcelia* tr. Pers.).
- Aspalathus** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Dornhülsenstr., s. g. Witschen D., fr. aspalathe, pied d'oise (gr. *ἀσπιάλαθος* ein Dornstr.), z. B. *A. spinosa* L., *indica* L. Ebenholz v. Madagaskar, s. *Lotus tenuifolius* Pluk.; *A. Ebēnus* L. amerik. Ebenholz (Bstr. Westind.).
- Asparāgi** Juss., fr. Aspariginées, Asparagoïdes Spargelartige, s. sogl.
- Asparāgus** T. (Liliac. Asparigineen, VI. 1) Spargel, fr. asperge, e. asparagus (sparagus), sparagrass, sparrow-grass (gr. *ἀσπάρραγος* u. Paxton: *ἀ* int. u. *σπάρρασσω* zerzupfe — bez. d. Blätter!), z. B. *A. officinalis* L. (altilis Aschers.).
- Aspasia** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) *Aspasia* (*Aspasia*, Freundin v. Perikles in Athen, Wtst. v. *ἀσπασίος* angenehm, nicht Paxton v. *ἀσπάζομαι* umfasse), z. B. *epidendroides* Ldl. (Amerika).
- Asperifolia** L., -foliaceæ Rchb. „Scharfblättrige“, i. q. Boraginææ Juss. (*asper* u. *folium*).
- Asperūgō** L. (Boragineen, V. 1) Scharfkraut, Schärfling O. W., fr. rapette, porte-feuille (v. *asper* rauh etc.).
- Asperūla** L. (Rubiaceen od. Stellaten, IV. 1) Waldmeister, Meister O. W., Meierkraut Viln., fr. aspérule, rubéole, hépatique étoilée, moscataline, muguet od. hépatique des bois (s. eb.), z. B. *A. odorata* L. s. g. Maitrank, fr. auch reine des bois, e. wood-ruff, sweet-scented-Squinancy, *A. cynanchica* L. Bräunewurz, fr. herbe à l'esquinancie (petite garance, rubéole), *A. arvensis* L. (*Rubeōla coerulæa* Bauh.), Zier. *A. azurea* Spach, e. sky-coloured-wood-ruff.
- Asphodelææ** Bartl. DC., -li Juss. (zu Liliacææ Bartl.) „Affodile“, Lauchartige.
- Asphodelīne** Rchb. (zu *Asphodēlus* L.), z. B. *lutēa* Rchb., fr. fleur od. belle d'un jour, s. *Asphodēlus*.
- Asphodēlus** L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Affodil“, Lauch, Gilbwurz, Schopflilie, fr. asphodèle, e. asphodel u. daffodil (daffodil-lily) (gr. *ἀσφῳδέλος*), z. B. *A. lutēus* L., fr. fleur od. belle d'un jour, e. day-lily.
- Aspidīstra** Ker (Liliac. Asparigineen od. Acoraceen, VIII. 1) Schild- od. Wurzelblume, Korbstempel (v. *ἀσπιδίον* Rundschildchen u. Wtst. *ἄστρον* Stern u. Bild), z. B. *Stuben A. elatior* Decsn. = *Plectogyne variegata* Hort.
- Aspidium** Sw. (Polypodiac.-Farne, XXIV. 1) Schildfarn, fr. aspidie, e. shield-fern (s. eb. — Schildform d. Sporenbälter!), z. B. Zier. *A. aculeatum* Sw. (*Polystichum* ac. DC.), *A. angulare* Klt. (*Polyst. ang. Presl*), *A. Filix mas* Sw. (*Polyst. s. Polypodium* F. m. L.), Bandwurm-Waldfarn W. „Farnkrautmännchen“ m. v. v. etc., s. *Nephrodium* Rich. „Nierenfarn“.
- Aspidosperma** Mart. (Contorten, V. 1) „Schildsamem“ (*ἀσπίς*, -έδος Rundschild, *σπέρμα* Samen), z. B. *macrocarpon* Mart., *Quebracho* (Q. blanco = Rinde) (Brasil.).

- Asplenium** L. (Farne, XXIV. 1) Strich-, Streifen- od. „Milzfarn“, fr. asplénion, e. scal-fern (v. *ἀσπληνον* Milzkraut — strichförm. Sporangien!), z. B. Decor. A. *Adiantum nigrum* L., Kalth. bulbiferum Forst., falcatum Lam. (Ostind.), flabellifolium Cav. (Neuholl.), Warmh. cicutarium Sw. (Jamaika), pulchellum Radd. (Bras.) etc.
- Aster** L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Aster“, Sternblume, fr. astère, étoilée, reine Marguërite, e. aster, cod- od. star-wort (gr. *ἀστὴρ*, -έρος lat. aster Stern), z. B. Zier. A. *chinensis* L. v. v., fr. Reines Marguërites couronnées „Cocardenastern“, Rosenaster, Topf. A. *alpīnus* L., ferner Gart. *formosissimus* Hort., fr. a. très-élégant, e. very-nice a., A. *Novi-Belgii* Nees, *Novae-Angliae* Ait., *horizontalis* Hort. (pendūlus Ait.) u. a. — *Asterēae* DC., -inēae Rich.
- Asterocephalus** Vaill. Spr. (Dipsaceen, IV. 1) „Sternkopf“, Grindrose od. Scabiose (s. eb. u. *κεφαλή* Kopf), z. B. A. *Columbaria* Vaill. — *Scabiosa* Col. L. (*Trichēra* C. Schrad.).
- Astilbe** Hamilt. (Saxifragaceen, X. 2) „Ohnglanz“ (*ἀ* pr., *στῆλη* Glanz — keine besond. schöne Blüt. Wtst.), z. B. Zier. A. *rivularis* G. Don, fr. A. des rivages, e. bearded-Spiraea, s. *Hoteia japonica* Decsn. (*Spiraea* jap. Hort. s. *barbata* Wall.).
- Astragalus** L. (Legumin. Astragaleen, XVII. 4) Wirbelkraut, Traganth, Stragel Seub., Bocksdorn Vilm., fr. astragale, adragant (dragant), barbe de renard, e. milk-vetch „Milchwicke“ (*ἀστρογάλος* Halswirbel — die untere Hülsennaht eingedrückt!), z. B. Zier. *galegiformis* L., e. goat's-rue-like milk-vetch, A. *Tragacantha* L., fr. tragacanth, e. tragacanth „Bocksdorn“.
- 1) **Astrantia** T. (Umbelliferen, V. 2) Sterndolde, Doldenstern, Thalstern, schwarze Meisterwurz, fr. astrance, radiaire, e. master-wort (v. *ἀστὴρ* u. *ἀντιος* entgegenkommend — Gegenstück bildend!), z. B. major L., fr. astr. élevée, sanicle femelle, e. greater master-wort, A. *Epipactis* L. f. (*Hacquetia* Ep. DC.), *helleborifolia* Salisb., minor Scop., e. smaller m.-w. 2) **Astrantia** *africana* Mor. (*Ranunculac.*, XIII. 7) = *Adōnis capensis* L.
- Astrapaea** Lindl. (Malvaceen, XVI. 7) „Blitzmalve“ (*αστραπαῖος* blitzend — brillante Blume!), z. B. A. *speciosa* Ldl. (*Pentapētes speciosa* W., B. Ostind.).
- Astrocephalus** Vaill. s. **Astero-**
- Astrocarya** (-on, -um) W. Mey., Mart. Spr. (Palmeaceen Phoeniceen, XVI. 1) „Sternnuss“ (s. v., *ζάκυρον* Nuss), z. B. A. *Borsigianum* C. Koch, s. *Stevensonia*.
- Ataccia** Presl (Aristolochieen Taccaceen, VI. 1) Arrowrootpflanze (*ἀ* int. u. *Tacca*), z. B. *cristata* Presl, s. *Tacca integrifolia* autt.
- Athamanta** Koch (Umbelliferen, V. 2) Bären- od. Heilwurz M.-Rehb. Grundheil, Augenwurz Grck., fr. athamante od. grande-berce, e. fluellin, speed-well (v. *Ἀθάμας*, -αντος Myth. Vater v. Phrixus u. Helle), z. B. A. *cretensis* L. (*Libanōtis* cr. Scop.), s. Mēum.
- Athanasia** Cass. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Unsterblichkeitsblume“ (?), Athanasius-Rainfarn, Immortelle, Jüngling D., fr. athanasie (gr. *ἀθανασία* v. *ἀ* u. *θάνατος* Tod? od. n. Athanasius, s. d. Aut.), z. B. Zier. annua Hort. (*Tanacetum* ann. L., *Balsamita* a. DC.), *Athanasieae* Less. DC.
- Athyrium** Roth (Polypodiac.-Farne, XXIV. 1) Frei-, Bogen- (Seub.), Strichfarn Rmpl.; fr. athyrium fougère femelle, e. lady's fern (v. *ἀθύριος* ohne Thüre, frei — nämlich d. Sporangien!), z. B. A. *Filix femina* L. m. v. *Goeringianum pictum* u. v. *Elworthii* Hort., s. *Aspidium Filix femina* L.
- Atossa** Alfld. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) Zaunwicke, fr. vesceeron, e. hedge-vetch (persischer Frauennamen!), s. *Vicia sepium* L.

- Atractylis** Scop. L. (zu Carthämus Rehb.) (Compos. Carduaceen oder Carlineen, XIX. 1) „Spindel“- od. Rockendistel, Wollen-Saffor, fr. quenouillette (v. ἀτρούλιος dem. ἀτρούλιον Spindel etc. — Stengel wollig, wie eine solche u. ebenso benutzt, Wtst.), *A. lanata* Scop. s. *Acarna* W., s. *Carthämus lanatus* L. (Heteracantha lan. Lk., Centrophylum l. Rehb.).
- Atragène** L. (Ranunculac. Clematideen, XIII. 6) Alpenranke, -rebe Seub., Doppelblume D., Kletterrose, fr. atragène (ἀτραγενή Theophr. n. Wtst. Clematis cirrhosa! nicht ἀτραγίς, eine Distel), Zier. *A. alpina* L. (Clematis alp. geranifolia Moris.), austriaca Scop., Clematidis Crantz, sibirica L. (Clematis sib. Müll.), americana Sims (Clem. verticillaris DC.).
- Atraphaxis** L. (Polygoneen, VI. 2) Knöterichmelde, Strauchm. D., s. g. Bockswizen (ἀτροάγαξις, lat. Atriplex v. α priv. u. τροίγω nähre — ohne sonderl. Nahrung!), z. B. undulata L. (Polygonum atraphaxoides Thb.), s. undulatum Berg.
- Atriplex** L. (Chenopodiaceen od. Atriplicaceen, XXIII. 1) Melde, Mille, fr. arroche, e. arrach (arach) u. orach, auch notch-weed „Kerblatt“ (v. ater in comp. atro- schwarz? od. α̂ intens. u. triplex dreifach — näml. Fruchthülle — unsicher!), z. B. geb. *A. hortensis* L. m. v. v., z. B. (Zier.) atrosanguinea Hort. Blutmelde u. cupreato-rosea Hort., erstere fr. Belle Dame (Bonne-) u. Follette, e. dark purple-coloured Garden-Orach. — Atriplicaceae Rehb., -caceae R. Br.
- Atropa** L. (Solaneen, V. 1) Wolfs- od. Tollkirsche, fr. morelle furieuse, bouton-noir, e. mad-apple, s. g. Belladonna, *A. Belladonna* L. (Mittel z. Verschön. d. Augen), fr. belle-dame od. belladonne u. follet (v. ἀτροπος unabwendbar — näml. d. Tod!).
- Attalä (-lia)** Hb. Bpl. Kth. (Palmen, VI. 1) „Attalus“-P. (n. Attalus I., Kön. v. Pergamus, † 198 v. Chr., n. Paxton v. attalus prächtig (?), vielm. attalicus attalisch, auch glänzend etc.), z. B. Warmh. *A. funifera* Mart. „Seilpalme“ (Bras.), compta Mart., excelsa, humilis u. speciosa Mart. (Bras.).
- Aubrietia** Adans. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Aubrietie“, fr. Aubriétie, z. B. Zier. deltoidea DC., purpurea Hort. (grandiflora Hort.) etc. (n. d. franz. Blumenaler Aubriet, Tournefort's Begleiter, † 1743), s. Alyssum, Draba u. Heliophila.
- Aucuba** Kämpf. Schreb. (Loranthaceen od. Cornaceen, XXII. 4) Fleck-Hartriegel, s. g. Goldorange, fr. aucube (n. aukuba, d. jap. Namen), z. B. Zier. japonica Kämpf. u. himalaica Hook.
- Aucuparia** Med. (sc. Sorbus) L. (sect. v. Sorbus Med.) (Pomaceen, XII. 3) Eberesche, Vogelbeerbaum, s. g. Quitscheren, *A. sylvestris* Med., fr. sorbier sauvage, e. service-tree, quick-beam, quicken-tree, roan-tree, *A. americana* W. (Sorbus microcarpa Pursh, Pirus amer. DC.) (aucuparius Vogelfang betr. v. avis Vogel, capio fange).
- Aulacomnium (-on)** Schwägr. (Moose, XXIV. 2) „Furchen“-M., Streifen-Sternmoos Leun. (v. ἀύλαξ, -ακος Furche u. μνίον, lat. Mnium Sternmoos, -höker. Kapselbasis, Wtst.), z. B. androgynum Schw. (am Grund d. Bäume), s. Mnium Dill.
- Aulax** Berg. (-axis Haw.) (Proteaceen, IV. 1 od. XXII. 4) „Furchenblatt“ (?), „Furchenblüher“! (s. eb., Wtst. Staubgef. in d. Kronenfurchen, od. Blattenunterseite gefurcht!), z. B. Zier. pinifolia R. Br. (*Protea p.* L.), umbellata R. Br. (*Protea aulacea* Thb.).
- Aurantiaceae** Corr. DC. Rehb., -iae Juss. (zu Ord. Terebinthinae Bartl.) Orangen, s. sogl.
- Aurantium** (sc. Citrus) L. (Aurantiaceen, XVIII. 2) Orange, Pomeranze (pomum aurantium), fr. u. e. orange (fr. oranger, e. orange-tree) (v.

- aurum Gold), z. B. Gewächsh. C. Aurantium L. echte Or., nur v.: C. Aur. Bigaradia Risso, saure od. Warzen-Or., v. chinensis (sinensis) Risso, süsse Or. od. „Apfelsine“, v. decumana L. Pompelmus, v. nobilis Lois. Mandarin-Or., Zier. Aurantium v. crispa Hort., s. g. Bouquet-Or. (v. v. fl. pleno, salicifolia etc.).
- 1) **Auricula** T. (sc. Primula) L. (Primulac., V. 1) „Aurikel“ (eig. „Öhrchen“), fr. oreille d'ours, e. bear's-ear, french-cow's-lip (dem. v. auris Ohr). 2) **Auricula** (sc. Hieracium) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) = Hieracium dubium Sm. 3) **Aur.** (sc. Peziza) L. (Pilze, XXIV. 4) Judasohr, fr. oreille de Judas, e. jew's-ear, s. Exidia Auricula Judae Fr.
- Avellana** (sc. Corylus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) gem. Haselstrauch, fr. avelinier (avellunier), coudrier, abelanie, noisetier, e. hazle-nut (-tree) (v. Avella i. q. Aquila in Oberitalien, Wtst. n. Avellino in d. Prov. terra di Lavoro, Neapel).
- Avena** L. (Gräser, III. 2) Hafer (Haber), -gras, fr. avoine, e. oats (unbek. Etymologie!), z. B. geb. A. sativa L. gem. H. u. orientalis Schreb. türkischer od. s. g. Fahnen-H., wild A. fatia L. Flug- od. Windh., fr. haveron, A. sterilis L. (macrocarpa Mnch., sensitiva Hort.) hygrometrischer od. Wetter-H., u. s. f.
- 1) **Averrhöa** (-oea) L. (Gruinalen od. Bombaceen, X. 4) Karambolabaum, Baumstachelbeere, A. Carambola L. (n. d. arab. Arzt Averrhoes zu Cordova, † 1217). 2) **Av. acida** L. (Cicca disticha Spr.) (Euphorbiac., XXI. 4) Gröps-Wolfsmilchbaum.
- Axolöpha** Alfd. (-ia DC.) (Malvaceen, XVI. 5) rauhhaariger Eibisch, A. hirsuta Alfd. (Althaea h. L.) (v. ἄξωγ, -ορος Achse? λόφος Haarschopf — dann fehlerh. gebildet! od. ἄξος adj. schleppend v. ἄγω i. q. ἔλξω ziehe, schleppe? Wtst. d. Fruchtbod. strahlig kammförmig!).
- Ayenia** Mut. L. (Büttneriaceen, V. 1) „Ayenie“ (n. d. duc d'Ayen de Noailles ben.), z. B. Treibh. pusilla Rz. Pv. (Dayenia inermis Mill.), aculeata Mut. (Byttneria mollis H. B. K.) (Str. Südam.), cordifolia Sess., etc.
- Aylanthus** Juss. st. Ailantus Desf.
- Azadirachtha** A. Juss. (sc. Melia) L. (Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) Manna- baum, Paradies-, Paternosterbaum, grossblättr. „Zedrach“ D., s. Azadiracta indica Breyn. (ἄζα Dürre, δια wegen u. ζάσσω spalte? Wtst. arabisch! — unsicher!).
- Azaläa** L. (Ericaceen, V. 1) „Azalee“, Felsenstr. Leun. Rmpl., Bergröschen, fr. azalée (v. ἄζαλέος trocken, dürr — bez. d. Standorts!), z. B. Treibh. A. indica L. m. v. v., pontica L. (arborëa L., Rhododendron flavum G. Don), mollis Blum. (China), wild: procumbens L. Zwergporst, s. g. Gamsennach (südd. Alpen) (Chamaerhododendron Buxb.).
- Azaleastrum** Planch. (subgen. v. Rhododendron) (Ericaceen, V. 1) Azaleen-Alpenröschen, Rh. ovatum Lindl. (China) (deter. Azalea).
- Azara** Rz. Pv. (Bixaceen od. Homalineen, XIII. 1) südamer. Orleans- strauch (n. d. Spanier Jos. Nic. Azara benannt), z. B. dentata u. serrata R. P.
- Azarölus** Scop. Borkh. (Pomaceen, XII. 2) „Lazarole“, welsche Espeln D. (v. ἄζα Dürre — Standort? Wtst. arab. azzarur od. al zarur wild. Apfel!), z. B. A. alpinus Borkh., fr. aubépin Azérolier, épine d'Espagne, e. azarole thorn, s. Crataegus Azarölus V. Azarolbirne u. Crat. s. Pyrus alpina Dur. „Alpenbirne“.
- Babiana** Ker (Irideen, III. 1) Pavianswurz (v. babianus Pavian, Wtst. Babia, Göttin d. Kindheit in Syrien — nieder. Kraut!), z. B. Thunbergii u. plicata Ker (Antholyza plic. L., Cap), aurea Ker = Tritonia aur. Papp., u. a.

- Bacchäris** L. (Compos. Astereen od. Baccharid., XIX. 2 od. XXII. 14) Bachusstrauch, Kreuzstr. Lauche, fr. bois-Guillaume, s. Grotheistenholz (Landmann's Spiek-Narde, Paxton) (D. Mariae chirotheica G. Frank) (gr. *Βάχμοις* od. *Βάτταροις* Diosc. v. *Βάχμος*, Pflanze m. wohlriech. Wurzel, Riemer), z. B. Zier. *halimifolia* L. (cuneif. Mnch.) meldenblättr. Kreuzstr.
- Bacillaria** Ehrbg. (Stückelalgen od. Diatomeen, XXIV. 3) „Stäbchenalge“, fr. bacillaire (dem. v. bacillus Stab).
- Baetris** Jacq. (Palmen, XXI. 6) Rohr- od. „Stabpalme“ (v. *βάκτρον* Stab — zu Spazierstöcken, Wtst.), z. B. Warmh. *caryotaefolia* Mart., *setosa* M. (m. Borstenwimpfern an d. Fiedern!), *longifrons* Mart., etc.
- Bacomycēs** Pers. Ach. (Flechten, XXIV. 3) Schwamm-od. Korallenflechte, Becherfl. W. (*βαυός* klein, *μύκης* Pilz), z. B. *cocciferus* Ach. = Herba ignis Offiz. (Nord-Eur.), s. *Cenomyce* Ach. u. *Cladonia* Hoffm.
- Baeothryōn** Nees (sc. Scirpus) Ehrh. (Cyperaceen, III. 1) „Kleinbinse“ (s. v. u. *ῥόϊον* Binse), s. *Scirpus pauciflorus* Lightf.
- Baeria** Fisch. Mey. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Baer'sblume“ (n. d. russ. Staatsr. u. Prof. C. E. v. Baer, † 1872), z. B. Zier. *chryso-stöma* F. M., fr. Baerie dorée s. g. „Goldmund“ (Californ.).
- Balanites** DC. Del. (Zygophylleen, X. 1) Zahnbaum (*βαλανίτης* eichelartig), z. B. *aegyptiaca* Del. Hadjildj-Gewürz, s. *Ximenia aeg. s. ferox* Poir.
- Balanophōra** Forst. (Balanophoreen, XXI. 1) „Eichelträger“, Kolbenschösser (*βάλανος* Eichel, *φορός* tragend), z. B. *fungosa* Forst. = *Cynomorium* Bal. — *Balanophoræa* Rich.
- 1) **Balantium** Kauf. (Farne, XXIV. 1) „Beutel“- od. „Börsen“-F. (gr. *βαλάντιον* Geldbeutel — Form d. Fruchtschleierchens!), z. B. Gewächsh. *B. antarcticum* Presl. 2) **Balantium** Hamilt. (Chrysobalaneen, XII. 1) (— meist leer. Eierstock, Wtst.).
- Baldingera** G., Fl. Wett. (Gräser, III. 2) Glanz- od. Bandgras (n. E. G. Baldinger, Prof. in Marburg, † 1804), Zier. *B. colorata* Fl. Wett. Bandgras d. Gärten, s. *Phalaris arundinacea* var.
- Ballōta** L. (Labiaten, XIV. 1) „Ballote“, Schwarz- od. Stink-Andorn, fr. ballote u. marrube, (gr. *βαλλωτή* v. *βάλλω* werfe zurück — durch üblen Geruch, Paxton), z. B. *nigra* L. v. *variegata* Hort., fr. *marrube noir* (marrubin n.) od. *fétide*, e. hare-hound, *B. suaveolens* L. s. *Bystropogon l'Hér.*
- 1) **Balsamina** Riv. (sc. Impatiens) L. (Balsamineen, V. 1) gem. „Balsamine“, fr. fruit élastique, e. balsam od. balsamine (gr. *βαλοσαμίνη* Balsamische, v. arab. balassan?). 2) **Balsamina** (sc. Momordica) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Balsamapfel, Wunderapfel Vilm., fr. momordique pomme de merveille, e. balsam-apple, balm-Momordica. — *Balsaminæae* A. Rich. (zu Ord. Gruinales Bartl.).
- Balsamifluæ** Blum. Jess. „Balsamfluss“- od. Amberbäume (zu Ord. Iteoidæe Bisch. Weidengehölze) (*βάλσαμον* u. fluō).
- 1) **Balsamita** Vaill. Desf. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Balsamblume“, fr. balsamite, z. B. *B. vulgaris* W. = *Tanacetum Balsamita* L. (Südfrankr.) s. g. Frauenminze D., fr. menthe coq, e. spearmint. 2) **Balsamita** DC. (sc. Chrysanthemum) L. (Comp. Anthem. XIX. 2) Strahl-Balsamblume, *B. annua* DC. (Athanasia a. Hort.).
- Balsamodendron** Kth. (Burseraceen, VIII. 1) „Balsambaum“, echter Myrrhenbaum, fr. balsamier (baumier), e. balsam-tree (-shrub), *B. Myrrha* Lk. (*βάλσαμον* u. *δένδρον* Baum).
- Bambüsa** Schreb. (**Bambos** Retz.) (Gramineen, VI. 1) Bambusrohr, Bambos, fr. bambou, e. bamboo-cane, auch Riesengras Leun. (v. d. ind. bambos od. d. malay. bambu), z. B. Zier. *B. arundinacea* L. (Südchina) Riesen-B., (klein) *B. Fortunei* fol. varieg. s. *nivei-vittat.* Van Houtt., v.

- aureo- u. argenteo-striata Hort., *B. aurēa* Hort., *B. nigra* Hort. Paris., fr. b. à bois noir, e. black-stemmed b.-c., etc.
- Banisteria** L. (Malpighineen, X. 3) Liane od. brasil. Kletterstrauch, fr. quapurier (*B. Quapara* W.) (n. d. engl. Mission. John Bainster ben.), z. B. *B. Quapara* W. u. *dichotōma* L. (*Acer scandens* etc. Plum.).
- 1) **Banksia** R. Br., L. f. (Proteaceen, IV. 1) Bank's-Silberfichte (n. d. engl. Nat. u. Reis. in Austral. Jos. Banks, † 1820), z. B. *Gewächsh. collina* R. Br., *Cunninghamii* Sieb., *littoralis* R. Br. 2) **Banksia** speciosa Kön. (Scitamineen, I. 1) Costwurz = *Costus speciosus* Sm. 3) **Banksia** Forst. (Thymeläen). 4) **Banksia** Domb. (Lythraeiden).
- Baphia** Afz. Spr. (Mimoseen, XXIII. 1) „Farb“- od. Klingholz (v. *βαιοφειον* Färberei), z. B. *nitida* Spr. afrik. Rotholz, e. bar-wood.
- Baptisia** Vent., R. Br. (Cassieen, X. 1) „Farbstrauch“, wilder Indigo (v. *βαπτω* färbe), z. B. *Zier. B. australis* R. Br., s. *Podalyria* Vent. s. *Sophōra austr.* L.
- Barbaraea** (rēa) R. Br. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Winter- od. Erdkresse, Kreissig O. W., Senf- od. Barbarakraut, Barben-Hederich, fr. roquette, herbe de St. Barbe (n. d. St. Barbara ben.), *B. vulgaris* R. Br. = *Erysimum Barbaraea* L.
- 1) **Barbula** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Bärtchen“, Bartmoos (dem. barba). 2) **Barbula** Lour., Pers. (Verbenaceen, XIV. 2) „Bärtchen“-V. (— haarfransige Blüten, Wtst.).
- 1) **Bardana** Offiz. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) gebräuchl. Klette Grck. (v. d. ital. *barda* Pferdeharnisch? od. st. *pordona* = *Onopordon?* Wtst.) i. q. *B. major* Off., s. *Arctium Lappa* L. s. *Lappa major* (*Lappa officinalis* All.), fr. lapourdier, bardane, fusilage, herbe aux teigneux „Gründigenkraut“. 2) **Bardana** (sc. *Arctium*) W. = *Lappa tomentosa* Lane, filzige Kl. Grck.
- Barkeria** Lindl. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Barker's“-O. (n. Barker-Webb, s. d. Aut.), z. B. *spectabilis* Batem. (Guatem.), *elegans* Knowl. Westc.
- Barkhausia** Mneh., DC. (-hausenia Hoppe) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Schnabelpippau Seub. (n. d. Prof. J. G. Barkhausen in Utrecht, † 1723), z. B. *intybacēa* DC. = *Crepis int. Brot.*, s. *Borkhausia* Böhm.
- Barleria** L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Barlerie“ (n. d. Dominikaner James Barrelier in Paris, s. d. Aut.), z. B. *B. longifolia* L., *B. Prionitis* L. fussangelf., etc., s. *Justicia* L.
- 1) **Barosma** W. (**Baryosma** R. Sch.) (Rutaceen Diosmeen, V. 1) Duft- raute, Bukkostrauch (*βαοίς*; stark etc., *σομύ*) Duft etc.), z. B. *odorata* D. (nicht -um), *serratifolia* (*Adenandra cordata* Lk.). 2) **B. Tonga** Pers. (Dipteryx T. W.) (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3).
- Barringtonia** Forst., Thb. (Myrtac. Melaleucac., XVI. 8) Myrtenpflaume (n. d. engl. Nat. Dan. Barrington, † 1800), z. B. *Gewächsh. B. speciosa* L., s. *Butonica* Juss. (*Mammea asiatica* L., *Commersonia* Sonner.) (schönst. B. des Australoceans!). — *Barringtoniēae* (sc. *Melaleucacēae*) Rehb.
- 1) **Bartonia** Mühlenb., Pursh (Loasaceen, IV. 1) „Bartonie“ (n. Dr. S. Barton, Bot. in Philadelphia), z. B. *Zier. aurēa* Lindl. (*Mentzelia Lindleyana*) m. v. *nana* (Californ.), fr. Bartonie dorée, e. golden Bartonia. 2) **Bartonia** Sims, W. (Gentianeen, IV. 1), s. *Andrewsia* Spr. u. *Centaurium Bartonia* Sims.
- Bartramia** Dill., Hedw. (-ēa DC.) (Moose, XXIV. 2) „Bartram's“-M. (von Dillen n. W. Bartram, Colonist in Pennsylvanien, ben. s. d. Aut.), z. B. *pomiformis* Flörke (Salzb. Alp.). — *Bartramiacēae* Schimp.
- Bartsia** (-tschia) L. (Scrophularineen, XIV. 2) Alpenkamm, Quell-

- Hahnenkamm (n. Joh. Bartsch, s. d. Aut.), z. B. alpina L., s. Staehelina alp. Crantz (Euphrasia rubra Raj.).
- Baryxylon (-um)** Lour. (Cassieen, X. 1) „Schwerholz“, Eisenholz v. Cochinchina, fr. baryxyle (βαρύς schwer, ξύλον Holz), B. rufum Lour.
- Basella** L. (Chenopodiaceen od. Phytolaccaceen, V. 3) Malabarspinat, Beerblume (v. einem malabar. Wort abgeleitet.), z. B. B. rubra L. u. vesicaria Lam. (— schwarze Beeren z. Rotfärben!), s. Anredra spicata Juss.
- Basilaea** Lam., Juss. (Liliaceen, VI. 1) Kaiserkrone (Corona Regalis Dill. = Fritillaria imperialis), B. bifolia Poir. etc. (βασιλειος königlich) s. Eucömis L.
- Basilicum** (sc. Ocimum) L. (Labiaten, XIV. 1) „Basilienkraut“, gem. Basilien, fr. basilic, plante-romaine, e. basil (gr. βασιλικὸν v. βασιλεύς König — königl. weg. Geruch u. Heilkraft!).
- Basilium** Mnch. (Labiaten, XIV. 1), gem. Basilien = Basilicum.
- 1) **Bassia** Juss., Kön. (Sapotaceen, XI. 1) Butterbaum, B. butyracäa Kön. (n. d. Bot. Ferd. Bassi in Bologna, † 1774), s. Philippe malabaris Kön. 2) **Bassia** muricata Allion. (Chenopodiaceen, V. 2) s. Salsöla mur. L. 3) **Bassiana** (sc. Botrytis) Mich. (Pilze, XXIV. 4) Muscardinepilz d. Seidenraupen.
- Batatas** Lam. (Convolvulaceen, V. 1) Batatenwinde, Camote, fr. patate od. batattes (malayisch!), B. edulis Chois. = Convolvulus Batatas L. (Ipomoea Bat. Rchb.).
- Batrachium** E. Mey. (zu Ranunculus L.) (Ranunculaceen, XIII. 3 od. 7) „Froschkraut“, -veilchen, -blume Mej., Haar- od. s. g. Löffelkraut, Wasserranunkel, fr. grénouillette, z. B. aquatile u. fluitans Oed., fr. brouille-blanche (βατραχίοσ Frosch, βατραχία — ἴον Veilchen, Mej.).
- 1) **Batschia** Mich. (Boragineen, V. 1) „Batschie“, s. Lithospermum Lehm. (Rindera carolinensis Pers.). 2) **B.** Mnch., Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1). 3) **B.** Thb. (Menispermeen, XXII. 12), z. B. racemosa u. spicata Thb. (Trichoa etc. Pers.) (n. d. Prof. J. G. Batsch in Jena, s. d. Aut.).
- Bauhinia** Plum., L. (Cassieen, X. 1) „Bauhinie“, Fassholz, fr. bois à barrique (n. Joh. u. Kasp. Bauhin, s. d. Aut.), z. B. scandens L., porrecta W. (Sennae spuriae Sloan.) (Indien).
- Beaufortia** Ait., R. Br. (Myrtac. Melaleucac., XVIII. 2) Tristan-Myrte (n. d. Herzogin Mar. v. Beaufort), z. B. splendens u. decussata Ait., s. Tristania R. Br.
- Beccabunga** (sc. Verónica) L. (Scrophularineen, II. 1) Bachbunge, fr. beccabunga, salade de chouette „Kauz-Salat“, véronique mourronnée, e. brook-lime (latinisiert „Bach-Pungen“ od. „Bunge“).
- Beckmannia** Host (Gräser, III. 2) Raupenähre (n. J. Beckmann, s. d. Aut.), B. eruceiformis W. (Cynosurus eruceif. Ait.) s. Phaläris L.
- Befaria** Sm. Druckfehler st. **Bejaria** Sm.
- Begonia** L. (Polygonaceen od. Begonien, XXI. 9) Schiefblatt, fr. bégonie (n. Mich. Begon, franz. Intendant auf St. Domingo, geb. 1638), z. B. Blattpfl. R. Rex J. Pz., falcifolia Hort., incarnata, argentea Lind., discolor R. Br., fr. b. à deux couleurs, e. two-coloured Beg. etc. — Begoniaceae R. Br.
- Behenantha** Otth., DC. (-the Schur) (Silenaceen, X. 3) „Behenblume“, s. g. Taubenkropf, fr. carnillet (-niolet), e. calves-foot = Cucubalus Behen L. (Behen vulgaris Mnch.), s. Silene inflata Sm. s. vulg. Grck. (behen, eig. eine Pfl. am Libanon, ἄνθη Blume).
- Bejaria** Sm. (Ericaceen, X. 1), „Bejar's“-Rhododendron (n. e. Spanier, Namens Bejar).
- Belis** Salisb. (Conifer. Araucarieen, XXI. 9) Spiesstanne Lauch. (v. βέλος

Geschoss — spießförm. Nadeln u. Zapfenschuppen!), z. B. lanceolata Sweet (jaculifolia Salisb.) (China).

- 1) **Belladonna** (sc. Atropa) L. (Solaneen, V. 1) Wolfs- od. Tollkirsche (ital. bella donna, fr. belle dame, schöne Dame — Mittel für schöne Augen etc.). 2) **Belladonna** Sweet (sc. Amaryllis) L. (Amaryllideen, IV. 1) Belladonna-Lilie.
- Bellevalia** Lapeyr. (Liliaceen, VI. 1) röm. Hyacinthe od. Meerzwiebel (n. d. Bot. P. R. Belleval in Montpellier, † 1598), B. romana Lap.
- Bellidiastrum** Mich. Cass. (zu Arnica) Rchb. (Compos. Bellidieen, XIX. 2) Stern- od. Alpen-Masliebchen, Maslieb-Wolverley, Ruckel O. W. (deter. Bellis, -idis od. Bellis u. *δοτρον* Bild, Wtst.), z. B. B. Michellii Cass. (Arnica s. Doronicum B. L., W.).
- Bellis** (G. -idis) L. (Compos. Radiaten od. Bellidieen, XIX. 2) Masliebchen, Tausendschön, Gänseblümchen, fr. paquerette, petite marguerite, fleur printanière, e. daisy (-zy), margarites od. margaronet (v. belle, lat. bellus, allerliebste), Zier. B. perennis L. v. fl. pleno, e. velvet-flower „Sammetbl.“, wild fr. auch liane rade u. margueritelle, e. argentine- od. bone-flower.
- Bellium** L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) italienisches od. See-Maslieb (Bellis maritima Bocc.) (s. v.), z. B. bellidioides L. (Bellis annua minima Triumf.), minutum L. (Bellis cretica T.).
- Benedicta** DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Benedikten“-Distel, fr. bénoite, chardon bénit u. galliotte, e. bennet, holy-thistle (benedictus gesegnet, „benedeit“ — Heilkraft!), s. Cnicus B. Vaill. (Centauria B. Rchb.).
- Benincasia** (-eza) Savi (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Benincasia“ (n. d. ital. Grafen Benincasa), z. B. cerifera Savi „Wachsurke“ (Ostind.).
- Benthamia** Lindl. (Cornaceen od. Hederaceen, IV. 1) „Benthams“ Cornel- od. Erdbeerstrauch (n. G. Bentham, s. d. Aut.), z. B. B. fragifera Ldl. (Cornus capitata Wall.) (Nepaul).
- Benthamidia florida** Spach (Cornaceen, IV. 1) Blumen-Hartriegel (s. eb. u. *ειδομα* gleiche), s. Cornus fl. L.
- 1) **Benzoïn** Hayne (Sapotac. od. Styracineen, X. 1) Benzoebaum, echte Benzoe, fr. badamier od. belzof, auch assa-doux, e. benjamin (fr. bien-joint) (n. d. franz. Bot. Benzoin, beschr. 1556 die echte Benzoe, Benzonia Schum.), B. officinale Hayne (Benzonia Schum.), s. Storax Benzoin Dryander. 2) **Benzoïn** (sc. Laurus) L. (Lauraceen, IX. 1) Benzoïn-Lorbeer. 3) **Benzoïn** (sc. Terminalia) L. (Combretaceen, XXIII. 1) Benzoe-Croton, s. Croton Benzoe L. (Terminalia angustifolia Jacq.).
- Berberidæae** Vent., DC., Rchb. Berberitzensträucher, s. sogl.
- Berberis** L. (Berberideen, VI. 1) Berberitzenstr., Sauerdorn (-rach), fr. vinetier, épine-vinette, e. piperidge-tree, barberry (barberry, bearberry) = Bärbeerstr. Mej. (v. d. arab. berberi? Berberis Berber? — ungewiss!), z. B. B. vulgaris L. (Oxyacantha Galeni Tabern.) m. v. v. (z. B. atro-purpurea Hort.), B. canadensis Pursh (caroliniana Hort.), B. repens Lindl., B. Mahonia Nutt. (Aquifolium Pursh) u. a.
- Berchemia** Neck. (Rhamnaceen, V. 1) „Berchemie“ (n. ein. franz. Bot. Berchem), z. B. Gart.-Schlingstr. volubilis DC. (Virgin.), s. Rhamnus s. Zizyphus vol. L.
- Bergenia** Mch. (zu Saxifraga Rchb.) (Saxifrageen, X. 2.) sibir. od. Dickblatt-Steinbrech (n. d. Prof. K. A. v. Bergen in Frankf. a. O., schr. Fl. Francofurt, † 1760), Zier. B. bifolia Mch., s. Saxifraga crassifolia L. (Geryonia Schrk.).
- Berisia** Spach (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) Alpen-Johannisbeeren (Anagramm v. Ribesia!), z. B. Zier. R. alpinum u. orientale Desf.
- Bermudiana** Feuill., Dill. (s. Sisyrinchium) L. (Irideen, XX. 2) „Ber-

- muden“ -Rüsselschwertel (n. d. Bermudes-Inseln ben.), z. B. *coerulæa* Feuill. (*Anthericum coer. D.*), s. *Bermudiana graminæa* Dill.
- Berterōa** DC. (zu *Farsetia* Rchb.) (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Berteroe“, Grauschildkresse, Germesl O. W., fr. cresson des sables, *B. incāna* DC. = *Alyssum incanum* (Farsetia s. *Moenchia inc.* autt.) (n. d. ital. Bot. u. Reis. in Südamer. Jos. Bertero, s. d. Aut.).
- Bertholletia** Hb., Bpl. (Melaleuceaceen, XVIII. 2) Brasilianer- od. Rahm-Nussbaum (n. d. Chemik. Graf Cl. L. de Berthollet in Paris, † 1822), z. B. *B. excelsa* H. B. (Südamer. B.).
- 1) **Bertolonia** Raddi, Spr. (Melastomaceen, XI. 5) „Bertolonie“ (n. d. ital. Bot. Bertoloni in Bologna, s. d. Aut.), z. B. *Warmh. marmorata* u. *aeñæa* Naud., *paniculata* Spr. (Str. Brasil.). 2) **B.** DC. (Compos. Cichoriac., XIX. 1). 3) **B.** Spin. (Verbenac., XIV. 2), z. B. *glandulosa* = *Myoporum viscosum* R. Br. 4) **B.** Spr. (Guttiferen). 5) **B.** Moç. Sess. (Rosaceen). 6) **B.** Del., Spig. (Polygalaceen).
- 1) **Berūla** Hoffn., Koch (Umbelliferen, V. 2) „Berle“, fr. berle (latinis. Berle), z. B. *angustifolia* Koch (*Sium ang. L.*) Wassereppich. 2) *Berula major* autt. = *Veronica Anagallis* L.
- Beschornesia** Lindl. (Liliaceen Agaveen, VI. 1) „Beschornes“-Agave, z. B. *Gewächsh. yuccoides* Lindl., *argyrophylla* etc. (n. d. Nam. Beschornes geb.).
- Besleria** L. (Gesneraceen, XIV. 2) „Beslerie“ (n. Bas. Besler, s. d. Aut.), z. B. *violacæa* Aubl. (Kletterstr. Guianas), s. *Cyrtandra* Forst.
- 1) **Bessera** (-ia) Schult. (Boragineen, V. 1) „Besser's“-Lungenkraut (s. d. Aut.), z. B. *azuræa* Schult. (*Pulmonaria az. Bess.*). 2) **Bessera** Spr. (Capparid. Flacourtiæen, XIII. 1) s. *Limacia* (Koelera W., Rumea Poit.). 3) **Bessera** Schult. f. (*Amaryllideen*, VI. 1), z. B. *elegans* (Brasil.).
- Beta** T. (Chenopodiaceen, V. 2) Mangold, Scharpkraut, Dick- u. Runkelrübe etc., fr. bette u. poirée, réparée, racine de disette „Dickrübe“, rève-male, e. beet (beet-rave, better-rave) „Runkelrübe“, red-beet „Rotrübe“ (n. d. celt. bet rot), z. B. *Zier. B. vulgaris L. v. rubra* Hort. rottripp. M., fr. poirée à corde rouge, e. red-ribbed b., brasilian *Swiss-Chard*, *B. vulgaris v. lutæa* Hort. gelbrüpp. M., fr. poirée jaune du Brésil (Chili).
- Betonica** T. (Labiaten, XIV. 1) „Betonie“, fr. bétoine, e. betony (v. d. celt. ben Kopf u. ton gut — als Niessmittel, Paxton), z. B. *Zier. grandiflōra* W. (*Stachys gr. Benth.*) (Sibir.), n. v. *rosea* Hort., *B. officinalis* L. etc.
- Betūla** T. (Amentaceen, XXI. 5) Birke, fr. bouleau, e. birch (v. d. celt. betu Birke), z. B. *Zier. B. alba L. v. pendūla* Ehrh., *odorata* Bechst. (*pubescens* Hort.) „Ruch“-B., *verrucosa* Ehrh. (beide *B. alba L.*) etc.
- Betūlus** (sc. *Carpinus*) L. (Amentaceen, XXI. 5) gem. Weiss- od. Hainbuche, Hornbaum, fr. charme, e. horn-beam, yoke-elm (s. eb.).
- Bicornes** Endl. Kl. der „Zweihörnigen“ (bi- zwei, cornu Horn — bez. d. Antheren).
- Bidens** T. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Zweizahn“, Wasserdost, fr. bident (bi — zwei, dens Zahn — zweispitz. Achänen!), z. B. *tripartitūsus* L., fr. tête cornue, langue de chat, s. g. Frauenspiegel, Wolff, etc., s. *Coreopsis Bidens* L.
- Bifolium cordatum** Fl. Wett. (Smilacineen, VI. 1) „herzblättr. Zweiblatt“, Schattenblume, s. *Convallaria bifolia* L. (*Majanthemum bif. Schmidt*).
- Bifōra** Hoffn. (Umbelliferen, V. 2) „Bifore“ Grck., „Zweihohl-Samen“ bess. *Bifōris* Spr. (bi- u. fōro durchbohre), z. B. *flosculosa* M. B., *radians* ds. (Taurien), s. *Coriandrum testiculatum* L.
- Bifrenaria** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Zweizügel“-O. (bi- u. frenum Zaum, Zügel — d. vier Pollenmassen an zwei besonderen Schwänzchen, Wtst.), z. B. *atro-purpuræa* Ldl. (*Maxillaria a.*) (Bras.).

- 1) **Bigelovia** Spr. (Oleaceen Foresterieen od. Samydeen, XXIII. 1) „Bigelowie“ (n. d. nordamer. Bot. Bigelow, s. d. Aut.), z. B. *B. ligustrina* Rees (Forestiera l. Poir., Borya l. W., *Adelia* l. Mchx.), *B. acuminata* Rees (Forestiera ac. Mchx.). 2) **B.** Sm. (Taxaceen). 3) **B.** DC. (Compos.).
- Bignonia** L. (Scrophularineen Bignoniaceae, XIV. 2) Trompetenblume, fr. Bignone (n. d. Abbé Bignon, † 1743, s. d. Aut.), z. B. *Zier. capreolata* L., fr. B. à vrilles, e. tendrilled *Bignonia* „Klimm“-Tr., Gewächsh. *venusta* Ker, *Carolinae* Lindl., *Chamberlaynii* Sims, u. a. B. *Catalpa* L. (*Catalpa bignonioides* Walt. s. *syringifolia* Sims m. v. nana Hort., nägleinblättr. Trompetenbaum. — Bignoniaceae R. Br.
- Bihl** (sc. Musa) L. (Musaceen, XXIII. 1) „Bihai“-Banane, fr. bi-hai (Südamer.), s. *Heliconia Bihai* (vaterl.).
- Bilimbi** (sc. Averrhoa) L. (Gruinalen od. Bombaceen, X. 4) Reizblatt-Av., „Blimbingbaum“ = *Bilimbum teres* Rumph. (ostind. Bstr.) (vaterl. — reizempfindl. Blattstiele, R. Bruce).
- 1) **Billardiëra** Sm. (*deria* Spr.) (Pittosporeen od. Polygaleen, V. 1) Blaubeer-Schlinge, fr. billardiëre (n. Labillardiëre, s. d. Aut.), z. B. *fusiformis* Lab. (*Sollya heterophylla* Lindl.), *paniculata* Sm. (*Froelichia p. W.*), *explanata* Mch. (*Verbena grandiflora*, *Buchnera canadensis* L.). 2) **Billardiera** (Labillardiëra R., Sch.) (Rhamnac., V. 1), z. B. *angustifolia* DC. 3) **B.** Vahl (Rubiaceen, IV. 1).
- Billbergia** Thb. (Bromeliaceae, VI. 1) Greisenbart (n. d. schwed. Bot. J. G. Billberg), z. B. *Stuben B. pyramidalis*, *zebrina* Ldl. = *Tillandsia z.*, *B. Chantini* Carr.
- Biöta** D. Don, Endl. (Cupressineen, XXI. 9) Lebensbaum, fr. arbre de vie, e. arbor vitae (gr. βίονη Leben), s. *Thuja* L. u. *Phyllocladus* Spach, z. B. *Zier. orientalis* Don v. *aurea* Hort. Waterer u. v. *filiformis* Hort. s. *erecta* Lodd. (fadige Zweige) u. *pendula* Endl.
- Biotia** Cass., DC. (Compos. Sigesbeckien, XIX. 2) „Biot's“-Aster (n. d. Astronomen Biot), *Zier. B. latifolia* DC. (Aster lat. Desf.), *commixta* DC., *corymbosa* DC. etc., s. Aster u. *Eurybia*.
- Bipinnula** Commers. (Orchideen, XX. 1) „Zweifeder“-O., Runzelbart (dem. bipinnus zweifederig), s. *Arethusa*.
- Bischoffia** Blum. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Bischoffsbaum“ (n. d. Bot. Bischoff, s. d. Aut.).
- Biscutella** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) Brillenschötchen, fr. lunetiëre (bi- zwei u. dem. scutum Schild, -ellum Schildchen — Schötchenform), z. B. *aureolata* L.
- Biserrula** (fehlerh. Bisserula) L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Doppelsägenhülle“, fr. scie od. double scie (bi- u. dem. serra Säge — Hülle an d. beid. Kanten gesägt!), z. B. *Pelecinus* L. Sägekraut D., fehlerh. *Bisserula* u. *Bicerrula* autt.!
- Bismalva** Mch. (zu *Malva*) Rchb. (Malvaceen, XVI. 8) „Doppelmalve“, fr. guimauve (bis zweimal od. doppelt — dopp. Kelchhülle!), z. B. B. *Alcea* L. u. *moschata* L., s. *Malva*.
- 1) **Bistorta** (sc. *Polygonum*) L. (Polygoneen, VIII. 3) Wiesenknöterich, Natterwurz, s. g. Schlippen (als Gemüse), fr. bistorte, e. adder's-word od. bistort, auch snake-weed (bistortus zweimalgedreht — nämli. d. Blumenähre!), s. *Bistorta major* autt. 2) **Bistorta** Rchb. (sectio v. *Polygonum* L.), z. B. *B. vivipara* kleine Natterwurz M. Rchb. (*Polygonum bistortoides* Pursh).
- 1) **Bivonaea (-nëa)** DC. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Bivonä“, Gelbtäschel (n. Bivona-Bernardi, s. d. Aut.), *B. lutea* DC. (Sibir.) s. *Thlaspi* l. *Biv.* 2) **Bivonëa (-ia)** Spr., Raf. (Euphorbiaceen, XXII. 5), z. B. *axillaris* Spr., s. *Adelia Martii* Spr. (bras. Str.).
- Bixa** L. (Cistifloren Bixaceen, XIII. 1) Orleanbaum, *B. Orellana* Rumph.

ostind. O. (nicht Orleana!), (n. d. bras. Nam. d. Pfl. biché), B. Uru-curana W. brasil. O., fr. roucouyer (orléan od. roucou, Orleana terra der Apoth.). — Bixaceae Rchb., -xinéae Kth. Orleanbäume.

- 1) **Blaeria** L. (bess. **Blairia** G.) (Ericaceen od. Viticeen, XIV. 2 od. IV. 1) „Blairie“ (n. Patrick Blair, Arzt in Boston, Lincolnshire), z. B. Treibh. ericoides Ait. (Erica Blaeria Thb.). 2) **Blairia** Houst. (Verbeneen, XIV. 2), s. Priva Ad. (Tortula W., Streptium Rxb., Verbena Dill.).
- Blakea** L. (-ckeae P. Br., -ckia Schrk.) (Lythrarieen od. Melastomaceen, XI. 1) „Blakee“ (n. Mart. Blake, Verbr. nützl. Kenntnisse, Paxton, n. Steph. Blake, schr. 1664 d. prakt. Gärtner, Wtst.), z. B. trinervia L. (Str. Jamaica), quinquenervia Aubl. (triplinervia) (B. Guiana), latifolia u. rosca Don (Str. Peru) u. a.
- 1) **Blandfordia** Sm. (Amaryllideen, VI. 1) „Blandfordie“ (n. Georg Marquis v. Blandford, Smith's Freunde), z. B. Gewächsh. B. flammēa Hook., Cunninghamsi Ldl., aurca Veitch, nobilis Sm. (Neusüd-wales). 2) **Bl. cordata** Andr. (Saxifragaceen), s. Solenandra cordifolia Vent.
- 1) **Blattaria** (sc. Verbascum) L. (Scrophularieen od. Solaneen, V. 1) „Schaben“- od. Mottenkraut, fr. herbe aux mites (v. Blatta Schabe u. Motte — geg. solche angew.). 2) **Blattaria zeylanica** Comm. (Sterculiaceen, XVI. 7) Schabenmalve, s. Pentapetes phoenicea L. (Dombeya s. Cavanillea ph.).
- Blechnum** L., W. (Farne, XXIV. 1) Rippen-, Kamm-, Streifenfarn, fr. blegne (gr. βλήγγον), z. B. Baumf. B. brasiliense Desv., australe L., occidentale L. u. a.
- Blepharis** Juss. (Acanthaceen, XIV. 2) „Wimper“-Acanthus, fr. bléphares (gr. βλεφαρίς: Augenwimper — Brakteen gewimp., Wtst.), z. B. boerhaaviaefolia Juss. (Acanthus maderaspatensis L.), arborca Spr. (Acanthus arb. Forsk.), linariaefolia Pers. (Senegal) u. a.
- Bletia** Rz. Pv. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Bletie“, Erdorchis (zu Orchid. terrestres Bot.) (n. d. span. Apoth. u. Bot. Don Louis Blet in Madrid), z. B. catenulata R. P., ensiformis L. (Peru), bicallosa Don (Stelis racemosa Sw., Empusa paradoxa Lindl.).
- Blighia** Kön. (Sapindaceen, VIII. 1) Akeebaum (n. d. Capt. Bligh, dem Verpflanz. dess. n. Westind., schr. Reise im Südmeere, 1792), z. B. B. sapida Kön., s. Akeesia africana Tuss.
- 1) **Blitum** L. (Chenopodiaceen, V. 2) Erdbeerspinat, Beermelde, Schmink-beere Rmpl., Schmirbel O. W., fr. blette od. épinard-fraise, e. strawberry-spinache (gr. βλίτον Melde), z. B. capitatum L., fr. bl. capitée. 2) **Blitum** (sc. Amarantus) L. (Amarantac., XXI. 5) wilder Amarant M. Rchb., fr. amarante-blette, s. Blitum album minus Pluck.
- Blysmus** Panz. (Cyperaceen, III. 1) Quellriet (βλυσμός d. Hervorquellen — wächst im Wasser), z. B. compressus Panz. (Scirpus compr. Pers.).
- Bobartia** L. (Cyperac. od. Irideen, III. 1) „Bobartie“, fr. bobart (n. d. Prof. Jak. Bobart in Oxford, † 1679), z. B. Zier. B. indica L. (Schoenus Bobartii Retz.), s. g. Bermudienne od. bunte Moräe, s. Moraea chinensis Thb. (Ixia ch. Ehret).
- Boca** (Bocca) prouacensis Fl. Flum. (Bixaceen, XIII. 1) „Bocco“- od. Rebhuhnholz (vaterl.), s. Banara Aubl.
- Bocconia** Plum. (Papaveraceen, XI. 1) „Bocconie“, fr. bocconie (n. d. Sicilianer Dr. med. Paolo Boccone, gen. Sylvius, schr. Icones pl. rar. Sicil., Melitae, Galliae et Italiae, Oxf. 1674, s. d. Aut.), z. B. Zier. B. cordata W. (Macleya c. R. Br.), fr. B. à feuilles en coeur, e. cordate-leaved B.
- Boebēra** W. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Boeber's“-Stinkblume, s. Dysodia Cav. (n. d. russ. Prof. d. Bot. Boeber, † 1820), z. B. Zier.

- chrysanthemoides W. (Dysodea glandulosa u. Tagētes papposa Mchx.), s. pumila Hort. Pis. (N.-Amer.).
- Boehmera** Lk. (-ia Jacq.) (Urticaceen, XXI. 4) Nesselbaum, Kätzchenschwanz, s. g. Ramie, B. ramiflora Jacq. (n. d. Bot. G. R. Böhm, s. d. Aut.), s. g. Caturus s. Procris ramiflora, B. utilis Rmpl. u. nivēa Jacq., s. g. Ramée od. Chinagras (geb. Gespinnstpfl. Hint.-Ind.). B. cylindrica Sw. (Urtica c. L.) u. a.
- 1) **Boerhavia** L. (Nyctagineen, II. 1) „Boerhavia“, fr. tassole (n. Boerhave, Prof. in Leyden, s. d. Aut.), z. B. africana Lour., arborēa Lag. (Mex.), tuberosa L., erecta L. (Solanum bacciferum Pluk.) u. a.
- 2) **Boerhavia** Vahl (Valerianeen, II. 1) B. chaerophylloides (Valeriana ch. Pers. u. laciniata Rz. Pv.), scandens L. (dichotoma Vahl), s. Valeriana s. Anisophyllum sc. Forsk.
- Bohēa** (sc. Thea) L. (Theaceen, XIII. 1) brauner Thee W., e. bohea (bohi) „Theebuh“, s. Thea flor. hexapetalis Amoēn. acad. (n. d. chines. Berg vui geb. Name).
- Bojeria** DC. (Compositen Bojerieen) „Bojerie“, z. B. speciosa DC. (n. d. Prager Bot. u. Reis. Wenzel Bojer, s. d. Aut.). — Bojeriēa DC.
- Boissiaea** Vent. (Cassien, X. 1) „Boissieu“-Cassie (n. C. V. Boissieu de la Martiniere, Begl. Lapeyrouse's, Wtst.).
- Boissieria** Domb. (Convolvulac. od. Boragineen, V. 1) Brustbeerbaum, B. trinervata Domb. = Cordia Boissieri autt. (n. d. Bot. Edm. Boissier in Genf, s. d. Aut.).
- Bolax** Comm., Juss., Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Bollendolde“ (βώλαξ Kloss, Bolle — Pfl. als halbkugelf. auf d. Erde lieg. Klumpen, Wtst.), s. Azorella Cav.
- Bolbitius** Tode (Pilze, XXIV. 4) Gold-Dungpilz Kumm. (βόλιβιτος Mist), z. B. vitellinus Tode, s. Agaricus v. L.
- Bolbophyllum** P.-Thou. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Bollenblatt“ (βολβός lat. bulbos Zwiebelbolle, γέλλος Laubblatt), z. B. leopardinum u. mutabile Lindl., s. Diphyes, Tribachia Ldl. u. Dendrobium Sw.
- Boldōa** Lag. Cav. (Nyctagineen, III. 1) „Boldoblume“ (n. d. span. Bot. Dr. Boldo ben.), z. B. fragrans Lag. (folia Boldo Offiz.), s. Salpianthus H. B. K. „Trompetenbl.“
- Bolētus** Dill. (Pilze, XXIV. 4) Löcher- od. Röhrenpilz, fr. bolet (gr. βωλίτης essb. Pilz), z. B. edulis L., fr. brugnet, B. buglossoides, fr. glue des chênes.
- Bollēa** Rehb. f. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Bollēa“ od. Bolle“-O. (n. d. deutsch. Reis. auf d. Azoren etc. 1853, Bolle), z. B. violacea Ldl., s. Vanda R. Br.
- Boltonia** Schreb., l'Hér. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Boltonie“ (n. d. schott. Bot. J. Bolton, s. d. Aut.), z. B. Zier. B. asteroides l'Hér. (Matricaria ast. L.), glastifolia l'Hér., fr. à feuilles de Pastel, e. woad-leaved „waidbl.“ B.
- Bolus** autt. (verdrückt?) st. Bolētus, s. d., z. B. scaber, ovinus etc.
- Bomarēa** Mirb. (Liliaceen, VI. 1) „Bomaree“ (n. Jacq. Christophe Valmont de Bomare, Bot. zu Paris, † 1807, schr. Dict. univ. d'hist. nat.), z. B. multiflora Mirb. (Alstroemeria m.), Gewächsh. edulis Mirb., Carderi, Caldasina, Salsilla (windend) etc.
- Bombacēae** DC. (zu Oxalidēae Rehb.) s. Bombax.
- Bombax** L. (Oxalid. Bombaceen od. Sterculiac., XVI. 8) Seiden- od. Baumwollenbaum, Wollsame D., Käsebaum, fr. fromager od. bombax, gossampin u. baquier (βομβάξ Baumwolle — Samenwolle), z. B. pentandrum L., fr. capouquier, s. Gossypium javanense Bauh. (Eriophōros javana Rumph.), B. Ceiba L. starker W., Wollorn, s. Xylon caule aculeata Hort. Cliff. (Gossypium arborēum Sloan.) (Südamer.).
- Bombycella** DC. (Malvaceen, XVI. 8) Seiden-Eibisch (βόμβυξ, -κος

Seide etc. — Staubgef. in Seide gehüllt!), s. *Hibiscus* L. u. *Bombyx* Med.

Bonannia Raf. (Sapindaceen, VIII. 1) „Bonannie“ (n. Bonanni, wandte zuerst Spiegellicht b. Mikroskop an, schr. Observationes etc., Rom 1699, Wtst. n. d. span. Guinea-Insel Bonanno od. Anabon).

1) **Bona nox** (sc. *Smilax*) L. (Smilacineen, XXII. 6) „Gute Nacht“. 2) **B. n.** (sc. *Ipomoea*) L. (Convolvulac., V. 1) prächt. Trichterwinde (— bei Tag geschlossene Krone!).

Bonopartēa Rz. Pv. (Bromeliaceen, VI. 1) „Bonapartee“ (n. Napoleon I. Bonaparte), z. B. *juncēa* R. P., s. *Misandra* j. autt. (*Yucca Boscii* Desf.).

Bonatēa (bess. -tōa) W. Lindl. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Bonatos“-O. (n. d. Prof. Ant. Bonato in Padua, † 1837), z. B. *speciosa* W. (Orchis sp. Sw.) (Capland).

Bonaveria Scop., Neck. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) „Bonaverie“ (n. J. B. Bonaveri im 18. Jahrh., schr. Verz. d. Pfl. um Comachio), z. B. *Securidaca* Scop. (*Securidaca vera* G. „beilkrautart.“ B.), s. *Coronilla Securid.* L. u. *Securilla* Pers.

Bonduc Plum. (sc. *Guilandina* L.) (Legum. Cäsalpinieen, X. 1) prächt. Theodore, s. *Theodora speciosa* Med. (fr. bon duc, guter Führer od. Herzog), s. auch *Bonduccella* L.

Bongardia C. A. Mey. (Berberideen, VI. 1) „Bongardie“, B. Rauwolfi Mey. (n. d. Bot. H. G. v. Bongard, russ. Staatsr., † 1839, s. d. Aut.), s. *Leontice* L.

Bonjeania Rchb. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Faltenklee (n. d. Bot. Bonjean in Chambery), z. B. *hirsuta* Rchb., s. *Lotus tomentosus* Rhod.

Bonnetia Schreb. (Ternstroemiaceen od. Guttiferen, XIII. 1) „Bonnetsbaum“ (n. d. Pfl.-Samml. Ch. Bonnet), z. B. *meridionalis* u. *racemosa* Sw., s. *Mahuria palustris* Aubl. u. *speciosa* Choisy.

Bonplandia Cav., W. (Rutac. od. Polemoniaceen, V. 1) „Bonpland'sbaum“, Angosturarindenbaum Rchb. (n. d. Bot. u. Reis. Ronpland), B. trifoliata W., s. *Galipea Cusparia* St. Hil. (Cusp. febrifuga Hb.) = *Angostura Cuspare* R. Sch.

1) **Bontia** L., W. (Myoporineen od. Polygalac., XIV. 2) wilder Ölbaum, B. daphnoides L. (Olēa sylvestris Pluk.) (Antill.) (n. d. Bot. Jak. Bontius, † 1631 in Batavia). 2) **Bontia** Petiv. (Orchideen).

Boōpis Juss. (Compos. Amphicarpanthen Rchb., XIX. 4) „Rinds“- od. „Ochsenaug“, fr. boōpis, e. eye of an ox (v. βούϛ, βοός Rind etc., ὄψ, ὄπιός Auge, βοόπις grossäug. Blume!).

Bootia Neck., DC. (Caryophylleen od. Silenac., X. 2) „Kuhnelke“, s. *Vaccaria* Med. (βοώτης Ochsentreiber, Wtst. v. Boot, s. sogl.). 2) **Bootia** Wall. (Hydrocharideen) (n. Arn. Boot, Arzt in London, † 1650, od. Ans. de Boot, ein Flamänder, Abb. v. Pfl. 16. Jahrh., Wtst.). 3) **B.** Bigel. (Potentilleen).

Boraginēae Juss., DC. Boraschgew. i. q. *Asperifoliae* Rchb. Scharf- od. Rauhblättrige, s. Borāgo (-īnis).

Borāgo (Borrāgo) L. (Boragineen od. Asperifolien, V. 1) „Borasch“, Borretsch, fr. bourrache, e. borage od. burrage (v. βορά Speise od. borra kurzes Haar, Wtst. d. verand. corago (cor u. ago) d. i. herzstärkend! — unsicher!).

Borassus L. (Palmen, XXII. 6) Weinpalme (βόρασσοϛ lat. borassus = Fruchthülle d. Palmen, Diosc.), z. B. *flabelliformis* L., fr. lontar od. bang, u. rondier „Fächer“-P., s. *Lontarus domestica* G.

1) **Borkhausenia** cava Fl. Wett. (Fumariaceen, XVII. 2) Hohlwurz, s. g. Kukuksblume (n. Borkhausen, s. d. Aut.), s. *Corydalis bulbosa* Pers. (*Fumaria cava* Ehrh.). 2) **Borkhausenia** Roth (Personaten, XIV. 2) Ziegenkraut, Herzblume, s. *Capraria lucida* W. (*Teedia* Pers.).

- Borkhausia** Böhm. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) i. q. Barckhausia Mch. (n. Barckhausen, s. d. Aut.), z. B. graveolens Lk. (Barkh. gr. Rehb.), s. Mysesris purpurea u. Crepis foetida L. (Hieracium foet. Karsch).
- Boronia** Sm. (Rutaceen, VIII. 1) „Boronie“ (n. Franc. Boroni, ital. Beleit. v. Dr. Sibthorp, † 1794), z. B. Stuben: elatior Bartl., pinnata u. serrata Sm., Drummondii etc., s. Heterandra u. Tetratheca Sm.
- 1) **Borŷa** W. (Urticaceen od. Euphorbiac., XXI. 4) „Bory'strauch“ (n. Bory de St. Vincent), z. B. Zierstr. ligustrina W. u. acuminata W. (Adelia ac. Mchx. u. Forestiera Poir.). 2) **Borya** Lab., R. Br. (Commelyneen, III. 1), s. Baumgartenia Spr. 3) **Borya** Brid. (Moose, XXIV. 2), s. Weisia vulcanica.
- Boscia** Lam., Thb. (Capparideen od. Terebinthac., IV. 3) „Bosc's“ Kapperbaum (n. d. Prof. d. Agricultur L. Bosc, s. d. Aut.), z. B. undulata Thb. (B. in Capland).
- Bosĕa** L. (Phytolacceen, X. 5) „Bose's“ Kermesbeerbaum, Goldrutenbaum D. (n. ein. Prof. d. Bot. E. G. Bose od. Kaufm. Kasp. Bose z. Leipz., schr. 1728 üb. d. Beweg. d. Pfl.), z. B. Yermamora L. canar. Maulbeer-Erve (span. yervo Erve u. Moro Maulbeere).
- Bossiaea** Vent. (**Boissiaea**) (Cassieen, X. 1) „Boissieu's“ Hülsen (n. d. Nam. Boissieu geb.), z. B. Treibl. plumosa, disticha, vera, heterophylla Sm. (Platylobium Sm.) (Neuholl.).
- Boswellia** Roxb. (Terebinthac. Bursereen, X. 1) indischer Weihrauchbaum (n. Joh. Boswell, Bot. in Edinb., schr. üb. Ambra 1736), z. B. serrata Rxb., thurifera Colebr. (glabra Rxb.), balsamifera Spr., s. Canarium W.
- Botor** Ad. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Vierkantbohne, eig. „Hirtin“ (v. *βώτωρ* Hirt od. -in, Wtst. malayischer Name!), z. B. B. tetragonolobus Ad., s. Dolichos t. L.
- Botria** (-trŷa) africana Lour. (Ampelideen, V. 1) afrik. Weinstock, s. Vitis afr. autt. (*βότρως* Weintraube).
- Botryanthe** Kl. (Euphorbiaceen, XXI. 1) „Traubenblüt“-E. (s. eb. u. *ἀρθη* Bl.).
- Botrycarpum** Rich. (s. Botryocarpum).
- 1) **Botrychium** Sw. (Ophioglosseae -Farne, XXIV. 1) „Traubenfarn“, Mondraute, B. Lunaria Pers., s. g. Walpurgiskraut (*βότρως* Traube od. *βότρονχιον* lat. viticulae Geringel d. Weinstocks, Locke). 2) **B.** Fr. (Pilze) Traubenpilz, s. Cytospora Fr.
- Botryocarpum** Rich. (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) Ahlbeerensstrauch (*βότρως*, -vos s. v., *καρπός* Frucht), z. B. nigrum (Ribes n. L.) m. v. v., schwarze Johannisbeere.
- 1) **Botrys** (sc. Chenopodium) L. (Chenopodiaceen, V. 2) Eichenblatt-Gänsefuss, „Traubenkraut“, fr. botrys. 2) **B.** (sc. Teucrium) L. (Labiatae, XIV. 1) Trauben-Gamander. 3) **Botrys africana** Lour., s. Botrya (Vitis afr. Spr.) (s. v.).
- 1) **Botrytis** Mich., Nees (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Traubenschimmel“ (gr. *βοτρῖτις* traubig — traub. gehäufte Sporen!), z. B. vulgaris Pers. 2) **Botrytis** (sc. Brassica) Metzg. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) Blumenkohl, fr. chou-fleur, e. cauliflower (colly-) (traub. Ansehen d. Wucherung!).
- Bougainvillĕa** Comm., G. Don (nicht -ginvillea Paxt.) (Nyctagineen, V. 1) „Bougainville's“ Wunderblume (n. d. franz. Seefahrer 1766/69 Bougainville), B. spectabilis W., s. Tricycla Lam.
- Boussingaultia** H. B. K. (Aizoideen od. Chenopodiaceen Baselleen, V. 3) Blumen-Gänsefuss (n. d. Nat. u. Reis. in Südamer., Prof. in Bogota J. B. Boussingault, nicht Chemiker M. Boussingault), z. B. Zier. baselloides Kth., fr. Baselle tubĕreuse „beerblumenart.“

- Bouvardia** Salisb. (Rubiaceae. Cinchonaceen, IV. 1) „Bouvardie“ (n. Dr. Bouvard, Aufs. d. bot. G.'s z. Paris. Wtst. n. Ch. Bouvard, Leibarzt Ludw. XIII, † 1780), z. B. Zier. B. Jacquini u. splendens (*Houstonia coccinea*), *leiantha* u. *longiflora*.
- Bovista** L., Pers. (sc. Lycoperdon) L. (Balgpilze, XXIV. 4) „Bovist“ od. Kugel-Balgpilz (d. latinis. bofist od. Bubenfist, d. i. Ochsenfurz, in Niederdeutschl., Jürgens).
- Bowdichia** H. B. K. (Cassieen od. Sapotaceen, X. 1) „Bowdichie“ (n. Edw. Bowdich, Secr. d. afr. Gesellsch. in Coast-Castle, † 1824), z. B. *virgilioides* H. B. K. (B. Südamer.), *speciosa* Spr. (*Moldenhawera floribunda* Schrad., *Dolichonema speciosa* Nees).
- Bowiea** Haw. (Liliaceen, VI. 1) „Bowie's-Lilie“ (n. J. Bowie, Sammler d. Kew-Gärten) B. *africana* Haw. (Saftpfl.).
- Bowlesia** Rz. Pv., R. Sch. (Umbelliferen, V. 2) „Bowles' Dolde“ (n. ein. irisch. Bot. Bowles, schr. üb. Spanien, † 1780), z. B. *lobata* R. P., *incana* u. *palmata* ds. (Peru).
- Brabējum** L. (Proteaceen, IV. 1 od. XXIII. 1) „Blumenscepter“-Baum (v. *βραβείον* lat. *praemium* Kampfpreis — Ansehn d. Baums!), z. B. *stellifolium* L. (*stellatum* Thb.) (B. Capl. u. Aethiop.), s. *Brabyala capens.* L. f. (*Amygdalus* Breyne).
- Brabyla** L. f. (Proteaceen, XXIII. 1) Blumenscepter-Baum (*βραβείον* s. eb., *ύλη* Holz), s. *Brabējum* L.
- Brachycōme (-ma)** Cass. (Compos. Bellidieen, XIX. 2) „Kurzhaar“, -schopf (*βραχύς* kurz, *κόμη* lat. *coma* Haupthaar — Pappus sehr kurzhaarig!), z. B. *iberidifolia* Benth., e. *candytuft-leaved* Br.
- Brachylōbus (-os)** All., Desv. (zu *Nasturtium* Rchb.) (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Kurzschote“ (s. eb., *λοβός* Hülse etc.), z. B. *austriacum* Crantz, *amphibium* R. Br. etc., s. *Nasturtium* u. *Sisymbrium*.
- Brachypodium** P. B. (Gräser, III. 2) „Kurzfuß“, -stiel, Zwenke (s. v., *πόδιον* dem. v. *πύξις*, -όδος Fuss — kurz gestielte Ährchen!), s. *Festuca* u. *Bromus*.
- Brachysēma** R. Br. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Kurzfahne“ (s. v., *σημα* Zeichen, Fahne — *vexillum* d. Blüte!), z. B. *Gewächsh. latifolium* R. Br., *longifolium* u. *speciosum* (mennigr., Neuholl.).
- 1) **Bradlea** Adans. (Papilionaceen, XVII. 4) „Bradley's“-Hülse (n. Rich. Bradley, Prof. in Cambridge, † 1732, s. d. Aut.). 2) **Bradleia** G. Schr. (-leya DC.) (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Bradleye“, z. B. *glauca* Lab. (Neucaled.), *philippensis* W. (-lippica Cav.) (Str., Philippinen), *Glochidion* G. (Gl. *ramiflorum* Forst.) etc. 3) **Bradlaeia** Neck. (Umbelliferen, V. 2).
- Bragantia** Pers. (Aristolochieen, XX. 5) „Bragantie“ (n. d. portug. Prinz. Joh. v. Braganza, Stift. d. Akademie z. Lissabon, † 1806), z. B. *Treih. racemosa* Lour. (Str. Cochinchina), s. *Apama* Lam.
- Brahēa** Mart. (Palmen, VI. 1) „Brahe's“ Fächerpalme (n. d. Astron. Tycho de Brahe, † 1601), z. B. *calcarata* Liebm., *dulcis* Mart. (*Corypha frigidā*, Mexiko).
- 1) **Brassavōla** Ait., R. Br. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Brassavola's“ O. (n. d. ber. Bot. Ant. Musa Brassavola in Rom, † 1555), z. B. *cucullata* Ait. etc., s. *Epidendron* u. *Cymbidium*. 2) **Brass.** Ad. (Compos. Inuleen, XIX. 2), s. *Helenium*.
- 1) **Brassia** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Brass“-O. (n. ein. Reis. u. gesch. Zücht. W. Brass), z. B. *maculata* R. Br. (Centralam.). 2) **Br.** Benth. (Labiataen, XIV. 1) — *Brassieae* Wall. (zu *Labiatae*).
- 1) **Brassica** L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) Kohl, fr. *chou*, e. keal, cabbage, swort, cole-wort (v. *βράζω* koche? od. *βράσσω* rausche? Paxton: n. d. celt. bresic „Kohl“, Varro: v. *praeseco* schneide vor — unsicher!), B. *oleracea* L. „Gemüsekohl“, m. v. v. (*acephala* DC.

Winterk., gemmifera DC. „Rosenk.“, sabauda L. Savoyer K. od. Wirsing, fr. chou de Savoie, e. crisped cabbage, capitata L. Kopfk. od. „Kappis“, fr. chou-cabu od. pommé, gongylodes L. Kohlrabe, e. cole-rape, botrytis L. Blumenkohl, fr. chou-fleur, e. colliflower etc.), Zier. B. oleracea v. acephala crispa Hort., fr. chou frisé vert, e. curled-german greens, B. oler. v. atropurpurea Hort., v. prolifera Hort. Sprossk., v. laciniata variegata Hort. scheck. Schlitzk., v. palmifolia Hort. Palmk. — Brassicæae Rich. Kohlartige. 2) **Brassica** marina autt. (Convolvulac., V. 1), s. Convolvulus Soldanella L. Meerstrands-Winde. S. Napus u. Rapa!

Brassicastrum (zu Brassica) Rehb. (Crucif. Siliq., XV. 2) Levkoi- u. levkoiblütiger Kohl, B. Cheiranthus Vill. u. cheiranthiflora DC. (deter. v. Brassica).

Braya Sternb. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Bray's“ Rauke, Kriechrauke (n. d. Bot. Fr. Gabr. de Bray, Gesandter etc., † 1831), z. B. supina Koch (Sisymbrium s. L.), alpina Sternb., glabella Richards.

Brayëra Kth. (Spiræaceen, XII. 2) „Brayer's“ Spiræe (n. D. Brayer in Constantinopel, zuerst geg. d. Bandwurm 1822), B. anthelminthica Kth. s. g. Kusso (Bstr. Abyss.).

Bredemeyëra W. (Polygalac., XVII. 3) „Bredemeyer'strauch“ (n. d. Hofgärt. z. Wien, Fr. Bredemeyer), B. floribunda W. (Südamer.).

Brexia P. Th., Nor. (Sapotac. Aquifoliac., Wtst. Saxifrageen, V. 1) „Regenblatt“ (v. βρέξις Nassmachen — Schutz geg. Regen, Wtst. madagass. Name!), z. B. B. madagascariensis Ker, s. Venana mad. Lam. Poir. (B., Madag.).

1) **Breynia** Plum., Schreb. (Capparideen, XXIII. 2) „Breyn's“ Langod. Dünnhülse (n. Jak. Breyn in Danzig, s. d. Aut.), B. indica L. f. s. Capparid Breynia L., B. disticha Forst. (Neucaled.), arborescens R. Br. (Capparis torulosa). 2) **Br.** Forst. (Euphorbiaceen, XXI. 9).

Brignolia Bertol. (Umbelliferen, V. 2) „Brignoli's“ Dolde, fr. brignole „Brunelle“ (n. d. Prof. J. L. Brignoli von Brunhof in Modena), z. B. pastinacaefolia Bert. s. Sium siculum.

Brillantasia (-taisia) P. B. (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Brillantaise“ (n. Brillantais, Rheder d. Compagnie von Oware, Westafri.), z. B. B. owariensis P. B.

Brīza L. (Gräser, III. 2) Zitter- od. Flittergras, fr. brize (brise), e. quaking-grass (βράζα v. βράζω od. βράζω nicke), z. B. Zier. B. maxima L. u. minor L. (Bouquets), s. gracilis Hort., Wiesen B. media L.

Broccoli s. Brassica asparagoides Metzg. „Spargelkohl“ (ital. Name dafür!), fr. u. e. broccoli (e. bore-cole).

Brodiaëa Sm. (Liliac. od. Irideen, III. 1) „Brodiaë“, fr. Brodiëe (n. d. schott. Kryptogamisten James J. Brodie), z. B. Zier. grandiflora, congesta u. coccinea (Nordwestamer.) s. Hookeria coronaria u. Dichelostemma congestum Kth.

Bromelia L. (Liliaceen, od. Bromeliac., VI. 1) Ananas, Br. Ananas L. (Ananassa autt.), fr. bromélie, e. pine-apple (n. d. schwed. Bot. Olaus Bromel, † 1705, schr. Chloris gothica), B. nudicaulis, fr. perroquet „Papageien“-An., lucida W. (lucide-virens Dill.), coarctata (Pitcairnea c.), Pourretia, lanuginosa etc. Bromeliacæae Lindl. Ananaslilien.

Bromus L. (Gräser, III. 2) Trespel, Dord, fr. brome u. fêtu, e. cockle, tare, darnel, auch ray (gr. βρόμος wild. Hafer), z. B. Bouquetgr. brizaeformis Fisch., Mey., in Saaten secalinus L., fr. seigle-bâtard, Bastardrogen.

Brosimum Schreb. (Artocarpeen, XXIII. 2) Brotnussbaum, B. Alicastrum Sw. essbarfrücht. od. rindiger Br. der Antillen (βρώσιμος essbar), s. Alicastrum arborëum P. Br.; B. (Alic.) spurium Sw.

- Brossaea** L. (Ericaceen, V. 1) „Brossäe“ (n. Gui de la Brosse, Arzt Ludw. XIII. v. Frankr.), z. B. Treibh. *Br. coccinea* L. (Str. Südam.).
- 1) **Brotëra** W., Spr. (-*teröa* DC.) (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) *Brotero*'sblume (n. d. portug. Bot. Felix A. Brotero, Prof. z. Coimbra, † 1828), z. B. *trinervata* Pers., *conrayerva* Cav. (Millera c. ds.).
- 2) **Brotëra persica** Spr. (Labiaten, XIV. 1), s. *Hyptis* p. Pers. 3) **Brotëra ovata** Cav. (Bittneriaceen, XVI. 7), s. *Pentapetes* ov. L.
- Broughtonia** R. Br. (Orchid. Vandeën, XX. 1) „Broughton's“-O. (n. d. engl. Bot. Arth. Broughton, Insp. d. bot. Gart. auf Jamaica im 18. Jahrh.), z. B. *sanguinea*, *alba* u. *grandiflora*, s. *Maxillaria* u. *Dendrobium*.
- 1) **Broussonetia** Vent. (Urticac. Moreen, XXII. 4) Papiermaulbeerbaum, Wautistrauch, fr. *broussonétier* (n. d. Arzt u. Nat. Broussonet in Montpellier, † 1807), *B. papyrifera* Vent., fr. *mûrier à papier*, e. *papermulberry*. 2) **Br.** Orteg. (Cassieen, X. 1), s. *Virgilia secundiflora* Cav. 3) **Br.** Gratel. (Confervac., XXIV. 3).
- Browallia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Browallie“ (n. d. Bischof J. Browallius z. Abo in Finnland, † 1737), z. B. *Stuben. abbreviata*, *humifusa* Forsk. (Buchnera h.), *elata* L. m. v. fl. albo Hort., *Czerwiakowska* Warez., *demissa* L.
- Brownaea** L. (-*nëa* Jacq., W.) (Polygalaceen, XVII. 3) „Browne's“-Rose (n. Patrick Browne, s. d. Aut.), *Gewächsh. B. coccinea* L. „Elffaden“ (stamina naturaliter sunt XI, Pers.), *Rosa de Monte* W. (*Hermesias* vulgo *Rosa* de M. Loeffl.).
- Brucëa** l'Hér., Mill. (Rutac. Zanthophylleen, XXII. 4) „Bruce's“ Gelbholzbaum (n. d. Reis. in Abyss. J. Bruce, † 1794), *B. antidysenterica* l'Hér. (ferruginëa ds.), *trifoliata* Spr., s. *Evodia drupacea* Lab.
- Bruchia** Schwägr. (Moose, XXIV. 2) „Bruch's“- od. *Faulmoos* (n. d. Apoth. Bruch in Zweibrücken, s. d. Aut.), *B. vogesiaca* Schwäg. (*Saproma* vog. Brid., v. *σαρόσω* mache faul). *Bruchiaceae* Schimp.
- Brugmansia** Pers., Bernh. (Solaneen, V. 1) Stechapfelbaum (n. d. Prof. Brugmanns in Leyden, † 1819), z. B. *Zier. candida* Pers. (*Datura arborëa* Hort.), *bicolor* Pers. (*Dat. sanguinea* R. P.) u. *Knightii* Horst (*Dat. cornigera* Hook.). 2) **Br.** Blum., Fisch. (*Rhizantheen* od. *Cytineen*, X. 1) neben *Rafflesia*!
- 1) **Bruguiera** Lam. (Rhizophoreen od. *Caprifoliaceen*, XI. 1) „*Bruguieres*“ Wurzelbaum (n. d. Arzt u. Reis. J. Guill. Bruguieres in Montpellier, † 1798), z. B. *B. gymnorrhiza* R. Br. (*Rhizophora* g. L.) (Ostind.) „*Nacktwurzelbaum*“.
- 1) **Brunellia** Hb. Bpl. (-*nelia* Rz. Pv.) (*Terebinthac.* od. *Zanthoxylëen*, XI. 5) „*Brunelli's*“ Gelbholzbaum, fr. *brunellier* (n. e. ital. Bot. Gabr. Brunelli z. Bologna), z. B. *acutangula* Hb. Bpl., *aculeata* u. *inermis* R. P. (B. Peru). 2) **Brunella** elatior Sloan. (*Acanthac.* XIV. 2), s. *Ruellia*. 3) **Brunella** T. (Labiaten, XIV. 1) s. *Prunella* L. (v. *Bräune*, geg. welche!)
- Brunia** L. (Corniculat. *Bruniaceen*, V. 1), *Capheide* (n. e. Reis. in Russl. u. d. Levante *Corn. Brun.* *Dietr. Lex.*, n. Alex. Brun, *Wtst.* n. *Corn. v. Bruyn* (*Lebrun*) v. Haag, Reis. im Orient 1673/74 u. 1701/08), z. B. *B. Levisanus* L. (*Protea* Lev. L.), *abrotanifolia* L. (*Levisanus capensis* Petiv.), *paleacea* Berg. s. *Berardia*.
- Brunfelsia** L., W. (**Brunsf.**) Plum. (Solaneen, V. 1) „*Brunsfels*“-Fruchtbaum (n. d. alt. Bot. O. Brunfels aus Mainz, † 1534, s. d. Aut.), z. B. *trifida*, *americana* L. etc.
- Brunsvigia** (-*wigia*) Heist., Ker (Amaryllidëen, VI. 1) *Narzissenschwertel* od. *Blutlilie* (zu Ehren d. Fam. Brunswick, Paxton, n. d. engl. Dynastie v. Braunschweig, *Wtst.*), z. B. *B. Josephinae* Red. (*Amaryllis gigantëa* Mar.), s. *Haemanthus* u. *Buphane* Herb.

- Brya** P. Br. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) „de Bry's“ od. falsches (grünes) Ebenholz (n. Joh. Th. de Bry, Nat. in Lüttich, † 1617).
- Bryacēae** Schimp. u. -inae Schimp. Fam. u. Ord. der Knotenmoose, s. *Bryum* L.
- Bryanthus** Gmel. (Ericaceen, X. 1) „Moosblumen-“ od. Torf-Heide, *B. repens* Gm., s. *Erica* s. *Andromeda bryantha* Thb. L. (v. *βρύον* lat. *Bryum* u. *ἄνθος* — wie Moos ausseh. Str.), *B. erectus*.
- Bryodēa** (-des) Salisb. (Liliaceen, VI. 1) Mooslilie (*βρωώδης* moosartig) (*Bryocles* Salisb. bei Wittstein, v. *βρύον* u. *ζλέδος* Ruhm — Kaps. sehr vielsamig!), z. B. *ventricosa* Sal. s. *Hemerocallis coerulea* Andr. (*japonica* β. L.).
- 1) **Bryonia** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10 u. XXII. 3) Zaun- od. Gichtrübe, Entwin O. W., fr. *bryone* (*brionne*) od. *couleuvrée* (*herbe à la femme battue*, auch feu ardent), e. *bryony* (*briony*) u. *shank* (gr. *βρωονία* od. -*ώνη* üppig rank. Gew.). 2) **Bryonia** Mechoacanna *nigra* s. *Convolvulus Jalapa* „Jalapenwinde“. 3) **Br.** *nigra fruticosa* (Asperifolien, V. 1), s. *Tournefortia*. 4) **Br.** *alba geniculata* (Araliaceen, IV. 1), s. *Cissus*.
- Bryonopsis** Hassk., Arn. (Cucurbitaceen, XXI. 10) unechte Zaun- od. Gichtrübe (s. eb. u. *ὄψις* Aussehen), z. B. *erythrocarpa* Naud., fr. à fruits écarlates.
- Bryophyllum** Salisb., Hook. (Crassulaceen, V. 5) „Spross-“ od. „Keimblatt“, „Embryoblatt“, fr. *bryophylle* (v. *βρύον* keime, *φύλλον* Blatt — dies. keimt auf d. Erde liegend!), Zier. *B. calycinum* Sal.
- 1) **Bryopteris** (sc. *Lycopodium*) L. (Bärlappe, XXIV. 1) „Moosfarn“ (Namen für d. Bärlappe) (s. v., *περις* Farn). 2) **Bryopteris** Nees (Jungermanniac. XXIV. 2) (Lebermoose mit Blattunterläppchen).
- Bryum** Dill. L. (Moose, XXIV. 2) Knotenmoos (Birn-, Eichen-, Stamm-, Jungfermoos), fr. *brion* od. *bry* (*brye*) (gr. *βρύον* v. *βρύω* keime — üppige M. mit birnförmigen Kapselknoten!)
- Bubon** L. (Umbelliferen, V. 2) „Scham-“ od. Mutterharzdohle, Steineppich, fr. *persil de Macédoine* (*B. macedonicum* L.), *persil des rochers*, e. *parsley-pert* (*βουβών* Schamleiste — Pfl. geg. Bubonen od. Weichengeschwülste, Wtst.), *B. Galbanum* L. s. *Anisum africanum* Pluk. (Str. Cap.).
- Bubroma** Schreb. (Malvaceen, XVIII. 1) „Ochsenfrass“ (v. *βοῦς* u. *βρώμα* Speise — ordin. Cacao nur für Vieh), z. B. *Guazuma* Juss. (*Theobroma Guaz.* L.).
- Bucco** Wendl. (Rutac. Diosmeen, V. 1) Duftraute (*bucco* Nam. in Südafr.), z. B. *B. obtusa* Wendl. s. *Agathosma obt.* Bartl. (*Hartogia ciliaris* L., *Diosma ciliata* Lam.).
- Bucephalon** (-um) Plum. (Urticaceen, XXII. 4) „Ochsenkopf“ (*βοῦς* u. *ζεγλή*), *B. racemosum* L. s. *Trophis* (Batis Jacq.) *americana* L. „Futternessel“ (v. *τροφή* Nahrung).
- 1) **Bucēras** Mnch., Ser. (zu *Trigonella*) (Papilionaceen, XVII. 4) „Ochsenhorn“ (*βοῦς* u. *κέρας* Horn). 2) **Bucēras** P. Br. (sc. *Bucida*) Sw. (Combretac. od. Myrobalaneen, X. 1) Ochsenhorngriffel.
- Bucērātes** (zu *Astragalus*) Rchb. (Papilionac. XVII. 4) Kaffee-Stragel, *B. baeticus* L. (— als Surrogat) (s. eb.).
- Bucīda** L. (Combretac. od. Myrobalaneen, X. 1) „Ochsentöter“, Rindsgift, Kuhhornbaum D. (*βοῦς* u. *caedo töte*, in compos. *cīdo*, subst. *cīda*). *B. Bucēras* Sw., fr. *grisgris*, e. *oxe-bane* (*κέρας* Horn — Äste hornart.!).
- Buchnēra** (Büchnera) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Büchner'sblume“ (n. d. Nat. J. G. Büchner, schr. üb. d. Pfl. d. Voigtlandes), z. B. *Treibh. B. coccinēa* Scop. s. *Achimēnes cocc.* Pers. (*Gesneria pulchella* Sw., *Trevirania cocc.* W.). — *Büchnerēae* (sc. *Personatae*) Rchb.

- Buddlĕa** L. (-leya, -leia, -leja) autt. (Verbenac. od. Loganiaceen, IV. 1) „Buddle'sblume“ (n. d. engl. Bot. Adam Buddle), z. B. Zier. B. globosa L. (capitata Jacq.), curviflora Hook. Arn. (Japan), Lindleyana Fort. (Chin.) etc.
- 1) **Buettneria** Loeff. (Byttn. — Pers.) (Columniferen od. Büttneriaceen, V. 1) „Büttnerie“ (n. d. Prof. Dav. Büttner in Göttingen, † 1768), z. B. scabra Pers. u. carthagenensis Jacq. (Südamer.). — Büttneriaceae DC. Rchb. 2) **Büttneria** Duh. (Nyctagineen, V. 1).
- Buglossum littorĕum** Rumph. (Lobeliaceen, V. 1) „Küsten-Ochsenzunge“ ($\beta\omicron\upsilon\zeta$ u. $\gamma\lambda\omega\sigma\sigma\alpha$), s. Šcaevöla Lobelia L.
- Bugrĕna** DC. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) (zu Ononis DC.) „Ochsenkorn“ ($\beta\omicron\upsilon\zeta$ u. grĕnum Korn).
- Bugranoides** DC. (Legum. Genisteen, XVII. 4) (zu Ononis DC.) (s. eb. u. $\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\mu\alpha\iota$ gleiche).
- Bugŭla** Juss. ($\beta\upsilon\lambda\alpha$ T.) (Labiaten, XIV. 1) Günsel, fr. bugle i. q. Ajuga L. (fr. bugle latinis. = Ajuga, unbek. Etymologie!).
- Bulbine** W. (-na Dietr.) (Liliaceen, VI. 1) „Zwiebel-“ od. „Bollenlilie“ (v. bulbus Zwiebelknolle od. $\beta\omicron\lambda\beta\acute{\iota}\nu\eta$ d. Alten = Muscari comosum), z. B. frutescens L. u. annua W., s. Anthericum.
- Bulbocapnos** Bernh., Drej. (Fumariaceen, XVII. 2) „Knollen-Erdrauch“ (s. eb. u. $\kappa\alpha\lambda\upsilon\omicron\zeta$ Rauch, -knollenwurzl. Erdrauch), B. cavus Drej. = Corydalis cava Wahlbg. „Hohlwurz“.
- Bulbocastĕnum** T. (sc. Bunium) L. (Umbelliferen, V. 2) Ackernuss, Erdkastanie, fr. bulbocastane, terrenoix u. ernote, e. earth-nut (bulbus Knollen, castĕnum Kastanie).
- 1) **Bulbocodium** L. (Colchicaceen od. Melanthac., VI. 1) „Zwiebelglocke“, fr. bulbocode (v. bulbus u. $\zeta\omega\delta\iota\omicron\nu$ Glocke, Wst. v. $\zeta\omega\alpha\zeta$ dem. $\zeta\omega\delta\iota\omicron\nu$ Fell — rauhhäut. Zwiebel), z. B. vernum L. Frühlings-Lichtblume, Uchtblume (d. i. Fröhldämmerungs-), fr. Crocus rouge u. groin de cochon „Saurüssel“. 2) **Bulboc.** (sc. Narcissus) L. (Amaryllideen, VI. 1) Waldglöckchen, -narzisse, fr. campanelle (-nette), s. Bulbocodium campanula autt.
- Bulbophyllum** Lindl. (Bolboph.- P.-Th.) (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Knollenblatt“ od. „Blätterknolle“ ($\beta\upsilon\lambda\beta\omicron\varsigma$ lat. bulbus u. $\varphi\upsilon\lambda\lambda\omicron\nu$ Laubblatt — Wurz. m. falschen, blättrigen Knollen), z. B. occidentale Spr., s. Dinĕma Lindl. s. Epidendron polybulbon Sw.
- Bulgaria** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Ranzenbecherchen (bulga Sack etc. — Fruchtlager sackartig!), z. B. sarcoides, inquinans etc.
- Bulliarda** (-ia) DC. (Crassulac., IV. 4) Wasserniedlich (n. P. Bulliard, † 1796 z. Paris, s. d. Aut.), B. Vaillantii DC., s. Tillaea aquatica Lam.
- Bumelia** Sw. (Myrsineen od. Sapotac. Lucumeen, V. 1) Eisenholz, s. g. Hochstamm D. ($\beta\omicron\upsilon\mu\epsilon\lambda\acute{\iota}\alpha$ eine Eschenart!), z. B. B. Manglilla W., foetidissima L., tenax W., L. f. (Chrysophyllum carolinianum Jacq.).
- Buniadĕae** DC. Zackenschotenartige, s. Bunias.
- Bunias** L. (Cruciferen Buniadeen, XV. 2) Zackenschote, -kraut O. W., Bergkohl, Meersenf D., fr. buniade (gr. $\beta\omicron\upsilon\nu\acute{\iota}\alpha\zeta$ kegelf. Rübe, Wst. v. $\beta\omicron\upsilon\nu\omicron\zeta$ Hügel — wächst auf solchen), z. B. B. Erucago L. (Eruca monspeliaca Bauh.) u. spinosa L. (Crambe spinosissima arabica Shaw), syriaca W. (Anastatica hierochuntica Crantz s. syriaca Jacq.), s. g. „Jerichorose“. — Buniadĕae DC.
- 1) **Bunium** L. (zu Carum) Rchb. (Umbelliferen, V. 2) Ackerkümmel, Knollendolde Leun., fr. bunion (v. $\beta\omicron\upsilon\nu\omicron\zeta$ Hügel u. Brüste — knoll. Form d. Wurzel), B. Bulbocastĕnum Koch (s. d.) „Ackernuss“, fr. terrenoix. 2) **Bunius** (s. Aethusa) L. (Umbellif., V. 2) Bergkümmel, s. Carum Bunius L. (Saxifraga montana minor Moris.). 3) **Bunius** (sc. Stilago) Burn. (Stilagineen, XXII. 3) Brüste-Griffelbaum (s. v.).
- Bupthalmĕae** Less., DC. Öchsen- od. Rindsaugen, s. sogl.

- Buphthalmum** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Ochsen“- od. „Rindsauge“, fr. buphthalme od. oeil de boeuf, e. ox-eye (βοῦξ u. ὄφθαλμός Auge), Zier. grandiflorum L., cordifolium Waldst. s. speciosissimum Schreb., s. Telekia cordif. DC., speciosissimum L., salicifolium DC., aroescens L. (Asteriscus frutescens Dill.) (Amer.).
- Bupleurum** L. (Umbelliferen, V. 2) Hasenohr, eig. „Ochsenlunge“ (od. -rippe), fr. oreille de lièvre, e. hare's-ear (s. v. u. πλευρόν Seite, Lunge, Rippe), z. B. Gartenstr. fruticosum L. u. perfoliatum L., fr. perce-feuille, s. Buprestis fruticosa Spr. s. sogl.
- Buprestis** Spr. (Umbelliferen, V. 2) Strauch-Hasenohr (gr. βούπορησις ein Käfer u. eine Pfl. d. Griechen, v. ποιῶ blühe auf — Wirk. d. Pfl. auf d. Rindvieh!), B. fruticosa Spr. (Tenorea frut. ds.), s. Bupleurum fr. L. (Orient u. Südeur.).
- Burchellia** R. Br. (Lonicereen od. Rubiaceen, V. 1) Büffelholz, -horn (n. d. engl. Reis. in Südafr. W. J. Burchell, schr. 1822 Beschreib. etc.), B. capensis R. Br. s. Lonicera bubalina L. (Cephaelis bub. Pers.).
- Burlingtonia** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Burlingtonie“, Gräfin Burlington's Prachtorchis (z. Ehr. d. liebl. Countess Burlington), z. B. rigida Lindl., fragrans Rchb. f. (Bras.).
- Burmannia** L. (Hämodorac. od. Amaryllideen, VI. 1) „Burmannie“ (n. Joh. Burmann, Prof. in Amsterdam, s. d. Aut.), z. B. Gewächsh. disticha L. (Ceyl.), biflora L. (Tripterella coerulea Elliott) (Virgin.). — Burmanniaceae Bartl. (zu Ensatae) DC.
- Bursaria** Cav. (Violarien od. Pittosporaceen, V. 1) „Taschenblume“ (bursa Börse od. Tasche — bez. d. Kapsel!), z. B. spinosa (Str. Neuholl.).
- Bursēra** Jacq., Schreb. (Terebinthac. Amyrideen, XXIII. 2) Chibou- od. Weissgummibaum, Sinarubab. D., fr. chibou u. gommier (n. Joach. Burser v. Kamenz in Neapel zu Ende d. 16. Jahrh.), B. gummifera L., fr. gomart (Westind.), acuminata W. etc., s. Terebinthus major etc. — Burseraceae DC., -serae (sc. Terebinthaceae) Rchb.
- Butēa** Roxb. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Bute's“ Bohne (n. John Earl of Bute, schr. Botanical tables, 9 Bde. in nur 12 Exempl., ein Prachtwerk), z. B. frondosa Rxb. (Erythrina monosperma Lam., Plaso Rheed.), superba peltata Rxb. etc. (Ind.).
- Butomacēae** Grck., -tomēae Rich., DC. (zu Helobiae DC.) Wasserliesche Leun., s. sogl.
- Butōmus** T., L. (Hydrocharideen od. Butomeen, IX. 3) Wasserliesch, -viole, Blumenbinse, Schwanenblume, Kameelheu, fr. butome, jonc-fleuri (-odorant), e. water-violet (-gladiole), flowering-rush (gr. βούτομος v. βοῦξ u. τόμος v. τέμνω schneide ab — „Ochsenchnitt“ — näm. weiden sie ab!), B. umbellatus L., fr. butome ombellé, e. water-violet umbellate.
- Butonīca** Juss., Lam. (Myrtaceen, XII. 1) „Ochsenkraft“ (βοῦξ u. τονιζός v. τόνος Stärke etc., Wst. v. buton Name d. Baums auf d. Molukken, baeton im Malayschen), z. B. terrestris rubra Rumph. (Eugenia acutangula L.), speciosa Juss. (Barringtonia sp. L.).
- Butyrospermum** DC. (Sapotaceen, VI. 1) „Buttersamen“, -baum (v. βούτυρον Butter u. σπέρμα Samen), B. Parkii s. Micadania R. Br. Scheebaum, Mungo-Park (Sudan).
- Buxbaumia** L., Hall. (Moose, XXIV. 2) „Buxbaum's“-M., fr. buxbaume (n. d. Nat. u. Reis. J. Chr. Buxbaum, † 1730 bei Merseburg). — Buxbaumiaceae Schimp.
- Buxēae** DC., Rchb. (-acēae Klotzsch, Grck.) (zu Butaceae Euphorbiaceae Rchb.) Buxgewächse Grck., s. sogl.
- Buxus** L. (Rutac. Euphorbiac. od. Trikokken, XXI. 4) „Bux“- od. „Buchsbaum“, fr. buis (bouis) od. bois-béni, e. box-tree (gr. πύξος v. πυξός fest — weg. d. Holzes, od. πύξις BÜchse, Wst., wozu verarb.), Zier.

- B. sempervirens* L., m. d. Formen arborescens u. suffruticosa („Staudenbux“); v. v. von arborescens: myrti-, thymi-, angusti-, rotundifolia etc., *B. balaërica* Lam. s. arborëa ds., etc.
- Byra-Ebēnus** Antillen-Ebenholz, s. Ebēnus (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) (vaterl. byr).
- Byssacēi** Rehb. Faser- od. Schimmelpilze, s. sogl.
- Byssus** Dill., L. (Schimmelpilze, XXIV. 4) Gruft- od. Schwindschimmel, Haar- od. Staubaftermoos D., fr. byssus u. fleur d'eau „Priestley'sche Materie“ (gr. βύσσοσ Flachs, feinste Faser etc.), z. B. antiquitatis L., Jolithus L. „Veilchenstein“ (— rot. Steinüberz. v. Veilchengeruch).
- Bystropōgon** l'Hér., W. (Labiaten, XIV. 1) Kelch- od. „Stopfbart“, fr. bystropoque (v. βύστροα d. Stopfen, πώγων Bart — Krone durch Haare verstopft!), z. B. suaveolens l'Hér. (Hyptis s. Pers. u. Mesosphaerum hirsutum P. Br.) etc., s. Mentha, Heliotropium canariense Mill.
- Byttneria** Loefl., s. Büttneria L., Pers.
- Cabomba** Aubl. DC. (Nymphaeaceen, XIII. 1) Haar-Nixe (v. d. hebr. kab Hohlmass, Wtst. arab. Name, — d. untergetaucht. Blätt. haarspaltig!), C. aquatica Aubl. (Nectris aq.), peltata F. Müll. — Cabombëae Rich. (zu Nymphaeacëae DC. od. Helypeltidëae Bartl).
- Cacalia** L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) Pestwurz, fr. cacalie, e. butterbur (κακαλία Diosc. Huflattich, viell. v. κακός schlimm u. λίαν sehr — bös. Unkraut!), z. B. alpina W. (Tussilago Cacalia Scop., Adenostylis viridis Cass.), fr. c. des alpes, Zier. C. Kleinia L. canarische, sonchifolia L. (coccinea Sweet) m. v. aurantiaca Hort., s. Emilia sagittata Cass., fr. c. écarlate, e. scarlet-Cacalia. — Cacialiëae DC.
- Cacão** T. (-ão Wtst.) (sc. Theobrōma) L. (Büttneriaceen, XVI. 4) „Cacaobaum“ (vaterl.), C. guianensis Aubl. = Theobr. Cac. L., fr. cacaoyer (-caotier), e. cacao-tree.
- Cachrys** L., Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Gersten“- od. Nussdolde (καχρυς Gerste — Samenähnlichkeit od. v. κάω brenne, n. Plinius — brennendschmeck. Samen!), C. maritima Spr. (Crithmum marit. L. f.), odontalgica Pall., microcarpa Spr., etc., s. Rumia Hoffm.
- Cacoucia** Aubl. DC. (Combretac. od. Myrobalaneen, XI. 1) „Cacoucie“, fr. cacouier (vaterl.), C. coccinea (Schousbaea c. W.) (Schlingstr. Guiana).
- Cactëae** DC. (-ti Juss.) Cactusartige, fr. cactoïdes (zu Ord. od. Kl. Peponifërae Kürbisfrüchtige, Endl.).
- Cacti** Juss.: a) Melocacti, b) Echinocacti, c) Mamillariae, d) Opuntiae, e) Cerëi, f) Epiphylla, g) Rhipsales.
- Cactus** L. (Cacteen, XII. 1) Fackeldistel, fr. cacte, cardasse (gr. κάκτος v. κάζω behandle übel od. κακοῦμαι bin verletzt, Wtst. — weg d. Stacheln!), z. B. coccinellifer L. (Opuntia c. T.) Cochenillen-C. od. Nopal, fr. raquette, C. Ficus indica L. indian. Feige, e. pimpillo, C. alatus L. (Epiphyllum al. Haw.) „Flügel“-C., C. truncatus Lk. (Epiph. trunc.) stutzästiger, C. speciosus Cav. (-sissimus Desf.) = Cerëus specios., fr. cierge specieuse, C. grandiflorus L. (Cerëus gr.), s. g. Königin d. Nacht, fr. serpent, C. Melocactus L., fr. melonchardon, C. triangularis L., fr. liane à vers, u. s. f.
- Cadaba** Forsk. (Capparideen, V. 1) „Cadaba“-Kapper (v. d. arab. kadhab), z. B. farinosa Forsk. (Bornu, glücl. Arab.), s. Stroemia far. Vahl, C. glandulosa Forsk. (Stroemia gl. Vahl) etc.
- Caestina** s. Coelestina!
- Caesalpinia** Plum., L. (Legumin. Cäsalpinieen od. Cassieen, X. 1) Brasilienholz, Fernambukholz, e. brasil-wood (fernambuck-) (n. d. Aristol-

teliker Cäsalpinus Aretinus 1519—1603, s. d. Aut.), z. B. C. echinata Lam. rotes Bras., C. (Haematoxylon) campechiana L. Campecheholz, e. campeche (-pesh) od. indian wood, C. Sappan L. Java- od. Bimas-Rotholz, C. vesicaria L. Brasilienholz, fr. brésillot. — Caesalpinieae (sc. Cassiäe) R. Br., Rchb.

- Caesia** R. Br. (Liliaceen, VI. 1) „Cäsus“-Lilie (n. d. Nat. Friedr. Cäsus, schr. tabulae philos. etc. Romae 1651), z. B. vittata, corymbosa etc. R. Br. (Neuholl.), s. Anthericum pusillum etc.
- Caesulia** Roxb. (Compos. Rolandreen, XIX. 5) „Tretblume“ (v. caesus erschlagen, οὐλῆ Narbe — wie zertreten ausseh. Pfl. Paxton, Wtst.: malabar. Namen!), C. orientalis Rxb. (Meyera or. DC.), radicans W. (Meyera guineens. Spr.), s. Cryphiosperum reptans (ζοίφιος versteckt — „kriechend. Verstecksamen“). — Caesuliäe DC.
- Cajanus** Spr., DC. (Cajan Ad.) (sc. Cytisus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Taubenbohne (v. d. malab. catjang = Taubenfutter, Paxton), z. B. Kalth. C. tricolor, argentëus, C. scarabaeoides P. Th. = Dolichos Catjang L. ind. Bohnenstr., etc., s. Cytisus.
- Cajophora** Presl (Loasaceen, XIII. 1) „Brennkraut“ (v. Caja Nesselbär od. Juckhaarraupe, v. καίω brenne — Paxton u. Wtst. — weg. d. Brennhaare unangreifb.!), C. lateritia Presl (Loasa lat. Jacq. s. aurantiäca Hook.).
- Cakile** T. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Meersenf, Rocket OW., fr. caquillier u. roquette de mer (v. κακός schlimm, ἴλη Knäuel od. κίλη Geschwulst, Wtst.? Leun: arab. Wort!). — Cakilinäe Rchb.
- Caladenia** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Schöndrüse“ (καλός u. ἄδην, -έρος Drüse — Glandelreihen auf d. Lippenscheibe!), z. B. alba, carnëa, coerulea etc. R. Br. (Neuholl.).
- Caladium** Vent. (Araceen, XXI. 1) Schönblatt-Aron (καλός u. ἄδην genug, sehr, Vilm. u. Wtst. aus ein. indisch. Wort geb.), z. B. Zier. C. esculentum Vent. karaïbischer Kohl od. Tarro, essb. Zehrwurz, fr. chou caraïbe od. calocasie, auch taro (tallo, tayó) u. gouet comestible, e. eatable cole, violacëa Desf. u. macrorrhizon (Stube). C. seguinum Vent. Schierlings- od. Schweigrohr, fr. sogue od. cigue (lat. cicuta Schierling).
- Calamagrostis** Roth, Ad. (Gräser, III. 2) Reith- od. Schilfgras (v. calämus Schilfrohr u. ἀρωστός Gras), z. B. litorëa DC., epigeios Rth. „Land“-Sch. etc.
- Calamariae** Endl. Kl. d. Schafffarne (s. eb.).
- Calamita** P.-B. (Gräser, III. 2) Riesenrohr (gr. καλάμιτος von Halmen od. Rohr), z. B. gigantëa P. B. = Apluda gig. Spr.
- Calamintha** Pursh, Mch. (Labiaten, XIV. 1) „Schönminze“, Basiliensquendel Leun., Kölme O. W., fr. calament, e. calamint (καλαμίνθη v. καλός u. μίνθα lat. mentha Minze od. Münse!).
- Calamites** Suck. (foss. Equisetaceen) foss. Schafthalm, „Calamit“ (gr. καλαμίτης z. Halm gehör.).
- Calampelis** D. Don (Bignoniaceen od. Sesameen, XIV. 2) „Schönrebe“, Hängfrucht (καλός u. ἀμπελις Rebe etc.), z. B. Zier. C. scabra Don, fr. bignone du Chili, e. rough-podded E., s. Eccremocarpus scaber Rz. Pv.
- 1) **Calämus** (sc. Acörus) L. (Juncaceen od. Acoraceen, VI. 1) „Kalamus“, deutscher Zittwer, fr. acore, e. wild ginger (v. d. arab. kalam od. Wtst. kalem, lat. calämus Rohr, Halm). 2) **Calämus** L. (Palmen, VI. 1) Schilf- od. Rotangpalme, s. g. spanisches Rohr, fr. rotang (rotin u. raton), e. ratan, auch s. g. Palmried, Zier. C. Draco W. Drachen-Rotang, s. g. Drachenblut.
- Calandrinia** H. B. K. (Portulacaceen, XI. 1) „Calandrinie“ (n. dem schweizer. Bot. J. L. Calandrini, schrieb Thesen etc. 1734), z. B. Topf.

- C. umbellata DC., grandiflora Ldl. (glauca Schrad.), speciosa Ldl., discolor Schrad. (elegans Hort.) etc., s. Talinum Ad.
- Calanthe** Lindl., R. Br. (Orchid. Vandeën, XX. 1) „Schönblüte“ (s. v. u. ἀρχή — schöne Bl., besond. gross. Labell! Wtst.), z. B. angraeciflora Rehb. f., veratrifolia R. Br. (Limodorum v. W.), purpurea Ldl. (Ceyl.) etc.
- Calathëa** G. F. W. Mey. (Scitamineen od. Marantaceen, I. 1) „Korb lippe“ (v. κάλαθος Handkorb — Form d. hohl. Labells! Wtst.), z. B. zebrina Mey. (Maranta z.), leopardina Reg., lutea Spr. etc.
- Calbõa** Van Houtt. (Convolvulaceen, V. 1) „Calboe“, Langfaden (n. J. Calbo, span. Arzt in Valencia, 16. Jahrh.), z. B. globosa, s. Macrostema Pers.
- 1) **Calceolaria** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Pantoffelblume“, fr. calceolaire, e. calceolaries (v. calceolus kleiner Schuh), z. B. Zier. rugosa Rz. Pv., Youngii hybrida Hort., scabiosaefolia Sims, plantaginea Sm. 2) **Calceolaria** Loeffl. (sc. Viola) L. (Violarien, V. 1) Pantoffelveilchen.
- 1) **Calceolus** (sc. Cypripedium) L. (Orchideen, XX. 1) „Frauensschuh“ (calceolus dem. v. calcus Schuh). 2) **C. Benth.** (Labiaten, XIV. 1) „Schuhchen“, s. Plectranthus l'Hér. u. Germanea Poir.
- 1) **Calcitrãpa** G. (sc. Centauria) L. (Comp. Centaureen, XIX. 3) „Fersengel“, s. g. Sterndistel, fr. chausse-trape (v. calx, -cis Ferse, trapa Fussangel, fr. trape — weg. d. lang. Kelchstacheln!), s. Calc. Hippophaestum G. (v. ἵππος Pferd, φαιστός leuchtend). 2) **C.** (sc. Centranthus) DC. (Valerianeen, III. 1) Stachelspornblume, s. Valeriana Calcitr. L. (— weg. d. stachelform. Nektarien!).
- Caldcluvia** G. Don (Corniculaten Cunoniaceen, VIII. 2) „Caldcluvie“ (n. Alex. Caldclough, Samml. in Chili 1819—25), C. paniculata Don, s. Weinmannia p. Cunn.
- Calëa** R. Br. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Schönaster“ (?) (καλός? od. st. Callea, Hahnenbart, gr. κάλλεα, lat. palea Bart, Kamm d. Hahns, Rieme? — unsicher, viell. v. G. Caley, st. Caleya! s. sogl.), z. B. solidaginea R. Br. „Schönrute“ (?), lobata Ow. (Conyza l.), javanensis Spr. (oppositifolia L.), s. Isocarpha opp. R. Br.
- Caleãna** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Caley's“-O., s. Caleya Ait. (n. George Caley, Insp. d. bot. G. St. Vincent, Reis. in Austral. anf. dies. Jahrh.).
- Calcestasia** R. Br. (Juncaceen od. Bromeliac., VI. 1) Blaubinse, Ananasbinse, C. cyanea R. Br. (Str. Neuholl.), s. Huttia elegans (v. καλός u. ἐξοτασις d. Ausrecken — Saum d. Blumendecke bild. einen Stern! Wtst.). — Calcestasiæe Endl.
- Calendula** L. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) Regenrose, Ringel- od. Totenblume Vilm., fr. calendule u. souci, e. marigold (corn-gold) (dem. v. calendae Kalender — zeigt Regen an!), z. B. C. arvensis L., Zier. C. officinalis L. m. v. v., z. B. ranunculoides, v. Meteor, v. fl. pleno Hort., fr. souci-double des jardins, e. double-flowering common marigold, v. complanata Hort., fr. Le Proust, e. level-marigold; C. pluvialis L. s. hybrida Sweet (Meteorina gracilipes Cass.) m. v. fl. pl. — Calendulacæe Rehb.
- Calepina** Ad. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Schötchen-Löffelkraut, Brachsötchen, Wendich O. W. (st. Chalepina i. e. Pf. aus Chalep od. Haleb [Aleppo] in Syrien).
- Caleya** Ait. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Caley's“-O., s. Caleana R. Br., z. B. major u. minor R. Br. (Neusüdwaes). Vgl. Caleana!
- Calimëris** DC., Nees (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schönschnitt“, fr. calimëride (καλός u. μερίς Schnitt — elegant geschn. Blätt., Wtst. Anthodium aus 2 bis 4 Reihen krautiger Schuppen!), Zier. C. incisa

DC. (Aster inc. Fisch.), fr. c. à feuilles incisées, e. cut-leaved c., s. Aster Cassiarabicus.

- Calinča** Aubl. (Dilleniaceen, XIII. 4) Raspelstrauch (v. *καλινός* hölzern, v. *κάλον* Holz, Wtst. guian. Name!), z. B. scandens Aubl. s. Tetracera Calinea W. (Doliocarpus Cal. F. Gmel.).
- Calla** L. (Araceen, XXI. 1) Schlangenwurz Seub. (Drachen-), Dutenbeere, fr. calle (chou-calle), e. dracón's-wort (v. *κάλλος* Schönheit? st. Cala v. *καλός* schön?), z. B. C. palustris L. Wasser-Aron, fr. c. des marais, e. marsh-Calla. Stube: C. aethiopica L. (Richardia aeth. Kth.). — Callacæe DC. Bartl. (zu Ord. Aroïdeae Bartl.) Callagewächse.
- 1) **Callicarpa** L. (-us autt.) (Labiaten od. Viticeen, IV. 1) „Schön“- od. Wirbelbeere, fr. callicarpe (*κάλλος* s. eb. u. *καρπός* Frucht etc.), z. B. Zier. Murasacki (fälschl. Deutzia gracilis), purpurea (Porphyrea dichotoma Lour.), umbellata Lour. (Str. Cochinch.), americana L., arboræa Roxb. (Nepaul) etc. 2) **C. lanata** autt. (Lauraceen, XI. 1) s. Tomex tomentosa L.
- Callichröa** Fisch., Mey. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Schönfarbblümchen“, Schönstrahl Rmpl. (*κάλλος* u. *χρῶμα* Farbe etc. — schön gelbe Bl.!), z. B. Zier. C. platyglossa F. M., fr. c. à larges ligules, e. broad-tongued C. „breitstrahl.“
- Callioceca** Schreb., DC. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) „Schönbeere“, Brechwurz (s. v. u. *κόκκος* Korn etc.), C. Ipecacuanha Brotero, s. Cephaelis „Kopfbeere“, s. d.
- Calliöre** Lk. (Amaryllid., VI. 1) „Schönmädchen“ (s. v. u. *κόρη* od. *κόρη* [κοίρη] Mädchen).
- Calligonum** L. (Polygonaceen, XI. 4) „Schönknöterich“, s. g. Hackenkopf D. (s. v. u. *γόρυ* Knie, Knoten — st. d. Blätt. mit merkw. ausseh. Auswüchsen, Wtst.), z. B. asperum Lour. (Trachytella Callig. DC.), polygonoides Pall (Armen.), s. Pallasia l'Hér. (Pterococcus „Flügelkorn“).
- 1) **Calliopsis** Rchb. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Schön“- od. Mädchenauge (s. v. u. *ὄψις* Auge, Antlitz etc.), z. B. Zier. C. bicolor v. purpurea, v. nana, v. Drummondii T. u. Gr. u. marmorata, s. Co-reopsis tinctoria Bart. 2) **Calliopsis** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5) „Schöngesicht“, s. Eumorpha DC. (Pelargonium elegans, grandiflorum u. variegatum W.).
- Calliparia** Rchb. (zu Aconitum) Rchb. (Ranunculac., XIII. 3) „Schönwangen“-Sturmhut (*καλλιπαρεία* schönwangige), z. B. delphinifolia DC.
- 1) **Callirrhöe** Nutt., A. Gray (Malvaceen, XVI. 8) „Kallirrhöe“, „Schönfluss“-M. (n. d. Oceanide Kallirrhöe, d. i. „Schönfließende“, *καλός* u. *ὄρη* Fluss), z. B. digitata, pedata A. Gray (Nuttallia p. Hook., Sida p. Spr.), involucrata A. Gr. (Malva inv. Torr. Gr.) etc. 2) **Callirrhöe** Lk. (Narzisseen, VI. 1).
- Callisia** L. (Commelynaceen, III. 1) Schön-, Blau- od. Kriechlilie (s. v. u. fr. lis Lilie), z. B. C. repens L. s. g. Zärtling D.
- 1) **Callistachya** Sm. (-ys Vent.) (Cassieen Cäsalpinieneen, X. 1) „Schönähre“ (*κάλλος* u. *στάχυς* Ähre), z. B. Gewächsh. C. lanceolata Vent., ovata Bot. Mag. etc., s. Oxylobium Andr. 2) **Callistachya** Raf. (Scrophularineen, II. 1) s. Veronica virginica L.
- Callistemma** Cass., R. Br. (fehl. -stema!) (zu Aster) Rchb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schönkranz“, Schönkrone *κάλλος* u. *στῆμμα* Kranz, Krone — d. Borst. d. äuss. Pappus bilden einen solchen, Wtst.), s. Aster chinensis (sinensis) L. u. indicus L.
- Callistemon** R. Br. (Myrtaceen Melaleucaceen, XII. 1) „Schönfaden“,

Reiherbusch, Flaschenbürste (s. v. u. *στῆμων* ὁ lat. stamen Faden — sehr lange Staubfäden!), *C. speciosus* DC., *lanceolatus* semperflorens etc., s. *Metrosideros* G.

- Callithamnion** (-um) Lyngb. (Florideen-Tange, XXIV. 3) „Schönbusch“ (*Γαμβίον* dem. *Γάμνος*; Busch — stark verzweigte purp. Fäden!).
- Callitriche** L., W. (Onagreen Callitrichineen, I. 2) Wasserstern, eig. „Schönhaar“, fr. morgeline d'eau (s. v. u. *θρίξ*, *τοίχος* Haar). — Callitrichaceae Rchb. (zu Onagrariae Juss.).
- Callitris** Vent. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Schmuck-Cypresse (st. *Callitrix* gr. *καλλιθρίξ*, Wtst. *τοίξ* dreimal — dreizähl. Quirlblätter!), z. B. *australis* Vent.
- Callixène** Juss., Lam. (Smilacineen, VI. 1) „Schönfremde“, -myrte (*ξενός* fremd), z. B. *marginata* G. (Str. Südamer.), s. *Enargëa* marg. Schreb.
- Callocoeca** (sc. *Cordia*) L. (Convolvulac., V. 1) „Schönpflaume“, *Sebeste* (*κόκκος* Korn, Beere etc.).
- 1) **Callopisma** Mart. (Gentianeen, V. 1) „Schönsaft“-Blume (*ὄπισμα* Pflanzen-Milchsaft), z. B. *perfoliata* M., s. *Dejanira* Schlichtd. 2) **C. de Not.** (Flechten, XXIV. 3) „Schönsaft“-Fl. (Wtst. *ὄπισμα* Ansehen (?), *ὀπίζομαι* habe Acht!).
- Callūna** Salisb. (Ericaceen, VIII. 1) „Besenheide“, fr. *bruc* od. *bruyère*, e. heath, sweet-broom u. furze, z. B. *Zier. C. vulgaris* Sal. (*Erica* vulg. L.), e. common ling, m. v. v. (v. *καλλύνω* reinige — als Besen!). — Callunæae (sc. *Ericaceae*) Rchb.
- Calobotrya** Spach (zu *Ribes*) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) „Schöntrauben“-Johannisbeerstr. (*καλός*, *βότρυς*, -*νος* Traube), *Zier. C. s. Ribes sanguinèum* Pursh m. v. v. *atro-sanguinèum*, *coccinèum* u. *rosèum* Hort.
- Calocasia** fehlerh. st. *Colocasia*, s. ḍ.
- Calocëra** Fr. (-*cëras* Cord.) (Pilze, XXIV. 4) „Schönhorn“ (*κερός* od. *κέρας*; Horn), z. B. *essb. furcata* u. *viscosa* Fr.
- Calochilus** R. Br. (Orchideen, XX. 1) „Schönlippe“ (*χαίλος*; Lippe — hier Labell!), z. B. *campestris* u. *paludosus* R. Br. (Neuholl.).
- Calochortus** Pursh (Juncaceen od. Liliaceen, VI. 1) „Schöngras“-Lilie (*χόστος*; Gras, Futter — Kraut m. schönen Doldentrauben, Wtst.), z. B. *Zier. elegans* Pursh (*Louisiana*), *venustus* s. *ilacinus* Bak., *glauca* Reg., *splendens* Benth.
- Calodendron** Thb. (Rutaceen, X. 1) Rauten- od. „Schönbaum“ (*δένδρον* B. — schöne bleib. Blätt. u. fleischf. Blüten, Wtst.). *C. capense* Thb.
- 1) **Calodracon** Van Houtt. (Araceen, XXI. 1) „Schöndrachenwurz“ (*δράκων* Drachen), *C. nobilis* Van Houtt. 2) **Calodracon** Benth. (Labiaten, XIV. 1) zu *Dracocephalum* L. „Schöndrachenkopf“.
- Calogyne** R. Br. (Campanulaceen, V. 1) „Schöngriffel“-Glockenbl. (*γυνή* — Griff. dreispaltig, jede der drei Narben mit einer Decke).
- Calonyction** Chois. (Convolvulac., IV. 1) „Nacht“- od. „Pracht“-Trichterwinde (*νύξ*, -*ντος*; Nacht — über Nacht offen!), *Zier. C. speciosum* Chois. (*Ipomoea Bona Nox* L., fr. *Ipomée bonne-nuit* od. *Calonyction élégant*, e. excellent *Ipomoea*), *macrantholeucum* Colla s. *Ipom. mexicana* v. *grandiflora* alba Hort.
- Calophāca** Fisch. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Schönlinse“ (*φακός* od. -*νή* Linse), *Zier. vulgarica* Fisch., s. *Cytisus pinnatus* Pall. (*Colutea* volg. Lam., *Adenocarpus* wolgens. Spr.).
- Calophyllum** L. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 1) „Schönblatt“, fr. *calaba* (*φύλλον* Laubblatt — prächt. Bl.!), z. B. *Inophyllum* W. „Schönaderblatt“ (*Tacamahaca* W.) grosses Sch. W., *bourbon'scher* od. *grüner Balsam* Leun., *C. Madrunno* H. B. K. (Fruchtb.), *nagassarium* Burm., s. *Mesua ferrëa* Nagasbaum od. *ceylonsches Eisenholz*.

- Calopogon** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Schönbart“, Fransenlippe (*καύγων* ó d. Bart — auf dem Labellum). *C. pulchellus* R. Br., s. *Cymbidium* p.
- 1) **Calosanthus (-us)** Haw. (*Kalos.-* autt.) (Sedeen od. Crassulac., V. 5) „Schönblüte“ (*ἀνθή* od. *ανθος*), Zier. *C. coccinea* Van Houtt. 2) **Calosanthus** Blum. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Schönblütenrispe“ (— schöne endstünd. Blütenrispen!).
- Calospira** Ser. (Spiräaceen, XII. 4) „Schönspiräe“ (zu *Spiraea* L.), Zier. *callosa* Thb. s. *Fortunèi* Planch., *crataegifolia* Lk., *cuneifolia* W., *bella* Sims etc. (*σπείρα* lat. *spira* Windung).
- Calostemma** R. Br. (Amaryllideen, VI. 1) „Schönkrone“ (*στέμμα* Krone etc. — um d. Schlund d. Bl. ein röhr. Kranz od. zwölfzäh. Mündung), z. B. *Gewächsh. C. purpureum* R. Br., *lutèum* Ker, *album* R. Br. etc. (Austral.).
- Calothamnus** Lab. (Myrtac. Melaleucaceen, XVIII. 3) „Schönstrauch“ (*θάμνος* Strauch), z. B. *quadrifida* Lab.
- 1) **Calothyrsus** Spach (zu *Aesculus*) L. (Sapindaceen, VII. 1) „Schönstrauss“ (*θύσος* Strauss etc.), z. B. Zier. *californicus* Nutt. 2) **Calothyrsus** R. Br. (Proteaceen, IV. 1).
- Calotís** R. Br. (Compositen, XIX. 4) „Schönohr“, z. B. Zier. *brevisetä* Benth., *cuneifolia* R. Br. (Neuholl.) (*ὄϊς, ὠτός* Ohr — 2 häut. Ohrchen d. Samenkronen).
- 1) **Calotrópis** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Schönkiel“ (*τρόπις* Schiffskiel — d. Blättch. d. *corona* staminèa nachenförm. Wtst.), z. B. Zier. *procera* R. Br. e. *mudar*, Riesenwachspfl. od. grosse Schwalbenwurz (Ind.), s. *Asclepias gigantèa* L. 2) **Calotr.** Don (Papilionaceen, XVII. 4) (— grosse *carina*!).
- 1) **Calpodendron** (sc. *Mespilus*) Ehrh. (Pomaceen, XII. 4) „Urnenbaum“ (*κάλλος* Gefäss etc., *δένδρον* B.), s. *Crataegus pyriformis* W. (Nordamer.). 2) **Calpod.** subgen. v. *Crataegus* Lauch. Scheinmispeln, z. B. *Cr. grandiflora* C. Koch, *mexicana* Moc. u. a.
- 1) **Caltha** L. (Ranunculaceen, XIII. 7) Dotterblume, Schmalz- od. Butterblume, fr. *populage*, *coccusæu*, e. *marsh-marigold* u. *cucullate-flower* (v. *κάλαθος* Handkorb), z. B. *C. palustris* L. m. v. fl. pl. Hort. 2) **Caltha** G. Frank (Compos. Calendulac., XIX. 4), *C. vulgaris* st. *Calendula arvensis* Acker-Regenrose. — *Calthæa* Rchb.
- Calycanthæe** Rchb. Kl. d. „Kelchblütigen“; *Calycanthæe* DC., Rchb. (sc. *Nyctagineæ*) Ldl. *Calycanthus*artige.
- Calycanthinae** DC. Bartl. Ord. d. „Kelchblümmler“ Leun. i. q. *Calycanthæe* Rchb.
- Calycanthus** L. (Nyctagineen *Calycantheen*, XII. 5) Würz- od. Gewürzstrauch, eig. „Kelchblume“, fr. *calycanthe*, e. *allspice* (*κάλλιξ, -κος* Kelch, *ἄνθος* — Kelch gefärbt wie eine Krone!), z. B. Zier. *C. floridus* L. (*sterilis* Walt.), fr. c. de la *Caroline*, *praecox* L. s. g. Winterblume, *laevigatus* W. (*ferax* Mchx.).
- Calycëra** Cav. (Compos. Amphicarpantheen, od. *Calycereen*, XIX. 4) „Kelchhorn“ (s. eb. u. *κερὸς* Horn — Kelchtheile hornförm., Wtst.). — *Calyceræe* R. Br., DC.
- Calycifloræ** Endl., DC. Kl. d. „Kelchblütigen“ (Endl. zu *Dialypetalæe* als Cohorte).
- Calycotome** DC., Lk. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Kelchschnitt“ (s. v. u. *τομή*) Schnitt — nach d. Abfallen d. Bl. wie abgeschnitt.), z. B. Zier. *villosa* Poir. (*Cytisus lanigerus* DC., *Spartium* l. Desf.), fr. *cytise laineux*, *spinosa* Lk. (*Spart. spin.* L.) etc.
- Calymenia** Nutt. = *Calyxhymenia* Orteg., s. d.

- Calyplectus** Rz. Pv. (st. Calycopl.-) (Salicariaceen, XII. 1) Falten-, Drehod. „Schlingkelch“ (*πλεκτός* gedreht etc. — gefalt. Kelchsaum!), z. B. *acuminatus* R. P. (*speciosus* Kth., B. Peru).
- 1) **Calypso** Salisb. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Calypso“, „Hüllen“-O. (v. *καλύπτω* verhülle = Calypso Myth., Oceanide od. Meernymphe — einz. schöne Endblüte), z. B. *borealis* Sal., s. *Cymbidium* b. Sw. (Norna bor. Wahlb., *Cypripedium bulbosum* L.). 2) C. P. Th. (Hippocrateen od. Malpighieen, Theaceen, III. 1) (- das \subseteq versteckt in d. Blüte!).
- 1) **Calyptranthes** Schreb., Sw. (-us Juss.) (Myrtaceen, XII. 1) Deckelmyrte Leun., „Schleierblüte“ (v. *καλύπτω* Haube etc., *ἀνθή* od. -ος — Kelchdeckel fällt b. Aufgehen ab!), z. B. *brasiliensis* Spr. s. *paniculatus* Spr. (nicht Rz. Pv.), *caryophyllata* Pers. (Myrtus car. Sw.) nägleinart. Myrte M. Rchb. 2) **Calyptranthus** P.-Th. (Capparideen, XIII. 1), s. *Capparis panduriformis*.
- Calypttraria** Naud. (Melastomaceen Davyeen, X. 1) „Schleierblume“ (s. v.), z. B. *Zier. C. haemantha* Van Houtt., s. *Melastoma Mutisii* Bpl., *Calyptrella* Naud.
- Calypttrion** Ging. (Violaceen, XIX. 6) „Schleierveilchen“ (s. v. u. *ἴον* Veilchen — d. unt. Kronblatt wie eine Haube!), s. *Corynostylis Berterii* Mart.
- Calyptrocalyx** Blum. (Palmen, XXI. 6) „Kappenkelch“-P. (s. v. — Kelchblätt. kappenförmig!).
- Calyptrostigma** Trautv., Mey. (Lonicereen, V. 1) „Haubennarbe“ (s. v. u. *στέγμα* Narbe etc.), z. B. *C. Middendorffiana*, s. *Diervilla* Carr. u. *Weigela* Midd. Hort.
- Calyptrophyllum** Bung., Mey. (Lonicereen, V. 1) „Kelchknöchel“ (*ἀλύξ*, -ος u. *σφινδόν* Knöchel, Ferse — Kelchröhre stiel.), z. B. *Zier. roseum* Mey m. v. v., e. rose-coloured *Diervilla*, s. *Diervilla* s. *Weigela rosea* L.).
- Calystegia** R. Br. (st. Calycost.-) Lour. (Convolvulaceen, V. 1) Bärenwinde, fr. *calystégie*, e. bear-bind (v. *ἀλύξ*, -ος u. *στέγη* Decke etc. — Bl. in zwei schön. Brakteen eingeschl.!), z. B. *sepium* (Convolvulus sep. L.) Zaunwinde, fr. *manchette de vierge*, *Zier. pubescens* Lindl. u. *dahurica* Chois.
- Calythrix** Lab. (st. Calycothrix) Schauer (Myrtaceen, XII. 1) „Kelchhaar“-M. (s. v., *ῥοιξ* Haar), z. B. *conferta* Schau., *tetragona* Lab., *glabra* R. Br. (Neuholl.).
- Calyxhymenia** Orteg. (**Calymenia** Pers.) (Nyctagineen, III. 1) „Kelchhautblume“, s. g. Sauerwurz (*ἀλύξ* u. *ἔμψυ*, -έρος Häutchen — kelchförm. Involutum), s. *Oxybaphus l'Hér.* s. *Mirabilis* Cav.
- Camāra** Plum. (sc. *Lantāna* L. (Verbenaceen, II. 1) Schneeball-Verbene, amer. *Lantane*, s. g. Wandelröschen, fr. *camara* „Gewölbstr.“ (v. *καμάρα* Wölbedecke, Wtst. südamer. Name!), ferner *Zier. C. arborescens* *Salviae folio* Plum. = *Lantāna odorata* L., Ait.
- Camarēa** A. St. Hil. (Malpighiaceen, X. 3) „Camaree“ (n. Don Man. *Fereira de Camara* Bethencurt e Sa, Dir. d. Diamanten-Distr. in Brasilien).
- Camaridium** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Wölb“-O. (s. v. u. *εἶδομαι* gleiche — Unterlippe concav), z. B. *ochroleucum* Ldl., *purpureum* Spr. etc., s. *Cymbidium ochrol.* Sw. u. *vestitum* Sw.
- Camarophyllus** Kumm. (Pilze, XXIV. 4) „Krebs“- od. „Garnelenpilz“ Kumm. (*cammarus* od. *gammarus* Garnele, *κάμμαρος* Krebs), z. B. *essb. virginicus*, „Jungfern“-P. (viell. „Wölblblatt“, s. v. — Lamellen sehr weitläuf. Kumm.).
- Camarōtis** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Wölbohr“ (s. v. u. *οὐζ*,

ὠτὸς Ohr od. *ζαμαρωτὸς* gewölbt — Labellspitze gewölbt), z. B. purpurea Ldl. (Sylhet, Ostind.).

Camassia Lindl. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Schönblumen-Lauch (n. d. amer. Wort quamash od. camass, eine schöne, grosse Blume), z. B. *C. esculenta* Ldl., fr. *camassie comestible*, e. *eatable C.*, s. *Anthericum* esc. Spr., *Phalangium* esc. Nutt., *Scilla* esc. Hook.

Camax Schreb. (Proteac. od. Asperifolien, IV. 1) Pallisadenholz (v. *ζάμαξ* Stange etc.), z. B. *C. fraxinea* W., s. *Rapourea* Aubl.

1) **Cambessedea** W. (Terebinthaceen, X. 1) „Cambessedie“ (n. *Cambessedes*, s. d. Aut.), *C. simplicifolia* Kth. (Mauria s. Kth., Str. Peru).

2) **Cambessedesia** DC., Mart. (Melastomac. X. 1), z. B. *purpurata* DC.

Cambogia L. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 1) Gummiguttbaum, fr. guttier u. camboje, e. gamboge, *C. Gutta* L., s. *Stalagmites cambogioides* W. (gutta Tropfen — hervorquell. Saft!) (n. d. indisch. Gebiet Camboge jens. d. Ganges).

Camelina Crantz (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Leindotter, fr. *caméline* od. *sésame bâlard* (— d'Allemagne), e. dotter u. gold-pleasure (st. *Chamaelina*, v. *ζαμαί* an der Erde u. *λίνον* Lein — Flachsunkraut!), s. *Myragrum* L. — *Camelinæ* Rehb. Leindotterartige.

Camellia L., Ker (Theaceen Camellieen, XVI. 8) „Camellie“ (n. d. mähr. Jesuiten G. J. Kamell, latin. *Camellius*, auf Manilla), Zier. *C. japonica* Ker, jap. Rose, Stuben: v. v. *paeoniaeflora*, *alba plena* u. *anemoniflora alba*, *axillaris* Sims (*Gordonia anomala*). — *Camelliaceae* DC., -æ Rehb.

1) **Cameraria** L. (Apocynen, V. 1) „Camerarie“, fr. *caméraire* (n. d. nürnberg. Arzt u. Bot. Joach. Camerarius, s. d. Aut.). *C. dubia* Sims (*Wrightia* d.), *lutæa* Lam. (*Tabernaemontana odorata* Vahl).

2) **Cameraria** Dill., Mch. (Portulacac. Samoleen, III. 3), s. *Montia*.

Cammaroidæa (zu *Aconitum*) Rehb. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Cammarum“-Sturmhut (s. sogl.), z. B. *cernuum* s. *flexicaule* Hoppe.

Cammarum DC. (-us Jacq.) (sc. *Aconitum*) (Ranunculaceen, XIII. 3) „Krebs“- od. „Käfer“-Sturmhut (v. *ζάμμαρος*; lat. *gammärus* od. *camm.*-, Krebs od. Käfer — weg. d. ober. Teils d. Krone, d. ein. gekrümmten Krebschwanz gleicht).

Camissonia Lk. (st. Chamiss.-) (Oenothereen Gaureen od. Onagrarien, VIII. 1) „Chamisso“-Kerze (n. d. Dicht. u. Bot. Chamisso), z. B. *C. flava* Lk.

Campanula L. (Campanulaceen, V. 1) „Glockenblume“, Glocke O. W., fr. *campanule* od. *gantelée*, fleur en clochette, e. bell-flower, cantonbury-bell (dem. v. *campāna* Glocke), z. B. Zier. (Ampelpfl.) *fragilis* Cyrill., Topf. *turbinata* Schott, Gartenbl. *C. Medium* L. *Mariette*, fr. *mariette*, *Carillon* od. *Violette de Marie*, e. *coventry-bell* od. *mariet*, violet-marian, *pyramidalis* L., *nobilis* Ldl., *carpathica* Jacq., *macrostylia* Boiss. etc., wild. in Wald u. auf Wies. *patula* L., *persicifolia* L., *Trachelium* L., *Rapunculus* u. *rapunculoïdes* L., als Zier. verw. *rotundifolia* L. v. *soldanelliflora plena* u. *ranunculiflora plena* Hort. — *Campanulacæae* DC., Rehb., -nacæae Rehb., -nulinæae Bartl., -nulinæae Endl. Ord. od. Kl. der Glöckler.

Campanumæa (nicht -moea) Blum., Don (Campanuleen Jasioneen, V. 1), „Milchglockenblume“ (*campāna* u. *μαία* Säugamme — mit Milchsaft!).

Camperia Benth. (Polygoneen, VIII. 3) „Campderie“ (n. F. Campder, schr. Monogr. des *Rumex*, Par. 1819).

Campella Rich. (Commelyneen, III. 1) „Sonnenneigblatt“ (v. *καμλί*) Krümmung u. *ἥλιος* Sonne — d. Blätt. d. Perigons neigen zu einander, od. v. *ἔλω* rolle? — ungewiss!), z. B. *C. Zanon* Rich. s. *Tradescantia Zanon* Sw.

Campella Lk. (Gräser, III. 2) Rasenschmiele (nicht etwa v. *campus*

- Feld, sond. v. Deschamps, eig. Loiseleur des Longchamps, analog Deschampsia P.-B.), z. B. caespitosa Lk. (Aira s. Deschampsia P.-B. caesp.).
- Camphōra** Nees (sc. Laurus) L. (Laurineen, IX. 1) „Kampher“-Lorbeer, fr. camphrier, e. camphire (-phore) (v. d. arab. kanfur, ind. kanpura „Kampher“), C. officinarum Nees s. Laurus Camphōra L.
- 1) **Camphorosma** L. (Chenopodiaceen, V. 2) „Kampherduftkraut“, fr. camphrée (s. eb. u. *δουή* Duft), C. monspeliensis L. (monspeliäca Pollich) s. Kochia arenaria Roth (Willemetia ar. Märk.), ruthenica M. B., annua Pall., ovata W. etc. 2) **Camphorosma** paleacea L. f. (Cinchonaceen od. Aquifoliac., IV. 1) „Kampherduftstr.“ s. Monetia pal. Spr.
- Campteria** Presl (Campderia Lag.) (Farne, XXIV. 1) „Biegungs“- od. Krummfarn, Zweiohr-F. (v. *καμπτήρ* Krümmung — näml. d. Wedelvenen in ihr. Verlauf), s. Pteris biaurita L. (— d. unterste Wedelfieder zweiteilig!).
- Camptosēma** Hook., Arn. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Krummfahne“ (*καμπτός* gekrümmt, *σήμα* Fahne etc. — Fahnenbasis beiders. m. Anhang, Wtst.), z. B. Zier. rubicundum L. (Dinoclea glycinoides DC., Kennedyia splendens Hort.).
- Campylobōtrys** Lindl. (Rubiaceen, IV. 1) „Krummtraube“ (*καμπυλός* krumm, *βότρος* Traube), z. B. Warmh. C. regalis Ldl. (Mexiko).
- Campylocaryum** DC. (Asperifolien, V. 1) „Krummnüsschen“ (*καρόον* Nüsschen — diese krumm!).
- Cananga** Rumph. (Anonaceen, I. 1) Traubenbaum, äthiop. Pfeffer, fr. canang (vaterl. guian. Name!), s. Guanabanus Plum., z. B. Ouregou Aubl. (Aberemoa ds.), s. Uvaria monosperma W.
- Canarina** Juss. (-rinia L.) (Campanulaceen, V. 1) „Canarienglocke“, fr. canarine campanulée, Stuben. C. Campanula L. (C. Zanguebar Lour.) Strichelblume, s. Campanula Canarina L. s. canariensis L. f. (n. d. canarischen Inseln ben.).
- Canarium** L., W. (Terebinthac. Bursereen, X. 1 od. XXII. 5) „Canarienbaum“ (malay. canari), z. B. C. commune L., balsamiferum W., bengalense W. ostind. Copal, s. Boswellia Colebr.
- Canavalia** DC. (-vali Ad.) (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Canavalie“, Canavali-Langbohne (vaterl. Nam. auf d. Südseeinseln!), z. B. ensiformis DC. (Dolichos ens. Thb.), obtusifolia DC. (Dol. rotundifolia Vahl) etc.
- Cancellaria** DC. (Malvaceen, XVI. 8) „Gittermalve“, fr. cancellaire (v. cancelli, -orum Gitter — Kelch im Hüllblatt eingeschl.) (zu Pavonia Cav.)
- Candēla** Catesb. (Rhizophoreen, XI. 1) „Leuchterbaum“, fr. chandèle (lat. candēla Kerze etc.), C. americana Cat. s. Rhizophōra Candel L. (Rhiz. Mangle Pluk.).
- 1) **Candollēa** Lab. (Dilleniaceen, XVIII. 2) „Candolle's“-Strauch (n. d. Prof. Aug. Pyramē de Candolle in Genf, s. d. Aut.), z. B. cuneiformis Lab. (Neuholl.), peduncularis u. fascicularis R. Br. (das.), s. Hibbertia Salisb. 2) **Candollēa** Armeria Rich. u. umbellata Lab. (Stylidiaceen od. Plumbagineen, V. 1), s. Stylidium Arm. etc. 3) **Candollēa** Baumg. (Ericaceen, VIII. 1), s. Menziēsia pilosa. 4) **Cand.** Batard. (Gräser, III. 2), s. Agrostis. 5) **Cand.** Mirb. (Farne, XXIV. 1), fr. Candollée (candolline), s. Cyclophōrus Desv. 6) **Cand.** Raddi (Jungermannieen, XXIV. 2).
- Canella** P. Br., L. (Garcinieen od. Hesperideen, XI. 1) „Canell“- od. Winterrindenbaum, wild. Zimmet, fr. fausse-canelle, e. canel (v. d. span. canela Zimmet), C. alba L., Sw. Weiss-Z., fr. canelle blanche

- (- batarde poivrée, - du Pérou), s. *Winterania Canella* L. (Can. Winterana G.), *axillaris* Mart. (Str. Brasil.). — *Canellacæe* DC.
- Canephōra** Juss. (Rubiaceen, IV. 1) „Korbträgerin“, fr. *canéphore* (*κα-νηφόρος* v. *κάνης* Matte, Korb etc., *φορός* tragend — Blumenstiele nach oben blumenf.), z. B. *axillaris* Lam.
- Canistrum** Morr. (Bromeliaceen, VI. 1) „Rohrkorb“ (lat. *canistrum*), z. B. *aurantiæcum* Morr.
- Cankrienia** de Vriese (Primulaceen, V. 1) „Cankriensblume“ (n. B. F. Cankrien, Pfeiffer), z. B. *chrysantha* de Vr.
- Canna** L. (Marantaceen od. Cannaceen, I. 1) Blumenrohr, fr. *canne* (- d'Inde), *faux-sucrier*, e. *cane*, *flowering-reed*, *indian-cane* (-shot) (lat. *canna*, gr. *κάννα*, celt. *can* = Rohr), Zier. C. *indica* L. m. v. *Annaei* Hort., C. *iridiflora* Rz. Pv., fr. *basilier à fleur d'Iris*, e. *iris-flowered Flowering-reed*, C. *glauca* L. (blass gelbblum.) u. a. — *Cannacæe* DC. (-nae Juss., -cæe Rchb.) blumenrohrartige (zu Ord. *Scitaminicæe* Bartl.).
- Cannabacæe** Endl., Græk. hanfartige, **-binçae** Endl. Ord. d. Hanfartigen, s. sogl. *Cannabis*!
- Cannabis** L. (Urticaceen *Cannabaceen*, XXII. 5) Hanf, fr. *canabé* (-bou) od. *chanvre* (altfr. *chambrie*), e. *hemp* (gr. *κάνναβις*, arab. *kaneb*), geb. C. *sativa* L. Zier. var. *gigantica* Hort.
- Cantharellus** Ad., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Krug“- od. Faltenschwamm, s. g. Pfifferling (dem. *cantharus*, gr. *κάνθαρος* Trinkgeschirr — Trichterform d. Huts!), z. B. *essb.* C. *cibarius* Fr. *Speise-Pf.*, fr. *escaville* (*escarville*), e. *blobber*, gift. *aurantiæcus* Eierschwamm, e. *paddock-stool* „Krötenstuhl“, s. *Merulius* Hall.
- 1) **Cantua** Juss. (Polemoniæ. od. *Convolvulac.*, V. 1) „Cantue“ (peruan. *cantu*), z. B. *Treibh.* C. *splendens* s. *buxifolia* Lam. (*Witheringia superba* l'Hér.), *dependens* u. *foetida* (*Periphragmos* Rz. Pv.), *cordata* Juss. (*uniflora* Pers.), *ovata* Cav. (*Periphragmos uniflora* R. P.) (*Zaunstr.*, Peru), s. *Gilia*, *Hoitzia* etc. 2) **Cantua** W. (*Loasaceen*, XIII. 1).
- Capança (-nia)** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) Wagenblume (*καπάνη* thessal. Wagen — Blumenform), z. B. C. *grandiflora* Decsn.
- Capellia** Blum. (Dilleniaceen, XIII. 7) „Capellie“ (n. d. Bot. Carlo Capelli, schr. Cat. stirpium in horto Taurinensi, Turin 1821, Wtst. n. Philem. Bar. van der Capellen, Gen.-Gouv. v. Batavia bis 1828), z. B. *multiflora* Blum. (B. Java).
- Capillus** Venëris (sc. *Adiantum*) L. (Farne, XXIV. 1) „Venushaar“ (*capillus* Haupthaar, Venëris Gen. v. Venus — schön lichte, feinflättr. Wedel!).
- Capitata** (sc. *Brassica*) Metzg. (Crucifer. *Siliquos.*, XV. 2) „Kopf“- od. „Haupterkohl“, s. g. *Kappis* (Weiss- u. Rotkraut) (v. *caput*, -itis Kopf, Haupt).
- Capnites** DC. (Papaverac. *Fumariaceen*, XVII. 2) „Erdrrauch“ (v. *καπνίζω* mache Rauch, *καπνός* — bez. d. duft. *Belaubung*!).
- Capnorchis** Borkh., DC. (Papaverac. *Fumariac.*, XVII. 2) „Orchis-Erdrrauch“ (v. *καπνός* s. eb. u. *Orchis* — weg. d. ähnl. *Blumen*!), z. B. Zier. C. *spectabilis* DC. (*Dielytra* s. *Dicentra spect.* autt.) s. g. *Herzblume*, *chrysantha*, *formosa* etc.
- Capparidastrum** DC. (Capparideen, XIII. 1) unechter Kappernstr. (zu *Capparis* L., wovon *deter.* od. *Wtst.* *ἄστρον* Bild).
- Capparidæe** Vent., DC., Rchb. (-rçae Rchb., -rîdes Juss.) (zu Ord. *Rhoeadæe* Bartl.) s. sogl.
- Capparis** L. (Capparideen, XIII. 1) „Kappernstrauch“, fr. *cappa* (*caprier*), e. *bean-caper* (gr. *κάππαρις*, arab. *kabar*), C. *spinosa* L. *echter K.* (*essbare Kappern*), *ovata* Desf., *sodata*, afrik. *Salzkapper*.
- Capraria** L. (Personaten, XIV. 2) „Geis“- od. „Ziegenkraut“, fr. *capraire*

- (v. capra Ziege, die d. Kr. gern frisst!), z. B. Zier. hirsuta Hb., Bpl. u. lanceolata Lk., Otto, s. g. Herzblume od. Antillentheee Leun., C. lucida W. (Teedia luc. Rudolph).
- Caprĕa** (sc. Salix) L. (Salicineen, XXII. 2) Sal- od. Sohlweide, Palmweide, fr. marsault od. gnĕdie, e. sallow-tree od. goat-villow (v. capra Ziege, von der ihr Laub gern gefr. wird), Zier. var. pendula u. tricĕlor Hort.
- Caprifoliacĕae** Bartl., DC., Rehb., Endl. (-folia Juss.) Geisblattgew. (zu Ord. Rubiacinae Bartl. DC.).
- Caprifolium** Rĕhl., Lam., R. Sch. (sc. Lonicĕra) L., Ad. (Lonicereen od. Caprifoliac., V. 1) „Geisblatt“, Je lĕnger je lieber, welsche Specklilie Vilm., fr. chĕvre-feuille romaine, e. goat's-leave, herb-trinity u. heart's-ease, garden-wood-bine od. -honey-suckle, s. Caprif. hortense Lam. (perfoliatum Rĕhl.) u. C. italicum R. Sch. (Periclymĕnum it. Mill.) m. v. v. (v. capra Ziege u. folium Laubblatt).
- Caproniana** (sc. Cerĕsus) Risso (Amygdaleen, XII. 1) „Eberkirsche“, Bocksk. (v. *ζάπροος* Eber od. Bock, ital. caprone, oder v. fr. capron = Riesenerdbeere — bez. d. Geruchs!), z. B. C. rubra Risso, s. Cerĕsus dulcis autt.
- Capsella** Vent., Mnch. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Hirtentĕschchen“, Tĕschel O. W., fr. bourseette od. mallette ĕ berger, e. shepherd's-purse od. cass-weed (dem. v. capsula Kapsel). C. bursa pastoris Mnch. Sĕckelkr., fr. tabouret od. moufette, C. ceratocarpa Mnch. etc., s. Thlaspi L.
- Capsicum** T. (Solaneen, V. 1) „Beissbeere“, fr. poivre du Brĕsil (- d'Espagne „span. Pfeffer“) u. corail, e. cockspur-pepper (*ζάψις* v. *ζάπτω* beisse, d. Beissen, od. capsicum v. capsula Kapsel-Beerenform!), z. B. C. annuum L. s. g. span. Pfeffer (ungar. Paprika), Zier. C. longum DC. m. v. v., C. grossum W. m. v. lutĕum, C. tomatiforme Hort., violacĕum Hb., Bpl., Kth., chilense Hort., cerasiforme L. m. v. v., etc.
- Caracalla** Lam., Endl. (sc. Phaseolus) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Kappenbohne“, fr. caracalle (lat. caracalla i. q. cuculla Kappe, gr. *καραζάλλων*, Wtst. *κάρια* Haupt u. *ζάλλη* od. *ζάλλεα* schĕne Kleider etc.), s. Caracalla arborescens Lam.
- Caragĕna** Lam. (sc. Robinia) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Erbsenstrauch, -baum, fr. caracan od. arbre aux pois, e. pea-tree (tatarisch so viel als Schwarzohr Leun.), Zier. C. arborescens Lam. (sibirica Ray) m. v. v., frutescens DC. (digitata Lam.) m. v. v. u. ferox Pall. s. spinosa DC. (Robinia spin. L.).
- Caraguĕata** Plum., Pis. (Bromeliaceen, VI. 1) „Caraguate“ (südamer. Name!) = Bromeli Acanga L. sparrige Ananas D., s. Tillandsia lingulata Jacq.; musaica Ē. Andrĕ „pisangart.“, latifolia u. clavata Plum. (Tillandsia serrata L.), splendens etc.
- Carallia** Roxb. (Rhizophoreen od. Pomaceen D., XI. 1) Wurzelbaum (n. d. hindostan. Telingasprache carillie Paxton), z. B. C. lucida Rxb. (B. Ostind.).
- Caralluma** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) Saft-Wachspfl. (carallum der Telingasprache), z. B. adscendens R. Br., umbellata Haw. (Str. Ostind.), s. Stapelia L.
- Carambĕla** Aubl. (sc. Averrhĕa) L. (Oxalideen Bombaceen, X. 5) s. g. Blimbing (v. d. franz. carambole Rot- od. Beiball, Billard).
- Carĕpa** Aubl. (-raipa Zucc.) (Meliaceen od. Ternstroemiaceen, VIII. 1) „Carap“ od. Crapholzbaum (n. d. guian. Nam. caraipe Paxton), z. B. paniculata Zucc., s. Xylocarpus Schreb.
- Carapichĕa** Aubl. (Rubiaceen, V. 1) „Carapichee“ (nach d. carĕib. Nam. carapiche!). C. guianensis Aubl. = Cephaelis involu-crata W.

- Cardamindum** Mnch. i. q. Tropaeölum Kapuzinerkresse (v. Cardamīne u. indus).
- Cardamīne** L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Schaumkraut, Wiesenkresse, Gauch- od. Kukuksblume Vilm., fr. cresson des près, e. meadow-cresses (-cuckoo) (gr. *καρδαμύνη* v. *καρδιά* Herz u. *δαμάω* bändige, Paxton), z. B. *C. pratensis* L. Zier. var. fl. pleno.
- Cardaria** Desv. (zu Lepidium) Rchb. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Herzschötchen“, Hungerblümchen-Kresse (v. *καρδιά* s. eb.), s. Lepidium Draba L. (*Draba umbellata* Mor.) u. *Cardiolēpis* Wallr.
- Cardiāca** T. (sc. Leonūrus) L. (Labiaten, XIV. 1) „Herzgespann“, fr. cardiaque (gr. *καρδιαζος* Herz betr. od. *καρδιά* u. *ἀζη* Heilung, Ruhe).
- Cardinalis** (sc. Lobelia) L. (Lobeliaceen, XIX. 6) „Cardinalblume“, fr. cardinale (Blume scharlachr.).
- 1) **Cardiolēpis** Wallr. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Herzschuppe“, s. *Cardaria* Desv. (s. v., *λεπίς* Schuppe, — Schötchenform!). 2) **Cardiolēpis** Raf. (Rhamnaceen, V. 1).
- Cardiospermum** L., Sm. (Sapindaceen, VIII. 3) „Herzsamen“, -erbse D., fr. cardiosperme, e. heart-pea (s. v., *σπέρμα* Samen), z. B. *elegans* Hb. Bpl. (Schlingstr. Peru), *Halicacābum* L. blasenfrücht. od. gem., fr. pois-de-coeur (cor-inde, Alkekenge), s. *Pisum vesicarium* Bauh. (Wst.: kugl. Same mit weiss. herzf. Keimwarze!).
- Cardopatiēae** Less., DC., s. sogl. Cardopätum.
- Cardopätum** Pers. (**-tium** Juss., **-thum** od. **-thium**?) (Compos. Carlinēen, XIX. 1) „Wegtritt-Distel“ (v. *cardūus* u. *πάτος* betretner Pfad, Wst. *πάθος* Leiden — früher geg. Herzleiden!), z. B. *corymbosum* Pers., s. *Brotēra* W., *Carthāmus* L. u. *Camalium* (Chamalium) Juss. — 2) **Cardopatia officinalis** W. i. q. *Carlina acaulis* L. „Eberwurz“.
- Cardopētus** Forst. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Muldendistel“? (*ζάδοπος* Mulde etc.?). *C. serratus* Forst., s. *Cardopatum* (Chamalium, *Carlina*) s. eb.
- Carduacēae** = Compositae Homoianthae Rchb. XIX. 1 (Aequalia L.) Distelartige „Gleichblütler“ (nur Röhrenblütchen etc.!).
- Carduncellus** Ad., Lob. (sc. *Carthāmus*) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Cardun-Saffor“ (dem. v. *Cardunculus*), s. *Carthāmus mitissimus* L. (*minutissimus* Paxt.!?).
- 1) **Carduncūlus** (sc. *Cynāra*) L. (Compos. Carduac., XIX. 1) „Cardone“, spanische od. „Cardun“-Artischoke M.-Rchb., fr. chardonnette (*cardonēte*) (v. *Cardūus* Distel, auf *Candia cardun* u. *chardonna*). 2) **Carduncūlus** Ad. (Comp. Card.) „Cardun-Saffor“, s. *Onobroma* G. u. *Carthāmus Carduncellus*, s. v.
- Cardūus** L. (Compos. Carduac., XIX. 1) Kopfdistel, fr. cardère u. chardon, e. cardoon u. thistle (lat. *cardūus* überh. Distel, v. d. celt. ard Spitze, gr. *ἄρδις*). *C. nutans* L., s. g. Moschusdistel, fr. *épine-blanche sauvage*.
- Carēum** Plin., Ad. (Umbelliferen, V. 2) Kümmel = *Carum* L.
- Carex** L. (Cyperaceen, XXI. 3) Segge, Riedgras, fr. caret (-reiche) u. laiche „Liesch“, e. sedge, reit, reed (-grass) (v. *careo* entbehre, Paxton, Wst.), z. B. *arenaria* L. (Offiz. *Rhizōma Caricis* Grck.), etc.
- Careya** Roxb. (Myrtaceen, XII. 1) „Carey's“-M. (n. d. Bot. W. Carey bei Calcutta), z. B. *arborēa* Rxb. (Pelvu Rheed.) (Gespinnstpfl. Ind.).
- 1) **Carīca** L. (Cucurbitaceen Papayaceen, XXII. 9) Melonenbaum (lat. *Carīcus* Kariē, aus *Caria* in Kleinasien). *C. Papaya* L. gem. Melonenb. (*Papaya vulgaris* Lam.). 2) **Carīca** (sc. *Ficus*) L. (Urticac. Artocarpeen, XXII. 9) gem. Feigenbaum, fr. figuier, e. fig-tree (— lief. d. *carīca* d. Apoth.).
- Caricēae (-cinēae)** Nees Seggen od. Riedgräser (v. *Carex*, -īcis).

- Carissa** L. (Apocynen, V. 1) „Wachsbaum“ (v. *Κάρισα* Karierin? Paxton, wahrsch. v. *κηρός* Wachs, lat. cera, Wtst.: östind. Namen!), z. B. C. Carandas L. (ind. carandas!), spinarum L. (Spina Rumph.), etc., s. Echites Burm. — Carissæe (sc. Contortæe) Rchb. Krähenaugen- od. Wachsbaumartige.
- Carlina** T. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Karlsdistel“, Eberwurz, fr. carline, e. carline-thistle (st. Carlina n. Karl d. Gr., dess. Heer davon geheilt wurde, Paxton (?), viell. st. Cardina (ital. = kleine Distel, cardo) als Druckfehler, Leun.!), z. B. Zier. C. acaulis L. Zwergdistel. — Carlinæe Rich.
- Carludovica** (Carlud.-) Rz. Pv. (Palmen, XXI. 9) „Karl-Louisen“-P., fr. carludovique, Panama-P. (n. d. span. König Karl IV. u. dess. Gemahlin Mar. Louise, † 1819), z. B. C. palmata (Salmia p. W., Bombonaxa, Jipijape Leun.), Warmh. humilis, latifolia R. P., Plumieri Kth., etc.
- Carlowitzia** (-zia) Mneh. (Compos. Carlineen, XIX. 1) Eselsdistel (n. H. K. v. Carlowitz, s. d. Aut.), z. B. C. (Carthamus) salicifolia Mneh.
- Carmichaëlia** R. Br., Spr. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Carmichael's“-Hornklee (n. d. Capt. Dugald Carmichaël, s. d. Aut.), z. B. C. australis R. Br. (Lotus austr. s. arborëus Forst.).
- 1) **Carolinæa** L. f. (Oxalid. Bombaceen, XVI. 8) „Carolinen“-Wollbaum (n. Caroline, Markgräf. v. Baden, † 1783), z. B. alba Lodd. u. princeps L. Pracht-W., s. Bombax grandiflora. 2) **Carolinia** Gaud. (Urticaceen, XXI. 4) (N. pr.).
- Carota** (sc. Daucus) L. (Umbelliferen, V. 2) Möhre, Mohrrübe, Mohrenkummel, Carote, fr. carotte, e. bird's-nest, „Vogelnest“ (— zusammengezog. Dolden nach d. Verblühen!) u. carrot (gr. *καρωτόν* viell. v. *κάρη* Kopf — Gestalt d. Dolde).
- Caroxylon** Thb. (Portulacaceen, V. 1) „Kümmelholz“?, Karostrauch (v. caroo = heisse Ebene d. Caplandes, Wtst.). C. Salsöla Thb. (Salsöla aphylla L. f.) Salzstr. v. Cap (schwerl. *κάρων* Kümmel! *ξύλον* Holz).
- 1) **Carpesium** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Strohkelch“, Kragenblume, fr. carpésie (gr. *καρπίσιον* Holz, Stroh — weg. d. äusseren Kelchschuppen!). 2) **Carpesium** G. Fr. = Valeriana v. Cubæe.
- Carpinus** L. (Betulaceen od. Cupuliferen, XXI. 8) Hain- od. Weissbuche, Heister O. W., Hornbaum Rmpl. (v. d. celt. car Holz, pinda Kopf — „Kopfholz“, zu Jochen dienend, gr. *ζυγία* Diosc. v. *ζύγιος* z. Joch. geh., Wtst. = Carpinus). C. betulus L., gem. Hainb., fr. carpin od. charme, e. yoke-elm, carpy, horn-beam (hard-), quick-tree (-beam, quicken-beam) m. v. v., C. Ostrya L., C. virginiana Lam. (beide Ostrya vulgaris u. virg.), C. orientalis Lam. (duinensis Scop.), fr. charme d'Orient, e. oriental horn-beam, etc.
- Carpoböli** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Fruchtschneller“ (zu Ord. Basidiomycetes de By) (*καρπός* u. *βόλος* Wurf v. *βάλλω* werfe — d. Fr. springt mit Gewalt ab!).
- 1) **Carpobölus** Mich. (sc. Lycoperdon) L. (Bauchpilze, XXIV. 4) (s. eb.). 2) **Carpobölus** Sw. (Ricciaceen-Moose, XXIV. 2) „Fruchtschnell“-M.
- 1) **Carpodëtus** Forst. (Rhamnaceen od. Celastrineen, V. 1) „Band“- od. Ringbeere (*καρπός* Frucht u. *δετή* Band — Beere mitt. v. e. Ring umgeben, Wtst.), z. B. Treibh. C. serratus Fr. 2) **Carpodëtes** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (v. *δετή* od. *δέτις* Fackelbündel — Frucht scharf dreikantig! — unklar!), s. Pancreatum recurvatum Rz. Pv.
- Carpoliza** Salisb. (st. -lyza, wie Antholyza, s. d.) (Amaryllideen, VI. 1) „Fruchtrachen“-Lilie (*καρπός* u. *λίσσα* Wut — d. Frucht springt in 3 Klappen wie ein Rachen auf). C. spiralis Sal., s. Haemanthus spiralis Ait.
- Carthämus** T. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Safflor, fr. carthame, e. safflower (arab. quortom od. korthom, hebr. kartami färben). C. tinc-

- torius L., fr. graine de perroquet, fleur de safran, safran bâtard (- d'Allemagne), safranon, e. dyer's-safflower (zafran, zaffir, -fre, -far) u. saphara.
- Carum** Koch (Umbelliferen, V. 2) Kümmel, altd. Garbe od. Karve Mej., fr. carvi (gr. *ζάρον*, nach Plinius v. *Κάρια* carische Dolde, Paxt. u. Wtst.), C. Carvi L. gem. Kümmel od. Carve, fr. faux-chervi, e. caraway od. skirwort.
- Caruncularia** Haw. (Asclepiadeen, V. 2) „Karbunkel“- od. Schwären-Wachspfl. (v. caruncula Fleischgeschwür — d. corona staminea mit Carunkeln). C. peduncularis Haw., s. Stapelia L.
- Carvi** T. (sc. Carum) L. (Umbelliferen, V. 2) Kümmel, fr. faux-chervi u. carvi, vgl. Carum.
- Carvifolia** Vaill. (sc. Selinum) L. (Umbellif., V. 2) „Kümmelblatt“, fr. carvifeuille (Carvi u. folium Blatt).
- Carya** Nutt. (Terebinthac. od. Juglandeen, XXI. 4) Pekan- od. Hickory-nussb. (gr. *ζάρον* Nuss), z. B. Zier. C. amara Nutt. (Juglans am. Mchx.), fr. noyer amer, e. bitter-nut-hickory, C. tomentosa Nutt. (Jugl. alba Mill., tomentosa Mchx.), fr. noyer tomenteux, e. mocker-nut-hick., C. alba Nutt. (Jugl. squarrosa Mchx. s. alba ds.), C. olivaeformis Nutt. (illinoënsis Wang., rubra G., Jugl. cylindrica Lam. etc.), fr. noyer-Pécanier, C. porcinus Nutt. (glabra Mill.) „Ferkelnuss“, etc., s. Juglans L.
- Caryocār** L. (Oxalid. Rhizoboleen od. Bombaceen, XIII. 4) Höckernussbaum (s. v. u. *ζάρα* Kopf), z. B. C. nuciferum L., fr. porte-noix, s. Pekea tuberculosa Aubl., C. villosum Pers. (Saouari Aubl.) (Str. Guiana).
- Caryophyllacēae** Grck. (-phyllēae Gay, DC. Rchb., -phyllinae Bisch. Ord. d.) Hornblattgew. Rchb., eig. „Nussblattartigen“, Hornkapseligen (*ζάρον* u. *φύλλον*).
- Caryophyllaster** Rumph. (Rubiaceen, IV. 1) „Nelkenstern“ (Caryophyllum u. *ἀστὴρ* Stern, Bild — wie ein kleiner Nelkenbaum!).
- Caryophyllastrum** Ser. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Nelkenwurz, i. q. Geum urbanum (deter. v. Caryophyllus L. Gewürznelke), s. sogl.
- 1) **Caryophyllata** T., Scop. (zu Geum) Rchb. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) „Nelkenwurz“ (s. v.), z. B. urbana Scop. (Geum urb. L.). 2) **Caryophyllata** alpina Bauh., s. Anemone narcissiflora L. 3) C. (sc. Myrtus) L. Nelkenrinde, fr. capelet.
- Caryophylloides** Blum. (Laurineen, IX. 1) Rot-Näglein, Rot-Zimmet, s. Cinnamomum rubrum (sogl. u. *εἶδομαί* gleiche).
- Caryophyllum** Ser. (Caryophylleen, X. 2) Gartenmelke = Dianthus Caryophyllus L. (s. sogl.).
- 1) **Caryophyllus** L. (Myrtaceen, X. 1) Gewürznelkenbaum. C. aromaticus L. s. Tangu Pluk., Gewürznäglein, fr. girofle (gir.-), e. clove (gr. *καρυόφυλλον* „Nussblatt“ — nämll. Kopf dess. aus Blätt. gewölbt, Wtst.), s. Eugenia caryophyllata Thb. (Jambolifera c. L.). 2) **Caryophyllus** (sc. Dianthus) L. (Caryophylleen od. Sileneen, X. 2) Gartenmelke (— riecht wie Gewürznäglein!), fr. astropole, e. clove-gillyflower, m. v. v. (Rümpfer: Saum-, Strich-, Band-, Flammen-, Tuschnelken, besond. schön Souvenir de la Malmaison). 3) C. saxatilis Bauh. = Arenaria tetraquetra L.
- Caryota** Thb., L. (Fieder-Palmen, XXI. 8) „Nussdattelpalme“, fr. caryote (*καρυωτός* wie e. Nuss gestalt. — palmula caryota d. Alten), z. B. Zier. C. urens L. ostind. Brennp., fr. ayri.
- Caryotaxus** Zucc. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Nusseibenbaum“ (s. v. u. Taxus). C. nucifera Zucc., s. Taxus s. Torreya nucif. Kämpf.
- Cascarilla** Ad. (sc. Croton) L. (Rutaceen Euphorbiac., XXI. 9) Cascarillen-Croton, fr. cascarille (chacarille), e. cascarilla (dem. des span. cascara Rinde), s. Croton linearis Jacq.

- Casearia** Jacq. (Samydeen od. Peponiferen, X. 1) „Casearie“ (n. d. holl. Missionar in Cochinch. u. auf Malabar, Joh. Casearius, schr. d. Text zu d. ersten Bänd. d. Hort. Malab.), z. B. C. *esculenta* Jacq., s. *Iroucana guianensis*, C. *parviflora* (Samyda p. L.) etc., s. *Chaetocrater* R. P.
- Casparia** Kth., DC. (Cassieen, X. 1) „Casparbaum“ (zu *Bauhinia* Plum.) (n. d. Bot. Caspar Bauhin, s. d. Aut.), z. B. C. *pes-caprae* H. B. K. (Bauh. p. c. Plum.).
- Cassäva** W. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Mandiocapfl. Seub., Maniokwurzel, „Cassavebrot“, e. *cassavi* od. *cassada* (vaterl.), s. *Jatropha Manihot* u. *Janipha* L.
- Cassebeera** (-ia) Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Cassebeer's-F. (n. d. Bot. Cassebeer, s. d. Aut.), z. B. *triphyllo* Kf. (Montevideo), *pinnata* Kf. (Bras.) etc., s. *Pteris*, *Adiantum*, *Cheilanthes* etc.
- 1) **Cassia** L. (Leguminos. Cassieen, X. 1) Cassie, Sennesblätterstr., Gewürzrinde, fr. *casse* (-sier) od. *laurier casse* (n. Olaus Celsius von d. hebr. *keziath*, gr. *κασσία* Gewürzrinde), C. *Senna* Lam. (obovata Collad. s. *obtusata* Hayn.) *Senna-C.*, C. *Fistula* L., fr. *caneficier* (*Cathartocarpus* *Fistula* Pers., *Bactyrilobium* *Fist.* W.), C. *lanceolata* Forsk., etc. Zier. C. *marylandica* L., fr. *casse de Maryland*, e. M.-Cassia etc. 2) **Cassia** (sc. *Laurus*) L. (Laurineen, IX. 1) Cassienod. Kanehl-Zimmet, s. *Persëa* *Cassia*. — *Cassiëae* Rchb. zu *Caesalpinieae* R. Br. (zu Kl. *Leguminosae* Endl.).
- Cassine** L. (Sapotaceen od. Terebinthineen, VI. 3) „Cassine“, fr. *cassine* od. *herbe de la St. Barthélemi* (*cassine* von d. Indianern in Florida gebr. Name), z. B. C. *Gongonha* Mart. Paraguay-Thee, fr. *maté* od. *thé du Paraguay*, s. *Ilex paraguariensis* autt., C. *Maurocenia* L. Instrumentenholz, C. *caroliniana* Lam. (Prinos *ambigüus* Mchx., *Ilex vomitoria* Ait.) etc., s. *Celastrus* L.
- Cassinia** R. Br. (Compos. Inuleen od. Gnaphalieen, XIX. 2) „Cassinie“ (n. d. franz. Bot. Henri Cassini, s. d. Aut.), z. B. C. *aurëa* R. Br. (*Angianthus tomentosus* Wendl.), *spectabilis* (Calea Lab.) etc. (Neuholl.). — *Cassinieae* Schultz-Bip. i. q. *Compositae* Kl. d. Korbblütler.
- 1) **Cassiöpe** D. Don (zu *Andromëda* L.) (Ericaceen, X. 1) Zwergheide (*Cassiope*, Mutt. d. *Andromeda*, Myth.), z. B. *tetragöna* Don, *hypnoides* ds. 2) **Cassiöpëa** Don (Compositen).
- Cassuviëae** DC., R. Br. i. q. *Terebinthi* Juss. (zu *Terebinthaceae* Rchb.) *Sumachgew.*, s. *sogl.*
- Cassuvium** Lam. (Terebinthac. *Cassuvieen* od. *Anacardieen*, IX. 1) abendländ. Nierenbaum, „Leertraube“? (v. *cassus* leer — unfruchtbar, uva Traube? Wtst. *malay. cadju!*), z. B. C. *pomifërum* Lam. (*Anacardium occidentale* L.).
- 1) **Cassyt(h)a** L. (-sita?) (Lauraceen od. Myristiceen, IX. 1) „Flachsseiden“- od. Schlinglorbeer, fr. *cassite* (v. *κασσίω* flicke zusamm., wovon auch *Cuscuta* Flachsseide!), z. B. *glabella* R. Br., *melantha* ds. etc. (Neuholl.), C. *corniculata* L. (*Cassuta cornëa* Rumph.). 2) **Cassytha** Gray (Phytolaccaceen, X. 5), s. *Cuscuta*.
- 1) **Castalia** (-lis) Salisb., DC. (Nymphäaceen, XIII. 1) „Quellnymph“ (n. d. schön. Nymph *Castalia*, Myth. u. Quelle am Parnass). C. *alba* Lk. (Nymphäa *alba* L.). 2) **Castalis** Less. (Compos. *Calendulac.* XIX. 4), s. *Dimorphothëca* Mch.
- Castanëa** T. (sc. *Fagus*) L. (Cupuliferen od. Amentac. Fageen, XXI. 8) wahre od. zahme Kastanie, s. g. *Marone*, fr. *marron* (veralt. *castagnon*), *châtaigner*, e. *eatable chest-nut* (sweet —, spanish —), C. *vesca* G. m. v. v., C. *americana* G. Don (*vesca* var. *amer.* Mchx.), fr. *châtaigner d'Amérique*, C. *pumila* Mill. (*Fagus* p. L., *nana* Dur.),

fr. ch. chincapin, e. dwarf-ch.-n. (gr. *καστανὸν* v. *Κάσταννα* Stadt in Thessalien, lat. *castanĕa*). — Castaneacĕae Lk.

- Castillĕja** Mut., L. f. (bess. **-jia**) (Scrophularin., XIV. 2) „Castilleje“ (n. Don Castilleja, Freund v. Mutis), z. B. *grandiflōra* Spr. (Euchrōma gr. Nutt.), *coccinĕa* Mut. (*Bartsia* c. L.), *sibirica* L. f.
- Castillōa** Cerv. (Urticac. od. Euphorbiac., XI. 3) Kautschukbaum, Holquachtl d. Mexikaner (n. d. span. Bot. Castillo; n. Don Castilleja, s. eb., Wtst.), *C. elastica* Cerv. (*Siphonia* el. s. Cahuchu W.).
- Casuarĭna** L. (Myricaceen od. Casuarineen, XXI. 1) „Casuar“- od. Keulenbaum, Streitkolbenb., Sumpfeiche Leun., fr. *filao* (n. d. ind. Straussvogel Casuar — Ähnl. mit dess. Federn, blätterlose, keulenf. Äste!), z. B. *equisetifolia* Forst., *africana* Lour., *paludosa*, *nana* etc. — Casuarinĕae Mirb. DC.
- Catabrōsa** P.-B. (zu Poa) Rehb. (Gräser, III. 2) Quell- od. „Futtergras“ (*καταβρώσις* Futter, v. *καταβίβρωσω* zehre auf), z. *aquatica* P. B., s. *Aira* aq. L. (*Glyceria* aq. Presl s. *Catabrosa* Kl. Richt.).
- Catalpa** Juss. (zu *Bignonia* Rchb., L.) (Bignoniaceen, II. 1 od. XIV. 2) Trompetenbaum, -blume, Zier. *C. syringifolia* Sims m. v. *nana*, s. *Bign.* Cat. L.), fr. *Bignone* de Virginie, *C. longissima* Sims, etc. (Nam. d. Pfl. in Carolina!).
- Catananche** L. (-ance T.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Zwangkraut“, Rasselblume, Stärkekraut, fr. *catanche* od. *cupidone* (*κατανάγκη* Zwangmittel, Liebestrank u. Pfl. dazu!), Zier. *C. coerulĕa* L., fr. *cupidone* bleue, m. v. *alba* Hort.
- Catappa** G., DC. (Combretac. od. Myrobalaneen, XXIII. 1) Büschelblattbündel (auf d. Molukken *catappan*), s. *Terninalia* *Catappa* L. (*Amygdalus* *indica* Raj.).
- Cataputĭa** major G. Fr. i. q. *Ricĭnus communis* (Euphorbiac. XXI. 9), davon *Cataputöl* u. *semina* *Cataputiae* d. Apoth. (vaterl.).
- Cataria** T., Hall., Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Katzenkraut“, chinesischer Ysop (v. *catus* Kater — Wtst. die Katzen wälzen sich darauf herum!), s. *Hyssōpus* *Lophanthus* L. „Schopfbüte“.
- Catasĕtum** Rich. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Sieborche“ i. q. *Catachaetum* autt. (v. *κατασέω* zersiebe — durchlöch. Lippe?, Wtst. *κατὰ* herab u. *seta* gr. *γαίτη* Borste — columna an d. Basis rankig!), z. B. *tridentatum* Hook., *Hookeri* Ldl. etc. (Südamer.).
- 1) **Catĕchu** (sc. *Mimōsa*) L. (Mimoseen, XXIII. 1) „Catechu“-Mim., fr. *cachou* (liefert *Succus* *Catechu* s. *Terra japonica* der Apotheken, W. — vaterl. Name!). 2) **Catĕchu** (sc. *Arĕca*) L. (Palmen, XXI. 5—10) *Catechu*-P. (Ind.), s. *Arĕca* *Taufel* G., Rumph.
- Catha** Forsk., Hassk. (*Cada*?) (Celastraceen, V. 1) Bügelholz, fr. *catha* (Wtst. v. d. arab. *kat*, schwerl. v. *κάδος* Fass!), z. B. *C. edulis* Vahl = *Celastrus* ed. autt.
- Catharanthus** G. Don (Contorten od. Apocynen, V. 1) „Reinblume“, Rosen-Sinngrün (v. *καθαρός* rein, lauter, *ἄνθος* Bl.), Zier. *C. rosĕus* G. Don (*Vinca* *ros.* L.) m. v. *alba* Hort., s. *Lochnera* *ros.* Rehb.
- Cathartocarpus** Pers. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Reinigungsfrucht“ (v. *καθάριος* Reiniger u. *καρτός* Fr. — zum Abführen), *C. Fistula* Pers. s. *Bacillus* Lindl., s. *Cassia* *Fistula* L.
- Cathcartĭa** (st. **-tia**) Müll. (Papaveraceen, XIII. 1) „Cathcart's“-Keulenmohn (n. d. engl. Lord Cathcart, Gesandter etc. zu Anfang des 19. Jahrh.'s), *C. villosa* Müll.
- Catiang** DC. (sc. *Dolĭchos*) L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) kleine Faseln (vaterl.), s. *Phaseolus* *minor* Rumph.
- Catinga** Aubl., Juss. (Myrtaceen, XII. 1) „Catinga“-M. (bei den Garipons in Guiana heisst d. Baum *iva-catinga*).

- 1) **Catonia** Mnch., Cass. (zu *Crepis* Rehb.) (Composit. Cichoriac. XIX. 1) „Caton's“-Pippau (n. d. Römer Cato dem Älteren, † 140 v. Chr.), z. B. *C. crocēa*, *aurea*, *alpestris* Rehb. etc. 2) **Catonia** Juss. (Personaten, XIV. 2), z. B. *Brownēi* Poir. s. *marginata* St. Hil. (Str. Jamaica). 3) **Cat.** Vahl (Convolvulac. V. 1).
- Cattleya** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Cattley's“-Pracht-O. (n. d. Bar. W. Cattley, Mitgl. d. Lond. Gart. Soc. u. Lindley's Freund), z. B. *crispa*, *Grahami*, *maxima* Ldl. (Bras.), *citrīna* (*Sobralia citr.* La L.) (Mexiko) etc.
- Catūrus** L. (Euphorbiac. od. Urticac. Humulineen, XXII. 3) „Katzenschwanz“, fr. *cature* (v. *catus* Wildkatze etc.), *οὐρά* Schwanz — Ansehen d. Blumenähre!), z. B. *ramiflorus* L. (*Boehmeria ram.* Jacq.) u. *spiciflorus* L. (*Acalypha hispida* Burm.).
- Caucalinēae** Koch, Haftdoldenartige, s. sogl.
- Caucālis** Hoffmg. (Umbelliferen, V. 2) Haftdolge, fr. *caucalide* (-lier) u. persil bâtard (gr. *καυκαλῖς* v. *κείω* krieche u. *καυλός* Stengel — mehrere Arten sehr niedr., Wtst.), Zier. *C. orientalis* L. s. *pulcherrimus* Koch.
- Caulerpa** Lamx. (Fadenalgen, XXIV. 3) „Kriechstengel“-Alge (*καυλός* Stengel u. *ξόλω* krieche).
- 1) **Caulinia** W., Pers., DC. (Ceratophylleen, XXI. 8) „Caulinie“, Zwergnixe (-najade) (n. d. ital. Bot. Caulini, schr. Dissert., Napoli 1792), z. B. *fragilis* W., s. *Fluvialis minor* Mich. (*Najas* Schrk., *Kernera* W., *Iitnera* Gm. minor). 2) **Caulinia** Mnch. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Caulinis-Bohne“, s. *Kennedya rubicunda* Vent.
- Caulophyllum** W., Mchx. (Berberideen, VI. 1) „Stengel“- od. Löwenblatt D., fr. *caulophylle* (*καυλός* Stengel etc., *φύλλον* Laub — Blätt. in d. Stiel auslaufend, wie eins damit!), z. B. *thalictroides* Mchx. (*Leontice* th. L.).
- 1) **Cavanillēa** Thb., Lam. (Sapotaceen od. Leguminosen, XVII. 4) „Cavanillee“ (n. d. Prof. Cavanilles in Madr.), z. B. *C. scandens* (Moldenhauera sc., Capstr.), *philippensis* Lam. (*Diospyros discolor* W.). 2) **Cavanillēa** Gmel. (Malvac. od. Sterculiac. XVI. 7) „Cavanilles“- od. Scharlachmalve, s. *Pentapetes phoenicēa* L. (*Dombeya* ph. Cav.), s. sogl.
- Cavanillesia** Rz. Pv. (Bombaceen, XVI. 8) „Cavanillesie“ (s. eb.), z. B. *cordata* s. *umbellata* R. P., *arborēa* W., *platanifolia* H. B. K. etc. (Str. Südamer.).
- Cavendishia** Lindl. (Ericaceen, VIII. 1) „Cavendishie“ (n. d. Chemik. Henry Cavendish, Entd. d. Wasserstoffs, † 1810).
- Ceanothus** L. (Rhamnaceen, V. 1) „Seckelblumenstrauch“, fr. *céanothe* (gr. *κεάνωθος* Scharte v. *κεντέω* steche od. *κείω* brenne, steche), z. B. Zier. *C. americanus* L. m. v. v., amer. Thee, e. New-Jerseytea od. *american red-rod*, z. B. v. *azurēus* Hort. s. *tardiflorus* Hornem. u. *rosēus* Hort., *C. thyrsoiflorus* Eschsch., *ferrēus* W. „Eisenholz“, *discolor* Vent. (*Pomaderris disc.* Desf., Str. Falklandsinseln) etc.
- Cebatha** Forsk. (Menispermaceen, XXII. 10) „Kebathbaum“ (v. d. arab. *kebath*, Pfeiffer).
- Cecidodaphne** Nees (Laurineen, VIII. 1) „Gallen“-Seidelbast (*κηκῖς*, *-ιδος* Gallapfel u. *Daphne*, s. d.).
- Cecropia** L. (Artocarpeen, XXII. 2) Ameisenbaum, Armleuchter-, Kanonen- u. Trompetenbaum Leun., fr. *coulequin* (v. *χοάζω* schreie etc. — d. hohle Stamm als Blasinstrument u. s. f.), z. B. *C. concolor* W. u. *peltata* Jacq.
- 1) **Cedrēla** L. (Ampelid. Cedreleen od. Hesperid. Meliaceen Rehb., V. 1) „Cedertanne“, Cuba-Cedernholz, Paternosterbaum, fr. *cèdre* (v. *Cedrus Ceder* u. *ἐλατη* Tanne — Geruch des Holzes nach Ceder!), z. B.

- C. odorata L., s. g. Cigarrenkistenholz, C. montana Bleistifholz.
 2) **Cedrela** Lour. (Myrtaceen, VIII. 1), s. Baeckea frutescens L. — Cedrelēae R. Br. Mahagonibäume (zu Ord. Ampelidēae Bartl.).
- Cedronella** L., Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Citronen“-Bienenaug, fr. cédronelle (dem. cedro span. Citrone), z. B. Zier. C. mexicana Benth., cana, triphylla Mnch. (Dracophyllum canariense L.).
- 1) **Cedrus** T., Barrel, Lk. (sc. Pinus) L. (Coniferen, XXI. 9) „Ceder“, fr. cèdre, e. cedar (n. d. Bach Kidron od. Kedron in Judäa, Paxton, v. *κέω* brenne, räuchere, Wtst.), z. B. C. libanensis Juss. (Libani Barrel.) i. q. Pinus Cedrus L. Libanon-C. od. Cedernfichte W., C. atlantica Man. Atlas-Ceder, C. Deodara Loud. Himalaya-C.
 2) **Cedrus** Mahagoni Mill. (Hesperideen, X. 1), s. Swietenia M. L. Mahagonibaum.
- Celiba** B., Plum., St. Hil. (sc. Bombax) L. (Oxalid Bombaceen, XVI. 8) fünfblättr. Wollenbaum (amer. Name!), s. Eriodendron jasminodörum DC.
- Celastrēae** R. Br., -inēae DC., -acēae Grck. Fleischmantelgew. (zu Ord. Tricoccae Bartl., Kl. Frangulacēae Endl.).
- Celastrus** L. (Theaceen Celastrineen od. Rhamnaceen, V. 1) Baumwürger, -mörder, Bügelholz, Kletterstr., fr. célastre, e. staff-tree (zu Stöcken!) (gr. *κίλαστρον* v. *κηλάς* Herbst — späte Frucht), z. B. Zier. C. scandens L. (Nordamer.), fr. bourreau des arbres, e. bitter-sweet „Bittersüss“, C. ceriferus autt. „Wachs“-Kletterstr. (Südostasien), e. wax-word, etc.
- 1) **Celosia** L. (Amarantaceen, V. 1 od. XXII. 5) Hahnenkamm, fr. célosie od. passe-velours, e. cock's-comb of the Florist v. *κηλώω* brenne — wie eine Flamme anzusehen, Wtst. *κηλέος* verbrannt — Blum. wie vertrocknet!), z. B. Topfbl. C. cristata L., plumosa m. v. v. Federbusch-H., fr. C. à panache cramoisi, e. feathered crimson-Celosia, C. argentēa L. m. v. linearis Sweet, s. spicata Hort., C. margaritacēa L., fr. Cél. perlée, u. C. japonica. 2) **Celosia** (sc. Iresine) L. (Amarantaceen, XXII. 5) Hahnenkamm-Wollast.
- Celsia** L. (Scrophularineen od. Verbascineen, V. 1) Bärenschwanz (n. Olaus Celsius, s. d. Aut.), C. Aretūrus Vahl (Verbascum Aret. L. f.), betonicifolia W. (Blattaria hispanica Dodart), linearis (Hemimēris coccinea) etc.
- Celtidēae** (sc. Urticēae Rchb. s. Ulmaceae Endl.) Zürgerbaumartige, s. Celtis.
- Celtis** T., L. (Urticac. od. Ulmac. Celtideen, XXIII. 1) Zürgerbaum (Zirgelb.), fr. micocoulier, fabrecoulier, e. lote- od. nettle-tree u. bitter-oak „Bittereiche“ (v. *κέλις* Peitsche — zu Peitschenstielen gebr.), z. B. Zier. C. australis L., e. european n.-tr., C. occidentalis L. (obliqua Mnch.), fr. m. de Virginie, e. north-american n.-tr. (in Amerika sugar-berry „Zuckerbeere“) m. v. v., C. aculeata Sw. (Rhamnus ignanēus Jacq.), laevigata Spr. (Momisia l. D.), etc.
- Cembra** Scop. (sc. Pinus) L. (Coniferen, XXI. 9) Zürbelkiefer, Arve od. Zutsche, fr. cembro od. cimbre, flammet, auch Eouve (Alvies) od. Auvier, e. cembran-pine m. v. pygmaea Fisch. (n. d. ital. Nam. d. Pfl. cembro od. cirmōlo geb.).
- Cenchrus** L. (Gräser, XXIII. 1) Stachel- od. Klebgras, fr. racle (gr. *κέγγος* Hirse), z. B. tribuloides L. (Panicastrella americ. minor Mch.), s. Crypsis Ait., Natia Ad. u. Manistūris Sw.
- Cenolophium** Koch (Umbelliferen, V. 2) Hohlrippe, -,kamm“ (v. *κενός* hohl, *λόφιον* Schopf etc. — aufgeblas. hohle Joche), z. B. C. Fischeri Koch (Russl. Lappl.).
- Centaurēa** L. (Composit. Centaureen, XIX. 3) Flockenblume, Tremse O. W., fr. centaurée, e. centauray, bull-weed, globe-flower od. knap-

weed (v. *Κένταυρος* d. Centaur), Zier. C. americana Nutt., suaveolens Hort., Cineraria L., candidissima Lam., macrocephala W., gymnocarpa Moris., orientale L., moschata L., fr. fleur de Grand-Séigneur „Sultansbl.“ od. bluet du Lévant, e. musk-centaury, m. v. fl. alb. Hort.; wild u. Gart. C. Cyanus L. blaue Kornbl. od. „Cyane“ u. montana L. (Pflaumengeruch!). — Centaureæe Rchb.

Centaurella Mchx. (Gentianeen, V. 1) „Kleinentaure“ (dem. Centaurium, s. hern.), z. B. i. q. Gentiana L. s. Erythraea Pers. Centaurium L. Tausendguldenkr. (Chironia Cent. Curt. s. Gerardi Schmidt). C. (Andrewsia) verna u. autumnalis Spr. „Andrews' Frühlings- u. Herbst-Enzian“.

Centaurem (sc. Centauræa L. s. Jacëa Pers.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Scharten-Flockenblume (habitus Serratulae Pers.).

Centauridium Torr.-Gr., Endl. (Compos. Inuleen, XIX. 3) „Schartenflockenblumgleiche“ (s. eb. Centauræum u. *είδομαι* gleiche), z. B. C. Drummondii T.-Gr., s. Centaurium Ad.

1) **Centaurium** Rich. (sc. Erythraea Pers. s. Gentiana L.) (Gentianeen, V. 1) Tausendguldenkraut, fr. chancelague, e. centaury (v. centum = 100 u. aurum Gold — hund. Goldstücke, Wtst.), s. Chironia L., Centaurella Mchx. u. Exacum L. 2) **Centaurium** Ad., Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) i. q. Centauræa Centauræum L., fr. centaurée, épine jaune „Golddistel“.

Centifolia (sc. Rosa) L. (Rosaceen, XII. 5) „Hundertblattrose“ od. „Centifolie“, Garten-(Bauern-)Rose m. v. muscosa Mill. „Moosrose“ (v. centum = 100 u. folium Blatt).

Centinodia Bauh. u. **Centinodium** Rchb. (zu Polygonum L.) (Polygonaceen, VIII. 3) „Hundertknoten“, Wegtritt-Knöterich, z. B. aviculare L. „Vogelknöterich“ (centum u. nodus Knoten — der Stengel-gelenke!).

Centradenia G. Don (Lythrarieen od. Melastomaceen, VIII. 1) „Stachel-drüse“ (*ζέντρον* Stachel, *ἀδὴν*, -έρος Drüse — d. Connektiv d. kleineren Antheren läuft in eine Drüse aus, das d. gröss. in einen Sporn), z. B. Warmh. C. floribunda Planch. (Centralamer.), grandifolia u. rosea Ldl. (Mex.), divaricata G. Don, etc.

1) **Centranthëra** Scheidw. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Antherensporn“-O. (s. eb., *ανθήρα* Staubbeutel), s. Acianthëra. 2) **Cetranthëra** R. Br. (Personaten, XIV. 2), z. B. hispida R. Br. (Neuholl.).

Centranthus DC. (Valerianeen, III. 1) „Spornblume“, -Baldrian, fr. centranthe (s. v. u. *κέντρος* — lange spitze Nektarien!), Zier. C. ruber DC. m. v. fl. albo (Valeriana rubra L., fr. Valériane rouge).

Centrocarcha D. Don (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Stachelspreu“ (s. v. u. *κάρχη* Spreu etc.), s. Rudbeckia.

Centrochilus Schauer (Orchideen, XX. 1) „Stachelippe“ (s. v., *χέιλος* Lippe — Labell m. ein. lang. keuligen Sporn), z. B. gracilis Schau.

Centroclinium D. Don, Endl. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Stachelboden“ (s. v., *κλίνη* Lager, Bett — nämli. Blumenboden m. stachel. Fransen), z. B. altissimum Pöpp., Endl., reflexum Hook, etc., s. Hipposëris Cass. u. Onosëris Less.

Centrolëpis Lab. (Commelyneen od. Restiaceen, I. 1) „Stachelschuppe“ (s. v., *λεπίς* Schuppe — d. mittl. Schuppe stachlig! Wtst.), z. B. fascicularis Lab. (Van Diemensl.), pulvinata R. Sch. (Desvauxia p. R. Br.).

Centrophyllum Neck. (**Kentroph.**) DC. (Compos. Cynareen, XIX. 1) „Stachelblatt“ (s. v., *φύλλον* Laubblatt), z. B. lanatum DC. Wollsaflor, s. Carthämus lan. L.

Centropōgon Benth., Presl (Lobeliac., XIX. 6) „Spornbart“ (s. v., *πώγων* Bart — d. beid. unt. Antheren in ein. Stachelbart ausl., Wtst.),

- z. B. Stuben *C. speciosus* Planch., *surinamensis* Presl, *tovarensis*, etc., s. *Siphocampylus* „Krummröhre“, u. *Sphaerocarpa* „Kugelfrucht“.
- Centrosia** Rich. (-sis P.-Th., Sw.) (Orchid. Vandeën, XX. 1) „Stachel“-O. (s. v., *ώσις* Stoss — Labell gespornt, Wtst.), z. B. *sylvatica* P. Th. (*Calanthe* s. Lindl.), s. *Alismorchis centrōsis* A. Rich.
- Centrosolenia** Van Houtt. (?) „Stachelfutteral“, „-scheide“ (s. v., *σωλήν* Rinne, Scheide etc.), z. B. *bracteata* u. *picta*.
- Centunculus** Dill. L. (*Lysimachieen*, IV. 1) Kleinling (*centunculus* dem. v. *cento*, -ōnis Lumpen), z. B. *minimus* L.
- Cepa** T. (sc. *Allium*) L. (*Liliac. Asphodeleen*, VI. 1) gem. od. Sommerzwiebel, fr. *centenille*, *ciboule* u. *oignon*, e. *cibol* (*ciboul*) u. *onion* (lat. *cepa* Zwiebel od. Bolle, v. d. celt. *cep* Kopf, gr. *κεφαλή* od. v. *κητος* Garten? Wtst.).
- Cepaea** (sc. *Sedum*) L. (*Crassulac. Seden*, X. 5) rispige Fetthenne (v. *κηπαιος* im Garten gezogen), s. *Sedum spatulatum* W. portulakblättr. Fetth. M. Rchb.
- Cephalidēae** DC. Kopfbeerartige, s. sogl.
- Cephaelis** Sw. (*Rubiace. Cinchonaceen*, V. 1) „Kopfbeere“, Brechwurz (v. *κεφαλή* K. u. *εἶλεω* wickle ein — Blütenst.), z. B. *C. Ipecacuanha* Tuss., eigentl. *Ipecacuanha* M.-Rchb., s. *Callicocca* Ip. Broter. „Schönbeere“, *alba* W. (*Tapogomea alba* Aubl.), *glabra* W. (*Tapog. gl.* Aubl.), etc.
- Cephalandra** Eckl., Zeyh. (*Cucurbitac.*, XXI. 10) „Kopfanthere“ (*κεφαλή* u. *άνθη*, -*θρος* Mann, Staubbeutel), z. B. *Zier. C. grandis* Kurz (*Bryonia* gr. L.), *Balkon C. quinqueloba* Schrad. „Balkonepheu“, etc.
- Cephalanthēae** DC. „Kopfblumenartige“, s. *Cephalanthus*.
- Cephalanthēra** Rich. (Orchid. *Arethuseen*, XX. 1) „Kopfkölbchen“, ständel, *Orant O. W.* (s. v., *άνθηρά* Staubbeutel — dieser gestielt, gipfelständig!), z. B. *grandiflora* Babingt., *Xiphiphylum* Rchb. f. s. *ensifolia* Rich., *rubra* Rich., etc., s. *Serapias* u. *Epipactis*.
- 1) **Cephalanthus** L. (*Rubiace. Caprifoliaceen*, od. *Dipsaceen*, IV. 1) „Kopfblume“, Knopfbaum, fr. *cephalanthē*, e. *button-wood* (s. v. u. *άνθος* Blume — in ein. Kopf vereinigt!), z. B. *Zier. occidentalis* L. amerik. *Kopfblumenstr.*, *C. chinensis* Lam. (*Nauclea purpurea* Roxb.), *C. orientalis* Lour. (*Acrodr̄yon* or. Spr.). 2) *C. procumbens* Lour. (*Plantagineen*, IV. 1 od. XXIII. 2), s. *Stilbe* pr. 3) **Cephalanthus** Cham. Schldl. (*Scrophularin. od. Loganiaceen*, IV. 1), z. B. *Sarandi*, s. *Buddlea glabra*.
- Cephalaria** Gren., Schrad., DC. (*Dipsaceen*, IV. 1) „Kopfblume“, Sternkopf, Grindrose u. Karde, s. *Dipsacus* L., *Scabiosa* L., *Succisa* M. K. u. *Asterocephalus* Wallr. (s. v.), z. B. *pilosa* Gren., s. *Dipsacus pilosus* L.
- Cephalotaxus** Sieb., Zucc. (*Cupressineen*, XXI. 9) „Kugeleibe“, -taxus (s. v. u. *Taxus* — bez. d. Blüten!), z. B. *drupacea* s. *Fortunei* Hook.
- Cephalōtus** R. Br., Lab. (*Crassulac. od. Corniculat. Seden*, XI. 5) Drüsenköpfchen, Kopfanthere (*κεφαλωτός* mit ein. Kopf versehen — Kelch inwend. m. kopftrag. Haaren bes., Wtst.), z. B. *Zier. C. follicularis* Lab. (Schlauchpfl. Neuholl.).
- 1) **Ceranium** Lyngb., Rochel (-on Ad.) (Tange, XXIX. 3) „Horn“- od. Knotentang W. (v. *κέρας* Horn? Leun. od. *κεράμιον* Thongefäß?), z. B. *hirsutum* Roth, s. *Callithamnion coccineum* Lyngb. (*Polysiphonia* cocc. Spr.). 2) **Ceranium** Blum. (*Aristolochieen*, XX. 5). 3) **Ceranium** Reinw. (*Polypodiace. Farne*, XXIV. 1), s. *Togularia*.
- Cerasēae** (sc. *Amygdalacēae*) Rchb. Kirschbäume.
- Cerasifera** (sc. *Prunus*) L. (*Amygdalac.*, XII. 1) „Kirschpflaume“, amerik. Kirsche, fr. *cerisette* (*cerasus* u. *fēro* trage).
- Cerastium** L. (*Alsineaceen*, X. 4) „Hornkraut“, fr. *céraiste*, e. horn-

weed (*κέρας* Horn — Form d. vorrag. Kapsel!), z. B. Zier. C. grandiflorum W. Kit. s. argenteum M. B. (incanum Hoffm.), fr. Argentine, tomentosum L., fr. oreille de souris, etc.

- 1) **Cerasus** (sc. Prunus) L. (Amygdalac., XII. 1) Sauerkirschbaum, fr. c  risier, e. cherry-tree, s. Cerasus acida Fl. Wett. (Prunus austera Ehrh.), fr. bigarreau, rote od. weisse (span.) Herzkirsche (gr. *κερασός* u. *κερασία*, fr. cerise Kirsche — v. Cerasunt in Kleinasien am Schwarzen Meer). 2) **Cerasus** (sect. v. Prunus) Rehb.   berh. Kirschbaum, auch S  sskirsche, C. dulcis Fl. Wett., fr. guigne (-nier).

Ceratosicyos Nees, Eckl. u. Zeyh. (Passifloreen, XX. 4) „H  rchen-Stichling“ (*κεράτιον* dem. v. *κέρας* Horn, u. Sicyos — schotenf. Kapsel).

- 1) **Ceratocephalus** Mch. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Hornk  pfchen“, Sichelsamen Leun. (*κέρας*, -ατος Horn, *κεφαλή* Kopf — Form d. Fr  chtchen!), z. B. falcatus Pers. (Ranunculus f. L.) u. orthoceras DC. (Ran. falc. M. B.). 2) **C.** Rich. delphiniifolius Ehret. (Compos. Heliantheen, XIX. 3), s. Coreopsis verticillata L. (Bidens pilosa L.).

Ceratochilus Lindl., Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Hornlippe“ (s. v., *χεῖλος* Lippe — diese beiderseits geh  rt, Wtst.), z. B. grandiflorus Lodd., s. Stanhopea gr.

Ceratochl  a DC. (Gr  ser, III. 2) „Horngras“, -samengras (s. v., *χλόα* Gras — d. unt. Spelze gegrannt, Wtst.), z. B. C. uniolooides DC. (Uni  la stricta Torr.) etc., s. Festuca.

Ceratodon Brid. (Moose, XXIV. 2) „Hornzahn“-M. (s. v., *ὀδών* Zahn — Z  hne zweih  rnig!), z. B. purpureus Brid., s. Dicranum s. Trichostomum purp. Hedw.

Ceratolobus Mart. (Palmen) „Hornh  lsen“-P. (s. v., *λοβός* H  lse etc.), z. B. C. glaucescens Mart.

- 1) **Ceratonia** L., W. (Cassieen Ceratonieen, XXIII. 3) Johannisbrotbaum, C. Siliqua W., fr. pain de St. Jean od. caroube (-rouge, -rouche), -roubier, e. carob, St. John's-bread (— lief. Siliqua dulcis d. Apoth.) (v. *κέρας*, -ατος Horn — Form d. H  lse!). 2) **Ceratonia** (sc. Mimosa) L. (Mimoseen, XXIII. 1) Johannisbrot-Mimose.

Ceratophyllac  ae Gray, -ll  ae DC. Igellockgew., **Ceratophyllinae** Bisch. Ord. d. Hornblattgew., s. sogl.

Ceratophyllum L. (Urticaceen od. Ceratophylleen, XXI. 5) „Horn“-od. „H  rnerblatt“, Igellock, Zinken O. W. Wasserzinke, Hirschhorn-Nessel, fr. c  ratophylle od. cornifle, auch mille-feuille cornue-d'eau (s. v., *φυλλον* Blatt — diese knollige Locken m. Widerhaken!).

Ceratozamia Miq. (Cykadeen, XXII. 12) „Horn“-Zapfenpalme (s. v. u. Zamia), z. B. terrestris u. mexicana Miq.

Cerb  ra L. (Apocynaceen, V. 1) „Gift-Hundsw  rger“, Schellenbaum (n. d. giftig beissend. H  llenhund Cerberus d. Myth.), z. B. C. manghas L. (Arbor lactaria Rmph. Ostind.) Milchbaum, fr. manglier    fruit v  nimeux, s. Ochrosia manghas Burm., C. chinensis Spr., s. Dissolena verticillata Lour.

Cercis L. (Cassieen, X. 1) Stammh  lsenbaum (v. *κερκίς* Pflock, Spule — Frucht wie ein Weberschiff od. eine Messersch  ide, Wtst.), z. B. Zier. C. Siliquastrum L. europ. Judasbaum, fr. gainier, e. Judas-tree, C. canadensis L. u. japonica v. Sieb. (chinensis Bunge), C. canadensis L., fr. bouton-rouge, Salatbaum v. Canada.

Cerealia Agric. Saatfr  chte od. „Cerealien“ (cerealis die Ceres, G  ttin d. Ackerbaus, betr.).

Cerefolium (sc. Scandix) L. (Umbelliferen, V. 2) Gartenkerbel, fr. cerfeuil, e. chervil (Cerefolium Plin., gr. *χαιρέφυλλον*, fr. cerfeuil, deutsch „Kerbel“).

- Chaerophyllum** Hoffg., L. (Umbelliferen, V. 2) Kälberkropf, -kern, Körfel O. W., eig. „Lustblatt“, fr. cerfeuil (v. *χαίρω* freue mich, *φυλλων* Laub — schöne Fiederform! od. d. deutsche „Kerbel“, lat. *ceresfolium*, gräcisiert!), z. B. C. *sylvestre* L. (*Anthriscus* s. Hoffm.), fr. cerfeuil sauvage od. persil d'âne „Esels-Petersilje“.
- 1) **Chaetospora** Ag. (Nostochineen od. Gallertalgen, XXIV. 3) „Borstenspore“ (*χαίτη* los. Haar, Borste, *σπορά* Samen, „Spore“). 2) **Chaetospora** Hb., R. Br., Rchb. (Cyperaceen, III. 1) Samenhaar-Cypergras (— an d. Basis des Fruchtknotens Borsten! Wtst.), s. *Rhynchospora* Vahl s. *Schoenus ferrugineus* L.
- 1) **Chaeturus** Lk. (Gräser, III. 2) „Borstenschwanz“, Katzenschw. (s. eb. u. *ούρά* Schwanz — unt. Spelze begrannt!), z. B. *fasciculatus* Lk., s. *Polypogon* fasc. Pers. 2) **Chaeturus** Ehrh. (Labiaten, XIV. 1) Katzenschweif, s. *Leonurus Marrubiastrum* L.
- Chamaebuxus** DC. (sc. *Polygala*) L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Zwergbux“ (*χαμαί* an der Erde, niedrig u. *Buxus*), z. B. C. *Karensium* Kurz.
- 1) **Chamaecerasus** Pers. (sc. *Prunus* L., sc. *Cerasus* Lois.) (Amygdalaceen, XII. 1) „Zwergkirsche“, sibirische Strauchkirsche, Erdweichsel, s. g. Ostheimer Weichselk., fr. faux cerasier, e. ground-cherry-tree od. Siberian cherry (s. v.), s. *Cham. alpicena* Delarb. 2) **Chamaec.** T., Med. (Lonicereen, V. 1) Heckenkirsche, z. B. C. *Xylostemum* Med. u. *tatarica* Med., s. *Lonicera Xylostemum* u. *tatarica* L.
- 1) **Chamaecistus** Mill. (sc. *Helianthemum*) (Cistaceen, XIII. 1) „Erdciststrauch od. gem. Sonnenröschen, s. *Cistus Helianthemum* L. (*Hel. vulgare* G.). 2) **Chamaecistus** (sc. *Rhodothamnus*) Rchb. (Ericaceen, VIII. 1) drüsiges od. Zwerg-Alpenröschen, s. *Rhododendron*. 3) **Chamaec.** Sloane (Turneraceen, V. 3), s. *Turnera cistoides* L., *Chamaec. Petiv.*, s. *Turnera pumilea* L. 4) **Chamaec.** Barrel., s. *Cistus thymifolius* L. (s. v. u. *Cistus*).
- Chamaecyparis** Spach (zu *Cupressus*) (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Zwergcypresse“, s. g. weiße Ceder (*χαμαί* niedrig, *κυπάρισσος* Cypresse), z. B. Zier. C. *sphaeroides* Spach m. v. v., s. *Cupressus thujoides* L. (*Thuja sphaeroidalis* Rich.), C. *nutkaensis* Sp. (*Cupr. americana* Trautv. s. *Thujopsis borealis* Fisch.), fr. cuprès d'Amérique.
- Chamaecyparissias** DC. od. **Chamaecyparissus** (sc. *Santolina*) L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) gem. Heiligenpflanze, eig. „Zwergcypresse“ (s. v. — der Blätt. wegen, wie eine kl. Cypresse!), s. *Santolina virens* Mill.
- 1) **Chamaedaphne** Mitch. (Rubiaceen, Cinchonaceen, IV. 1) „Zwerg-Seidelbast“ (s. v. u. *Daphne*), z. B. C. *repens* L. (*Syringa baccifera* Pluk.), s. *Mitchella* L. 2) **Chamaedaphne** Mch., Catesb. (Ericaceen, X. 1) *Ch. sempervirens* Catesb., s. *Kalmia angustifolia* L., *Ch. calyculata* Mch., s. *Andromeda cal.* L.
- Chamaedorëa** W. (Palmen) „Zwergpalme“ (s. v. u. *δούρον* Baum, Lanze — kleine P. m. rohrart. Stamm, Wtst.), z. B. *Ch. Ahrenbergiana* Berg-P., *elatior* Mart., *elëgans* etc.
- Chamaedryon** Ser. (zu *Spiraea*) (Rosaceen, XII. 4) Zwerg-Eich-Spiräen od. gamanderblättr. Rmpl. (*χαμαί* niedrig, *δρύς*, -*νός* Eiche — m. Blätt. ähnl. denen d. Eiche!), z. B. *Sp. chamaedryfolia* Jacq. (*ulmifol.* Scop.), *chamaedryfolia* L., *hypericifolia* L. etc.
- 1) **Chamaedrys** T. (sc. *Teucrium*) L. (Labiaten, XIV. 1) gem. Gamander (— *Chamaedrys germanisier*!), Schafkraut, fr. *chamédrys* od. *chênette* (s. v. — weg. der Eichenblattform!). 2) **Ch.** (sc. *Veronica*) L. (Scrophularineen, II. 1) Gamander-Ehrenpreis („Vergissmeinnicht“), fr. *germandrée*, e. *germander*.
- Chamae-Iris** (sc. *Iris*) Bertol. (Irideen, III. 1) falsche od. Erd-Schwertlilie, fr. *Iris faux-Iris*, e. *false* I.

- Chamaelaucium** Desf., DC. (Myrtaceen, X. 1) „Zwergpappel“, fr. chaméleuce od. pas d'âne (s. v. u. *λεύκη* Weisspappel), z. B. ciliatum u. plumosum Desf. (Str. Neuholl.). — Chamaelauciæe Rchb.
- 1) **Chamaelæa** (sc. *Tragia*) L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 3) Schiller-Bocksblatt, span. Zeiland (*γαμαίλεος* od. *γαμαίλειον* schillerblättr. Pfl., Riemer od. Chamäleon Zool. od. *γαμάι* u. *έλαία* Ölbaum, „kleiner Ölbaum“), z. B. C. tricocca G., s. Cneōrum tricoccon L. 2) **Chamaelæa** T., Borna. (Rhamnaceen, V. 1) „Chamäleon“-Heidenmyrte, C. pilosa = *Phyllea stipularis* L. 3) **Ch.** *africana* Herm. (Thymeläaceen, VIII. 1), s. *Grubbia rosmarinifolia* Berg., C. *indica* = *Daphne pilosa* s. *villosa* L.
- Chamaemespilus** Med., DC. (sect. v. *Sorbus*) Ser. (Pomaceen Sorbeen, XII. 4) „Zwergmispel“, Strauch-Mehlbeere Rmpl., s. *Mespilus Chamaemespilus* L. (*Sorbus* Ch. Crantz).
- Chamaemorus** (sc. *Rubus*) L. (Rosaceen, XII. 5) Sumpf-Himbeere M. Rchb., „Zwergmaulbeere“, s. g. Moltebeere (Multe-), e. cloude-berry (s. v. u. *Morus*, gr. *μόρον* od. *μούρον* Maulbeere).
- Chamaenerion** T., Schreb. (-ium T., Scop.) (zu *Epilobium*) Rchb. (Onagrariaceen, VIII. 1) Weidenröschen, „Zwergoleander“ (s. v. u. *Nerium*, gr. *νηρίον* Oleander), z. B. C. *hirsutum* Scop. u. *montanum*, s. *Epilob. hirs.* u. *mont.* L.
- 1) **Chamaepeuce** (sc. *Serratula* s. *Stachelina*) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Erd“- od. „Zwergfichte“ (gr. *γαμαίπεικη* i. q. *-λεύκη* Hufblattich, lat. *Tussilago* F. W. Riemer — Blätt. nadelförm. etc., Wtst.). 2) **Ch.** *Prosp.* Alp. (Compos. Carduac., XIX. 1) Topfbl., C. *diacantha* DC., fr. Cham. à deux épines, e. double-prickled Ch., s. *Carduus diac.* Lab.
- 1) **Chamaepitys** T. (sc. *Ajuga*) Schreb. (Labiaten, XIV. 1) „Erd“- od. „Zwergfichte“, gelber Günsel, fr. *chamépitys* od. *Ive musquée* u. *ivette*, e. ground pine (s. v. u. *πίτυς* Fichte), s. *Teucrium Chamaepitys* L. 2) **Ch.** *incana* autt. (Convolvulac., V. 1) Harzkraut, s. *Cressa cretica* L.
- Chamaeplium** Wallr. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) (zu *Erysimum* L.) „Erdfüll“-Hederich (s. v. u. *πλειον* voll).
- Chamaeranthemum** Reg. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zwerg-Menderle“ (*γαμαί* u. *Eranthemum*), C. igneum Reg. = *Eranthemum igneum* Hort.
- Chamaerops** L. (Palmen, VI. 1) „Zwergpalme“ (s. v. u. *ρόψ*, *-όψις* Strauch), z. B. *Gewächsh. humilis* L. mittelmeer., C. *chinensis* s. *excelsa* Thb. s. *Fortunei* Hort., s. g. Hanfpalme.
- Chamagrostis** Borkh. (Gräser, III. 2) „Zwerggras“ (s. v. u. *αγρωστις*), C. *minima* Bkh., s. *Mibora* v. P.-B. (*Sturmia* m. Hoppe, *Knappia agrostidæa* Sm.).
- Chamlagu** (sc. *Robinia* P'Hér. s. *Caragana* Lam.) (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) mongol. Erbsenbaum (mongol. Name!).
- Chamomilla** Gay, DC. (sc. *Matricaria*) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) echte „Kamille“ od. gem. Mutterkraut, fr. *camomille*, e. *camomile* u. *stitch-wort* (gr. *γαμαίμηλον* i. q. *ἀνθεμις* eig. „Erdapfel“ v. *μηλον* — riecht wie Quitten, Wtst.).
- Chamorchis** Rich. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) Zwergstendel Seub. (*γαμαί* an der Erde u. *Orchis*), C. *alpina* Rich., s. *Ophrys alp.* L. u. *Chamaeræpes* Spr.
- Chara** L., Ag. (Characeen, XXI. 1) Armleuchter, fr. *charagne* (-aigne) od. *charapot*, *girandole* u. *lustre d'eau*, e. *chandelier* (gr. *χαρά* Freude — näml. am Wasser, Wtst.). — Characæe Rich. Ord. der Armleuchter (*Siphonocaulae* Bisch. „Röhrenstengler“).
- Charianthus** Don (-tha A. Braun) (Melastomaceen Miconieen, X. 1) „Reiz“- od. „Grazienblume“ (*χαρίεις*, *-εσσα* reizend etc., *ἀνθος* od. *ἀνθη* Bl. — schön hochrot!), z. B. *coccineus* Don, s. *Chaenanthæra* Rich.

- Charieis** Blum. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Holde“, Schmuck- od. Reizaster (s. eb. — schön blau!), z. B. heterophylla Cass., s. Kaulfussia amelloides Nees.
- Chariessa** Becc. (Olacineen, III. 1) „Holdselige“ (*χαρίεις*, -εσσα, -ίεν hold etc.), z. B. Smithii Becc., s. Villaresia Smithii F. Müll.
- Charlwoodia** Sweet (Liliaceen, VI. 1) „Charlwood's“-Dracaene (n. G. Charlwood od. Charleswood, enthus. engl. Bot.), z. B. Topf C. rubra (Dracaena r. Hort.), C. (Drac.) congesta Sägezahn. Dr.
- Chate** (sc. Cucumis) L. (Cucurbitac. XXI. 10) ägyptische Melone Vilm., e. egyptian cucumber (chate, Wtst. d. ägypt. Name, v. *χάτος* od. -τις Mangel?).
- Chayōta** Jacq. (Cucurbitac., XXI. 10) essbare Chayote, C. edulis Jacq. (Name d. Pfl. in Westind., Wtst.), s. Secchium P. Br.
- Cheilanthes** Sw. (Farne, XXIV. 1) „Lippenschleierchen“, Schuppenfarn (*χειλος* Lippe od. Rand, *ἀνθή* Blüte — blühen am Rande, Wtst.), z. B. C. odōra Sw., microphylla Sw. etc., s. Notochlaena u. Polypodium.
- 1) **Cheiranthus** L. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) Lack, Levkoje, Veil Vilm. (arab. kheyry, nicht v. *χειο* Hand, *ἄνθος* Bl., Wtst. die man gern in d. Hand hält), Zier. C. Cheiri L. (kheyry) Goldlack, gelbe Viole od. Veil, fr. cheiranthe u. garranier, e. yellow-stock, C. incanus L. (Matthiōla inc. R. Br.) m. v. v., z. B. v. cocardeau, Winter-Levkoje, C. annuus L. (Matth. ann. R. Br.) m. v. v., z. B. Erfurter, Sommer-Levkoje. 2) **Cheiranthus** (sc. Brassica Vill. s. Sinapis Koch) (Crucifer. Siliq.) Levkoy-Kohl od. -Senf, lackblüt. Senf Grck. 3) **Ch.** (sc. Erysimum) Pers. (Crucif. Siliq.), s. Erysimum cheiranthoides L. lackart. Schotendotter Grck. 4) **Ch.** (sc. Manulea) L. (Scrophularineen od. Lobeliac. XIV. 2) Lack- od. Levkoy-Handblume, s. Lobelia Ch. L. (Manulea lat. für Cheiranthus „Handbl.“ — fünffing. Blatt!).
- Cheiri** Dorst. (sc. Cheiranthus) L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2), s. eb. Goldlack, Gelbveil Vilm., fr. violier jaune od. à fleurs j., giroffé des murailles, auch rameau d'or, Jalousie, Muret etc., e. gilliflower, kelri, common wall-flower, s. Cheiranthus fruticosus L., C. Delileanus Hort. Par., fr. giroffée de Delile (arab. kheyry, nicht *χειο*, -ρος Hand!).
- Cheiropsis** DC. (Ranunculaceen Clematideen, XIII. 7) Hand-Waldrebe v. *χειο*, -ρος Hand u. *ὄψις* Aussehen — weg. einer d. Blume wie eine Hand einschliess. Hülle, Wtst.), z. B. montana Ham. (anemonaeflora Don) Himalaya-W., s. Clematis mont. s. anem.
- 1) **Chelidonium** T. (Papaveraceen, XIII. 1) „Schwalbenwurz“, Schell- od. Schöllkraut, fr. chéloïne, e. celandine (-lende) u. swallow-wort, tetter-wort u. silken-cully „Seidenpinsel“ (v. *χελιδών* Schwalbe — Plin. blüht bei deren Rückkehr!), z. B. diphyllum Mchx., s. Stylophorum d. Nutt., C. Glaucium L. Hornmohn, e. horned-poppy, s. Glaucium luteum Scop., C. corniculatum L. (Glaucium corn. Pers.). — Chelidoniaceae (sc. Papaveraceae) Rehb. 2) **Chelidonia** Koch (zu Cardamine L.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2), z. B. Decor.-Blattpfl. Ch. grandiflōra argentea Koch, s. Cardamine chelidonia Pers.
- Chelōne** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Schildblume“ od. „Krotten-schild“, fr. galane u. tortue (gr. *χελώνη* Schildkröte — weg. d. Oberlippe!), z. B. Zier. C. barbata Cav. v. coccinea, C. glabra L. m. v. v., C. obliqua L. (alba Mnch. purpurea Mill.), C. Pentstemon L. s. Pentstemon Ait., s. Pentstemon l'Hér.
- Chenopodiaceae** Endl. Ord. d. Gänsefussgew. (zu Kl. Oleraceae Endl. Gemüsegew.), s. hern.
- Chenopodiaceae** Vent., -diaceae DC. Gänsefussartige (i. q. Atriplicaceae autt. Meldenartige), s. hern.

- Chenopodiina** Moq.-Tand. (Chenopodiac., V. 2) „Gänsefüsschen“ Grck., z. B. *maritima* Moq. = *Chenopodium* m. L.
- Chenopodium** T. (Chenopodiaceen od. Atripliceen, V. 2) „Gänsefuß“, fr. pate (patte) d'oise, herbe aux vers, e. goose-foot od. belvidere (v. *χῆν. -νος* Gans, *πυθῖον* Socke etc. v. *πυθῖς. -όδος* Fuss), Gart. C. hortense R. Cch. (Suaeda hort. Forsk.) „Gartenmelde“, Zier. C. scoparium L., s. g. Studentenkraut u. atriplicis L. Purpur-G., C. ambrosioides L., fr. thé de santé (- du Mexique) od. ambrosine, e. hedge-mustard.
- Cherlera (-ia)** L. (Arenarieen od. Alsineen, X. 3) „Cherlerie“ (n. Cherler, Mitarb. d. Joh. Bauhin, Herausg. eines Prodromus von Tabernaemontani Hist. plant. univers. 1619), z. B. C. sedoides Jacq., s. *Lychnis alpina* Pluk., C. sedoides Forsk. = *Arenaria procumbens* Vahl.
- Chilodia** R. Br. (-dium autt.) (Labiaten, XIV. 1) Lippenzahnstrauch (*χειλος* Lippe u. *ὀδὸν* Zahn — halb zweiteil. Unterlippe! Wtst.), z. B. Treibh. C. scutellarioides R. Br.
- Chimaphila** fehlerh. st. **Chimatophila** = **Chimophila** Pursh, s. d.
- Chimatophila**, s. eb.
- Chimonanthus** Lindl. (zu *Calycanthus*) L. (Calycifloreen Bunge, XII. 5) „Winterblume“ (-blüte) (v. *χειμῶν, -ώνος* Winter u. *ἄνθος* Bl.), z. B. Zier. C. praecox s. fragrans Ldl. (*Calycanthus* pr. L.) — Stuben im Dez. u. Jan.
- Chimophila** Pursh (st. **Chimatophila**) (zu *Piröla* Rchb.) (Ericaceen, X. 1) „Winterlieb“, -grün (*χειμωφιλος* v. *χειμα, -αιος* od. *χειμῶν, -ώνος* Winter u. *φιλος* Freund, Liebhaber), z. B. umbellata Pursh = *Pyröla* (*Pirola*) umbellata L.
- China** (sc. *Smilax*) L. (*Smilacina*, VI. 1) „China“-*Smilax* (— Stechwinde) (— lief. d. Chinawurzel d. Apoth.).
- Chiococca** P. Br. (st. **Chionococca**) (Cinchonaceen od. Coffeaceen, V. 1) „Schneebeerenstrauch“, Hohlbeere, fr. chiococque (v. *χιών, -όνος* Schnee — Beeren glänz. schneeweiss!), z. B. C. anguifuga Mart. Schlangenstrauch, C. paniculata L. (*Psychotria* p. W. s. alpina, Bstr. Surinam), C. opulima Spr. (*Coffea* op. Forst., Neucaled.).
- Chionanthus** L. (Oleaceen Jasmineen od. Sapotac. Fraxineen Rchb., II. 1) „Schneeblume“, Schneeflockenbaum Rümpl., fr. arbre de neige od. Chionanthe de Virginie, fleur en neige, e. virginian snow-flower (-drop) (v. *χιών, -όνος* u. *ἄνθος*), Zier. C. virginicus L. m. v. *maritima* Pursh, C. compacta Sw. (*Linociera* c. R. Br.), C. tetrandra Vahl (*Maypea guianensis* Aubl.).
- Chirita** Don, Hamilt. (Cyrtandreen od. Scrophularineen XIV. 2) „Handschuhblume“ (v. *χειρῖς, -ιδος* Ärmel, Handschuh? Wtst. ind. Name!), z. B. Warmh. C. Moonii, Walkeri u. zeylanica Don.
- Chironia** L. (Gentianeen, V. 1) „Chiron's-Enzian, Tausendguldenkraut, fr. chiron (n. d. Centauren Chiron, berühmt. Arzt, Myth.), z. B. Zier. C. frutescens L. „Strauch-Chironie“, Gewächsh. linoides L., floribunda Paxt. s. Fischeri Hort., s. *Erythraea* u. *Centaureium*.
- 1) **Chironium** Scop. (sc. *Laserpitium*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Chiron's“-Dolde (s. eb.). 2) **Opopanax Chironium** Koch = *Pastinaca* *Opopanax* L. (Umbellif. V. 2).
- Chlamydëa** Banks (-dia G.) (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Mantellilie“, Flachslilie (v. *χλάμυς, -υδος* Oberkleid — weg. deren Verwendung!), z. B. C. tenacissima G. = *Phormium tenax* L. neuseel. Flachs.
- Chlidanthus** Herb., Lindl. (Amaryllideen, VI. 1) Prunk-Narzisse (v. *χλιδῆ* Prunk etc., *ἄνθος*), z. B. fragrans Herb., s. *Pancretium luteum* Poir.

- Chlōra** L. (Gentianeen, VIII. 1) Achtspalt-Enzian, Bitterling, Grünling
Leun., Gelbkraut Rümpl., fr. chlore, e. yellow-wort (χλωρός grüngelb),
z. B. Zier. grandiflōra Griseb.
- Chloranthus** Sw., R. u. Sch. (Piperaceen Chlorantheen od. Caprifoliac.,
II. 1) „Grünblume“, Grünling, Pflaumenpfeffer (s. eb.), z. B. C. ser-
ratus u. spicatus R. Sch. (Jap.), s. Nigrina serr. u. spic. Thb.
- Chlorēa (-raea)** Lindl. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Grünorche“ (v.
χλωράω bin gelb- od. blassgrün), z. B. Austinae Gray.
- Chloridēae** Kth. Fingergräser, s. Chloris.
- Chlōris** Sw., Desv. (Gräser, XXIII. 1) „Grün“- od. Fingergras (v. χλω-
ρίζω bin grüngelb od. χλωρός gelbgrün), z. B. Zier. C. tenella Roxb.,
s. Ctenium indicum Spr.
- Chlorococcum** Fr. (Nostochineen-Algen, XXIV. 3) „Grünkorn“-Alge
(— grün. Überzug v. Rinde d. Bäume!) (χλωρός u. κόκκος Korn).
- Chlorocrepis** Griseb. (zu Hieracium L.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1)
„Grünpipau“ (s. v. u. Crepis, s. d.), z. B. staticifolia Gris. (Hiera-
cium stat. Vill.), s. Tolpis st. Schultz-Bip.
- Chloromyron** Rz. Pv., Pers. (Tiliaceen od. Capparideen, XIII. 1) „Grün-
balsambaum“, Marien-B. (s. v. u. μύρον Balsam- od. Duftöl), z. B.
verticillatum R. P., s. Oleum s. Balsamum Mariae (B., Peru).
- 1) **Chlorophytum** Ker (Liliac. Asphodeleen od. Sarmentaceen, VI. 1)
„Grünilie“ (χλωρός u. φυτόν Pfl.), z. B. Zier. Stuben: C. Stern-
bergianum Steud. (Cordylīne vivipāra Hort.), s. Anthericum s. g.
fliegender Holländer, C. laxum R. Br., inornatum Ker, elatum R.
Br. (Phalangium el. Red.). 2) **Chlorophytum** Ag. (Algen, XXIV. 3)
„Grünalge“. 3) **Chl.** Pohl (Rubiaceen, IV. 1) — Blätt. schön grün!
- Chloroxylon** P. Br., DC. (Hesperideen od. Cedreleen, X. 1) „Grünholz“
(s. v., ξύλον Holz), C. Swieteni P. Br., s. Swietenia s. Laurus
Chloroxylon L. Atlas- od. Seidenholz vom Himalaya, fr. bois satiné.
- Chondrilla** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Knorpelsalat“, Krüm-
ling O. W., fr. chondrille (χόνδρος Knorpel u. Klumpen etc. —
Gummiklumpen an d. Stengeln, Paxton).
- Chorisia** Kth. (Oxalid. Bombaceen, XVI. 8) „Choris“-Wollbaum (n. d.
russ. Nat. u. Reis. Choris ben.), z. B. ventricosa Kth., insignis
H. B. K. (B. Südamer.), etc.
- Choristopetalae** DC. „Getrenntkronblättrige“ = Dialypetalae Endl. u.
Polypetalae Juss. (χωριστός getrennt).
- Chorozeḗma** Lab. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Kreisfahne“ (v. χορός
Kreis, σημα Fahne — zugerund. Vexill!), z. B. Gewächsh. ilicifolium
Sm., Henchmanni R. Br., varium Benth. etc. (kl. Hstr.), s. Oxylo-
bium Andr.
- 1) **Christophoriana** T., DC. (Ranunculaceen, XIII. 1) „Christophskraut“,
schwarze Christwurz, Giftfahre od. -traube (v. Χριστόφορος, St.
Christoph, „Christusträger“, Legende), z. B. C. nigra s. spicata T.
DC., s. Actaea nigra Fl. Wett. s. spicata L., racemosa T. (Actaea
rac. L. s. Cimicifuga r. L.). 2) **Christophoriana** arborēa Pluk. (Ara-
liaceen, V. 5) Angelikabaum = Aralia spinosa L. (Angelica arbores-
cens Comm.), C. canadensis Moris. = Aralia racemosa L.
- Chronosemium** Desv., Ser., DC. (zu Trifolium Rchb.) (Legumin. Trifo-
lieen, XVII. 4) Dauerfahne (χρόνος Zeit, σημειον Zeichen, Fahne
— Blüt. nach d. Verblüh. sitzenbleibend, Wst.), z. B. T. agrarium
u. procumbens L. etc., s. Lupulina Desf.
- Chroolepidēae** autt. Schorfalgen, s. sogl.
- Chroolēpis (-us)** Ag. (Confervaceen, XXIV. 3) „Hautschorf“ (v. χροά
od. χροός Haut, λέπος Schale od. λεπής Schorf etc. — farb. Über-
züge auf Steinen etc.), z. B. Jolithus Ag. „Veilchenstein“, -moos.
- Chrysanthēnum** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Wucherblume,

eig. „Goldblume“, fr. chrysanthème, e. chrysantenon (*χρύσοσ* Gold, *ἀργεῖμον* i. q. *ἀρθος*), z. B. C. segētum L. s. g. böse Blume od. Saatwucherbl., fr. fleur dorée, souci des champs (- des blés), marguérite jaune, e. marigold, C. Leucanthemum L. s. g. Marguerite od. grosse Gänseblume, fr. marguérite grande, oeil de boeuf, e. margarite, Gartenbl. C. coronarium L., fr. chr. des jardins, e. garland chr., m. v. fl. albo Hort., C. carinatum Schousb., fr. chr. tricolore, m. v. v., C. rosëum Lindl. (Pyrethrum ros. Ldl. s. carnëum M. B.), liefert s. g. pers. od. kaukas. Insektenpulver, C. indicum Curt. (japonicum u. ind. Thb.), Ramatuelle od. s. g. Winteraster, s. Anthemis artemisiaefolia L. s. grandiflora Hort., m. v. v. z. B. grandiflorum, Pompon, Bronze-Dragon, Yellow-Dragon etc.

- 1) **Chrysëis** Lindl. (Papaveraceen, XIII. 1) „Goldmohn“ (gr. *Χρυσήϊς* Frauennamenname v. *χρύσοσ* Gold), C. californica Ldl. = Eschscholtzia cal. Cham. 2) **Chrysëis** Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Goldblume, -flockenbl., s. Centaurea suaveolens W. (Chrysis Ren.).

Chrysobalanus L. (Myrobalanceen, XII. 1) „Goldpflaume“, Icacopflaume (*χρύσοσ* u. *βάλανος* Eichel etc., lat. glans — eichelförmige gelbe Frucht, Wtst.), C. Icacó L. westind. Cacaopflaume.

Chrysobaphus Wall. (Orchideen, XX. 1), „Goldfarb“-O. (s. v., *βαφή* Farbe).

Chrysobotrÿa Spach (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) Gold-Johannisbeerstrauch, „Goldträubchen“ (s. v. u. *βότρους*, -*νος* Traube), z. B. Zier. revoluta Spach (Ribes aurëum Pursh) s. g. Chokoladenstr. (R. fragrans Lodd.), fr. grosseiller doré, C. Lindleyana Sp., s. Ribes tenuiflorum Lindl.

Chrysocephalum Walp. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Goldköpfchen“ Rmpl., fr. chrysocephale (*χρύσοσ* u. *κεφαλή* Kopf), z. B. Zier. apiculatum Steetz, s. Helichrysum ap. DC. (Gnaphalium ap. Lab.).

Chrysocoma L., DC. (Compos. Astereen od. Eupatorineen, XIX. 1) „Goldschopf“ Seub., -haar, fr. chrysocome (s. v., *κόμη* lat. coma Haupthaar — gelbe, fein haarf. Blüten, Wtst.), C. coma aurëa L. (Conyza Comaurëa L.), s. Linosyris Cass. u. Gnaphalium.

Chrysoglossum Blum. (Orchideen, XX. 1) „Goldzungen“-O. (— Labell goldfarbig!).

Chrysophyllum L. (Sapotaceen, V. 1) Sternapfelbaum, eig. „Goldblatt“, indisches Eisenholz, fr. cañitier (s. v., *φύλλον* Laubblatt — die Bl. unten rostf. goldglänz. überzogen!), C. ferrugineum s. Cainito L., s. Manglilla Chrysoph. Lam. (Myrsine Manglilla R. Br.), auch Nycterisition ferruginëum Rz. Pv.

- 1) **Chrysosplenium** T., L. (Saxifragaceen, X. 2) „Goldmilz“, Milzkraut, fr. hépatique des marais, dorine od. saxifrage hépatique dorée, e. milt-wort (-wast), spleen-wort (s. v., *σπλήν*, -*ηνώσ* Milz — geg. Milzkrankh.!), z. B. oppositifolium L. s. repens Lk. 2) **Chrysosplenium** Walt. (Polygonaceen, VIII. 3) wolliger Knöterich, s. Eriogonum tomentosum Mchx.

Chrysurus P.-B., Rich. (Gräser, III. 2) „Goldschwanz“ (s. v., *οὐρά* Schwanz — schwanzähnl. Ährchen gelb!), z. B. Zier. C. cynosuroides Pers. (Cynosurus aurëus) u. a., s. Hymenothecium Lag., Aegopogon Hb.

Chysis Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Giess“-O. (*χύσις* d. Giessen od. Schütten — hängt von d. Bäum. herab, Wtst.), z. B. Warmh. C. bractescens Lindl. (Amer.).

- 1) **Cianitis** (bess. **Cyan.**-) autt. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Blauflockenblume, „Cyanengleiche“, Berg- od. Wald-Cyane (*κυανίτις* od. -*νοειδής*), z. B. C. sylvatica autt. = Centaurea montana L. (Cyänus mont. Fl. Wett.). 2) **Cyanitis** Reinw. (Saxifragac., X. 2) Blausteinbrech (— Blüten u. Früchte blau! Wtst.).

- Ciborium** Endl. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) (zu Pezīza L.) „Becherpilz“ (*κιβωριον* lat. ciborium Becher etc.).
- Cibotium** Kaulf. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Kistchenfarn“ (*κιβώτιον* Kiste — bez. d. Sporangien!), z. B. Chamissoi Kaulf. (Sandwichsins.), Billardieri Klf. (*Dicksonia antarctica* Lab.).
- Cicca** L. (Euphorbiac., XXI. 4) Wunderbaum- od. Ricinus-Euphorbium (*κικι* Wunderb. — d. Rinde ähnl. wie bei Ricinus purgierend, Wtst.), C. disticha L., s. Averrhoa acida L. f.
- Cicendia** Adans. (Gentianeen, IV. 1) Bitterkraut, Fadenblatt Leun., Zindel O. W., Vierspalt-Enzian (n. d. Namen Cicendi geb., Wtst. d. veränd. Gentiana od. Centaurium!), C. filiformis Ad., s. *Exācum* fil. W.
- 1) **Cicer** T. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Kicher“, -erbse, fr. pois-chiche u. garranche, e. chick-pea (cicer, -ëris „Kicher“, hebr. kīkar rundlich!), C. arietinum L. u. sativum L. (*Cicerula* sat. Alfd.). 2) **Cicer** (sc. *Astragalus*) L. (Legum. Astragaleen, XVII. 4) kicherart. Traganth. 3) **Cicëra** (sc. *Lathyrus*) L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) rote Platt-erbse M.-Rehb.
- Cicerbīta** Wallr. (zu *Prenanthes*) Rehb. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Krautichorie“ (Cicer od. *Cichoria* u. *herbesco*, Partic. *herbitus*, werde zu Gras od. Kraut, st. *Cichoria herbīta*!).
- Cicercūla** Alfd. s. Cicer (dem. cicer).
- Cicerella** Mnh. (zu *Lathyrus*) L. (Papilionaceen, XVII. 4) „Kicherchen“ (dem. Cicera sc. *Lathyrus* L.).
- Cichoriacëae** Rehb. (-racëae Juss.) cichorienartige Korbblütler (zu Ord. *Compositae* Endl. etc.).
- Cichorium** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Cichorie“, Wegwarte, Warte O. W., fr. cichorée (escarole od. scarole, -riole), e. cichory (succory) (gr. *κικώριον* v. *κίω* gehe u. *χωρίον* Acker, Feld etc., Wtst.), z. B. C. Intybus L. gem. u. geb. Cichorië, C. Endivia L. „Endivien-salat“.
- Cicla** (sc. Beta) L. (Chenopodiaceen, V. 2) weiße Runkelrübe, w. Mangold, s. g. Römischkohl, var. v. *Beta vulgaris* L. Dickrübe (-wurz) (Wtst. st. *sicūla* — in Sicilien wild, schwerl. v. *Cilix*, -icis Cilicier in Kleinasien, od. *κικλῖς* Gitter? *κίγκλος* lat. *cinclus* Wasserstaar?).
- Ciconium** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5) „Storchgeranium“ (v. *ciconia* Storch, wie Geranium v. *γέρας* Kranich), z. B. Zier. *inquans* Ait. (*Pelargonium* inq.), zonale L. m. v. *scandens* Ehrh., *acetosum* Ait. etc., s. *Pelargonium*.
- Cicūta** L. (Umbelliferen, V. 2) Wasserschierling, Wüterich, fr. *cicutaire* od. *ciguë*, e. water-hemlock u. kecks (*kex*), C. *virosa* L., fr. *ciguë* vireuse (*cicuta* Plin. Schierling v. *κίω* od. *γίω* bin hohl), s. *Cicutaria* Riv.
- 1) **Cicutaria** Riv., T. (Umbelliferen, V. 2) Wasserschierling, fr. *cicutaire* (s. eb.). 2) **Cicutaria** Vill. (sc. *Chaerophyllum*) L. (Umbellif., V. 2) schierlingblättr. Kälberkropf, s. *Chaeroph. hirsutum* L., *Cicut. bulbosa* (*Chaeroph. bulb.* L.), C. *palustris tenuifolia* Vill., s. *Phellandrium*.
- Cienfuegia** W. (-fuegosia Cav.) (Malvaceen, XVI. 7) „Cienfuegosie“ (n. d. span. Bot. Bernardo Cienfuegos, Ende d. 16. Jahrh., Pfeiffer), z. B. *digitata* Cav. etc., s. *Fugosa* (-ia) Juss.
- Cimicifūga** L. (Ranunculaceen, XIII. 4) Wanzenkraut, -, „flucht“ od. -tod, fr. *chasse-punaise*, herbe aux punaises, e. bug-flight (*cimex*, -icis Wanze, fūga Flucht — vertreibt d. Wanzen), z. B. C. *foetida* L. (*Actaea cim.* L.), *racemosa* Bart. (Act. rac. L.).
- Ciminalis** Ad. s. *Cyminalis* Borkh. (Gentianeen, V. 2) „Kümmel“-Enzian (v. *κίμνον* Kümmel), s. *Gentiana acaulis* u. *Pneumonanthe* L.
- Cinära** T. s. *Cynära* Vaill.

- Cinchōna** L. (Rubiaceae Cinchonaceen, V. 1) China- od. Fiebertindenbaum, fr. quinquina, e. china- od. peruvian-bark, *C. officinalis* L. (n. d. Gräfin de Cinchon, Vicekönigin v. Peru, welche 1638 davon kuriert wurde, Paxton: nach de la Condamine v. kina od. quina od. Indianer = Rinde). — Cinchonacēae Lindl. (zu Rubiacēae Rehb., Ord. Rubiacīnae Bartl.).
- 1) **Cineraria** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Aschenpflanze“, Wandelblume Leun., fr. cinéraire, cendriette (v. cinis, -ēris Asche — Ansehen d. Stocks!), z. B. Zier. *C. cruenta* P'Hér. s. hybrida W. canarische m. v. hybrida nana Hort., *C. amelloides* L., s. *Agathaea* am. Cass., *C. maritima* L. (Senecio m. Rchb.), fr. c. maritime, e. rag-wort od. silvery-white Cin. etc. 2) **Cineraria** (sc. *Centaurēa*) L., Jacq. Aschen-Flockenblume (Teppichpfl.), s. *Centaurēa candidissima* Lam.
- Cinnamomēae** Lauch. (sect. v. Rosa) Pfingst- od. Zimmtrosen, z. B. *R. cinnamomēa* L., *alpina* L. etc., s. sogl.
- Cinnamomum** R. Br., Nees (Laurineen, IX. 1) Zimmtlorbeer, fr. cinnamome, e. cinnamom (v. d. arab. kinamom od. china u. amomum Wtst.), s. *Laurus* s. *Persēa Cinnamomum* G., L.
- Circaea** L. (Onagrarien, II. 1) „Hexenkraut“, fr. circée, herbe aux magiciens (- de St. Etienne), e. witch-wort (hag-) (n. d. Zauberin Circe, Myth.), z. B. *lutetiana* L., *intermedia* Ehrh., etc.
- Circinātia** (sc. *Chlorophyta*) Rehb. „Zirkel“- od. „Wickelkräuter“, i. q. *Filices* Farne (*circinus* Zirkel etc. — näml. beim Sprossen d. Wedel!).
- Cirrhaea** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Rankenschnabel“ (v. *cirrus* gr. *ζίφος* Ring, Locke, nicht *ζιφός* gelb — inner. hin- u. hergedreht. Blütenblatt! Wtst.), z. B. *Loddigesii* Ldl. (*Cymbidium* dependens Lodd.), *viridi-purpurea* Ldl. (Bras.), s. *Gongora* v.-p. Hook.) etc.
- Cirrhopetalum** Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Rankenblatt“ (**Cirropet.**) (s. eb. u. *πετάλον* Blütenblatt — d. *columna* m. 2 blumenblattart. Hörnern an d. Spitze, Wtst.), z. B. *Blumēi* Ldl., s. *Ephippium ciliatum* Blume.
- Cirsium** T., Vaill. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Kratzdistel, „Aderkropfkraut“, fr. cirse (v. *ζισσός* Blutaderknoten — bei d. Alten geg. solche gebraucht, Wtst.), z. B. *lanceolatum* Scop. (*Carduus lanc. L.*, *Cnicus l. W.*), *eriphorum* Scop. (*Card. s. Cnic. er. L., W.*), *palustre* Scop. etc., s. *Carduus* u. *Cnicus*.
- Cissampelos** L. (Menispermaceen, XXII. 12) „Epheurebe“, Grieswurz Dietr. (v. *ζίσσος* lat. *Cissus* u. *ἄμπελος* Weinstock — schlingt wie d. Rebe! Wtst.), z. B. *C. Pareira* L. gebräuchl. Grieswurz Leun., *Pareira brava* d. Apoth.
- Cissus** L. (Sect. v. *Vitis* Lauché) (Ampelideen od. Vitaceen, IV. 1) Klimme, griechisches od. arabisches Epheu, Fiederrebe Lauch. (v. d. arab. *quissos*, Paxton), z. B. *Gartenspal. C. antarctica* Vent. (Neuholl.), *Warmh. C. discolor* Blum. (Java) u. *vitigēna* L., *porphyrophylla* Hort., *velutina* Hort., *capensis* W. (*Vitis c. Thb.*), *serianaefolia* Bung. (*Ampelopsis bipinnata* Mchx.).
- Cistacēae** Dunal, **Cisti** Juss., **-inēae** DC. Rchb., **-stēae** (sc. *Cistinēae*) Rehb. „Cistgew.“, s. *Cistus*.
- Cistiflorae** Bartl. Ord. der *Cistus*blütler Rehb.
- Cistus** T. (Cistaceen, XIII. 1) „Cist“- od. Sonnenrose, fr. ciste, e. cistus- od. holly-rose (gr. *ζίστος* Kapsel od. *ζίστη* lat. *cista* Kiste — weg. der Fruchtkapseln!), z. B. *Gewächsh. C. vaginatus* Ait. (*symphytifolius* Lam.), *ladaniferus* L., *laurifolius* L., *purpureus* Lam. etc.
- Citharexylum** L. (**-raexylon** Sm.) (Verbenac. od. Viticeen, XIV. 2) „Geigenholz“ Leun., fr. *guitarin*, *citharexylon* u. *cotelet* (*ζιθάρα* Glaser, Botan. Taschenwörterbuch. 9

- Cithere etc., ξύλον Holz — weiss. Eisenholz d. Handels!), z. B. caudatum L., quitense Spr. (Südamer.).
- Citinus** Sm. (bess. Cytinus L., Pers.) (Aristolochieen, XX. 8) „Fleischkelch“-Osterluzey (κύτινος; lat. cytinus fleisch. Kelch d. Granatapfels!).
- Citrullus** Neck. (sc. Cucurbita) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Arbuse, Angurien-Kürbis W., Wassermelone M. Rehb., fr. citrouille, melon d'eau, e. citrul od. water-melon, fr. auch pastèque (v. citrus Citrone), s. Anguria Citrullus dicta Blackw.
- Citrus** L. (Aurantiaeen, XVIII. 1) „Citronenbaum“, fr. citronier, e. citron- od. lemon-tree (n. d. Stadt Citron in Judäa, Paxton, gr. ζίτροον lat. citrus Citronenb. — wahrsch. vom Pers. kitt, d. Namen für Medien, Schmitthenner), z. B. C. medica L. gem. Citrone m. v. v., z. B. v. Cedro Citronat, fr. cédrat (florentina, macrocarpa, paradisiaca „Paradiesapfel“, umbilicata), v. Limonia s. Limonum „Limonum“ (L. Bergamotta, calabrīca, dulcis süsse Limonen, fl. pleno, vulgaris), C. Aurantium L. Orange od. Pomeranze (pomum aurantium, fr. pomme d'or od. orange) m. v. v., z. B. v. Bigaradia saure Or. od. Pom. (multiflora, myrtifolia Hort. s. g. Myrtorange, nobilis Lois., s. g. Mandarin-Or., v. salicifolia, v. crispifolia (fr. le Bouquetier), v. Aurantium chinensis „Apfelsine“ od. süsse Or., C. decumana L. (Citr. Aurantium decumanum L. f.), s. g. Pompelmus, Topfor. C. chinensis Hort., Zwergor. C. japonica L.
- Cladium** P. Br. (Cyperaceen, III. 1) Schneide, Nussbinse Seub. (gr. κλάδιον dem. v. κλάδος; Schoss etc. — zahlr. verwirrt Wurzeln u. auch Blütensträusse, Wtst.), z. B. Mariscus R. Br. deutsche Schneide.
- Cladonia** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3), „Astflechte“, s. g. Rentiermoos (v. κλάδος Ast etc. — verzweigter Wuchs, Wtst.), Cl. rangiferina s. sylvatica, fr. mousse du nord, C. coccifera Hoffm. Korallen-M., C. alpicornis etc.
- Cladosporium** Lk. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Astspore“, Russtau, Brandpilz, Kettenfaser (s. eb., σπορά Spore — d. zahlr. Zweige laufen in Sporidien aus, Wtst.), C. fumāgo Fr.
- Cladrastis** Raf. (Legumin. Sophoreen, X. 1) „Berstaststrauch“, Gelbholzbaum (κλάδος; Ast etc. u. ὄσσω zerreisse), Cl. tinctoria Raf. s. Virgilia lutēa L. u. Sophora tinctoria L.
- Clanbrasiliana** (sc. Abies) DC. (Coniferen Abietenen, XXI. 9) Zwergfichte (N. pr.), s. Abies excelsa DC. var. Clanbrasiliana.
- Clarkia** Pursh (Onagraceen, VIII. 1) „Clarkie“ (wahrsch. n. d. Apoth. Clark in Grantham, Isaak Newton's Lehrherrn, n. Andern n. d. General Dan. Clarke, Begl. d. Statth.'s Lewis in Louisiana durch Nordwest-Amerika), Zier. C. pulchella Pursh, fr. Cl. délicate, e. nice Cl., m. v. pulcherrima, Cl. elegans Dougl. etc.
- Clavaria** Vaill. L. (Keulenpilze, XXIV. 4) „Keulen“- od. Korallenpilz, fr. clavaire od. ganteline, mairotte (v. clava Keule, Kolbe — astige, keulige Form!), z. B. essb. C. delicata, Botrytus u. flava, s. g. Ziegenbart, fr. gallinette (-nole), glossopète, langue de terre (-de serpent). — Clavariēi DC. Keulenpilze.
- Claviceps** Fr., s. Cordyceps, s. d. (clava s. v. u. caput, -ceps, -cipitis in compos.) (Pilze, XXIV. 4).
- Claviga (-vija)** Rz. u. Pv. (Myrsineen, V. 1) „Clavigo's“-Myrtenbaum (n. d. span. Nat. J. Clavigo Faxardo, Herausg. v. Buffon's Werk. im Span.), z. B. Zier. C. ornata Van Houtt., s. Theophrasta longifolia Jacq.
- Claytonia** L. (Portulaceen, V. 3) „Clayton's“-Portulak (n. d. engl. Arzt J. Clayton, † 1773 in Virginien), Cl. Portulacaria L. f. Portulakbaum, s. Crassula P. Dill. (Portulacaria afra Schreb.), C. arctica Adams u. sibirica L. (Limnia arct. Stockh.).

- Ceanthe** Salisb. (Irideen, III. 1) „Schliessblüt“-Schwertel (v. *κλείω* schliesse zu — dreht sich nach d. Verblühen zu, Wtst.).
- Clematidëae** DC. Waldrengew. (zu Ord. Polycarpicæ Bartl., Fam. Ranunculaceae Juss.), s. Clemätis.
- 1) **Clemätis** L. (Ranunculac. Clematideen, XIII. 7) Waldrebe, fr. *clématite*, herbe aux gueux, e. lady's-bower, climber u. wavering-tree (gr. *κληματις* u. *κλήμα* Klimme, Ranke), Zier. *Cl. integrifolia* L., *patens* Morr., Decsn., *azurëa grandiflora* Hort., *florida* Thb., *lanuginosa* Lindl. m. v. v., z. B. v. *rubro-violaçea* Hort., *Cl. viticella* L. m. v. v. (plena, *Francofurtensis*, *Guascoi* u. *venosa* Hort.), s. g. ital. W., *C. Viorna* L. (Nordwest-Amer.), *Cl. Vitalba* L. s. g. Hexenzwirn od. gem. W., *C. Flammüla* L. — Bastardformen: *Jackmanni*, *Fortunëi* Moore, *rubella* Jackm., *Prince of Wales*, *Lady Bovill* Jackm. u. a. 2) **Clemätis** (sc. *Mutisia*) L. f. (Compos. Mutisieen, XIX. 2) Waldreben-Mutisie.
- Clematitë** (sc. *Aristolochia*) L. (Aristolochieen, XX. 5) gem. Osterluzey (v. *Clematis*, -itë, s. eb.).
- 1) **Clementëa** Cav. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohnenbaum (n. J. R. Clemente, Prof. zu Madrid, schr. üb. d. Weinbau v. Andalusien), *C. nitida* Cav., s. *Dipterix* (Str. Cuba). 2) **Clementëa palmiformis** DC. (Farne, XXIV. 1) Palmenfarn, s. *Angioptëris erecta* Hoffm. (*Polypodium* er. Forst.).
- Cleöme** L. (Capparideen, XV. 2) Pillenbaum, -blume, Senfkapper Leun., fr. *cléome* u. *mosambé* (moz. -), e. bastard-mustard (v. *κλείω* verschliesse, nach Octav. Horatius, Arzt d. 4. Jahrh.'s *Cleome* dem *Sinapis* verw. Pfl., wovon Linné Gebrauch machte), Zier. *C. spinosa* L., *pungens* W. (Süd-Amer.).
- Cleonia** L. (Labiaten, XIV. 1) „Schliessblüte“, s. g. Kreuzpflanze, fr. *cléonie* (v. *κλείω* s. eb. — enger Schlund d. sehr dünnen Blüte, Wtst.), z. B. *C. lusitanica* L. (*Prunella* lus. Moris.), s. *Bugula odorata* lusit. Moris.
- Clerodendron** Hortul. (-drum L.) (Verbenac., XIV. 2) „Loos“- od. Schicksalsbaum (v. *κλήθος* Loos etc., *δέσδορον* B. — eine Art als Schicksalspfl.!), z. B. Warmh. *C. fragrans* L. (Volkameria fr. Vent.) (trop. Asien), s. *Rhododendron villosum* Roth „Duft-Verbene“, *C. Thomsonae* Balf., *squamatum* Vahl, *calamitosum* L. „unheilbringende“ (Volkameria *alternifolia* Burm.).
- Clethra** L. (Ericaceen Clethreen, X. 1) „Heidenerle“, Scheineller Lauch., Maiblumenbaum, Laubheide (gr. *κλήθρα* Erle), z. B. Zier. *C. alnifolia* L., *arborëa* L., *tinifolia* (Volkameria *arborëa*), *C. mexicana* s. *quercifolia* u. a. (Wtst. *κλήθρα* v. *κλάω* breche — sprödes Holz!).
- Cleyëra** Thb. (fehlerh. *Cleyrea* Dietr.) (Theaceen od. Ternstroemiaceen, V. 1 od. XIII. 1) „Cleyers“-Strauch (n. d. holl. Arzt u. Bot. Dr. Andr. Cleyer in Batavia um 1675), z. B. *C. japonica* Thb. (Ternstroemia jap.), *ochracea* DC. (Ternstr. *Lushia* Don) (Nepaul).
- Clianthus** Sol., Endl. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Schliessblume“ (v. *κλείω* schliesse u. *άνθος* — Ansehn d. aufliegenden Fahne etc.!) Wtst.), z. B. Zier. *C. Dampieri* A. Cunn., s. g. deutsche Flagge.
- Clidëmia** Don (Melastomaceen, X. 1) „Clidemie“ (n. e. altgriech. Bot. *Clidemus*, schr. üb. Pfl.-Krankh.), z. B. Gewächsh. *C. elegans* Don, s. *Melastoma agreste* Aubl. (Guiana).
- Cliffortia** L., (Rosac. Cliffortieen od. Sanguisorbeen, XXII. 12) „Cliffortie“ (n. Dr. jur. G. Cliffort, Bürgermeister v. Amsterd. etc., Gönn. Linné's, † 1750), z. B. *odorata* L. u. *strobilifera* L., s. *Cedrus conifera* *Juniperi folio* Pluk. — Cliffortiëae (sc. Rosacëae) Rehb.

- Climacium** Web., Mohr (Laubmoose, XXIV. 2) „Treppen“- od. „Leitermoos“ (v. *κλίμαξ*, -ος od. *κλείμαξ* lat. climax Leiter etc. — bez. d. inner. Peristoms, Wtst.), s. Hypnum dendroides L.
- Clinopodium** T., L. (Labiaten, XIV. 1) „Bettfüsschen“, Wirbeldost Grck., Weichdosten (— majoran), fr. clinopode od. pied-de-lit (*κλινοπόδιον* v. *κλίνη* u. *πόδιον* — Quirlblüt. wie Bettfussrollen, Wtst.), C. vulgare L., s. Calamintha Clinop. Spenner (Melissa Clin. Benth.).
- Clintonia** Dougl. (Lobeliaceen, XIV. 2) „Clintonie“ (n. d. General Clinton, Oberbefehlsh. geg. G. Washington in Nordamer., od. n. de Witt, Gouvern. v. New-York, Freund d. Naturw., Wtst.), Zier. C. pulchella Lindl., fr. Clintonie gentile, e. nice Cl.
- Clitocybe** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schiefkopf“, s. g. Trichterling (*κλίτος* Neigung, *κυβή*) Napf etc.), z. B. suaveolens, fragrans, „Anispilz“, etc.
- Clitopilus** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schiefhut“, Pflaumenpilz Kumm. (s. eb. u. *πίλος* Hut), z. B. Prunulus u. popinalis.
- Clitoria** L. (-ius Petiv.) (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Scham“- od. „Clitorisblume“ D., fr. clitoire (v. *κλειτορίς* Schamzünglein v. *κλείω* verschliesse), z. B. Galactia L. Milch-Cl. (Phaseolus minor lactescens Sloan.), C. Ternatĉa L. (von Ternate, Molukk.), s. Vilmorinia DC.
- Clivia** Lindl. (Amaryllideen, VI. 1) „Clive's“-Lilie (n. d. Herzogin v. Northumberland, ehem. Lady Clive), z. B. Warmh. C. nobilis Ldl. u. miniata ds. m. v. splendens Hort. (Cap), s. Imantophyllum (Himantoph.) Aitoni Hook.
- Clusia** L. (Guttiferen Clusieen, XXIII. 1) Schweinsgummi v. Jamaica, fr. clusier od. figuier maudit (marron) (n. Charl. de l'Ecluse, lat. Clusius, Prof. in Leyden, s. d. Aut.), Cl. minor L. (fol. venosis Fabr.), s. Decumaria barbĉra L. — Clusiĉae (sc. Guttifĉrae) Rehb.
- Cluytia** Ait. (Clutia Boerh., L. f.) (Euphorbiac., XXII. 15) „Cluytie“, fr. clutelle (n. d. Prof. Outgers Cluyt in Leyden, s. d. Aut., † 1650), z. B. androgyna L. f. (Andrachne fruticosa L.).
- Clymĉnum** T., DC. (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Rank“-Platterbse, fr. clymĉne (gr. *κλύμενον* v. *κλύζω* umranke — eine Schlingpfl.), s. Lathyrus bicolor Mnch.
- Clypeöla** G. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) „Schildtäschlein“, fr. clypĉole od. bouclier de Narbonne (dem. v. clypĉn Schild, C. Jonthlaspī L., s. Jon-Thlaspī DC. (*ζον* Veilchen).
- 1) **Cneörum** L. (Rutac. od. Terebinthac., III. 1) Zeiland (gr. *κνήωρος* Theophr., Gewächs m. Blätt. wie ein Oelbaum, Wtst. od. *κνήωρον* Nessel v. *κνήω* jucke), C. tricoccon L. spanischer Z. M.-Rehb., Zwergölbaum (-olive) Wolff, fr. camĉlée od. garoupe, s. Chamaelĉa tricocca Bauh. 2) **Cneörum** (sc. Daphne) L. (Thymelĉac., VIII. 1), s. Thymelĉa Cn. Scop. rosmarinblättr. Zeiland od. Zindel, fr. Thymĉlée des Alpes od. Daphne camĉlé, e. trailing D. od. garland-flower m. v. v. 3) **Cneorium** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulac., V. 1) candische od. Stechwinde.
- Cnestis** Juss. (Camareen od. Terebinthac., X. 5) „Raspel“- od. „Juckstrauch“, Baumbohne, Nesselhaarkapsel (gr. *κνήστις* Raspel etc. v. *κνήσω* brenne, jucke — bez. d. Kapseln!), z. B. C. corniculata Lam. etc., s. Rourĉa Aubl. u. Robergia Schreb.
- 1) **Cnicus** L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Stech- od. „Kratzdistel“ (v. *κνήζω* kratze), s. Cirsium Rehb. 2) **Cnicus** Benedicta Vaill. i. q. Centaurĉa Benedicta L. Benedicten-Flockenblume (Compos. Centaureen, XIX. 3).
- Cnidium** Cusson (Umbelliferen, V. 2) „Brenndolde“ (v. *κνίδη* Nessel od. *κνίζω* jucke), z. B. venosum Koch, Cn. Silaus Spr. (Silaus pra-

tensis Bess.), apioides Spr. (Ligusticum ap. Lam.) etc., s. Smyrnum, Selinum u. Angelica.

Cobaea Cav. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Cobäe“ od. „Cobokletterstr.“, Glockenrebe, fr. cobée (n. d. span. Jesuiten u. Bot. Barn. Cobo, † 1657 zu Lima in Peru), Zier. C. scandens Pv. (Süd-am.), fr. C. grimpanse, e. climbing C.

Coburgia Herb., Sweet (Amaryllideen, VI. 1) „Coburgie“, „Coburg's“-Narzisse (n. d. Prinzen Leopold v. Coburg-Gotha, nachmal. König v. Belgien), z. B. trichroma Herb. u. reticulata Herb., s. Amaryllis.

Coca (sc. Erythroxylon) L. (Malpighieen, X. 3) „Cocastr.“, bolivisches Kaublatt, fr. coca (vaterl.), s. g. Hunger- u. Durstbaum (— d. Blätt. dienen zum Kauen).

Coccinea (-ia) Wright-Arn. (Cucurbitaceen, XXI. 9) „Scharlachbeere“ (gr. κόκκινος, lat. coccineus scharlachrot — Farbe d. Fr.), Zier. C. indica W.-Arn., s. Bryonia grandis L.

Coccocypselae Cham., Schldl., s. sogl.

Coccocypselum P. Br., Schreb. (Cinchonaceen, IV. 1) „Kugelkapsel“, Hohlbeere, Fachbeere od. Spaltfrucht D. (κόκκος Korn, Beere, ζυψέλη Höhlung, Kapsel — Beere m. hohler Krone, Wtst.), z. B. biflorum W. etc., s. Manettia picta W.

Coccoloba L. (Polygonac., VIII. 3) „Beerenhülse“, „Beerkelch“ D., Traubenbaum (s. v. u. λοβός Lappen, Hülse — Frucht dreikant., schwammig, Wtst.), z. B. C. uvifera L. Seetraube Leun., e. sea-side-grape „Strandtraube“, C. sagittifolia Ort. (Str. Bras.), s. Polygonum acetosaeifolium Vent., C. australis Forst. (Polyg. tamifolium Vent.), nymphaeifolia, etc.

Coccolinae Bartl. Ord. d. „Kokkeln“ Leun. s. Cocculus.

Cocculus C. Bauh., DC. (sc. Menispermum) L. (Laurineen Menispermaceen, VI. 4) „Kokkels“- od. Fischkörnerstrauch, Cochenillenbeere (κόκκος Korn, Beere, lat. coccus, dem. cocculus), C. caroliniana DC. (Wendlandia populifolia W.), C. palmatus DC., s. g. Columbowurzel d. Apoth.

Coccyganthe A. Br. (Caryophylleen od. Silenac., X. 5) „Kukuksblume“ = Lychnis flos cuculi L. (κόκκος, -υγος Kukuk, άνθη Bl.).

Coccygia Scop. (Cotinus Coccygia autt.) (Terebinthac. Sumachineen, V. 3) Perückenbaum (gr. κοκκυγία δένδρον, lat. Cotinus, κοκκυγιος purpurfarbig).

Cochlearia T., L. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Löffelkraut“, fr. herbe aux cuillères, e. spoon-wort (scurry-grass „Scorbutkr.“), fr. auch cranson (lat. cochlear od. -leare Löffel — Form d. Blätter, Wtst.), C. officinalis L. echtes L., C. Armoracia L. Meerrettig, fr. cranson rustique, s. Armoracia rusticana Fl. Wett.

Cochliostema E. André (Commelyneen, III. 1) „Schneckenfaden“ (κοχλίον dem. v. κοχλίς Schnecken, στήμα od. στήμων Faden, lat. stamen), Warmh. C. Jacobianum E. Andr.

Cochlospermum H. B. K. (Theac. Ternstroemiaceen, XIII. 1 od. XVI. 8) „Schneckensamen“, Löffelsamen D. (?) (v. κοχλίς Schneckenwindung, σπέρμα Samen — dies. nieren- od. schneckenförm. gewunden, Wtst.), z. B. hibiscoides Kth., s. Bombax s. Maximiliana Gossypium L. falscher Seidenwollb. Leun., C. helicacuba Kth., s. g. Ballonpflanze.

Cocos L. (Palmen, XXI. 6) „Kokospalme“, fr. cocotier (gr. κόκκος vaterl., verw. mit κόκκος Korn etc.), C. nucifera L. „Kokosnuss“-P., e. coco (cocoa u. cacao), C. butyracea L. „Butternuss“-P., C. guineensis = Bactris minor Jacq. „Guinea“-Kok., Stuben: C. plumosa s. Romanzoffiana.

Codiaeum Rumph. (Euphorbiac., XXI. 9) „Kopf-Wolfsmilch“ (v. κωδία od. -δεία Mohnkopf, schwerl. v. κώδιον Vlies — Zweige zu

- Kränzen, Wtst.), *C. andamanicum* Kurz, s. *Croton* and. s. *variegatum* L. (*Phyllaurëa Codiaeum* Lour.).
- Codon** L. (Convolvulaceen, V. 1) Schellen- od. Glockenwinde (v. *ζώδων* Glocke etc. — Blütenform!), z. B. *C. Boyeni* L. (Cap) etc.
- 1) **Codonia** Spr. (zu *Campanula* L.) (*Campanulac.*, V. 1), z. B. *C. Medium* L. (s. eb.). 2) **Codonia** Vahl (*Ebenaceen*, XXII. 8) Glockenblüt-Ebenholz. 3) **Codonia** Dumer. (*Jungermanniac.*, XXIV. 2) Glocken-Lebermoos (— *Involucrum* glockig!).
- Codonium** Vahl (*Ebenaceen*, XXII. 8) i. q. *Codonia* Vahl (s. eb.), *C. arborescens* V. (westind. Bstr.), s. *Schoepfia americana* W.
- Codonoprasum** Rehb. (zu *Allium* L.) (*Liliac. Asphodeleen*, VI. 1) „Glockenlauch“ (s. v. u. *πράσον* Lauch — Blütenköpfe vor d. Aufblüh. glockenförmig!).
- Codonopsis** Wall. (*Campanulac.*, V. 1) Dünn- od. Ampelglocke (s. v. u. *ψις* Aussehen), z. B. *Warmh. C. gracilis* Hook. f. s. *Leptocodon* u. *Fischeria* G. Don.
- Codonorchis** Lindl. (*Orchideen Vandeen*, XX. 1) „Glocken“-O. (s. v. — Blumenform!).
- Coelestina (-ia)** Cass. (*Compos. Eupatorineen*, XIX. 1) „Himmels“- od. *Blaudosten* (*coelestinus* i. q. *coelestis* himmelblau — schönblaue Blütenköpfe!), *Warmh. C. ageratoides* Kth. (*Sparganophorus* ag. Lag. „Wickelträger“), s. *Eupatorium coelestinum* L., *C. coerulea* Cass., s. *Ageratum coelestinum* Sims.
- Coeli rosa** Desv. (sc. *Lychnis*) L. (*Caryophyllen* od. *Sileneen*, X. 4) „Himmelsrose“, kahlblättr. Lichtnelke M.-Rehb., e. knight's-cross „Ritterkreuz“, s. *Agrostemma C. r. L.* (*Lychnis segutum* Moris.).
- Coeloglossum** Hartm., Lindl. (*Orchid. Ophrydeen*, XX. 1) „Hohlzüngel“ O. W. (v. *κοιλός* hohl — wovon *coelum* Himmel, *γλώσσα* Zunge — Labell m. konkavem Nagel, Wtst.), z. B. *viride* Hoffm., s. *Platanthera vir.* Lindl. u. *Satyrium vir.* L.
- Coelogyne** Lindl. (*Orchid. Malaxideen*, XX. 1) „Hohlstempel“ (s. v. u. *γυνή* Weib, Stempel — *Columna* an d. Spitze kappenförm., Wtst.), z. B. *marmorata* Rehb. f. u. *fimbriata* Ldl. (China), *C. speciosa* Ldl., s. *Angraecum nervosum* Rumph.
- Coelospermum** Blum., DC. (*Rubiaceen*, XXI. 7) „Hohlsamen“ (s. v., *σπέρμα* Samen — *Pyrenen* vorn hohl, Wtst.), z. B. *C. scandens* u. *corymbosum* Blum. (Java).
- Coffea** L. (*Rubiaceen* od. *Cinchonac.*, V. 1) „Kaffeebaum“, fr. *cafer* (-feyer), e. *coffee-tree* (café, coffee) (n. d. afrik. Land *Caffa* od. *Kafa*, wo ursprüngl. zu Hause), *C. arabica* L. — *Coffeaceae* (zu *Rubiaceae*) Rehb., -*feae* DC., -*feincae* Lindl. (zu *Ord. Rubiaceae* Bartl.).
- Coix** L. (*Gramineen*, XXI. 3) Thränengras (*ζοίξ*, -*zox*; eig. eine Palme), *Zier. C. lacrimans* L. (*Lacrima Hort.*) *Marien-*, *Christus-* od. *Hiobsthraue* Rmpl., fr. *larmes de Job*, herbe à *Chapelets*, e. *Job's-tears*, s. *Lithagrostis* G.
- Colax** Lindl. (*Orchid. Malaxid.*, XX. 1) „Schmarotzer“ (*ζόλαξ* Schmeichler, *Schmarotzer* — *schmarotzt* auf B.), z. B. *C. aromaticus*, s. *Maxillaria arom.*, *C. palmifolius* Ldl., s. *Dendrobium p.* Sw., etc.
- Colchicaceae** DC. (zu *Ord. Liliaceae* Bartl.) *Zeitlosen*, *Giftlilien* Seub., s. *sogl.*
- Colchicum** T., L. (*Melanthaceen* od. *Liliac. Colchicac.*, VI. 3) *Zeitlose*, fr. *colchique*, tue-chien, lis vert, e. *meadowsaffron* (v. *Colchis*, Heimat der *Medea*, die daraus Gift bereitete, *Myth.*, Wtst.: wo nach *Dioscorides* besond. zu Hause!), *C. autumnale* L. „Herbst“-Z., *Zier. C. variegatum* u. *alpinum* L., *byzantinum* Gawl., *orientale* s. g. *Herzwurzel*, fr. *hermès* od. *hermodate* „*Hermesdattel*“.
- Coleanthus** Seidl. (*Gräser*, II. 1) „*Scheidenklappgras*“, -blütgras *Græk.*

(*κολεός* Scheide, lat. *culēus* u. *ἄνθος* — aufgeblasene Blattscheide, Wtst.), z. B. *C. subtilis* Seidl., s. *Schmidtia* s. *Tratt.* s. *utriculosa* Sternb.

- Coleonēma** Wendl. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Scheidenfaden“ (s. eb. u. *νήμα*, -τος Faden — Staubfäden in d. Rinne des Kronblattnagels, Wtst.), *Zier. C. pulchra* Hort. (album Bartl.), s. *Diosma* s. *Adenandra alba* Thb., R. S.
- 1) **Colēus** Lour. (Labiaten, XIV. 1) „Staubfadenscheide“, Braun- od. Buntblatt (*κολεός* od. -or Scheide — Staubfäden als Scheide um d. Griffel, Wtst.), *Zier-Blattpfl. C. Blumī* Benth., *scutellarioides* Benth. m. v. fol. atro-purp. viride-cinctis, *C. nigricans*, *C. Verschaffeltei* Lem., *C. multicolor* Veitch, *pictus* ds. etc., s. *Gesnera* u. *Plectranthus* l'Hér.
- 2) **Colēus** Corda (Pilze, XXIV. 4) *Scheiden-Bovist* (— Basis der Fruchtlageräste in einen Stiel verw., Wtst.).
- 1) **Collaea** DC. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Colläe“, „Colla“-Süßbohne (n. d. Bot. Colla, s. d. Aut.), z. B. *speciosa* DC. (*Odonia speciosa* Bertol., *Cytisus spec.* Hort.). 2) **Collaea** *procumbens* Spr. (Compos. Verbesineen, XIX. 2), s. *Verbesina mutica* L. 3) **Collaea** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Colla“-O.
- 1) **Collēma** Hoffm., Ach. (Gallertflechten, XXIV. 3 od. 4) „Gallert“-Flechte (v. *κόλλα* Leim etc., lat. *gluten*). — *Collemaceae* Fr., DC. Ord. der Gallertflechten. 2) **Collēma** Andr. (Campanulaceen, V. 1) *Klebantheren-Glockenbl.* (— Antheren anfangs etw. zusammenhängend, Wtst.).
- Colletia** Comm. (Rhamnac., V. 1) „Collets“-Dorn (n. Commerson's *Gegner Collet*, schr. Pfl. von Brest, — stachl. Pfl., aus Hass v. Commerson so genannt! Wtst.), *Zier. C. spinosa* Lam. s. *horrida* W. (*ferox* Gill., Hook.), *C. cruciata* Gill., Hook. s. *bictonensis* Lindl. (Chili), *C. serratifolia* Vent. (*Rhamnus Spartium* Domb.) etc.
- Collinsia** Nutt. (-*linsonia* DC.) (Scrophularineen, II. 1) „Collins“-Blume (n. Z. Collins, Vice-Präs. d. nat. Ges. in Philadelphia, nicht Newton's Zeitgen. Collins, † 1669), *Zier. C. bicolor* Benth. m. v. v., *C. verna* Nutt., s. *Conobea borealis* Spr., *C. praecox* Vahl (Str. Carolina), *C. tuberosa* Vahl s. *serotina* Walt. (Carol.), *C. tricolor* Benth. m. v. v., *C. candidissima* Nutt., etc.
- Collomia** Nutt. (Polemoniaceen, V. 1) „Kleb“-Enzian, fr. *collomie* (v. *κόλλα* Leim u. *ῥιζος* Schulter — nämll. Deckblatt, das klebr. anzufühlen, Vilm. u. Pfeiffer: *seminis qualitas*, Wtst.: Sam. m. zähklebr. Überzug!), *Zier. C. coccinea* Lehm., fr. c. *écarlate*, e. *scarlet*-Coll. (Calif.), *C. grandiflora* Dougl. s. *glutinosa* Dietr. (verwild. an Flussufern!).
- Collybia** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Münz“- od. „Pfennigpilz“ Kumm. (v. *κόλλιβος* klein. Geldstück — flachrund. Hut!), z. B. *C. esculenta* (*Agaricus prunulus*) s. g. *Krösling* od. *Mousseron*.
- Colocasia** Schott u. Endl., Catesb. (sc. Arum) L. (Aröideen, XX. 9) *essb. Zehrwurz*, Tarro od. Kalo Leun. (arab. *kolkas*), fr. *manteau de Ste. Marie* (gr. *κολοκασία* od. -ίον, eine Art Arum! Wtst. v. *κόλον* Speise u. *κόζω* versehe, schmücke — Blätt. zu Kränzen!), z. B. *Blattzier. C. esculenta* Schott, s. *Caladium escul.* Vent.
- Colocynthis** T. (sc. Cucūmis) L. (Cucurbitac., XXI. 10) „Coloquinten“-gurke, fr. *coloquite* (pomme de -), *coloquintelle* *unechte Coloq.*, e. bitter-gourd (-apple), *coloquintida* (gr. *κολοκυνθίς* v. *κόλον* Eingeweide u. *κόζω* bewege — drastische Wirkung, Wtst.!), s. *Trichosanthes amara* L.
- Columbaria** Thouill. (Dipsaceen, IV. 1) *Taubengrindrose* (v. *columba* Taube), *C. vulgaris* Presl = *Scabiosa Columbaria* L.

- Columnĕa** Plum. L. (Gesneraceen, XIV. 2) „Columnee“ (n. Fab. Columna, aus d. ital. Geschl. d. Colonna, neapol. Bot., s. d. Aut.), Topf. C. scandens L., Schiedeana Schldl., aurantiaca Deesn., cochinchin. Poir. (Achimenes coch. Spr.), erecta Lam. (Trevirania er.), trifoliata Lk. (violacea Jacq. f.), s. Stemodia suffruticosa, etc.
- Columnifĕrae** Bartl. Ord., Endl. Kl. d. Säulchenfrucht gew. od. „Säulchen-träger“ (columna Säule, fĕro trage).
- Columna** (sc. Corylus) L. (Cupuliferen, XXI. 5) Byzantiner Haselnuss (columnus aus Haselholz).
- Colutĕa** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Blasenstrauch, fr. bague-naude (-dier), faux sĕnĕ (sĕnĕ bâtard), e. bladder-Senna (gr. *κολου-τέα* (-λυτέα od. -ία) Schotenbaum wie Johannisbrotb., F. W. Riemer, Wtst.: v. *κολούω* verstümmle — als Gestr. leicht zu zerstören!), Zier. C. arborescens L. m. v. v.), C. cruenta Ait. s. orientalis Lam. (humilis Scop.), C. caspica M. B. (Sphaerophysa DC. „Kugelblase“), C. annua Murr. (Lessertia ann. DC.), C. frutescens L. m. v. grandiflora Hort., fr. bag. d'Ethiopie, s. Sutherlandia frut. R. Br.
- Comaclinium** Scheidw., Planch. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Schopflager“ (*κόμη* lat. coma Haarschopf, *κλίση* Bett, Lager — Blumenboden!), Zier. C. aurantiacum Van Houtt., s. Tithonia splendens Hortul.
- Comarum** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Blutaugre Grĕk., Fünffblatt-Gänsekraut, fr. comaret (gr. *ζόμερον* Frucht d. Erdbeerbaums, F. W. Riemer — ähnl. Frucht! Wtst.), C. palustre s. Potentilla pal. Scop.
- Combretaceae** R. Br., -tĕae DC. (zu Ord. Calycanthinae Bartl.) Langfadenartige, s. sogl.
- Combrĕtum** Löffl. (Onagreen Myrobalanen od. Combretac., VIII. 1) Langfaden Leun. (bei Plinius nicht näher erkl. Schlingpfl.), Warmh. C. obtusifolium Löffl. Leimbaum (Bras.), C. purpureum Lam., s. Poivreä coccinea DC., C. macrophyllum etc.
- Commelina** Dill., L. (-lĕna Hoffmg.) (Commelinaceen, III. 1) Scheiden- od. Schilflilie, Tagblume, fr. commeline, e. day-flower (n. Casp. Commelyn, Prof. z. Amsterdam, † 1731, s. d. Aut.), Garten C. coelestis W. (tuberosa L.) m. v. v., e. blue day-flower. — Commelinaceae R. Br. (zu Juncinae Bartl.) Gras- od. Schilflilien.
- 1) **Commersonia** Forst. (Büttneraceen, V. 5) „Commersonie“ (n. d. franz. Bot. u. Reis. Commerson, s. d. Aut.) C. diphylla Andr. (Büttneria dasyphylla Gay (Str. Neuholl.), echinata L. (Resteria alba Rumph.) (B. Austral.). 2) **Comm.** Sonner. (Melaleucaceen, XVI. 8), C. speciosa Sonn., s. Barringtonia spec. L. (B. Australocean).
- Comocladia** P. Br., L. (-dium Sm.) (Terebinthac. Cassuvieen od. Anacardieen, III. 1) „Schopfzweigbaum“, Kotbaum (— weg. d. Geruchs), unechtes Brasilienholz, fr. comoclade (*κόμη* u. *κλάδος* Zweig — Blattbüschel an d. Zweigspitzen, Wtst.), C. angulosa W. (Dodonea Plum.) (Str. Amer.), dentata L. (B. Südamer.), etc.
- Compositae** Adans. Bartl., Endl., Ord. d. Zusammengesetzten (Korb- od. Vereinsblütler) (zu Kl. Aggregatae Endl.) (v. compōno Part. Pass. -positus).
- 1) **Comptonia** Banks, Schreb. (Taxaceen od. Myricac., XXI. 3) „Comptonie“, fr. comptonie (n. H. Compton, Bisch. von London, Banks' Freund, in Fulham), Zier. C. asplenifolia Banks, s. Liquidambar aspl. L. u. peregrina L. (Myrica aspl. L.). 2) C. Duham. (Farne, XXIV. 1), C. Ceterach, e. sweet Fern-bush.
- Conanthĕra** Rz. Py. (Liliac., VI. 1) „Kegelanthere“ (*κόνος* lat. conus Kegel, *ἀνθήρα* Staubbeutel — diese zu einem Kegel zusammen-geneigt! Wtst.), C. Echeandia Pers. (Echeandia terniflora Ort.), C.

Forsteri Spr. (Anthericum Adenanthēra Forst.), *C. bifolia* R. P., s. *Bermudiana bulbosa* Trew (Chili).

Conferva Ag., Lk. (Algen od. Confervac., XXIV. 3) Fadenalge, Wasserfaden, fr. lin-marin (v. conferveo gähre, heile zusammen, Plin.; st. conferta v. confercio verdichte, Paxton — ungewiss!), *C. rivularis* L. Bach-W., fr. plante-éponge? — Confervaceae Ag., DC. Ord. d. Fadentange, -véae Kütz. Fam. d. Conferven.

Coniferae Juss., Endl., Bartl., Rchb., Ord. d. „Zapfenträger“ (Nadelhölzer) (conus Kegel, Zapfen, fero trage) (Carrière: Cupressineen, Abietineen, Araucarieen, Podocarpeen, Taxineen u. Gnetaceen).

Coniomorpha Otth. (Silenac., X. 3) „Kegelfrucht“-*Silene* (*zovíov* dem. v. *zōvos*; Kegel, *μορφή* Gestalt), s. *Silēne conoidea* L. kegelkelchiger Taubenkropf Grck.

Coniomycetes Fr., Endl. „Staubpilze“ (v. *zovía* Staub, *μύκος*, -ητος Pilz (*μύκος*)). -myci Nees Ord. d. Staubpilze.

Conioselinum Fisch. (Umbelliferen, V. 2) „Schierlingssilje“ (v. *Conium* u. *Selinum*, s. d.), *C. tataricum* Fisch., s. g. Maludenwurz.

Conium (**Conium**) L. (Umbelliferen, V. 2) Schierling, fr. fénouil-sauvage „wild. Fenchel“, e. wild-cicely u. hemlock, auch kecks (kex) (gr. *zōνειον* od. *zōνιον*, nicht n. Linné v. *zónis* Staub od. Asche, sond. v. *zōvos*; Schwindel od. Wtst. v. *zováoθαι* schwindelig werden).

Connaraceae DC., R. Br., -rēae (sc. *Terebinthaceae*) Rchb. Stechdornartige, s. sogl.

1) **Connarus** L. (*Terebinthac.* Connareen, XVI. 5) Stechdorn, Baumbohne Dietr., fr. connare (gr. *zόvραος* lat. *Connarus* i. q. *Paliurus* Stehdorn), *C. decumbens* L. (*Amphinomia* DC.), *pubescens* DC. (*Robergia* Schreb.), *africanus* Lour. (*Omphalobium* G., DC.). 2) **Connarus** Thb. (*Malvaceen*, XVI. 1), *C. decumbens* Thb., s. *Hermannia triphylla* L.

Conoclinium DC. (*Compos.* Inuleen, XIX. 2) „Kegeltett“-Blume (*zōvos*; lat. *conus*, *zλίνη* Bett-Blumenboden — dies. kegelf.), Zier. *C. janthinum* Moore, s. *Hebeclinium janth.* DC. = *Eupatorium coelestinum* L. himmelbl. Wasserhanf (Bras.).

Conomorpha DC. (*Myrsineen*, V. 1) „Kegelgriffel“ (s. v., *μορφή* Gestalt — kurz. Griff. fast kegelf. Wtst.).

Conophallus Beccari (*Aroideen*, XX. 9) „Kegelphallus“ (s. v., *γαλλός*; Pfahl, männl. Glied, lat. *palus* — näml. d. Blütenkolbe!), *C. Titanum* E. Becc. *Riesen-Arum* (Sumatra).

1) **Conophōra** (-ros) (*Proteaceen*, IV. 1) „Coniferen“-Silberbaum (s. v., *φροός* tragend), *C. capensis* Pet. Gaz., s. *C. pini folio* Petiv. = *Protea nana* Thb. (*Leucadendron* Berg.). 2) **Conophōra** DC. (*Compos.* *Eupatorineen*, XIX. 1) Kegel-Pestwurz (— Fruchtbod. m. schmal. unfrucht. Kegel, Wtst.), s. *Cacalia* L.

Conopsēa (sc. *Orchis*) L. (*Orchideen* *Ophryd.*, XX. 1) Fliegen-O. (gr. *zōνωψ*, -ωπος Mücke, *Entomologie*: *Conops* L. Stechfliege), s. *O. conopea* R. Br. (*Satyrium conopsēum* Wahlbg.).

Conopsidium Wallr. (*Orchid.* *Ophryd.* XX. 1) „Stechfliegen“- od. Kukuks-O. (s. eb. u. *εἶδομαι* gleiche), *C. platantherum* Wallr., s. *Platanthēra chlorantha* Custer, etc.

Conostylis R. Br. (*Liliac.* *Hämodorac.* od. *Amaryllideen*, VI. 1) „Kegelgriffel“-Lilie (s. v., *στύλις*; Griffel — dies. kegelf. verbreit., Wtst.), *C. aculeata* R. Br. etc. (Neuholl.), *C. americana* Pursh, s. *Argolasia aurēa* Pursh „Weisszöttige“.

Conringia Heist. (fehlerh. *Coringia* autt.!) (*Cruciferen* *Siliquos.*, XV. 2) „Conringie“ (n. H. Conring, Prof. z. Helmstädt, † 1681), z. B. *C. orientalis* Andrez., s. *Erysimum* or. R. Br. (*Brassica* or. L.) morgenländ. Schotendotter.

- Consolida** (sc. Delphinium) L. (Ranunculac., XIII. 3) Feld- od. Acker-
rittersporn, fr. riste-perle (v. consolīdo befestige, heile zusammen,
Chirurgie: Consolidae regalis flores!).
- Contortae** Bartl. Ord., Endl. Kl., Rchb., Fam. d. Drehblütigen od. „Con-
tortus“ (— Blüten drehen sich auf, contortus zusammengewunden v.
contorqueo), s. Apocynäe Juss., DC.
- Contra** (sc. Artemisia) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Wurmsamen- od.
Zittwer-Beifuss (contra gegen — näml. d. Samen geg. Würmer!).
- 1) **Contrayerva** (-ba) autt. (sc. Milleria) (Compos. Millerieen, XIX. 4)
„Gegengift“-M., Giftwurz, e. contrayerva, s. Flaveria Contr. Juss.
(span. = lat. contra u. herba „Gegenkraut“). 2) **C.** (sc. Dorstenia)
L. (Urtiac. Artocarpeen, IV. 1) wurmtreibende Dorstenie, peruan.
Giftwurz.
- Convallaria** L. (Sarmentac. od. Smilaceen, VI. 1) Maiblume, Zauke O. W.
(fehl. Zanke autt.), fr. convallaire, e. may-flower (park-), liriconfancy
(v. convallis = rings umschloss. Thal), C. majalis L., fr. muguet, lis de
mai (- des vallées), e. may-lily, convally (lily of t. valley) (flores
Liliorum Convallium Apoth.), s. Polygonatum majale Allioni.
- Convallium** T. i. q. Convallaria majalis L. (s. eb.).
- Convolvulacæe** DC., Rchb., Endl. Ord. (zu Kl. Tubiflorae Bartl.), -vuli
Juss. Winden, s. sogl.
- Convolvulus** T., L. (Convolvulac., V. 1) „Winde“, fr. liserole (-ron, liset),
e. winder (wind-rope), rope od. bind-weed (v. convolvo winde zu-
sammen — Nachts u. bei Regen!), C. arvensis L., fr. fleur des champs,
Zier. C. tricolor L. m. v. v., z. B. v. azureus Hort.
- Conyza** L. (sc. Inula), DC. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Dürrwurz, Flöh-
kraut, fr. conize (-se), chasse-puce, e. flea-bane (nach Ambrosinus v.
κόρυζα synop. κνίζα Krätze, wogeg. in Anwendung, od. v. κορία
Asche — als klebr. Pfl. damit behaftet, Wtst. — ungewiss!), C. squar-
rosa L. (Inula Conyza DC.) sparriger Alant, fr. herbe aux cousins
u. buchante, C. retusa DC., fr. gallette (saliette „Scharfgesalzene“
Wolff) etc.
- 1) **Cookia** Retz., Sonner. (**Kookia** Rchb.) (Aurantiaceen, X. 1) Wampee-
od. Südsee-Orange (n. d. Erdumsegler Jam. Cook, † 1779), z. B. C.
punctata Sonner., s. Quinaria Lansium Lour. (B. Südchina), C. chloro-
sperma, etc., s. Glycosmida Spr. (-osmis Corr.). 2) **Cookia** Gmel.
(Thymeläen, VIII. 1).
- Cooperia** Hook. (Amaryllideen, VI. 1) „Cooper's“-Narzisse (n. d. Gart.-
Insp. Jos. Cooper zu Wentworthhouse, Earl Fitzwilliam, od. Dan. Cooper,
schr. Fl. metropolit., Lond. 1833—35, Wtst.).
- Copaifera** L. (Cassieen Ceratonieen, Amyrid. od. Polygalac., X. 1) „Co-
paifabalsambaum“, fr. copahu od. cupaiba (-ayba) (n. d. brasil. Nam.
d. B.'s copaiba!), C. officinalis L.
- Copallinum** (sc. Rhus) L. (Terebinthac., V. 3) „Copal“-Sumach, fr. cop-
pal (-palle, -palline, -palme), e. copal (vaterl. — lief. d. Copalgummi
od. -harz!).
- Copernicia** Mart. (Palmen, VI. 1) „Copernicus“- od. Wachs-P. (n. d.
Astronomen Nic. Copernicus, † 1543), C. cerifera Mart., s. Corypha
cer. autt.
- Coprinus** Pers. (Pilze, XXIV. 4) „Mistpilz“, -schwamm (gr. κόπρινος
v. κόπρος Kot od. κοπρία Misthaufen), z. B. atramentarius Pers.
„Tintenschw.“, fimetarius L. „Dungschw.“
- Coprosma** Forst., L. f. (Rubiaceen od. Apocynen Carisseen, XXIII. 1)
„Kotduft“ (s. eb., ὄσμη Geruch etc.), z. B. C. foetidissima L. f., hir-
tella Lab., lucida L. f. (Str. Neuseel.).
- Coptis** Salisb. (Ranunculac., XIII. 7) „Spaltblatt“-Nieswurz (v. κόπτις

spalte etc. — verschnitt. Blätter!), *C. trifolia* Sal. = *Hellebōrus trifolius* L.

- 1) **Corallīna** T. (Florideen od. Blütentange, XXIV. 1) „Korallentang“, -moos, fr. coralline, e. coral-moss (v. corallino, -na ital. korallenfarbig). — Corallinēae Decsn. Korallentange (zu Ord. Floridēae Ag. Blüten- od. Rot-Tange). — 2) **Corallina** (sc. *Mespilus*) Risso (Pomaceen, XII. 4) „Korallen“-Mispel.
- 1) **Corallodendron** T. (-drum) (sc. *Erythrīna*) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Korallenbaum“, „Korallen“-Scharlachblume (*zoοάλλωv* rote Koralle, *δέρδωv* B.). 2) **C.** Jungh. (Schimmelpilze, XXIV. 4).
- Corallorrhīza** Rupp. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Korallenwurz“ (s. v., *όύζα* Wurzel — diese wie ein Korallenstock geformt!), z. B. *C. innata* R. Br. gem. K., s. *Ophrys* Cor. L.
- Corbularia** Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Korb“-Narzisse (v. *corbula* Körbchen — Form d. Nektariums!), z. B. *C. albicans* Haw. (*Narcissus* a., *Pseudo-Narcissus juncifolius* Clus.).
- Corchōrus** L. (Tiliaceen, XIII. 1) Nesselröschenstrauch (gr. *ζοοχορος* schlecht. Gemüse, bei Theophr. = *Anagallis arvensis* L., v. *ζοοέω* reinige — abführend! Wst.), z. B. *C. olitorius* Trew Muspf. Diétr., *Moluchiagewürz*, fr. corette, *C. capsularis* L., s. g. Jute (Bast- od. Textilgew.), Zier. *C. japonicus* L. (*Kerria* jap. DC., Rosaceen) japan. Ranunkelstr., s. g. Judenpappel, fr. mauve des juifs, e. jew's-mallow.
- 1) **Cordaea** Nees (Lebermoose, XXIV. 2) „Corda“-Leberm. (n. d. Bot. u. Reis. Corda, s. d. Aut.). 2) **Cordaea** Spr. (Papilionaceen, XVII. 4).
- Cordia** L. (Convolvulac. od. Boragineen, V. 1) Brustbeere (n. *Euricius* Cordus, Arzt in Bremen, † 1535), z. B. *C. Myxa* L. schwarze Br., *Sebstenenbaum*, fr. sebestier, *C. scabra* DC. Rosenholz von Martinique, etc.
- Cordiēra** Rich. (Rubiaceen Guettardeen, XXI. 7) „Cordiere“ (n. Cordier, schr. Guide de l'amateur des champignons, Par. 1826 u. a.), z. B. *C. triflōra* DC., etc.
- Cordyceps** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Keulenkopf“ (v. *ζοοδύλλη* Kolbe etc., -ceps in compos. = caput Kopf), z. B. *C. capitatus* u. *purpureus*, s. *Claviceps* p.
- 1) **Cordylīne** Comm., Pers. (Liliac. Smilac. od. Asphodeleen, VI. 1) „Kolbenlilie“ (s. eb. — bez. d. Wurzeln!), Zier. *C. australis* Lindl., s. *Dracaena* u. *Dianella* austr., Stuben: *C. (Drac.) stricta*, *cannaefolia*, *nutans*, *lentiginosa*, *Haageana* etc. 2) **Cordylīne** *vivipara* Hort., s. *Chlorophytum Sternbergianum* Steud. (*Anthericum*).
- Cordylocarpus** Desf., Sm. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) Keulenrettig D., „Keulenfrucht“ (*ζοοδύλλη* Kolbe etc., *καρπός* Frucht), z. B. *C. glaber* Desf., *muricatus* ds. etc., s. *Erucaria aleppica* G.
- Coreopsidēae** Less., DC. Wanzenblumenartige, s. sogl.
- Coreopsis** L. (Coriopsis) (Composit. Heliantheen, XIX. 3) „Wanzenblume“, „Mädchen“- od. „Schönauge“, fr. *coréope* (v. *ζοοίς*, -τος Wanze od. *ζοοή* (*ζωοή* od. *ζοοή*) Mädchen? *όψις* Aussehen, Auge — Samenform wanzenartig!), Zier. *C. tinctoria* Nutt. (*Calliopsis* t. DC. s. bicolor Hort. m. v. v., z. B. *nana* Hort. u. *nana purpurea* Hort., v. *marmorata* Hort., *C. Drummondii* Torr., Gray, *C. coronata* Hook., *auriculata* L. etc., s. *Calliopsis* Rehb. u. *Bidens* L.
- Corēta** P. Br. (sc. *Corchorus*) L. (Tiliaceen, XIII. 1) „Putz“-*Corchorus* (v. *ζοοέω* reinige, putze etc.), s. *Corchōrus siliquosus* L.
- Coriandrum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Koriander“, fr. coriandre, e. coriander (v. *ζοοίον* od. *ζοοάριον* v. *ζοοίς* Wanze — weg. d. Geruchs!), s. *Corion* Hoffm. — *Coriandrēae* Koch.
- 1) **Coriaria** Niss., W. (Rutac. od. Coriariaceen, XXII. 9) „Gerber“- od. „Lederstrauch“, fr. *rédoul* od. *rédoux*, herbe faux-tanneurs (lat.

corium, gr. *ζόσιον* Leder), z. B. *C. nepalensis* u. *myrtifolia* L. 2) *Coriaria* (sc. *Rhus*) L. (Terebinthineen, V. 3) Gerber-Sumach, fr. *coroyère* od. *roux* (rouvre) des corroyeurs, e. hide-tanning-Rhus, elm-leaved Sumach-tree. 3) *Coriaria* Pall. (Plumbagineen, V. 5) „Lederblatt“, s. *Statice latifolia* Sm. s. *cordata* L. — *Coriariæae* DC. (zu Rutaceae Simarubeae Rchb. (Ord. Malpighiinae Bartl.) Ledersträucher.

Coricium Ker (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Jünglings“-O.? (v. *ζόσιον*, -*ιχος* Jüngling?), z. B. *bicolor* etc., s. *Corycium* Sw.

Corindum T. (Sapindaceen, VIII. 3) „indianisches Herz“, fr. *corinde*, s. *Cardiospermum Corindum* L. brasil. Herzsamen (cor, -dis Herz, indus indianisch — Same schwarz m. weiss. herzförm. Keimwarze, Wtst.).

Coringia Rchb., DC. s. *Conringia*!

Corion Hoffmg., Lk. (Umbelliferen, V. 2) „Koriander“, s. *Coriandrum*, z. B. *testiculatum* Lk. (*Coriandrum* t. L.), s. *Bifora flosculosa* M. B. (*ζόσιον* vgl. *Coriandrum*).

1) **Coris** T., L. (Primulac. od. Personaten Selagineen, V. 1) Erdkiefer, fr. *coris* od. *cauris* (*ζόσιον* Wanze — Ansehen der Blume! *coreos* herba d. Apoth.), z. B. *C. monspeliensis* L. blaue Erdkiefer, s. *Coris quorundum* Clus. (Symphytum petraeum Cam.). 2) **C.** (sc. *Hypericum*) L. (Creta, Zierpfl.).

Corispermum L. (Amarantaceen, I. 2) „Wanzensamen“, fr. *corisperme* (s. v., *στέριμα* Samen), z. B. *intermedium* (Kali folio gramineo Loes.), *squarrosum* L. u. *hyssopifolium* L.

Cormophyta Endl. Stock- od. Achsenpflanzen (*κορυμὸς* Stamm etc., *φυτὸν* Pflanze).

Cornus Spach (Pomaceen, XII. 3) Spierlingsbaum, Spierling (s. eb.), *C. domestica* Spach = *Sorbus domestica* L., fr. *corne* (-mier), *sorbe* (-bier).

Cornaceæ Græk., -*næae* DC. Endl. Cornellengew. Græk. (zu *Araliaceae* Rchb.), s. *Cornus*.

Cornelia Hardw. (Lythrarieen, IV. 1) „Corneliuskraut“ (n. Herm. *Cornelius*, schr. Catal. horti publ. Amstelodami 1661), z. B. *C. verticillata* Arduin., s. *Ammannia baccifera* L.

Corniculatae Endl. Kl. der Horn- od. Gehörtntfrüchtigen (*corniculum* Hörnchen) (zu Kl. *Sediflorae Calycanthae* Rchb.).

1) **Cornucopiae** (sc. *Fedia* G., sc. *Valeriana* L.) (Valerianeen, III. 1) „Füllhornkraut“, algerischer Baldrian, fr. *Valeriane d'Alger* od. *corne d'abondance* (cornu Horn, copia Fülle). 2) **Cornucopiae** L. (Gräser, III. 2) „Füllhorngras“, z. B. *C. cucullatum* L. halskappiges od. morgenländ., fr. *coqueluchiole*, s. *Alopecurus*.

Cornus T. (Cornaceen, IV. 1) Hartriegel, Hornstrauch, Cornelstr., „Cornelle“ Græk., fr. *cornouille* (-ler), e. *cornel-tree*, *cornelian*, *dog's-berry-tree*, *dog-wood*, *gatten-wood*, auch *privet* (v. *cornu* Horn — weg. d. Härte d. Holzes!), Zier. *C. mas* L. *Cornelkirsche*, *Durlitze*, fr. *cornouiller mâle*, *Corneilles*, e. *cornelian-cherry-tree*, s. *C. masculina* l'Hér.; *C. sanguinea* L., fr. *sanguinelle* od. *sangain*, gem. *Hornstr.* *C. florida* L. (*Benthamidia flor.* Spach) *Blumen-H.*, fr. *c. fleuri*, e. *showy C.* od. *flowered-dog-wood*; *C. canadensis* L., fr. *herbacé*.

Cornutia Plum., L. (Verbenaceen, XIV. 2) „Cornutie“ (n. Jacques *Cornut*, lat. *Cornutius*, franz. *Nat. u. Reis.*, schr. *Canadensium plant. hist.* 1635), z. B. *punctata* W. (*Hosta coerulæa* Jacq.), *pyramidata* Spr., *staminea* Vahl, etc.

Corolliflorae DC. Kl. d. Kronblütigen od. Ganzblumigen (*Monopetalæe* Juss.) (*corolla* Blumenkrone).

- 1) **Coronaria** A. Br. (sc. Agrostemma) L. (Sileneen od. Caryophyllen, X. 4) Garten- od. „Kranzrade“ Grck., s. *Lychnis Coronaria* Lam. u. *Coronaria tomentosa* A. Br. (Zier.). 2) **C.** (sc. *Lychnis*) Moris. i. q. *Lychnis Flos Jovis* Lam. (Agrostemma fl. Jov. L.) schirmtraub. Lichtnelke M. Rchb. 3) **Coronaria** Flos cuculi A. Br. Kukuks-Kranzrade (— Lichtnelke), s. *Lychnis fl. cuc.* L. (v. corona Kranz — nämll. kleiner um den Schlund der Blume!).
- Coronariae** Endl., Rchb. Kl. der Kronlilien Endl. (corona Krone — schöne Blumenkr.).
- Coronilla** Neck., L. (Leguminos. Coronilleen, XVII. 4) Kronwicke, „Krönlein“ O. W., fr. coronille, sain foin d'Espagne, e. sickle-wort (dem. corona — Blütenstand!), Zier. *C. glauca* L. (Mirabellenduft!), variegata, Emérus L. s. g. Peltsche, montana Scop., *C. Securidaca* L. „Beilkr.“, wild *C. varia* L. (— bunte Krone!). — *Coronillæae* DC. Peltschenartige.
- 1) **Coronöpus** Hall. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Krähenfuss“, Feldkresse, Zwang O. W., fr. coronope (*ζορώνη* Krähe, *ποὺς* Fuss, *Cor. Ruellii* All.), s. *Cochlearia Coronöpus* L. (Senebiera *Cor. Poir.*). 2) **Coronöpus** (sc. *Plantago*) L. (Plantagineen, IV. 1) Krähenfuss-Wegerich (Plant. coronopifolia Roth).
- Corothamnus** Presl. (Papilionac. Genisteen, XVII. 4) Zwergginster, „Besenstrauch“ (*ζοροξ* Besen, *θάμνος* Strauch), z. B. *C. decumbens* Dur. (Genista prostrata Lam.).
- Corrëa** Sm., Andrews (-raea Hort. Kew., -reia Vand.) (Rutac. Diosmeen, VIII. 1) neuseeländ. Thee (n. d. Bot. *Correa da Serra* in Portugal, † 1823, s. d. Aut.), Treibh. *C. ampullacëa*, bicölor, formosa, speciosa etc., s. *Gomphia* DC.
- Corrigiöla** L. (Paronychieen od. Portulacac., V. 3) Hirschsprung, Strandling, Linge O. W., fr. corrigiöle (dem. v. corrigia Schuhriemen), *C. littoralis* L. — *Corrigiolacëae* (sc. *Portulacëae*) Rchb.
- Cortinaria** (-us) Fr. (Blätterpilze, XXIV. 4) Fasersaum-Pilz, „Spinnwebschleier“ Kumm. (v. *cortina* Bettvorhang, fr. courtine, Schwammhäutchen d. Pilze!), *C. castanëus* Fr. etc.
- 1) **Cortüsa** L. (Primulaceen, V. 1) Alpenprimel, Heilglöcklein, Bärsanikel Rmpl., fr. cortuse, e. mourtain-Sanicle (n. d. Prof. J. A. Cortusi, latin. Cortusus, zu Padua, † 1596, s. d. Aut.), *C. Matthiöli* L. 2) **Cortüsa** arundinacëa Plum. (Cannaceen, I. 1), s. *Thalia geniculata* Rottb. 3) **Cortüsa** americana Herm. (Saxifragac., X. 2), s. *Tiarella cordifolia* L.
- Coryanthes** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Helm“- od. „Schopf“-O. (*ζόουξ* Helm, Schopf, *ἀνθή* Blüte — Oberlippe helmförmig! Wst.), z. B. Bruchmülleri Rchb. f., speciosa Hook., macrantha ds. (Gongöra m. Hook.), etc. (Südamer.).
- Corycium** Sw. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Helm“-O., „Helm-ling“ D. (gr. *ζωύριον* dem. v. *ζόουξος* Köcher, Sack etc. — oberst. Blütenblatt ähnl. geformt!) (vgl. *Coricium* Ker), z. B. *C. bicölorum* Sw., *crispum* Sw. (*Arethusa* cr. Thb.), etc.
- Corydälis** DC. (Fumariaceen, XVII. 2) Hohlwurz, Lerchensporn, Kappenmohn D., fr. coridale (-rydale), fume-terre „Erdrauch“, e. hollw-root, birth-wort (*ζορυδάλιξ* Schopflerche — lerchenspornartige Nektarien!), s. *Fumaria* L., Zier. *C. lutëa* DC. (*Capnoides* l. DC.), *C. nobilis* Pers. u. ochroleuca K., wild: *C. cava* Wahlbg. „Hohlwurz“, *C. solida* Sm. (*bulbosa* DC.) „Derbwurz“, etc.
- Corylopsis** Sieb. u. Zucc. (Betulac. od. Hamamelideen, XXI. 8) „Scheinhasel“ (*Corÿlus* u. *ψις* Aussehn), Zier. *C. spicata* S. Z.
- Corÿlus** T., L. (Betulac. od. Cupuliferen, XXI. 8) Haselstrauch, fr. coudrier od. noisetier, e. hazle-tree (-nut), auch blea od. bleak (v.

ζόουζ Helm — Form d. Kätzchenschuppe, Wtst.), *C. Avellana* L. gem. H., fr. noisetier commun, m. v. v., *C. tubulosa* W., fr. avéline (-nier), e. phillbert, Zeller- od. Lamberts nuss, m. v. rubra Borkh. „Blutnuss“, *C. Colurna* L. Byzantiner Nuss (byzantinisch Desf.), fr. noix de Byzance, e. Constantinopel-hazel.

- 1) **Corymbiferae** Vaill., Juss., DC. (zu Synantherae Rich., Ord. Compositae Bartl.) „Ebensträussige“ (v. corymbus, gr. *ζόουμβος* i. q. vertex Scheitel, Bot. Ebenstrauss od. Doldentraube). 2) **Corymbiferae** (sect. v. Rosa Lauch.) „Büschelrosen“.
- Corymbium** L. (Compos. Rolandreen, XIX. 6 od. V. 1) „Ebenstrausblume“, Wollkorn D., fr. corymbiole (s. eb.), z. B. *glabrum* u. *scabrum* L., s. *Bupleurifolia umbellata* Pluk.
- Corynandra** Schrad. (Capparid. Cleomeen, XV. 2) „Kolbenanthere“ (*κοούνη* Kolbe, *άνθη*, -*ρθος* Mann, Staubbeutel — diese oben kolbig!), z. B. *pulchella* Schrad. (Nepaul).
- Corynephorus** P. B. (Gräser, III. 2) „Kolben“- od. „Keulengranne“, Silbergras od. Bunke (s. eb., *φουός* tragend), z. B. *C. canescens* P. B., s. *Aira can. L.* (*Avena c. W.*, Weingärtneria c. Bernh.).
- Corynocarpus** Forst. (Myrsineen od. Hesperideen, V. 1) „Keulennuss“ D., Kuhbaum von Neuseeland (s. v., *καρπός* Frucht), *C. laevigatus* Forst. (Str. Neuseeland).
- Corypha** L., Lam., Roxb. (Palmen, VI. 1) „Schopf“- od. Schirm-P., fr. coryphe (*κορυφή* i. q. *ζόουζ* Schopf etc.), Stuben: *C. s. Livistonia australis*, *rotundifolia*, *Jenkinsii*, *filifera* etc. — *Coryphaea* DC.
- Corysanthes** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 4) Grosshelm (*ζόουζ*, -*ρθος* u. *άνθη* — d. obere Blütenbl. ein. gross. Helm bildend!), z. B. *bicalcarata*, *fimbriata* etc.
- Coscinium** Colebr. (Menispermaceen, XXII. 6) „Siebsamen“ (*ζόσκινιον* Sieb dem. *ζόσκινιον*).
- Cosmanthus** Nolt., A. DC. (Hydrophylléen, V. 1) „Schmuckblume“, fr. *cosmanthe* (v. *κόσμος* Schmuck etc., *άνθος* Bl.), Zier. *C. fimbriatus* Nolt. (*Eutoca* f. Hort.), fr. c. frangé.
- Cosmea** Cav. W. (-*mia* Domb.) (Compos. Senecionid., XIX. 2) „Schmuck“-Dahlie (s. eb.), Zier. *bipinnata* W., *parviflora* W. (*Coreopsis* p. Jacq.), *sulphurea* W. (*Coreops. artemisiaefolia* Jacq.), s. *Cosmos* Cav. (-*mus* Pers.).
- Cosmibuena** Rz. Pv. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Weltgut“, Fieberrinde (Cosmo- in compos. Welt, bueno, -na span. gut), z. B. *obtusifolia* R. P., s. *Cinchona macrocarpa* Vahl s. *grandiflora* R. P.), *acuminata* R. P. (kl. B., Anden) etc.
- Cosmidium** Gray, Nutt. (Compos. Senecionid., XIX. 2) (zu *Coreopsis* L.) „Schmuckdahliengleiche“ (v. *Cosmos* od. *Cosmea*, s. d. u. *εἶδομαι* gleiche), Garten: *C. Burridgianum* Hook. m. v. *atro-purpureum*, Engelmanni u. *filiforme*.
- Cosmophyllum** C. Koch (Composit. Verbesineen, XIX. 2) „Schmuckblatt“ (s. v. u. *φύλλον* Laub), Zier. *C. calaliaefolium* s. *calalioides* Koch, s. *Ferdinandea emmens* Lag. (grossblättr. Blattfl.).
- Cosmos** Cav. (-*mus* Pers.) (Compos. Senecionid. od. Heliantheen, XIX. 3) „Schmuck“-Dahlie (vgl. *Cosmea* W., -*mia* Domb.), Zier. *bipinnatus* Jacq., Cav. m. v. *purpureus* Hort. Rabattenschmuck Vilma., s. *Coreopsis coronata* L.; *C. diversifolius* Otto m. v. *atro-sanguineus* Bot. Mag., s. *Dahlia Zimapani* Roehl.
- Cossignia** Comm. (*Cossinia* Pers., DC.) (Sapindaceen, VI. 1) „Cossignie“ (n. d. franz. Nat. Cossigny, der dem Namengeber Commerson ein Herbar. der Coromandelküste verehrte), z. B. *C. pinnata* Lam., *triphyllo* Lam. s. *borbonica* Comm. s. g. weiss. Eisenholz (Insel Bourbon), s. *Pimela nigra* Lour.

- Costa** Fl. Flum. (Diosmeen, V. 1) „Costa“-Duftraute (n. Christoph a Costa, portug. Chirurg d. 16. Jahrh.'s).
- Costus** L. (Scitamineen, I. 1) „Costwurz“, wilder Ingwer, fr. cost (costh) (gr. *κόστος*, arab. koost od. gash „Zierpf.“), Topf. C. zebrinus u. speciosus Sm. (Banksia sp. Kön.), arabicus L. s. glabratus Sw. (Anonýma Merian).
- Cota** (sc. Anthëmis) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) stechende Kamille M.-Rehb. (cota d. alte Name für eine Kamillenart, von d. gr. *κοτίς* od. *κόττα* Kopf).
- Cotinus** T. (sc. Rhus) L. (Terebinthaceen, V. 3) Perückenbaum, -sumach, Gelbholz, eig. „Ölbaum“ (gr. *κότινος* Theophr. der wilde Ölbaum — zu Kränzen u. dgl. F. W. Riemer), s. Cotinus Coccygia Scop. (*κοκκόγιμος*, cotinus Sumach).
- Cotoneaster** Med. (zu Mespilus), Rehb. (Pomaceen, XII. 4) Quitten- od. Zwergmispel, -quitte, fr. néffier cotonneux, cognassier (deter. v. cotonëum Quitte), C. vulgaris Lindl. s. integerrima Med. (Mespilus Cotoneaster L.) Kutte O. W., fr. cotonéastre commun, C. tomentosa Ldl. s. coccinea Steud. (Mesp. tom. W. s. eriocarpa DC.), fr. néffier tomenteux, e. woolly Cot., C. acuminata (Mesp. ac. Lodd., Crataegus ac. Desf.), C. frigida Wall. (Pirus Nussia Hamilt.) Berg-Zwergmispel, C. Pyracantha Spach „Feuerdorn“, s. Pyracantha Spach.
- 1) **Cotula** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Laugenblume, Kuhdille Leun., fr. cotule (dem. Cota, alt. Name für eine Kamillenart, s. Cota), Zier. C. stricta L. (Lidbeckia pectinata Berg.) (Str. Cap), alba u. herbacea, s. Eclipta erecta L. 2) **Cotula** (sc. Anthëmis) L. (Comp. Anthem.) Stink-Kamille, fr. oeil de vache, e. may-weed (Wtst. von *κοτίλη* Becher, hohle Hand etc.!).
- 1) **Cotylëdon** L. (Sedeen, X. 5) Nabelkraut, fr. cotylet (-lëdon), e. hipwort (gr. *κοτυλήδων* Höhlung, Gelenkpfanne, d. Pfl. „Venus-Nabel“, umbilicus Venëris), C. umbilicus L. s. orbiculata, coruscans etc. (jetzt Gartenpfl.!). 2) **Cotylëdon** (sc. Saxifraga) L. (Saxifrageen, X. 2) Nabelkraut-Steinbrech, s. g. Venusnabel (umbilicus Venëris). 3) **Cotyledon** pinnata Hort. Kew. (Crassulaceen, V. 5), s. Verëa pinnata Dietr. (Bryophyllum Salisb.), Crassula Cotylëdon Jacq., s. Cot. arborescens Pers.
- Couepia** Aubl. (Amygdalac. od. Myrobalaneen, XVI. 7) Guianapflaume (vaterl. Name!), C. guianensis Aubl. = *Acia amara* W.
- Coumarouna** (Cumaruna) Aubl. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohne od. wohlriechende Coumaroune (guian. Name cumaron), C. odorata Aubl. (Taraless), fr. coumarou od. coumier, s. Diptëryx W., Schreb.
- Courataria** Aubl. (Lecythideen, XIII. 1) „Couratari“-Topfbaum, fr. couratari (vaterl.), C. estrellensis Raddi, s. Lecythis Couratari autt.
- Courbaril** Plum. (sc. Hymenaea) L. (Cassieen, X. 1) Heuschreckenbaum (südamer. Name!)
- Couroupita** Poir., Aubl. (Lecythideen od. Melaleucac., XVI. 8) „Couroupita“-Topfbaum, fr. couroupite, C. guianensis Aubl., s. Lecythis bracteata autt. (curupitu tumu in Guiana, Wtst.).
- 1) **Courtoisia** Rehb. (Polemoniaceen od. Convolvulac., V. 1) „Courtoisblume“ (n. d. Prof. Courtois in Lüttich), C. daucifolia Rehb. 2) **Courtoisëa** Nees, Kth. (Cyperaceen, III. 1).
- Coussapöa** Aubl., Juss. (Urticac. Artocarpeen, XXII. 2) „Coussabibaum“ (vaterl. cussabi), s. Cecropia Gaud.
- Coussarëa** Aubl., Juss. (Rubiaceen, V. 1) „Coussaree“, z. B. C. violacea Aubl. (in Guiana coussare).
- Coutarëa** Aubl. (Rubiaceen, VI. 1) „Coutaree“, Gewächsh. C. speciosa Aubl. (Str. Guiana, Nam. coutare), s. Portlandia hexandra L.

- Coutoubëa** Aubl. (Gentianeen, V. 1) (vaterl. Name coutoube).
- Cracca** Riv., T. (sc. Vicia) L. (Leguminos. Vicien, XVII. 4) Vogelwicke, fr. vesseron od. arousses, e. bird's-tares od. ax-vetch, auch heath's-pease „Heiden-Erbse“ (v. *ζοάζω* krächze — von d. schreienden Vögeln gesucht, Wtst., od. fr. craquer krachen u. aufschneiden, d. i. lügen? — ungewiss!).
- Crambe** T. (Cruciferen Lomentac., XV. 2) Meerkohl (v. *ζοαμβός* trocken), *C. maritima* L. gem. M., fr. chou-marin (crambe-), è. sea-kale, Zier. *C. cordifolia* Stevens, fr. cr. à feuilles en coeur, tatarica Jacq. (*Tatarica ungarica* Clus.).
- Cranichis** Sw. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Schädel“-O., Helmlippe D. (v. *ζοαρίον* Schädel, *ἔζω* habe — d. aufr. Labell. gewölbt, concav, Wtst.), z. B. *luteola*, *aphylla*, *diphylla* etc., s. *Polystachya* Hook. (*Dendrobium polystachyum* Sw.).
- Craniolaria** L. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Schädelkapsel“, fr. craniolaire od. cornaret (v. *ζοαρίον* Schädel — Frucht wie ein geteilt. Vogelkopf, Wtst.), *C. fruticosa* L. (*Gesneria* fr.), *annua* L. (*Martynia* L.).
- Craspedia** Forst., Schreb. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Fransenblume“ (*ζοάσπεδον* Saum, Franse — frans. Saum d. Blütenchen), z. B. *C. uniflora* Forst. (Neuholl.), *pilosa* Spr. (*Podosperma pedunculare* Rehb.) (Neuholl.).
- Crassula** L. (Crassulac., V. 5) „Dickblatt“ (v. *crassus* dick), Zier. *Cr. coccinea* L. (*Calosanthus* c. Van Houtt.), *umbellata* Jacq. (*Septas capensis* L.), *falcata* (Rochëa f. DC.), *capitata* (Jonquillenduft!), *Ampelpfl. spathulata*, *centauroides* L. (*Sedoides* afric. *annua* Herm.) etc. — **Crassulacëae** DC. (zu Ord. Succulentae Bartl.) „Dickblättr“, Saft- od. Fettpfl.
- Crataegus** L. (Pomaceen, XII. 2) Weissdorn, fr. aubépine, e. white-thorn (haw-) u. beam-tree (gr. *ζοάταιγος*, ob v. *ζοάτρος* Kraft u. *ἄγω* führe? od. *ζοατέω* beherrsche? *crates*, -is Geflecht? — unsicher!), Cr. *Oxyacantha* L. m. v. v., Zier. fl. *punicëo*, fl. albo pleno u. rubro pleno Hort., *C. purpurea* Bosc. s. *sanguinea* Hort., fr. aub. pourpre, *C. grandiflora* C. Koch (*Mespilus* gr. Sm. s. *Smithii* DC.), fr. néflier à grandes fleurs, e. Smith's-medlar, *C. punctata* Ait. (*Azarölus* Hort., *Mespilus cuneifolius* Ehrh. s. *punct. L.*), fr. aub. à fruit ponctué, *C. coccinea* L. (*Mesp. cocc. Mill.*) Scharlach- od. Korallendorn, Mehlapfelbaum, fr. aub. écarlate, *C. monogyna* Jacq. spitzblättr. Weissd. M.-Rehb., etc.
- Crataeva** L. (Capparideen, XI. 1) „Cratevas“-Kapper (n. d. Wurzelgräber *Krateuas* od. *Cratevas*, s. d. Aut.), z. B. *C. gynandra* L. Stinkapfel od. Guakobaum, fr. poire à trois feuilles „Schleimapfelbaum“ Wolff, *C. Marmelos* L., *C. Tapia* L. Steinapfelb., Knoblauchbirne D.
- Craterellus** Nees (Pilze, XXIV. 4) „Mischkrüglein“, Füllhornpilz Kumm. (dem. v. *crater*, -ëris Mischgefäss), *C. cornucopioides*.
- Crenea** Aubl., Schreb. (Salicariëen, XI. 1) „Quellenweiderich“, Kerbling D., fr. crénée (v. *ζοήνη* Quelle, nicht v. *creneau* Zinne od. *crénéle* gekerbt; Wtst. guian. Name!), Treibh. *C. maritima* Aubl. (Guiana).
- Crepidëae** Cass. Pippauartige s. *Crepis*.
- Crepidötus** Nees (Pilze, XXIV. 4) „Beschuhter“, Halbstiefelchen Kumm. (*ζοηπιδωτός* v. *ζοηπιδώω*), z. B. *alveölus* muldenf.
- Crëpis** L. (Compos. Cichoriac. XIX. 1) Grundfeste, Feste O. W., Pippau, fr. crëpide, e. bastard-hawk-weed „Bastard-Habichtskraut“ — Schuhform od. Festaufliegen d. Blätt. ? (*ζοηπιδός* Schuh, fester Stand!), z. B. Wiesen: *C. biennis* L., Anger: *C. polymorpha* s. *virens* L.,

Raine etc. *C. tectorum* L., *Zier. barbata* L. (*Hieracium baeticum majus* Herm.), s. g. Christusaage, rubra L.

Crescentia Jacq., L. (Personat. Büchnereen, XIV. 2) „Crescentie“ (n. Pet. Crescenzi, Petrus de Crescentiis, in Bologna, † 1320), z. B. *C. Cucjete* u. *cucurbitina* L. Kalabassenbaum, fr. calebassier. — *Crescentiaccæ* R. Br.

Cressa L. (Convolvulaceen, V. 1) „Creta“-Winde, Harzkraut D., fr. cresse, Cr. cretica L. f. (*Cressa* = Bewohnerin v. Creta).

Crinum L. (Amaryllideen, VI. 1) Hakenlilie, fr. crinole u. lis, e. crinum-lily (gr. *κρίνον* Lilie), *Zier. C. gigantēum* Hort., longiflorum Herb., *scabrum* Sims, *americanum* L., fr. lis-asphodèle Halmilie, *C. africanum* L. (*Mauhlia capensis* Thb. u. *Agapanthus umbellatus* l'Hér.).

1) **Crista galli** (sc. *Rhinanthus*) L. (Scrophularineen od. *Rhinanthac.*, XIV. 2) „Hahnenkamm“, s. *Alectorolophus* Hall. (*crista* Kamm, e. crest, gallus Hahn). 2) **Cr. g.** (sc. *Erythrina*) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4). 3) **Cr. g.** (sc. *Hedysarum* L., sc. *Onobrychis* G.) (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) kleiner Hahnenkamm (*Caput galli minus* Triumfetti).

Crithmum (nicht *Critamus*!) Bess. (Umbelliferen, V. 2) Sichelholde (v. *κρίθνη* Gerste — Standort? weg. d. Ähnlichk. d. Samens mit Gerste, Wtst.), *C. Falcaria* Rchb. s. *agrestis* Bess., s. *Drepanophyllum sioides* Wib. u. *Falcaria Rivini* Host.

Crithmum T. (Umbelliferen, V. 2) Meerfenchel, Bacille, fr. bacile (v. *κρίθνη* Gerste — Samenähnlichk.!), *C. maritimum* L. (*Cachrys mar. Spr.*), fr. criste-marine od. passe-pierre (perce-) u. pourprier aquatique, e. sea-fennel u. samphire (-pire), auch batis.

Crocodilium Vaill., L. (zu *Centauria*) Rchb. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Grossdorn- od. Dürrkelch-Flockenblume, „Krokodil“-Fl. (gr. *κροκόδειλον* eine Pfl., v. *κροκόδειλος* Krokodil — weg. d. stachelschupp. Kelchs!), s. *Centauria Verutum* L.

Crococsmia Planch. (Irideen, III. 1) „Safranschwertel“ (*κρόκος* lat. *Crocus* Safran, *δσμή* Duft), *C. aurēa* Planch., s. *Tritonia aurēa* Pappe.

Crococylon Eckl., R. Br. (Celastrineen, V. 1) Safranholz (*Crocus* Safran, *ξύλον* Holz — Farbe dess.), *C. crocēum* R. Br., s. *Elaeodendron* (-um) *crocēum* DC., „safrangelb. Ölbaum“.

Crocus T., L. (Irideen, III. 1) Safran, fr. safran, e. saffron (*κρόκος* Theophr. urspr. ein chaldäisch. Wort, Wtst. v. *κρόκη* Faden — d. Staubfäd. z. Färben!), *Zier. C. vernus* All. (*vernalis* Jacq.) m. v. v. (*lutēus* u. *aurēus* Lam., *sulphurēus* u. *versicolor* Ker etc.), *C. sativus* L. *Gewürz-S.*, *nudiflorus* Sm., etc.

Crossandra Salisb. (Acanthaceen, XIV. 2) „Fransenanthere“ (*κρόσσος* Franse, *άνήρο*, *-νδροός* Mann, *Anthere* od. Staubbeutel — diese bebartet, Wtst.), *C. undulaefolia* Sm., s. *Harrachia speciosa* Jacq. u. *Ruellia infundibuliformis* Andr.

Crossopetalum P. Br. (Sapotaceen od. Celastrac., IV. 4) „Fransenkronblatt“ (s. eb. u. *πέταλον* lat. petalum Kronblatt), z. B. *fruticosum* P. Br. (Str. Westind.), s. *Rhacoma Crossopet.* u. *Myginda Rhac.* Jacq., L.

Crossostylis Forst., Schreb. (Sterculiac. od. Myrtaceen, XVI. 8) „Fransengriffel“, „Kranzsäule“ D. (s. eb. u. *στυλῖς*, *-ίδος* Griffel), z. B. *biflora* Forst.

Crotalaria L. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Rasselhülse“, „Klapperschote“ D., fr. crotaire, e. rattling-cod (v. *κρόταλον* Klapper), Treibh. *C. purpurea*, *juncēa* L. s. g. Sunn od. bengalischer Hanf, s. *Hallia* Thb., *Rafnia* Thb. u. *Podalyria* Lam.

Croton L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Purgierstrauch, „Zeckensame“, Krebsblume D., fr. croton (v. *κρότων* Zecke od. Waldbock, Hunde-

laus), Zierblattpfl. C. Benzöë L. Gummilackbaum, pictum u. maximum, trilobatum W., sebiferum W., etc., s. Codiaeum, Clutia, Schradëra etc.

- Crowea** Sm. (Rutaceen Diosmeen, X. 1) Purgierraute (n. Dr. J. Crowe in Norwich, Bot. u. Samml. v. Weiden), Treibh. latifolia Paxt. (Eriostemon l.), major, etc., Sommer-Zier. saligna Andr. (Str. Neuholl.).
- Crozophora** Neck. (Euphorbiac., XXI. 9) Lackmuspflanze M.-Rchb., e. litmoss-plant, Färber-Croton W. (ζοοτων Zecke, ποροδ; tragend — hökr. Frucht! od. v. ζωώζω färbe? Wtst.), s. Croton tinctorium L.
- Crucianella** L. (Rubiaceen, IV. 1) „Kreuzblatt“, fr. crucianelle, croisetze, e. cross-wort (dem. v. crux, -cis Kreuz — Blattstellung!), Ampel C. stylosa Trin., e. petty Madder m. v. purp. Hort., angustifolia L., etc., s. Rubia u. Rubiöla.
- 1) **Cruciata** Scop., T. (zu Galium L.) (Rubiac., XXIII. 1) „Kreuz“-Labkraut (cruciatu8 gekreuzigt — Blattstellung!), z. B. muralis Moris., s. Valantia Cruciatä L. s. muralis L. (Galium cr. Sowerb.), fr. torture d'Espagne. 2) **Cr.** (sc. Gentiana) L. (Gentianeen, V. 1) Kreuz-Enzian, s. g. Sibyllenwurz, fr. gentiane croisetze, e. cross-wort Gentian. 3) **Cruciata** montana minor Burr., s. Anagallis Monelli L.
- Cruciferae** Juss., DC., Rchb. „Kreuzträger“ od. Kreuzblumige (zu Rhoeodëae Bartl.) (crux, -cis Kreuz u. fëro trage).
- Cruciflorae** (sc. Thalamanthae) Rchb. „Kreuzblütler“ Rchb. (s. eb. u. flos, -öris Blume).
- Cryphiospermum** P.-B. (Compos. Cäsulieen, XIX. 5) „Verstecksamen“ ζουφιό8 versteckt, σπέρμα Samen — d. Achänen in d. Spreublättern, Wtst.).
- Crypsis** Ait. (Gräser, II. 2) „Dornengras“, C. aculeata Ait., s. Anthoxanthum ac. L., C. alopecuroides Schrad. (Heleochlöa al. Host) (ζρόψι8 d. Verbergen — Blütenähre an d. Basis von einem Scheideblatt, Wtst.).
- Cryptanthus** Klotzsch, DC. (Bromeliac., VI. 1) „Versteckblüte“ (ζουπιτό8 versteckt, άνθος Bl. — d. Blüt. stecken in d. Blattscheiden), z. B. bivittatus DC.
- Cryptocarya** R. Br. (Laurineen, IX. 1) Nusslorbeer, javan. Eisenholz Leun. (s. eb., ζάρονν Nuss — d. Frucht steckt in d. beerenart. geschloss. Röhre d. Blütendecke, Wtst.), C. glaucescens R. Br. (Neuholl.), mucronata Spr. (Cayenne), s. Laurus mucr. Poir.
- Cryptococcus** Kütz. (Pilze, XXIV. 4) Hefenpilz, Cr. fermentum Ktz. (s. eb., ζύζζο8 Korn).
- Cryptogamae** L. Verborgen- od. Undeutlichblühende, „Kryptogamen“ (s. v., γάμο8 Ehe, Blüte), -gamia L. XXIV. Kl. d. Kryptogamen (γάμο8 hochzeitlich etc.).
- Cryptomeria** D. Don (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) Cypressen-Wachholder, Wachh.-Cypr. (s. v. u. μηρόλον Hüfte etc. — Stielästchen versteckt!), Zier. C. japonica Don (Cupressus jap. L.) s. elegans Don, s. Taxodium jap. Brong., araucarioides u. elegans Veitch.
- Cubeba** (sc. Piper) L. (Piperaceen, II. 2) „Cubeben“-Pfeffer, „Kubebe“, fr. crëbëbe od. cubëbe, poivron à queue od. musquë (- de Mascaren), e. cubeb (vaterl. kupipali d. i. schlechter Pfeffer!).
- 1) **Cucubäus** G. (Sileneen, X. 3) Taubenkropf, Hühnerbiss, fr. cucubale (v. cucubo schreie wie ein Kukuk — also „Kukuksblume“ — ungew., Linnë: st. cacobölus v. καζό8 schlecht, βόλο8 v. βάλλω Wurf!). 2) **Cucubäus** Behen L. (Sileneen, X. 3), s. Silëne inflata Sm. (vulgaris Grck.) aufgeblas. Taubenkr. Grck., s. g. Widerstoss, auch Wandelblume, fr. carnillet (-niolet), e. calves-foot „Kalbsfuss“!
- 1) **Cucullaria** Raf. (sc. Fumaria) L. (Papaverac. Fumariëen, XVII. 2) Kukuks- od. „Kapuzen“-Erdrauch, Mönchskappe, fr. cucullaire (nicht

- cuculus Kukuk, sond. cucullus Kappe, Kapuze). 2) **Cuc.** Buxb. (sc. Valantia) L. (Rubiace., XXIII. 1) Kappenfrucht-Labkr. (— d. Fr. von d. häut. Braktee kapp. umschloss., Wtst.). 3) **Cuc.** Schreb. (Vochoysiac. od. Myrobalaneen, I. 1) „Kappenkelch“, z. B. emarginata Vahl, s. Vochoya brasiliens. Vand. (— einer der 5 Kelchklappen gross kappenf., Wtst.). 4) **Cuc.** Pers. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) Kapuzen-P. od. -Morchel (— Hut am Rand unterseits angewachsen).
- Cucumis** L. (Cucurbitac., XXI. 1c) Gurke od. „Cucumer“, fr. concombre, lat. cucumis, -ëris Gurke od. Hohlgefäß (v. d. celt. cucc hohl od. bauchig), z. B. C. Conomon Thb. japan. G., C. Dudaim L. pers. od. wohlriech. G. (Apfelmelone), C. sativus L. Salat-G., Zier. C. metuliferus E. Mey. zackenfrücht. G., fr. c. porte-bornes, e. pronged c., C. Anguria L. Arada-G. (C. echinatus Mnch.), fr. angurie, c. arada od. marron, cornichon des Antilles, e. arada c., C. flexuosus L. Schlangen-G. (Cuc. Melo var. flex. Naud.), fr. melon-serpent, e. snake-c.
- Cucurbita** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Kürbis, fr. citrouille od. cource, e. gourd od. bumpkin (pumpion) (v. curvus krumm, Paxton (?), aus cucumis u. orbis Kreis — runde Gurke! Wtst.), Zier. C. Pepo DC. (vgl. Pepo), C. perennis Asa Gray, fr. cource od. cocombre vivace, e. perennial-gourd, dipsacëus Ehrenb. (Bardana Fenzl, Momordica dasycarpa Hochst.) „Karden“-K., C. lagenaria L. „Flaschen“-K., fr. calebasse, e. bottle-gourd, C. melanosperma Naud. Malabar-K., fr. cource-boule de Siam, e. Malabar-melon, fälschl. Angurien-K. (Kletterzierspfl.). — Cucurbitacëae Juss., DC., Rchb.
- Culilaban** autt. (sc. Laurus) L. (Laurineen, IX. 1) „Culilaban“-Lorbeer (Ostind.) (vaterl. culitlawan — Rinde mit Nelkengeruch).
- Cullumia** R. Br. (Compos. Gorterieen od. Arctoideen, XIX. 3) „Cullumie“ (n. Sir Thom. Cullum, schr. 1774 üb. engl. Pfl.), z. B. C. ciliaris Hort. Kew., s. Berkheya W. u. Gorteria L.
- Cuminëae** Koch Pfefferkümmelartige, s. Cuminum!
- Cuminia** Colla (Labiaten, XIV. 1) „Cuminie“ (n. Hugo Cumini, Samml. v. Pilzen 1805 im Thal v. Pisa).
- Cumingia** Lindl. (Liliaceen, VI. 1) „Cuming“-Lilie (n. d. engl. Reis. auf d. Philippinen 1836/39 Cuming), z. B. C. trimaculata Lindl., s. Cumingia D. Don (n. Lady Gordon Cumming in Schottl.).
- Cuminum** Bauh., L. (Umbelliferen, V. 2) Kreuzkümmel, plattd. Köhme Mej., Pfeffer- od. Mutterkümmel, C. Cuminum L. Moris. echter, röm. od. ägypt. Kümmel Leun., fr. cumin (n. d. arab. kammon, gr. *κμίνον* lat. cuminum Kümmel).
- Cunila** L. (Labiaten od. Boragineen, II. 1) Castrierfaden, fr. cunile (filamenta castrata duo L.) (v. cuneo spitze keilförmig zu — Staubfäden, Paxton? od. conus Kegel, Wtst.? — zweifelhaft!), z. B. fruticosa W. (zu Thymus L.), s. Westringia rosmarinifolia Sm.
- 1) **Cunninghamia** Rich. (Coniferen Araucarien, XXI. 9) „Cunninghams“-Tanne (n. d. Bot. u. Reis. Cunningham, s. d. Aut.), z. B. C. sinensis R. Br., s. Pinus u. Belis Salisb. 2) **C.** Schreb. (Rubiace. Coffeaceen, IV. 1), z. B. verticillata W. (Antirrhoea borbonica Gmel., Str., Ins. Borbon), s. Malanea Lam.
- 1) **Cunonia** Büttn. (sc. Antholyza) L. (Irideen, III. 1) „Cuno's“-Schwertel, Scharlach-Schmetterling (flos papilionacëus coccinëus L.) (n. J. Chr. Cuno, Kunstgärten u. Gartendicht. z. Amsterdam, schr. 1749 Catal. sein. Gartens). 2) **Cunonia** capensis R. Br. (Cunoniaceen od. Corniculaten, X. 2) Cap-Cunonie, s. Osterdikia Burm. — Cunoniacëae R. Br. (zu Corniculatae Rchb.).
- Cupania** Plum., L. (Sapindaceen od. Myristicaceen, VIII. 1) „Cupanie“ (n. d. ital. Mönch u. Bot. Cupani, s. d. Aut.), C. americana L. Eisen-

- holz v. Bourbon, *C. tomentosa* L. (Str. Domingo) (Trigōnis tom. Jacq.), s. *Molinaea* Juss. u. *Quiva* Cav.
- Cuphaea** (-ēa) Jacq., P. Br. (Lythraceen, XI. 1) „Kelchhöcker“-Weiderich (*λίθος* Höcker — höck. Kelchgrund!), s. *Lythrum* *Cuphea* L. f., Zier. *C. lanceolata* Ait. m. v. v. *purpurea* u. *nana* Hort., *viscosissima* Jacq., *miniata*, *acinifolia* St. Hil., *silenoides* Nees, *strigulosa* Bot. Reg., *platycentra* Benth. etc. (bel. Zierbl. d. Gärt.).
- Cupressinae** Rich., DC. Cypressen (zu Ord. od. Kl. Coniferae Bartl.), s. *Cupressus*.
- Cupressus** T. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Cypresse“, fr. *cyprès*, (gr. *κυπάρισσος* v. *κύω* erzeuge u. *πάριος* regelmässig, nicht v. Cypern!), z. B. *C. sempervirens* L. Pyramiden-C. m. v. *funebri* Häng-C., *C. Lawsoniana* Murr. (*Chamaecyparis* Laws-Parl.), *C. nutkaensis* Lamb. (*Thujopsis borealis* Fisch.). — *Cupressinae* Carrière: *Juniperus*, *Widdringtonia*, *Frenela*, *Actinostrobus*, *Callitris*, *Libocedrus*, *Biöta*, *Thuja*, *Fitz-Roya*, *Thujopsis*, *Chamaecyparis*, *Retinospora*, *Cupressus*, *Taxodium*, *Glyptostrobus*, *Cryptomeria*, *Arthrotaxis*, *Sequoia*, *Wellingtonia*, *Cunninghamia* u. *Sciadopitys*.
- Cupuliferae** Rich., Rchb. (zu Amentaceae Bartl., Kl. Juliflorae Endl.) „Becherfrüchtige“ (v. *cupula* dem. v. *cupa* Napf, u. *fero* trage).
- Curatella** L. (Dilleniaceen, XIII. 2) „Schab“- od. „Barbierstrauch“ (v. *ζουρξέω* schabe — d. Blätt. dienen in Guiana zum Glätten etc., Wtst. v. *curatus* bearbeitet, v. *curo* etc.). *C. americana* L. (Bstr.), *Campaiba* St. Hil. (Bras.), *imperialis* autt., s. *Theophrasta* imp. Juss.
- Curculigo** G. (Amaryllideen od. Liliaceen, VI. 1) „Kornwurmsame“, Rüssel-Lilie D. (v. *curculio* Rüsselkäfer od. Kornwurm — Samen aussehen!), *Stuben C. recurvata* Dryand. m. v. *fol. variegatis*, *C. orchioides* Roxb. etc.
- Curcuma** L. (Scitamineen, I. 1) Gelb- od. Gilbwurz, fr. *curcuma* u. *terre-mérite*, *souchet*, *safran des Indes*, e. *indian saffron* (v. d. arab. u. ind. *kurkum*), s. *Amomum Curcuma* L. (*C. rotunda* u. *longa* L.).
- Curmeria** Andr., Mast. (Araceen, XX. 9) „Curmerie“ (caraib. Name *courimari*), z. B. *Wallisii* Mast. u. *picturata* André (Neugran.).
- Cuscüta** T., L. (Convolvulaceen, V. 2) Seide, Flachsseide, fr. *cuscute*, *barbe de moine*, *lin de lierre* (- *maudit*) u. *cremaillère*, auch *teigne*, e. *dotter* (v. d. ital. *cassuto*, arab. *kechout* Paxton, gr. *ζασσίω* flicke zusammen, *verstricke* — schlingend. *Wachstum*!), *C. carinata* R. Br., s. *Grammicea aphylla* Lour. — *Cuscutaceae* DC., Endl., -tæae Presl., Lk. (zu Ord. Tubiflorae Bartl., Fam. Convolvulaceae Juss.).
- Cuscütina** Pfeiff. (Cuscutaceen, V. 2) wohlriech. Flachsseide, *C. suaveolens* Pfeiff. (*Engelmannia* Pfeiff.), s. *Cuscüta* *suav.* L.
- Cyanaea** DC. (Nymphäaceen, XIII. 1) „Blaunymphäe (*κυανός* blau), s. *Nymphaea*.
- Cyananthus** Wall. (Campanulaceen, V. 1) „Blaublume“ (s. eb. u. *ἄνθος*), z. B. *lobatus* Wall. (Nepaul).
- Cyanastrum** Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Blausternblume“, *Moschus-Flockenbl.* (s. eb. u. *ἄστρον* Sternblume), s. *Amberböa* (*Centaurea moschata* L.).
- 1) **Cyanëa** DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) (*Centaurea* sect. *Cyānus*).
2) **Cyanëa** Renealm. (Gentianeen, V. 1). 3) **C.** *Gaudich* (Lobeliaceen V. 1 od. XIX. 6) „Blaulobelie“ (*κυανός* blau).
- Cyanella** L. (Liliaceen, VI. 1) Cap- od. „Cyanen“-Lilie (dem. v. *Cyānus* *Cyane*), *C. capensis* Jacq., *C. alba* u. *lutëa* L. etc. (— mehrere blaublühende Arten! Wtst.).
- Cyanophyllum** Lindl. (Melastomaceen, X. 1) „Blaublatt“ (*κυανός* blau,

- φύλλον* Laub — prächt. bläul. Blattpfl.!), Warmh. *C. magnificum* Lindl.
- Cyānus** Desp., Pers. (sc. *Centaurea* L., zu *Centaurea* sect. *Rchb.*) (Compos. *Centaurea*, XIX. 3) Blaue Kornblume, s. g. „Cyane“ (gr. *κυανή*), fr. aubifoin (aubiton), pérole, barbeau u. fleur d'azur (- des champs, - de Zacharie), e. bachelor's-button, blue-bottle, *C. Cyānus* L. (Saaten), *C. montana* L., *C. rosea* Bang, *C. trinervia* W., repens Dalech., s. *Stachelina dubia* L.
- Cyathēa** Sm. (Baumfarne, XXIV. 1) „Becher“- od. „Tutenfarn“ (v. *κύθηον* Becherchen — d. Sporenbehälter! od. *κύθος* Becher — ganzer Farnhabitus!), Zier. *C. dealbata* Hook. (Neuseel.) u. *ferox* (Stubenf.), *C. speciosa* H. B. K., s. *Hemitelia spec.* Kaulf.
- Cyāthus** Hall. (Lycoperdiaz. Pilze, XXIV. 4) „Becherpilz“ (s. eb.), z. B. *scutellaris* u. *Crucibulum* „Schmelztiegel“.
- Cycadēae** Rich., Endl. Ord. der Palmfarne od. Zapfenpalmen (zu Kl. *Coniferae* Endl.), s. *Cycas*.
- Cycas** L. (Cycadeen, XXIV. 1) Sagobaum, -palme (gr. *κύκας* Theophr. ägypt. Palme), Treibh. *C. circinalis* L. (Indien, *Olus calappoides* Rumph., *Arbor zagoë Amboinense* Seb., *Sagobaum v. Amboina*), *C. revoluta* Thb. (Jap.), Warmh. *Riuminiana* Reg., *Rumphii* u. *glauca* Miq.
- Cyclāmen** L. (Primulaceen, V. 1) Erdscheibe, Saubrot, Alpenveilchen, fr. pain de pourceau, marron de cochon, e. hog's- od. sow-bread (gr. *κυκλαμίνης* u. *-μύρον* v. *κύκλος* Kreis, Scheibe — scheibenförm. Wurzelstock!), Zier. *C. europaeum* L., *persicum* Mill., *vernum* J. Gray (repandum Sm.), *neapolitanum* Tenore s. *hederaefolium* Koch.
- Cyclanthēra** Schrad. (Cucurbitac., XXI. 10) „Ringbeutel“-Gurke, fr. cyclanthère od. concombre grimpante (*κύκλος* Ring, *άνθηρά* Staubbeutel — Antheren als pollenführender Ring), Zier. *C. pedata* Schrad. „gefingerte“, fr. c. à feuilles digitées.
- Cyclobothra** Sweet, Benth. (Liliac., VI. 1) „Zirkelgrube“, Bartkaiserkrone (s. v. u. *βύθρος* Grube — Nektargrube der Blumenblätter!), Stuben *C. barbata* Benth. (*Fritillaria b. L.*), *alba* Benth. (Californ.) (— kugl. inwend. barthaar. Blumen!).
- Cynōches** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schwanenhals“ (*κύκνος* lat. *cygnus* (cygnus) Schwan, *άνθηρ* Nacken — lange, gekrümmte Columna), *C. Loddigesii* Ldl. (Surin.).
- Cydonia** T. (zu *Pyrus* Rchb.) (Rosaceen Pomaceen, XII. 4) Quitte, fr. coin (coing, cognassier), e. quince u. malocotoon (melicotony), quince-tree (gr. *Κύδωνία* od. *-νία* v. *Κύδων*, Stadt auf Creta, jetzt Canea), Garten *C. vulgaris* Pers., *C. rosea* Pers., Zier. *C. japonica* Pers. n. v. v., *C. sinensis* Thouin (*Pirus sin.* Poir.).
- Cylindrocarpa** Reg. (Campanulac., V. 1) „Cylinderfrucht“, Walzen- (analog *Prismatocarpus* l'Hér. v. *κύλινδρος* u. *σαρκώδης*), z. B. *Sewerzowi* Reg.
- Cylista** Ait. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Grosskelch“ (v. *κύλιξ* lat. calyx Kelch — dies. sehr gross!), z. B. *C. scariosa* Roxb., *villosa* Ait. (*Dolichos hirsutus* Andr.).
- Cymbalaria** Dill., Mill. (zu *Linaria* Rchb.) (Scrophularineen, XIV. 2) „Cymbelkraut“, fr. cymbalaire (cimb.-), Zier. u. wild *C. muralis* Fl. Wett., s. *Linaria Cymb.* T. (*Antirrhinum Linaria* L.) (*cymbalum* „Cymbel“ od. Hohlbecken — Blatt mitten vertieft).
- Cymbaria** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Nachenkraut“ D., Nachen- od. Bootfrucht, fr. cymbaire (v. *κύβη* Nachen etc. — Krone oben nachenf. aufgeblasen), z. B. *daurica* L., *borysthēica* Pall.
- Cymbidium** Sw. (-dia R. Br.) (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Nachen-

lippe“ (s. eb., εἶδομαι gleiche — Labell concav), z. B. alöefolium Sw., ensifol. Sw., etc.

Cynosma G. (Rutac. Xanthophylleen, X. 1), „Kümmelraute“ (v. *ζίμυρον* Kümmel, *ῥομῆ* Duft — d. Blätt. riechen wie Rosskümmel! Wtst.), s. Jambolifera pedunculata L. (Jambolana Rumph., Caryophyllus Tangu aromaticus malabaricus Pluk.).

Cyninum s. Cuminum römischer od. Mutterkümmel.

Cynanchum L., R. Br. (Asclepiadeen od. Apocynen, V. 2) „Hundswürger“, Würger Schill., fr. cyananque od. étriangle-chien, auch scammonée de Montpellier, e. dog's-bane (v. *ζύων*, -*νός* Hund, *ἄγγω* würge etc. — viell. auch geg. d. angina der Hunde! Wtst.), z. B. C. viminale L. (Telfel Tavil Alp.).

Cynapium (sc. Aethusa) L. (Umbelliferen, V. 2) „Hundspetersilje“, Gleisse, Gartenschierling, fr. persil de chien (- de crapaud, - des foux), e. dog's-persil (s. eb. u. Apium Silje, Sellerie).

Cynara Vaill. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Artischoke, fr. artichaut, e. artichoke u. cardoon (gr. *κινάρα* v. *ζύων* Hund — Schuppen wie Hundszähne), Cultur C. Scolymus L. gem. Artischoke, C. Cardunculus L. Cardone od. Cardun-Artisch. — Cynaræe Less. Artischokendisteln.

Cynarocephalæ Juss. (sc. Synantheræe Rich.) zu Ord. Compositae Bartl. „Distelköpfige“ (Cynara s. eb. u. *κεφαλή* Kopf).

Cynocrambe (sc. Mercurialis) Scop. (Acalypheen, XXII. 8) „Hundskohl“, fr. chou-de-chien (*ζύων*, -*ίνο*; Hund u. *καύμβη* Kohl).

Cynodon Rich. (Gräser, III. 2) „Hundszahn“ (s. eb. u. *ὄδων* Zahn — spitzgezähnte Spelzen), z. B. C. Dactylon Pers., fr. tremme, e. dog's-tooth, kriech. Hundsgras Wolff., s. Digitaria u. Agrostis; C. virgatus, s. Poa chinensis Burn.

Cynoglossum L. (Boragineen, V. 1) „Hundszunge“, fr. cynoglosse u. langue de chien, e. dog's-tongue (hound's-) (s. v. u. *γλῶσσα* Zunge — Form u. Weichh. d. Blätter!), Zier. C. coelestinum Hort. (C. Omphalodes L.), blaues u. C. limifolium L. weiss. Garten-Vergissmeinnicht, s. Omphalodes verna Mneh., fr. cynogl. printanière, e. garden-forget-me-not u. O. linif., fr. argentine od. corbeille d'argent, e. flax-leaved-hound's-tongue, wild C. officinale L.

Cynomëtra L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Hundsmatrze“, -rute D. (s. v. u. *μήτρα* lat. matrix Gebärmutter, „Matrze“ — handgrosse fleisch. Fruchthülsen), z. B. cauliflora L. (Cynomorium Rumph.), ramiflora L., C. Agallocha Spr. (Aloëxylon Agallochum Lour.) (Str. Cochinch.).

1) **Cynomorium** L. (Balanophoreen, XXI. 1) „Hundsrute“ (s. v. u. *μορίον* männl. Glied — weg. d. ähnl. Gestalt d. blattlosen Schmarotzers), C. coccinëum L. roter Hundskolben, s. Fungus typhoides cocc. Bocc. s. g. Maltheserschwamm (Balanophora fungosa Forst.), C. cajanense Sw. (Cayenne), jamaïcense Sw., C. Balanophora W. 2) **Cynomorium** Rumph. (Cassieen, X. 1), z. B. sylvestre Rumph., s. Cynomëtra ramiflora L.

Cynosurus P.-B., L. (Gräser, III. 2) „Hundsschwanz“, Kammgras, fr. crételle, e. comb-grass (s. v., *οὔρα* Schwanz — ährenf. Rispe!), z. B. coracanus L. krummähr. u. C. Lima L. feilenförm. (Wangenheimia disticha Mneh.), s. Eleusine coracana G.

Cyparissias (sc. Euphorbia) L. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) Cypressen-Wolfsmilch (*κυπάρισσος* v. *κυπάρισσος* lat. Cupressus Cypresse — weg. d. Blätter!).

Cyperacæe DC., Grck., Seub. „Cypergräser“, Seggen, Riedgräser Seub. (zu Ord. Glumacæe Bartl.).

Cyperoidæe Juss., Rchb. i. q. Cyperacæe (Cyperus u. εἶδομαι gleiche).

- Cypërus** L. (Cyperaceen, III. 1) Cypergras, fr. souchet, sultan, e. cypërous (v. *Κύπριος* cyprische Venus od. *κύπερος* lat. cypërus gewürzh. Pfl. d. Wassers), Zier. C. alternifolius fol. variegatis u. C. Papÿrus L. „Papierstaude“.
- Cyphella** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Zitterbecher Kumm. (*κύφελλον* Höhlung — concave Hutform!), z. B. musciöla Fr. etc.
- Cypripedium** L. (Orchid. Cypripedieen, XX. 1) Frauenschuh, fr. cypripède, chaussure de Venus, soulier de Notre-Dame, e. lady's-slipper, woman's-shoe (v. *Κύπριος* cyprische Venus, *πέδιον* dem. *πέδη* Fussbekleidung), Zier. C. Calceölus L., fr. marjolaine bâtarde u. sabot de la Vierge, e. common lady's-slipper, Dayanum Rchb., insigne Wall., Mauhleie, Hookerae Rchb. f., etc., s. Calceölus Gmel., Aumm.
- 1) **Cyrilla** L. Gard. (Cunoniaceen od. Saxifrageen, V. 1) „Cyrillo“-Cunonie (n. d. Prof. Dom. Cyrillo in Neapel, schr. pl. rar. regni Neapol., Fasc. I, Napoli 1788), z. B. antillana Mchx. (Itea Cyrilla Sw. 2) **Cyrilla** l'Hér. (Bignoniaceen, XIV. 2), pulchella l'Hér., s. Trevirania coccinea W.
- Cyrtandra** Forst. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Krummfaden“ (*κυρτός* krumm, *άνθη*, *-νόθος* Mann, Staubfaden!), z. B. staminëa Forst., etc., s. Besleria L.
- Cyrtanthëra** Van Houtt. (Acanthaceen, XIV. 2) „Krummanthère“ (s. eb., *άνθηρά* Staubbeutel), z. B. C. Ghiesbreghtii u. Ghiesbreghtiana Decsn., magnifica, etc.
- 1) **Cyrtanthus** Ait., Herb. (Amaryllideen, VI. 1) Bogenlilie, „Krummblume“ (s. v., *άνθος* Bl. — Tubus d. Krone lang u. gebogen, Wtst.), Zier. C. angustifolius Ait. (Amaryllis cylindracëa l'Hér.). C. M., Kennëi, obliquus Ait., etc. 2) **C.** Schreb. (Rubiaceen, V. 1), z. B. longiflorus Gm., s. Solena l. W. (Posoqueria l. Aubl.).
- Cyrtocarpa** H. B. K. (Terebinthaceen, X. 1) „Höckerfrucht“ (*κυρτός* höckerig, *καρπός* Fr. — diese oberh. d. Mitte m. 5 Hökern, Wtst.), z. B. procëra H. B. K. (B. Mexiko).
- Cyrtochilum** H. B. K. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Höckerlippe“ (s. v., *χειλος* Lippe — Labell m. höckerig. Nagel, Wtst.), z. B. undulatum Kth. u. flexuosum Hb. Bpl.
- Cyrtodeira** Van Houtt. (Gesnerac., XIV. 2) „Krumm“- od. „Höckerhals“ (s. v., *δειρή* Hals), z. B. C. cupreata Van H., s. Achimënes R. Br.
- Cyrtomium** Presl (Farne, XXIV. 1) „Krummschildfarn“ (*κύρτωμα* Krümmung), z. B. falcatum Presl, s. Aspidium f. Fisch., Langsd.
- Cyrtostylis** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Krummgriffel“ (s. v., *στυλις* Griffel — Columna halbstielrund u. an d. Spitze breit ohrenf.), z. B. reniformis R. Br. (Neuholl.), reflexa Spr., s. Epipactis r. Lab., etc.
- Cysticapnos** Boerh., G. (Papaverac. Fumariac., XVII. 2) Blasen-Erdrauch“ (*κύστις* Blase, *καπνός* Rauch — Kaps. blasig aufgetrieben, Wtst.), z. B. C. africana G., s. Fumaria vesicaria L.
- Cystidanthus** Hassk. (Asclepiad., V. 2) „Blasennelke“ (s. eb., Dianthus Nelke), z. B. C. campanulatus.
- Cystopteris** Bernh. (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) „Blasenfarn“ (s. v., *πτέρις* Farn — Indusium ein eiförm. Bläschen, Wtst.), Zier. C. fragilis Bernh., e. brittle C. „brüchiger“, C. regia Presl, etc., s. Aspidium.
- Cyteophytum** Neck. (Papilionaceen, XVII. 4) „Nachenpflanze“ (*κύτος*, *-εος* Höhlung, Schiff etc., *φυτόν* Pfl.). Cyteophÿta Neck. Fam. d. Nachenpfl. d. i. Papilionaceen (mit carina!) i. q. Cyteophörae (Cytinëae) Neck.
- Cytheraea** DC. (Terebinthac. Spondiaceen, X. 4) Balsampflaume, fr. cythérée (*Κυθήρεια* Beiname d. Venus nach d. Ins. Cythera bei

Lakonien — schön rot u. w. Blüte u. sehr süsse Frucht), s. Spondias L.

- 1) **Cytinēae** DC., Rchb. (zu Aristolochiēae Bartl.) Wurzelschmarotzer m. verkümm. Blätt. (XX. 8). 2) **Cytinēae** s. Cyteophorae Neck. Fam. d. Nachenblütler od. Papilionaceen (v. *κύτος*, -*εος* Höhlung, Schiff, carina d. Bot.).
- Cytinus** L. (**Citinus** Sm.) (Cytineen, XX. 8) Cistwurz-Schmarotzer (*κύτινος* eig. Ansatz der Granatapfelblüte — Ähnl. d. Kelchs damit!), z. B. C. Hypocistis L. (*ὑποκιστίς* Schmarotz. an d. Wurzel des Cistus), s. Thyrsine Gled. u. Asarum Hypocistis L. f.
- Cytipogon** Raf. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Cistwurzbart“ (Cytinus s. eb., *πώγων* Bart), z. B. capitatum u. virgatum Raf.
- Cytisus** L., DC. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Geisklee, Baumbohne od. Bohnenbaum, fr. cytise (citise) (gr. *κύτισος* Kleestr. = Medicago arborēa, n. *Κύθνος*, einer d. Cykladen, ben.), Zier. C. alpinus L. s. angustifolius Mch. (Laburnum alp. Mill.), fr. cyt. des Alpes, C. Laburnum L. m. v. v., gem. Bohnenb. od. s. g. Goldregen, fr. ébenier des Alpes, faux ébenier, Arc-bois, e. Peascod-tree „Erbsschoten“-B., bean-trefoil-tree „Bohnen-Kleebaum“, C. purpureus Scop., C. canariensis L., Rhodus- od. Rosenholz, fr. bois de Cypre, - de Rhode, Treibh. C. elongatus Waldst. u. Kit. rutenförm. u. sessilifolius L.
- Czackia** Bess. Andrews (zu Anthericum Rchb.) (Liliac., VI. 1) „Czackie“, unechte Zaunlilie (n. d. poln. Bot. u. Patriot. Thadd. Czacki, † 1813 zu Dubno), C. Liliastrum Andr., s. Anthericum s. Phalangium Liliastrum Pers. (Hemerocallis Lil. L.).
- Czernya** Presl (Gräser, III. 2) Teichrohr, Cz. arundinacēa Presl = Arundo Phragmites L. (n. Joh. Czerny, schr. 1517 Ortus sanitatis).
- Daboecia** D. Don (sc. Andromeda L., sc. Menziēsia Sm.) (Ericaceen, X. 1) „Daboek's“-Heidestrauch (n. d. Nam. eines irländ. Heiligen Daboek), s. Erica Daboecii u. Vaccinium cantabricum Juss. „Heidelbeere v. Cambridge“, D. polifolia Don, s. Menziesia pol. Juss.
- Dacrydium** Sol., Banks (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Thränen“- od. Gummitanne (gr. *δακρύδιον* dem. *δάκρυ* Thräne — d. i. Harz od. Gummi!), D. cupressinum Sol. neuseeländ. Pium.
- Dactylicapnos** Wall. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Finger-Erdrauch“ (*δάκτυλος* Finger, *καπνός* Rauch — zusammenges. Blätt.), s. Dielytra Borkh. u. Adlumia Raf.
- Dactylis** L. (Gräser, III. 2) Knaulgras, Hundsgas, fr. dactyle od. chientend à bossettes, e. buck's-horn u. dog's-grass (v. *δάκτυλος* Finger — gefingerte Blüten-Knäuel!), Zier. D. glomerata L. fol. varieg. „buntes Kn.“
- Dactylites** Tausch., DC. (Saxifragac., X. 2) „Finger“-Steinbrech (s. eb.), s. Saxifraga tridactylites L.
- Dactylon** Rich., Vill. (sc. Cynodon) Pers. (Gräser, III. 2) Fingergras (s. v. — Stellung d. Ährchen!), s. Digitalia Dactylon Scop. s. stolonifera Schrad. gefing. Hundszahn Grck., fr. tremme kriech. Hundsgas Wolff.
- 1) **Dactylophyllum** Benth. (Polemoniaceen, V. 1) „Fingerblatt“ (s. v., *φύλλον* Laub — handf. gespalt. Blätt.), s. Gilia Parryae Gray.
- 2) **Dactyloph.** Spenn. (Rosac. Potentilleen, V. 5 od. XII. 5) s. Sibaldia L.
- Daedalēa** Pers. (Hautpilze, XXIV. 4) Wirrschwamm Kumm. (*δαίδαλος* künstlich, verworren — Gestalt d. Huts, Wtst.), z. B. D. quercina, abietina etc.

- 1) **Dahlia** Cav., Cass. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Dahlie“ od. Georgine, fr. Géorgine, e. common Dahlia (n. d. Prof. Dahl zu Åbo in Finnland, † 1787, s. d. Aut.), Zier. D. variabilis Desf., D. coccinea W., rosea W., purpurea W.-m. v. v., D. Zimapani Roetzl. (Bidens atro-sanguinea Hort.) etc., s. Georgina W. — 2) **Dahlia** crinita Thb. (Hamamelideen, XXII. 1) Stellmacherholzbaum, s. Trichoclādus crinitus Pers.
- Daſ** L. (Thymeläaceen, X. 1) „Fackel“-Seidel ($\delta\alpha\acute{\iota}$ Brandfackel — Form d. Blütenstands!), z. B. laurifolia Jacq. s. octandra L. (Str.).
- 1) **Dalbergia** Roxb. L. (Leguminos. Hedysareen od. Dalbergieen, XVII. 3) Rosenholz, Ficatin- od. Sissuholz, D. latifolia L. (n. d. schwed. Obersten C. Dalberg, der lang in Surinam lebte). Dalbergiæe (sc. Papilionacæe Hedysaræe) Rchb. 2) **Dalbergia** phoenicea Tussac (Personaten od. Gesnerac. XIV. 2), s. Besleria sanguinea Pers.
- 1) **Dalëa** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Schorf- od. Grindbohne (n. d. engl. Bot. Thom. Dale zu Ende d. vor. Jahrh.), s. Psoralea Dalea L. 2) **Dalëa** G., P. Br. (sc. Eupatorium) L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1).
- Dalechampia** Plum., L. (Euphorbiac. Hippomaneen, II. 1) „Dalechampie“, fr. dalechampe (n. d. franz. Botaniker Jacques Dalechamps, † 1588, s. d. Aut.), Gewächsh. D. scandens L. u. Roezliana Müll. s. rosea (schön ros. Brakteen!).
- Dalibardia (-da)** Mchx. (sc. Rubus) L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) „Dalibard's“-Brombeere (n. d. franz. Bot. Th. F. Dalibard, schr. Florae Paris. Prodr. 1749).
- Dalrymplea** Spr. (-pëlea Roxb.) (Rhamnac. od. Sapindaceen, XXIII. 2) „Dalrymple'sbaum“ (n. Alex. Dalrymple, schott. Geogr., † 1808, schr. Traité s. l. découvertes etc. 1767), z. B. domingensis Spr., pomifera Roxb. etc., s. Turpinia Vent.
- Damätiris** Cass. (Compos. Arctoideen, XIX. 1) „Demeterblume“, Ceresbl. ($\Delta\alpha\mu\acute{\alpha}\tau\eta\rho$ dor. st. $\Delta\eta\mu\eta\tau\eta\rho$ Göttin Demeter od. Ceres, Wtst. v. $\delta\alpha\mu\acute{\alpha}\tau\epsilon\iota\alpha$ Bezwingerin — d. Spreublätth. d. Fruchtbodens umfassen d. weibl. Blüten!), z. B. D. pudica Cass.
- 1) **Dammära** Rumph., Mirb. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Dammarrharzbaum“, Dammar- od. Kaurifichte, fr. dammara (Nam. auf Amboina!), z. B. orientalis s. alba, australis Lamb. etc. 2) **Dammära** selanica Rumph. (Anonaceen, XIII. 6) Bitterholz, s. Xylopia or. Spr.
- Dampiëra** R. Br. (Scaevolaceen od. Campanulac. Goodeniaceen, V. 1) „Dampiere“ (n. d. Weltumsegler Capt. Will. Dampier, s. d. Aut.).
- 1) **Danäa** All. (Umbelliferen, V. 2) „Danadolde“ (n. d. Bot. P. M. Dana zu Turin, Ende d. vor. Jahrh., Herausg. d. Pfl. v. Piemont), D. aquilegifolia All., s. Ligusticum aq. W. 2) **Danäa** Colla (Composit.).
- Danäë** Med. (Smilaceneen, XXII. 13) Traubendorn Lauch. (Danaë, Mutt. d. Perseus, Myth. — Zeus kam in Gestalt goldnen Regens zu ihr, was d. schön. Ächseltrauben andeuten, Wtst.), D. racemosa Med., s. Ruscus r. L.
- Danaea** Sm. (Farne, XXIV. 1) „Dana“-Farn (s. vorh. Danaa!), z. B. alata Sm. (Caraiben-Ins.).
- Dandelion** Beckm. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) (zu Tragopōgon) „Löwenzahn“, fr. dent-de-lion, s. Leontodon u. Tragopōgon.
- Daniellia** DC. (Crassulaceen, V. 5) „Daniellie“ (n. Stefano Danielli, schr. Raccolta di questioni intorno etc. Bologna 1723).
- Danthonia** DC. (Gräser, III. 2) „Danthoine's“ Gras (n. d. franz. Bot. Danthoine), D. pallida R. Br., s. Avena Brownii Spr., D. decumbens DC., s. Triodia dec. P.-B. (Sieglingia dec. Bernh.).

- Dantia** P.-Th., DC. (Onagreen Jussieuen, X. 1) „Dantie“ od. Isnardie (n. Ant. Danty d'Isnard, Prof. z. Paris, s. d. Aut. Isnard), *D. palustris* Klotzsch, s. *Isnardia* p. L.
- Daphnanthes** C. A. Mey (subgen. v. *Daphne*) (Thymeläeen, VIII. 1) (*Daphne* u. *ἀνθή* Blüte), z. B. *D. Cneōrum* L., s. *Cneōrum*!
- Daphne** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Kellerhals, wild. Pfefferstr., Zeiland O. W., fr. thymelée, daphné, garou u. cancetille, e. spurge-olive (-laurel, -flax) (gr. *δάφνη* Lorbeer, Paxton: v. *δαίω* brenne u. *φωνή* Stimme — prasselt b. Brennen! ?), *D. Mezerēum* L. gem. S., Stuben (Winterbl.): *D. odōra* Thb. u. *indīca* L., Alpen *D. Cneōrum* L. rosmarinblättr. Zeiland.
- 1) **Darlingtonia** DC. (Leguminos. Mimoseen, XXIII. 1) „Darlington's“—Mimose (n. d. amerik. Bot. D. W. Darlington, beschr. in *Fl. cestrīca* (v. Chester) 1837 d. Pfl. um Chester, Philad. 1837), z. B. *brachylōba* u. *glandulosa* DC. 2) **D.** Torr. (Sarraceniaceen, XIII. 1) *D.*'s Schlauchtute, Fliegenfallen-Schlauch, *D. californīca* Torr.
- 1) **Darwinia** Rudge (Myrtaceen, XII. 1) „Darwinie“ (n. Erasm. Darwin, Arzt z. Derby, schr. *Phytonomia* etc.). 2) **D.** Dennst. (Thymeläac.).
- Dasylyrion** R. Br. (-ium Zucc.) (Amaryllid. od. Bromeliaceen, VI. 1) „Zottenlilie“ (*δαυλῖς* rauh, zottig, *λείριον* Lilie — haar. Blütendecken, Wtst.), Warmh. *angustifolium* u. *juncēum*, Stuben (Winterbl.) *glaucum*, *acrotrichum* s. *gracile*, *longifolium* etc.
- Dasynēma** Schott (Dilleniaceen, XIII. 7) „Rauhfa den“ (s. v., *νήμα* Gespinnst, Faden — Blätt. unten wollhaar.), z. B. *hirsuta* u. *pubescens* Schott.
- Dasypphyllum** H. B. K. (Compos. Cynareen, XIX. 1) „Rauhblatt“ (s. v., *φύλλον* Laub — Blätter beiderseits seidenhaar. u. stachlig! Wtst.), z. B. *argentēum* Kth., etc.
- Dasypōgon** R. Br. (Juncaceen od. Bromeliac., VI. 1) „Rauhbart“ (s. v., *πάγων* Bart — d. 3 äuss. Perigonblätter bebartet, Wtst.), z. B. *bromelifolius* R. Br. (Neuholl.).
- Dasyspermum** Neck (Umbelliferen, V. 2) „Rauhsamen“ (s. v., *σπέρμα* Samen), s. *Scandix*.
- 1) **Datisca** W. (Halorageen, XXII. 10) Streichkraut, gelber Hanf Leun., fr. *cannabine*, *D. cannabina* W. (v. *δατέομαι* verteile u. *ῥίζω* meine — man glaubt, dass d. Pflanze gegen *Scrophulose* verteilend wirke). 2) **Datisca** Ham., Don (Resedaceen, XI. 3), z. B. *nepalensis* Don. — *Datiscāe* Presl (zu *Resedacāe* DC.).
- Datura** L. (Solanaceen, V. 1) Stechapfel, fr. *datore*, *pomme épineuse*, herbe au diable, e. apple-thorn, mad-apple (wahrsch. v. d. arab. *tatōrah* od. *datora* Wtst., lat. *tatula*, od. pers. *tat* stechen, schwerl. *δατέομαι* verteile), Zier. *D. humilis* Desf. (*fastuosa* var. *flava* fl. pleno), *fastuosa* L. m. v. *duplex* alba u. v. dupl. *violacēa* Hort., fr. *manteau bleu*, *Huberiana* fl. pl., ägypt. St., *D. Tatūla* L., *D. Metel* L., *D. meteloides* DC. wilde Giftpfl., *D. Stramonium* L. — *Daturēae* (sc. *Solanacāe*) Rehb.
- Daubentonia** DC. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Daubentonie“ (n. d. Nat. L. Joh. Maria Daubenton, s. d. Aut.), Warmh. *D. Tripetiana* Poir., *punīcā* DC., s. *Piscidia pun.* Cav., s. *Aeschynomēne* u. *Daubentonia* DC.
- Daubenya** Lindl. (Liliaceen, VI. 1) „Daubeny's“—Lilie (n. d. Prof. Dr. Daubeny in Oxford, schr. on t. degree of select. by t. plants w. regard to t. earthy constituents etc. 1833).
- Daucināe** Koch „Möhrendoldige“, s. *Daucus*.
- Daucus** T. (Umbellifer., V. 2) Mohrrübe od. Möhre (gr. *δαῦκος* v. *δαίω* brenne — erhitz. Pfl., Wtst. — unsicher!), *D. Carōta* L. „Carote“ od. Gelbrübe d. Küchengartens, fr. *carote* (-otte).

- Davallia** Sm. (Farne, XXIV. 1) Büchsenfarn (n. d. Schweizer Bot. Edm. Davall, † 1799), s. Trichomanes. — Davalliaceae Mett.
- Daviësia** Sm. (Cäsalpinieen od. Sophoreen, X. 1) „Daviesie“ (n. d. Bot. Hugh Davies aus Wales, Mitgl. d. Linn. Gesellsch. in London, schr. 1813 üb. grossbrit. Pfl.), Gewächsh. D. corymbosa, latifolia R. Br., mimosoides ds. etc. (Neuholl.), s. Viminaria Lk.
- 1) **Davya** DC., Rchb. (Melastomac. Merianeen, X. 1) „Davye“ (n. d. engl. Nat. Humphrey Davy, † 1829), z. B. glabra u. guianensis DC., s. Lavoisiera DC. u. Platycentrum DC. 2) **Davya** Moç., Sess. (zu Sau-rauja W.) (Ternstroemiace., XIII. 1).
- Dayenia** Hill. (Sterculiaceen, V. 1 od. XVI. 8) Dayenie (n. d. Duc d'Ayen de Noailles ben.), D. inermis Mill., s. Ayenia pusilla.
- 1) **Decaisnea** Hook. f. (Menispermeen od. Lardizabaleen, XXII. 10) „Decaisnee“ (n. d. franz. Bot. Decaisne, s. d. Aut.), Gewächsh. insignis, s. Stackia ins. 2) **D.** Lindl., Brongn. (Orchideen).
- Decamerion** Nutt. (Vaccinieen, XVIII. 1) Buckelbeere Lauch. (δέξα zehn, μυρίον Hüfte etc.), z. B. D. frondosum Nutt., s. Gay-Lussacia frond. Torr. Gr. (Vaccinium glaucum Mich. s. frondosum L.).
- 1) **Deckenia** Wendl. (Palmen) „Decken's“-P. (n. d. Nam. Decken geb.), D. nobilis Wendl. 2) **Deckenia** Göpp. (foss. Palmen), s. Lepidodendron (st. Dechenia? n. d. Oberberghauptm. Dr. H. v. Dechen in Bonn?).
- Decumaria** L. (Myrtac. od. Guttiferen Clusieen, XXIII. 1) „Dekumarie“ Lauch., „Zehnerblütenstr.“ (v. decumus = decimus d. Zehnte — Blume etc. zehnteilig!), D. barbära L. echte D. (radicans Mch.).
- 1) **Deeringia** R. Br. (Amarantac. od. Chenopodiaceen, V. 1 od. XXI. 5) „Deeringie“ (n. d. Bot. Schriftst. Dr. Charl. Deering, schr. Catal. Stirpium etc. about Nottingham 1738), D. celosoides R. Br., indica Spr. (Celosia baccata autt.). 2) **Deeringia** (-ia) Adans. (Umbelliferen, V. 2).
- Deforgia (Desforgia)** Lam. (Campanulac., V. 1) „Desforgie“ (n. d. Gouvern. d. Ins. Bourbon Desforges ben.), z. B. borbonica Lam., s. Forgesia Juss.
- Deidamia** P.-Th. (Passifloreen, XVI. 2) (Deidamia, Tocht. d. Lykomedes, bei welcher Achilles in Frauenkleidern weilte!).
- Dejeuxia** Kth. (Gräser, III. 2) „Dejeux“- Schilfgras (n. d. Nam. Dejeux od. Deyeux geb.), D. silvatica Kth., s. Calamagrostis arundinacea Roth (Arundo silvatica Schrad.).
- Delosma** Andrzc. (zu Hesperis Rchb.) (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Abendduft“, Nachtviole (δέληη Abend, ὄσμη) Duft, Geruch), z. B. matronalis, L., inodora L. (sylvestris Crantz).
- 1) **Delairëa** Lem. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Sommer- od. Schnell-Epheu (n. d. Bot. Delaire ben.) Stuben D. scandens Lem. (Mikania sc. s. Senecio mikanoides Otto). 2) **Delairea** Desv. (Sophoreen, X. 1).
- 1) **Delima** L. (Dilleniaceen, XIII. 1) „Polierblatt“, Feil- od. Raspelstr., fr. délime (v. delimo feile ab — d. Blätt. dienen z. Polieren), D. sarmentosa L. (Tetracera s. Dryand.). — Delimëae (sc. Dilleniaceae) Rchb. 2) **Delima** guianensis Rich., s. Begonia castaneifolia Schott (Polygonaceen, XXI. 9).
- Delphinium** L. (Ranunculac., XIII. 3) Rittersporn, fr. dauphin (-nelle), pied d'alouette, éperon de chevalier, e. lark-spur (gr. δελφίνιον dem. v. δελφίν od. -γιζ Delphin — Gestalt d. geschloss. Blüte, Wtst.), Zier. D. Ajacis L. m. v. v., z. B. v. formosum Hort., fr. pied d'al. brillant (azurb. mit Zeich. AJAC), nudicaule Torr. u. Gr. (scharlach), elatum L., grandiflorum L. s. sinense Fisch., hybridum Hort. mit v. coelestinum Hort. u. fl. pl. Hort., triste Fisch. (rotbr.) etc. Saat: D. Consolida (auch Garten: s. g. Levkojen-R. m. v. candeläbrum).

- 1) **Demidovia** Pall. (Rosac. Tetragoniaceen od. Portulacac., XII. 4) Neuseeländ. Spinat = *Tetragonia expansa* L. (Culturpfl.) n. d. russ. Grafen Demidoff, Schüler Linné's, † 1828 in Moskau). 2) **Demidovia** Hort. Mosq. (Melanthaceen, VIII. 4), s. Paris L. 3) **Demidoffia** Dennst. (Myrtac.). 4) **D.** Gmel. (Convolvulac.).
- Dendrobium** Sw. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baumwucherer“ D., — Schmarotzer-O. (*δένδροον* B. *βίωζ* Leben od. *βιώω* lebe — als Schmarotz. auf Bäumen), z. B. Warmh. *densiflorum* Wall., *speciosum* Sw., *formosum* Rxb., *albo-sanguineum* Wall. etc. (Indien).
- Dendrochilum** Blum., Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lippen-orche“ (s. eb. u. *χειλος*; Lippe — starklipp. B.-Schmar.!), Warmh. *nodatum* Ldl.
- Dendrolinum** Blum. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lein“ (s. v. u. Linum Flachs od. Lein), s. Eria Lindl.
- Dendrolirium** Blum. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lilie“ (*λείριον* Lilie — schöne Blumen geschlossen v. Liliengestalt, Wtst.).
- Dendromëcon** Benth. (Papaveraceen, XIII. 1) „Baum-Mohn“ (s. v., *μύζων* Mohn — mohnart. Str., Wtst.), Gewächsh. *rigidum* Planch.
- Dendropëmon** Blum. (Loranthaceen, VI. 1) „Baum-Schmarotzer“ (s. v., *πύμων* schädlich — Schmar.!).
- Dendroplithöë** Blum., Mart. (Loranthac., VI. 1) „Baum-Schwindsucht“ (s. v., *φθόγη* Auszehrung etc.), s. *Cichlanthus* Blum.
- Dens Leonis** T. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Löwenzahn“ = *Leontodon Taraxacum* L. (— weg. d. scharfzahn. Blätter!).
- Dentaria** T. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Zahnwurz“, fr. *dentaire* (v. *dens*, -tis Zahn — Wurzel m. Schuppenzähnen!), D. *pentaphyllos* L. (*Saxifraga montana* Gesner), Wald: D. *bulbifera* L.
- Dentella** Forst. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Zähnenkrone“, Zahnblume D. (dem. v. *dens*, -tis Zahn — bez. d. zahn. Kronzipfel), D. *repens* L., s. *Oldenlandia rep.* Burm.
- 1) **Dentellaria** Raj. (Rubiace. Cinchonac., IV. 1), d. *zeylanica* „Zähnenkrone“ v. Ceylon = *Knoxia* z. L., fr. *dentelaire*, herbe aux cancers „Krebsgeschwürkr.“ (d. vor. identisch?). 2) **Dentellaria** Sloan. (Plumbagineen, V. 1), s. *Plumbago scandens* L.
- Deodara** Roxb. (sc. Cedrus) L. (Coniferen, XXI. 9) „Deodara“—Ceder (v. d. indisch. *Deva Dara* = Gottesbaum) n. v. *argentea* u. *viridis* Hort. (Himalaya), s. *Pinus*, *Abies* u. *Larix Deod.* Lamb., Lindl., Koch.
- Deparia** Hook., Grev. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Becherfarn“ (v. *δέταξ*, -ας Becher, wie analog *Cyathea* v. *κύαθος* Becher), z. B. *Moorii*, s. *Cibotium* Kaulf. u. *Dicksonia l'Hér.*
- Dermatogastères** Cord. u. -*mycetes* Rehb., „Fellbauch“— od. Hüllpilze (*δέσμα*, -ατος Haut etc., *γαστήρ*, -ερος Bauch, *μύζης*, -ητος Pilz).
- Deschampsia** P.-B. (Gräser, III. 2) „Deschamps“—Gras (n. d. franz. Bot. Loiseleur Des-Longchamps, † 1849), D. *caespitosa* P.-B., s. *Aira caesp.* L.
- Desclieuxa** (-*cliaea* Μοç. Sess.) (Rubiace. Coffeac., V, 1) Perlkaffee (v. d. Nam. Desclieux geb.), D. *leucocarpa* M. S., s. *Margaris* DC.
- 1) **Desfontainea** (-*ia*) Rz. Pv. (-*nesia* autt.) (Solanac. od. Gentianeen, V. 1) „Desfontaine“ (n. d. ber. Bot. Desfontaines, s. d. Aut.), D. *Hookeri* Dun., *spinosa* R. P., *splendens* Hb. Bpl., s. *Linkia peruviana* Pers. u. *splendens* Poir. 2) **Desfontainea** Arrab. (Euphorbiac.). 3) **Desfontainesia** Hoffm. (Sapindac. Fraxineen).
- 1) **Desmanthus** W. (Legumin. Mimoseen, XXIII. 1) „Büschelblütenstr.“, Büschelschopf D. (*δέσμη* od. -*αις* Bündel, *άρθος* — weg. d. Blütenstands!), D. *destillatorius* „abträufelnder“, *natans*, s. *Neptunea oleracea* Lour. 2) **Desmanthus** Benth. (Asclepiadeen od. Gymnanthereen,

- V. 2) „Büschelbl.“ 3) *Desmantha* DC. (zu *Desmanthus* W.) (Mimoseen).
- Desmidiaceae** Endl. Büschel- od. Bündelalgen (s. sogl.).
- Desmidium** Ag. (Algen, XXIV. 3) Kettenstäbchen, „Bündelgleiche“ (s. v. u. *εἶδομαι* gleiche od. *εἶδος* Bild).
- Desmodium** Desv. (zu *Hedysarum* Rchb.) (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Bündelhülse“, Wandelklee, bewegl. Süssklee (*δέσμων*) bündelförmig — weg. d. Blütentrauben!), Warmh. D. (*Hedysarum*) *gyraus* DC. „Drehblatt“-W., *penduliflorum* Oud., *Garten D. canadense* DC.
- Desmoncus** Mart. (Palmen) „Fesselhaken“ (s. v. u. *ὑψος*, lat. *uncus* Haken — Schaft u. Blattscheiden m. zahlr. Widerhaken, Wtst.).
- Desmotrichum** Blum., R. Br. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Fesselhaar“ (*δέσμος* Fessel, *τήξ*, *τήξος* Haar — Anthere an ein. Rücken Zahn befestigt), *D. angulatum* s. *Dendrobium* a. Lindl.
- Detariaceae** (sc. Mimosaceae) Rchb. „Bündel-Mimosen“, s. sogl.
- Detarium** Juss. (Legumin. Mimoseen, XXIII. 1) „Bündel“-M., „Detar“-M. (v. *δετή*) Bündel — Stand d. Blüten, Wtst.: *detar* Name am Senegal, essb. Frucht: *datch*), *D. senegalense* Juss.
- Detris** Ad. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Gering“-Aster, „Schlecht“-A. (zu *Agathea* Cass. — Gegensatz!) (v. *deter*, Fem. -*tris*, ungebr. Positiv v. *deterior*, gering, schlecht, Wtst.: *detris* d. *corruptierte aster*!).
- 1) **Deutzia** Thb., Sieb., Zucc. (Philadelphaceen, XII. 1) „Deutzie“ (n. d. Ratsherrn Joh. Deutz z. Amsterdam), *Gart.*: *D. glabra* Sieb., Zucc. (Japan), *crenata* S., *Z. s. scabra* Hort. m. v. v., *Z. B. fl. plen.*, *staminea* R. Br. s. *canescens* Hort. (Philadelphus *stam. Wall.*), *Stuben*: *D. gracilis* S., *Z. (gracilis vera Hort.)*, s. *g. Maiblumenstrauch* m. v. v.
- Deveuxia** P.-B. s. *Dejeuxia*! (zu *Calamagrostis* Roth), *Z. B. neglecta* Fr. s. *stricta* Nutt., *arundinacea* Roth = *Arundo silvatica* Schrad.
- 1) **Diacantha** Lag. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Zweidorndistel“, „Paarstachel“-D. (*δι-* zwei, *ἀκανθα* Dorn od. Stachel — an d. Basis d. Äste!), *D. arboræa* Less. (*Barnardesia arb. L. f.*). 2) **Diacantha** (sc. Grossularia) L. (Ribesiaceen, V. 1) paarstachelige Stachelbeere M.-Rchb.
- Diadelphia** L., Kl. d. „Zweibrüderigen“ (XVII. Kl.) (*δι-* u. *ἀδελφός* Bruder — Staubf. in zwei Partien!).
- Dialypetalae** DC., Endl. i. q. Polypetalae Juss. „Getrenntkronblättrige“ v. *διαλίω* trenne, *πέταλον*, lat. *petalum* Kron- od. Blumenblatt).
- Diandria** L., Kl. der „Zweimännigen“ (II. Kl.) (*δι-* u. *ἀνήρ*, -*ῥός* Mann, Bot. Staubgefäß!).
- Diana** Comm. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) „Diana“-L. (— wie *Diana* in d. Wäldern).
- Dianella** Lam. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Dianelle“, fr. *dianelle* (dim. *Diana*, s. eb.), *Stuben*: *D. australis* Lam. (*Dracaena indivisa* Hortul.), *D. coerulea* Sims, *longifolia* u. *revoluta* R. Br., s. *Dracaena* u. *Cordylina*.
- Dianthæra** Sol., Jacq. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zweianthere“, fr. *dianthère* (*δι-* u. *ἀνθήρα* Staubbeutel — jeder Staubf. scheint 2 Antheren zu tragen, Wtst.), *D. americana* Forsk. s. *Barleria (Justicia) flava* Jacq.
- Dianthus** L. (Caryophyllen od. Silenaceen, X. 2) Nelke, Grasblume, fr. *oeillet*, e. pink od. *gillflower* (v. *Ζεύς*, *Λίβης* u. *ἀνθος* „Zeusblume“, Wtst. *διος* göttlich, schön!), *Garten*: *D. plumarius* L. *Federnelke* od. s. *g. Federröschen*, e. *pheasant-eye*, *sweet-William*, *Gart.- u. Topfbl.*: *D. Caryophyllus* L. *Garten-N.* od. *Grasrose*

- (-blume) m. zahlr. v. v. (vgl. Caryophyllus!), e. clove-gilly-flower, Gartenzier. *D. barbatus* L. „Bartnelke“, s. g. Tausendschön m. v. v., z. *B. nanus* Hort., fr. fleur d'Arménie u. mignonette, e. sweet John, *D. chinensis* L. m. v. v., z. *B. Heddewigii* Hort. u. Heddw. diadematus, v. laciniatus „Schlitz-N.“ u. a., *D. caesius* Sm. m. v. fl. pl. Pfingst-N., wild *D. superbus* L., *D. carthusianorum* L. „Karthäuser“-N. s. g. Marien- od. Blutströpfchen, etc.; ferner Zier. *D. dentosus* Fisch., *dentosus hybridus* Hort.
- 1) **Diapensia** L. (-zia Uhlenb.) (Ericaceen od. Primulac., V. 1) „Schmerzheilblume“, Trauerbl. *D.* (v. *διαπένθη* = *Sanicula*, Wtst. v. *δια* wegen u. *πένθος* Schmerz — Pflanze geg. Wunden!), *D. lapponica* L., s. *Pyxidanthera* Mchx. 2) **Diapensia** (sc. *Astrantia*) Scop. (Umbelliferen, V. 2) = *Sanicula europaea* G. Frank.
- Diaphyllum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Durchblatt“, Durchwachs (*δια* hindurch, *φύλλον* Laub — durchwachsene Blätt!), *D. triadiatum* Hoffm. „dreistrahliges“, s. *Bupleurum perfoliatum* Lk.
- Diastēma** Benth. (Gesneraceen, XIV. 2) „Zwischenstellung“ (*διάστημα* Abstand — näml. zwischen *Achimenes* u. *Gesnera*, Paxton), *D. quinque-vulnerum* Van Houtt. „fünfnarbige“.
- Diatōma** DC. (Algen, XXIV. 3) „Schniti“- od. Stückelalgen (*διατομή*) Spaltung — wegen d. Aussehens!). — *Diatomacēae* Harv., -mēae Ag. Diatomeen od. Bacillarien, d. i. „Stäbchenalgen“.
- Dicentra** Borkh. (Papaverac. Fumariaceen, XVII. 2) „Doppel“- od. „Zweisporn“, -flügel, s. g. Herzblume, Jungfern- od. thranendes Herz (*δι-* u. *ζέντρον* Stachel, Honigsporn — Antherenklappen lang hornförm. Wtst.), s. *Dielytra* s. *Fumaria spectabilis*.
- Dicēra** Forst. (Tiliaceen Elaeocarpeen, XIII. 1) „Doppelhörchen“ (*δι-* u. *ζέρας* od. *ζερός* Horn), s. *Elaeocarpus Dicera* L. u. *Eriostemon* Collad.
- Dicerna** DC. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Zweimünzkleee“ (*δι-* u. *ζέσμα* Geldstück — Hülse m. 2 kreisr. münzenförm. Gliedern, Wtst.), s. *Hedysarum* u. *Zornia* Gmel.
- Dichaea** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppelorche“ (*δίχα* in zwei Teile geteilt — d. Blätt. stehen zweireihig, Wtst.), z. B. *diandra* Rchb. f., s. *Fernandezia* Rz. Pv.
- Dichilus** DC. (-cheilus Rchb.) (zu *Cytisus* Rchb.) (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Zweilippkelch“ (*δι-*, *χειλος* Lippe — näml. d. Kelch!), z. B. *argentus* L. silberblättr. Bohnenbaum = *Lotus arg.* Brot.
- Dichōdon** Bartl. (zu *Stellaria* Rchb.) (Alsinaceen, X. 3) „Doppelzahn“ (*δίχα* s. v. u. *ὀδών* Zahn — Kronblätter gespalten!), z. B. *cerastoides* L. u. *anomala* Rchb. (*Cerastium anomalum* W. K.).
- Dichoglottis** Fisch., Mey. (Caryophyllen, X. 3) „Doppelzunge“ (s. v. u. *γλῶττα* Zunge — Kronblattspreite meist zweiteilig, Wtst.).
- Dichondra** Forst. (Ehretiac. od. Convolvulac., V. 1) „Doppel“- oder „Zweikorn“, fr. *dichondre* (*δι-*, *χόνδρος* Knorpel u. Korn — aus jed. Blüte zwei Körner! Wtst.), z. B. Hängvasen *D. repens* Forst. u. *sericēa* ds., s. *Sibthorpia convolvulacea* L. (Neuseel.).
- Dichorisandra** Mik. (Commelyneen, VI. 1) „Zweispalt-Anthere“ (*διχωρίζω* spalte, *άνθη*, -*νδρός* Mann, Staubbeutel — Staubgef. in zwei Gruppen getrennt), Warmh. *D. ovalifolia*, *discolor*, *nana* (*violacēa* u. *alba*), *musaica* Lind. (Columb.), *vittata* Lind. etc.
- Dichostylis** P.-B. (Cyperaceen, III. 1) „Doppelgriffel“, Wasserriet (*δίχα* in compos. *διχο-*, *στυλις* Griffel), *D. fluitans* P. B. (*Scirpus* fl. L.) etc., s. *Echinolytrum* Desv. u. *Eleogiton* Lk.
- Dichophyllum** Dill. (Urticac. Ceratophyllen, XXI. 8) „Zerschneidblatt“, Igellock, s. *Dichotophyllum* st. *Dichotomophyllum* (*διχοτομέω* zer-

schneide od. *δίγα* entzwei u. *φύλλον* — zerfetztes Laub d. Igellocks!), s. Ceratophyllum.

Dicksonia l'Hér. (Baumfarne, XXIV. 1) „Dicksonie“ (n. d. engl. Bot. Jan. Dickson, † 1822, s. d. Aut.), Zier. D. cicutaria Sw., dissecta Sw., punctilöba Kze.

Diclinia Juss. „Zweilagerige“, Getrenntblütige — Gegensatz zu Zwitterblüten! (*δί-* u. *κλίνη* Bett etc.).

Dielytia DC. fehlerh. st. Dielytra Bork. (s. d.) — oft angewandtes Fehlerwort!

Dicōma Cass., Less. (Compos. Carlineen, XIX. 1) „Zweischopf“-Anthere *δι-*, *κόμη* lat. coma Haarschopf — Antherenschwänze geschlitzt, Wtst.), z. B. lanuginosa DC.

Dierānum Hedw. (Laubmoose, XXIV. 2) „Gabelzahn“-M., fr. bifurque (*διχοῦρος* od. *-ής* zweiköpfig — Zähne d. Peristoms zwei- bis dreiteilig, Wtst.), D. scoparium Hedw.

1) **Dictamnus** L. (Rutaceen, X. 1) „Diptam“, fr. dictame, e. dittany (dittany) (*δίπτυμονος* v. *λίπτη* Berg auf Creta u. *θάμνος* Strauch, bei d. Alten Origanum Dictamnus L., Wtst.), wild u. Zier. D. Fraxinella Pers. s. albus L. 2) **Diet.** (sc. Origanum) L. (Labiaten, XIV. 1) candischer Diptam (s. eb.).

Dictyanthus Deesn. (-tha Raf.) (Stapeliaceen od. Aristolochieen, V. 2) „Netzblume“ (*δίπτυς* od. *δίπτυνον* Netz, *ἄρθος*), z. B. Pavoni Van Houtt. „Pavon's-N.“, s. Stapelia campanulata Pav.

Dietyosperma Wendl. (Palmen) „Netznuss“-P. (s. eb., *στέγμα* Samen od. Frucht), D. alba Wendl.

Didelta l'Hér., Ait. (Compos. Millerieen od. Arctoideen, XIX. 4) „Doppeldelta“ (*δι* u. *δέλτα* Buchst. Δ — Form d. dopp. Fruchtknotens!), s. Polymnia L. u. Favonium G.

Didesmus Desv. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Zwei-“ od. „Doppelfessel“ *δι-* u. *δεσμός* Fessel — Schötchen wie 2 Kettenglieder, Wtst.), D. perennis Desv., s. Myagrum perenne L.

Didiscus DC., Hook. (Umbelliferen, V. 2) „Doppelscheibe“ (*δι-* u. *δίσκοςος* lat. discus Scheibe — Früchte zusammengedr., fast zweifach, Wtst.), Zier. D. coerulēus Hook., s. Trachymēne coer. Rudg. u. Huegelia R. Br.

Dieffenbachia Schott, Endl. (Aroideen, XX. 9) „Dieffenbach's“-Aron (n. d. deutsch. Reis. Prof. E. Dieffenbach in Giessen, Wtst. n. d. ber. Operateur Dieffenbach z. Berlin, † 1847), Warmh. D. costata Schott (Caladium cost.), Baraquiniana Verschaff., D. s. Seguine picta u. eburnea elfenbeinw. gestielte.

Dielytra Borkh. (nicht Diel.-!) DC. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Doppelfutteral“, -herzohr, Leierblume, Herzblatt s. g. thränend. Herz (*δι-*, *ἐλυτρον* Futteral, Scheide — zwei umgebog. Ohrzipfel!), Zier. D. spectabilis DC., fr. coeur de Marie, Dielytra de Chine, e. showy Diel., s. Dicentra spect. (Fumaria sp. L.), D. formosa DC., fr. D. d'Amérique, D. eximia DC., fr. D. distinguée, D. chrysantha DC., etc.

Diēnia Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Doppelzūgel“ (*δι-* u. *ῥίνα* Zūgel — d. Pollenmassen zu je 2 zusammenh., Wtst.), D. fusca, cylindrica, Myurus Ldl. (Pedilēa Ldl.).

Dierāma Bak. (Irideen, III. 1) „Trichter“-Schwertel (*δίεραμα* Trichter, Durchschlag), D. pendula Bak.

Diervilla T. (-ea) L. (Lonicereen, V. 1) „Dierville's“-Geisblatt, fr. dierville (n. d. franz. Chirurg. Dierville, Tournefort's Freund), Zier. D. versicolor Sieb., Zucc. (Weigela japonica Thb. s. arborēa Hort.), D. canadensis W. s. trifida Mnch. (Lonicera Diervilla L.), D. rosēa Hort. (Weigela ros. L., Calysphŷrum ros. Mey.).

- Diētes** Salisb. (Irideen, III. 1) „Doppelverwandte“, „Zweijährige“ Wtst. (*δι-* u. *ἔτις*; Freund, Verwandter — nämll. Iris u. Moraea! Wtst. *δι-ετις* zweijährig!), Stuben: D. bicolor Sal.
- 1) **Dietrichia** Tratt. (Crassulaceen, V. 5) „Dietrich's“-Dickblatt (n. Fr. Gottl. Dietrich, Übers. v. Loudon's Encyclopädie d. Gartenk., Jena 1836—49, s. d. Aut.), Zier. D. coccinea Tratt. = Crassula s. Larochea (Rochea) coccinea Pers., D. odorata Tratt. (Crassula odoratissima Andr.). 2) **Dietrichia** Gies. (Scitamineen, I. 1).
- Digitalis** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Fingerhut“, fr. doigtier, digitale, gantelet, gant-de-Nôtre-Dame, herbe au pauvre-homme, e. fox-gloves „Fuchshandschuhe“ (digitus Finger), z. B. wild u. Zier. D. purpurea L. m. v. gloxiniaeflora Hort., D. grandiflora Ait. (blassgelb), ferruginæa L. (rotgelb), lanata Ehrh. etc.
- Digitaria** Schrad. (Gräser, III. 2) „Fingergras“, -hirse, -fennich Seub., fr. pied de poule „Hühnerfuss“ (s. eb.), D. sanguinalis Scop. (Panicum s. L.), filiformis Kôl. (humifusa Rich.), s. Panicum filif. Grck., etc.
- Digrâphis** Trin. (Gräser, III. 2) „Doppelschrift“- od. Bandgras (*δι-* u. *γράφις* Griffel — d. beid. Griffel m. pinselförm. od. federf. Narben, Wtst.), Zier. D. arundinacea Trin., s. Arundinaria americana Mchx.
- Dilâtris** L. (Liliac. Hämodoraceen, III. 1) „Doppeldienerin“, fr. dilatris (*δι-*, *λάτρις* Dienerin, Wtst. Blüte aussen, wie d. Kapsel struppig — doppelt bedient!), D. corymbosa L., s. Ixia hirsuta u. Wachen-dorfia umbellata.
- Dilepŷrum** Mchx. (Gräser, III. 2) „Zweihüllgras“ (*δι-*, *λέπυρον* Schale etc. — jed. Blütch. hat 2 Kelch- u. Kronspelzen, Wtst.), D. minutiflorum Mchx., s. Mühlenbergia diffusa Schreb.
- Dillenia** Thunb. (Ranunculac. Dillenieen, XIII. 6) „Dillenie“, Rosenapfelbaum (n. d. Darmstädter Bot. Dillenius, Prof. in Oxford, † 1747, s. d. Aut.), Zier. D. speciosa s. indica Thb.
- Dillwynia** (-nea, -winia) Sm. (Legumin. Cäsalpinieen, X. 1) „Dillwyn's“-Cäsalpinie (n. d. engl. Bot. Lewis Weston Dillwyn, s. d. Aut.), Gewächsh. cinerascens Bot. Cab., floribunda Sm., parvifolia R. Br., speciosa, coronata etc.
- Dimia** Spr., R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Doppelnebenkrone“ (v. *διμὸς* st. *δίδυμος* doppelt — d. corona staminea dopp. vorhand., Wtst.) od. „Schreckpflanze“ (v. *δειμα* od. -μος Schrecken — weg. d. Ansehens!).
- 1) **Dimocarpus** W. (Sapindac. od. Amyrideen, VIII. 1) „Doppelfrucht“, Zwillingspflaume, st. Didymocarpus (*δίδυμος* zwiefach, Zwilling, *ζωρπὸς* Fr.), D. Litschi W., s. Sapindus edulis Ait. 2) **D. Lour.** (Euphorbiaceen, XXI. 1).
- Dimorpha** Sm., W. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Zweiförm“ D. (*δίμορ-φος* von dopp. Gestalt, Wtst. *διὰ* durch od. ähnlich u. Amorpha — ein Kronbl. an Stelle d. Carina!), D. grandiflora W. (Parivōa gr. Aubl.), tomentosa W. (Parivōa tom.) Filz-Lederhülse, s. Palovea Aubl.
- Dimorphanthus** Miq. (Araliaceen, V. 5) „Doppelformblüte“ (s. eb., *διμορφος* — frucht- u. unfrucht- Blüten verschieden, Wtst.), D. mand-schuricus Maxim., s. Aralia edulis autt.
- Dimorphopetalum** Bert. (Crassulac., V. 5) „Doppelform-Kronblatt“ (s. eb., *πέταλον* — vier ungleichgrosse Kronblätt., zwei fast verkümmert).
- Dimorphothēa** Mnch., DC. (Comp. Calendulac., XIX. 4) „Doppelformfrucht“ (s. v., *θήκη* Behälter — zweierlei Achänen, Wtst.), D. pluvialis Mnch. s. Calendula pluv. L. „Regenrose“.
- Dinēma** Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Zweifaden“-O. (*δι-* u. *νήμα* Gespinnst od. Faden — je 2 Pollenmassen an 1 Faden! Wtst.), D. polybulbon Ldl. „vielknoll.“ (Epidendron p. Sw.), s. Bolbophyllum orientale Spr.

- Dinētus** Sweet (Convolvulaceen, V. 1) „Drehwinde“ (*δινητός* herumgedreht — Wtst. *δις* doppelt u. *νητός* gedreht etc. — d. zwei äuss. Kelchblätt. gleich, die drei innern vergröss. sich nach d. Verblühen!), s. Porāna Burm. „Wanderwinde“.
- Diocleā** Kth. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Diokles“-Bohne (n. d. altgriech. Bot. Diokles von Caristos, schr. ein *διζοτουζόν*), Gewächsh. D. glycinoides (Kennedy splendens Vent.) etc., s. Dolichos u. Hymenospōron Spr.
- Dionaea** L. (Cistineen Droseraceen, X. 1) Venus-Fliegenfalle, fr. dionée u. attrape-mouches, e. catchfly (n. Dione, Mutter d. Venus, Zuname), D. Muscipula L., fr. miracle de nature.
- Dioon** Lindl. (**Diōn** Bot. Mag.) (Cycadeen, XXII. 11) „Zweieipalme“ *δι-* u. *ῥορ* lat. ovum Ei — jede Schuppe mit 2 solchen!), D. edüle Lindl.
- Dioscorēa** Plum., L. (Sarmentac. od. Dioscoreen, XXII. 6) Yamswurzel (Cassavebrot, Mandioccamehl), fr. dioscorée, igname od. yam, e. yams (n. Dioscorides aus Cilicien, ber. Arzt zu Nero's Zeit, schr. üb. Arzneimittel etc.), Gart. u. Culturpfl. D. Batatas Decsn. „Bataten“, fr. ign. batate od. de Chine, e. indian yams, Warmh. D. bulbifera u. discolor variegata, multicolor Baraquin m. v. v. chrysophylla Lindl., metallica Lindl. etc., D. Eldorado u. prismatica Lindl. (— alle buntblättr.). — Dioscorēae DC., -reacēae R. Br. (zu Ord. Liliacēae DC.) Schmeerwurzwurzwächse Grck.
- Diosma** L. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Götterduft“, fr. diosme (v. *διος* göttlich, Wtst. od. *Λίος* Gen. v. *Ζεύς* u. *δομή* Geruch etc. od. auch *δίοσμος* durchdring. Geruch!), Gewächsh. D. fragrans s. speciosa Hort., uniflora L. (Adenandra W.), ovata Thb., capitata L. etc. — Diosmēae Rehb. (zu Rutaceae Rutariae Rehb.) Buccogewächse.
- 1) **Diospÿros** L. (Sapotac. Mimusoepen, XXIII. 2) Dattel- od. Lotus-pflaume, fr. plaqueminier (s. eb. u. *πυρός* Weizen, überh. Frucht! od. lat. *pyrus* Birne, Paxton — Früchte meist v. angenehm. Geschmack, Wtst.), D. Lotus L. Lotusbirne, D. Ebenum L. Kōn. Ebenholz (lignum Ebenum), s. Melanoxylon Schott. 2) **Diospÿros** (sc. Tetranthēra) Spr. (Laurineen, IX. 1), s. Laurus Diospÿros Pers.
- Diostomaea** Spenn. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Göttermäulchen“, Zweiblatt (s. v. u. *στόμα* Mund — schöne Blütenform, Wtst.), D. ovata u. cordata Spenn., s. Listera ov. u. cord. R. Br.
- Diothonaea** Lindl., Rehb. f. (Orchideen, XX. 1) „Doppelschleier“-O. (*δι-* *ὑθόνη* Leinwand, Schleier — d. Columna ausgebreit. etc., Wtst.), D. cotoniaeflora Rehb. f. „quittenblüt.“
- 1) **Diōtis** Schreb. (Amarantac. od. Chenopodiac., XXI. 4) „Zweiohr“-Melde (*δι-* *οὐς*, *ῥτος* Ohr — d. weibl. Perigon zuletzt zweiflügl.), D. atriplicina Spr., s. Obione pedunculata Moq.-Tand. (Atriplex ped. L.), s. Halimus ped. Wallr., D. ceratoides W., s. Ceratospermum papposum Pers. (Achyranthes papp. Forsk.). 2) **Diōtis** Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 2) (zu Santolina L.) (— Kronröhre zweiflügl.).
- Dipelta** Maxim. (Lonicereen, V. 1) „Doppelschild“ (*δι-* *πέλις* klein. Rundschild — bez. d. Frucht), D. floribunda Maxim.
- Diphāca** Lour. (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Zweikernstrauch“, „Doppellinse“ (*δι-* *φακί* Linsenfrucht — jede Hülse trägt 2 Linsen), s. Dalbergia Roxb.
- Diphylleia** Rich. (-ēja Mchx.) (Berberaceen, VI. 1) „Zweiblattstrauch“ *δι-* u. *φυλλειον* Laub — nicht mehr als 2 Blätt.), D. cymosa Mchx. (Carolina).
- Diphÿsa** Jacq. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Zweiblasen“-Strauch *δι-* *φύσα* Blase etc. — Hülse an beid. Enden blasig), D. carthagenensis Schiede, etc.

- Diplachne** P.-B., Lk. (zu *Festuca*) Rehb. (Gräser, III. 2) „Doppelspelze“ (*διπλός* dopp., *ἀγνή* Spreu etc. — jed. Blüth. hat 2 Spelzen, Schüppch. u. Kronspelz), *D. serotina* Lk., s. *Molinia* ser. M. K.
- Diplacrum** Kth., Endl. (Cyperaceen, XXI. 11) „Doppelspitze“ (s. eb., *ἄζοον* Spitze — festschliess. zweispitz. Schlauch um d. Frucht), *D. caricinum* Kth. etc.
- Dipläcus** Nutt. (Scrophularineen, XIV. 2) „Zweiplattennarbe“ (*διπλαζοῦς* Kuchen od. *πλάξ*, -ζός; Platte — Narbe m. zwei Lamellen), *D. glutinosus* u. *grandiflorus* Van Houtt.
- Dipladenia** DC. (Apocynen, V. 1) „Doppeldrüsen“-Würger (s. v., *ἄδην. ενος* Drüse — 2 Drüs. od. Höker an d. Basis des Ovariums), Stub. Gewächsh. *D. splendens* Hort., *atro-purpurea*, *Harrisii* Purdil etc., s. *Echites* P. Br.
- Diplarrhena** Dietr. (Irideen, III. 1) „Zweimann“-Schwertel (s. v., *ἄδδην. ενος* Mann — nur 2 vollst. Staubgefässe), s. *Moraea diandra* Vahl.
- Diplasium (-zium)** Sw. (Farne, XXIV. 1) „Doppelschleier“-F. (v. *διπλάζω* verdoppeln od. *διπλάσιος* doppelt — zu zweien vereinte Fruchthaufen), Zier. *D. giganteum*.
- Diplocolobæe** (sc. Cruciferae) DC. (richt. **Diplacol.**) „Zweikuchentlippige“ (*διπλαζοῦς* Kuchen, *λοβός* Lappen — bez. des Samens b. Aufgehen!).
- Diplectrum** Pers. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Doppelsporn“ (*διπλήκτρον* Sporn, lat. *plectrum* etc.), s. *Satyrium* Sw. L.
- Diplocentrum** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppelstachel“ (*διπλόος* u. *ζέντιον* Stachel, Sporn — Labell m. 2 Stacheln), *D. recurvum* Ldl.
- Diplochilus** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppellippe“ (s. v., *χειλος* Lippe — scheinb. dopp. Labell).
- Diplochiton (-ta)** DC. (Melastomac., VIII. 1) „Doppelhemd“ (s. v., *χιτων* Unterkleid etc. — Blüte noch in 2 Brakteolen gehüllt), *D. aurea*, *bracteata* DC. etc.
- Diplochlaena** R. Br. (Rutac. Diosmeen, XIII. 2) „Doppelkleid“ (s. v., *χλαίνα* Kleid — bez. d. Blütenform!), s. *Diplolaena* Desf.
- Diplocōma** Don (Compositen Eupatorin., XIX. 1) „Doppelschopf“ (s. v., *κόμη* lat. *cōma* Haarschopf — dopp. vorhand. Pappus d. Scheibe), *D. villosa* Don, etc.
- Diploconchium** Schauer (Orchideen, XX. 1) „Doppelmuschel“ (s. v., *κόγχη* lat. *concha* Muschel etc. — das *Hypochilum* nachenf., gehört, d. *Epichilum* konkav), *D. gymnocephalum* Schauer.
- Diplolaena** Desf., Damp. (Rutaceen, XIII. 2) „Doppelmantel“ (s. v., *λαίνα* i. q. *χλαίνα* Mantel, Kleid), s. *Diplochlaena* R. Br.
- Diplolepīs** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Doppelschuppe“ (s. v., *λεπίς* Schuppe — jed. Blättch. d. *corona staminea* scheint doppelt).
- Diplomeris** D. Don (Orchideen, XX. 1) „Doppelstück“, -lippe (s. v., *μερίς* od. *μέρος* Stück, Teil — d. Antherenschnäbelchen m. 2 fleisch. Fortsätzen), s. *Diplochilus* Lindl.
- Diplomitrium (-on)** Corda (Lebermoose, XXIV. 2) „Doppelmützchen“ (s. v., *μυτιρίον* dem. v. *μίτρα* Mütze, Haube etc. — scheint dopp. vorhand.).
- Diplopappus** DC. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Doppelpappus“- od. Mantelaster, Feinstrahl (s. v., pappus Samenkronen — diese einbis mehrreihig), *D. annuus* DC., s. *Stenactis* ann. Nees (Bellis ann. L.).
- Diplopetis** Endl. (Sapindaceen, XXIII. 1) „Doppelschild“ (s. v., *πέλις*) klein. Rundschild — Blütenscheibe in eine Schuppe ausgehend).
- Diploprion** Viv. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) „Doppelsäge“ (s. v., *πρίον* Säge — beide Hülsenränder runzln. od. stachlig), *D. medicagionoides* Viv., s. *Medicago* *Ibyca* Spr.

- Diplostephium** DC. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Doppelkranz“-Aster (s. v., στεφρίον dem. v. στέφος i. q. στέφανος Kranz — Pappus inn. u. aussen borstig), Zier. D. amygdalinum Cass. (Canada) etc., s. Aster L.
- Diplostaxis** DC. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Doppelreihe“, -samen, s. g. Rampe (Rempe) (s. v., τάξις Reihe — dopp. Reihe Samen in jeder Schote!), D. tenuifolia DC. (Wegunkr.), muralis DC., etc.
- Diplothemium** Mart. (Palmen, XXI. 6) „Doppelscheide“ (s. v., θημῶν Haufen etc. — d. Brakteen schliessen je 2 männl. Blüten ein, einhäus. Blüten an dems. Kolben, aber mit dopp. Scheide), D. maritimum Mart., s. Cocos arenaria Gomez „Sand-Kokospalme“.
- Diplusödon** DC. (Lythraceen, XI. 1) „Doppelzahn“-Weiderich (s. v., ὀδῶν Zahn — 6 äuss. u. 6 inn. Kelchzähne), D. buxifolium DC.
- Dipōsis** DC. (Umbelliferen, V. 2) „Doppelgeliebter“ (δι- u. πόσις, -εος Geliebter — Pfeiffer: d. Seitenblüt. männl., d. inner. weibl.!), D. Bulbocastanum DC. „Erdkastanie“, etc., s. Hydrocotyle saniculifol. Lam.
- Dipsacēae** Juss., DC., -acēae Grck., fr. dipsacées Karden (Caprifoliacēae Dipsacēae Rchb.).
- Dipsacus** T. (Dipsaceen od. Aggregaten, IV. 1) Kardendistel, Karde, fr. chardon od. cardère, e. fuller's-weed, tazel (-sel) (gr. δίψακος v. διψάω dürste — sammelt in d. Blattachseln Wasser, daher auch fr. bain de Venus „Venusbad“), Cultur: D. fullōnum L. Weberkarde, fr. chardon à bonnetier (- à foulon), cardère des foulons, e. fuller's-thistle (-weed), wild D. sylvestris L. (-ster Huds.) gem. Karde, fr. cardère des bois, e. shepherd's-rod „Schäfer's-Rute“, tazel (-sel) (D. Fullonum var. a L.).
- Diptera** Borkh. (Saxifragac., X. 2) „Zweiflüglerin“ (δι- u. πτέρον Flügel, δίπτερος zweiflüglig — weg. d. 2 Kronblätter!), Ampelpfl. D. sarmentosa Borkh. (Saxifraga s. L.) s. g. Judenbart.
- Diptērix** s. Dipteryx.
- Dipterocarpeāe** Blum., DC. (Tiliacēae Dipteroc. Rchb. u. Ochnacēae DC.) (zu Ord. Columniferae Bartl.) „Zweiflügelnuss“-Gew., s. sogl.
- Dipterocarpus** Roxb. (Tiliac. Dipterocarpeen od. Ochnaceen, XIII. 1) „Zweiflügelnuss“ (δίπτερος zweiflüglig, καρπός Frucht — diese von 2 Flügeln gekrönt).
- 1) **Dipterygia** Presl (Umbellifer., V. 2) „Doppelflügelfrucht“-Dolde (δι- u. πτέρωξ, -γος Flügel). 2) **Dipterygium** Decsn. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Zweiflügelschötchen“ (δι-, πτερόγχιον dem. v. πτέρωξ, Flügelchen), z. B. isaticarpum Decsn. „waidfrüchtiges“.
- Dipteryx** (-ix) Schreb. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) „Doppelschwinge“, Tongabohnenbaum, D. Tonga Schreb. (δι-, πτέρωξ Flügel — nämll. d. beid. ober. Kelchzipfel, wie Flügel!), s. Barosma Tonga W., Pers.
- Ditychocarpus** Reg. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Zweifaltenfrucht“ (δι-, πτύχη Falte, καρπός), D. hispīdus Reg., s. Chorispōra DC. u. Raphānus L.
- Dirca** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Quellenseidel“, Leder-, Blei-, Ceder- od. Sumpfhholz (n. der Dirce od. Dirca, Gemahlin d. Königs Lycus v. Theben u. Quelle bei Theben, Myth. — Pfl. im Wasser wachs.), D. palustris L., fr. Dirca des marais, bois de plomb (- de cuir, - des Canadiens).
- Dircaea** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Quellenblume“ (s. eb.), Stuben D. Cooceri Decsn., bulbosa m. v. lateritia, u. D. refulgens Van Houtt., s. Gesneria bulbosa autt.
- Disa** Berg., L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Grossblume, Nass-O. (v. δεισα Nässe? Wtst. Name d. Pfl. am Cap!), D. grandī- s. uniflōra

- Berg. (*Satyrium grandifl.* Thb.), *barbata* Sw. (*Satyr. barbata* Thb.), *longicornis* Thb., etc., s. *Schizodium* Lindl., *Orchis* L., etc.
- Disaccium** DC. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Zweisack“-Senf (*δί-, σακ-ζίον* Säckchen — 2 Kelchblätt. an d. Basis sackförmig), s. *Sināpis* T., L.
- Disandra** L. (Scrophularineen, VII. 1) „Einmannblume“, „Wechselmannbl.“ (v. *δεις* einer, während *οὐδεις* keiner, *ἀνῆρ*, -*ῥδοος* Mann, Staubgef., Paxton u. Wtst. Wechsel in d. Zahl, schlimm zu zählen, (wechs. v. 5—8), also *δὺς* miss-, schlimm — daher richtiger *Dysandra*!), Ampelpfl. *D. prostrata* L., s. *Sibthorpia peregrina* Bot. Mag.
- Discantheae** Endl., Kl. d. „Scheibenblütigen“ (*δίσκος* lat. *discus* u. *ἀνθή* od. -*ος* Blüte): *Aralien*, *Umbelliferen*, *Ampelideen*, *Cornellen* u. *Loranthaceen*.
- Dischidia** R. Br. (Asclepiad. *Ceropegieen*, V. 2) „Spalt“-Wachspfl. (*δισχιδής* gespalten — d. *corona staminea* zweiteilig), *Warmh.* *D. Raflesiana* Wall. (B.-Schmarotzer m. merkw. Anhängseln!), s. *Colyris* Vahl u. *Leptostemma* Blum.
- Discooactus** Miq. (Cacteen, XII. 1) „Scheibencactus“ (*δίσκος* lat. *discus* Scheibe), s. *Echinocactus* Salm-Dyck.
- Discomycetes** Fr. „Scheibenpilze“ (s. eb. u. *μύκης*, -*ητος* Pilz).
- Disparāgo** G., DC. (Compos. *Seriphieen*, XIX. 6) Sommerflockenblume (v. *dispar* ungleich — Wtst.: *Anthodium* mit nur 2 Blüten, eine zungenförmige u. eine röhrige!), s. *Seriphium* s. *Centaurea solstitialis* L.
- Dispēris** Sw. (Orchideen *Arethuseen*, XX. 1) „Doppelsack“-O. (*δεις* zweimal, doppelt, *πήρα* Sack, Tasche etc. — d. beid. Pollenmass. m. entfernten Beutelchen), *D. purpurata* Rchb. f., *alata* Lab. etc., s. *Arethusa* Sw.
- Dispōrum** Salisb. (Melanthaceen, VI. 3) „Zweisamen“ (*δί-*, *σπορά* od. -*ρος* Same — jedes der 3 Fächer hat 2 Samen).
- Dissōlēna** Lour. (Apocynneen, V. 1) „Doppelscheide“ (*δεις*, *σωλήν* Scheide — Krone doppelröhrenf.), *D. verticillata* Lour., s. *Cerbēra chinensis* Spr.
- Disteganthus** Lemaire (Bromeliac., VI. 1) „Doppeldeckblume“ (*δί-*, *στέγη* Decke etc. *ἀνθος* Bl.), *D. basilateralis* Lem.
- Distemma** Lab. (Passifloreen, XX. 4) „Doppelkranz“ (*δί* u. *στέμμα* Kranz — Zusammensetz. d. Blume!), s. *Passiflora* L. u. *Muricuja* T., z. B. *D. coccinea* DC. (Neuholl.), *Hahnii* Fourn. (Mexiko) etc.
- Distylis** Gaud. (Campanulac. *Goodenoviaceen*, V. 1) „Doppelgriffel“ (*δί-*, *στυλις* Griffel — zwei unten verwachs. convergente Griffel), z. B. *Berardiana* Gaud.
- Distylium** Sieb. u. Zucc. (Hamamelideen, IV. 2) Zwei- od. Doppelgriffel (s. eb.), *D. racemosum*, s. *Hamamelis* rac. S. Z. (Japan).
- Ditmaria** Spr. (Myrobaleen od. *Vochysiaceen*, I. 1) „Ditmarie“ (n. d. Senator *Ditmar* in Rostock, s. d. Aut.), *D. floribunda* Spr. etc., s. *Erisma* Rudg. u. *Debraea* R. u. Sch.
- Diūris** Sm., R. Br. (Orchideen, XX. 1) „Doppelschwanz“ (*δί-*, *οὐρά* Schwanz — Columna m. 2 schwanzart. Seitenlappen).
- Dodartia** L., Mill. (Scrophularineen, XIV. 2) „Dodartie“ (n. d. alt. Bot. F. *Dodart*, schr. *Mémoires pour servir à l'hist. d. pl.*, 1676), s. *Anarrhinum bellidifolium* W. (*Linaria odorata* *Dodart*, *Timbuleta* *Forsk.*).
- Dodecadenia** Nees (Laurineen *Tetranthereen*, IX. 1) „Zwölfdrüsen“-Topflorbeer (*δώδεκα* zwölf, *ἀδην*, -*ερος* Drüse — Krone u. Kelch zwölfteilig), *D. grandiflora* Nees.
- Dodecandria** L., Kl. der „Zwölfmännigen“ (XI. Kl.) (s. eb., *ἀνῆρ*, -*ῥδοος* Mann, Staubgefäss).
- Dodëcas** L. (Myrtaceen, XI. 1) „Zwölfaden“ (*δωδεκάς* Zahl Zwölf — so viel Staubfäden!), *D. surinamensis* L. (Str.).

- Dodecathëon** L. (Primulaceen, V. 1) „Zwölfgötterblume“, Göttergabe M.-Rchb., fr. girosele (gyr.-), douze-dieux, e. cow's-lip „Kuhlippe“ (eig. δωδεκάθεος von den 12 Göttern einer), Zier. D. Meadia L. virgin. G. (für mea dea meine Göttin), fr. gir. de Virginie, e. virginian cow's-lip, m. v. v., integrifolium Mchx., etc.
- 1) **Dodonaea** L. (Sapindaceen, VIII. 1) „Dodoensbaum“ (n. Dodoens, lat. Dodonaeus, aus Mecheln, Leibarzt Kaiser Maximilian's I., † 1585), D. viscosa L. (Ptelea visc. L.), s. Staphyloidendron Pluk. u. Thlaspidioides arborescens Barrere. — Dodonaeaceae H. B. K. (sc. Sapindaceae Juss., Ord. Malpighinae Bartl. 2) **Dodonaea** Plum. (Anacardiaceen, III. 1) (s. Ilex Dodonaea L. f.), z. B. angulosa W. u. ilicifolia L., s. Comocladia L.
- Doellingeria** Nees (Compositen) „Döllingerie“, z. B. scabra Nees (n. d. Landshut-Münchener Anatomen J. Döllinger, Wtst.: Th. Döllinger, Reis. am Senegal u. 1836 mit A. v. Nordmann am Kaukasus, † in Moskau).
- Dolichonema** Nees (Sapotaceen od. Cassieen, X. 1) „Langfaden“ (δολιχός lang, νήμα Faden etc. — einer d. Staubfäd. sehr lang u. unfruchtbar.), D. speciosa Nees, s. Moldenhawera floribunda Schrad. u. Bowdichia speciosa Spr.
- Dolichos** G., L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) Fasel-, Soja-, Gewürzbohne, fr. dolique, e. bonavist (s. eb.), Gärt. D. Lablab L., fr. dolic od. haricot d'Egypte, D. urens L. Teufelsbohne, fr. œil-od. yeux-de-bourrique, D. pruriens L. (Phaseolus americanus Pluk.), fr. pois à gratter od. pouilleux „Kuhkrätze“ Wolff, s. Strizolobium P. Br.
- Dolioscarpus** Rol. (Ranunculac. Delimeen, XXII. 12) „Fassfrucht“ (lat. dolium Fass, καρπός Fr. — diese eine einf. ein- bis zweisamige Beere), D. Rolandi, s. Tetracera Dolioscarpus W.
- Dolomiaea** DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Dolomieu“-Distel (n. d. Geologen Dolomieu, † 1801 in Paris), D. macrocephala DC.
- Dolophyllum** Salisb. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Trugblatt“ (δόλος lat. dolus Trug etc., φύλλον Blatt), s. Thuja.
- Dolophragma** Fenzl. (Caryophylleen, X. 2) „Trugwandkapsel (s. eb., φράγμα Wand, Scheidewand — die Klappen d. Kapsel tragen mitten nur halb d. Wände).
- 1) **Dombeya** Cav., Boj. (Geraniac. Dombeyaceen, XVI. 5) „Dombeye“ (n. Jos. Dombey aus Macon, † 1795 in engl. Gefang.), D. umbellata u. viburnifolia Boj. — Dombeyaceae Kth. 2) **D.** lappacëa l'Hér. (Bignoniac., XIV. 2), s. Tourretia lapp. 3) **D.** chilensis Lamb. (Coniferen, XXI. 9), s. Araucaria imbricata Pav.
- Donatia** Forst. (Saxifragac. od. Paronychieen, III. 3) „Donatie“ (n. d. venetian. Bot. Donati), D. fascicularis L. (Str.), s. Polycarpon magellanicum L.
- Donax** P.-B., L. (Gramineen, III. 2) Pfahl- od. Pfeilrohr, Klarinetten-R. Lauche (gr. δόναξ od. δῶναξ v. δονέω od. -νάω schwanke umher, Wtst.), D. arundinaceus P.-B., s. sativus Lam., s. Arundo Donax L. (D. Dioscoridis Bauh. u. β indica, D. laconica versicolor Moris.).
- Dondia** Spr. (Araliaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Dondie“, Sternrolde (n. d. franz. Bot. Dondie Duprée, Wtst. n. Jacopo di Dondie, † 1385, schr. promptuarium medicinae etc.), D. Epipactis Spr., s. Hacquetia Neck. od. Dondisia M.-Rchb. (Astrantia L.) Epipactis.
- Dondisia** M.-Rchb., s. Dondia.
- 1) **Donia** autt. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Donblume“, deutsche Flagge (n. d. Bot. Gebr. Don, s. d. Aut.), s. Clianthus Sol. 2) **Donia** Hook., Nutt., Less. (Compos. Astereen, XIX. 2) Don's-Aster, D. ciliata Hook. (Grindelia cil. W.), D. glutinosa R. Br. (Grind. gl. W.).

- 3) **Donia** R. Br. (Polygoneen Oxyrideen, VI. 2), *D. sapida* R. Br., s. *Oxyria digyna* Cambd. (Rumex d. L.).
- 1) **Doodia** R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Doody's“-F. (n. d. Lond. Apoth. Sam. Doody), *D. caudata* R. Br., s. *Woodwardia c. Sm.* 2) **Doodia** Roxb. (Portulacac., X. 1).
- Doratolēpis** Benth. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Speerschuppe“, s. *Podolēpis* Lab. „Stielschuppe“ (v. *δόρου*, -*ατος* Speer, *λεπίς* Schuppe — Schuppenform d. Anthodiums!).
- Dorēma** D. Don (Umbelliferen, V. 2) Ammoniakpfl. Leun., Gummidolde (gr. *δώρημα* Geschenk? wahrsch. *δόρου* Schaft — lange, schlanke Stengel), *D. ammoniacum* Don, e. gum-ammoniac.
- 1) **Doria** Ad. (sc. Senecio) L. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Doria“-Baldgreis (n. d. alten Dogen v. Genua, Andr. Doria — weg. d. w. Pappus!), s. *Jacobaea Doria* Fl. Wett. hohes Kreuzkraut (Greiskr.). 2) **Doria** Thb., Less. (Compos. Senecionid., XIX. 2), s. *Cineraria alata* u. *bipinnata* W. (Wtst.: v. d. franz. doré goldfarb. — Blütenfarbe?).
- Doritis** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Spiess“- od. „Lanzen“-O. (nicht v. *δοῦντις* Preis b. Wettspiel, sond. v. *δόρου* Lanze — Labell spiessförmig dreilappig), *D. pulcherrima* Ldl. (Cochinch.).
- 1) **Doronicum** T., L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Gemswurz, fr. doronic, tabac des Vosges (n. Linné v. *δώρον* Gabe u. *νίκη* Sieg od. n. Vaillant v. d. arabischen *doronigi* — z. Tödtung wilder Tiere!? Wtst.), Garten: *D. caucasicum* M. B., fr. d. du Caucase, e. caucasian leopard's-bane u. *Pardalianches* W. (s. d.). 2) **Doron.** (sc. Senecio) L. Gebirgs-Kreuzwurz M.-Rchb.
- Dorstenia** Plum., L. (Urticaceen Artocarpeen, IV. 1) „Dorstenie“, fr. dorstène (n. Theod. Dorsten, Prof. zu Marburg, † 1539), *D. Contrayerva* L. peruan. Giftwurz, Bezoar- od. Schlangenzwurz, fr. u. e. *contrayerva*, s. *Drakena radix* Clus., *D. caulescens* L. (*Parietaria racemosa* Plum.), *D. radiata* Lam. (*Kosaria* Forsk.).
- Dortmannia** Don (sc. Lobelia) L. (Lobeliaceen, V. 1 od. XIX. 6) Wasser-Lobelia M.-Rchb. (n. d. Gröninger Apoth. Dortmann ben.).
- Doryanthes** Corr. (Amaryllideen Agaveen, VI. 1) „Speerblume“ (*δόρου* Speer, *άνθη* Bl. — langer lanzenf. Schaft!), *D. excelsa* R. Br., *D. Palmeri* W. Bull etc.
- Doryenium** T., Mnch. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Backenklee Leun., „Spiess“- od. „Speerklee“ (gr. *δορύκνιον* Diosc. v. *δόρου* Speer — z. Vergift. d. Speere diente *Convolvulus Doryenium* L.), *D. suffruticosum* u. *herbacum* Vill.
- Doryopteris** Sm. (Farne, XXIV. 1) „Speerfarn“ (v. *δόρου*, -*ατος* u. -*ος* Speer, *πτερίς* Farn — spiessf. Wedel!), Zier. *D. collina* Raddi (Bras.), *sagittifolia* Sm., *palmata* Sm. etc. (das.).
- 1) **Doryphōra** Rchb. f. (zu *Cephalanthēra* Rchb.) (Orchideen, XX. 1) „Speerträgerin“ (s. v., *φορός* tragend). 2) **Doryphōra** Endl. (Laurineen Monimieen, XXI. 3) — langlanzettl. Perigonlappen), z. B. *D. sassafras* Endl. (Neuholl.).
- Dothidēa** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Geschwür“- od. Dürripilz (v. *δοθιήν* od. -*θιών* Geschwür u. *εἶδομαι* gleiche — braune Farbe u. Gestalt wie ein solches), s. *Asterōmā* DC. — *Dothideaceae* DC.
- 1) **Douglasia** Lindl. (Primulaceen, V. 1) „Douglas“-Primel (n. d. schott. Bot. u. Reis. in Californien 1834, David Douglas). 2) **Douglassia** Schreb. (Laurineen, VI. 1), s. *Laurus hexandra* Sw. 3) **Douglassia** Houst. (Viticeen, XIV. 2) = *Clerodendron* s. *Volkameria fragrans*.
- Draba** L., DC. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Hungerblümchen, fr. drave (gr. *δράβη* Diosc. = *Lepidium Draba* L., eine bittere Pfl.), *D. verna*

L., fr. mignonette, Zier. D. aizoides L., D. repens M.-B., fr. dr. rampante, e. creeping Draba (Sibir.).

- Dracaena** L. (Liliac. Smilaceae od. Asphodeleen, VI. 1) „Drachenbaum“, fr. dracène (gr. *δοράκαινα* weiblicher Drache — d. blutrote Saft = Drachenblut!), Dr. Draco L. echter Dr., s. g. Drachenblut, fr. dracène od. dragonnier (bois-de-chandelle), e. dragoon's-blood (Dr. reflexa autt.), Zier. ensifolia Wall., fr. reine des bois, D. Aubryana A. Br. (leichtblüh.), D. terminalis stricta Hort. rotstreif., D. marginata Lam., rubra (rotbeerige), Warmh. Dr. (Charlwoodia) congesta, (Dracaenopsis) australis, (Dianella) indivisa spitzschilfbl., v. bruno-lineata Hort., v. brun.-lin.-latifolia, (Cordylina) Haageana breitblättr., Mooreana br. carmin., etc.
- 1) **Draco** (sc. Dracaena) L. (Liliaceen, VI. 1) gem. Drachenbaum (s. eb.).
 2) **Draco** (sc. Pterocarpus) Jacq. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) Drachen-Flügelfruchtbaum (draco Früche).
- Dracoecephalum** L. (Labiaten, XIV. 1) „Drachenkopf“, fr. dracocéphale, tête-de-dragon, e. dragoon's-head (gr. *δοράζων* u. *ζεγαλή* Kopf), Garten D. moldavicum L., fr. moldavique, canescens L., grandiflorum L., argunense Fisch.
- 1) **Dracontium** L. (Aroideen, XX. 9) „Drachenwurz“, fr. draconte, e. dragon's-wort (v. *δοράζων*, -οντος Drache — Stengel fleckig wie Schlangenhaut!), z. B. pertusum L. = Philodendron pertusum Kth. s. g. Baumwürger. 2) **Dr.** (sc. Arum) L. kleiner Aron M.-Rchb.
- Dracopis** DC. (zu Rudbeckia Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Drachenaugen“ (s. v., *δράκος* Gen. v. *ὄψ* Auge, Gesicht), Zier. D. amplexicaulis Cass., s. Rudbeckia ampl. Jacq.
- 1) **Dracunculus** T. (sc. Arum) L. (Aroideen, XX. 9) „Drachenwurz“, fr. draconcule od. serpentinaire (dem. v. draco Drache). 2) **Drac.** Bess. (sc. Artemisia) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Dragun-Beifuss, Esdragon, fr. estragon od. herbe-au-dragon (— Wurzel schlangentartig gewunden).
- Drakaea (-keä)** Lindl. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Drake's“-O. (n. Franz Drake, d. Erdumsegler unter Königin Elisabeth v. England), D. elastica van Houtt., s. Arethusa Sw.
- Drepanocarpus** F. W. Mey. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) „Sichelhülse“ Kino od. senegalsches Santelholz (*δορεπάνη* Sichel, *ζαροπός* Frucht), s. Pterocarpus L.
- 1) **Drepanophyllum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Sichelblatt“ (s. eb., *φύλλον* Laubblatt), s. Sium Falcaria L. (Critamus F. Rchb.) u. Falcaria Rivini Host s. vulgaris Bernh. — 2) **Drep.** Rich. (Moose, XXIV. 2) „Sichelmoos“, D. fulvum Hook., s. Fissidens falcifolius Schwäger.
- Drimys** Forst. (falsch Drymis!) (Magnolieen, XIII. 4) Winterrindenbaum, fr. boique (gr. *δομύς* beissend, scharf — arom. Rinde!), Gewächsh. D. Winteri Forst. = Wintera Pers., aromatica Murr. (Chili).
- Drosanthe** Spach (Hypericineen, XVIII. 3) (zu Hypericum L.) Mannsblutblume (nicht v. *δορός* der Tau, sond. Androsaemum u. *ἀνθή* Bl.), D. helianthemoides Spach.
- Drosëra** L. (Cistineen Droseraceen, V. 5) „Sonnentau“, fr. rosée du soleil, rorelle od. herbe de la rosée, e. ros-solis u. sun-dew (v. *δοροσείος* betaut — gestielte Drüsen im Sonnenschein wie Tau), D. rotundifolia L. — Droseracæe, -ræe Rchb.
- Drosophyllum** Lk. (Cistineen Droseraceen, V. 5) „Taublatt“ (*δορός* Tau, *φύλλον* Blatt — im Sinn der vorigen!), D. lusitanicum Lk., s. Spermogöla droseroides Brotero.
- Drummondia** DC. (Saxifragaceen, V. 2) „Drummondie“ (n. d. Pflanzensammler Thom. Drummond, † 1835 auf Cuba), D. pentandra DC., s. Mutella pent.

- Drupac̄ae** DC., Seub. „Steinfrüchtler“ Leun. (drupa, gr. *δρούπια* Steinfrucht).
- Drusa** DC. (Araliaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Le Dru’s“—Dolde (n. d. Reis. Bot. u. Reis. in China Le Dru, schr. voyage aux îles de Ténériffé etc., Paris 1810), *D. oppositifolia* DC.
- 1) **Dryandra** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Dryander’s“—Silberbaum (n. d. schwed. Bot. Jon. Dryander), Gewächsh. *D. formosa*, *falcata* R. Br., *nobilis* Lindl., *speciosa*, *floribunda*, *nivea* etc. R. Br. 2) **Dryandra** L., Thb. (Euphorbiaceen, XVI. 4) „Dryandersbaum“, *D. cordata* L., s. *Vernicia montana* Lour.
- Dryas** L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) Achtauge, „Dryade“ od. Waldgöttin Vilm., Silberkraut, Hirsch- od. Silberwurz, fr. *dryade* u. *chénette*, e. mountain-Avens (*Λιονάς*, -*άδος* Baumnymphe od. Dryade, v. *δρύς* Eiche — Blattähnlichk.), Zier. *D. octopetala* L. (Alp.), fr. *dryade à huit pétales*, e. eight-petaled-m.-Av. — *Dryadæa* Vent.
- Drymaria** W., DC. (Paronychieen, V. 3) „Waldknorpelblume“ (v. *δρυμός* od. -*ον* Eichwald — sehr verbreitet wachsend, wie ein kleiner Wald, Wtst.), *D. cordata* Kth., s. *Holostëum cord.* L. (*Loeflingia renifolia* Lag.) etc., s. *Illecebrum* T.
- Drymōda** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Waldorche“ (*δρυμώδης* waldig — auf Waldbäumen), s. *Epidendron* L.
- Drymonia** Mart. (Gesneriac. od. Bignoniac., XIV. 2) Wald- od. Zart-Gesnere (*δρυμόνιος* adj. v. *δρύμιος* od. -*ων* Eichwald, Wtst. v. *δρυμός* (?) zart, fein — zarter Klimmstrauch!).
- Drymophila** R. Br. (Sarmentaceen, VI. 1) „Waldlieb“ (s. eb., *φίλος*, -*η* Liebhaber, -berin), *D. cyanocarpa* R. Br. (Neuholl.).
- Dryaria** (bess. **Dryaria**) Bory St. Vinc. (Farne, XXIV. 1) „Baumfarn“ (v. *δρύς*, -*ίος* (nicht *δρύμιος*), Baum; ähnl. Fehler in d. Entomologie *Drynobia* st. *Dryobia*, „Wald-Eichenglucke“), *D. coronans* Bory, *morbillosum* etc., s. *Psygium* Presl s. *Polypodium* L.
- Dryobalanops** G. f. (Tiliac. od. Laurineen, Dipterocarpeen, XIII. 1) Flügeleiche od. Kampherölbaum (*δρύς*, -*ίος* Eiche, *βάλανος* Eichel, *ὄψ* Gesicht — Frucht wie eine Eichel in einem Becherkelch), *D. aromatica* G. f., s. *Dryobalanus* autt.
- Dryopeia** (-*ėja*) A. P.-Thouars (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Baum“-O. (s. v., *ὄπρω* schaue — Baumschmarotzer!), *D. discolor* u. *oppositifolia* P.-Th.
- Dryoptēris** Sm. (Farne XXIV. 1) „Eichenfarn“ (s. v., *περίς* Farn), s. *Polypodium Dryoptēris* L. Eichen-Tüpfelfarn Leun.
- 1) **Duchesnea** Sm. (-*nĩa*) G. Don (Rosaceen Sanguisorbeen, XXI. 8) „Duchesne’s“—Erdbeere (n. d. Bot. Duchesne, schr. Hist. des Fraisières, Par. 1766), *D. fragiformis* Sm., s. *Fragaria indica* Hort.
- 2) **Duchesnia** Cass. (Compos. Inuleen, XIX. 2), s. *Francoeuria* DC.
- 1) **Dudaïm** (sc. Cucūmis) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Apfel-Melone, „Dudaïm-Gurke“ (*Dudamia* Beckm.), s. *Cucūmis Melo* var. *Dudaïm* Naud. (*Cucumis odoratissimus* Mnch. s. *pictus* Jacq.) (hebräisch. Bibelwort nicht bekannter Bedeutung). 2) **Dudaïm** G. Frank (Solaneen, V. 1) Alraun = *Mandragōra officinalis* Mill.
- Dugaldea** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Dugald’s“—Blume (n. Dugald Stewart, schott. Philos., † 1828).
- Duhaldēa** DC. (Compositen) „Duhald’s“—Blume, *D. chinensis* DC. (n. d. Reis. J. B. Duhalde, Beschr. v. China, Mitte des 17. Jahrh.’s.).
- 1) **Duhamelia** Pers., Domb. (Contorten od. Sapotac. Lucumeeen, V. 1) „Duhamelie“ (n. d. franz. Bot. Duhamel du Monceau, † 1782), *D. ventricosa* P., *D. Manglilla* Domb., s. *Bumelia Manglilla* W. u. *Hamelia* Jacq. 2) **D.** Pers. (Rubiaceen, IV. 1).

- Dulacia** Neck. (Myrobalaneen, XII. 1) „Dulac's“- od. Moquillo-Mandel, s. Moquilea Mart., Zucc. od. Acia Schreb. (Acioa Aubl.) (n. Franz Alleon Dulac).
- Duleamāra** Mnch. (sc. Solanum) L. (Solaneen, V. 1) „Bittersüss“, Alp- od. Wasserranke, Saurebe, Stickwurz, Seidelbeere, fr. douce-amère, morelle, loque, vierge, vigne de Judée, e. bitter-sweet, woody-night-shade „holziger Nachtschatten“ (dulcis süß, amārus bitter).
- Dulichium** Pers. (**Dulcēhium**) Rich. (Cyperaceen, III. 1) „Doullichion“-Riet (n. d. echinadischen od. jonischen Insel *Δουλίχιον* Homer, od. dulcis süß — so schmeck. Wurzel), D. canadense Mchx., spathacēum Pers. (Cypērus spath. W.).
- 1) **Dunalia** Hb., Bpl., Kth. (Solaneen, V. 1) „Dunal's“-Strauch (n. d. franz. Bot. Dunal), D. solanacēa Hb., Bpl. (südam. Str.). 2) **D. Spr.** (Lythriariēn, VI. 1), tuberosa Spr., s. Peplis tetrandra L. 3) **D. R. Br.** (Labiaten).
- Duperreya** Gaud. (Solaneen od. Convolvulaceen, V. 1) „Duperrey's“-Strauchwinde (n. d. Bot. u. Reis. Duperrey, s. d. Aut.), D. sericēa Gaud. (Hstr.).
- Duranta** L. (Viticeen, XIV. 2) „Durante“-Müllen (n. d. Arzt u. Bot. Castor Durante, † 1590), Warmh. D. Bonardi, Plumieri L. s. spinosa (Castorēa racemosa Plum.) u. Ellisia L. (Str.).
- Durio** Rumph., L. (Sterculiaceen, XVIII. 3) Kürbisfruchtbaum, ind. Zibethbaum Leun., fr. durion, D. zibethinus L. (v. duryon, dem malayischen Nam. d. Frucht).
- Duris** Juss. (Capparideen, XIII. 1) Baumkapper (*δοῦρον* od. -ρα Baum).
- Duroia** L. f. (Rubiaceen Guettardeen, VI. 1) Waldcacao, Marmeladendosen-Baum (n. d. franz. Bot. Duroi), D. Eriopila L. „Wollhaar“-Cacao (Cacao sylvestris Aubl.), s. Genipa Merianae Pers.
- 1) **Duvalia** Haw. (Asclepiadeen, V. 2) „Duval's“-Wachspfl. (n. den Botanikern Duval, s. d. Aut.) D. compacta Haw., s. Stapelia replicata Jacq. 2) **Duvalia** Nees (Lebermoose, XXIV. 2), D. rupestris Nees, s. Marchantia hemisphaerica L.
- Duvaua** Kth. (Terebinthac. Anacardieen, XXII. 9) „Duvau's“-Nierenbaum (n. d. franz. Freunde Kunth's Duvau), s. Amyris polygāma Cav. (Schinus dependens Orteg.).
- Duvernoya** Desf. (Lythriariēn, XI. 1) „Duvernoy's“-Kelchhücker (n. Duvernoy, schr. Fl. v. Tübingen, 1722), s. Cuphea Jacq.
- Dyckia** Mart., Schult. (Bromeliaceen, VI. 1) „Dyck's“-Ananaspfl. (n. d. Fürst. Salm-Dyck, Gönner d. Bot.), D. frigida Hook. f., s. Pourretia frig. Hort. Lind.
- Dypsis** Nor. (Palmen, XXI. 8) „Tauchpalme“ (v. *δύπτω* tauche unter — steht im Wasser, Kolben in nur oben offenen Scheiden), D. pinatifrons „fiederwedelige“, s. Areca gracilis Thouars.
- 1) **Dysodēa** Pers. (**-dia**) Cav., Lag. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Stinkblume“ (*δυσωδής* übelriechend), D. glandulosa Less., s. Boebēra W. 2) **Dysodēa** Pers. (**-da** Lour.) (Rubiac. Cinchonaceen, V. 1), s. Serissa Commel. 3) **Dysodēa** foetida (Disodea f.) autt. (Compos. Cichoriac., XIX. 1), s. Crepis foet. L. (Barkhausia f. DC., Hieracium f. Karsch).
- Dysophylla** (nicht **Disoph.-**) Blum., Benth. (Labiathen, XIV. 1) „Stinkblatt“ (s. eb. st. Dysodophyllum v. *δυσωδής* u. *φύλλον* Blatt), D. strigosa Benth. (Ostind.), s. Mentha.
- Dysoxylon** Blum. (Hesperid. Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) Riech- od. „Stinkholz“ (v. *δυσούζω* rieche übel, od. *δυσωδής* s. v., *ξύλον* Holz), D. alliacēum Blum., s. Trichilia alliacēa Forst.

- Earīna** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Frühlings“-O. (ἐαφ, -ροφ Frühlings — blüht im Sept. u. Okt., d. Frühl. Neuholl.'s), z. B. E. Deplanchéi Rchb. f.
- Ebelia** Rchb. (Rubiaceen, IV. 1) „Ebelie“ (n. W. Ebel, schr. de Armeriae genere, Königsb. 1840).
- Ebenacēae** Juss., DC. (zu Ord. Styracīnae Bartl.) „Ebenholzbäume“.
- Ebenoxylon** Lour. (Sapotac. od. Lucumeen, XXIII. 2) Ebenholz v. Cochinchina, fr. ébénoxyle, s. Diospýros Ebēnum L.
- Ebēnum** Kön., L. f. (sc. Diospýros) L. (Sapotac. od. Lucumeen, XXIII. 2) Schwarzholz = Lotus, Schwarzholzkern, echtes „Ebenholz“ W. (Ἐβενος Théophr., hebr. eben, arab. abnous Stein!).
- 1) **Ebēnus** L. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) Ebenholz, Schwarzholz, E. cretica L., fr. ébène (-nier), e. ebony-tree (eben-, ebon-) (gr. ἔβενος Theophr., lat. ebēnus, arab. abnous). 2) **Ebēnus** (sc. Maba) Spr. (Ebenaceen, XXII. 8) gem. Ebenholz (Ebēnus vulgaris Roxb.). 3) **Ebēnus** (sc. Aspalathus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Ebenholz = Dornhülsenbaum, s. g. Rhodiserholz. 4) **Ebēnus** Comm. (Lucumeen od. Mimusopeen, VIII. 1).
- Ebūlum** Pont., Grck. (-us) (sc. Sambūcus) L. (Caprifoliaceen, V. 3) Zwerghollunder, Attich od. Eppich, fr. aubier (obier), petit sureau, sureau aquatique, e. danewort, dwarf- od. marsh-elder (lat. ebulum od. -lus Eppich — yiell. von εὖ u. βουλῆ Rat — n. Plinius als Mittel geg. allerlei Übel), E. humile Grck. s. Samb. Ebūlus L.
- Ecastophyllum** P. Br. (Hecast.-), H. B. K. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 4) „Einzelblatt“ (ἐκαστος, lat. singūlus einzeln, φύλλον Bl.), E. frutescens P. Br., s. Pterocarpus s. Hedysarum Ecastoph. L.
- Ecballion** Koch (-um Rich.) (Cucurbitac., XXI. 10) „Spritz“- , Vexier-, Eselsgurke (v. ἐκβάλλω werfe heraus — näml. bei Berührung die Samen!), E. agreste Rchb. s. Momordica Elaterium L. (Ecballium Elaterium Rich.).
- Eccilia** Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) Hohlstiel P. Kumm. (v. ἐκκοιλῆνυ höhle aus), z. B. calophylla, griseo-rubella Fr. etc., s. Agaricus L.
- Eceremocarpus** Rz., Pv. (Bignoniac., XIV. 2) „Hängfrucht“, Schönrebe Rmpl. (v. ἐκκρέμαμαι hänge herab, καρπός Fr.), E. scaber R. P., rauhrüchtig, fr. Bignone du Chili, e. rough-podded Ecer. (Wand-Decor.), s. Calampēlis scabra Don.
- Echeandia** Orteg. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) „Echeandie“ (n. Greg. Echeandia, Prof. in Saragossa), E. terniflōra Ort. s. Conan-thēra Echeandia Pers.
- Echeveria** DC. (Crassulaceen, X. 5) „Echeveri's“-Dickblatt (n. Echeveri, Wtst.: Echever, Zeichner d. Fl. Mex., in Mexiko), Gärt. secunda Lindl. m. v. glauca, metallīca Nutt., coccinēa DC., fulgens Lem., Stuben: retusa Lindl., campanulata, etc., s. Cotylēdon L.
- Echinacēa** Mch. (zu Rudbeckia Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Stachelkopf“- od. Purpur-Rudbeckie (v. ἐχίνος Igel), Zier. E. purpurea Mch. s. serotīna DC., s. Rudb. purp. L. s. hispida Hoffm.
- Echinanthriscus** Lantzius-Beninga (Umbellifer., V. 2) „Stachel-Klettenkerbel“ (s. eb. u. Anthriscus), E. vulgaris Lantz. s. Anthriscus vulg. Pers. (Scandix Anthr. L.).
- Echinaria** Desf. (zu Sesleria Rchb.) (Gräser, XXIII. 1) „Stachel“- od. „Igelgras“ (s. v. — Kronspelz. eingeschnitten, lang, steif u. rauh), E. capitata Desf. s. Sesleria echinaria Schrad. s. Cenchrus capit. L. f.
- Echinocactus** Salm-Dyck, Lk., Otto (zu Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Stachel“- od. „Igel“-Cactus (s. v.), Topf. E. Ottonis Lehm., Scopa Lk., Otto „Besen“-C., Linkii u. corynodes „kolbig“, mammillosus Lem., Mirbelii, cylindracēus Engelm., etc.

- Echinocarpus** Blum. (Tiliaceen od. Bixaceen, XIII. 1) „Stachelfrucht“ — Linde (s. v., *καρπός* — Kaps. m. auss. stachl. Klappen), E. s. *Sloanea paradisearum* F. Müll.
- Echinochlōa** P.-B. (zu *Panicum* L.) (Gräser, III. 2) „Stachelgras“ od. -hirse (s. v., *χλόα* od. -*ύη* Gras — Spelz. d. geschlechtslos. Blüth. stark begrannt), E. *crus-galli* „Hahnensporn“ od. Hühner-Fennich M.-Rchb., fr. *pie-de-poule*.
- Echinocystis** Torr. u. Gr., Cognx. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Stachelblase“ (s. v., *κύστις* Blase — d. kugl. aufgeblas. Frucht stachelborstig), E. *australis* Cognx.
- Echinodorus** Rich., Engelm. (Alismaceen, VI. 5) „Igelkopff“ — Froschlöffel, „Igelschlauch“ (s. v., *δορός* Schlauch — *Carpidieen* lederart. einsamig etc.), E. *natans* u. *ranunculoides* Eng., s. *Alisma natans* etc.
- Echinoglochin** Lehm. (Boragineen, V. 1) „Igelsame“, s. *Echinosperrum* Sw. (s. v., *γλωχίν* Spitze, Ecke — stachelspitz. Samen!), E. *Lappula* Lehm s. *Lappula Myosotis* Rupp. (*Myosotis Lappula* L.).
- Echinolobium** Desv. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) „Stachelhülse“, *Esparsette* (s. v., *λοβιον* dem. v. *λοβός* Hülse — Glied d. Hülse weichstachl., widerhakig etc.), s. *Hedysarum Onobrychis* L.
- Echinomelocactus** DC. (Cacteen, XII. 1) „Stachel-Melonendistel“, s. *Melocactus* DC.
- Echinonyctanthus** Lem., Miq. (Cacteen, XII. 1) „Stachel-Nachtblume“ (s. v., *νύξ*, -*νιτος* Nacht, *άνθος* — nächtl. Blüten aus dorn. Höckern), s. *Echinopsis* Zucc.
- Echinopæae** (sc. *Compos. Homoianthae* Rchb.) „Kugeldistelartige“, s. *Echinops*.
- Echinophōra** T., Col., L. (Umbelliferen, V. 2) „Stachelträgerin“, -Hülldolde, Igelklette *Dietr.*, fr. *échinophore* (s. v., *φορός* tragend — d. ganze Pfl. hat Stacheln), E. *spinosa* L. s. *Daucus*, *Crithmum*, *Caucalis* u. *Pastinaca echinophōra apūla* Column.
- Echinops** L. (*Compos. Echinopeen*, XIX. 5) Kugeldistel, Igelkopf, Knopfwurz O. W., fr. *échinope*, *boulette*, e. *globe-thistle* (v. *έχινος* Igel u. *όψ* Ansehen), *Zier. E. ruthenicus* Fisch., *sphaerocephalus* L., *Ritro* L. glattblättr., fr. *boulette azurée*. — *Echinopsidæae* Less., DC. (-*opæae* Rchb.).
- Echinopsilon** (-um) Moq.-Tand. (*Chenopodiaceen*, V. 2) „Stachelhaar“ Grck. (nicht v. *ψιλός* nackt, sond. *ψίλον* dor. st. *πίλον* Feder — strahlig fünfstachel. *Perigon*), E. *hirsutus* Moq. s. *Salsōla hirsuta* L.
- Echinopsis** Zucc. (Cacteen, XII. 1) „Stachelcactus“, „Igelgleicher“ (s. v. u. *όψις* Aussehen), *Gewächsh. E. Eyriesii* Zucc., *multiplex* Zucc., *Decaisneana* Lem. u. *Zuccarinii*, s. *Echinonyctanthus* Lem.
- Echinosperrum** Lehm., Sw. (Boragineen, V. 1) „Igelsamen“, Stachelnüsschen *Seub.* (s. v., *σπέρμα* Samen — dies. rauh, wie Kletten!), E. *Lappula* u. *deflexum* Lehm., s. *Myosotis* etc. L., *Wahlbg.*
- 1) **Echinus** (sc. *Statice*) L. (*Plumbagineen*, V. 5) „Stachelblatt“ (gr. *έχινος* Igel). 2) **Echinus** Lour. (*Euphorbiac.*, XXI. 9), E. *trisulcus* Lour., s. *Mappa cochinchinensis* *autt.*
- Echites** P. Br., L. (*Apocynen*, V. 1) „Viper“ od. „Otter“-Wachskraut, *Klammerstrauch* D., fr. *échite* (gr. *έχίτης* Otterstein u. -strauch v. *έχίς*. -*ιως* Otter, Schlange — schlangenart. gewund. Stengel), *Zier. E. Melaleuca* u. *nutans*; E. *caudata* L. s. *Strophanthus dichotomus* DC.
- Echium** L. (Boragineen, V. 1) „Natterkopf“, fr. *vipérine*, *herbe aux vipères*, e. *adder's-tongue* od. *viper's-bugloss* (*έχμιον* od. *έχθειον* Otternkraut — Stengel fleckig, *Wst.*, *Staubfäd.* wie Schlangenzungen vorstehend!), wild E. *vulgare* L., *Zier. creticum* L. (non *Pall.*) *canadischer N.*

Eclipta L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Fehlkrone“, Mehlblume D. (v. *ἐκλείπτουμαι* fehle — dem Samen fehlt Krone u. Flügel, Wtst.: *ἐκλείπω* lasse aus, *ἐκλείψις* Verfinsternung, n. Rumphius Auswurf d. Sonne bei Sonnenfinsternissen nach Ausleg. d. Malayen!), *E. erecta* L. (*Cotula* s. *Verbesina alba*), s. *Micrelimum asteroides* Forst.

1) **Edgeworthia** Falcon. (Myrsineen, V. 1) „Edgeworthie“ (n. d. engl. Novellistin Miss Mary Edgeworth, † 1849), z. B. *chrysantha* Falc. 2) **Edg.** Lindl., Meisn. (Thymeläeen, VIII. 1), s. *Daphne Gardneri* Wall.

Edraianthus DC. (Campanulaceen, V. 1) Büschelglocke Koch-Hallier (v. *ἐδραῖος* sitzend, *ἄνθος* — sitzende Blüt.), z. B. *pumila* DC. Zwerg-„Sitzblume“, *tenuifolius* u. *Kitaibelii* A. DC. (östr. Alp.).

1) **Edwardsia** Salisb. (-**wardia** Raf.) (Cassieen Sophoreen, X. 1) „Edwardsie“ (n. d. Bot. S. Edwards), *E. chilensis* Miers, s. *Sophora sericea* s. *macrocarpa* Sm., *E. microphylla* Sal. (Soph. micr. Ait.) etc. 2) **Edw.** Neck. (Compositen).

Eglanteria (sc. Rosa) L. (Rosaceen, XII. 5) gelbe Rose, fr. *églantine* (-tier), e. *églantine*, s. *Rosa lutea* J. Bauh. (v. d. franz. *églantier* Hunds- od. Heckenrose).

Ehrenbergia Mart., Spr. (Rutac. Zygophylleen, X. 1) „Ehrenberg's“ - od. brasil. Burzeldorn (s. d. Autoren), *E. tribuloides* Mart., s. *Tribulus brasiliensis* Hort.

1) **Ehretia** L. (Boragineen od. Hydrophylléen, V. 1) „Ehret's“-Wasserblatt (n. G. Dion. Ehret, arb. für Jussieu in Paris, † 1770 in Engl.), s. Hydrophyllum. — *Ehretiaceae* Mart. (zu Hydrophyllae R. Br.). 2) **Ehretia** W. (Ebenaceen, XXII. 6), *E. ferrera* W., s. *Ferreola* s. *Maba buxifolia* Kön.

1) **Ehrharta** Thb., Sm., Web. (Gräser, III. 2) Reis-Leersie, *E. clandestina* Web., s. *Leersia oryzoides* Sm., *E. capensis* Thb. etc. (n. d. schweiz. Bot. Ehrhart, Linné's Schüler). 2) **Ehrhardia** Scop. (Laurineen) (nach demselben!).

Eichleria (g. n.) (Oxalideen, X. 4) „Eichler's“-Sauerklee (n. d. Bot. A. W. Eichler), *E. (Oxalis) Blanchetiana* Moric.

Elaeagnaceae R. Br., -**nae** DC., -**ni** Juss. (zu *Proteaceae* Rchb.) Strand-dorngewächse, s. sogl.

Elaeagnus L. (Proteac. Elaeagneen, IV. 1) Oleaster od. Ölweide, s. g. wilder Ölbaum, fr. *olivier sauvage*, *olivétier*, auch *chalef*, e. *oleaster* (*olivaster*), wild olive-tree (gr. *ἐλαίωγος* Wtst. *ἐλαία* od. *-λαίη* Ölbaum u. *ἄγρος* (*Vitex Agnus castus*) geb. — Blätt. ähnl. denen des Keuschlamms!), Zier. *E. angustifolia* L. s. *hortensis* M.-B., fr. *daphnot* des Antilles, *E. argentea* Pursh (*macrophylla* Hort.) amerik. Silberbaum, fr. *chalef argenté*, e. *Missouri-silver-tree*.

Elaeis Jacq. (**Elaïs** L.) (Palmen, XXII. 6) „Ölpalme“, fr. *avoira*, e. *oily-palm* (*ἐλαῖς* v. *ἐλαιον* Öl), *E. guineensis* L. wahre, afrik. u. *E. guyanensis* P. Br. (Stuben).

Elaeocarpus L. (Tiliac. Elaeocarpeen, XI. 1) „Oliven“- od. „Ölfruchtbaum“, Ganiterbaum D., fr. *ganitre* (*ἐλαιον* Öl, *καρπός* Fr. — Ähnlichk. mit ein. Olive), *E. sylvestris* Poir., s. *Adenodum sylv.* Lour., *E. Perim-Kara* DC. malabar. Ganiterb. Leun. (El. *copallifer* Vahl s. *Vateria indica* Rheed.), s. *Craspedum* Lour.

Elaeoselinum Koch, DC. (Umbelliferen, V. 2) „Ölsilje“ (s. v. u. *Selinum* gr. *σέλινον* Silje).

Elaphomyces Nees (Bauchpilze, XXIV. 4) Hirschtrüffel, s. g. Hirschbrunst (*ἐλάφος* Hirsch, *μύκης* Pilz). — *Elaphomyces* Fr.

Elaphrium Jacq. (Amyrideen Burseraceen, VIII. 1) Leichtholz Leun. (*ἐλαφοός* gering — gering. spez. Gewicht), s. *Fagura Elaphrium* (zu *Amyris* Spr.) *Tacamahac*-Harzbaum.

- Eläte** Ait. (Palmen, XXI. 3) „Fichten“- od. „Tannen“-P. D., fr. *élate* (gr. *ἐλάτιη* Fichte), *E. sylvestris* L., s. g. wilder Dattelbaum D., s. Phoenix.
- Elaterium** Mch. (sc. Momordĕica) L. (sc. Ecballium C. Rich.) (Cucurbitac., XXI. 10) „Schleuder“- od. Spritzgurke, Esels-, Vexier-G., Igel- od. Hundskürbis, fr. momordique élastique, e. wild-squirting-cucumber, s. Ecballium agreste Rchb. s. Elaterium C. Rich. (*ἐλατιήρ* Treiber etc. — schleudert aufspringend d. Samen fort!).
- 1) **Elatine** L. (Lythrarieen, VIII. 4) „Tännel“, fr. *élatine* (*ἐλατινός* v. *ἐλάτιη* Fichte etc. — Ähnl. d. Pfl. damit!). — *Elatinĕae* Rchb., -tinacĕae Camb., Grĕk. (zu Lythrarieae Rchb.). — 2) **Elatine** (sc. Antirrhinum) L. (Scrophularineen, XIV. 2) Tännel-Löwenmaul.
- Elemifĕra** Plum. (sc. Amyris) L. (Terebinthaceen Amyrideen, VIII. 4) „Elemi“-Balsam, fr. *élémier*, e. elemy (elemi vaterl. Name d. Harzes u. fĕro trage), *E. racemosa* Plum., s. *Cornus racem.* Plum. u. *Isocariba* Marcgr.
- Eleochāris** Lestib. (nicht *Elaeoch.*) (Cyperaceen, III. 1) „Teichriet“, Riet Grĕk. (v. *ἐλος*, -*εος* Sumpf u. *ζάρις* Freude), s. *Scirpus* L. u. *Heleochāris* R. Br.
- Eleogiton** Lk. (Cyperaceen, III. 1) Flutsimse (s. eb. u. *γείτων* Nachbar etc.), *E. fluitans* Lk., s. *Scirpus* s. *Heleocharis fluit.* Hook.
- Elephantopus** Cass. (Compos. Segregaten, XIX. 5) „Elephantenfuss“, fr. *éléphantope*, pied d'éléphant (*ἐλεφας*, -*αντος*, *πους* Fuss — weg. d. Wurzelblätt.), *E. scaber* L.
- Elephantusia** W., Mart. (Pandaneen, XXII. 1) „Elephantenbaum“, fr. *éléphantusie* (s. eb., *ουσία* Wesen), *E. macrocarpa* Mart., s. g. vegetabil. Elfenbein, s. *Phytelephas* Rz. Pv.
- Elĕphas** T. (Scrophularineen, XIV. 2) Elephantenrüssel, Rüsselhelm, fr. *éléphas* (s. v. — lange Oberlippe!), *E. italica* T., *orientalis* T., s. *Rhinanthus Elephas* L., *orient. L.*, etc.
- Elettaria** Don, Maton (Amomeen od. Scitamineen I. 1) Cardamom-Ingwer (elettari, Nam. d. Pfl. auf Malabar), *E. Cardamomum* White echte Cardamomen (*Cardamomum minus*), *Cardamom-Alpinie*, s. *Amomum Cardamomum* L. (*Alpinia* C. autt.).
- Eleusine** Lam. (Gräser, III. 2) Hartgras (n. Eleusina, Stadt in Attika mit Cerestempel, Ceres od. Göttin d. Getreides!), *E. (s. Poa) dura* Scop., s. *Sclerochloa dura* P.-B., Zier. *E. coracana* Lam. ind. Kammergras od. Korakan (*Tocussa*).
- Eleutherococcus** Maxim. (Araliaceen, V. 5) Stachelbaum Lauch., „Freikorn“ (*ἐλεύθερος* frei, *κόκκος* Korn etc.), *E. senticosus* Max. (*Hedera* sent. Rupr.).
- Eleutherogynae** A. Rich. (sc. Monocotyledōnes Juss.) „Freiweibige“ (*γυνή* Weib, Stempel etc. — Fruchtknot. unverwachsen, frei!).
- 1) **Elichrysium** W. (**Helichr.** - G.) (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Strohblume, eig. „Sonnengold“ (v. *ἥλιος* Sonne, Wtst. v. *ἐλλίξω* od. *ἔλω* winde, rolle?, *χρῶς* Gold), Zier. *E. proliferum* W., spec. *tabile grandiflorum* Hort., purpurĕum, besond. aber orientale G. u. *bracteatum* W. s. g. Immortelle von Malmaison, *brachyrhynchum* Sond. (Austral.), wild *E. arenarium* DC. Sand-Immerschön. 2) **Elichr.** *aethiopicum* Pluk. (Rhamnac., V. 1), s. *Phyllica eriophora* Ait.
- Elisma** Buchenau (*Alismaceen*, VI. 5) Schwimm-Froschlöffel (v. *ἔλος* Sumpf — analog *Alisma*!), *E. natans* Buch. s. *Alisma nat.* L.
- Elleanthus** Presl (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Wickelblume“ (v. *ἔλλω* wickle ein, *ἄνθος* — d. Blüt. in Brakteen eingeschloss.), *E. liniifolius* Presl, s. *Isochilus* Lindl.
- 1) **Elodĕa** Rich., Mchx. (Elatineen, VIII. 4) Wasserquendel (*ἐλωδής*, -*εος* Sumpf liebend), *E. canadensis* Mchx. s. g. Wasserpest, s. Ana-

- chäris *Alsinastrum* Rich. u. *Tropperaria pestifera* autt. 2) **Elodëa** Ad., Chois. (-des Spach) (Hypericineen, XVIII. 3) Sumpf-Hartheu, *E. petiolata* u. *tubulosa* Pursh, *E. palustris* Spach, s. *Hypericum* *Elödes* L.
- Elödes** Spach (zu *Hypericum* L.) (Hypericineen, XVIII. 3) „Sumpf“-Hartheu, *E. palustris* Spach, s. *Hypericum* *Elödes* L. (vgl. eb.) (*ἑλωδης*, -εος Sumpf liebend).
- 1) **Elsholtzia** W. (*Elssholzia* Græk.) (Labiaten, XIV. 1) Kamm-Ysop (n. Joh. Sig. Elsholtz, schr. Fl. marchica, † 1688), *E. cristata* W. (Hyssöpus cr. W.), *E. ocimoides* W. (*Mentha* oc. Lam.). 2) **Elsholtzia** Rich. (Melaleuceaceen, XVIII. 2).
- Elsneria** Walp. (Umbelliferen, V. 2) „Elsner's“-Dolde (n. Mor. Elsner, s. d. Aut.).
- 1) **Eluteria** (sc. *Clutia*) L. (Euphorbiac., XXII. 14) „Wollhüllen“-Purgierstrauch (v. *ἑλύω* hülle ein, *ἕλιον* Wolle? — unbestimmt, vielleicht d. veränd. *Alaternus*!), s. *Croton* *Eluteria* Sw. (*Ricinus dulcis arborescens* Seb.). 2) **Elutheria** (bess. **Eluteria**) P. Br., arborica P. Br., s. *Guarea trichiloides* L. (Meliaceen, VIII. 1) = *Melia* *Guarea* Jacq.
- Elymus** L. (Gräser, III. 2) Haargras, fr. *elyme* (gr. *ἑλυμος* Fennich v. *ἑλύω* hülle ein — Blätt. zu grob. Flechtwerk), Zier. *E. arenarius* L., fr. *él. des sables*, e. sand-elymus, *E. Hystrix* L., s. *Asperella hystrix* Hb. (*Hystrix patula* Munch.).
- Embothrium** Forst. (Proteaceen, IV. 1) „Grübchen“-Anthere (v. *ἐν* in, *βοθρόν* dem. v. *βόθρος* Grube — d. Antheren in einer Grube d. Kelchblätt.), Gewächsh. *E. speciosissimum* Sm. (*Telopea* R. Br.) (Prachtstr. D.), *E. coccineum* Forst. (Südspitze Amerika's).
- Emërus** T. (sc. *Coronilla*) L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) Peltschen, Skorpion-Kronwicke, fr. *émërus*, *coronille-des-jardins*, e. scorpion-Senna-Coronilla (v. *ἡμερος* gezähmt — zahme, angenehme Pfl.), s. *Emërus* Mill.
- Emilia** Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Scharlach-Quastenkopf (n. Rousseau's *Emile* benannt?), Zier. *E. sagittata* DC. m. v. *aurantiaca* Hort. „Orangeköpfchen“, s. *Cacalia sonchifolia* Hort.
- Empetracëae** (-trëae) Nutt. (sc. *Rutaceae*) Rehb. (zu Ord. *Tricoccae* Bartl.) Rauschbeerartige, s. sogl.
- Empëtrum** L. (Rutac. *Empetraceen*, XXII. 3) Rausch- od. Krähenbeere, „Felsenstrauch“ D., fr. *camarine* od. *vaccinet*, e. *crack-berry* (gr. *ἐμπετρον* auf Felsboden wachs., *ἐν* u. *πέτρα*), *E. nigrum* L.
- 1) **Empüsa** Lindl. (Orchideen Malaxideen, XX. 1) „Gespenst“-O. (*ἐμπούσα* Gespenst, Popanz), *E. lancifolia* Ldl. (*Malaxis* l. Sw.), *paradoxa* Ldl., s. *Stelis racemosa* Sm. (*Bletia bicallosa* Don). 2) **Empüsa** Cohn (Insektenpilz, XXIV. 4) Fliegen tödter, -schimmelpilz.
- Empusaria** Rehb. f. (Orchid. Malaxid., XX. 1) = *Empusa* Lindl. (s. eb.).
- Enaleïda** Cass. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Wehrblume“ (*ἐν* in, *ἀλχη* od. -χίς Wehr, Kraft), *E. pilifera* Cass., *foeniculifolia* Cass. (*Tagëtes clandestina* Lag.).
- Enantioblastae** Endl., „Gegensprosser“ (*ἐναντίον* gegenüber, *βλαστὸς* Keim) i. q. *Juncacëae* Bartl.
- Enantiosparton** C. Koch (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Zwerg-Pfriemen (s. eb. u. *σπάρτος* Genst, lat. *Genista* od. *Spartium*), *E. radiatum* C. Koch (*Genista* rad. Scop., *Telinaria* r. Presl, *Cytisus* rad. Koch) (Südeur.).
- Encalypta** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Haubenmoos“, Glockenhut (*ἐγκαλύπτω* verhülle etc. — grosse Haubenglocke der Kapsel), *E. vulgaris* Schreb., etc., s. *Bryum* u. *Leersia*. — *Encalypta*cëae Schimp.

- Encephalartos** Lehm. (Cycadeen, XXII. 11) Brotpalme Leun., Sago- od. Kafferbrodbaum (*ἐν* in, *κεφαλή* Kopf, *ἄστος* Brot — in d. kopf- förm. Zapfen etc.!), *E. lanuginosa* Jacq. (*Zamia lan.* Thb.), *E. Hildebrandti* Lehm.
- Endiusa** Alfd. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Zitterlinse (v. *ἐνδιάω* wohne unt. freiem Himmel), *E. hirsuta* Alfd., s. *Ervum hirsutum* L. (*Vicia h.* Koch).
- Endivia** (sc. *Cichorium*) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Endivien“- Salat, Wegwarte, fr. u. e. *endive* (v. *ἐνδον* lat. in od. auf, via Weg — Wegwarte, Wtst. v. d. arab. *hendibeh*!).
- Endymion** Dumort. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Sternhyacinthe, Hasen- glöckchen Grck. (n. d. schön. Hirten Endymion, Myth.), Zier. *E. non scriptus* Grck. (*Agräphis nutans* Lk., *Hyacinthus n. scr.* L.).
- Ensatae** Endl., Rchb., DC., Bartl. Ord. d. Schwertlilien (Schwertelgew. Rchb.) (v. *ensis* Schwert).
- Ensete** (sc. *Musa*) Bruce (Scitamineen, VI. 1 od. XXIII. 1) äthiopische Banane (vaterl.!).
- Enteä** R. Br. (Tiliaceen, XIII. 1) „Schönlinde“ (v. *ἐντελή* vollkommen — schönes Aussehen, Wtst.).
- Entolōma** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Krummrand“, Schleierpilz Kumm. (*ἐντὸς* einwärts, *λωμα* Rand — dies. einwärts gekrümmt!), *E. rhodopolium* „Rosenpilz“ (*δόδος* Rose, *πώλεομαι* bewohne).
- Epacridæae** R. Br., DC. (zu Plantaginæae Rchb.) Bergheiden (zu Ord. Ericinæae Bartl.) (s. sogl.).
- Epäcris** Forst., Sm. (Plantagineen od. Epacrideen, V. 1) Fels- od. Berg- heide, Felsbusch Rmpl. (*ἐπί* auf, *ἄκρος* Bergspitze — Standort in Neuseeland), Zier. *E. grandiflora* W., *purpurascens* R. Br., *impressa* Lab., etc., s. *Dracophyllum* Lab.
- Ephēdra** L. (Gnetaceen, XXII. 13) Pferdeschwanz, Meerträubel Rmpl., fr. raisin de mer od. uvette, e. mangrove-grape (gr. *ἐφεδρα* (-ος) daraufsetzend — an Felsen klimmend), Zier. *E. vulgaris* Rich., mono- u. *distachya* L., *media* C. A. Mey.
- 1) **Ephemērum** Hampe, Schreb. (Moose, XXIV. 2) „Tag“- od. „Eintags“- Moos (*ἐφήμερος* auf einen Tag, v. *ἐπί* u. *ἡμέρα* — d. Moos dauert nicht lang). 2) **Ephemērum** Rchb. (zu *Lysimachia* L., Murr.) (Pri- mulaceen, V. 1) Wald- od. „Eintags“-*Lysimachie*, *E. (Lys.) nemorum* L. 3) **Ephemērum** T., Moris. (Commelyneen, VI. 1) virginische Tradescantie, *E. phalangoides* Moris. = *Tradescantia virginica* L. (tägl. eine neue Blume!), *E. bengalense* Pluk. bengal. Commelyne, s. *Commelina* L.
- Ephippium** Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schabracken“-O. (*ἐπίπ- πιον* Pferdedecke v. *ἐπί* u. *ἵππος* — Labell wie ein Pferdesattel ge- formt), *E. lepidum* u. *cornutum* Blum.
- Epichäris** Blum. (Hesperid. Meliaceen, X. 1) „Reiz“-, Paradies- od. Pater- nosterbaum (*ἐπιχάρεις* reizend — schön. ansehnl. Baum), *E. sericea* Blum. etc., s. *Guarëa* Spr.
- Epidendron (-um)** L. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Baumwurzler“, -orche (*ἐπί* auf, *δένδρον* B. — wurzeln od. schmarotzen auf Bäumen!), *E. aromaticum* s. *Vanilla* autt. (*Vanilla arom.* W.) „Vanille“. — *Epi- dendræae* Juss. Baumorchen, z. B. *Cattleya*, *Laelia*, *Epid.* etc. 2) **Epi- dendrum** (sc. *Lycoperdon*) L. (Bauchpilze, XXIV. 4) Baum-Blutmilch Kumm., s. *Lycogala* *Epid.* Mchx.
- Epigaea** L. (Ericac. Rhodoreen od. Melastomaceen, VIII. 1 od. X. 1) „Erd- primel“, Grundstrauch (*ἐπί* u. *γῆ* od. *γαία* Erde — kriecht etc.), Zier. *E. repens* L. kriechendes Immergrün, s. *Memecylon* L., *Mitch.*, *E. cordifolia* L., s. *Gaultheria sphagnicola*, etc.

- Epigynia** Juss., „Oberstempelige“ — mit oben, d. h. auf d. Blumenboden stehend. St. (ἐπί u. γυνή).
- Epilinum** Weihe (sc. Cuscūta) L. (Convolvulac. Cuscuteen, V. 2) Flachs-seide Grck. (ἐπί u. Līnum gr. λίνον Lein od. Flachs).
- Epilobium** L. (Onagrarien, VIII. 1) Weidenröschen, Schotenweiderich, Eberich O. W., fr. épilobe, herbe de St. Antoine, e. loose-strife, willow-herb (ἐπί od. λοβίον Hülschen od. Schote — Blüt. auf lang. schotenförm. Fruchtkelch), Zier. E. spicatum Lam. s. angustifolium L. (Chamaenerion speciosum Lodd.), fr. osier-fleuri, e. spiked-willow-herb m. v. fl. albo Hort., E. rosmarinifolium Hänke (angustifol. Lam.), fr. épil. à feuilles de Rosmarin, e. rosemary-leaved w.-h., Ufer: E. hirsutum L., fr. ép. rose, -velue od. -hérissé.
- Epimedium** L. (Papaverac. od. Berberideen, IV. 1) „Nick“- od. Sockenblume Rümpl., Nickvierblatt, fr. épimède, e. barren-wort (v. ἐπι-μύδομαι sinne nach — mit gesenkt. Kopf! Wtst.: ἐπί u. μύδιον in Medien wachsend, n. Dioscor.), Zier. E. macranthum Morr., Descn. u. violacæum Morr., Decsn. (Topf), E. alpinum L., e. alpine barr.-w., E. diphyllum Grah. (Aceranthus d. Morr., Decsn.).
- 1) **Epipactis** Rich., Hall. (Orchid. Neottien, XX. 1) Sumpfwurzel, -orche, Sitter O. W. (gr. ἐπιπακτις von ἐπιπακτώω schliesse zu, Pfl. sonst ἐλλεβορόνη), E. palustris u. Helleborine Crantz. 2) **Epipactis** (sc. Dondia) Spr. (Umbelliferen, V. 2) grüne Dondie Spr., s. Astrantia Epip. L. f. (v. ἐπιπήγνυμι mache gerinnen — näml. Milch, Wtst. v. ἐπι-σπάω ziehe heraus — d. Wurzel bei d. Alten als Fontanel od. Haar-seil, näml. diej. von d. ähnl. Hellebörus albus (Veratrum album), was Haller mit d. ähnl. Epipactis andeuten wollte).
- Epipetalia** Juss., „Oberkronblättrige“ — mit oberständ. Kron- od. Blumenblättern (ἐπί u. πέταλον).
- Epiphyllum** Herm., Haw. (zu Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Blattcactus“, Ast- od. Stutzblatt-C. (ἐπί u. φύλλον Laub — Blume auf d. Blatt sitzend), Zier. (Stuben, Topf) E. portulacifolium (stumpfkeilblättr.), truncatum Haw. (gestutzt), violacæum u. violac. superbum, Altensteinii Pfeiff. s. truncat. multiflorum, etc., s. Cactus Phyllanthus L. u. Phyllocactus Lk.
- Epipogium** Gm. (-pōgon R. Br.) (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Bartlippchen, „Aufbart“, Bananen-O. (ἐπί u. πόγων Bart — bez. d. büschelfas. Wurzel), E. aphyllum Gm., s. Satyrium Epipogium L. (Limodōrum Epip. Sw.).
- Epistaminia** Juss. mit oberständigen Staubgefässen (ἐπί u. stamen, -inis Staubgefäss).
- Epithymum** (sc. Cuscūta) L. (Convolvulac. Cuscuteen, IV. 2) „Quendelseide“ (ἐπί u. Thymus Thymian od. Quendel).
- Equisetum** L. (Equisetaceen, XXIV. 1) Schaft- od. Schachtelhalm, Gliederfaru, Kannenkraut, eig. „Pferdeborste“, fr. prèle od. asprèle, e. horse-tail od. shave-grass (v. equus Pferd, seta Borste). — Equisetacæe DC., Rchb. Kl., Ord. od. Fam. d. Schafthalme.
- Eragrostis** P.-B. (zu Poa L.) Rchb. (Gräser, III. 2) „Liebesgras“, Flittergras O. W. (v. Ἔρωσ od. ἐρὸς Liebe, ἀγρωσις Feldgras, Wtst. ἐρὸς sehr, Partikel der Verstärkung! — vielblüt. Ährchen zu einer gross. Rispe vereinigt), Bouquetgr. E. major Host, minor Host s. poaeformis Lk. (Poa Eragrostis L.).
- Eranthemum** R. Br. (zu Ruellia) Rchb. (Acanthaceen, II. 1) „Erdblume“, Menderle D. (v. ἔρα od. ἦρα Erde, Wtst. ἐρὸς sehr, s. eb., ἀνθεμον i. q. ἀνθος — schöne zahlr. Blüten!), Warmh. E. sanguinolentum Hort. (Hypoestes Hook.) (rotader. Blattpfl. d. Warmh.), igneum Hort. (Chamaeranthemum Nees), leuconeum Hort., etc.

- Eranthis** Salisb. (zu Hellebörus) Rchb. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Winterblume“ od. Winterling, *E. hiemalis* Sal., fr. *eranthé* u. *helléborine* od. *Anémone Aconite* des Hollandois, e. *common winter-aconite* (v. ἤρι früh od. ἔαρ Frühling, ἄριστος Bl. — blüht frühzeitig!), s. *Hellebörus hiemalis* L. „Wintersturmhut“ Rmpl.
- Eremostachys** L. (Labiatae, XIV. 1) „Einzelähre“ (v. ἔρημος einsam, leer, στάχυς Ähre — hat nur eine od. wenige quirl. Blütenähren), Zier. *E. laciniata* Bunge (*Phlomis* l. L.), fr. *phlomide laciniée*, *E. iberica* Fisch., Mey. (*Phlomis* ib. L.), fr. *phlomide du Caucase* od. d'Ibérie.
- Eria** Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Woll“-O. (ἔριον Baumwolle, Wolle — auss. woll. Blüten), *E. rosea* Ldl. (*Octomeria* r. Ldl.) etc.
- Erianthus** Rich., P.-B. (Gräser, III. 2), *E. Ravennae* Rich. „Ravennagrass“, -zuckergr., eig. „Wollblütgras“, fr. *érianthe* od. *canne de Ravenne*, e. *Ravenna-sugar-grass* (*E. saccharoides* Mchx.), s. *Saccharum giganteum* Pers. u. *Andropogon Ravennae* W. (ἔριον Baumwolle, ἄριστος Blüte — einblüt. Ährchen in Seidenwolle gewickelt), *E. japonicus* P.-B. (*Saccharum* jap. Thb., Obanna Kämpf.).
- Erica** (nicht *Erica*) L. (Ericaceen, VIII. 1) Heide, Glocken- od. Schnabelheide Leun., fr. *bruyère*, e. *heath* (gr. ἑρίκη od. ἑοείκη Diosc. — viell. ἑοείκη breche, „Brüchling“? Leun. Wtst.), Töpf: *E. herbacea* L., *Gewächsh.*: *E. cylindrica* Wendl., *propendens* Andr., *ventricosa* Thb. m. v. *elegans*, *coccinea* etc., *speciosa* Andr. etc., *Waldheiden* *E. vulgaris* L., s. *Calluna* Salisb. — *Ericaceae* DC., Rchb., Kltzsch., Endl., -ceae R. Br.
- Ericinæe** DC., Bartl., Leun. Ord. d. Heideartigen Bartl.
- Erigeron** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Dürrewurz, Flöh- od. Berufskraut (Berufungskr. Vilm.), eig. „Früh“- od. „Baldgreis“, „Altmannskr.“ Dietr., fr. *erigeron*, e. *flea-bane* (v. ἤρι früh u. γέρον Greis — gleich an d. Blüt. weiss. Pappus!), Zier. *E. alpinum* L. u. *grandiflorum* Hort., *E. speciosum* DC. (*Stenactis spec.* Lindl.), e. *showy fl.-b.*, *E. glabellum* Nutt. (Nordamer.), e. *smootish fl.-b.*, *Feldunkr.* *E. canadense* L., s. g. *Franzosenkraut*.
- 1) **Erinus** L. (Scrophularineen, XIV. 2) *Alpen-Leberbalsam* Rmpl., *E. alpinus* L., fr. *érine des Alpes*, e. *alpine liver-balsam* m. v. *fol. hirsutis* Hort. s. *hispanicus* Boiss. (gr. ἑρινός, ἡ eine Pfl., ὁ lat. *caprificus* wild. Feigenbaum, v. ἔριον Baumwolle? — unbek.). 2) **Erinus** (sc. *Lobelia*) L. (Lobeliaceen, XIX. 6) (langäst. Ampelpflanze). 3) **Erinus** (sc. *Campanula*) L. (Campanulaceen, V. 1) *kleinkronige Glockenbl.*
- Eriobotrya** Lindl. (Pomaceen, XII. 4) „Wolltrauben“-Mispel, japan. *Wollmispel*, *E. japonica* Ldl., s. *Mespilus Cuila* Buchan. u. *japonica* Thb. (ἔριον Wolle, βότρυς Traube).
- Eriocaulon** L. (Commelyneen od. Restiaceen, III. 3) „Wollstengel“, *Eckhalm* D., fr. *joncinnelle* (ἔριον Wolle, *zanlōs* Stengel), *E. decangulare* L., s. *Nasmythia articulata* Huds. (*Randalia americana* Petiv.), *quinquangulare* L. (*Scabiosa graminæa* Pluk.), *E. spadicum* s. *Schoenus spad.*, etc. — *Eriocaulonæe* Endl.
- Eriocnema** Naud. (Melastomaceen, X. 1) „Wollschiene“ (s. v., *σνήμη* Bein, *Schienbein* etc.), *E. aenea* marmoræa Van Houtt., s. *Bertolonia* Raddi.
- Eriodendron** DC. (Malvaceen od. Sterculiaceen, XVI. 8) „Wollenbaum“ (s. v., *δένδρον* B.), *E. pentandrum* DC., s. *Bombax pentandrum* L.
- Eriophorum** L. (Juncaceen od. Cyperaceen, III. 1) *Woll-* od. *Dungras*, *Binsenseide*, *Wiesenwolle* Leun., fr. *porte-laine*, *laine des près* (- des marais) u. *linaigrette*, e. *eud-wort* (-weed), *cotton-weed* (s. v., *φορός* tragend).

- Eriopōgon** Endl. (Gramineen, III. 2) (zu Saccharum) „Wollbart“ (s. v., *πώγων* Bart — d. Ährch. seidenhaar. mit in eine Röhre verwachs. Schuppen).
- Eriopsis** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Wollorchisähnliche“ (Eria Ldl. u. *ὄψις* Ansehen), E. bilōba Ldl. (Columbien).
- 1) **Eriostēmon** Pers., Sm. (Rutac. Diosmeen, X. 1) „Wollfaden“-Raute (s. v., *στῆμων*, lat. stamen Staubfaden), *Gewächsh. E. buxifolium, cuspidatum, linifolium, pulchellum* (Diosma pulchella L., Hartogia p. L.), E. squamēum Lab. (Phebalium squamulosum Vent.) (Neuholl.), E. capense Pers. s. Diosma s. Okea uniflōra L. 2) **Eriostēmum** Collad. (Tiliaceen, XI. 1), s. *Elaeocarpus reticulatus*. 3) **Eriostēmon** Less. (Compositen) (— Antheren mit wollwimper. Schwänzen, Wtst.).
- Erithālis** P. Br. (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Grünchina, Lederkrapp Leun., Balsamstrauch (*ἑριθαλῆς* od. -ῆς v. *ἑρὶ* sehr, *θάλλω* grüne — tiefgrüne Blätt.), E. odorifera P. Br., s. *Amýris balsamifera* L., E. polygāma Forst, s. *Timonius* Rumph.
- Erodēa** Sm. (Cinchonac. Coffeaceen, IV. 1) „Vielast“-Chinastr., „Ästling“ D., westind. Citronenholz, s. g. *Hisparilla* (v. *ἑρωδῆς* voller Äste od. Zweige — sehr buschige Pfl.), E. montana Sm. (Putoria Pers. *Pavetta foetidissima* Cyrill.), auch s. *Knoxia litoralis* P. Br. u. *Thymelaea* Sloan.
- Erodium** l'Hér. (Geraniaceen, XVI. 2) „Reiherschnabel“, e. heron's-bill (v. *ἑρωδῖος* Reiher — langschnäbl. Kapsel!), Garten E. alpinum l'Hér., *petraeum, Manescavi Boubani* (Pyren.), e. *Manescaut's h.-b.* u. *moschatum* l'Hér. (*Geranium* m. L.) bisamduftend. R., e. *musk-h.-b.*, Unkraut E. *cicutarium* l'Hér., s. *Geranium* sect. *Erodium* L.-Pers.
- Erophila** DC. (zu *Draba*) Rchb. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Frühlings-Hungerblümchen (*ἔρως* Liebe, Hunger, *φίλη* Freundin, Wtst. *ἔρως* i. q. *ἔριον* Wolle — Stengel unt. u. Blätt. weiss behaart), E. (*Draba*) *verna* L.
- Eruca** T. (sc. Brassica), L. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) Rauke, Runke M.-Rchb., fr. roquette, e. rocket-gentle, E. sativa Lam. i. q. Brass. Er. L. (*eruca* Plin. wilder Kohl), E. erecta Lag., s. *Brassica Tournefortii* DC.
- Eruca**gō T., Hornem. (sc. Bunias) L. (Crucifer. Lomentac., XV. 2) senfblättr. Zackenschote, E. runcinata Hornem., fr. *erucage* u. roquette des champs Stachel-Meersenf, Bauernsenf (s. eb.).
- Erucaria** G. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Raukensenf“ (s. v.), s. *Sināpis, Cordylocarpus* u. *Brassica*.
- Erucastrum** Presl (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Hundsrauke“, Wegkohl, Remppe M.-Rchb., fr. roquette, e. rocket (deter. v. *Eruca*, Wtst. *Eruca* u. *astrum* Stern od. Bild), E. inodōrum J. Bauh. s. *Pollichii* Spenn. (*Sisymbrium gallicum* W.), s. *Eruca Erucastrum* Fl. Wett.
- Ervilia** Lk. (zu *Ervum*) Rchb. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) Rosswicke, Feldlinse (*Ervilia* Plin. = *Lathýrus Cicera* L.), E. sativa Lk., s. *Vicia Ervilia* L., W. knotenfrüchtige Erve Grck., fr. *gerousse*, e. ers.
- Ervum** L. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) „Erve“ od. Erbse, Linse, fr. ers od. *gerousse* (E. *hirsutum* L.), e. ers od. *strangle-tare* (-weed) „Würg-Lolch“ (v. d. celt. erw d. i. gebautes Land, lat. *arvum*), E. *Lenticula* Schreb., E. *hirsutum* L. Zitterlinse, s. *Endiusa hirsuta* Alfd. (*Vicia* h. Koch).
- Eryngium** T. (Umbellifer. Saniculeen, V. 2) Mannstreu, Brackdistel, fr. *érynge* od. *panicaut* (chardon Roland, - à cent-têtes), e. *eringo, sea-holly* (-holm), *share-* od. *fever-wood* (gr. *ἐρύγγιον* od. *ἐρύγγιον* Distelart, n. Paxt. u. Wtst. v. *ἑρύγω* rülpse, breche mich), Zier. E.

alpīnum L., bromeliaefolium L., pandanifolium, amethystinum L. etc., wild E. campestre L. s. g. Brackdistel.

Erysibe Rebut. (-īphe Hedw.) (Schimmelpilze, XXIV. 4) Mehltau, fr. érysiphe u. tétoron „Sauger“, e. mil-dew (gr. ἐρυσίβη rotpulv. Mehltau v. ἐρυσθρός rot od. ἐρυσίπελας Hautentzündung), s. Alphitomorpha Wallr.

Erysimum G., L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) Schotendotter Grck., Hederich Seub., Schoterich O. W., fr. érysime, tortelle, vélar u. giroflée, e. hedge-mustard (E. Alliaria L.), Zier. E. Petrowskianum Fisch., Mey., fr. giroflée de Petrowski, Marshallianum Andrez., Barbarea L. v. fl. pl. Hort. u. fol. varieg. (gr. ἐρύσιμον, lat. irio, Wtst. v. ἐρύω rette — bez. d. Heilkräfte).

Erythraea Rich. (Gentianeen, V. 1) Rosen-Enzian, Tausendguldenkraut, fr. fiel-de-terre, e. centaury, E. Centaureum Pers. (Gentiana Cent. L.) (ἐρυθραῖος rötlich).

1) **Erythrina** L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Scharlachblume“, Korallenbaum Rümpl., fr. érythrine (ἐρυθρός rot), Zier. E. crista galli L., fr. crête de coq, E. Corallodendron L. m. v. orientalis Murr. Korallen- od. Kondoriholz, C. herbacea L. (Florida), E. speciosa Andr., etc. 2) **Erythrina** (sc. Piscidia) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Fischtöter.

Erythronium L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Hundszahn, Zahn- od. Rotlilie, Rotwurz (s. v.), Winter-Zier. E. dens canis L., fr. dent de chien, e. dog's-tooth-Violet.

1) **Erythroxylon** L. (Malpighiac. od. Violac. Sauvageseen, X. 3) „Rotholz“ (s. v., ξύλον Holz), E. Coca Lam., Cocastr., Rmpl. Kaublatzbaum, s. Sethia St. Hil. 2) **Er.** (sc. Rhamnus) Pall. (Rhamnac., V. 1) „Rotholzdom“, fr. nerprun à bois rouge, e. red-wooded buskthorn.

Escallonia Mut., Sm. (Ribesiaceen Escalloniaceen od. Saxifrageen, V. 1) „Escallonie“ (n. d. Entdecker Escallon in Neugranada), Gewächsh. E. floribunda Hb., macrantha Arn. u. rubra Pers. — Escalloniaceae R. Br. (zu Ribesiaceae Rchb.).

Eschscholtzia (-zia) Cham. (Papaverac., XIII. 1) „Eschscholtzie“ (n. d. Nat. J. Fr. Eschscholtz in Dorpat, † 1831), E. californica Cham. (Chryseis cal. Lindl.) m. v. leucantha Hort. (calophylla Hort.), fr. globe du soleil, E. de Californie, tenuifolia Benth., crocea Benth. m. v. v. (rosä, striata etc.).

1) **Esculus** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) „Speise“-Eiche (v. esca Speise). 2) **Esculus**, s. Aesculus L. Rosskastanie, s. d.

Esmarchia Rchb. (Asteraceen, X. 4) „Esmarch's“-Hornkraut, E. cerasioides Rchb., s. Cerastium tetrandrum Curt. (n. d. Bot. Ant. Esmarch, schr. Fl. v. Schleswig u. üb. Gräser, Lpz. 1797).

Ethulia L., Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Sittenheil“?, fr. éthulie (v. ἠθούς od. ἔθος Sitte u. οὐλίος heilend, Wtst. ἐσθής Kleid, οὐλός weich, kraus od. αἴθω brenne, οὐλόος gefährlich), Zier. E. corymbosa Cass. angustifolia Boj., divaricata L. (Chrysanthemum bengalense Pluk.).

Euazalea Planch. (zu Azalä L.) (Ericaceen, V. 1) „Schön-Azalee“ (εὖ wohl, schön etc.), z. B. A. pontica, daurica etc.

Eucalyptus Lab. l'Hér. (Myrtaceen, XII. 1) „Schönmützenbaum“, „Schönhaube“, neuholl. Gummibaum, fr. eucalypte (-lipte), Zier. E. globulus Lab. s. glauca DC. Fieberbaum, Fieberheil, robusta l'Hér. austral. Eisenholzb. (Eisen-Veilchenbaum, blauer od. roter Gummib.), E. resinifera Lab., Kinobaum (εὖ- u. καλυπτός verhüllt — beim Aufblühen abfall. Haube, wie bei Calyptanthus, Wtst.).

- Eucharidium** Fisch., Mey. (Onagrariaceen, IV. 1) „Reiznarzissenähnliche“ (s. sogl. u. *εἰδομαί* gleiche — angen. rosablüh. Pfl. Wtst.), Garten *E. concinnum* F. u. M., fr. Euch. élégant, *E. grandiflorum* F. M. m. v. v.
- Euchäris** Planch. (Amaryllideen, VI. 1) „Reiz“- od. Grazien-Narzisse (*εὐχαρίς* angenehm etc.), Zier. *E. amazonica* Lind.
- Euchlaena** Schrad. (Gräser, III. 2) Guatemalagrass, s. g. Teosinte, eig. „Schönmantel“ (*εὐ* u. *γλαίνα* Oberkleid — d. Blüt. betr.), *E. gigantéa* Schrad. (als Futter geb. trop. Gras), s. *Panicum* L. u. *Reana luxurians* Brign.
- Euclidium** R. Br. (Cruciferen Nucamentaceen, XV. 2) „Schönschlösschen“ (v. *εὐκλείς* wohlverschlossen — sehr deutl. Schotennähte! — *εὐ* u. *κλείδιον* Schlösschen!), *E. rostratum* R. Br., s. *Myagrum* r. Scop. „Schnabeldotter“, *E. syriacum* R. Br. (*Soria* syr. Desv.), s. *Anastatica* syr. Jacq. (*Bunias* syr. G.) „syrische Jerichorose“.
- Eucide** Zucc. (Loasaceen, XIII. 1) „Schönnessel“, Langfaden (*εὐ* u. *κίδη* Nessel), Stuben *E. bartonioides* Zucc., s. *Microsperma* bart. Walp.
- Eucömis** L., l'Hér. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Schopflilie“, fr. eucomide (*εὐ* u. *κόμη* Schopf etc. — an d. Spitze d. Blütentraube ein Blattbüschel!), Zier. *E. punctata* l'Hér., fr. basilée ponctuée, e. dotted Euc., s. *Basilaea* p. Juss., Topf *E. regia* Ait., *undulata* ds., etc.
- Eudianthe** Rehb. (Sileneen, X. 4) „Schön-Lichtnelke“, s. *Lychnis* L. (*εὐ* u. *Dianthe* i. e. *Διὸς ἄνθη* Zeus-Blume, Wtst. *εὐδιδὸς* schön u. *ἄνθη*, zu *Lychnis* — schönrote Bl.!), *E. coeli-rosa* u. *laeta* A. Br. (Lychn. coel.-ros. Desr. s. *Agrostemma coeli rosa* L.).
- Eugenia** L. (Myrtaceen, XII. 1) Gewürznäglein, -nelkenbaum, Jambusenbaum u. s. f. (n. d. Prinzen Eugen v. Savoyen, Gönn. d. Bot., † 1736), *E. Jambos* L., *E. sinemariensis*, fr. maripou, Warmh. *E. Ugni* Hb. (Chili), *Michelii* Lam., s. g. Cayennekirsche, *brasilienis* L., *E. caryophyllata* Thb., s. *Caryophyllus aromaticus* L.
- Eulalia** Kth. (Gräser, XXIII. 1) „Eulalie“ (N. pr. v. *εὐλαλος* beredt), Zier. *E. japonica* Kth., s. *Andropogon*.
- 1) **Euosma** W. (-*mia* H. B. K.) (Rubiaceen, IV. 1) „Wohlduftstrauch“ (*εὐ* u. *ὄσμη* Duft etc.), s. *Evosmia* s. *O'Higginsia* (*Higginsia*) Rz. Pv. 2) **Euosma** Andr. (Gentianeen, V. 1).
- Eupatoria** (sc. *Agrimonia*) L. (Rosaceen, XI. 2) gem. Odermennig (s. sogl.).
- Eupatorium** T. (Composit. Eupatorineen, XIX. 1) Wasserhanf, -dost, Ottig O. W., Kunigundenkraut etc. (gr. *εὐπατόριον* Pfl. nach Mithridates *Eupator*, d. Kön. v. Pontus, † 64 v. Chr.), *E. cannabinum* L., fr. langue de chat, herb de Ste. Cunegonde, eupatoire d'Avicenne u. cornuet, e. water-hemp, eupatory, hemp-agrimony, sweet-maudlin (-mawlin), Zier. (Winter): *E. guatimalense*, *purpureum* L., *aromaticum* L., *ageratoides* L., etc. — *Eupatoriaceae* Rich., -*iacéae* DC., -*riñae* Rehb.
- Euphorbia** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) Wolfsmilch, Hundsmilch, fr. euphorbe, lait-de-loup, e. milk-weed, sea-lettice, spurge, wolf's-milk (v. *εὐφόροβιον* milchendes Stachelgew. in Afrika, Plinius: nach *Euphorbus*, Leibarzt d. Königs Juba, ben.), s. *Tithymalus* T., z. B. *E. Esula* L., fr. észule „Eselsmilch“, laitue de chèvre „Ziegenmilch“, *Gerardiana* Jacq., *Cyprisias* L. „Cypressen“-W., *palustris* L., Zier. *E. variegata* Sims, Stuben *E. jacquiniaeflora* Hort. (scharl. Winterbl.), *splendens* Boj., *fulgens* Karw., etc. — *Euphorbiaceae* Kltzsch., Grck., -*biaceae* (sc. *Rutaceae*) Rehb. (zu Ord. *Tricoccae* Bartl.).
- Euphrasia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) Augentrost, fr. euphrasie, e. euphrasy (gr. *εὐφρασία* Frohsinn etc. — für ein wirks. Augenmittel

gehalten! Leun., Wtst.), *E. officinalis* L., fr. langéole od. lumenet, e. euphrasy u. eye-bright.

Eurya Thunb. (Theac. Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Weitaststrauch“ D. (v. *εὐρύς* weit, breit — bez. d. Äste!), *E. japonica* s. Macartnei Champ., s. Fisakaki Kämpf.

Euryale Salisb. (Nymphaeaceen, XIII. 1) Dorn-Nymphäe (n. Euryale, e. d. Gorgonen, Myth., nicht Wtst. *εὐρύαλος* breit — sehr grossblättr.), *E. ferox* Sal. (— Dornen d. Blattunterseite!), s. *Anneslea spinosa* Andr.

Eurybia Cass. (zu Aster Rchb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Weithinmächtige“, „Allgewaltige“ (*εὐρύβης* weit u. breit mächtig, *εὐρύς* u. *βία* Gewalt), Zier. *E. corymbosa* Cass., Gewächsh. glandulosa u. lyrata DC., Gart. argophylla Cass., „weissblättr.“

Eutaxia R. Br. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Schönreih“-Cäsalpinie (*εὐτάξια* schöne Reihe — steife, einfache gegenständ. Blätt.), s. Dillwynia Sm.

Euterpe G., Mart. (Palmen, XXI. 8) Kohlpalme, Pallisadenpalme Leun. (Euterpe, eine d. Musen, od. v. *εὐτερπέης* wohlfeil — Wtst. stattlich. Ansehen!), *E. oleracæa* Mart. (*Aræca* ol. L.) u. *edulis* Mart.

Eutœa R. Br. (Hydrophylléen, V. 1) „Vielblumenkraut“, fr. Eutoque (*εὐτοκος* fruchtbar im Gebären — jede Placenta m. zahlr. Eiern), *E. multiflora* R. Br., s. *Cosmanthus mult.* Dougl., Gart. *E. Wrangeliana* Fisch., Mey., *Menziesii* R. Br. u. *viscida* Benth. (Cosmanth. visc. A. DC.) „Klebglocke“, fr. *Eut. viscida*, etc., s. *Hydrophyllum* u. *Polemonium*.

Euulmus C. Koch (zu *Ulmus* L.) (Urticac. Ulmaceen, V. 2) „Schönrüster“ (*εὐ* u. *Ulmus*), z. B. *campestris* L.

Euvicia Endl. (zu *Vicia* L.) (Legumin. Vicien, XVII. 4) „Schönwicke“ (*εὐ* u. *Vicia*), z. B. *Cracca* L., *angustifolia* All.

Euvitis Endl. (zu *Vitis* L.) (Ampelideen, V. 1) „Schönrebe“ (*εὐ* u. *Vitis*), z. B. *vinifera* L., *Labrusca* L., etc.

Euxölus Moq.-Tand. (Amarantaceen, XXI. 5) Spinat-Amarant (*εὐ*, *euxinus* wirtbar u. ölus, -ëris Küchenkraut!), *E. viridis* M.-T., s. *Albersia* Blitum Kth. (*Amarantus* Bl. L.).

Evax G., DC. (Composit. Gnaphalieen, XIX. 2) Schimmel- od. Fadenkraut, s. *Filago* T. (v. *εὐάξος* zerbrechlich? n. Plinius v. *Evax*, arab. König zu Nero's Zeit), *E. pygmaea* Desf. s. *umbellata* G., s. *Micröpus* pygm. Desf.

Evodia Forst. (Rutaceen, IV. 1) „Wohlduft“-Raute (*εὐώδης* wohlriechend), z. B. *elaeodendroides* Bak., *hortensis* Forst. (*Fagara Evodia* L.), *E. febrifuga* St. Hil. (*Esenbeckia* f. St. Hil.) brasil. China- od. Fieberrinde.

Evolvulus L. (Convolvulaceen, V. 1) „Aufwickelwinde“ (v. *evolvo* wickle auseinander — nied. kriechende Kräuter!).

Evonymus T., L. (Celastraceen, V. 1) Spindel- od. Spillbaum, Pfefferriesel, s. g. Pfaffenhütchen, fr. *fusain* od. *garais* (*garas*), *bonnet de prêtre*, e. spindle-tree, butonic u. prick-wood (gr. *εὐώνυμος* von gutem Namen), *E. europaeus* L. (*vulgaris* Mill.) m. v. v., Zier. *E. japonicus* Thb. m. v. v. (*macrophyllus*, *aureo-maculatus*, *aureo-marginatus* Hort.), etc.

Evosmia H. B. K. (-osma W.) (Rubiaceen, IV. 1) „Wohlgeruchstr.“ (*εὐ* u. *ὄσμη*) Duft, z. B. *caripensis* Hb. Bpl., s. *O'Higginsia* Spr. (vgl. *Euosma* W.).

Ewyckia Blum. (Lythraceen, XI. 1) „Ewyckie“ (n. Van Ewyck, e. holländ. Gelehrten).

Exäcum L. (Gentianeen, IV. 1) Bitterblatt (v. *ex aus*, ago treibe — Mittel geg. Gift!), *E. filiforme* W. (*Cicendia* fil. Delarbre), *E. aphyllum* Jacq. (*Lita* aph. Dietr.), *albens* s. *pedunculatum* L., etc.

- Excoecaria** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XXII. 3) „Blind“- od. „Blendebaum“ (v. excoeco mache blind — Wirk. d. Milchsafts in die Augen), E. Agallocha L. (Arbor excoecans Rumph.).
- Exidia** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Lappenpilz, Hollunderschwamm, s. g. Judasohr, E. Auricula Judae (v. ἐξιδίω schwitze aus — weg. d. Sporangien), s. Tremella L.
- Exoascus** Fuckel (Pilze, XXIV. 4) „Aussenschlauch“, Zwetschtaschenpilz (ἐξω hinaus, ἀσχός Schlauch — d. Mycel dringt bis in d. Zweige des Baums).
- Exochorda** Lindl. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) Hartschalfrucht-Spiräe (ἐξω aussen, χορδή lat. chorda Darmsaite — bez. d. knorpeligen Frucht!), Zier. E. grandiflora Lindl. (Spiraea gr. Hort.).
- Exostemma** Hayne, DC. (richt. -stema Pers., H. B. K.) (Cinchonaceen, V. 1) „Aussenfaden“ (ἐξω s. v. u. στήμων lat. stamen Staubfaden — diese hängen aus d. Blume heraus), E. caribaea Hayne (Cinchona car. W. s. jamaicensis Wright).
- Faba** T., Mnch. (zu Vicia L.) Rchb. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Sau- od. Buffbohne (Puffb. Rmpl.), Pferdebohne, fr. fève de marais, e. hog's-bean (lat. faba Bohne v. d. celt. faff, Wtst. gr. φάγω esse?), F. vulgaris Mnch. = Vicia Faba L. (Casp. Meer), F. equina Bauh. s. minor L. (Vicia Faba L. β), narbonensis Biv.
- Fabago** T. (sc. Zygophyllum) L. (Rutaceen, X. 1) gem. Jochblatt, s. g. Bohnenkapper D. (v. faba Saubohne — bohnenf. Samen).
- Fabiana** Rz. Pv. (Solanac. od. Convolvulac., V. 1) „Fabianopflanze“, fr. fabiane (n. d. Erzbischof v. Valencia Franc. Fabiano ben.), Glash. F. imbricata Rz. Pv. (Hstr.).
- 1) **Fabricia** G. (Myrtaceen, XII. 1) „Fabricius“-Myrte (n. d. Bot. Ph. K. Fabricius). 2) **Fabricia** plicata Thb. (Amaryllideen, VI. 1) „Fabricius“-Duffllilie, s. Gethyllis plic. Jacq. 3) **F. Scop.** (Papilionaceen). 4) **F. Adans.** (Labiaten).
- 1) **Fagāra** Schreb. (Terebinthaceen, VIII. 1) Sattelbaum D., fr. fagarier (wahrsch. aus d. Arabischen, schon Avicenna brauchte d. Namen, schwerl. v. φάγος od. φαγεός Wetzstein, der d. Metalle gleichs. anfrisst, φαγός Fresser), F. inaequalis D. (Amyris inaeq. Spr.), copallifera D. (Amyris s. Elaphrium cop. Sess.). 2) **Fagāra** L. (Sapotac. od. Rutac. Diosmeen, IV. 1), F. Pterota L. Eisenholz v. Jamaika, F. Piperita L. japan. Pfeffer (Piper japonicum Kämpf.).
- Fagonia** T. (Rutac. Zygophyllen, X. 1) „Fagon's“-Jochblatt, fr. fagone (-goue) (n. Guy Crescent. Fagon, Prof. u. Leibarzt Ludw.'s XIV., † 1718), F. persica DC. s. indica L., Bruguieri DC. s. mysorensis Roth.
- Fagopyrinae** Bartl., DC. Ord. d. Buchweizenartigen, s. sogl.
- Fagopyrum** T. (Polygonaceen, VIII. 3) „Buchweizen“, Heidekorn, fr. bucaille od. blé saracin (-noir), e. buck-wheat (book-), bollemong, panicle (pannicle) u. bird's-tongue „Vogelzunge“ (v. φηγός lat. fagus Buche, πίθος Weizen — Samen wie Bucheckern!), F. esculentum Mnch. = Polygönum Fagopyrum L., F. tataricum G. s. erectum Gm. (Polyg. tat. L.), s. Fagotriticum sibiricum Act. Stockh. (Fagus u. Triticum Weizen).
- Fagraea** Thunb. (Loganiaceen, V. 1) „Fagraeus“-Fruchtbaum (n. Thunberg's Freunde J. T. Fagraeus), F. imperialis u. tahitensis Thb., s. Willughbeia zeylanica Roxb.).
- Fagus** L. (Cupuliferen od. Corylaceen, XXI. 5) Rot- od. Waldbuche, fr. hêtre, fouteau (fayar, fou), faine „Buchecker“, e. beech-tree (gr. φηγός v. φάγω esse etc.), F. silvatica L. (Castanea Fagus Scop., F.

- sylvestris Mchx.), fr. hêtre commun, e. common b.-tr., m. v. v., z. B. aspleniifolia Lodd. s. heterophylla Loud., v. purpurea Ait. (atro-rubens Dur., atro-purp. Hort., colorata DC.) s. g. Blutbuche.
- Falcaria** Host (zu Critämus Trag.) Rehb. (Umbellifer., V. 2) „Sichel-dolde“, Sichel O. W. (falx, -cis Sichel), s. Sium Falcaria L. (Seseli Falc. Scop.) u. Drepanophyllum sioides Wib. s. agreste Hoffm.
- Farfära** DC. (sc. Tussilago) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Hufattich, Husten-, Acker-, Eselshuf (viell. corripert aus $\varphi\acute{\alpha}\nu\gamma\zeta$ Luftröhre u. $\varphi\acute{\alpha}\rho\sigma$ Lappen, Wtst. v. far Mehl u. fero trage — Mehl auf d. Blattunterseite), Zier. v. fol. varieg. Hort., fr. pas d'âne à feuilles panachées.
- Farfugium** Lindl. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Fleckenblatt-Hufattich (aus Farfara u. fugio fliehe gebildet!), Topfbl. F. grande Ldl., s. Ligularia Kaempferi var. Sieb. u. Zucc.
- 1) **Farsetia** R. Br., Turr. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Farsetie“, Sandkresse, Weisssteinkraut, fr. cresson des sables, F. incana R. Br. (n. d. venet. Bot. Ph. Farseti ben.), s. Alyssum incanum L. (Berteroa inc. DC. u. Farsetiana DC.). 2) **F.** (sc. Cheiranthus) L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) strauch. Mondviole, s. Lunaria fruticosa s. leucojifolia T.
- Fatsia** Decsn. (Araliaceen, V. 5) „Fatsie“, F. japonica Decsn., s. Aralia jap. s. Sieboldii Hort. (vaterl. Name fatsi).
- Fedia** Mnch. (Valerianeen, III. 1) Schmalzkraut, Feld- od. Lämmersalat, Nisschen, Rapünzchen Grck. etc., fr. mache, blanchette u. laitue de brébis, e. rampion u. corn-sallad (v. fedus atlat. Böcklein, Wtst. d. corrumpierte $\varphi\omicron\upsilon\tilde{!}$), F. locusta Rehb. s. olitoria Vahl, s. Valerianella olit. Mnch. = Valeriana Locusta var. *a* olitoria L.; F. olitoria G. = Valerianella Auricula s. dentata DC. (rimosa Bast.).
- Felicia** DC. (zu Aster Rehb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Felicie“ od. „Felix“-Aster (n. d. Legat.-Rat Felix in Regensburg, † 1846), F. tenella Nees, fr. Felicie delicate, e. slender F., s. Aster tenellus Thb. (Kaulfussia ciliata Nees).
- Feliciana** Camb. (Lythraieen, XI. 1?) „Feliciane“ (n. José Feliciano Fernandez Pinhero, schr. üb. Agricult. in Brasilien).
- 1) **Fenzlia** Benth. (Polemoniaceen, V. 1) „Fenzl's“-Speerkraut (n. d. Prof. Fenzl in Wien), Zier. F. dianthiflora Benth. (Gilia dianthoides Endl.). 2) **Fenzlia** Arn. (Myrtaceen Memecyleen, VIII. 1). 3) **F.** Endl. (Lythraceen, XI. 1?).
- Ferdinanda** (-dea) Lag. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Ferdinand's“-Strauch (n. d. König Ferdinand VII. v. Spanien, † 1833), z. B. F. augusta u. emänses Lag.
- Ferolia** Aubl. (Rosaceen od. Laurineen Cedreleen, X. 1) Atlas- od. Satinetholz, fr. bois-benoit-fin u. férole (bois de -), e. satin-wood, F. guianensis Aubl., s. Chloroxylon Swietenii (guian. Name ferol).
- Feronia** Corr., DC. (Aurantiaceen, X. 1) Wald-Pomeranze, Elephantenapfel, F. elephantum Corr. (v. Feronia Göttin d. Wälder, Wtst. n. Feroni, florent. Bot., schr. 1804 Verz. sein. Gartengew.).
- Ferraria** L. (Irideen, III. 1 od. XX. 3) Tiger- od. Pfauenlilie, F. tigrida u. pavonia L. (n. d. Jesuiten Ferrari, s. d. Aut.).
- Ferreola** Kön., Roxb. (Ebenaceen, XXII. 6) Maba-Eisenholz, F. buxifolia Kön. (Maba Forst.), s. Ehretia ferréa W. u. Pisonia buxif. Rottb. (v. ferréus eisern — ungemain hart. Holz!).
- Ferula** T. (Umbelliferen, V. 2) „Steckenkraut“, fr. fêrule, e. gigant's-fennel „Riesen-Fennich“ (ferula Rute v. ferio schlage damit), z. B. F. asa foetida L. Stink-Asand von Persien, s. g. Teufelsdreck, Zier. F. communis L. gew. Rutenkraut, tingitana L. f., fr. fêr. de Tanger etc.
- Festuca** L. (Gräser, III. 2) Schwingelgras, eig. Futtergras, fr. fêtuque,

e. fescue-grass (Linné: n. d. celt. fest d. i. Futter geb.), z. B. Zier. *F. glauca* Schrad., Ufer *F. fluitans* L. (*Poa* s. *Glycesia fluit.* Scop., R. Br.), fr. fétuque flottante, brouille, etc.

Feuillaea (-llēa. **Fevillēa**) L., P. (Cucurbitaceen, XXII. 6) „Feuillee“ (n. d. Reis. Feuillée, s. d. Aut.), z. B. *cordifolia* u. *trilobata* L., s. *Trichosanthes punctata* L. f., *F. scandens* L., fr. liane contre-poison (coudeuvre).

Ficaria Dill. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Feigen“-Ranunkel, Feigwurz, Feigwarzenkraut, Scharbock Grck., Schmergel, Gessel O. W., fr. ficaire, petite chéloidine u. hémorrhoidale od. aureillette, e. scurvy od. spring-Pile-wort (v. *ficus* Feige — näml. feigenförm. Wurzelknollen), *F. ranunculoides* Mch. s. *verna* Huds. = *Ranunculus Ficaria* L., Zier. *F. calthaeiflora* Rchb.

Ficoideae Juss., DC. „Feigenartige“ (zu Ord. *Urticinae* Bartl.).

Ficus T. (Urticac. Ficoideen, XXIII. 3) Feigenbaum, fr. figuier, e. fico fig-tree (lat. *ficus* v. gr. *φῖκος* v. *φῖκου* wachse? Wtst. d. veränd. *σῆζορ* Feige!), Gewächsh. *F. elastica* Roxb. Gummibaum d. Stuben, *F. australis* W., *F. scandens* Lam. s. *stipulata* Thb., *F. indica* L. ind. Baniane, fr. figuier d'Inde, *F. beniamina* L. Baniane, fr. banians, *F. Carica* L. essb. Feige, etc.

Filago T., W. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 4) Schimmel- od. „Fadenkraut“, fr. herbe à coton, e. mould-weed (v. *filum* Faden), s. *Evax* G. — *Filaginæae* Cass. (zu *Inulæae* Cass. od. *Gnaphaliæae* Less.).

Filipendula T. (sc. *Spiraea*) L. (Rosac. *Spiraeaceen*, XII. 4) Erdeichel, „Knollfaden“-*Spiræe*, fr. *Spirée filipendule*, e. drop-wort u. queen of meadow „Wiesenkönigin“, Zier. v. fl. pleno Hort. (v. *filum* Faden, *pendulus* herabhängend — Wurzelfäden m. knolligen Enden!).

Filices Juss., DC., Rchb., Kl. d. Laub- od. Wedelfarne, fr. fougères, e. ferns. — **Filicinae** DC. Ord. d. Laubfarne (v. *filix*, -*icis* Farnkraut).

1) **Filix** femina Bernh. (sc. *Aspidium* Sw., *Asplenium* L. s. *Athyrium* Roth) (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) weiblicher Schild-, Milz- od. Streifenfarn. 2) **Filix** mas (sc. *Aspidium* Sw., *Polypodium* L. s. *Polystichum* Roth) Wurmfarne, fr. silique. 3) **Filix** (sc. *Lichen*) L. (Flechten, XXIV. 3) „Farn“-Flechte (*filix*, -*icis* Farnkraut, Wtst. entw. v. *filum* Faden, weg. d. Wurzelfäden, od. v. *πτερόν* Flügel — weg. d. Wedel!).

Fissidens Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Spaltzahn“ (*fissus* gespalten u. *dens* Zahn), z. B. *adiantoides* u. *osmundoides* Hedw.

Fistula DC. (sc. *Cassia*) L. (Cassieen, X. 1) „röhrenförm.“ Cassie (*fistula* Fistel, Röhre etc. — Hülsenform!), s. *Cathartocarpus Fistula* Pers.

Fistularia Ach., Grev. (Tange, XXIV. 3) „Pfeifen“- od. „Röhrentang“, *fistulaire* (s. eb.), z. B. *F. tabacaria* Grev., fr. pétimbe.

Fistulina Nees, Bull. (Pilze, XXIV. 4) „Röhrenpilz“, Leberschwamm Kumm., *F. hepatica* Bull. s. g. Blutschwamm (essb.) (s. eb.).

Fittonia Coëm., Lem. (Acanthaceen, XIV. 2) „Fittonie“ (n. d. Schwestern Elisabeth. u. Sarah Mary Fitton, schr. *Convers. on botany*, 8. edit. Lond.), z. B. Stubenblattplf. *F. Verschaffelti* Coëm. m. v. *argyroneura* (silberaderig), *F. gigantea* Lindl. u. *Pearcei* ds., s. *Gymnostachyum Verschaffelti* Lem. etc.

Fitzroya Hook. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Fitzroy“-Cypresse, s. g. Alercobaum, *F. patagonica* Hook. (n. d. engl. Schiffscap. *Fitzroy* ben.).

Flacourtia l'Hér., Comm. (Capparideen od. *Tiliaceen*, XIII. 1) „Flacourtie“ (n. d. franz. Statthalter Etienne de Flacourt auf Madagascar, † 1660), z. B. *F. cataphracta* l'Hér., *rhamnoides* Burch. u. *inermis* Roxb. — *Flacourtiaceae* Rich., DC., -*icæ* Rchb. (zu *Cistiifloræ* DC.).

- 1) **Flammüla** (sc. *Ranunculus*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) brennender Hahnenfuss, „Flämmchen“ (dem. *flamma* Flamme). 2) **Flammula** Dill., Rupp. (sc. *Clemätis*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) scharfe Waldrebe, fr. *flammule* od. *Clématide odorante*, e. *sweet-scented Virgin's-bower*, m. v. *rubella* DC., s. *Flammula scandens* Dill. (*caespitosa* Scop., „Rasenrebe“ od. *fragrans* Ten.). 3) **Fl.** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Flämmchen“-Schwamm (— weg. d. schnell verschwind. Manschette), z. B. *saniosa*, *limonia* etc., s. *Agaricus*.
- Flindersia** R. Br. (Ampelideen od. *Meliac.* *Cedreleen*, X. 1) molukki-scher Rasselbaum (n. d. *Capt. Matth. Flinders*, † 1814), *Fl. moluccana* R. Br.
- Floridäe** Ag., Rchb. Ord. d. Rot- od. Blütentange Seub., Hautalgen Rchb. (flos, -öris Blume).
- Flumina** Fr. (Gräser, III. 2) Flussschwengel (*flumen*, -inis Fluss), *Fl. arundinacea* Fr., s. *Scolochlōa festucacea* Lk.
- Fluviales** Endl., fr. *fluviales*, Kl. d. Najaden od. „Flusspflanzen“ (s. sogl.).
- Fluvialis** Michel (Najadeen, XXII. 1) „Fluss“-Najade (*fluvius* Fluss), *F. latifolia* Mich., s. *Najas fluviatilis* Lam., *Fl. flexilis* Pers. (XXI. 1), s. *Najas flex.* Rostk. (*Caulinia fl. W.*), *Fl. minor* Mich., s. *Caulinia fragilis* W. (*Najas minor* Schk., *Ittnera* m. Gm.).
- Foeniculum** Ad., T. (Umbellifer., V. 2) „Fenchel (Fönchel)“, fr. *fénouil*, e. *fennel* (ital. *finocchio*) (*foeniculum* dem. v. *foenum* Heu, deutsch.: Fenchel), Gärten: *F. vulgare* G., s. *Anethum lutēum* s. *Foeniculum* L.
- Foenum graecum** T. (sc. *Trigonella*) L. (*Leguminos.* *Trifolieen*, XVII. 4) Bockshornklee, gemeiner Kuhhornklee W., griech. Steinklee, s. g. „griech. Heu“, fr. *fénugrec* od. *senègre*, e. *fenugreek* (*fenny-*) (*foenum* od. *fenum* Heu — nämll. getrockn. Blätt. in Käse! — lange hornförm. Hülschen).
- Foetidia** A. Cunningh., Comm., Juss. (*Myrtaceen*, XII. 1) „Stinkbaum“ D. (v. *foetidus* übelriechend — nämll. d. Holz!), *F. mauritiana* Lam. (Ins. *Mauritius* od. *Bourbon*).
- Fontanesia** Lab. (*Oleaceen*, II. 1) „Desfontaine's“-Strauch (n. d. Bot. u. Reis. Prof. *Desfontaines* z. Paris), *Gewächsh. F. phillyreoides* Lab.
- Fontenellēa** St. Hil. (*Spiraeac.*, XII. 4) „Fontenelle“ (n. Julia de Fontenelle, schr. mit H. Tollar Manuel de l'arboriste, Paris 1828).
- Fontinalis** Dill., L. (*Moose*, XXIV. 2) Quell- od. Brunnenmoos (*fons*, -tis Quelle), *F. antipyretica* L. (in Quellengraben — früher um Schornsteine geg. Feuersgefahr!).
- Forestiera** Poir. (*Oleaceen* *Forestieren*, XXIII. 1) „Forestiere“ (n. Forestier, Arzt zu Paris zu Poiret's Zeit), *F. ligustrina* Poir. s. *Bigelowia lig.* Rees (*Borya l. W.*), *F. acuminata* Poir. (*Bigelowia* s. *Borya ac.*) s. *Adelia acum.* Mchx.
- Forskohlea** L. (*Urticaceen*, X. 5) Forskohlee (n. Pet. Forsk., Prof. in Kopenhagen), z. B. *F. tenacissima* L. f., *angustifolia* L. etc.
- Forstera** L. (*Plumbagineen*, XX. 1) „Forstere“ (n. d. Gebrüd. Forster, Cook's Begleit. b. d. Weltumseglung), *F. sedifolia* L. f.
- Forsythia** Vahl (*Oleaceen*, II. 1) „Forsyth's“-Strauch (n. d. engl. Bot. W. A. Forsyth, schr. 1802 üb. d. Cult. d. Obstb.), Zier. *F. viridissima* Lindl. (China), *suspensa* Vahl (*Syringa susp.* Thb.), *Lilac pensata* Lam.) (Chin., Jap.), *scandens*, s. *Decumaria* L.
- Fothergilla** L. (*Corniculat.* *Cunoniaceen* od. *Hamamelideen*, XII. 2) „Fothergill's“-Strauch (n. d. Arzt in Uptom J. Fothergill, † 1780), Zier. *F. alnifolia* L. f. s. *Gardenii* Mchx. (N.-Amer.).
- Fourcroea (-croya)** Vent. (*Bromeliac.* od. *Amaryllideen*, VI. 1) „Fourcroy's“-Agave (n. Fr. v. Fourcroy, Gründ. d. Polytechnikums in

Paris, † 1809), z. B. *F. foetida* Vent. (*Agave foet.* L.) „Stinkagave“, *F. gigantēa* V. (*Agave cubensis*) mex. Gespinnst-Ag., s. g. Maguey-holzbaum.

- Fragaria** L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) Erdbeere, fr. fraise (-sier), e. straw-berry (lat. *fraga*, -orum Erdbeere v. fragro dufte), z. B. wild u. geb. *F. vesca* L. gem. Erdb. m. v. *sempertlorens*, fr. fraise de quatre saisons, Monats-E. (z. B. *Princesse royale*), *F. Majaufēa* Duch. (collina Ehrh.) Knackbeere (z. B. *vineux de Champagne*), *F. elatior* Ehrh. (moschata Duch.) Moschus-E., fr. capronnier, *F. virginiana* Duch. (z. B. Roseberry) Scharlach-E., *F. chiloēnsis* Ehrh. Chili-E., *F. grandiflōra* Ehrh. Ananas-E. — Zier. *F. indicā* Andr. (Ampel), e. yellow-str.-b., *vesca* L. v. *muricata* Duch. u. *grandiflōra* Ehrh. v. fol. variegat. Hort., *F. scabra* s. *chilensis* Ehrh. „Riesen-erdbeere“.
- Fragariastrum** Ser. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Erdbeer-Fingerkraut, s. *Potentilla fragariastrum* Ehrh. s. *fragariaefolia* Gm. (prostrata Fl. Wett. (deter. v. *Fragaria*).
- Fragifera** Koch (zu *Trifolium* sect. *Vesicastrum* Rchb.) (Legumin. *Trifolieen*, XVII. 4) Erdbeerklee, *Trif. fragiferum* L. etc. (*fraga* Erdbeere u. *fēro* trage — näml. nach d. Blüten beerenförm. aufgebläsene Kelchröhren).
- Fragosa** Rz. Pv. (Araliaceen, V. 5) „Fragose“ (n. Joh. Fragoso, Leib-arzt Philipp's II., schr. 1572 üb. amerik. Arzneimittel).
- Fragraea** Reinw. (Contorten Loganiaceen, V. 1) Eisenholz v. Sumatra, Königsholz od. Tembesubaum Leun., *F. peregrina* Reinw. (vgl. *Fagraea*, wovon nur irrtümlich entstellt!).
- 1) **Franciscēa** Pohl (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Franzblume“, -strauch (n. Franz od. Franciscus II., Kaiser v. Österreich), *Gewächsh. F. uniflōra* Pohl, *eximia* Scheidw., *calycina* Benth. 2) **Franciscēa (-caria)** DC. (Crassulaceen, V. 5), *F. coccinēa* = *Crassula* s. *Rochea coccinēa* (*Calosanthos* c. Van Houtt.).
- Francōa (-kōa)** Cav. (Corniculaten Sedeen, X. 5) „Franco's“ -Dickblatt (n. d. span. Bot. d. 16. Jahrh.'s *F. Franko* in Valencia). — *Francoacēae* DC., A. Juss.
- 1) **Frangula** T. (sc. *Rhamnus*) L. (Rhamnaceen, V. 1) Faulbaum, „Bruch“-Wegdorn, Bruch- od. Pulverholz, Schwarzerle, fr. *frangule*, *nerprun*, *bourgēne*, *aulne noir*, *rhubarbe de moines* (— des paysans), e. black-berry-bearing alder od. breaking buck-thorn, s. *Frangula* *Alnus* Mill. (v. *frango breche* — Holz brüchig!). 2) **Frangula** Mill. (sect. von *Rhamnus*, V. 1), z. B. *Rh. rupestris*, *pumila* etc.
- Frankenia** L. (Violarien Sauvageseen od. Frankeniaceen, VI. 1) „Frankenie“ (n. d. Prof. Frankenius z. Upsala, † 1661), z. B. *F. pulverulenta* L. u. *hirsuta* L. (*Nothria* h. Berg.).
- Fraxinaster** DC. (subgen. v. *Fraxinus*) (Sapotac. Fraxineen, XXIII. 2) Esche (deter. v. *Fraxinus* Esche), z. B. *F. excelsior* L., *angustifolia* Vahl, *parvifolia* Lam., etc.
- Fraxinella** T. (sc. *Dictamnus*) Pers. (Rutaceen, X. 1) weisswurziger Diptam, s. *Dictamnus albus* L., auch Eschwarz, fr. *fraxinelle* „Eschenstrauch“ (dem. *Fraxinus* — Ähnlichk. d. Blätt.).
- Fraxinus** T., L. (Sapotac. Fraxineen od. Oleaceen, XXIII. 2) Esche, fr. *frêne*, e. ash-tree (v. *φράξις* Zaun — Zaunholz!), Zier. *F. excelsior* L. s. *apētāla* Lam. m. v. v., z. B. v. *aurēa* W. (*Fr. aurēa* Pers.), v. *pendūla* Ait. Traueresche, fr. *frêne parasol*, v. *heterophylla* Vahl s. *monophylla* (*simplicifolia* W.), v. *angustifolia* Bauh., *F. parvifolia* W., *F. argentēa* Lois., *F. oxycarpa* W. (-phylla M.-B.), *F. americana* L. (alba Marshal, *acuminata* Lam.), *F. Ornus* L. Blumen-E., etc. — *Fraxinēae* (sc. *Sapotacēae*) Rchb.

- Fremontia** Torr. (Chenopodiaceen, V. 2) „Fremont's“-Gänsefuß (n. L. C. A. Fremont, schr. 1806 üb. Arachis, 1807 üb. Orobanche Diosc. etc.), Kalth. F. californica Torr.
- Frenela (-lia)** Mirb. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Fresnel's“-Cypresse (n. d. Physiker A. J. Fresnel ben.), F. australis, glauca, triquetra etc., s. Callithrix u. Cupressus.
- Freycinetia** Gaudich., DC. (Pandaneen od. Bromeliac., XXII. 1) „Freycinetie“ (n. d. franz. Schiffsap. Freycinet, auf d. bot. Reise unt. Gaudichaud's Begleit. 1817/20).
- Fritillaria** L. (Liliaceen, VI. 1) „Schachbrettblume“, Kaiserkrone, fr. fritillaire, e. fritillary od. crown-imperial (-thistle) (v. fritillus Schachbrett — scheckige Zeichnung einer Art!), Zier. F. imperialis L., fr. couronne imperiale, herbe aux sonnettes, e. imperial crown, m. v. v. (lutea maxima Hort. etc.), F. Meleagris L. Schachbrett- od. Brettspielbl., s. g. Kiebitzbl., F. persica L., fr. lis de Perse (— de Suse), e. persian fr. (Treibh.).
- Frullania** Raddi (Lebermoose, XXIV. 3) „Frullanie“ (n. d. Italiener Frullani), z. B. tamarisci u. dilatata Nees.
- Frustranea** L. (sc. Syngenesia L., XIX. 3) mit unfrucht. Randblütchen (frustraneus vergeblich).
- Fucaceae** Ag., DC. Echte Tange (zu Ord. Fucoidae Ag.), s. Fucus.
- Fuchsia** Plum. (Onagreen Myrobaleen, VIII. 1) „Fuchsie“ (n. d. Prof. in Tübingen Leonh. Fuchs, † 1565), Zier. F. coccinea Ait. (triphylia Plum.), s. Skinnera cocc. Forst., F. corymbiflora R. P. (Anden) m. v. nana, F. fulgens Lindl. (Mexiko), m. v. superba, v. floribunda u. v. pyramidalis; F. gracilis Ldl. (Mex.), microphylla Hb. u. Bpl., globosa Lindl. m. v. erecta u. v. maxima, F. serratifolia R. P., macrantha u. spectabilis Hook. (Königin d. Fuchsien), arborescens Sims (Schufia Spach — anagramm. Fuchsia!), excorticata L. f. (Neuseel.) etc.
- Fucoidae** Ag., DC., Rchb. Tangalgen Rchb., Ledertange Seub., Schwarz-tange (fucus Tang, *είδομα* gleiche).
- Fucus** L., Grev. (Tange, XXIV. 3) Seetang, fr. sart, goëmon (goesmond), e. tang (lat. fucus, gr. *φύκος*; Seetang, v. *φίω* wachse), z. B. F. vesiculosus L. gem. Blasantang, F. serratus L. Sägetang, etc.
- Fuligo** Hall. (Lycoperdaceen-Pilze, XXIV. 4) Russpilz, s. g. Lohblüte, s. Aethalium Lk. (fuligo, -inis Russ), z. B. F. candida Rebert. (Aeth. cand. Schidl.), F. septium s. flava Lk. „Lohblüte“, etc.
- Fumana** Dun., Mill. (sc. Helianthemum Bauh. s. Cistus L.) (Cistineen, XIII. 1) heidelbeerblättr. Ciströschen (schwerl. v. fumus Rauch, sond. Eigennamen!), s. Chamae-Cistus Bauh.
- Fumaria** T., L. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Erdrrauch“, fr. capnoïde, fume-terre, fiel de terre „Erdgalle“, lait-battu u. pied de geline „Hühnerfuß“, e. fumatory (fumitory) (v. fumus Rauch — fein verteiltes Laub!), z. B. F. officinalis L., capreolata L. etc., s. Corydalis DC. u. Platycapnos Bernh. — Fumariaceae DC., -iëae Rchb.
- Funaria** Hedw., Schreb. (Moose, XXIV. 2) „Strick“- od. Drehmoos (funis Strick), z. B. F. hygrometrica Hedw. „wetteranzeigendes“. — Funariaceae Schimp.
- Fungi** L., DC., Rchb., Endl. Kl. d. Pilze od. Schwämme (fungus, gr. *σφύγγος*, fr. fonge, e. mushroom Schwamm).
- Funkia** Spreng. (Liliac. Hemerocallideen, VI. 1) „Funks“-Lilie (n. H. Chr. Funk, Apoth. in Gefrees am Fichtelgeb., † 1839), Zier. F. alba Andrews s. japonica Thb., caerulea Andr., grandiflora u. albo-marginata Hook., Sieboldi Hook., lancifolia Spr. m. v. fol. varieg. Hort. etc., s. Hemerocallis L. u. Hosta Tratt.

Fusisporium Lk. (Pilze, XXIV. 4) „Spindelsporen“-Schimmel (fusis Spindel, *σπορά* Spore — d. Sporidien spindelf!), z. B. *solani* Mart. s. g. „Kartoffelfäule“, *aurantiacum* Lk., s. *Camptosporum* aur. Spr.

Gagēa Ker (zu Ornithogälum Rehb.) (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Gagel“, Gelb- od. Goldstern (Paxton: n. d. engl. Mönch Thom. Gage, schr. üb. Amerika 1648, Wtst.: Sir Thom. Gage, bot. Dilettant dies. Jahrh.'s), z. B. *lutēa* Ker, fr. *étoile jaune*, s. *Ornithogalum* lut. L.

Gaillardia Sw., Foug. (Galardia Lam., Schreb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Gaillardie“, fr. *gaillarde* (n. Gaillard de Charentonneau, Liebh. d. Bot., Wtst. Marentonneau!), Zier. G. *picta* Sweet s. *Drummondii* DC. (bicolor var. *Drummondii* Hook.), fr. G. *peinte* m. v. *nana* Hort., G. *perennis* Hort. s. *lanceolata* Mchx. (*rustica* Cass.) m. v. *grandiflora* lutea Hort.

Galactodendron Kth. (Urticac. Artocarpeen, XXI. 1) „Milch“- od. Kuhbaum (*γάλα*, -*ακτος* Milch, *δένδρον* B.).

Galanga Rumph. (Scitamineen, I. 1) „Galgant“, e. galangal (malabar. kelengu!), G. *major* u. *minor* Rumph., s. *Alpinia* Galanga Sol.

Galanthus L. (Amaryllideen, VI. 1) Schneeglöckchen, eig. „Milchblume“ (*γάλα* Milch, *άνθος* Bl.), G. *nivalis* L., fr. *perce-neige*, violier d'hiver (- de Fevrier), violier bulbeux, galantine u. nivéole, e. snow-drop (-deep) m. v. *plicatus*, e. folded sn.-dr. (Caucasus).

1) **Galarrhoeus** Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) „Milchfluss“, -pilz, Pepperling, Brätling (s. v. u. *ῥοά* od. *ῥοία* Fluss), z. B. essb. *deliciosus*, *pipe-ratus* etc. — 2) **Galarrhoeus** (nicht-rhaeus!) Haw. (Euphorbiac., XI. 3) „Milchfluss“, G. *creticus* Haw., s. *Euphorbia* *cret.* Mill.

Galatella Cass., DC. (zu Aster Rehb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Milch-aster“ (v. *γάλα* Milch — weg. Milchsafte!), Zier. G. *punctata* Cass., *linifolia* Nees, *dracunculoides* DC., *Meyendorffii* Reg., *cana* Nees (*Aster canus* Waldst. Kit.).

Galaxia Thb. (Irideen, XVI. 1) „Milchschwertel“ (v. *γαλακτώ* gebe Milch), z. B. *ovata* u. *graminea* Thb., s. *Ixia* *Galaxia* u. *fugacissima* L. f., G. *narcissiflora* W. = *Sisyrinchium* n. Cav.

Galbanum Don (Umbelliferen, V. 2) Gummi-Galbanum, „Galban“- od. Mutterharzkraut, fr. *galbanifère*, e. galbanum, G. *officinale* Don (lat. galbanum Plin. Mutterharz, eine syrische Pfl.), s. *Opoidea* galbanifera Lindl., *Bubon* Galbanum s. *gummiferum* L.

Gale T. (sc. Myrica) L. (Amentac. Myricaceen, XXII. 4) gemeiner Gagel, Wachsbeere, brabantier Myrte, fr. *galé* (celt. gal = Balsam!).

Galēga T., L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Geisklee Seub., -raute, „Galei“ O. W., fr. *rue de chèvre*, e. goat's-rue (n. Ruelle das veränd. glaux, Wtst., v. *γάλα* Milch — den Ziegen Milch gebend!), Garten G. *orientalis* L., G. *officialis* L., fr. *Lavanèse*, e. common g.-r., m. v. fl. alb. Hort. (bicolor Hort.), G. *tinctoria* L., fr. *faux-indigo*. — Galegēae (sc. Papilionacēae) Rehb.

Galeobdolon Sm., Huds. (Labiaten, XIV. 1) Gelb- od. Goldnessel, eig. „Wieselgestank“ (v. *γαλή* Wiesel od. Katze etc., *βδόλος* Gestank), G. *lutēum* Sm., s. *Galeopsis* *Galeobdolon* L. (*Lamium* *Galeobd.* Crantz), Zier. var. *fol. varieg.* Hort.

Galeopsis L. (Labiaten, XIV. 1) Hohlzahn, Helmkrachen, fr. *galéope*, eig. „Mardergesicht“, auch Hanfnessel, fr. *chambreule* (*chanvreule*) (s. eb. u. *ὄψις* Gesicht etc.), z. B. G. *ochroleuca* Lam. Theekraut O. W. (*herba* *Galeopsisidis* Offizin.).

1) **Galēra** DC., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Mützenschwamm“ (*galērus* Mütze etc.), z. B. *lateritia* DC., s. *Agaricus* l. 2) **Galēra** Blum. (Orchideen, XX. 1) Mützen-O. (— d. *Columna* gewölbt).

- Galinsöga** Rz. Pv. (-gæa Zucc., -gëa Cav., -gia W.) (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Galinsogakraut“, Kleinstrahl, Knopfkrout O. W. (n. M. Galinsoga, k. Intendant zu Madrid), z. B. parviflora R. P., s. g. Franzosenkraut, s. Mocinna Lag. — Galinsogæe DC.
- Galipea** Aubl. (Rutaceen, II. 1) Angosturabaum (n. d. Galipons, Indianern am Orinoko), G. Cusparia St. Hil. s. Angostura Cuspare R. Sch., s. Bonplandia W.
- Galium** L. (Rubiaceen, IV. 1) Labkraut, Wald- od. Frauenstroh, fr. caille-lait (gaillet), fleur de St. Jean, e. runnet-herb (rennet-), cheese-runnet (-wort), lady's bedstraw (v. γάλα Milch — macht solche gerinnen, wie d. Kälberlab!), z. B. G. verum L. echtes L., s. g. Wegekr. od. Frauenstroh, e. our Lady's-bed, (†. sylvaticum L., e. wood-roof „Walddach“, -meister (echtem Waldmeister ähnlich!) etc.
- Galorrhoeus** Haw., s. Galarrhoeus!
- Galphima (-ia)** Cav. (Caryophyllen Malpighieen, X. 3) „Galphimie“, unechte Malpighie (Anagramm v. Malpighia!), z. B. glauca u. hirsuta Cav. — Galphimiæe Rchb.
- Gamolëpis** Less., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Vereinsschuppe“ (γάμος Ehe, λεπὶς Schuppe — d. Schupp. d. Anthod.'s bis mitten verwachsen), Zier. G. Tagëtes DC. s. annua Less., s. Othonna s. Psilothonna E. Mey. Tagëtes.
- Gamopetalæ** DC., Endl. Kl. d. Ganzkronigen (s. eb. u. πέταλον Kronblatt — verwachs. Krone!).
- Ganja** Rumph., DC. (Tiliaceen, XIII. 1) Muspflanze D. (malay. Name!), G. sativa Rumph. s. Corchorus capsularis L.
- Garcinia** L. (Guttiferen Garcinieen, XI. 1) „Garcinie“ (n. d. Engl. Lawrence Garcin, Reis. d. 18. Jahrh.'s in Indien), G. Mangostana L. wohl-schmeck. Mangostane, fr. brindone.
- 1) **Gardenia** L. f., Ellis (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) (zu Randia Houst.) „Gardenie“, fr. gardène (n. Dr. Alex. Garden, Nat. in Carolina, Nord-Amer.), Treibh. G. florida L. s. g. Cap-Jasmin n. v. plena u. v. Fortuneana Hort., Warmh. Stanleyana, G. radicans Thb., G. Rothmannia L. s. capensis Thb. Cap-Eisenholz, G. grandiflora Hort. chines. Gelbschote, G. Thunbergia L. (Thunbergia capensis Montin). — Gardeniaceæ Rich., -niæe DC., Cham., Schldl. 2) **Gardenia** Coldenia Dietr., s. Hypericum virginicum (Dietr.) (Hypericineen, XVIII. 2).
- Gardoquia** Rz. Pv. (Labiaten, XIV. 1) „Gardoque“, fr. gardoque (n. d. Spanier Don Diego Gardoqui, Mitarb. d. Fl. Peruv., Wtst. Finanz-min. Kön. Karl's IV. v. Span.), Zier. G. betonicoides Lindl. (Cedronella mexicana Benth., Dracocephalum mex. Kth.).
- Garidella** T., L. (Ranunculaceen, X. 3) „Garidel's“-Blume, fr. garidelle (n. d. Provencer Pierre Garidel, schr. Pfl. von Aix, † 1739), z. B. G. Nigellastrum L. „Fenchelblume“ u. unguicularis Lam.
- Garrya** Dougl. (Garryaceen od. Antidesmeen, XXII. 5) „Garry's“-Strauch (n. Nic. Garry, unterst. Douglas' Untersuch. d. Pfl. von Nordwest-Amer.), Zier. G. elliptica Dougl. (ähnl. Viburnum). — Garryacæe DC.
- Gasteria** Haw., Duv. (Liliac. od. Bromeliac., VI. 1) „Bauch“-Aloe (v. γαστήρ, -ερος, -στος Bauch — Blütenröhre an d. Basis), z. B. ensifolia Duv., s. Agave ensif., G. disticha Duv. (Aloë dist. L.), colubrīna Nees, subverrucosa Salm-Dyck, etc.
- Gasteromycetes** Fr. „Bauch“- od. Balgpilze (s. eb. u. μύκης, -ητος Pilz).
- Gastonia** Juss., Comm. (Araliaceen, XI. 5) „Gaston's“-Aralie (n. Gaston v. Bourbon, Sohn d. Kön. Henri IV.), z. B. G. palmata Roxb.
- Gastrolobium** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieneen, X. 1) „Bauchhülse“ (s. v.,

- λοβίον Hülschen — bauchig aufgetr. Hülse), z. B. bilobum R. Br. (Bstr. Neuholl.), Zier. calycinum, villosum, spinosum etc.
- Gastronēma** Herb., Sims (Amaryllideen, VI. 1) „Bauchfaden“ (s. v., *νήμα* Faden — d. Staubfäd. m. Antheren in d. bauchige Blüte eingeschl., Wtst.), Zier. G. clavatum Van Houtt., sanguinēum Lindl.
- Gaudinia** P.-B. (Gräser, III. 2) Ährenhafer Leun. (n. d. Bot. u. Pred. Gaudin zu Nyon, s. d. Aut.), G. fragilis P.-B., s. Avena fr. Host.
- Gaultheria** Kalm, L. (-thiera aut.) (Ericaceen, X. 1) Wintergrünstrauch, Theebeerenstr., canadischer od. Bergthee Rnpl., Scheinbeere Lauch., fr. gaulthérie, thé de Canada (- de Labrador, - de montagne) (n. d. schwed. Arzt Hugues Gaulthier in Quebec), Zier. G. procumbens L., fr. g. couchée, leucocarpa etc.
- 1) **Gaura** Jacq., Pers. (Onagrarien Oenotheren, VIII. 1) „Prachtnachtkerze“ (*γαυρός* prächtig), Zier. G. Lindheimeri Engelm., G. biennis L., G. fruticosa scandens Loefl. (Combrētum laxum L.) etc.
- 2) **Gaura** Lam. (zu Lechēa L.) (Cistineen, III. 3) Leche's-Cistrose.
- Gay-Lussaccia** Hb. u. Bpl. (Ericaceen Vaccinieen, XVIII. 1) „Gay-Lussac's“-Torfheidelbeere, Buckelbeere Lauch. (n. d. Chemik. Gay-Lussac, † 1850), G. Pseudo-Vaccinium Cham., Schldl. (Brasil.), pulchra Pohl (Gewächsh.), G. dumosa Torr. u. Gr. (Decamerion d. Nutt.) etc., s. Andromeda u. Vaccinium.
- Gazania** G. (Compos. Gorterieen, XIX. 3) „Gazanie“ (n. Theod. Gaza, Übers. d. Theophrast, 1432), Zier. G. pavonina s. Pavonia R. Br. (Gorteria ringens Thb.), speciosa Less. (Gorteria pectinata Thb.) u. splendens Hort.
- Geaster** Pers., Fr. (-astrum Mich.) (Pilze, XXIV. 4) „Erdstern“ (*γη* od. *γέα* Erde, *αστηρ*, -έρος od. *αστρον*, lat. aster od. astrum Stern). — Geasteridēi DC.
- Geissöis** Lab. (Cassien, X. 1) „Dachziegel“-Hülsenstr. (v. *γεῖσον* Dachziegel — Samen zweireihig ziegelartig), G. racemosa Lab. (Neucaledon.).
- Geissomeria** Lindl. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ziegelkelch“, -ähren = Acanthus (*γεῖσον* Ziegel, *μοῖς* od. *-ος* Stück etc. — dicht ziegelartig ausseh. Blütenähren), Stuben: G. longiflora R. Br.
- Gelasine** Herb. (Irideen, III. 1) „Lachschartel“ (*γελασινός* lachend — schön blaue od. violette Blüten!), Zier. G. azurea Herb.
- Gelsemium** Juss. (zu Bignonia Rchb.) (Bignoniac., XIV. 2) Carolina-Jasmin (gelsemium ital. Name für Jasmin), z. B. G. nitidum Mchx. s. sempervirens Pers., s. Bignonia semp. L.
- Genetyllis** (nicht -thyllis) DC. (Myrtaceen, XII. 1) „Venus“-M. (*γενετυλλίς* Schutzgöttin d. Geburt, Zuname der Venus), Zier. G. macrostegia u. tulipifera Hort.
- Genipa** Plum. (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Marmeladen-Büchsc, fr. genipayer (in Guāna genepapa, in Brasil. janipalea, Wtst.), G. Merianae Plum., s. Duroia Eriopila L. u. Gardenia L. f.
- Genipella** Rich. (zu Genipa Plum.), s. Alibertia Rich.
- Genista** L., Lam. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Genst“ od. „Ginster“, fr. genêt, e. lady's-slipper (v. d. celt. gen, Wtst.: lat. genu Knie?), z. B. sagittalis L. (Cytisus sag. Koch), fr. genistelle od. spargelle, G. tinctoria L. m. v. sibirica Hort., fr. fleur à teindre (herbe à jaunir, - aux teintures) u. gēnestrole, n. dyng-broom (dier's-), Stuben: G. canariensis L., alba L. u. ramosissima (Cytisus Atleyanus), monosperma Lam. (köstl. duft.) etc. — Genistēa Rchb.
- Gentiana** T. (Gentianeen, IV. 2 u. V. 2) „Enzian“, fr. gentiane, e. gentian, baldmony (*γεντιανι* Diosc. n. Gentius, Kön. d. Illyrier,

- der zuerst deren Wirkung erprobte, Paxton u. Wtst.), *G. lutea* L., e. bitter-wort, yellow g. (Offiz.), Zier. *G. acaulis* L., *verna* L., *asclepiadæa* L. s. g. Schellenkraut, wild *G. campestris* L., fr. gentianelle, etc. — *Gentianæae* DC. (-nae Juss., -nacæae Grck.) (zu Ord. Confortae Bartl.).
- Geoglossum** Pers., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Erdzunge“ (*γῆ* od. *γῆα* Erde, *γλῶσσα* Zunge), z. B. *viride*, *hirsutum* etc.
- Geonoma** W. (Palmen, XXI. 6) „Erdpalme“ (*γεωνόμος* Landverteiler od. in d. Agrikultur erfahren — Stammspross. an d. Spitze werden zu neuen B.), z. B. *paniculigera*, Carderi Hort. Bull., *macrospatha* Spruce, etc.
- Georchis** Rchb. f. (Orchideen Neottien, XX. 1) „Erd“-O. (s. v. u. Orchis — wächst auf d. Erde, nicht auf B.!), z. B. *subregularis* Rchb. f.
- Georgina** W. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Georgine“ od. Dahlie (n. d. Reis. in Sibirien, Prof. Georgi zu Petersburg, nicht nach König Georg III. v. Engl.!), s. *Dahlia*.
- Geracium** Rchb. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Habichtssalat“ (zu *Hieracium* L.) (Wtst. d. veränderte *Hieracium*! od. v. *γηράσσω* Perf. *γεγήρασε*, altere — weg. d. Pappus!), z. B. *praemorsum*, *parviflorum* etc. Rchb.
- Geraniacæae** DC. (-niæae Rchb., -nia Juss.) Storchschnabelige, i. q. *Grinales* Endl. s. sogl.
- Geranium** L. (Geranieen, XVI. 4) Storchschnabel, fr. *bec de cicogne* (- de grue), *gèranier*, e. stork's-bill (crane's-) (gr. *γεράκιον* v. *γέρας* Kranich — schnabelige Frucht!), z. B. wild *G. columbinum* L., fr. *pie-de-pigeon*, e. dove's-foot, *G. Robertianum* L., fr. herbe à Robert, *G. rotundifolium* L., fr. mauvette „Malvchen“, *G. pratense* L., *silvaticum* L., wild u. Gärt. *G. sanguineum* L., *lancastriense* Wither. etc.
- Gesnera** L., Rchb. (-ria Plum., Pers.) (Gesneraceen od. Scrophularineen, XIV. 2) „Gesnerie“ (n. Conr. Gesner, s. d. Aut.), *Gewächsh. G. s. Naegelia zebrina*, *cardinalis* Hort. s. *macrantha* Spr., *barbata*, *Bastarde Bethmanni* u. *Donkelaari*, *G. pulchella* Sw., s. *Achimenes coccinea* Pers. — *Gesneracæae* DC., -ræae Rchb.
- Gethyllis** L. (Amarylhideen, VI. 1) „Lust“- od. Duftlilie (-Narzisse), *Papierlilie* D. (*γηθύλλης* Porre, v. *γῆθω* ergötze), *G. ciliaris* L., s. *Papiria cil.* Thb., *G. plicata* Jacq., s. *Hypoxis* s. *Fabricia plic.* Thb.
- 1) **Gëum** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Nelkenwurz, *Benediktenkraut*, *Raffel O. W.*, fr. herbe de St. Benoît, e. herb-Bennet u. sanamund (v. *γεύω* schmecke, rieche? — ungewiss!), Zier. *G. coccineum* Sibth. „Scharlach“-N., wild. *G. urbānum* L., fr. *gariot*, e. throat-root, *G. rivale* L. *Wiesen-Garaffel*, etc., s. *Adamsia* Fisch. 2) **Gëum** (sc. *Saxifraga*) L. (*Saxifragac.*, X. 2) *nierenblättr. Steinbrech M.-Rchb.*
- Gifola** Cass. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (Compos. *Gnaphalieen*, XIX. 4) *Schimmel-*, *Filz-* od. *Fadenkraut* (*Anagramm* v. *Filago*¹⁾), z. B. *G. vulgare* Cass. (*Gnaphalium germanicum* W. u. *pyramidatum* W.).
- Gilia** Rz. Pv. (*Gillia* Dietr.) (Polemoniaceen, V. 1) „Gil's“-*Speerkraut* (n. d. span. Bot. im 18. Jahrh. Ph. S. Gil, schr. mit Xarez üb. exotische Pfl.), Zier. *G. tricolor* Benth. m. v. v., *G. (Leptosiphon) brevicula* Gray, *G. laciniata* R.-P., *capitata* Dougl., fr. *G. à bouquets* etc., s. *Ipomeria*, *Ipomopsis* u. *Cantua*.
- Gillenia** Mch. (Rosac. *Spiracæen*, XII. 4) „Gillen's“-*Spiræe*, fr. *Gillénie* (n. d. Arzt Ant. Gillen, s. d. Aut.), z. B. *G. trifoliata* Mch.

1) Ähnliche sind noch *Ifoga*, *Logfia* u. *Oglifa* Cass.

D. V.

- (*Spiraea trif. L. u. Gastonia palmata Roxb.*), fr. G. à trois folioles, e. three-leaved G.
- Gingko L.** (Coniferen Cupressineen od. Taxineen, XXI. 5) „Gingko-baum“ (vaterl. Name!), *G. bilöba L. m. v. v.* (*Arbor nucifera folio adiantino Kämpf.*), fr. gingo u. noyer de Japon, e. gingko-tree, s. *Salisburia adiantifolia Sm.*, e. maiden-hair-leaved Sal.
- Githago Desf.** (sc. *Agrostemma*) L. (*Caryophylleen od. Sileneen*, X. 5) Rade, Kornblume (— rade), fr. lampette, e. darnel (git od. gith, n. *Plinius eig. d. Schwarzkümmel in Saaten!*), *G. segëtum Desf.* (*Lychnis Githago Lam. s. segëtum W. (nicaensis A. Br.) = Agrost. Gith. L.*)
- Glabraria L.** (Laurineen, XVIII. 4) Glatt- od. Leichtholz - Lorbeer (glaber, -bra glatt), s. *Arbor similis Camphorae od. Lignum laevis minus Rumph.* (laevis glatt, levis leicht — n. *Rumph. gering. spec. Gewicht.*)
- Gladiölus T., L.** (Irideen, III. 1) „Schwertel“, Siegwurz, fr. glaiëul (glayeu), espatule, e. sword-lily „Schwertlilie“ (dem. v. *gladius* Schwert), Gärt. u. Topfzier. *G. communis L.*, fr. glé od. glaiëul commun, e. common sw.-lil., *G. gandavensis Hort.* „Genter“-S. m. viel. v. v., *byzantinus Mill.*, *Colvilli Sweet*, *cardinalis Curt.* „Scharlach“-S., *ramosus Schneevogt*, *psittacinus Hook.*, etc.
- Glaucium T., L.** (Papavaceen, XIII. 1) Hornmohn, Gilbkraut O. W., fr. glaucie, pavot cornu, e. horned poppy (v. *γλαυκός* blaugrün — näml. d. Blätter!), Zier. Gl. *lutëum Scop.* (*Chelidonium Glaucium L.*, *Gl. flavum Crantz*), fr. gl. jaune, *corniculatum Curt. s. phoeniceum G. (Chelid. corn. L.) m. v. tricölor Bernh.*
- 1) **Glaux L.** (Primulaceen, V. 1) „Milchkraut“, Sermel O. W., fr. herbe au lait (— aux nourrices), e. milk-trefoil (v. *γάλαξ* Milch, *Paxt. u. Wtst. v. γλαυκός* s. eb.), *G. maritima L.* 2) **Glaux Bauh.** (sc. *Astragalus*) L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Schwielenblasen-Traganth.
- Glaziova Wendl.** (Palmen, XXI. 6) „Weddel“- od. Sprühpalme (— wie ein versprühender Springbrunnen!), Zier. *G. elegantissima Wendl.*, s. *Cocos Weddeliana Hort.* (Nam. in Brasil).
- Glecoäma (-chöma) L.** (Labiaten, XIV. 1) Gundelrebe, eig. Gunderrebe Mej., Gundermann, Grund- od. Erdrebe, Erdpheu, fr. lierre-terre, e. ground-ivy, cat's-foot, tunn-hoof (gr. *γλήχων*, lat. *pulegium Poley*, eine Lippenpfl.), s. *Glechon Spr.*
- Gleditschia L.** (Legumin. Mimoseen od. Cassieen, XXIII. 2) Lederhülsenbaum, s. g. Christusdorn (n. Prof. Gleditsch in Berlin, s. d. Aut.), Zier. *G. triacantha L. m. v. v.*, fr. fëvier d'Amérique „amerik. Bohnhülsenb.“, e. honey-locust, amerik. thorny Acacia od. sweet-locust, e. auch three-thorned hon.-loc., *G. inermis Hort.* (*Mimosa Houstoni l'Hér.*), s. *G. sinensis Lam. s. horrida W. m. v. inermis Hort. (G. japonica Lodd.)*.
- Gleichenia Sm.** (Farne, XXIV. 1) „Gleichen's“-F. (n. d. Bot. u. Mikrosk. Frhrn. v. Gleichen-Rusworm in Franken, † 1783). — *Gleicheniacëae Kze., DC.*
- Glinus L.** (Ficoideen od. Aizoideen Tetragoniaceen, XI. 4) „Klebrüster“, fr. glinole (*γλίρος* v. *γλία* Leim = klebr. Rüster F. W. Riemer, von Theophrast angew. auf Masholder, *Paxt., Wtst.*), z. B. *G. lotoides L. u. dictamnoides L.*
- Globularia L.** (Globularieen od. Buchnereen, IV. 1) „Kugelblume“, fr. boulette od. marguerite bleue, e. globularia (globulus dem. globus Kugel), Zier. *G. longifolia Ait. (salicina Lam.)*. — *Globulariëae DC.* (zu *Personatae Bucheriëae Rehb.*).
- Gloriösa L.** (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Prachtlilie“ (*gloriosus ruhm-*

- voll etc.), Zier. *G. superba* L. (Methonica Red.) (Ind.), Leopoldi Hort. (Westaf.), etc.
- Glossarrhen** Mart. (Violariaceen, V. 1 od. XIX. 6) Zungenveilchen, „Beutelszunge“ (*γλώσσα* Zunge u. *ἄρσόνιον* männlich etc. — Antherenspitze mit Zungenanhang), *G. floribundus* u. *pauciflorus* Mart. (Str. Brasil.), s. Schweiggera St. Hil.
- Glossodia** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Zungen“-O. (*γλωσσώδης* [zungenähnlich — Zungenanhang zwisch. Columna u. Labell), *G. major* u. *minor* R. Br. (Neuholl.).
- Gloxinia** l'Hér. (Gesneraceen, XIV. 2) „Gloxinie (n. d. Arzt Gloxin in Colmar, s. d. Aut.), Warmh. *G. hybrida* Hort. m. v. *crassifolia*, *speciosa* Ker (*Ligeria* sp. Ker), m. v. *erecta* Hort.
- Glumacēae** Bartl., Endl., DC., Rchb., Ord. d. Spelzblütigen od. Balgpflanzen (Graminēae u. Cyperoidēae).
- 1) **Glyceria** R. Br. (Gräser, III. 2) „Süssgras“, Schwaden Grck., Manna-schwengel, fr. herbe à la manne (manne de Prusse, - de Pologne), chien-dent aquatique (v. *γλυκερός* süß), *G. fluitans* R. Br. „Mannagrütze“, s. *Festuca fluit.* L. (*Poa* fl. Scop.), *G. aquatica* Wahlbg. „Wasserschwaden“ (*G.* s. *Poa altissima* Mnch., *Poa* aq. L., *G.* *spectabilis* M.-K.). 2) **Glyceria** Nutt. (Umbelliferen, V. 2) Wassernabel, *G. repanda* Nutt. u. *erecta* Nutt., s. *Hydrocotyle repanda* Pers. u. *erecta* L.
- Glycine** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Süssbohne“ (gr. *γλυκινός* od. *γλυκίς* süß), Zier. (Wanddekor.) *G. chinensis* Sims (*Wistaria* chin. DC.), m. v. v., *G. frutescens* L. (Wist. fr. DC. s. *speciosa* Nutt.), fr. *G.* d'Amérique, e. shrubby Wurm. od. kidney-bean-tree, *G. subterranea* L., s. *Arachis africana* Burm, fr. haricot de terre (- du Pérou), *G. arborescens*, fr. haricot en arbrisseau „Bohnenbaum“, etc.
- Glycirrhiāa** T. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Süssholz, „Süsswurzel“, fr. réglisse, e. sweet-root (s. eb. u. *ρίζα* Wurzel), *G. echinata* L., *glabra* L., etc.
- Glycosmis** Corr. (-mīda Spr.) (Rutaceen od. Aurantiac., X. 1) „Süssduft“-Limonie (s. v., *σμούνη* Duft), *G. pentaphylla* Corr., s. *Limonia* dent. (Sclerostylis Blum.), *G. arborea* Corr., *cyanocarpa* Spr. u. *chlorosperma* Spr., s. *Cookia cyan.* u. *chlor.* Blum.
- Glycyphylla** Raf. (Ericaceen, VIII. 1) „Süssduftblatt“ (*γλυκίς* u. *φύλλον* Laub — d. Blätt. riech. angenehm!).
- Glyptostrobus** Endl. (Coniferen, Cupressineen, XXI. 9) Nuss-Cypresse, s. *Cupressus nucifera* Hort. (v. *γλυπτός* Kupfer- od. Stahlstich, *στρόβος* Kreisel etc. — d. Früchte oben m. gefurcht. Torus).
- Gnaphalium** T., L. (Compos. Inuleen od. Gnaphalieen, XIX. 2) Flocken- od. Ruhrkraut, fr. herbe à coton, e. petti-cotty (v. *γναφάλιον* Flocke, Wolle etc.), z. B. *dioecum* L., fr. pied-de-chat „Katzenpfötchen“, e. dow-weed, s. *Antennaria* d. R. Br., *G. arenarium* L. (*Helichrysum* ar. DC.) „Sand-Immortelle“, -Immerschön Grck., fr. bouton d'or, e. everlasting-flower, als Zier. (Teppich) *G. lanatum* Hort. (*Helichrysum petiolatum* DC.), Gartenzier. *G. margaritaceum* L. perlköpf., fr. bouton d'argent od. perlière. — Gnaphaliēae Less.
- Gnetacēae** DC. (zu Urticacēae Rchb., Piperacēae Gaud., Coniferae Carr.), s. *Gnetum* L.
- Gnētum** L., Sm. (-ton Blum.) (Gnetaceen, XXI. 9) Meerträubel, z. B. *Gn. Gnemon* L. ind. *Gnemon*baum D. (st. *Cnetum* od. *Cnethum* v. *ζνιγ'θη* i. q. *ζνιδη* Nessel? — od. st. *Genetum* v. *γενητός* geboren? Wtst. d. veränd. *gnemon*! — ungewiss!).
- 1) **Gnidia** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Gnidischer“ Lorbeer od. ital. Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- Zeiland (v. Gnidus od. Cnidus, Seestadt in Karien), Zier. G. imbricata Thb., radiata Burm., pinifolia L. f., etc., s. Passerina u. Daphne.
- Godetia** Lindl., Spach (Onagrarien, VIII. 1) „Godetie“ (n. d. Bot. u. Reis. am Kaukasus, Ch. d. Godet, s. d. Aut.), Garten G. rubicunda Spach (Oenothēra purpurēa Curt.), fr. énothère pourpre, e. ruddy God. m. v. v., G. Lindleyana Spach (Oen. Lindl. Dougl.), etc.
- Goethēa** Nees, Mart. (Geraniac. Wallichieen od. Malvaceen, XVI. 4) „Goethe“-Geranium (n. d. Dichter W. Goethe), z. B. semperflorens u. cauliflōra Mart., s. Pavonia Cav.
- Goldfussia** Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Goldfuss“-Acanthus, G. anisophylla Nees, s. Ruellia anis. (n. d. Prof. Goldfuss in Bonn, † 184*).
- Gomotia** Mut. (-zia L. f., Schreb.) (Rubiaceen, IV. 2) „Gomozie“, Zier. G. granadensis L. f. Granatbeerensträuchlein, s. Nertēra depressa G.; viell. richtiger: Gomezia Mut. (Rubiaceen, IV. 2) (n. Bernh. Ant. Gomez, Verf. e. bot.-med. Werks üb. brasil. Pfl. 1803).
- Gomphidium** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Pflockgleicher“ (γόμεφος Pflock, Keil, εἶδομαί gleiche), s. Gomphus Pers. Keilpilz, z. B. G. glutinosus u. viscidus, schmieriger u. klebriger K.
- Gompholobium** Sm. (Cassieen, X. 1) „Pflockhülse“ (γόμεφος u. λόβιον dem. λοβός Hülse — diese wie ein Nagelkopf), Zier. G. splendens, barbigerum DC. „bartführende“, polymorphum R. Br., virgatum ds. etc., s. Burtonia R. Br. u. Jacksonia ds.
- Gomphrēna** L. (Amarantaceen, V. 2) Kugelamarant, s. g. Winterblume od. rote Immortelle, fr. fleur immortelle od. gomphrēne (v. γόμεφωμα Verbindung? — ungewiss!), Zier. G. globosa L. m. v. nana compacta, aurantiāca Decsn. (Haageana Klotzsch), etc.
- Gomphus** Pers., Nees (Pilze, XXIV. 4) „Keilpilz“ Kumm. (γόμεφος Pflock, Keil) (zu Agaricus L.), z. B. rosēus s. glutinosus Pers. (Nadelw.).
- Gongōra** Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Gongora“-O. (n. Don Aut. Caballero y Gongora, Vicekön. von Neugranada, Wtst. Bisch. v. Cordova, Gönner v. Mutis), z. B. Charontis Rchb. f., portentosa Lindl. „abenteuerliche“, quinquenervis R.-P. (Südamer.) etc., s. Coryanthes, Cirrhaea u. a.
- Goniolimon** Boiss. (Plumbagineen, V. 5) „Eckwiderstoss“ (γωνία Ecke Limonium, s. d.), Zier. G. tataricum Boiss. (Statice tat. s. strigosa Pall.), G. eximium Boiss. (Statice ex. Schrank), speciosum Boiss. (Limonium spec. Pers.), Stat. argentēa Siev., etc.
- Goniophlebium** Blum, Presl. (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) „Eckader“-F. (s. eb. u. γλέψ, -εβός Ader — die Nerven d. Wedel bilden drei- u. viereckige Figuren), Stuben G. argūtum Sm., subauriculatum Blum.
- Gonolobēae** (sc. Asclepiadēae) Rchb., sogl.
- Gonolobus** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Kantenhülsen“-Wachspfl. (γώνος Eck, Kante, λοβός Hülse — diese kantig, dreirippig), z. B. Schlingstr. (Südamer.), G. filiformis R. Sch. (Cynanchum leucanthum Jacq. s. Asclepias Jacquiniana Dietr.), guianensis Spr. (Cynanch. viridiflorum Mey.).
- Goodenia** Sm. (Goodenovieen od. Campanulac. Lobelieen, V. 1) neuholl. Goodenough-Strauch, (n. d. engl. Bot. Dr. Goodenough, † 1827), Stuben G. grandiflōra Sims, ovata Sm.
- Goodenoviēae** R. Br. (zu Ord. Campanulīnae Bartl.), s. eb. Goodenia Sm.
- Goodia** Salisb. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Good's“-Ginster (n. Pet. Good, Samml. für d. Kew-Gärten in Neuholl.), Gewächsh. latifolia Sal. (Str. Neuholl.), polysperma DC. (Cytīsus tomentosus Andr.), simplicifolia Spr. (Platychilum Celsiusianum Delaun.), etc.

- Goodyēra** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) Spalt-O., Sacklippe (n. d. engl. Bot. John Goodyer zu Hamshire), *G. repens* R. Br. (Neottia rep. Sw., *Satyrium* r. L.), Gewächsh. pubescens Lindl.
- Gorinkia** Presl., s. *Conringia* Heist. (n. d. Nam. Conring, nicht Gorink!).
- Gordonia** Ellis (Theaceen od. Malvac., XVI. 8) „Gordonsstrauch“ (n. d. Gart.-Insp. Alex. Gordon zu Mile-Land, London), Zier. *G. javanica* Ell., s. *Franklinia* Alatumaha Marshal, *Lasianthus*, *Alcea* u. *Laplacea* Kth. inaequalitēra Schott.
- Gorteria** L. (Compos. Gorterieen, XIX. 3) „Gorterie“ (n. d. holl. Prof. Joh. v. Gorter zu Harderwyk, † 1783), z. B. *G. (Gazania) ringens* Thb. u. splendens Hort., *pectinata* Thb. (*Gazania speciosa* Less.), *G. fruticosa* L. f. (*Attractylis oppositifolia* L.). — Gorterieae Rchb.
- Gossypium** L. (Malvaceen, XVI. 8) Baumwollpflanze, -strauch, -staude, fr. cotonnier, e. cotton-tree (v. gossium Wulst v. d. arab. goz od. gothn sanfte Substanz), *G. herbaceum* L., *G. carpas*, *G. religiosum* L. (Chin., Ind.) Nanking-B., *G. arborēum* L. (Ind.).
- Graminēae** DC., Rchb. (-ina Juss.) (zu Ord. Glumacēae Bartl.) Gräser (gramen, -inis Gras).
- Grammanthes** DC. (Crassulaceen, V. 5) „Schriftblume“, fr. grammanthe (γράμμα Buchstabe, άνθη Blüte — d. Buchst. V auf d. Blumenblätt.!), Zier. *G. gentianoides* DC., s. *Vauanthes* Haw. u. *Crassula* L.
- Grammatocarpus** Presl. (Loasaceen, XIII. 1) „Schriftfrucht“ γράμμα, -ατος Schriftzug, γρατός Fr. — d. Kapsel linienförmig gedreht), Zier. *G. volubilis* Presl. (*Scyphanthus elegans* Don).
- Grammatophyllum** Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schriftblatt“ (s. v., γράλλον Laub — Blätt. linienförm. gestreift), z. B. *Roemplerianum* Rchb. f., *speciosum* Blum. (Ind.), s. *Angraecum scriptum* Rumph. (*Epidendrum* scr. L. f., *Gabertia* scr. Gaud.).
- Grammitis** Sw. (Farne, XXIV. 1) Voll- od. „Schrift“-F. (v. γραμμή Schrift — linienförm. Sporangien), z. B. *Ceterach* Sw. (*Ceterach officinarum* W.).
- Granadilla** T., DC. (Passifloreen, XX. 4) „Granadille“, fr. grenadille, e. granadille (span. Name für *Passiflora* Passionsblume!), s. *Passiflora* L.
- Granatēae** DC., Seub. (zu *Lythraeae* *Salicariēae* Rchb.) Granatbäume, s. sogl.
- 1) **Granatum** (sc. Punica) L. (Salicariēen Granateen, XII. 1) „Granatbaum“, fr. grénadier, e. granate, pomegranate (lat. pomum granatum „kernvoller Apfel“, v. granum Korn). 2) **Granatum** litorēum Rumph., s. *Xylocarpus Granatum* Kön. (Meliaceen, VIII. 1) ostind. Grenadillenholz, fr. grenadille de marqueterie.
- Graphophorum** Desv. (Gräser, III. 2) Pinselgras, „Schriftträger“ (v. γραφή Schrift, φορός tragend — d. Spelzen gekielt), z. B. *cynosuroides* Kön. (*Triodia cyn.* Spr.).
- Graphis** Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Schriftflechte“ (v. γραφή Schrift — Ansehen d. Flechte!), z. B. *Dumastii* Spr., s. *Fissurina* Dum. Fée.
- Gratiola** L. (Scrophularineen Gratioleen, II. 1) „Gnadenkraut“ (v. gratia od. grates Gottesgnade), *Gr. officinalis* L., fr. gratiole od. séné des prés „Wiesen-Sennes“.
- Grevillēa** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Greville's“-Silberstrauch (n. d. Bot. C. F. Greville, † 1809, Paxton, od. n. Rob. Kaye Greville, ber. schott. Kryptog.), Zier. *G. bipinnatifida*, *flexuosa*, *sericea*, etc.
- Grewia** L., Juss. (Tiliaceen, XIII. 1) „Grews's“, *Grew's-Capstr.* (n. Nehem. Grew, s. d. Aut.), z. B. *G. Microcos* L. (*Microcos paniculata* G.), *G. elastica* Juss. (Faserpfl. Ind.'s.).
- Greyia** Hook., Harv. (Saxifrageen, X. 2) „Grey's“-Kafferstrauch (n. Lord Grey of Groby?), *G. Sutherlandi* Hook.
- Griffinia** Ker (Amaryllideen, VI. 1) „Griffin's“-Narzisse (n. W. Griffin

- Esq. v. South-Lambeth), Stuben Gr. Blumenavia K. Koch u. Bouché u. hyacinthina maxima.
- Grimmia** Ehrh. (Moose, XXIV. 3) „Grimm's“-M. (n. d. Arzt J. F. K. Grimm in Gotha, † 1821, schr. Fl. v. Eisenach), z. B. G. pulvinata Ehrh. „Polster“-M.
- Grossularia** Scop. (sc. Ribes) L. (Ribesiaceen, V. 1) Stachelbeere, „Kräuselbeere“, fr. grosseille (-eillier épineux), e. goose-berry-bush, fea-berry (feabe) (v. grossus dick, dem. grossulus kleine unreife Feige, od. viell. d. Altname „creutzelbeere“ latinisiert, Rümpler). — Grossulariëae (zu Peponiferae Leun. Ribesiaceae Rchb.), -aceae DC. Grck.
- Grubbia** Berg., Schreb. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Grubbia“ (n. Mich. Grubb, Vorst. d. ostind. Gesellsch., schr. Beitr. z. Capflora), G. rosmarinifolia Berg., s. Chamaelea africana Herm.
- Gruinales** Endl. „Storchschnäbler“ (v. grus, -uis Kranich).
- Guaiaecum** L. (-jaecum Plum.) (Sapindac. Zygophylleen, X. 1) Franzosenholz v. St. Domingo, fr. gayac, bois-saint-à-pians (südam. Name d. Pfl. gujak!), G. officinale L. „Pockenholz“.
- Guajava** T. (-jaba) (Myrtaceen, XII. 1) Kujavebaum Leun. (vaterl. Name!), G. pyriformis G. s. alba dulcis Comm., pomifera Bauh. s. alba acida Pluk., s. Psidium pyrifera u. pomif. L.
- Guazuma** Plum., Juss. (Malvac. od. Büttneriac., V. 1) Ochsenfrass, -brot (Nam. d. Pfl. in Mexiko), G. polybotrya Cav. u. tomentosa Kth., s. Bubröma pol. W. u. Theobroma Guazuma L.
- 1) **Guettarda** Vent. L. (Rubiaceen, XXI. 7) „Guettard'sbaum“, fr. guettard (n. d. franz. Pflanzen-Physiol. Et. Guettard, 1748), G. speciosa L., fr. fleur de St. Thomé. — Guettardiëae (zu Rubiaceae) Rchb. 2) **Guettarda** Schreb. (Styracineen, XI. 1), G. argentea W., s. Halesia arborescens P. Br.
- Guilandina** Juss. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Kugel- od. Schusserbaum, fr. eniquier od. guënic, e. nicker-tree (n. Melchior Wieland, latin. Guilandus, Prof. in Padua, † 1590), G. Bonduc L., fr. bon duc, G. Moringa L. (Moringa polysperma G.) Behennussbaum, fr. ben, e. ben-nut, s. Hyperanthera Mor. Vahl, blaues Santel- od. Griesholz (lignum nephriticum), Zier. G. dioeca L. s. inermis Duham. (Gymnocladus canadensis Lam.), G. echinata Spr., s. Caesalpinia echinata autt. „Brasilienholz“.
- Guilelma** (-lielma) Mart. (Palmen, XXI. 6) „Wilhelminen“-P. (n. d. Kön. Kar. Wilhelmine v. Bayern, † 1841), G. speciosa Mart., s. Bactris Gachipaes Hb. u. Kth.
- Gunnëra** L. (Urticac. Artocarpeen od. Gunneraceen, II. 1) „Gunnërpflanze“, fr. gunnëre (n. d. Prof. Gunner in Kopenh.), Ornament G. perpensa L. (Perpensum blitispermum T.), Zier. G. scabra R. P. s. Panke acaulis Molin. „Panke“, s. g. Rhabarber-G., G. manicata, s. Misandra Comm. u. Acanthospöra Spr.
- Gustavia** L. (Myrtac. Melaleucac., XVI. 8) „Gustavbaum“ (n. König Gustav III. v. Schweden), Warmh. G. augusta L., s. Perigara hexapetala Aubl., Warmh. ferner G. speciosa DC., insignis Hook., fastuosa W., gracillima Miers, etc.
- Gutierrezia** Lag. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Gutierrezie“, fr. gutierrezie (n. d. span. Bot. Gutierrez), Herbstzier. G. gymnospermoïdes Lag. (Gunthera viscosa Reg.), linearifolia Lag. (Galinsogea l. Spr.), etc.
- Guttiferae** Juss., DC., Endl., Rchb. (ungramm. Guttaeferae Kön.) Harzsafthaltige (gutta Tropfen, fero trage).
- Guzmannia** Rz. Pv. (Bromeliac., V. 2) „Guzmannie“ (n. d. span. Nat. u. Sammler A. Guzmán), Zier. G. tricolor R. P. (Pourretia sym-

- pagentéra R. P.) u. picta R. P. (Nidularium fulgens Lem.) etc., s. Pitcairnea l'Hér.
- Gwillimia** Rottl., DC. (zu Magnolia L.) (Magnoliaceen, XIII. 7) „Gwillimie“, asiat. Magnolie (n. d. franz. Bot. Guillemeau?), G. (Magn.) Yulan Desf.
- Gymnadenia** R. Br. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) „Nacktdrüsen“-O., Händelwurz O. W. (γυμνός nackt, ἀδην, -έρος Drüse), s. Orchis L. u. Habenaria W.
- Gymnanthëra** R. Br. (Asclepiad. Periploceen, V. 2) „Nackt-Anthere“ (s. eb., ἀνθηρά Staubbeutel), G. nitida R. Br. (Str. Neuholl.).
- Gymnocladus** Lam. (Cassieen Cäsalpinieen, XXII. 9) „Nacktabaum“, Schusserbaum (s. v., κλαδός Ast — nach d. Abfall. d. Blätt. auffall. nackte Aste!), Zier. G. canadensis Lam., s. Guilandina dioeca L.), fr. cliquier od. bon duc du Canada, ésciot Dietr., e. Kentucky-Coffee-tree, amer. stump-od. nicker-tree „Knickerbaum“, s. Hyperanthera dioeca Vahl.
- Gymnogramma (-me)** Desv. (Farne, XXIV. 1) „Nacktschrift“-F. (s. v., γράμμα od. -μή Schriftzeichen — nackte Sporangien wie Schriftzüge!), Zier. G. peruviana argyrophylla s. argyrea Hort. u. chrysophylla Kaulf. aurea Hort. „Gold- u. Silber“-F., G. Wetenhalliana (Schwefelpuder, Blattquasten), sulphurea Desv., Lancheana Hort. (schönste Form!), etc., s. Acrostichum L., Grammitis Sw., Hemionitis L. u. a.
- Gymnomycetes** Rehb. „Nacktpilz“ (s. v., μύκηξ, -ητος Pilz).
- Gymnospermae** Endl., Kl. d. Nacktsamigen (στέρωμα Samen) i. q. Coniferae Zapfenträger (Nadelhölzer).
- Gymnostachyum** Nees, Ch. Lem. (Acanthaceen, XIV. 2) „Nacktähren“-Acanthus (s. v., στάχυς Ähre — Ährenkolben blattlos! Wtst.), Zier. G. Verschaffelti Ch. Lem. (Blattpfl.), etc., s. Fittonia Coëm.
- Gymnōthrix** DC., P.-B. (Gräser, III. 2) „Nackthaar“ (s. v., θρίξ Haar — Borstenhülle d. Blüt. fällt ab), Zier. G. caudata Schrad., japonica Kth. u. latifolia Schult., G. crinita Hb. s. Pennisetum cr. Spr.
- Gynandrae** Endl. (zu Amphibraya Endl.) Kl. d. Weibermännigen (γυνή u. ἀνήρ, ἀνδρός Weib u. Mann — mit einand. verwachsen!).
- Gynandria** L. „Weibermännige“ (XX. Kl.) (s. eb. — verwachs. Geschlechtsteile d. Blüten!).
- Gynerium** Hb. u. Bpl., Nees (Gräser, XXII. 3) „Frauenhaar“, Pampasgras, fr. herbe géante des pampas (γυνή u. ζοιον Wolle — rauhaar. Spelzen d. weibl. Blütchen), Zier. G. argentëum Nees, fr. Gyn. argenté od. roseau à plumes, e. silver-Gynerium.
- Gypsocallis** D. Don (Ericaceen, VIII. 1) „Gypsschöne“, fleischfarb. Heide, G. carnëa D. Don, fr. bruyère à fleurs carnées, e. flesh-coloured Moor-Heath (γύψος Gyps. κάλλος Schönheit — auf Kalkboden, schöne Pfl., Wtst.), s. Erica saxatilis Salisb. (hederacëa L., bracteata Mnch.).
- Gypsophila** L. (Silenaceen, X. 2) „Gypslieb“, -kraut, fr. gypsophile u. soude vermiculaire „Wurm-Salzkraut“ (G. Struthium L. „Seifenkr.“), Zier. (Bouquete) G. paniculata L., elegans M.-B., Stevenii Fisch., scorzonerifolia Desf., muralis L. etc. (s. eb. u. φιλί Liebhaberin — liebt sonnig. trockn. Kalkboden).
- Gyrocarpus** Jacq. (Myrobalaneen, XXIII. 1) „Kreisel Frucht“ (v. γυρόω drehe im Kreise herum, καρπός Frucht — d. Fr. beim Hochwerfen weg. d. Flügel), G. americanus Jacq., asiaticus W. s. Jacquini Roxb. (Bäume).

- Habenaria** W., R. Br. (Orchid. Ophryd., XX. 1) Zaum- od. Zügel-O., Riemenlippe (v. habēna Zügel — Lippe riemenförm., Fadenorg. an d. Antherenbase), *H. bifolia* R. Br. (Platanthēra b. Rehb., Orchis b. L.), *viridis* R. Br. (Plat. vir. Lindl., Satyrium v. L.), *albida* Sw. (Gymnadenia albida Rich., Orchis a. Scop. etc.).
- Hablitzēa (-tzia)** M. B. (**Habzelia** DC.) (Chenopodiaceae od. Annonaceae, V. 1 od. XIII. 7) Guineapfeffer (n. C. v. Hablitz, Reis. in d. Krim, Wittst. n. C. L. Hablitzl aus Preussen, in Russland erzogen, Begleit. v. S. G. Gmelin etc., schr. üb. Taurien), *H. tamoides* M. B.
- Habranthus** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (zu Amaryllis Herb.) „Pracht“-Narzisse (*ἀβροῦς* reizend etc., *ἀνθος* Bl.), Zier. *H. intermedius* Herb., *kermesinus* Sweet, *Andersoni* Herb., etc.
- Habrothamnus** Endl. (Solaneen od. Celastraceen, V. 1) „Prachtstrauch“ (s. eb., *Γάμνος* Strauch), Winterzier. *H. elegans* Brongn., *corymbosus* Endl. (Meyenia Schldl.), *Regelii* Planch. (Guatemala), etc.
- Habzelia** DC. f. (Annonaceae, XIII. 7) Guineapfeffer, fr. coraya (v. habzeli, d. äthiop. Namen d. *H. aethiopiaca* (Piper aethiop.), s. *Hablitzēa* M.-B.
- Hackēa** Schrad. (**Hakea** Wendl.) (Proteaceen, IV. 1) „Hake's“-Strauch (n. d. Bot. u. hannövr. Minist. Frhrn. v. Hake), Gewächsh. *H. petrophyloides*, *florida* u. *nitida* R. Br., etc., s. *Conchium* Sm. u. *Banksia* R. Br.
- Haecquetia** Neck. (Umbelliferen, V. 2) Hüllen- od. Kleinkopfdolde, Doldenköpfchen (n. d. Prof. Balth. Hacquet in Lemberg, † 1788), z. B. *H. Epipactis* DC. gelbgrüne *H.*, s. *Astrantia* L. f. s. *Dondia* Epip. Spr.
- Haemadictyon** Lindl. (Apocynen, V. 2) „Blutnetz“ (*αἷμα*, -ατος Blut, *δίκτυον* Netz — grosse dunkelgr. rotdurchad. Blätt.), Warmh. *H. nutans* A. DC. (*Echites rubro-venosa* Lindl.) m. v. *maxima* (Prachtbelaubl.).
- Haemanthus** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Blutblume“, — Narzisse, fr. *hēmanthe* od. *fleur de sang*, e. blood-flower (s. e. u. *ανθος* — Blume tiefrot), Stuben *H. coccineus* L., fr. *serpentaire*, *H. puniceus* L., *cinnabarinus* Decsn., *albiflos* Jacq., *spiralis* Ait. (*Strumaria spir. Ker*), *multiflorus* L., *Toxicarius* L. (gift.).
- Haematococcus** Ag. (Urkornalgen od. Nostochineen, XXIV. 3) „Blutkugelchen“, s. g. roter Schnee (s. v., *κόκκος* Korn), s. *Protococcus nivalis* Ag.
- Haematoxylon (-um)** L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Blut“- od. Campecheholz, Blauholz (s. v., *ξύλον* Holz — Farbe dess. blutrot!), *H. campechianum* L., fr. *campêche* od. *assourou*, e. blood-wood.
- Haemochäris** Salisb., DC. (Theaceen od. Ternstroemiaceae, XIII. 1) „Busch“- od. „Heckenthee“ (v. *αἷμος* Busch, Hecke, *χαῖρος* Freude — Wtst., *αἷμα* Blut? — Blum. meist schön rot?), s. *Gordonia* Spr., *Wickstroemia* Schrad., *Laplacēa* St. Hil.
- 1) **Haemodörum** Sm. (Liliac. Haemodoraceen, III. 1) Blutwurz, „-schlauch“ (*αἷμα* Blut, *δορῶς* Schlauch, Wtst.: *δώρον* Gabe — blutr. Wurzelknollen! *αιμώδορον* Theophr. i. q. *Orobanche cruenta* Bertol.), *H. brasiliense* Spr. (Hagenbachia br. Nees). — Haemodoraceae R. Br.
- 2) **Haemodöron** Wallr. (Rhinanthac., XIV. 2) „Blut-Ervenwürger“ (zu *Orobanche* L.).
- Hakēa** s. *Hackea*.
- Halesia** L. (Styracineen od. Ebenaceen, XI. 1) „Hales“-Storaxstrauch, fr. *halésier* (n. Steph. Hales, s. d. Aut.), Zier. *H. tetraptera* L. Schneeflockenbaum od. „Vierflügelfrucht“, e. common snow-drop-tree, *H. stenocarpa* K. Koch, *H. arborescens* R. Br. (*Guettarda argentēa* W.), etc. (Austral.).

- 1) **Halicaäba (-um)** Rumph. (Sapindac., VIII. 3) gem. Herzerbse (gr. ἄλικαζάβος d. arab. alkekengi), s. *Cardiospermum Halicaäbum* L., fr. cardiosperme, pois-de-coeur, cor-inde, Alkekenge. 2) **Halicaäbum** (sc. Physälis) Scop. (Solanaceen, V. 1) Judenkirsche, fr. coqueret od. alkékengi, e. ebenso od. winter-cherry, s. *Physalis Alkekengi* L.
- Halianthus** Fr. (Alsinaceen, X. 3) „Salzblume“, Salzmiere Grck., See- miere (v. ἄλις, -λις Salz od. Meer — salz. Standorte), *H. peploides* Fr., s. *Honckenya pepl.* Ehrh. (*Arenaria p. L.*, *Alsine p. Wahlbg.*).
- Halimodendron** Fisch. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Salzstrauch“ (*ἄλιμος* salzig, *δέσδορον* Baum — salz. Standort!), Zier. *H. argenteum* DC. (*Caragana arg. Lam.*), *Robinia Halodendron* L. f.), e. silver-leaved Salt-tree (Sibir.).
- Halimus** Wallr. (Atripliceen, XXI. 5) „Salzmelde“, Wasserburgel, fr. halime (s. eb.), *H. portulacoides* Wallr. (*Obione p. Moq. Tand.*, *Atriplex p. L.*).
- Halodendron** L. f. (sc. *Robinia ds.*) (Legum. Galegeen, XVII. 4) „Salz- baum“ (*ἄλις, -λις* u. *δέσδορον*), s. *Halimodendron* Fisch.
- Halodiscus** Ser., Rmpl. (zu *Spiraea L.*) (Rosac. Spiräac., XII. 4) „Salz- scheibe“? (s. v., *δίσκος* lat. discus Scheibe? wahrsch. fehlerh. st. *Holodiscus* Lauch., s. d.).
- Haloragæa** DC., Rchb., Halorrhagidacæa Grck. Wassernussgew., s. *Haloragis*.
- Halorägis** Forst. (richt. -orrhägis!) (Halorageen, VIII. 4) „Seebeere“, Wassernuss (*ἄλις, -λις* Salz, Meer, *ῥάξι, -αγός* Weinbeere — Früchte Weinbeeren ähnl., am Meeresgestade!).
- Hamamelidæa** R. Br. (zu Laurinæa Rchb., Ord. Umbellifloræ Bartl.), sogl.
- Hamamelis** L. (Hamamelideen, IV. 2) Zaubernuss, „Mitapfel“, Zaubers- hasel, e. witch-hazel (v. ἅμα zugleich, *μῆλον*, lat. malum Apfel — alte Frucht u. neue Blüte zusammen! Wtst.: eig. Homomelis v. ὁμός gleich — einem Apfel ähnl.), Zier. *H. virginica* L. s. *corylifolia* Mnch. m. v. *macrophylla* Hort., fr. pistachier noir, e. virginian witch-Hasel (wych-Hasel) virgin. Zauberst. — Hamamelæa DC.
- Hamulium** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Häkchen“-Alant? (v. hamulus Häkchen? — schwerl. v. *ἄμυλον* Stärkemehl!), s. *Verbesina alata* L.
- Hancornia** Gomez (Apocyneen, V. 1) „Hancornie“ od. Mangaiba (n. einem Portugies. Phil. Hancorn, Pfeiff.), *H. speciosa* Gom. u. *pubescens* Mart. (Str. Brasil.).
- Hardenbergia** Benth. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Hardenberg's“ od. Kennedy's-Bohne (n. einer Gräfin Hardenberg, geb. v. Hügel), s. *Kennedyia Vent.*
- Hardwickia** Roxb. (Cassieen, X. 1) „Hardwick's“-Hülsenbaum (n. d. Gen.-Maj. d. Artillerie Thom. Hardwick, Ostind. Compagnie), *H. binata* Rxb. (Faserpfl. Indiens).
- Harina** Hamilt. (Palmen, VI. 2) „Stall“-P.? (lat. hara Schweinstall? Wtst.: ostind. Name!), *H. caryotoides* Ham. s. *Wallichia car.* Roxb.
- Harmala** Mnch. (sc. Pegänum) L. (Rutac. Zygophylleen, XI. 1) gem. Harmala, Harmel- od. arabische Raute, fr. harmale (arab. harmel = Raute, Forskäl), *H. multifida* Mnch., s. *Pegan. Harm. L.*
- Harpalium** Cass., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Starr- oder „Packsamenbl.“ (*ἀφοιαλίς* od. *-λέος* festpackend — nämli. d. Samenhülle!), Zier. *H. rigidum* Cass., fr. soleil rigide, s. *Helianthus rigidus* Desf.
- 1) **Hartmannia** DC. (Compos. Madien od. Sigesbeckieen, XIX. 2) „Hartmannie“ (n. K. J. Hartmann, schwed. Arzt etc., s. d. Aut.,

Pfeiffer n. Jos. Ad. Hartmann, Reis. etc.), z. B. H. Streetsii Gray u. H. Madia L., s. Hemizonia. 2) H. Spach (Onagrarien, VIII. 1) Hartm.'s-Nachtkerze, H. macrantha Spach, s. Oenothēra tetraptera Cav.

- 1) **Hastingia** Sm. (Labiaten, XIV. 1) „Hastigie“ (n. Warren Hastings, Gen.-Gouv. Ostindiens, † 1818), Zier. H. coccinea Sm., s. Moluccella L. (Holmskioldia Retz.). 2) H. Kön. (Büttneriac., V. 1).
- Hauya** Moç. u. Sess. (Onagrarien Montinien, XXII. 4) „Hauy's“-Montinie (n. d. Mineralogen René Just. Hauy, † 1822 in Paris), z. B. H. elegans Moç. u. Sess.
- Haworthia** Duv., Salm-Dyck (Liliac. Aloideen, VI. 1) „Haworth's“-Aloë (n. d. engl. Bot. Haworth), H. albicans Duv., s. Aloë.
- Hebeclādus** Miers (Solanaceen, V. 1) „Flaumschoss“ (ἡβη Flaum, lat. pubes Mannbarkeitshaare, κλάδος Trieb, Ast), Zier. H. biflorus Hook. (Peru).
- Hebeclinium (-num)** DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Flaumlager“-Dosten (s. eb., κλίνη Bett, Lager — Pubescenz d. Fruchtbodens), Zier. H. janthinum DC., s. Conoclinium j. Moore.
- Hebelōma** DC. (Pilze, XXIV. 4) Jugend-Blätterpilz Kumm., „Flaumrand“ (s. v., λῶμα Saum etc. — bez. d. gefransten Manschette, Wtst.), H. fastibile, truncatum etc., s. Agaricus L.
- Hebenstreitia** L., Thb. (Buchnereen od. Selagineen, XIV. 2) „Hebenstreite“ (n. d. Prof. Hebenstreit in Leipzig, † 1757), Zier. H. dentata L. (alba Hort.), tenuifolia Schrad. (integrif. L.) etc.
- Hebradendron** Grah. (Guttiferen, XI. 1) „Hebräerbaum“ (ἑβραῖος hebräisch, δένδρον B. — rundum abspringende Antheren, wie durch Beschneidung), s. Garcinia amboinensis Gummiguttbaum (Stalagmites cambogioides W. s. Gutta Offiz.).
- Heatonia** DC., Richb. (zu Ranunculus L.) (Ranunculac., XIII. 7) Weissranunkel (ἑκατόν hundert — näml. Früchtchen in einer Blüte!), z. B. palustris u. pilosa Lour. s. cantoniensis DC., sowie Ran. pyrenaeus L., platanifolius L. etc.
- Hedēra** Sw., L. (Araliaceen, V. 5) Epheu, Eppich, fr. lierre (l'hierre), e. ivy, tree-ivy „Baumeppeich“ (v. d. celt. hedra Cordel od. Wtst. ἑδρα Sitz v. ἔζω sitze fest — an Stämmen etc.), wild u. Zier. H. Hélix L. europ. E. m. v. v. (palmata Hort. u. aborescens Hort., v. latimaculata elegans (um Spiegel herum), v. taurica Booth (Fenster. u. Ampeln), v. Leeana, v. digitata Hort., v. poetica Hort. etc.; H. hibernica Hort. irischer od. schott. E., H. colchica C. Koch (Roegneriana Hort.), H. algeriensis Hort. (canariensis W. u. maderensis Hort.). — Hederaceae A., Rich., DC.
- Hedycarya** L., Pers. (-ia Forst.) (Urtiac. Monimieen od. Nyctagineen, XXII. 9) „Süssnuss“, Stielnuss (ἡδύς süß, κάρυον Nuss — nussf. Früchte sehr süß!), z. B. H. dentata L. (Str. Neuseel.), hirsuta Spr. (Bengal.) etc., s. Hydrocarÿa Spr.
- Hedychium** Kön. (Scitamineen Alpinien, I. 1) „Süssschnee“, Kranzblume D. (s. v. u. γιών Schnee — Liebl. Geruch), Warmh. H. coronaria Kön. (Kaempferia Hedychium Lam.), Gardnerianum Wall.
- Hedycrēa** Schreb. (Amygdalaceen od. Myrobalaneen, XII. 1) „Süssfleisch“, Zuckerpflaume D. (s. v., καέα Fleisch — sehr süsse fleisch. Fr.), H. incana W. etc., s. Licania Aubl.
- Hedyotidēae** Cham., Schldl. s. Hedyōtis!
- Hedyōtis** Lam. (Rubiace. Cinchonaceen, IV. 1) „Süssohr“- od. Ohrkraut Leun., Oehrling D. (s. v., οὔς, ὄτος Ohr — bez. d. Blätterform u. weg. süß. Geruchs), H. Auricularia L. (Valerianella palustris Burm.), hispida Lam. (Oldenlandia umbellata L.), graminifolia L. s. herbacea Forst. (Old. stricta Sw.) etc.

Hedysarĉae Rehb., s. sogl.

Hedysarum L. (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) „Süss“- od. „Manna-
klee“, Hahnenkopf, fr. sainfoin u. tête de coq, e. cock's-head (gr. ἡδύσαρον v. ἡδύς süß u. σάρω Besen etc., Wtst. ἀρωμα Arom!),
Zier. H. coronarium L. spanisch. H. od. Kron-Mannäkle, fr. sain-
foin d'Espagne, e. garland-cock's-head m. v. fl. alb. Hort., H. ca-
pitatum Desf., H. sibiricum Poir., H. humile L., fr. tête de poule
„Hühnerkopf“, H. cordatum Thb. (Hallia cord. Thb.), H. hamatum
L. (Stylosanthes procumbens Schreb.), H. gyrans L. (Desmodium
gyr. Desv.) beweglicher S., H. Onobrychis L. s. Onobrychis sativa
Lam. s. viciaefolia Scop., Esparsette od. türk. Klee.

Heinsia DC. (-zia Van Houtt., -zia Scop.) (Rubiaceae. Cinchonac., V. 1)
„Heinsius“-Chinastrauch (n. d. Philolog. Heinsius, Übers. v. Theo-
phrast's Schr., Leyden 1613), Zier. H. tigrina.

Helenium L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Alant, fr. Hélénie, e. horse-
heal od. bastard-sun-flower (gr. ἑλέμιον nach Ἑλέριος, Sohn d. Kön.
Priamus v. Troja? Wtst. wohl v. ἥλιος Sonne — Gestalt d. Blume!),
Zier. H. autumnale L., tenuifolium Nutt., atro-purpureum Kth.
Bouché m. v. grandicephalum Lem., lanatum Spr. (Actinella lan.
Pursh), s. Trichophyllum l. Nutt., etc.

Heleocharis R. Br. (Juncaceen, III. 1) „Teichbinse“, -riet (ἑλος, -εος
Teich etc., χαῖρις Freude — wächst in Sümpfen!), H. palustris R.
Br. (Scirp. p. L.), uniglumis Lk. (Scirp. un. Lk.), multicaulis
Koch, etc.

Helianthemum T., Mill. (Cistaceen, XIII. 1) „Sonnenröschen“, fr. héli-
anthème, fleur du soleil u. herbe d'or, e. sun-rose (ἥλιος Sonne u.
ἄνθεμον i. q. ἄνθος Blume), Zier. H. polverulentum DC. (Cistus
apenninus u. polifolius L.), grandiflorum DC. (variabile Spach), um-
bellatum Mill., guttatum ds. (Cist. gutt. L.), vulgare G. (Chamae-
Cistus Mill.) m. v. lutëum fl. plen., v. album fl. pl. etc., H. coccī-
nëum Hort. v. fl. pl.

Helianthus L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sonnenblume“, fr.
hélianthe, herbe au soleil, fr. u. e. girasol, e. sun-flower u. turnesol
(ἥλιος u. ἄνθος), Zier. H. annuus L. (Peru) m. v. v. (uniflorus,
macrophyllus, gigantëus, flore pleno, globosus fistulosus Hort.), H.
indicus L. m. v. nanus Hort. fl. pl., H. multiflorus L. m. v. fl. pl.
u. orgyialis DC. (beide Nordamer.), H. argyrophyllus A. Gr., fr.
soleil du Texas; H. tuberosus L., fr. topinambour, s. g. Erdbirne
(cult.).

Helichrysum W., G. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Immerschön, Stroh-
blümchen, fr. éternelle od. immortelle, fleur de paille, e. eternal-
flower, everlasting- (gr. ἑλί- od. ἡλιόχορσος „Sonnengold“ — glänz.
goldgelb. Aussehen!), wild H. arenarium DC. Sand-Immortelle, s.
Gnaphalium aren. L., Zier. H. bracteatum W. (lucidum Hänk. s.
chrysanthum Pers.), Garten-Strohblume, m. v. v. brachyrrhynchum
Sond., Humboldtianum Gaud. u. orientale G. (Bouquet-I.), macran-
thum Benth. s. monstrosum Hort. m. v. monstr. purpureum nanum
fl. pl., H. creticum, s. Tinaria G. Fr. „Mottenkraut“, etc., s.
Elichrysum W. (s. d.).

Heliconia L. (Musaceen, V. 1) „Helikon“-Banane (n. d. Berg Helikon,
Sitz der Musen, Myth.), Warmh. H. farinosa, discolor s. bicolor Benth.
(Brasil.), Bihai Sw. „Pisang-H.“ (Musa Bihi Hort., Antill.) etc.

Helictëres L. (Sterculiaceen, XVI. 7) „Schraubenfrucht“-Malve, „Schrau-
benbohne“ Leun. (gr. ἑλικτήρ, -ῆρος Ohrgehäng — Kaps. spiral.
gewunden), z. B. H. lanata Krz. (Oudemansia l. T. u. B.), H. Isora
L. (Faserpfl. Ind. u. Jamaika's).

Heliophĭla L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Tagliebchen“, „Sonnen-

- freund“ Rmpl. (*ἡλιος* S. u. *φιλῆ*) Freundin — Standort sonnig!), Zier. H. pilosa Lam. s. arabioides Hort. (Orthoscēlis pil. Spach), circaeoides L. f. Chamira cornuta Thb.) etc., s. Cleōme, Pilosa u. Peltaria L. — Heliophilēae Rehb.
- Heliopsis** Pers. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sonnenauge“ Rmpl., fr. héliopside (s. v., *ὄψις* Gesicht etc. — gelbgestrahlte Blüten!), Zier. H. canescens H. B. K. (Helianthus buphthalmoides Hort.), laevis Pers. etc., s. Aemella, Buphthalmum u. a. — Heliopsidēae DC.
- Heliotropium** T., L. (Boragineen, V. 1) „Sonnenwende“, fr. héliotrope, fleur des dames, herbe aux chancres „Skorpionschwanz“, -aux verrues „Warzenkraut“, e. héliotrope od. turnsol u. scorpion's-tail (*ἡλιος* u. *τροπιῆ*) Wende, v. *τρέπω* wende zu, drehe — wendet sich d. Sonne zu!), Zier. H. grandiflorum Don, s. corymbosum R. P., H. peruvianum L. m. v. v. (Boucheanum, Volaterranum etc.), fr. h. du Pérou od. herbe du Saint-Fiacre, e. widow-wail „Witwenklage“, s. g. Vanillen-Hel.; wild H. europaeum L.
- Helipterum** DC. (Compos. Anthemideen od. Inuleen, XIX. 2) „Schraubenflügel“-Immortelle (v. Helichrysum u. *πτερόν* Flügel od. *ἔλιξ* Schraube — nur flaum. Pappus, sonst wie Helichrysum, Wst.) Sommer-Zier. H. anthemoides u. Sanfordi Hook. (Topf-Imm., Neuholl.), cassinianum DC., s. Schoenia Steetz.
- 1) **Helix** (sc. Hedēra) L. (Araliaceen, V. 5) europ. Epheu (s. Hedēra!) (*ἔλιξ* alles Gewundene!). 2) **H.** (sc. Salix) L. (Salicineen, XXII. 2) Purpurweide, s. Salix purpurēa L.
- Helleborine** Hall. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nieswurz“-O., fr. elleborine (v. Hellebōrus, s. sogl. — von Haller weg. d. Ähnl. damit so benannt!), H. latifolia Bauh. (Epipactis Helleborine Crantz), s. Serapias latif. W. (Epip. lat. All.), H. angustif. Bauh. (Serapias longifolia L.).
- Hellebōrus** L. (Ranunculac., XIII. 7) Nieswurz, fr. u. e. hellebore od. fr. herbe de cru, e. sneeze-wort (gr. *ἑλλέβορος*, n. Paxton v. *ἔλω* bin tödlich u. *βορᾶ* Speise — tötet durch ihren Genuss!), Zier. H. niger L. s. g. Christblume od. Schneerose O. W., fr. fleur d'hiver, e. christ-mass-rose, m. v. grandiflorus Hort., H. atrorubens W., Kit., purpurascens ds., orientalis Lam. (Griech.), olympicus Lindl., intermedius Guss. (Calabr.) m. v. abschasicus Hort., viridis L., wild H. foetidus L., fr. pièd de griffon „Greifenfuss“. — Helleborēae Rehb.
- Hellenia** W. (Scitamineen, I. 1) „Hellenius“-Gewürzllilie (n. C. N. Hellenius, Prof. in Åbo in Finnland, schrieb Dissert. acad. 1789 u. a.), H. coerulēa R. Br., rufa Presl., abnormis Ldl., grandiflōra Retz. (Costus speciosus Sm.), alba Retz. etc., s. Amōmum.
- Helminthia** Juss., Pers. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Wurmsalat“ Seub., -lattich H.-Rehb. (v. *ἑλμινθς*, -*νθος* Wurm — d. gestreift. Samen gleichen e. Hauf. Würmer), H. echioīdes G. scharfblättr., s. Picris ech. L.
- Helminthochorton** Ag. (-os Lk.) (Florideen-Tange, XXIV. 3) „Wurmtang“, -moos, -knotentang W. (s. eb. u. *ζύστος* Futter etc. — wirkt wurmabtreibend), s. Sphaerococcus s. Ceramium Helminthochortos.
- Helobiae** (richt. **Heleobiae**) Bartl., Endl. Kl. d. Sumpflilien od. Schlammwurzler Rehb. (*ἔλος*, -*εος* Sumpf, *βιώω* lebe).
- Helonia** L., W. (Juncaceen od. Melanthaceen, VI. 3) Torflilie, Schwindblume Rmpl., e. blazing-star (star-wort) (v. *ἔλος* Teich etc., *νηιάς* schwimmend — sumpflieb. Pfl.), Zier. H. latifolia Mchx. s. bullata L., s. Tofieldia calycina Wlnhbg. (Anthericum cal. L.) u. Scheuchzeria Pseudo-Asphodelus Scop.
- Helosciadium** Koch (richt. **Heleose.**) (Umbelliferen, V. 2) „Sumpfschirm“, Scheiberich O. W. (s. v., *σκιάδιον* Schirmdach v. *σκιᾶ* Schatten — in Sumpf wachs. Schirmpfl.!).

- Helosëris** (st. **Heleos.**) (zu *Cineraria*) Rchb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Sumpfsalat“ (s. v., *σέλις* Salat), s. *Cineraria palustris* L.
- Helōsis** Rich. (Balanophoreen, XXI. 1) Nagelstoss, -schosser (v. *ἤλος* Nagel, Zwecke u. *ᾠσις* Stoss — stösst nagelförmig hervor! Wtst. Schuppen nagel!). *H. guianensis* s. *cayennensis* Rich., s. *Cynomorium* cay.).
- Helospōra** Jacks. (Rubiaceen, IV. 1) „Nagelsamen“ (s. eb., *σπορά* Samen — diese krumm wie Krallen), *H. flavescens* Jacks. (kl. B.), s. *Timonius* fl. Bak. (Polyphragmon fl. Krz.).
- Helvella** L. (Pilze, XXIV. 4) Falten- od. Steinmorchel, fr. *hélvelle* (v. *helveolus* dem. *helvus* rötlich, od. *helus* i. q. *olus*, -ëris Gemüse, Helm. u. Rabenh. v. *helvor* schwelge: *helvella* jed. kl. Küchenkr.!), *H. esculenta* L. (essb.). — *Helvellacëi* Fr.
- Helwingia** W. (Santalac. od. Cornaceen, XXII. 3) „Helwingie“ (n. d. Bot. G. A. Helwing, Pred. zu Angersburg in Preussen, † 1748, schr. Fl. v. Preussen 1726 u. Flora campana Lps.), *H. ruscifolia* W., *japonica* W. (Osyris j. L.).
- 1) **Helxīne** Rchb. (sect. v. *Polygonum* L.) (Polygonaceen, VIII. 1) „Windknöterich“ (gr. *ἑλξίνη* eine schleppende Pfl. v. *ἔλξω* schleife etc. — windend. Wuchs!), z. B. *P. dumetorum* L., *Convolvulus* L., *tataricum* u. *Fagopyrum* L. 2) **Helxīne** Req. (Urticaceen, XXIII. 1) Wand- od. Glaskraut, *Helxīnes herba* Apoth. = *Parietaria* L., fr. *helxine* od. *pariétaire*, *H. Soleirolii* Requier, s. *Parietaria* Sol. Spr.
- Hemerocallis** L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) „Tagschöne“, -lilie, Affodil-Lilie Vilm., fr. *hémérocale*, e. day-lily (v. *ἡμέρα* Tag, *záλλος* Schönheit — nur b. hellem Tag offen!), Zier. *H. fulva* L. (*crocea* Hort.) m. v. v., *flava* L., fr. *lis jaune*, e. yellow day-lily, *H. coerulea* W. (*Funkia* coer. Andr. s. *ovata* Spr.) etc., s. *Funkia* Spr.
- Hemiandra** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Halbanthere“ (v. *ἡμι* halb, *ἀνήρ*, -*δοος* Mann, Staubbeutel — dies. nur halb!), Gewächsh. *H. pungens* R. Br. (Neuholl.).
- Hemiclīdia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Halbschliess“-Silberbaum (s. eb., *κλεις*, -*δος* Schloss — d. Frucht springt nur teilweise an d. Spitze auf), s. *Dryandra* R. Br.
- Hemimëris** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Halbblume“ (s. v. u. *μέρος* Teil — ein Teil d. Blume viel grösser, so dass sie halb scheint), Gewächsh. *H. urticifolia* u. *coccinea* (*Celsia linearis* Jacq.), *lineariifolia* H. B., *parviflora* ds., etc., s. *Celsia*, *Diascia* DC., *Alonsoa* R. P.
- Hemionītis** L. (Farne, XXIV. 1) „Esels“-Farn, fr. *hémionite*, Halbmondkraut, Gitterfarn (gr. *ἡμιονίτις* v. *ἡμιώνος* Halb- od. Maulesel — bringt kein. befrucht. Samen hervor), Zier. *palmata* L. u. *japonica* Thb.; *H. esculenta* Retz. (*Diplazium* esc. Sw.) etc., s. *Antrophyum* Kauf., *Scolopendrium* Sm. u. a.
- Hemitelia** Presl. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Halbschleier“-F. (*ἡμιτελής* halbvollendet — nämll. d. Fruchtschleiercheu zuletzt zurückgebogen), *Warnh. grandifolia* Spr. (*Cyathea* gr. W.).
- Henna** Alcanna Rauw. (Lythrarieen, VIII. 1) „Henna“- od. „Alkannawurz“, s. g. Schminke (vaterl.), s. *Lawsonia inermis* L. f. s. *alba* (*Alcannae verae radix* zum Rotfärben!).
- Hepatica** L. (Ranunculac., XIII. 7) „Leberblume“, fr. *hépatique*, e. liver-wort (v. *ἥπαρ*, -*ατος* Leber — weg. d. Blattlappen), Zier. *H. triloba* Chaix (*Anemone Hepatica* L.) m. v. v., z. B. *rubra* fl. pleno, fr. *herbe de la Trinité*, e. three-lobed-Hep., *angulosa* Lam. (grossblum. azurbl.) etc.
- Hepaticae** Juss. (-*ci* Rchb.) Kl. d. „Lebermoose“ (s. eb.) (einige geg. Leberkrankh.!).

- Heraclēum** L. (Umbelliferen, V. 2) Bärenklau, „Herakles“- od. Heilkraut Rmpl., fr. berce, e. comfrey u. bear's-breech (v. Ἡρακλῆς; Herakles od. Herkules, der sie zuerst anwandte, Plinius), Gart.-Zier. H. asperum M. B. s. Panaces Pers. (pubescens Villm., Rmpl.), gigantēum Fisch., flavescens Baumg. (austriacum Pall.), wild H. Sphondylium L.
- Hermannia** L. (Sterculiac. od. Büttneraceen, XVI. 2) „Hermannie“ (n. Hermann, Arzt in Batavia, dann Prof. in Leyden, † 1695), Stuben H. fragrans (Str. Cap), alnifolia L. (Ketmia africana), triphylla L. (Connarus decumbens Thb.), etc., s. Ketmia T. u. Mahernia L. — Hermannieae DC.
- Hermidium** R. Br. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Einknolle „Säulchen“-O., Ragwurz Grck., Hünge O. W., fr. hermin (v. ἑρμῖν, -νος Bettstellenfuss — nur ein Fussstollen, d. i. eine Würzelknolle!), H. Monorchis R. Br. (Orchis Mon. Crantz, Ophrys Mon. L., Satyrium Mon. Pers.).
- Hernandia** L. (Myristiceen, XXI. 3) „Hernandie“, fr. hernandier (n. d. span. Bot. Dr. Franc. Hernandez, Leibarzt Philipp's II., 1593—1600 als Natf. in Westind.), H. ovigera L. „Eierbaum“, H. sonora L. „Rasselnuss“, span. Arbol de cañon „Kanonbaum“ (— Steinfrucht hohl m. losen Kernen!).
- Herniaria** L. (Illecebreen, V. 2) „Bruchkraut“ od. Tausendkorn, Harnkr. G. Frank, fr. herniaire od. herniole, herbe aux hernies, e. hern-hill, black-heath (v. hernia Bruchkrankheit — geg. diese angewendet!), H. glabra, hirsuta L. etc.
- Hertia** Less. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Hert's“-Fettpfl. (n. d. Bot. Joh. Casim. Hert, schr. de Pimpinella Saxifraga, Gissae 1726), H. s. Othonna crassifolia Less.
- Hesperaloe** (Liliaceen, VI. 1) Abend-Aloe, neue Zier. H. yuccaefolia rotblüh. Yucca (Tex.) (Ἑσπερος, lat. Hesperus od. vesp̄ra Abend etc.).
- Hesperidēae** L., Rehb. (-ides Endl., fr. hesperidées) „Hesperidenäpfel“ od. Orangen (v. Hesperia Hesperien od. Abendland, Spanien etc.) (s. eb.).
- Hesperis** L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Abend“- od. Nachtviole, Frauenveil od. -Viole, Damaskenblume Wilm., Rmpl., Kilde O. W., fr. Julienne, Cassolette, Damas, Girarde etc., e. dame's-violet, rocket u. queen's-gilliflower (s. v.), Zier. H. matronalis L. m. v. v. (candidissima Hort. u. fl. alb. pleno Hort.), H. maritima Lam. (Cheiranthus m. L., Malcolmia m. R. Br.) Seestrand's-Levkoje, e. sea-rocket etc., m. v. fl. alb. Hort., H. bicolor Hort. (Malcolmia b. Boiss.), etc.
- Heterocentron** (-um) Hook., Arn. (Melastomac. Rhexieen, VIII. 1) „Wechselsporn“ (ἑτεροῦς anderer, wechselnd, abweichend, ζήτηρον Sporn etc. — d. Antheren d. läng. Staubfäd. m. gestielt. borstenförm., die d. kürz. nur an d. Basis zweihöcker. Connectiv), Warmh. H. rosēum Hook., subtrinervum ds., etc.
- Heteromorpha** Cham. (Umbelliferen, V. 2) „Wechselblatt“-Dolde (s. v., μορφή) Gestalt — näml. d. beid. Teilfrüchtchen u. d. Blätt.), H. arborescens Schldl., s. Bupleurum arb. L.
- Heterotōma** Zucc. (Lobeliaceen, XIX. 6) „Anderschnitt“-Lobelia (s. v., τομή) Schnitt — Oberlippe d. Kelchs drei-, Unterl. zweispaltig), H. lobelioides Zucc., s. Heterosōma autt.
- 1) **Heuchēra** L. (Saxifrageen, V. 2) „Heucher's“-Steinbrech, fr. Heuchère (n. J. H. v. Heucher, Prof. z. Wittenberg, † 1747), H. americana L. Alaunwurzel, e. alum-root, s. Cortusa amer. Herm. u. Sanicula amer. spicata Pluk., Zier. H. micrantha Dougl. (N.-Amer.), villosa

- Mchx. (N.-Am.). 2) **Heuchĕra** dichotōma Murr. (Rubiaceen, V. 1), s. Oldenlandia pentandra Retz.
- Hevĕa** Aubl. (Euphorbiaceen, XI. 3) Kaoutschuk- od. Federharzbaum, fr. hĕvé (hewe Nam. d. B.'s in Guiana, Wtst.), H. guianensis Aubl., syn. Jatropha s. Siphonia Schreb. Cahuchu s. elastica Schr.
- Hexacentris** Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Sechssporn“ (ἕξ sechs, ζέν-τρον Sporn etc. — im Ganzen sechs Antherensporne! Wtst.), Warmh. H. mysorensis Wight (Mysore in Ostind.), s. Thunbergia L.
- Hexandria** L. VI. Kl. d. „Sechsmännigen“ (s. eb., ἀνῆρ, -δρός Mann, Staubgefäß!).
- 1) **Heyderia** K. Koch (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Riesen-Thuja, H. decurrens Koch (Libocedrus dec. Torr.), s. Thuja gigantĕa Carr. (n. d. Bot. Ed. Heyder, s. d. Aut.). 2) **H. Fr.** (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) „Heyder's“-Morchel.
- Heynĕa** Roxb. (Hesperid. Meliaceen, X. 1) „Heyne's“-Orange (n. d. Bot. u. Indien-Reis. Dr. Benj. Heyne, † 1819), Zierb. H. quinquejuga Spr., s. Trichilia russinervis Blum.
- Hibbertia** Anderss., Salisb. (Dilleniaceen, XIII. 3) „Hibbertie“ (n. G. Hibbert, der durch Niven am Cap sammeln liess, † 1838), Ampel H. perfoliata Hüg. u. grossulariaefolia Sims, H. volubilis Andr. (Dillenia scandens W.).
- Hibiscus** L. (Malvaceen, XVI. 8) Eibisch, syrische Rose, Blumenbaum, fr. guimauve „Mistelmalve“ (gr. ἰβίσκος od. ἐβίσκος, dem Ibis gew. Pfl., Paxt., Wtst.), Zier. H. syriacus L. s. Ketmia arborĕa Hort., fr. ketmie, H. rosa sinensis L. chines. Malvenrose Rmpl., H. splendens Grah. (Neuholl.), H. rosĕus Thor. (Süd-Eur.), Warmh. H. Cooperi Hort. (scheckblättr.), H. liliiflorus Cav., phoenicĕus W. (Ind.), Cameroni Knowl., mutabilis L., fr. fleur-changeante, Thunbergii Hort. (Sida vesicaria Cavend., africana Mill. s. grandiflora Hort.), Gartenbl. H. Trionum L. Stundenblume, cannabinus L., obtusifol. W. etc.
- Hicorius** Raf. (Juglandeen, XXI. 8) (zu Juglans L.) „Hickorynussb.“ (vaterl.), s. Carya amer. Nutt. etc.
- Hieracium** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Habichtskraut“, fr. épervière (herbe à l'épervier, e. hawk's-herb (-weed) od. kite's-foot u. sange (v. ἱέραξ, -ος Habicht), z. B. H. murorum L., fr. pulmonaire des Français, Gartenbl. H. aurantiacum L., fr. ép. orangée, e. orange-hawk-weed od. golden mouse-ear, etc.
- Hierochlōa** R. u. Sch. (-chlōĕ Gm., Rchb.) (zu Holcus L.) (Gräser, XXIII. 1) „Heiligen“- od. Mariengras, Darrgras Seub. (v. ἱερός heilig, γλῶσσαι od. -όη Gras — s. g. Heiligen-Gras in Preussen), H. borealis R. u. Sch. s. repens P.-B., s. Holcus bor. Schrad. s. odoratus L.
- Higginsia** Rz. Pv., Pers. (Rubiace. Cinchonac., IV. 1) „Higgins'“-Chinastrauch (n. Don O'Higgins, span.-amer. Beamten), z. B. aggregata, obovata u. verticillata R. P., s. O'Higginsia Rz. Pv., Campylobōtrys Lindl. u. Evosmia H. B. K.
- Himantoglossum** Spr. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Riemen“- od. Rollzunge (v. ἴμας, -άντος Riemen, γλῶσσα Zunge — d. drei Labiumlappen lang riemenförmig!), z. B. hircinum Spr. (Loroglossum h. Rich.), s. Satyrium L.
- Himantophyllum** Ait., Spr. (Amaryllideen, VI. 1) „Riemenblatt“ (s. eb., φύλλον Laubblatt), s. Imantophyllum Hook. u. Clivia Lindl. (s. d.).
- Hindsia** (schlecht **Hinsia**) Benth. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Hinds'“-Chinastrauch (n. R. B. Hinds Esq., Nat.-Liebh. u. Reis. 1836/42, nicht Wtst.: n. d. brasil. Nam. d. Pfl. Hinsia!).
- Hippeastrum** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Ritterstern“ (v. ἵππεῖς, -έως Ritter, ἄστρον lat. astrum Stern — d. Blätt. stehen zweizeilig

- od. „reitend“, d. Blüt. sternf. Wtst.), Warmh. *H. fulgidum* fl. pl. Van Houtt., Johnsii, reginae, vittatum Herb. m. v. v. (Winterbl.).
- Hippion** Schmidt, Spr. (Gentianeen, V. 2) „Rossveilchen“, Bitterblatt (v. *ἵπιος* Pferd u. *ἴον* Veilchen — gröss. als ein Veilchen), z. B. obtusifolium Schm. u. axillare ds., *H. vernum* etc., s. *Gentiana* etc.
- Hippocastänum** T. (sc. *Aescülus*) L. (Sapindac. Hippocastaneen, VII. 1) „Rosskastanie“, fr. maron d'Inde, e. common horse-chestnut (s. eb. u. *κασιανόν* Kastanie), Zier. v. v. fl. pleno, argenteo-variegata u. laciniata Hort., v. rubicunda Schubert. — Hippocastanëae DC. (-nacëae Grck.).
- Hippocratëa** L. (Theaceen Malpighieen, III. 1) Waldmandelbaum (n. *Hippocrates* v. Kos, s. d. Aut.), *H. comosa* Sw. (*Cōa scandens* Plum.), *aspera* Lam. (Tonsella scabra Schreb.) etc. — Hippocratëae (sc. Theaceae) Rchb., -ticëae Juss., H. B. K., -teaëae DC., Kth.
- Hippocrëpis** L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) „Pferdehuf“- od. Hufeisenklee (s. v. u. *ζηρπίς*, -ίδο; Schuh — Form d. Hülsen wie Hufeisen!).
- Hippomäne** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XXI. 9) Mancinellenbaum, fr. hippomanes od. poirier vënimeux, eig. „Rosstrunst“ od. „Rossmanna“ (s. v. u. *μαρία* Raserei, Brunst, od. *μάννη*, später *μάννη* Manna — bei d. Alten ein Kraut in Arkadien etc.), *H. Manzinella* L. Curaregiftbaum, fr. manceniller, *H. biglandulosa* L. s. *Sapium acuparium* Jacq., fr. glutier. — Hippomanëae Rchb.
- Hippomarathrum** Fl. Wett. (sc. Sesëli) L. (Umbellifer., V. 2) „Rosfenchel“ (s. v., *μάραθρον* Fenchel), *H. pelviforme* Fl. Wett., s. *Sesëli articulata* Crantz.
- Hippophäë** (nicht Hippophaea!) L. (Santalac. Elaeagneen, XXII. 4) Sand- od. Seedorn, eig. „Rosstöter“ od. „Rosslight“, fr. hippophaë u. argousier (v. *φάω* töte, *H. d. Alten* aber = *Euphorbia spinosa*! nach Andern v. *φάος*, -εος; Licht — d. Genuss d. Blätt. für d. Augen der Pferde angebl. heilsam!), Zier. *H. rhamnoides* L. gem. Meerdorn, fr. lumière de cheval (Besingstrauch, Wolff) u. grisët, e. seabuckthorn, shallow-thorn.
- Hippüris** L. (Onagreen Halorageen, I. 1) Tannenwedel, eig. „Pferdeschweif“, fr. pesse od. pin aquatique, e. horse-tail (-willow), s. *Limnopenuce* Vaill., *Pinastella* Dill. (*ἵπιος* u. *οὐρά*, *ἵππουρις* d. Alten = *Equisetum* u. *Ephedra*!). — Hippuridacëae Grck., -deae Lk.
- Hiraea** Jacq., L. (Caryophylleen Malpighieen, X. 3) „De la Hire's“-Malpighie (n. d. franz. Bot. de la Hire, † 1727), z. B. *H. reclinata* L. (*Trioptëris Hiraea* Banks), *odorata* W., *pinnata* W. (*Flabellaria paniculata* Cav.) etc. — Hiraeacëae Kth.
- Hircülus** Tausch. (sc. *Saxifraga*) L. (Saxifrageen, X. 2) „Böcklein“-Steinbrech, cistblumiger St. Grck. (dem. *hircus* Bock — zwei hornförm. Griffel).
- Holcus** L. (Gräser, XXIII. 1) Ross- od. Honiggras, Darrgras Seub., Wolff, fr. houque u. cousse-couche (v. *ὄλκος*; an sich ziehend, Plinius: zieht Dornen aus d. Fleisch!), s. *Hierochlōa* u. *Arrhenatherum* P.-B.
- Holeracëae** L. i. q. Oleracëae Endl. Küchenkräuter (holus od. olus, -ëris Gemüse).
- Holodiscus** Ser. (nicht *Halodiscus* autt.!) (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) (zu *Spiraea* L.) „Ganzscheiben“-Spiräe (v. *ὄλος* ganz, *δίσκος*, lat. discus Scheibe — diese in d. Blüte mit ganzem Rand! Lauch.), z. B. *Sp. ariaefolia* Sims.
- Holoschoenus** Lk. (Cyperaceen, III. 1) Kugelriet (s. eb. u. *Schoenus* Knopfgras), *H. vulgaris* Lk., s. *Scirpus Holoschoenus* L.
- Holostëa** (sc. *Stellaria*) L. (Alsinaeen, X. 3) grossblum. Sternmiere, Waldsternkraut, e. wood-row (-rovel „Waldroogen“) (v. *ὄλοστεός*

ganz knöchern — Kapseln! Paxt. u. Wtst. nach Plinius: Gegensatz, wie *lucus a non lucendo* — weich. Kraut!).

- Holostëum** L. (Alsineaceen, X. 3) Spurre, Schachtkohl Grck., fr. mignonne Ackernelkengras Wolff (s. eb.), *H. umbellatum* L.
- Holostigma** Spach (Onagrarieen, VIII. 1) (zu *Monopsis Salisb.*) „Ganz“ od. Kugelnarbe (s. v., *στίγμα* Narbe — diese ungeteilt!), Zier. *Bottae* Spach (*Oenothera Bistorta Veitchiana* Hort. „Veitch's Nachtkerze“), s. *Sphaerostigma bistortum* Walp.
- Homalia** Brid. (Moose, XXIV. 2) (zu *Leskča* Hedw.) „Gleichmoos“ (*ὁμαλός* gleichmässig — d. Sporangium an d. Basis gleich).
- 1) **Homalium** Jacq., Schreb. (Amygdaleen Homalineen, XIII. 3 od. XVIII. 4) „Regelrechtblume“ (s. eb. — gleichförm. Verteilung d. Staubfäden in Büschel!), z. B. *racemosum* Jacq. (Str.), *H. Racoubea* Sw. (*Racoubea guianensis* Aubl.) etc., s. *Blackwellia* Comm. u. *Capimoga* Aubl. 2) **Homalium** Pers. (Coniferen Abietineen, XXI. 9), *H. incanum* Pers., s. *Pinēda* inc. Rz. Pv. (Str.).
- Homogyne** Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Brand- od. Alplatlich (*ὁμῶς* gleich, *γυνή* Weib, Bot. Stempel — ausser zwitterigen auch weibl. Blüten, deren beider Narben gleich), *H. alpina* Cass., s. *Tussilago alpina* L.
- 1) **Honckenya** Ehrh. (zu *Arenaria*) Rchb. (Alsineaceen, X. 3) „Honckenye“ od. Salzmiere, *Porselei* O. W. (n. Gerh. Aug. Honckeny, † 1794, schr. syst. Verz. d. deutsch. Gew.), z. B. *peploides* Ehrh. 2) **Honckenya** W. (Tiliaceen, XIII. 1) „Honckeny's“-Linde.
- 1) **Hoppēa** L. (Sapotac. Mimusopeen, XVIII. 4) „Hope's“-Süssblatt (n. d. schott. Bot. Thom. Ch. Hope, schr. Tentamen inaug. de montibus etc. Edinb. 1787), z. B. *H. tinctoria* L. f. u. *dealbata* Hance. 2) **Hoppēa** Roxb. fehlerh. st. **Hoppēa** Dietr. (Tiliac. od. Dipterocarpeen, XIII. 1) „Hoppe's“-Flügelfruchtbaum, s. sogl.
- 1) **Hoppēa** Rchb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Hoppee“ od. Hufattich-Cinerarie (n. d. Bot. Hoppe, s. d. Aut.), Zier. *H. speciosa* Rchb. (*H. s. Cineraria sibirica* L.). 2) **Hoppēa** Roxb. (Sapotaceen, X. 1) „Hoppe's“-Baum, *H. odorata* Rxb. (B. Ostind.), *dichotōma* W. (*Platera pusilla* Roxb.). 3) **Hoppēa** Nees (Cyperaceen, III. 1). 4) **H. W.** (Gentianeen). 5) **Hoppēa** Dietr. (s. v.).
- Hordëum** L. (Gräser, III. 2) Gerste, fr. orge, e. barley (v. *horreo* bin stachlig Leun. od. *horrīdus* rauh — weg. d. Grannen, od. Wtst.: *hordus* i. q. *fordus* schwer, trüchtig? — Brot daraus?), gebaut *H. vulgare* L. gem. vierzeil. (Winter- u. Sommer-) Gerste, e. beer- od. square-barley, *H. disty'chum* (-on) L. „zweizeil.“ od. „Sommer“-G., fr. pomette, e. *buttledon-barley*, *H. hexastachyon* L. „sechszel.“ G., wild *H. murinum* L., fr. orge-follette (-sauvage), e. rye-grass „Mäusegerste“, Zier. *H. jubatum* L. „Mähnen“-G., e. *mancaered-b.*
- 1) **Horminum** T., L. (Labiaten Salviaceen, XIV. 1) Pyrenäen-Melisse, „Reizkraut“ (gr. *ὄρμινον*, -μῖνος v. *ὄρᾶω* rege auf, Dioscorides: reizt z. Liebe), Zier. *H. pyrenaicum* L. (*Melissa pys.* Scop.) s. g. Ritterkreuz. 2) **Horminum** Mnch. (sc. *Salvia*) L. (Labiaten, II. 1) Scharlei, Scharlachkraut, Zier. *H. coloratum* Mnch. (*sativum* Mill.), s. *Salvia colorata* Thore m. v. v., fr. sauge ormin, Prudhomme.
- Hornungia** Rchb. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) „Hornungsschötchen“ (n. ein. Apoth. Hornung in Aschersleben), *H. petraea* Rchb., s. *Hutchinsia* p. R. Br.
- Horsfieldia** Blum. (Myristicaceen, XXII. 13) „Horsfield's“-Muskatnussbaum (n. d. engl. Reis. in Java Thom. Horsfield), *H. aculeata* Blum., *odorata* W., s. *Myristica* Spr.

- Hortensia** Comm., Pers. (sc. *Hydrangea*) Sm. (*Saxifrageen*, X. 2) „Hortensia“ (n. Commerson's Geliebten Hortense Barré ben., Wtst. n. d. Astronomin Hortense Lapaute, † 1788), Zier H. *speciosa* Pers. s. *mutabilis* Hort. (*Hydrangea hortensis* Sm. s. *opuloides* Lam.).
- 1) **Hosta** Jacq. (*Verbenaceen*, II. 1) „Host's“-Verbene (n. d. Arzt u. Bot. Host in Wien, s. d. Aut.), H. *coerulea* Jacq., s. *Cornutia* Plum.
- 2) **Hosta** Tratt. (*Liliaceen*, VI. 1) „Host's“-Tag-Lilie, H. *japonica* Tratt., s. *hemerocallis* jap. W. 3) **Hostia** Mnch. (zu *Barkhausia* Rchb.) (*Compos. Cichoriac.*, XIX. 1) „Host's“-Pippau, H. *foetida* Mnch. (B. s. *Crepis* foet.). 4) **Hostia** Fl. Flum. (*Myrsineen*, V. 1)
- 5) **Hostea** W. (*Asclepiadeen*, V. 2).
- Hoteia** Morr., Decsn. (*Spiräac.* od. *Saxifrageen*, X. 2) japanische Spiräe (n. d. japan. Bot. Ho-Tei, Wtst. n. ein. span. Bot.), Zierstr. H. s. *Spiraea japonica* Decsn. Hort., fr. Hoteia du Japon, e. *japanese* Hoteia, s. *Astilbe rivularis* Hamilt. (*Spiraea barbata* Wall.).
- 1) **Hottonia** L. (*Primulaceen*, V. 1) „Hottonie“, Wasserfeder, fr. hottone, plume d'eau (plumeau od. -mette), mille-feuille-queue-de-cheval, auch lustre d'eau (n. Pet. Hotton, Prof. z. Leyden, † 1708), H. *palustris* L., Zier. H. *indica* L., s. *Limnophila gratioloides* R. Br. —
- 2) **Hottonia** W. (*Onagraceen* Halorangee, XXI. 5), H. *serrata* W., s. *Serpicula verticillata* L. u. *Udora* Spr.
- Houlletia** Brongn. (*Orchid. Vandeen*, XX. 4) „Houllet's“-O. (n. d. franz. Gärtn. u. Reis. in Brasilien mit Guillemin, Houllet), H. *picta* Rchb. f.
- Houstonia (-tonia)** L. (*Rubiaceen*, IV. 1) „Houston's“-Strauch (n. d. engl. Bot. W. Houston, s. d. Aut.), z. B. *coerulea* L. (*Chamaejasme inodora* Pluk.), H. *purpurea* L. (*Knoxia* p. Lam.), *coccinea* Jacq. (*Bouvardia Jacquinii* Hb.).
- Houttuynia** Thb., Schreb. (*Aroid. Saurureen* od. *Alismaceen*, III. 3 od. VII. 3) „Houttuynie“ (n. d. holl. Arzt u. Bot. Houttuyn), Zier. H. *cordata* Thb., „Herzblatt“-Echsenchwanz (Chin., Jap.), s. *Polyparea cochinchinensis* Lour., H. *capensis* Houtt., s. *Montbretia* cap. Bak.
- Hovēa** R. Br. (*Legumin. Genisteen*, XVII. 4) „Hove's“-Ginster (n. d. poln. Bot. Ant. Pantal. Hove, Reis. in d. Krim u. in Persien, Wtst. n. W. How, schr. *Phytol. Brit.* 1650), *Gewächsh. Celsii latifolia*, *pungens*, *major* etc.
- Hovenia** Thb., Schreb. (*Rhamnaceen*, V. 1) „Hoven's“-Süssdorn (n. ein. Bot. Dav. v. d. Hoven, holl. Commiss. in Japan, Wtst.), H. *dulcis* Thb., span. *Arbol de corintas* „Korinthenbaum“.
- Howardia** Weddell (*Cinchonaceen*, V. 1) „Howard's“-Chinabaum, H. *caracasensis* Wedd.
- Howeia** Becc. (*Palmen*, XXI. 6) „Howe's“-Palme, H. *Belmoreana* Becc. (n. W. E. Howe, s. d. Aut.).
- Hoya** R. Br. (*Asclepiadeen*, V. 2) „Hoy's“-Wachspfl., s. g. „Porzellan- od. Wachtblume“ (n. d. engl. Zücht. Thom. Hoy, Ob.-Gärtn. d. Herz's v. Northumberland), *Stuben* H. *carnosa* R. Br., *Warmh. bella* Hook. (*Ampelpfl.*), *imperialis* Lindl. (*Borneo*), *variegata* de Vriese (Jap.) etc.
- 1) **Huegelia (Hügelia)** Benth. (*Polemoniaceen*, V. 1) „Hügelie“ (n. d. Baron K. v. Hügel zu Wien, Reis. in Ostind. u. Austral. 1831/36), H. *cyanēa* Rchb. (*collomoioides* DC.). 2) **Huegelia** Rchb. (*Araliaceen* od. *Umbelliferen*, V. 2) „Hügel's“-Aralie, Zier. H. *coerulea* Rchb., fr. *Huegelie azurée*, e. *blue* H., s. *Didiscus coer.* Hook. u. *Trachymene coer.* Grah. 3) **Huegelia** R. Br. (*Diosmeen* *Boronieen*, VIII. 1), s. *Decadantha* Rchb. s. *Boronia* Sm.
- Hugonia** L. (-na Cav.) (*Hugoniaceen*, XVI. 6) „Hugonie“ (n. d. engl. Bot. J. Hugon, schr. 1711 bot. System), H. *mystax* L. „Knebelbart“-H. (*Aegoceros* etc. Raj.), s. *Modira canni* Rheed.

- 1) **Humboldtia** Vahl (Boragineen, V. 1) „Humboldtie“ (n. Al. v. Humboldt), *H. laurifolia* Vahl (Str. Ceyl.), s. *Batschia* l. Vahl. 2) **H.** Rz. Pv. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Humboldt's“-O., z. B. *cordata* R. P., s. *Stelis* cord. Sw. 3) **H.** Wall. (Cassieen, X. 1), *H. Brunonis* Wall. 4) **H.** Neck. (Gentianeen, V. 2).
- 1) **Humëa** Sm. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Hume's“-Aster (n. d. Lady Hume, Bar. of Wormleybury Hertsh., † 1837), Zier. *H. elegans* Sm., fr. *Humée élégante*, m. v. v. (z. B. purpurëa), s. *Calomeria amarantoides* Vent. (*Razumovia paniculata* Spr.). 2) **Humëa** Roxb. (Tiliaceen, XIII. 1).
- Humiria** (Houm-) Aubl. (-ium Rich., A. Juss.) (Meliac. Humiriaceen, X. 1) „Humirie“ (bei den Galipons in Guiana houmiri), *H. balsamifera* Aubl. (*Vantanea paniculata* Urban), *H. contractum* Moric. (*Myrodendron amplexicaule* W.). — Humiriaceæ Mart. (zu Meliaceæ od. Styracëæ Rchb.).
- Humulus** L. (Urticeen, XXII. 5) Hopfen, *H. Lupulus* L., fr. houblon, vigne du nord, e. hop- od. hops-plant u. bind (d. germ. Humal latinisiert! nicht etwa humilis — weil auf der Erde = humus kriechend).
- Hunnemannia** Sweet (Papaveraceen, XIII. 1) „Hunnemannie“ (n. d. engl. Reis. u. Samml. J. Hunnemann, † 1839), Zier. *H. fumariaefolia* Sweet.
- Huntleya** Batem. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Huntley's“-O. (n. d. Geistl. u. Samml. Huntley), z. B. *violacea* Lindl. u. *Meleagris* ds.
- 1) **Hura** L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 9) Sandbüchsenbaum, fr. sablier (südamer. Name hura!), *H. crepitans* L., s. g. Rasselbüchse, fr. hura. 2) **Hura** Kön. (Scitamineen, I. 1), *H. Siamensium* Kön., s. *Globba Koenigiana* Spr.
- 1) **Hutchinsia** Wight Arn. (Aselepiad., V. 2) „Hutchinsie“ (n. d. Irländerin Miss Hutchins, Kryptogamistin). 2) **Hutchinsia** R. Br. (zu *Lepidium* Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Hutchinsie“ od. Remse O. W., Stein- od. Zwergkresse, *H. petraea* u. *alpina* R. Br., s. *Lepidium* u. *Hornungia* petr. Rchb. 3) **Hutchinsia** Ag. (Tange, XXIV. 3) „Hutchins“-Tang, z. B. *fastigiata* vierteil. *H. Wagn.*, s. *Polysiphonia* Grev. u. *Callithamnion* Lyngb.
- Hyacinthus** T., L. (Liliaceen, VI. 1) „Hyazinthe“, fr. hyacinthe (Jacinthe), e. hyacinth, crow-toes, our Lady's-flower (gr. Ὑάκινθος *Hyacinth*, Liebl. d. Apollo, Myth., die Hyacinthe d. Alten = *Gla-diolus communis*, viell. v. d. arab. jakuth „rot“ abzuleiten), Zier. *H. amethystinus* L., fr. Jac. améthyste, e. blue-bottle od. amethystine h., m. v. v. (s. *H. hispanicus* Lam. s. *angustifolius* Med.), *H. orientalis* L. gem. Garten-H., fr. Jac. cultivée, e. oriental h., m. v. v. (Holländ., Pariser, einf. Passe-tout, *H. albus* Jord, fr. blanc de montagne, *H. praecox* Jord. fr. romaine blanche „früheste Topf-H.“).
- Hybanthus** Jacq. (Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Buckelveilchen“, „blume“ (ὕβος bucklig, ἄριστος Bl. — bez. d. Form d. Kronblätt.), *H. havanensis* Jacq., s. *Viola Hybanthus* L. (klett. Bstr. Südamer.).
- Hydnum** L. (Pilze, XXIV. 4) Stachelpilz, essb. *H. Erinaceus*, fr. érinace od. hydne, fr. u. e. urchin (gr. ἵδρον od. οἶδρον Trüffel). — *Hydnœi* DC.
- Hydrangæa** L. (Saxifrageen od. Corniculat. Cunoniac., X. 2) „Wasserstrauch“ (v. ἵδωq in comp. ἕδωq- Wasser, ἄγγος-, εος Urne — ähnl. d. Frucht m. ein. Wassergefäss, Lauch.), Zier. (Topf) *H. Hortensia* Comm. (*hortensis* Sm.) s. japonica v. Sieb. (*opuloides* Lam., *Hortensia rosæa* Desf. s. *speciosa* Pers. japan. Rose Leun.), *H. arborescens* L. (*vulgaris* Mchx., *frutescens* Mnch.), *H. Otasca* v. Sieb. (n. Siebold's in Japan geborn. Tochter ben.) etc.

- Hydrastis** L. (Ranunculac., XIII. 7) „Wasserbürgerin“ (v. ἵδωρ, ἵδωρ- u. ἀστὴ Stadtbewohnerin, Wtst. n. ein. Amerikanerin ben.), H. canadensis L. (Warneria Mill.).
- Hydrilla** Rich. (Hydrocharideen, XXII. 8) „Wasserquirl“, H. verticillata Casp. (Ἵδρω- u. ἴλλω wälze — quirlständ. Blätter!), s. Serpicula vert. L. f. u. *Udora occidentalis* Koch.
- Hydrocarÿes** Lk. „Wassernussgew.“ (v. ἵδρω- in compos. Wasser, ζάρον Nuss).
- Hydrocëra** Blum. (Oxalideen od. Balsamineen, V. 1) „Wasserhorn“ (s. v. u. ζέρας od. ζερός Horn — 5 spitze, sitzende Narben!). — Hydrocerëae Blum. (zu Ord. Gruinales Bartl.).
- Hydrocharidëae** DC., Rchb. -ides Juss. Froschbissgew., Nixenkräuter Rchb. (zu Ord. Hydrocharidinae Bisch., s. sogl.).
- Hydrochäris** L. (Hydrocharideen, XXII. 8) Froschbiss, H. morsus ranae L., fr. morène, e. frog-bit (s. v. u. χάρις, -ιδος Freude — Fundort!).
- Hydrochlōa** P.-B. (Gräser, XXI. 6) „Wassergas“ (s. v., χλωὰ od. -οὴ Gras), s. Hydropyrum Lk.
- Hydroclëis** L., Rich., Comm. (Alismac. od. Butomeen, XIII. 5) „Wasserstolz“ Rmpl., fr. hydroclëide (s. v. u. ζλέος Ruhm, Wtst. ζλέος Schlüssel — schliess. Milchsaft ein!), Zier. H. Humboldti Endl. (Limnochäris Humb. L., C. Rich. u. Stratiotes nymphoides W.).
- Hydrocotÿle** T. (Umbelliferen, V. 2) „Wassernabel“, Nabel O. W., fr. hydrocotyle, a goblet (gobelet od. écuelle d'eau), herbe aux Patagons (s. v. u. ζοτύλη Höhlung, Nabel — d. rund. Blätt. mitten vertieft), H. villosa L. (Centella v. s. Mercurialis afra L.), spananthe W. spärlich blüh. (Spananthe articulata Jacq.), vulgaris L., etc. — Hydrocotyleae DC., Spr.
- Hydrolapāthum** Huds. (sc. Rumex) L. (Polygonaceen, VI. 3) „Wasserpimper“, e. water-sorrel, Flussampfer Grck., Butterweckenkraut (z. Einwickeln von Butter!), Hunger- od. Pockenkr., Rossampfer, wilder Rhabarber, fr. oseille à longues feuilles (s. v., ζάπαθον Ampfer).
- Hydrolëa** L. (Hydroleaceen, V. 2) „Wasser-Ölstrauch“, „-Olive“, Kleber D., fr. coutarde (s. v. u. Olea Öl- od. Olivenbaum, od. olëum Öl — d. Blätt. ölig, schmierig!), H. crispa u. urens L. (Wigandia cr. u. ur. Kth.), spinosa L., zeylanica Vahl (Nama zeyl. s. Steris aquatica Burm.).
- Hydropeltidëae** DC., Bartl. „Wasserschildpfl.“ od. Wasserrosen, sogl. (πέλιτη Rundschild, εἶδομαι gleiche).
- Hydropeltis** Mchx. (Nymphäac. Hydropeltideen od. Podophylleen, V. 1) „Wasserschild“ (s. eb. — bez. der auffliegend. Blätt.), z. B. purpurea Mchx., s. Brasenia peltata Pursh.
- Hydrophäce** Hall. (Najadeen, I. 1) „Wasserlinse“ (s. v. u. φακῆ Linse), s. Lemna L.
- Hydrophyllum** L. (Asperifolien od. Hydrophylléen, V. 1) „Wasserblatt“, Rinnenblume D., fr. hydrophylle u. feuille d'eau (s. v. u. φύλλον Laub — Blätt. m. Wasserrinnen!), Zier. H. virginicum Lam. u. canadense L., etc., s. Nemophila Benth., Eutöca R. Br. u. Phacelia Juss. — Hydrophyllëae R. Br.
- Hydrophÿta** Endl., Lyngb. „Wassergew.“ i. q. Algae Tange (s. v., φυτόν Gewächs).
- 1) **Hydropÿper** Endl. (sc. Elatine) L. (Lythrarieen Elatineen, VIII. 4) „Wasserpfeffer“-Tännel, fr. hypopiper, e. betle (betel). 2) **Hydropÿper** (sc. Polygonum) L. (Polygoneen, VIII. 3) „Wasserpfeffer“-Knöterich (s. v. u. pÿper, gr. πέπερι Pfeffer).
- Hydropÿrum** Lk. (Gräser, XXI. 6) „Wasserweizen“, Sumpf-Kappengras, wilder Reis (v. u. πυρός Weizen, nicht πυρόν Wachtfeuer!), H. esculentum Lk., s. Zizania aquatica L.

- Hygrocybe** Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Wasserschale“, Glaskopf Kumm. (*ὕγροϛ* nass, *κρυβή* Höhlung, Napf etc. — d. hohle Hut nass!), *H. conica*, *coccinea* etc., s. *Agaricus* L.
- Hygrophila** R. Br. (Acanthaceen, XV. 2) „Nässefreundin“ (s. eb., *φιλή* Freundin — wächst in Sümpfen), z. B. *H. formosa* R. Br. u. *brasilensis* Spr., etc., s. *Ruellia* L. u. *Dicliptera* Juss.
- Hymenaea** L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Locustbaum (v. *ἡμεναῖος* hochzeitlich — d. Blätterpaare nähern sich in d. Nacht einander), *H. courbaril* Jacq. ostind. Heuschreckenb., s. g. Locustholz, fr. *courbaril*, *H. Candolleana* u. *floribunda* Kth. (B. Südam.), s. *Trachylobium* aut.
- Hymenathërum** Cass. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Hautantherenblume“ (v. *ἡμῆρ*, -*ένος* Häutchen, *ἀθήρ*, -*έρος* Spreuschuppe — d. Antheren-Connectiv häutig, breit), Zier. *H. tenuilobum* DC. s. *tenuifolium* Cass. (Tex.).
- Hymenocallis** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (zu *Pancretium* L.) „Schönhaut“ -Narzisse (s. eb. u. *záλλος* Schönheit — sehr zarte Blütenabschn.), *H. speciosa* Herb., s. *Pancretium Dryandri* s. *speciosum* Salisb.
- Hymenodictyon** Wallr. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) Netzflügel Frucht, „Hautnetz“ (s. v. u. *δίκτιον* Netz — Samen von netzförm. Flügel umgeben), z. B. *flaccidum* Wall., s. *Cinchona* fl. Spr.
- Hymenomycetes** Fr., Rchb., Endl. „Hautpilze“ (s. v. u. *μύκηϛ*, -*ητος* Pilz).
- Hymenophyllum** L., Sm. (Farne, XXIV. 1) „Hautwedel“-F. (s. v., *φύλλον* Laubblatt — Blätt. häutig, zart), z. B. *cruentum* Cav., *asplenoides* Sm. (*Trichomanes* aspl.), etc. — *Hymenophyllacæe* Endl., Grck., -llæe Bory (zu *Polypodiacæe* DC.).
- Hymenoxys (-is)** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Spitzhaut“-Blume (s. v. u. *ὀξύς* spitz — Pappusblättchen häutig u. zugespitzt), Zier. *anthemoides* u. *californica* DC. (*Shortia* calif. Hort.).
- Hyobanche** Thb., L. (Personaten Orobancheen, XIV. 2) „Schweinswürger“, fr. *fleur de fève* „Saubohnenblüte“ (v. *ὕς*, *ἰός* Schwein u. *ἄγγω* würge) z. B. *sanguinea* L. (*Orobanche mauretanicæ* Petiv.).
- Hyophorbe** G. (Palmen, XXI. 8) „Schweinefutter“ (s. eb. u. *φορβή* Speise), z. B. *Commersonii* Mart., *indica* G. etc., s. *Arëca*.
- Hyoscyamus** L. (Solaneen, V. 1) Bilsenkraut, eig. „Schweinsbohne“, fr. *hyosciamæ* (*jusquiame* u. *lugan*), e. *hen-bane*, *musk-crawfoot* (v. *ὕς*, *ὕός* u. *ὕαμος* Bohne — d. bohnenart. Kapseln auch f. Schweine giftig).
- Hyosëris** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Schweinesalat“, fr. *lait-de-cochon* (s. v., *σέρις* Salat), z. B. *amplexicaulis* Mchx. (*Krigia* ampl. Schreb.) etc., s. *Dens leonis* Pluk.
- Hyospäthe** Mart. (Palmen, VI. 3) „Schweinskolbe“ (s. v., *σπάθη*, lat. *spatha* Blütenscheide — in Brasil. „Schweinspalme“!), *H. elegans* Mart.
- Hypechusa** Alfd. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) „Aushaltungs“-Wicke, gelbe W. (v. *ὑπέχω* Part. Fem. unterhalte, halte aus — Sinn un-*deutlich!*), *H. lutea* Alfd. = *Vicia* lut. L.
- Hypëcöum** L. (Papaveraceen, IV. 2) Gelbauge Seub., Lappenblume Leun., fr. *hypëcoon* (v. *ὑπὴξω* töne dazu, rassele — d. Samen in d. reif. Frucht! nicht n. Paxton: *ὕληκοον* Diosc. unterthan, lat. *procumbens* niederliegend!).
- Hypoëlytrum** Lk., Nees, s. *Hypoëlytrum* Rich.
- Hyperanthëra** Forsk., Vahl (*-antha* Perring) (Cassieen od. Diosmeen, X. 1) „Oberanthere“, Flügelnsamen-Moringa, Behennuss D., *H. Moringa* Vahl (*Guilandina* Mor. L. s. *Mor. pterygosperma* G.) (*ὕπερ* q

über, ober, ἀνθηρόν Staubbeutel — d. 5 läng. fruchtb., d. 5 kürz. unfruchtb.), H. dioeca Pers. (Guil. dioeca L. s. Gymnocladus canadensis Lam.).

Hyperica Juss., -icēae Chois., -cinēae DC., Rchb., -caēae Grck., fr. hypericoīdes „Hartheugew.“, sogl.

Hypericum T., L. (Hypericineen, XVIII. 2) Hartheu, Johanniskraut, fr. herbe de St. Jean, e. park-leaves (gr. ὑπερίκον Johanniskr. v. ἔλλο unter u. ἐρίκη od. ἐρείκη Heidekr., Paxton: ὑπέρο u. εἰκῶν, -όνος Bild — wég. d. ansehnl. Blüten!?), H. perforatum L., fr. millepertuis, Zier. H. Ascyron L. (s. d.), calycinum L. (Kleinas.), fr. éclair od. Millepertuis à grandes fleurs (à grand calice), e. large-calyxed Hypericon, androsaemum L., fr. toute-saine, e. tutsan, H. Kalmianum L., W. (Hstr. Nordam.), linarioides, Gewächsh. H. japonicum L., Thb., sessiliflorum, fr. bois à Baptiste, etc.

Hyperrhiza Bosc., Nees (Pilze, XXIV. 4) Wurzelstreuung Kumm. (ἔλλο über, ὄζα Wurzel — überird. Fibrillen wurzelart. zu einem caudex!), z. B. liquaminosa N. Saft-W.

Hyphaena G. (-ne Pers.) (Palmen, XXII. 6) „Gewebe“-P., Dum- od. Astpalme, fr. doume Pfefferkuchenbaum (— Fruchtschale essbar!) (v. ἰθαίω überspinne od. ἰγή Gewebe — Fruchtfasern z. Verspinnen!), H. thebaïca Mart. (Douma theb. Duham.), s. Cucifera theb. Pers. (cuci, gr. χοϊκι Kokosnuss).

Hypoloma DC. (Pilze, XXIV. 4) „Gewebe“- od. „Fadensaum“ ἰγή Gewebe, λῶμα Saum — d. Manschette spinnwebartig), z. B. H. lateritium DC.

Hypomycetes Rchb., Endl. „Fadenpilze“ (s. eb. u. μύκης, -ητος Pilz).

Hypnum L. (Moose, XXIV. 2) Astmoos, fr. hypne (gr. ὑπνον Moos an Bäumen i. q. σφάγγρον, Wst. v. ἕπνος Schlaf — einschläf. Wirkung!), Guirlanden H. serpens, velutinum, splendens u. cupressiforme L.

Hypocalymna Endl. (Myrtaceen, XII. 1) „Unterhüll“-Myrte (ὑπὸ u. κάλυμμα od. -μνά Hülle — Eierstock unten, d. Blüt. von trocken. Bracteolen umgeben), Gewächsh. Cunninghami Endl.

Hypochoeris (-choeris) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Ferkelsalat“, Kosten O. W., fr. laitue-de-cochon (- de porc), porcelle (ἔλλο für, χοῖρος, lat. porcellus Ferkel), z. B. pinnatifida Cyr. (Boebera p. Spr.) etc.

1) **Hypocistis** T. (sc. Cytinus) L. (Cytineen, XX. 8) „Hypocist“, W. (succus Hypocistidis Offiz.), s. Thyrsine Gled. 2) **Hypocystis** Beckm., s. Asarum Hypocistis L. (Aristolochieen Asarineen, XI. 1) (gr. ὑποκιστίς Wurzelschmarotzer v. ὑπὸ u. κίστος, lat. Cistus — schmarrotzt an Cistuswurzeln).

Hypocyrtia Mart. (Gesneraceen, XIV. 2) „Unterbuckel“ (ὑπὸ unten, κυρτός bucklig — Kronröhre hinten an d. Basis), H. gracilis Mart. (Brasil.).

Hypoelytrum Rich. (Cyperaceen, III. 1) „Unterhüllen“-Segge (ἔλλο u. ἔλλυτρον Decke, Hülle), s. Hypelytrum Nees (Hypolytrum Vahl, auch Hypaelyptum Vahl), z. B. argentæum Vahl s. senegalense Pers., filiforme, pungens etc.

Hypoglossum (sc. Ruscus) L. (Sarmentac., XXII. 11) Zungen-Mäusedorn, „Unterzungen“-M., auch Ruscus Hypophyllum „Zungenblatt“, fr. double-langue, hippoglosse (fehlerh. st. hypogl.), langue de cheval u. laurier alexandrin (v. ἔλλο u. γλώσσα Zunge — d. Blüten auf d. Blätt. unter besond. Deckblättern stehend!).

Hypogynia Juss. „Unterweibige“ od. „stemplige“ (ἔλλο u. γυνή — d. Stempel od. Fruchtknoten unter d. Blume!).

Hypolytrum Vahl s. Hypoelytrum Rich.

- Hypopetalia** Juss. „Unterkronblättrige“ (*ἔπὸ* u. *λέταλον* Kronblatt — diese verständig!).
- Hypophegëa** (sc. Monotröpa) L., Wallr. (Ericaceen Monotropeen, X. 1) Fichten- od. „Buchenspargel“, Buchen-Ohnblatt (*ἔπὸ* u. *γηγῶς*, lat. fagus Buche), s. Hypopitys (s. d.).
- Hypophyllum** (sc. Ruscus) L. (Sarmentac., XXII. 11) „Unterblatt“-Mäusedorn, s. Hypoglossum (*ἔπὸ* u. *φύλλον* Laubblatt, — Blüt. an d. Blattunterseite!).
- Hypopityacëae** Klotzsch, Grck. (zu Ericacëae Rchb.) Fichtenspargelartige, sogl.
- Hypopitys** Scop. (sc. Monotröpa) L. (Ericac. Hypopityaceen, X. 1) „Fichtenspargel“, Ohnblatt (— Pfl. ohne Laubblätter!) (*ἔπὸ* u. *λίτις* Fichte — schmarotzt an deren Wurzeln!), s. Monotröpa Hypophegëa Wallr.
- Hypostaminëa** Juss. mit unterständ. Staubgefäßen — näml. unter d. Fruchtknoten! (stamen, -inis Staubfaden).
- Hypoxis** L. (Amaryllideen od. Hypoxideen, VI. 1) „Untenspitzkapsel“, s. g. Härtling (*ἔπὸ* u. *ὀξίς* spitz — Basis d. Kapsel! Wtst. d. Blätt. spitzig!), H. Arnotti, decumbens L. (Anthericum sessile Mill.), stellata Thb., minuta L. (Helonias m. L. f.) etc., s. Fabricia Thb. u. Gethyllis L.
- Hypoxylon** Bull. (Sphaeriaceen-Pilze, XXIV. 4) „Holzstielchen“ Kumm. (*ἔπὸ* unten, *ξύλον* Holz — leder. fast holzig. Substanz), z. B. vulgare, filiforme etc.
- Hyptis** Jacq. (Labiaten, XIV. 1) „Beuglippe“, Linksblume D. (v. *ὑπιτις* zurückbeugt — Form d. Blüten!), z. B. capitata Jacq. (Clinopodium capense Sw.), Chamaedrys W. (Clinop. Cham. Vahl) etc., s. Nepeta, Brotera Spr. u. a.
- Hyssopus** L. (Labiaten, XIV. 1) „Ysop“ (Isop Rmpl.), fr. hyssope (hyssope), e. hyssop (gr. *ὑσσωπος* v. *ὑς*, *ὑός* Schwein u. *ῶψ*, *ὄλος* Gesicht — rüsselart. Blume! Wtst. hebr. esob, arab. azzof = heil. Kraut, nicht näher bekannt!), Zier. H. officinalis L. m. v. v. (fl. albo u. rosëo Hort.), cristatus L. s. ocimifolius (Elsholtzia crist.), Lophanthus L. chines. Ysop od. Katzenkr. (Cataria flor. inversis Hall.) etc.
- 1) **Hystrix** Rumph. (sc. Barleria) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Stachel“-Barlerie (gr. *ὑστρίξ* Stachelborste), H. frutex Rumph., s. Barl. Hystr. L. 2) **Hystrix** (sc. Aspalathus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Dornhülle“. 3) **H.** (sc. Merisma) Spr. (Pilze, XXIV. 4) Stachelpilz, s. Hydnum Hystrix u. Echinus Hall. (Heridium hystrinum Pers.). 4) **Hystrix** Mch. (Gräser, III. 2) „Stachelgras“, s. Echinochlöa P.-B. (— sehr lange, spitze Grannen!).
- Jacaranda** Juss. (Bignoniaceen, XIV. 2) brasil. Jacarandabaum, s. g. Palisanderholz (Polixanderholz¹) (vaterl. Name!), J. brasiliensis Juss., e. black-rose-wood „schwarz. Rosenholz“, s. Machaerium Pers., Warmh. J. grandiflora u. mimosaefolia Ker. 2) **Jac.** Barrel. (Araliaceen, V. 5) „Goldblatt-Allheil“, J. arborëa Barr., s. Panax chrysohyllum Vahl (Amer.).
- 1) **Jacëa** Pers. (sc. Centaurëa sect. Rchb.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Wiesenflockenblume, fr. jacëe u. tête de moineau „Spatzenkopf“ Wolff, s. Rhaponticum Scop. s. Cyänus Fl. Wett. Jacëa (v. jacëo liege nieder), ferner z. B. Centaurëa splendens, Rhapontica L. etc.

1) Palisander n. Goepfert v. pao santo bras. = heilig. Holz (auch Polyxander, Polisander u. a. m.) (Köln. Zeit. Nr. 226. 2., 1851).

- 2) **Jacēa** Camer. (Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Heil-Veilchen“ (v. ἵον Veilchen u. ἀξέουαι heile, Wtst.).
- 1) **Jackia** Blum. (Polygalaceen, XVII. 3) „Jackie“ (n. d. engl. Reis. in Sumatra 1813/22 W. Jack, s. d. Aut.), z. B. *J. excelsa* Blum. (Monnina exc. Spr.). 2) **Jackia** Spr. (Büttneriac., V. 1 od. XVI. 5), *J. spectabilis* Spr., s. *Wallichia speciosa* DC. 3) **Jackia** Wall. (Rubiaceen, V. 1), *J. ornata* Wall., s. *Zuccarinia* orn. Spr.
- 1) **Jacksonia** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Jackson's“-Baum (n. d. schott. Bot. G. Jackson), Treibh. *J. trifurcata* (Gompholobium f. Sm.), *spinosa* R. Br. (Neusüdwailes), s. *Gomphol. spin.* u. *Daviesia* sp. Sm. 2) **Jacks.** Raf. (Capparideen, XIII. 1).
- 1) **Jacobaea** T. (sc. Senecio) L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Jakobs-Kreuzkraut, Jakobsblume, fr. *jacobée*, fleur od. herbe de St. Jacques, e. St. James-wort (rag-) u. seggrum (n. d. Apostel Jakobus — blüh. um Jakobstag!) 2) **Jacobaea** Vaill. (Senecio, sect. a Rchb. flor. radiatis) Strahlblüt-Greiskräuter, z. B. *elegans*, *erucifolius* etc. 3) **Jac.** Plum., s. *Pectis* L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1), *J. humifusa* Plum. u. *Pectis ciliaris* L. 4) **Jac.** Comm., s. *Othonna* L. (Compos. Senecionideen, XIX. 2), *J. africana* Comm., s. *Oth. parviflora* L.
- Jacobia** DC. (Lythrarieen od. Melastomac. Rhexieen, VIII. 1) (zu *Trembleya* DC.) „Jakobie“ (n. Jakob Trembley, schr. Mem. pour servir à l'hist. d. l. vie etc. de Charl. Bonnet, Bern 1795).
- 1) **Jacquinia** L. (Myrsineen od. Solaneen Ardisiaceen, V. 1) „Jacquinie“ (n. d. Prof. Jacquin in Wien), Treibh. *J. armillaris* L. „Jacquin's-Armbandstrauch“ (Antill.), *aurantiaca* Ait. (Sandwichsins.). 2) **Jacquinia** aculeata, s. *Medeöla* Pers. ac. (Melanthaceen, VI. 3).
- 3) **Jacq.** Mut. (Tiliaceen, XIII. 1).
- 1) **Jaegera** Gies. (Scitamineen, V. 1) „Jäger's“-Banane (n. d. Bot. G. F. Jäger). 2) **Jaegeria** H. B. K. (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) „Jägersblume“, z. B. *urticaefolia* Spr. (*Viborgia* urt. Kth.), *uliginosa* Spr. (*Spilanthus* ul. Sw.) etc., s. *Polymnia* L. u. *Verbesina* L.
- 1) **Jalapa** T. (sc. Convolvulus) L. (Convolvulac., V. 1) „Jalapenwinde“, fr. u. e. jalap, Jalapenwurz (vaterl. n. d. mexik. Distrikt Jalapa). 2) **Jalapa** (sc. *Mirabilis*) L. (Nyctagineen, V. 1) Wunderblume, e. marvel.
- Jambolana** Rumph., s. *Jambolifera* L. sogl.
- Jambolifera** L. (Rutac. Rutarieen, VIII. 1) „Jamboli“- od. Kümmelraute (vaterl. jamboli = olivenart. Frucht), *J. pedunculata* L. (B. Ostind.), aromatische Malabar- od. Tangu-Gewürznelke, s. *Cyminosma* G. = *Caryophyllus* Tangu aromat. malabar. Pluk.
- Jambos** Adans. (*Jambosa* Rumph.) (sc. *Eugenia*) W. (Myrtaceen, XII. 1) „Jambusenbaum“, fr. *giambo* (jambosier, jambe-longue) (malay. jambu Schambu), *J. malaccensis* DC., s. *Eugenia* *Jambos* L., *J. vulgaris* DC. s. g. Rosenapfel.
- Janipha** Kunth (Rutac. Euphorbiaceen, XI. 3) Brechnuss (n. d. brasil. janipaba!), *J. frutescens* Löfl., s. *Jatropha* *Janipha* L. s. *carthagenensis* Jacq.
- Jasione** L. (Campanulac. od. Lobeliaceen, V. 1) Schafrapunzel, Monke O. W., Schafscabiöse Rmpl., „Jasonsblume“, fr. *jasione*, e. sheep's-bit (gr. *ιασώνη* Theophr. v. Ἰάσω Heilgöttin, Wtst. v. *ιασις* Heilung od. ἵον Veilchen u. *σιος* (θεός) göttlich — vortreffl. Heilpfl.!), z. B. *J. montana* L., e. mountain-sh.-b. u. perennis Lam.
- Jasmīnum** L. (Contorten Jasmīneen, II. 1) „Jasmin“, fr. u. e. jasmin, e. jessamin od. jasmine (v. *ιάσμη* Jasmin d. Perser, arab. *ysmyū* Paxton, jasmin d. Perser), Warmh. *J. officinale* L. m. v. v. echter J., Stuben gracile u. odoratissimum L., *azoricum* L., *glaucum* Hb., *Kth. (ligustrifolium* Lam.) (Cap), *J. Sambac* Ait. arab. *J. m. v. v.*,

- J. grandiflorum* L. s. g. spanischer J., Gärten *J. fruticans* L., fr. j. jaune, e. shrubby j., nudiflorum Lindl., fr. j. à fleurs nues, e. naked-flowered j., humile L.
- Jatröpha** L. (Euphorbiaceen, XI. 3) „Arztkost“, Brechnuss, fr. médicinier (v. *ιατρούς*; Arzt u. *τροφή* Nahrung, Wtst. *γάγω* esse), J. Manihot L. Maniok- od. Cassavebrot-Strauch (s. g. Yucca- od. Stärke- wurzel), *J. elastica* L., s. Hevëa guianensis Aubl. Kaoutschukbaum.
- Ibëris** L. (Cruciferen-Siliculosen, XV. 1) Bauernseif, Schleifenblume Rmpl., e. clown's-mustard u. candy-tuft, mithridate-mustard (gr. *ιβηρίς* v. Iberia Ebroland, eine kressenart. Pfl.), Zier. I. umbellata L., fr. thlaspi-lilas (taraspic) od. -en ombelle, e. umbelled-candytuft, m. v. v., amara L. (Thlaspi am. Crantz), m. v. hesperidiflora Hort., Topf. I. sempervirens L., fr. taraspic vivace od. corbeille d'argent, e. ever-green candituft, Tenoreana DC., pinnata Gouan, fr. thlaspi odorant, e. sweet-scented c., etc.
- Icacina** A. Juss. (Myrobalaneen od. Oleineen, XII. 2) Senegal-Cacaopflaume, I. senegalensis A. Juss.
- Icaeo** Plum. (Myrobalaneen, XII. 2) westind. Cacaopflaume, fr. icaquier (-caque) (vaterl. in Bras. acaja), s. Chrysobalanus Icaeo L. s. Guai- era Marcgr.
- 1) **Icica** Aubl. (Burseraceen od. Amyrideen, VIII. 1) Icica-Myrrhe, Elemiharzbaum Seub. (vaterl. Name in Guiana!), I. altissima, brasiliensis etc., s. Amÿris L. 2) **Icica (Isika)** coerulea Borkh. (Lonicereen, V. 1) blaue Heckenkirsche, s. Xylosteum canadense Duham. s. Solonis Eaton (Lonicëra coer. L.), Isika lucida Mch., s. Lonicëra alpigëna L.
- Icosandrae** Lauch. (sect. v. Crataegus L.) (Pomaceen, XII. 2) „Zwanzig- männige“ (*είκοσι* zwanzig, *άνθη*, -*δένος* Mann, Staubgefäss), z. B. Oxyacantha, monogyna etc.
- Icosandria** L. XII Kl. „Zwanzigmännige“ (s. eb.).
- Idaea** (sc. Vaccinium Vitis) L. (Siphonandraceen od. Vaccinieen, VIII. 1) Preisselbeere, fr. airelle rouge, e. red-bilberry (Idaeus, vom Berg Ida auf Creta).
- Idaeus** (sc. Rubus) L. (Rosaceen, XII. 3) Himbeere, fr. framboise (-sier), e. rasp-berry (ras- od. hind-berry), -bush od. -tree, auch framboise (s. eb.).
- Jeffersonia** Barton (Ranunculac. Podophylleen, V. 1 od. VIII. 1) „Jefferson's“-Entenfuss (n. d. Unions-Präs. Thom. Jefferson, † 1826), Zier. J. diphylla Pers. s. Bartonis Mehx. (binata Bart.) „Zweiblatt“, s. Podophyllum diphyllum L. (Virgin.).
- Jenkinsonia** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5) „Jenkinson's“-Pelargonium (n. Jam. Jenkinson, schr. descript. of brit. plants, Kendal 1775), z. B. J. quinata u. tetragöna Sw., s. Pelargonium u. Chorisma Lindl.
- Ifloga** Cass., DC. (zu Gnaphalium Rchb.) (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Haarstempel-Fadenkraut, s. Trichogyne DC., z. B. Fontanesii Cass. (Anagramm von Filago, wie auch Gifola, Logfia etc.).
- Ignatia** L. (-tiana Lour.) (Contorten Strychneen, V. 1) „Ignatiushohne“ (e. Ignatius Loyola, Stift. des Jesuiten-Ordens), I. philippinica Lour., s. Strychnos Ignatii Berg.
- Jirasekia** W. (Primulaceen, V. 1) „Jirasek's“-Gauchheil (n. ein. Bot. Joh. Jirasek, schr. mit Haenke u. A. Beob. auf Reis. n. d. Riesengebirge, Dresd. 1791), z. B. alpina Schm. s. tenella Rchb., s. Anagallis tenella L.
- 1) **Ilex** L. (Sapotac. Aquifoliac. od. Ilicineen, IV. 4) Stecheiche, Hülsen, s. g. Stechpalme, fr. chêne-verte u. yeuse od. houx, e. holly-tree od. knee-holly, evergreen oak (lat. ilex, -icis Stecheiche v. d. celt. ec od. ac Spitze), Zier. I. Aquifolium L. m. v. v., fr. houx-commun,

- e. common-holly, Theeplf. I. paraguariensis St. Hil. Paraguay-Thee, s. g. Mate (nicht Maté). 2) **Ilex** T. (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 5) eigentl. Stecheiche, fr. yeuse. — Ilicinéae Seub. Stechpalmen od. Hülsenartige (s. 1) Ilex).
- Illairia** Lenne, C. Koch (Loasaceen, XIII. 1) „Illaire's“-Brennwinde (n. ein. Berliner Bot. Illaire), Zier. I. canarinoïdes marienglockenart.
- Illecëbrum** T., L. (Portulacac. od. Illecebran, V. 1) Knorpelblümchen Seub., fr. illecëbre, panarine od. herbe au panaris „Nagelgeschwürkr.“ (v. illecëbra Anreizung), z. B. cymosum L. (Paronychia cym. T.), verticillatum L. etc. — Illecebræae DC., R. Br. (zu Paronychiacæae St. Hil. od. Portulacacæae Rchb.).
- Illicium** L. (Magnolieen Illicieen, XIII. 7) Stern-Anis (v. illicio Locke an), I. anisatum L. (Anisum stellatum Mat. med.), fr. u. e. badiane, e. stellated od. indian anise. — Illicicæae DC. (zu Magnoliacæae Rchb.).
- Illippe** Kön. (Sapotaceen, XI. 1) Butterbaum (v. ἰλλῶς schielend, ἴππος Pferd, ἡ Stute? — unklar!), I. Malabaris Kön., s. Bassia longifolia L.
- Illus** Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Schiel“-Narzisse (ἰλλῶς schielend), z. B. triandrus, cernuus Haw., albus etc.
- Imantophyllum** Hook. (**Himantoph.**) Hook. (Amaryllideen, VI. 1) „Riemenblatt“ od. Clive's-Lilie, s. Clivia Lindl. (ἰμάς, -άριος Riemen, φύλλον Laubblatt), Stuben I. miniatum Hook. m. v. splendens Hort.
- 1) **Imbricaria** Hoffm., Schreb. (Flechten, XXIV. 3) Ziegel- od. Schindelflechte, fr. imbricaria (v. imbrex, -icis Schindel od. Dachziegel). 2) **Imbricaria** Comm. (Sapotaceen, VIII. 1) „Schindel“- od. „Ziegelbaum“, fr. bembrice, I. maxima Poir. s. g. Molukken-Eisenholz (— zu Schindeln benutzt!), s. Mimusops L. 3) **Imbricaria** Sm. (Myrtaceen, V. 1) „Regenschirm“-M. (imbricus v. imber, -bris Regen — Blüt. wie ein Regenschirm stehend).
- Impatiens** Riv., L. (Oxalideen Balsamineen, V. 1) Springkraut, Balsamine (lat. inpatiens ungeduldig — d. frisch. Kaps. springen beim Berühren auf), wild I. noli tangere L., Topf od. Garten I. Balsamina L. m. v. v., fr. bellesamine od. jalousie, e. Balsam od. common-garden-balsamine, v. Solferino, v. nana Hort., I. glanduligera Royle s. Roylei Wall., I. tricornis L., e. cornigerous B., etc.
- Imperata** Cyr. (bess. -tia!) (Gräser, III. 2) „Imperati's“-Gras (n. Ferrante Imperati, neapolit. Bot. d. 16. Jahrh.'s), z. B. cylindrica Host u. sacchariflora Hort., s. Saccharum cylindricum Lam. s. Lagurus cyl. L.
- Imperatoria** T., L. (Umbelliferen, V. 2) Meisterwurz, Ostritz O. W., fr. imperatoire, Angélique française, e. master-wort (lat. imperatorius kaiserlich v. imperator Herrscher — weg. d. unvergleich. Kraft!).
- Incarvillæa** Juss. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Incarville's“-Trompetenblume, fr. incavillée (n. d. franz. Missionair in China R. P. d'Incarville), Zier. I. chinensis Lam., s. Bignonia Tecoma Juss.
- Indigofera** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Indigpflanze“, fr. indigotier (indigo Indigofarbe u. fero trage), Zier. I. australis R. Br., decora Lindl., Dosua Ham., etc.
- Inga** Plum., W. (sc. Mimosa) L. (Mimoseen, XXIII. 1) „Inga“-M. (inga westind. Name d. Pfl.), z. B. I. bigemina W., I. Sassa W. abyssin. Inga-M., Warmh. Harrisii u. pulcherrima Cerv.
- Inocarpus** Forst. (Sapotac. Mimosopeen od. Lucumeeen, X. 1) „Sehnen“- od. „Faserfrucht“ (v. ἴς, ἰνὸς Sehne etc., σαρκώδης Frucht — faser. Hülle!), I. edulis L. (B. Austral.), s. Gujanus Rumph.
- Inocybe** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Raufaserkopf Kumm. (s. eb., *zubiñ*) Höhlung, Napf etc. — fransig. Hut!), z. B. rimosa, pyriodora etc., s. Agaricus L.

- Inophyllum** (sc. Calophyllum) Pers. (Guttiferen, XIII. 1) „Sehnenblatt“, Tacamahaca-Harzbaum W. (s. v., *φύλλον* Laub, Blatt).
- Intsia** Nor., Thou. (sc. Acacia s. Mimosa) L. (Mimoseen, XXIII. 1) indisches od. „Intsi“-Eisenholz (vaterl. madagassischer Name!), s. Tamarindus Intsia Spr.
- Intybus** (sc. Cichorium) L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Cichorie, Endivie, fr. u. e. endive (v. tubus Röhre? — röhr. Stengel? Wst. arab. hendibeh!).
- Inula** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Alant, Flöhkraut, fr. aunée od. inule, herbe aux puces, e. elecampane od. flea-wort (aus d. gr. *ἐλέριον* durch Corruption? od. Wst. v. *ἰρώω* (*ἰρέω* u. *ἰρώω*) leere aus — Wirkung d. Wurzel, Plinius), Gärten I. Helenium L., grandiflörum W., oculus Christi u. suaveolens L.
- Joachimia** Tenore (Gräser, III. 2) „Joachim's“- od. Raupengras (n. Dr. Jochim Jung in Lübeck, vgl. Jungia! Wst. n. Joachim Murat, Schwager Napoleon's I.), J. phalaroides Ten. (Beckmannia eruciformis Host), s. Cynosurus eruc. Ait.
- Jochroma** Benth. (Solanaceen, V. 1) „Veilchenfarbe“ od. blauer Prachtstrauch (*ἰον* Veilchen, *ροῶμα* Farbe), s. Habrothamnus cyanus Ldl.
- Johannia** W. (**Joannæa** Spr., **Joannesia** Pers.) (Compos. Carlineen, XIX. 1) „Johannesblume“ (n. d. Erzherz. Johann v. Oesterreich, Pfeiffer), J. insignis W. (Chuiragaga Juss.), brasiliensis Spr., s. Flotovia glabra Spr., J. microphylla Tratt. (insignis W. var.).
- 1) **Johnsonia** R. Br. (Commelyneen, III. 1) „Johnsonie“ (n. d. Apoth. Thom. Johnson), z. B. J. hirta u. lupulina R. Br. 2) **Johns.** Catesb. (Viticeen od. Verbeneen, IV. 1), J. americana Cat., s. Callicarpa L. 3) **Johns.** Adans. (Hesperideen, XVIII. 2).
- Jolithus** (sc. Lepraria) Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Veilchenstein“-Fl., s. g. Veilchenmoos (*ἰον* Veilchen, *λίθος* Stein — Geruch der Steinflechte nach Veilchen!).
- Jondraba** Med. (zu Biscutella Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Brillenschote (*ἰον* Veilchen, Draba Hungerblümchen), J. auriculata L., hispida DC. etc.
- Jonesia** Roxb. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Jones“-Hülsenbaum (n. P. Jones, schr. mit Kingston Fl. Devoniensis etc., London 1829), Gewächsh. J. Asoca Rxb. (Asjogam Rheed.) (B. Ostind.), J. pinnata Roxb., etc.
- Jonidium** Vent. (Violarien, XIX. 6) Ipecacuanha-Veilchen, „Veilchengleiche“ (*ἰον* u. *ἰῖδομα* gleiche), J. Ipecacuanha Vent. wahre Veilchenwurz (Brechwurz), s. Pombalia Ipec. Vand. (Viola Ipec. L. s. Jonidium Vent.).
- Jonopsidium** DC., Rchb. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) stengelloses Löffelkraut (Jonopsis u. *ἰῖδομαί*), Zier. J. acaule Rchb., s. Cochlearia ac. Desf. s. pusilla Broter., s. Jonopsis DC.
- 1) **Jonopsis** DC. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Veilchengleiche“ (s. v. u. *ἰψις* Gesicht, Aussehen — dem Veilchen sehr ähnl.!). 2) **Jonopsis** Hb., Kth. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Veilchengesicht“ (s. eb.), J. pulchella Kth., s. Cybelion Spr. „Cybele“-Veilchen.
- Jonquilla** DC. (sc. Narcissus) L. (Amaryllideen, VI. 1) „Jonquille“, binsenblättr. Narzisse, fr. narcisse jonquille, e. jonquil-Narcissus m. v. fl. pl. (fr. jonquille v. jone, lat. juncus Binse).
- Jonthlasi** T., DC. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Veil-Täschelkraut“, fr. jon-thlasi (*ἰον* u. Thlasi Täschelkr. — Blüt. wie gelbes Veil, Frucht wie Thlasi!), s. Clypeöla Jonthl. L.
- Josephinia** Vent. (Bignoniaceen od. Pedalieen, XIV. 2) „Josephinie“ (n. d. Kaiserin Josephine v. Frankr.), z. B. J. imperatricis Vent. u. grandiflora R. Br. (Neuholl.).

- Josikaea** Jacq. (sc. *Syringa*) (Oleaceen, II. 1) „Josika's“-Lilac M.-Rchb. (n. d. Freifrau Josika ben.).
- Jovibarba** DC. (Crassulac., XI. 5) „Zeus“- oder „Jupitersbart“ (zu *Sempervivum*) (*Jovis* Gen. v. *Jupiter* u. *barba* Bart — Ausläufer aus d. untersten Achseln).
- 1) **Ipecacuanha** Vent. (sc. *Jonidium*) (Violarien, XIX. 6) Brechwurzel, wahres Brechweihen (aus d. portug. i klein, pe am Wege, caa Kraut u. goene Brechen erregend). 2) **Ipec.** Arrud. (sc. *Cephaelis*) Rich. (Cinchonaceen, V. 1) echte *Ipecacuanha*, Brech-Kopfbeere (Brasil.).
- Ipomœa** (-mœa) L. (Convolvulaceen, V. 1) Trichterwinde, fr. *ipomœe* (v. *ἵψ*, *ἰπὸς* Wurm, *ὄμοιός* ähnlich), Zier. J. purpurœa Lam. s. *hispida* Zucc. m. v. v., fr. *ipomœe-pourpre*, e. *morning-glory*, *tuberosa* L., fr. *liane à tonnelles*, I. *bona nox* L. (*Calonyction speciosum* Chois.), fr. *Ip. de l'après-midi*, e. *excellent Ip.*, I. *pes tigridis* L., fr. *pièd de tigre*, I. *hederacœa* s. *Huberi* (*Pharbitis* hed. Chois.), I. *coccinœa* L., *Topf* etc. *violacœa* (*rubrocoerulea*) Hort. u. *limbata elegantissima* Hort. — beide v. v. von *purpurœa* Lam., I. *mexicana* m. v. *grandiflora alba* Hort., s. *Calonyction macrantholeucum* Colla, Warmh. *gossypifolia* etc.
- Ipomopsis** Rich., Benth., Mchx. (Polemoniaceen, V. 1) „Trichterwindengleiche“ (v. *Ipomœa* u. *ὄψις* Aussehen), Zier. I. *elegans* Mchx. (*Gilia coronopifolia*) m. v. v. (*lutœa*, *superba* etc. Hort.), I. s. *Cantua picta* Hort. (*Polemonium rubrum*) etc., s. *Ipomœria* Nutt.
- Ipsœa** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Korkbaum“-O.? „Wurm“-O.? (v. *ἵψος* Korkbaum? od. *ἵψ*, *ἰπὸς* Wurm? — unsicher!), z. B. I. *speciosa* Ldl. (Ceyl.).
- Iresine** W. (Irsine Spr.) (Amarantaceen, XXII. 5 od. Chlenopodiac., V. 2) „Wollast“-Amarant, s. g. *Straussfeder* (v. *εἶθος* st. *ἔθος* od. *ἔριον* Wolle), *Teppichbeete* I. *Herbstii* Hook., s. *Achyranthes Verschaffelti* Lam., m. v. fol. *aureo-variegato* Hort.), I. *Lindeni* Van Houtt., I. *eriantha* Lam. (*Celosia* er. Vahl), *glomerata* Spr. (*Pfaffia glauca* Spr.), I. *persica* Spr., *javanica* Spr. (*Aerva jav.* Juss., *Illecebrum jav. L.*, *Amaranthus albus gangeticus* Pluk.) etc.
- Iria** Rich. (sc. *Cyperus*) L. (Cyperaceen, III. 1) *Schwertlilien-Cypergras*? (v. *Iris* *Schwertlilie*, Gen. *ἴριος* v. *ἴρις* od. *εἶρις* *Regenbogen*? — od. *εἶριον* Wolle? — *culmo seminudo*, zur Hälfte nackt, zur Hälfte wollig? — unbek., Wtst. d. Name *malabarisch*!).
- Iriarta** (-tœa) Rz. Pfv. (Palmen, XXI. 8) *Stelzenpalme* (n. d. span. Gönn. d. Bot. Joh. Iriarte), I. *exorrhiza* Mart., *andicœla* Spr. (*Ceroxylon* and. Hb.), *Treibh. ventricosa* Mart., *altissima* u. *praemorsa* Kl. etc.
- Iridœae** R. Br., DC., Rchb. (-*dacœae* Grck., -*des* Juss.) *Schwertlilien* od. *Schwertelgewächse* (*Iris*, -*idis*).
- Irio** DC. (sc. *Sisymbrium*) L. (Cruciferen *Siliquos.*, XV. 2) *glatte Rauke*, fr. *laitue de muraille*, s. *Sisymbrium glabrum* W. (lat. *irio* = gr. *ἐρίσιμον*, v. *ἐρίομαι* *errette* — mediz. Kraft, scharf wie *Senf*!).
- Iris** T., L. (Irideen, III. 1) *Schwertlilie*, fr. *Iris*, *flambe* u. *glæul* (lat. *gladiolus* „*Schwertel*“), e. *flag*, *flower de luce*, *spurge-wort* u. *sword-grass* (v. *ἴρις*, -*ιδος* od. *εἶρις*, Gen. auch *ἴριος* *Göttin Iris* u. *Schwertlilie*, st. *ξίρις* — *Farbe des Regenbogens*!), *Garten*: I. *pumila* L. *Zwerg-Schw.*, I. *germanica* L. m. v. v. *Himmelslilie*, *Violenwurz*, fr. *glæul bleu*, *sibirica* L., *florentina* L. *Veilchenwurz*, fr. *Ir. armes de France*, e. *godder*, *versicolor* L., *panormitana*, *Susiana* L. *Fürstin* od. *Dame in Trauer* (Pers.), fr. *deuil* od. *crêpe*, *fleur du Diable*, *iberica* Hoffm. m. v. *ochracœa*, *persica* L., *reticulata* M. B., *Xiphium* L. s. *hispanica* Hort., *xiphiodes* Ehrh. (*anglica* Hort.),

- engl. od. portug. etc., wild I. Pseud-Acōrus L. Wasser-Schw., spuria L. Bastard-S., graminēa L. grasblättr.
- Irpex** Tod. (Pilze, XXIV. 4) „Eggenpilz“ Kumm. (*Ἐπιπυλῆς* od. *Ἰριπυλῆς*, lat. urpex Egge — Unterseite d. Hutes!), z. B. lacteus etc., s. Hydnium L.
- Isätis** C. Bauh. (Crucifer. Nucamentaceen, XV. 2) Waid, fr. guède, e. woad, green-weed u. pastel (gr. *ισάτις*; Pfl. z. Blaufärben, od. v. *ισάζω* glätte — galt als Mitt. geg. Hautkrankh.), wild u. cult. I. tinctoria L., s. g. deutscher Indig, fr. pastel, e. dyer's-weed u. pastel.
- 1) **Ischaemum** P.-B. (Gräser, XXIII. 1) „Blutstillgras“, Schuppengr. D. (v. *ἰσχω* hemme, *αἷμα* Blut), z. B. muticum L., aristatum L., hispidum Kth. (Andropogon virens Spr.). 5) **Isch.** (sc. Andropogon) L. (Gräser, III. 2) gem. Bartgras Grck.
- Isertia** Schreb. (Cinchonac. Guettardeen, XXI. 7) „Isert's“-Chinabaum n. d. Chirurg. P. E. Isert, in dän. Diensten, schr. 1788 Reise in Guinea), I. coccinea Vahl = Guettarda cocc. Aubl.
- Isika** Ad., Borkh. = Icaica Aubl. (subgen. v. Lonicera) (Lonicereen, V. 1) Doppelfrucht Lauch., z. B. L. s. Is. coerulea Borkh. (nicht etwa v. Isicus der Isis geheil., sond. icica vaterl., Wtst. d. verstämm. Xylosteum!).
- Ismene** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Ismene“-Narzisse (n. Ismene, Tocht. d. Oedipus u. d. Iokaste, Myth. — Seestrangepfl.), I. Amancaes Herb., nutans Herb. etc., s. Pancreatum.
- Isnardia** L. (Onagrarien Jussieuen, IV. 1) „Isnardie“, Sumpfranke, Sapfel O. W. (n. Ant. Danty d'Isnard, Prof. z. Paris, † 1724), I. palustris L. (Dantia p. Thou.), s. Ludwigia repens Sw.
- Ischilos (-us)** R. Br. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Gleichlippe“ (*ἴσος* gleich, *χειλος* Lippe — d. Labell mit den übr. inn. Teilēn), z. B. linearis u. prolifer Hort. Kew., s. Cymbidium u. Elleanthus Presl „Wickelblume“.
- Isoëtæe** Bartl., Rchb. (zu Selaginēen Endl.) Brachsenkräuter, s. sogl.
- Isoetes** L. (Lykopodiaceen Isoeteen, XXIV. 1) Brachsenkraut, Brassenfarn, fr. calamaria (*ἴσος* od. *ἴσος* gleich, *ἔτης* Geselle? od. *ἔτος* Jahr? — d. ganze Jahr gleich! — ungewiss!), I. lacustris L. u. echinospora Durieu, s. Calamaria Dill.
- Isolēpis** R. Br. (Cyperaceen od. Juncaceen, III. 1) „Gleichschuppe“, Zartriet, Frauenhaar (s. v., *λεπίς* Schuppe — Schuppen gleichf.!), Topf u. Dekor. I. gracilis Nees (Ostind.), s. g. Frauenhaar u. pygmaea Roth (Chili) (Ampeln) etc., s. Scirpus u. Heleochäris R. Br.
- Isolirion** Catesb., Bak. (Liliaceen, VI. 1) (sect. v. Liliun — aufrechte Blumenform!) (s. v. u. *λείριον* Lilie), z. B. bulbiferum L., Catesbaei Walt. (Nordamer.) u. gigantēum Wall. s. cordifolium Don, Thunbergianum R. u. S. (Jap.) m. v. v. (z. B. bicolor Sieb, marmoratum ds.).
- Isonandra** Hook., Wight (Myrsineen od. Sapotac. Styraceen, XI. 1) Gutta-Perchabaum (s. v. u. *άνηρα*, -*δρός* Mann — 12 gleichlange Staubgefäße!), I. Gutta Hook., auch Tubanbaum gen.
- Ispogon** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Gleichbart“ (s. v., *πώγων* Bart — d. Nuss überall gleichbartet!), Treibh. I. anemonifolius R. Br., Baxteri, cuneatus, formosus R. Br. etc., s. Protēa L.
- Ispopyrum** L. (Ranunculaceen, XIII. 7) Tolldocke, Muschelblümchen Leun., eig. „Gleichweizen“ (s. v. u. *πυρός* Weizen — die Samen gleichen Getreidekörnern), z. B. wild u. Garten: I. thalictroides L. u. anemonoides (aquilegioides) L., etc., s. Aquilegia W.
- Isōra** L. (sc. Helictēres) (Sterculiaceen od. Bombaceen, XX. 7) „Isora“-Schraubenmalve, s. Helictēres jamaicensis Jacq. (nicht v. *εἰσοράω* blicke an, sond. Wtst. malabar. isora-murre!).

- Isotōma** R. Br., Lindl. (Campanulaceen od. Lobeliaceen, XIX. 6) „Gleichschnitt“-Lobelia, Gleichsämler Vilm. (s. v. u. *τομῆ*); Schnitt — nämll. d. Blumenlappen!), Zier. I. axillaris Lindl. (Neuholl.), petraea F. Müll.
- Itēa** L. (Corniculaten Cunoniaceen od. Saxifrageen Escalloniaceen, V. 1) „Itee“, virginische Weide, fr. Itée (gr. *ἰτέα* lat. vitis Wiete, Weide — weidenähnl. Blätter u. am Wasser), Zier. I. virginica L., s. Diconangia Mitch. „Doppelkegelkapsel“.
- Iteoidēae** Bisch. Ord. der Weidengewächse (s. eb. u. *εἶδομαι* gleiche).
- Ittnēra** Gm. (Najadeen, XXI. 1) Wassernymphe (n. d. Univ.-Curator F. de Ittner in Freiburg, † 1821), I. major Gm., s. Najas major DC. s. monosperma W. (Fluvialis latifolia Mich.).
- Juanullōa** Rz. Pr. (Solanaceen, V. 1) „Juanullo“ (n. Don Georg Juan u. Don Ant. Ulloa, Condamines' Begleiter in Südamer. zur Gradmessung), I. parasitica R. P. (Str.).
- Jubaea** Hb., Kth. (Palmen, XXI. 6) „Mähnenpalme“, Chili-P. (v. juba Mähne — feinfiederige Wedel; Wtst. nach Juba, Kön. v. Numidien, schr. unter Augustus üb. Bot. u. Geogr.), Stuben I. spectabilis Hb., Kth., s. Cocos chilensis Molin.
- Juglandacēae** Grck., -dēae DC. Wallnussartige (zu Amentacēae DC.) s. sogl. Juglans, -ndis!
- Juglans** L. (Juglandaceen, XXI. 9) Wall- od. Welschnussbaum, eig. „Jupiter's-Nuss“ (Jovis glans), fr. noix od. noyer de jauge, e. walnut-tree; z. B. J. regia L. m. v. v., fr. noyer commun, e. royal od. common w.-n., Zierb. J. nigra L., fr. pacane (-nier), noyer noir, J. cinerēa L. (oblonga Mill., cathartica Mchx.) Ölnuss, fr. n. cendré, e. butter-nut (Amer. oil-nut), J. fraxinifolia Lam. (Pterocarya caucasica C. G. Mey.), J. alba L. (Carya alba Nutt.) Hickorynussb. etc., s. Carya Nutt.
- Jujūba** (sc. Rhamnus) L. (Rhamnaceen, V. 1) „Jujuba“- od. Judendorn, rote Brustbeere, fr. jujube (-bier) u. gingeole, nerprun jujubier, e. jujub (-be) (vaterl. Name!), s. Zizýphus Jujuba W.
- Juliflōrae** Endl. Klasse der Kätzchenträger (*ἰουλιος* st. *οὐλος* Wickel etc., flōreo blühe).
- Juncaginēae** Juss., -aginacēae Rich., Grck., -cīnae Bartl., -cacēae Bartl., -cēae Rchb., -cī Juss. Binsenartige, Gras- od. Simsenlilien Rchb. (s. sogl.).
- Juncus** T., L. (Juncaceen, VI. 1) Binse Grck., Simse Rchb., Seub., fr. jonc, e. bent-rush, bul-rush u. reak (v. jungo verbinde — dient zu Geflecht!).
- 1) **Jungermannia** L., Nees (Lebermoose od. Jungermanniaceen, XXIV. 3) „Jungermann's“-Moos, fr. jongermanne, carpolévide (n. Prof. Jungermann in Giessen, † 1653), z. B. bicuspidata L. — Jungermanniacēae Rchb. (zu Sporangiobrýa Kapselmoose Rchb.), „Jungermannien“-Lebermoose. 2) **J.** (sc. Mnium) L. (Moose, XXIV. 2) „Jungermann's“-Sternmoos.
- Junipērus** T., L. (Conifer. Junipereen od. Cupressineen, XXII. 5) Wachholder, fr. genièvre (genévrier), e. juniper-tree (v. juvenis jung u. pario gebäre — Abortivmittel: Junipērus Sabina! Paxton: n. d. celt. jenenprus rauh, steif!), J. communis L. m. v. v. (z. B. suecica Hort., hibernica Pyramiden-W., cracovia u. pendula), J. Oxycedrus L. span. od. Ceder-W., fr. cèdre piquant, cedride, e. sharp-cedar, J. virginiana L. Ceder-Sadebaum, s. g. rote Ceder, fr. cèdre rouge, e. red-Cedar, m. v. v., J. lycina L., s. g. Olibanum od. Weihrauch-Wachholder, fr. manne d'encens, J. Sabina L. Sadebaum, etc. — Juniperēae Rchb.
- Jurinēa** (-aea) Cass. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Kornblumen- od. Silberscharte Seub., Flockenwurz O. W. (n. L. Jurine, Prof. in Genf, † 1819), J. cyanoides Rchb. s. Pollichii Koch, etc., s. Serratula L.

- Jussiaea** St. Hil., L. (-sieuua Pers., -sieuuaca Rottl.) (Onagrariaceen, X. 1) „Jussieu's“ - Kerze (n. Bernh. de Jussieu, s. d. Aut.), z. B. *peruviana* L., *racemosa* Rottl., *J. edulis* autt., s. *Antichorus* Schreb.
- Justicia** L. (Acanthaceen, II. 1) „Justicie“ (n. d. schott. Gärtn. u. Bot. J. Justice, schr. t. brit. gardener's director, 1767 u. a.), Warmh. *J. carnéa* Lindl. (Bras.), *coccinèa* Aubl. (Cayenne), *speciosa* Roxb. (Peristrophe Nees) (Ind.), *J. Adhatoda* L. s. *arborea* Ait., fr. *carmentine*, ind. Nussb., s. *Adhatoda Zeylonensium* Herm., *J. americana* L., s. *Dianthèra* am. Mill., etc.
- 1) **Iva** L. (Compos. Ambrosiaceen, XXI. 5) „Iva“ (alt. bot. Name, urspr. yua, Wtst. v. abigo treibe ab, nämll. d. foetus, wie *Teucrium* s. *Ajuga Iva* L.), z. B. *annua* u. *frutescens* L., *ciliata* W., etc., s. *Ambrosia* L. 2) **Iva** (sc. *Teucrium*) L. (Labiät., XIV. 1) Erdkiefer, Schlagkraut, fr. *ivette*.
- Ixia** L. (Irideen, III. 1) „Klebzwiebel“, Abendblume Perring (v. Ἰξίος Mistel, Vogelleim, lat. viscum), Zier. I. *patens* Ait., *maculata* L. m. v. v. (*viridiflora* Lam., *conica* Salisb., *incarnata* Jacq.).
- Ixiolirion** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Ixia-Narzisse“ (v. *Ixia* s. eb. u. *λείριον* Lilie — d. *Ixia* sehr ähnlich), Zier. I. *Pallasii* Fisch. m. v. *tataricum* Schult. u. *Ledebouri* Fisch., Mey.
- Ixōra** L. (Rubiace. Cinchonac., IV. 1) „Ixorastr.“ (Paxton v. iswara, eine malabar. Gotth., der d. Blumen dargebr. werden, Wtst. *isora*!), Warmh. I. *coccinèa* L., *Griffithii* Bot. Mag., *odorata* Hook. (Coffea od. Forst.), *alba* L. (*Jasminum indicum* Pluk.), *owariensis* Poir. (*Pavetta* ow. P.-B.).
- Kadsura** Juss. (Ranunculac. Anonac. od. Menispermeeen, XIII. 7) japan. Kugelfaden od. Flaschenbaum (jap. Name d. Pflanze), K. *japonica* Dun., s. *Uvaria* jap. (*Sphaerostema*, fehlerh. -stemma Blum. — d. Staubfäden unten zu ein. Kugel vereinigt).
- 1) **Kaempferia** Spr. (-ia W., Pers., -pheria L.) (Scitamineen, I. 1) „Kämpferie“ (n. d. Bot. Kämpfer), K. *Galanga* L. *Galgant* = *Alpinia* Gal. Sw. (*Caiceölus Philippensis* Petiv.), K. *rotunda* L. *Veilchen-Gewürz-lilie*. 2) **Kaempferia** Houst. (Verbenaceen, IV. 1) Kämpfer's-Schnittblume, s. *Tomex verbenacea* Sw.
- Kageneckia** Rz. Pv. (Rosac. Spiräaceen, XXIII. 2) „Kageneck's“ - Spiräe (n. d. Graf. Friedr. Kageneck, österr. Gesandten in Madrid), K. *lancoolata* u. *oblonga* Rz. (Bäume), *glutinosa* Kth. (*Lydaea* Lyday Mol.) klebästige, etc.
- Kalanchoë** Adans. (**Kalench.**- Haw.) (**Cal.**-) (Crassulaceen, X. 1) „Kalanchoë-Dickblatt“ (chines. N. d. Pfl. *calankoë*, Wtst.), K. *aegyptica* DC. (*Cotylèdon nudicaulis* L., Vahl), s. auch *Verèa* W. u. *Crassula* L.
- 1) **Kali** T., Scop. (sc. *Salsöla*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) gem. Salzkraut (Kali, eine alkalische Salzbase, Chemie), s. *Kali Tragus* Scop. 2) **Kali** folio *graminèo* Loes. (Chenopodiaceen, V. 2 od. I. 2), s. *Corispermum intermedium* L. „Wanzensamen“. 3) **Kali** *curassavica procumbens* Pluk. (Portulacac., X. 1), s. *Trianthèma monogynum* L. „eingriffel. Dreiblume“.
- Kalmia** L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) „Kalmie“ (n. Pet. Kalm zu Åbo in Finnland, Linné's Schüler), Zier. K. *latifolia* L., e. *calicoflower*, *angustifolia* L. (*Chamaedaphne sempervirens* Catesb.), e. (in Amerika) *sheep-laurel*.
- Kandelia** DC. (Rhizophoreen, XI. 1) Wurzel- od. Leuchterbaum (malab. kandel, lat. *candèla* Leuchter — weg. d. langen, lederartigen, lang hängenbleibenden Früchte vom Ansehn ein. Kronleuchters!), s. *Rhizophōra Candel* L.

- Karatas** Jacq. (sc. Bromelia) L. (Bromeliaceen, VI. 1) „Karatas“-Ananas, Karat-Aloe, fr. karatas (in Brasil. karaquata-acanga).
- Kataf** Forsk. (sc. Amyris) L. (Terebinthac. Amyrideen, VIII. 1) arabischer Balsam (arab. kataf!).
- 1) **Kaulfussia (-fusia)** Nees (Compos. Astereen, XIX. 2) „Kaulfuss“-Aster (n. d. Prof. Kaulfuss z. Halle, † 1830), Zier. K. amelloides Nees (Charieis heterophylla Cass.) s. Neesii Hort. m. v. v. 2) **K.** Blum. (Mesodmeen-Farne, XXIV. 1) „Kaulfuss“-F., s. *Aspidium aesculifolium* Blum.
- Kennedyā (-dīa)** Vent. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Kennedystrauch“ (n. d. Zücht. Kennedy, Firma Lee u. Kennedy in Hammersmith, schr. m. Lee Catal. of pl. and seeds, Lond. 1774), Treibh. K. bimaculata, coccinea, rubicunda Vent., macrophylla ds., cordata Ldl., etc., s. *Glycine* L.
- Kentia** Blum. (Palmen, XXI. 8) „Kent's“-P. (n. d. Miss Kent, schr. Sylvan sketches, Lond. 1825), z. B. K. sapida Mart. (Arēca s. Sol.), Zier. K. Canterburyana Bull.
- Keraudrenia** Gay (Büttneriaceen, V. 3) „Keraudrenie“ (n. Cl. Keraudren, Marine-Generalarzt, Pfeiffer), z. B. K. hermanniaefolia Gay (Str. Neuholl.).
- 1) **Kernēra** Med. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) „Kerner's“- od. Felsen-Löffelkraut, Stein-Löffelkr. Seub., K. saxatilis Med. (Cochlearia sax. od. Camelina u. Myagrum) (n. d. Bot. J. S. Kerner). 2) **Kernēra** W. (Potamoogen od. Fluvialen, I. 1), K. oceanica W. (Zostēra oc. L.), s. Caulinia Pers. u. Posidonia Kön. „Kerner's“-Seegras. 3) **Kerneria** Mnch., Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Kerner's“-Zweizahn, s. *Bidens* T.
- Kerria** Lk. (**Keria** DC.) (Rosac. Potentilleen od. Tiliaceen, XIII. 1) „Kerrie“ („Kerie“), japan. Ranunkelstr. Gold- od. Nesselröschen, Judenpappel Leun. (n. d. engl. Bot. John Bellender-Ker, s. d. Aut., od. n. W. Kerr, Samml. für d. Kew-Gärten, Rümpl.), Zierstr. K. japonica L. m. v. v. (z. B. fl. pleno Hort.), s. *Corchorus japonicus* L., Thb. (*Rubus* j. autt.).
- 1) **Ketunia** T., Scop. (Malvaceen, XVI. 8) „Ketmie“, fr. Ketmie (Name in Syrien), Zier. K. rosca Hort. (*Hibiscus rosens* Thor.), s. g. Festblume, fr. fleur de sabale, K. liliiflora Hort. (*Hibisc. lil. Cav.*), s. g. Ludwigsblume, fr. fleur de St. Louis, K. syriaca Scop. (*Hibisc. syr. L.*) syrischer Eibisch (veralt. Ketmie, Rmpl.), K. *Trionum* Scop. „Stundenblume“ (*Hib. Tr. L.*) etc. 2) **Ketmia** folio quinque-fido Burm. (Sterculiaceen, XVI. 8), s. *Bombax gossypinum* L. „Baumwollenbaum“.
- Khaja (-ya)** A. Juss. (Hesperideen Meliaceen, X. 1) afrikan. Mahagoniholz (vaterl.!), Kh. senegalensis A. Juss.
- Khutrow** (sc. Abies) Loud. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Smith's“- od. Khutrow“-Fichte, fr. sapinette de l'Himalaya, Epicēa pleureur, e. Kh.-spruce-fir, s. *Abies Smithiana* Lindl. (*Pinus* Kh. Royle s. *Smithiana* Wall. und *Picea Morinda* Lk. (vaterl.).
- Kielmeyēra** Mart. (Ternstroemiaceen od. Guttiferen, XIII. 1) „Kielmeyer's“-Glanzblatt, s. g. Drehstamm (n. d. Staatsrat K. v. Kielmeyer in Stuttgart, † 1844), K. speciosa M., s. *Bonnetia* Schreb.
- Kieseria** Reinw., Nees (Ternstroemiaceen Theaceen od. Guttiferen, XIII. 1) „Kieserie“ (n. d. Prof. D. G. Kiefer in Jena), K. sericea Rw., stricta Nees (*Bonnetia* str. Mart.) etc.
- Kigelia** DC. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Kigelie“, s. g. Götzenholz (malabar. kigeli-keia, Wtst.), K. pinnata DC. (Afrika).
- Kiggelaria** L. (Capparideen Flacourtiaceen od. Terebinthaceen, X. 5 od. XXII. 9) „Kiggelarie“ (n. d. holländ. Bot. Francis Kiggelaar, schr.

- Phytographia curiosa Amsterd. 1702), *K. africana* L. (B.) u. *integrifolia* autt. (Str. Cap).
- Kinkina** Adans., s. *Cinchona* L. (vaterl.).
- Kirganelia** Juss. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Kirganelie“ (v. kirganeli, Nam. d. Pf. auf d. Malabarküste), *K. s. Urinaria indica* Burm. (Kirganeli Rheed.), *K. virginica* Juss. (Str.), s. *Phyllanthus Kirganelia* W.
- Kitaibelia** W. (Malvaceen, XVI. 8) „Kitaibel's“-Malve (n. d. Prof. P. Kitaibel in Pest, † 1818), Zier. *K. vitifolia* W., e. vine-leaved *K.*, fr. Kitaibélie à feuilles de vigne.
- Kittelia** Rehb. (Lobeliaceen, XIX. 6) „Kittel's“-Lobelia (n. M. Kittel, s. d. Aut.).
- Klaprothia** Hb., B., *K.* (Loasaceen, XIII. 1) „Klaproth's“-Brennwinde (n. d. Nat. Klaproth, schr. Beitr. z. chemisch. Kenntnis d. Mineralkörper, 6 Bde. 1795—1815), *K. mentzelioides* H. B. K., s. *Guapurium herbaceum* Spr.
- Klattia** Bak. (g. n.) (Irideen, III. 1) „Klatt's“-Schwertlilie (n. F. W. Klatt, s. d. Aut.), *K. partita* Bak.
- Kleinia** L. (zu *Cacalia* L.) (Compos. Baccharideen, XIX. 1) canarische Pestwurz M.-Rehb. (n. d. Bot. J. H. Klein), Zier. *Cacalia Kleinia* L., *Kl. articulata* L. „gliederstengl.“, *ficoides* Haw., *fulgens* Hook. etc.
- Klopstockia** Karst. (Palmen, XXI. 5) „Klopstock's“-Wachspalme (n. d. deutsch. Dicht. Klopstock), *Kl. cerifera* Karst. u. *Quinduensis* ds. (Columbia in Süd-am.), s. *Ceroxylon* Hb., Bpl.
- Klotzschia** Cham. (Umbelliferen, V. 2) „Klotzsch's“-Dolde (n. d. Bot. Klotzsch in Berlin).
- Klugia** Schldl., Endl. (Gesneriac. od. Bignoniaceen, XIV. 2) „Klugie“ (n. Friedr. Klug, schr. Bücher-Verz. d. Gesellsch. naturf. Freunde in Berlin, 1828), Treibh. *Kl. azurca*, Warmh. *zeylanica* Schdl.; *Klugia* Endl. s. *Didymocarpus* W., *Klugia* A. Juss. s. *Loxonia* Jack discolor u. *hirsuta* Jack (Sumatra).
- Knappia** Sm. (Gräser, III. 2) „Knapp's“-Gras (n. J. L. Knapp, Verf. d. brit. Gräser), *K. agrostidea* Sm., s. *Mibora verna* Adans.
- Knautia** Coult., L. (Dipsaceen od. Aggregaten, IV. 1) „Knaut's“-Grindrose, Ackersternkopf, Kleppel O. W. (n. d. Arzt Christoph Knaut z. Halle, † 1716), *Kn. arvensis* Coult. (*Scabiosa* arv. L.) u. *silvatica* Dub., *K. palaestina* L. f. (*Pterocephalus brachiatus* Spr.), *orientalis* L. f.
- Knightia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Knight's“-Silberfichte (n. d. Präsid. d. Gartenbau-Gesellsch. Thom. Andr. Knight Esq., † 1838), *K. excelsa* R. Br. (hoh. straff. B.).
- Kniphofia** Mnch., A. Rich. (Liliaceen, VI. 1) „Kniphofie“ (n. Joh. Jer. Kniphof, † 1765, schr. Lebendig Official Kräuterbuch, Erfurt 1733/34), *K. Quartiniana* A. Rich. s. *aloides* Mnch., s. *Tritoma Uvaria* Gawl.
- 1) **Knorrëa** Moç. u. Sess. (Terebinthac. Bursereen, VI. 1) „Knorr's“-Terebinthenbaum (n. G. Wolff. Knorr, schr. üb. Gartenpf. 1770—72), s. *Hedwigia* Sw. 2) **Knorria** Sternb., Göpp. (foss. Farnpalmen, XXIV. 1) „Knorr's“-Schuppenbaum, s. *Lepidodendron* Brongn.
- Knowltonia** Salisb. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Knowlton's“-Adonisröschen (n. d. Curator d. bot. Gart. s. z. Eltham, Thom. Knowlton, † 1781), *K. rigida* Sal. (*Adonis capensis* L. f.).
- Knoxia** L. (Rubiaceen. Cinchonaceen, IV. 1) „Knox's“-Chinastrauch (n. Rich. Knox, schr. Berichte v. Ceylon 1681), *K. scandens* P. Br. *Aegiphila elata* W.). *K. zeylanica* L. „Ceylon-Veronika“, s. *Dentelaria zeyl.* Raj., *K. brasiliensis* Spr., s. *Declieuxia herbacea* Schldl.
- Kobresia** W. (Cyperaceen, III. 1) „Kobresie“, Hüllsegge (n. Dr. v. Kobres in Augsburg, Förd. d. Bot., verkaufte 1811 sein Naturalienkabinet

- an d. Kronprinzen v. Baiern), K. s. Elyna Schrad., caricina W., s. Carex bipartita All. s. hybrida Schkuhr.
- Kobus** Banks (Magnolieen, XIII. 7) zierliche Magnolie (vaterl.), s. Magnolia gracilis Salisb.
- Kochia** Roth (Chenopodiaceen, V. 2) „Kochie“, Pfriemenblatt, Staudich O. W. (n. d. deutsch. Floristen W. Dan. Koch, Prof. z. Erlangen, † 1849), K. scoparia Schrad. (Chenopodium scop. L.), s. g. Studentenkraut Rmpl.
- 1) **Koelera (-ia)** Pers. (Gräser, III. 2) „Koeler's“-Kammgras, Kamm-schmiele, Ritschgras O. W. (n. G. L. Koeler, Prof. in Mainz, schr. Descr. graminum etc., 1802), K. cristata Pers. 2) **Koelera laurifolia** W. (Menispermaceen, XXII. 4) „Koeler's“-Mondsamenbaum, s. Limacia Becc. (B. St. Domingo).
- Koelpinia** Pall. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Kölpin's“-Milche (n. Al. Bernh. Koelpin in Greifswald, Pallas' Zeitgenossen, schr. üb. d. sibir. Schneerose 1779), K. linearis Pall., s. Lampsana s. Rhagadiö-lus Koelpinia L.
- 1) **Koelreutera** Spr. (-ia Laxm.) (Sapindaceen, VIII. 1) Koelreuter's“-Gelbrispentbaum (n. d. Prof. Joh. Koelreuter in Karlsruhe, † 1806), Zierb. K. paniculata Laxm. s. Paullinioides l'Hér., fr. savonnier paniculé, e. panicle-flowered K., s. Sapindus chinensis L. 2) **Koelreutera hygrometrica** Hedw., s. Funaria h. Hedw. (Moose, XXIV. 2).
- 1) **Koenigia** Comm. (Büttneriaceen, XIV. 2) „Königie“ (n. d. dän. Nat. u. Reis. Joh. Gerh. König) (schwerl. Paxton: n. d. Schweiz. Math. Sam. König!). 2) **Koenigia** L. (Polygonaceen, III. 3), z. B. K. islandica L., nepalensis Don.
- Kohlrauschia** Kth. (Caryophyllen, X. 2) „Kohlrausch“-Nelke (n. d. Pädag. u. Geschichtsschr. Kohlrausch in Hannover, † 1867? od. Physiker Kohlrausch in Erlangen, † 1858? ungew.), K. prolifera Kth., s. Dianthus prolifer L. (Tunica prol. Scop.)
- 1) **Kolbea** Schldl. (Melanthac. od. Juncaceen, VI. 3) „Kolbe's“-Giftililie (n. d. Reis. M. B. Kolbe, schr. Besch. d. Vorgeb.'s d. Guten Hoffn. u. d. Hottentotten, Frkft. 1745), K. elegans P.-B., Breyntiana Schldl. (Tulipa Br. L.). 2) **Kolbia** P.-B. (Passifloreen, XVI. 2) (n. d. Nam. Kolb).
- Koniga** R. Br. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Meerstrands-Steinkraut, K. maritima R. Br. (n. Charl. König, Insp. d. brit. Museums, mit Sims 1805—1806 Annales of Botany), s. Alyssum mar. L., Teppichg. K. variegata Hort., etc., s. Adyssetum (-on) Adans., Glyce u. Farsetia libyca Spr.
- 1) **Kopsia** Blume (Apocynen, V. 1) „Kopsie“ (n. d. Prof. Kops, m. Van Hall, Miquel etc. Verf. d. Fl. batäva, fig. col. etc. Amsterd. 1800—1860). 2) **Kopsia** Dumort. (zu Orobanche Rchb.) (Personaten Orobanchen, XIV. 2), z. B. coerulea Vill., arenaria Borkh. etc.
- 1) **Kosteletzkya** Presl (Malvaceen, XVI. 6) „Kosteletzky“-M., z. B. hastata Pr. (s. d. Aut.). 2) **K. J. Eck.** (Algen, XXIV. 3).
- Krameria** Loeffl. (Polygalaceen, XIV. 2 od. IV. 1) „Kramerie“ (n. d. öster. Arzt etc. G. H. Kramer, schr. elenchus vegetab. et animal. per Austriam inferiorem etc. Vienna 1756), z. B. triandra Loeffl. (peruvian. ratanhia), s. Ixina L. (Str. Amer.).
- 1) **Krockeria** Mnch. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Krocker's“-Klee (n. d. Bot. A. Krocker, schr. Fl. Silesiaca etc.), K. s. Lotus oligoceras-tos Mnch. 2) **Kr. Neck.** (Anonaceen, XIII. 6).
- Kuhnia** L. f., Schreb. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Kuhn's“-Wasserdost (n. Adam Kuhn, Linné's Schüler), K. Critonia W. s. Dalea eupatorioides L. (Eupatorium alternifolium Ard.), s. Critonia P. Br., Kleinia L. u. Jaumea Pers.

- 1) **Kunthia** Hb., Bpl. (Palmen, VI. 1) „Kunth's“-P. (n. d. ber. Bot. K. Sig. Kunth in Berlin, A. v. Humboldt's Freunde), *K. montana* H. B., *xalapensis* Dietr. (Chamaedorea Schiedeana Mart.). 2) **K.** Dennst. (Terebinthac. Bursereen, X. 1), s. *Garuga* Roxb.
- 1) **Kunzēa** Spr. (Rosac. Prockieen od. Pomaceen, XII. 1) „Kunzee“ (n. d. Prof. Kunze in Leipzig), *K. tridentata* Spr. (*Tigarea trid.* Pursh), s. *Purshia* DC.
- Kutchubaea** Fisch. (Rubiaceae. Gardenieen, V. 1) „Kutschuby's“-Gardenie (n. Kutschuby, Minist. d. Innern in Russland zu Fischer's Zeit), *K. insignis* Fisch.
- Kydia** Roxb. (Polygonaceen, VIII. 3) „Kydie“ (n. d. Colonel Rob. Kyd, Dir. d. bot. Gart. z. Calcutta), *K. calycina* u. *fraterna* Roxb.
- Kyllingia** L. f., W. (-ga Rottb.) (Cyperaceen, III. 1) „Kylling's“-Kopfriet (n. d. dän. Bot. P. Kylling, † 1696, schr. *Viridarium danicum*, 1628), z. B. *monocephala* L., s. *Schoenus coloratus* L. u. *Mariscus col.* Vahl.
- 1) **Labatia** Sw. (Styraceen, X. 1) „Labat's“-Storaxbaum (n. d. franz. Mönch u. Missionair J. B. Labat, † 1738 in Paris). 2) **Labatia** Scop. (Aquifoliaceen, IV. 4) „Labat's“-Stechpalme.
- Labiatae** Juss., DC., Rehb. „Lippenblüter“, Rachenblumige (v. *labium* Lippe) XIV. 1 L.
- Labiatiflorae** Bartl., DC., Ord. d. Lippenblumigen (s. eb. u. *flos*, -öris Blume) i. q. *Labiatae* Juss.
- Lablab** Savi (sc. *Dolichos*) L. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) gem. od. „Lablab“-Faselbohne (arab. *lablab* od. *liblab*), Zier. *L. vulgare* Savi s. *microcarpus* DC. (*Dolichos purpureus* Jacq.), fr. *dolique d'Egypte*, e. *hyacinth-bean* m. v. *fl. alba* Hort. u. *albus nanus* Hort., s. *Lablavia* Adans.
- Labrusca** (sc. *Vitis*) L. (Ampelideen, V. 1) filziger Weinstock, fr. *vigne labrusca* od. *de renard*, e. *wild-vine* od. *fox-grape* „Fuchstraube“ (*labrusca* wilde Weinrebe, v. d. hebr. *busca* Wtst.), s. *Vitis aestivalis* Mehx. Sommerrebe v. Carolina.
- Laburnum** Med., DC., Mill. (zu *Cytisus* Rehb.) (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Goldregen, Bohnenbaum, fr. *laburne* od. *l'aubours*, *faux ébenier*, e. *Pea-scod-tree*, *bean-trefoil*, *bean-tree*, Zier. *L. vulgare* Gris., s. *Cytisus Laburnum* L., *L. nigricans* L., *Adami* Poir., *alpinum* Mill. (*Cyt. alp.* Mill.) etc. (st. *albumum* Splint, von *album* sc. *lignum* — sehr weiss. Splint u. hart. Holz, Plin.).
- Lachenalia** Jacq., L. (Liliaceen, VI. 1) „Lachenal's“-Hyazinthe (n. Werner de Lachenal, Prof. d. Bot. z. Basel, † 1800), Warmh. *L. orchiooides* Ait. (Phormium s. *Hyacinthus orch.* L. f.), *tricolor*, *quadricolor*, *uniflora*, etc.
- Lacis** Schreb. (Podostemeen, XIII. 2) „Schlitzblatt“ D. (gr. *λακίς* Fetzen — geschlitzte Blätt. u. Blütenscheide), z. B. *foeniculacča* Schr. (*Marathrum foen.* Hb.) s. g. *Passecarne-Gemüse* v. Neugranada „übertrifft Fleisch“, *fluviatilis* W. (*Mourera fl.* Aubl.) etc.
- Lacistēma** Sw., W. (Urticac. od. Myricaceen, II. 3) „Schlitzfaden“, Gagelpfeffer D. (s. eb. u. *στῆμων* Staubfaden, lat. *stamen* — diese zweiteilig), *L. piperoides* W. (*Piper aggregatum* Berg.) (Str. Jamaica, Surin.).
- 1) **Lactuca** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Lattich“, fr. *laitue*, *laiteron*, e. *lettice*, *lettuce* (v. *lac*, -ctis Milch — führt Milch in d. Gefässen!), *L. sativa* L. *Lattich-Salat*, v. *romana* Hort. „Römersalat“, s. g. *Sommer-Endivie* (z. B. *gelber Pariser*, *Romaine blonde maraichère*, *gelber Alphange*, *Forellen-* u. *Strunksalat*), v. *capitata*

- Hort. „Köpfsalat“ (z. B. Steinkopf, Eiersalat, Kopf-Montrée, Schwedenkopf etc.), v. Stech- od. Rupfsalat, s. g. Latsche, Schnittsalat, v. augustana Hort. Spargelsalat (Strunks.); wild L. scariöla L. Wild-L., virosa L. „Gift“-L., etc. 2) *Lactuca* (sc. Ulva) L. (Algen, XXIV. 3) Meer-Lattich, fr. laitue de mer.
- 1) **Ladänum** Alp. (-nium Spach) (Cistaceen, XIII. 1) „Ladanum“-Gummi (v. d. *λῆδος*-Strauch gesamm. Harz = ladänum), L. creticum Alp., s. Cistus cret. L. u. ladaniferus L. 2) **Ladänum** (sc. Galeopsis) L. (Labiaten, XIV. 1) schmalblättr. Hohlzahn, s. Galeopsis angustifolia Ehrh.
- 1) **Laelia** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Lälia“-O. (Laelius, römischer Geschlechtsname), z. B. grandiflora Ldl. (Mex.). 2) **Laelia** Adans. (Cruciferen Buniadeen, XV. 1) Zacksenchole, L. cochlearioides Pers. (Bunias cochl. L.), s. Calepina Corvini Desv.
- Lagenaria** Ser. (Cucurbitaceen, XXI. 9) „Flaschenkürbis“, s. g. Calabasse, fr. gourde-calabasse u. coui od. courge-bouteille, e. bottle-gourd od. large-american-gourd (v. *λάγγρος*, lat. lagena Flasche, weitbauchige mit engem Hals), Zier. L. vulgaris Ser. (Cucurbita Lagenaria L. s. leucantha Duchesn.) m. v. Gurda Ser. Pilgerflasche, fr. gourde de pèlerin, L. v. Cugurda L. Heberkürbis, fr. gourde siphon od. courge en entonnoir, v. clavata Ser. Herkuleskeule (L. clavaeformis Hort.), v. pyrotheca Sw. Pulverflasche, fr. gourde poire à poudre, e. powder-horn, v. depressa Ser., v. longissima Hort., fr. g. massue-très-longue.
- Lagerstroemia** L. (Lythrarieen, XIII. 1) „Lagerstroem's“-Baum (n. Magn. v. Lagerstroem, Dir. d. ostind. Kompagnie z. Gothenburg in Schweden, † 1759), L. regina Roxb. prachtvoller L., L. grandiflora Roxb. (Dua-banga gr. Kurz).
- Lagetta** Juss. (Myrobalaneen, VIII. 1) Leinwand- od. Spitzenbaum Leun., Schnurrenrinde (Nam. d. B.'s in Jamaica lagetto), L. funifera Mart. u. lintearia Lam. (Archipel), s. Daphne brasiliensis Raddi, etc.
- Lagoecia** L. (Umbelliferen, V. 2) Hasenkümmel, „-haus“, Federknopf D. (v. *λαγώς* Hase, *οἶκος* Haus — Samen in Wollhüllen, wie kl. Häschen!), L. cuminoides L. (Cuminum sylvestre Bauh.).
- Lagopodium** Ser. (zu Trifolium Rehb.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) „Hasenpfötchen“ (s. eb. u. *ποδίον* dem. v. *πούς*, *πόδος* Fuss, Socke — Aussehn d. zott. Köpfchen!), s. Trifolium arvense L.
- Lagopus** Ser. (Leguminos. Trifolieen, XVII. 4) „Hasenfuss“, -pfötchen i. q. Lagopodium! (s. eb.).
- Lagosëris** Lk., M. B. (zu Barkhausia Rehb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Hasensalat“ (s. v. u. *σέλις* Salat), L. taraxacoides Lk. etc., s. Crepis u. Barkhausia Mneh.
- Lagunaea** Cav., Schreb. (Malvaceen, XVI. 8) „Laguna's“-Malve (n. d. span. Arzt u. Bot. d. 16. Jahrh.'s Andr. Laguna), L. aculeata Cav. (Hibiscus Solandra l'Hér. s. Solandra lobata Murr.).
- Lagunaria** DC., Endl. (Malvaceen, XVI. 8) „Lagunamalvenartige“ (s. eb.), z. B. L. Pattersoni DC. (lilablüh. Prachtb.).
- Lagurus** L. (Gräser, III. 2) „Hasenschwanz“, Sammetgras, fr. lagurier, lagure, e. hare's-tailgrass (s. v. u. *ὄβρα* Schwanz — kurze, weiche Ähre!), Zier. L. ovatus L., fr. l. à épis ovales, gros Minet, e. egg-eared-h.-t., L. cylindricus L., s. Saccharum cyl. Lam.
- Lalage** Lindl. (Leguminosen, XVII. 4) „Lalagestrauch“ (n. der von Horaz verewigten Lalage — prächt. Aussehen!), L. ornata Ldl. (Neuholl.).
- Lallemantia** Fisch., Mey., M. B. (Labiaten, XIV. 1) „Lallemant's“-Drachenkopf (n. Avé Lallemant, Adjunkt d. bot. Gartens in Petersb.), z. B. iberica M. B. (Dracocephalum ib. M. B.) (Ölpfl.).

- 1) **Lamarckia** Mneh. (zu Cynosurus Rehb.) (Gräser, III. 2) Goldschwanzgras (n. d. Prof. J. B. de Lamarck in Paris, † 1829), Zier. *L. aurēa* Mneh. (Cynosurus aur. L.), fr. Lamarckie dorée. 2) **Lamarckia** Rich. (-ckea Pers.) (Solaneen, V. 1) „Lamarck's“-Stechapfel, *L. coccinea* s. *glaberrima* Rich., s. *Datura* L. 3) **Lamarckia** Bursa Olivi (Tange, XXIV. 3), s. *Codium Bursa* Ag.
- Lambertia** Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Lambert's“-Silberstrauch (n. d. Bot. Aylmer Bourke Lambert Esq.), *L. formosa* Sm. (Str. Neuholl.).
- Laminaria** Lamx. (Leder-Tange, XXIV. 3) Riemen- od. „Blatt“-Tang (lamina Blech, Blatt), z. B. *esculenta* Lamx., *digitata* Lamx. etc. — *Laminariaceae* Ag. „Blatt“-Tange“.
- Lamium** L. (Labiaten, XIV. 1) Taubnessel, Bienensaug, Saug O. W., fr. lamion (-mier), oeil de chat, e. archangel, dead-nettle (blind-) (v. *λάμος* Schlund od. *Λαύλα* fabelh. Ungeheuer, Haifisch — aufger. Rachen!), *L. album* L., fr. lamier blanc, pièd-de-poule, *L. maculatum* L. rotes Bienenhütel etc.
- Lamprophyllae** Bartl., DC. „Glanzblattgew.“ (*λαμπρός* glänzend, *φύλλον* Laub).
- Lamprostachys** Boj. (Labiaten, XIV. 1) „Glanz-Ziest“ (s. eb. u. *Stachys* Ziest, v. *στάχυς* Ähre — schöne, glänz. Endtraube).
- Lampsäna** T., Váill. (**Lapsäna** L.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Rainkohl, Hasenlattich, Milche Grek., fr. lampsane, herbe aux ragades „Rainkr.“ (gr. *λαμψάνη* u. *λαψάνη* v. *λαπάζω* purgiere).
- Lanaria** Ait., Thb. (Amaryllideen, VI. 1) „Woll“-Hyazinthe, Filzlinie (v. lana Wolle — Blume u. Fruchtknoten filzig), *L. plumosa* Ait., s. *Hyacinthus lanatus* L. (*Argolasia* Juss.).
- Lansium** Blum., Rumph. (Hesperideen Meliaceen, X. 1) echter „Lansabaum“ Leun. (wahrsch. vaterl. Name zu Grund liegend), *L. domesticum* Jack (*Cipadessa fruticosa* Blum., Str. Molukken), *L. montanum* Jack (*Milnaea* m. Roxb.) (Str. Sumatra).
- 1) **Lantāna** L. (Verbenaceen, XIV. 2) Schneeball-Verbene, s. g. Wandelröschen Rmpl., fr. lantaniere (nicht v. lana Wolle, sondern Wtst. v. lentare biegen), Zier. *L. hybrida* Hort. Blendling von *L. Camāra* L., *L. nivea* Vent., *crocēa* Jacq. (— Ähnlichk. m. *Viburnum*!). 2) **Lantāna** (sc. *Viburnum*) L. (Lonicereen, V. 3) filziger Schneeball, gem. Schlinge, Bandstrauch u. Pabstweide Rmpl., fr. hardeau od. manciene (-sienne, mentiane), e. way-faring-tree od. wild guelder-rose.
- Laodicēa** s. *Lodoicēa* Comm.
- Lapāchys** Torr. u. Gr. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Drummond's Rudbeckie, schönste Obeliskenblume, s. *Rudbeckia Drummondi* Hook. = *Obeliscaria pulcherrima* DC. (v. *λαπάζω* höhle aus u. *laxiere*?).
- Lapageria** Rz. Pv. (Smilaceen, XXII. 6) „Lapagerie“, Warmh. *L. rosēa* R. P. (n. d. Nam. Tascher de la Pagerie, d. Familiennamen d. Kaiserin Josephine, Dietr. u. Wtst.: n. d. Bot. Jos. Lapagerie).
- Lapāthum** T., Scop., Lam. (zu *Rumex* Rehb.) (Polygonaceen, VI. 3) Zwitterblüt-Ampfer (gr. *λάπαθον* Ampfer v. *λαπάζω* purgiere), z. B. *R. Hydrolapāthum* Huds. Fluss-A., *Nemolapāthum* Ehrh. sc. *conglomeratus* Murr.
- 1) **Lapeyrousia** Gawl., Pourr. (-peyrousia autt.) (Irideen, III. 1) „Lapeyrouse's“-Schwertel (n. d. Bot. La Peyrouse), z. B. *L. abyssinica* Bak. (*Geissorhiza* ab. R. Br.) „Schindelwurzel“, *bracteata* Thb. (*Gladolus* br. Thb.). 2) **Lapeyrousia** Thb. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 3), *calycina* Thb. (Osmites cal. L. f.).
- Laplacēa** H. B. K. (Ternstroemiaceen, XIII. 5) „Laplace's“-Baum (n. d. berühmt. Math. etc. Laplace), *L. speciosa* Kth. (Südam.), *inaequalitēra* Schott (*Gordonia semiserrata* Spr. — nur zur Hälfte gesägte Blätt., daher „ungleichseitig“!).

- Lappa** T. (sc. *Arctium*) L. (Composit. *Carduaceen*, XIX. 1) Klette, fr. cousins, e. base-rocket (lat. lappa v. d. celt. llap Hand, gr. *λάγνη* ergreife — wegen d. häckrigen Kelchschuppen!), *L. major* G. (Arct. Lappa L.), *L. minor* DC. (glabra Lam.), *tomentosa* Lam. (Arct. *Bardana* W.) etc.
- Lappago** Schreb. (Gräser, XXIII. 1) „Kletten“- od. Stachelgras (s. eb. — stachlig gefranste Kelchspelzen), z. B. *L. racemosa* Schreb., s. *Cenchrus rac. L.* u. *Phalāris muricata* Forsk.
- 1) **Lappula** Mnh. (sc. *Myosōtis*) L. (Boragineen, V. 1) „Klettchen“- od. Stachelsamen-Vergissmeinnicht (dem. lappa Klette — Klettenfrüchte!).
- 2) **Lappula** L., DC. (Tiliaceen, XI. 1) (sc. *Triumfetta*) Jacq. (— hakeige Kapseln).
- Lapsana** T. s. *Lampsana* T., Vaill.
- Larbrēa** St. Hil. (zu *Stellaria* Rchb.) (Alsinaceen, X. 5) Wasser-Sternmiere, -Weichling Grck., -Hornkr. (n. d. Abbé de l'Arbre, schr. Fl. de l'Auvergne, 1795), *L. aquatica* St. Hil. = *Malachium aq. Fr.* (*Cerastium aq. L.*).
- Lardizabāla** Rz. Pv. (Menispermaceen od. Berberideen *Lardizabaleen*, XXIII. 2) „Lardizabal's“-Schlingstr. (n. d. span. Nat. Mich. *Lardizabal y Uribe*), *L. bi- u. triternata* R. P. (Chili), s. *Boissieria trit. Domb.* — *Lardizabalēae* DC. (zu *Berberidēae* DC.).
- Laricio** Poir. (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) „Lärchenkiefer“, Meerstrands- od. corsische Kiefer Rmpl., fr. pin de Corse, e. corsican od. larch-pine, s. *Pinus maritima* Mill. od. *sylvestris v. marit. Ait.* (v. *larix*, -icis Lärche).
- Larix** DC. (sc. *Pinus* L., sc. *Abies* Poir.) (Coniferen, XXI. 9) „Lärche“, fr. mélèze, e. larch-tree (larsh, larynx-tree) (lat. *larix*, -icis Lärche), wild u. Zier. *L. decidua* Mill. s. *europaea* DC. (*excelsa* Lk., *vulgaris* Fisch.) m. v. *pendula* Hort., *L. americana* Mchx. (*pendula* Salisb., *microcarpa* Poir., *Pinus laricina* Dur. etc.), fr. mél. d'Amérique, e. american larch, *L. davurica* Turcz., sibir. Ceder, Lärche v. Dahurien in Sibir., etc.
- Larochēa** Pers. (Crassulaceen, V. 5) „Laroché's“ od. schönrotes Dickblatt (n. d. Genfer Arzt u. Bot. Franç. Laroché, schr. üb. *Ixia* u. *Gladiolus*), Topfbl. *L. coccinea* Pers. (*Crassula c. L.*, *Dietrichia c. Tratt.*); s. *Rochea* DC.
- Laserpitium** T. (Umbelliferen, V. 2) Laserkraut, fr. laser, sermontaine, e. lazer-wort (laser-) (gr. *λάσαρον* i. q. *Σίλγιον*, eine Arznei- od. Speisepfl., u. *pix*, -icis Pech etc., Wtst. *πιτίζω* tröpfle), z. B. *latifolium* L., *Siler L.* etc.
- Lasiagrostis** Lk., Kth. (Gräser, III. 2) „Rauhgras“ (*λασιός* rauh etc., *ἀγρωστι*; Feldgras — d. Kronspelzen rauhhaarig), s. *Stipa splendens* s. *Calamagrostis* Wahlbg. (*Calamagr. speciosa* Host, *Arundo spec. Schrad.*).
- Lasiandra** DC. (Melastomaceen, X. 1) „Zotten-Staubfaden“ (s. eb. u. *ἀνδρο*, -δρό; Mann, Staubfaden — diese meist behaart), Winter-Topfbl. *L. Fontanesiana* DC., *coerulea* (Melastoma *coer. Hort.*), *lepidota* Naud., *macrantha* Lindl., etc.
- Lasiopetalum** Cass., Sm. (Büttneriaceen, V. 1 od. XVI. 7) „Woll-Blumenblatt“ (s. v. u. *petalum* gr. *πέταλον* Kron- od. Blumenblatt — diese unten rostfilzig), Treibh. *L. parviflorum* Rudg. (Str. Neuholl.), *ferruginæum* Andr., *arborescens* Ait. (*Gaya platyphylla* Spr.), *purpurea* Sims (Thomasia p. Gay) etc.
- Lastula** Alfd. (Legumin. Vicien, XVII. 4) „Haarflocken“-Platterbse (*λασιός* zottig, *τίλον* Flocke), *L. hirsuta* Alfd. = *Lathyrus hirs.* *L. Lastraea* Presl (-strēa Bory St. Vinc.) (Farne, XXIV. 1) „Delastre“-

Farn (n. C. J. L. Delastre, schr. 1835 üb. d. Veget. d. Depart. de la Vienne), Zier. *L. patens* Presl (eleg. Grosswedel).

Latania Comm. (Palmen, VI. 1) Schirmpalme (fr. u. ind. latanier nach vaterl. Namen!), Warmh. *L. borbonica* Lam., fr. latanier rouge (cléophore), s. *Livistonia* s. *Corypha chinens.* Mart. (Ins. Bourbon od. Mauritius).

Lathraea L. (Orobanchen, XIV. 2) „Geheim“-Schmarotzer, Schwammkraut, Schuppenwurz, fr. clandestine od. herbe cachée u. écaillée, *L. squamaria* L., fr. auch herbe à la matrice (*λαθραϊο;* heimlich), s. *Orobanche* L.

Lathyrus (sc. *Euphorbia*) L. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) kreuzblättr. Wolfsmilch, Spring- od. Maulwurfskraut M.-Rchb., fr. catapuce (gr. *λαθυρίς*; v. *λά* sehr u. *ἔρω* heile od. *σοφός*; heftig — Samen stark purgierend).

Lathyrus L. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) Platt- od. Blatterbse, fr. gesse, e. chickling-vetch (gr. *λάθυρος*; Paxton *λά* als Augment od. sehr, *σοφός*; hitzig — früher als *Aphrodisiacum*, Wtst.), Saaten *L. tuberosus* L. Erdmandel od. -nuss, fr. suron, gesse-tubéreuse, magon (macusson, mégusson, minson), e. earth-pea od. -nut, Zier. *L. odoratus* L., spanische Wicke, m. v. v., fr. gesse odorante od. pois de senteur, e. lady's-pea (sweet-), z. B. v. Kronprinzessin v. Preuss., *L. tingitanus* L., fr. gesse de Tanger, *L. latifolius* L. Bouquetwicke (Wolfschote) m. v. v. (albo, roseo, splendens Hort.), *grandiflorus* Bot. Mag. s. *biflorus* Raf., e. large-flowered-everlasting-pea, etc.

1) **Laugeria** Sw., Vahl (bess. **-geria** Spr.) (Ehretiaceen od. Hydrophyllaceen, V. 1) „Laugier's“-Wasserblatt, fr. laugier (u. Laugier, schr. anal. de l'amphibole du cap de Gattes), Zier. *L. odorata* L. (*Edechia* Loefl.). 2) **Laugeria** Jacq. (**-geria** Rz. Pv.) (Rubiaceen. Guettardeen, V. 1), s. *Guettarda hirsuta* u. *tomentosa* R. S.

Lauræae Rchb. (**-ri** Juss., **-raceae** DC.) (zu *Laurinæae* Vent., Rchb., Orl. d. Lorbeergew.), s. *Laurus*!

1) **Laurœola** (sc. *Daphne*) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) lorbeerblättr. Seidelbast, immergrüner S., Zindelbast, Lorbeerstaude Vilm., fr. laurœole mâle od. des Anglais, e. spurge-laurel, s. *Thymelæa Laurœola* Scop. (dem. v. *Laurus*). 2) **Laurœola** Meissn. subgen. v. *Daphne* (Thymel., VIII. 1), z. B. D. *Laureöla* u. D. *pontica* L.

1) **Lauro-Cerasus** T. (sc. *Prunus* L. s. *Cerasus* Lois.) (Amygdalaceen, XII. 1) Kirschlorbeer, eig. „Lorbeerkirsche“, fr. laurier-cerise, amandier, laurier au lait, e. cherry-bay (-laurel) od. laurel-cherry (v. *Laurus* Lorbeer u. *Cerasus* Kirsche). 2) **Laurocerasus** Lauché Gruppe v. *Prunus* „Kirschlorbeerbäume“, z. B. Pr. *Lauro-Cer.*, *caroliniana* Mill., *lusitanica* L.

Laurus Plin., T., L. (Lauraceen, IX. 1) Lorbeer, fr. laurier, e. laurel, bay-tree (v. d. celt. blaur d. i. schöngrün, Paxton u. Wtst., letzt. auch viell. v. laus Lob — mit Lorbeer gekrönte Sieger!), Zier. *L. nobilis* L. edler L., *L. Sassafras* L. u. *L. Benzoin* L., *Lindera Benzoin* Meisn. „Benzoe-Lorbeer“ (N.-Amer.).

Lavandula L. (Labiaten, XIV. 1) „Lavendel“, fr. lavande, e. lavender od. spike (-nard) römischer Lavendel, *L. Spica* L. f. (v. lavo bade, wasche — beim Baden d. Römer!).

Lavatera T. (Malvaceen, XVI. 8) „Lavater“, Pappelrose Rmpl., Erne O. W., fr. lavatère (n. d. beiden Schweizer Ärzten etc. in Zürich Lavater, Freunden Tournefort's), Zier. *L. arboræa* L. Malvenbaum, fr. mauve de mer (-en arbre), e. mallow-tree, tree-like *Lavatera*, *L. trimestris* L. Dreimonats-Pappel, Sommer-P. Vilm., fr. mauve-fleuri, e. three-monthly *L. m.* v. fl. albo.

Lavauxia (**-zia**) Spach (Onagrarieen, VIII. 1) löwenzahnblättr. Nacht-

- kerze, *L. mutica* Spach, s. *Oenothera taraxacifolia* Sweet (n. Franç. Delavaux, Gründ. d. bot. Gartens z. Nîmes).
- Lavoisiera** DC. (Melastomac. Merianeen od. Lythrarieen, X. 1) „Lavoisiere“ (n. d. ber. Chemiker etc. Lavoisier, guillot. 1794), *L. alba* DC. etc. — Lavoisieræ DC. (zu Melastomacæe Rchb.).
- Lavradia** Vand., Velloz. (*Lauradia* Spr.) (Violarieen Droseraceen, V. 1) „Lavradiostroauch“ (n. d. Marquis v. Lavradio, Vicekön. v. Brasilien), *L. alpestris* Mart. s. *ericoides* St. Hil. (Str. Bras.), elegantissima St. Hil. (Sauvagesia el. St. Hil.), etc.
- Lawsonia** L. (Lythrarieen, VIII. 1) Alkanastrauch (n. John Lawson, schr. Beschr. Vor. Carolina, Lond. 1709), *L. Acronychia* L. (*Acronychia laevis* Forst.).
- Lazarölus** Borkh., Med. (Pollveria Med.) (Pomaceen, XII. 4) Pollviler od. Bollweiler-Birne, fr. poirier cotonneux, e. Bollwyler pear-tree, s. Pirus Pollveria L. s. Bollwilleriana DC. (tomentosa Mnch., auricularis Knoop) (v. *λασιώς* rauh u. Azarölus, s. d.).
- Lebeckia** Thb. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Lebeck“—Mimose, fr. Ébénier de l'Orient, s. Mimosa Lebeck L. (n. d. arab. loebach), *L. contaminata* Thb. (*Spartium* cont. L. f.), *cytisoides* Thb. (*Ebënus capensis* L. f.), etc.
- Lebretonia** Schrank (Malvaceen, XVI. 8) „Lebreton's“—Malve (Levretonia Schrk.) (n. F. Manuel Lebreton, schr. de botanica à l'usage d'amateurs, Par. 1787), z. B. *L. coccinea* Schrk. (*Pavonia* Schrankii Spr.).
- Lecanora** Ach. (Flechten, XXIV. 3) Kuchenflechte, „Schüsself.“ (v. *λεξάνη* Schüssel etc. u. *ὄρω* sehe aus — d. Scheibe anfangs concav!), z. B. *L. varia*, *ventosa*, *tartaræ* etc.
- Lechenaultia** R. Br. (Goodenovieen, V. 1) „Lechenault's“—Goodenovie (n. d. franz. Reis. Lechenault de la Tour), z. B. Warnh. *L. formosa* R. Br., *grandiflora* DC. (*biloba* Lindl.), *multiflora* Lodd. etc.
- Lecythidæe** Rich. (zu Melaleucacæe Rchb.) Topfbaumgew. Leun., s. sogl. **Lecythis** Loeffl. (Melaleucac. Lecythideen, XIII. 1) „Topfbaum“, Topfruchtbaum (v. *λέκυθος* od. *λέκος*, -εος Topf — d. Frucht gleicht einem bedeckelten Topf!), *L. Ollaria* L., fr. marmite de singe (Jacapucaya Maregr.), *L. bracteata* W. (Coutoupita guian. Aubl.).
- 1) **Ledebouria** Roth (Sarmentac. od. Smilaceen, VI. 1) „Ledebour's“—Hyazinthe (n. d. Prof. Ledebour in Dorpat, s. d. Aut.), *L. hyacinthina* Roth (*Erythronium indicum* Rottl.). 2) **Ledeb.** Lk. (Umbelliferen, V. 2), Ledebour's od. taurische Bocksoldde, *L. pimpinelloides* Lk. (*Tragium tauricum* Ledeb.).
- 1) **Lëdon** Clus. (Ericaceen, X. 1) i. q. *Lëdum* L. Porst (gr. *λήθος* lat. *Lëdum*, Porststrauch), z. B. *L. latifolium* Clus. = *Kalmia latifolia* L. 2) **Lëdon** (sc. *Cistus*) Lam. (Cistaceen, XIII. 1), s. *Ledonia* Dun. mittelländ. Cistrose, *Ladanum*-Gummistrauch, s. *Cistus ladaniferus* Monspeliensum Duham.
- Lëdum** L. (Ericaceen, X. 1) Porst od. Porsch, Knie-Porst, wilder Rosmarin, fr. lëdon u. romarin de Bohême od. sauvage, e. sweet-willow (-gale), s. g. niederländ. Myrte (gr. *λήθος*, *Ladanum*-Strauch, Zier. *L. palustre* L., fr. lëdon des marais, s. g. Bienenheide Vilm., Mottenkraut Rmpl., Wanzenkr. Leun., Brauerkr. Vilm., fr. auch herbe aux punaises.
- Leea** L. (Ampelideen od. Hesperideen Leaceen, V. 1) Wasserrebe (n. Jam. Lee, Gründ. d. Hammersmith-Züchtereie, † 1795), *L. sambucina* L., *javanica* Blum. (*Staphylæa indica* Burm. u. *Aquilia* Cav.), *L. spinosa* Spr., s. *Aralia chinens.* L. — Leacæe (sc. Hesperidæe) Rchb.

- Leersia** Sm., Soland. (Gräser, III. 2) „Leersie“ od. Reisgras (-quecke), *L. oryzoides* Sm. deutsch. Reis Rmpl. (n. d. Univ.-Apoth. Joh. Dav. Leers zu Herborn, † 1774), s. *Oryza clandestina* A. Br.
- Legnötis** Sw., W. (Rhizocarpeen od. Elaeocarpeen, XIII. 1) „Bortenohr“, Saublume Dietr. (*λέγνη* od. -*νον* Borte, *οὖζ*, *ἄτος* Ohr — gefranst. Kronsaum), z. B. *elliptica* Sw. u. *L. Cassipourea* Sw. (Cassipourea guian. Aubl.).
- Leguminosae** Juss., DC., Endl., Rchb. Kl. od. Ord. d. Hülsenpfl. (v. legümen, -inis Hülsenfrucht).
- Leycesteria** (Leyc.-) Wall. (Rubiaceen, V. 1) „Leycesterstrauch“ (v. W. Leycester, Ober-Richter in Bengalen, eifr. Beförd. d. Gartenbaus), *L. formosa* Wall.
- Leimanthium** Mchx., W. (Melanthac. od. Juncaceen, XXIII. 1) „Wiesenblume“ (*λειμών* Wiese, *ἄρθιον* dem. v. *ἄρθος* Blume), z. B. *laetum*, *pellucidum* W. etc., s. *Melanthium* u. *Veratrum*.
- 1) **Leiocarpum** DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Glattfrucht“-Rebhuhnlattich (*λείος* glatt, *ζαροπός* Frucht — Achenien glatt), s. *Perdium* L. 2) **Leiocarpus** Blum. (Euphorbiaceen, XI. 9). 3) **Leiocarpus** DC. (Myrobaleen, X. 5) (zu *Anogeissus* Wall.).
- Leiochilus** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Glattlippe“ (s. eb. u. *ζεῖλος* Lippe).
- 1) **Leiophyllum** Pers. (Ericaceen, X. 1) „Glattblatt“, Sandmyrte Lauch. (s. v., *γυλλόν* Laub — d. Blätt. beiderseits sehr glatt), *L. buxifolium* Ell. (Ammysine b. Pursh, *Ledum* b.). 2) **L.** Miq. (Piperaceen, II. 3) (zu *Artanthe* Miq.) „Glanzblatt“-Pfeffer — Blätt. oben glänzend glatt, unten weichhaar.).
- Lembotropsis** Griseb. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Nachenkiel“, Schiffchenblume od. Ähren-Geisklee Rmpl. (*λέμβος* Nachen, *τοόπις* Schiffskiel — d. Carina nachenförm.), Zier. *L. nigricans* Gris., s. *Cytisus* nigr. L.
- Lemna** L. (Najadeen od. Lemnaceen, II. 1) Wasser- od. Meerlinse, Entenfloß, -grün Leun., fr. lentille d'eau (- de marais), canillée od. lenticule, e. duck-meat (-weed), fen-lentil (gr. *λέμνα* od. *λέμμα* Schale, Schuppe, od. Wst. v. *λέμνη* Sumpfteich!), s. *Hydrophace* Hall. — *Lemnaceae* (zu *Najadéae*) DC.
- 1) **Lemonia** Lindl. (Rutaceen, V. 1) „Lemon's“-Raute (n. Bar. Sir Charl. Lemon, nicht Wst. v. *λειμών* Wiese!). 2) **Lemonia** (zu *Gладиолус*) Pers. (Irideen, III. 1) „Lemon's“-Schwertel.
- Lemo ferus** Rumph. (Hesperid. Aurantieen, XVIII. 2) wilde Lemone od. Orange (Lemo od. Limo, s. g. *Pompelmuse* od. *Citrone*).
- 1) **Lennæa** Klotzsch u. Otto (Leguminos., XVII. 4) *Lenné's*-Hülsenstr. (n. d. Landsch.-Gärtn. *Lenné*). 2) **Lennæa** (sc. *Monstera*) C. Koch (Aroideen, XXI. 3) durchbrochenblättr. Baumwörder, s. *Philodendron pertusum* Kth. u. *Monstera deliciosa* Liebm.
- Lennōa** H. B. K., Llal. Lex. (Primulac. od. *Lennoaceen*, V. 1) „Lennō's“-Schmarotzerpfl. (n. d. Nam. *Lenno*), *L. coerulea* H. B. K. (Mex.) (Schmarotz. an d. Rhizom von *Perimenium parviflorum* Gray, einer Compositen), vgl. Manuel de Villada, *Apuntos relativos à la Lennoa coer.* H. B. K., *La Naturaleza* V.
- Lens** T. (zu *Eryum* Rchb.) (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Linse, fr. lentille, e. lentil (lens, -tis Linse, celt. lentil, viell. v. *lenis* mild — als Speise, Wst.), *L. esculenta* Mch. s. *sativa* Hall., s. *Eryum* *Lens* L. Saatlinse, *E. dispersum* Rxb. s. *camelorum* Spr. etc.
- Lentago** DC. (sc. *Viburnum*) L. (Lonicereen, V. 3) canadischer Schlingbaum (v. *lento* biege etc.), fr. *viorne* du Canada od. luisant, e. *tree* od. *Canada-Viburnum*.

- Lentibularia** Gesn. (Lentibularieen, II. 1) Wasserhelm (v. lens, -tis Linse u. tubulus Röhrchen — Wurzelschläuche!), *L. major* Riv., s. *Utricularia vulgaris* L. — *Lentibulariæ* DC., -riacæe Rich., Græk. Schlauchkräuter od. Wasserhelmgew.
- Lenticula** Scop. (Najadeen od. Lemnaceen, II. 1) Linschen (dem. v. lens, -tis Linse), z. B. *trifulca* u. *minor* Scop., s. *Lemna tris.* u. *min.* L.
- Lentiscus** T. (sc. *Pistacia*) L. (Terebinthaceen, XXII. 5) Mastixbaum, fr. pistachier lentisque, e. lentisk (v. *lentescio* bin klebrig — Mastix-Gummi!).
- 1) **Leonotis** R. Br. (richtig. **Leontotis!**) (Labiaten, XIV. 1) „Löwenohr“ (v. *λέων*, -οντος Löwe, *ὄτις*, *ὄτος* Ohr), z. B. *Leonurus* R. Br. (*Phlomis Leonotis* Pers.) goldfarb. Löwenohr od. Löwenschweif (*ὄτις* Schwanz — Ährenstand d. Blüt.!). 2) **Leonotis** Spr. (Contorten od. Myrsineen, V. 1), *L. glycyarÿa* Spr., s. *Theophrasta* gl. Spr.
- Leontice** L., Mchx. (Papaveraceen od. Aristolochieen *Taccaceen*, VI. 1) Löwenblatt, *L. Leontopetalum* L. (gr. *λεοντιζή*) eine Pfl. — Blumenblatt von d. Form einer Löwenfussspur!), *L. altaica* Pall., *Chrysogonum* L. gefiedertes, *Alberti* Reg. (Turkestan) etc.
- Leontodon** L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Löwenzahn“, *Dohr* O. W., fr. liondent, dent-de-lion u. tête de moine, e. dandelion od. lion's-tooth (*λέων*, -οντος Löwe, *ὀδών* od. *ὀδύς*, -οντος Zahn — scharfzahnige Blätter!), *L. Taraxacum* L. Röhrchenkraut, Kettenblume etc., fr. pissenlit, s. *Taraxacum officinale* Web., L. autumnalis L. (*Apargia* aut. W.), *hastilis* L. (*Aparg. hispida* W.) etc.
- Leontopetalon** (-um) Moris. (sc. *Leontice*) L., s. *Leontice!*
- Leontopodium** Pers., R. Br. (sc. *Gnaphalium*) L. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) „Löwenfuss“, s. G. Edelweiss, fr. pas-de-lion, e. lion's-paw (-leaf) u. padelion (s. v. u. *πόδιον* Socke v. *πούς*, -ύδος (Fuss)).
- 1) **Leonurus** L. (richt. **Leonturus!**) (Labiaten, XIV. 1) „Löwenschweif“ (s. v., *ὄτις* Schwanz — jähriger Blütenstand!), *L. Cardiaca* L. Herzgespann, fr. mélisse sauvage, e. lion's-tail, archangel u. cardiac. 2) **Leonurus** (sc. *Phlomis*) L. afrik. Löwenschweif od. Löwenohr (*Leonotis Leonurus* R. Br.), s. *Sideritis africana* Barth.
- Leopoldia** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Leopold's“-Narzisse (n. *Leopold I.*, Kön. v. Belgien).
- Leopoldina** (bess. **-dinia**) Mart. (Palmen) „Leopoldinen“-P. (n. d. verstorb. Kaiserin *Leopoldine* v. Brasilien, geb. Erzherz. v. Österreich), *L. pulchra* Mart.
- Leotia** Hill. (Pilze, XXIV. 4) Kappenpilz Kumm. (v. *λείότης* Glätte? dann bess. *Liotia!* — glattes Hymenium! Wtst.), z. B. *circinans* u. *lubrica*.
- Lepechinia** W. (Labiaten, XIV. 1) „Lepechinie“ (n. d. russ. Bot. J. *Lepechin*, schr. Tagebuch d. Reisen durch versch. Provinzen d. russ. Reichs in 1768/69), *L. spicata* W. (*Uricia* *pyramidata* Hortul.), s. *Horminum clinopodifolium* Pers., etc.
- Lepidium** L., R. Br. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Schuppenkresse“, *Karse* O. W., Pfefferkraut Græk., fr. lepidier, passage (chasse-rage) (*λεπίδιον* dem. v. *λεπίς* Schuppe — Schötchen wie Sch.!), *L. sativum* L. Gartenkresse, fr. anitor, e. garden-cresses, *L. vesicarium* L., fr. pied de corneille, etc. — *Lepidiæe* Rchb.
- Lepidocarpon** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Schuppenfrucht“, -kopf, schöner Silberbaum M.-Rchb., s. *Protea speciosa* Thb. s. *cristata* Lam. (*λεπίς*, -ύδος Schuppe, *καρπός* Frucht).
- Lepidocarÿon** (-um) Mart. (Palmen, XXI. 7) „Schuppennuss“-P. (s. eb. u. *λόπον* Nuss — Blütenkolb. zwischen Schuppen!), z. B. *enneaphyllum* Barb. Rod., *gracile* u. *tenue* Mart. (Südam.).

- Lepidodendron** Brongn. (foss. Lycopodiaceen-Farne, XXIV. 1) „Schuppenbaum“ (s. v. u. *δέρνδοον* Baum — Schaft wie beschuppt!).
- Lepidosëris** Rehb. (zu Barkhausia Rehb.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schuppensalat“ (s. v. u. *σέρις* Salat — Kelchschuppen!), z. B. Bivoniana Rehb. (Crepis purpurea Biv.), hiemalis Biv., etc., s. Barkh. u. Crepis.
- Lepigönum** Wahlbg., Fr. (Alsiniaceen, X. 3) „Schuppensamen“ od. Salzmiere Leun., Meersandkr. (v. *λέπος* Schuppe u. *γόνος* Kind, Samen — Sam. zusammengedrückt, wie eine Sch.), L. marinum Wahlbg., s. Arenaria media L. s. marina Sm.
- Lepiöta** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schuppenhut“-P. (v. *λέπος* Schülfe, Schale, st. Lepiöta v. *λεπιδωτός* schuppig — schuppiger Hut!), L. procëra DC. (Agaricus proc. L.) s. g. Parasolpilz od. Bubutzen, auch s. g. Schulmeister.
- Lepiphörum** G. Don (zu Rhododendron L.) (Ericaceen od. Rhodoraceen, X. 1) Schuppenblatt, z. B. chrysanthum Pall. (v. *λέπος* s. v., *φορός* tragend — d. Blätt. sind schülferig!).
- Lepismium** Hook. (Cactaceen, XII. 1) „Schuppen“-Cactus (v. *λεπισμιά* Schelfe — Kelchschuppen dachziegelförmig!), s. Cereus squamulosus DC.
- Lepra** Ehrh., Hall. (Lepraria Ach.) (Flechten, XXIV. 3) „Krätz“- od. „Schorf“-Flechte, fr. lèpre (gr. *λέπρω* Aussatz — krätzart. Aussehen!), s. Verrucaria Hoffm.
- Leptadenia** R. Br., DC. (Asclepiadeen, V. 2) „Dünnrüden“-Stapelie (*λεπτός* dünn, *ἀδήςν*, *-ένος* Drüse — d. Narbenkörperchen sehr klein!), z. B. pyrotechnica R. Br. s. g. March (Innerafr.).
- Leptälix** Raf. (zu Fraxinus L.) (Oleac. od. Sapotac., XXIII. 2) „Dünn“-Esche (v. *λεπταλέος* i. q. *λεπτός* dünn u. *ἄλιξ* od. *ἡλίξ* Kamerad), z. B. mandschurica Rupr., Novae-Angliae Mill.
- Leptandra** Nutt. (Scrophularineen, II. 1) „Dünnanthere“, virgin. u. sibir. Ehrenpreis (*λεπτός* u. *ἀνήρ*, *-δοός* Mann, Staubbeutel!), L. virginica Nutt. u. sibirica ds., s. Veronica L.
- Leptaurëa** (sc. Zoegea) L. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Gold-Feinstrahl“ (s. v. u. aureus golden — analog Centaurëa gebildet!), s. Zoegea aleppica Jacq.
- Leptocarpaea** DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) (zu Sisymbrium L.) „Dünnschote“ (s. v. u. *καρπός* Frucht — dünne, lange Schoten!), z. B. Loeselii DC. (Sisymb. Loes. L.), „Lösel's“-Rauke.
- Leptochlöa** P.-B., Röm. (Gräser, III. 2) „Dünngras“ (s. v., *χλόα* od. *-η* Gras — dünnährig!), L. cynosuroides u. filiformis Röm., s. Poa chinensis L.
- Leptodactylon** Hook., Arn. (Polemoniaceen, V. 1) „Dünnfinger“ (zu Gilia R. P.) (s. v., *δάκτυλος* od. *-ον* Finger — d. Blätt. haarspaltig!), Zier. L. californicum Hook.
- Leptogium** Fr. (Gallertflechten, XXIV. 3) „Weichboden“-Fl. (v. *λεπτός* *-γειος* od. *-γαιος* auf weichem, zartem Boden vorkommend).
- Leptonia** Lk., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Zärtling“ Kumm. (v. *λεπτός* mache dünn — häutiges Hutfleisch), z. B. chalybea, Liukii etc., s. Agaricus L.
- Leptoptëris** Col. (Farne, XXIV. 1) „Dünnwedel“-F. (s. v., *πτερίς* Farn), Zier. L. superba Col. (Todëa sup. Sw.).
- Leptopyrum** Rehb. (Ranunculac. Isopyreen, XIII. 7) Doldocke M.-Rehb., eig. „Dünnbirne“ (s. v. u. *pyrum* Birne — kleine Blüt. auf haarfein. Stielen, Wst. kleine, liniennabelige Samen!), L. fumarioides Schrk.
- Leptorrhynchus** Benth., DC. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Dünnrüssel“ (s. v., *ρύγχος* Rüssel — dünne, schnabelige Achenen!), Zier. L. aureus Benth. (Helichrysum elegans Hort., Morna el. s. nitida Lindl. u. Waitzia aur. Steetz), suaveolens Bth. (Morna nivea Ldl., Helichr.

- decumbens Portenschl. u. Waitzia corymbosa Wendl. v. Benthaliana Walp.) etc., s. Viraya Gaudich.
- Leptosiphon** Benth. (Polemoniaceae, V. 1) „Dünnröhre“ (s. v., *σίφων* Röhre — enge Röhre d. Blumentrichters!), Zier. L. rosëus u. hybridus Hort., m. v. Vilmorinianus Hort., androsacëus Benth. (Gilia andr. Steud.) m. v. fl. albo Hort., L. lutëus Benth. (Gilia l. Steud.) u. aurëus Bth. (Gilia lutëa v. aurëa Hort.) m. v. rosëus.
- Leptospermum** Forst., Sm. (Myrtaceae, XII. 1) „Dünnsamen“-M., Theeod. Südsee-Myrte D., fr. leptosperme (s. v., *σπέρμα* Samen — zahlr. sehr kleine Samen), L. Thea W. (Melaleuca Thea Wendl.), L. scoparium Forst. (Melal. scop. L.) „Besen“-Myrte, s. Billotia Collad.
- Leptosyne** DC. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Feinheitsblume“ (*λεπτοσύνη* Feinheit, Zartheit — in allen Teilen zart), Zier L. Douglasii DC. u. maritima A. Gray, s. Agarista DC.
- Leptotes** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Dünnblatt“-O. (*λεπτότης* Feinheit, Dünne — linienförm. Kronblätt!), z. B. L. bicolor Ldl. m. v. serrulata Hort.
- Lepturus** R. Br. (Gräser, III. 2) „Dünnschwanzgras“ (s. v., *οἶον* (Schwanz — dünne, fadenf. Ähre!), L. repens R. Br., etc., s. Roitboellia Roth u. Monerna subulata P.-B.
- Leschenaultia** R. Br., s. Lechenaultia!
- Leskëa** Hedw. (-kia W., Brid.) (Laubmoose, XXIV. 2) „Leske's“-Moos (n. d. Prof. N. G. Leske in Marburg, † 1768), z. B. L. sericea Hedw., s. Hypnum L.
- Lepedëza** Rich., Mchx. (-zia Nutt.) (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Lepedez“-Esparsette (n. d. Gouv. v. Florida im vor. Jahrh. Lepedez), Zier. L. bicolor Turcz., fruticosa Mchx. etc., s. Anthyllis, Medicago u. Hedysarum L.
- Leucadendron** L. (bess. Leucod.- R. Br.) (sc. Melaleuca s. Myrtus) (Myrtac. Melaleucac., XXII. 4) „Weiss“- od. Silberbaum (*λευκός* weiss, *δένδρον* Baum — silberglänz. Blätter!), L. argentëum Lam. (Atlasgebirg), s. Protea stellaris, L. sphaerocephalum Berg. (Protea sph. L.) etc.
- Leucanthëum** T., DC. (sc. Chrysanthemum) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Weissstrahl-Wucherblume, grosse Gänseblume, s. g. Marguerite, fr. marguerite grande u. oeil de boeuf, marguerite des champs (s. eb. u. *ἀνθεμον* i. q. *ἀνθος* Blume), L. vulgare T. = Chrys. Leuc. L.
- Leucas** Burm., R. Br., Benth. (Labiaten, XIV. 1) Weissfilzkraut (*λευκός* od. -*ζή* weissanzuseh. Pfl. — Blüt. meist weiss dickbehaart!), z. B. indica, zeylanica, martinicensis etc., s. Phlomis L.
- Leuce** Dub. (subg. v. Populus L.) (Salicaceen, XXII. 7) Silber- od. Weisspappeln (*λευκή* weisse — d. Blattunterseiten weissfilz!), z. B. alba L., canescens W., tremula L. etc.
- Leucobryum** Hampe (Moose, XXIV. 2) „Weissmoos“ (*λευκός* weiss, *βρύον* lat. Bryum Moos), z. B. L. vulgare Hampe, s. Dicranum glaucum Hedw.
- Leucodonium** (st. Leuco-Codonium) Rchb. (zu Cerastium L.) (Sileneen, X. 5) „Weissglocken“-Hornkraut (s. v. u. *κόδων* Glocke), z. B. C. arvense L., tomentosum L. etc.
- Leucøjum** L. (Amaryllideen, VI. 1) Knoten- od. Märzblume Leun., Milchglöckchen Seub., Sporkelblume O. W., fr. perce-neige, e. spring-snowflake (gr. *λευκόν* *ιον* eig. Weiss-Veilchen — erscheint mit d. Veilchen!), L. vernum L., s. Nivaria verna Mch., fr. grelot blanc od. nivéole du printemps.
- Leucomëris** Don (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Weissstück“ (s. v. u. *μέρις* od. -*ος* Stück, Teil — d. Blätt. unten flockig, filzig!), Zier. L. decora Krz., spectabilis Don (Eupatorium sp. autt.).

- 1) **Leucophäë** autt. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Weisszunderblatt (*λευκοφαῖς* weisssschimmernd), *L. canariensis* Hort. (Chaorra-Strauch), Teppichg. candicans, macrostachya etc. 2) **Leucophäë** Webb (Labiaten, XIV. 1) Weisssschimmerblatt, s. Marrubiastrum Mnch.
- Leucophyta** R. Br. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Weisspflanze“ (s. v., *φυτὸν* Gewächs), Teppichg. *L. Brownii* Less. (Hstr. Neuhol.).
- Leucopogon** R. Br. (Epacrideen, V. 1) „Weissbart“ (s. v., *πάγων* Bart Kronsaum m. weiss. Längsbart!), Treibh. *L. Drummondii* DC. (Neuholl.), *microphyllum* R. Br. (Perōa m. Pers.).
- Leucopsidium** DC. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Weissaugähnliche“ (v. *Leucopsis*, s. sogl. u. *εἶδομαι* gleiche — d. *Leucanthemum* ähnl.!), Zier. *L. arkansanum* DC.
- Leucopsis** DC. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Weissauge“, -gesicht (*λευζός* u. *ὄψις* Auge, Angesicht — Achenen wollig, Strahlenpappus länger etc.), s. *Aplopappus* DC.
- Leucopus** Lk. (Pilze, XXIV. 4) „Weissfuss“, Violethut (*λευζός, ποὺς* Fuss — sehr weiss. Strunk, Hut violet od. blau!), s. *Agaricus* *L.*
- Leucorchis** E. Mey. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Weissorchide“ (s. v. u. *Orchis*), *L. albida* E. Mey., s. *Gymnadenia* a. *Rich.* (*Orchis albida* Scop., *Satyrium* a. *L.*).
- Leucosināpis** DC. (Cruciferen Siliquos. XV. 2) (zu *Sināpis* *L.*) „Weiss-senf“ (— m. weiss. Samen!), s. *Sināpis alba* *L.*
- 1) **Leucospermum** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Weissamen“-Silberbaum (s. v., *σπέρμα* Samen), z. B. *L. conocarpon* R. Br. „Kegelfrucht“-*W.*, *attenuatum*, *grandiflorum* R. Br., etc., s. *Protea* u. *Leucodendron* R. Br., *L. puber* R. Br., s. *Diastella bryiflora* Salisb. 2) **Leucospermum** Benth. (Labiaten XIV. 1) (zu *Teucrium* Benth.).
- Leucothōë** D. Don (Ericaceen, X. 1) (zu *Andromēda* *L.*) schöne Rosmarinheide (*Λευκοθουή* mythol. Name aus *λευζός* u. *θούος*, -ή hurtig), Zier. *L. floribunda* Don, s. *Androm. pulchra* s. *floribunda* Bot. Mag. (*Aganota pulchra*), e. many-flowered *Andromēda*.
- 1) **Leucoxylon** (sc. *Bignonia*) *L.* (Bignoniaceen, XIV. 2) „Weissholz“ (s. v., *ξύλον* Holz). 2) **Leucoxyton** (sc. *Vitex*) *L.* (*Verbenac.*, XIV. 2) „Weissholz“-Müllen (Str. Ceyl.). 3) **Leucoxyllum** Blum. (*Terebinthaceen*, XXII. 5) „Weissholz“-Glanzblatt (— weiss. Holz u. glänz. lederart. Blätt.).
- Levisanus** Petiv., Thb., Schreb. (sc. *Protēa*) *L.* (Proteaceen od. *Myrtac.* *Bruniac.*, V. 1) stabwurzblättr. *Brunie* od. *Kopfheide*, *L. capensis* Pet. Gaz., s. *Brunia Levisanus* *L.* f. s. *abrotanoides* Berg. (n. d. engl. Geistl. *Levisanus*) (*Erica capitata* s. *nodiflora* Port.).
- Levista** (—*stia*) Pursh (richtig. **Lewisia**!) (*Alismac.* od. *Portulacac.*, XI. 1) Bitter- od. *Tabakswurzel* Leun. (n. *Meriweather Lewis*, engl. Statth. v. *Louisiana* 1804—06), *L. rediviva* Pursh.
- Levisticum** Koch (Umbelliferen, V. 2) *Liebstöckel*, fr. *livèche*, sermentaire u. *séseli des montagnes*, e. *lovage* (gr. *λιβυστικόν* libysches Kraut, Paxton: v. *levo* erleichtere, *Wst.* d. veränd. *Ligusticum*!), *L. officinale* Koch, s. *Ligusticum Levisticum* *L.*
- Liātris** G. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Glatt“- od. *Prachtscharte* Rmgl., fr. *liatride* (v. *λειος* glatt, *ιατρός* ἰ d. Hebamme), Zier. *L. spicata* W. (*Serratula spic.* *L.*), fr. *liatride en épi*, e. *long-spiked* *L.*, *L. elegans* W. (*Serratula speciosa* Ait. s. *Stachelina eleg.* Walt.), *odoratissima* W. (*Anonÿmos* Walt.).
- 1) **Libanōtis** Scop. (Umbelliferen, V. 2) *Heilwurz* (gr. *λίβανωτις* v. *λίβανος* Weihrauch u. *ὄζω* rieche — *Weihrauchdolde*!), *L. montana* Crantz, s. *Athamanta* *Lib.* *L.* (*Seseli* *Lib.* Koch, *Turbith.* *Tausch.*), *L. sibirica* Koch, s. *Atham.* *sib.* *L.* 2) **Lib.** (sc. *Cachrys*) *L.* (*Umbellif.*, V. 2) *Weihrauch-Gerstendolde*.

- Libertia** Spr., Dumort. (Irideen Patersonieen, XX. 2) „Libert's“—Rüssel-
schwertel (n. d. belg. Mademoiselle M. A. Libert de Malmédy, lief.
Abbild. v. Lebermoosen), *L. azurëa* Spr., s. *Sisyrrhinchium formo-
sum* (Nematostigma A. Dietr.).
- Libocedrus** Endl. (Coniferen, XXI. 9) Weissceder Jess. (v. *λεῖβω* tröpfle
u. *Cedrus Ceder* — harzreich!), *L. Doniana* Endl., s. *Thuja chilensis*
Chiliceder, *L. decurrens* Torr., s. *Thuja gigantëa* Carr. s. *Heyderia*
decurrens Koch.
- Libonia** C. Koch (Acanthaceen, XIV. 2) „Libon's“—Strauch (n. d. Gärtn.
Libon in Lüttich, † 1861 in Brasil.), z. B. Winter-Zier. *L. floribunda*
C. Koch (Bras.) u. *penrhosiensis* (Sericobonia ignëa Hort.).
- Licania** Aubl. (Rosac. Amygdalac., XII. 1) Süßfleisch-Mandel (v. *λεῖκ-
νον* syncop. aus *λεζανον* Mulde?, Wtst. d. veränd. calignia, Nam.
d. B.'s in Guiana), *L. incana* Aubl., s. *Hedycrëa* Schreb.
- Lichënes** DC., Endl., Rehb., Kl. d. Flechten, XXIV. 3 (gr. *λεῖχην* lat.
lichën Flechte, v. *λεῖζω* lecke, streiche hin, — krieche auf d. Ober-
fläche etc.).
- Licuāla** Rumph. (Palmen, III. 1) Strauch-, Roll- od. Cigarren-P. (Name
d. P. in d. Macassar-Sprache auf Celebes), *L. Rumphii* Blum. „Rumpf's“
Rollp., *L. spinosa* Wurbm, peltata Roxb. etc.
- Liebigia** Endl. (Cyrtandrac. od. Bignoniac., XIV. 2) Liebig's od. Troms-
dorff's-Krummfaden (n. d. Chemik. Just. v. Liebig), *L. speciosa* Endl.,
s. *Tromsdorffia speciosa* Mart.
- Ligeria** Ker (Gesneriaceen, XIV. 2) „Ligerie“ (v. Fluss Liger d. i. Loire ?
od. st. Ligyria v. *λυγυός* fein, hell, ? — ungew.), Zier. *L. caulescens*
u. *speciosa* Ker (*Gloxinia* sp. Ker).
- 1) **Ligularia** Cass., DC. (Compos. Adenostyleen, XIX. 2) Bandblume
Rimpl. (v. *ligūla* Blatthäutchen), Zier. *L. sibirica* Cass., fr. *Ligulaire*
de Sibérie, *macrophylla* DC. m. v. *speciosa* DC. (*Cineraria* *macroph.*
Ledeb.), *L. Kaempferi* Sieb., Zucc. (*Tussilago japonica* L. f.) m. v.
aureo-mac. *S. Z. u. fol. argenteo-varieg.*, etc., s. *Senecio*. 2) **Ligula-
ria** Sweet (Geraniac., XVI. 5), s. *Pelargonium Athamantoidëa* DC.,
incisum W., *trifidum* Jacq., etc. 3) **Ligularia** Duv., A. Br. (*Saxi-
fragac.*, X. 2), s. *Saxifraga sarmentōsa* L. s. *ligulata* Murr.
- Ligulatae** G. (sc. Compositae) „Zungenblütige“ Compositen, i. q. Cicho-
riacëae (XIX. 1) (*ligūla* dem. v. *lingua* Zunge).
- Liguliflorae** L. (s. eb.) Zungenblütige Compositen (XIX. 1).
- Ligusticum** L., Koch (Umbelliferen, V. 2) Liebstöckel, fr. *livèche*, ser-
mentaire, e. bladder-seed „Blasensamen“ (*Ligusticus* aus Ligurien),
Zier. *L. Levisticum* L., *L. peloponnesiacum* L. (*Athamanta goloka*
Hacq.), s. *Molospermum cicutarium* DC., fr. *livèche du Peloponëse*,
e. water-hemlock-like bl.-s.
- Ligustrina** Reg. (Oleaceen, II. 1) Amur-Liguster, Zier. *L. amurensis*
Reg. (*ligustrinus* ligusterartig, s. *Ligustrum*), s. *Syringa* *amur.* Rupr.
- Ligustrum** L. (Oleaceen, II. 1) „Liguster“, Rainweide (nicht Rhein —!),
fr. *frésillon* od. *tröene*, e. *privet* od. *prim* (print) (v. *ligo* binde —
Zweige z. Flechten!), *L. vulgare* L., fr. *tröene*, s. g. Beinholz, Zaun-
riegel u. Dintenbeerstrauch, m. v. v. (z. B. *sempervirens* Pieri, ital.
Lig., v. albo- u. aureo-varieg. Hort.
- Lilac** T., Juss. (Oleaceen od. Jasmineen, II. 1) „Lilak“ od. Nägelein,
s. *Syringa* L. (in Persien lilac — lilafarb. Blütensträusse!). — *Lila-
cëae* Vent. — *Lilacum* s. *Lilium* (fehlerh.!).
- Lilia** Juss., -acëae Bartl., DC. „Liliengew.“, s. *Lilium*!
- Lilium** (richt. *Lilacum*!) *Perpensa* Lam. etc. (Oleaceen, II. 1), s. *Lilac*
T. (*Syringa suspensa* etc.).
- 1) **Liliago** (sc. *Anthericum*) L. (Liliaceen, VI. 1) „Lilien“-Zaublume

- od. Grasilie Grck. 2) **Liliago** (sect. v. Anthericum Rchb.), z. B. ramosum L. (Phalangium ram. Lam.) u. Liliago Pers. (aus Liliium geb.).
- Liliastrum** Lk. (sc. Anthericum) L. (Liliaceen, VI. 1) grosse Zaunblume M.-Rchb. (deter. v. Liliium, Wtst.: *ἀστράρον* Bild!), s. Czackia Liliastrum Andrez.
- Lilium** T. (Liliaceen, VI. 1) „Lilie“, fr. lis, e. lily u. luce, auch ray (v. d. celt. li = weiss), Zier. (Topf) L. auratum Lindl. „Goldband“-L. Rmpl., fr. lis à bandes dorées, e. golden-rayed lily, speciosum Thb. s. lancifolium Hortul. (superbum Thb.) japan. Pracht-L., fr. lis brillant, e. japanese lily, longiflorum Thb., eximium Court., Washingtonia Kellogg, tigrinum Gawl., tigr. splendens Van Houtt., fulgens Morr. s. sanguineum Hort. m. v. atro-sang., superbum L., Gärt. a) Hang- od. Rollblumen-L.: Martagon L. Türkenbund m. v. v. (z. B. dalmaticum Moly s. Martagon Catanii Vis.), pomponium L., chalcidonicum L.; b) Steh- od. Geradblumige: L. candidum L. m. v. v., bulbiferum L. Feuerl. m. v. phoeniceum Bauh., etc. — Oder: I. Notholirion, Himalaya- od. unechte L. (*ρόδος* unehelich, *λειλίον* Lilie), z. B. roseum u. Hookeri, II. Eigentl. od. echte L.: a) Eulirion Trichter-L. (*εὐλίον* schön, z. B. candidum, longiflorum, cordifolium Don s. giganteum Wall., Riesen-L. von Nepaul; b) Archelirion Erz- od. Offenlilien (*ἀρχή* Anfang u. Herrschaft!), z. B. auratum, speciosum, tigrinum; c) Isolirion Gerad-L. (*ἴσος* gleich, aufrecht), z. B. bulbiferum, Catesbaei Walt.; d) Martagon Türkenbund-L., z. B. pomponium, chalcidonicum etc. Essb. Knollen: L. kamschatcense L. (nigrum Sieb., Fritillaria k. Don u. Sarana k. Fisch.) schwarze od. Serenna-L. (vaterl.).
- 1) **Limacia** Lour. (Menispermaceen, XXII. 6) „Schnecken“-Mouidsamen (v. limax, -ācis, gr. *λείμαξ*, -ακος Schnecke — schneckenf. zurückgebog. Griffel). 2) **Limacia** Dietr. (Bixaceen, XIII. 1) Schneckenfrucht-Orleanbaum (— d. Frucht schneckenf.!).
- Limacium** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Schneckenpilz“ (s. eb. — Manschette klebrig, wie eine Schnecke), z. B. eburneum u. discoidum (essb.).
- Limetta** Risso (st. Limonetta) (sc. Citrus) L. (Hesperideen Aurantien, XVIII. 2) „Limette“, Bergamotte od. Perette, süsse Citrone Leum., fr. limette (-ttier) (dem. v. Limon, arab. limoun Citrone).
- Limnanthemum** Gmel. (Gentianeen, V. 1) „Teichblume“ Seub., -Enzian, Seekanne, Tauche O. W. (v. *λίμνη* Teich, Sumpf, *ἀνθεμον* i. q. *ἀνθος* Blume), L. nymphaeoides Lk. s. peltatum Gmel., s. Villarsia nymph. Vent. (Schweykertia n. W., Menyanthes Nymphoides L., Pers.).
- Limnanthes** R. Br. (Geraniaceen, X. 1) „Sumpfbblume“ Vilm. (*λίμνη* u. *ἀνθη* od. *-θος* Bl.), Zier. L. Douglasii R. Br. m. v. grandiflora Hort. (Californ.), alba Hartweg, etc.
- Limnochäris** Hb., Bpl. (Hydrocharideen, XIII. 1) „Teichfreude“, -blume (s. v. u. *χάρις* Reiz, Freude — Standort!), Zier. L. Humboldtii Rich., s. Hydroclēis Hb., Endl.
- Limnochlöa** (-öe) P.-B. (Cyperaceen, III. 1) „Pfuhlsmise“ (s. v. u. *χλόα* od. *-ύη* Gras etc. — Sumpfstandort), z. B. acicularis, caespitosa L. etc., s. Scirpus L.
- Limnopence** Vaill. (Halorageen, I. 1) „Sumpffichte“, Tannenwedel (s. v. u. *πέυκη* lat. picea Pechtanne — tannenart. Aussehen d. Pfl.!), s. Hippuris L.
- Limodorum** T., Thb. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) Dingel, fr. limodore (gr. *λιμοδόρον* od. *λειμοδ.*- Unkraut unt. d. Kümmel! F. W. Riemer, v. *λειμών* Wiese u. *δόρον* Gabe, Wtst. *λιμοδ.* st. *Αίμοδορον* Theophr. = Orobanche cruenta!), z. B. triste Thb., abortivum Sw. etc., s. Orchis etc.
- Limonia** G., L. (Aurantien od. Bixaceen, X. 1) „Limonelle“ Dietr.,

L. acidissima L., *lucida* Forst. etc. (v. Limon, arab. limoun Citrone — citronenart. Frucht!).

- 1) **Limonium (Limōnum)** (sc. Citrus) Risso (Hesperid. Aurantieen, XVIII. 2) „Limonienbaum“, *Limone* od. *Sauer-Citrone* Leun., fr. *limon* (-monier), e. *lemon* (-tree) (s. eb.), s. *Citrus medica* Hayne. 2) **Limonium** (sc. Statice) L. (Plumbagineen, V. 5) *Juften-Gerbkraut*, *Widerstoss*, fr. *limoine* (gr. *λειμόδιον* Wiesenpfl.), *Zier. L. speciosum* Pers. (*Statice speciosa* L.) gem. *Strandnelke*, fr. *Immortelle bleue*, e. *wild-marsh-Beet*, m. v. v. 3) **Limonium** G. Frank i. q. *Pyröla* L. (Ericaceen, X. 1) *Wintergrün*, fr. *limonellier*?

Limopeuce Vaill. s. *Limnopeuce*! (v. *limus* Schlamm u. *πέυχη* Fichte — Schlammfichte, s. g. Tannenwedel).

Linacēa Grck., -*nēa* DC., Rchb. „*Flachs-* od. *Leingew.*“, s. *Linum* L.!

Linaria T. (Scrophularineen, XIV. 2) „*Leinkraut*“, *Frauenflachs* od. *Flachskraut*, *Drunt* O. W., fr. *linaire* od. *lin sauvage*, auch *pélore*, *velvete*, *élatine* u. *véronique femelle*, e. *toad-flax* od. *snap-dragon* (v. *Linum* Lein od. *Flachs* — ähnl. *Habitus*!), *wild L. vulgaris* Mill., s. *Antirrhinum Linaria* L., *Zier. L. bipartita* W. m. v. fl. *albo, elegans* u. *triphylla, triornithophora* W. „*Dreivogel*“-*Fr.*, fr. *lin. à grandes fleurs*, e. *three-bird's-toad-flax* m. v. *carnea* Hort., *alpina* DC. *blaue Johannisblume*, *Unser Frauen Haar*, *L. Cymbalaria* Mill. (*wild an Mauern* u. *Ampelpfl.*) m. v. *fol. roseo-varieg.*

- 1) **Lindēra** Thunb. (Lauraceen, VI. 1) „*Lindere*“ (n. d. schwed. Bot. *Linder*, *nobilis Lindestolpe*, *Joh.*, schr. *Fl. Wiksbergensis*, *Stockh.* 1716), z. B. *umbellata* Thb., *Benzoïn* Meisn., *falscher Benzoebaum*. 2) **Lindēra odorata** Aschers. (Umbelliferen, V. 2) *wohlriech. Süssdölde* = *Myrrhis odorata* Scop.

Lindernia All. (Scrophularineen, XIV. 2) „*Lindernie*“, *Gelbmäulchen* (n. d. Bot. *Balth.* v. *Lindern* in *Strassb.*, † 1755), *L. pyxidaria* L. (*Gratiöla inundata* Kit.), *japonica* Thb. (*Ambulia* Lam.).

Lindheimēra Gray, Engelm. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „*Lindheimer'sblume*“ (n. d. Bot. u. *Reis. Dr. Ferd. Lindheimer*), *Zier. L. texana* Gray.

- 1) **Lindleya** Hb., Kth. (Rosac. Amygdaleen, XI. 5) „*Lindley'smandel*“ (n. d. Prof. d. Bot. *John Lindley* in *Lond.*), z. B. *L. mespiloides* Kth. 2) **Lindleya** Nees (Theaceen od. *Ternstroemiaceen*, XVI. 8) „*Lindley's-thee*“, z. B. *L. fruticosa* Nees, s. *Gordonia semiserrata* Spr. (*Wikstroemia* Schrad.).

Lindsaea (-*sea*, -*saya*) Dryand. (Farne, XXIV. 1) „*Lindsay's*“-*F.* (n. d. engl. *Kryptog. Lindsay*), z. B. *elongata* Cav., *falcata* Dryand. (*Adiantum* f.).

- 1) **Lingua** (sc. *Ranunculus*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) *grosser Hahnenfuss*, eig. „*Zunge*“ (lat. *lingua* *Zunge*). 2) **L.** (sc. *Othonna*) L. (Compos., XIX. 4) „*Zungen*“-*Schleierblume*. 3) **L.** (sc. *Serapias*) L. (*Orchideen*, XX. 1) „*Zungenorche*“ (*Orchis Lingua* Scop.). 4) **L.** (sc. *Acrostichum*) L. (Farne, XXIV. 1) „*Zungen*“-*F.*

- 1) **Linkia** Cav. (Proteaceen, IV. 1) „*Link's*“ *Silberbaum* (n. d. Bot. *H. F. Link*). 2) **Linkia** Pers. (*Solaneen*, V. 1). 3) **Linkia** Lyngb. (*Nostochineen*, XXIV. 3).

Linnaea Gron. (Lonicereen, XIV. 2) „*Linnäe*“, *Rande* O. W., *nord. Moosglocke* od. *Moorkriecher* (n. d. schwed. *Nat. K. v. Linné*, lat. *Linnaeus*), *wild u. Zier. L. borealis* Gron., fr. *Linnée boréale*, e. *northern Linnaea*.

Linophyllum (sc. *Thesium*) L. (*Santalaceen*, V. 1) „*Leinblatt*“, *Verneinkraut* Grck. (*λίνον* *Lein*, *φύλλον* *Blatt*).

Linosýris DC. (Compos. *Baccharideen*, XIX. 2) *Goldschopf* (v. *Linum*

- u. *Osyris* — mit beiden Ähnlichk.), *Zier. L. vulgaris* Cass. (*Chryso-cōma Linosyris* L.), fr. *L. vulgaire* u. *dorelle*, e. common-Linos.
- Linum** L. (Linaceen od. Caryophylleen, V. 5) *Lein*, *Flachs*, fr. lin (filasse de lin „Flachs“, les filasses), e. aise, line, flax (-weed) (gr. *λίνον* v. d. celt. lin Faden), geb. *L. usitatissimum* L., *Zier. L. grandiflorum* Desf. (*grandifl. rubrum* Hort.), fr. lin à grandes fleurs, e. large-flowered od. crimson flax, *campanulatum* s. *flavum* L., fr. lin à fleurs campanulées, e. bell-shaped-flax, *perenne* L. (*montanum* Hort.), *sibiricum* Ait., wild *L. catharticum* L. „Purgier“-L., fr. lin sauvage purgatif.
- Liparia** L. (Leguminos. Galegeen od. Genisteen, XVII. 4) „Fettstrauch“ (v. *λίπαρος* fettig glänzend — näml. Stengel u. Blätt.!), z. B. *sphaerica* L. (*Genista afr. ruscifol.* Raj.), *umbellata* L. (*Borbonia* u. autt.) etc.
- Liparis** Rich. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Fettblatt“-O., Ständling O. W., Glanzwurz ds., Glanz-O. (s. eb.), z. B. *L. Loeseli* Rich. (*Malaxis* Loes. Sw., *Ophrys* Loes. L., *Sturmia* Loes. Rehb.).
- Lippia** L. (Verbenaceen, II. 1 od. XIV. 2) „Lippie“, fr. Lippie (n. d. franz. Arzt u. Reis. in Abyssinien Dr. Aug. Lippi, † 1713, viell. auch Fr. Jos. Lipp, schr. *Enchiridium bot.*, Wien 1765), *Ampel L. montevidensis* u. *L. canescens* Kth. (*filiformis* Schrad. s. *repens* Hort.), fr. *L. blanchatre*, e. whitish Lippia, Topf. *L. citriodora* Hort. (*Aloysia* citr. Pers. u. *Verbena triphyllos* l'Hér.) „Citronenstrauch“.
- Liquidambar** L. (Amentaceen Balsamaceen, XXI. 9) *Storax*- od. „Amberbaum“ (v. *liquidus* flüssig u. *ambra* Amber- od. Balsamharz), *Zier. L. styraciflua* L. m. v. „Storaxbaum“, fr. *L. copal* od. *Copalme* de l'Amérique, e. sweet-Gum-Liquidambar, *L. imberbis* W. (*Liq. orientalis* Mill., *Platanus* or. Pock.).
- Liquiritia** Mnch., Pers. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Lakritzenholz“, gem. Süßholz, fr. réglisse, e. licorice (-rish) (v. *liquidum* u. *radix*, -icis Saft und Wurzel), *L. officinalis* Mnch., s. *Glycyrrhiza glabra* L. (Apoth. *liquiritiae radix* Süßholzwurzel, liefert „Lakritzensaft“, Wtst. d. veränd. *Glycyrrhiza*!).
- Liriodendron** Juss., L. (Magnolieen, XIII. 6) *Tulpenbaum*, „Lilienb.“, fr. tulipier, e. tulip-tree u. canoe-wood (v. *λείριον* Lilie, *δένδρον* B., nicht etwa *λίρα* Leier, weg. d. Form d. Blätt.), *Zier. L. Tulipifera* L. (*Tulipifera Liriodendron* Mill.) m. v. v., *Tulpen- oder Leierblatt-B.*, *L. Liliifera* L. (*Sampacca montana* Rumph.).
- Lisianthus** L. (Gentianeen, V. 1) „Glattblume“, *Bauchbl. D.* (v. *λίς* od. *λίσσος* glatt, *άνθος* — glatte Beschaff. d. Blume u. ganzen Pfl.), *Gewächsh. Russelianus* Hook., *calygonus* u. *acutangulus* Rz. Pv., *coeruleus* Aubl., etc.
- 1) **Lissanthe** R. Br. (Epacrideen u. Styphelieen, V. 1) „Glattblüte“ (s. eb. u. *άνθη* Blüte), z. B. *sapida* R. Br. (Str. Neuholl.), *strigosa* ds. (*Styphelia* str. Sm.) etc., s. *Ardisia* G. 2) **Lissanthe** Knight, *Salisb.* (Proteaceen, IV. 1) *Glattgriffel*, s. *Lissostylis* R. Br.
- Lissochilus (-os)** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Glattlippe“ (s. v., *χειλος* Lippe — diese unbehaart!), *L. speciosus* R. Br. (*Cymbidium giganteum* Thb., Cap).
- Lissostylis** R. Br. (Proteac., IV. 1) (zu *Grevillea* R. Br.) *Glattgriffel*, s. *Lissanthe* Knight (s. v. *στυλίς* Griffel).
- 1) **Listera** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Listere“ od. *Zweiblatt* Grck., fr. double-feuille (n. d. Leibarzt d. Königin Anna v. Engl., Mart. Lister, † 1711), z. B. *L. ovata* u. *cordata* R. Br. 2) **Listeria** Raf., Neck. (Rubiaceen, IV. 1).
- Lita** Schreb. (Gentianeen, V. 1) „Schlicht“-Enzian, *Dünnling* D. (*λιτός* schlicht, dünn etc.), z. B. *L. aphylla* D. (*Gentiana* aph. Jacq.), *coerulea* W. u. *rosea* W., s. *Vohiria* Aubl.

- Litchi (Litschi)** Sonner. (Amyrideen od. Sapindac., VIII. 1) chines. Zwillingspflaume (chines. Name d. Pfl.), *L. s. Litsäa chinensis* Lam., *s. Dimocarpus Litchi* W. (*Nepheium L.*, *Sapindus edulis* Lour.).
- Lithophila** Sw., Schreb. (Paronychieen, II. 1) Stein-Nagelkraut, „Stein“- od. „Felslieb“ (*λίθος* Stein, *γίλος* Liebhaber — Standort stein. Orte!), *L. muscoïdes* Sw.
- Lithospermum** T., L. (Boragineen, V. 1) „Steinsamen“, Schminke O. W., fr. grémil, herbe aux perles, e. gremil (gray-mill), stone-drop (s. eb. u. *στέλλα* Samen — hart wie Stein!), Zier. *L. purpureo-coeruleum L.*; fr. grémil violet, e. purple-blue Gromwell od. gremil, Garten: *L. pulchrum* Lehm. (*Pulmonaria virginica L.*), fruticosum *L. u. petraeum* A. D. C., canescens Lehm. *s. conspicuum* Spr., e. whitish Gromwell, *L. officinale L.*, fr. millet d'amour „Liebeshirse“ (-gris, perlé, perlé du soleil).
- Litsäa (-sëa)** Lam., Nees (Amyrideen od. Sapindaceen, VIII. 1) „Litsäe“, Strahl-Lorbeer, Zwillingspflaume (aus d. chines. od. japan. Namen litchi gebildet, vgl. Litchi Sonner.), z. B. *angustifolia* Krz., *s. Actinodaphne* Nees, *L. chinensis* Lam. (Litschi chin. Sonner.), *s. Tetranthëra laurifolia* Jacq. u. *Dimocarpus Litchi* W.
- Littaea** Tagliab. (*Lyttaea* Brign.) (Bromeliaceen, VI. 1) „Lyttae“ (zu Ehr. d. Herzogs v. Lytta bei Mailand, Gönn. d. Bot., Wtst. n. d. Duca Antonio Litta in Lainate, in dess. Gart. d. Pfl. 1815 zuerst in Europa blühte), Zier. *L. geminiflora* Brign. (*Yucca Boscii* Hort.), *albicans* (Agave a.), *modesta* W. Hook. (windend) etc. *s. Uvularia L.*
- Littorella** L. (*Litor.*- aut.) (Plantagineen, XXI. 4) Strandling, „Üferkraut“, fr. littorelle (v. litus od. littus, -öris Strand etc. — besond. an salz. Wassern, Wtst.), *L. lacustris L.*, *s. Plantago uniflora L. f.*
- Livistona (-ia)** R. Br. (Palmen, VI. 1) „Livistone's“-P., Schirmpalme Rmpl. (n. Murray Baron v. Livistone bei Edinburg, Freund Balfour's), *L. chinensis* Mart. Latanenapfel-P., *s. Latania* Comm., Stuben *L. humilis* R. Br., *rotundifolia* etc.
- Livonia**, *s. Libonia*!
- 1) **Lloydia** Salisb. (zu *Ornithogalum* Rchb.) (Liliaceen, VI. 1) „Lloyd's“-Vogelmilch (n. George N. Lloyd, schr. bot. terminology, Edinb. 1826), *L. alpina* Sal. (*Ornithog. serotinum* Rchb., *Anthericum* ser. L.).
- 2) **Lloydia** Neck. (Compositen).
- Loasa** Adans., Schreb. (*Loosa L.*, Pers.) (Sedifloreen Loasaceen, XIII. 1 od. XVIII. 2) Brennwinde (aus d. südamer. Namen geb.), Zier. *L. aurantia s. lateritia* Hook. (*Cajophora later.* Presl), m. v. *Herberti* Hort., *L. acanthifolia* Lam. (*Ortiga chilensis* Feuille.). — *Loasacëae* DC.
- Lobadium** Raf. (subg. v. *Rhus L.*) (Terebinthac. Sumachineen, V. 3 od. XXII. 5) Gewürz-Essigbaum, *L. aromaticum* (*Rhus aromatica* Ait.) (v. *λοβός* Lappen u. *ἄδος* Fülle — Scheibe mit 5 Lappen, darunter d. Blütenblätt. eingefügt stehen), *s. Toxicodendron cuneatum* Mill.
- Lobelia** L. (*Campanulac.* od. *Lobeliaceen*, V. 1 od. XIX. 6) „Lobelië“, Spaltglöckchen, Spleisse O. W., fr. lobélie (n. Lobel od. Matth. de l'Obel, lat. *Lobelius*, Bot. am Hof Jakob's I. v. Grossbrit., † 1616), Zier. *L. Erinus L. m. v. v.* (z. B. *hybrida grandiflora superba* Hort., v. *speciosa* Hort., v. *gracilis erecta* Hort., v. *marmorata* Hort., Topf-Zwergbl. v. Miss. Murphy, Topf: *L. erinoides u. ramosa* Benth., Gartenbl. *L. fulgens* W. (*Rapuntium f.* Presl), m. v. *multiflora* Hort., *L. cardinalis* Hort. (*Rapuntium card.* Presl), fr. *cardinale* „Scharlach“-L., etc. — *Lobeliacëae* Juss., DC., *Lobeliëae* zu *Campanulacëae* Rchb.
- Lobularia** Desv. (zu *Alyssum* Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Lappen“- od. Meerstrands-Steinkraut (dem. v. *lobus* Lappen — zweiteil.

- Pubescenz), *L. maritima* Desv., s. *Alyssum marit.* Lam. (Clypeöla m. L., Koniga m. R. Br.).
- Locheria** Neck. (Compositen) „Lochersblume“ (n. den Schweizer Hans Locher-Balber, schr. Nekrolog auf P. Usteri M. D. Bürgerm. v. Zürich, 1832), Zier. *L. magnifica*.
- 1) **Lochnera** Rchb. (Apocynen, V. 1) „Lochner's“ od. rosenrotes Immergrün, *L. rosea* Rchb., fr. *Pervenche rose* od. de Madagascar, e. old-maid, s. *Vinca rosea* L. (*Catharanthus ros.* G. Don) (n. M. Lochner, schr. Comment. de Ananassa etc., Norimb. 1719). 2) **Lochneria** Scop. (Tiliaceen, XIII. 1).
- Lockhartia** Hook., Rchb. f. (Orchideen, XX. 1) „Lockhart's“-O. (n. Dav. Lockhart, Vorst. d. bot. Gart. in Trinidad, Neugranada), z. B. *pachyglossa* ds., „Dickzunge“, *elegans* Hook. (*Fernandezia* e. Lodd.).
- Locusta** (sc. *Valeriana*) L. (Valerianeen, III. 1) Rapünzchen Grck., s. *Valerianella olitoria* Mnch. (*Valeriana Locusta* L. var. a. *olitoria* L., *Fedia* ol. Vahl (*locusta* Heuschrecke)).
- Lodoicëa** Comm. (**Laodicëa** Labill.) (Palmen, XXII. 13) Meer- od. See-cocos-P., maldivische Nuss (n. *Laodice*, Prinzessin v. Troja? od. st. *Ludovicëa*? unsicher!), *L. Sechellarum* Lab. (*Cocos maldivica* Pers.), auch s. *Lontarus* u. *Borassus* L.
- Loeflingia** L. (Loeffl.- Röm.) (Portulacac. od. Paronychieen, III. 1) „Loefling's“-Knaut (n. Pet. Löfling, Linné's Schüler), *L. indica* L. (*Pharmacëum depressum* L. f.), *renifolia* Lag. etc.
- Loeselia** L. (Polemoniaceen, V. 2) „Loeselia“ (n. Joh. Lösel, Prof. zu Königsberg, † 1652), z. B. *ciliata* L. (*Hoitzia Loeselii* Spr.).
- Logania** R. Br. (Gentianeen od. Loganieen, V. 1) „Logan's“-Bitterblatt (n. d. engl. Statth. von Pennsylv. J. Logan, † 1736), z. B. *pentacrina* Scop., Gm. (*Ruyschia Surubea* Jacq., Aubl.) — *Loganiëae* R. Br.
- Logfia** Cass. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (Compos. Gnaphalieen, XIX. 4) Fadenkraut (*Anagramm* v. *Filago*), z. B. *brevifolia* Cass.
- Loiseleuria** Desv. (Rhodoraceen Azaleen, V. 1) „Loiseleur's“- od. niederlieg. Azalee, *L. procumbens* Desv. (n. *Loiseleur-Deslongschamps*, s. d. Aut.), s. *Azalea proc.* L. (*Chamaelëdon proc.* Lk.).
- Lolium** L. (Gräser, III. 2) Lolchgras, fr. zizanie, e. tare (v. d. celt. loloa Raygras), z. B. *L. perenne* L., fr. raygras de l'Angleterre, engl. Ray- d. i. Rasengras, e. ray- od. rye-grass, *L. temulentum* L. Taumelgras, fr. ivroie (ivraie) od. gerzerie, e. damel.
- Lomaria** W. (Farne, XXIV. 1) „Saum“- od. „Randfarn“ (*λωμα, -ατος*; Saum — Stand d. Indusien od. Samenhalter!), z. B. Zier-Baumfarn *L. gibba* W. u. *Pattersoni* Spr., etc., s. *Onoclea* Sw.
- Lomatia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) Flügelsamen (s. eb. — Frucht m. breit. Hautsaum!), Zier. *longifolia* R. Br., *ilicifolia* etc. R. Br. (Str. Neustüdwaales), s. *Embothrium* Forst.
- Lomatogonium** A. Br. (Gentianeen, V. 2) „Fransenkante“ Koch (Hallier) s. v. u. *λωνια* od. *λωνος* Ecke, Kante — d. beiden Narben m. d. Carpidien-Nähten d. Länge nach zusammen!), *L. carinthiacum* A. Br. (*Gentiana car.* Fröl., *Swertia car.* Wulf.).
- Lomatophyllum** W. (Liliaceen, VI. 1) „Randblatt“-L., Bandlilie D. (s. v., *φύλλον* Laub — d. Blätt. am Rand knorpelig!), z. B. *L. borbonicum* W. (*Phylloma aloiflora* Haw.).
- Lomentacëae** DC., Rchb. „Gliederschotige“ Cruciferen (v. *lomentum* Gliederschote).
- Lonas** Adans., G. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) geruchlose Immortelle (*Anagramm* v. *Santolina*, wozu früher gehörig), Zier. *L. inodora* G. s. *umbellata* Cass., fr. *Lonas sans odeur*, e. scentless *Lonas*, s. *Athanasia annua* L.

- 1) **Lonchitis** L. (Farne, XXIV. 1) „Lanzenfarn“, Buchtenf. D. (*λογγίτις* lanzenähnlich), z. B. *pedata* L. (*Pteris podophylla* autt.). 2) **L.** (sc. *Polypodium*) L. (Farne, XXIV. 1) scharfer Schildfarn Grck., s. *Aspidium Lonchitis* Sw. (*Polystichum Lonch.* Roth).
- Lonchocarpus** H. B. K. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Lanzenhülse“ (*λόγγη* Lange, *καρπός* Frucht — Hülse lanzettf.), z. B. *formosianus* DC. (Ins. Formosa), *macrophyllus* Kth. etc., s. *Dalbergia*, *Robinia* etc.
- Lonicera** L. (Caprifoliac. od. Lonicereen, V. 1) „Lonzitze“ Grck., Geisblatt, Heckenkirsche, fr. *chèvre-feuille*, e. honey-suckle (n. d. Bot. Adam Lonitzer, lat. *Lonicærus*, Prof. u. Arzt in Frankfurt a. M., † 1586), L. *Xylostæum* L. Hecken- od. Hundskirsche, *nigra* L. Hundbeere, e. dog's-berry, L. *alpigena* L., *tatarica* L., etc.
- Lontarus** Rumph. (Palmen, XXII. 6) „Lontar“, Wein- od. Palmyrapalme, fr. *lontard* (v. d. vaterl. *lontar*), L. *domestica* G., s. *Borassus flabelliformis* L.
- Lopezia** Cavend. (Myrobalanen, I. 1) „Lopezie“ (n. d. span. Nat. Francisco Lopez, Wst. n. Thom. Lopez, schr. üb. d. neue Welt), Zier. L. *coronata* Andrz. s. *racemosa* Cavend. (mexic. Jacq.) u. *miniata* DC.
- 1) **Lophanthus** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Kamm“- od. „Schopfbblume“ (*λόφος* Kamm etc., *ἄνθος* — Blüt. in Büscheln!), z. B. *chinensis* Benth., s. *Hyssopus Loph.* L. 2) **Loph.** Forst. (Hermanniac. od. Büttneriac., XVI. 2), L. *tomentosus* Forst., s. *Waltheria Loph.* Forst.
- Lophospermum** D. Don (Bignoniaceen, XIV. 2) „Kammsame“ Rmpl. (s. v. u. *σπέρμα* Samen — diese von breit. Kammsaum umgeben), Ziergitterpfl. L. scandens Don s. *erubescens* Zucc. m. v. *Andersoni* Hort., Balkon-Hängpfl. *spectabile* Hort.
- Loranthaceæ** Don „Riemenblumenartige“ (-*thidææ* Gray, -*thææ* Bartl., Rchb.) (s. sogl.).
- Loranthus** L. (Caprifoliac. Lorantheen, VI. 1) „Riemenblume“ (*λωρόν* lat. *lorum* Riemen, *ἄνθος* Bl. — Kronzipfel riemenf.), L. *europæus* Jacq. (Krain, Litorale etc.).
- Loroglossum** Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Riemenzunge“ (s. eb. u. *γλώσσα* Zunge — d. Labell lang zungenf.), L. *hircinum* u. *anthropophorum* Rich., s. *Himantoglossum hirc.* Spr. u. *Acères anthr.* R. Br.
- Lotææ** Rchb. Schotenkleeartige, s. *Lotus*!
- Lotus (-us)** DC. (Nymphaeaceen, XIII. 1) weisser Lotus, ägypt. Seerose (*λωτός* — wovon jedoch nicht *Lotophagen* Homer! s. sogl.), s. *Nymphaea Lotus* L.
- 1) **Lotus** L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Schoten- od. Hornklee, Schüchel O. W., fr. *lotier*, *mêlilot* de l'Allemagne, e. *lote* (-tree) (gr. *λωτός* Theophr., s. sogl.), L. *corniculatus* L. (— Hörnchen an d. Hülsen spitze!), Zier. L. *Tetragonolobus* L. (Tetrag. *purpureus* Mnch.) engl. Erbse, fr. *lotier* *pourpre*, e. *purple-trefoil*, L. *jacobaeus* L. *Jakobs-klee*, fr. l. de l'île de Jacques, e. *St. James-island's-trefoil*. 2) **Lotus** (sc. *Rhamnus* L. s. *Zizyphus* T.) (Rhamnaceen, V. 1) *Lotus* od. *essb.* *Judendorn* W., fr. *lotos* (*lotus*), *lotier* *des anciens*, - *des lotophages* (*λωτοφάγοι* Homer, die Frucht vom Lotusbaum *Essende*, Nordaf.). 3) **Lotus** (sc. *Nymphaea*) L. (Nymphäaceen, XIII. 1) ägypt. Seerose, fr. *lotier* d'Egypte. 4) **Lotus** (sc. *Diospyros*) L. (Sapotaceen, XXIII. 2) s. g. italien. od. indische Dattelpflaume M.-Rchb., e. *bastard-lote-tree* „unechter Lotusbaum“.
- 1) **Loudonia** Lindl. (Halorageen, VIII. 4) „Loudon's“-Seebeere (n. d. engl. Bot. J. C. Loudon). 2) **Loudonia** Berter. (Papilionaceen).

- Louichéa** Schreb. (*Lovichea* l'Hér.) (Chenopodiac. od. Urticaceen, V. 2) Kampherkraut (n. René Louiche des Fontaines, s. Desfontaines), L. Pteranthus Forsk. s. cervina l'Hér., s. Camphorosma Pter. L.).
- Lowéa** Lindl. (Rosaceen, XII. 5) „Lowe's“-Rose, Berberitzenblatt-R., s. *Rosa berberifolia* autt. (n. d. Baccalaureus R. T. Lowe, Univers. Cambridge, schr. Primitiae et Novitiae Faunae et Florae Maderae et Portus Sancti, Lond. 1851).
- Loxanthéra** Blum. (Loranthaceen, VI. 1) „Schräganthere“ ($\lambda\omicron\xi\delta\zeta$ schräg etc., $\acute{\alpha}\nu\theta\rho\acute{\alpha}$ Staubbeutel — diese stehen schief), L. speciosa Blum., s. *Loranthus* L.
- Lubin** Vent., Lk. (Primulac. Lysimachieen, V. 1) „Lubin's“-Lysimachie (n. d. franz. Beamt. u. Bot. in Ostindien S. Lubin), L. atropurea Lk. (*Lysimachia atr.* L.), spathulata Vent. (*Lys. mauritiana* autt.) etc.
- Lucidor** (sc. Antholyza) L. (Irideen, III. 1) „Lichtgeschenk“-Rachenlilie, gestielte R. Dietr. (lux, -cis Licht, $\delta\acute{\omega}\theta\omicron\nu$ Gabe, — wie in Theodor!).
- Luculia** Sweet (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Luculi“-Chinastrauch (n. d. nepaulischen Nam. d. Pfl. luculi-swa), Zier. L. gratissima, s. *Cinchona gr.* u. *Mussaenda Luculia* autt.
- Lucuma** Juss. (Sapotac. Mimosopeen od. Lucumeeen, X. 1) „Lucumbaum“ (Nam. in Peru). — *Lucumëae* Juss., DC.
- Ludia** Lam., Comm. (Bixaceen, XIII. 1) „Spottblatt“, Änderling D. (v. ludo spiele, spotte — nämll. d. Blätt. in d. Form!), L. heterophylla Lam. „verschiedenblättr.“.
- Ludolfia (-phia)** W. (Rohrgräser, III. 2) „Ludolf's“-Rohr (n. d. Prof. Matth. Ludolf in Berlin, † 1756), L. macrosperma W. Riesenrohr (*Arundinaria m.* Michx., *Miegia m.* Pers.), glaucescens W. (*Panicum arborescens* L.) etc.
- Ludovia** Poit., Pers. (Pandaneen Cyclantheen od. Palmen, XXI. 9) „Ludovie“, L. lancaefolia A. Br., s. *Carludovica lanc.* Hort. Par. (*Salmia* W.), s. *Carludovia* Rz. (*Carlodovica* R. P.) Karl-Luisen-Palme (n. d. span. König Karl IV. u. dess. Gemahlin Mar. Louise, † 1819).
- Ludvigia** Gronov. (-wiglia L.) (Lythrarieen, IV. 2) „Ludwigie“ (n. d. Prof. Chr. Gottl. Ludw. in Leipz.), L. decurrens Walt. s. jussoides Mchx. (Carolina), L. aquatica Clayt. (*Ammannia ramosior* L.), s. *Ludwigiaria* DC.
- Luffa** T., Cavend. (Cucurbitaceen, XXI. 5) Kanten- od. Beissgurke, Schwammkürbis Rmpl. (arab. louff), Zier. L. cylindrica s. *Poppia Fabiana* Hort. (L. Petola Ser.), fr. Paponge, Torchon, Concombre à noyau etc., e. cylindrical-fruited Luffa, L. acutangula Ser. „scharfkantige“, fr. L. à fruits anguleux, e. strainer-vine, s. *Cucumis acutangula* Ser. u. *Momordica Luffa* L.
- 1) **Lunaria** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) „Mondviole“, Mondveil Vilm, fr. lunaire, e. moon-wort (v. luna Mond — Form d. Samen!), Zier. L. biennis Mich. (annua L., inodora Lam.) Silberblatt O. W. (— silberne Schoten-Scheidewände!), rediviva L. (odorata Lam.), s. g. Flittern, fr. lunaire vivace, e. revived moon-wort. 2) **Lunaria** (sc. *Rumex*) L. (Polygonaceen, VI. 3) Mondampfer. 3) **Lunaria** (sc. *Osmunda*) L. (Farne, XXIV. 1) Mondfarn, -raute, fr. lunaire, bulbonac u. ménisse, e. lunary, bolbonac (Fiederlappen mondfl.). 4) **Lunaria** Plum. (Lentibularien, II. 1) Wasserhelm, L. palustris Plum., s. *Utricularia foliosa* L.
- Lunularia** Mich. (Lebermoose, XXIV. 3) „Mondbecher“ Leun. (dem. v. luna Mond — d. Kaps. halbmondfl.), L. vulgaris Mich. (*Marchantia eruciata* L. s. *Staurophora pulchella* W.).

- Lupēria** DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Trauer“-Levkoje (v. *λυρός* traurig — schmutzig gelbrot), s. Matthiöla tristis R. Br.
- Lupinaster** Mneh., DC. (zu Trifolium Rchb.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) sibirischer Klee (deter. v. Lupīnus, s. d.), z. B. Trif. alpinum L., montanum L., L. macrocephalus Pursh, etc.
- Lupīnus** T., L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Lupine“ oder „Wolfsbohne“, fr. lupin, e. lupine (v. lupus Wolf — hungrig wie ein Wolf jed. Boden verzehrend, Wtst. n. Plinius), Zier. L. nanus Dougl. m. v. v. Zwerg-L., fr. l. nain, e. dwarf-l., polyphyllus Dougl., varius L. weissblau (semiverticillatus Desv.), fr. l. petit bleu, L. lutēus L. (auch gebaut!), fr. l. jaune odorante, sulphurēus Dougl. (Californ.), tricolor elegans Hort. etc.
- Lupularia** Ser. (zu Medicago L.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Hopfenklee“, s. Medicago lupulina L. (v. lupulus Hopfen).
- Lupulina** Desv. (zu Trifolium L.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Hopfen-Kleeartige (s. eb.), z. B. Tr. procumbens etc.
- Lupulus** (sc. Humulus) L. (Urticaceen, XXII. 5) gem. Hopfen, fr. vigne du nord, e. hop's-plant od. bind (dem. v. lupus Wolf? — ungewiss! Wtst. schlingt sich um Weiden u. dgl. = „Weidenwolf“ (Lupus salictarius Plin.).
- Lussacia** Spr. (Ericac. Vaccinieen, X. 1) „Gay-Lussac's“-Heidelbeerstrauch (n. d. franz. Nat. Gay-Lussac), L. vaccinium Spr. (Vacc. brasiliense Spr. s. Gay-Lussacia Pseudo-Vaccinium Schldl.), L. buxifolia Spr. (Gay-Luss. b. Hb.) etc., s. Thibaudia glandulosa Hb.
- Luxemburgia** St. Hil. (Violaceen Sauvagesieen, XIII. 1 od. XVI. 8) „Luxemburgie“ (n. d. Herzog v. Luxembourg, unt. dess. Patronage St. Hilaire 1816—1822 Brasil. bereiste), L. speciosa St. Hil. s. octandra St. Hil. (Str. Bras.), s. Plectanthera Mart.
- Luzula** DC. (Juncaceen, VI. 1) „Hainsimsengras“, Marbel Grck. (v. lucus Hain — Standort! Wtst. v. luceo glänze — Blüt. u. Blätt. mehr. Arten!), L. albida DC., silvatica Gaud. s. g. Lichel, campestris DC. gemeiner Marbel, etc.
- Lycaste** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Lykaste“ (Paxton: Nam. einer schön. Frau in Sicilien, von Lykastos, Stadt auf Creta, abgeleitet.), z. B. Skinneri Ldl. (Guatem.).
- Lychnis** T., L. (Caryophylleen od. Sileneen, X. 5) „Lichtnelke“, Lichte O. W., fr. lychnide (v. *λύχνος* Leuchte), Topfbl. L. fulgens Fisch., Haageana Lem. m. v. fl. albo Hort., hybrida aurantiaca Hort., Gartenzier. L. chalcedonica L., s. g. brennende Liebe, fr. fleur de Jérusalem „Jerusalemkreuz“ m. v. v., coeli rosa Desc. (Agrostemma c. r. L.) u. flos Jovis DC. „Jupiters“-L., L. Viscaria L. v. fl. pl. Pechnelke, fr. bourbonnaise, attrape-mouche, alpina L. (Viscaria alp. Fr.), sylvestris Hoppe v. fl. pl. Hort., wild u. Gart. L. flos cuculi L. „Kukuks“-Lichte, fr. fleur de coucou od. lampette déchirée, e. cuckoo-flower, L. Preslii Sek., L. grandiflora Jacq. (China) etc.
- 1) **Lychnitis** (sc. Phlomis) L. (Labiaten, XIV. 1) lichtnelkenart. Flammenlippe. 2) **L.** (sc. Verbascum) L. (Scrophularineen, V. 1) lichtnelkenart. Wollkraut Grck. (v. *λυχνίτης* Leuchter, Kerze!).
- Lycium** L. (Solaneen, V. 1) Bocks- od. Wolfsdorn, Hexenstrang od. Teufelszwirn Rmpl., fr. lyciet (liciet), e. goat's- od. box-thorn (*λύκιον* Diosc. v. *λύκος* Wolf od. *Λυκία* Lycien), Gartenstr. L. barbarum Ait. (vulgare Dun. s. flaccidum Mneh.), L. europaeum L., ruthenicum Murr., chinense Mill. (barbarum var. chin. Ait., barbarum Lour.).
- Lycocōnum** (sc. Aconitum) L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Wolfstod“-Eisenhut, Wolfs-Sturmhut Grck., -wurz, fr. tue-loup (étrangle-, herbe

- au -), e. wolf's-bane (yellow w.-b.), libbard's-bane (v. *λίχος* u. *κτός* Mord).
- Lycogāla** Mich. (Pilze, XXIV. 4) Blut- od. „Wolfsmilch“ (s. v. u. *γάλα*, -*κτός* Milch), z. B. plumbëum Mich.
- Lycoperdon** Mchx. (Pilze, XXIV. 4) Staub- od. Kugelpilz, Bovist, eig. „Wolfs“-F., fr. vesse- od. pisse de loup „Wolfswind“ etc. (*λίχος* u. *πέροδομαι* farze), z. B. *L. gigantëum* Riesen-Bovist, gemmatum stachelwarziger, etc.
- Lycopersicum** Dun. (-on T.) (sc. Solānum) L. (Solaneen, V. 1) „Wolfs- pirsich“, s. g. Paradies- od. Liebesapfel, Tomate, fr. tomate (*λίχος* u. Persica Pirsich), *L. esculentum* Dun. s. Humboldtii W., *L. pyriforme* Dun. (*Solanum pomiferum* Cav.), *L. procumbens* Dun. (Süd- amer.).
- Lycopodiaceae** DC., Rchb., Seub. Bärlappgew., -**podineae** DC. dsgl., s. sogl.
- Lycopodium** L. (Lycopodiaceen, XXIV. 1) „Wolfssuss“, Bärlapp, Kolben- moos D., fr. lycopode, pied-de-loup, mousse-massue od. plicaire, e. earth-moss (s. v. u. *πόδιον* Fussesocke v. *πόδες*, -*όδος* Fuss — Form ähnl. d. Wolfsfährte!), *L. clavatum* L. etc.
- Lycopsis** L. (Boragineen, V. 1) „Wolfsgesicht“, Krummhals, Wall-Ochsen- zunge, fr. licope, lycopside u. face-de-loup (s. v. u. *ὄψις* Gesicht), s. *Echioides* Riv.
- Lycopus** L. (Labiaten, XIV. 1) „Wolfssuss“, Wolfstrapp, Zigeunerkraut D., fr. lycope, coumène, lance du Christ, e. mother-wort (s. v. u. *πους* Fuss), z. B. *L. amethystinus* Steven (*Amethystea coerulea* L.) etc.
- Lycōris** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Lykoria“-Narzisse (zu *Amaryllis* L.) (Wtst. n. d. Nereide Lycoris, od. n. *Λυκώρεια* Gegend bei Delphi), Zier. *L. aurea* Herb. (Amar. aur. Ait.).
- Lygëum** L. (Gräser, III. 1) „Nuss“- od. „Bindgras“ (v. *λυγώω* biege, binde), z. B. *L. Spartum* L.
- Lygodium** Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Kletterfarn, „Schling“- Mondfarn (v. *λυγωδής* geschmeidig — im Orient zum Flechten), Zier. *L. japonicum* Sw., scandens Sw. (Osmunda scand. autt.).
- Lygodsodëa** Rz. Pv. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Weidenrut“-Stink- kraut (*λίγος* Weidenrute, *Dysodea* v. *δυσωδής*, -*εος* übelriechend), z. B. *ciliata* Lk. u. *foetida* R. P. (*Paederia* f. L.).
- 1) **Lyonia** Nutt. (zu *Andromëda* Rchb.) (Ericaceen, X. 1) „Lyon's“-Torf- od. Rosmarinheide (n. d. Sammler in Amerika John Lyon), *L. ferru- ginëa*, *rigida* u. *paniculata* Nutt., s. *Andromëda* L. 2) **Lyonia** Raf. (*Polygonaceen*). 3) **L.** Ell. (*Asclepiadeen*).
- Lysimachia** L. (Primulaceen, V. 1) Gilbweiderich, Felberich O. W., Fried- los Jess., fr. lysimaque, herbe à cent-maux (Plinius: n. d. König Lysimachus, wahrsch. aber v. *λύω* löse, *μάχη* Kampf — lasse d. Kampf los, daher „Friedlos“, od. löse d. Schmerzen, daher herbe à cent maux!), wild u. Zier. *L. vulgaris* L., e. common Loose-strife, fr. cor- neille, *L. Nummularia* L. (Ampelpfl.) „Pfennigkraut“, *Lechenaultii* Duby etc.
- Lysimachion** Tausch. (zu *Epilobium* Rchb.) (Onagrarieen, VIII. 1) Wei- denröschen (s. v.), z. B. *E. angustifolium* L. etc.
- Lysipōma** Hb. Bpl. Kth. (*Campanulac. Lobeliaceen*, V. 1 od. XIX. 6) „Lösdeckel“ (*λύσις* Lösung, *πώμα* Deckel — d. Kapsel springt m. ein. Deckel auf), z. B. *acaulis* Kth. (*Lobelia androsacëa* W.), *aretioides* Kth. (*Lob. glandulosa* W.), etc.
- Lythracëae** Grck., -**rariae** Rchb., -**rariëae** DC. „Blutkrautgew.“, s. sogl.
- Lythrum** L. (Lythraceen, XI. 1) „Blutkraut“, Weiderich, fr. salicaire, e. blit (blites, blits), blood-flower (v. *λύθρον* Blutschmutz — Farbe d. Blumen u. ehem. geg. Blutfluss), Zier. *L. virgatum* L. s. austri-

áčum Jacq. (*Salicaria virg.* Mnch.) (N.-Amer.), fr. salicaire effilée, e. rod-like *Lythrum*, *L. Salicaria* L. „Weiderich“, m. v. roseum superbum Hort., fr. salicaire commun, e. willow-herbe, *L. Cuphëa* L. (*Cuphea viscosissima* Jacq.), *L. fruticosum* L., etc.

- Maackia** Rupr. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Maack's“-Cäsalpinie (n. d. Gymn.-Dir. Maack in Irkutsk), *M. amurensis* Rupr.
- Maba** Forst. (Ebenaceen, XXII. 8) Maba- od. Teufelsbaum, fr. mabouier, Maba-Eisenholz (maba Nam. d. Baums auf d. Tonga-Ins.), *M. buxifolia* Pers. (Ferreöla bux. Kön.), *M. Ebënus* Spr. (*Ebënus vulgaris* Roxb.) gem. Ebenholz.
- Maburnia** P.-Thou. (Irideen, III. 1) „Burmans“-Schwertel (Anagramm v. Burmania!), s. *Burmannia capensis* Mart.
- Machaeranthëra** Nees (Compos. Astereen, XIX. 2) „Säbelanthere“ *μάχαιρα* Säbel, *ἀνθήρα* Staubbeutel — Antheren m. Messeranhang an d. Spitze), *Zier. M. tanacetifolia* Rchb. f., s. *Aster tanac.* H. B. K.
- 1) **Machaerium** Pers., Kth. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Säbelhülse“ (s. eb. — Hülse säbelf. zugespitzt!), *M. acuminatum* Kth. (*Nissolia arborëa* Jacq.), *ferruginëum* Kth. (Niss. ferr. W.). 2) **Machaerium** Juss. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Säbelchen“, Palisanderholz (*μαχαίριον* dem. v. *-μαίρα* Säbel), s. *Jacaranda brasiliensis* Juss.
- Machilus** Nees, Wall. (Laurineen, IX. 1) Duft-Lorbeer, *M. odoratissimus* Wall. (*Persea* od. G.) (Name indisch. Ursprungs).
- Machlis** DC. (Compositen) „Buhlerin“ (v. *μαχλός* geil etc. — d. ♀ Blüt. nackt).
- Maëis** W. (Myristiceen, XIII. 1) Muskatblume, s. *Myristica moschata* Rumph. s. *officinalis* L. (v. d. gr. *μάξχο* Makir, ind. Gewürz — n. *Aemilius Macer*, Verf. d. ältest. mediz. Werks „Macer floridus de virtutibus herbarum, d. ganze Mittelalter hind. citiert, s. *Jessen Bot. d. Gegenwart u. Vorzeit*, S. 130).
- Mackaya** Arnott (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Mackay's“- od. Rotpfahl-Kürbis (n. Dr. Mackay, Dir. d. Gart.'s am Trinity-College z. Dublin, † 1862), s. *Erythropalum* Blum.
- Macleania** Grah., Hook. (Ericaceen Vaccinieen, X. 1) „Macleans“-Heidelbeere (n. John Maclean Esq., Kaufm. u. Bot. in Lima, Peru), *M. coccinëa* Decsn. etc.
- Macleya** R. Br. (Papaveraceen, XIII. 1) „Macleys“- (n. A. Macley, Sekr. d. Linné'sch. Gesellsch. in Lond.), *Zier. M. cordata* R. Br., s. *Bocconia cord.* W.
- Maclura** (-ria) Nutt. (Urticaceen Moreen, XXI. 4) Osagendorn Rmpl., -orange (n. d. engl. Geologen W. Maclure, † 1840 in Mexiko), *M. aurantiaca* Nutt., fr. Maclure épineux (mâle u. femelle), e. osage-orange, s. *Morus* s. *Broussonetia tinctoria* L., Vent.
- Macradenia** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Langdrüsen“-O. (*μαζός* lang, gross, *ἄδην*, -ερος Drüse — langgeschwänzte Pollenmass!), z. B. *polystachya* Spr. (*Epidendron* p. Thou.) etc.
- Macrocarpum** Spach (sect. v. *Cornus* L.) (Cornaceen, IV. 1) „Grossfrucht“-Cornelstr. (s. eb. u. *μακρός* Frucht), z. B. *C. mas* L. echte Cornelkirsche.
- 1) **Macrochilus** Knowl., Westc. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Langlippe“ (s. v. u. *χελός* Lippe — lange, ungeteilte Lippe!), s. *Miltonia* Lindl.
- 2) **Macroch.** Presl (Lobeliaceen, XIX. 6) „Langlippen“-Lobelie (= lang herabhäng. schmale Lippenzipfel!), s. *Lobelia* L.
- Macrochlōa** Kth. (Gräser, III. 2) „Lang“- od. Pfiemengras (s. v. u. *χλόα* Spross, Gras — sehr hohe Gräser!), z. B. *tenacissima* Kth., s. g.

- Espartero gras od. Halfa (Algerien — dient zu Matten, Geflechten u. als Papiersurrogat).
- Macrocnēmum** P. Br., Vell. (Cinchonaceen, V. 1) „Langschienen“-Chinastr., „Stengelblume“ D. (s. v. u. *ζνίμη* Schienbein — sehr lange Blumenstiele!), *M. speciosum* Jacq., s. *Mussaenda* spec. autt.
- Macrobolium** L., Schreb. (Cassieen Cäsalpinieen, III. 1) „Lang“- od. „Grosslappe“ D. (s. v. u. *λοβιον* dem. v. *λοβός* Lappen — d. ob. Kronblatt sehr lang), z. B. *hymenaeoides* W. (*Vouapa bifolia* Aubl.), *staminum* Mey. (B. Guiana), *pinnatum* W. (*Outea guian.* Aubl.), *sphaerocarpon* W. (*Vouapa Simira* Aubl.).
- Macropiper** Miq. (Piperaceen, II. 3) „Langpfeffer“ (s. v. u. *piper* Pfeffer — grosse Blätt!), z. B. *excelsum aureo-pictum* Bull.
- Macroscēpis** Hb. Bpl. Kth. (Apocynen, V. 2) „Lang“- od. „Grossdecke“ (s. v. u. *σκέπη* Decke etc. — d. Kelch grösser, als d. Krone u. an d. Basis m. Brakteen), z. B. *obovata* Kth., *longiflōra* Spr. etc., s. *Cynanchum* L.
- Macrostylis** Bartl. (Rutaceen, V. 1) „Langgriffel“-Raute (s. v., *στυλίς*; Griffel — diese lang hervorstehend), z. B. *lanceolata* u. *barbigēra* Bartl., s. *Agathosma* W. u. *Diosma* L.
- Macrōtis** Raf. (Ranunculaceen, XIII. 1) „Langohr“, traubiges Christophskraut (s. v. u. *ὄψις*, *ὠτος* Ohr — lange Blütentraube), s. *Actaea racemosa* L.
- Macrothyrus** Spach (zu *Aesculus* L.) (Sapindaceen, VII. 1) „Gross“- od. „Langstrauss“ (s. v., *θύσος* „Thyrus“ u. Strauss — langer Blütenstiel), Zier. *M. parviflōra* Walt. s. *macrostachya* Mchx.
- Macrotrōpis** DC. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Grosskiel“ (s. v. u. *τροπίς* Schiffskiel — Kielblatt. so gross als d. Fahne), z. B. *foetida* u. *inodōra* DC., s. *Anagiris chinensis* u. *inodōra* Spr.
- Macrozamia** Miq. (Cycadeen-Farne, XXIV. 1) „Hoch-Zamia“ (s. v. u. *Zamia* — hoh. d. *Zamia* ähnl. Gewächs!), Treibh. *M. spiralis* Miq. u. *plumosa* Hort. Bull.
- Madaria** DC. (Composit. Sigesbeckieen, XIX. 2) „Glatzenblume“, zierl. Ölmadie (Gatt. aus Arten von *Madia* gebildet, v. *μαδαρός*; kahlköpfig?), Zier. *M. elegans* DC. s. *corymbosa* Hort., fr. *Madaire élégante*, s. *Anthēmis elegans* Hort.
- Madia** Don, Mol. (-*dēa* Sol.) (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) Öl-, „Madiē“, Klebsaat (v. d. chilenischen *madi*, od. v. *μαδάω* lat. *mado* bin schmierig od. matschig — Charakt. v. *Madia sativa*!), geb. *M. sativa* Mol. Ölmadie, Zier. *M. elegans* Don (*Madaria* el. DC. s. *corymbosa* Hort. — *Madiēae* DC.
- Magnolia** L. (Ranunculac. Magnolieen, XIII. 6) „Magnolien“- od. Biberbaum Rmpl., fr. magnolier od. laurier tulipier „Tulpen-Lorbeer“ (n. d. Prof. Pet. Magnol z. Montpellier, † 1745), Zierb. *grandiflora* L. m. v. v., *obovata* Thb. s. *purpurea* Sims, *Yulan* Desf. s. *conspicua* Salisb. (Südchina) m. v. (Blendlingen) *triumphans*, *Alexandrina*, *Soulangeana* etc., *glauca* L. s. *fragrans* Sal. Biber- od. Sumpf-M., fr. *arbre de Castor*, e. *beaver-wood* od. *swamp-Magnolia*, *tripetala* L. s. *umbrella* Lam. „Schirmbaum“, fr. *arbre parasol*, e. *elk-wood* etc., *macrophylla* Mchx. (*Michauxii* Hort.) etc. — *Magnoliēae* DC.
- Mahagōni** Ad. (sc. *Swietenia*) L. (Rutaceen, X. 1) „Mahagonibaum“ (Meublesholz — westind. Name *maagoni*!).
- Mahaleb** (sc. *Prunus*) L. (Amygdaleen, XII. 1) Weichselkirschbaum, Steinweichsel, St. Luzienholz, Felsenkirsche, Dintenberg, fr. *Bois de St. Lucie*, *prunier odorant*, e. *Mahaleb-cherry-tree*, *perfumed ch.-tr.* (arab. Name *mah-haleb*!), s. *Prunus odorata* Lam. m. v. v.
- Mahernia** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Mahernie“ (Hermannie) (*Ana-*

- gramm v. *Hermannia*!), *Zier. M. glabrata* Hort. (jonquillenduft. Stubenpfl.), *incisa* Jacq., *odorata* Andr.
- Mahonia** Nutt. (Berberideen, VI. 1) „Mahon'strauch“, fr. Mahonie, e. ash-berberry (n. d. amerik. Bot. Bernh. Mac-Mahon zu Anfang dies. Jahrh.'s, schr. Gartenkalender, Philad.), *Zier. M. Aquifolium* Nutt. (Berberis Aq. L.) stechpalmlättr., fr. M. à feuilles de houx, e. holly-leaved ash-berb., M. fascicularis DC. (Berb. pinnata Lag.), M. nervosa Nutt. (glumacæa DC.), repens G. Don (Berb. rep. Lindl.) etc.
- Majanthëmum** Roth (Smilacineen, VI. 1) „Mai“- od. Schattenblume Grck. (v. Majus Monat Mai u. ἄνθεμον i. q. ἄνθος Bl.), M. bifolium Schmidt s. *Convallaria* Web., s. *Convallaria bif. L.* u. *Smilacina bif. Desf.*
- Majorāna** Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Majoran“ od. „Mairan“ Grck., fr. marjolaine, e. majoram (marjoram, -rom, -rum) (n. d. arab. maryamych od. marjamie), M. hortensis Mnch. s. vulgaris, s. *Origānum Majorāna* L.
- Malabatrīca** (sc. Melastōma) L. (Melastomaceen, X. 1) Schwarzbeere, Tomalopatra (*Fructus niger*) Rumph. (gr. *μαλάβαθρον* ind. Gewürz od. Nelkenblatt, Betel), s. *Laurus malabatrūs!*
- Malachium** Fr. (zu *Cerastium* Rchb.) (Alsineen, X. 5) „Weichling“ Grck. od. Weichkraut Seub. (gr. *μαλάχιον* weiches Kleid — weichanzufühl. Pfl.!), M. aquaticum Fr. (*Cerast. aq. L.*, *Larbræa aq. Ser.*).
- Malaguetta** (sc. *Amomum*) L. (Scitamineen, I. 1) Malaguetta-Pfeffer, Cardamome (Name in Guinea).
- Malaxis** Sw. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Zartorche“ (v. *μαλαχός* lat. mollis weich, zart), z. B. *paludosa* Sw. (*Ophrys palud. L.*), *monophyllos* Sw. etc. — *Malaxidæe* Lindl.
- Malcolmia** R. Br. (Crucifer. Siliquosen XV. 2) „Malcolmie“ (n. d. Zücht. W. Malcolm in Lond., † 1835, schr. 1771 *À Catal. of Hothouse and Greenhouse*), *Zier. M. maritima* R. Br. m. v. alba, bicolor Lois., Chia R. Br. levant. M. (Chios), s. *Cheiranthus Chius* L.
- Malōpe** L. (Malvaceen, XVI. 8) „Malvenantlitz“, fr. malope, fausse mauve (v. *Malva u. ωπι*) Antlitz, Ansehn, Wtst. d. veränd. *μαλάγη*, Plin.), *Zier. M. trifida* Cavend. (*Malopa tr. Lem.*), m. v. *grandiflora* Hort., *parviflora* l'Hér. (*Palavia malvaefolia* Cavend.).
- Malpighia** L. (Caryophylleen Malpighieen, X. 3) „Malpighie“, amerik. Kirsche, fr. moureiller, brin d'amour (n. Marcello Malpighi, Prof. in Bologna, † 1693), z. B. *argentæa* Jacq. (*Bunchosia arg. DC.*), *coccolobaefolia* Spr. (*Byrsonima c. DC.*), *Armeniāca* Cav. (*Bunchosia Arn. DC.*), *crassifolia* L. s. *Moureila* Aubl. (*Byrson. ferruginæa* Hb., Bpl.) (Bstr. Südam.). — *Malpighiaceæ* DC., -iae Juss., -iæe Rchb., -inæ Bartl. Fam. u. Ord. d. Malp.-Gew.
- Malus** T. (zu *Pirus* L.) (Rosac. Pomaceen, XII. 4) Apfelbaum, fr. pommier, e. apple-tree (gr. *μήλον* od. *μάλον* lat. malum Apfel, Obst, malus Apfelbaum), *Zier. M. spectabilis* Kaido fl. pleno Prachtapfel Rmpl., M. floribunda v. Sieb. „blütenreicher“, *Toringo* v. Sieb.
- Malva** L. (Malvaceen, XVI. 6) „Malve“, fr. mauve, e. mallow, auch Rosen- od. Käsepappel Grck., fr. fromageon (lat. malva, gr. *μαλάγη* v. *μαλάσσω* erweiche — als Heilmittel), z. B. wild M. *rotundifolia* L., fr. petite mauve, wild u. *Zier. M. moschata* L. „Moschus“-M., fr. m. musquée, e. musk-mallow (*M. trifida* Cav.), M. *Alcæa* L., *Siegmar'swurz*, *silvestris* L., Gärten: *mauretanica* L. *Zebra-M.*, fr. m. d'Algier, e. mauritanian M., *crispa* L., *miniata* Cav. (*Sphaeralcæa* m. Spach) mennigr. M., fr. m. à fleur cinabre, e. vermilion M. etc. — *Malvacæe* Juss., R. Br., DC., Rchb., -væe Rchb.
- Malvaviscus** Ad., Ait. (Malvaceen, XVI. 6) Baum- od. Tutenmalve, fr. mauvisque Bastard-Eibisch Wolff (Wtst. aus *Malva* u. *ισκός* ähnl.

- od. *Hibiscus* gebildet), Treibh. *M. arborëus* Cav., s. *Achania* s. *Hibiscus Malvariscus* Ait.
- Malvinda** Med. (*Malvinda* Burm.) (Geraniac. od. Sterculiaceen, XVI. 8) „indische Malve“ (aus *Malva* u. *indica* geb.), z. B. *M. ulmifolia* Burm. (*Waltheria* ind. L.), *palmata* „Handblatt“-*M.* (*Sida* p.).
- Mammēa** L. (Guttiferen *Garcinieen*, XIII. 1) Brüstebaum, „Mammei“ D., *Mammibaum*, fr. *mamei* (n. d. amerik. *mammey*, lat. *mamma* Mutterbrust — brustwarzenähnl. Griffel), *M. americana* L. Aprikosenbaum von St. Domingo, fr. *Abricotier d'Amérique*.
- Mammillaria** Haw. (zu *Cactus* Rehb.) (Cacteen, XII. 1) „Zitzen“-*Cactus* (v. *mamilla* Brustwarze — ganz m. solchen Höckern besetzt!), Zier. *M. coronaria*, *densa* u. *longimamma* (gelb), *Lehmanni* u. *simplex* (blassgelb), s. *Cactus mammillaris* L.
- Mancinella** (sc. *Hippomäne*) L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Manchinell“- od. Giftapfelbaum (*manzanilla* dem. v. d. span. *manza* Apfel — Früchte wie ein Franzapfel).
- Mandevillēa** Lindl. (Apocynen, V. 2) „Mandeville's“-Hundswürger (n. H. J. *Mandeville* Esq., Min. in Buenos-Ayres, Wtst.: n. John *Mandev.*, Reis. in Asien u. Afrika, † 1771), z. B. *Gewächsh. M. suaveolens* Lindl. (Schlingstr.), s. *Echites* DC.
- Mandihoca** Piso, s. *Manihot*!
- Mandirola** Van Houtt. (Gesneriac., XIV. 2) „Mandirola“ (unbek. Etymologie!), Zier. *M. multiflora* Van H., s. *Achimenes* m. *Gard.*, *picaturata*, *Roezlii*.
- Mandragōra** T. (Solaneen, V. 1) Hexenkraut, Alraunwurzel, fr. *mandragore*, *racine du Saint-esprit*, *mainde-gloire*, e. earth-apple, *mandrake* (v. *μάρδορα* Viehstall u. *αγορά* Sammelplatz — wächst um Ställe, Wtst. *μάρδοραγοράς* od. *-οης* betäub. Pfl., hebr. *dudaim*, als Schlaf- u. Liebestränk gebr., *Riemer*), *M. acaulis* G., s. *Atrōpa Mandragōra* L.
- Manettia** L., Mut. (Rubiaceen, Cinchonaceen, IV. 1) „Manettie“ (n. Xaver *Manetti*, Dir. d. bot. Gartens z. Florenz), *Gewächsh. M. bicolor* Paxt., *fimbriata* Schldl. (*Nacibe* Aubl.), *picta* W., *lanceolata* Vahl (*Ophiorrhiza* l. *Forsk.*), etc.
- Mangifēra** L., (Terebinthaceen, Anacardieen, V. 1) Mangobaum, „Mangoträgerin“, *Mangopflaumenb.*, fr. *manguier* (-gier), e. mangrove (ind. Name d. Frucht *manga*), Warmh. *M. indica* L., s. *Manga* Rumph.
- Mangium** Rumph. (Rhizophoreen, XI. 1) Leuchter- od. Stelzenbaum (vaterl. *mangle*), *M. candelabrum*, *celsum*, *minus* etc. Rumph., s. *Rhizophōra Mangle* L. *Mangrovebaum*, fr. *palétuvier*, *M. caseolare* Rumph., s. *Sonneratia acida* L. (B. Molukk.) (*Rhizophōra* s. *Aubletia caseol.* L., G.), s. *sogl.*
- 1) **Mangle** Pluk., DC. (sc. *Rhizophōra*) L. (Rhizophoreen, XI. 1) „Mangle“- od. *Mongrovebaum*, *Wurzel-*, *Leuchter-* u. *Stelzenbaum*, *Wurzelsenker* (indischer Name des B.'s!), s. *Candēla americana* Catesb. 2) **Mangle** Sloan. (Anacardiaceen, XXIII. 2 od. *Myoporineen*, XIV. 2), *M. laurocerasifolia* Sl. *oriental. Nierenbaum*, s. *Anacardium orientale* Bauh. (*Avicennia tomentosa* L. s. *Bontia germinans* L. f.).
- Manglilla** Juss. (sc. *Bumelia*) W. (Sapotaceen od. *Lucumeen*, V. 1) *Eisenholz* (*manglilla* dem. v. *mangle* in Peru), s. *Sideroxylon Manglilla* Lam. (*Myrsine* M. R. Br.); *M. Chrysophyllum* Lam., s. *Duhamelia Manglilla* Domb.
- Mangostana** Rumph., G. (sc. *Garcinia*) L. (Guttiferen, XI. 1) wohl-schmeck. *Mangofrucht*, fr. *mangoustan* (-gostan) (malayisch. Name der Frucht!).

- Manicaria** G. (Palmen od. Pandaneen, XXI. 5—10) „Ärmel“- od. „Sackpalme“, westind. Netzpalme, *M. saccifera* G. (v. manīca Ärmel, Manschette — Blütenscheide!).
- 1) **Manihot** Plum. (Euphorbiaceen, XXI. 11) Manihotwurzel, fr. manioc (-chot) (brasil. Name!), *M. utilis* Pohl, s. *Jatropha Manihot* L. Cussave, „Maniokmehl“. 2) **Manihot** DC. (sc. *Hibiscus*) L. (Malvaceen, XVI. 8) (zu *Abelmoschus*) indischer od. Manihot-Eibisch, schwefelg. M.-Rchb.
- 1) **Manna** Don (Sapotaceen Fraxineen, II. 1 od. XXIII. 2) „Manna“-Esche (*μάρνα* Mannazucker v. d. arab. mann Geschenk — Gabe d. Himmels), *M. rotundifolia* Don s. *Fraxinus* rot. Ait., W. u. Fr. Or-nus L. 2) **Manna** nepalensis Don (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) Mannaklee von Nepaul, s. *Hedysarum Hamiltonii* Spr.
- Manzanilla** (-canilla Plum.) (sc. *Hippomäne*), s. *Mancinella*!
- Mappa** Juss., Spr. (sc. *Ricinus*) L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Molukken-Wolfsmilchbaum, „Tafeltuchb.“ Leun. (v. mappa lat. u. ital. Serviette etc. — Blätter zu Tischdecken! nicht Wtst.: nach Marc. Mappus, Arzt z. Strassb., schr. üb. Thee etc. 1691, vgl. d. folgende!)
- Mappia** Schreb. (Dilleniaceen, XIII. 6) „Mappus“-Dillenie (s. eb.).
- Maranta** L. (Marantaceen od. Cannac., I. 1) „Maranta“, Pfeilwurz, e. arrow-root (n. d. venetian. Arzt Barthol. Maranta, † 1754), *M. arundinacea* L., Zier-Blattpfl. *M. striata* u. *zebrina* Sims, s. *Calathæa* G. F. W. Mey u. *Phrynium* Roxb., W.
- Marasmius** (-ium) Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Welk“-P. (*μαρασμὸς* Altersschwäche, v. *μαραίνω* welke — d. Hutlamellen werd. zuletzt lederartig), *M. alliaceus* Fr. Mousseron d. Küche, Gewürz-P.
- Maráthrum** Raf. (Umbelliferen, V. 2) Fönchel od. Fenchel, *M. foeniculacæum* Hb. (Lacis f. Spr.) (gr. *μάραθρον* od. -θρον, lat. foeniculum), s. *Foenicūlum* T. (*Hippomarathrum* Dub.).
- Marattia** Sw. (Osmundaceen od. Wasserfarne, XXIV. 1) „Maratti“-Farn (n. d. Prof. G. F. Maratti in Rom, schr. 1760 de floribus Filicum), Zier. *M. alata* Sm. u. *elegans* Endl. — *Marattiaceæ* Kaulf.
- Maregravia** Plum., L. (Guttiferen, XIII. 1) „Maregrav's“-Gummistrauch (n. d. Reis. in Brasil. u. s. f. G. Maregrav, † 1644 in Guinea), *M. umbellata* L., *pieta* W. (Str. Bras.), *spiciflora* Rich. (Str. an Vulkanen auf Guadeloupe). — *Maregraviæ* Juss.
- Marchantia** March. f., Raddi (Lebermoose, XXIV. 3) „Marchantie“, Stein-Lebermoos, Leberkraut Leun., e. lichen (geg. Leberkr. gebr.) (n. d. franz. Gart.-Dir. Nic. Marchant z. Blois, † 1678), *M. polymorpha* Radd., fr. *hépatiche* des fontaines. — *Marchantiacææ* Cord.
- Margäris** DC. (Rubiaceen, XXII. 7) „Perlkaffee“, s. g. *Perlitas* der Mexikaner, Pfeiffer (*μαργαρίς*, -ίδος Perle — weg. d. Beeren!), *M. barbigera* u. *nudiflora* DC.
- Margarita** Gaud. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Margarite“, fr. marguérite, eig. Gansblümchen od. Masliebchen (s. eb. — Wtst. d. Strahlblütchen perlmutterartig rot u. weiss!), *M. Bellidiastrum* Gaud. (*Arnica* Bellid. W.), s. *Bellidiastrum* Mich.
- Margaritaria** L. (Euphorbiaceen, XXII. 7) „Perlenknopf beere“, *M. nobilis* L. (*μαργαίτις*, lat. margarita Perle — Frucht aus 4—5 glänzend. Knöpfen).
- Marianus** (sc. *Carduus*) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Mariendistel“, fr. chardon Marie, e. Lady's-thistle od. milk-th. (n. Maria, d. Mutter Christi, von deren Milch d. weissen Blutflecken her-rühren sollen), s. *Silybum Marianum* G.
- Marīca** Schreb. (Irideen, III. 1) Sumpflilie Rmpl., Morastl. D. (*marīcus* v. mare, d. celt. mar Moor! Wtst. d. veränd. America — im

- tropischen Amerika z. Hause), *M. paludosa* W. (*Cipura paludosa* Aubl.).
- Marila** Pers., Sw. (Guttiferen Clusiaceen, XIII. 5) „Durchschein“-Schweinsgummi (*μαρλίλη* glühende Kohle — durchscheinende Adern! Paxton, Wtst.: Name d. B.'s auf d. Antillen!), *M. racemosa* Sw., s. *Bonnetia* rac. Sw. (B., Amer.) (Mahurëa Aubl.).
- Mariscus** Hall., Vahl (sc. *Cladium*) R. Br. (Cyperaceen, III. 1) „Moor“-od. Bollsimse D., deutsche Schneide (n. d. celt. mar Moor, latinisiert!), s. *Schoenus Mariscus* L. u. *Cladium germanicum* Schrad.
- Marmelos** (sc. *Crataeva*) L. (Capparideen, XI. 1) Schleimapfel, fr. poire à trois feuilles (v. d. portug. marmelo Quitte, wovon auch marmelade!), s. *Cucurbitifera* Pluk.
- Marrubiastrum** Mnch. (sc. *Leonurus*) L. (Labiaten, XIV. 1) „Andorn“-Löwenschweif, fr. marrubiastrum, faux marrube (deter. v. *Marrubium*, s. d.), s. *Chaiturus* W. *Marrubiastr.* Rchb. s. *leonuroides* W.
- Marrubium** L. (Labiaten, XIV. 1) Filz- od. Weichandorn, fr. marrube, pied de loup, e. hoare-hound (v. *μάρορ* lat. marum Katzenkraut, hebr. mar bitter, rob viel, schwerlich Linné: v. Maria Urbs, Stadt in Latium).
- Marsdenia** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Marsden's“-Wachspfl. (n. d. Admir.-Skr. W. Marsden, schr. hist. of Sumatra, Lpz. 1785), *M. tenacissima* R. Br. (Faserpfl. Indiens).
- 1) **Marshallia** (-*llia*) Gmel., Schreb. (Compos. Eupatorineen od. Heliantheen, XIX. 1 od. 3) „Marshal's“-Blume (n. Humphrey Marshal), *M. bulbosa* Raf., *aliena* Spr. (Montevid.). 2) **Marshallia** Pursh (Proteaceen, IV. 1), *M. lanceolata* Pursh, s. *Persoonia lanc.* Mchx.
- Marsilea** (-*ia* Grck.) L. (Marsiliaceen, XXIV. 1) „Marsilie“, Roll- od. Schneckenfarn, Kleefarn Seub., Schleimfarn Endl., fr. marsile (nicht n. d. Grafen Aloys Ferd. Marsilli v. Bologna, sond. nach L. F. Marsigli, lat. Marsilius, schr. de generatione Fungorum, Romae 1714), *M. quadrifoliata* L., *salvatrix* Hanst. „Retterin“ (— fristete den Gefährten der Burk'schen Austral-Expedition das Leben, Leunis). — *Marsiliaceae* R. Br., Bartl., Rchb. (zu *Hydropterides* Endl.) Wurzel-farne Rchb.
- 1) **Martägon** Cam. (sc. *Lilium*) L. (Liliaceen, VI. 1) Türkenbund, Krull- od. Berglilie, Goldwurz, fr. martagon, e. martagon, king's-spear u. turk's-cap (v. Mars, -tis u. *ἀγών* Kampf, -preis, Wtst.: n. d. Alchymisten st. Martigënus eisenbürtig, Kind des Mars!). 2) **Martägon** Bak. (sect. v. *Lilium* L.), z. B. ausser *Martägon* L. noch *byzantinum* Hort. s. *chalconicum* L., *pomponium* L., *dalmaticum* Moly m. v. album Hort., *superbum* L., *speciosum* Thb. s. *lancifolium* Hort., *canadense* L. s. *penduliflorum* Red. etc.
- Martinezia** Rz. Pv. (Palmen, XXI. 11) „Martinez“-P. (n. d. span. Bot. Martinez y Leache Miquel, schr. Disput. de vera et legitima Aloës electione, Pompejopoli, 1644, Wtst.: n. Quer Josef y Martinez, Prof. z. Cadix, † 1764, schr. Fl. v. Spanien), Zier. *M. caryotaefolia* Hb., Kth., *erosa* (Antill.).
- Martynia** L. (Bignoniaceen od. Sesameen, XIV. 2) Gemshorn od. Elephantenrüssel, fr. cornaret, e. elephant-trunk (n. John Martyn, Prof. in Cambridge, † 1768, schr. Fl. v. Cambridge), Zier. *M. proboscidea* s. *annua* L. (*alternifolia* Lam.), fr. ongles du diable etc. m. v. v., *M. fragrans* Lindl., *lutëa* Lindl., *spathacea* Spr. (*Holoregmia viscida* Nees), *perennis* L. (*Gloxinia maculata* l'Hér.) etc.
- Maru** (sc. *Origänum*) L. (Labiaten, XIV. 1) arabischer Majoran (v. d. arab. mary-amych).
- Marum** Hall. (sc. *Teucrium*) L. (Labiaten, XIV. 1) Katzen-Gamander *M.*-Rchb., Katzenkraut, fr. marjolaine de Crête, e. mastich (-stick)

- (v. d. hebr. mar, gr. *μάροον* brennend bittere Pfl.), *H. hispanicum nigrum* Hall., Bocc., s. *Teucrium multiflorum* L.
- Marūta** Cass., DC. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Marute“, Stinkkamille, fr. maroute (wahrsch. Marum-Geruch! s. eb.), s. *Cotūla* L. Laugenblume.
- Masdevallia** Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Masdevall's“-O. (n. d. span. Arzt u. Bot. Jos. Masdevall), z. B. *M. attenuata* u. *Shuttleworthi* Rehb. f.
- Massonia** L. (Liliaceen, VI. 1) „Masson's“-Meerzwiebel (n. d. schwed. Reis. in Südafr. 1772 u. 1786/96 Fr. Masson, schr. *Stapeliae novae* etc.), *M. corymbosa* Sims (*Scilla* cor. Sims), *ensifolia* (*Pollanthes pygmaea*), *lanceolata* Thb. s. *angustifolia* L., etc.
- Mastix** W. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Mastix“-Pistazie, fr. mastic, e. mastich-tree (gr. *μαστίχη* Mastix, Harz der Pistazie), s. *Pistacia Lentiscus* W.
- Mastixia** Blum. (Cornaceen, IV. 1) „Peitschen“-Cornelstr. (v. *μάστιξ*, -γος Peitsche — dünne, schlanke Triebe!).
- Matricaria** Vaill., L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Mutterkraut“, echte Kamille, fr. matricaire, oeil de soleil, e. mother-word od. camomil (-mile) (v. matrix, -cis Gebärmutter — heil. Kraft d. Kamillenthees für Kindbeterinnen!), Offiz. *M. Chamomilla* L., Gartenbl. *M. eximia* Hort. m. v. *grandiflora* Vilm., *M. Parthenium* L. (*Chrysanthem. s. Pyrethrum Parthenium* Sm., Pers.) Metterich Vilm. Jungfernkrl., Mädchenblume, Mutterkamille, Fieberkraut, e. common feverfew od. -pellitory, m. v. *aurēum* Hort., fr. *pyrēthre dorée*, e. golden-feather (Teppichg.) v. fl. pl., wild u. Zier. *M. inodora* L. (*Chrysanth. inod.* L., *Matricaria grandiflora* Hort., *Pyrethr. inod.* Sm.), *parthenioides* Desf. (*Anthēmis* p. Bernh.) m. v. *multiplex* Hort., fr. m. Mandiane.
- Matricarioides** Less. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) (zu *Tanacētum* L.) „Mutterkraut“-Rainfarn (s. v., *εἶδομαί* gleiche).
- 1) **Matthiöla** R. Br. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) Levkoje, fr. giroflée, gazon de Mahon (n. Pet. Andr. Matthioli, lat. Matthiölus, von Siena, Leibarzt d. Kaisers Karl V., † 1577, schr. *Compend. de plantis* etc.), Gart. u. Topf: *M. annua* Sw. Sommer- u. *M. incana* R. Br. Winter-Levkoje, beide m. v. v., s. *Cheiranthus annua* u. *incana* L. 2) **Matthiöla** Plum. (*Rubiace. Guettardeen*, V. 1) „Matthioli's“-Guettarde, *M. scabra* Plum. (*Guettarda* sc. Lam.).
- Maulhia** (*Maulia*) Thb. (Liliaceen, VI. 1) „Maulie“ od. blaue Tuberosse (n. H. D. Joh. Maule, schwed. Kaufm., Linné's Zeitgenossen), *M. capensis* Thb., s. *Agapanthus umbellatus* l'Hér. s. *Crinum africanum* L.
- Maurandia** Ort., Jacq. (*Scrophularineen*, XIV. 2) „Maurandy's“-Kletterpfl. (n. Dr. Maurandy, Prof. in Carthagen), Zier. *M. Barklavana* Lindl. m. v. v. (*ilacina* Vilm., *coccinea* Hort., *purpureo-grandiflora* Hort. etc.), *M. semperflōrens* Ort. (*Usteria scandens* Cav.) u. *antirrhiniflora* W., etc.
- Mauritia** L. f. (Palmen, XXII. 6) „Moritz“-P. (n. d. Prinz. Moritz v. Nassau-Oranien, † 1665), Zier. *M. aculeata* Hb. Kth., *flexuosa* L., *vinifera* Mart., Wein- od. gem. Fächel-P., guaraunischer Palmwein, Leun. od. Ipuruma.
- Maurocenia** Mill. (*Sapotac. Aquifoliaceen*, V. 3) Instrumentenholzbaum (n. J. F. Maurocenus, schr. *Catal. pl. et. Patav.* 1713), *M. Frangularia* Mill., s. *Cassine Maurocenia* L.
- Maxillaria** Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Kinnbacken“-O. (v. maxilla Kinnbacken — bezügl. d. vorgezogn. Basis der Columna), z. B. *aromatica* Hook. (*Colax* ar. Lindl.), *picta* Hook. (Bras.) etc.
- 1) **Maximiliana** Mart. (Palmen, XXIII. 3) „Maximilian's“-P. (zu Ehr. d. Prinzen Maximilian v. Neuwied), *M. regia* Mart. u. *insignis* ds.

(Brasil.). 2) **Maximiliana** St. Hil. (-nia Schrk.) (Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Maximilian's“-Schneckensamen (n. Maximilian I., König v. Bayern), s. *Cochlospermum* Kth., *M. Gossypium* St. Hil., s. *Bombax gossypinum* L. falsch. Seidenwollenbaum.

Maximowiczia (-witschia) Rupr. (Menispermeeen od. Annonaceen, XXI. 5) „Maximowicz“-Spaltantherenstr. (n. d. russ. Reis. u. Bot. Maximowicz), z. B. *chinensis* s. *amurensis* Rupr., s. *Kadsura chin.* Turcz.

Mecconopsis Vig., DC. (Papaveraceen, XIII. 1) „Mohngleiche“ (*μῆζων* Mohn, *ψυζ* Aussehn), z. B. *M. cambrica* Vig., s. *Papaver cambr.* s. *Stylophorum* c. Spr.

Medeola L. (Melanthac. od. Smilaceen, VI. 3) „Medea“-Spargel (dem. v. Medea, d. Giftnischerin v. Colchis, od. v. medeo heile — Heilkraft), Ampelpfl. *M. asparagoides* L., s. *Myrsiphyllum* s. *Asparagus medeoloides* Thb. (*Dracaena medeol.* L. f.).

1) **Medica** Risso (sc. Citrus) L. (Hesperid. Aurantieen, XVIII. 2) Cedrat od. Cedrot M.-Rchb. echte Citrone (Orangerieb.), s. *Citrus Malus* Blackw., „Citronenapfel“ (*Medicus* aus Medien). 2) **Medica** (zu *Medicago* Rchb.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) e. medick, z. B. *M. lupulina* Scop. Hopfenklee, fr. lupuline, *orbicularis* W.

Medicago L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Schneckenklee, e. snail-clover (-trefoil) (ob von *medico* heile? od. Wtst.: *medicus* medisch, aus Medien eingeführt die Luzerne!), z. B. geb. *M. sativa* L. Luzerne od. ewiger Klee, fr. trèfle de Bourgogne, e. lucern od. medick-fodder, wild *M. lupulina* L. „Hopfenklee“, fr. trèfle noir, *mélilot des champs*, *mignonette* od. *minette dorée*, *M. falcata* L. „Sichelklee“, fr. *lente* (vgl. *Medica* Rchb.).

Medinilla Gaudich. (Melastomac. od. Lythraceen, X. 1) „Medinille“ (Wtst.: n. D. José de Medinilla y Pineda, Gouv. d. Marianen), *M. farinosa* Gaudich., *Gewächsh. magnifica* Lindl.

1) **Medium** T. (sc. Campanula) L. (Campanulaceen, V. 1) grossblum. Glockenblume, Marienglocke, fr. *medium* od. *mariette* (gr. *μῆδιον* ein Kraut, *μῆδιος* medisch, Wtst. v. *medius* mittler — mittelgrosse Blumen?). 2) **Medium** (sc. *Convolvulus*) L. (*Convolvulac.*, V. 1) linealblättr. Winde.

Meesia Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Meese's“-M. (n. d. niederl. Gärtner. Dav. Meese, schr. Fl. Frisica, 1760), z. B. *M. serrata* G., s. *Walkera serr.* W. — *Meesiacæe* Schimp.

Megapterium Spach (Onagrariaceen, VIII. 1) Grossflügel-Kerze, grossfrücht. Nachtkeze (*μεγὰς* gross, *πτερόν* Flügel — vierflügl. Kapsel), Zier. *M. Nuttallii* Spach (*Oenothera macrocarpa* Pursh).

Melaleuca L. (Myrtac. Melaleucaceen, XVIII. 2) Cajaputbaum, fr. caieput (*M. Cajeputi* Roxb.), „Schwarzweiss“- od. Silberbaum Leun. (*μελάς* schwarz, *λευκός* weiss — Stamm schwarz, Äste u. Blätter weiss), Zier. *M. squamea* Lab., *M. Leucadendron* L. „Weissbaum“ (— auch d. Stamm weiss!), *viridiflora* (*Metrosideros quinque-nerva* Cav.), *pulchella* R. Br., etc.

Melampyrum L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Schwarzweizen“, altd. „Schwartweizen“ Mej., woraus: Wachtelweizen, Gletsch O. W. (*μελάς* u. *πυρός* Weizen — d. Samen schwärzt unter Mehl das Brot), in Saaten: *M. arvense* L., fr. *mahon* od. *millet jaune* (-sauvage), auch *rouge-herbe* (*rougerelle*), e. *cow-wheat*, Wald: *M. nemorosum*, *silvaticum*, *cristatum* u. *pratense* L.

Melandrium (-dryum) Röhring (Sileneen, X. 5) Lichtnelke, Lichte O. W., fr. *ben* (Wtst.: n. Girol. Melandri, schr. mit Moretti Analyse *chimica di Colchico autumn.* etc., Padua 1805), *M. rubrum* Græk. s. *sylvestre* Röhl. u. *M. album* Græk. s. *pratense* Röhl. (*Lychnis dioica* L. *α. diurna* u. *β. vespertina* Sibth.).

- Melanorrhoea** Wall. (Terebinthac. Anacardiaceen, XXIII. 2) „Schwarzfluss“ (s. v. u. *δοία* Fluss etc. od. *δένω* u. *δέω* rinne — an d. Luft schwarzwerd. Saft), z. B. M. glabra Wall. (B.).
- Melanosināpis** Schimp. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) (zu Sināpis L.) „Schwarzsenf“ (*μελάς*, -*άνος* u. Sināpis Senf — schw. Samen), M. communis Schimp., fr. rouette sauvage, s. Brassica s. Sināpis nigra Koch, L.
- Melanoxylon** Schott. (Cäsalpinieen, X. 1) „Schwarzholz“ (s. v., *ξύλον* Holz — B. m. braunsch. H.!), M. Braīna Schott (B. Brasil).
- Melanthacēae** Endl. i. q. Colchicacēae DC., Giftlilien, s. Melanthium L.
- 1) **Melanthium** L. (Juncaceen od. Melanthaceen, VI. 3) „Honigblume“, -binse, fr. *mélanthe* (gr. *μελάνθιον* Diosc. eig. „Schwarzkümmel“, F. W. Riemer, Wtst.: v. *μέλι* Honig u. *άνθος* — Kronblätt. an d. Basis m. Honigsäckchen!), M. uniflorum Jacq., s. Tulipa Breyiniana (Kolbea Schldl.), M. indicum L. (Angularia ind. R. Br.), M. spicatum Van Houtt. (Wurmbea purp. autt.). 2) **Melanthium** Diosc. (Ranunculac., XIII. 5) = *Nigella sativa* L. (s. eb. 1).
- Melastōma** Burm., L. (Lythraceen Melastomaceen, X. 1) „Schwarzmund“, -schlund D., -beere, Erdbeerstrauch Leun., fr. *melastome* (*μελάς* schw., *στόμα* Mund — anhaltend schwarzen Mund machende Beeren! Paxt., Wtst.), Warmh. M. malabathricum L. (Indien) etc., s. Osbeckia L. — Melastomacēae Don, DC.
- Meleagris** (sc. Fritillaria) L. (Liliaceen, VI. 1) Schachblume, s. g. Kiebitz-Ei, fr. *meléagride* (v. Meleagris Perlhuhn, in ein solch. verwand. Schwester des Meleager, Myth. — Ähnlichk. mit d. Gefieder des Perlhuhns, Wtst.).
- Melia** L. (Hesperideen Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) „Mannabaum“ (*μελία* od. -*ίη* Manna-Esche v. *μέλι* lat. mel Honig), M. Azederach L. Zedrach-M., fr. margousier Paternosterbaum od. Paradiesblume, fr. lilas des Indes. — Meliae Juss., -iacēae DC. (zu Hesperidēae Rchb. od. Ampelidēae Bartl.).
- Melianthus** T., L. (Sapindac. Paullinieen od. Rutaceen Zygophylleen, XIV. 2) „Honigblume“, -strauch, fr. *mélianthe*, fleur à miel, e. honeyflower (s. v., *άνθος* Bl.), z. B. Winterpfl. major L. (Capl.), minor L., fr. pimprenelle d’Afrique.
- Melica** L. (Gräser, III. 2) Perl- od. Schöngras, eig. „Honiggr.“, fr. canfe u. *mélica* (v. *μέλι* Honig — d. Mark d. Stengels honigsüss), z. B. M. nebrodensis Parlat. s. glauca Schult., uniflora Retz., nutans L. etc.
- Melicocca** Juss., L. (Sapindaceen, VIII. 1) Honigbeerenstrauch, „Honigfrucht“ D. (s. v., *κόκκος* Korn, Beere — d. Frucht m. süßsäuerl. Fleisch), M. bijuga L. span. Mamoncilla „Zitzensucklerin“ (Melicoccus bijugatus Jacq.), diversifolia Juss. (Stadmannia d. Spr.), s. Nux americana Comm.
- Melilōtus** T., L. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Stein- od. „Honigklee“, „Melilotenkl.“, Klever O. W., fr. u. e. *mélilot*, fr. trèfle miellé (gr. *μελίλωτος* nach Honig riechend. Klee), z. B. cultiv. M. coeruleus Desr. Siebenzeit O. W., fr. m. bleu, e. blue m. od. great-sweet-scented m., wild M. officinalis Desr. s. arvensis Wallr., etc.
- Melissa** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Melisse“, Meter O. W., fr. *mélisse* od. thé de la France, e. balm-mint, balsamint (gr. *μέλισσα* Biene od. Bienenhonig — d. Bienen anlock. Pfl.), M. officinalis L. Citronen-Melisse, fr. citragon (*citronelle*, herbe de citron), e. balmmint gentle, m. v. fol. varieg. Hort.
- Melissophyllum** Riv. (sc. Melittis) L. (Labiaten, XIV. 1) „Melissenblatt“, melissenblättr. Biensauge Grck., Bergmelisse Wolf, fr. *mélisse bâtarde* (*melissière*, -lissot) (s. eb. u. *φύλλον* Laubblatt).

- Melittis** L. (Labiaten, XIV. 1) Biensauge Grck., Immenblatt M.-Rchb. v. μέλιττα i. q. μέλισσα Biene, Imme — d. Bienen anlock. Pfl.), *M. Melissophyllum* L. (s. eb.), *M. grandiflora* Sm. etc.
- Melo** T. (sc. Cucumis) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) echte od. Zucker-„Melone“, fr. mēlon sucré, e. melon (melo v. μήλον Apfel, Melone od. Pfebe) m. v. v. (a. Cantaluppen, b. Netz-M., c. Maltheser-M., Zier. Vilmorin's Kletter-M.).
- Melocactus** C. Bauh., DC. (sect. v. Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Melonen“-Cactus, fr. mēlon-cardon herissé od. mēlocacte, e. melon-thistle (Melo s. eb. u. Cactus), Stuben: *M. communis* Lk., Otto (St. Domingo).
- Melochia** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) arab. Salatstrauch (aus Melochieh, dem arab. Namen v. Corchorus olitorius, gr. κόρχορος schlechte Gemüsepfl.), *M. parvifolia* Hb., portoricensis Spr. s. crenata Bert. etc., s. Abutilon Adans.
- Melodinus** Forst (Apocynen Carissee, V. 2) „Apfelwirbel“-Hundswürger, s. g. Windapfel D. (v. μήλον, lat. malum Apfel u. δίνος od. δίνη Wirbel etc. v. δινέω winde, Wtst.: Stengel windend!), *M. phyllireoides* Lab.
- Melongēna** T. (sc. Solanum) L. (Solaneen, V. 1) Eifrucht- od. Apfel-Nachtschatten, eig. „Melonenerzeuger“, fr. melongēne u. mayenne od. bëringēne (aubergine) Melangana-Apfel Wolff, s. Solanum pomiferum Pluk. (v. melo Melone u. -gēnus, gr. -γένος in compos. erzeugend).
- Melopēpo** T. (sc. Cucurbita) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Turban-Kürbis M.-Rchb., fr. melonnée (aus melo Melone u. pēpo, gr. πέπων Pfebe, Kürbis).
- Melothria** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Haarblumen“-Zaunrübe, s. g. Kümmerling D. (gr. μήλωθρον Rebe, Zaunrübe = Vitis alba Plin.), *M. cucumerina* L. (Cucumis parva repens Pluk.) u. pendula L. s. scandens P. Br., s. Trichosanthes cucumerina L., foetida etc.
- Melvilla** Anders. (Lythrarieen, XI. 1) „Melville's“ Kelchhöcker-Weiderich (n. Lord Rob. Dundas Melville, engl. Minist. 1807, Wtst.: Melville, schr. les Amours des plantes, Paris 1835), Zier. *M. speciosa* Anders., s. Cuphea Jacq.
- 1) **Memecylon** L. (Melastomac. od. Loranthaceen, XI. 1) Safranbaum Dietr., Leun. (gr. μεμύκylon Diosc. Frucht d. Erdbeerbaums, Arbutus), z. B. edule Roxb. (Ostind.) u. tinctorium Kön. (ramiflorum Lam.) etc., s. Epigaea repens L. 2) **Memecylon** Mitch., Burm. (Sapotaceen od. Ericen, IV. 1), *M. umbellatum* Burm., s. Samara laeta L. (Str. Ostind.). — Memecylae DC. (zu Ord. Myrtinae Bartl.).
- Menispermum** T., L. (Menispermeen, XXII. 6) „Mondsamen“, fr. menisperme, e. moon-seed (v. μήν, -νός Mond u. σπέρμα Samen — dies. halbmondf.!), Zier. *M. canadense* L. (angulatum Mneh.) m. v. lobatum DC. (*M. virginicum* L., carolinian. Hort.), m. Chondrodendron Spr. „Knorpelb.“ (Chondrod. tomentosum R. P.), *M. Cocculus* L. (Cocculus suberosus DC.) „Kokkelskörner“ (cocculi indici), *M. palmatum* L., s. g. Colombowurzel, fr. calumbé (colombo), *M. Limacia* Spr. (Limacia scandens Lour.) etc. — Menisperma Juss., -mæe DC. (zu Laurinæe Rchb., Ord. Cocculinae Bartl.).
- Mentha** L. (Labiaten, XIV. 1) „Minze“, „Münse“ (nicht Münze!), fr. menthe, e. mint (lat. menta od. -tha, nach Minthe, gr. Μένθη, Tocht. d. Cocytus, von Proserpina aus Eifersucht in eine Minze verwandelt, Myth.), Gärt. *M. crispa* L., fr. baume „Balsam“, *M. piperita* Huds. „Pfeffer“-M., e. pepper-mint, *M. gracilis* fol. varieg. Hort., wild *M. rotundifolia* L., aquatica u. arvensis L., etc.

Menthastrum Sloan. (Labiaten, XIV. 1) unechte Minze (zu *Mentha* Rehb.) (deter. v. *Mentha*), z. B. *M. sylvestre*, *M. maximum* Sloan., s. *Bystropōgon suaveolens* l'Hér.

Menyanthes L. (Gentianeen, V. 1) Fieber-, Biber- od. Bitterklee, Zotten- od. Zottelblume Ö. W., fr. *menyanthe*, trèfle des marais (-d'eau), nymphaeu (*M. nymphoides* L.), e. water-od. marsh-trefoil (-clover), bog-bean u. feverfew (v. *μηρίς* Zorn etc.? od. *μην*, -ρός Mond u. Monat? od. *μηνίω* zeige an — näml. Sumpf, Wtst. — ungewiss! *ἀνθη* Blume), *M. trifoliata* L. etc.

Menziesia Sm. (Ericaceen Rhodoreen, VIII. 1) „Menzies“-Kugelstrauch (n. Archimbald Menzies, schott. Chirurg u. Bot. unter Vancouvers 1791—1794 Reis. an d. Nordwestküste v. Nordam.), Zier. *M. globosa* Sm., *polifolia* Juss., s. *Daboecia* u. *Andromēda* L.

1) **Mercurialis** T., L. (Euphorbiac. od. Acalypheen, XXII. 8) „Merkurs“- od. Bingelkraut, fr. *mercuriale*, foirelle u. cagarelle, auch chou de chien, e. mercury (dog's-) (n. d. Gott Merkur, der seine Heilkraft entdeckte, Plin., od. *Mercurius* Quecksilber Offiz.), wild. *M. annua* L., s. g. Speckmelde od. Winterkraut, fr. *rimberge* u. *foirande*, Wald *M. perennis* L. 2) **Mercurialis** (sc. *Tragia*) L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 3) „Tragus“- od. „Bocks-Bingelkraut“, s. *Croton* Gronov.

Merendēra Ramond (Colchicaceen, VI. 3) „Merendere“, Zier. *M. Bulbocodium* Ram., fr. *mèrendère* bulbocodé (Colchicum montanum L. s. *Bulbocodium* autumnale Lapeyr.) (v. d. span. *Quita meriendas* = *Colchicum* autumnale L. abgeleitet!).

1) **Meriana** Sw. (Melastomaceen, VIII. 1 u. X. 1) „Merian's“-Erdbeerenstr. od. Schwarzmundbeere (n. d. Dame Mar. Sibylle Merian v. Frankf. a. M., ber. Insektenmalerin u. Reis. in Surinam, † 1717), z. B. *M. leucantha* Sw. u. *purpurea* Sw. (Jamaika), s. *Rhexia* L. 2) **Meriana** Trew (Irideen, III. 1) „Merians“-Schwertel, *M. flore rubello* Trew, s. *Gladiolus Merianus* Jacq. (*Watsonia humilis* Mill.). 3) **Meriana** Fl. Flum. (Convolvulac., V. 1) Merians-Winde.

Meristostigma A. Dietr. (Irideen, III. 3) „Spaltnarbe“ (*μεριστὸς* geteilt, *στίγμα* Narbe — 3 zweiteilige Narben), z. B. *anceps* D., s. *Oviēda* anc. Spr.

1) **Mertensia** Don (Boragineen, V. 1) „Mertensie“ (n. d. Bot. Mertens), z. B. *virginica*, *sibirica*, *davurica* etc. 2) **Mertensia** H. B. K. (Ulmaceen Celtideen, XXIII. 1), z. B. *laevigata* Kth., s. *Celtis* s. *Momisia* l. Dietr. 3) **Mert.** Soland. (Myrsineen, V. 1). 4) **Mert.** W. (Osmundaceen, XXIV. 1). 5) **Mert.** Roth (Florideen, XXIV. 3).

Merulius Fr. (Pilze, XXIV. 4) Holz- od. Hausschwamm (schwerl. n. Wtst. v. *merula* Amsel, vielm. v. *μηρός* Hüftknochen od. *μέρος* Stück etc. u. *οἶλος* od. *ὄλος* verderblich — verderbl. Holzschwamm!), *M. lacrymans* Fr., „Thränenschw.“

Mesembryanthēmum L. (Aizoideen od. Ficoideen, XII. 4) „Mittagsblume“, Zaserbl., Eiskraut, fr. *ficoïde*, fleur de midi, e. fig-marigold (v. *μεσημβροία* Mittag, *ἀνθεμον* Bl., n. Linné *μέσος* mitten u. *ἐμβροιον* Embryo — mitten mit Blume wie ein Embryo!), Zier. *M. crystallinum* L. Eispfl., fr. *glaciale* od. herbe à glace, e. ice-plant, *pomeridianum* L., „Nachmittagsbl.“, Topf *M. caninum*, *tigrinum* Haw., *capitatum* Haw., Ampel *M. tricolor* W. etc. — *Mesembryanthemēa* Seub. Eiskräuter.

Mespilus L. (Rosaceen Pomaceen, XII. 4) „Mispelstrauch“, fr. *mèle* od. *meslier* (-lis) u. *néflier*, e. medlar-tree u. quick (gr. *μέσπιλον* Mispel v. *μέσος* mitten u. *πίλος* Fleck u. Stein, Fels), wild u. Gärt. *M. germanica* L. s. *vulgaris* Rehb. m. v. v.

- Mesüa** L. (Guttiferen Clusiaceen, XVI. 8) ceylan'sches Eisenholz od. Nagasbaum (n. Mesuah, d. Leibarzt Harun Alraschid's, † 809 in Damascus), *M. ferräa* s. *speciosa* Choisy (Calophyllum nagassaricum Burm.), *M. bracteata* Spr. (Camellia drupifera Lour.).
- Metel** (sc. Datūra) L. (Solaneen, V. 1) weisser Stechapfel *M.-Rchb.*, Stachelnuss Wolff, fr. noix-métel (méthel) (arab. methel, latinis. mixtale, Mischkorn od. Igelskolbe).
- Methonica** Herm. (Liliaceen, VI. 1) Rankenblatt- od. Prachtlilie (v. Methone, macedon. Stadt am thermäischen Busen, Wtst. st. mendoni malabarisch = Mendoni Rumph.), Zier. *M. superba* Lam. s. *malabarorum* Herm., s. *Gloriosa superba* L. (foliis cirrhiferis L., Pers.).
- Metrodoräa** St. Hil. (Rutaceen, V. 1) „Metrodoree“ (n. Metrodorus, Pflanzenmaler u. Philos. d. 2. Jahrh.'s v. Chr.), Zier. *M. atro-purpuräa* Van Houtt., *nigra* St. Hil. (Str. Bras.) etc.
- Metrosidëros** G., R. Br. (Myrtaceen, XII. 1) echtes od. „Kerneisenholz“ (v. *μύτιρα* Mark, Kern, *σιδήρος* Eisen — hart. Kernholz!), *M. vera* L.; ferner *M. corifolius* Vent. u. *amboinensis* G., s. g. Schönmütze, Nanibaum d. Molukken, „Eisenmass“ Rmpl., Gewächsh. *M. buxifolia* Cunn. (Neuseel.), *florida* Sm. (Leptospermum scandens Forst.) etc., s. Lepto- u. Stenospermum Forst., Sweet.
- Metroxylon** Rottb., Kön., Mart. (Palmen, XXI. 7) „Markholz“-P. (s. eb. u. *ξύλον* Holz — viel Mark im Stamm!), s. *Lepidocaryon* Mart., *Sagus* G. u. *Raphia* P.-B.
- Mëum** T., Jacq. (Umbelliferen, V. 2) Bärendolde, -fenchel, Mutterwurz O. W., fr. mëum (méon), e. mew od. set-wort (gr. *μῆον* Saufenchel st. *μείον* geringer — nämll. als Athamanta), Zier. *M. athamanticum* Jacq., s. *Aethusa* Mëum L.
- 1) **Meyenia** Benth., Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Meyen's“-Bärenklau (n. d. Bot. Prof. Meyen in Berlin), *M. erecta* Benth., s. *Thunbergia* L. 2) **Meyenia** Schldl. (Solaneen, V. 1) „Meyenie“. 3) **Meynia** Lk. (-na Roxb.) (Sapotac. Mimosoepen, V. 1) Meyen's Eisenholz, *M. spinosa* Lk., s. *Sideroxylon* spin. var.
- 1) **Mezerëum** (sc. Daphné) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Kellerhals, wilder Pfefferstrauch, fr. mezéréon, bois gentil od. joli, chamélee u. garou, lauréole femelle, e. mezereon, neck of a cellar, spurge-olive od. -laurel (v. d. pers. mazeryin, ital. ammazare töten — giftig!), Zier. v. v. fl. albo u. autumnale Hort. 2) **Mezereum** C. A. Mey. subg. v. *Daphne*, z. B. noch *D. altaica* u. *caucasica* Pall.
- Miböra** P.-B. (Gräser, III. 2) Zwerggras (wahrsch. für *μυζοῦ βοσῶν* kleiner Frass!), *M. verna* P.-B., s. *Chamagrostis minima* Borkh. (Sturmia min. Hoppe, *Knappia agrostidëa* Sm.).
- 1) **Michauxia** P'Hér. (Campanulaceen, VIII. 1) „Michaux'“-Glockenblume (n. d. franz. Bot. Andr. Michaux unter Louis XVI., Reis. in Persien u. Nordamer.), Zier. *M. campanuloides* Juss. (Mindium Juss., Medium Dioscoridis Rauw.), fr. Michauxie à fleur de Campanule, e. bell-flower-like M. 2) **Mich.** Neck. (Compos.).
- Michelaria** Dumort. (Gräser, III. 2) „Michel's“-Gras (n. Michel, Entdeck. d. Pfl. in d. Ardennen), *M. bromoides* Dumort., s. *Bromus arduennis* Kth. (*Libertia* ard. Lej.).
- Michelia** L. (Magnoliaceen, XIII. 7) „Micheli's“-Magnolie (n. d. Florentiner Bot. Pietr. Ant. Micheli, † 1737), *M. Champacca* L., *M. Tsiam-paca* L. (evonymoides Burm.), *M. Doltsopa* Buchan. (*Manglietia glauca* Blum.).
- Microcarpae** Lauch. (sect. v. *Crataegus* L.) (Pomaceen, XII. 2) „Kleinfrüchte“, Beeren-Mispeln (*μικρός* klein, *καρπός* Frucht), z. B. *acerifolia* Mch.

- Microcarpium** Spach (sect. v. *Cornus* L.) (Cornaceen, IV. 1) echte Hartriegelstr. (s. eb.), z. B. *C. sanguinea* L., *sibirica* Lodd., etc.
- Mieröpus** L. (Compos. Tarchonantheen, XIX. 4) „Kleinfuss“, kleiner Löwenfuss, Falzblume Koch (s. v., *πῶϊς* Fuss — ähnl. *Leontopodium*), z. B. *supinus* L. liegend. u. *erectus* L. aufrecht., *pygmaeus* Desf. (*Evax pygmaea* DC.).
- Microptelea** Spach (subg. v. *Ulmus* L.) (Ulmaceen, V. 2) Kleinblatt-Ulme (s. v. u. *πτελέα* Ulme), z. B. *U. parvifolia* Jacq.
- Microsperma** Hook. (Loasaceen, XIII. 1 od. XVIII. 2) „Kleinsamen“-Brennwinde (s. v., *σπέρμα* Samen — Kaps. m. zahllos. kl. Samen), z. B. *bartonioides* Van Houtt. (*Eucnide bart.* Zucc.), s. *Mentzelia* L.
- Microstylis** Nutt. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Kleingriffel“, Einblatt, *M. monophylla* (-los) Lindl. (Tyrol etc.) (s. v. u. *στύλις* Griffel — *Columna* äuss. klein), s. *Ophrys* s. *Malaxis* mon. Sw., *M. ophioglossoides* Nutt. (*Prescottia* oph. Spr.).
- Mierōtis** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Kleinohr“ (s. v. u. *οἴζ.* *ὄτος*; Ohr — kleine Blume m. gehört. *Columna*), z. B. *porrifolia* (*Epi-pactis* p. Sw.) etc. (Neuholl.).
- Mikania** W. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Mikanie“, s. g. Sommerod. Schnell-Epheu (n. d. Prof. Mikan in Prag), *Stuben M. scandens* Lem. (*Senecio mikanoides* Otto, *Delairea mik.* Lem.), *acuminata* u. *vitifolia* DC. etc.
- Milium** L. (Gräser, III. 2) Hirsen- od. Flattergras, Waldhirse Seub., Millgras O. W., fr. mil u. grémil, fr. u. e. millet (schwerl. n. Paxton v. mille tausend, wahrsch. *μῖλος*; u. -*λίη* Schneide, Schmiele, lat. *milium* Hirse, Wtst.: v. d. celt. mil Stein — harte, glänzende Samen!), z. B. *M. effusum* L., fr. grémil.
- Millea** Cav. (nicht *Milla*!) (Liliaceen, VI. 1) „Milla“- od. unechter Lauch (n. d. Ober-Gärtn. Julian Milla im k. Gart. z. Madrid!), *M. biflora* Cav. (Mex.), *uniflora* Grah. (Buen.-Ayr.), *borbonica* Bak. (*Nothoscor-dum* b. Kth.).
- 1) **Millefolium** (sc. *Achillaea*) L. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Tausendblatt“, Schafgarbe, fr. millefeuille, herbe au cocher „Kutscherkr.“, *soureils de Venus*, e. milfoil (v. mille tausend, folium Blatt). 2) **Millefolium palustre** Pluk. (Lentibularien, II. 1) „Sumpf-Tausendblatt“, *M. aquaticum* Pluk., s. *Utricularia minor* u. *vulgaris* L. (— stark zerschlitzte, vielteilige Bl.!).
- Millegrana** Surian (Portulacaceen Illecebreen, V. 3) „Tausendkorn“, fr. mille-grains (mille u. granum Korn — unzählige kleine kugelige Blätter! Wtst. in d. Kaps. unzähl. kl. Samen!), s. *Herniaria* L.
- Milleria** L. (Compos. Millerieen, XIX. 4) „Millersblume“ (n. Phil. Miller 1691—1771), z. B. *angustifolia* Cav. (*Flaveria* ang. Juss.), *quinqueflora* L. (*dichotoma* Cav.) u. *biflora* G. (*Delilia Broterii* Spr.).
- Milletia** Wight u. Arn. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Madagascarenholz (n. d. franz. Bot. Millet d'Aubenton, schr. Notice sur la cult. des oseraies du Dép. de l'Aisne, Lyon 1837), *M. leucantha* Krz., s. *Galedupa elliptica* Lam.
- 1) **Millingtonia** Roxb. (**Mallingt.** W.) (Bignoniaceen, II. 1 od. XIV. 2) „Millingtonie“ (n. d. Prof. Sir T. Millington in Oxford, schr. 1776 üb. Physiologie etc.), *M. (Mall.) hortensis* W., *suberosa* Roxb. (*Bignonia* sub. Roxb.), *ferruginea* Nees (*Meliosma* ferr. Blum.). 2) **Millingtonia** Ham. (Legumin. Onobrychideen, XVII. 4) „Mill's“-Esparsette, z. B. *semi-alata* Ham., s. *Flemingia* Roxb.
- Miltonia** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Milton's“-O. (n. John Milton. † 1674, d. Dicht. d. verlorn. Paradieses Rmpl., nicht n. Milton Earl Fitz-William, Gönn. d. Bot., Paxton), z. B. *M. spectabilis* Ldl. (Braş.),

- Karwinskii Hort. etc. (Mex., Centralamer.), s. *Macrochilus Fryanus* Westc.
- Mimētes** Salisb., R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Gauklerblumen“-Strauch (gr. *μυμητης*; Nachahmer — gleicht versch. andern Gattungen!), z. B. *capitulata* u. *cucullata* R. Br. (Südafr.), s. *Protëa* L. etc.
- Mimosa** Ad., L. (Mimoseen, XXIII. 1) Sinnpflanze, fr. mimose (-meuse) (v. *μυμέω* mache eine Bewegung), Zier. *M. pudica* L. „empfindl. M.“, Sensitive od. Schampfl. Vilm., fr. sensitive (sensible), e. sensitive plant od. chaste Mimosa. — *Mimosëae* Endl. (-sacëae Rehb.).
- Mimulus** G., L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Gaukler“- od. Affenblume Rmpl., Maskenbl. Vilm., fr. mimule, e. monkey-flower (dem. *mimus* „Mime“ od. Schauspieler od. *μυμῶ*, -οῦς Affe — sonderb. Blüten!), Topf. *M. moschatus* L. „Moschuspfl.“, *cardinalis* L. m. v. v. Scharlach-G., *cuprëus* Hook. v. Brillant Hort., *hybridus* Hort. m. v. v. (z. B. *tigrinus* u. fl. pleno Hort.), *M. variegatus* Hort., s. g. Arlequin etc.
- Mimusops** L. (Sapotac. Mimosopeen od. Lucumeen, VIII. 1) „Affengesicht“, Spitzenblume D. (v. *μυμῶ*, -οῦς Affe, ὄψ Gesicht — wie ein Affenkopf), z. B. *M. Elengi* Rumph. s. *lucida* Poir., *M. Imbricaria* W. (*Imbricaria* Pers., *Escallonia* Kth.), *M. dissecta* (Achras d. Forst.) etc. — *Mimusopëae* Rehb.
- Mirabilis** L. (Nyctagineen, V. 1) „Wunderblume“, Jalape Dietr., fr. fleur admirable (- de nuit), e. nyctage od. jalap, s. *Nyctago* Juss., DC. (*mirabilis* wunderbar — weg. d. Farbenmannigfalt. d. Blumen desselben Stocks!), Zier. *M. Jalapa* L., fr. belle de nuit (-de quatre heures), belle mexicaine, merveille du Pérou, e. jalap-flower, s. g. Schweizerhose, longiflora DC.
- Mirbelia** Sm. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Mirbelie“ (n. Brisseau-Mirbel, s. d. Aut. unt. Mirbel!), z. B. Gewächsh. *Baxteri*, *grandiflora*, *ilicifolia* etc., *reticulata* Sm., s. *Pultenaea rubiaefolia* Andr. (Str. Neuholl.).
- Mitella** T., L. (Saxifrageen, X. 2) „Bischofshut“, fr. mitelle, e. barrenwort? (dem. *mitra* Pabsthut — weg. d. Frucht!), z. B. *M. diphylla* L. (*Cortusa americ. altera* Mentz.), *M. foliis ternatis* L. (*Tiarella trifoliata* L.).
- 1) **Mithridatëa** Wilde, Comm. (Urticaceen Monimieen, XXI. 8) Trommelbaum v. Madagascar, fr. bois-tambour, e. drum-tree (n. *Mithridates* Eupator, Kön. v. Pontus, † 64 v. Chr.), *M. quadrifida* W. (*Tambourissa* q. Bak.), s. *Ambōra sempervirens* Juss., *M. toxicaria* D. (*Ipo tox. Pers.*, *Antiäris* t. Leschen. *Bon-hupas* Ostind.). 2) **Mithr.** *Cratev.* (*Liliac.*, VI. 1) = *Erythronium dens canis* L.
- Mitraria** Cav. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Mitrastrauch“ (v. *mitra* Pabsthut — viereck. Frucht), z. B. *M. coccinea* Cav. (Kletterstr. Chiloë).
- Mitrula** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Haubenpilz“ Kumm. (dem. v. *mitra* Kopfbinde etc. — Form d. Schlauchlagers auf dem Stiel nützenförm.), z. B. *cucullata* u. *paludosa* Fr.
- Mnesitheon** Raf. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Gottgedenk“ (*μνησθεος* Gottes eingedenk, Wtst. nach d. alt. Arzt *Mnesitheos* ben. F. W. Riemer: Benennung des *Juniperus* bei *Dioscorides*!), z. B. *album* Raf. (*Bupthalmum angustifol.* Pers.), *luteum* Raf. (*Louisiana*) etc.
- Mnium** Dill. (Moose, XXIV. 2) Sternmoos, fr. mnie (*μνιον* v. *μνιω* zerstöre = βόλον Moos), z. B. *hornum* u. *ligulatum* (Waldböden).
- Modecca** Jacq. (Passifloreen, XXII. 5 od. XVI. 2) „Modecca“-Passionsblume (ostind. Name d. Pfl.), z. B. *integrifolia* Jacq., *trilobata* Roxb., etc.

- Moehringia** L. (Alsineen, VIII. 2) „Moehringie“, Dreinerv-Sandkraut, Spelle O. W. (n. d. Arzt H. Möhring z. Jever, † 1792), *M. trinervis* L.
- 1) **Moenchia** Ehrh. (Alsineen, IV. 4) „Mönchie“, aufrecht. Mastkraut, Vierling O. W. (n. d. Prof. Conr. Mönch z. Marburg, † 1805), *M. s. Sagina erecta* Fl. Wett. 2) **Moenchia** Roth (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Weisssteinkraut, Sandkresse, *M. incana* Roth, s. *Alyssum inc.* L. (*Berberoa inc.* DC., *Farsetia inc.* R. Br.), *M. sativa* Roth = *Camelina sat.* Crantz. 3) **Moenchia** Med. (Liliaceen, VI. 1).
- Mogorium** Juss. (Contorten Jasmineen, II. 1) arab. Jasmin, fr. mogori (ostind. Name d. Str.'s), s. *Jasminum Sambac* Ait. (*Nyctanthes Samb.* L., Thb.).
- Mohria** Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Weihrauch-F. (n. d. Univ.-Adjunct. zu Kiel D. M. H. Mohr, † 1808), *M. thurifräga* (-fëra) Sw. s. *crenata* Desv., s. *Polypodium* s. *Adiantum Caffrorum* autt.
- 1) **Moldenhauëra** DC. (-hawera Schrad.) (Cassieen, X. 1) „Moldenhauer's“-Hülse (n. d. Pfl.-Physiol. Joh. Jak. Moldenhauer in Kiel, † 1827), *M. floribunda* Schrad., s. *Bowdichia speciosa* Spr. (*Dolichonemia spec.* Nees „Langfaden“, *M. scandens* Spr. (*Cavanillea scand.* Thb. 2) **Mold.** Spr. (Urticaceen, XXI. 4).
- 1) **Molinaea** Juss. (Sapindaceen, VIII. 1) „Molinabaum“ (n. d. span. Reis. in Chili 1782, Molina), *M. alternifolia* u. *canescens* Roxb., etc., s. *Cupania* Pers. 2) **Molinaea** Comm. (Rhamnaceen, V. 1), s. *Retanilla* DC. 3) **Molinaea** Mart., Bert. (Palmen, XXI. 6) „Molina“-P., s. *Jubaea spectabilis* Hb., Kth. (*Cocos chilensis* Mol.).
- Molinia** Mnh., Schrk. (Gräser, III. 2) Blauschmiele, Steifhalm, Pfeifenschmiele, Schmelche O. W. (n. Molina ben., s. eb.), *M. coerules* Mnh. Pfeifengras Seub., Vilm., -binse, Zier. v. fol. varieg. Hort. (*Festuca coerules* Hort., *Aira c. L. f.*, *Melica c. L. Mant.*) buntes Blangras od. blaue Schmiele.
- Molle** T., Clus. (sc. Schinus) L. (Terebinthac. Pistazieen, XXII. 5) Mastix-Nierenbaum, peruv. Pfefferbaum, fr. mastic des Indes (peruan. nulli).
- 1) **Mollügo** Kth. (sc. Pharmacœum) L. (Paronychieen, III. 3) „Weichkraut“, Weichling D. (v. mollis weich), *M. arenaria* Kth. etc., s. *Alsine* Pluk., *Spergula* Burm. 2) **Mollügo** (sc. Galium) L. (Rubiaceen, IV. 1) weiches Labkraut.
- Molospermum** (bess. **Moloposp.**) Koch (Umbellifer., V. 2) „Striemen-samen“, fr. livèche, e. bladder-seed (v. *μώλωψ*, -πος Strieme, *σπίσμα* Samen — Früchte m. breit. braun. Ölstriemen), Zier. *M. cicutarium* DC. (*Ligusticum peloponnesiacum* L.), fr. livèche du Pelopon-nèse, e. water-hemlock-like bl.-s.
- Moluccella** L. (Labiaten, XIV. 1) Trichterkelch (n. d. Molukken-Ins. ben.), *M. laevis* L. etc.
- Moly** Clus., Mnh. (sc. Allium) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Blumen-od. Zauberlauch Vilm. (gr. *μῶλυ* Zauberkr. od. Knoblauch, Wtst. v. *μολίω* entfernen — näml. Krankh.!), fr. u. e. moly, fr. auch ail doré, e. golden-garlick, s. *M. Dioscoridis* Clus.; *M. atro-purpureum* Rudd. = *Allium subhirsutum* u. *descendens* L.
- Mombin** Plum., DC. (sc. Spondias) L. (Terebinthaceen, X. 4) Balsampflaume, fr. mombin (Name des B.'s in Amerika), s. *Myrobalanus* s. *Prunus americana* Pluk.
- Momordica** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Beissgurke“, Springkürbis Dietr., Balsam- od. Wunderapfel, fr. momordique, balsamine mâle (-rampante), e. balsam-apple (v. mordeo, momordi etc., beisse — Samen wie angebissen! Paxton, Wtst., ätzend. Saft d. Frucht, Leun., Wtst.), Zier. *M. Charantia* L. (*muricata* W.) indisch. Gurkenapfel, rebenblättr. B., *M. Balsamina* L. Balsam- od. Wunderapfel, fr. mo-

- mordique pomme de merveille, e. balsam-apple (balm-Momordica), M. Elaterium L. Spritzgurke (vgl. Elaterium Mnch.!).
- Monadelphia** L., XVI. Kl. „Einbrüderige“ (*μοῖρός* einzeln, *ἀδελφός* Bruder — in einen Haufen verwachs. Staubfäden!).
- Monandria** L., I. Kl. „Einmännige“ (s. eb. u. *ἀνῆρ*, -*δός* Mann, in d. Bot. Staubgefäß!).
- Monanthes** Haw. (Crassulaceen, XI. 7) „Einblumen“-Dachwurz, s. *Sem-pervivum monanthos* autt. (s. v., *ἀνθή* Blüte).
- Monarda** L. (Labiati, XIV. 1) „Monarde“, fr. monarde (n. d. Arzte Nic. Monardus, † 1578 zu Sevilla), Gartenbl. M. didyma L. „Zwillings“-M., fr. m. écarlate od. Thé d’Oswego, e. Twin-Mon. od. Oswego-tea, M. fistulosa L. m. v. v. (z. B. affinis Lam., altissima W., Clinopodia L., violacæa Desf. etc.), fr. m. fistuleuse od. velue, e. tubular-Mon.
- Monas** Ehrbg. (Vibronen, XXIV. 4) „Monade“, Kugelbakterie, z. B. M. prodigiosa Ehrbg. Wunder-M., blutende Hostie, s. Micrococcus Cohn (*μοῖρά*; Einheit, „Monade“ Leibnitz).
- Monēsēs** Salisb., G. Don (-*sis* Walp.) (Ericac. Pyroleen, X. 1) „Einzelblum“-Wintergrün (s. v. u. *ἕσις* Wesen — einblum. Schaft!), M. grandiflora Salisb., s. Pyrola s. Chimatobia uniflora L. u. Mey.
- Monimia** P.-Thou. (Urticaceen Monimieen, XXI. 4) „Monimie“ (n. Monime, Gemahlin d. pontisch. Königs Mithridates Eupator, † 64 v. Chr.), M. rotundifolia P.-Thou. (Ambora tomentosa Bory St. Vinc.) (Str. Ins. Bourbon), ovalifolia P.-Thou. (Str. Martinique) etc. — Monimiæae Juss., DC.
- 1) **Monnieria** L. (-*ra* Aubl.) (Terebinthac. od. Rutac. Diosmeen, XVII. 1) „Lemonnier’s“ Schlangengiftkraut (n. d. Bot. Guill. Lemonnier, Prof. am k. Gart. zu Paris, † 1800), M. trifolia Loefl. 2) **Monnieria** Pers., P. Br. (Scrophularineen, II. 1) „Lemonnier’s“-Kriechkraut, z. B. africana Pers., s. Herpestes cuneifolia Pursh.
- Monochaetum** DC. (Melastomaceen od. Lythrarieen, VIII. 1) „Einzelborste“ (s. v. u. *χαίτη* loses Haar, Borste — d. Antheren-Connectiv läuft in eine Borste aus), z. B. umbellatum DC., s. Arthro-stemma Pav.
- Monochlamydæae** DC. „Einhüllige“, Perigonblütige Leun. (s. v. u. *χλαμύς*, -*δος* Kleid, Mantel — nur einerlei Hüllblätter, nicht besond. Krone u. Kelch!).
- Monoclinia** L. „Einlagerige“, Zwitterblumen (s. v. u. *κλίση* Bett — beide Geschlechter in einer Blüte beisammen!).
- Monocotylæae** Grck. (-*ledonæae* Juss.) „Einsamenlappige“ od. „Monocotylen“ (s. v. u. *μοτιληθών*, -*όνος* eig. Gelenkpfanne, Saugwarze, Bot. Samenlappen, s. g. Keimblatt!).
- Monodōra** Don, Dumont (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 7) „Einzel-fell“-Flaschenbaum, westind. od. Kalabassen-Muskatnuss (s. v. u. *δορά* Haut, Fell — einzellige Frucht!), M. Myristica Don (Annona Myr. G.). — Monodoræae (zu Annonacæae) Rehb.
- Monoeclia** L., XXI. Kl. „Einhäusige“ (s. v. u. *οἶκος* Haus — beiderlei Blüten auf einem Stock).
- Monœpigynia** Juss. „Oberweibige“ Monocotylen (s. v., *ἐπί* auf, über, *γυνή* Weib, Bot. Stempel — mit einem oberständigen Stempel).
- Monogynia** L. „Einweibige“ (*μοῖρός* u. *γυνή* — mit einem Stempel!).
- Monohypogynia** Juss. „Unterweibige“ Monocotylen (s. v., *ὑπό* unter, *γυνή* — mit einem unterständigen Stempel od. Fruchtknoten!).
- Monolopia** DC. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Einschuppenblume“ (gr. *μονολοπιος* mit einfacher Schale — nur ein Schuppenkreis am Anthodium), Zier. M. californica Hort. s. major DC. (Lasthenia gla-brata Hort. non Lindl.).

- Monoperigynia** Juss. „Umweibige Monocotylen“ (s. v., *περὶ* herum, *γύρη* — mit umständigen, d. i. gleichhoch mit den Staubfäden gestellten Stempeln).
- Monorchis** L., Mentz. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Einknolle“ (s. v. u. *ὄρχις* Hode — nur eine Wurzelknolle!), s. Ophrys *Monorchis* Hall. (Herminium R. Br., Satyrium Pers., Arachnites Hoffm. *Monorchis*).
- Monotröpa** L. (Ericaceen, X. 1) Ohnblatt, Schmeerwurz, Fichtenspargel (gr. *μονότροπος* einsam — Standort! oder auch sonderbar! Wtst.), *M. Hypopithys* L., fr. suce-pin (-racine). — *Monotropæae* Nutt. DC.
- Monsonia** L. (Geraniaceen, XVI. 7) „Monsonie“, fr. monsone (n. Lady Anna Monson, Assistentin von Lee, schr. *Introduct. to Botany*), z. B. *grandiflora* Burm. s. *speciosa* L., *Heritieri* DC. s. *spinosa* l'Hér., *Burmanni* DC. (*Geranium spinosum* L.).
- Monstera** Adans., Schott (Aroideen, VII. 3) „Monster“-Aron od. Baumwürger (v. *monstrum*, fr. *monstre* ungeheuerliche Gestalt), Gewächsh. *M. Lennea* C. Koch s. *deliciosa* Liebm., s. *Philodendron pertusum* Kth.
- Montanöa** La Llave u. Lex. (*Montagnaea* od. -nia Spr.) (Compositen, XIX. 4) „Montanoablume“, „Montagnebl.“ (n. C. Montagne, schr. üb. *Phykologie*, übers. v. K. Müller, Halle 1851, od. n. d. *Naturphilos. Montaigne*, Vertheid. v. Raymund's Theol. natur. um 1430? od. n. d. mexik. *Patrioten Montanoa*?), z. B. *Gartenbl. M. heracleifolia* Brongn., *pubescens* Spr. etc.
- Montbretia** Red., DC. (Irideen, III. 1) „Montbret's“-Schwertel (n. G. Coquebert de *Mombret*, Reis. im Orient, † 1836), z. B. *capensis* Bak. (*Tritöma* Ker s. *Houttuynia cap.* Thb.), *M. securigera* Red. (*Gladiolus* s. *Tapinia* sec. Dietr.).
- Montezuma** (bess. -*zumia*) Moç., Sess. (Bombaceen, XVI. 7) „Montezumabaum“ (n. d. mexik. Kaiser Montezuma, 15. Jahrh.), *M. speciosissima* Sess.
- 1) **Montia** Mich., L. (Portulaceen *Samoleen*, III. 3) Bach- od. Flutquendel, *Greusel* O. W. (n. Gius. *Monti*, Prof. zu Bologna), *M. fontana* L. „Quell-Montie“ *M.-Rehb.* 2) **Montia** *Houst.* (Tiliaceen).
- Montinia** L. (*Samoleen* od. *Onagrarien*, XXII. 4) „Montinie“ (n. d. schwed. Bot. *Lorenz Montin*, schr. üb. *Splachnum*, † 1785), z. B. *M. acris* L. (*caryophyllacea* Thb.) (Cap).
- 1) **Moquinia** DC. (Compositen) „Moquinie“ (n. d. franz. Bot. *Moquintandon*), z. B. *Bojeri* DC., s. *Spadonisma* DC. 2) **Moquinia** *Grissel.* (*Loranthaceen*, VI. 1), z. B. *glabra* *Griss.* 3) **Moq.** *A. Spr.* (*Campanulac.*, V. 1), z. B. *rubra* *A. Spr.* (Capstr.).
- Moracæae** Endl., Grck. „Maulbeerbäume“, s. *Morus* T.
- Moraea** L. (Irideen, III. 1) „Moräus“-Schwertelie, *Panther-* od. *Rollschwertel* (n. *Joh. Moraeus*, Arzt zu *Fahlun* in Schweden, *Linné's* Schwiegervater), *Zier. M. chinensis* Thb. *chines.* *Pantherblume* *Vilm.*, fr. *Morée de Chine*, e. *Chines. M.*, s. *Pardanthes chin.* Ker, *M. fimbriata* Hort. (*Iris chinens.* Bot. Mag.), *M. diandra* Vahl (*Diplarrhæna Moraea* Dietr.).
- Morchella** Dill. (Pilze, XXIV. 4) „Morchel“, *Spitzmorchel*, fr. *morille*, e. *moril* u. *trub* (ob v. *mor* niedersächs. für *mürb*? Wtst., *Helm-Rabst.*), z. B. *M. conica* Pers., *esculenta* L. *Speisemorchel*, u. *deliciosa* Fr. — *Morchellini* *Rehb.*
- Moræae** (sc. *Artocarpæae*) *Bartl.* *Maulbeergew.*, s. *Morus* T.
- Moricandia** DC. (*Cruciferen Siliquos.*, XV. 2) „*Moricandi*“- od. *Ackerkohl* (n. *Steph. Moricandi*, ital. Bot., schr. *Fl. Veneta*, *Genuae* 1820 u. a.), wild u. *Zier. M. arvensis* DC. (*Brassica arv.* L. s. *pur-*

purĕa Mill.), fr. Moricandie des champs, e. cabbage-flowered M., s. Turrĭtis arv. R. Br. s. Crantzia frutescens Lag.

- 1) **Morina** T., L. (Labiāt. Nepeteen, II. 1) „Mordine“, fr. morine (n. d. franz. Bot. L. Morin, † 1715), Zier. *M. longifolia* Wall. u. *M. persica* Don (Asaphes nepalensis Spr.). 2) **Morina** Don (Verbenaceen).
- Morinda** Vaill., L. (Rubiaceae. Cinchonaceen, V. 1) „indische Maulbeere“, fr. morinde, m. royoc, fausse rhubarbe Tintenwurzel (aus *Morus indica* — Ähnlichk. d. Frucht m. d. Maulbeere!), z. B. *M. tinctoria* Roxb. (Str. Ostind.), phillyreoides Lab. (Str. Neucealed.), muscosa Jacq. (Cephaelis m. Sw.) etc.
- Moringa** G. (sc. Guilandina) L. (Cassieen Cäsalpinieen od. Rutaceen, X. 1) „Moringabaum“ (vaterl. Name!), *M. Pterygosperma* G., s. Guil. Mor. L.; *M. zeylanica* Lam., s. *Hyperanthera* Mor. Vahl (Guiland. Mor. Jacq.). — Moringeae Wight (zu Rutaceae).
- Morio** (sc. Orchis) L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) gem. od. Salep-Orchis, Wiesen-Knabenkraut, Kukuksblume, eig. „Schalksnarr“ (lat. morio, -onis, gr. $\mu\omega\omega\delta\varsigma$ Narr — Blüte einer Narrenkappe ähnlich!), fr. folle-femelle.
- Morisonia** Plum., L. (Capparideen, XVI. 8) „Morison's“-Kaperbaum, Teufelsb. Wolff, fr. mabouia (-bouier), masse des sauvages (n. d. schott. Bot. Rob. Morison), *M. americana* Jacq., s. *Capparis Morisonia* Sw.
- Morna** Lindl. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Mornablume“ (n. Morna, Heldin nordischer Romane, Wst.: neuholl. Name!), Zier. *M. nitida* Lindl. s. *elegans* Hort. (Helichrysum el. Hort., *Leptorrhynchus aureus* Benth., *Waitzia* aur. Steetz), *M. nivea* Lindl. (Helichr. decumbens Portenschl., *Leptorrh. suaveolens* Benth., *Waitzia corymbosa* Wendl., v. *Benthamiana* Walp.).
- Morocarpus** Scop., Ad. (Chenopodiaceen, V. 2) Maulbeerspinat, -frucht, Erdbeerspinat (*morus* Maulbeere, $\mu\alpha\gamma\lambda\acute{o}\varsigma$ Frucht — rote Beerenfrüchte), s. *Blitum capitatum* L.
- Morsus ranae** T. (sc. Hydrochäris) L. (Hydrocharideen, XXII. 8) „Froschbiss“ (*morsus* d. Biss, rana Frosch — d. mürben Blätter u. weichen Wurzelfasern v. Froschquappen verschluckt!).
- Morus** T., L. (Artocarpeen od. Urticac. Moreen, XXI. 4) Maulbeerbaum, fr. mürrier, e. mulberry (-tree), hirtle-berry (gr. $\mu\acute{o}\rho\omega\upsilon$ n. d. celt. mor gr. $\acute{\alpha}\mu\alpha\iota\tau\acute{o}\varsigma$ schwarz), Gärt. *M. nigra* L., fr. mürrier noir, e. black-fruited m.-b.-tr., *M. alba* L., fr. m. blanc, e. white-fruited m.-tr. m. v. v., *M. rubra* L. m. v. *scabra* Loud.
- 1) **Moscharia** Rz. Pv. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Moschuskraut“ ($\mu\acute{o}\sigma\chi\omicron\varsigma$ Moschus, Räucherwerk — riecht wie Moschus!), *M. pinnatifida* R. P. (*Mosigia* p. Spr.), s. *Moschifera* Mol. 2) **Moscharia** Forsk. (Labiaten, XIV. 1). 3) **Moscaria** Pers., s. *Moscharia* Rz. Pv.
- Moschatellina** T. (sc. Adoxa) L. (Araliaceen, VIII. 4) Moschus- od. Bisamkraut, fr. moscatelline, fleur od. herbe musquée, e. moschatel (s. eb.).
- Moschosma** Rehb. (Labiaten Ocimoideen, XIV. 1) „Moschusduft“-Kraut (s. v., $\delta\sigma\mu\acute{\iota}$ Duft), s. *Ocimum* L.
- Moussonia** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Moussonie“, z. B. *elegans* Decsn. (schwerl. n. Mousson = Passatwind, sond. N. pr.).
- Moutabēa** (*Moutoubēa*) Aubl. (Cinchonaceen od. Lucumeen, V. 1) Kappenblume D. (Str. Treibh.), s. *Cryptostomum laurifolium* W. (v. ay-moutabou, Nam. d. Pfl. in Guiana).
- Moutan** Sims, DC. (sc. Paeonia) L. (Ranunculaceen, XIII. 2) Baum-Päonie, fr. Pivoine Moutan (- en arbre), e. tree-Paeony (chines. Name d. Pfl.) m. v. v., s. *Paeonia arborēa* Don (*suffruticosa* Andr., *fruticosa* Dumort.).

- Moxa** W. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Moxa“- od. Brennwohlen-Beifuss, s. g. indisch. Moos, fr. u. e. moxa, s. *Artemisia chinensis* L. (Moxa d. i. Brennwohle, näml. bei Hüftweh auf d. Haut abgebrannt, auch aus zerrieb. Blumen d. *Artemisia vulgaris*, Willdenow).
- Mucor** L., Mchx. (Pilze, XXIV. 4) Schimmel, Kopfschimmel, Kahl (lat. mucor, -ōris n. d. celt. mucr feucht — Schimmel etc.), M. Mucēdo, fr. fleur d'humidité. — Mucorinēae Fr.
- Mucūna** Ad. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Brennbohne, Kuhkrätze (n. d. brasil. Namen mucuna-guaca — brennborst. Hülse!), Zierschlingpfl. *M. urens* u. *pruriens* Ad., s. *Strizolobium* P. Br., *Carpopogon* Roxb. u. *Dolichos* G.
- Muelleria** (Müllera) L. f. (Cassin Cäsalpinieen, X. 1) „Müller's“-Sophore (n. d. dän. Bot. O. Müller), *M. moniliformis* L. f. „Rosenkranz“-S., *M. verrucosa* Pers. (Ormocarpum verr. P. Br.).
- Muenchhausia** L. (sc. Lagerstroemia) W. (Malastomac. od. Lythrarieen, XIII. 1) „Münchhausensbaum“ (n. O. v. Münchhausen), *M. speciosa* L. (Lagerstr. spec. W.), s. *Banava* Camell.
- 1) **Mungo** (sc. Phaseolus) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Rauhkopf- od. Ichneumonbohne (mungo d. portug. Wort für den ind. Schlangenchneumon). 2) **Mungos** (sc. Ophiorrhiza) L. (Cinchonaceen, V. 1) ostindische od. Ichneumon-Schlangenzwur.
- Murex** Burm. (sc. Pedalium) L. (Scrophularieen od. Sesameen, XIV. 2) „Stachelschnecken-Ruderfrucht“ s. g. Fussangel D. (murex Stachelschnecke), s. *Hyoscyamus maritimus* Herm.
- Murraya** L., Kön. (Aurantaceen, X. 1) „Murray's“-Orange (n. d. Prof. Joh. Adam Murray in Göttingen), Warmh. *M. exotica* L. (Chalcas japonens. Lour.), Burmanni Spr. (*Glaucena excavata* Burm., Str. Java), *Koenigii* Spr. (Bergera K. L.) (Bstr. Ostind.).
- Murueuia** (-cuja) T. (Asclepiadeen Passifloreen, XVI. 2) „Murucuya“-Passionsblume (brasil. Name!), *M. speciosa* Spr. (*Tacsonia* sp. Kth.), aurantiāca Pers. (Str. Neucealed.).
- Musa** L. (Scitamineen Musaceen, V. 1) Pisang, Banane, Paradiesfeige, fr. plantanier, pisang, fruit du père Adam (figuier d'Adam), bananier u. bacove, e. plantain u. banana (Paxton: v. d. ägypt. mauz, Linné: n. Ant. Musa, Leibarzt d. Kais.'s Augustus, schr. de Betonica, Gewächsh. *M. vittata* Hort. (chinensis Sweet var.), chinensis Sweet (Cavendishii Paxt.), Ensete Bruc. (Aethiop.), sapientum L. Braminen-Banane Rmpl., paradisiāca L. (Gespinnstpfl. Indiens) etc. — Musae Juss., -sacēae DC., Endl. (zu Ord. Scitamineae Bartl.).
- Muscari** T., Desf. (Liliaceen, VI. 1) „Muskat“- od. Bisamhyacinthe Grck., Moschus- od. Perl-Hyaz., fr. mousse-grecque, e. muscary (d. Blüt. riech. nach Muskatnuss), Gärt.: *M. botryoides* Mill. Trauben-Hyaz., Träubel O. W., fr. lilas-de-terre, e. grape-flower (-hyacinth), moschatum W., monstruosum Mill. u. comosum L. Feder- od. Corallen-Hyaz. n. v. plumosum Hort.
- 1) **Muscipula** (sc. Dionaea) L. (Cistineen Droseraceen, X. 1) „Fliegenfalle“, fr. Dionée attrape-mouches, e. fly-trap. 2) **Muscip.** (sc. Silene) L. (Sileneen, X. 3) Fliegen-Leimkraut, e. fly-wort (v. musca Fliege u. capio fange, nicht Wtst.: „Mausfalle“, mus u. capio!).
- Musci** L., Juss., -cinēae Bisch., DC., Kl. d. Moose (Laubmoose, fr. mousses frondoses, Musci frondosi Hedw.), s. *Bryinae* Schimp. (muscus Moos).
- Mussaenda** L. (Rubiaceen Cinchonaceen, V. 1) Langschiene (ceylan'scher Name einer Art, *M. frondosa* L.), z. B. coccinea u. candida Poir. (*Macrocnemum* cocc. u. candidissimum R. Br.), lanceolata Spr. (*Manettia* l. Vahl) etc., s. auch *Rondeletia* u. *Gardenia*!
- Musschia** Don (Campanulaceen, V. 1) „Muschia“-Glockenblume (n. Jean Henri Mussche, schr. Catal. d. pl. du jard. bot. de la ville de Gand,

- 1810 u. Hort. Gandavensis 1817), Gewächsh. M. Wollastoni Lowe, s. Chrysangia Lk.
- 1) **Mutellina** G. (sc. Mēum) (Umbelliferen, V. 2) Alpen-Bärwurz, Köpernikel Grck., s. g. Muttern Dietr., fr. méon des Alpes, s. Phellandrium u. Ligusticum Crantz. 2) **Mutellina** (sc. Artemisia) (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Gletscher-Beifuss, s. Artemisia glacialis Jacq. (dem. Mutina Modena? — Mutellinae radix Offiz.).
- Mutisia** L. f. (Compos. Perdicieen od. Mutisieen, XIX. 2) „Mutisblume“ (n. d. südamer. Bot. Cölest. Mutis), z. B. Clematitis L. f., grandiflora Hb., Bpl., speciosa Ait. (Bras.), latifolia Don (Schlingstr. Chili) etc. — Mutisiaceae Less., DC., -siæae ds.
- Myagram** T., L. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) Hohldotter (ὄψαρος eig. Fliegenfänger v. μύα (-νία) Fliege u. ἄγρα Jagd, Fang).
- Myanthus** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Fliegenblume“ (s. eb. u. ἄνθος Blume — d. Blüt. nach d. Verblühen wie plattgedr. Fliegen), M. cernuus Lindl. (Catasetum trifidum Hook.).
- Mycelis** Cass., DC. (zu Prenanthes Rchb.) (Compos. Cichorieen, XIX. 1) „Fliegenschmutz“-Salat (μύα Fliege u. κηλίς Fleck, Schmutz — Bezieh. unklar!), z. B. ambigua Cass., muralis Rchb. s. angulosa Cass., s. Chondrilla mur. Wallr. (Cicerbita m.).
- Myceña** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Helmpilz Kumm. (v. μύκης Pilz), z. B. pura, alliacea etc. (winzige Pilzchen) (zu Agaricus L.).
- Mycetes** Spr., Kl. d. Pilze (gr. μύκης, -ητος od. -ου Pilz, Schwamm).
- Mycophycæe** Ktzz., Endl. Ord. d. „Schimmel“- od. „Pilzalgen“, Algenpilze Seub., Schleimflocken, s. Phycomycetes de By. (μύκης, -ου u. φύκος lat. fucus Alge).
- Mygalurus** Lk. (Gräser, III. 2) „Mäuseschwanz“ (v. μυγαλή Spitzmaus, οὐρά Schwanz), s. Festuca bromoides L. u. uniglumis Soland.
- Myginda** Jacq. (Sapotaceen od. Rhamneen, IV. 3) „Myginda“, Myrrhen-Stechpalme (n. d. Bot. Franz v. Mygind), M. uragoga L., Jacq. Zipfel-M. (Str. Südamer.) (v. οὐρά u. ἄγωγός Führer), s. Plex Myrsinitis s. myrsinoides Pursh.
- Myoetönium** (sc. Aconitum) Rchb. (Ranunculaceen, XIII. 3 od. 7) „Mäusetod“-Sturmhut (μύς, -νός Maus, κτόνος Mord).
- Myogalum** Lk. (Liliaceen, VI. 1) „Mäusemilch“, Stiftblume (s. eb., γάλα Milch), s. Albuca Rchb. u. Ornithogalum (zu Gagea Ker).
- Myopörum** Sol., Banks (Polygalaceen od. Myoporineen, II. 1) „Mäuseweg“, -frass Leun. (s. eb. u. πόρος Durchgang — d. Blätt. durchsicht. punkt.!), z. B. Ampeln M. parvifolium, s. Pogonia glabra Andrz.
- Myosëris** Lk., Rchb. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Mäusesalat“ (s. v., σέρις Salat), s. Borkhausia purpurea Böhm. u. Lagosëris taurica M. B.
- Myosotidium** Van Houtt. (Boragineen, V. 1) „Mäuseohrgleiche“ (Myosötis u. εἰδομαί gleiche), z. B. noble Van Houtt.
- 1) **Myosötis** Dill., L. (Boragineen, V. 1) „Mäuseohr“, Vergissmeinnicht, fr. gremillet, oreille de souris, e. mouse-ear (μύς, -νός u. οὐς, ὄτος Ohr — Form u. Behaar. d. Blätt.!), z. B. Sumpfwies. M. scorpioides L. s. palustris With., fr. scorpione, aimez-moi, grémillet, ne m'oubliez pas, petit-bleu, oeil de perdrix etc., e. marsh-forget-me-not, mouse-od. scorpion-grass echtes Verg., Gärten: M. azorica Wats., Blendl. Impératrice Elisabeth (Hybr. v. azorica Wats. u. alpestris Schmidt), Rabatten M. sylvatica L. u. alpestris Schm. m. v. fl. albo (lithospermifolia Hornem.), e. alpine-forget-me-not. 2) **Myosötis** (sc. Agaricus s. Naucoria) Fr. (Pilze, XXIV. 4) Vergissmeinnicht- od. Schnitzel-Pilz, Rabhst. 3) **Myosötis** arvensis hirsuta Vaill. (Alsineen, X. 5), s. Cerastium vulgatum L. s. glomeratum Thuill.
- Myosürus** Dill., L. (Ranunculaceen, V. 6) „Mäuseschwanz“, fr. queue

de souris, e. mouse-tail (s. v. u. οἶζα Schwanz — Form d. Fruchtbodens!), *M. minimus* L.

- Myriandra** Spach (subg. v. *Hypericum* L.) (Hypericaceen, XVIII. 2) „Tausendmann“-Hartheu (v. *μυροί* zehntausend, *ἀνήρ*, -δός Mann — tausend Staubgef.!), z. B. *H. Kalmianum* u. *prolificum* L.
- Myrica** L. (Myricaceen, IV. 2 od. XXII. 4) Gagelstrauch, „Wachsbaum“, fr. myrique, e. gale od. dutch myrtle (gr. *μυρίκη* v. *μύρον* ausfliess. Balsamharz), Zier. *M. Gale* L., fr. mirte Galé od. -bâtard Ölmyrte Wolff, pimento royal, e. candleberry-myrtle od. sweet-Gale, *M. cerifera* L. brabanter Myrte Viim., fr. Cérrier de la Louisiane, e. american candle-berry-Myrte, m. v. *latifolia* Ait. (*M. carolinensis* Mill.). — Myricaceae Rich., Grk., -ricae Rich., Rchb. Gagelgew. Grk., Wachsbeeren Leun.
- Myricaria** Desv. (Tamaricineen, XVI. 5) „Myricarie“, Wachsbaum, Tamariske, Kerzenbeerenstr., fr. cirier u. laurier sauvage (*μυρίκη* s. eb. = Tamarix der Alten!), z. B. Zier. *M. germanica* Desv. (Tamarix germ. L. s. *decandra* Mch.) gem. od. deutsche Tamariske, fr. Tamaris d'Allemagne, e. german Tamarisk, *M. dahurica* DC. sibir. Tamar. (*Tamarix* dah. W.), fr. Tamaris de Sibérie, e. dahurian myrtle.
- Myriophyllum** L. (Halorageen, XXI. 9) „Tausendblatt“, fr. mille-feuille aquatique (*μυροί* zehntausend, *φύλλον* Laub — Blätt. haarfein zerschlitzt!).
- Myristica** L. (Myristiceen, XXII. 13) Muskatnussbaum, fr. muscadier (noix-muscade), e. nut-meg (gr. *μυριστικός* wohlriechend, wie parfümierte Salbe riechend!), *M. officinalis* L. echte, gebräuchl. — Myristiceae R. Br.
- Myrobalana** (sc. *Prunus*) Lois. (Drupaceen od. Amygdaleen, XII. 1) Balsam- od. Kirschkpflaume, fr. prunier Myrobalan od. Cerisette, e. myrobalan plum (v. *μύρον* Duftöl, *βάλανος* Nuss etc.), s. *Prunus cerasifera* Ehrh., s. g. amerik. Kirsche.
- Myrobalanus** G., Lam., DC. (sc. *Spondias*) L. (Terebinthaceen, X. 5) „Balsam“- od. Purgierpflaume, Behennuss, fr. myrobalanier (s. eb.), s. *Spondias Mombin* Jacq. (non L.). — Myrobalanæae (sc. *Onagraceae*) Rchb.
- Myrodendron** Schreb. (Tiliaceen od. Humiriaceen, XIII. 1) „Balsambaum“ (s. v. u. *δέρδρον* B.), z. B. *amplexicaule* W., s. *Houmiria* Juss.
- Myrosma** L., W. (Scitamineen, I. 1) „Balsam“-Gewürzlilie (s. v., *ῥομή* Duft — wohlriechend!), z. B. *cannaeformis* W. (*cannaefolia* Spr.), s. *Maranta Myrosma* A. Dietr.
- Myrospermum** Jacq. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Myrrhenkern“-Baum, Tolu-Balsam, „Balsamsamenbaum“ (s. v., *σπέρμα* Samen, Fruchtkern — haupts. im Stamm Balsam), *M. toluiferum* Spr., s. *Toluifera Balsamum* L. (*Myroxylon* tol. Rich.).
- Myroxylon** L. f. (-um Kth.) (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Balsamholz“ (s. v. u. *ξύλον* Holz — dies. von balsam. Geruch!), *M. toluiferum* Spr. (*M. Toluifera* Kth.) s. *peruiferum* L. f. peruanischer Balsamb., s. *Myrospermum* tol. Spr. (s. eb.), *M. orbiculatum* Forst. u. *suaveolens* Forst., s. *Xylosma* Schreb. (XXII. 11).
- Myrrhis** Scop., Moris. (Umbellifer., V. 2) Süssdolde, Aniskerbel, fr. cicutaire odorante, cerfeuil musqué (*μυρρίς* Myrrhe, würzig. Kraut), *M. odorata* Scop., Zier. *M. rosea* Spr.
- Myrsine** L. (Myrsineen od. Solaneen Ardisiaceen, V. 1) Myrrhen, Myrtenblume, e. myrrh (gr. *μυρσίνη* Myrte — ähnl. Belaubung), *M. africana* Berg. L., *M. Manglilla* W., s. *Bumelia* Sw. — Myrsinæae Bartl. i. q. Solanaceae Ardisiaceae Rchb.

Myrsiphyllum s. Myrtiphyllum!

Myrtaceae DC., Rchb., -tēae Rchb., -ti Juss., -tiflōrae Endl., Rchb., -tīnae Bartl., s. Myrtus.

Myrtillus (sc. Vaccinium) L. (Ericaceen od. Siphonandraceen Vacciniēen, VIII. 1) gem. Heidelbeere, Schwarzbeere O. W., eig. „Myrtchen“, fr. myrtille, brimbelle, maceret, bleuet, e. bilberry, hurtleberry (dem. v. Myrtus Myrte — Ähnl. d. Belaubung!).

Myrtiphyllum P. Br. (Myrsiph.-W.) (Melanthaceen od. Smilaceen, VI. 3) „Myrtenlaub“ (μύρτος u. φίλλον Laubblatt!), Zier. M. asparagoides W. (Spalier u. Ampel), s. Medeōla asp. L.

Myrtus L. (Myrtaceen, XII. 1) „Myrte“, fr. myrte, e. myrtle (mirtle) (gr. μύρτος v. μύρον ausfließ. wohlriech. Saft), Zier. M. communis L. m. v. v. (z. B. italica Mill., romana, baetica, tarentina etc. Mill.), M. leucocarpa Sm. (Griechenl.).

Myūrus Ehrh. (sc. Festuca) L. (Gräser, III. 2) „Mäuseschwanz“-Schwingel (μῦς, -νός Maus, οῦρά Schw.).

Myxa Blackw., Endl. (sc. Cordia) L. (Asperifolien od. Convolvulaceen, V. 1) schwarze Sebeste oder Brustbeere, ägypt. od. arab. Pflaume, e. assyrian plum (μύξα, -τα Pflaume od. Sebesten), s. Sebestēna offic. Blackw. „Sebestenbaum“.

Myxaciūm DC., Fr. (Pilze, XXIV. 4) Schleim-Hutpilz Kumm. (v. μύξα Schleim u. ἀκμή Spitze — Manschette klebrig! Wst.), z. B. muscosum, croceo-coerulēum etc., s. Agarīcūm L.

Myxogastēres Fr. „Schleimbalgpilze“ (zu Ord. Myxomycētes Wallr.) (μύξα v. γαστήρ, -έος Bauch).

Myxomycētes Wallr. „Schleimpilze“ (s. v. u. μύκης, -ητος od. -ου Pilz).

1) **Naegelia** DC., Reg. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Nägeli“ (n. d. Prof. Nägeli in München), Stuben u. Sommergart. N. zebraīna Hort., cinnabarīna Lindl., anabilis Decsn. m. v. Cérise d'or. 2) **Naeg.** Lindl. (Pomaceen, XII. 4), s. Cotoneaster Med.

Naematelia (bess. Nemat.-) Fr. (Pilze, XXIV. 4) Zitterpilz, eig. „Gespinntverfertiger“ (νημα Gespinnt, τελέω vollende — Schlauchlager enth. ausser d. Spordien noch einen festen Körper), z. B. encephala etc., s. Tremella Dill.

Nagassarīum Rumph. (Guttiferen, XVI. 8) „Nagasbaum“ (v. nagassaran Flöten der Bajaderen — d. Holz dazu lief. B!), s. Mesua ferrea L.

Nageia (-ja) G. (Coniferen Taxaceen od. Myricaceen, XXII. 4) „Nagi“-Gagel (v. nagi, Name d. Str.'s in Japan, naga Beere), z. B. N. bracteata Krz. (Podocarpus br. Blum.).

Najadēae A. Rich., Rchb., -jādes Juss., DC. (zu Helobiae Endl.) Najaden od. Wassernymphen, s. sogl.

Najas L., W. (Fluvialen od. Helobien Najadeen, XXI. 1) „Najade“, Wassernymphe (gr. ναιάς, Pl. ναιάδες v. νάω od. νάω (ρέω) schwanke, schwimme), s. Fluviales Vaill., Mchx. u. Potamogēton Pluk.

Napaea L. (Malvaceen, XXII. 13) Sammetmalve, eig. „Waldthal“-M. (ναλαιός in Waldthälern etc., Ναλαιά Waldthal-Nymphen, Wst. : zus. aus νῆ nicht u. παός hell!), z. B. N. laevis L. s. hermaphrodita L., s. Sida Nap. autt.

Napellus Riv., Dod. (sc. Aconitum) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) „Napell“-Eisenhut M.-Rchb., fr. napel, e. lark's-heel „Lerchensporn“, morion, casque, monk's-hood „Mönchskappe“ (dem. v. νάπη Nachen, nicht Wst. v. νάλιος Rübe — weg. d. Wurzel!).

1) **Napoleōna** P.-B. (Belvisiaceen od. Olacineen, XIII. 1) „Napoleons“-

- Belvisie od. Passiflore (n. Napoleon I., Kais. v. Frankr.), z. B. N. imperialis P.-B. — Napoleonæae DC. 2) **Napoleōna** R. P. (Cyclantheen od. Pandaneen, XXII. 12), s. Phytelēphas R. P.
- Napus** T. (sc. Brassica) L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Reps (Raps) od. Kohlrübe, Kohlsaart,, fr. chou-navet, navette od. rabette, e. cole-rappe, navew (lat. napus, -i Steckrübe, gr. *νάπυ* od. *νάλειον* Senf).
- Narcissus** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Narzisse“, Sternblume Seub., fr. narcisse, e. lily-daffodil, star-flower (-hyacinth) (n. Narcissus, dem in sich verliebten Jüngling, Myth. — blickte unt. sich in d. Quellspiegel, — nick. Blume!), Zier: N. poëticus L. Garten-Sternbl., fr. n. des poëtes, Cladinette, oeil de faisan etc., e. poët's-Narcissus, Pseudo-Narcissus L., s. g. Märzbecher u. Osterblume m. v. fl. pleno, Stuben: N. Tazetta L. Dolden-, Bouquet- od. Tross-N. m. v. v., incomparabilis Mill., odorus W., Jonquilla L. Jonquille od. Binsen-N. (Hermione Jong. Haw. s. juncifolia Salisb. — v. jone, lat. juncus) m. v. fl. pl., N. minor L., fr. N. petit, e. smaller-N., calathinus L. s. reflexus Lois. etc. — Narcissæae Rehb. (-si Juss.) i. q. Amaryllidæae DC.
- Nardosmia** Cass. (zu Tussilago Rehb.) (Compos. Tussilagineen, XIX. 2) „Narden“- od. wohlriech. Hufblattich (*νάδος*; wohlriech. Narde, *ῥοσμή*) Duft — riecht der Valeriane Nardus ähnl.!), Zier. N. fragrans Rehb., s. g. Winter-Heliotrop d. Orangerien, s. Tuss. fragr. Vill.
- Nardurus** Rehb. (Gräser, III. 2) „Nardenschwanz“ (s. Nardus u. *οἶσι* Schwanz), s. Festuca tenuiflora Schreb. u. Micropyrum Gaud. „Kleinweizen“.
- 1) **Nardus** Moris. (Valerianeen, III. 1) Narde (gr. *νάδος*, indisch nard — besond. Geruch!), N. celtica Mor., s. Valeriana celt. L. 2) **Nardus** L. (Gräser, III. 1) „Narden“- od. Borstengras Seub., fr. nard, z. B. N. stricta L. „straffes“, indica L., fr. spicanard od. espicanardy, e. nard-spike. 3) **Nard.** Lob. (sc. Andropogon) L. (Gräser, XXIII. 1) Narden-Bartgras, N. Gangitis Lob. sc. scorpioides Lam., s. Monerma Gang., P.-B.
- Nartheçum** Möhring (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Beinheil, Sumpf- od. Ährenlilie Leun. (Anagramm v. Anthericum, Wtst.: v. *νάθηξ* Schaft — nackt. Schaft d. Blum.!), z. B. calyculatum Huds. (Tofieldia palustris Huds.) u. ossifragum Huds., s. Anthericum etc. L.
- Narthex** Falconer (Umbelliferen, V. 2), Stinkasant, s. g. Teufelsdreck *νάθηξ*. -νος Doldenpfl. Ferula, Rute od. Schlagstock!), N. Asa foetida Falc., s. Ferula Asa foet. L.
- Nasturtium** R. Br. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) Sumpf- od. Brunnenkresse, fr. laberte, cresson de ruisseau (- de fontaine), e. water-cresses (-parsley), balsamite, lady's-smock, nose-smart (st. nasitortium „Nasenprickler“), z. B. officinale R. Br. (Sisymbrium Nast. L.) „gebräuchl.“ od. Salat-Br.
- Natrix** Mnch. (sc. Ononis) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) gelbe od. „Ringelnatter“-Hauhechel (Natrix Zoologie = Ringelnatter, eig. „Schwimmerin“ — amgebl. Wirk. geg. Schlangen).
- Nauclæa** L. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) ostind. Gambirstrauch, Kino od. Bastard-Catechu (st. navicula od. naucella Napf, dem. v. navis Schiff — Kaps. nachen- od. napfförm.!), N. Gambir s. orientalis L., africana W. (Uncaria inermis W.) etc.
- Naucoria** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Schnitzelpilz Kumm. (v. naucus gering, Wtst. naucum Nusschale? vielm. nauci indeclin. Sattel inmitt. d. Nuss, nichts nütze! u. *σοάω* sehe — Wtst.: Manschette mit d. schupp. Hut verwachsen!), z. B. graminicola etc., s. Agaricus L.
- Nauenburgia** W. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Nauenburgsblume“ (n. d. bot. Autoren Joh. Sam. Nauenburg, schr. Lehrb. d. reinen Bot.,

- Hamb. 1798), *N. trinervata* W., s. *Brotēra Contrayerva* Spr. (*Flaveria repanda* Lag.).
- 1) **Naumburgia** Mch. (Primulaceen, V. 1) „Naumburgie“ (n. d. bot. Aut. Naumburg od. Nauenburg, s. eb.), *N. thyrsoflora* Mch. (*Lysimachia* th. L.). 2) **Naumburgia** W. = **Nauenburgia** W. (s. eb.).
- Nauplius** Cass. (zu *Bupthalmum* Rchb.) (Compos. Inuleen, XIX. 2) Gestirnblume, Wasser-Rindsauge (n. Nauplius, d. sternkund. Argonauten, v. *ναύς* Schiff u. *πλεῖω* fahre zu Schiff), *N. aquaticus* Cass., s. *Asteriscus* Mch.
- Navaretia** Rz. Pv. (Convulvaceen, V. 1) „Navarettie“ (n. Fr. Ferd. Navarette, k. span. Leibarzt, schr. üb. d. Natg. v. Granada), Zier. *N. cotulaefolia* Van Houtt., pubescens, involucrata Rz. Pv. (Chili) etc.
- Necessaria** L. (sc. Polygamia, XIX. Kl. 4. Ord.) „Notwendige“, d. i. Randblütchen fruchtbar, daher notwendig!
- 1) **Neckēra** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Necker's“-Astmoos (n. d. Bot. N. J. Necker in Mannheim), z. B. *N. heteromalla* Hedw. (*Daltonia* het. Spr.). 2) **Neckeria** Gm. (Paronychieen, I. 1) Necker's od. Pollich's-Feldknaul, *N. campestris* Gm., s. *Pollichia* c. L., Schreb. 3) **Neckeria** Scop. (Fumariaceen, XVII. 2) Necker's-Erdrauch.
- 1) **Nectandra** Berg., Roxb. (Gnidia L.) (Thymeläaceen, VIII. 1) „Honigbeutel“-Strauch (*νήκταο* u. *ἀνήθο*, -*δρόος* Mann, Bot. Staubgefäß), z. B. *N. Puchury* Nees u. Mart. Pichurimbohne, s. *Ocotea Pichurim* Kth. 2) **Nectandra** Rottb. (Laurineen, IX. 1) „Honigdrüsen“-Strauch (— 3 der Staubfäd. mit Honigdrüsen, Leun.), *N. sanguinea* Rottb., s. *Laurus* sang. Sw.
- Nectris** Pursh, Schreb. (Hydrocharideen, VI. 2) „Schwimmerin“ (*νήκτρις* — schwimmt auf d. Wass.!), z. B. *peltata* F. Müll. u. *aquatica* W. (Cabomba p. F. Müll. u. aq. Aubl.) schildblättr. u. Wasser-Haar-nixe, *N. pinnata* Pursh, s. *Floerkia palustris* Nutt.
- 1) **Negundo** Mch. (sc. Acer) L. (Sapindac. Paulinien, XXIII. 1) Eschenahorn (malabar. Name!), Zierb. *N. aceroides* Mch. s. *fraxinifolia* Nutt. = *Acer Negundo* L. m. v. v. (folio albo u. aureo-varieg. Hort.). 2) **Negundo** (sc. Vitex) L. (Verbenaceen, XIV. 2) „Negundo“-Müllen (*Legondium litoreum* Rumph.).
- Neillia** D. Don (Rosac. Spiräaceen od. Homalineen, XII. 4) (Gruppe v. Spiräa Lauché) „Neill's“-Spiräe (n. d. schott. Bot. Neill, schr. fruit-, flower- and kitchengarden, Edinb. 1840), Zier. *N. thyrsoflora* Don (Himal.) etc.
- Nelsonia** R. Br. (Scrophularineen, II. 1) „Nelson's“-*Acanthus* (n. d. Bot. Dav. Nelson, Cook's Begleiter, nicht Admiral Nelson Dietr.), z. B. *campestris* R. Br. (Neuholl.), *hirsuta* Röm. (*Justicia brunelloides* Lam.) etc. — Nelsoniäe (zu *Acanthaceae*) Nees.
- Nelumbium** W., Juss. (Nymphaeaceen, XIII. 6) heilige Padma, prächt. Nelumbo od. Lotusblume Rmpl. (nelumbo d. Namen in Ceylon), *N. speciosum* W. — *Nelumbiae* Endl., Kl. d. Lotusgewächse, -bonäe DC. *Nelumbien* Bartl.
- Nelumbo** T., G. (sc. Nymphaea) L. (Nymphaeaceen, XIII. 1) rosenfarb. Seerose, *N. nucifera* G., s. *Nymphaea Nelumbo* L., fr. fève d'Egypte (vaterl. Name in Ceylon!), s. *Nelumbium speciosum* W. (*Colocasia* der Römer, Ind. u. Ägypt.). — *Nelumbonäe* DC. *Nelumbien* Bartl.
- 1) **Nematanthus** Schrad., DC. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Fadenblume“ (*νήμα*, -*ατος* Faden u. *ἀνθος* — d. Blume einzeln auf fadendünn. Stielen), Treibh. *N. chloronema* u. *ionema* Mart., s. *Columnnea splendens* Hort. 2) **Nematanthus** Nees (Restiaceen od. Commelyneen, XXII. 3) Fadenblüten-Strickgras, s. *Restio viminalis* L. (— Blüten-decke aus 6 Fäden).

- Nematophycæe** Rabhst. „Fadenalgen“ i. q. Confervæe Ag. (s. v. u. *φύκος* Tang od. Alge).
- Nemaehènes** Cass. (st. **Nematauch.**) (zu *Barkhausia* Rehb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Fadenhalsblume“ (s. v. u. *ἀβήνη*, *-ένος* Hals od. Nacken — Pappus haardünn), z. B. *aculeata* Cass. (Barkh. *aspéra* Rehb.), s. *Endoptera* DC. u. *Crepis* L.
- Nemesia** Vent. (Scrophularineen, XIV. 2) Grossfrucht-Löwenmaul (gr. *Νεμέσια* v. *Νέμεσι*; Rache göttin, Dioscor. Namen eines Löwenmauls!), *N. macrocarpa* Vent. (*Antirrhinum macroc.*), *bicornis* Pers. (*Antirrh. bic.* L.), *Zier. floribunda* Lehm. (*affinis* var. Benth.), *versicolor* E. Mey. m. v. *compacta elegans* Hort., v. *coerulea* u. *alba* Hort.
- Nemolapathum** Ehrh. (sc. *Rumex*) L. (Polygoneen, VI. 3) „Hain“- od. knäulblüt. Ampfer M.-Rehb., s. *Rumex glomeratus* Schreb. (*ρέμος* Hain, Wiese, *λάπαθον* Ampfer).
- Nemopanthes** Raf. (Aquifoliaceen, IV. 4) „Fadenblüte“, Berghülsen Lauch. (v. *νήμα* Faden, *ῥω*, *-τος* Ansehen, *ἄνθη* Blüte — Blüten auf fadendünn. Stielen), *N. fascicularis* Raf. s. *canadensis* DC. (*Prinos lucida* Ait.) etc., s. *Ilex canad.* s. *prunifolia* Mühlb.
- Nemophila** Benth., Bartl. (Boragineen Hydrophyllæen, V. 1) „Waldlieb“, Hainschönchen Leun., Triften- od. Hainblume Vilm. (v. *ρέμος* Hain u. *φιλος* Liebhaber — Standorte), *Zier.*: *N. insignis* Benth. m. v. v., *atomaria* Fisch., Mey. m. v. v. (*crambeoides* Hort. u. *cramb. maculata* Hort., *maculata* Benth., *discoïdalis* Hort. etc.), s. *Hydrophyllum* L., *Phacelia* Juss. u. *Eutöca* R. Br.
- Nenuphar** Hayne (Nymphæaceen, XIII. 1) Höllenkraut, Mummel, Nixblume, fr. *nénuphar* od. herbe d'enfer, e. *nenehare* od. *nénuphar* (*nénuphar* persisch = nicht essbar!), *N. lutëum* Hayne, s. *Nuphar lutëum* Sm. (*Nymphaea* *lut.* L.).
- Neottia** L. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nestwurz“ (*νεοττία* Nest — Wurzelfasern wie ein solches!), *N. nidus avis* Rich. „Vogelnest“, s. *Ophrys* L. u. *Spiranthes* Rich. — *Neottieæ* Lindl.: *Neottia*, *Listera*, *Epipactis* etc.
- Neottidium** R. Br., Schldl. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nestähnliche“, Nestwurz (s. eb. u. *εἶδομαι* gleiche), *N. nidus avis* R. Br., s. *Neottia* *nid. av.* Rich. (*Ophrys* *nid. av.* L.).
- Nepenthæe** Lindl., DC. Kannenträger, Schlauch- od. Kannenpfl. Rmpl., s. *sogl.*
- Nepenthes** L. (Aroideen od. Nepentheen, XX. 3 od. XXII. 13) Kannentrauch, fr. *népente* od. *plante distillante* (gr. *νηπενθής* i. q. *νηπαθής* Leid verscheuchend), *Zier. N. destillatoria* L. (*Bandura zeylanica* Burm.), fr. *bandure*, *N. Phyllamphōra* W. „Blattkrug“ (— Form d. Blüte!), *N. Rafflesiana* Jack, *ampullaria* Jack (Singapore), *villosa* Hook. f. (Borneo) etc.
- 1) **Nepeta** L. (Labiaten, XIV. 1) Katzenminze, -kraut Vilm., „Nepete“ O. W., fr. *menthe de chat*, e. *cat-mint* od. *nep* (*nip*), z. B. *N. Cataria* L., *Zier. N. macrantha* Fisch., *Meyeri* Benth. (*micrantha* Nees) (v. *Nepete* jetzt *Nepi*, Stadt in Etrurien, wo häufig wild! Wtst.), s. *Melissa*, *Thymus* u. *Teucrium*. — *Nepetæe* Rehb. 2) **Nepeta** (sc. *Melissa*) L. (Labiaten, XIV. 1) katzenminzart. Schönminze, s. *Calamintha Nepeta* Sm.
- Nephelium** L. (Sapindac. od. Urticac. Gunneraceen, XXI. 5) „Kletten“-Seifenbeere (*νεφέλιον* dem. v. *νεφέλη* Wolke, alt. Namen der *Bardana* — Frucht hakig, wie Klette), *N. lappacëum* L. *Litschibaum* od. *Zwillingspflaume*, s. *Euphoria Nephelium* DC.
- Nephrodium** Rich., Mchx. (Farne, XXIV. 1) „Nieren“-F. (*νεφροδής* nierenartig — Form d. Fruchthaufen), z. B. *articulatum* Hort.

- Nephrolépis** Schott (Farne, XXIV. 1) „Nierenschuppen“-F. (*νεφροδῶς* Niere, *λεπίς* Schuppe — d. *Indusium nierenf.*!), z. B. *exaltata* Schott, *tuberosa* Presl, etc.
- Neptunéa (-nia)** Lour. (Mimoseen, XXIII. 1) „Neptun's“- od. Wasser-Mimose (n. d. Gott d. Meeres Neptun — d. Pfl. wächst im Wasser), *N. oleracea* Lour., s. *Mimosa* s. *Desmanthus natans* W.
- Nerine** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Nerine“-Narzisse (n. d. Nereïde Nerine od. v. *νηρόδῶς* wasserliebend), Zier. *N. undulata* Herb. (*Amaryllis crispata* Hort.), *sarniensis* Herb. (*Amar. sarn. L.*) „Guernsey“-Lilie (Stubenbl. d. Vorwinters).
- Nerium** L. (Apocynen, V. 1) Oleander, Lorbeerweide, Rosenlorbeer (Lorbeer-Rose), fr. fleur de St. Joseph, oléandre, rosage, e. oleander, rose-bay (gr. *νηρίον* v. *νηρόδῶς* wasserliebend!), Zier. *N. Oleander* L. m. v. v. (z. B. fl. pleno u. fl. albo, splendens fl. pl.) etc.
- Nertēra** Sol., Banks (-ia G., Sm.) (Rubiace. od. Alsineen, IV. 2) „Nertere“ od. Gomozie, Sumpfranke D. (v. Eigennamen? od. *νεοτερόδῶς* unten — nied. Wuchses, steckt m. d. Stengeln in Sumpf), Zier. *N. depressa* G. (*Gomozia granadensis* L. Granadabeeren-Sträuchlein), *N. tetrasperma* H. B. K. s. *assurgens* P.-Thou., s. *Erythrodanum alsineforme*.
- Nesléa (-lia)** Desv. (Cruciferen Nucamentac., XV. 1) Rispen- od. Hohl-dotter Leun., Dötterlein Ö. W., Finkensame (n. d. franz. Bot. J. A. N. de Nesle, schr. *Introd. à la Bot. Poitiers*), z. B. *N. paniculata* Desv., s. *Myagrum* T.
- 1) **Nectouxia** H. B. K. (Solaneen, V. 1) „Nectouxie“ (n. d. Bot. Aut. Hipp. Nectoux, schr. *Diss. de Cassiis aegypt. u. Voyage dans la haute Egypte, 1808*), *N. formosa* Kth., s. *Atropa arenaria* W. 2) **Nectouxia** DC. (Cruciferen).
- Neuendorffia** Adans. (Solaneen, V. 1) peruvian. Schellenblume (n. Neuendorff, von dem Adanson nichts Näheres mitteilt), *N. peruviana repens* Ad., s. *Nolana prostrata* L.
- 1) **Neumannia** Brongn. (Bromeliaceen, VI. 1) „Neumann's“-Ananaspfl. (n. K. Fr. Neumann, Herausg. v. *Marco Polo's Reisen, 1845, Wtst.*: n. d. Obergärtn. Neumann in Paris), s. *Pitcairnea l'Hér.* 2) **Neum.** Rich. (Bixaceen).
- Neurocarpum (-us)** Desv. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Nervenhülse“ (v. *νευρά* Nerv etc., *καυλός* Frucht — jed. Hülsenklappe mit einem Längsnerv), *N. guianens.* Desv., s. *Crotalaria* g. autt.
- Neuroptēris** Brongn. (foss. Farne, XXIV. 1) „Nerven“-F. (s. eb. u. *πτερίς* Farn).
- Nicandra** Ad., Juss., G. (Solaneen, V. 1) „Nicanderblume“, „Männersieg“, Gift-Blausaum, -beere Grck. (n. d. griech. Arzt Nicander in Colophon, 16) v. Chr., od. v. *νικάνω* besiege, *ἀνήρ*, *-δός* Mann — als Gift!), Zier. *N. physaloides* G., e. winter-cherry-like *N.*, s. *Atröpa phys. G.* u. *Calydermos* R. P. (nicht Lag.).
- 1) **Nicotiana** T., L. (Solaneen, V. 1) Tabakpflanze, fr. tabac od. herbe au Grand-Prieur (- à l'ambassadeur, - à la reine), e. tobacco, nicotian (n. d. franz. Gesandt. am portug. Hof Jean Nicot aus Nimes um's J. 1585), Gärt. *N. rustica* L. Bauern-T., fr. tabac rustique od. faux-tabac, *N. havanensis* Lag. (*virginica* Hort.) s. *Tabacum* L., m. v. v., gem. od. *Havanna-T.*, e. true-tabacco, *N. latissima* Mill. s. *macrophylla* Spr. (*Tabacum* L. v. *macroph.* Schrk.) u. *gigantēa* Hort. „Riesen“-T., *Maryland-T.*, *Baumkanaster*, *N. glauca* Grah., *N. longiflōra* Cav. (*angustifolia* R. P.), sehr dekorativ *N. Wigandioides* Hort. 2) **Nicot.** Schreb. (*Gentianeen*, V. 1).
- Nidularia** Bull. (Lycoperdac.-Pilze, XXIV. 4) „Nestchen“, Teuerling Kumm. (dem. v. *nidus* Nest — nach d. Öffnen gleicht d. Pilzchen

- einem Nestchen mit Eiern darin, näml. m. den Peridiolen! Kumm.), z. B. Olla u. crucibulum Topf- u. Tiegel-N.
- Nidularium** Sm. (Bromeliaceen, VI. 1) „Vogelnest“-Bromelie, Blütennest-Perring (v. nidulum Nestchen — Blütenform!), Stuben: *N. fulgens* Lem. (Guzmania picta Rz. Pv.), Scheremetiewii Reg. etc.
- Nidus avis** (sc. Ophrys) L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Nestwurz od. „Vogelnest“, fr. nid d'oiseau (nidus Nest, avis Vogel), s. Neottia n. av. Rich.
- Nierembergia** Rz. Pv. (Solaneen, V. 1) „Nierembergie“ (n. d. span. Jesuiten u. Prof. Joh. Euseb. Nieremberg, † 1663), Zier. *N. gracilis* Hook. (Buen-Ayres), calycina, frutescens Dur., *N. punicea* Hort. (Petunia violacea Lindl.) m. v. v. etc., s. Leptoglossis Benth., Salpiglossis R. P. u. Petunia Juss.
- Nigella** T., L. (Ranunculaceen, XIII. 5) „Schwarzkümmel“, fr. nielle u. nigelle, toute-épice, e. bishop-wort u. fennel-flower (nigella dem. v. nigra — schwarze Samen!), Acker: *N. arvensis* L., fr. nielle des champs, poivrette, Gartenzier. *N. damascena* L. m. v. nana Hort., s. g. Jungfer im Grünen od. Grethchen im Busch, fr. cheveu de Venus etc., e. love in a mist, *N. hispanica* L. m. v. atro-purpurea Hort.
- Nigritella** Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Schwarzstendel“ Seub., Braunelle (v. nigritia Schwärze — schwarzrote Blüt. einiger Arten), z. B. angustifolia Rich. (Satyrium nigrum L., Alpen), globosa Rchb. (Orchis gl. L., Traunsteinera gl. Rchb.).
- Nil** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulaceen, V. 1) arabische od. Nil-Winde, fr. liseron Nil, - de Michaux, étoile du matin (nil d. arab. Name, nicht Fluss Nil! Linné), s. Ipomoea Nil Roth (Pharbitis Nil Chois.) himmelblaue Trichterwinde.
- Nipa** Thb. (Palmen, XXI. 1) Molukken-Strauchpalme (Name auf den Molukken!), z. B. fruticans Thb.
- Niphaea** Lindl. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schneeglume“ (v. νῖψ, -γοζ Schnee — schneew. Blütenhaufen), Treibh. *N. albo-lineata* Hook., rubida Hort. u. Roezlii Reg.
- Niphobolus** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Schnee“-F., Sternhaar-F. (νιφόβολος m. Schnee beworfen — d. Wedel unten schupp. weissfilzig), Kalth. *N. Lingua* Spr. (Jap.), adnascens Kaulf. (Cyclophorus Desv.), s. Polypodium adn. Sw.
- 1) **Nissolia** T. (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Viciaen, XVII. 4) „Nissolle's“-Blatterbse (n. Guill. Nissolle in Montpellier, † 1735). 2) **Nissolia** Jacq. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Amarant-Cayenneholz, blaues Eben- od. Luftholz, *N. arboræa* Jacq.
- Nitella** Ag. (zu Chara Rchb.) (Characeen, XXI. 1) „Armleuchter“ (nitella Leuchter v. nitêo leuchte), z. B. flexilis Ag., tenuissima Desv., gracilis Sm. etc., s. Chara L.
- Nitratia** L., Schreb. (Aizoideen Tetragoniaceen od. Tamariscineen, XI. 1) „Salpeterstrauch“ (gr. νίτρον, lat. nitrum Salpeter — wächst in salz. Wasser Sibiriens, z. B. tridentata Desf. (Casp. Steppe), Schoberi L. (Osýris Gm.).
- Nobla** (**Nobula**) Ad. (sc. Phyllis) L. (Cinchonaceen, V. 1) „Noblastrauch“, canarischer Baldrian (schwerl. fr. noble, lat. nobilis edel, sondern vaterl. Name!), s. Valerianella canariensis frutescens Pluk., simpla Nobla Dill.
- 1) **Noccaea** Rchb. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Nocca-Täschelkraut“ (n. Domenico Nocca, Prof. in Pavia geg. Ende d. 18. Jahrh.'s), s. Thlaspi. 2) **Nocca** Cav. (Noccaea Cass., Jacq.) (Compos. Rolandreen, XIX. 3), s. Lagascea W., z. B. helianthifolia Cass.

- Noisettia** H. B. K. (Violaceen, V. 1 od. XXI. 6) „Noisette's“-Veilchen (n. d. franz. Züchter Léon Claude Noisette, schr. u. a. Le jardin fruitier 1821, 1832/39), z. B. *frangulaefolia* Kth. (Kletterstr. Südamer.), *Roquefeuillana* St. Hil. (*Anchietea* Roq. St. Hil.) etc., s. *Ionidium* u. *Viola longifolia* Hort.
- Nolana** Sw., L. (Solaneen, V. 1) „Cymbelblume“ (v. nola Glöckchen etc. — Blütenform), Zier. N. *prostrata* L., fr. *Nolane couchée*, s. *Teganium procumbens* Schmid. (*Walkeria* Ehret., *Neuendorffia repens* Ad.), *paradoxa* Lindl., fr. N. *paradoxale*, Ampel N. *atriplicifolia* D. Don s. *grandiflora* Hort. m. v. fl. albo Hort., *lanceolata* Miers (*Sorema* l. Miers) etc.
- Nolanea** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Glockenpilz“ (s. eb.), z. B. *pascua*, *fumosa* etc., s. *Agaricus* L.
- Noli tangere** (sc. *Impatiens*) L. (Balsamineen, V. 1 od. XIX. 6) wilde Balsamine, Kräutchen „Rühr' nicht an“ (noli wolle nicht, tangere berühren — d. Samenkapseln springen bei Berühr. auf!).
- Nonnea** Med. (Boragineen, V. 1) „Nonne'sblume“, Braunrichter, -blasenkelch, Runzelnüsschen Leun., Näpflein O. W. (n. d. Bot. J. Ph. Nonne in Erfurt, schr. üb. *Secale* 1764), z. B. *arvensis* DC. etc., s. *Anchusa* u. *Lycopsis* L.
- Nopalëae** (Cactëae) DC. (Cacteen, XII. 1) Cactusgewächse, z. B. *Nopal sylvestre* Thierr.-Menonville *Cocheniillen-Cactus* od. „Wald-Nopal“, s. *Cactus coccinellifer* L. (d. mexik. Name d. Pfl. *nopal-nochotzli*).
- Norantëa** Aubl. (Guttifer. *Marcgraviëen*, XIII. 1) „Norante“-Gummibaum (aus d. vaterl. Namen bei den Galibis *gonora-antegri* geb.), N. *guianensis* Aubl. — *Norantëa* Choisy.
- Nordmannia** Fisch., Mey. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Nordmann's“-Seidelbast (n. A. v. Nordmann). 2) **Nordmanniana** (sc. *Picea*) Loud. (Coniferen, XXI. 9) „Nordmann's“-Tanne od. *Kaukasus-Edeltanne*.
- Nostoc** Vaill., Vauch. (Algen od. Nostochineen, XXIV. 3) Gallertalge, Zittertang, Schleimling Leun., fr. *fleur du ciel*, e. *nostock* (v. *νοστις* od. *νοστις* Nässe), s. *Tremella Nostoc* Pers. (*Linckia Nostoc* Roth). — *Nostochacëae* Endl., Rabhst., -chīnae Rehb.
- Nothochlaena** R. Br. (bess. **Nothochlaena**) (Farne, XXIV. 1) „Bastardrock“, Trugfarn Rmpl. (v. *νόθος* unecht, *γλαίνα* Oberkleid — d. *Indusium* durch Borsten vertreten), z. B. *Terrarien* N. *candida* u. *rufa* Presl (*Acrostichon bonariense* W.).
- Notorrhizëae** DC. „Rückenwurzler“ (sc. *Crucifërae* — hinsichtl. d. Samenkeime!) (v. *νότος* Rücken u. *ρίζα* Wurzel).
- Notylia** Lindl. (Orchideen *Malaxidëen*, XX. 1) „Rückenhöcker“-O. (s. eb. u. *τύλη* Höcker, Wtst. *ἔλη* Basis), z. B. *multiflora* Lindl. etc., s. *Pleurothallis* R. Br. „Seitenblüt“-O. (— nur 1 Stengelblatt, in dess. Achsel d. gehäuften Blüten).
- Nucamentacëae** DC. (sc. *Crucifërae*) Nusschötchenträger (*nucamentum* v. *nux*, -cis Nussfrüchtchen).
- Nuculifërae** Endl. „Nüsschenträger“, i. q. *Asperifoliae* (*nucula* dem. v. *nux*, -cis Nüsschen).
- Nuga** (sc. *Guilandina*) L. (Cassieen *Cäsalpinieen*, X. 1) „Stachelblatt“-*Cäsalpinie*, s. *Caesalpinia Nuga* R. Br. u. *Nugaria* DC. (v. *νύγω* steche — Stacheln an d. Blättern! Wtst.: v. *nugae* Kleinigkeiten, Rumpf beschr. d. Baum unter d. Namen *nugae sylvarum*; bei *Plinius* *Nuga* eine d. *Intybus* ähnl. Pfl.!).
- 1) **Nummularia** (sc. *Lysimachia*) L. (Primulaceen, V. 1) „Pfennigkraut“, „Münzkr.“ O. W., Nabelkr. u. Egel-Felberich O. W., fr. herbe aux deniers (- aux écus), monnoyère, e. money-wort, buck-weed, pennywort (-rot), wild u. Ampeln (v. *nummus* Münze — runde Blätter!).
- 2) **Nummularia** Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Pfennigpilz“ (— weg. d. Form!).

- 3) *Nummularia lactea minor* Rumph. (Asclepiadeen, V. 2), s. *Dischidia nummularia* R. Br.
- Nuphar** Sibth., Sm. (Nymphäaceen, XIII. 1) Nixblume, Mummel O. W., Teichrose Seub. (n. Paxton v. naufar d. i. blau glänzend, arab. Wort für *Nymphaea*, n. Leunis: nenuphar v. ne nicht, nuphar essbar! od. aus *νυγδάριον* dem. *νύμφη* Nympe, Nixe!), Zier. N. album Hort. (*Nymphaea* s. *Castalia alba*), fr. blanc d'eau, nénéuphar blanc, e. water-rose, N. lutéum Sm. (Nymph. *lutéa* L.) s. g. grosses Butterfass, gelbe Kannenblume — Form d. Frucht!
- 1) **Nuttallia** Dicks., Bart. (Malvaceen, XVI. 5) „Nuttall's“-Malve (n. d. nordamer. Prof. Thom. Nuttall), z. B. *digitata* Dicks. (*Sida dig.* Spr.), s. *Callirrhoe* Nutt. 2) **Nuttallia** DC. (Aquifoliaceen, IV. 4). 3) **Nutt.** Torr. u. Gray (Rosaceen, XII. 4).
- Nux vomica** (sc. *Strychnos*) L. (Apocynen, V. 1) „Brechnuss“ (nux Nuss, vomicus brechenerregend, v. vomo breche mich).
- Nyctagineae** DC., Rchb., -gines Juss. „Nyctagineen“ (zu Ord. *Fagopyrinae* Bartl.), s. sogl.
- Nyctago** Juss. (Fagopyrineen Nyctagineen, V. 1) „Nacht“- od. Wunderblume, fr. *nyctage*, belle de nuit (v. *νύξ*, -*νιός* Nacht — öffnet sich in d. Nacht, fr. belle de nuit!), Zier. N. *hortensis* Juss. (*Mirabilis Jalapa* L.) gem. Wunderbl., N. *longiflora* DC. (*Mirab. long.* DC.) m. v. *violacea* Hort.
- Nyctanthes** L. (Sapotac. Jasmineen, II. 1 od. XXII. 1) „Nachtblume“ (s. eb. u. *ἀνθη* Blüte — wie vorh.!), z. B. N. *arbor tristis* L. Trauerbaum (*Scabrita* od. -*tes scabra* L.), *pubescens* Retz. (*Jasminum* p. W.).
- Nycteria** D. Don, Benth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Nacht-Leberbalsam“ (nicht etwa v. *νυκτερινός* nächtlich, sond. *νύξ*, -*νιός* Nacht u. *ἐρινός* lat. *Erinus* — schwärzl. aussehend), Zier.: N. *selaginoides* Benth. (*Erinus* sel. Thb.) u. *capensis* Benth. (*Erinus* cap. L.) s. *lychnidea* L.), s. *Selago Lychnidea* L. f.
- Nymphaea** L., Neck. (Nymphäaceen, XIII. 1) Teich-, See- od. Wasserrose, -lilie, Kandel O. W., fr. lis d'eau, nénéuphar u. plateau, e. water-rose (-lily) (*νυμφαία* od. *νύμφη* Nympe, Nixe), z. B. N. *alba* L. (*Castalia* a. Lk.) m. v. v., N. *Lotus* L., N. *lutéa* L. (Nuphar *lutéum* Sm.) gelbe Nixblume, Kellerwurz, gelbe Kannenblume, gross. Butterfass Vilm., N. *odorata* Ait. (N.-Amer.) u. *nitida* Sims (Sibir.), *versicolor* Roxb. (Ind.), *coerulea* Savigny (Afr.), *ampla* DC. (Amer.) etc. — *Nymphaeaceae* Bartl., DC. etc.
- Nymphoides** T., Fisch. (sc. *Menyanthes*) L. (Gentianeen, V. 1) Seekanne (*Nymphaea* u. *εἶδομαι* gleiche), s. *Limnanthemum peltatum* Gm. s. *nymphaeoides* Lk. seerosenart. Seekanne Grck. (*Villarsia* n. Vent., *Schweykerta Nymphoides* W., Gm.).
- 1) **Nyssa** L. (Santalaceen od. Hamamelideen, XXIII. 2) „Nyssa“- od. *Tupelobaum* Rümpl. (gr. *Νύσσα* Nam. einer Wassernympe), z. B. N. *aquatica* L. s. *denticulata* Catesb. (biflora Mchx., *integrifolia* Ait.), fr. nyse aquatique „Wasserbaum“, e. water-Tupelo-tree (*Tupelo* d. amer. Name!). 2) **Nyssa** R. Br. (Combretaceen, VIII. 1) „Nyssa“-Langfaden, s. *Combretum* Loeffl.
- Nyssanthes** R. Br. (Amarantaceen, XXI. 5) „Stechamarant“ (v. *νύσσα* steche, *ἀνθη* Blüte — deren Abschnitte sind stachlig! Wtst.).
- Obaejaca** Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) (zu *Senecio* L.) Wald-Greiskraut (-Kreuzkr.), z. B. O. *sylvatica* Cass., s. *Senecio silvaticus* L. (*Anagramm* v. *Jacobaea*!).
- Obeliscaria** Cass. (zu *Rudbeckia* Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Säulen“- od. „Obeliskblume“ (gr. *ὀβελίσκος* Spitzsäule, Obelisk

— ähnl. erhöhter Blumenboden!), z. B. pinnata Vent., triloba L. etc., Zier. O. pulcherrima DC. (Tex.) m. v. atro-sanguinea u. aurantiaca Hort.

Oberonia Lindl. (Orchideen Malaxideen, XX. 1) „Oberon's“-O. (n. d. Zaubergott Oberon!), z. B. longibracteata Ldl., anthropophora Ldl. (Ostind.), spatulata Ldl. (Malaxis equitans Blum.) etc., s. Cymbidium, Dendrobium etc.

Obione G. (Chenopodiaceen, XXI. 5) Keilmelde, Salme O. W. (aus Obi, sibir. Strom u. ὄνη Waare etc. geb. Wort!), z. B. portulacoideus Moq.-Tand. (Atriplex L. s. Halimus Wallr. port.), muricata G. (Atriplex sibiricum L.) etc., s. Diötis Schreb. „Zweiohr“-Melde.

Obruthium s. Ostruthium!

Ochna Schreb. (Simarubeen od. Ochnaceen, XIII. 1) Nagelbeere, z. B. parvifolia Vahl (Evonymus inermis autt.) (Str. Arabiens) (v. ὄχνη wilde od. Wurgbirne — Ähnl. m. Birnblättern!). — Ochnaceae DC. (zu Rutaceae Simarubäe Rchb.).

Ochrus Pers. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Blass“- od. „Ocher“-Erbse, s. g. italienische E., fr. ocre (ochre), s. Pisum Ochrus L. (Lathyrus Ochr. DC.) (v. ὄχρος Blässe, bleiche Farbe — gelb. Mark ders.).

Ocimum (nicht **Oeynum**!) L. (Labiaten, XIV. 1) Basilienkraut, wohlriech. Basilikum, fr. basilic, e. basil (gr. ὄκμιον v. ὄζω rieche), O. gratissimum L., fr. marjolaine rouge, O. Basilicum L. poln. Balsam, Presiljenkraut Vilm., gem. Basilie, O. minimum L. m. v. violaceum Hort.

Octandria L., VIII. Kl. „Achtmännige“ (ὄκτω acht, ἀνήρ, -δρός Mann, Staubgefäß).

Ocmeria Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Achtstück“-O. (s. eb. u. μηρόν Hüfte etc. od. μηρός Lende — 8 Pollenmassen), s. Dendrobium Sw.

Oculus Christi (sc. Inüla) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Christusauge“, Christaugen-Alant M.-Rchb.

Oeynum s. Ocimum!

Odontia Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Zahnpilz“ (ὀδούς, -όντος Zahn — Stacheln d. Hutes!), z. B. fimbriata, barba Jovis etc., s. Hydnum L.

1) **Odontites** Spr. (sc. Bupleurum) L. (Umbellifer., V. 2) gelbhüll. Hasenohr M.-Rchb., O. luteola Spr. (Bupl. odont. L. s. aristatum Bartl.) (— Hüllblättchen spitz!). 2) **Odontites** Hall., Pers. (zu Euphrasia Rchb.) (Scrophularineen, XIV. 2) „Zahntrost“ Leun., roter Augentrost, z. B. O. rubra Pers., verna Bellard., lutea Rchb. etc., s. Euphrasia etc. u. Bartsia L. (v. ὀδούς, -όντος Zahn — geg. Zahnweh).

Odontoglossum H. B. K. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Zahnzunge“ (s. eb., γλώσσα Zunge — Labell genagelt u. an d. Bas. m. Kamm versehen), z. B. Hallii Lindl. u. Bictoniense Lindl. (Guatem., prächtig!).

Oedera Crantz, L. (-ia DC.) (Compos. Inuleen, XIX. 5) „Oeder's“-Rindsauge (n. d. Prof. Oeder in Kopenh.), O. prolifera L. (Buphthalmum capense L. f.), aliēna L., hirta Thb. (Str. Cap) etc.

Oenanthe Lam. (Umbelliferen, V. 2) (Rebdolde, Pferdesaat Grck., Würzlering O. W. (gr. οἶνος Wein, ἀνθή Blüte — weg. d. Geruchs!), O. pimpinelloides L., fr. méchon, etc., s. Phellandrium L.

Oenocarpus Mart. (Palmen, XXI. 11) „Weinfrucht“- od. Most-P., Wein-P. Rmpl. (s. eb. u. καρπός Frucht — aus dies. in Brasil. Wein bereitet, s. g. Batava), O. Bacaba Mart. u. Batava ds.

Oenothēra L. (Onagreen, VIII. 1) Nachtkerze, „Weinblume“ Seub., fr. énothère, e. evening-Primrose (gr. οἶνοθήριος Blume, deren Wurzel v. Weingeruch!), Zier u. verwild. O. biennis L. Garten-Rapunzel Vilm, fr. én. bisannuelle, Onagre commun, Jambon des Jardiniers etc., e. biennial ev. Pr., tree-Pr., O. taraxacifolia Sweet

- s. *acaulis* Cav. (*Lavauzia mutica* Spach), *tetraptëra* Cav. (*Hartman-
nia macrantha* Spach), *serotina* Sweet, fr. én. tardive od. d'automne,
glauca Mchx. (Mississippi), *Fraseri* Pursh (N.-Amer.), *Drummondii*
Hook. m. v. v., *versicolor* Hort. (*campylocarpa* Hort., -calyx Koch,
Bouché), *grandiflora* W., *Lamareckiana* Ser. s. *grandiflora* Lam. (non
W.), *Sellovii* Lk. Otto, *Bistorta Veitchiana* Hort. (*Holostigma Bot-
tae* Spach s. *Bistorta* Nutt., *Veitch*, *Sphaerostigma bistortum* Walp.)
etc. — *Oenotheræae* (sc. *Onagræae*) Rchb.
- Oglifa** Cass., Less., DC. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (Compos. Gnaphalieen,
XIX. 4) Feld-Fadenkr. (eins d. Anagramme v. *Filago*! vgl. *Gifola*),
s. *Filago arvensis* L.
- Ohlendorffia** Lehm. (Scrophularineen, XIV. 2) „Ohlendorff'sstrauch“
(n. Dr. Chr. Friedr. Ohlendorff aus Holstein, † auf St. Croix), *O.
procumbens* Lehm. (Cap).
- Oidium** Lk. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Eischimmel“, Traubenpilz,
O. Tuckeri Lk. (*ὄδον* Ei u. *εἶδομαι*).
- Olacineæ** DC. (zu *Sapotacæae* *Styracæae*) Rchb. Stinkholzartige, s. *Olax*.
- Olax** L. (Olacineen od. Sapot. *Styracineen*, III. 1) Kot- od. „Stink-
holz“ (*olax* v. *oleo* rieche, nicht n. *Paxton* v. *ὄλαξ* od. *αἰλαξ*
Furche!), *O. zeylanica* L. (B.), *psittacorum* s. *Fissilia psitt.* Lam.
- Olbia** Med., DC. (zu *Lavatera* Rchb.) (Malvaceen, XVI. 6) „Olbia“
-*Lavatera* (*Lav. Olbia* L.), fr. *Lavatière d'Hyères*, e. downy-leaved
mallow (*Olbia* = *Hyères*, Inseln bei der Provence, wo vorkommend!).
- 1) **Oldenlandia** L. (*Saxifrageen* od. *Cinchonaceen*, IV. 1) „Oldenland's-
strauch“ (n. d. dän. Reisend. H. B. Oldenland, † 1700 in Südafr.).
Garten: *O. Deppeana* DC., s. *Hedyotis* L., *O. biflora* L., s. *Antir-
rhinum humile* etc. *Burm.*, *O. paniculata* L., s. *Mollugo zeyl.* etc.
Burm. 2) **Oldenlandia** Plum. (*Onagreen* *Jussieueen*, X. 1), *O. aqua-
tica* P. Br., s. *Isnardia palustris* L.
- Oldfieldia** Benth. (*Euphorbiaceen*, XXI. 1) afrik. Teakbaum, afrik.
Eichenholz (n. d. engl. Bot. Oldfield).
- Olëa** L. (*Sapotac. Oleaceen*, II. 1) Öl- od. Olivenbaum, fr. *olivier*, e.
olive-tree (lat. *olëa* = gr. *ἐλαία*, celt. *olew* od. *eol* Ölbaum), cultiv.
O. europaea L. gem. Ölbaum, Treibh. *O. fragrans* Thb. (*Osmanthus*
fr. *Lour.*), *O. malabarica* autt. *Nimbobaum*, fr. *carabou*, *O. Oleaster*
Lk. wild. Öl. (Griechenl., Paläst.). — *Oleacæae* Lindl., -*einæae* Lk.,
DC., -*einae* Rchb. (zu *Ord. Ligustrinæ* Bartl.).
- Oleander** (sc. *Nerium*) L. (*Apocynen*, V. 1) *Oleander* etc., s. *Nerium*!
(aus *Olea* u. *ὄριος* Strauch, *Wtst.* -*ander* bedeutet. *ἀνδροειος* männ-
lich, kräftig).
- Oleaster** Hoffmg., Endl. (*Oleaceen*, II. 1), s. *Olëa*! (deter. *Olëa* Ölbaum,
wilder Öl., fr. *olivier*, *olivier sauvage*, e. *oleaster*).
- Oleracæae** Endl., Kl. d. „Gemüsegewächse“ (*olus*, -*ëris* Küchenkraut,
Gemüse).
- Ollaria** (sc. *Lecythis*) L. (*Lecythideen*, XIII. 1) Topf- od. Topffrucht-
baum (*olla* Topf — Ähnl. d. Frucht damit!), s. *Jacapucaya* *Maregr.*
- Olyra** L. (Gräser, XXI. 3) *Einkorn*, *Amelkorn*, *Emmergras*, s. g. *Blicken*
(gr. *ὄλυρα* Getreide, *Einkorn*, *Wtst.* v. *ὄλυω* gelte wenig, bei *Homer*
Gerste für d. *Pferde*!), *O. latifolia* L. (*Jamaica*), *arundinacëa* Hb.
(*Peru*) etc. — *Olyræae* *Nees*.
- 1) **Omphalëa (-ia)** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Nabelschwamm“ (*ὄμφαλός*
Nabel), z. B. *ostreata* Fr. (*Agaricus ostr.* s. *dimidiatus* Bull.) *Austern-
schwamm*, *Buchen-*, *Drehling-*. 2) **Omphalëa** L. (*Euphorbiaceen*,
XXI. 3) „Nabel“-*Wolfsmilch*, *Grübling* D. (— *Staubgef.* auf einem
fleisch. *Nabel*), s. *Omphelandria* P. Br.
- Omphalobium** G. (*Terebinthac.* *Connareen*, XVI. 5) „Nabellappen“
(s. eb. u. *λοβόν* dem. v. *λοβός* *Lappen* etc. — d. *Samen* m. vom

Nabel ausgehend. Arillus), *O. Lambertii* G., s. g. Zebraholz, *O. indicum* G. (Connarus asiat. L.), african. DC. (Conn. afr.) etc.

- Omphalodes** T. (Boragineen, V. 1) „Nabelkraut“ od. -nüsschen Seub., Gedenkemein (Denkmein O. W.), Garten-Vergissmeinnicht (*ὄμφαλῶδης* nabelrund — näml. d. Samen!), Zier. *O. verna* Mch., s. Cynoglossum *Omphalodes* L., *O. longiflora* A. DC. (*Lindelofia spectabilis* Lehm.), *O. Luciliae* Boiss. (Alpen) etc.
- Onagra** T., Scop. (Onagreen, VIII. 1) Nachtkerze (v. *ὄνος ἄγχιος* wilder od. Waldesel — weg. d. Blätter wie Ohren), *O. biennis* Scop., fr. onagre, herbe aux ânes, s. *Oenothera biennis* L. — *Onagrae* Juss., -grariëae DC., -gracëae Grek., -grariae Rchb., -grëae ds.
- 1) **Oncidium** Lindl. (Orchid. Vandeën, XX. 1) „Wulst“- od. Schmetterlings-O. (v. *ὄγκος*, lat. uncus Haken, Höcker etc. — näml. auf d. Labellbasis, u. *εἶδος* Bild, Gestalt), *O. papilio* Lindl. vegetabilischer Schmetterling Leun. 2) **Oncidium** Fr. (Schimmelpilze, XXIV. 4) Schleimhaar od. Papierschimmel, *O. chartarum* Nees, s. *Myxotrichum* Kze.
- Oncosperma** Blum., Van Houtt. (Palmen, XXI. 8) „Bug“ od. Nierensamen-P. (s. v., *σπέρμα* Samen), s. *Nephrosperma* van Houtteana Balf. f., *O. fasciculatum* Blum., filamentosum ds. (Areca Nibung Mart. s. *tigillarum* Jacq.).
- Onobroma** G., DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Eselsfrass“ (*ὄνος* u. *βρώμα* Speise), *O. creticum*, coeruleum, lanatum u. minutissimum Hornem., s. *Carthamus* etc.
- Onobrychëae** (sc. *Hedysarëae*) Rchb., s. *Onobrychis*.
- 1) **Onobrychis** T. (sc. *Hedysarum*) L. (Legumin. *Onobrycheen*, XVII. 4) Esparsette, türkischer Klee (*ὀνόβρυχης* „Eselsfutter“ von *ὄνος* u. *βούρω* beisse etc.), *O. sativa* Lam. gem. Esparsette, fr. sain foin, foin de Bourgogne, plante sacrée, e. cock's-head, esparcet u. sain-foin, auch medick-vetching. 2) **Onobr.** (sc. *Astragalus*) L. (Legumin. Loteen, XVII. 4), s. *Astrag. tenuifolius* L. f. (*Phaca caulescens* etc. Willich).
- Onoclea** L., Sw. (Farne, XXIV. 1) Schminkwurz- od. Roll-F. Dietr., fr. onoclée (n. Vilm.-Rümpl. d. veränd. *ὀνόκλιος* Eselsfutter, Wtst. st. *Onochilus* od. *Onochelis* = *Echium rubrum* bei Theophr., Dioscor., Nicander u. Plinius!), Zier. *O. sensibilis* L. „Fühl“- od. Rossfarn Rümpl.
- Ononis** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Hauhechel, Ochsenbruch, fr. bugrane, arrête-boeuf, e. cammock od. rest-harrow (gr. *ὄνωνις* v. *ὄνος* Esel u. *ὄνη* Kauf od. Waare — andere Lesart *Anonis* „Unnütze“ v. *ἀ* priv. u. *ὀνήνημι* nütze, Wtst.), Zier. *O. Natrix* L. gelbe H., fr. bugr. gluante, *O. rotundifolia* L. (*Natrix* rot. Mch.), *O. frutescens* L., e. shrubby rest-harrow, *O. pinguis* L., fr. mêlitot de montagne, - des sables, etc., wild *O. spinosa*, repens L. etc.
- Onopordon** Vaill. (-um L.) (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Krebs- od. Eselsdistel, Klebe O. W., Kampf- od. Wolldistel, wilde Artischoke Vilm., fr. pédane (pet d'âne „Eselswind“), e. common spear-thistle (s. v. u. *πῶδῃ* F. od. Wind, v. *πέδω* farze — angebl. Wirk. auf d. Esel! Wtst.), wild *O. Acanthium* L., Zier. *O. illyricum* s. elongatum Lam. (horridum Viv.) u. arabicum L.
- Onoseris** W., Cass., DC. (Compos. *Perdicieen* od. *Mutisieen*, XIX. 2) „Eselslattich“, „-salat“ (s. v. u. *σείσις* Salat), Zier. *O. purpurata* W. u. *speciosa* Hb., Bpl. (Neugran.), *O. mexicana* W. (Str.), s. *Atractylis* L.
- Onosma** L. (Boragineen, V. 1) Lotwurz, Walzenglocke, Borstenstengel (gr. *ὄνοσμα* i. q. *ἐνόσειος* Eselslippe, v. *ὄνος* u. *ὄσμη* Geruch u. Geschmack), *O. arenarium* W.

- 1) **Onychium** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Huf“- od. Nagel“-F. (v. ὄνυξ, -υγος, dem. ὄνυχιον Klaue etc. — d. Indusiengabel klauenf. gebogen), *O. auratum* Kaulf. (*Pteris filiculosa* Desv.), *lucidum* Spr. (*Leptostegia luc.* Don) etc. 2) **Onychium** Blum. (Orchideen Malaxid., XX. 1) (— d. äuss. Seitenblätt. d. Blume umgebogen), s. *Dendrobium* Sw.
- Opälus** Ait. (Sapindac. Acereen, VIII. 1 od. XXIII. 1) italienischer od. „Opal“-Ahorn, fr. érable Opale, e. Opal- od. Italian Maple (gr. ὀπίλλος Opal od. Hornkiesel — bez. d. Früchte?), s. *Acer italicum* Lauth. s. *rotundifolium* Lam.
- Opercularia** Rich., Schreb. (Rubiace. Cinchonaceen, IV. 1) „Deckelkelch“, -pflanze D., fr. operculaire (v. operculum Deckel — Kelch m. Deckel), *O. aspera* G. (Rubioides asp. Sol.), *paleata* Young (*Cryptospermum* Pers.) etc.
- Ophianthe** Hanst. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schlangenblüte“, Runzelblatt (ὄφις, -ιος Schlange, ἄνθη Blüte), *O. libanensis* Hanst., s. *Rhytidophyllum floribundum* Van Houtt.
- Ophioearyon (-um)** Endl., Meisn. (nicht -earion!) (Terebinthac. Anacardiaceen, IX. 1) „Schlangennuss“ (s. eb. u. *κάρυον* Nuss — bez. d. Würzelchens und Schwänzchens), z. B. *paradoxum* Van Houtt.
- Ophioglossum** L. (Traubenfarne, XXIV. 1) „Natterzunge“, fr. ophioglosse, herbe sans couture „ohne Naht“, lance du Christ, e. adder's-tongue (s. v. u. *γλώσσα* Zunge — dünne, spitzzulauf. Ähre), *O. vulgatum* L. gem. N.
- Ophiopogon** Curt., Ker (Smilacaceen, VI. 1) „Schlangenbart“, e. adder's-beard (s. v. u. *πάγων* Bart), Zier. *O. spicatus* Ker (*Liriöpe* spic. Lour.), *O. japonicus* Curt. (*Convallaria* jap. L.), fr. O. du Japon, herbe aux turquoises, e. japanese adder's-b., *O. Jaburan* Lodd. (Stubenpfl.).
- Ophiorrhiza** Forsk. (Cinchonac. od. Contorten, V. 1) „Schlangenzwurzel“, e. snake-root, tarragon (s. v. u. *ρίζα* Wurzel — diese geg. Schlangenbisse), z. B. *O. Mungos* L. — *Ophiorrhizæe* (sc. Contortæe) Rchb.
- Ophioscorodon** Don, Wallr. (sc. Allium) L. (Liliaceen, VI. 1) „Schlangenschlauch“, Perlzwiebel, Rockenbolle Grck., fr. rocambolle (-quembole), s. *Allium sativum* L. v. *Ophiosc.* Hort. Knoblauch (Perlzwiebel-Kn.) (s. v. u. *σκόροδο*n Knoblauch — Staubfäd. wie Schlangenzungen).
- Ophioxylon** Burm. (-um L.) (Apocynaceen, XXIII. 2) „Schlangenhholz“, fr. serpentine (s. v. u. *ξύλον* Holz — dies. geg. Schlangenbisse angew.), Treibh. *O. serpentinum* L. (Str. Ind.).
- Ophrys** L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Ragwurz, Fliegenkraut, Insekten-O. Leun., fr. fleur-aillée (gr. ὄφρυς Augenbraue — weg. d. gebog. Form d. Kelchblätt.!), z. B. *apifera* Huds., *muscifera* ds. etc. — *Ophrydæe* Lindl.
- Oplismenus** Kth. (**Hoplis.**- P.-B., Woods) (Gräser, III. 1) „Waffen“- od. Stachelgras, Kraftklaue Perring (gr. ὀπλισμένος bewaffnet — Stachelgrannen!), *O. crus galli* Kth. (*Panicum* cr. g. L.) s. g. Hühnerhirse, Zier. *O. imbecillis* Kth. (*Panic.* imb. Trin.) etc., s. *Orthopogon* R. Br. u. *Echinochloa* P.-B.
- Opobalsamum** (sc. *Amýris*) L. (Terebinthac. Amyrideen, VIII. 1) „Balsamsaft“, Mekkabalsam M.-Rchb., fr. xylobalsamum, e. opobalsam (gr. ὀπός Saft etc.), s. *Balsamea meccanensis* Gled.
- Opopanax** Koch (nicht -ponax L., Pers.) (sc. *Pastināca*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Heilwurz“ (gr. ὀπός τοῦ Παναζοῦς Saft der „Allesheilpfl.“, v. *πάς* od. *πάν* alles u. *ἀκτέω* od. *ἀκτέομαι* heile).
- Oporanthus** Herb., Röm. (Amaryllideen, VI. 1) „Herbstblume“ (ὀπώρα Herbst, ἄνθος — blüht wie *Colchicum* im Herbst!), s. *Amaryllis Hippeastrum* Herb. u. *Sternbergia* sect. *Oporanthus* Röm.

- Oporina** Less. (-nia Don) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Herbst“-Apargie, *O. autumnalis* Don = *Apargia autumnalis* W. s. *Leontodon* aut. L. (ὄπωρονος herbstlich).
- 1) **Opūlus** T. (sc. *Viburnum*) L. (Caprifoliaceen, V. 3) Schneeball, Wasser-schlinge, -holder, m. v. v., fr. Viorne Obier (Obier d'Europe), boule de neige, pain-blanc, rose de Gueldre, e. ople-tree, snow-ball, Gelderose od. marsh-elder (lat. *Opulus* ursprüngl. Feldahorn, von ὄπλος Saft? st. *populus* Pappel, Wtst. — unsicher!). 2) **Opulus** Mch. subg. v. *Viburnum* L., z. B. noch *V. Oxycoccus* Pursh, *acerifolium* L. u. *orientale* Pall.
- 1) **Opuntia** Endl. Kl. d. Cactusgewächse. 2) **Opuntia** T. (sect. v. *Cactus* Rchb.) (Cacteen, XII. 1) Cochenillen-Cactus, Nopal, Feigendistel, fr. poirier piquant (lat. *Opuntia* opuntisch, v. *Opus*, -untis Stadt in Lokris — d. Pfl. im östl. Griechenl. wild), Topf: *O. vulgaris* Mill. (*Cactus Opuntia* L.), fr. *Nopal vulgaire*, *Raquette* etc., e. common indian fig, *O. microdasys* Lehm. „pinselborstige“, *O. Rafinesquina* Engelm., *O. Ficus indica* Mill. etc.
- Orania** Mart., Blum. (Palmen, XXI. 6) „Oranien“-P. (n. d. holl. Dynastie Nassau-Oranien), Zier. *O. regalis* Blum. (porphyro-carpa Mart.) (Java), *arvensis* Becc.
- Orbēa** Haw. (Asclepiad., V. 2) „Kreiskronen“-*Asklepias* (orbis Kreis — d. Krone vor ihren Zipfeln m. gross. erhahn. Kreis!).
- Orchidacēae** Grck., -ides Juss., -idēae DC., Rchb. Orchideen, Stendeln od. Knabenkräuter, s. *Orchis*.
- Orchidinae** Bisch., DC. Kl. d. Orchideen¹⁾, s. *Orchis*.
- Orchidocarpus** Mchx. (-um Rich.) (Ranunculaceen Annonaceen, XIII. 6) „Hodenfrucht“ (v. ὄρχις, -ιδος Hode, καρπός Frucht), z. B. *grandiflorus* Mchx. etc., s. *Asimīna* Spr. u. *Porcelia* R. P.
- Orchis** L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Knabenkraut, Stendel, Ragwurz, Kukuksblume etc., fr. couillon de chien „Hundehode“, e. orchis, goat's-stones „Geissteine“, bee- od. gnat-flower, stander, adder-grass etc. (gr. ὄρχις Hode — solche Knollen an d. Wurzeln!), z. B. *O. morio* L. Salep-O. (s. *Morio*), *O. mascula* L., fr. testicule de prêtre, *O. militaris* L., fr. capette, Gauchblume Wolff, etc.
- Oreocallis** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Bergzierde“ (v. ὄρος, -εος Berg, κάλλος, τὸ d. Schönheit — auf Bergen in Peru!), Treibh. *grandiflora* R. Br. (*Embothrium* gr. Lam.) etc.
- Oreodaphne** Nees (Lauraceen, IX. 1) „Berg“- od. „Felsenlorbeer“ Rmpl. (s. eb. u. *Δάφνη* Lorbeer — berglieb. Lorbeer!), z. B. *californica* Nees (B.), *regalis* Reg. etc.
- Oreodoxa** W. (-xia Hb., Kth.) (Palmen, XXI. 8) „Bergruhm“, -palme (s. v., δόξα Ruhm etc. — Zierde d. Berge in Südamer.), z. B. *regia* Hb., Kth. (*Oenocarpus* reg. Spr.), *O. oleracea* Mart. Kohlpalme (*Arēca* ol. Jacq.), s. *Euterpe caribaea* Spr., etc.
- Oreopanax** Decsn. (Araliaceen, V. 5) „Bergheil“ (s. v. u. πάναξ od. πανακίης alles heilend) (zu *Aralia* L.), z. B. *O. peltatum* Lind.
- Oreoselinum** Hoffm. (zu *Peucedanum* Mch. od. *Athamanta* L.) (Umbelliferen, V. 2) „Bergsilje“, fr. persil de montagne, e. parsley-pert Steinewpich (s. v. u. σέλινον Silje), *O. legitimum* M. B. (*Peuced.* *Oreoselinum* Mch., *Atham.* *Oreosel.* L., *Selinum* *Oreos.* Scop.).
- Origānum** T. (Labiaten, XIV. 1) Dosten, Majoran, eig. „Bergschmuck“ (st. *Oreogānum*!), fr. origan, e. organy (gr. ὀρίγανον v. ὄρος, -εος Berg u. γάνος Schmuck — Stand u. Geruch!).

1) Einteilung: a. Malaxidēae, b. Epidendrēae, c. Vandēae, d. Ophrydeae, e. Neottiēae, f. Arethuseae, g. Cypridēae.

- Orlaya** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Orlaye“, Breitsame (n. Joh. Orlay, Arzt etc. in Moskau), *O. grandiflora* Hoffm. (Caucalis gr. L., *Platyspermum* Koch).
- Orleana** Hort. s. *Orellana* (sc. *Bixa*) L. (Bixaceen, XIII. 1) „Orleanbaum“ (Wst.: wächst an den Ufern des Orelhana = Marañon od. Amazonenstrom), s. *Arbor mexicana* Bauh.
- Ornēnis** Cass. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Schösslingblume“ (v. ὄρνεινος Spross etc. — oben blattlose Stengel), z. B. *nobilis* J. Gay, s. g. römische Kamille, s. *Anthemis nob.* L.
- Orniscus** DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Halsbandschote“ (gr. ὄρνισκος dem. v. ὄρνις Band — Schote schnurförmig).
- Ormosia** Jacks. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Rosenkranzbohne“ (v. ὄρνις Reihe, Kette — bez. d. Hülse!), *O. dasycarpa* Jacks., s. *Podaliria* Poir. s. *Robinia coccinea* Hort. u. *Sophora monosperma* Sw.
- Ornithocephalus** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Vogelkopf“ (ὄρνις, -ιθος Vogel, κεφαλή Kopf — langschnäbl. Columna).
- Ornithogalum** L. (Liliaceen, VI. 1) „Vogelmilch“ od. Milchstern, fr. ornithogale, lait d'oiseau, e. star of Bethlehem (s. eb. u. γάλα Milch — milchw. Blüten), z. B. wild u. Garten: *umbellatum* L. weisse Feldzwiebel od. gem. Hühnermilch Schmidl., fr. fleur od. dame d'onze heures, churle, e. unbelled star of Bethl., Winterbl. *O. arabicum* L. „Stern v. Arabien“, ferner Zier. *O. pyramidale* L., fr. épi de lait, *O. pyrenaicum* L. span. Bethlehemstern, etc.
- Ornithopus** L. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) „Vogelfuss“, Klauenschote, Vogelklaue Seub., fr. ornithopode, pied d'oiseau, bois de merle (s. v. u. πους Fuss), z. B. *perpusillus* L. (*Ornithopodium* Bauh.), gebaut *O. sativus* Brot. s. g. *Serradella*.
- Ornitröphe** Comm., Juss. (Sapindaceen, VIII. 1) Vogelfutter, -pfeffer D. (v. ὄρνις den Vogel betr. u. τροφή Nahrung — Fr. von d. Amsel begier. aufgesucht! Wst.), s. *Schmidelia* L.
- Ornus** Scop., Pers. (sc. *Fraxinus*) L. (Sapotaceen Oleaceen od. Fraxineen, II. 1) Manna- od. Blüten-Esche, Blumen- u. Zwerg-Esche Vilm., fr. orne (-nier), frêne à la manne, e. manna-ash (*ornus* gr. ὄρνεινος Berg-Esche v. ὄρος Berg), Zier. *O. europaea* Pers. (*Fraxinus* *Ornus* L. s. *florifera* Scop.), fr. ornier commun, Buch- od. Wald-Esche, e. european flowering ash, m. v. v., *O. mannifera* Hort. s. *rotundifolia* Pers. (*Frax. rot. Ait.*), fr. Frêne à la manne, e. oriental manna ash, eigentl. Manna-Esche, *O. floribunda* G. Don (*Frax. flor. D. Don*), fr. Frêne du Népaul, e. abundant-flowering-ash, *O. americana* Pursh (*Frax. am. L.*, *Frax. Orn. am. Lodd.*), fr. Fr. à fleurs d'Amérique, e. american Flowering-Ash.
- Orobanche** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Ervenwürger“, Sommer- od. Sonnenwurz, Braunschupper Leun., Hanfwürger u. Kleeteufel, fr. herbe aux taureaux (- du lion), e. broom-rape (v. ὄροβος Erve od. Erbse, ἄγγω erwürge — Hülsenfr. umwindend).
- Oröbus** T., L. (Legumin. Vicien, XVII. 4) Kicher- od. Walderbse, fr. orobe, e. bitter-vetch (gr. ὄροβος Erbse etc. v. ὄρω errege u. βούς Ochse — gut. Rindviehfutter), Topf: *O. aureus* Stev., ferner Zier. *O. vernus* L. (*Lathyrus vern.* Wimm.), s. g. Waldkicher, m. v. v., *atro-purpureus* Desf. (Algerien), *flaccidus* Wald Kit., *lutēus* L. s. *montanus* Scop. (*Lath. mont. Godr. Gren.*), *niger* L. (*Lath. niger* Wimm.) etc.
- 1) **Orontium** L. (Araceen, VI. 1) Kalmus, Wasserähre D. (v. ὄρω errege? od. v. Fluss Orontes in Syrien? — wächst im Wasser), z. B. *aquaticum* L., *japonicum* L. (*Rhodia jap. Endl.*). 2) **Orontium** Pers. (sc. *Antirrhinum*) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Orant“ od. Feld-

Löwenmaul, fr. orange od. tête de cochon (v. ὄρος Berg? Wtst.), s. Orontium arvense Pers. — Orontiaceae DC., Bartl.

- Orphium** E. Mey. (Gentianeen, V. 1) „Rot-Enzian“ (v. ὄρφος, lat. furvus braunrot? od. ὄρφιον dem. v. ὄρφος, lat. orphus Orfe, ein Fisch? Wtst.: n. Orpheus, der wie Chiron in d. Heilkunde erfahren! — unsicher!), Zier. O. frutescens E. Mey. (Str. Cap), s. Chironia decussata Vent.
- Orthoceras** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Geradhorn“ (ὄρθος gerade, κέρας Horn — d. äuss. Blumenblätt. aufrecht linienförm!), z. B. strictum R. Br. (ähnl. Diuris Sm.).
- Orthosanthus** Sw. (Irideen, III. 1) „Geradblumen“-Schwertel (s. eb. u. ἄνθος — d. Blum. nicht gebückt, wie Gladiolus!), z. B. chimboracensis Bak. (Moraea gladioloides s. chimb. H. B. K.).
- Orthospermum** R. Br. i. q. Orthosporum Ness., P. M. E. s. sogl.
- Orthosporum** Ness., P. M. E. (Chenopodiaceen, V. 2) „Geradsamen“ s. v. u. σπορά i. q. σπέρμα Sam. — d. Samen steht vertikal, z. B. glaucum u. rubrum P. M. E., s. Chenopodium etc.
- Orthostachys** R. Br. (Boragineen, V. 1) (zu Heliotropium T.) „Geradähren“-Heliotrop (s. v. u. σταχὺς Ähre — diese in d. Jugend nicht spiralg), z. B. H. fruticosum L.
- Orthostemon** R. Br. (Gentianeen, V. 1) „Geradfaden“-Enzian (s. v. u. στήμων, lat. stamen — d. Staubfäd. gleich lang, d. verblüht. Antheren gerad, nicht verdreht, wie Erythraea).
- Orthothecium** Schott., Endl. (Sterculiaceen, XI. 1 od. XVI. 7) „Geradkapsel“-Sterkulie (s. v. u. ἄρνη Behälter — d. Kapsel nicht gedreht, wie Helicteres).
- Orthotrichum** Hedw. (Moose, XXIV. 2) Haarmoose, Goldhaar, eig. „Geradhaar“ (s. v. u. ῥοιξ, ῥοίχος Haar — d. Zähne d. Peristoms gerade), z. B. crispulum u. affine (an Waldbäum.). — Orthotrichaceae Schimp. Goldhaarmoose Leun.
- Orvala** L., DC. (Labiaten, XIV. 1) „Orvelkraut“ Vilm., grossblum. Taubnessel (franz. orvale, was aber eig. Salvia Hornimum), Zier. O. lamioide DC., fr. lamier orvale, e. large-flowered dead-needle (Lamium Orvala L.), O. garganica L. f. (Papia g. Mnch.).
- Orzya** L. (Gräser, VI. 2) „Reis“, fr. rizon, e. rice (v. d. arab. eruz). — Oryzæe Kth.
- Osbeckia** L. (Myrtac. Melastomaceen, VIII. 1) „Osbeck's“-Myrte (n. d. schwed. Bot. P. Osbeck), Treibh. O. chinensis L., aspæra Wight u. Arn., stellata Don (kl. Str.), ornata Sw. (Melastoma orn. Hort.) etc. — Osbeckiæe DC.
- Oscillaria** Bosc (Fadenalgen, XXIV. 3) „Schwingfaden“, fr. oscillaire (v. oscillo „oscilliere“ od. schwinde hin u. her), s. Oscillatoria Vauch. — Oscillariaceae Rabht. „Schwingfadenalgen“.
- Osmanthus** Lour. (Oleaceen, II. 1) „Duftblume“ (ὄσμη Duft, ἄνθος Bl.), O. fragrans Lour. = Olea fragr. Thb. (jap. Thee-Parfum).
- Osmites** L., Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 3) „Duft“- od. Kampherblume (v. ὄσμη Duft — riecht stark nach Kampher), O. camphorina L. (Bellis camphorifera Seb.), calycina L. (Lapeirousia c. Thb.) etc.
- Osmunda** L. (Farne, XXIV. 1) Rispen- od. Trauben-F., Mondraute, fr. osmonde, e. osmund, moonfern (-wort), Zier. O. regalis L., s. g. Walpurgiskr., spectabilis W. etc. (n. d. sächs. Gott Osmund, Wtst. d. skandinav. Gott Osmunder, Beinamen d. Thor!). — Osmundacæe R. Br., Rhb. Traubenfarne Seub.
- Osteospermum** L. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) „Knochen“- oder „Beinsamen“ Rmpl., fr. porte-collier (ὀστέον Knochen, σπέρμα Samen — d. Achenen knochenhart!), O. moniliferum L. „Paternosterstrauch“ Rmpl., s. Bidens calendulacæa Thb.

- Ostericum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Osterick“ O. W., Mutterwurz (st. ἰστέριον v. ἰστέρα Gebärmutter, Leun.; d. veränderte Ostruthium! Wtst.), früher zu Imperatoria T.
- Ostruthium** (sc. Imperatoria) L. (Umbelliferen, V. 2) Meisterwurz (v. ὄστρουα Auster, lat. ostrum Purpursaft? Wtst. v. στρούθος Sperling — Gestalt d. Blüten, wie ein flieg. Vogel!), s. Selinum Imperatoria Crantz.
- Ostrya** L., Mich. (Amentac. od. Cupuliferen, XXI. 8) Hopfenbuche, Hartholzbaum (ὄστρια od. ὄστρέον Muschel — weg. d. Kätzchenschalen!), O. vulgaris W. (carpinifolia Scop. s. italica Spach), s. Carpinus Ostrya L., fr. Ostryer commun, e. hop-hornbeam, m. v. quercifolia Hort., O. virginica W. (Carp. virg. Abbot s. triflora Mnch. etc.), fr. charme de Virginie, e. virginian horn-beam.
- 1) **Osýris** L. (Santalaceen, XXII. 3) Harn- od. Weissstrauch, Sanddorn (gr. ὄσυρις od. ἄζυρις i. q. Chenopodium Gänsefuss, Wtst.: viell. Gott Osiris d. Ägypter!?), z. B. O. alba L. (Littorale), O. rhamnoides Scop. (Hippophaë rhamn. L.), fr. rouvet, s. g. Poeten-Cassie, Wolff. 2) **Osýris** Gmel. (Aizoideen Tetragoniaceen, XI. 1) Salpeterstrauch, s. Nitraria Schoberi L.
- Otaacanthus** Lindl. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ohr-Acanthus“ (v. οἶς, ἄτος Ohr u. Acanthus Bärenklau), Warmh. O. caeruleus Lindl.
- Othonna** L. (Compos. Senecionideen, XIX. 4) „Schleierblume“, Linnenbl. (gr. ὄθοννα v. ὀθύνη Linnen, Schleier — poröse Blätt.! Wtst.), z. B. crassifolia L. (Hertia Less.), abrotanifolia L. (Cineraria abr. Berg. etc.).
- 1) **Otidëa** (-dia s. -dium Lindl.) (zu Pelargonium l'Her.) (Geraniaceen, XVI. 5) „Trappenschnabel“ (v. ὠτίς, -ίδος Trappe v. οἶς, ἄτος Ohr — Ohrfedern!), z. B. Treibh. O. carnosa Sweet (Str. Cap), dasycaulon Sweet, etc., s. Pelargonium l'Hér. 2) **Otidea** (-dia) Fock. (Becherpilze, XXIV. 4) „Ohrenbecher“ (s. eb. u. εἶδομαι gleiche).
- 1) **Otites** Sm., Otth. (sc. Silëne) L. (Sileneen, X. 3) „Ohrlöffel“-Leimkraut (gr. ὠτίτης ohrähnlich), s. Cucubalus Ot. L., Lychnis Ot. Scop. 2) **Otites** (sc. Polypodium) L. (Farne, XXIV. 4) „Ohrenwedel“-F.
- Ourisia** Juss., Comm., Pers. (Scrophularineen, XIV. 2) „Ourisie“ (nicht οὐρία Schwanz, ἰσὺς gleich, sond. Wtst.: n. Ouris, Gouv. d. Falklandsins., von dem Commerson d. Pfl. erhielt!), Zier. O. coccinea Pers. (Dichrōma cocc. Cav.) (Anden).
- Ouvirandra** P.-Thou. (Najadeen od. Alismaceen, XXI. 1) Spitzenblatt, O. s. Hydrogëton fenestralis Pers. madagassische Gitterpfl. oder Wasser-Yam (v. ouvi Yam u. rano Wasser, Wtst.: auf Madagask. ouvirandu!).
- 1) **Oviëda** L. (-dia DC.) (Verbenac. od. Caprifoliaceen, XIV. 2) „Oviëdie“ (n. Oviedo y Valdes, Gonçalo Fernandez de, schr. Sumario . . . de las Indas, Toledo 1526), z. B. O. mitis L. (Clerodendron siphonanthus R. Br.). 2) **Oviëda** Spr. (Irideen, III. 1) „Oviedo's“-Schwertlilie, z. B. anceps Spr., falcata Spr., bracteata ds. etc., s. Meristostigma A. Dietr. u. Lapeyrousia Gawl.
- Oxalëae** Rehb., -lidëae DC., Rehb., -lidacëae Grck. Sauerkleeartige, s. Oxälis.
- Oxälis** L. (Oxalideen, X. 4) Sauerklee, Sauer O. W., fr. oxalide u. surelle, pain du coucou, oseille des bois (- des pâques), e. wood-sorrel, cuckoe's-sorrel (v. ὄξυς scharf, sauer, ἄλις, -λις Salz — weg. d. Kleesalzgehalts), wild O. Acetosella L., Zier. O. floribunda Lehm., rosëa Jacq., Valdiviensis Barnéoud, tropaeoloides Hook., versicolor (Cap), Deppei Sw. (Mex.), Bowiei Lind. (Cap), corniculata L. v. fol. atro-purp. Hort., etc.

- Oxyacantha** (sc. Crataegus) L. (Rosac. Pomaceen, XII. 2) gem. Weissdorn, eig. „Scharf“- od. „Spitzdorn“ (nicht „Sauerdorn“, was Berberis!), fr. mai, oxyacanthé u. épine-blanche (aubépin), e. white-thorn, haw-thorn „Hagedorn“ (ὄξυς spitz etc., ἄκανθα Dorn), Zier. v. v. fl. puniceo, fl. albo pleno u. fl. rubro-pleno Hort.
- Oxyandra** DC. (Tiliaceen, XIII. 1) (zu Sloanea L.) „Spitzantheren“-Sloanebaum (s. v. u. ἄνθηρα, -δρως Mann, Staubbeutel — diese lang zugespitzt).
- Oxyanthus** DC. (Rubiaceen. Cinchonaceen, V. 1) „Spitzblume“ (s. v. u. ἄνθος — spitzlaufende Kronzipfel!), Treibh. O. speciosus DC. s. tubiflorus, versicolor Van Houtt. etc., s. Gardenia tubiflora Andr. (Str. Afr.) etc.
- Oxybaphus** (-os) l'Hér. (Nyctagineen, V. 1) „Farbspitzen“-Nachtblume (s. v., βαφή Färben v. βάγω od. βάπτω tauche ein etc. — d. Blüt. an d. Zweigspitzen m. gefärbt. Perigon!).
- Oxycarpus** Lour. (Guttiferen, XI. 1) „Scharf“- od. „Sauerfruchtbaum“ (s. v., καρπὸς Fr. — Frucht u. Blätter von sehr saurem Geschmack).
- Oxycedrus** (sc. Juniperus) L. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) span. od. Cedern-Wachholder Rmpl., fr. Cade, Cèdre piquant, e. sharp-cedar od. brown-berried Juniper (— spitze Cederblätter!).
- Oxyceros** Lour. (Rubiaceen, IV. 1) „Spitzhornpfl.“ (s. v. u. κέρας Horn — m. spitz. hornförm. Stacheln bes.).
- Oxycoccus** (-us) T., Rich. (Ericaceen Vaccinieen, VIII. 1) „Scharf“- od. „Sauerbeere“, Kranich- od. Moosbeere, fr. canneberge, e. moss-, fen- od. cran-berry (s. v. u. κόκκος Beere etc. — sehr saure Beeren!), O. macrocarpa Rich., s. Vaccinium Oxycoccus L. (Schollera Ox. Roth).
- Oxydendron** DC. (Ericaceen Andromedeen, X. 1) „Sauerbaum“ (s. v. u. δένδρον B. — saure Blätter!), O. arborum DC., s. Andromeda arb. L.
- Oxylobium** Andr. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Spitzhülsen“-Str. (s. v., λόβιον dem. v. λοβὸς Hülse — diese spitz!), O. capitatum Benth., cordifolium Andr. (Str. Neuholl.), retusum R. Br. (Podolobium cori-acèum DC.) etc., s. Gompholobium Sm., Pultenaea Sm. u. Chorzema Lab.
- Oxypetalum** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) Spitzblume, „Spitzenkrönchen“ Vilm., Rmpl. (s. v. u. πέταλον Kronblatt — Kronzipfel spitz!), Zier. O. coerulum Decsn. (Tweedia coer. Don s. versicolor Bot. Mag.).
- Oxytropis** DC. (Leguminos. Astragaleen, XVII. 4) „Spitzkiel“, -fahne, Fahnwicke, Wirbelkraut (s. v. u. ὄξυς Schiffskiel — d. Carina läuft in eine Spitze aus!), s. Astragalus L.
- Oxyura** DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Spitzschwanz“ (s. v., οὐρά Schwanz — d. Blüten am Ende d. ob. blattlosen, rauhen Zweige), Zier. O. chrysanthemoides Lindl. (Californ.), s. Callichróa Douglasii Torr. u. Gray.
- Ozodia** Wight (Umbelliferen, V. 2) „Wohlgeruchdolde“ (gr. ὄζωδις aromatisch riechend).
- Ozölis** Spr. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Übelgeruch“-Sammetblume, „Stinkblume“ (gr. ὄζολις d. Stinkende, Übelriechende), s. Tagetes multiflora Hb., Bpl.
- Ozophyllum** Schreb. (Diosmeen, V. 1) „Stinkblatt“ (v. ὄζω rieche, φύλλον Laub — stinkende Blätter!).
- Pachira** Aubl. (Oxalideen Bombaceen, XVI. 8) weisser Prachtwollenbaum, „Dickwollenbaum“ (v. παχίς dick, ἄριον Wolle, Wtst. Name d. B.'s in Guiana!), P. alba Aubl. (Carolinäa a. Lodd.), aquatica Aubl. (Carol. princeps L.), s. g. Cacao sauvage.

- Pachites** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Dickähren“-O. (s. eb. — d. Blüt. in dicken, steifen Ähren!).
- Pachycarpus** E. Mey. (Asclepiadeen, V. 2) „Dick“- od. „Feistbalg“- (s. v., *καρπός* Frucht — d. Balgkapsel bauchig aufgeschwollen m. schwammigen Wänden!).
- Pachydendron** Haw., W. (Liliaceen, VI. 1) „Dickbaum“-Aloë (zu Aloë L.) (s. v., *δένδρον* B. — gedrängte Gipfelblätter!).
- Pachyphytum** Lk., Ott., Kl. (Crassulaceen, V. 1) „Dickpflanze“ (s. v., *φυτὸν* Gewächs — fleisch. Staude!), Zier. P. bracteosum Klotzsch (Echeveria br. Lindl.) (Hstr., Mex.).
- Pachyrrhizus** Rich. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Dickwurzel“- od. Knollenbohne (s. v. u. *ρίζα* Wurzel — diese dickknollig u. essbar!), P. tuberosus Spr. (*Dolichos bulbosus* L. s. tuberos. Lam., *Strizolobium* tub. Spr.).
- 1) **Padus** Mill. (sc. Prunus) L. (Amygdaleen, XII. 1) Ahl- od. Traubenkirsche, Vogelkirsche, Ölbeerbaum Wolff, Silberregen Vilm., fr. cerisier à grappes, laurier-putier „Stinklorbeer“, e. fowl-cherry-tree m. v. v. (Theophr. *πάδος* urspr. = Prunus Mahaleb, viell. Padus = Fluss Po, Wtst.). 2) **Padus** Lauch. (sect. v. Prunus) Traubenkirschen, z. B. noch Pr. Lauchiana Bolle, virginiana L., serotina Ehrh. etc.
- 1) **Paederia** L. (Apocynen od. Contorten Carisseen, V. 1) „Stinkwinde“, Knackbeere, fr. danaïde (v. paedor Gestank — sehr übl. Geruch d. Pfl.), z. B. foetida L. (*Lygodysodea* foet. R. P., *Convolvulus* foet. Rumph.), fragrans Lam. (Danais fr. Balf. f.) (Ins. Maurit.). 2) **Paederia** Wight (Rubiaceen, IV. 1).
- Paederōta** L. (Scrophularineen, II. 1) „Päderastenblume“, „Knabenliebe“ (gr. *παιδέωσις*, -ωσις i. q. *παιδεραστῆς* Knabenschänder), z. B. P. Ageria s. lutea L. (*Wulfenia Ageria* Vahl).
- Paeonia** T., L. (Ranunculaceen, XIII. 2) Pfingst-, Königs- od. Bauernrose, fr. péone od. pivoine, fleur royale, - de mallet „Felleisen“-Bl., e. peony (paeony) (n. Plin. v. Paeon Gott d. Ärzte, od. n. Päonien ben., wo wild wachsend, Wtst.), Zier. P. officinalis L. Putennie od. Gichtrose etc., fr. Pivoine des jardins, e. shop-Paeony, m. v. v. (P. femina L.), P. tenuifolia L. (offic. var.) (Sibir.), P. paradoxa Andr. s. peregrina Mill., P. albiflora Pall. (sinensis Poit.), P. corallina Retz. s. mascula L., fr. piv. mâle od. corail, P. Witmanniana Bot. Reg., P. arborēa Don (P. Moutan Sims) etc. — Paeoniaceae Rchb., Bartl.
- Palafoxia** L., Lag. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Palafoxblume“ (n. d. span. General u. Vert. v. Saragossa, Palafox), Zier. P. texana DC., Hookeriana.
- Palāva** Rz. Pv. (-via Cav.) (Malvaceen, XVI. 8) „Palavie“ od. „Palau“-Malve (n. A. Palau y Verdera, Prof. z. Madrid im 18. Jahrh.), Zier. P. flexuosa Masters „bogenstenglige“, malvifolia L. (*Malope parviflora* l'Hér.) etc.
- Paliurus** T., G. (Rhamnaceen, V. 1) Stech-, Christus- od. Judendorn, fr. nerprun paliure, porte-chapeau (gr. *παλιουροσ* urintreibend v. *πάλλω* treibe, *οἴον* Harn — soll harntreibend wirken), P. australis G., s. Zizyphus Paliurus W. s. aculeata Lam. u. Rhamnus Paliurus L.
- 1) **Pallasia** L. (sc. Calligonum) l'Hér. (Polygonaceen, VIII. 2) „Pallas“-Knöterich (n. d. russ. Nat. u. Reis. Pallas), z. B. caspica L. (*Pterococcus aphyllus* Pall.). 2) **Pallasia** Ait. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Schönauge, z. B. procumbens Spr. (*Encelia* proc. Kth.), halimifolia l'Hér., s. *Coreopsis limensis* Jacq. Schönauge von Lima (Peru). 3) **Pallasia** Scop. (Gräser, III. 2) „Pallasgras“. 4) **Pallasia** Van Houtt. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Pallas“-Duftraute.

Palmaeae Bartl., DC., Rchb., -mae Juss., Kl. od. Ord. d. Palmen (gr. *πάμμα* das Geschwungene od. *πάμμα* Schild, lat. parma, lat. palma Palme).

Palmella Lyngb. (Nostochineen, XXIV. 3) Schleim- od. „Zitteralge“ (v. *παλμός* das Zittern), s. Coccochloris. — Palmellaceae Näg., -melleae Kütz. Zitter- od. Gallertalgen.

1) **Panāces** (sc. Heraclēum) L. (Umbelliferen, V. 2) „Allheil“-Bärenklau (*πάναιες* allesheil. Kraut, „Panacee“, *πᾶς* od. *πάν* u. *ἀκέραι* heile), s. Heraclēum aspērum M. B. s. pubescens Vilm. (grosse Gartenzierdölde!). 2) **Panāces** carpimon Cold. (Araliac., V. 5 od. XXIII. 2) canad. Aralie, s. *Aralia racemosa* L. (Christophoriana canadensis Moris.) (*ζάρπιμος* Früchte tragend).

1) **Panax** L. (Araliaceen, XXIII. 2) „Allheilpflanze“, Kraftwurzel D. (gr. *πάναξ*, -*αξος* i. q. *πανακίης* Alles heilend; Plinius führt 4 *πανακίης* an: asclepische, heraklische, chironische u. centaurische), z. B. P. Schin-seng Nees, e. ginseng, echte Kraftwurz od. Ginseng Leun., fr. mandragore de la Chine, P. crassifolius Decsn. (*Aralia trifoliata* Hort.). 2) **Panax** aculeatus Ait. (Terebinthac. Zanthoxylen, XXII. 2) Stachel-Kraftw., s. *Zanthoxylon trifoliatum* L. (d. vorigen identisch?).

Paneratium Herb., L. (Amaryllideen, VI. 1) Trichter- od. Narzissenlilie, Gilgen od. Kraftblume, fr. pancrais (-cratier) (v. *πανκρατίης* Alles beherrschend — stärkende Heilkr.), Zier. P. illyricum L., maritimum L. Meerstrands-Narzisse od. Meerlilie, fr. lis-narcisse (-Matthiole), caribaeum L., speciosum Salisb. (Hymenocallis spec. Herb.).

Pandānus L. f. (Pandaneen, XXI. 1) Palmkolbe, Schraubenbaum, fr. pandanier, e. screw-tree (v. d. malayisch. pandang = ansehnlich), z. B. Candelabrum P.-B. „Leuchterbaum“, P. utilis Bory (Madag.), Treibh. graminifolius, odoratissimus L. f. (*Atrodactylis* Forst.), javanicus m. v. variegatus Hort. etc. — Pandanēae R. Br., DC. (zu Ord. Aröideae Bartl., DC. Palmkolben).

Panīcum L. (Gräser, III. 2) Fennich, Hirsegras, Hirse, fr. panic, pied de coq, e. french-wheat, panic-grass (v. panis Brot? wahrsch. v. panica Rispe, Wtst.: *πανικη* Perücke v. *πανικός* panisch, den Pan betr.), geb. P. miliacēum L. gem. Hirse, Zier. virgatum L. „rutenhalm“, fr. panic effilé, plicatum Lam. m. v. v. (fol. niveo-vittatis, fol. varieg., P. capillare Gron. (*Eragrostis elegans* Hort., non Nees), P. altissimum Desf. Guineagrass, s. g. Mohar od. Riesenschwaden (maximum Jacq.).

Papāver T., L. (Papaveraceen, XIII. 1) Mohn, (verdorb.) Pfaffen, fr. pavot, e. poppy (v. papa Papp, d. i. verdickte Milch, u. verum wahr — früher z. Einschläf. d. Kinder), geb. P. somniferum L. m. v. v. Gartenmohn (z. B. monstrosus Hort. s. polycephalum Hort. u. Mursellii Hort. (chines. Gart.-M.) — s. g. Päonienmohne), P. Rhoëas L. Klatschrose m. v. v. (z. B. fl. pleno, s. g. Ranunkelmohn), P. bracteatum Lindl., P. orientale L. (Kaukas.), fr. P. d'Orient od. du Levant, e. eastern Poppy, P. cambricum L. engl. M., P. nudicaule L. (Sibir.), crocēum Ledeb. etc. — Papaveraceae DC., Rchb. (-rēae Rchb.).

1) **Papaya** T., Juss. (sc. Carīca) B. (Peponiferen, XXII. 9) Melonenbaum, fr. papayer, melonifère u. lolotier, e. papaw od. melon-tree (malayisch. Name papaia-maram), P. vulgaris Lam. (Caric. Pap. L.), sylvestris Rumph., fr. champada, s. Bergera Koenigii L. f. (B. Ost-ind.). — Papayaceae Mart. (zu Peponiferae Bartl.).

Paphinia Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Paphinie“, d. i. Paphia- od. Venus-O. (v. Paphia Zuname d. Venus n. d. Stadt Paphos auf Cypern), T. cristata Lindl. (Guyana), s. Maxillaria.

- Papilionacéae** L., Rchb. „Schmetterlingsblütige“, fr. papilionacées (v. papilio Tagfalter — Gestalt der Leguminosen-Blüten!).
- Papiria** (-**πυρία**) Thunb. (Amaryllideen, VI. 1) Lustlilie, Papierlilie D. (v. papȳrus Papierstaude — Blätt. wie Papierrollen u. m. trockner Hautscheide), s. Gethyllis L.
- Pappophōrum** Schreb. (Gräser, III. 2) „Dunenträger“, Federgras D. (gr. *πάππος* Grossvater, davon lat. pappus Greisenhaar od. Federkronen — Ähre ein seidenglänzend. Büschel!), z. B. gracile R. Br. (Enneapōgon gr. Desv. „Neunbart“, alopecuroides Vahl (Stüdamer.).)
- Papyrifera** Vent., s. Broussonetia papyrif. Vent. (Moreen, XXII. 4) Papier-Maulbeerbaum, „Papiertägerin“ (papȳrus u. fēro — Bast zu Papier benutzt!).
- 1) **Papȳrus** Bruce, W. (Cyperaceen, III. 1) „Papiersstaude“, fr. jonc papyracé (gr. *πάπυρος* i. q. *βίβλος* od. *βύβλος* Papierbinse), P. antiquorum W. = Cȳperus Papȳrus L. 2) **Papȳrus japonica** Lam., s. Morus s. Broussonetia papyrifera Vent. Papier-Maulbeerbaum (s. eb.).
- Paradisía** Mazzucati (Liliaceen, VI. 1) „Paradies“ (Eigenname Paradiis! schwerl. *παράδεισος* Baum- od. Paradiesgarten!), Zier. P. Liliastrum Bertol. unechte Zaunlilie, s. Czackia s. Anthericum Liliastrum L.
- Parallosa** Alfd. (Leguminos. Viciéen, XVII. 4) einblüt. Erve, P. monanthos Alfd. (Ervum m. L.), s. Vicia monantha Koch (Cracca monanthos Godr. Gren. (gr. *πάραλος* v. *παρά* bei u. *ἄλος*, -ος See, Eilschiff — weg. d. Schiffchens d. Blüte? — unklar!).
- Pardalianches** (sc. Doronicum) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Gemswurz, „Leopardenwürger“, Schwindelkraut, fr. doronic, herbe aux panthères, e. leopard's-bane od. panther-strangler (gr. *παρδαλιανχέ;* sc. *φάρμακον* Arznei, woran d. Panther erstickt), s. Doronicum austriacum Jacq.
- Pardanthus** Ker (Irideen, III. 1) „Pantherblume“ (*πάρδος* Panther, *ἄνθος*; Bl. — pantherfleckige Bl.!), P. chinensis Ker (Moraea chin. Thb.).
- Pareira** (sc. Cissampelos) L. (Menispermeen, XXII. 13) gebräuchl. Grieswurz, portug. u. fr. Pareira brava d. i. wilder Weinstock, fr. auch vigne sauvage, liane en coeur (- tête de serpent).
- Parellus** (sc. Lichen) L. (Flechten, XXIV. 3) „Wandflechte“ (fehl. st. parietellus v. paries, -ētis Wand!).
- Pariāna** Aubl., Schreb. (Gräser, XXI. 7) „Guianagras“ (guian. Name dess.!), z. B. glauca Nees, campestre Aubl.
- Parietales** Endl. „Wandfrüchtige“ (v. paries, -ētis Wand — an d. Fruchtwänden befest. Samen!).
- Parietaria** T., L. (Urticaceen, XXIII. 1) „Wand“- od. Mauerkraut, Glas-, Peterskr. etc., fr. casse-pierre, perce-muraille, herbe de Nôtre-Dame, e. pellitory of the walls, parietary, Peterswort (s. eb.), s. Perdicium G. Frank.
- Paris** L. (Melanthaceen, VIII. 4) Einbeere, Wolfs- od. Fuchsbeere, fr. raisin de rénard od. herbe paris, e. herb-Paris od. true love (v. par, -is Paar — gleiche Vierzahl aller Teile), P. quadrifolia L. gift. Einbeere (Wald).
- Parkia** R. Br. (Mimoseen, XXIII. 1) „Mungo-Park's“ -Mimosa (n. d. ber. schott. Reis. Mungo-Park, † 1805 in Afrika), P. africana R. Br., s. Inga biglobosa s. senegalensis u. Mimosa taxifolia Pers.
- Parmelia** Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Schild“- od. Schüsselflechte (v. parma Fechtschild — Form d. Fruchtlagers!), z. B. conspersa Ach., usneoides ds. etc.
- Parnassia** T. (Saxifragaceen, V. 3) Ein- od. Herzblatt, Leberblume, fr. fleur du Parnasse, Parnassie, fleur hépatique, hép. blanche noble

(n. d. Berg Parnassus bei Delphi, d. Sitz d. Musen). — Parnasiæa Rechb. (zu Cistifloræ Bartl.).

Parochëtus Hamilt. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Grabenbohne“ (*παρά* bei, *ὄχρητος* Graben, Canal — kriechende Uferkräuter!) Ampel *P. communis* Ham. (Westind.).

Paronychia T., Juss. (Portulacæen Illecebreen od. Paronychæen, V. 1) „Nagelkraut“ (gr. *παρωνυγία* Nietnagel — Aussehen d. Deckblätt. u. geg. Fingerkrankh.), z. B. *serpyllifolia* Lam. (Illecëbrum s. Vill.). — Paronychiacæe St. Hil., -iæe DC.

Parrotia C. A. Mey. (Hamamelideen, IV. 2) „Parrotie“ (n. F. Parrot, Arzt z. Heilbronn, † 1841, Prof. z. Dorpat), z. B. *P. persica* C. A. Mey. (Hamamelis p. Fisch.).

Parthenium (sc. *Pyrethrum*) Pers. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Jungfernkraut“, Mutterkraut, fr. *parthénie*, *espargoutte*, *petit-muguet* (v. *παρθένος* Jungfrau — gegen Frauenkrankheiten gebr.; *Παρθένιον* bei d. Alten noch andere, z. B. *Parietaria*, *Chrysocöma* etc. Wtst.), s. *Matricaria Parthenium* L., Zier: v. v. (z. B. Teppichg. aurëa, e. golden-feather). 2) **Parthenium** L. (Ambrosiaceen, XXI. 5) „Jungfernbrume“, z. B. *P. Hysterophorus* Vaill. „Gebärmutterträger“, *integrifolium* L., s. *Villanova* Lag. Spr.

Paspalum L. (-lus Mnch., Flügge) (Gräser, III. 2) Pflannengras, fr. *pas-pale*, *cérésie* (gr. *πάσπαλος* Hirse aus *πάσ* ganz u. *πάλη* Mehl), z. B. *digitatus* Mnch., s. *Digitaria pilosa*.

1) **Passerina** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Spatzenstrauch“, „Sperlingskraut“, Vogelkopf D., Spatzenzunge, fr. *passerine* (v. *passer* Sperling — Samen wie ein Vogelskopf), Zier. *P. filiformis* L. u. *grandiflora* L. f. (Cap), *hirsuta* L. (Metnam Forsk., Sanamunda Breyn) (Str. Südfrankr.). 2) **Pass.** Wickstr. (sc. *Stellera*) L. (Thymeläac., VIII. 1) Spatzenkraut, fr. *le grémil d'Allemagne*, s. *Passerina annua* Wickstr. 3) **Pass.** (sc. *Erica*) L. „Sperlingsheide“.

Passiflora Juss., L. (Asclepiad. Passifloreen, XVI. 2) „Passionsblume“, fr. *fleur de la passion*, *grénadille*, e. *passion-flower*, *granadille*, *virginian-climbre* (v. *passio* Passion od. Leiden Christi — n. Ferrari in d. Blume d. Zeichen der Leiden Christi od. Marterwerkzeuge zu finden), Balkon: *P. coerulea* L., *hermesina* Lk., Ott. (Rio Janeiro), *edulis* Sims (Bras.), fr. *grénadille*, e. *water-lemon*, *racemosa* Brot., *quadrangularis* L. (Peru) etc. — Passifloræe Juss. (zu Asclepiadæe Rechb. od. Peponifæe DC.).

Pastinaca T. (Umbelliferen, V. 2) „Pastinak“, Zuckerwurzel, fr. *panais*, e. *parsnep* (-nip) (v. *pastinum* Hacke — womit d. essb. Wurzeln ausgemacht wurden, Wtst. v. *pastus* Nahrung!), *P. sativa* L. m. v. *urens* Requien.

Patientia (sc. *Rumex*) L. (Polygoneen, VI. 3) Garten-Ampfer, s. g. englisch. Spinat, fr. *patience* u. *parelle*, e. engl. *spinage* (v. *patientia* Geduld — lässt sich immer wieder schneiden! Wtst.: von langsam. medicin. Wirkung!).

Pattersonia R. Br. (Irideen, III. 1) „Patterson's“-Schwertel (n. W. Patterson, engl. Cap-Reis., schr. *Narrative of four journeys etc.* London 1789).

Paulinia Schum., L. (Sapindaceen, VIII. 3) „Paullinie“, fr. liane, *Paulinie* (n. d. Bot. Paullini), z. B. *P. asiatica* L., fr. liane *épineuse*, *P. australis*, *barbadensis*, *caribaea*, *multiflora*, fr. liane à persil, etc., s. *Seriana* Schum., *Scopolia* Sm. etc. — Paulliniæe Rechb.

Paulownia Sieb. u. Zucc. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Paulownienbaum“, Blauglockenb., Zierb. *P. imperialis* S. Z., fr. *Paulownie imperiale*, e. *imperial* P. (n. Anna Paulowna, russ. Grossf. u. Gemahlin d.

- Prinz. Friedrich d. Niederlande), s. *Bignonia tomentosa* Thb. u. *Incarvillea tom.* Spr.
- Pavetta** Rheed., L. (Rubiaceae, Cinchonaceae, IV. 1) „Pavetta-Baum“, Scheel- od. Schellkorn D. (malabar. Name d. B.'s!), z. B. *P. indica* L., *australis* Hook., *pentandra* Sw. (*Psychotria Pavetta* Sw., Bstr. Ostindiens) etc.
- Pavia** Boerh. (zu *Aesculus* L.) Rchb. (Sapindaceae, Hippocastaneen, VII. 1) „Paw's“-Rosskastanie (n. Pet. Paw, im 16. Jahrh. Prof. in Leyden), Zierb. *P. rubra* Lam. (*Aesculus Pavia* L.), e. american small buck-eye, *P. lutea* Poir. Wangenh. (*Aesc. flava* DC.), fr. pavier jaune, e. amer. sweet buck-eye, *P. humilis* G. Don, Lodd. (*Aesc. Pavia* var. *humilis* Hort. u. v. *atro-sanguinea* Hort.), *P. alba* Poir. s. *edulis* Hort., *P. discolor* Pursh (*Macrothyrsus discolor* Spach), *P. s. Aesc. glabra* W., *P. s. Aesc. rosea* Arb. Musc. etc.
- Pecten** DC. i. q. *Pecten-Veneris* (sc. *Scandix*) L. (Umbelliferae, V. 2) „Kamm-Kerbel“, „Venuskamm“ (*ecten*, -inis Kamm — zweireihig bebart. Fruchtschnabel).
- Pedicularis** T., L. (Scrophulariaceae, XIV. 2) „Läusekraut“, Rodel O. W., fr. *pédiculaire*, *crête de coq*, e. lice-bane, louse-wort (v. *pediculus* Laus — früh. Anwend. geg. d. Läuse u. Samenform).
- Pegänium** L. (Rutaceae, XI. 1) „Feistraute“ (*πήγανον* Raute, Wtst.: v. *πήγνυω* erhitze? — Geschmack u. Wirkung!?) vielmehr *πήγω* od. *πήγνυμι* schlage, befestige, *πήγος* feist etc. — angebl. weg. d. fleisch. Blätter, F. W. Riemer), z. B. *P. Harmala* L. = *Πήγανον ἀργιόν* Diosc.
- 1) **Peireskia** Spr. (auch -quia u. **Pereskia** Plum., Pers.) (zu *Cactus*) Rchb. (Cactaceae, XII. 1) „Peiresce's“-*Cactus*, Baum-C. (n. Nic. Fabric de Peiresce, lat. *Peireskios*, in Aix, † 1637, schr. üb. Pflanzenkultur), z. B. *P. aculeata* Plum. u. *portulacaefolia* (Cact. *Pefreskia* Pers. u. port. L.). 2) **Pereskia** Fl. Flum. (Theaceae, XIII. 1) (zu *Hippocratea* L.).
- Pelargonium** l'Hér. (Geraniaceae, XVI. 5) Kranich- od. „Storchschnabel“ (v. *πελάργος* Storch, aus *πελός* schwarz u. *ἀργός* weiss — schnabl. Frucht!), Zier. *P. peltatum* Ait. (Ephedra-Geranium d. Ampeln), zonale W. m. v. v. u. *inquans* Ait. m. v. v. (— Scharlach-Geranie d. Gärt. u. Stuben) u. daraus Blendlinge od. Hybriden, P. grandiflorum W. s. g. Blumisten-P. m. v. v. u. Hybriden, e. fancy-Pel. d. i. „Phantasie“-P.; *P. capitatum* Ait. dichtsöld. Stuben-P., *P. odoratissimum* Ait. s. g. Citronen-Ger., *P. roseum* Hort. (*rosodorum* Hort., *radula roseum* W.) Rosen-Ger., *quercifolium* Ait. etc.
- Pelecyphora** Ehrbg. (Cactaceae, XII. 1) „Beilträger“ (*πέλεκτος* Beil, *φορός* tragend — Rutenbündel d. röm. Consuln!), *P. aselliformis* Ehrbg. „Rutenbündel“-C. (*Fascies*-C.), s. *Melocactus* C. Bauh.
- Pelagrina** (sc. *Alstroemeria*) L. (Liliaceae, VI. 1) bunte *Alstroemerie* M.-Rchb., „Pilgerin“ (*pelegrinus* st. *peregrinus*, fr. *pelerin* Pilger, Fremdling).
- Peloria pentandra** L. (Scrophulariaceae, V. 1 od. XIV. 2) Frauenflachs, Fünffaden-Leinkraut, s. *Linaria vulgaris* Mill. Abnormität (gr. *πέλωρ*, -ος Ungetüm, Monstrosität — ausgeart. Form!).
- Peltandra** Raf. (Araceae, XXI. 1) „Scheiben“- od. „Schildbeutel“-*Aron* (*πέλιτη* Rundschild, *ἀνήθη*, -δος Mann, Staubbeutel — dies. schildförm.), *P. virginica* Raf., s. *Arum* L.
- Peltanthera** Roth (Apocynaceae, V. 1) „Schildanthere“ (s. eb. u. *ἀνθηρά* — d. Antheren hängen m. d. Mitte wie Schildchen an d. Narbe).
- Penicillaria** W., Sw. (Gräser, III. 1 od. XXIII. 1) „Pinselgras“, s. g. *Duhn* (v. *penicillum* Pinsel — Ährchen in Grannen gehüllt), z. B. *spicata* W. (*Holcus spic.* L.), s. *Pennisetum typhoideum* Pers. (Ostind.).

- Penicillium** Lk., Pers. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Pinselschimmel“ (s. eb.), z. B. *glaucum* Pers., *candidum* Grev., s. *Botrytis sparsa* Spr.
- Pennisetum** Rich., P.-B. (Gräser, III. 1) „Federborstengras“ (penna Feder, seta Borste — Ährchen in gezähnte Borsten gehüllt), Zier. *longistylum* Hochst. (Abyss.) s. *villosum* u. *angustifolium* Hort., s. *Gymnothrix* Hb. „Nackthaar“.
- Penstemon** Ait. (**Pentst.**- l'Hér., **Pentastemon** l'Hér., Hort.) (Scrophularineen, XIV. 2 od. V. 1) „Fünffaden“, Bartfaden Rmpl. (*πέντε*, in compos. *πέντα*- fünf, *στήμων* ὀ d. Staubfaden — deren hier 5 st. 4!), Zier. *gentianoides* G. Don m. v. v. (*Chelone* g. Hb. Bpl. Kth.), *pubescens* Ait. s. *hirsutus* W., s. *Chelone* *Penstemon* L. (*Cynorhynchium* nov-anglicum Pluk.), *heterophyllus* Hort., *hybridus* Hort., *P. Digitalis* Nutt. (*Chel. Dig. Sweet*) etc.
- Pentadesma** Don, R. Br. (Guttiferen Garcinieen, XVIII. 2) „Fünfbündel“, Butterbaum, *P. butyracea* Don (s. eb. u. *δέσμη* Bündel — d. Staubfäden in fünf Haufen).
- Pentandria** L., V. Kl. „Fünfmännige“ (s. v., *ἀνήρ*, -*δρός* Mann, Bot. Staubgefäß!).
- Pentapetes** L. (Sterculiac. od. Büttneriaceen, XVI. 7) „Fünfblatt“- od. Scharlach-Malve (*πενταπέτες* i. q. *πεντάφυλλον* Fünfblatt — fünfteil. Laub, Kelch u. Kapsel), *P. phoenicea* L., s. *Cavanillea* phoen. Gm. (*Dombeya* ph. Cav.).
- Pentapterigium** flavum s. *Pentapteris*! sogl.
- Pentapteris** Hall., DC. (Onagreen Halorageen, XXI. 8) „Fünfflügel“-Tausendblatt (s. v. u. *πτεροίς* od. *πτερον* Flügel), s. *Myriophyllum* L. u. *Pentapterophyllum* Dill.
- Pentapterophyllum** Dill. (Onagreen Halorageen, XXI. 8) „Fünfflügelstengel“ (s. v. u. *φύλλον* Laub — Blätt. zu fünf in Quirlen), s. *Pentapteris* Hall.
- Pentaria** DC. (Asclepiad. Passifloreen, XVI. 2) „Fünfblatt“-Passiflora (zu *Murucua* T., Aubl.) (v. *πεντάς* Fünzfahl — Perigon aus 10 Teilen).
- Pentarrhaphia** Lindl. (schlecht **Pentaraphia**!) (Bignoniaceen, XIV. 2) „Fünfnahrt“, bauchige Gesnerie (s. v. u. *δαφνή* Naht — Kelchröhre fünfrippig), *P. cubensis* Decsn., s. *Gesneria* *ventricosa* Hort.
- Pentas** Benth. (Cinchonaceen Hedyotideen, V. 1) „Fünfappenblume“ (*πεντάς* Fünzfahl — je 5 Teile!), Treibh. *P. carnea* Benth. (*Sipanča* Hort.), *carnea rosea* Van Houtt.
- Penstemon** s. *Penstemon*!
- Peperomia** Rz. Pv. (Piperaceen, II. 3) (zu *Piper* L.) „Pfeffergewächs“ Rmpl. (v. *πέπερι* Pfeffer u. *όμός* gleich), z. B. Stuben-Blattpfl. *P. arifolia* Miq. v. *argyrea* Hort. (*marmorata* Hook.), Warmh. u. Stub. *resediflora* Lind., *Verschaffelti* Lem.
- 1) **Peplis** (sc. *Euphorbia*) L. (Euphorbiaceen, XI. 3) Meerstrands-Wolfsmilch (*πεπλίδς* od. -*ος* Kleid — bedeckt d. Erde nach all. Seiten, Wstst.? wohl weg. d. Deckblätter!). 2) **Peplis** L. (Lythrarieen, VI. 1) Bachbucgel, Sumpfwendel Seub. (*Peplis* bei Plinius das Kraut *Portulak*). 3) **Peplus** (sc. *Euphorbia*) L. (Euphorbiaceen, XI. 3) Garten-Wolfsmilch, „Gewand“-W. (v. *πέπλος* Gewand — weg. d. Hüllblätt.!).
- Pepo** T. (sc. *Cucurbita*) DC. (Cucurbitaceen, XXI. 10) gem. Kürbis, „Phebe“ od. „Pfebe“, fr. *pepon* od. *potiron*, e. *pompion* (pumpion) od. *pumkin* (gr. *πέπων*, lat. *pepo* Melone, Pfebe, v. *πέπων* reif), Zier. u. geb. *C. Pepo* v. *aurantiformis* Hort. „Apfelsinen“-K., v. *verrucosa* Hort. „Warzen“-K., v. *piriformis* alba, *striata* u. *annulata* Hort., v. *maliformis* u. *malif. praecox* Hort.
- Peponiferae** Endl., Bartl. Kürbisfrüchtige od. „Pfebenträger“ (s. eb. u. *fēro* trage).

- 1) **Perdicium** L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Rebhuhn“-Lattich (v. perdux, -ïcis Rebhuhn — soll v. Rebhühn. ausgescharrt werden), *P. lactucoides* Vahl (Aster magellanicus Lam.), brasiliense L., chilense W. etc., s. Tussilago. 2) **Perdicium** DC. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1), *P. Taraxaci* Vahl (semiflosculare Thb., Cap). 3) **Perdicium** G. Frank (Urticaceen, XXIII. 1), s. *Parietaria* T.
- Pereskia** s. *Peireskia*!
- Peretta** Risso (Aurantiaceen, XVIII. 2) „Perette“, Limette, Bergamotte (ital. peretta Birnchen, dem. v. pera Birne), s. *Citrus Limetta* Risso.
- Perfoliata** Burm. (-tum G. Fr.) (Umbelliferen, V. 2) „Durchwachs“-Hasenohr (per edulis Thb., folium Blatt — d. Stengel scheint durch dass. hindurchgewachsen!), s. *Bupleurum longifolium*, *rotundifolium* etc. L., Bruchwurz: z. B. *montana* u. *alpina* Bauh. etc.
- Perforaria** Chois. (Hypericineen, XVIII. 2) durchstochenes Johanniskr., s. *Hypericum perforatum* L. (perforo durchbohre — durchsichtige Punkte in d. Blätt.).
- Pergularia** L. (Asclepiadeen, V. 2) „Laubenstrauch“ D., fr. *pergulaire* (v. *pergūla* Durchgang, Rebengeländer — wozu d. windende Str. geeignet), z. B. *edulis* Thb., *purpurea* Vahl (Asclepias *cordata* Burm.) etc.
- Periclymenum** Mill. (sc. *Lonicera*) L. (Caprifoliaceen, V. 1) deutsches od. Wald-Geisblatt, Specklilie, fr. *chèvre-feuille* des bois, e. woodbine, common honey-suckle (gr. *περιζλόμενον* rankend. Strauch!), *P. vulgare* Mill. (Lonic. *Pericl.* L.), s. *Lonicera germanica* Dietr. (Caprifolium *Per. R. Sch.*).
- Perigynia** Juss. (Mono-Perigynia, sc. Monocotyledones) „Umweibige“ (*περὶ* herum, *γυνή* Weib, Stempel — diese um- d. i. nicht ober- noch unterständig!).
- Perilla** L. (Labiaten, XIV. 1) „Perille“, Grossmelisse (indisch. Name d. Pfl.!), *P. ocimoides* L. (*Melissa maxima* Arduino), Zier. *P. nankinensis* Decsn. m. v. *atro-purpur.* fol. *laciniatis* Hort. (Blattpfl.).
- Peripetalia** Juss. „Umkronblättrige“ (*περὶ* herum, *πέταλον* Kronblatt — letztere stehen um die Stempel herum, nicht höher oder tiefer!).
- Periplōca** L. (Asclepiadeen, V. 2) Baumschlinge, fr. *périploque* (gr. *περιπλοκή* Umschlingung — Schlingstrauch), Zier. *P. graeca* L. griech. Seidenrebe od. Hundsschlinge, s. g. Maltheserkreuz Rmpl., fr. *Pér. de la Grèce*, e. greek *P.*, -silk-tree.
- Peristaminia** Juss. mit „umständigen“ (nicht ober- noch unterständig.) Staubfäden (s. v. *stamen*, -ïnis).
- 1) **Peristēra** (-ia) Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Tauben“-O. (*περιστέρα* Taube — schnablige Frucht), z. B. *P. elata* Hook. 2) **Peristēra** DC. (Geraniaceen, XVI. 4) Tauben-Ger., s. *Pelargonium l'Hér.*
- Peristylus** Lindl. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Umgriffel“-O. (s. v., *στύλος* Säule, Griffel), z. B. *albīdus* Lindl. (*Habenaria* Sw., *Gymnadenia* R. Br., *Orchis albīda* Scop.).
- 1) **Peronia** Rêd., Cord. (Cannaceen, I. 1) „Peron's“-Bl. (Wtst.: n. Fr. Peron, unter Baudin Reis. in d. Südsee, † 1810), z. B. *stricta* Rêd. (*Thalia dealbata* Fras. Sow.). 2) **Perona** Pers. (Zitterpilze, XXIV. 4) „Peron's“-Zitterpilz.
- Peronospora** Tul., Cord. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Bohrschimmelpilz“ (v. *περονάω* durchbohre, *σπορά* Spore, Helm.-Rabst.: v. *περόνη* Spitze — d. Spore sitzt an den stachelspitz. Enden d. Seitenzweige), *P. infestans* Casp. s. *effusa* Rabst. Kartoffelpilz (— Trockenfäule der Kartoffel).
- Perōtis** Ait., Schreb. (Gräser, III. 2) „Stummelgras“ (*περότης* od. *πῆρος* verstümmelt — äuss. kleine, wehrlöse Kronspelzen), z. B. *latifolia* Ait. (*Saccharum spicatum* L., *Alopecurus malabaricus* Scheuchz.).

- 1) **Persēa** G. (sc. *Laurus*) L. (Lauraceen, IX. 1) „Perseus“-Lorbeer, Gärtner's heiliger Baum Ägyptens (n. d. Halbgott Perseus, nicht: von Persien), *P. caryophyllacēa* G. Nelkenzimmetbaum, *P. gratissima* G. vegetab. Schmalz (pericarpio butyracēo), echter Abacate- od. Advokatenbaum Leun., *P. indicā* G. Madera- od. falsches Mahagoniholz. 2) **Persēa** (*Laurus* sect. *Rchb.*), z. B. *Laurus* s. *Persea* *Cinnamomum*, *Camphōra* u. *Cassia* L.
- Persīca** T. (Amygdalaceen, XII. 1) „Pfersichbaum“, fr. pécher, e. peach-tree, melicotony (gr. *περσική*) die Persische — stammt aus Persien), Zier. *P. vulgaris* Mill. fl. pleno Rosen-Pf., v. *coccinēa*, v. v. *versicolōr*, *camelliaeflōra* u. *dianthiflōra* Hort., Gartenobst: *P. vulgaris* Mill. (*Amygdalus* *Persīca* L. u. *sibirīca* Pall.) m. v. v., z. B. fr. grosse Mignonne.
- 1) **Persicaria** (sc. *Polygonum*) L. (Polygonaceen, VIII. 1) Flöhkraut-Knöterich, fr. persicaire (v. *Persica* s. eb. — weg. d. Ähnl. d. Blätter!). 2) **Persicaria** T. (*Polygonum* sect. *Rchb.*), z. B. Zier. *Persic. orientalis* T. m. v. v. tabakblättr. Knöterich, wild *Hydropiper* L., laxiflōrum Weihe, *amphibium* L. etc.
- Personatae** Endl., *Rchb.* Maskenblumige, fr. personnées (v. *persona* Maske) i. q. *Scrophulariacēae* R. Br.
- 1) **Persoonia** Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Persoon's“-Silberfichte (n. d. Bot. u. Arzt Persoon). 2) **Persoonia** Mchx. (Compositen). 3) **Persoonia** W. (Hesperideen).
- Pervinca** T., Scop., Lam. (Apocynen, V. 1) Sinn- od. Immergrün, fr. pervenche, e. periwinkle (v. *pervinco* überwinde — näml. d. Winter), s. *Vinca* L., z. B. *latifolia* Garid. s. *major* Lam. (*Vinca* maj. L.) u. *minor* Lam. (*Vinca* min. L.).
- Petalanthae** Endl. „Kronblütige“, Primelblütige (*πέταλον* Kronblatt, *άνθη* Blüte — diese aus einem Kronblatt bestehend od. ganz!).
- Petalostēmon** DC. (-mum Rich., Mchx.) (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Kronenfaden“ Perring, „Kronblattfaden“ (*πέταλον* Kronblatt, *ὀστήμων* d. Faden, lat. *stamen* — d. Kronblätt. m. fadenf. Stielen), z. B. *candidus* u. *violacēus* DC., s. *Daļa* L.
- Petasites** T., G. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) Pestilenzwurz, fr. pétasite, chaperonière, e. butterbur od. lag-wort (pestilence-) (gr. *πετασίτης* v. *πέτασος* Sonnenhut, eine schirmblättr. Pfl.!), wild *P. officinalis* Fl. Wett. (*Tussilago* *Petasites* L.) u. v. *hybrīdus* (Tuss. *hybrīda* L.), Zier. *P. nivēus* Baumg.
- 1) **Petasostylis** Griseb. (Stypheliaceen, V. 1) „Hutgriffel“ (*πέτασος* Krempehut, *στυλις* Griffel), z. B. *nigrescens* Van Houtt., s. *Lisianthe* R. Br., *Dietr.* 2) **Petasost.** (fehlerh. *Petalost.*) Lindl. (Gentianeen, V. 2), s. *Omphalostigma* Griseb.
- Petesia** L., Bartl. (Rubiace. Cinchonaceen, IV. 1) „Flügel“-China, Kratz- od. Kranzbeere, fr. pétésie (*Ptesia* Sw.) (v. *πέταμαι* u. *πτάμαι* od. *πτῆμι* fliege), z. B. *P. Lygistum* L. (*Manettia* Lyg.), *carnea* Forst. (B.) etc.
- Petilium** L. (Liliaceen, VI. 1) Kaiserkrone (*πετάλιον* od. *-ήλιον* Blattschirm — Blattschopf üb. d. Blume!), *P. imperiale* L. = *Fritillaria* imp. L.
- 1) **Petroselinum** Hoffm. (Umbellifer., V. 2) „Petersilje“, fr. persil, e. parsley (v. *πέτρος* Fels u. *σέλινον* Silje), geb. *P. sativum* Hoffm. (*Apium* *Petrosel.* L.). 2) **Petros.** (*Peucedanum* sect. *Rchb.*), z. B. *Chabraei* *Rchb.*, *austriacum* Koch etc., s. *Oreoselinum* Hoffm., e. mountain-parsley.
- Petunia** Juss. (Solaneen, V. 1) „Petunie“, Tabaksblume Rmpl. (n. d. brasil. *petun* „Tabak“), Zier. *P. violacēa* Lindl. m. v. v. (*Nierembergia* *punicēa* Hort., *Pet. mirabilis* *Rchb.* s. *phoenicēa* Lindl.), *P.*

- nyctaginiflora Juss., fr. P. blanche, - à fleurs odorantes, P. hybrida Hort. m. v. v. Bastard-P., hybr. superbissima Hort., s. Nierembergia R. P., Salpiglossis integrifolia u. Nicotiana nyctaginiflora autt.
- Peucedänum** Koch (Umbellifer., V. 2) Haarstrang, Sau- od. Rossfenchel, fr. peucedane, e. sow-fennel (hog's-), hair-strong (hare's-), sulphurwort, hog's-root (gr. *πενκεδανός* i. q. *πιζοός* bitter, Wtst.: *πειζνη* Fichte, *δανός* niedrig (?), vielm. ausgetrocknet!), Wies. P. officinale L. etc., s. Selinum, Cnidium etc. — Peucedanæe Rchb.
- Peziza** Dillw. (Pilze, XXIV. 4) Becherpilz, Napfmorchel, fr. pezize (v. *πέζις* Stiel od. *πέζις* ein gestielt. Pilz, Plinius Pezicae = Lycoperdon Bovista), z. B. lentifera, fr. porte-lentille, etc.
- Phāca** L. (Leguminos. Astragaleen, XVII. 4) Berglinse, Knollenkraut (*φακή* Linsenfrucht), P. floridana W. (Robinia vesicaria Jacq.) etc., s. Astragalus leontinus, oroboides etc.
- Phacelia** Juss. (Boragineen Hydrophylléen, V. 1) „Wasserbündel“, fr. Phacélie (gr. *φάκελος*, lat. fasciculus Bündel — d. Blüt. stehen in Bündeln, Wtst.), Zier. P. congesta Hook. (Hydrophyllum bipinnatifidum Mchx.), tanacetifolia Benth. m. v. fl. albo Hort., fr. ph. à feuilles de Tanaise, e. tansy-leaved Ph.
- Phaecidium** Cass. (zu Crepis Rchb.) (Compos. Cichoriac. XIX. 1) Habichtskraut-Pippau M.-Rchb. (*φαιδιάσιον* schöne weisse Schuhe d. Gymnasiarchen in Athen, F. W. Riemer, *ζοηλῆς*, lat. Crepis = Schuh), s. Crepis pulchra L. s. Prenanthes hieracifolia W.
- Phaedranassa** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Glanzkönigin“, Schminke-lilie (v. *φαιδρός* glänzend, *ἄνασσα* Herrscherin), z. B. chloracea u. obtusa Herb. (Peru), s. Phycella Lindl. (*φύκος* Schminke).
- Phaius** (-ios, -jus) Lour. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Fahl“- od. „Dunkelorché“ (*φαιός* schlummerig, dämmerig, fahl u. dunkel — Farbe d. Blüten), z. B. grandifolius Lour. (Pachyne spectabilis Salisb.) etc., s. Bletia R. P., Dendrobium Sw. etc.
- Phalacraea** DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Kahl“-Leberbalsam (*φαλακρός* kahlköpfig — d. Achenen ohne Pappus! Wtst.), Zier. coelestina u. Wendlandii.
- Phalaenopsis** Blum. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Schmetterlings“-O. (*φάλαυνα*, lat. Phalaena Nachtfalter, *ὄψις* Aussehen — Gestalt d. gross w. Blüten! Wtst.), Warmh. Schilleriana Rchb. f. (Philippin.), grandiflora Lindl. (Java) etc.
- Phalangium** T. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Spinnenlilie“, Zaunblume, fr. phalangère, e. spiderwort (gr. *φαλάγγιον* gift. Spinne u. Pfl. geg. deren Biss — weg. d. dünnen, langen Wurzelzweige! Wtst.), Zier. P. Liliago Schreb. (Anthericum Lil. L.), P. Liliastrum Lam. (Anther., Czackia Andr., Paradisia Bertol. Hemerocallis Liliastr. L.) unechte Affodil-Lilie, fr. lis des Allobroges od. Ph. faux-lis, P. ramosum Lam. (Anther. ram. L.) Erdspinnenkr., Sandgras- od. kleine Sand-Lilie, P. (s. Scilla) pomeridianum DC. californ. Seifenpfl. Leun., etc.
- Phalāris** L. (Gräser, III. 2) „Glanzgras“ (*φαλαρίς* Grasart, v. *φαλαρός* glänzend — solche Samen! W.), Zier. P. arundinacea L. v. picta Hort., s. g. Bandgras, fr. roseau panaché, chiendent-ruban, ruban de bergère, geb. u. verwild. canariensis L. Canariengras (-hirse Grck.).
- Phalloidēi** DC. Giftmorcheln od. Eichelpilze (Phallus sogl. u. *είδομαι* gleiche).
- Phallus** L., Mch. (Pilze, XXIV. 4) „Eichel“- od. „Gliedpilz“, Giftmorchel, Giftschwamm Leun. (*φαλλός* Pfahl, männl. Glied, „Eichel“ — Ähnl. damit!), P. impudicus L., rubicundus Fr. (Satyrus rub. Bosc) (Carolina), conicus Müll. (Verpa c. Sw.) etc.

- Phanerogamae** L. „Deutlichblühende“ (*φανερὸς* sichtbar, *γάμος* Ehe, in d. Bot. Blüte).
- Pharbitis** Chois. (Convolvulaceen, V. 1) „Bart“- od. Prunkwinde Rmpl. (gräzisiertes barba Bart! Wtst.: v. *φαρβή* Farbe (!?) — elegante bl., violette od. rote Blüten!), *P. barbata* od. barbigera Hort. s. *limbata* Lindl. (*Ipomoea barb.* Hort.) m. v. v. (z. B. *grandiflora superba*), *P. Nil* Chois. (*Ipom. Nil* Hort.) (Südam.), *Learii* Lindl. (Ostind.).
- Pharus** P. Br., L., Schreb. (Gräser, XXI. 6) „Lappen“- od. Nerven- gras D. (v. *φαρος* Lappen, Hülle — Neger zu Kleidungsst.), z. B. *latifolius* L., *P. Br.* (Jamaica, Guiana), *aristatus* Retz. (*Zizania Retzii* autt.) ostind. Wasserreis.
- Phascum** L., Dicks. (Moose, XXIV. 2) Glanz- od. Bartmoos, Ohnmund, fr. phasque (v. *φάσχω* glänze — bez. d. Kapseln! Rabhst., Wtst.), z. B. *nitidum* s. *axillare* etc.
- Phaseolus** L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Bohne, „Fasel“ Rmpl., fr. fève, faséole, e. facele, phasel (gr. *φάσηλος* od. *-ήολος* Bohne u. Kahn — Ähnl. d. Samens damit!), Gart.: *P. multiflorus* L. türk. od. Feuerbohne m. v. v. bicolor u. albiflorus Hort., e. scarlet-runner bean, fr. haricot d’Espagne od. écarlate „Scharlachb.“, geb. ausserdem *P. vulgaris* L. gem. Garten- od. Stangenbohne, fr. haricot (des haricots verts Bohnengemüse, - confits au sel eingemachte), *P. nanus* L. Busch- od. Zwerg-B., fr. féverole kleine Feldbohne.
- Phegoptëris** Fée (Farne, XXIV. 1) „Buchen“- od. Eichenfarn, Tüpfel- farn (*φηγός*, lat. *fagus* Buche, aber auch Eiche, *πτερίς* Farn), z. B. *polypodioides* Fée (*Polypodium Phegopt. L.*), *Dryopteris* Fée „Eichen- farn Grck. (*δρὺς*, *-ίος* Eiche).
- Phelipaea** T. (Scrophularin. Orobanchen, XIV. 2) „Phelipaux“-Som- merwurz (n. d. beid. franz. Marine-Beamten Louis u. Jerome Phe- lipaux ben.), z. B. *Ph.* (s. *Orobanche*) *lutea*, *coerulea* C. A. Mey., *coccinea* etc.
- Phellandrium** T., L. (sc. *Oenanthe*) Lam. (Umbelliferen, V. 2) Wasser- fenchel, Rosskümmel Grck., fr. phellandre (irrtüml. ciguë aquatique Wasserschierling, *Cicuta virosa* L.), *P. aquaticum* L. (*Oenanthe aquat.* Lam.) m. v. conioides Nolte, Grck. (v. *φελλός* Kork? od. *φηλόω* betrüge? *ἀνήρ*, *-δός* Mann? Krause: st. *Philydron* „Wasser- liebhaber“, Wtst. — ungewiss!).
- Phellodendron** Rupr. (Terebinthac. Xanthophylleen, XXII. 5) „Kork- baum“ (*φελλός* Kork, *δένδρον* B.), Zierstr. *P. amurense* Rupr. (Bstr. v. Amurland).
- Phellos** (sc. *Quercus*) L. (Cupuliferen, XXI. 8) „Kork“- od. Weiden- eiche, fr. chène saule, e. willow-oak (s. eb.).
- Philadelphus** L. (Philadelphéen, XII. 1) Pfeifenstrauch, deutscher Jas- min, fr. Séringa (-gat) (*φιλᾶδελφος* eig. Schwesterliebhaber, z. B. Ptolemaeus Philadelphus v. *φιλω* liebe, *ἄδελφῆ* Schw., *-ός* Bruder, — geschwisterlich sich umfass. Zweige, Wtst.), *P. coronarius* L. gem. „Kronen“-Jasmin, Antoniblüh Vilh. (*Syringa suaveolens* Mch.), fr. séringat commun, Séringa des jardins, e. garland Phil. od. mock- orange „Orangenspott“, m. v. v. (z. B. *grandiflorus speciosissimus* Hort. für Balkone), *P. latifolius* Schrad. s. *pubescens* Lois., *P. speciosus* Schrad. (*grandiflorus* Hort.), *grandiflorus* W. (*inodorus* Hor- tulan.), *P. inodorus* L. (*Syringa inod.* Mch.), *P. floribundus* Schrad., fr. Sér. florifère etc. — *Philadelphacéae* Don, Grck., *-ëae* DC., Rchb.
- Philesia** Juss. (Liliac. Philesiaceen od. Smilaceen, XXII. 6) Lilien- strauch (v. *φιλησία* Dieberei od. *φίλησις* d. Lieben — Liebl. An- blick), Zier. *buxifolia* Lam. s. *magellanica* Rausch.
- Phillyrea** L. (*Philyrea* T.) (Sapotaceen Oleaceen, II. 1) Steinlinde,

- fr. phillyrée, tillot (-lau) (gr. *φιλύρα* od. -*ρη* Linde — ähnl. Blätter), z. B. *latifolia*, *media* etc. (Str. d. Mittelmeergeb.'s).
- Philodendron** Schott, Lindl. (Aroideen Callaceen, XXI. 3) „Baummörder“ (v. *φιλῶ* liebe, *umarme*, *δέσπορον* B. — töten B. durch festes Umschlingen!), Stuben: *P. pertusum* Kth., Selloum C. Koch (Sellow'sum Hort.), *fenestratum* Hort. etc., s. *Monstera* Ad., *Caladium* Vent. u. *Arum* L.
- Philogyne** Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Weiberlieb“ (s. v. u. *γυνή* Weib), Zier. odöra Haw. (*Narcissus odoratus* W.), e. sweet-scented *Narcissus*.
- 1) **Philonotis** Sw. (Moose, XXIV. 2) „Nassmoos“ (s. v. u. *ροτὶς* Nässe), *P. fontana* Sw. (*Bartramia* f. Sw.). 2) **Philonotis** (sc. *Ranunculus*) Ehrh. (*Ranunc.* XIII. 3 od. 7) blassgelber Hahnenfuss, s. *Ranunc. sardous* Crantz s. *hirsutus* Curt.
- Philydium** Banks (Philydreen od. Juncaceen, I. 1) „Wasserlieb“, Wollentilie D. (v. *ἕδωρ* in compos. *ἕδωρο-* [st. *ἰδατος*] Wasser u. *φιλῶ* liebe), Zimmeraquar. *P. lanuginosum* G. (*Garciana cochinchinensis* Dietr.). — *Philydræa* Endl.
- Philyra** Klotzsch (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) „Philyra“-Wolfsmilch (n. *Philyra*, *Oceanide* u. Mutt. d. Chiron, Myth.).
- Phlebodium** R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Aderfarn“ (v. *φλεβώδης* aderig — zahlr. veräst. *Adern* d. Wedel), z. B. *Decorat.* *P. aureum* R. Br. (*Polypodium* aur. L.).
- Phlegmacium** Fr. (-tium Wtst.) (Pilze, XXIV. 4) Schleimhautpilz (*φλέγμα* Brand u. Schleim, *ἀκμή* Spitze — klebr. Manschette), s. *Myxadium* DC.
- Phlegmaria** (sc. *Lycopodium*) L. (Bärlappe, XXIV. 1) „Brand“- od. „Zünd“-Bärlapp (*φλέγμα* Brand, wie bei Selago — weg. d. Blitzpulvers od. Hexenmehls aus Bärlapp).
- Phléum** L. (Gräser, III. 2) Lieschgras, fr. *fléau* (fléole) od. *marsette* (*φλέως* Theophr. Liesch, Wtst.: v. *φλέω* fliesse — geg. Ohrenfluss!), z. B. *P. pratense* L. etc.
- Phlomis** L. (Labiaten, XIV. 1) „Flammenlippe“, fr. *phlomide*, sauge en arbrisseau „Strauch-Salbei“ od. sauge de Bethléhem (- de Jerusalem), auch Filzkraut Leun., Löwenschwanz Rmpl. (gr. *φλομὶς* Wollkraut v. *φλόξ* Flamme — früher zu Lampendochten), Garten: *P. agraria* Ledeb., *Samia* L., *herba venti* L. etc., s. *Leucas* Burm.
- Phlox** L. (Polemoniaceen, V. 1) „Flammenblume“, fr. u. e. *phlox* (gr. *φλόξ*, -*γος* Flamme — einige Arten sehr feurig! etc.), Garten: *Drummondii* Hook. m. viel. v. v., *subulata* L. s. *frondosa* Hort., *setacea* L. *Rasen-Phl.*, *nivalis* Sw., *decussata* u. *hybrida* Hort. m. zahlr. v. v., *verna* Sweet, fr. *printanier*, *maculata* L. (*latifolia* Mchx., *pyramidalis* Sm. etc.) m. v. *alba* Hort. (*candida* Pers., *suaveolens* Ait.), *paniculata* L. (*scabra* Sw., *undulata* Ait. etc.).
- Phoenix** L. (Palmen, XXII. 3) Dattelpalme, fr. *dattier* (*palmier* d.), e. *date-tree* (gr. *φοίνιξ*, -*ιξος* Dattelp. u. Phönizier od. Purpur — im Lande Phönizien wachsend), Stub. u. Treibh. *P. reclinata* Jacq. (Cap), *farinifera* Roxb. ostind. *Sagopalme*, *silvestris* Roxb. (Ostind.), *dactylifera* L. (Afr. etc.).
- Phoenixopus** Koch, Cass. (zu *Prenanthes* Rchb. (Compos. *Cichoriac.*, XIX. 1) „Phönixfuss“, *Steinsalat*, *Mauerlattich* Seub. (v. *φοίνιξ* Phönix, *fabelh.* Vogel u. Purpur — Blütenstiele rot), z. B. *viminea* s. *decurrens* Cass., *ramosissima* Rchb. etc.
- Pholiota** Fr. (-dota!) (Pilze, XXIV. 4) „Schuppenpilz“ Kumm. (v. *φολις*, -*ιδος* Schuppe, *φολιδωτός* geschuppt — Manschette flockig, strahlig etc.!), z. B. *mutabilis* Fr., s. g. *Stockschwamm*.
- Phormium** Forst., Thb., L. (Liliac. *Asphodeleen*, VI. 1) *Flachslilie*, neuseeländ. *Flachs* (*φορμίον* dem. v. *φορμός* Schilfkorb, *Matte* —

wozu verwendet etc.), Techn. u. Zier. P. tenax Forst. neuseel. od. Schifflachs, fr. lin de la Nouvelle Zélande, e. tough-flax-lily od. New-Zealand-flax, s. Chlamydäa tenacissima G.

- Phorolöbus** Desv. (Farne, XXIV. 1) Rollfarn (v. φορός tragend, λοβός Lappen — d. Fruchthaufen trägt d. zurückgerollt. Wedelrand), z. B. crispus Desv., s. Allosorus cr. Bernh. (Osmunda cr. L., Onoclea cr. Hoffm.).
- Photinia** Lindl. (Pomaceen, XII. 2) „Glanzblatt“-Weissdorn (v. φωτεινός glänzend — immergr. glänz. Bl.!), z. B. serrulata Ldl. (Crataegus glabra Thb. s. Mespilus bengalensis Hort.).
- Phragmidium** Kze., Lk. (Brand-Pilze, XXIV. 4) „Fächerbrand“, „Querwandspore“ (v. φάγμα Scheidewand, εἶδομα gleiche — Sinn unklar!), z. B. incrassatum Lk. (auf Rosen u. Rubus), s. Puccinia Pers.
- Phragmites** Trin. (Gramineen, III. 2) Schilfrohr (φραγμίτης zu Zäunen od. zur Wand dienlich — Gebr. z. Berohrung d. Wände!), P. communis Trin., s. Arundo Phragmites L., fr. roseau u. jonc, e. kex (kecks), reed, rush, gem. Teichrohr.
- Phthora** Crantz (Thora L.) (sc. Ranunculus) L. (Ranunculac., XIII. 7) Gift-Ranunkel (φθορά Verderben, Tod), s. Ran. hybridus Biria.
- Phu** DC. (sc. Valeriana) L. (Valerianeen, III. 1) grosser Baldrian (Φοῦ pontisch. Name d. Baldrian n. F. W. Riemer, arab. fu!).
- Phycäa** (-këa) Wallr. i. q. Algae Roth, Algen od. Tange (gr. φῦκος lat. fucus Tang u. Schminke).
- Phycella** Lindl. (Amaryllideen, VI. 1) „Schminklilie“ (s. eb. — Blüt. wie geschminkt rot!), Zier. P. corusca Lindl., Herbertiana Ldl. u. ignea Ldl. (Chili), s. Amaryllis.
- Phycomycetes** de By., Ord. d. „Algenpilze“ od. Pilzalggen i. q. Myco-phyceae Ktzg. (s. eb. u. μύκης, -ήτος Pilz).
- Phygelius** E. Mey. (Scrophularineen, XIV. 2) „Sonnenflüchter“ (v. φύγω od. γείγω lat. fugio fliehe, ήλιος Sonne — liebt schatt. Stand), P. capensis E. Mey. (Cap).
- Phylia** L. (Rhamnaceen, V. 1) Heidenmyrte (φυλίχη Teophr. = Rhamnus Alaternus L. v. φύλλον Laub — immergrüne Blätter), Stuben: P. ericoides L. (Str. Cap), paniculata Wendl. etc., s. Chamaelea Burm. T.
- Phyllamphora** Lour. (Nepentheen od. Aroideen, XXII. 13) „Blattkanne“, Kannenstrauch (φύλλον u. ἀμφορένς lat. amphora Kanne — krugförm. Blattbildg.), s. Nepenthes Phyll. W.
- 1) **Phyllanthus** L. (Euphorbiac., XXI. 8) „Blattblume“, fr. phyllanthe (φύλλον Laub, άνθος Blüte — dies. unmittelbar. auf d. Blätt.), z. B. Emblia L. (Myrobalanus), squamifolius Spr. (Nymphanthus sq. Lour.).
- 2) **Phyllanthus** Miq. (sc. Cactus L. s. Opuntia Endl.) (Cacteen, XII. 1) „Blattstengel“-C., s. Epiphyllum Haw.
- Phyllis** L. (Rubiaceae. Cinchonaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Blatt“- od. „Laubdoide“, s. g. schöne „Phyllis“ (Φυλλίς Personennamen v. φύλλον Laub — besond. schönes Laub!), P. Nobla L. (Str. Canar. Ins.), fr. phyllis, s. Bupleuroides Mch. u. Valerianella canariensis frutescens, simpla Nobla dicta Dill.
- Phyllocactus** Lk. (Cacteen, XII. 1) „Flügelcactus“, s. Cactus alatus Hort. (φύλλον u. Cactus), Stuben: P. Ackermanni (Mex.), grandis Lem. (Antill., Guian.), anguliger Lem. (Mex.) etc., s. Phyllanthus Miq.
- Phyllocladus** Rich., Spach (Taxaceen, XXII. 12) „Blattzweigbaum“, „Blattästler“ Perring (φύλλον u. κλάδος Ast od. Zweig — dieser platt, wie ein Laubblatt!), Zier. P. stricta Spach = Thuja s. Biota orientalis L., Don morgenländ. Lebensbaum, Treibh. P. rhomboidalis Rich., trichomanoides R. Br. s. asplenifolius Lab. (Neuholl.).

- Phyllodöce** Salisb. (Ericaceen, X. 1) Blauheide Lauch. (*φύλλον* u. *δοξέω* halte dafür — Blätter linienf. wie bei Erica!), z. B. *taxifolia* Sal. (Andromeda coer. L., Erica c. W.), s. Menziesia Juss., Sm.
- Phyllostegia** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Blattdeckblume“ (s. v. u. *στέγη* Decke — d. Kelchlappen blattartig), z. B. *dentata* u. *grandiflora* Benth. (Sandwichs-Ins.), s. Prasium gr. Gaudich.
- Physalis** L. (Solaneen, V. 1) „Blasen“- od. Judenkirsche, Schlutte, fr. coquerette, cerise d'hiver, lanterne etc., e. winter-cherry, morel-berry (-cherry) (v. *φύσα* u. *φυσάλις* Blase — Beere in d. blasenart. aufgetr. Kelch!), z. B. wild u. Zier. P. Alkekengi L., cult. P. *edulis* s. peruviana W. (Atropa ed. Hort.), s. g. Ananaskirsche.
- Physocarpus** Camb., DC. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Blasenfrucht“, -spiräe (zu Spiraea Rchb., Rmpl.) (s. eb. u. *καρπός* Frucht — d. Kapsel häut. aufgeblasen!), z. B. Sp. *opulifolia* L. u. *amurensis* Rupr.
- Physostegia** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Blasenkelch“, fr. physostegie (s. v. u. *στέγη* Decke etc. — d. Kelch blasig aufgetrieb.). Zier. *virginiana* Benth. m. v. *speciosa* Bth. u. *nana* Hort., fr. *Cataleptique*, e. *virginian* Ph., *imbricata* Hook. (Dracocephalum imbr. Hort.) (Tex.).
- Physurus** C. Rich. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Blasenschweif“-O. (s. v. u. *οὐρά* Schwanz — Labell m. Hodensackspore), s. Anoctochilus Blum.
- Phytelphas** Rz. Pv. (Calycantheen od. Pandaneen, XXII. 12) Elfenbeinnuss, s. g. vegetabil. Elfenbein, Elephanten-Palme (*φυτόν* Pflanze, *ἐλεφας* Elephant u. Elfenbein — d. harte v. Same als vegetab. Elfenbein!), P. *macrocarpa* R. P., s. Elephantusia m. Mart.
- 1) **Phyteuma** L. (Campanulaceen, V. 1) Waldrapunzel, Triftwurz O. W., Teufelskralle (gr. *φύτευμα* Dioscor. kräftigende Pflanze, als Aphrodisiacum), z. B. *spicata* L. (*spicatum* L. u. *nigrum* Schmidt s. *Rapunculus* L., Pers.). 2) **Phyteuma** (sc. *Reseda*) L. (Resedaceen, XI. 3) kleine Resede M.-Rchb. 3) **Phyt.** (sc. *Lobelia*) L. Rapunzel-Lobelia.
- Phytocräne** Wall. (Urticaceen od. Menispermeeen, III. 1?) „Quellenstrauch“ (*φυτόν* Pfl., *ζοήνη* Quelle — lief. durch Anbohren milden Saft!), z. B. *gigantēa* u. *borneensis* Becc.
- Phytolacca** T., L. (Aizoideen Phytolacceen, X. 5) Kermesbeere, amerik. Scharlachbeere, eig. „Pflanzenlack“, fr. *phytolaque*, teinturier, raisin d'Amérique, e. scarlet-berry, kermes-, ten-stamened-Foxgloves (s. v. u. *lacca* Lack — d. Beere lief. rote Farbe!), P. *decandra* L., *dioeca* L. (B. Südam. — *bella* *sonibra* span.). — *Phytolaccēae* Rchb.
- Picea** D. Don, Lk. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Tanne, „Pechtanne“, Edeltanne Rmpl., fr. *sapin*, e. *pitch-tree* od. *spruce-fir* (v. *pix*, -cis Pech), z. B. P. *alba* Lk. echte, deutsche Edel- od. Weissanne, s. *Abies alba* Mill. (*Pinus Picea* Duroi, *Abies pectinata* Lam., DC.), fr. *sapin blanc* etc., e. *combe-like-leaved Silver-Fir*, Zier.: v. v. *Rinzii* s. *metensis*, *pendula* etc., P. *balsamēa* Loud. (Canad.) nebst v. *Fraseri* Loud., P. *Nordmanniana* Loud. (Kauk.), P. *Pinsapo* Loud. span. Tanne, P. *Pichta* Loud. sibir. Tanne, *cephalonica* Loud. (*Apolinis* Planch.), *Reginae Amaliae* Helder. (*peloponnesiaca* Hort.), *nobilis* Loud., *amabilis* Loud., *grandis* ds., *lasiocarpa* Lindl. (*grandis* s. *Parconsi* Hort.) (N.-W.-Amer.), *Pindrow* Royle, *Himalaya-Tanne*, P. *firma* Sieb. u. Zucc., *Webbiana* Lindl. (Japan).
- Pichta** (sc. *Picea* Loud., sc. *Abies* Forb.) sibirische Edeltanne, s. eb. (v. d. russ. *picht*. engl. *pitch* Pech).
- Pieris** Ness. (Cyperaceen, III. 1) „Bittersimse“ (*πιρρός* bitter), z. B. *nitens* Nees.
- Picris** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Bitterkraut“, fr. *picride* (*πιρρίς*, -ίδος v. *πιρρός* s. eb.), s. *Crepis* L.

- Pilĕa** Lindl. (Urticaceen, XXI. 4) „Hut“-Nessel, „Haarnessel“ Perring v. *πίλος* Filzhut, Kappe, nicht v. *pilus* ein Haar — d. weibl. Blüte m. ein. kappenf. Kelchklappe), z. B. *callitrichioides* Lindl., *muscosa* Ldl., *serpyllifolia* Wedd. (Urtica *serpyllacea* Kth.) etc.
- Pilocarpus** Vahl (Rutac. Diosmeen, V. 1) Schleuderfrucht D. (s. eb. u. *ζαοιλόσ* — d. Endocarp löst sich ab u. springt elast. in zwei Lappen auf), z. B. *pinnatifolius* u. *racemosus* Vahl (Str. Westind.), s. *Evoñymus latifolius* racem. Plum.
- Pilocarĕus** Lem. (Cacteen, XII. 1) Hut- od. Kugel-Kerzencactus Rmpl., „Haar“- od. „Vliess“-Kerzencactus (v. *πίλος* Filzhut od. auch v. d. lat. *pilus* Haar u. *Cerĕus* Säulen- od. Kerzencactus), z. B. *Houllettianus* Lem., *chrysomallus* Van Houtt., etc., s. *Cephalocerasus* Pfeiff.
- Pilogyne** Schrad. (Cucurbitaceen, XXI. 10 od. XXII. 3) Kugel- od. „Hutgriffel“, „Stempel“ (s. v. u. *γυρή* Weib, Bot. Stempel — kopfod. hutförm. Narbenklappen!), z. B. *suavis* Eckl. (*Bryonia scabra* Thb.).
- Pilophōra** Jacq. (Palmen od. Pandaneen, XXI. 5—10) Mützen-, Muff- od. Netzpalme (s. v. u. *φορός* tragend), *P. saccifĕra* Jacq., s. *Manicaria* sacc. G. sacktrag. Netzpalme, auch vegetabil. Elfenbein (vgl. *Phytelĕphas*).
- Pilosella** Koch (zu *Hieracium* L.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Mäusehörlein-Habichtskraut, fr. piloselle, oreille de rat (dem. v. *pilosus* haarig — Behaar. d. Blätt. u. Stiele!).
- Pilularia** L. (Marsiliaceen od. Wasserfarne, XXIV. 1) „Pillenfarn“, fr. *pilulaire*, mousse dorĕe (v. *pilŭla* Pille, dem. v. *pila* Ball — Sporangien wie Erbsen od. Pillen!), *P. globulifĕra* L.
- 1) **Pimelaea** Sm. (-lĕa Banks, -lia Forst., Sm.) (Thymelĕaceen, II. 1 od. X. 1) „Fett“- od. „Schmeer“-Seidelbast, neuholl. Glanzstrauch Schmidl. (v. *πιμελή* Fett, Schmeer — fett- u. harzreich!), *P. decussata* R. Br., *rosea* ds., *laevigata* G. (*Passerina prostrata* L.), *P. Gnidia* Sm. (*Banksia* Gn. Forst.). 2) **Pimela** Lour. (Sapindac. od. Terebinthaceen, XXII. 5) Schmeer-Canarienbaum, Schmeer-Copal, *P. nigra* Lour., s. *Canarium Pimĕla* W. (*Cossinia borbonica* DC.).
- Pimenta** Lindl. (Myrtaceen, XII. 1) „Pimentpfeffer“-Strauch, fr. *piment*, *poivre de la Jamaïque*, e. *cod-pepper*, *pimento* (-ment) (v. d. span. *pimento*, indianischer Pfeffer), s. *Myrtus Pimenta* L.
- Pimpinella** L. (Umbelliferen, V. 2) Bibernelle, fr. *pimpinelle*, e. *burnet* od. *pimpernell* (-pinell) (*pimpinella* st. *bipinnula* „doppelfiederige — bez. d. Blätter), z. B. *alba* s. *Saxifrĕga* L. Stein- od. Bockspeterlein, fr. *persil de bouc*, *boucage*, *P. Anisum* L. „Anis“, fr. *l'anis*, s. *Tragium Anisum* Lk.
- 1) **Pinardia** Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Pinardie“ (n. *Pinard*, Vorst. d. bot. Gartens z. Rouen), z. B. *coronaria* Less. (Wallis, Veltlin). 2) **Pinarda** Fl. Flum. (Scrophularineen).
- Pinaster** Clus. (sc. *Pinus*) Sol., L. (Coniferen, XXI. 9) Sand-, Strand- od. Bordeauxkiefer, Terpentinkiefer Vilm., Büschelk., fr. *pinastre*, *pin maritime* od. de *Bordeaux*, e. *cluster-pine*, *pinaster-pine*, s. *Pinus maritima* Poir. s. *syrtica* Thore (deter. v. *pinus* Kiefer).
- Pincenectia** (-netia) DC. (Bromeliaceen, VI. 1) „Pincenetie“, Keulenlilie (n. d. franz. Eigennamen *Pincenect* od. -net, Wtst.: viell. st. *Freycinetia*), Warmh. *P. glauca* DC. (*Dasyliirium* gl. R. Br.), *tuberculata* Hort., span. *Porra* d. i. Keule (— weg. d. unten keulig erweiterten Stammes!).
- Pinckneya** Rich., Ait. (-nĕa Pers.) (Rubiaceen, Cinchonac., V. 1) „Pinckney's“-Chinastrauch (n. d. nordamer. Bot. *Pinckney*), *Treibh. P. pubescens* Pers. (Südcarolina).

- Pinča** (sc. *Pinus*) L. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Pinie“, Nusskiefer, fr. pigmon, e. pinion (pinēus föhrenartig v. pinus Föhre, Kiefer).
- Pinguicūla** L. (Lentibularien, II. 1) „Fettkraut“, Butterschmeerwurz, s. g. Kiebitzfett G. Fr., fr. grassette, herbe grasse od. huileuse u. tue-brébis „Schaftod“, Wolff, auch langue d'oise u. sanicle à éperon (dem. v. pinguis fett).
- Pinites** Goepf. (foss. Conifer. Abietineen, XXI. 9) Bernsteinbaum, P. succinifer Goepf. (v. pinus u. succinium Bernstein).
- Pinsapo** (sc. *Abies* Boiss. od. *Picea* Lindl.) (Conifer. Abietineen, XXI. 9) spanische Edeltanne Rmpl., fr. sapin d'Espagne, e. mount-Atlas-Cedar (zusamm. aus *Pinus* u. *Sapo*, franz. sapin Tanne), s. *Abies Luscombeana* Hort.
- Pinus** L., Lk. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Tanne, Föhre, Kiefer, fr. pin u. sapin, e. pine-tree u. fir (gr. *πίνος* od. *πινος* Harz, Theophr. Tanne, lat. pinus, v. d. celt. pin Berg), P. sylvestris L. Föhre, Forle od. Kiefer, fr. pin sauvage od. sylvestre (- d'Ecosse etc.), e. fir-tree, scotch-fir, bull-trout etc., m. v. argentea Hort., P. Strombus L. Weymouthskiefer, fr. pin du lord Weymouth, P. virginiana, fr. pin de Jersey, P. austriaca Höss. s. nigra Lk., P. Taeda L., fr. pin d'encens Weihrauch- od. Terpentinkiefer, rigida Mill., excelsa Hamilt. Trauerkiefer od. Kiefernkönig, fr. grand Pin du Népaul od. pleureur, e. lofty-pine, etc.
- Piper** L. (Piperaceen, II. 3) „Pfeffer“, fr. poivre (-vriar), e. pepper (gr. *πίπερι*, arab. babary, lat. piper), z. B. aggregatum Berg. (Lacistema myricoides W.), nigrum L., fr. caméade wilder od. Bergpf., longum orientale L., fr. pimpelin od. pipot, P. Cubēba L., Betle L., etc. — Piperacēae Rich., -itae DC., -inae DC.
- Piptanthus** Sweet (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Fallblüte“, indisch. Zirkelhülsenbaum (zu Anagŕis T.), A. indica autt. (v. *πίπτω* lasse fallen, *ἀνθος* — lässt beim Aufgehen d. Blume fallen).
- Piraster** Wallr. (sc. *Pirus*) L., Borkh. (Pomaceen, XII. 4) Wild- od. Holzbirne, fr. poirier commun, s. *Pirus Achras* G. s. communis L., Zier. v. v., z. B. fl. pleno Hort. (deter. *pirus* Birnb.).
- Pirōla** ⁹T. (Pyrōla L.) (Ericaceen Pirolaceen, X. 1) Wintergrün, fr. pirole, e. winter-green (dem. v. *pirus* Birnbaum — „Aussehen d. Blätter!“), s. Limonium G. Fr. — Pirolacēae Lindl.
- Pirus** Grck. (bess. als *Pyrus* L.) (Pomaceen, XII. 4) Birn- u. Apfelbaum (v. *pirum*, fr. poire Birne od. *pirus*, fr. poirier Birnbaum, nicht v. *πυρός* Weizen), P. communis L. u. P. Malus L. Holzbirn- u. Holzapfelbaum, fr. poirier u. pommier-sauvage, e. wild pear- u. crab- od. wild-apple-tree; Zierb. P. nivalis Jacq., fr. poire de neige, e. snowy-leaved-pear-tree, P. sinensis Lindl. (sinīca Royle, communis Lois.), fr. poirier de la Chine, e. chinese p.-tr. m. v. v., P. baccata L. (Malus bacc. Desf.), fr. pomme baccifère od. - de Sibérie, e. siberian crab m. v. v., P. spectabilis L. Ait. Prachtapfelb., fr. pomme-fleurī, e. showy-flowering wild apple tree od. chinese crab-tree.
- Piscidia** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Fischtod“, -fänger, fr. bois-ivrant (v. piscis Fisch u. caedo in compos. -cīdo töte — Anwend. d. Wurzelrinde z. Fischfang), z. B. carthagenensis L. (Carthagena, Südamer.), longifolia W. (Aeschynomene l. Cav.).
- Piscipula** Loeffl. i. q. *Piscidia* L. (s. eb. — piscis u. capio fange).
- 1) **Pisonia** L. (Ebenaceen Styraceen, XXIII. 2) „Piso's“-Ebenholz (n. W. Piso, Arzt bei Moriz v. Nassau 1634—41), z. B. aculeata L., fr. liane épineuse, P. inermis L., buxifolia Rottb., s. Ferreōla s. Maba bux. 2) **Pisonia** Rottb. (Nyctagineen, V. 1) Pison's Wunderblume. — Pisoniēae (zu Nyctaginēae) Rehb.

- Pistacia** L. (Terebinthaceen Cassuvieen, XXII. 5) „Pistazie“, Terpen-
tin- u. Mastixbaum, fr. pistache (-chier), e. pistachio-nut (-tree) u.
pistake-tree (arab. fustaq, gr. πίσσα Harz u. ἀέρομαι helfe), P.
Terebinthus L. (Str. Südeuropa), vera L. Pistaziennuss, fr. noix de
pistache (Orient), P. Lentiscus L. Mastixb. (Orient), fr. manne du
Libanon od. mastichine.
- Pistia** Jacq., L. (Hydrocharideen od. Aroideen, XIII. 6) Muschelblume
gr. πιστός getränkt — wässer. Standort!), P. stratiotes L. Wasser-
wegerich, s. Plantago aquatica Rumph.
- Pistillaria** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Stempelpilzchen (v. pistillum Pistill
od. Stempel — keulenförm.), z. B. micans, muscicola Fr. etc.
- 1) **Pisum** L. (Leguminos. Vicien, XVII. 4) Erbse, fr. pois, e. pea (Pl.
pease) (gr. πίσον v. d. celt. pis), geb. P. sativum L. Feld-, Scho-
ten- od. Brech-Erbse Grck. m. v. v., fr. pois verts od. en cosse,
Abänd.: P. arvense L. Zucker-E., fr. p. sans cosse od. goulu, e.
sugar-plum, Ackererbse, fr. petits-pois, Früherbse, fr. pois Michaux,
etc. 2) **Pisum** (sc. Ulva) L. (Algen, XXIV. 3) Watt-Erbse, fr. pois-
marin.
- Pitcairnea** L'Hér. (-ia Ait.) (Bromeliaceen, VI. 1) „Pitcairn's“-Schmar-
rotzer-Ananas (n. W. Pitcairn, Prof. in Edinburg, † 1713), P. lati-
folia Ait. (Antill.), staminea Lodd. u. splendens (Bras.), flavescens
Bak. (Cochliopetalum flav. Bew.).
- Pittosporum** Sol., Banks (Pittosporéen, V. 1) „Pech“- od. „Kleb-
samien“ (πίττα Pech, σπορά Samen — dies. harzig!), Stuben: P.
Tobira Ait. s. chinense Dou, span. Azahar de la China Orangen-
blüte v. China, coriaceum Ait. (Str. Canarische Ins.), viridiflorum
Sims, etc. — Pittosporæe DC.
- Placœa** Miers (Amaryllideen, VI. 1) „Blumenbank“-Narzisse (v. πλάξ,
-αζος Blumenbank, Wtst.: chilen. Name!), Zier. P. Arzæ, grandiflora
Lam. (Chili).
- Plagiochila** Dum., Nees (Lebermoose, XXIV. 3) „Schrägrippe“, Stutz-
kelch Leun. (πλαγίως schräg etc., γείλος Lippe — Mündung des
Involucells schräg abgest.), z. B. asplenoides Nees.
- 1) **Planera** Gm., Mchx. (Urticaceen od. Ulmaceen, IV. 2) „Planers-
baum“ (n. d. Prof. Planer zu Erfurt, s. d. Aut.), Zier. P. carpi-
nifolia Wats. (Richardi Mchx.) (Kaukas.), aquatica Gm. (ulmifolia
Mchx.), s. Anonymus aq. Walt. (Carolin.). 2) **Planera** Gies. (Scita-
mineen, I. 1).
- Plantago** L. (Plantagineen, IV. 1) Wegerich, Wegbreit Leun., fr. plan-
tain, e. plantain, waybroad (v. planta Fusssohle — womit platt-
getreten! nicht Linné v. planta Pflanze u. tango fühle an).
- Plasmodiophora** Woron. (Schmarotzerpilze, XXIV. 4) „Plasmodium-
trägerin“ (Plasmodium Schleimkörper, πορός tragend), z. B. bras-
sicæ Wor. Kohl-Klauenkrankh. Rmpl.
- Platanthëra** Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Breitkölbchen“, Threm
(Trehm) O. W. (πλατύς breit, ἀνθήρα Staubbeutel — platte An-
therenschnäbelchen!).
- Platanus** L. (Amentac. Plantaneen, XXI. 9) „Platane“, Sykomore
Rmpl., fr. u. e. platane, e. plane-tree (gr. πλάτανος v. πλατὺς
breit — weg. d. Blätt. u. Baumkronen), Zier: P. vulgaris Spach
(occidentalis u. orientalis L.) m. viel. v. v., s. g. Kleiderbaum (— weg.
Abwerfens d. Rinde!), P. orientalis L. (orient. verus Duh.) u. P.
acerifolia Ait. (P. vulg. Spach, v. acerifol. Spach s. orient. Ait.,
intermedia Hort.). — Platanæe Rchb., -nacæe Lestib., Grck.
- Platycapnos** Bernh., DC. (zu Fumaria L.) (Fumariaceen, XVII. 2)
„Breitfrucht“-Erdrach (s. v., χαίτης Rauch), z. B. spicatus Bernh.

- Platycarya** (nicht -caria) v. Sieb. u. Zucc. (Juglandeen, XXI. 8) „Platt“- od. „Breitnuss“ (s. v., *κόρον* Nuss — Steinfr. flach gedrückt!), z. B. strobilacäa S. Z., s. *Fortunaea* Ldl.
- Platyceeratum** Rich. (zu *Arabis* Rehb.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Breithörnchen“ (*κερατίων* dem. v. *κέρας*, -τος Horn), z. B. alpina u. crispata W.
- Platyceerium** Desv. (Farne, XXIV. 1) „Breit“- od. „Platthorn“, Ge- weihfarn Perring (s. v. u. *κέρος* Horn — wie Elenngeweihe, schauf- lig!), Warmh. u. Ampel: *alcicorne* Gaud. „Elenhorn“, s. *Neuro- platyceros* Presl.
- Platyedon** DC. (Campanulaceen, V. 1) „Breitglocke“, Pracht- (s. v. u. *κόδων* Glocke), z. B. *grandiflora* DC. (*Wahlenbergia* s. *Campanula* gr. Hort.).
- Platylobium** Sm. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Blattschote D., „Breit“- od. „Platthülse“ (s. v., *λόβιον* dem. v. *λοβός* Hülse — diese flach zusammeng.), z. B. *formosum* Sm. (Str. Austral.), *latifol.* Andr. (*Bossiaea heterophylla* Sm.) (Neuholl.).
- Platyspermum** Hook. (-ma Hoffm.) (Umbelliferen, V. 2) „Breitsamen“ (s. v. u. *σπέρμα* Samen), z. B. *grandiflorum* M. u. K., s. *Caucalis* gr. L. (*Daucus* gr. Scop., *Orlaya* gr. Hoffm.).
- Plectocomia** Mart. (Palmen, VI. 1) „Haarflechten“-P., Stachelrank- stamm Rmpl. (*πλεχτός* geflochten, *κομη* lat. coma Kopfhaar — d. Staubfäden an d. Basis zusammenh.), z. B. *assamica* Griff., *macro- stachya* Krz. etc.
- Plectogyne** Lk. (Acoraceen od. Liliac. Asparagineen, VIII. 1) „Korb- stempel“, Erdschild, Schild- od. Wurzelblume (*πλεχτή* Korb, *γυνή* Weib, Stempel — Narbe sehr gross, korbförmig!), Stuben *P. varie- gata* Hort., s. *Aspidistra elatior* Decsn. v. varieg.
- Plectopoma** Van Houtt. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Korbbecher“, Deckel- kapsel (s. eb. u. *πόμα* Becher, Deckel — Kapsel m. Deckel!), Warmh. *gloxiniaeflora* V. H., s. *Achimenes* R. Br.
- Plectranthus** l'Hér. (Labiaten, XIV. 1) „Hahnensporn“, Mottentod, -könig, Harfenstrauch Leun. (*πλήκτρον* Sporn, Stachel — Krone an d. Basis gespornt!), z. B. *fruticosus* l'Hér. (Str. Cap), *Forskolaei* Vahl, etc., s. *Ocimum* u. *Colinus*.
- Pleëa** Rich. (-ia Mchx.) (Juncaceen, IX. 3) „Plée“-Blume (n. d. Bot. Plée, schr. Types de chaque famille etc., Par. s. 1844), z. B. *tenui- folia* Mchx. (*Carolina*) etc., s. *Anguillaria* R. Br.
- Pleurorrhizæe** (sc. Cruciferae) DC. „seitenwurz. Kreuzträger“ (*πλευρόν* Seite, *ρίζα* Wurzel — bez. d. keimend. Samen!).
- Pleurospermum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Rippensamen“, Hohl- rippe Leun., Schlauchrippe Seub. (v. *πλευρά* Rippe, *σπέρμα* Samen — sehr starke Fruchtrippen!).
- Pleurothallis** R. Br. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Seitenblüt“-O. (s. v., *θαλλίς* Zweig v. *θάλλω* wachse, blühe — d. Blüten stehen in d. Achsel des einen Stengelblatts!), z. B. *coccinea* R. Br. (*Rodriguezia* cocc. R. P.), *sagittifera* Kth. (*Notylia multiflora* Ldl.), etc.
- Pleurötus** Fr. (Hautpilze, XXIV. 4) „Seitenohr“, Seitenstiel-P. Kumm., Drehling, *P. ostreatus* Fr. (s. v. u. *οὖς*, *ώτος* Ohr — d. Hut sitzt zur Seite!).
- Plinia** L. f. (Amygdaleen od. Myrtac., XII. 1) „Pliniuskirische“, Furchen- (n. d. röm. Nat. Plinius d. Älteren, † 79 n. Chr.), z. B. *crocäa* L. f., *pedunculata* s. *rubra* L. f., s. *Eugenia* autt.
- Plocäma** Ait. (Cinchonac. Coffeaceen, V. 1) „Zopfchina“, „Flechtling“ (d. *ζλόκαμος* Haarflechte etc. — herabhäng. verschlungene Zweige!), z. B. *pendula* Ait. (Str. Canar.), s. *Canthium* Lamb.

- Plocoglottis** Blum. (Orchideen, XX. 1) „Zopfzunge“ (v. *πλόκος* Strick etc., *γλιώττα* Zunge — Labell an d. Bas. m. eingebogn. Falten an d. Columna gedr.), z. B. javanica Bl.
- Plocostemma** Blum. (Asclepiadeen, V. 2) „Flechtkranz“, -krone (s. eb. u. *σίτμμα* Kranz — d. Nebenkronen wie gestrickt), z. B. lasianthum Van Houtt., s. Hoya las. R. Br.
- Plumbaginæae** Vent., DC., Rchb., -inae Grck., -ines Juss. Bleiwurzwurz., s. Plumbago!
- Plumbago** T., L. (Plumbagineen, V. 1) „Bleiwurz“, fr. plombage (plaubage), dentelaire, malherbe, e. plumbing, plummet od. lead-wort (v. plumbum Blei u. ago führe — d. Wurzelfett ders. färbt d. Hände bleigrau), P. europaea L. (Tripolium Dioscoridis), Zier.: rosea L. (Ostind.) m. v. coccinea (Thalia cocc. Lour., Plumb. cocc. Boiss.), P. Larpentae Lindl. (China) etc.
- Plumeria** L. (-miera T.) (Apocynen, V. 1) „Plumier's“-Hundswürger (n. d. ber. Bot. Plumier), Zier.: P. rubra L. (St. Antill.), lutea R. P., mexicana Lodd. etc.
- Plutëus** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Sturmdach“-P. (plutëus od. -ëum Schirmdach), z. B. phlebophorus, pellitus etc., s. Agaricus L.
- Pneumonanthe** Schmidt (sc. Gentiana) L. (Gentianeen, V. 2) „Lungen“-Enzian, blauer Tarant, gross. Herbst-E., eig. „Lungenblüte“, fr. pulmonaire des marais, e. marsh-Gentian od. windflower-Gent. (*πνεύμων* Lunge, *άνθη* Blüte — geg. Lungenkrankh. u. bauchig aufgeblas. Krone).
- Poa** L. (Gräser, III. 2) Rispen- od. Viehgras, Rispelgras O. W., fr. paturin „Futtergras“ od. poa (gr. *πόα* od. -η u. *ποία* Futter v. *πύω* weide ab), Zier. P. trivialis L. v. variegata Hort., Wies. pratensis L., zwisch. Pflaster: annua L., etc., s. Glyceria u. Festuca. — Poacæae Endl. Rispengräser.
- Podagraria** Riv., Mnch. (sc. Aegopodium) L. (Umbelliferen, V. 2) gem. Geisfuß, Geier od. Giersch, „Podagra“- od. Fussgicht-Dolde, fr. herbe à Gérard, - à la goutte, podagrine, pièd de chèvre, e. goutwort (v. *πόδς*, -όδος Fuss u. *γράω* nage etc.), s. Ligusticum Pod. Crantz.
- Podaliria** Dietr. (schlecht -lyria Lam.) (Cassieen Cäsalpinieneen, X. 1) „Podalirie“, wilder Indigo (n. Aeskulap's Sohn Podalirius, gr. *Ποδαλίριος* Arzt d. Griech. vor Troja), z. B. australis Lam., e. southern wild-Indigo, P. alba W. (Sophora a. Ait., Crotalaria a. L., Anonis Mart.) (Carolina), aurca W. (Soph. aur. Ait. etc.) etc., s. Baptisia R. Br., Virgilia Cav. u. Sophora R. Br.
- Podocarpus** l'Hér., Rich. (Coniferen Taxaceen, XXI. 9) „Fussfrucht“, chines. Eibenbaum (*πόδς*, -όδος Fuss, Stiel, Basis, *καρπός* Frucht — fleisch. verdickte Scheibe um d. Samen), z. B. Zier. taxifolius Hb. Bpl. (Taxus montana W., Mex.), asplenifolius Lab. (Neuholl.), Koraiana v. Sieb. etc., s. Taxus chinensis u. Thalamia asplenifolia Lab.
- Podolëpis** Lab. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Stielschuppe“ (s. v. u. *λεπίς* Schuppe — d. innerst. Kelchschuppen gestielt), Zier. P. auriculata Hort. s. chrysantha Endl., gracilis Grah. s. angustifolia Hort. m. v. v., affinis Hort., fr. P. à grandes fleurs, etc., s. Scalia Sims u. Stylolepis Gray.
- Podolobium** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieneen, X. 1) „Fuss“- od. „Stielhülse“ (s. v. u. *λοβίον* dem. *λοβός* Hülse — diese gestielt), z. B. trilobatum R. Br. (Chorozema trilobum Sm.), scandens DC. etc., s. Pultenia Andr. u. Daviësia Sm.
- Podophyllum** L. (Ranunculac. Podophylleen, XIII. 1) „Fussblatt“ Rmpl., Entenfuss, fr. podophylle, e. duck's-foot (s. v., *πόδλλον* Laubblatt —

Aussehn dess. wie ein Entenfuss), Zier. peltatum L., e. May-apple, s. Anadophyllum canadense Catesb., P. diphyllum L., s. Jeffersonia diph. Pers. — Podophyllacēae DC.

- 1) **Podosperma** Lab., Less. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Stielsamen“ (s. v., *στέμμα* Samen — d. Achenien gestielt), z. B. pedunculare Rchb. (*Craspedia pilosa* Spr.) (Neuholl.), angustifolia Lab. (dasselbst) etc., s. *Podothēca* Cass. 2) **Podospermum** DC. (zu *Scorzonēra* Rchb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Stielsamen“—*Scorzonere*, z. B. laciniatum DC. u. octangulare Roth.
- 1) **Pogonia** Juss., R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Bart“-O. (*τῶ-γων* Bart — Labell m. Kammbart), z. B. ophioglossoides Ker (Nordamer.). 2) **Pogonia** Andr. (Verbenac. Myoporineen, II. 1) „Bart“-Mäusefrass, z. B. debilis Andr. (*Myoporum* d.) (= behaart. Schlund).
- Pogostemon** Desf. (Labiaten, XIV. 1) „Bartfaden“, indisch. Dosten, Patschouliplf. Rmpl., P. Patschouly Pellet. (Ostind.) (s. eb. u. *στῆ-μων* Staubfaden — diese mitten bebartet).
- Poincettia (-settia)** Grah. (Euphorbiaceen, XI. 3) „Poincettie“ (n. Poincette od. Poinsette, d. Entd. d. Pfl. in Mexiko), Warmh. u. Stuben: P. heterophylla Karw. (rotgipfelblättrig!), pulcherrima Grah., s. Euphorbia pulcherrima Grah.
- Poincia** Neck. (-cinia DC., -ciana Breyn., L.) (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Poinci's“-Cassie, fr. poincillade, fleur de paon (- de paradis) „Pfauschwanz“ (n. de Poinci, Gouv. d. Antill. Mitte d. 17. Jahrh.'s), z. B. Gilliesii L. (Südamer.), bijūga Jacq. etc., s. Caesalpinia etc.
- 1) **Poiretia** Vent., Sm. (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Poiret's“-Esparsette (n. d. franz. Bot. u. Reis. in d. Berberei Poiret), z. B. linearis Sm. (Hovea l., Coronilla l.), psoraleoides DC. (*Turpinia montevidensis* Spr.). 2) **Poiretia** Cav. (Epacrideen, V. 1) „Poiret's“-Felsbusch, P. cucullata Cav., s. *Sprengelia incarnata* Sm. 3) **Poiretia** Gm. (Gentianeen, V. 2) „Poiret's“-Enzian.
- Polemonium** L. (Polemoniaceen od. Convolvulaceen, V. 1) Speerkraut (nicht Sperrkraut!), Leiterblatt od. Jakobsleiter, fr. polémoine, valeriane grecque od. bleue griech. Baldrian Rmpl. (v. *πολεμος* Krieg — speerart. Blätter! Wst.: n. d. pont. Kön. Polemon ben.), Zier. coerulēum L. blaue Himmelsleiter Grck. od. Jakobsleiter, reptans L., e. creeping Jacob's-ladder, rubrum L. (*Cantua coronopifolia*) etc.
- Polianthes** (bess. Poly-) L. (Liliac. Hemerocallideen, VI. 1) „Vielblüt“-Lilie, s. g. Tuberose, P. tuberosa L., fr. tubéreuse des jardins, Jacinthe des Indes, e. tuberosa (Mex.), s. *Amīca nocturna* Rumph. s. g. Nachthyazinthe (v. *πολύς* viel, *ἄρθη* Blüte, nicht v. *πόλις* Stadt od. *πολιός* weisslich, Wst. u. Rmpl. v. *πόλις* Stadt — Stadtblume, häufige Fensterbl. d. Städte!).
- Pollinia** L., Spr. (Gräser, XXIII. 1) „Pollini's“ Bartgras, Goldbart (n. d. Bot. Cyrillo Pollini, Prof. zu Verona), z. B. P. Gryllus Spr., depauperata ds., s. *Andropogon* u. *Homoplitis* Trin.
- Pollveria** (sc. *Pirus*) W. (Pomaceen, XII. 4) „Pollwiler“ od. „Bollweiler“ Birne, Lazarol-, Hanbutten-, rote Honigbirne Vilm., fr. poirier cotonneux, e. Bollwyller Pear-tree (n. d. Dorf Bollweiler im Elsass, Wst.: n. d. Bar. v. Pollwiler, in dessen Garten J. Bauhin d. Birne zuerst fand), s. *Pirus Pollvilleriana* Bauh. s. *Pollvilla* Gmel. (*Pir. tomentosa* W., *irregularis* s. *auricularis* Knoop u. *Lazarölus* P. Med.).
- Polyadelphia** L., XVIII. Kl. „Vielbrüderige“ (*πολύς* u. *ἀδελφός* — in mehrere Bündel verwachsene Staubfäden!).
- Polycarpicæ** Endl., Bartl., -pēae DC. „Vielfrüchtler“ (s. v. u. *ζαρκ-πός* Frucht — d. Blum. vielfrüchtig).
- Polycarpon** Löffl. (-um L.) (Portulacaceen Paronychieen, III. 3) „Viel-

- frucht“-Knaul, Nagelkraut (s. eb. — zahlr. kleine Früchte!), z. B. magellanicum L. (*Donatia fascicularis* Forst.).
- Polyenēmum** L. (Aizoideen Atripliceen, III. 1) Knorpelkraut, Geferkr. Ö. W. (*πολύνημον* vielgliederig — bez. d. Stengels).
- Polygäla** L. (Polygalaceen, XVII. 3) Kreuzblume, Ramsel O. W., eig. „Milch“- od. „Vielmilchkraut“, fr. laitier (lotier), e. milk-wort u. stire-wort (*πολύ* viel, *γάλα*, -τος Milch — das Vieh sehr nährend!), Stuben: P. latifolia Ker, cordifolia W., Treibh. grandiflora Hook., myrtifolia L. etc. — Polygalacéae Rehb., -läeae Juss., DC., Rehb., -linae Endl. Bitterlinge Leun.
- Polygamia** L., XXIII. Kl. „Vielehige“ u. Syngenesia Polygamia L., XIX. Kl. Vielblütige Syngenesisten od. s. g. Compositen (*πολύς* u. *γάμος* Ehe od. Blüte — vielerlei Blüten auf einer Pflanze od. in einem Blütenkorb!).
- Polygonätum** T., Desf. (Liliac. Smilaceen, VI. 1) Weiss- od. Schminke-wurz, Gelenkwurz Rmpl., Vielgelenkblatt, Vielknoten-Maiblume, fr. grénouillet od. muguet sceau de Salomon, e. polygony od. Salomon's-seal „Salomonssiegel“ (s. v. u. *γόνυ*, -ατος Knie — zahlr. Knoten des unterird. Stocks!), z. B. multiflorum All., verticillatum Mnch., latifolium Desf. m. v. fl. pleno, vulgare Desf. (*Convallaria Polygonatum* L.) m. v. macranthum (japonicum Hort.).
- Polygönum** L. (Polygonaceen, VIII. 3) „Knöterich“ (nicht v. *πολύγονος* vielzeugend, sond. *γόνυ* Knie od. Knoten — viele Knoten d. Stengels!), fr. centinode u. renouée, trainasse, e. knot-grass, z. B. aviculare L., fr. langue de passereau, e. knot-grass „Vogelknöterich“ od. s. g. Wegtritt, P. Bistorta L., e. snake-weed m. v. latifolium Hort., Gärt.: P. orientale L. (Persicaria or. T.) m. v. v., Zier. P. acuminatum Kth. s. cuspidatum v. Sieb. u. Zucc. (mächt., haselblättr. Zierstr. Japan's), fr. Renouée de Siebold, P. amplexicaule Don, sachaliense F. Schmidt; cultiv.: P. Fagopyrum L. „Buchweizen“ (s. d.). — Polygonacéae Juss.
- Polymnia** L. (Compos. Senecionideen, XIX. 4) Musenblume, „Liederreiche“ (n. Polymnia od. Polyhymnia, d. Muse d. Gesanges — Schönh. d. Blume!), Zier. P. Uvedalia L. (Wedalia Mill.) (Carolina), s. Delta Ait., P. maculata Cav. (Mex.).
- Polypetäla** Juss., Kl. d. „Vielkronblättrigen“ (*πέταλον*, lat. petälum Kron- od. Blumenblatt).
- Polypodium** L., Sw. (Farne, XXIV. 1) Tüpfelfarn, eig. „Vielfuss“-F., fr. polypode, e. polypody, male-fern (*πόδιον* dem. v. *πόδες*, -όδος Fuss — weg. d. zahlr. Wurzelstöcke der jährl. absterbenden Wedel), wild u. Zier. P. vulgare L. Eichenfarn, Engelsüss, m. v. v. (z. B. cambricum L. Tüpf. v. Wales), Stuben u. Gewächsh. P. aureum L. (Phlebopodium aur. R. Br.), morbillosum (*Drynaria coronans* Bor.), effusum Sw. (Jamaika), pectinatum L. (Westind.).
- Polypögon** Desf. (Gräser, III. 2) „Vielbart“- od. Bürstengras (*ὁ πώγων* d. Bart — dichtwollige, begrannete Spelzen!), z. B. elongatus Hb. Bpl. (Südamer.), monspeliensis Desf. (*Santia plumosa* Savi, *Agrostis panicéa* Host etc.).
- Polypörus** L., Fr., Mchx. (Pilze, XXIV. 4) „Löcher“- od. „Porenschwamm“, Feuerschwamm, Zunderpilz (s. v. u. *πόρος* Durchgang, „Pore“ — unters. voller Poren!), P. igniarius, fomentarius etc. — Polyporei DC.
- Polysaccum** DC. (Pilze, XXIV. 4) Erbsenstreuung Kumm. (saccus Sack), z. B. pisocarpium wahrer E., s. Polypära aut.
- Polystichum** Roth (Farne, XXIV. 1) Punktfarn, „Vielpunkt“ oder „-Strich“ (*στίχος* Reihe — Fruchthauf. in mehreren Reihen!), Zier.

- P. Filix mas Roth „Farnkrautmännchen“ m. v. cristatum Hort., s. Lastraea Presl, Nephrodium Stempel (Polypod. Filix mas L.).
- Polytrichum** L. (Moose, XXIV. 2) „Haarmoos“, Widerthon, fr. polytrich od. perce-mousse (πολύτριχον vielhaarig — Stengel u. Mützen!), z. B. commune L. — Polytrichacēae Schimp.
- Pomacēae** Rchb. (zu Rosacēae) Kernobst, Apfelfruchtartige (v. pōmum Apfel).
- Pomaderris** Labill. (-toderris R. u. Sch.) (Rhamnaceen, V. 1) „Kapselhaut“-Dorn (πῶμα Deckel, δέρος i. q. δέρος Haut — bez. d. Kapsel!), z. B. apetala Lab., candicans, elliptica etc. (Neuholl.).
- Pomariae** Lindl., Grck. i. q. Pomacēae s. v. (v. pōmum, pomarius d. Apfelobst betr.).
- Pombalia** Vand. (Violarien, V. 1 od. XIX. 6) „Pombal's“ Veilchenwurz (n. d. portug. Minist. Marquis de Carvalho, † 1782), P. Ipecacuanha Vand., s. Viola s. Ionidium Ip.
- Pontederia** L. (Commelynaceen, VI. 1) „Pontederablume“ (n. d. Prof. Jul. Pontedera in Padua, † 1757), Treibh. P. cordifolia Mart. (Bras.), azurčea Sw. (Jamaica), lanceolata Nutt. (Südcarol.) etc., s. Leptanthus Mchx. u. Heteranthera R. P. — Pontedericēae Mart.
- Populus** T. (Salicaceen, XXII. 7) „Pappel“, Belle, altd. Alber (e. abele-tree) Mej., fr. peuplier, e. poplar, wimote u. abele-tree (v. πάλιαλ-λουμα zittere, zapple Leun., Wst.: populus Volk — dess. Plappern nachahmend!), Zier. P. nigra L. m. v. pyramidalis Roz. (dilatata Ait., italica Ludw.), fr. léard Schwarz- u. italien. od. lombard. P., canadensis Mchx. (carolinensis Mchx. s. monilifera Ait.), canad. od. Rosenkranz-P., hybrida M. B., fr. grisaille (canescens Sm., alba Mill., alba-tremula Wimm.) Grau-P., alba L. Silber-P., fr. aubel, tremula L. Zitter-P., fr. tremble, e. trembling-asp od. aspen-tree (Espe od. Aspe), atheniensis Ludw. (von Athens in Nord-Amer.) s. tremuloïdes Mchx. (graeca Ait.), balsamifera L. (Tacamahaca Mill.) echte Balsam-P., fr. harame, nebst cordata Lodd. (macrophylla Lindl.) etc.
- Porāna** Burm., L. (Convolvulac., V. 1) „Wander“-Winde (v. πορείου-wandere — erstreckt sich weithin, Wst.: ostind. Name!), z. B. volubilis L. (ostind. Str.), acuminata P.-B. (Oware).
- Porcellites** Cass. (zu Hypochoeris Rchb.) (Compos. Cichoriac. XIX. 1) „Ferkelkraut“, fr. porcelle, salade de porc (porcellus Ferkel, dem. v. porcus Schwein), z. B. brasiliensis Less.
- Porliera** Rz. Pv. (-ia Hb.) (Sapindac. Zygophylleen, VIII. 1) „Porlier's“ Strauch (n. d. span. Gesandten in Indien Ant. Porlier de Laxamar), z. B. hygrometra R. P. (Peru).
- Porpax** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Griff“- od. „Henkel“-O. (πόρπαξ Handhabe — bez. d. Wurzelknollen!).
- Porphyrocōma** (-me) Hook. (Acanthaceen, XIV. 2) „Purpurschopf“ (πορφύρεα Purpur, κόμη lat. coma Haarschopf — purp. Blütenschopf!), z. B. lanceolata Hort. (Warmh.).
- 1) **Porrum** T. (sc. Allium) L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Lauch, „Porrée“, fr. poireau u. porreau, e. leek (gr. πάρορον lat. porrum v. d. celt. porri essen), cultiv. m. v. v. (z. B. Porrée v. Rouen, Erfurter P. etc.). 2) **Porrum** (sect. v. Allium Rchb.), z. B. ascalonicum, vineale etc.
- Portlandia** P. Br., Schreb. (Rubiaceen Cinchonaceen, V. 1) „Portlandie“ (n. d. Herzogin v. Portland, Correspond. v. J. J. Rousseau 1766—76), z. B. coccinea Sw., grandiflora L. etc.
- Portula** Dill. (sc. Peplis) L. (Lythraceen, VI. 1) gem. Bachburgel Grck. (dem. porta Pforte — wie Portulak aussehend).
- Portulāca** T., L. (Portulacaceen, X. od. XI. 1) Fleischblatt, Burzelkraut, fr. pourpier, e. purslane (-lain) u. porcelain (v. porto führe,

lae Milch? Paxt., od. dem. porta Thüre — bez. abführ. Wirkung? od. latinis. Burzelkraut purslain? — ungewiss!), wild u. Gärt. P. oleracea L. Gemüse-Portulak, s. g. Kerbuzel, Zier. P. grandiflora Lindl. m. v. v., fr. chevalier d'onze heures (z. B. v. plena Hort. Portulakröschen). — Portulacaceae Rchb., -laceae Bartl., DC., Juss.

Posoqueria Aubl. (**Posoria** Raf.) (Rubiaceae. Cinchonaceae, V. 1) „Posoqueria“-Chinast. (aymara posoqueri d. Nam. ein. Art bei d. Galbis in Guiana), Warmh. P. formosa Planch. u. multiflora Ch. Lem. (kl. B. Südamer.), s. Solena W. u. Gardenia Spr.

Potamoicae Juss., Grck., -mogēae DC., **Potamogetonēae** Rchb. Laichkräuter (s. sogl.).

Potamogeton T., L. (nicht -gēton!) (Fluvialen od. Potamoegen, IV. 3) Laichkraut, Froschlattich, „Flussgewächs“, fr. potamogeton u. potamot, épi d'eau, e. pond-weed (v. ποταμός Fluss u. γείτος Verbaladj. v. γέρω erzeuge, od. γείτων Nachbar?, fr. potamo-géiton! — wächst in Wasser!).

Potamoptychis Buxb. (Lythraceae Elatineen, VIII. 4) „Flussfichte“ (s. v. u. πύτυς Fichte), s. Elatine L.

Potentilla L. (Rosaceae Potentilleen, XII. 3) Fingerkraut, fr. potentille od. quinte-feuille „Fünfblatt“, e. cinque-foil od. five-leaved grass (v. potens, -entis mächtig — heilkräft. Leun. u. Wtst.), z. B. anserina L. Gänsekr. (Gänserich), e. wild-tansy, Zier. atrosanguinea Lodd. m. v. hybrida Hort., nepalensis Hook., grandiflora L., aurea L., fruticosa L. m. v. tenuifolia W. (floribunda Pursh) etc. — Potentillaceae Rchb.

Poterium L. (Rosaceae Sanguisorbeen, IV. 1) „Becherknopf“, Wiesenknopf, Bibernelle (ποτήριον Becher — Gestalt d. Blümchen!), P. Sanguisorba L. (Sang. minor Scop. u. glaucescens Rchb.) (wild u. Küchengart.).

Pottia Ehrh. (Moose, XXIV. 2) „Pott's“ Moos (n. d. Zücht. Hofr. J. F. Pott in Braunschw., † 1805). — Pottiaceae Schimp.

Preissia Cord. (Lebermoose, XXIV. 3) „Preissie“ (n. d. Prof. Balth. Preiss in Prag, s. d. Aut.).

Prenanthes L. (Compos. Cichoriaceae, XIX. 1) Nicksalat, Nicke O. W., Hasenlattich Grck., fr. laitue de muraille, e. pellitory (v. προνήστις lat. pronus übergeneigt, άνθη Blüte), z. B. purpurea L.

Preptanthe Rchb. f. (Orchid. Vandeae, XX. 1) „Schön“- od. „Anstandsblume“ (πρεπτός anständig etc., άνθη), z. B. vestita Rchb. f., s. Calanthe vest. Wall.

Primula L. (Primulaceae, V. 1) „Primel“ od. Schlüsselblume, Himmelschlüssel Grck., eig. „Erstlingsbl.“, fr. primevère (dem. v. primus erster — im ersten Frühling!), P. veris L. „Frühlings“-Pr., fr. primevère, e. ox-lip, polyanthe (-thos), primrose, cow's-lip u. bird's-eye, Zier. P. Auricula L. m. v. v. „Aurikel“, elatior L. nebst veris L. m. v. v. Garten-Primeln, farinosa L. Mehl-Pr., fr. majale, acaulis Jacq. (grandiflora Lam.) m. v., Topfbl. chinensis Lindl. m. v. v. (z. B. fimbriata, kermesina u. filicifolia), Gletscher minima L., villosa Lap., nivalis Pall. m. v. turkestanica Pall. (Sibir.), cortusoides L. m. v. v. (z. B. amoena) u. a. — Primulaceae Vent., DC., Grck., -lāe (zu Lysimachiaceae) Rchb.

Prinīpes Endl. i. q. Palmae, „Edelbäume“ (princeps, -īpis Fürst).

1) **Prinos (-us)** L. Aquifoliaceae. Ilicineen, VI. 1) Kastanien-Stecheiche, Winterbeere (gr. πίνος Stecheiche, lat. Ilex, v. πίνω säge — stachelig-gesägte Blätter!), z. B. verticillata W. (Str. Nordamer.). 2) **Prinos** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 5) Kastanien-Eiche Rmpl., fr. chène Prin, e. chest-nut-white Oak.

- Prionium** E. Mey. (Juncaceen, VI. 1) Palmgras, -binse Rmpl., Baumbinse, *P. palmata* E. Mey. (Cap) (v. *πρίων* Säge — gesägte, schwertf. Blätter!), s. *Juncus serratus* Thb.
- Prismatoearpus** P'Hér. (Campanulac., V. 1) „Säulenfrucht“, Frauenod. Venuspiegel Seub. (*πρίσμα*, -ατος; Prisma, Säule, *χαρπός* Frucht), *P. Speculum* DC. (Legousia' arvensis Dur.), s. *Campanula* Spec. L. (*Specularia* Heist. Spec. A. DC.).
- Pritchardia** J. Linden (Palmen, VI. 1) „Pritchard's“-P. (n. Steph. F. Pritchard, s. d. Aut.), *P. filifera* J. Lind. s. *filamentosa* Mart. (Chili).
- Protëa** L. (Proteaceen, IV. 1) Silberbaum, -fichte, fr. protée, e. silverfir (v. Proteus, dem Gestalt wechselnden Meergott, Myth., Linné: ein wahr. Proteus!), Gewächsh. argentëa L., acuminata Sims, coccinea R. Br. etc. (immergrüne Capstr.!). — Proteaceae DC., -teae Juss., Rchb., -teinae Bartl., DC. Ord. d. Silberbäume, fr. protëoides.
- Protococcus** Ag. (Algen, XXIV. 3) „Urkorn“ (*πρωτός* erster od. Ur-, *κόκκος* Korn — gleichs. Anfang d. Pflanzenwelt!), *P. nivalis* Ag. „Schneepilz“ (*Coccochloris* niv. Spr.), viridis Crantz, s. g. Priestley'sche Materie. — Protococcaceae Endl.
- Protomyces** Unger (Pilze, XXIV. 4) „Urpilz“ (s. eb., *μύκης*, -ητος; Pilz), z. B. *solani* Wallr. Kartoffelkrätze, -gnatz. — *Protomyces* Wallr., de By, DC. „Urpilze“.
- Protophyta** Endl. „Urpflanzen“ (s. v. u. *φυτὸν* Pfl.).
- Prumnopitys** Phil. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Spitzenfichte“ (*προυνός* d. äusserste etc., *πίτυς* Fichte), *P. elegans* Phil.
- Prunella** L. (*Brunella* T.) (Labiaten, XIV. 1) „Brunelle“, Bräunenblume, Braunmälchen, Gottheil (— soll d. Bräune heilen!), fr. brunelle, e. prunel u. brunion (brown-wort) (dem. v. *prunus* Pflaume, — weg. d. Geruchs! od. brunus, fr. brun braun — braune Kelche! Wtst.: *pruna* Glühkohle u. Bräune — geg. diese!), *P. grandiflora* Jacq. n. v. *alba* Hort.
- Prunophora** Neck. i. q. *Prunus*, sogl. „Pflaumenträgerin“.
- Prunus** L. (Amygdalaceen, XII. 1) Pflaume, fr. prunier, e. plum-tree (gr. *πρωῖνος* lat. *prunus* v. *pruina* Duft — auf d. reif. Obst!), z. B. *spinosa* L. Schlehe od. Schwarzdorn, fr. prunelier, *épine-noire*, e. sloe u. black-thorn, auch german acacia, *P. domestica* L. s. *economica* Borkh. gem. Pfl. od. Zwetsche, fr. prune ronde u. longue „Rundpflaume“ u. „Langpfl.“ (Zwetsche), *P. insititia* L. Haferpfl., Spilling, Bilse; *P. avium* L. Vogelkirsche, fr. merisier, *P. Padus* L. Ahl- od. Traubenkirschb., Faulb., *P. Mahaleb* L. Steinweichsel; Zier. *P. Lauro-Cerasus* L. „Kirschlorbeer“, *P. lusitana* L. portugies. Lorbeer, trilöba Lindl. (*Amygdalopsis* Carr.) (China) etc.
- Psalliota** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Ring“- od. „Fesselohr“ (*ψάλλιον* Zaun, *ὄψ*, *ὄτος* Ohr — ringf. stehenbleib. Manschette!), *Ps. campestris* DC. (*Agaricus* c. L.) s. g. „Champignon“.
- Psamma** P.-B., R. u. Sch. (Gräser, III. 2) „Sandrohr“ (gr. *ψάμμη* Sand), s. *Arundo arenaria* L. (*Ammophila* Host).
- Psammisia** Van Houtt. (Gräser, III. 2) „Sandrohrgleiche“ (s. eb. u. *ῖσος* gleich), z. B. *sclerophylla* V. H.
- Psathyra** DC. (Hutpilze, XXIV. 4) „Mürbpilz“ Kumm. (*ψαθυρός* zerreiblich etc.), z. B. *cernua*, *fatua* etc., s. *Agaricus* L.
- Pseud-Acacia** (sc. *Robinia*) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) unechte Akazie, Schotendorn, fr. faux-acacia, e. locust-tree (v. *ψεύδος* Trug, in compos. pseud- od. pseudo-), Zier. v. *inermis* Dum. Kugel-Akazie.
- Pseud-Acorus** (sc. *Iris*) L. (Irideen, III. 1) Wasser-Schwertlilie, eig. „falscher Kalmus“, fr. flambe d'eau u. faux-Acore, lis de marais, e. water-flag, bastard-Acorus, flower-deluce (s. v.).

- Pseudo-Capsicum** (sc. Solanum) L. (Solaneen, V. 1) „falsche Beissbeere“, s. g. Korallenkirsche (s. v.).
- Pseudo-Narcissus** (sc. Narc.) L. (Amaryllideen, VI. 1) „unechte Narzisse“, s. g. Märzbecher, fr. campane od. faux-Narcisse (s. v.).
- Pseudo-Platanus** (sc. Acer) L. (Aceraceen, XXIII. 1) Berg- od. Waldahorn, gem. weiss. Ahorn, eig. „falsche Platane“, fr. fausse Platane u. érable Sycomore, e. mock-platane-tree, Sycomore, great maple.
- Pseudo-Strobus** u. **Pseudo-Tsuga** Carr. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) unechte Weymouthkiefer u. Douglastanne, Ps.-Ts. Douglasii Carr.
- Psidium** L. (Myrtaceen, XII. 1) Heilmyrte, Guyave- od. Kujavebaum Leun., fr. gouyavier od. poirier des Indes (v. ψιζ, -ιδος Brosame, ψιδιον Granatapfelb. — wohlschmeck. Fr.!), P. pyriferum L. Erdbeer-Guyave, aromaticum Aubl. Citronellbaum, sinense, Catleyanum Sab. rote Erdbeer-Guyave.
- Psilocybe** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Kahlkopf“-Pilz Kumm. (ψιλοδ; kahl, ζυβή Tassenkopf etc.), z. B. campanulata, coprophila etc.
- Psophocarpus** Neck. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Knallhülse“ (ψόφος Getöse, καρτος Frucht — zerplatzt m. ein. Knall!).
- Psoralea** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Schorf“- od. „Grindbohne“, Harzkleee (ψωραλειος grindig — besond. Kelch drüsenhöckerig!), z. B. aculeata (Str. Cap), americana L. (Str. Madeira), P. Dalea L.
- Psychotria** L. (-ium P. Br.) (Cinchonac. Coffeaceen, V. 1) „Lebens“- od. „Heilchina“ (v. ψυχή Seele, Leben u. δτροφή erregen — wird nach P. Browne auf Jamaika als Kaffee gebr.), z. B. emetica Mut. schwarze Brechwurz Leun., pedunculata Sw. (Psychotrium fruticosum P. Br.) etc., s. Psychotrophum P. Br.
- Psyllium** T., Juss. (zu Plantago Rehb.) (Plantagineen, IV. 1) Flohsamen-Wegerich, fr. herbe-aux-puces, e. flea-wort (ψύλλιον Flöhkr. v. ψύλλα Floh — Ähnlichk. d. Samen damit!), s. Plantago Psyllium L. u. arenaria Waldst., Kit.
- Pternicia** Neck., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Nieseakraut“, Dorant, Bertram, fr. bouton d'argent, e. double-flowered-Goose-tongue (gr. πταρμική Nieskr. — Niesen erregend!), Zier. P. vulgaris DC. v. fl. pl., Clavennae DC. (Achillaea Clav. s. argentaea Vis.).
- Ptelaea** L. (Rutac. Xanthoxyleen, IV. 1) Kleestrauch, Leder-, Geld- u. Hopfenbaum (gr. πτελέα Ulme v. πτημι fliege — Fruchthautflügel!), Zier. trifoliata L. Kleebaum Vilm., fr. Ptelée à trois feuilles, e. shrubby-trefoil. — Pteleaceae Kth.
- Pteris** L. (Farne, XXIV. 1), „Flügelarn“, Saumf. Rmpl., fr. ptéride (πτερις Farn, v. πτερόν Flügel — näml. ausgebreit. Wedel!), z. B. aquilina L. „Adler“-F. (— östr. Doppeladler auf d. Querschnitt d. Stengels!), Zier. quadri-aurita m. v. argyrea (-aea Morr.) u. tricolor Lind., cretica L. m. v. albo-lineata, aspericaulis Wall. (Java), arguta Vahl (Canar.) etc.
- Pterocarpus** L. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) „Flügelfruchtbaum“, fr. ptérocarme (s. eb., καρπος Frucht — d. kreisr. Fr. rund v. Hautflügel umgeben!), z. B. santalinus L. Santel- od. s. g. Jamaikaholz (Santalum rubrum Offiz.), P. Draco L. Drachenblut.
- 1) **Pterocarpya** Nutt. (Juglande, XXI. 9) „Flügelnuss“ (s. v., ζάρονον Nuss — angewachs. zweiflügl. Hülle!), Zier. P. caucasica C. A. Mey., s. Juglans pterocarpus Mchx. (fraxinifolia Lam.) u. Rhus obscura M. B., e. caucasian Pteroc. 2) **Pterocarpus** DC. (Polygalaceen, XVII. 3) (— Steinf. m. Hautrandumgebung!).
- 1) **Pterococcus** Pall. (Polygoneen, XI. 3) „Flügelkorn“ (s. v., κόκκος Korn — Kanten d. Nuss m. dopp. Hautflügel), z. B. aphyllus Pall., s. Pallasia L. (Calligonum Pall., l'Hér.). 2) **Pterococcus** Hassk. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) (— d. vier Knöpfe d. Fr. geflügelt).

- Pterophyllus** Ginkgo Nels. (Cupressineen Taxaceen, XXI. 5) „Flügel-
laub“- od. Ginkgobaum (s. v. u. *φύλλον*), s. Ginkgo biloba L. (Salis-
buria adiantifolia Sm.).
- Pterospermum** Schreb. (Geranieen Dombeyaceen, XVI. 7) „Flügelkern“
Leun. (s. v., *σπέρμα* Samen — dies. m. häut. Fortsatz!), z. B. Pt.
acerifolium Schreb., s. Pentapetes ac. Cav. (Dombeya u. Eriochlaena DC.).
- Pterostyrax** v. Sieb. u. Zucc. (Styraceen, X. 1) „Flügelstoraaxbaum“
(*πτερόν* u. Styrax — Fr. fünfflügelig), z. B. hispida S. Z. steifhaar.
(Jap.).
- Ptychosperma** Lab., Scheff. (Palmen, XIII. 3) „Falten“- od. „Runzel-
samen“ (*πτυχή* Falte etc., *σπέρμα* — Same kantig etc.), z. B. Cun-
ninghami H. Wendl., gracile Lab.
- Ptychotis** Koch (zu Crithamus Trag., Rchb.) (Umbellifer., V. 2) „Falten-
ohr“ (*πύξις*, -*γος* Falte, *ὄξις*, *ὠτός* Ohr — Frucht gerippt!), z. B.
heterophyllus Koch (Bunius Rchb.) i. q. Crith. saxifragus Rchb.
(Seseli Sax. L.).
- Puccinia** Pers. (Staubpilze, XXIV. 4) schwarzer Rost (n. Thom. Puccini,
Prof. in Florenz), P. graminis Tul. Gras- od. Getreiderost, Brand,
s. Urædo linearis Pers. (Wintersporen) u. Aecidium berberidis Pers.
(gelbe Sommersporen an Berberitzenstr.).
- Pueraria** DC. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Puerari's“- od. knollige
Esparssette (n. M. N. Puerari, Prof. in Kopenhagen) P. tuberosa DC.,
s. Hedysarum tuberosum Roxb.
- Pulegium** Mill. (sc. Mentha) L. (Labiaten, XIV. 1) „Poley“-Minze, fr.
menthe-pouliot, e. poly (-ley), penny-grass, pudding-grass, pulic, puliol
(latinisiert poley; Wtst. v. pulex u. ägo vertreibe — soll d. Flöhe
vertreiben), P. vulgare Mill. = Mentha Pulegium L.
- Pulicaria** G. (zu Inula Rchb.) (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Flöhkraut“,
Floh-Alant Seub., Dourian O. W., fr. pulicaire, e. flea-wort, penny-
royal (v. pulex, -icis Floh — soll d. Flöhe vertreiben), P. vulgaris
Mill. u. dysenterica Fl. Wett. s. Inula etc.
- 1) **Pulmonaria** T., L. (Boragineen, V. 1) „Lungenkraut“, fr. pulmo-
naire, herbe aux poumons, e. pulmonary, lung-wort u. lady's-glove
(v. pulmo, -ōnis Lunge), Zier. azurëa Bess., dahurica (-varica) s.
sibirica G. Don, virginica L. (Stenhammëra virg. Rchb.). 2) **Pul-
monaria** sylvatica Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) „Lungenflechte“, fr.
pulmonaire des chênes, thê des forets (— des Vosges), e. lichen, s.
Sticta s. Lobularia Pulm. Hoffm.
- Pulsatilla** T. (sc. Anemone) L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) Küchen-
schelle, eig. Kuckschelle (Kukuks-) Mej., fr. cloucourde od. coquelourde,
e. pash-flower (pasque-) od. campana (dem. v. pulsatus geschlagen
= kleine Glocke, Wtst. auch pulsare schlagen, umherstossen — näml.
vom Wind auf d. Anhöhen!), P. vulgaris Lobel = Anemone Pul-
satilla L., pratensis Mill., alpina Delarb. Teufelsbart Grck., patens
Mill., vernalis Mill. etc., s. Anemone etc.
- 1) **Pumilio** Haenke (sc. Pinus) L. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Krumm-
od. Knieholz-Kiefer, „Zwerg“-K., Latsche, fr. pin suffis du Briançon-
nais, crin, mugho u. torche-pin (pumilio Zwerg). 2) **Pumilio** (sc.
Silene) Wulff. (Sileneen, X. 3) „Zwerg“-Leimkraut, s. Lychnis Scop.
u. Cucubalus L. Pumilio.
- Punicea** T., L. (Myrtaceen od. Lythraceen, XII. 1) Granatbaum (Punicea
Phönizierin od. Punierin, punische Farbe — intensiv rote Farbe v.
Blüte u. Frucht), Zierb. P. Granatum L., fr. migraine, m. v. fl. pleno
Hort., P. nana L. Zwerggranate m. v. Legrellei fl. pl.
- Puschkinia** Adams (Liliaceen, VI. 1) „Puschkin's“ Meerzwiebel (n. d.
russ. Bot. Graf Mussin-Puschkin von Adams ben., † 1837), P. scil-
loides Adams, s. Adamsia scill. W.

- Putennia** „Putennie“ s. *Paeonia officinalis* Retz. Pfingstrose (v. puteo stinke).
- Putoria** Pers., DC. (Rubiaceae. Coffeaceen, V. 1) Stinkkaffeestrauch, Vielast-K. (v. putor Gestank — d. zerriebenen Blätt. riechen widrig!), *P. s. Ernödea montana* Sm. — *Putoriäe* DC. (zu *Spermacocöe* Endl.).
- Puya** Mol. (Bromeliaceen, VI. 1) „Puy’s“ Ananaspfl. (Eigennam. Puy? od. altrf. Puy Berg, z. B. Puy de Dôme; Wtst.: Namen d. Pfl. in Chili!), z. B. *P. Altensteinii* Lk., *chilensis* Mol. etc., s. *Pourretia lanuginosa* R. P. u. *Pitcairnea l’Hér.*
- Pyracantha** Spach (sc. *Crataegus* Pers. s. *Mespilus*) L. (Pomaceen, XII. 4) „Feuerdorn“, -busch Vilm., fr. buisson ardent u. pyracanthe, e. fiery-thorn, m. v. *crenulata* Loud. (gr. *πυράκανθα* v. *πῦρ* Feuer u. *ἀκανθα* Dorn). 2) **Pyrae**. Lauché (sect. v. *Cotoneaster* Med.) (Pomaceen, XII. 4) Feuersträucher, z. B. *C. Pyracantha* Spach u. *crenulata* Roxb.
- Pyraister** Borkh. s. *Piraster!*
- Pyrenomycetes** Fr., Endl. „Kernpilze“ (v. *πυρήν*, -*ήνος* Kern, *μύκης*, -*ητος* Pilz).
- Pyrethrum** W., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Bertram“, Mutterkraut, Flohtöter, Speiwurzel, Geiferwurz, fr. pyrèthre (pirètre, -rette), pied d’Alexandre, e. bartram (bertram), soap-wort (-weed) Gärten: *P. Parthenium* Pers., Sm. (*Matricaria* Parth. L.) m. v. *aurea* Hort. Teppichg., e. golden-feather u. v. *laciniata* Hort., *P. Tchihat-chewii* Boiss., *P. roseum* Lindl., s. g. *kaukas.* od. persisch. Insektenpulver, *P. eximium* DC. (*Matric. exim.* Hort.) m. v. *grandiflora* Vilm., *P. sinense* Sab. (*Chrysanthemum indicum* L.) s. g. Winteraster, e. Chinese od. Japanese Chrysanth. (gr. *πύρεθρον* hitzig gewürzh. Pfl., Wtst.: v. *πῦρ* u. *ἄθροος* häufig, viel).
- Pyrola** s. *Piröla.*
- Pyrus** s. *Pirus.*
- Pythion (-um)** Mart. (Araceen, XXI. 1) Bollenwurz, Glocken-Aron (gr. *πυθίων* eine Pfl. „Bollenwurz“ F. W. Riemer, v. *Πύθιος* pythisch, zu *Pytho* od. *Apollo* gehörig), s. *Arum campanulatum* autt., s. *Pythonium* Schott. (n. d. mythol. Schlange *Python* etc. — weg. d. Kolbens u. Gebrauchs geg. Schlangenbiss).
- Qualëa** Aubl. (Vochysiac. od. Myrobalaneen, I. 1) „Qualeastrauch“ (n. dem Nam. d. Pfl. bei den Galibis in Guiana quale), z. B. *Perrini Spr.*, *lutea* Lk., *rosea* u. *coerulea* Aubl.
- Quamoelit** T., Mch. (sc. *Ipomoea*) L. (*Convolvulac.*, V. 1) Trichterwinde (Paxton: v. *κλίματος* Bohne u. *κλίτος* Neigung — steigt nicht hoch), *Q. vulgaris* Chois. (*Ipomoea* Q. L.), fr. fleur cardinale (— du Cardinal) od. *Ipomée* Q., e. Indian Pink u. Cypress-Vine od. american red-bell-flower, m. v. v. fl. albo u. roseo Hort., s. *Ipomoea coccinea* autt.
- Quapoya** Aubl. (Guttiferen *Garcinieen*, XI. 1) „Quapoya“-Gummistrauch (quapoy Nam. d. Str.’s in Guiana!), s. *Xanthe Spr.*, *Clusia macro-* u. *microcarpa Spr.*
- Quassia** L. (Rutaceen *Simarubeen*, X. 1) „Quassien“- od. Bitterholzbaum, fr. quassie (n. Quassi, dem ersten Negersclaven, der v. d. Rinde Gebrauch machte, Paxton), *Q. amara* L. echte Q., *Q. Simarüba* L. Ruhrindenbaum.
- Quercus** L. (Cupuliferen, XXI. 8) Eiche, fr. chène (veralt. chesne), e. oak-tree (n. d. celt. quer schön u. cuez Baum, latinis. quercus. Andere v. d. gr. *γοίφος*; Ferkel — weg. d. Eichelfutters!), z. B. *Q. Robur* L. f. Stiel- od. Sommer-E. (*Q. pedunculata* Ehrh.), sessili-

fłora Sm. (Robur Mill. u. var. β L.) Trauben-, Stein- od. Winter-E., Zier. macrocarpa Mchx. (macrophylla Hort.), stellata Wagh. (obtusiloba Mchx.), rubra L., coccinea W. Scharlach-E., palustris W., Prinos (-us Hort.) Kastanien-E. m. v. v., Cerris L. türk., Burgunder- od. Zerr-E., ferruginea Mchx. (nigra L., marylandica Ray), Phellos L. weidenblättr. od. Kork-E., imbricaria Mchx. (laurifolia Hort.), infectoria Oliv. Färber- od. Gall-E., etc.

Queria G., Löffl. (Paronychieen, V. 1) „Querie“ (n. Jos. Quer y Martinez, Prof. z. Cadix, † 1764).

Quihoui (sc. Ligustrum) v. Sieb. u. Zucc. (Oleaceen, II. 1) japan. Liguster (schöner Zierstr., vaterl. Name!).

Quillaja Mol. (Rosac. Spiräaceen, XXIII. 4) Panamaholz (-rinde), Seifenrinde, Q. saponaria Mol. (Chili) (Nam. in Chili quillai v. quillean waschen), s. Smegmaria W.

Quina Poir. (-ina Aubl.) (Guttiferen Clusiaceen, XXIII. 1) „Quina- baum“, fr. quiniér (Nam. in Guiana quina!), z. B. glandulosa Rz., guianensis Tul.

Quinõa (sc. Chenopodium) L. (Chenopodiac., V. 2) „Quinoa“-Spinat, Reismelde Rmpl. (Peru- od. Anden-Getreide) (vaterl. Name kenua od. quinoa!).

Quinquina Condam., Endl. (Cinchonaceen, V. 1) westind. od. St. Lucien-Fieberrindenbaum (cortex Chinae St. Luciae Offiz.), fr. bois de fièvres (vaterl. Quinquina Piton), s. Cinchona s. Pitonia DC. floribunda Sw. (Exostemma floribundum W.).

Quisqualis Rumph., L. (Combretaceen, VIII. 1) indian. Wunderling od. Sonderling, fr. quisqualier (n. d. Ausdruck des Erstaunens quis? qualis? quisqualis? d. i. zweifelhaft!), z. B. Zier. Q. pubescens Burm. s. indica L. grosse südind. Liane.

1) **Quivisia** Comm. (Meliaceen od. Hesperideen, X. 1) „Quiviholz“, fr. bois de quivi (quivi d. Name d. Pfl. auf Isle de France), s. Gaura L. Cav. 2) **Quivisia** Cav. (Araliaceen, IV. 1) „Quivi“- od. Gilibert's-Aralie, s. Gilibertia W.

Racodium Pers. (Rhacodium Lk.) (Faserpilze, XXIV. 4) Lappen- od. „Lumpenschorf“ ($\delta\alpha\omega\delta\eta\varsigma$ lappenartig, zerlumpt — in Weinkellern etc.), z. B. cellare Pers. „Kellertuch“.

Racomitrium Brid. (Moose, XXIV. 2) „Zackenmütze“ (v. $\delta\acute{\alpha}\kappa\omicron\varsigma$ Fetzen etc., $\mu\upsilon\tau\acute{\alpha}\iota\omicron\nu$ Mütchen — Mützenbasis zerschlitzt!), s. Grimmia Ehrh.

Radiatae Juss. „Strahlblütige“ Compositen i. q. Corymbiferae Vaill., Rehb. (radius Strahl — d. Randblütchen zungenförmig).

1) **Radiõla** Gm., Dill. (Lineen, IV. 3) „Zwerg“-Lein, eig. „Strahlchen“, Strahlkraut Leun. Haarkraut O. W., R. linoides Gm. (dem. v. radius Strahl — strahl. Ansehen!), s. Linum Radiõla L. 2) **Radiõla** DC. (Crucifer. Lomentac., XV. 2) (zu Raphanus T.) „Radieschen“.

Radõla Dumort., Nees (Lebermoose, XXIV. 3) „Kratzmoos“ (radõla Kratzeisen — d. Kapselklappen inwendig knotig gestreift).

Radõlum Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) „Raspelpilz“ Kumm. (s. eb. — d. Hut höcker- od. stachelwarzig!), z. B. tomentosum, quercinum etc.

Rafflesia Arnold, R. Br. (Cytineen Rhizantheen od. Rafflesiaceen, XI. 1) „Raffles“-Riesenblume (n. Raffles, Gouv. v. Surinam, † 1826), R. Arnoldi u. Patma Blum.

Ramischia Opiz (Ericaceen Piroleen, X. 1) „Ramischie“, Einseit-Wintergrün (n. d. Prof. Ramisch zu Prag), R. s. Pirola secunda L.

Ramondia Rich. (Solaneen od. Cyrtandreen, V. 1) „Ramondie“ (n. d. franz. Bot. u. Reis. L. v. Ramond), Zier. R. pyrenaica Rich. (sea-

- pigëra St. Hil.), s. Chaixia Myconi Lap. (*Verbascum Myconi* L.) u. *Myconia borraginëa* Lap.
- Ranunculastrum** DC., Rehb. (sect. v. *Ranunculus*) Gelbranunkel Rehb. (deter. v. *Ranunc.*), z. B. asiaticus, *Flammula* L. etc.
- Ranunculus** Hall., L. (*Ranunculaceen*, XIII. 3 od. 7) „Ranunkel“, Hahnenfuss, fr. *rënoncule*, e. crow-foot „Krähenfuss“, eig. „Fröschchen“ (dem. v. *rana* Frosch, gr. *βατραχίον* v. *βάτραχος*), auch Butterblume, e. butter-flower, z. B. Gartenzier: asiaticus L. m. v. superbissimus Hort. türkischer Turban Rmpl. (*hortensis* Pers.), fr. bouton d'or, e. king's-cub, gold-knops, *aconitifolius* L. v. fl. pleno Hort., s. g. Silberknöpfchen, africanus Hort., fr. *rënoncule Pivoine* oder d'Afrique u. turque oder *rënoncule des fleuristes*, e. garden-crow-foot, R. acris L. v. fl. pleno Hort. gefüllt. Spiegelblümchen od. kl. Goldknöpfchen, fr. *bassinot* (*bacinet*), *bulbosus* L. m. v. fl. pl. Hort, fr. *minon* gefüllt. Hahnensporn od. Taubenfuss, R. repens L. v. fl. pl. Goldknöpfchen, *illyricus* L. (*sericeus* Russel), R. *Lingua* L. gross. Sumpf-H., *graminëus* L. grasblättr. H., fr. *gouette*, e. grassy crowfoot, Decorat. v. Teichen R. *aquatilis* L., fr. *rën. des marais*, *salade des grenouilles*, e. king's flower, s. *Batrachium* aq. E. Mey. Frosch- od. Haarkraut, R. *fluitans* Lam. (*fluviatilis* W.), s. *Batr. fluit.* Wimm.; giftig: R. *sceleratus* L., fr. *douve* od. *pied-pou*, Sumpf-H.
- Rapa** T. (sc. *Brassicæ*) L. (*Cruciferen Siliquos.*, XV. 2) Rübe, Weiss- od. Wasserrübe, Rübsen od. Rübenkohl, fr. *chou-rave*, *rabiole*, e. rape-cole u. turnip (gr. *ράπις*, lat. *rapa*, celt. *rab* Weissrübe), R. *esculenta* Koch m. v. *teltoviensis* Alfid. Teltower od. märkische R., Brass. *Rapa* v. *oleifera* DC. Rübrepß Grck., *a. annua* Koch Sommer-, *β. hiemalis* Martens Winter-Rübsen od. Rübsamen.
- Rapatea** Aubl. (*Restiaceen* od. *Commelyneen*, VI. 1) Spatelkraut (vaterl. Name!), z. B. *paludosa* Aubl. (*Mnasion* pal. W.). — *Rapateaceæ* Körnicke.
- Raphanistrum** T. (*Cruciferen Lomentaceen*, XV. 2) Hederich Grck., Repshederich, Ackerrettig, Griebel- (Kriebel-) Rettig, Feldkohl, fr. *rave sauvage* od. *raphanistre*, e. bank-cresses (deter. v. *raphanus* s. d.), R. *segetum* T. s. *innocuum* Fl. Wett., s. *Raphanus Raphanistrum* L.
- Raphanözon** DC., Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Rettiggeruch“-P. (s. sogl. u. *ὄζον* rieche), z. B. *detonsus* etc., s. *Cortinarius* Fr.
- Raphanus** T., L. (*Cruciferen Lomentaceen*, XV. 2) Rettig (-tich), fr. *raifort*, e. radish (gr. *ραφανίς* v. *ρά* leicht u. *φαινομαι* gehe auf), cultiv. R. *sativus* L. Garten-R. m. v. *niger* DC. u. v. *Radiola* DC. „*Radieschen*“.
- Raphia** P.-B., Comm. (Palmen, XXI. 7) Nadelpalme (v. *ράφις* Nadel — d. Frucht nadelspitz endigend), z. B. *taedigera* Mart. „*fackeltragende*“, s. *Rhapis* L., *Metroxylon* Kön. u. *Sagus* G.
- Raphiölëpis** Lindl. (*Rosac. Pomaceen*, XII. 2) „*Nadelschuppe*“ (von *ράφιον* dem. v. *ραφις*, -*ίδος* Nadel, *λεπίς* Schuppe — nämll. Kelchzipfel!), z. B. *indica* Lindl., *japonica* v. S. u. *Zucc.* etc., s. *Crataegus* etc. L.
- Raphistemma** Wall. (*Asclepiadeen*, V. 2) „*Nadelkranz*“ (s. v. u. *στέμμα* Kranz — d. Nebenkrone m. lang. schmal. Blätt.), z. B. *pulchellum* Wall. (*Schlingstr.* *Indiens*).
- Rapistrum** Boerh. (*Cruciferen Lomentaceen*, XV. 2) Repsdotter, Windsbock Grck. (deter. *rapa*), z. B. *orientale* DC., *perenne* All. etc., s. *Myagrum* L.
- Rapontica** Hort. (*Oenothereen*, VIII. 1) Garten-Rapunzel = *Oenothëra biennis* L. (*rapa* u. *pontica* *pontische*).

- 1) **Rapuncūlus** T. (sc. Campanūla) L. (Campanulac., V. 1) „Rapunzel-Rübe“ Rmpl., -Glockenblume M.-Rchb., fr. raponcule, e. rampian. 2) **Rapunc.** Scop. (sc. Phyteuma) L. (Campanulac., V. 1) Ähren-Rapunzel, s. Rapunculus spicatus Scop. (Phyteuma spicatum L. s. nigrum Schmidt).
- Rapuntium** Lobel, Mill., Presl (Lobeliaceen, XIX. 6) „Rapunzel“-Lobellie, fr. raiponce (rapuntium od. rapunculus Rapunzel, veralteter Ausdr. für Rübchen), Zier. R. fulgens Presl (Lobelia f. W.), fr. lobélie éclatante od. brillante, splendens Presl (Lob. spl. W.) m. v. queen Victoria Hort., speciosum Pr. (Lob. syphilitica L.) gem. Lobellie, R. cardinale Pr. (Lob. card. L.) Cardinalblume, e. scarlet-Lobelia.
- Ratabida** Raf. (-tibida Sweet, DC.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Säulen-Rudbeckie (Wtst.: das veränd. Rudbeckia, wozu früh. gehörig!), s. Rudbeckia columnaris Pursh s. Drummondii Hook. (Obeliscaria pulcherrima s. Tagetes DC.).
- Ravenala** (-lia) Adans. (Musaceen, VI. 1) „Ravenal“-Uranie (Nam. d. Pfl. auf Madagascar ravenal!), R. madagascariensis Poir., s. Urania speciosa W.
- Reāna** Brignoli (Gräser, XXI. 3) „Ré's“-Riesengras (n. d. Bot. Francisch o Ré, s. d. Aut.), Zier. R. luxurians Brign., s. Tripsacum monostachyum, s. g. Teosinte (Euchlaena luxur. Schrad.).
- 1) **Regelia** Planch. (Palmen, XXII. 3) „Regel's“-P. (n. d. Bot. Regel, s. d. Aut.), R. princeps Planch. 2) **Regelia** Schauer (Myrtaceen, XII. 1) „Regels“-Myrte.
- Rehmannia** Bung., Liboschitz (Gesneriaceen, XIV. 2) „Rehmannie“ (n. d. russ. Leibarzt Jos. Rehmann, geb. Badenser, † 1838), Zier. R. chinensis Fisch. s. glutinosa Libosch. (Gerardia glut. L.), s. Digitalis G.
- Reineckēa** Kth. (Liliac. Dracaeneen, VI. 1) „Reinecke“ (n. J. C. Reinecke, schr. d. Erde od. Schilderg. d. Natur u. Sitten etc., Weimar 1803), z. B. carnea Kth. v. fol. varieg. silberstreif. Blattpfl., s. Sansevieria Andr.
- Renanthēra** Lour. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Nierenanthere“, Spinnen-Luftorche (v. ren, renes Nieren, ἀνθήρα Staubbeutel), z. B. coccinēa Lour. (Cochinch.), arachnites Lindl. etc.
- Renealmia** R. Br. (Irideen, III. 1) „Reneaulme's“-Schwertlilie (n. Paul Reneaulme, franz. Bot., schr. 1611 Essai sur l'hist. des plantes).
- Resēda** L. (Resedaceen, XI. 3) „Resede“ od. Wau, fr. résēda (v. resēdo stille wieder — näml. d. Krankh.), Farbpf. R. luteola L., fr. gaude od. vaude, lis des teinturiers, auch herbe-jaune, e. dier's-weed od. weld, Garten: R. odorata L. m. v. v., fr. herbe d'amour od. gaude (gode), fr. u. e. mignonette (z. B. v. eximia, v. gigantēa s. rubiginosa, v. multiflora compacta Hort.). — Resedacēae DC., -dēae Rchb. (zu Cruciferae Capsulares).
- Restiacēae** R. Br. (zu Juncinae DC.) Strickgrasartige, s. Restio L.
- Restio** L. (Juncineen Restiaceen, XXII. 3) „Seil“- od. „Strickgras“ (v. restis Seil etc. — dient am Cap als solches), z. B. dichotomus Fris. Descr. (Schoenus capensis Thb. s. Willdenowia teres Thb.), elongatus s. viminēus Fris. Descr., s. Calorophus elong. autt. langer „Schönschlurf“ (ῥόφος Schlurf, Schleim etc.).
- Restrepia** Kth. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Restrepus“-O. (n. Jos. Em. Restrepus, schr. Geogr. d. Anden), z. B. elegans Karst. (Columbia).
- 1) **Reticularia** Bull., Tul. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) „Netzling“ (reticulum dem. v. rete, -is Netz), z. B. muscorum etc. 2) **Reticularia**

Baumg. (Flechten, XXIV. 3) „Netzflechte“ (zu *Sticta* Schreb.) (— *Thallus* netzaderig!).

Retinaria G. (Rhamnaceen, V. 1) Harz-Gouanie, amer. Harzbaum, fr. resinier (gr. *ρήτινη*, lat. *retina* od. *resina* Harz), z. B. *scandens* G., s. *Gouania Retinaria* DC. (*Sphaerocarya scandens* DC.).

Retinospora (-*nispōra*) Sieb. u. Zucc. (sc. *Juniperus*) (Cupressineen, XXI. 9) „Harzsamen“, Heidewachholder, Lebensbaum-Cypresse, Flach-Cypr. Perring (s. eb. u. *σπορά* Samen), Zier. *picifera* (nicht *pisif.*-!), *aurēa* u. *filifera* Hort., *ericoides* Hort. s. *squarrosa* S. u. Z., s. *Chamae-Cyparis picif.* u. *squarr.*, *obtusa* S. u. Z. (*Chamaec. obt.* ds.), s. g. *Sonnenbaum* Vilm. od. *Hinoki-Cypresse* (Jap.).

Rhabdoweisia Bruch (Moose, XXIV. 3) „Streifen“-Weisie (*ράβδος*; Rute etc. u. *Weisia*-Moos), z. B. *fugax* Br. (Felsritzen).

1) **Rhacōma** L. (Sapotac. od. *Celastrineen*, IV. 1) „Zottelschopf“ (gr. *ράζωμα* od. *ράζος* Lumpen, Fetzen; Wst.: von *Rha* = Wolga, wöher d. Pfl. bezogen, *Rhacoma* Plin. = *Rhēum rhapsonticum*!), *R. Crossopetalum* (nicht *Crassop.*! *Dietr.*) „Fransen“- od. „Zottelblume“. 2) **Rhae.** Adans. (Compositen).

Rhagadiōlus T. (sc. *Lapsana*) L. (Composit. *Cichoriaceen*, XIX. '1) „Ritzen“- od. „Schründenkelch“, Sichelalat D., fr. *rhagadiole* (v. *ρήγας*, -*άδος* Ritze — jed. Kelchzipfel m. Spaltvertiefungen!), z. B. *edulis* G., etc., s. *Koelpinia* Pall.

Rhamnaceae R. Br., -*nēae* DC., *Rchb.*, -*ni* Juss. Kreuz- od. Wegdorn-artige, s. *Rhamnus*!

Rhamnus L. (Rhamnaceen, V. 1) Kreuz- (eig. Kreise-) Dorn Mej., Wegdorn Seub., eig. Wehedorn, fr. *nerprun* (lat. *niger prunus*), e. buckelthorn od. rhein-berry „Rheinbeere“ (gr. *ρήζυρος* Dornstr. v. d. celt. *ram* Gesträuch), z. B. *cathartica* L. Purgierdorn, Wehenbeere Mej., Dintbeerstr. Vilm., fr. *bourg-épine*, *nerprun purgatif* od. *commun*, e. *purging buck-thorn* od. *yellow-berry*, s. *Cervispina cath.* Much.

Ramphospermum Andrez. (zu *Sināpis*) *Rchb.* (Cruciferen *Siliquos.*, XV. 2) „Schnabelsamensamen“ (*ράμφορος* Krummschnabel, *στέγμα* S. — etwas krumm. Schnabelfortsatz d. Schoten).

1) **Rhaphis** Lour. (Gräser, XXIII. 1) „Nadelgras“ (*ραφίς*, -*ίδος* Nadel — nadelf. Blüthengrannen), s. *Andropogon acicularis* Retz. 2) **Rhaphis** P. Br. (*Rhaphis* L. f., Schreb.) (Palmen, XXI. 7) Nadel- od. Sagopalme (v. *ράφης* Nadel od. *ραπίς* Rute — d. Palmen sind nur rutenförm. Schäfte), Zier. *R. flagelliformis* Ait. m. v. *variegata* etc., s. *Raphia* P.-B. (*Rhaphis* L. f.), *Sagus* G., *Metroxylon* Kön. „Kernholz“.

Rhaphistemma s. **Raphist.**

Rhaphis L. f., Schreb., Ait. (Palmen, XXI. 7) „Ruten“-P. (v. *ραπίς*; Rute — rutenf. Stämme!), s. *Rhaphis* P. Br.

1) **Rhapontica** DC. (Composit. *Centaureen*, XIX. 3) Klettenblatt-Flockenblume (v. *Ρᾶ* u. *ρήρον*, lat. *Rha-ponticum* Fluss in Pontus, *Ρᾶ* auch Wolga), *R. scariosa* DC., s. *Centaurea Rhapontica* L. (*Serratula Rhaponticum* DC.). 2) **Rhaponticum** Less., Lam. (zu *Centaurea*), z. B. Zier. *scariosum* Lam. (s. eb. 1), fr. u. e. *rhapontic Flockendistel* Rmpl., *pulchrum* Fisch., Mey. etc., s. *Centaurea Rhap.* L., *jacca* L., *alba* L. etc. 3) **Rhaponticum** Alp. (sc. *Rhēum*) L. (*Polygonaceen*, IX. 2) *Rhapontik-* od. *pontischer Rhabarber*, fr. *rapontique* (fr. u. e. *rhapontic*) *de montagne*, auch *Mönchs-Rhabarber*.

Rhedia L., Pers. (**Rhedia** *Rchb.*) (*Guttiferen Garcinieen*, XIII. 1) „Rheede's“-Gummibaum, fr. *cyroyer* (n. H. *Rheede* Van Drakenstein, s. d. Aut.), *R. lateriflōra* L. (*Mammēa humilis* Vahl).

Rhēum L. (*Polygonaceen*, IX. 2) *Rhabarber*, fr. *rhubarbe*, e. *rhubarb* (v. *ρήρον* Fluss u. *Ρᾶ* lat. *Rha* Wolga, daher „Rhabarber“ *Rha* bar-

bärum), z. B. R. Rhabarbärum Pall., fr. u. e. rhabarb (rew-, rhu-, rheu-) eig. „fremdes od. barbarisches Rheum“, R. Rhaponticum L. (s. v.), Zier. R. nobile Hook. f., australe Don, undulatum L., palmatum L. (Nepal), R. Emodi Wall., officinale Baill. (palmatum tan-guticum Reg.) etc.

Rhexia L., Nutt. (Lythraceen Melastomaceen, VIII. 1) „Bruchheil“, Ankerblume Rmpl., fr. quadrette od. rhexie (v. ῥήξις Durchreissung, Bruch — Anwend. geg. Brüche), Zier. R. virginica L., holosericea Bpl. (Lasiandra argentea DC.), taxifolia St. Hil. (Marcetia tax. DC.). — Rhexiæae DC.

Rhinanthus L. (Scrophularineen, XIV. 2) Hahnenkamm, Wiesenklapper, Klapperkraut, eig. „Nasenblume“, fr. cocrète, e. cock's-comb, fr. auch crête de coq u. oreille de cochon, s. Alectorolophus Hall., z. B. major u. minor L. (v. ῥίν, -ίρος Nase, Rüssel u. ἄνθος Bl. — Ähnl. d. Blume m. ein. Schweinsrüssel). — Rhinanthacæae DC.

Rhinopetalum Fisch. (Liliaceen, VI. 1) „Nasenkronblatt“ (s. eb. u. petalum Kronblatt — d. oberste Blumenblatt m. hornart. ausgeh. Nektargrube!), z. B. Karelini Fisch.

Rhipidodendron Willd. (Amaryllideen, VI. 1) „Fächerbaum“, -aloë (ῥιπίς, -ίδος Fächer, δένδρον Baum — fächerart. Verzweigung dess.), z. B. dichotomum W., s. Aloë dich. L.

Rhipsalis Haw., G. (Cacteen Opuntieen, XII. 1) „Geisselcactus“, Rutendistel, -cactus Leun. (v. ῥίψ, -πίος Rohrschleuder, Weidenschl. v. ῥίπτω schleudere — hängende Blüten!), z. B. penduliflora Nees, parasitica Haw., etc., s. Cactus etc.

Rhizanthæa Endl. „Wurzelblüter“ (ῥίζα Wurzel, ἄνθη Blüte) i. q. Rhizocarpæae Batsch.

Rhizobolus G., Schreb. (Bombaceen Rhizoboleen, XIII. 4) „Wurzelschneller“, Butternussbaum (s. eb. u. βόλος v. βάλλω werfe, d. Wurf — sehr grosse Keimwürzelchen), s. Caryocār butyrosium W. (Pekea but. Aubl., Castanea peruviana Clus.). — Rhizobolæae DC., Rehb. (zu Malpighiæae Bartl.).

Rhizocarpæae Batsch, Seub. „Wurzelfrüchtige“ (s. v., καρπός Frucht) i. q. Rhizanthæae Endl.

Rhizophora L. (Lythrac. Rhizophoreen od. Lorantheen, XII. 1) Wurzelbaum, -senker, „-träger“, fr. paletuvier (s. v., φορός tragend — d. noch hängende Samen bei d. Berührg. d. Erde Wurzel schlagen!), z. B. R. Mangle L. Mangrovebaum, Leuchter- od. Stelzenbaum, s. Aegiceras G. — Rhizophoræae R. Br., DC. Mangrove- od. Manglebäume.

Rhizopogon Fr., Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Wurzelbart“, -Trüffel (s. v., ῥιζών Bart — netzart. Wurzelfasern!), z. B. aestivus Fr., s. Tuber aest. Spr., etc., s. Lycoperdon gibbosum.

Rhodanthe Lindl. (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Rosenblume“ Vilm. (ῥόδον Rose, ἄνθη Blüte), Zier. R. Manglesii Lindl. m. v. v. (Neuholl.) „Rosen-Immortelle“ Leun. (z. B. v. atro-sanguinea Hort., v. fl. pleno „Fürst Bismarck“, v. maculata etc.).

Rhodiola L. (zu Sedum DC.) (Crassulaceen, XXII. 7) „Rosenwurz“-Fetthenne (dem. v. ῥοδίος rosig — d. Wurzel v. stark. Rosengeruch!), Zier. R. rosæ L. s. odorata Lam., s. Telephium luteum minus Moris. s. g. Rhodiserwurz (Anacampseros T.) (essb., hoh. Norden).

Rhodochiton Zucc. (Scrophularineen, XIV. 2) „Rosenrock“ (s. v. u. χιτών Unterkleid etc. — Kelch rosenr.!), z. B. Pracht-Schlingpfl. volubile Zucc. (Lophospermum atro-sanguineum Hort., Mex.).

Rhododaphne G. Fr. s. Nerium Oleander L. „Rosenlorbeer“ (ῥόδον u. Daphne Lorbeer).

- Rhododendron** L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) Alpenrose, eig. „Rosenbaum“, fr. rosage (-sagine) od. laurier rose des Alpes, e. rose-bay (*ῥόδον* u. *δέιδρον* Baum), Alpen: R. ferruginum L. gem. Alpenröschen od. Almrausch, fr. rosage commun, u. hirsutum L. haarig. Alpenr., fr. rosage velu, Zier.: R. Catawbiense Mchx., Alprose von Catawba (m. viel. Blendling.), maximum L. (Nordam.), ponticum L. m. v. v., dahuricum L. (Südsibir.), Glash. arborum Sm. (Nordind.), campanulatum Wallr. (das.), argentum Hook. f., etc.
- Rhodolēa (-leia)** Bot. Mag. (Hamamelideen, IV. 2) „Rosen-Olive“ (s. v. u. Olēa Olive), Treibh. Championi Bot. M. (China).
- Rhodōra** L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) Sumpfrosee Leun., Frührose Lauch. (s. v. u. *ῥόρα* od. *ῥόρα* Sicht, Ansehn), Zier. R. canadensis L., s. Rhododendron Rhodōra G. Don (Chamaer. rhododendros Duham.). — Rhodoraceae Klotzsch, Grck. (zu Ericaceae Rehb.).
- Rhodothamnus** Rehb. (Ericaceen, X. 1) Alpröschen, „Rosenbüschlein“ (s. v. u. *ῥάμνος* Busch — klein. rosenr. blüh. Str.), s. Rhododendron Chamaecistus L.
- Rhodotypos** Sieb. u. Zucc. (Rosac. Spiräaceen, XII. 5) Jambukistrauch Rmpl., Scheinkerrie Lauch., eig. „Rosenbild“ (s. v. u. *ῥύλιος* Schlag, Bild od. Typus — bez. d. Frucht!), Zier. kerrioides S. u. Z.
- Rhoeadēa** DC., -ādes Endl. Mohnpflanzen, s. Rhoeads!
- Rhoeads** (sc. Papāver) L. (Papaverac. od. Rhoeadeen, XIII. 1) Klatschrose, -mohn Vilm., Acker-, Feld-, Ranunkelmohn, s. g. Pfaffen, fr. coquelicot, pavot coq., ponceau, fleur pleurétique, e. cockle-weed, corn-poppy etc. (gr. *ῥοιὰς* abfallend — näml. d. Kelchblätt. b. Aufgehen!).
- Rhopāla** G., Schreb. (Proteaceen, IV. 1) „Keulen“-Silberbaum (*ῥόταλον* Keule — näml. d. Narbe keulig!), z. B. complicata Hb. Bpl., montana Aubl., robusta Roxb. (Helicia cochinch. Lour.) etc.
- Rhūs** L. (Gen. Rhōis) (Terebinthaceen od. Anacardiaceen, V. 3 od. XXII. 5) Sumach, fr. rhus od. roux, sumac, e. rhus od. sumach-tree (gr. *ῥοῦς*, *ροῦ* od. *ῥοός* von d. celt. rhudd rot — Farbe d. Frucht! od. *ῥίω* fliesse — lass. Saft fließen, stopf. Durchfall!), Zier. R. typhinum (-na) L. Essig- od. Hirschkolbe, Essigbaum, fr. vinaigrier, e. stag's od. buck's-horn-tree, fever-Rhus, virginian sum.-tree, m. v. pumila u. v. viridiflora Hort., R. Coriaria L. Gerber-S. od. Schwarzholz Vilm., fr. roux des corroyeurs, e. hide-tanning Rh., elm-leaved Sum.-tree, R. Cotinus L. Perücken-S. (Cotinus Coccycgea od. Coccycgia Scop.) Gelb- od. Fisetholzbaum, fr. l'arbre à perruques, bois jaune, fustet u. marabout, e. Venus- od. Venice-Sumach, venetian S., R. Toxicodendron L. u. radicans L. (Nordam.), R. vernix L. s. vernicifera DC. Firnisbaum (Jap.), R. Copallinum L. „Kopal“-S. (Nordam.) etc.
- Rhymōris** Pers. (Blätterpilze, XXIV. 4) „Furchenschwamm“, Krämpel- od. Deichselpilz Kumm. (v. *ῥυμός* Furche, *ὄον* lat. ovum Ei), z. B. involucrata P. wahrer F.
- Rhynchoearpa** Schrad. (Cucurbitac., XXI. 10) „Schnabelfrucht“ (*ῥίγγος* Schnabel, *καρπός* — Beere m. lang. Schnabel!), Zier. dissecta Naud. (Coniandra d. Schrad.), s. Bryonia diss. s. africana Thb.
- Rhynchopēra** Klotzsch (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Schnabelranzen“ (s. eb. u. *ῥήρα* Sack, Ranzen), z. B. punctata Van Houtt., s. Pleurothallis R. Br.
- Rhynchosia** Lour. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Schnabelkiel“ (s. v. — in Bez. auf d. carina d. Blüt.!), z. B. volubilis, menispermoïdes DC. etc., s. Glycine u. Dolichos.
- 1) **Rhynchospermum** Reinw. (Apocynen, V. 1) „Schnabelsamen“ (s. v.

u. *στέουα* S.), Zier. jasminoides Ldl. (Schlingpfl. Jap.). 2) **Rh.**- autt. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) (— Achenen kurz geschnäbelt!).

Rhynchospora Vahl (zu Schoenus) L. (Cyperaceen, III. 1) „Schnabelsamensamen“, Moorsimse, Semde O. W. (s. v. u. *στορά* Samen — Nuss m. bleibend. Griffel), z. B. *alba* u. *fusca* Vahl.

1) **Rhytispermum** (st. **Rhytidosp.**) (Ulmaceen Celtideen, XXIII. 1) „Runzelsamen“-Zügelbaum (*ῥυτίς*, *-ίδος*; Runzel, *στέουα* Samen), s. *Celtis*. 2) **Rhyt.** Lk. (Boragineen, V. 1) (zu *Lithospermum*) (— d. Nüsschen runzlig!).

1) **Ribes** L. (Ribesiaceen od. Grossularieen, V. 1) Johannis- u. Stachelbeerstrauch (*ribes* veränd. *rubus* Leun., od. *ribas* eine saure Pfl. d. arab. Ärzte Paxt. = Rheum *Ribes* Wst. — unsicher!), Gärten: *R. nigrum* L. Ahlbeere, dän. *solbaer* „Sonnenbeere“ Mej., fr. *cacis* od. *poivrier*, *R. rubrum* L. m. v. *album* Hort., rote Johannisbeere, s. g. Ribissel Vilm., fr. *ribette*, e. *currant* (corand), *R. grossularia* L. gem. od. rauhe Stachelb., fr. *groseillier commun*, *R. Uva crispata* L. Kahlbeere, *R. reclinatum* L. rote Stachelb. — Zier.: *alpinum* L. (dioecum Mneh.), fr. *groseillier des Alpes*, e. *alpine currant*, *sanguineum* Pursh m. v. v. (z. B. *atro-sanguineum* Hort.), *R. Calobotrya* sang. Spach, echte Schöntraube, aureum Pursh Goldtraube, s. g. Chokoladestr., s. *Symphocalyx* Berland. (*R. palmata* Desf., *fragrans* Lodd., *Chrysobotrya revoluta* Spach). 2) **Ribes** (sc. *Rhēum*) L. (Polygonaceen, IX. 2) Zuckerblatt-Rhabarber (*folia tanquam saccharo candido adpersa* Dill.). — *Ribesiaceae* Rehb. (*Ribesium* G. Fr. „Johannis-träubel“).

Ribesia Berland., DC. (zu *Ribes*, sect. *inermia*) Johannistrauben (s. eb.).

1) **Riccia** Mich. (Lebermoose, XXIV. 3) „Riccie“ (n. P. Franc. Ricci, Senator in Florenz im 16. Jahrh.), z. B. *glauca* Mich. — *Ricciaceae* Rehb. 2) **Riccia** Fl. Flum. (Tange, XXIV. 3).

1) **Richardia** Kth. (Araceen, XX. 9) „Richardie“ od. *Calla* (n. d. franz. Bot. Prof. L. Cl. Mar. Richard z. Paris), *Stuben R.* s. *Calla aethiopica* Kth. (*Zantedeschia aeth.* Spr.), *hastata* Hook. m. v. *albo-maculata*. 2) **Richardia** L., Hout. (*Rubiaceen*, VI. 1) *Richardsonie*, *R. scabra* G., s. *Richardsonia* sc. Kth. (n. d. engl. Bot. u. Reis. unter Franklin 1819/22 Rich. Richardson, schr. 1699 üb. Gartenkultur).

Ricinus T., L. (*Euphorbiaceen* od. *Trikokken*, XXI. 9) Wunderbaum, fr. *ricin* od. *girasol*, e. *oil-nut-tree* u. *palmatory* (lat. *ricinus* Zecke, gr. *ρίζυνο*; hebr. *kikar* d. i. rundlich — Samenähnlichk.), Zier. *R. communis* L. s. *tunicensis* Desf. (major u. minor Hort.), fr. *carapas* (-pat), *palma Christi* u. *figuier infernal*, e. *palma Christi* u. *palmary*, m. v. v. (*rutilans*, *sanguineus* etc.), *R. viridis* W., *africanus* Mill. — *Ricinēae* (sc. *Euphorbiac.*) Rehb.

Ridolfia Moris. (Unbellifer. Ammineen, V. 2) „Ridolfie“, Saatenfenchel, *R. segētum* Moris. (wohrl. *Decorat.*-Pfl.) (n. C. Ridolfi, Prof. in Pisa, schr. ein. Pfl.-Katal., Florenz 1843), s. *Foeniculum* seg. autt.

Rindera Pall. (Boragineen, V. 1) „Rinder's“ Hundszunge (n. Dr. Rinder in Moskau, der d. Pfl. b. Orenburg fand), *R. tetraspis* Pall., *carolinensis* Pers., etc., s. *Cynoglossum Rindera* Pall. s. *laevigatum* L. u. *Batschia canescens* Pers.

Ritro Schkuhr, Endl. (sc. *Echinops*) L. (Compos. *Echinopeen*, XIX. 5) echter „Ritro“, kochblättr. Kugeldistel, fr. *boulette azurée* (Nam. d. Pfl. in Südeuropa), s. *Echinops strictus* Schrad.

Rivina L. (bess. *-nia* Juss.) (Phytolacceen od. *Chenopodiaceen*, IV. 1) „Rivinie“ (n. d. Prof. Rivinus in Leipzig, † 1723), Zier. *R. humilis* L., *R. paniculata* L., s. *Salvadōra persica* Vahl etc.

Robertsonia Haw. (zu *Saxifraga*) Rehb. (*Saxifragaceen*, X. 2) „Robertsonie“ (n. W. Robertson, schr. *Collect. de Serres chaudes pour forcer*

- des ananas etc., Lond. 1798), Ampelpfl. *R. sarmentosa* Haw. s. *stolonifera* Jacq., s. g. Judenbart, s. *Diptera stol.* Borkh. (*Saxifr. sarn.* L. s. *stol.* Jacq.), *R. crenata* Mch. s. *dentata* Haw., s. *Saxifr. Gēum* L.
- Robinia** L., DC. (*Leguminos. Galegeen*, XVII. 4) „Robinie“, s. g. Akazie, fr. Robinier, bois d'ainon, e. locust-tree (n. Joh. Robin, Gärtn. d. Kön.'s Heinr. IV. v. Frankr. um 1600), Zierb. *R. Pseud-Acacia* L. gem. Schotendorn, m. v. v. (z. B. *inermis* Dum. s. *umbra-culifera* DC. Kuglakazie, fr. Rob. Parasol); *R. viscosa* Vent. s. *glutinosa* L. Pech- od. Klebakazie, m. v. *albiflora* Hort.), *R. hispida* L. (rosča Lois.) m. v. v. (z. B. *bella rosea*) Rosen-Ak. Vilm., fr. Rob. rose, e. *hispid Robinia*.
- Robsonia** Berland., DC. (*Ribesiaceen*, V. 1) „Robson's“-*Johannisbeere* (n. Steph. Robson, schr. t. brit. Flora, York 1777), s. *Ribes speciosum* Pursh (*Californ.*).
- 1) **Robur** (sc. *Quercus*) L., W. (*Cupuliferen*, XXI. 8) Stein-, Winter-, Rot-, Traubeneiche (*robur*, -bōris Kraft u. Hartholz, celt. rove), fr. rouvre (roure) od. durelin, e. elke, holm-oak (-tree), auch barren scarlet-oak, s. *Q. sessilis* Ehrh. (*sessiliflora* Sm.). 2) **Robur** (sc. *Quercus*) Sm., Grck., s. *Q. pedunculata* Hoffm. s. *racemosa* Lam. Stiel- od. Sommer-eiche, fr. gravelin (*Q. femina* Roth, *longaeva* Salisb., *fructipendula* Schrk.).
- Roccella** DC. (*Flechten*, XXIV. 3) Fels- od. Lackmusflechte, fr. orseille (ursolle), e. archil u. litmoss (span. *rocca* Felsen), s. *Lichen Roccella* L. — *Roccellēi* Nyl.
- Rochea** DC. (*Crassulaceen*, V. 5) „De la Roche's“ Dickblatt (n. d. Bot. De la Roche), Zier. *R. falcata* DC., *odoratissima* u. *coccinea* DC. (*Larochea* Pers., *Dietrichia* Tratt., *Kalosanthes* Haw.).
- Rodschedia** Gärtn. (*Cruciferen Siliculos.*, XV. 1) Hirtentäschchen, *R. bursa pastoris* Fl. Wett. (n. d. Bot. E. K. Rodschied, schr. de necess. et util. studii bot. Marburg 1790, † 1796 in Essequebo), s. *Capsella Bursa* s. *Thlaspi burs. past.* L.
- Roëlla** L. (*Campanulaceen*, V. 1) „Roëlle“ (n. W. Roëll, Prof. d. Anatom. z. Amsterd.), z. B. *ciliata* L. s. *reticulata* Lam. (*Campanula afric.* Comm., *Aculeosa mauretanica* Pluk.), s. *Zygophyllum fruticosum* autt. u. *Roeperia* Spr. *fruticulosa* A. Juss.
- Roestelia** Rehbent., Lk. (*Staubpilze*, XXIV. 4) „Röstel's“- od. Gitterrost, -brand D. (n. d. Apoth. Röstel zu Landsberg), *R. cancellata* Rehbent., s. *Gymnosporangium fuscum* Oerst. (davon die *Aecidium*-Generation!).
- Rogiera** Planch., Lindl. (*Rubiaceen Hedyotideen* od. *Rondeletieen*, V. 1) „Rogiere“ od. *Rondeletie* (n. d. Namen Rogier u. *Rondelet*), Zier. *R. cordata* u. *elegans* Planch., *gratissima* Pl., Ldl. s. *Rondeletia* Plum.
- Rolandra** Schreb., Rottb. (*Compos. Echinopeen*, XIX. 5) „Rolander's“-Kugeldistel (n. Dan. Rolander, Schül. v. Linné, bereiste Surinam), *R. argentēa* Sw., s. *Echinops fruticosus* L. f.
- Romulēa** Pers. (*-lia* Marrat.) (*Irideen*, III. 1) (zu *Ixia* L.) römische Uchtblume (*Romulēus* v. Kön. Romulus od. römisch), z. B. *R. Bulbocodium* v. *nivale* Bak. Schnee-Haarfaden, s. *Trichonēma nivale* Boiss., Ker.
- Rondeletia** Plum., L. (*Rubiaceen Cinchonac.*, V. 1) „Rondeletie“ (n. d. Nat. Guill. *Rondelet* z. Montpellier, 16. Jahrh.), Zier. *R. speciosa major* Hort. (*odorata* Jacq., *coccinea* Moç., *speciosa* Lodd.) (*Havanna*), *americana* (das.), *Burdiei* Hook. (*Venezuela*). — *Rondeletieā* DC.
- Roripa** Scop. (*Crucifer. Siliquos.*, XV. 2) Wasserkresse Leun. (rös, -ris Tau? *ripa* Ufer? — unklar! viell. N. propr.), s. *Nasturtium amphibium*, *silvestre* etc.
- Rosa** L. (*Rosaceen*, XII. 5) Rose, fr. rose (-sier), e. rose, wilde: *R. canina* L. Hunds- od. Heckenrose, fr. *cynorrhodon*, e. dog-briar

(-rose), sweet-briar, canker-rose u. hep-tree od. haw-thorn „Hagedorn“, *R. arvensis* Huds. (*sylvestris* Herm., *serpens* Ehrh., *repens* Scop., Gm.) Kriechrose, fr. *R. rampante*, e. field-r., *R. rubiginosa* L. Weinrose, fr. rosier rouillé, *R. villosa* L. (*pomifera* Herm., K. Koch, mollis Sm.) Apfelrose, etc.; Zierr.: a) *Pimpinellifoliae* K. Koch „Bibernellrosen“, z. B. *lutëa* Mill. (asiat. Türkei) m. v. v. (*R. bicolor* Jacq. s. *punicëa* Mill. s. g. Kapuziner-R., v. persian yellow (fl. pl.) etc.), *R. sulphurëa* Ait. (*hemisphaerica* Herm.) „Schwefel“-R. od. s. g. gelbe Centifolie Rmpl., *R. spinosissima* L. s. *pimpinellifolia* DC. (auch wild), fr. r. *pimprenelle*, s. g. Marien-R. od. Marterdorn, m. v. v. — b) *Cinnamomëae* K. Koch „Pfingstrosen“, z. B. *cinnamomëa* L. „Zimmt“-R. m. v. v. (*R. foecundissima* Münchh.), *R. alpina* L. „Alpen“-R. m. v. v. u. Hybr. (*R. Boursaultrosen alpina-chinensis*). — c) *Hortenses* K. Koch „Gartenrosen“, z. B. *damascëna* Mill. (Syr.) *Damascener-R.*, Hauptstammrose d. edlen Gartenrosen, *R. centifolia* L. „Centifolie“ m. v. v. (*R. muscosa* Mill. „Moosrose“, v. *provincialis* Mill. *Pomponrose*, e. cabbage-r., v. *parvifolia* W. „Burgunder“-R., v. *pulchella* Hort. „Champagner“-Röschen, v. *divionensis* Hort. „Dijon“-R.), *R. gallica* L. *Essig-* od. *Purpur-R.* (Südeur.), fr. r. de Provens (Champagne). — d) *Caninae* K. Koch „Hundsrosen“, z. B. *villosa* L. (*pomifera* Koch) Apfel-R., *alba* L. weiße R. m. v. v. (*R. maiden's-blush*, fr. *Cuisse de Nymphé*. — e) *Corymbiferae* K. Koch „Büschelrosen“, z. B. *repens* Scop. (s. ob.) s. *capreolata* Mill. m. v. v. (*R. Ayrshire-R.*), *R. sempervirens* L. (Orient), *multiflora* Thb. (Jap., Chin.), *moschata* Mill. *Moschus-R.* (als Hybr. *Noisette-R.*), *setigera* Mchx. *Prairie-* od. *Kletter-R.* (Nordam.) — f) *Nobiles* K. Koch „Edelrosen“, z. B. *chinensis* Jacq. s. *indica* Hort. m. v. v. (*R. semperflorens* Curt. s. *bengalensis* Pers. Monats-R.), *R. minima* Curt. „Liliput“- od. *Lawrence-R.* (Topf.), *R. fragrans* Röd. *Theerose*, *R. borbonica* Hort. „Bourbonrose“ m. v. v. (*R. Gloire de Dijon*), *R. Noisettana* Röd. „Noisette“-R. (Hybr. v. *R. bengal. m. moschata*!). — *Roses remontantes* (immerblüh. Hybriden) früher s. g. *Herbstrosen* (— Abkömml. v. *Damascener* u. *Chineser-Rosen*, Rmpl.). — *Rosaceae* Juss., DC., -sëae (zu *Rosaceae*) Rehb.

Rosanowia Reg. (Gesneriac., XIV. 2) „Rosanowie“ (n. d. Nam. Rosanow geb.), z. B. *conspiciua* Reg., s. *Biglandularia* Seem.

Rosiflorae Endl., Rehb. „Rosenblütige“ (*rosa* u. *flos*, -*oris* Blume etc.).
Rosmarinus L. (Labiaten, XIV. 1) „Rosmarin“, eig. „Meertau“, fr. *encensier* u. *romarin*, e. *rosemary* (*ros-marine*) u. *heart's-root* (*ros*-, *oris* Tau, *marinus* vom Meer — Standort! viell. v. *ῥώψ* niedr. Strauch u. *μύρτος* balsamisch, Leun.).

Ros-sölis T., Scop. (Droseraceen, V. 5) rundblättr. „Sonnentau“ (s. v., sol, -is Sonne), s. *Drosera rotundifolia* L.

1) **Rottboella** L. (-ia Roth, Schreb.) (Gräser, III. 2) „Rottboell's“-Gras, Dünnschwanz (n. d. dän. Bot. C. F. Rottboell, schr. Descr. plant. quarundam Surinamensium, Hafn. 1798), s. *Lepturus* R. Br. (*Aegilops* L. u. *Cymbachne* W. 2) **Rottb.** Scop. (*Lucumeen*, X. 1).

Roupellia Hook. (Apocynen, V. 1) „Roupellie“ (n. ein. Eigennamen), Treibh. *R. grata* Hook. (Schlingstr. Westafr.), s. *Strophanthus Stanleyanus* Hook.

Royëna L. (*Lucumeen* od. *Mimusopeen*, X. 2) „Royene“ (n. d. Prof. Adr. v. Royen z. Leyden, † 1779), z. B. *glabra* L. (*Vitis Idaea aethiopicæ* Comm., *capische* Preisselbeere), *ambigua* Vent., *lucida* L. (*Staphylo-dendron* afric. Comm., *Cap-Str.*) etc.

Rojlëa Wall. (Labiaten, XIV. 1) „Royle's“ *Ballote* (n. d. Prof. J. Forbes

Royle z. London), z. B. *elegans* Wall. (*Phlomis calycina* Roxb., Str. Ostind.), s. *Ballota cinerea* Don.

Rubia T. (Rubiaceen od. Stellaten, IV. 1) Krapp, „Färberröte“, *R. tinctoria* L., fr. garance, provinziell auch rapequicou u. rubi, e. madder od. mather u. gosting (v. rubëo bin rot — roter Farbstoff d. Wurzeln). — Rubiaceae Juss., DC., Rchb., fr. rubiacées i. q. Stellatae L. Sternkräuter — Rubicinea Bartl. Ord. d. Krappgew.

Rubus L. (Rosaceen, XII. 3) Brombeere, Steinbeere O. W., fr. ronce od. framboisier, e. bramble, black-, knot- u. rasp-berry (hind-) (v. d. celt. rub rot, d. lat. rubëo bin rot — nämlich d. Früchte etl. Arten), z. B. wild: *R. plicatus* W., Nees s. *fruticosus* L. faltenblättr. od. Wald-Brombeere, fr. ronce commune, thyrsoidëus Wimm., caesius L. Bocks- od. Kratzbeere, fr. ronce bleue, e. grey-bramble od. dew-berry, *R. Idaeus* L. Himbeere, fr. framboise (-sier), e. rasp- od. hind-berry, Zier. *R. odoratus* L., fr. ronce odorante, m. v. fl. albo, nobilis Reg., bellidi- u. rosaeflorus Hort., arcticus L., laciniatus W., fr. ronce à feuilles laciniées, e. cut-leaved-bramble, *R. fruticosus* L. m. v. fl. pl. u. rubro fl. pl. Hort., fr. r. commune, c. common black-berry.

Rudbeckia Ad. (Myrobalaneen, X. 5) „Rudbeck's“-Balsampflaume (s. sogl.).

Rudbeckia L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Rudbeckie“ (n. d. schwed. Bot. Prof. Olaus Rudbeck), Zier. *R. hirta* L., *speciosa* Wend., *amplexicaulis* Vahl (-folia Jacq.), *Drummondii* Hook., *purpurea* L. s. *serotina* Nutt. etc., s. *Dracopis*, *Obeliscaria*, *Echinacea* Mnch. etc.

Rudgëa Salisb. (Rubiaceen, Coffeaceen, V. 1) „Rudge's“-Kaffeestrauch (n. Edw. Rudge, schr. *Plantae Guianae rariores*, Lond. 1805), *R. macrocephala* Sal., *spicata* Spr. (*Coffea spic. Kth.*) etc.

Rudolphia W. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Rudolphi's“-Süssbohne (n. d. Bot. K. Asm. Rudolphi zu Jena), z. B. *peltata* W. (*Erythrina planisiliqua* Corallodendron Plum.), s. *Glycine sagittata* autt.

Ruëllia L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ruëllie“, fr. crustolle (n. d. franz. Arzt etc. Jean de la Ruelle, lat. *Ruellius* in *Soissons*, Leibarzt Franz I., † 1537, schr. de natura *Stirpium*), Zier. *R. superba* Dietr. (*formosa* Andr., *elegans* Poir.) (Hstr. Brasil.), *maculata* Wall. (Ostind.) etc.

Rumex L. (Polygonaceen, VI. 3) Ampfer, fr. raguette u. oseille, e. sorrel u. dock (lat. *rumex*, -icis v. *ῥύμα* Fluss, Paxton: v. *rumo sauge?*, *ruma* od. -mis säugende Brust), Gärten *R. Patientia* L. s. g. englischer Spinat, *scutatus* L. Schildampfer, wild: *R. Acetosa* L. Wiesen-Sauerampfer, fr. oseille ordinaire, e. sorrel, *R. Acetosella* L. Spitzampfer, *R. aquaticus* L., fr. plante britannique, *R. crispus* L., *sanguineus* L. s. *nemorosus* Schrad., fr. sang-de-dracon, e. bastard-rhubarb, etc.

Rupifraga Otth. (Sileneen, X. 3) „Felsbrech“, s. *Silene rupestris* L. (v. *rupes*, -is Felsen, frango zerbreche — liebt stein. Boden!).

Ruppia L. (Fluvialen od. Potamogeen, IV. 3) Seestrands- od. Meerfaden, Wasserriemen, Salde O. W. (n. d. deutsch. Bot. Bernh. Rupp, lat. *Ruppia*), *R. maritima* L. (*Buccaferrëa* m. Mich.).

1) **Russelia** L. (Saxifragaceen, V. 2) „Russellie“, *R. s. Vahlia* Thb. *capensis* (n. d. Bot. Lord John Russell, Herz. v. Bedford, Wtst.: n. d. engl. Arzt u. Orient-Reis. Alex. Russell, † 1786). 2) **Russellia** Jacq., Juss. (Scrophularineen, XIV. 2) „Russellie“, Zier. (Ampeln) *R. juncëa* Zucc., *multiflora* Sims, *sarmentosa* v. *semperflorëns* Hort.

Ruscus L. (Sarmentaceen, XXII. 13) Mäusedorn, fr. brusce (bruse) (lat. *Radix Brusci*), fragon, houx frëlon, petit-houx, auch husson, e. butcher's-broom „Fleischerbesen“, knee-holm (rus, -ris Land, scopae Besen, *ruris scopae*, unde *Ruscus* Plin.), z. B. *androgynus* L. (Canar.).

- Russūla** Fr., Pers. (Hutpilze, XXIV. 4) „Rotpilz“, Reizker (dem. v. russus rot), z. B. emetica s. lurida Pers., s. g. „Täubling“, s. Agaricus em. Schaeff., R. foetens Pers. Stink-Täubling, essb. aurata, lutca etc.
- 1) **Ruta** L. (Rutaceen, VIII. 1) „Raute“, fr. rue, e. rue, herb of grace (gr. *ρύτι*) v. *ρύομαι* rette od. *ρύω* mache fließen), R. graveolens L. Duft- od. Gartenraute, fr. sauve-vie. 2) **Ruta muraria** (sc. Asplenium) L. (Farne, XXIV. 1) Stein- od. Mauerraute, e. wall-rue od. stonefern. — Rutacēae Juss., DC., -tariae Rchb. Rautengew.
- Sabadilla** (sc. Verātrum) L. (Melanthaceen, VI. 3) Läusesamen, fr. cévadille, e. louse-wort (-bane) (dem. v. cebada span. Gerstenkorn).
- Sabal** Adans. (Palmen, VI. 1) Zwergpalme (vaterl. Name!), Stuben S. umbraculifera Mart. (Blackburniana Hort.), Adansonii Guerus (Corypha minor Murr.).
- 1) **Sabbatia** Adans. (Gentianeen, V. 1) „Sabbatie“ (n. d. ital. Bot. Const. Sabbati, schr. 1772—84 üb. d. röm. Gart., Wtst. n. Liberatus Sabbati, schr. 1745 Synops. pl. Romae), Gewächsh. S. campestris Nutt. (Tex.). 2) **Sabbatia** Mneh. (Labiaten, XIV. 1) „Sabbati's“-Lippenblume.
- Sabīna** (sc. Junipērus) L. (Junipereen od. Cupressineen, XXII. 12) Sade- od. Sevenbaum (Sieben-, Seben-), Mägdebaum, Stinkwachholder, fr. sabine od. savinier, e. sabine od. common savin (v. Sabīna Sabinierin? Seben (Seven) d. lat. sabīna, Wtst.: *σέβω* verehere — weg. d. Heilkraft! — ungewiss).
- 1) **Sabinēa** DC. (Papilionaceen, XVII. 4) „Sabine's“ Schmetterlingsblüte (n. d. engl. Bot. J. Sabine, Stifter d. Vereins f. Gartenkultur in London, † 1837). 2) **Sabinēa** C. Koch (sect. v. Pinus L.) (Coniferen, XXI. 9) Sabine-Kiefern (— 3 Nadeln in d. Scheide), z. B. P. Sabineana Dougl. (n. d. Reis. Sabine, 1823 in Grönland), Coulteri Don (Macrocarya Lindl.), Jeffrey Oreg. „Jeffrey's“-K. (alle in Californ.), Gerardiana Wall. (Himal.).
- Sabulīna** Rchb. (zu Arenaria L.) (Alsineen, X. 3) „Sandmiere“, fr. sabline (v. sabillum, fr. sable Sand — Standort), z. B. stricta Rchb. (Aren. uliginosa Schleich.).
- Saccharum** L. (Gramineen, III. 2) Zuckerrohr, fr. canne à sucre, e. sugar-cane (gr. *σάκχαρον*, arab. soukar), S. officinarum L. gem. Z. m. v. off. violacēum, S. cylindricum Lam. u. Maddenii Hort. (Ziergr.).
- Saccolabium** Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Sacklippe“ (saccus u. labium), z. B. guttatum Ldl. (Sarcanthus gutt. ds. s. Aërides retusa Sw.), s. Saccophilus Blum.
- Sagina** L. (Alsineen, X. 3) „Mastkraut“, Knebel O. W., fr. sagine, e. pearl-wort (sagina Mästung etc.), Zier. S. subulata Wimm. (Arenaria sub. s. acicularis Hort.).
- Sagittaria** L. (Alismaceen, XXI. 5) „Pfeilkraut“, fr. saette od. sagette, léchière „Lieschkraut“, e. arrow-head (v. sagitta Pfeil — Form d. Blätter!), z. B. sagittifolia L. m. v. fl. plen. s. japonica Hort., S. sinensis s. gigantca u. lancifolia Hort.
- Sagus** Rumph., G., Jacq., W. (Palmen, XXI. 7) „Sagopalme“, fr. sagu od. lançan, e. sago-tree (malay. sagu d. Name v. mancherlei Palmen), Zapfenpalme Perring, z. B. S. Rumphii W. (Raphia Comm., Metroxylon Rottb., Saguera Rumphii Roxb.), s. Arenga saccharifera Lab. (Gomutus sacch. Rumph.), S. taedigera Mart., vinifera Hort. (Raphia v. P.-B.) (Guinea), S. Ruffia Hort. (Madag.) etc.
- Salicacēae** Rich., -licēae Rchb., -licinae Rich., DC., -cinēae Seub. (zu Ord. Iteoidēae Bisch.) Weiden (s. Salix).

- Salicaria** T. (sc. *Lythrum*) L. (Lythraceen, XI. 1) „Weiderich“, fr. salicaire, gem. Blutkraut (v. *salix*, -icis Weide — wächst unter solchen!). — *Salicariae* Juss., -carięae Rchb.
- Salicornia** T., L. (Aizoideen Atripliceen od. Chenopodiaceen, II. 1) Glasschmalz, „Salzhorn“-Kraut, fr. *salicor* (-cot, -corne), e. glasswort (v. *sal*, -lis Salz, *cornu* Horn — d. Zweige wie Hörner spitz etc.).
- Salisburia** Sm. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Salisbury's“- od. Ginkgobaum (n. d. engl. Gärtn. u. Bot. R. A. Salisbury), Zier. *S. adiantifolia* Sm. = *Ginkgo biloba* L.
- Salix** T., L. (Salicaceen, XXII. 2) Weide, fr. saule, e. willow, withy „Wiete“ u. wicker (*salix*, -icis Weide, v. d. celt. *sal* nahe u. *lis* Wasser), z. B. Zier. *S. babylonica* L. Trauer- od. Thranenweide, fr. saule pleureur, e. weeping-willow, *S. pendula* Mnch., m. v. *annularis* Hort. Locken-W., wild u. Zier.: *S. daphnoides* Vill. (praecox Hoppe) gem. Reif- od. Duft-W., *acutifolia* W. (pruinosa Bess., *caspica* Hort.), *amygdalina* L. (*triandra* Hoffm.), *viminalis* L. gem. Korb- od. Flechtw., fr. u. e. osier (ozier), *pentandra* L. Lorbeerw., *alba* L. gem. Weiss- od. Kopfw. m. v. *vitellina* L. Gold- od. Dotterw. u. v. *argentęa* Hort. s. *regalis* Hort. Silberw., *fragilis* L. Bruch- od. Knackw., *purpurea* L. (Napoleonis, *nigra pendula*, *babylonica violacęa* Hort.), *S. Helix* L. gem. Bachw. (m. v. *uralensis* Hort., v. *Doniana* Sm. u. v. *mirabilis* Hort.), *rubra* Huds. (m. v. *Forbiana* Sm., v. *Pontederana* W. Koch, v. *austriaca* Host. etc.), *S. Capręa* L. Sal-, Sohl- od. Palmw. (m. v. *pendula* Hort. u. Hybrid. *capr. fol. varieg. od. tricolor* etc.), *Silesiaca* W., *aurita* L., *cineręa* L., *phylicae-* u. *prunifolia* Sm., *S. Elaeagnos* Scop. (*rosmarinifolia* u. *aspleniifol.* Hort.) Rosmarin-W., u. a. m.
- Salpianthus** Hb. Bpl. (Nyctagineen, V. 1) „Trompetenblume“ (*σαλπιγγ* Trompete, *αγθος* Bl.), s. *Boldoa* Lag.
- Salpiglossis** Rz. Pv. (Srophularin. od. Solaneen, XIV. 2 od. V. 1) „Trompetenzunge“ (s. eb. u. *γλωσσα* Zunge — d. Griffel bild. eine röhrl. Zunge!), Zier. *S. sinuata* R. P. s. *variabilis* Hort. (Chili) m. v. *nana* Hort., *coccinea* Van Houtt. etc.
- Salsola** L. (Chenopodiaceen, V. 2) „Salzkraut“, fr. salsovie, marie u. cornulaque, e. salt-weed (-wort) (dem. v. *salsus* salzig — Salzboden!), z. B. *S. Kali* L. gem. *S. (Kali siculum lignosum* Bocc.), *S. aphylla* L. (*Caroxylon* Sals. Thb., Cap).
- Salzwedelia** G. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Pfeilginster, *S. sagittalis* Fl. Wett. (n. P. Salzwedel in Frankfurt a. M. im vor. Jahrh.), s. *Genista sag. L. (Cytisus s. Koch)*.
- Salvadora** L. (Phytolacceen, IV. 1) „Salvadore“, s. g. Siwák (Senfbaum des Neuen Testamentes) (n. d. span. Bot. J. Salvador ben.), *S. persica* Vahl, s. *Cissus arboręa* Forsk. u. *Rivinia paniculata* L. (*Grossularia Embelia* Retz.).
- Salvia** L. (Labiaten, II. 1) „Salbei“, fr. sauge, e. sage (v. *salvus* gesund od. salvo rette, heile), Zier. *S. Sclaręa* L. Muskateller-S., *S. Horminum* L. Scharlachkraut, *S. officinalis* L., Garten-S. m. v. *tricolor* Hort., *S. patens* Benth. (Mex.), *S. splendens* Sell. (ponceau-rote Brakteen, Bras.), *coccinea* L. m. v. v., *S. Roemeriana* Scheele (*Porphyrantha* Decsn., Tex., Bras.), *tricolor* Lem. (Mex.), *janthina* Ott., *Dietr.* (Mex.) etc.
- Salvinia** Mich., Guett. (Wasserfarne od. Rhizocarpeen, XXIV. 1) „Salvinie“, Büschel- od. Schwimmfarn, Schwimmblatt O. W., Kugelknäul (n. Ant. Maria Salvinus, Prof. in Florenz im 17. Jahrh.), *S. natans* All., Hoffm., s. *Marsilia natans* L. — *Salviniaęae* Bartl., -acęi Rchb.

- Sambac** Ait. (sc. *Jasminum*) L. (Oleaceen, II. 1) arabischer Jasmin, fr. sambac (pers. Name zambac!), s. *Nyctanthes* Samb. Thb. (*Mogorium* Juss.).
- Sambucus** T., L. (Caprifoliaceen Sambuceen, V. 3) Hollunder, Holder od. Flieder, fr. sureau, e. bore-tree, elder- od. pipe-tree (gr. σαμβύκη Harfe — aus dess. Holz gemacht! od. σαμβύξ äol. rot — bez. d. Fruchtsaftes! ungewiss!), z. B. *nigra* L. s. *vulgaris* Lam. Flieder, Sebestenbaum Vilm., fr. sureau commun, e. common Elder, m. v. v. (z. B. v. *laciniata* Hort., s. g. Petersiljen-H.), *S. canadensis* L., *racemosa* L. Trauben- od. Berg-H. m. v. v., *californica* s. *glauca* Hort. m. v. Fontenaysii Carr., etc. — *Sambucæ* H. B. K., -cinæe Batsch (zu *Caprifoliacæ* Juss., Rchb.).
- Samolus** T., L. (Primulaceen, V. 1) „Salzbunge“, fr. samole od. mou-ron d'eau „Wasser-Gauchheil“ (v. d. celt. san heilsam u. mos Schwein — bei den Galliern geg. Viehkrankh.), *Samolæ* (sc. *Lysimachiacæ*) Rchb., Bungen (nicht Pungen! Grck.).
- Samyda** L. (*Amygdaleen* *Samydeen*, X. 1) „Birkenpflaume“ (v. σαμύδα Birke — Ähnlichk. damit), z. B. *polyandra* W. (*Melistaureum* *distichon* Forst. Neuceald.), *serrulata* L. (*Guidonia* *ulmifolia* Plum., Südamerika). — *Samydeæ* DC. (zu *Amygdalacæ* Rchb.).
- Sanchezia** Rz. Pv. (*Acanthaceen*, II. 1) „Sanchezblume“ (n. Jos. Sanchez, Prof. d. Bot. in Cadix), z. B. *nobilis* Hook., *oblonga* u. *ovata* R. P., etc.
- Sandersonia** Hook. (*Sarmentaceen*, VI. 1) Maiblumen-Kaiserkrone, *S. aurantiaca* Hook. (Südaf.) (N. pr.).
- Sandoricum** Cav. (*Hesperideen*, XVIII. 2) „Sandoribaum“ (malay. sandori od. santoor).
- Sanguinaria** Dill., T. (*Papaveraceen*, XIII. 1) „Blut“- od. Rotwurz, fr. sanguinaire, e. blood-wort (v. sanguis, -inis Blut — gelbroter Saft!), *Zier. canadensis* L., e. canadian *Buccoon*, *Redrot* od. *Turmeric*.
- 1) **Sanguisorba** L. (*Rosac.* *Sanguisorbeen*, IV. 1) „Blutsauge“, *Wiesenkopf*, *Kölbel* O. W., fr. sanguisorbe, e. burnet (v. sanguis, s. eb. u. sorbéo sauge), z. B. *officinalis* L., *Zier. S. media* L. (Canada), *canadensis* L. u. *dodecandra* Moretti (Alp.). 2) **Sanguis**. (sc. *Poterium*) L., s. g. „Bibernelle“, jetzt mit 1 zusamm.! s. *S. minor* Scop. — *Sanguisorbæe* Torr. u. Gr.
- Sanicula** T., L. (*Umbelliferen*, V. 2) „Heilkraut“, -dolde, *Bruchkraut*, fr. sanicle, herbe de St. Laurent, e. bear's-ear „Bärenohr“, *sanicle* u. *self-heal* „Selbstheil“ (v. sano heile — als Heilm. sehr in Ruf!). — *Saniculæe* Rchb.
- 1) **Sanseviëra** Thb. (-*severia* Réd.) (*Liliac.* *Asparageen*, VI. 1) „Sanseviere“ (n. Raim. v. Samaro, Fürst v. Sanseviero in Neapel, † 1771, Paxton: n. d. schwed. Bot. M. Sansevier, Stuben: *S. carnæa* fol. varieg. (*Reineckia* carn. Kth.), *zeylanica* Thb. (*Liriope* *spicata* Lour.) (*Faserpfl.* Südindiens). 2) **Sans**. Andr. (*Aroideen*, XXI. 9).
- Santalacæe** R. Br., DC., Rchb. „Santelgew.“, s. sogl.
- Santalum** L. (*Santalaceen*, IV. 1) „Santelbaum“, fr. u. e. santal (auch sandal) (v. d. pers. sandul, arab. sandal „nützlich“, z. B. *album* L. (*Sirium* *myrtifolium* Roxb.), *rubrum* L. (*Pterocarpus* *santalinus* L. f.), *paniculata* u. *Freycinetiana* Santelholz d. Sandwichsinseln.
- 1) **Santolina** (sc. *Achillæa*) L. (*Compos.* *Anthemideen*, XIX. 2) „Heiligen“-Garbe. 2) **Santolina** T. (*Compositen* *Eupatorineen*, XIX. 1) „Heiligenpflanze“, *Heiligen-* od. *Dochtkraut*, *Baumwollenkr.* *Leun.*, fr. santoline od. petit cyprès u. aurone femelle „weibl. Äberute“, e. ground-cypress, *Zier. S. Chamae-Cyparissus* L. u. *rosmarinifolia*, *S. viridis* W., fr. *S. verdâtre* (*santolinus* v. *sanctus* heilig u. *Linum* *Lein*).

- Sanvitalia** Lam. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sanvitalie“, fr. sanvitalie (n. d. Prof. Sanvitali zu Brescia, † 1767), Zier. procumbens Lam. s. villosa Cav. m. v. fl. pleno Hort., mexicana Hort. (Zinnia Haageana Reg. s. Ghisbreghtii Verlot).
- Sapindus** L. (Sapindaceen, VIII. 3) „Seifenbaum“, fr. savonnier, pomme de savon, e. soap-berry (sope-) (contrah. aus *sapo indus* „indische Seife“ — d. fleisch. Samenmantel als Seife!), z. B. *edulis* Ait., s. *Dimocarpus Litchi* Lour. „Zwillingspflaume“. — Sapindacæe DC., Rchb., -dæe Rchb., -di Juss.
- Sapinus** Endl. (zu *Pinus*) (Coniferen, XXI. 9) „Safttanne“, fr. *sapin* (v. *sapa* Saft, *Pinus* Tanne).
- Sapium** Jacq., P. Br., Juss. (Euphorbiaceen, XXI. 2) „Fettbaum“ (v. d. celt. *sap* fett od. klebrig — in Südamer. als *Vogelleim!*), z. B. *aucuparium* Jacq., s. *Hippomäne biglandulosa* L.
- 1) **Saponaria** L. (Sileneen, X. 2) „Seifenkraut“, fr. *saponaire* od. *savonnaire*, e. brüuse-wort od. *saponaire*, auch *soap-wort* (-weed), Zier. *S. officinalis* L. m. v. v. (fl. pleno etc.), *calabrica* Guss. (*multiflora* Hort.) m. v. fl. albo Hort., *caespitosa* DC., Stuben: *ocimoides* L.
- 2) **Saponaria** Lour. (sc. *Sapindus*) L. Seifenbeerbaum (*sapo*, -ōnis, gr. *σάπων*, -ωνος Seife).
- Sapōta** Mill. (Sapotaceen od. Lucumeeen, VI. 1) „Sapotillbaum“, s. g. Breiapfel, fr. *sapote* (-tier, -tillier) (in Mex. *cochit-zapotl!*), s. *Achras Sapōta* L. (Surin.). — Sapotacæe Rchb., -tæe R. Br., -tae Juss., „Sapotaceen“.
- Sappan** (sc. *Caesalpinia*) L. = **Sappania** DC. (Cassieen Cäsalpiniteen, X. 1) „Sappan“- od. Braunholz. (malayisch. Name!).
- Sarāna** Kamschatka Hort. (Liliaceen, VI. 1) „Serenna“ od. kamschadalische Kaiserkrone (vaterl.), s. *Fritillaria Kamsch.* autt. (essbare Zwiebelknollen!).
- Sarauja** s. **Sauravia!**
- Sarcanthus** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Fleischblume“ (*σάρκοζ*. -ζος Fleisch, *ἀνθος* — fleisch. Blüten!), z. B. *paniculatus* Ldl., s. *Aërides* pan. Ker.
- Sarcocephalus** Afz. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Fleischkopf“, essbare Chinabeere (s. eb. u. *μεγαλή* Kopf), *S. esculentus* Afz.
- Sarcochilus** (nicht -um!) R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Fleischlippe“ (s. v. u. *γείλον* Lippe — Mittellappe d. Labells fleischig!), z. B. *falcatus* R. Br. (Neuholl.), *nepalensis* Spr. (*Gastrochilus calceolaris* Don s. *Saccolabium* c. Ldl.).
- Sarcostemma** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Fleischkrone“, Pfeffermilch D. (s. v. u. *στέμμα* Krone, Kranz — d. Blättch. d. inner. Blumenkrone fleischig!), z. B. *annulare* Roth (Ostind.), s. *Asclepias viminalis* (Cynanchum vim. L.).
- Sargassum** Ag. (Tange, XXIV. 3) Beerentang, „Sargasso“-Meertang (portug. *sargasso* See gras, Wtst.: *σαργάνη* Band — platte Thalluszweige!).
- Sarmentacæe** Rchb. Zaukenlilien, fr. *sarmentacées* (v. *sarmentum* Schössling, s. g. Zauke).
- Sarmienta** Rz. Pv. (Gesneraceen, II. 1) Kletterhelm (n. d. span. Bot. Mart. *Sarmiento* ben.), Warmh. *S. repens* R. P., s. *Utricularia fol. carnosis* Feuille. (Chili).
- Sarothamnus** Wimm. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Besenstrauch“, Pfrieme, gem. Besenpfiemen Rmpl. (*σάρον* Besen, *θάμνος* Strauch), fr. *sartion*, e. broom, *S. scoparius* Wimm., s. *Spartium* Sc. L.
- Sarracenia** (-cinia) L. (st. *Sarrasinia* Croom.) (Cistineen Droseraceen, XIII. 1) Wasserkrug, Damensattel, Trompetenblatt (n. Dr. J. A. Sarrasin, Übers. d. Dioscorides 1598, Wtst.: n. d. Arzt Sarrasin in Que-

bec im 18. Jahrh., schr. üb. d. Natg. v. Canada), Kalth. S. Drummondii Hook. m. v. alba u. v. rubra, S. purpurea L., flava L. m. v. Catesbaei, etc. — Sarraceniäe Rchb.

Sarsaparilla (-parrilla) (sc. Smilax) L. (Smilaceen, XXII. 6) „Sarsaparillen“-Smilax, fr. salsepareille, e. sarsa od. sarsaparilla (in Südamer. aus zarza span. Brombeerstr. u. parrilla dem. v. parra Weinstock — kl. wind. Str. m. Stacheln!), s. Smilax glauca Mchx.

Sassafras F. v. Nees (Laurineen, IX. 1) „Sassafras“-Lorbeer, fr. sassafras, pavame, bois de canelle, laurier des Iroquois „Irokesen-Lorbeer“, e. sassafrass (saxafr.-) u. ague-tree (vaterl. Name!), S. officinalis F. v. N., s. Persca s. Laurus Sass. L.

Sassaparilla W., s. Sarsap.-L.

Saturėja T., L. (Labiaten, XIV. 1) Pfefferkraut, Bohnenkräutchen, „Serge“ O. W., fr. sarriette, e. savoury od. dittander u. thymbra, Gärt.: S. hortensis L. u. Thymbra L. (lat. saturėja od. -jum von Σάτυρος Satyr — weg. d. aphrodisischen Wirkung!). — Saturinäe Benth.

Satyrium Sw., L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Satyr“-O., Bocksgelien Diatr., fr. testicle de chien, e. satyrion (gr. Σάτιριον geilmachende Pfl. F. W. Riemer, v. d. arab. satar Bock), s. Orchis etc.

Satýrus Bosc (Pilze, XXIV. 1) „Satyr“-P. (Σάτυρος Satyr, geiler Bacchus-Gefährte, Myth.), S. rubicundus Bosc, s. Phallus rubic. Fr.

Sauraja (-auja, -avia) W. (Theaceen Ternstroemiaceen, XII. 5 oder XIII. 3) „Saurauja“-Theestr. (n. d. port. Bot. Graf Fr. v. Saurauja, Willdenow's Bekannten, g. z. Wien 1760 etc., Diatr.: n. d. Geheimrat Graf v. Saurau!), Warmh. S. macrophylla u. excelsa W. (südamer. B.!), s. Palava R. P. u. Ternstroemia Mut. — Sauraujäe A. Juss.

Sauromätium Schott (-tium Spach) (Araceen Dracunculaceen, XX. 9) „Sarmaten“-Aron (v. Σαυρομάται od. Σαρμάται Sarmaten in Südrussland, Wst.: σαύρος Eidechse u. μάτος d. Suchen — von den Eidechsen aufgesucht!), S. guttatum Schott., s. Arum pedatum Wall. s. Colocasia Brong. (Nepal, Java).

Saururus L. (Piperaceen Saurureen, VII. 3) „Eidechsen“- od. „Molchschwanz“ Rmpl., fr. lézardelle u. saurure (σαύρος od. -ρη Eidechse, οἴσα Schwanz — bez. d. Blütenkätzchen!), Zier. S. cernuus L. (Virg.) s. S. Serpentaria repens Pluk., S. natans L. (Aponogëton monostachyon L.) etc. — Saururäe Rich.

Sauvagesia Jacq., St. Hil. (Violaceen od. Droseraceen, V. 1) „Sauvagesie“ (n. d. Prof. F. B. Sauvages in Montpellier, † 1767), z. B. elegantissima St. Hil. (Lavrada el. St. Hil.), erecta Jacq. — Sauvagesiäe Bartl. (zu Violacäe Rchb.).

Saxe-Gothaea Lindl. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Sachsen-Gothäe“ (n. d. Prinz. Albert v. Sachsen-Gotha, Königin-Gemahl v. England), Saxgothaea conspicua Ldl.

1) **Saxifräga** L. (Corniculaten Saxifrageen, X. 2) „Steinbrech“, fr. u. e. saxifrage (v. saxus Fels u. frango zerbreche — Standort!), Zier. (Ampel) S. sarmentosa L. (Diptera s. Borkh.), s. g. Judenbart, Garten: S. umbrosa L., s. g. Porzellanblümchen Rmpl., crassifolia L. roter od. sibirisch. Garten-St., e. drop-wort, Fortunëi Hook. m. v. tricolor Hort., oppositifolia L. m. v. pyramidalis Hort., S. Cotyledon L. etc. 2) **Saxifr.** (sc. Gypsophila) L. (Caryophyllen, X. 2) steinbrechende Felsnelke Grck., s. Tunica Sax. Scop. 3) **Saxifr.** (sc. Pimpinella) L. (Umbelliferen, V. 2) gem. Bibernellidolde, fr. sanicle de montagne (- de Virginie), e. break-stone u. London-pride, auch mountain-heath. 4) **Saxifr.** (sc. Silene L. s. Lychnis Scop.)

- (Sileneen, X. 3) steinbr. Leimkraut (Alp.). — Saxifragacēae Vent., DC., -gēae R. Br., -gae Juss. „Steinbrechartige“.
- 1) **Scabiōsa** L. (Aggregaten od. Dipsaceen, IV. 1) „Grindrose“, fr. scabieuse, e. scabious (v. scabies, -ei Räude, Grind), Zier. S. atro-purpurea Desf. m. v. v. (z. B. candidissima u. nana), fr. fleur des veuves, e. sweet-scabious, s. g. Wittwenblume, s. Asterocephalus atrop. Spr., S. caucasica M. B., tatarica Gm., alpina L., etc. 2) **Scabiōsa** (sc. Centaurēa) L. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Scabiosen-Flockenblume“.
- Scammonia** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulaceen, V. 1) „Scammonium“-Winde (arab. scamunia, od. v. d. gr. *σκάμμουα* Gegrabenes?), s. Scammonia syriaca Mor.
- Scandix** G. (Umbelliferen, V. 2) Kerbel, Nadelkerbel Seub., Hechel O. W., e. cicely u. shepherd's-needle, cow-weed (v. scando klettere? gr. *σάριδιξ*, -ιξος Kerbel), z. B. Cerefolium L. Garten-K., fr. cerfeuil, e. sweet-cicely (-fern), S. Pecten L. Kamm-K. od. Venuskamm, S. odorata L., s. Myrrhis Scop.
- Scariōla** Endl. (sc. Lactūca) L. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) Wildlattich (st. seriōla dem. *σάρις* Salat, od. st. Serriōla dem. serra Säge — sägeartige Rippenstacheln d. Blatt!).
- Schedonorus** P.-B. fehlerh. st. Schoenodorus P.-B. (nicht etwa von *σχιόδον* in der Nähe u. *ῥοος* Berg!).
- Scheeria** Seem. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Scheerie“ (n. Fr. Scheer Esq. ben.), Treibl. S. mexicana Seem., s. Achimenes Scheerii Hort.
- 1) **Schelhammēra** R. Br. (Liliac. od. Melanthac., VI. 1) „Schelhammer's“-Giftlilie (n. d. Prof. C. C. Schelhammer in Jena), z. B. undulata R. Br. u. multiflora ds. (Str. Neuholl.). 2) **Schelhammeria** Mch. (Cyperaceen, XXI. 3) „Schelhammer's“ Cypergras, S. cyperoides Mch. 3) **Sch.** Heist. (Cruciferen).
- Scheuchzeria** L. (Juncaceen, VI. 1) Blumensimse, Moorbinse, Spinnling O. W. (n. d. Prof. Scheuchzer in Zürich, † 1738, s. d. Aut.), S. lacustris L.
- Schinus** L. (Terebinthaceen Anacardieen, XXII. 9) Mastix-Nierenbaum (gr. *σχίνος* Mastixbaum, v. *σχίζω* schneide ein — näml. dass d. Harz fließt, lat. lentiscus), z. B. S. Molle L. peruvian. Pfefferbaum (Piperodendron Heist), S. tragodes L. (Fagara tr. L., Xanthoxylon tr. DC.).
- Schisandra** Sm. (Schiz-) Mchx. (Menispermeen Schisandreem, XXI. 5) „Spaltantheren“-Mondsamen, „Spaltbeutel“ D. (v. *σχίζω* spalte, *ἀνήρ*, -δός Mann, Bot. Staubbeutel — diese öffnen sich durch vertikale Ritzen), z. B. coccinea Mchx. (Schlingstr. Nordam.), chinensis (Kadsura) Turcz. u. japonica L. (Kads. u. Uvaria j.).
- Schisanthes** Haw., s. Schizanthus Endl.
- Schistocarpi** C. Müll. (sc. Musci) spaltfrüchtige Laubmoose (*σχιστός* v. *σχίζω* gespalten, *καρπός* Fr.).
- Schistostēga** Web., Mohr (Moose, XXIV. 2) „Spaltdeckel“-Moos (s. eb. u. *στέγη* Deckel — dies. zerreisst strahlig), z. B. osmundacea Web., M., s. Gymnostomum pennatum Hedw.
- Schizaea** Sm. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) „Spalt“-Rispenfarn (v. *σχίζω* spalte — fächerf. gespalt. Wedel!).
- Schizandra** s. Schisandra!
- Schizanthus** Endl. (Schis.- Haw.) (Amaryllideen, VI. 1) „Spaltblumen“-Narzisse (s. v. u. *ἀνθή* Bl. — Kranz d. Blütenschlunds gelappt!), s. Narcissus L.
- Schizanthus** Rz. Pv. (Scrophularineen, II. 1) „Schlitzblume“ (s. v., *ἀνθος* — d. Krone zweilipp., d. Lippen gespalten!), Zier. S. pin-natus R. P. m. v. v., retusus Hook. m. v. v., papilionaceus Hort. m. v. v. albus, L. Grahami Hook.

- Schizolobium** Vogel (Cassieen, X. 1) „Spalthülse“ (s. v., *λόβιον* Hülse — d. lederart. Epicarp trennt sich v. d. häut. Endocarp!), *S. excelsum* Vog. (B. Bras.).
- Schizonötus** Lindl. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Spaltrücken“, -blatt od. -blume (s. v. u. *νότος*: Rücken, Wtst. *ὄλς, ὄτὸς* Ohr — d. Blätt. fiederspalt. u. m. Blattohren!), Zier. *S. tomentosus* Ldl., s. *Spiraea Lindleyana* Wall.
- Schizopetalon** Sims (-um Hook.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Schlitzkronblatt“ (s. v. u. *πέταλον* Kronblatt — dies. geschlitzt, fiederspaltig!), Zier. *S. Walkeri* Sims (Chili).
- 1) **Schizophyllum** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Spaltlamellen“-P. (s. v. *γίλλων* Blatt — d. Lamellen d. Länge nach gespalten!), z. B. *commune*, s. *Daedalea* Pers. 2) **Schizoph.** Nutt. (Compositen) — d. Blätt. dopp. fiederspaltig!).
- Schizostylis** Harv. (Irideen, III. 1) „Spaltgriffel“ (s. v. u. *στύλλς* Griffel — dies. dreispaltig!), Stuben (Winterbl.) *S. coccinea* Harv. (Südafr.).
- Schlagintweitia** Griseb. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) „Schlagintweit's“-Habichtskr. (n. d. Reis. im Himalaya, Gebr. Schlagintweit), *S. intybacea* Griseb., s. *Hieracium* L.).
- Schleichera** W. (Sapindac. od. Malpighieen, XXIII. 2) Macassarölbaum (n. d. Schweiz. Nat. Schleicher, schr. 1815 Verz. d. Schw. Flora, s. d. Aut.), *S. trijuga* W. (*Stadmannia* tr. Lam.), s. *Melicocca* Juss. (B. Ceylon).
- Schlimmia** Planch. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schlimmie“ (Eigennam.), z. B. *trifida* Rchb., s. *Wallisia* Schwägr.
- 1) **Schmidtia** Tratt. (Gräser, II. 1) Scheidenklapp-Gras (n. Fr. Wilib. Schmidt, Prof. in Prag, † 1796), *S. subtilis* Tratt., s. *Coleanthus* s. Seid. „Scheidenblüte“. 2) **Schm.** Mnch. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1), s. *Aethionia* D. Don (n. d. Bot. J. A. Schmidt, s. d. Aut.).
- Schobëra** (-ia) C. A. Mey. (Amarantac. od. Chenopodiac., V. 2) „Schobere“ od. Soda-Gänsefuss (n. d. Reis. Gottl. Schober, an d. Wolga etc. 1717—18), *S. maritima* C. A. Mey., s. *Suaeda* m. Dumort. u. *Chenopodina* m. Moq., Tand.
- Schoenia** Steetz (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Schönie“ (n. Dr. J. M. A. Schön in Hamburg), Zier. *S. oppositifolia* Steetz, s. *Helipterum Cassinianum* DC.
- Schoenoprasum** (sc. Allium) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Schnittlauch, fr. *cive* od. *civette*, e. *chives* od. *porret* u. *shalot* (v. *σχοίρος*: Binse, *πόσσον* Lauch).
- Schoenodörus** P.-B. (nicht *Schedonörus* P.-B.) (Gräser, III. 2) Binsengras (v. *σχοίρος*: Binse u. *δῶρον* Gabe — d. Blätt. binsenart.), z. B. *pratensis* u. *arundinaceus* Schreb., s. *Festuca* u. *Bromus*.
- Schoenus** P.-B., L. (Cyperaceen, III. 1) Kopfried, Strickgras, Schmerle O. W., fr. *choin* (*σχοίρος* Binse u. Strick — zum Binden benutzt!).
- 1) **Schollëra** (nicht *Scoll-*) Roth (Caprifoliac. od. Siphonandrac. Vaccinieen, VIII. 1) „Scholler's“- od. Moosbeere (n. F. G. Scholler, schr. Fl. Barbiensis, Lps. 1775), *S. Oxycoccus* Roth = *Vaccinium Oxyc.* L. s. *Oxycocc. palustris* Pers. 2) **Sch.** W. (Commelynaceen, III. 1) „Dünnblume“, s. *Leptanthus* Mchx. 3) **Sch.** Rohr (Chenopodiac. od. Amarantaceen, XXI. 4) Kleinfucht-Amarant, s. *Microtea debilis* Sw. 4) **Sch.** Sw. (Phytolaccaceen, X. 5).
- 1) **Schomburgkia** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Schomburgk's“-O. (n. d. Reis. Dr. Rob. H. Schomburgk, in Brit. Guiana Entd. d. Victoria Regia, s. d. Aut.). 2) **Schomburghia** DC. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schomburgk's“-Schönaster, *S. caleoides* DC.
- Schortia** s. *Shortia*!

- Schotia** Jacq. s. **Scotia** Thb. (**Scottia** R. Br.) (Cassieen, X. 1) (n. Rich. Van der Schot, Reis. mit Jacquin).
- Schottia** Jacq. (Asclepiadeen, V. 2) „Schott's“ *Asclepias* (n. H. Schott).
- Schousboea** W. (Myrobalanceen, XI. 1) „Schousboe's“-Schlingstr. (n. d. dän. Reis. in Marokko 1791/93 Assessor Schousboe, s. d. Aut.), Zier. S. *coccinea* W. (Guian.), s. *Cacoucia* Aubl., DC.
- 1) **Schubertia** Mart., Zucc. (Asclepiadeen, V. 2) „Schubert's“ Wachspfl. (n. d. Prof. Schubert in Erlangen, s. d. Aut.), z. B. *multiflora* Mart.
- 2) **Schub.** Mirb. (Cupressineen, XXI. 9) Wasser-Cypresse (zu *Cupressus* Rchb.), z. B. *S. disticha* Mirb., s. *Taxodium* Rich. (s. *Cupr. dist. L.* (Zierb.).
- 1) **Schweiggera** St. Hil. (-ria Spr.) (Myrobalanceen od. Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Schweigger's“-Veilchen (n. d. Prof. Schweigger, s. d. Aut.), z. B. *Warmh. S. microphylla* u. *pauciflora* Spr., s. *Glossarrhen* Mart. 2) **Schweiggeria** Mart. (Guttiferen Clusiaceen, XXIII. 1), s. *Renggeria* Meisn.
- Schweykerta** Gm., W. (Gentianeen, V. 2) „Schweykert's“ Teichblume, Seekanne etc. (n. J. M. Schweykert, s. d. Aut.), *S. Nymphoides* Gm., s. *Villarsia Nymph.* Vent. (*Limnanthemum* etc.).
- Sciadocalyx** Reg. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schirmkelch“ (*σκιάς, -άδος* Schirm, *κάλυξ* Kelch), Zier. Warscewicz Reg.
- Sciadophyllum** P. Br. (fehlerh. **Sciodaph.-!**) (Araliac., V. 5) „Schirm“- od. Schattenblatt Seub. (zu *Actinophyllum* R. u. S.), z. B. *Brownii* Spr., s. *Aralia Sciadoph.* Hort. (v. *σκιάς, -αδος* u. *φύλλον* — d. Blätter fingerf. ausgebr. wie ein Schirm).
- Sciadopitys** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Schirmtanne“ (s. v. u. *πίτυς* Fichte etc. — d. Zweige stehen im Quirl!), Zier. *verticillata* S. u. Z., s. *Taxus vert.* Thb.
- Seilla** L. (Liliaceen, VI. 1) Meerzwiebel, Haspel od. Zille O. W., fr. *scille* od. *squille*, e. *squill*, sea-onion (-leek) (gr. *σκίλλα* Meerzwiebel v. *σπίλλω* i. q. *σπίζω* spalte — d. Zwiebel in dünne Blätter!), wild u. Zier. *S. bifolia* L., s. g. Sternhyazinthe Seub. od. Blaustern Rmpl., *S. amoena* L. (*Hyacinthus stellaris* Jacq.), *campanulata* Ait., *italica* L., *nutans* Sm., *sibirica* Andrecz., *peruviana* L. (*Hyac. peruv.* Hort. s. *Sc. Clusiana* Hort.) m. v. v., *nivalis* Hort. etc., s. *Agraphis* Lk.
- Skimmia** (**Skimmia**) Thb. (Xanthoxyleen, IV. 1) „Skimmie“ (vaterl. Name *Mijama Skimmi* (Japan), *Gewächsh. S. japonica* Thb.
- 1) **Sciophila** Heller (Smilacaceen, VI. 1) „Schattenlieb“, -blume (*σκιά* Schatten, *φιλος* Liebhaber), *S. convallarioides* Wib., s. *Majanthemum bifolium* (Smilacina b. Desf.). 2) **Sciophila** Gaud. (Urticaceen, XXI. 4) (— schattig. Stand!).
- Scirpus** T., P.-B. (Cyperaceen, III. 1) *Simse*, fr. *scirpe*, e. *rush*, bentgrass, *reak* (reate) (lat. *scirpus* *Simse* u. *Binse*, v. d. celt. *sirs* *Binse*, davon *scirpo* ich binde).
- Scitamineae** Bartl., DC., Endl., Rchb. *Bananengew.*, *Gewürzschilfe* (-lilien) (v. *scitāmen*, -inis *Peitsche* — weg. d. *Wurzelausschläge*!).
- Sciarēa** T. (sc. *Salvia*) L. (Labiaten, II. 1) *Muskateller-Salbei*, „*Scharleien*“ G. Fr., fr. *sclarée* od. *orvale*, *toute-bonne*, e. *clary-sage* u. *orvial* (*Sciarēa* — d. latinisierte „*Scharlei*“, ital. *schiarea* — v. *clarus*?).
- Scleranthus** L. (Portulacac. *Sclerantheen*, X. 2) *Knaul* (eig. *Gnaphalium*, fr. *gnavelle* Mej.), „*Knorpelblume*“ (v. *σκληρός* hart, *ἄνθος* — feste, vertrockn. Blüte!), z. B. *polycarpus* L. (*Vermicula nova planta* Col.). — *Scleranthaceae* Lk., Grck., -thēae Rchb. (zu *Portulacaceae* ds.).
- Sclerochlōa** P.-B. (Gräser, III. 2) „*Hartgras*“ (s. eb. u. *γλόα* od. -η *Gras* — *Gräser* v. *dürr. Ansehn* m. *Borstenblättern*!), z. B. *dura* u. *rigida* P.-B., s. *Cynosurus dur.* L. u. *Megastachya rig.* R. u. S.

- Scleroderma** Pers. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) „Hart“- od. Kartoffel-Bovist (s. v., *δέρομα* Fell etc. — Peridium fest, rindenartig!), z. B. vulgare Fr. falsche Trüffel. — Sclerodermëi DC.
- Sclerotium** Tode (Urpilze, XXIV. 4) „Hart“- od. Knorpelpilz (*σκληρότιον* i. q. *σκληρότης* Verhärtung — näml. d. Schlauchlager!), z. B. clavus Fr. s. g. Mutterkorn (Hungerkorn).
- Scollëra** Roth s. Schollëra!
- Scolochlōa** Lk., Koch (Gramineen, III. 2) „Stachelgras“ (*σκολός* Dorn etc. — weg. d. Kelchspelzen!), z. B. arundinacëa M. u. K. zahmes Rohr = Arundo Donax L. (Donax arundinac. P.-B.).
- Scolopendrium** Sm. (Farne, XXIV. 1) Hirschzunge, Zungenfarn O. W., fr. scolopendre, e. mule-fern, stone-wort od. scolopendra (v. *σκολοπένδρα* Skolopender od. Tausendfuss — weg. d. Fruchthaufen, Wst.), Zier. Sc. officinarum Sm. m. v. v., s. Asplenium Scolop. L.
- Scolosanthus** Vahl (Cinchonac. Coffeaceen, IV. 1) „Stachelblume“, s. g. Tutenbl. D. (s. v., *άνθος* — Kronlappen zurückgekrümmt! Wst.), z. B. versicolor Vahl (Catesbaea parviflōra Lam., Str. Ins. St. Cruz).
- 1) **Scolymus** (sc. Cynära) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) gem. Artischoke, fr. artichaut, e. artichok u. shard (v. *σκολός* Dorn — Pfl. sehr stachlig!). 2) **Scol.** (sc. Protëa) L. (Proteaceen, IV. 1) Artischocken-Weissbaum, s. Leucadendron scolymocephalum L. f. 3) **Scolymus** L. (Compos. Carduac., XIX. 1) Golddistel M.-Rehb., z. B. maculatus L.
- 1) **Scopolia** Jacq. (-la ds.) (Solaneen, V. 1) „Scopolie“ (n. d. Nat. Scopolii z. Pavia, s. d. Aut.), z. B. carniolica Jacq. = Hyoscyamus Scopolia L. (Scopolina R. u. S.). 2) **Scopolia** L. (Thymeläaceen, XX. 6), S. composita L., s. Daphne pendula Sm. 3) **Scopolia** Sm. (Xanthoxyleen, V. 1 od. XXI. 5) Scopoli-Gelbholz, s. Toddalia Juss. u. Paullinia Schum. 4) **Scopolia** Forst. (Euphorbiaceen od. Trikokken, XXIII. 2), s. Griselinia Forst., z. B. lucida Forst. (Str. Neuseel.). 5) **Scop.** Ad. (Cruciferen).
- Scopolina** R. u. S. (Solaneen, V. 1) Krainer Toll- od. Frühlings-Wolfskirsche (vgl. 1. Scopolia Jacq., n. Scopolii ben.), S. atropoides Schult., s. Scopolia carniolica Jacq. (Atrōpa c. Scop.).
- 1) **Scordium** Sloan. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Knoblauchstrauch“ (*σχοροδίων* dem. *σχοροδον* Knoblauch), S. maritimum fruticosum Sloan., s. Stemodia maritima Jacq. (Stemodiaca m. P. Br.). 2) **Scordium** T., Cav. (sc. Teucrium) L. (Labiaten, XIV. 1) knoblauchduftender Stachel-Gamander, fr. chamarras (Scordium spinosum Cav.), s. Teucrium spinosum L.
- 1) **Scorodonia** T. (sc. Teucrium) L. (Labiaten, XIV. 1) salbeiblättr. od. Knoblauch-Gamander (s. eb.). 2) **Scorodonia** (sc. Scrophularia) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Knoblauchs“-Braunwurz.
- Scorodopräsum** Mich. (sc. Allium) L. (Liliaceen, VI. 1) Schlangen- od. wilder „Knoblauch“, e. scordion (-dium) (s. eb. u. *πρόδιον* Lauch).
- Scorodosma** Bunge (Umbelliferen, V. 2) „Knoblauchsduft“, s. g. Teufelsdreck (s. v. u. *δσμή* Duft), s. Ferula Asa foetida L.
- Scorpiurus** L. (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) „Skorpionschwanz“, -klee, s. g. Raupenklee, fr. chenille, e. scorpion's-tail (Scorpius Skorpion, *οὐρά* Schwanz — gekrümmte u. geglied. Hülse!), Zier. S. vermiculatus L., fr. ch. vermisseau, e. vermicular caterpillar, muricatus L., fr. ch. hérissée, chenillette, e. prickly cater-pillar, subvillosus L., fr. ch. velue, etc.
- Scorzonëra** T., Vaill., L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Schwarzwurz, „Schlangenzwurz“, fr. scorsonère, auch „Vipergras“, e. vipre's-grass (v. scurzon, d. catalon. Wort für Viper, Paxton, od. ital. scorza Rinde u. nëra schwarze).

- Scotia** Thb., Jacq., Ait. (Scottēa DC., Scottia R. Br.) (Cassieen, X. 1) „Scott's“-Cassie od. Guajacstrauch (n. R. D. Scott, Prof. in Dublin, schwerl. d. mittelalterlichen Gelehrten Duns Scotus, † 1308), *S. speciosa* Thb., s. *Guajacum afric.* Plum., *S. dentata* R. Br. (Str. Neu-holl.), *laevis* Ldl. (Str. Afr.) etc.
- Scribaea** Fl. Wett. (Sileneen, X. 3) „Scriba's“-Beeren-Traubenkropf (n. d. Bot. u. Pfarr. Scriba in Arheiligen b. Darmst.), *S. divaricata* Fl. W., s. *Cucubalus baccifer* L. (*Silēne baccifera* W.).
- Scrophularia** T., L. (Scrophularineen, XIV. 2) Braun- od. Drosswurz O. W., Kropfwurz- od. „Skrophelkraut“, fr. *scrophulaire*, e. *scrophulary*, fig-wort, brown-, kernel- (scrophulae Drüsen od. Skropheln v. *scrofa* (-pha) Schwein — Gebr. geg. d. Drüsen d. Schweine), z. B. *Zier. S. aquatica* L., fr. *scr. aquatique* od. *herbe du siège*, m. v. fol. variegat. Hort. buntes St. Antonskr. od. Wasserkropfwurz. — Scrophulariaceae R. Br., -rinēae ds., Juss., -rināe (sc. Personatae) Rehb.
- 1) **Scutellaria** L. (Labiaten, XIV. 1) „Schälchen“- od. Helmkraut, Schildhelm od. Schildträger Grck., fr. *scutellaire*, *tertianaire*, *lysimaachie bleue*, e. *skull-cap* (*scutella* Schlüsselchen — nāml. auf d. Kelch!), *Zier. macrantha* Fisch., fr. *Toque à grandes fleurs*, *alpina* L. etc. 2) **Scutellaria** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Schüsselflechte (— Fruchtlager schüsself.).
- Scyanthus** Sweet, Don, Presl (Loasaceen, XVIII. 2) „Tassenblume“, (v. *σζύφρη* od. *σζάφρη* Wanne od. Tasse, *ἄρθοσ* — d. 5 od. 10 Kronblätter kappenf.! Wtst.), *Zier. elegans* Don, s. *Grammatocarpus volubilis* Presl.
- Scytanthus** Hook. (Asclepiadeen, V. 2) „Lederblume“ (*σζύτοσ* Leder etc., *ἄρθοσ*), *Zier. S. Gordoni* Hook., s. *Stapelia* s. *Hoodia Gordoni* Sweet.
- Seaforthia** R. Br. (Palmen, XXIII. 1) „Seaforth's“-P. (n. Franc. Lord Seaforth, Gönn. d. Bot.), *Stuben: S. elegans* R. Br., *Dicksoni* u. *robusta* R. Br., s. *Arēca* L.
- Sebestēna** G., Dill. (sc. *Cordia*) L. (Convolvulac. od. Asperifolien, V. 1) „Sebestenpflaume, Brustbeerlein (d. pers. Name d. Frucht sebestan), s. *Cordia Myxa* L. s. *Sebestena officinalis* Blackw., *Cord. Seb. L.* s. *Seb. scabra* Dill. u. *S. domestica* (*Cord. Myxa* Blackw.).
- 1) **Sebifera** Lour. (Amyrideen od. Laurineen, VIII. 1) „Seben“- oder „Sebestenträgerin“ (s. eb.), *S. glutinosa* Lour., s. *Litsea* s. *Dimocarpus Litchi* (*Sapindus edulis* Lour.), s. g. *Zwillingspflaume*. 2) **Sebifera** Lour. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Talgbaum“ (v. *sēbum* Talg, *fēro* (trage), s. *Ricinus chinensis sebifera* Pet. s. *Croton sebiferum* L.
- Sebipira** Mart. (Palmen) (südamer. Name! Wtst. od. s. eb. u. *pira* od. *pera ital.* Birne?).
- Sebophōra** Neck. (Myristiceen, XXII. 13) (zu *Myristica* L.) Fett-Muscattussbaum (sebum Talg u. *φοσός* tragend).
- 1) **Secale** L. (Gräser, III. 2) Korn, Roggen, fr. *seigle*, e. *rye* (v. *seco* schneide? v. d. celt. *segal* v. *sega* Sichel, Wtst.), *S. cereale* L. Saatroggen. 2) **Secale cornutum** L. (Pilze, XXIV. 4), s. g. Mutterkorn, Entwick. v. *Cordiceps* Fr.
- Secchium** P. Br. (Cucurbitaceen, XXI. 8) „Mast“- od. Stachelgurke D. (v. *σζήζός* Stall — dient z. Mästen! Wtst.: d. veränd. *Sicyos*, wozu früher gehörig!), z. B. *edule* R. Br. essb. *Chayotte* (Cuba), s. *Sicyos edulis* Sw.
- 1) **Securidāca** L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Beil“-Kreuzblume (*securis* Beil, *δάξω* od. *δηξω* beisse, greife an — das Beil weg, d. Härte? d. Kaps. m. lang. messerf. Flügel!), z. B. *erecta* L. (Str. Domingo), *volubilis* L. s. *scandens* Jacq. (Str. Südamer.). 2) **Securid.** Mill., T. (sc. *Coronilla*) L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) Beilkronwicke,

- S. lutea* Mill. = *Coronilla Secur.* L., fr. faucille d'Espagne, e. hatchet-
vetch (— Beilform d. Hülse!), s. *Securigera* DC. u. *Securilla* Pers.
- Securinġa** Juss. (-nġa Comm.) (Euphorbiaceen, XXII. 5) „Beiltrotz“,
Axtspott D. (v. *secūris* Beil, *nġo* verneine, widerstehe — mehr wie
beilhart. Holz!), *S. nitida* W. (B. Isle de France).
- Sedġae** (sc. *Corniculatae*) Rchb. s. *Sedum*!
- Sġdum** L. (Corniculaten *Sedeen*, X. 5) Mauerpfeffer, Fetthenne, Fett-
kraut Seub., „Sede“ O. W., fr. orpin, e. stone-crop „Steinkropf“
(ob v. *sedeo* sitze? od. v. *sġdo* stille? — unsicher!), z. B. *S. acre*
L., fr. *vermiculaire* od. *pain d'oiseau*, e. pepper-crop, *S. album* L.
s. *teretifolium* Lam., fr. *trique-madame* „Tripmadam“, Zier: pur-
purġum Lk. s. *Telephium* β purp. L., *coerulġum* Vahl, Sieboldii
Sweet m. v. *variegata* Hort. (Ampeln), *maximum* Rchb. m. v. fol.
varieg., *splendens* Hort., *kamschatġicum* Fisch., Mey., Topf *S. fa-*
barium Lem. (*Fabaria* Koch), *Sempervġvum* Ledeb. (Kaukas.), Amp-
eln: *sarmentosum* Bge., *Anacampseros* L., *spurium* M. B. etc.
- Segregatae** L. (*Polygamia segregata*, XIX. 5) Compositen mit „geson-
derten“ Blġtchen (*segrġgo* sondere ab).
- Selaginġae** Juss. i. q. *Acanthacġae* „Licht-Acanthaceen“ (Selago, -ġnis
Leuchtkraut etc.).
- Selaginġella** P.-B., Spring. (Lycopodiaceen od. Bġrlappe, XXIV. 1) (zu
Lycopodium L.) Zwerg-Bġrlapp, Mooskraut O. W., e. rock (dem. v.
Selago, -ġnis Leucht- od. Blitzpulverkraut, v. *σελαγġω* leuchte), z. B.
denticulata Spring. Wimperzahn-B. — *Selaginġellġae* Metten.
- 1) **Sġlġo** L., Pers. (Acanthaceen, XIV. 2) „Licht“-*Acanthus* (Wtst.:
celt. sel Gesicht, jach heilsam — geg. Augenkrankh. od. seligo wġhle
aus — auserw. Pfl. (?)), z. B. *S. ovata* (Lippia ov. Burm.), *articulata*
u. *bracteata* Thb., s. *Stilbe*, *Eriġnus* etc. 2) **Selago** (sc. *Lycopodium*)
L. (Lycopodiaceen, XXIV. 1) Tannen-Bġrlapp, Tangelmoos, Semust
Grek., fr. selage (-gine) (v. *σελαγġω* leuchte — weg. d. Blitzpulvers
od. Hexenmehls, d. i. Bġrlappsamens!).
- Selenġpedium** Rchb. f. (Orchid. *Cypripedġen*, XX. 1) „Mondfrauen-
schuh“ (v. *σελġνη* Mond u. Mondgġtġin Selene, u. *πġδιον* Fuss-
schuh — analog *Cypripedium*!), z. B. *caudatum* Rchb. f. (Peru).
- Selġnum** L., Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Silje“, Waldsilje, fr. *assilis*
od. *sġlin* (gr. *σġλινον* Silje od. Eppich — besond. in compos.), z. B.
S. Carvifolia L. „Kġmmelblatt“-S.
- Semecarpus** L. f. (Terebinthaceen *Anacardiġen*, XXIII. 2) „Zeichen-
frucht“, ostind. Herzfrucht od. Dintenbaum, Acajou (*σġμα* Zeichen,
ζαγġτġς — d. schwarze Saft zum Zeichnen d. Zeuge!), *S. Anacard-*
ium L. f. (*Anac. orientale* Bauh.).
- Sempervġvum** L. (Corniculat. *Sedeen*, XI. 5) Haus- od. Dachwurz,
Hauslauch Vilm. (-laub), fr. orpin, grassette, barbe de Jupiter (Jou-
barbe), herbe magique od. maure, e. jubarb, house-leek etc. (*semper*
immer, *vġvum* lebendig), z. B. *tectorum* L. Donnerbart etc., m. v.
rustica Schnittsp. s. *Requieni* Hort., *arachnoidġum* L., *arborġum*
L., etc.
- Senebiġra** Pers., Poir. (Crucifer. *Siliculos.*, XV. 1) Feldkresse, Krġhen-
fuss (n. d. Pastor Joh. Senebier zu Genf, † 1809, s. d. Aut.).
- Senecio** T., L. (Compos. *Senecionid.*, XIX. 2) Kreuzkraut, eig. „Greis-
kraut“ Mej., „Senwurz“ O. W., Baldgreis Grk., fr. *seneġon*, e.
cross-word, groundsel (-sil) (v. *senex*, -ġnis Greis — nach d. Blġhen
schnell m. weiss. Pappus bedeckt!), Zier. *S. mikanoides* Otto (*Mi-*
kania scandens Lem., *Delairea micanoides* Lem.), s. g. Sommer- od.
Schnellepheu d. Stuben, Spaliere: *macroglossus*, Gġrt.: *pulcher*
Hook. u. Arn., *aurantiġcus* DC., *flammġus* Turcz., *elegans* L. m. v. v.

- fr. sen. d'Afrique, e. purple Jacobaea, etc. — Senecionöae Cass., -cionoidöae Less.
- Senëga** DC. (sc. Polygäla) L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Senegawurz“ (vaterl., Wtst. n. d. engl. snake Schlange — d. Wurz. geg. Schlangengibiss!), *S. contrayerva* DC. „giftwiderstehende“.
- Senna** T., G. (sc. Cassia) L. (Cassieen, X. 1) „Sennes“-Bitterblatt, fr. sënë, e. senna od. sene (vaterl. arab. senna!).
- Sequoia** Endl. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Mammouthskiefer, fr. sëquoja (californ. Name d. B.), *S. sempervirens* Endl., e. (in Amerika) Red-wood (*Taxodium* s. Lamb.), gigantëa Endl. = *Wellingtonia* gig. Lindl.
- Serapias** L., Sw. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Schwert-O. (gr. *Σεραπιὰς* eine Orchis, nach *Σέραισις* pers. Kleid weiss m. Purpurstreif, Wtst.: n. Serapis, egypt. Gott — als *Aphrodisiacum* dienend), z. B. *S. Lingua* Sw., *Xiphophyllum* L. f. s. *ensifolia* L. etc., s. *Neottia*, *Disa* etc.
- Seriana** (-jana) Schum. (-janía) Plum. (Sapindaceen, VIII. 3) „Ketten“-Liane (Paxton: n. d. franz. Mönch Paul Sergeant, od. v. series Reihe, Kette — als s. g. Liane od. Schlingguirlande), *S. sinuata* Schum., s. *Paullinia Seriana* L., *angustifolia* W. (Paull. mexic. Jacq.) etc.
- Sericobonia** autt. (Acanthaceen, XIV. 2) „Seidenpinsel“-Libonie aus *Sericogräphis* u. *Libonia floribunda* zusammengezog. ! — künstlicher Bastard v. beiden), *S. ignëa* autt. (*Serico-Libonia ign.*).
- Sericogräphis** Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Seidenpinsel“ (*σηρικὸς* v. Seide, *γραφίς*, -ίδοξ Pinsel — d. Griffel!), s. *Aphelandra Ghiesbreghtii* u. *Gendarussa* Nees.
- Seriöla** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Klein“- od. Nesselsalat, fr. sëriole Kugelträger Wolff (dem. *σέρις* Lattichsalat — ähnl. Blätt.!), z. B. *laevigata* L., *aetnensis* L., Jacq. etc.
- Seriphium** L. (Compos. Inuleen, XIX. 6) Meer-Wermut (*σερίφιον* eine Art Wermut v. d. Insel Seriphos), z. B. *cinerëum* L. f. (*Stoebe* c. Berg., *Brennia cineroides* cap. Petiv.), *plumosum* etc.
- Serissa** Commel. (Rubiaceen, V. 1) „Serissa“-China (Wtst.: n. d. Bot. Serissa, schr. Vollst. Char. d. Garten-Nelke, 1804), *S. foetida* W. s. japon. Thb., s. *Lycium* jap. Thb. s. indic. Retz.
- Serpentaria** Rich. (sc. Aristolochiä) L. (Aristolochieen od. Serpentarien, XX. 5) „Schlangenzurz“, fr. liane à serpent, vipérine de Virginie, e. serpenty etc. (*serpens*, -tis Schlange — d. Wurz. gegen deren Biss!). — *Serpentariae* Endl. Kl. d. Schlangenzurz-Gew.
- Serpicula** L. (Onagrariaceen Halorageen, XXI. 5) „Kriechkraut“, Schleichling D. (v. serpo krieche), *S. repens* L. s. *serpyllifolia* Burm. (*Lau-rembergia* rep. Berg.), *verticillata* L. f. (*Hydrilla* v. Rich.).
- Serpyllum** T. (sc. Thymus) L. (Labiaten, XIV. 1) Feldthymian, Quendel, Hühnerpoley Vilm., fr. thym sauvage, e. wild-thyme, stone-basil etc. (gr. *ἔρπυλλον* v. *ἔρπω* krieche, dem. v. *serpens*?).
- Serratula** L., DC. (Compos. Carduac., XIX. 1) „Scharte“, fr. sarrette, e. shard od. saw-wort (dem. v. *serratus* gesagt — bez. d. Blätter!), z. B. *tinctoria* L., fr. s. teinturienne, e. dyer's-shard, Zier. *S. coronata* L., etc.
- Sersalisia** R. Br. (Sapotaceen, V. 1) Seiden-Eisenholz (n. d. neapol. Geistl. J. B. Sersalis, gepriesen v. Fabius Columna), *S. sericëa* R. Br. = *Sideroxylon sericëum* L. f.
- 1) **Sesänum** L. (Bignoniaceen od. Sesameen, XIV. 2) weisser „Sesam“, Kuntschut Leun., fr. sësäme, e. oily-grain (arab. semsem), z. B. *S. orientale* L., *indicum* L., *javanicum* Burm., s. *Achimenes sesamoides*

- W. 2) *Sesamum* G. Fr. s. *Camelina sativa* Crantz (Cruciferen Sili-
culos., XV. 1). — *Sesamëae* DC.
- Sesëli** L. (Umbelliferen, V. 2) „Sesel“, Steinkümmel od. Rossfenchel,
fr. sëseli, e. sesely u. heart's-wort (σέσλι, -εω; Diosc. vier versch.
Dolden, Wtst.). — *Seselinëae* Koch.
- Sesleria** Hard. (Gräser, III. 2) Balgähre, Gilzgras O. W. (n. d. venet.
Arzt Leonh. Sesler, schr. Natg. d. adriat. Meeres), *S. coerulea* Ard.,
s. *Cynosurus* c. L.
- Setaria** P.-B. (zu *Panicum* L.) (Gräser, III. 2) Borstengras, -Fennich
Seub. (seta Borste — Ähre m. Borsten).
- Sheppardia** (*Shepherdia*) Nutt. (Elaeagnen, XXII. 4) „Sheppard's“
Silber-Sanddorn (n. John Sheppard, Curat. d. Bot. Gartens zu Liver-
pool, † 1836, schr. on trees etc. Lond.), Zier. *S. argentëa* Nutt. (Hip-
pophäë arg. L.), scandens Nutt. (Hipp. canad. L.).
- Sherardia** Dill., L. (Rubiaceen, IV. 1) Acker- od. Blausternchen, Nolde
O. W. (n. d. engl. Reis. W. Sherard, † 1728 in Oxford).
- 1) **Shortia** (*Schortia*) Hort. (Compos. Helianthen, XIX. 3) „Shorts-
blume“ (n. Thom. Short, schr. Medicina brit. Lond. 1747), Zier.
S. californica Hort., s. *Hymenoxis cal.* DC. (*Ptilomëris aristata* Hort.).
2) **Shortia** A. Gray (Ericaceen) (n. Prof. Ch. Wilk. Short in Lexing-
ton, Nordam., † 1862).
- Sibbaldia** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Kriechrose (n. Rob. Sibbald,
Prof. in Edinb., schr. üb. schott. Pfl. in Scotia illustr. 1684), *S. pro-
cumbens* L., s. *Chamaerhodos* Don u. *Pentaphylloides frutic.* Pluk.
- Sibthorpia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Sibthorpie“ (n. d. Prof. John
Sibthorp in Oxford, † 1796, s. d. Aut.), Ampeln: *S. europaea* L.
(*Disandra prostrata* L.), *evolvulacea* L. (*Dichondra repens* Forst.).
- Sicydium** Schldl. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Texas-Haargurke (*Sicyos* u.
είδομαι gleiche), *S. Lindheimeri* Torr. u. Gr.
- Sicyos** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Haargurke, Stacheling (gr. σίκυος
Gurke), Zier. *angulata* L., s. *Bryonoides* Dill., *S. edulis* Sw. (*Sec-
chium* ed. Sw.) essb. Chayote.
- Sida** L. (Malvaceen, XVI. 8) Sammetmalve, -pappel (*σίδη* Theophr.
eigentl. weisse Teichrose u. Granatapfel, Linné irrt bei Aufstell.
dies. Namens, wie öfter, Wtst.), z. B. *S. Abutilon* L. (*Abut. pubescens*
Mnch.).
- Sideritis** L. (Labiaten, XIV. 1) Gliedkraut, „Eisenkraut“, fr. crapau-
dine, marrube-faux, e. clown's- od. iron-wort (gr. σιδιρίτις v. σί-
δηρος Eisen — Heilm. geg. Wunden v. Eisen geschlagen!).
- 1) **Sideroxylon** L. (-lum L. f.) (Sapotac. Mimosopeen, V. 1) „Eisen-
holz“, fr. arbre de Mars, e. iron-wood s. eb. u. ξύλον Holz), z. B.
cymosum L. (Str. Cap), *decandrum* L. (*spinosa* L. f.) (*B.* Nordam.).
2) **Sider.** (sc. *Acacia*) L. (Mimoseen, XXIII. 1) Kieselholz der An-
tillen. 3) **Sider.** s. *Scleroxylon* W. (Myrsineen, V. 1) Hartholz, s.
Melanophloeos (sc. *Myrsine*) R. Br.
- Sieglingia** Bernh. (zu *Festuca* L.) (Gräser, III. 2) „Siegling's“ Gras
(n. d. Prof. Siegling in Erfurt von Bernhadi 1800 ben.), *S. decumbens*
Bernh., s. *Triodia* P.-B. dec. (*Danthonia* d. DC.).
- Sieversia** W. (zu *Gëum* Rchb.) (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Bergnelken-
wurz (n. d. russ. Samml. J. Sievers), s. *Geum montanum* L. (*Dryas*
anemonoides Pall., *Anemone pusilla* G.).
- 1) **Sigillaria** Brongn. (foss. Lycopodiaceen, XXIV. 1) „Siegelbaum“ (v.
sigillum Siegel — weg. d. Eindrücke!). 2) **Sig.** Raf. (*Smilacineen*,
XXII. 6) „Siegelwurz“ (— Wurzelstock m. Siegelnarben!).
- Siläus** Bess. (Umbelliferen, V. 2) „Silau“ (v. σιλίω glänze — bez. d.
Blätter!), *S. pratensis* Bess.

- Silēne** L. (Caryophyllen Sileneen, X. 3) Leimkraut, Klebnelke Leun., Spettel O. W., fr. silēne u. cornillet, e. catch-fly (v. $\Sigma\lambda\lambda\eta\gamma\sigma$ Gott Silen, der immer mit Geifer od. $\sigma\acute{\iota}\alpha\lambda\omicron\nu$ bedeckt war — weg. d. klebr. Stiele!), z. B. inflata Sm. s. vulgaris Grck. Taubenkropf, nutans L. nickende, Zier. S. pendula L. (barbata, rosea u. graeca Hort.) m. v. v. (z. B. nana, alba etc.), compacta M. B., etc. — Silenēae Rchb., -nacēae DC., Grck.
- Siler** Scop. (Umbelliferen, V. 2) Rosskümmel, fr. sermontaine, e. mountain-laser-wort (lat. siler, -ēris eig. Spindelb. u. Bachweide, Wtst. d. abgeänd. Sium od. Selinum), S. montanum Crantz, s. Laserpitium Siler L.
- Siliculosae** L. (sc. Crucifērae) Schötchenträger (silicula dem. v. silīqua Schote) XV. 1 L.
- Siliquastrum** T. (sc. Cercis) L. (Cassieen, X. 1) Schotenhülbaum, Judasb., fr. arbre de Judée „von Judäa“ (deter. v. silīqua Schote), Zier. cordatum u. orbiculatum Mnch. (Cercis canad. u. Siliquastr. L.).
- Silīquosae** L. (sc. Crucifērae) „Schotenträger“ (silīquosus v. silīqua Schote) XV. 2 L.
- Silphium** L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Langstrahl (gr. $\Sigma\lambda\lambda\eta\gamma\omicron\nu$ i. q. $\lambda\acute{\alpha}\sigma\alpha\omicron\nu$ on saft. Arznei u. Speise, nordafr. Wort silphī), Zier. S. laciniatum L.
- Silybium** G., Vaill. (fehl. **Silybrum** Hornem.) (Compos. Carduaceen, XIX. 1) (zu Cardius Rchb.) Stechkraut, Marien-, Frauen- od. Silberdistel (gr. $\sigma\acute{\iota}\lambda\upsilon\beta\omicron\nu$ on Quaste, Wtst. d. ägypt. Name sobil), Zier. S. marianum G., fr. lait de Ste. Marie, e. lady's- od. milk-thistle, S. eburneum Coss., Durieu (Algerien).
- Simaruba** Aubl. (zu Quassia Rchb.) (Rutac. Simarubeen, X. 1) Bitteresche Leun., „Simaruben“-Bitterholz, fr. macre (—cier) (d. caraïb. Name!), S. amara u. ferruginēa Aubl. s. g. Cedronbohne, s. Quassia Sim. u. excelsa. — Simarubēae DC., -bacēae Seub.
- Sināpis** T., L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Senf, fr. sinapi od. senève (moutarde „Möstrich“), e. mustard u. senvy (Augment $\sigma\iota$ u. $\nu\acute{\alpha}\lambda\iota\nu$ Senf, schwerl. $\sigma\iota\nu\acute{\omicron}\varsigma$ schädlich u. $\acute{\omega}\psi$ Auge — beisst in diese, Wtst.), S. nigra L. (Brassica n. L.), fr. roquette sauvage (Melanosināpis Schimp.), gebaut S. alba L., Unkraut S. arvensis L. Hederich, e. carlock, harlock u. kedlack, auch wild-rape.
- Sinningia** Nees (Gesneriaceen, XIV. 2) „Sinningie“ (n. d. Univ.-Gärtu. W. Sinning in Bonn), z. B. Helleri Nees, s. Gloxinia Schottii Mik.
- Sipho** P'Hér. (sc. Aristolochiā) L. (Aristolochieen, XX. 5) Pfeifenkopfstr., Heberblume Vilm., fr. aristoloche en siphon, e. siphon-like od. tubeflowered Birth-wort ($\sigma\acute{\iota}\varphi\omega\nu$ Pfeife etc.).
- Siphocampylos** (-us) Pohl (Lobeliaceen, XIX. 6) „Krummhals“-Lobelia (s. eb. u. $\kappa\alpha\mu\pi\acute{\upsilon}\lambda\omicron\varsigma$ krumm — d. Kronröhre krumm!), Zier. (Winterbl.) Encianus Hort., bicolor etc., schönste coccineus Hook. (Bras.).
- Siphonandracēae** Klotzsch „Röhrenbeutelige“, Heidelbergew. (s. v. u. $\acute{\alpha}\nu\eta\sigma\iota$. - $\delta\theta\acute{\omicron}\varsigma$ Staubbeutel).
- 1) **Siphonia** Rich. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Kaoutschukbaum (s. v. — weg. d. Gewinnung in Röhren- od. Gefässform!), S. Caluchu Rich. s. elastica Pers., s. Jatrōpha elast. L. f. u. Hevā guian. Aubl.
- 2) **Siph.** Benth. (Rubiaceen, V. 1) „Dünnröhrenkrone“ (d. Krone m. sehr lang. dünn. Röhre!).
- Siphonocaulae** Bisch. i. q. Characēae DC. „Röhrenstengelige“ (s. v. u. $\kappa\alpha\nu\lambda\acute{\omicron}\varsigma$ lat. caulis Stengel).
- Sisārum** T., Ad., DC. (sc. Sium) L. (Umbellifer., V. 2) „Zuckerwurz“, fr. girolle, sison-chervi, e. skirret (gr. $\sigma\acute{\iota}\sigma\alpha\omicron\nu$ on, arab. dgizer, Siser Plin.), s. Sisar. Germanorum Moris.

- Sison** L. (Umbelliferen, V. 2) Gewürzdoide, fr. sison (v. d. celt. sison fließender Strom — als Standort!), z. B. inundatum L., fr. sison inondé, S. Amōmum L., fr. ginseng.
- Sisymbrium** All., L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) Rauke, Raukensef Grck., fr. roquette (gr. *σισύμβριον* Diosc.), z. B. officinale Scop., Sophia L. etc.
- Sisyrinchium** (-syrinchium) T., L. (richt. Syorrh.- Hoffmg.) (Irideen od. Hämodoraceen, XX. 2) Rüsselschwertel, „Schweinsrüssel“, fr. sisyrinque (v. *σιρος* Speise, *σῦς* Schwein, *δύγγος* Rüssel — bez. d. Zwiebel!), Zier. grandiflorum Dougl. (Mex.), longistylum s. Douglasii Hort. (Chil.), Bermudianum L., fr. Bermudienne, e. Bermuda-flag, etc.
- Sium** L. (Umbelliferen, V. 2) Wassermerk (gr. *σιον* v. d. celt. siw Wasser, ein Sumpfrk. F. W. Riemer), Zier. S. latifolium L. Brunnen- od. Froschpeterlein, Wassereppich, fr. ache d'eau, e. large-leaved Skirret.
- Skimmia** s. Scimmia!
- Skinnēra** Forst. (Onagrarieen od. Myrobalaneen, VIII. 1) „Skinner's“ Fuchsia (n. Steph. Skinner, gab 1671 ein Etymologicon bot. heraus), Sk. coccinea Forst. = Fuchsia cocc. Ait.
- Smegmaria** W. (Rosac. Spiräaceen, XXIII. 2) „Seifenstr.“, Wäscherbäum D., s. g. Panamaholz (-rinde) (*σμήγμα* d. Schmierer — d. Rinde dient als Seife!), s. Quillaja Saponaria Mol. (Chili) u. Smegma-dermos Rz. Pv. „Seifenrinde“.
- Smilacina** Desf. (Smilacineen, VI. 1) Schattenblume (v. *σμίλαξ*, -νος Stechwinde), S. bifolia Desf. = Majanthemum bif. Schmidt.
- Smilax** L. (Smilacineen, VI. 1 od. XXII. 6) Sarsaparill-Stechwinde, „Kratzeisenstengel“, fr. squine od. ësquine (*σμίλαξ* Stechwinde v. *σμίλη* Kratzeisen — Stengel voll Stacheln), z. B. S. excelsa L., fr. boyau du Diable „Teufelsdarm“, S. Sarsaparilla L. (Nordam.), etc. — Smilacēae R. Br., DC.
- Smyrniūm** L. (Umbelliferen, V. 2) Myrrhendolde, Liebstöckel, fr. macēron, e. smyrnian (gr. *σμύριον* Dolde mit Myrrhensamen v. *σμύρινα* i. q. *μύρρα* Myrrhe), z. B. S. olus atrum L., gem. Maceron- od. Myrrhenkr. Leun., etc. — Smyrnēae DC., -niēae Rchb.
- Sobralia** Rz. Pv. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Sobral's“-O. (n. d. span. Bot. Don Fr. Mart. Sobral), z. B. macrantha Lindl., dichotōma R. P. (Peru, span. Flor del paradisā) etc.
- Sodada** Forsk. (Capparideen, XIII. 1) Soda-Kapper (v. d. arab. sodad).
- Sogalgina** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sogalgine“ (Anagramm v. Galinsogea!), Zier. S. trilobata Cass., s. Galinsogea tr. Hort.
- Soja** Mnch. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Sojabohne“ (v. sooja Name einer Sauce in Japan, zu welch. d. Bohnen benutzt), Zier. S. hispida Mnch. = Dolichos Soja L.
- 1) **Solandra** L., Sw. (Solaneen, V. 1) „Solander's“ Stechapfel (n. d. schwed. Reis. D. K. Solander, Begleit. d. Weltumseglers Sir Jos. Banks, s. d. Aut.), Zier. S. herbacea Hort. (Datura ceratocaula Ort.), grandiflōra Sw. (Stramonium scandens Pluk. s. Dat. sarmentosa Lam.).
- 2) **Solandra** L. f. (se. Hydrocotyle) L. (Umbellifer., V. 2), z. B. capensis L. f. 3) **Sol.** Murr. (Malvaceen, XVI. 8) „Sol.'s“ Eibisch, S. lobata Murr., s. Hibiscus Solandra P'Hér. (Lagunaea l. W.).
- Solanoīdes** T. (Phytolacceen, X. 5) „Nachtschattengleiche“ (Solanum u. *είδομαι* gleiche).
- Solānum** L. (Solanaceen, V. 1) Nachtschatten, fr. endormie, herbe aux sorciers u. morelle, e. morel, night-shade, dwale u. bane-wort (v. solari Schmerz stillen — einschläf. Wirkung!), Culturpfl. S. tuberosum L. Kartoffel, fr. pomme de terre, e. potatoe, irish-auricot, n.

v. v., S. Melongēna L. Eierpflanze, fr. aubergine, S. Lycopersicum L. Liebes- od. Paradiesapfel (Lycopersicum esculentum Dun.), Zier. S. Pseudo-Capsicum L. Korallenkirsche m. v. nanum (Stubenpfl.), Gärten: pyracanthum Lam. (Madag.), galeatum Hort. (Bras.), gigantum Jacq.'s. niveum Hort., etc. — Solanēae Juss., DC., -nacēae Rehb.

- 1) **Soldanella** T., L. (Primulaceen, V. 1) Alpenglöckchen, Troddelblume Seub., fr. soldanelle des Alpes (ital. soldo, Sou, lat. solidus — weg. d. kreisrund. Blätt.! od. dem. v. soldana Sultanin?). 2) **Soldanella** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulac., V. 1) Meerstrands-Winde, Seekohl Wolff.

Solidago L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Goldrute, fr. verge d'or, e. golden-rod (v. solidus dicht u. ago führe, Wtst. — zum Wundenheilen), Zier. S. canadensis L., nutans Ait., multiflora Desf., wild S. Virga-aurea L. gem., Goldrute“.

- Sollja** Lindl. (Pittosporeen, V. 1) „Solly's“-Pechsamenblume (n. d. Bot. Rich. Horsm. Solly ben.), z. B. Ampel S. heterophylla Ldl., s. Billardiera fusiformis Lab.

Sonchus L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Sau- od. Gänsedistel, „Sonche“ O. W., fr. laiteron (lacion), lait d'âne, laitue de lièvre, e. hare's-lettuce, sow-thistle etc. (gr. σόγγος Theophr. od. σόζγο; Hasenkohl, Wtst.: v. σομφος weich etc. — Struktur d. Stengels!).

Sonerila (-rilla) Roxb. (Melastomac. od. Burmannieen, III. 1) „Sonerile“ (vaterl. indisch Sonneri-lla Rheed.), Zier. S. margaritacea Lindl. (Ostind.).

Sophora R. Br. (Cassieen Sophoreen, X. 1) „Sophore“, Eschen-Akazie (d. arab. Name sophera), Zier. S. japonica L. s. g. Schnurhülse, m. v. v. (z. B. pendula Hort.), s. Styphnolobium Schott.

Sophrontis Lindl. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Züchtige“ (v. σωφρονέω bin züchtig — Anthere durch d. Flügel d. Columna verdeckt!), z. B. grandiflora Ldl. (Sophronia gr. Ldl.) etc., s. Cattleya Ldl.

Sorbaria Ser. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Ebereschen“-Spiräe (v. Sorbus Eberesche — ähnl. Laub!), s. Spiraea sorbifolia L. u. Lindleyana Wall.

- 1) **Sorbus** T., L. (Rosac. Pomaceen, XII. 3) Eberesche, Mehlbirn- u. Elzbeerbaum Vilm., fr. sorbe (-bier), e. sorb-apple (Sorbus d. Sorbe, slav. Volk, od. sor celt. „herb“¹, Wtst. wohl auch sorbeo verschluckte od. arab. sorbet od. sherbet, Getränk aus deren Saft!), z. B. Obst S. domestica L. Speierling, Spier- od. Sporpapfel etc., fr. corne (-mier), e. sorb-apple-tree od. service-tree (Cornus domestica Spach), Wald- u. Zierb.: S. Aucuparia L. m. v. v. „Vogelbeerbaum“, fr. sorbier des oiseaux, e. fowler's-service-tree, quicken-tree „Quitschen-beerb.“, S. torminalis Crantz Elz- od. Arlsbeerb., fr. alisier, e. maple-leaved serv.-tr., s. Crataegus t. L. (Pirus t. Ehrh., Mespilus t. All., Azarolus t. Borkh.), S. americana W., S. hybrida L. (Pirus pinna-tifida Ehrh. s. fennica Bab., Azarolus pinn. Borkh., S. quercifolia Hort.), S. Aria Crantz Mehlbeerb. u. intermedia Pers. (scandica Fries) s. g. Oxelbirne. 2) **Sorbus** DC. (Rosac. Spiräac., XII. 4), s. Sorbaria Ser.

Sorēma Lindl. (Nolanaceen, V. 1) „Hauf“-Cymbelblume (v. σώραμα Anhäufung), Zier. lanceolata Miers (Nolana l. Miers).

Sorghum Pers. (Gramineen Andropogoneen, XXIII. 1) Mohrrhirse, „Sorgho“ od. Durrha (sorgho indian. dsura od. durra arab. Name), S. vulgare Pers., fr. millangue od. grand-millet, s. Holcus avenaceus s. Sorgho L.

Soria Ad., Desv. (Crucifer. Nucamentac., XV. 2) Nusschötchen (n.

Soria, ein. span. Provinz Altcastiliens?), *S. syriaca* Desv., *s. Euclidium* syr. R. Br.

Southwellia Salisb. (Sterculiaceen, XVI. od. XXI. 9) „Southwell's“ Stinkbaum (n. Rob. Southwell, schr. 1698 Anleit. z. Trockn. d. Blum.), *S. nobilis* Sal. (Sterculia nob. Sm.).

Soyeria Monn. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Soyer's“ Pippau (n. d. franz. Bot. Soyer-Willemet), *z. B. montana* Monn. (Hieracium m. Jacq., *Crepis* m. Tausch.) etc.

Spadiciflorae Endl. (-es Seub.) „Kolbenblütige“ Seub. (spadix, -ίς Blumenkolbe, flos, -ōris Bl.).

Sparassis Fr. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) Strunkpilz, Ziegenbart, s. g. Glucke (v. *σπαράσσω* zerzupfe — zerzupft. Ansehen!), *z. B. crispa* Fr.

Sparaxis Ker (Irideen, III. 1) „Schlitzschwertel“ Perring (s. eb. — Blüten-scheide grannig zerrissen), *z. B. Stuben: pulcherrima* Ker, *s. Ixia amoeniflora* autt. u. *Gladiolus*.

Sparganium T., L. (Typhaeaceen, XXI. 1) Igelskolbe, fr. métel, laiche „Liesch“, e. bur-reed (*σπάργανον* Wickelband — Gebr. d. Blätt. als Böttcher-Liesch!), *z. B. ramosum* L.

Sparmannia Thb. (nicht **Sperr-** od. **Sparmm.-**) (Tiliaceen, XIII. 1) „Sparmannsstrauch“ (n. d. schwed. Reis. in Südafr. Andr. Sparmann, † 1787), *Zier. S. africana* Thb.

Spartianthus Lk. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Binsenpfriemen“ Rmpl. (*σπάρτη* od. -ον Strick, wovon *Spartium* L., u. *ἀνθος* Bl.), *z. B. juncēus* Mnch. m. v. v., fr. genêt d'Espagne, e. spanish-broom, *s. Genista junc.* Lam. *s. odorata* Mnch.

Spartina Schreb. (Gräser, III. 1) Strick- od. Besengras, Pfriemengriffel D. (s. eb. — steife, *z. B.* Binden anwendb. Gräser), *z. B. cynosuroides* W. *Prairiegras*.

Spartium L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Pfriemenstr., Besenpfriemen Vilm., s. g. Besenginster, fr. spartion, genêt à balais, e. broom (v. *σπάριον* Strick), *Zier. scoparium* L. m. v. v. (*z. B. album* Hort.), *juncēum* L. (*Spartianthus* j. Lk.), *purgans* L. (*Genista* p. L. f.), fr. griot Purgierginster, etc., *s. Sarothamnus* Wimm.

Spartocytisus Webb., Berth. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Pfriemengeisklee Lauch. (s. v. u. *Cytisus*), *Zier. sessilifolius* Borkh. (*Cytisus* sess. L.) italien. Bohnenbaum, *album* Webb., etc.

Spatalanthus Sweet (Irideen, III. 1) „Prachtblume“ (*σπατάλη* Luxus etc., *ἀνθος*), *s. Trichonēma monadelpha* Ker.

Spathodea P.-B., R. Br. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Scheidenkelch“ D. (*σπάθη* Blattscheide, *εἶδομαι* gleiche — Kelch blumenscheidenartig), *Zier. speciosa* (Westafr.) u. *campanulata* P.-B., *s. Bignonia*.

Spatulea (bess. **Spath.-**) Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Spatenpilz“ Kumm. (*σπάθη* lat. *spatha* s. eb. u. *οὐλος* derb, ganz — d. Gipfel spatenf. vom Stiel durchsetzt Kumm., spatelähnl. Form d. Schlauchlagers Wtst.), *s. Spathularia* Pers.

Specularia Heist. (Campanulaceen, V. 1) „Venusspiegel“ (v. *speculum* Spiegel — rund. Spiegel in d. Blume!), *S. Speculum* A. DC., fr. mirette, e. Venus'-looking-glass, *s. Campanula* u. *Prismatocarpus*.

Spelta Endl. (sc. *Triticum*) L. (Gramineen, III. 2) „Spelz“ od. Dinkel, fr. speautre u. blé-locar (-ocular), e. pelt od. amel-corn, auch fesels (neulat. *spelta*, d. latinis. *Spelz*!).

Spergella Rchb. (zu *Spergula* L.) (Caryophyllen od. Illecebreen, X. 5) „Spörkling“ Seub. (dem. *Spergula*).

Spergula L. (Caryophyll. od. Alsineen, X. 5) Spark od. „Spörgel“, fr. aspergoutte (esparg-, -goule), e. spurry (neulat. *Spörgel* latinis., od. v. *spargo* streue aus), *Zier. subulata* Schwartz (*pilifera* Hort.).

- Spergularia** Pers., Presl (Alsineen, X. 5) Schuppenmiere Grck., Sperkling O. W. (s. eb.), z. B. segetalis Fenzl (Alsine s. L., Lepigonum s. Koch, Arenaria s. Lam.), salina u. rubra Presl.
- Spermacöce** Dill., L. (Rubiace. Spermaceen, IV. 1) „Kronsame“ od. Zahnwirbel D. (σπέρμα Same u. ἀκρωτή st. ἀκμή Spitze — zwei Kelchspitzen auf d. Frucht sitzenbleibend), z. B. tenuior L. (Anonymus americ. Pluk.). — Spermacöceae Rehb.
- Sphaeranthus** Vaill., Schreb. (Compos. od. Inuleen, XIX. 5) „Kugel“ od. Ballblume D., fr. sphéranthe (σφαῖρα Kugel u. ἄνθος — d. Bl. in kugl. Köpfen), z. B. ind., afric. u. chin. L., s. Ethulia, Cotula u. Senecio.
- Sphaerobolus** Tod. (Pilze, XXIV. 4) „Kugelschneller“ (s. eb. u. βόλος Wurf — bei d. Reife kohlsamenähnl. Spordienblasen abwerfend), z. B. stellatus Tod.
- Sphaerococcus** Stackh. (Florideen, XXIV. 3) „Kugel“ od. „Knopftang“ (s. eb., κόκκος Korn etc. — Form d. Behält.), z. B. bacciferus Ag. „Beerentang“, crispus Ag. Caraghen-Moos, etc.
- Sphaerophoron** Pers. (-um Duperr., -us Pers.) (Flechten, XXIV. 3) „Knopfflechte“ (s. v., φορὸς tragend — kugl. Massen an d. Spitzen d. Thallus!), z. B. ceratites (Dufourea cer. Sommerf.), coralloides Pers. (Stereocaulon globiferum Schreb.).
- Sphaerostigma** Ser. (Onagrarieen, VIII. 1) „Kugelnarbe“ (s. v., στίγμα Narbe), Zier. S. bistortum Walp., s. Oenothëra Bistorta Veitchiana Hort. s. Botta Hort.
- Sphagnum** Dill., L. (Moose, XXIV. 2) Torfmoos, fr. sphoigne (gr. σφάγγωνος i. q. σφόγγος Schwamm — locker u. leicht wie Schw.). — Sphagnacöce C. Müll., -ninae Schimp.
- Sphenogyne** R. Br. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) „Keilnarbe“ σφῆν, -νος Keil, γυνή Weib etc. — d. Narbe schräg abgestutzt), Zier. S. speciosa Fisch., Mey. (crocea, elegans u. versicolor Hort.).
- Sphenophyllum** Brongn. (foss. Farne, XXIV. 1) foss. „Keilblatt“ (s. eb., φύλλον Laub — dies. keilförm.).
- Sphondylium** T., Hoffm. (Spondyl.- Scop., DC.) (sc. Heraclëum) L. (Umbelliferen, V. 2) Bärenklau (σφόνδυλος od. σπόνδυλος Wirbel — aufgetriebene Stengelknoten!), Zier. S. asperum s. pubescens Hoffm. Riesen-B., wild S. branca Scop. = Heracl. Sphond. L.
- Spica** Benth. (sc. Lavandula) L. (Labiaten, XIV. 1) gem. Lavendel, Öl- od. Ähren-Lavendel, fr. lavande, e. lavender-spike (v. spica Ähre — Blütenstand, daher Spiköl st. Lavendelöl!).
- Spicaria** Benth. (zu Hyptis Jacq.) (Labiaten, XIV. 1) „Ähren“-Beuglippe (s. eb.).
- Spigelia** L. (Apocynen Carisseen, V. 1) „Spigellie“, fr. spigélie, e. worm-grass, pink-root (n. d. Prof. Adr. van der Spigel zu Padua, † 1625), z. B. marylandica L. (Lonicera m. L. f.), splendens Hook. (Centralamer.). — Spigeliacöce Mart.
- Spilanthes** Jacq., W. (-thus Forst.) (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Fleckenblume“, Husarenknopf od. Parakresse Leun. (v. σπῖλος Fleck, ἄνθη od. -ος Bl. — weisl. Bl. m. schwärzl. durch Pollen verursachten Flecken), z. B. Acmella L. s. g. ABC-Pflanze (— Kinder müssen sie kauen etc. Willd.), s. Verbesina Acm. L. f.
- Spinacia** T., L. (-chia G. Fr.) (Chenopodiaceen, XXII. 4) „Spinat“, veralt. Binetsch, fr. les épinards, e. spinach (-age) (latinis. Wort, od. v. spina Dorn — stachl. Früchte!), cult. S. oleracea L. m. v. parvifolia Hort. „Winter“-Sp.
- Spiraea** L. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Spiräe“ od. Spierstrauch, fr. spirée, e. drap-wort (gr. σπειραία v. σπειρα lat. spira Spirale, d. Gewundene — nämll. d. Kapsel v. Spir. Ulmaria Wtst.), Zier.: pal-

- mata Thb., japonica Hort. (Hoteia j. Decsn., Astilbe rivularis G. Don), callosa Thb. s. Fortunei Planch. m. v. v., bella Sims s. Hookeri Hort. m. v. coccinea Hort., crataegifolia Lk., fr. sp. à feuilles d'aubépine, salicifolia L., Lindleyana Wall. (Schizonotus tomentosus Ldl.) u. v. a. — Spiraeaceae (sc. Rosaceae) Rchb.: a) Sorbaria, b) Physocarpus, c) Holodiscus, d) Spiraria Rispen-Sp., e) Chamaedryon Gամամեր-Sp., f) Calospira Grossdolden-Sp.
- Spiranthes** Rich. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Wendel“-O., Drehling, Spiral-O., Drehwurz O. W. (s. v. u. ἄνθη — Blütenstand spiralig!), s. Ophrys u. Neottia.
- Spirodela** Schleid. (Najadeen, II. 1) „Deutlichgewundene“ (s. v. u. ὄλιος deutlich), S. polyrrhiza Schleid., s. Lemna p. L.
- Splachnum** L. (eig. Splachn.-) (Moose, XXIV. 2) „Lungenmoos“, Schirm- (σπλάγγνον Lunge etc. — weg. d. Sporangiums). — Splachnacēae Schimp.
- Spondias** L. (Terebinthac. Spondiaceen, X. 4) Mombin- od. Balsampflaumenbaum (σπονδίαξ od. σποδιάξ; Pflaumenbaum — Ähnl. d. Frucht), s. Mombin Plum. u. Myrobalanus G. — Spondiacēae Kth.
- Spongia** L. (Algen od. Amorphozoen, XXIV. 3) Meer- od. Seeschwamm (v. σπόγγος Schwamm), S. communis u. usitatissimus Lam.
- Spongilla** DC. (Algen od. Amorphozoen, XXIV. 3) Flussschwamm, S. fluviatilis (Spongia fluv. L.) (demin.).
- Spongostemma** Rchb. (zu Scabiosa L.) (Dipsaceen, IV. 1) „Schwammkranz“-Scabiose (s. v. u. στέμμα Kranz — d. Saum d. Hüllchenkranzes ist schwammig), Zier. S. atropurpurea L.
- Sprekelia** L., Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Sprekelie“ (n. J. H. v. Sprekelsen in Hamburg, † 1764), Zier. S. formosissima Herb. s. g. Jakobslilie (Amaryllis form. Hort.).
- Sprengelia** Sm. (Epacrideen, V. 1) „Sprengelie“ (n. d. Bot. Konr. Sprengel, s. d. Aut.), Stuben S. incarnata Sm. (Str. Austral.), s. Poretia cucullata Cav.
- Spumaria** Pers. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) Schaumpilz, Kukulkspeichel (spuma Schaum — d. Inhalt d. Peridiums eipe schaum. Masse), S. Mucilago P.
- 1) **Squamaria** Hall., Scop. (sc. Lathraea) L. (Scrophularin. Orobanchen, XIV. 2) „Schuppenwurz“ (squama Schuppe — schupp. Schant), s. Squam. Orobanche Scop. 2) **Sq.** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Schuppenflechte (— Thallus schuppenf.).
- Stachys** T., L. (Labiaten, XIV. 1) Ziest, fr. stachide od. épiaire, e. hedge-needle (στάχυν; Ähre — weg. d. Blütenstands), Teppich: lanata Jacq., Zier.: coccinea Jacq., grandiflora Hort. (Betonica gr. s. hirsuta L.), wild: germanica L. Rosspoley, etc.
- Stachyurus** v. Sieb. (Pittosporeen, V. 1) „Ährenschwanz“ (s. eb. u. οὐρά Schwanz — d. Blütentraube im Herbst als Kätzchen erscheinend), z. B. praecox Sieb. u. Zucc.
- Stagmaria** Jack, Wall. (Terebinthac., XXII. 5) „Teufel“- od. „Tropfen“-Firnissbaum (v. στάγμα Tropfen — tropft ätzend. Milchsafft aus), S. verniciflua Jack.
- Stalagmites** Murr., Schreb. (Guttifer. Garcinieen, XVIII. 2) „Tropfgummibaum“, Guttabaum D. (Ostind.) (v. σταλαγμός d. Tröpfeln — entlässt gelb. Milchsafft), S. Gutta s. cambogioides W. Gummiguttb., s. Garcinia Spr. (Xanthochymus Roxb.).
- Stanhopea** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Stanhope's“-O. (n. d. Grafen v. Stanhope, Vice-Präs. d. Lond. Bot. Gesellsch.), Warmh. insignis Hook., oculata Ldl., tigrina Batem., etc.
- Stapelia** L. (Asclepiadeen, V. 2) „Stapel's“-Aaspfanze, fr. stapélie, fleur de crapaud „Krötenbl.“, s. g. Schachbrett (n. d. holländ. Arzt

- J. B. van Stapel, Übers. des Theophrast, † 1736), *S. variegata* L., *hirsuta* L., *cactiformis*, etc. — Stapeliaceae (sc. Asclepiadéae) Rchb.
- Staphisagria** Riv., Bauh. (sc. Delphinium) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) Läuse Samen-Rittersporn, fr. staphisaigre, herbe aux poux, e. stave's-acre (*σταφίσις*, *-ίδος* Rosine, *ἄγροισ* wild — Samen rosinenähnl. geg. Läuse!).
- Staphyléa (-laea)** L. (Sapindac. od. Celastraceen, V. 3) Pimper- od. Klappernuss, fr. staphylier, pistache sauvage, e. bladder-nut (gr. *σταφυλή* Weintraube — Blütenstand), Zier. trifoliata L. (Staphylo-dendron tr. Mnch.) u. pinnata L. Paternosterstr., Blasen- od. Judenus.
- Staphylo-dendron** Scop., T. (Sapindaceen, V. 3) „Traubenbaum“ (s. eb. u. *δένδρον* B.), *S. pinnatum* Scop., s. *Staphylea* p. L. 2) **Staphylo-d.** Pluk. (sc. Dodonaea) L. (Sapindaceen, VIII. 1) Dodoens'-Traubenbaum, s. Dod. s. *Thlaspidioides arborescens* Barr. 3) **Staph.** africanum Comm. (Sapotac. Mimusoepen, X. 2) afr. T., s. *Royèna lucida* L.
- Statice** T., L. (Plumbagineen, V. 6) Nelkengras, Strandnelke Leun., fr. herbe à sept tiges, e. lavender (gr. *στατιζή* zum Stehen bringend., adstringierend. Kraut — hemmt d. Bauchfluss Plin.), Zier. *S. incana hybrida* Hort., *sinuata* L. m. v. v., *elata* Fisch., *tatarica* L. s. *dalmatica* Presl (trigona Pall.) m. v. *angustifolia* Boiss. (Goniolimon tat. Boiss.), *Armeria* Sm. (Arm. vulg. *W. s. campestris* Wallr.) Grasnelle Grck., fr. gazon d'Espagne, *maritima* Mill. (Arm. mar. *W.*) Strandgrasnelle, e. common sea-lavender, m. v. v.
- Steenhammera** Rchb. (Boragineen, V. 1) virgin. Lungenkraut, *S. virginica* Rchb., s. *Pulmonaria* v. L. (n. d. Probst in Stockh., C. Steenhammer, dem Reichenbach bot. Mitteilungen verdankte).
- Stelis** Sw. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Stangensegel“ (*στηλίς* Stange m. Segel am Schiffshinterteil, bei Theophr. eine Schmarötzerpflanze *Loranthus europ.*), z. B. *micrantha* Sw. (Epidendron s. *Dendrobium* m. Sw.), *racemosa* Sw. (Bletia *bicallosa* Don, *Empusa paradoxa* Ldl.).
- 1) **Stellaria** L. (Caryophyllen od. Alsineen, X. 3) Stern- od. Vogelkraut, Sternmiere Seub., e. bethlehem-star, hen-bit „Hühnerbiss“ (v. stell a Stern), *S. media* Cyr. (Alsine m. L.) Vogelmeier od. Meierich, fr. mouron, e. chick-weed. 2) **Stellaria** Dill. (Onagreen, VIII. 1) „Blattsternkraut“ (— d. Blätter bilden einen Stern).
- 1) **Stellaris** Mnch. (Liliaceen, VI. 1) Milchstern (v. stella Stern), *S. corymbosa* Mnch., s. *Ornithogalum umbellatum* L. 2) **Stellaris bifolia** Mnch. (Liliac., VI. 1) zweiblättr. Zille, s. *Scilla bif.* L.
- Stellatae** L. „Sternkräuter“, i. q. Rubiaceae Juss., sternblättr. Pfl., fr. étoillées (s. v.).
- Stellera** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Steller's“-Seidelstr. (n. d. bot. Samml. G. W. Steller, Reis. in Kamschatka, † 1745), *St. Passerina* L. (*Passerina annua* Wickstr.) Spatzenkraut, fr. grémil d'Allemagne u. langue de passerau „Sperlingszunge“.
- Stemodia** L., Schreb. (Gesneriac., XIV. 2) „Doppelfaden“ (*στημόων* Staubfaden, *δίς* od. *δίς* dopp., zwei — jed. Faden scheinbar m. zwei Antheren), z. B. *aquatica* W. (Ostind.), *camphorata* Vahl (Ceyl.), s. *Chonacola* Herm., *Capraria* u. *Columna* Plum.
- Stemona** Lour. (Smilaceen, XXII. 6) „Fadenspargel“ (s. eb. — d. inner. Blumenblätt. tragen d. Antheren), Warmh. *S. tuberosa* Lour., s. *Ubiium polypoides* Rumph. (zu *Tamus* W.).
- Stemphylium** Wallr. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Tresterschimmel“ (*στέμφυλον* Trester v. Oliven etc. — Wtst. Sporidien oliventörm!) z. B. *ericocotnum* Wallr. Russtau od. Schwärze der Ericen, „Eric-Töter“.

- Stenactis** Cass., Nees (Compos. Erigereen, XIX. 2) „Feinstrahl“, Feinchen O. W. (*στεινός* schmal, *ἀκτίς* Strahl — feine Strahlenblütchen!), z. B. annua Nees s. bellidiflora A. Br., s. Bellis a. L. (Diplopappus a. Bl. Fing. u. Polyactidium DC. a.).
- Stenocarpus** R. Br. (Proteac., IV. 1) „Dünn“- od. „Feinfrucht“ (s. eb., *ζαρπός* Fr. — dies. linienf. dünn!), z. B. Cunninghamii R. Br., s. Agnostus sinuatus Cunningh.
- Stenogastra** Bot. Mag. (Cyrtrandreen od. Gesneriac., XIV. 2) „Dünnbauch“ (s. v., *γάστρα* od. -η Bauch), Zier. S. concinna Hook.
- Stenoglossum** Kth. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Schmal“- od. „Dünnzunge“ (*γλώσσα* Z. — schmal. Labell!).
- Stenophragma** Celak. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Dünn“ od. „Schmalwand“ Grck. (s. v., *γοῦγμα* Zaun, Wand), S. Thalianum Col. (Arabia Thaliana L., Sisymbrium Thal., Gay-Monn.).
- Stenospermium** Schott (Aroideen, XXI. 1) „Schmalsamen“-Aron, s. Spathiphyllum Schott (*σπέρμα*, -ατος Samen).
- Stenospermum** Sweet (Myrtaceen, XII. 1) „Feinsamen“-Eisenholz (s. eb.), s. Metrosideros R. Br.
- Stenotaphrum** Trin., Kth. (Gräser, III. 2) „Enggrabenspelz“-Gras, Flach- od. Amerikagr., s. Americum complanatum autt. (s. v. u. *τάφος* od. -γοή Graben — Kelch- u. untere Kronspelze hohl!).
- Stephanotis** P.-Thou. (Asclepiad., V. 2) „Kranzohr“ (*στέφανος* Kranz, *ὄψος*, *ὀπτός* Ohr — fünfblättr. Nebenkronen), Warmh. S. floribunda A. Brongn. u. Thouarsii ds. (Schlingstr. Madagascar).
- Sterculia** L. (Sterculiaceen od. Büttneriac., XI. 1 od. XVI. 7 u. XXI. 9) „Stinkbaum“ Leun. (v. Sterculius Gott des Mistes, sterculus, -ōris Kot — übler Geruch einiger Arten), z. B. acuminata P.-B. (Cola Bauh.), crinita Cav. (Ivira pruriens Aubl.), s. Helictères. — Sterculiaceae Rehb., -iēae Kth.
- Sternbergia** Waldst. u. Kit. (Amaryllid., VI. 1) „Sternberg's“-Narzisse (n. d. Bot. Kasp. Graf Sternberg, s. d. Aut.), z. B. lutēa Ker (Istrien), s. Amaryllis lut. L., colchiciflora W. K. (Ungarn) etc.
- Stevia** Cav. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Stevie“ (n. P. J. Esteve, Prof. z. Valencia im 16. Jahrh.), Zier. S. purpurea Pers., ivaefolia W. u. serrata Cav.
- Stewartia** Cav. (Malvac. od. Ternstroemiaceen, XVI. 8) „Stewart's“ Malvenbaum (n. John Stewart, Marq. v. Bute b. London), S. Malachodendron s. virgin. Cav., s. Stuartia l'Hér.
- 1) **Stiftia** (Stiftt.-) Mik. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Distelbaum (n. d. kais. Leibarzt A. J. v. Stiftt in Wien, † 1836), z. B. insignis u. chrysantha Mik. 2) **Stifttia** Nord. (Fucioideen, XXIV. 3).
- Stilago** L. (Euphorbiaceen, XXII. 3) Tropfenbaum, Salamanderb. D. (v. *στίλη*, lat. stilla Tropfen u. ago führe — d. Rinde von Saft strotzend), z. B. S. Bunius Burm. Brustbaum (Ostind.). — Stilaginēae DC.
- Stillingia** Gard., Schreb. (Euphorbiac., XXI. 8) „Stilling's“ od. chines. Talgbaum, Talgbeerenb., fr. sébifère, e. tallow-tree (n. d. engl. Bot. Stilling-Fleet im vor. Jahrh., schr. Miscellaneous tracts, 1759), S. sebifera Mchx., s. Croton sebif. L. Talg-Croton.
- Stipa** Vahl, L. (viell. bess. **Stypa**) (Gräser, III. 2) Pfriemen- od. Federgras, fr. stipe od. étiepe, e. feather-grass (v. *στίβλη*, lat. stupa Werg, od. v. stīpo stopfe aus — lange federige Grannen!), S. pennata L. Waisenhaar, Steinfeder etc., fr. plumet de Vaucluse etc., e. true f.-gr., capillata L. „Haarfedergr.“ etc.
- 1) **Stoebe** Leyss. (zu Centaurea Rehb.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Sommer-Flockenblume (gr. *στοίβη* d. Stopfen — bei d. Alten eig. = Poterium spinosum L.), s. Centaurea solstitialis L. s. sicula Leyss.

- u. C. Stoebe L. schmalblättr. Fl. M.-Rchb. 2) **Stoebe** L. (Compos. Segregaten, XIX. 5) „Stopfblume“, z. B. aethiop. L. etc., s. Seriphium L. u. Gnaphalium L. f.
- 1) **Stoechas** T. (sc. Lavandula) L. (Labiaten, XIV. 1) „Zeilen“-Lavendel, fr. stécas u. quercillet, e. cassidony od. french lavender (gr. *στοιγῆς*, -ῶδο; in Zeil. geordn., Wtst. n. d. Stoechaden, d. s. hyerische Inseln), s. St. arabica Antiq. 2) **St.** citrina autt. (sc. Gnaphalium) L. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Sand-Immortelle (Gnaph. arenar. L., Helichrysum ar. DC.).
- Stokesia** l'Hér. (Compos. Ethulieen, XIX. 1) „Stokesie“ (n. Dr. Jon. Stokes, Withering's Gehülfl., schr. bot. mater. med., Lond. 1812, Rümpl. n. d. Dublin. Arzt W. Stokes), Zier. S. cyanea l'Hér. (Cartesia centauroides Cav., Carthamus laevis Mill. s. carolinian. Mchx.).
- Stramonium** T., Mnch. (sc. Datura) L. (Solaneen, V. 1) gem. Stechapfel, fr. stramoine, e. thorn-apple (v. *στορέω* Perf. Pass. *ἑστομαμαι* drehe — Blüt. der Contorten, Wtst. aus *στορέγγον*, unser Solanum, u. *μανιζόν* rasend zusamm. — macht rasend), Zier. S. fastuosum Mnch. (Datura f. L.) egypt. St., fr. str. d'Egypte.
- 1) **Stratiotes** L. (Hydrocharid., XIII. 6 od. XXII. 10) Wasser- oder Krebs-scheere, Siggel D., fr. stratiote, e. water-soldier (*στορατιώτης* Soldat — Schwertblätter), Zier. S. aloides L., s. g. Straussfeder, fr. str. Aloès, e. aloë-like w.-s. 2) **Str.** (sc. Pistia) L. (Lemnaceen, XX. 5) Muschelblume, s. Plantago aquatica Rumph.
- Streblidia** Lk. (zu Chaetospóra R. Br.) (Cyperac., III. 1) „Dreh“- od. „Walzen“-Riet (v. *στοεβλός* verdreht od. *στοεβλή* Walze u. *εἶδουμαι* gleiche), z. B. ferruginèa Lk. (Schoenus f. L.).
- Strelitzia** Ait., Schreb. (Musaceen, V. 1) „Strelitzie“ (n. d. Gemahlin Georgs III., g. Prinzessin v. Meckl.-Strelitz), Warmh. S. reginae Banks (Heliconia Bihai L. f.), augusta Thb. (Hel. alba L. f.) (Cap) etc.
- Streptocarpus** Lindl. (Cyrtandreen od. Bignoniac., XIV. 2) „Drehfrucht“ (*στοεπιτός* gedreht, *χαρπός* Frucht — d. lange Schotenkaps. spiralig gedr.), s. Didymocarpus W.
- 1) **Streptogyne** Rchb. (zu Himantoglossum Rchb.) (Orchideen Ophryd., XX. 1) „Drehstempel“ (s. eb., *γυρνῆ* Weib etc.), z. B. viridis Rchb. (Platanthera v. Ldl., Gymnadenia v. Rich.). 2) **Str.** P.-B. (Gräser, III. 2) „Spiralnarben“-Gr.
- Streptopus** Rich., Mchx. (Smilacineen, VI. 1) „Dreh“- od. Knotenfuss, Zapfenkraut D., Hockenblatt M.-Rchb. (s. v. u. *ποῦς* Fuss — die Stiele gedreht!).
- Strizolobium** P. Br. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Kreisch“- od. „Rauschhülse“, Juckhaarbohne (v. *στρίζω*, lat. strideo rausche — beim Streichen d. rauhfilz. Hülse), s. Dolichos pruriens L.
- Strobilacæae** Rchb. (sc. Coniferae) „Zapfenbäume“ (v. *στροβίλος* Tannenzapfen).
- Strobalanthes** Blum. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zapfenblume“ (s. eb., *ἄνθη* — bez. d. beblätt. Blütenrauben), Zier. auriculata Bl. u. Sabiniiana Nees (Ruëllia Sab. Lindl.).
- Strobis** (sc. Pinus) L. (Conifer. Abietineen, XXI. 9) Weymouthskiefer, fr. pin du lord W. od. de la nouvelle Angleterre, e. Weymouth od. white-pine, Pumpkin- etc. (*στροβίος* Wirbel od. Wirtel, aber auch Betäubung — beschwert b. Räuchern d. Kopf, Wtst.).
- Strophanthus** Pers., Desv. (Apocyneen, V. 1) „Drehblumen“-Hundswürger (*στροσφή* Drehung, *ἄνθος* — d. Kronzipfel mit gedrehten Schwänzen), Warmh. dichotomus DC. (Echites caudata L.), capensis A. DC. etc.
- Strumaria** Jacq. (Amaryllid., VI. 1) „Kropfllilie“ D. (struma Kropf — d. Griffel in d. Mitte m. solchem), z. B. spiralis Ker (Haemanthus

- spir. Ait.), filifolia Jacq. (Leucojum strumos. L., Crinum tenellum L. f.
- Struthiopteris** W. (Farne, XXIV. 1) „Strauss“-F. (struthio Strauss, *πτέρις* Farn — grosse Wedel), Zier. S. germanica W. u. pennsylvanica W., s. Osmunda Struth. L.
- Strychnos** L. (Apocynen, V. 1) Krähenauge (*στρογγύος* Diosc. eine Pfl. v. *στρογγύω* reisse herum Leun. wegen der narkot. Wirkung), S. Nux vomica L. „Brechnuss“, fr. noix vomique, e. vomie-nut, S. Ignatia Berg. (Ignatia amara L.) Fiebernuss, fr. noix d'Ignace, S. colubrina L. f. (Lignum col. Blackw.) „Schlangenhholz“.
- Stuartia** l'Hér. s. Stewartia Cav.
- 1) **Sturmia** Rchb. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) Knielippe, Gelbkiel (n. d. Nat. Jak. Sturm in Nürnberg, † 1848, s. d. Aut.), z. B. Loeselii Rchb. „Lösel's“ Glanzkraut, s. Liparis Rich. 2) **Sturmia lucida** G. f. (Rubiaceae. Guettardeen, V. 1), s. Laugeria luc. Rz. Pv.
- Stylidium** Sw. (Plumbagineen Stylidieen, XX. 2) „Säulenblume“ (*στίλος* Säule, *εἶδομαι* erscheine — d. Blüthe in eine Säule verwachs.), Zier. S. fasciculatum u. Armeria Pers., s. Stylis Poir., auch s. Candollea Armeria Rich. u. Ventenatia Sm.
- Stylolëpis** Lehm. (Compos. Senecionid., XIX. 2) „Stielschuppe“ (zu Podolëpis DC.) (*στίλος* u. *λεπίς* Schuppe — d. Anthodiumschuppe. m. drüsig. Stielen), z. B. gracilis Lehm.
- Styphelia** Sm. (Epacrideen Styphelieen, V. 1) „Hartheide“ (*στυφελός* hart, fest — d. Frucht betr.), Zier. S. tubiflora u. splendens Sm., s. Epäeris, Monotöca R. Br., Ventenata Sm. etc. — Stypheliëae Rchb.
- Stypholobium** Schott (Cassieen, X. 1) „Sauerhülse“, s. g. Schnurhülse (*στυφνός* od. *στρογγύος* sauer, herb, *λόβιον* Hülse — dies. m. herb. Mark), s. Sophora R. Br.
- Styrax** T., L. (Sapotac. Styracineen, X. 1) „Storaxbaum“ (n. d. arab. assthirak, od. v. stiria Eiszapfen od. Tropfen, Wst. — weg. d. austretend. Harzes), S. officinalis L. Apotheke-St. u. S. Benzoïn Dryand.
- Suaeda** Pall., Forsk. (zu Chenopodium L.) (Chenopodieen, V. 2) „Strand-Soda“, Meerstrands-Gänsefuß M.-Rchb. (v. d. arab. souad Soda), S. maritima s. chenopodioides Pall. (Salsola mar. M.-B.).
- Suber** T. (sc. Quereus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) Korkeiche, fr. phello-drys u. liège, e. cork-tree (suber Kork — liefert in d. Rinde Kork, s. g. Pantoffelholz).
- Subularia** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) „Pfriemenkresse“ (subula Pfriemen — bez. d. Stengelblätt.), z. B. aquatica L.
- Succisa** Vaill. (zu Scabiosa L.) (Dipsaceen, IV. 1) Teufelsabbiss, Sumpfsabbiose, fr. succise, mors du diable, e. devil's-bit (succisus unten abgestutzt Wurzel).
- Succulentae** Bartl. „Saft“- od. Fettpflanzen (succulentus saftig).
- Superflua** L., XIX. 2, Ord. der „Überflüssigen“ (Strahl- wie Scheibenblüthen fruchtbar) (superfluus überflüssig).
- Suriana** L. (Thymeläac., X. 4) „Surian's“ Seidel (n. Joh. Donat. Surian, Arzt in Marseille, Mitarb. Plumier's), z. B. maritima L., s. Thymelaea Sloan. (Str. Südam.). 2) **Sur.** Jacq. (Terebinthaceen).
- Sutherlandia** R. Br. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Sutherland's“ Blasenstr. (n. d. Herzog Jam. v. Sutherland in Edinburg, beschr. 1683 d. Pfl. s. Gartens), Zier. S. frutescens R. Br. (Colutea frut. L.), fr. bague-naudier d'Ethiopie, e. shrubby bladder-Senna.
- Swainsonia** Salisb. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Swainson's“ Blasenstr. (n. d. Zücht. Isaac Swainson zu Ende d. vor. Jahrh.'s), Zier. S. purpurea Sal. u. Greyana Lind., s. Colutea L. u. Loxidium Vent.
- 1) **Swartzia** W. (-zia Rchb.) (Mimoseen Swartzieen, XXIII. 1) „Swartz“-Mimose, Cocoholz, Eisenholz von Cayenne, Panacocoholz (n. d. Prof.

- Ol. Swartz in Stockh., s. d. Aut.), *S. tomentosa* W. etc. 2) **Swartzia** Schreb. (Solaneen, V. 1), z. B. *grandiflora* Gm. (Solandra gr. Sw.). 3) **Sw.** Hedw. (Moose, XXIV. 2), s. *Cynodontium* Hedw.
- 1) **Sweertia (Swertia)** L., Pers. (Gentianeen, V. 2) Sumpf- od. Flügelstiel-Enzian, Tarant O. W. (n. d. holl. Gärtn. Em. Sweert, schr. 1612 Florilegium etc., s. d. Aut.), Zier. *S. perennis* L., fr. *Swertie vivace*, e. perennial Fell-wort. 2) **Swertia** Ludw. (Compositen).
- Swietenia** L. (Cedrelaceen od. Meliaceen, X. 1) Mahagonibaum (n. Gerh. v. Swieten in Leiden, † 1772), *S. Mahagoni* L., fr. *acajou à meubles*, e. mahogany, *S. febrifuga* Roxb. Fieberrindenb.
- Syāgrus** Mart. (-um Dietr.) (Palmeen, XXI. 6) „Saurüden“-P. (v. *σῶα-γρος* wilder Eber u. Saurüde, od. *Syagrus*, nach Aelian vorhomer. Geschichtsschr. d. Trojan. Kriegs?), z. B. *cocoides* Mart. (Bras.).
- Sycomōrus** (sc. *Ficus*) L. (Urtiac. Artocarpeen, XXIII. 3) Maulbeerfeige, Stamm-, cypr. od. egypt. Feige, fr. *sycomore*, e. *sycamore* (-camine) (v. *σῖκος* Feige u. *Morus* Maulbeere — Maulbeerblätt. u. Feigenfrüchte!), s. *Ficus cypria* Rauw.
- Symphocalyx** (st. **Symphyc.**) Berland. (zu *Ribes* Rmpl.) (Ribesiace., V. 1) „Verwachskehl“ Goldtraube (*συμκνήξ* verwachsen u. *κάλυξ* Kelch), Zier. *S. s. r. aurëum* Pursh u. *tenuiflorum* Ldl., s. *Chryso-botrÿa* Lindleyana Spach.
- Symphoria** Pursh, Spr. (Caprifoliace., V. 1), Peterstrauch, Schneebeerenstr. (v. *συμορά* Versammlung — näml. v. Beeren), Zier. *S. racemosa* Pursh, *glomerata* ds., s. *Symphoricarpus* Dill.
- Symphoricarpa** Neck. (-pus Dill., Mchx.) (Caprifoliace., V. 1) Peter- od. Schneebeerenstr., Wachsbeerenstr., fr. *symphorine*, e. St. Peter's-wort (s. eb. u. *καρπός* Frucht), Zier. *vulgaris* Mchx. m. v. fol. varieg., *racemosus* Mchx. (*alba* Raf., *leucocarpa* Hort., *Symphoria* rac. Pursh), s. *Lonicera Symphoricarpus* L.
- Symphyandra** A. DC. (Campanulaceen, V. 1) „Verwachsmännige“ (v. *συμφυής* u. *ἀνήρ*, -δούς — d. Antheren zu ein. lang. Röhre verwachs.), Zier. *S. pendula* A. DC. (Campanula p. M.-B.).
- Symphysogynae** A. Rich. sc. Monocotyledonae DC., „Verwachsweibige“ (*σῦμφυσις* u. *γυνή*).
- Symphÿtum** T., L. (Boragineen, V. 1) Beinwell, Wallwurz, fr. *symphyte*, *consoude royal*, herbe du Cardinal, e. wall-wort, consound etc. (*σῦμ-φυτον* v. *σῦμφίω* wachse zusammen — heilt Beinbruch), wild u. Zier. *S. officinale* L. m. v. *purpurëum* Hort. u. v. *coccineum*, Zier. *asperillum* Sims m. v. fol. varieg., *caucasicum* M.-B. s. *orientale* L.
- Sympiēza** Lichtenst. (Ericaceen, IV. 1) „Pressheide“ (v. *συμπιέζω* drücke zusamm. — näml. d. Staubf. an d. Krone, Wtst. zusammen-gedr. Kelche), z. B. *capitella* Licht. (*Blaeria bracteata* L.).
- Symplocarpus** Salisb., Nutt. (Araceen, XX. 9) „Fruchtvereinigung“ (*συμπλοκή* Verknüpfung, *καρπός* — d. Beeren, vereinigt), Gewächsh. foetidus Sal. (*Pothos foet.* Sims), s. *Dracontium* f. L.
- Symplocos** L. (Styraceen od. Lucumeen, XVIII. 4) „Staubfadenring“ (*σῦμπλοκος* verflochten — näml. d. Staubfäd. an d. Basis), z. B. *martinicensis* Jacq., *tinctoria* l'Hér. (Hopea t. Pers.) etc.
- Synandrae** A. Br. i. q. Synantherae Rich. „Verwachsbeutelige“ (*σύν* zusammen, *ἀνήρ*, -δρός Mann etc.).
- Synantherae** Rich., Juss., s. *Syngenesia* L. Röhrenbeutelige Korbblütler (s. eb. — d. Staubb. in e. Röhre verwachsen).
- Syngenesia** L. Kl. d. „Verwachsbeuteligen“ (v. *συγγενής* zusammen-gewachsen — näml. d. Staubb.).
- Synpetälae** Rehb. Ganzblumige (*σύν* zusammen, *πέταλον* Kronblatt — diese bild. ein Ganzes!).

Syntherisma Schrad., Walth. (Gräser, III. 2) Bluthirse (v. *συνθηρέσω* gehe mit auf d. Jagd — wird mit gemäht zu Viehfutter), z. B. *ciliare* Schrad. (*Digitaria cil.* Kön., *Panicum c.* Retz.), s. *glabrum* Schrad. (*Digit. humifusa* Rich.) etc.

Syrenia Andr. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Syrenie“, Lackrute (*Anagramm v. Erysimum*), z. B. *angustifolia* Rehb. etc., s. *Cheiranthus*.

1) **Syringa** L. (Oleaceen, II. 1) Nägelein, span. Flieder, Lilak, fr. lilas, e. lilac (-lach) u. staff-tree (v. *σύνιγξ*, *-ιγγος* Röhre — Form d. Blüte?), Zier. S. *vulgaris* L. m. v. v. (z. B. *alba* Hort.), *persica* L., e. persian jasmin, m. v. *laciniata* Hort., *rothomagensis* Renault (chinens. W., *dubia* P.) (wahrsch. Hybride d. beid. vor.), *Rouen-flieder* m. v. lilas royal „Königsflieder“. 2) **Syringa** suspensa Thb. = *Forsythia susp.* Vahl (Oleaceen, II. 1). 3) **Syringa** amurens. Rupr. = *Ligustrina am.* Reg. (Oleac. II. 1). 4) **Syringa** T. = *Philadelphus* L. (Philadelphéen, XII. 1) Pfeifenstrauch (— Holz z. Pfeifenröhren).

Syurus Endl. (Gräser, III. 2) (zu *Lepturus* R. Br.) „Sauschwanz“ (*σὺς*, -*σο*; Schwein, *οὐρά* Schwanz).

Tabernaemontana L. (Apocynen, V. 1) „Tabernämontan's“-Milch- od. Kaoutschukbaum (n. Jac. Th. *Tabernaemontanus* „aus Bergzabern“, Leibarzt d. Pfalzgraf. Joh. Casimir, † 1590), z. B. *utilis* Walk.-Arn., s. *Galactodendron* ut. Kth., *elastica* Spr. (*Urceola el.* Roxb.) etc., s. *Nerium* u. *Cameraria* L.

1) **Tacamahaca** Spach (subgen. v. *Populus* L.) (Salicineen, XXII. 7) Balsampappel (vaterl.), z. B. *P. balsamifera* L. 2) **Tac.** (Guttiferen, XI. 1) (Name in Ostind.).

Tacca Forst. (Taccaceen od. Aristolochieen, VI. 1) tahitisches Arrowroot od. = Salep Leun. (malay. Name d. Pfl.), z. B. *integrifolia* Ker (Ostind.), *pinnatifida* Sw. (*Leontice leontopetaloides* G.). — *Taccaceae* Presl.

Tacsonia Juss. (Asclepiad. Passifloreen, XVI. 2) „Tacsonie“ (tacso peruan. Name einer Art), Warmh. T. *insignis* Maxw. (Peru), *quitensis* Maxw. u. *Vanvolxemii* Hort. (Neugran.) etc.

Tacsonioides DC. (zu *Passiflora* L.) „Tacsoniengleiche“ (s. eb.).

Taeda (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) Weihrauch- od. Terpentinkiefer, fr. pin de l'encens, e. frank-incense-Pine (Loblolly-, in Amer. Oldfield-Pine) (*taeda* Kienfackel).

Tagetes T., L. (Compos. Tageteen, XIX. 2) Sammetblume, s. g. Studentenbl., Totenbl. D., Afrikaner od. Tuneserbl., stinkende Hoffahrt etc., fr. fleur africaine (- de Tunis, - de Rome), e. french-marigold *pass-velours* u. *velvet-flower* (v. Tages, -*ētis* Enkel Jupiter's, schön. Jüngling, etrusk. Gottheit Myth.), Zier.: *patula* L. m. v. v., *lucida* Cav., *erecta* L. m. v. fl. pl., etc., s. *Ozölis* Spr., *Enalcida* Cass. u. *Boebëra* W. — *Tagetëae* Rehb., *-tinëae* Cass.

Talinum Ad., Juss. (Portulacac., XI. 1) Blüten-Portulak, Brautpfl. Leun. (v. *γαλία* Blüte? Wtst. Name d. Pfl. am Senegal), Zier. T. *patens* W. (*Calandrinia Andrewsii* Hort.) u. *spectabile* Ott.

Tamarindus L. (Cassieen Cäsalpinieen, III. 1) „Tamarindenbaum“, Sauerdattel Wolff, fr. tamarindier, e. Indian-date u. tamarind (v. d. arab. tamer Dattel u. hindi indisch), T. *indica* L., *Intsia* Spr. (*Metrosidëros amboinensis* Rumph., *Rumphia amb.* L., P.).

1) **Tamariscus** T., All., Lam., s. *Tamarix* Desv. 2) **Tamariscus** aethiopicus (Compos. Segregaten, XIX. 5), s. *Stoebe cinerea* s. *ericoides* L. (*Eupatorium eric.* Breyn.) (s. sogl.).

- Tamarix** Desv. (Aizoideen Tamariscineen, V. 3) „Tamariskenbaum“, fr. tamaris, e. tamarisk (v. Tamaris, jetzt Tambro, Fluss d. Pyrenäen, an dessen Ufern wachst., Wtst. n. d. Volk der Tamarisker dort), Zier. T. gallica L. (pentandra Pall.), fr. athle, T. germanica L. (decandra Mch., Myricaria germ. Desv.), tetrandra Pall. m. v. v. (Oligadeniae Ledeb. „wenigdrüsige“), africana, chin. etc. (Decadeniae Ledeb. „zehndrüs.“).
- Tamus** L., Ait., l'Hér. (Tamnus Juss., Dietr.) (Smilaceen, XXII. 6) Schmeer- od. Stickwurz, fr. tame (-mier), e. black-bryony, choke-weed etc. (gr. *θάμος* od. *θάυρος*, Tamnus Plin. Kletterstr. m. Beeren), Zier. T. Elephantipes l'Hér. (Testudinaria Elephantopus Burch.), s. Dioscorēa Spr., T. communis L. gem. Schmeerwurz.
- Tanaëctum** L. (Compos. Anthemid., XIX. 2) Rainfarn, Wurmkraut Vilm., fr. tanaisie, herbe aux vers, e. tansy (n. J. Bauhin st. *ἀθανασία* Unsterblichk., schwerl. *ταναός* lang u. *ἀξή* Spitze od. *ἀζέομαι* heile — bleibt lang frisch etc., Wtst.), Zier. T. vulgare L. m. v. crispum Hort., fr. Barbotin, e. common tansy, T. annuum L. (Balsamita ann. DC., Athanasia a. Hort.).
- Tapia** Plum. (sc. Crataeva) L. (Capparideen, XI. 1) Stinkapfel, Totenbaum D., Knoblauchsbirne, fr. tapin (-nier), s. Apioscorödon Pluk. u. f. Tapia arborea triphylla Plum. (vaterl.).
- Taralëa** Aubl. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohne (Name bei d. Galibis tarala), s. Diptërix Schreb. u. Dalbergia L.
- Taraxäcum** Hall., Juss. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) Löwenzahn, Röhrenkraut, Pfaffenöhrlein Seub., Milchbusch Rmpl., fr. dent de lion, e. dandelion od. lion's-tooth u. cucullate-flower (v. *τάραξις* Bauchgrimmen u. *ἀζέομαι* heile), T. officinale Web. (Leontodon Taraxacum L.), fr. pissenlit „Bettpisser“ u. salade de taupe „Maulwurfssalat“.
- Tarchonanthus** L. (Compos. Tarchonantheen, XIX. 2) „Tarchon“- od. Tarragonblume, Pelzsame D. (v. Tarchon arab. Name für Tarragona in Spanien, Wtst. tarchon = Artemisia Dracunculus od. Esdragon), T. camphoratus L.
- Tatula** (sc. Datura) L. (Solaneen, V. 1) blassblauer Stechapfel (Gart. Zier.) (schwerl. dem. v. *τάτα* Väterchen, sond. v. d. arab. tatorah, lat. tatula = Datura).
- Taxodium** Rich. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Eiben- od. Sumpfcypresse, Sumpfeeder, fr. chauve od. cyprès d'Amérique, e. deciduous cypress (*τάξος* Eibenb. u. *εἶδουαι* gleiche), Zier. T. distichum Rich. m. v. v., s. Cupressus s. Schubertia Mirb. disticha.
- Taxus** T., L. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) Eibenbaum, Ibe Vilm., Taxus, fr. if, e. yew od. ewe-tree (gr. *τάξος*; i. q. *συιλᾶξ* Eibe, v. *τάξις* Reihe — Stellung d. Nadeln, Wtst. angebl. v. *τόξον* Pfeil od. Bogen), Zier.: T. baccatus L., fr. If commun, m. v. v., T. canadensis W. (baccata minor Mchx.) etc. — Taxäe Rhhb., -inëae ds.
- Tazetta** (Tazzetta) (sc. Narcissus) L. (Amaryllideen, VI. 1) Tross- od. Dolden-Narzisse, fr. Narcisse à bouquet od. - de Constantinople (dem. v. Taza span. d. Tasse — Form d. Nektariums!), s. Hermione Taz. Haw. u. Narcissus orientalis Hort.
- Tecoma** Juss. (zu Bignonia Rhhb.) (Bignoniaceen, XIV. 2) Trompeten-Jasmin (mex. Name tecoma cochitl „Bettpisser“ — harntreib. Wurzeln! Leun.), Zier. T. radicans Juss. m. v. v., fr. Jasmin trompette od. - de Virginie, e. trumpet-flower, grandiflora Sweet (Bignonia gr. Thb. s. chinens. Lam.).
- Tecophilaea** Bert. (-ëa Endl., Lindl.) (Irideen, III. 1) „Kindlieb“, Topfbl. T. Cyanocrocus Bert. Blau-Crocus (*τέξος* Kind, *φιλέω* liebe, Wtst. n. Tecophila Billotti, Tocht. d. Bot. Al. Colla).

- Tectona** Sm. (-nia L. f.) (Verbeneen, V. 1) „Teakbaum“, „Thekab.“, ind. Eichenb. Leun. (tecca d. Namen dies. Schiffsbauholzes in Malabar), T. grandis L., s. Theka Hort., Kew. etc.
- Teedia** Rudolph (Scrophularineen, XIV. 2) „Teedie“ (n. d. Bot. J. G. Teede in Portugal, † in Surinam), T. lucida Rud., s. Capraria l. W., Herzblume D. (Borkhausenia Roth).
- Teesdalia** R. Br. (bess. -læa Grck.) (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Zwerg-Bauernsenf, Rahle O. W. (n. d. engl. Bot. Rob. Teesdale, † 1804), z. B. nudicaulis R. Br. (Ibëris nud. L.), T. Lepidium R. Br. (Guepinia Lep. Desv.).
- Teganium** Schmidel (Convolvulaceen, V. 1) „Tiegelchen“, niederlieg. Schellenblume T. procumbens Schmid. (τηγάνιον dem. v. τηγανον Tiegel — d. Eierstock in ein. fleisch. hypogyn. Scheibe), s. Nolana prostrata L. (Walkesia Ehret., Neuendorffia peruv. repens Ad.).
- Telanthëra** (Teleianth.-) Reg. (Amarantaceen, XXI. 5) (zu Alternanthëra R. Br.) „Vollantheren“-Amarant (τελειός vollendet, άνθηρού — alle Antheren vollständig!), Blattpfl. versicolor Reg.
- Telebölus** s. Thelebölus!
- Telekia** Baumg. (zu Bupthalmum Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Telekie“, Rindsauge (n. d. ungar. Grafen Teleki v. Szek), Zier. T. speciosa Baumg. (Buphth. sp. Schreb. s. cordifolium W. K.).
- 1) **Telephium** (sc. Sëdum) L. (Sedeen, X. 5) Fetthenne, e. live-ever (-long). 2) **Tel. Imperati** L. (Paronychieen, V. 1) wechselblättr. Telephium Leun. (gr. τηλέφιον i. q. -φιλον „ferne Liebe“, F. W. Riemer, Plinius: n. Telephos, von Achilles verwund. Könlg v. Mysien, Fraas: i. q. Cerinthe aspera! Wst.). — Telephiëae DC. (sc. Paronychiaceae St. Hil.).
- Telfairia** Hook. f. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Telfairie“ (n. d. irisch. Bot. Ch. Telfaire, † 1833), s. Feuillëa peltata s. Jollifia Boj.
- Telmateja** (sc. Equisetum) Ehrh. (Equisetaceen, XXIV. 1) grossscheidiger Schafthalm (τελματιαίος in Sumpf wachsend), s. Equis. maximum Lam.
- Telmatophäce** Schleid. (Lemnaceen, II. 1) „Teichlinse“ (τέλμα, -ατος Teich, γαζή Linse), T. gibba Schl. (Lemna g. L.).
- Telopëa** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Weithinsichtbare“ (τέλος Ferne, όπλώ sehe — in d. Auge fallend rotblühend), T. speciosissima R. Br. (Embothrium spec. Sm.).
- Tenageia** (sc. Juncus) Ehrh. (Juncaceen, VI. 1) Sumpfbirse (v. τέναγος Sumpf), s. Juncus gracilis s. Vaillantii Thuill.
- Tephrosia** Pers. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Aschenblatt“, surinam'scher Giftbaum Leun. (τέφρα od. -η Asche — aschgrau behaart), s. Galëga, Robinia u. Indigofëra.
- Terannus** P. Br., Schreb. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Weich“-od. Laubenbohne D. (v. τεράμων od. -μός weich, gut zu kochen, Wst.: reichbehaart, od. v. τεραμνον od. -οεινον Zelt, Laube — wozu in Jamaika gebr.), T. volubilis Sw., s. Phaseölus hirtus Plum. s. Dolichos uncinatus L.
- Terebinthus** T. (sc. Pistacia) L. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Terebinthe“, Terpentin-Pistazie, fr. térébinthe (gr. τερεβινθος v. τερέω bohre od. schneide an — dass Saft fliest). — Terebinthaceae DC., -thinae Endl.
- Terminalia** L. (Combretac. od. Myrobalaneen, XXIII. 1) „Gipfelbündel“, Catappabaum (Katappenb. Perring), indian. Tintenholz od. Mandelb. (v. terminus Spitze — bez. d. Blätterstands an d. Zweigen), T. Catappa L. (Amygdalus ind. Raj.), s. Myrobalanus Fatraea Poir., T. Benzoin L. s. angustifolia Jacq.

- Ternatēa** T. (sc. Clitoria) L. (Legumin. Glycinieen, XVII. 4) „Ternate“-Schamblume, Blaublume, fr. fleur-bleue (n. d. Molukken-Insel Ternate).
- Ternstroemia** L. f., Mut. (Theaceen Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Ternstroemie“ (n. d. schwed. Reis. in Ostind. C. Ternstroem, † 1745), T. meridionalis Sw. u. japonica Thb. (Cleyera j. Thb.). — Ternstroemiaceae DC., -miēae (sc. Theaceae) Rchb.
- Terpanthus** Mart., Nees (Rutaceen Diosmeen, V. 1) „Reiz“- od. „Lustblume“ (τεπρινός reizend etc., ἄριστος — schöne, wohlriech. Blüten), T. jasminodorus Mart. (Spiranthēra odoratissima St. Hil.).
- Testudinaria** Salisb. (Dioscoreen od. Smilaceen, XXII. 6) „Schildkrötenwurz“, Elephantenfuss-Schmeerwurz (v. testudo, -inis Schildkröte — Form d. Wurzelkopfs), T. elephantipes Ait. (Tamus el. l'Hér.).
- Tetracera** L. (Dilleniaceen, XXII. 12) „Vierhornkapsel“-Strauch, Raspelstr. D. (τέτρα vier, ζέως Horn — krummvierhörn. Kapseln), T. potatoria W. (Dillenia scandens autt.) Brunnenb. Leun.
- Tetradynamia** L., XV. Kl. „Viermächtige“ (s. eb. u. δύναμις Stärke — unter 6 Staubgef. 4 grössere!).
- Tetragonia** L. (Aizoideen Tetragoniaceen, XII. 4) „Vierecksfrucht“ od. -blatt (s. v. u. γὰρος od. γωρία Ecke — Fr. vierkantig geflügelt!), s. Tetragonocarpus Comm., cult. T. expansa L. neuseeländ. Spinat, s. Demidovia tetragonoides Pall. — Tetragoniaceae Rchb.
- Tetragonolobus** Scop. (zu Lotus Rchb.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) Flügelhülse, Spargelerbse, -bohne, Sparz O. W. (s. v., λοβός Hülse — diese geflügelt vierkantig), T. siliquosus Roth (Lotus siliq. L.) u. purpureus Mch.
- Tetrahit** Dill. (sc. Galeopsis) L. (Labiaten, XIV. 1) breitblättr. Hohlzahn, gem. Daun, Hanfnessel (τέτρα u. ἕντε Runde — vier Blätter in d. Runde od. vierkant. Stengel, nicht te u. trahit „täuscht dich“).
- Tetralix** (sc. Erica) L. (Ericaceen, VIII. 1) Sumpf-Glockenheide Grék., „Vierdraht“-Heide, vierblättr. H. Vilm., fr. bruyère des marais, e. four-leaved od. cross-leaved heath (s. v. u. ἑλίξ Drehung — d. Blätter zu vieren in Reihen).
- Tetrandria** L., IV. Kl. „Viermännige“ (s. v. u. ἀνῆρ, -δρὸς Mann, Staubgefäss).
- Tetranēma** Benth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Vierfaden“ (s. v. u. νῆμα Faden — Gegensatz zu Penstemon „Fünffaden“), z. B. T. mexicana Benth. (Penstemon mex. autt.).
- Tetranthēra** Jacq. (Lauraceen, IX. 1) „Vierantheren“-Lorbeer, Topf- od. Talg-L. Leun. (s. v. ἀνθήρα Staubbeutel — d. Antheren vierfächerig), z. B. trinervia Spr., s. Laurus Myrrha Lour. s. Litsēa ceylanica Nees.
- Tetrapeltis** Wall. (Orchideen, XX. 1) „Vierschild“-O. (s. v., πέλιτη Rundschild — vier Pollenmassen an gemeins. Drüse), z. B. fragrans Wall. (Nepal).
- Tetraphis** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Vierzahnmoos“ (s. v. u. ὄραξις Nadel — 4 spitze Peristomzähne), z. B. Browniana Brid. (ovata Hook.), s. Tetrodontium Brid. — Tetraphidēae Schimp.
- Tetraptēris** Cav. (-ra Dietr.) (Malpighiaceen, X. 3) „Vierflügel“ D. (s. v. u. πτερόν Flügel — d. Kaps. m. 4 gekreuzt. Flügeln), z. B. acutifolia Cav. etc., s. Trioptēris Spr.
- Tetrathēca** Sm. (Tiliaceen od. Tremandrac., VIII. 1) „Vierzellen“-Anthere, „Vierbüchse“ Perring (s. v. u. θήκη Büchse etc. — d. Antheren vierfäch.), z. B. ericifolia Pers. u. juncēa Sm. (Neuholl.).
- 1) **Teucrium** L. (Labiaten, XIV. 1) Gamander, Bergsalbei, Bathengel, Frauenbiss, fr. germandrée od. calamandrier, e. germander (τέικριον n. d. Trojan. Prinzen Teucer ben., Plinius), Zier. T. Chamaedrys

- L. Edel-Gamander od. Feldeypresse, Topf: T. Marum L. (Marum verum Hort.) Katzen- od. Mastixkr. 2) **Teucr.** (sc. Veronica) L. (Scrophularineen, II. 1) breitblättr. Ehrenpreis, fr. teucrlette Erdweihrauch Wolff, s. Teucris u. Teucropsis Benth.
- Teutliopsis** Celak. (zu Atriplex L.) (Atripliceen, XXIII. 1) „Mangoldgleiche“ (*τευτλίων* lat. Beta Mangold od. Bete u. *ὄψις* Aussehen), z. B. A. litorale L., patulum L. etc.
- Thalamia** Spr. (Cupressineen Taxaceen, XXI. 9) „Ruder“- od. Thränenbaum (v. *θαλαμία* Ruder — dazu dien. Holz? Wst.: v. *θαλάμιος* Lager — becherf. Scheibe d. Eierstocks), z. B. asplenifolia Lab. (Podocarpus aspl. Lab.) (B. Neuholl.), s. Dacrydium Sol.
- Thalamiflorae** DC. „Bodenblütige“ od. „Fruchtbodenblütler“ Grck. (s. eb. u. floreo blühe — d. Blütenteile alle auf d. Blumen- od. Fruchtboden stehend).
- Thalia** L., Schreb. (Marantaceen od. Cannac., I. 1) „Thal“-Pfeilwurz, fr. Thalie (n. d. deutsch. Arzt J. Thal, lat. Thalius, schr. 1588 Verz. d. Harzpf.), Zier.: cannaeformis W. (Phrynium dichotomum Roxb.), dealbata Sowerb., s. Pteronia stricta Réd. s. Maranta racemosa.
- Thalietrum** T. (Ranunculaceen, XIII. 7) Wiesenraute, Wielandskraut O. W., fr. thalietron od. pigamon, e. meadow-rue (gr. *θάλιετρον* v. *θάλλω* grüne — besond. frischgrüne Sprossen), Zier.: T. aquilegifolium L. m. v. v., fr. colombine plumacée od. plumeuse, Stuben anemoides Mchx. v. fl. plen., wild T. minus L., flavum L. etc.
- Thallophyta** Endl. „Lagerpflanzen“ (*θαλλός* Zweig, Thallus d. Flechten etc., *φυτόν* Pfl.).
- Thapsia** T., L. (-ium Nutt.) (Umbelliferen, V. 2) Laser- od. Böskraut, Liebstockel (gr. *θαψία* Diosc., n. d. Insel Thapsus ben.), z. B. villosa T., fr. malherbe, T. Asclepium L. „Aeskulap's“-Böskr., s. Panax Ascl. apulum Col., actaeafolium Nutt. (Ligusticum act.), atro-purpureum etc.
- Thapsus** (sc. Verbascum) L. (Scrophularineen, V. 1) Königskerze, kleinflum. Wollkraut Grck., fr. chandelle royale od. molène, e. high-taper etc. (gr. *θάψος* Wollkr., Kr. d. Ins. Thapsus).
- Thea** L. (Theaceen od. Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Theestrauch“, fr. thé, e. tea (chines. Nam. teha, nicht etwa *θεά* Göttin!), z. B. T. Bohēa L. brauner Thee, fr. thé bou, T. viridis L. (sinensis Blackw.), fr. thé vert u. impérial „Kaiserthee“ (— beide auch Stubenpfl.). — Theaceae Rehb.
- Theka** Juss., s. Tectona!
- Thelala** Alfld. (Hypopithaceen od. Pirolaceen, X. 1) Wintergrün (v. *θηλή* Mutterbrust, *ζίττε* — Aussehen d. Blütenknospen), z. B. rotundifolia Alfld. (Pirola r. L.), chlorantha Alfld. etc.
- Thelebölus** Tod. (bess. Telebölus autt.) (Pilze, XXIV. 4) Weitschneller Kumm. (v. *τέλος* Ferne, nicht v. *θηλή* Zitze u. *βόλος* Wurf — werfen kugl. Sporenblasen aus), T. terrestris Tod.
- Thelygönium** Pers. (Urticac. od. Begoniaceen, XXI. 9) „Mädchenschiefblatt“ (v. *θηλύς* weiblich u. *γονή* Geburt — Plinius: sie bewirkt, dass Mädchen empfangen werden), z. B. Cynocrambe Pers. „Hundskohl“.
- Thelyphönium** (sc. Aconitum) Rehb. (Ranunculac., XIII. 3) „Frauentod“ (*θηλυφόνοσ* Weiber mordend).
- Thelypteris** (sc. Polypodium s. Acrostichon) L. (Farne, XXIV. 1) „weiblicher“ od. Sumpf-Farn (s. v., *πτερίς*; Farn).
- Thenardia** Kth. (Apocyneen, V. 1) „Thenard's“ Hundswürger (n. d. franz. Chemiker Thenard, Kunth's Freunde), z. B. floribunda Kth., scabra Spr. (Echites sc. Lab.) etc.

- Theobrōma** Juss., L. (Sterculiaceen od. Büttneriac., XVIII. 1) Cacao-
baum (v. *θεός* Gott u. *βροῦμα* Speise), Th. Cação L. Chokoladebaum.
- 1) **Theophrasta** (-ēa) L. (Solāneen Ardisiaceen od. Myrsineen, V. 1)
„Theophrast's“ Myrtenblume, fr. coquemollier (n. Theophrastus, d.
Vater d. Naturgesch.), Treibh. T. macrophylla Lk. (Bras.), longifolia
Jacq. (Claviga ornata Don) (Neugran.). 2) **Th. imperialis** Juss. (Dil-
leniac., XIII. 2), s. Curatella L.
- Thermopsis** R. Br., Don (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Feigbohnenstr.,
Fuchsbohne Rümpl. (v. *θερμός* Feigbohne od. Lupine u. *ὄψις* Aus-
sehen — d. Lupinen ähnl. Kräuter, Wst.), Zier. T. fabacēa DC.,
fr. Th. Fève, e. garden-bean-like Th., s. Podaliria u. Sophōra.
- Thesium** L. (Santalaceen, V. 1) Leinblatt, Verneinkraut, Vermainkr.
O. W. (v. *θήξ* Sklave — weg. gering. Ansehens, n. Athenäus v.
Theseus, welch. der Ariadne ein. Kranz daraus gab, Wst.), T. Lino-
phyllum L., etc.
- Thespesia** Corr., Spr. (Malvaceen, XVI. 8) Kirchen-Malve, -pappel (v.
θεσπέσιος göttlich — um Kirchen gezogen, Wst.: herrl. gelbe Bl.
m. rotteck. Basis!), T. populneā Corr. (B Ost- u. Westind.), s.
Hibiscus p. L.
- Thladiantha** Bung. (Cucurbitac., XXI. 10) „Quetschblüte“ (v. *θλάω*
zerquetsche, *ἀνθή* Blüte — weg. d. Aussehens? Wst.: Bunge kannte
nur ein gepresst. Exemplar), Zier. dubia Bung. (Nordchina).
- Thlaspi** Dill., L. (Cruciferen Silliculos., XV. 1) Täschelkraut, Breittasche,
Pfennigkraut, Klasper O. W., fr. thlaspie (v. *θλάω* drücke zusam-
men — Form d. Schötchen!), z. B. T. bursa pastoris L. (Capsella
b. p. Mnch.), fr. bourse à berger ou pasteur, T. arvense L., cam-
pestre L. etc.
- Thora** (sc. Ranunculus) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) Gift-Ranunkel, fr.
thora (st. *θροά* Verderben — früher zur Vergift. d. Pfeile), s. Ran.
scutatus W.
- Thrinax** L. f., Schreb. (Palmen, VI. 1) Fächer- od. Schilf-P. (gr. *θρί-
ραξ* Dreizack — Fächerform d. Blätt.), Stub. T. parviflōra Sw., argentēa
Lodd. etc., s. Corypha palmacēa P. Br. (span. Palma plateada
Silber-P.).
- Thrinicia** Roth (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Hundslattich, Zinnen- od.
Randkrönchen, Zinnsaat O. W. (v. *θρινιός* Zinne, Rand — Standort
auf Mauerzinnen? Stand d. Samen in einem Kranz auf dem Frucht-
boden?), T. hispida Roth, s. Colobium h. Roth.
- Thryallis** L. (Malpighiaceen, X. 1) Kurzähre, Docht pfl. D. (gr. *θουάλλις*
Docht — weg. Anwendg. d. ähnl. Verbascum zu Dochten), z. B.
brachystächys u. brasiliensis L.
- Thuja** T., L. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Lebensbaum, Opfer-
od. Weihrauchbaum (gr. *θυσία* v. *θύω* opfere), Zier. T. occidentalis
L. m. v. v. (Friedhöfe), fr. Cypres arbre de vie, Cèdre américain
od. blanc, e. western arbor vitae, T. orientalis L. (Biota or. Don)
m. v. aurea Hort., v. nana u. v. pendula Endl., T. plicata Don, fr.
Thuja plissé, m. v. nana Hort., T. gigantēa Nutt. Riesen-L., s.
Libocedrus decurrens Torr. etc.
- Thujopsis** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Lebensbaum-
gleiche“, japan. Cypresse (*θυσία* u. *ὄψις* Aussehen), z. B. borealis
Fisch. (Chamaecyparis nutkaensis Lamb.), T. dolabrata S. Z., fr.
Thuyops. en doloire, s. Phylloclādus dol. Spach.
- 1) **Thunbergia** L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Thunbergie“ (n. d. schwed.
Bot. Thunberg, s. d. Aut.) Stubenklimpfl. T. alata Boj., Hook. m.
v. v. (z. B. Sommerbank: v. Barkeri, Fryeri u. lutēa Hort.), Warmh.
fragrans Roxb. 2) **Thunb. capensis** Montin (Cinchonaceen, V. 1), s.
Gardenia Thunb. L.

- Thymelaea** Ad., Scop. (sc. Daphne) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Purgierstr., fr. thymélee (gr. *θυμελαία* Purgierstr. F. W. Riemer, eig. Daphne Gnidium L.), T. Mezerëum Scop. = Daphne Mez. L., T. Passerina Coss., Germ. = Stellera Pass. L. (Pass. annua Wikst.), T. minor Gessn. = Daphne Cneorum L., etc. — Thymeläeae DC., -leacëae Rehb. Seideln.
- Thymus** T., L. (Labiaten, XIV. 1) „Thymian“, fr. thym, e. thyme (thime u. tyme) (gr. *θύμος* od. -ον Thymian, Wtst.: v. *θυμός* Kraft — stärkende Wirkung!), Gart. T. vulgaris L. m. v. fol. varieg. Hort. u. v. golden-fleece, T. citriodora Schreb. (Mittelmeerl.), Topf: T. Mastichina L. (Span. etc.), etc.
- Thysanacanthus** Planch. (Acanthac., XIV. 2) „Strauss“-Acanthus (*θύσσανος* weinlaubumrankt. Stab u. Acanth.), z. B. barterioides Pl. u. rutilans Lindl.
- Thysselinum** Hoffm. (Thysel.- Ad.) (Umbelliferen, V. 2) „Opfersilje“, Sumpfhhaarstrang, Oelsenich Grck. (v. *θύω* opfere u. Selinum Silje), T. palustre Hoffm., s. Peucedänun p. Mch.
- Tiarella** L. (Saxifrageen, X. 2) „Spitzmütze“ Perring, Turbankapsel, fr. tiarelle (dem. v. tiara pers. Turban — Kapselform), Zier.: cordifolia L., trifoliata L. (Mitella fol. tern. L.).
- Tiglionum** Klotzsch, Meyen (sc. Croton) L. (Euphorbiac., XXI. 9) Purgier-Croton, fr. grains de tilli, e. bezoar-nut „Bezoarnuss“, s. Granum moluccanum Rumph. Granatillbaum (n. ein. d. molukk. Inseln, Wtst. n. *τίλος* Diarrhöe — weg. d. Wirkung).
- Tigridia** Juss. (Irideen, XX. 2) „Tigerlilie“, -blume, fr. tigridie od. fleur tigrée (v. *τίγρις*, -ίδος Tiger — bunt wie Tigerfell), Zier. T. Pavonia Réd. m. v. v., s. Ferraria Tigridia Bot. Mag. (Tigr. grandiflora Hort.), conchiflora Sweet, gelbe T.
- Tilia** L. (Tiliaceen, XIII. 1) Linde, fr. tilleul, e. linden-tree (lime- u. teil-tree) (v. *τίλον* st. *πίλον* Feder od. Flügel — geflüg. Blütenstiele), T. parvifolia Ehrh. (ulmif. Scop. etc.) Stein- od. Winterlinde, m. v. pendula Hort. u. fol. varieg., T. platyphyllos Scop. (grandifolia Ehrh. etc.) holländ. od. Sommerlinde, m. v. v., T. americana L. Schwarzl. Vilm. (canadens. Mchx. etc.), argentëa DC., Silberl. (alba Waldst. Kit. etc.) etc. — Tiliacëae DC., Rehb., -liëae Rehb.
- Tillaea** Mich. (Crassulaceen, IV. 4) „Tilli's“ Moosblümchen, Moosniedlich (n. M. A. Tilli zu Pisa, † 1740), T. muscosa L.
- Tillandsia** L. (Bromeliaceen, VI. 1) „Tillandsie“, Greisenbart, Pack- od. Polstermoos Leun. etc., fr. caragate (n. Prof. Elias Til-Lands, lat. Tillandsius, zu Åbo in Finnland), Zier.: T. splendens A. Brong. (Guian.), bivittata Hook., bulbosa v. picta Hook., etc.
- Tilletia** Tul. (Staubpilze, XXIV. 4) „Tillet's“ Weizenbrand, s. g. Schmierbrand (n. Matth. Tillet in Bordeaux, † 1791), T. Caries Tul.
- 1) **Timmia** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Timm's“-Moose (n. d. Bot. J. C. Timm in Malchin, † 1805). — Timmiacëae DC. 2) **Timmia** Gm. (Liliaceen, VI. 1) „Timm's“-Lilie.
- 1) **Tinus** (L. Ericaceen od. Laurineen, IX. 1) Heidenerle (gr. *τινος* lat. tinus Lorbeerschneeballen, v. *τείνω* dehne hinaus — blüht im Winter!), T. occidentalis L. s. Clethra trifolia Sw. 2) **Tinus** (sc. Viburnum) L. (Caprifoliac., V. 1) Lorbeer-Schneeballen, fr. laurier thym od. tin, s. Laurus Tinus Hort.
- Tithonia** Desf. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Aurorablume, fr. tithonie (v. Tithonus Liebling der Aurora od. Göttin d. Morgenröte, Myth. — d. Blum. meist morgenrot!), Zier. tagetiflora Desf. u. tubiflora Hortul.
- Tithymälus** T., Haw. (Euphorbiac., XI. 3 od. XXI. 1) Wolfsmilch (gr. *τιθύμαλος* od. -μαλλος Wolfsm. v. *τιθή* od. *τιτθή* Amme u. *μα-*

- λός od. μάλλός weich — giebt Milch), s. Euphorbia L. — Tithymalæa Rchb. eigentl. Wolfsmilchpfl.
- Tobira** Kämpf. (Pittosporeen od. Celastraceen, V. 1) (zu Evonymus L.) „Tobira“-Spillbaum (vaterl. Name in Japan), s. Evonymus Tobira L. (Pittospörum Tob., Ait.) (Stubenzier).
- Todea** W., Sw. (Osmundaceen, XXIV. 1) „Tode's“-Rispenfarn (n. d. Bot. u. Pred. H. J. Tode, † 1797, s. d. Aut.), Zier. T. africana W. (barbara Moore, Osmunda totta Sw.) (Cap), superba Col. etc.
- Toffieldia** Huds. (Melanthaceen, VI. 3) „Tofieldie“, Kelchblilie, Kelke O. W. (n. d. engl. Bot. Tofield † 1793), T. calyculata Whlbg. Sumpft. Grck., pubescens Pers. (Narthecium p. Mchx.) etc.
- Tolpis** Ad., G. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Borsten- od. Bartpippau (v. Tolp od. Zülpich, Tolpiacum? od. τολπινη Zwiwrknäul? — ungewiss!), Garten: T. barbata G. (Crepis b. L., Drepania b. Juss.).
- 1) **Toluifera** Lour. (Terebinthaceen, X. 1) Tolubalsambaum, fr. tolu (vaterl. tolu = Balsam), T. Balsamum L. Tolubalsam (n. Tolu, ein. Stadt am caraïbischen Meer ben. Wtst.), s. Myroxylon toluiferum Rich. (Myrospermum tol. Spr.).
- Tommassinia** Bertol. (Umbellifer., V. 2) „Tommassini“-Dolde (n. d. Bot. Tommassini, s. d. Aut.), z. B. verticillaris Bert., s. Peucedanum vert. Koch.
- Tordylium** T., L. (Umbelliferen, V. 2) Zirmet, Drehkraut, Kletterdolde, fr. tordyle, codille laiteuse (gr. τσοδύλιον eine Doldenpfl., aus τσώρος Dreheisen u. ἴλλω drehe — d. Samen schneckenf. etc.), T. nodosum L., fr. manchotte.
- Torenia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Torenie“ (n. Olaf Torene, Linné's Schüler, Reis. in China, † 1753) Ampel T. asiatica L., T. Fourrieri Lind. (edentula) etc.
- Torilis** Ad., Spr. (Umbellifer., V. 2) Borstdolde, Klettenkerbel (v. τσοξίω bohre? Wtst. d. corruipierte Caulalis!), z. B. infesta Koch u. T. Anthriscus Gm., s. Caulalis etc. Crantz, Jacq.
- Toringo** v. Sieb. (sc. Pirus) L. (Rosac. Pomaceen, XII. 4) japan. Toringo-Apfel (jap. Name d. Pfl.), s. Pirus Sieboldii Reg.
- Tormentilla** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Heidegger, Blutwurz, fr. tormentille, e. tormentil u. sept-foil „Siebenblatt“ (v. tormen, -inis Bauchgrimmen? tormentum Bauchweh? viell. besser v. tormentum Seil v. torqueo drehe).
- Torminaria** Ser. (zu Pirus s. Sorbus) (Pomaceen, XII. 4) „Kolikbirne“, Elsbeerbaum Rmpl., fr. torminal (tormen, -inis Bauchweh — früh. geg. Ruhr), s. Sorbus torminalis Crantz.
- 1) **Torreya** Walk. (Taxaceen, XXII. 12) „Torrey's“-Eibenbaum (n. d. engl. Bot. J. Torrey, s. d. Aut.), T. grandis Walk., taxifolia Arn., T. Myristica Van Houtt. etc. 2) **Torreya** Arn. (Nyctagineen, V. 1), z. B. paniculata Spr. (Bras.). 3) **Torr.** Raf. (Cyperaceen, III. 1), z. B. caespitosa Raf. (Cyperus caesp. Torr.). 4) **Torr.** Spr. (Verbeneen).
- 1) **Tortula** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Drehzahn“-M. (tortus gedreht — spiräl. Zähne d. Peristoms), s. Zygotrichia Brid. u. Barbula Hedw. 2) **Tortula** Roxb. (Verbeneen, XIV. 2), s. Streptium Roxb. Drehkrone.
- 1) **Tournefortia** L., R. Br. (Boragineen od. Ehretiaceen, V. 1) „Tournefort's“ Heliotrop, fr. pittone od. faux héliotrope (n. d. ber. franz. Bot. J. Pitton de Tournefort, s. d. Aut.), Zier. T. heliotropoides Hook., s. Messerschmidia L. 2) **Tourn.** Ponted. (Rubiaceen).
- Tourretia** Domb. (-rettia Schreb., W.) (Bignoniaceen, XIV. 2) „Tourrettie“ od. klettenartige Dombeya (n. Marc. Ant. Louis Claret de la Tourrette, bot. Aut. u. Rousseau's Freund), T. volubilis Schr. s. lappača W., s. Dombeya lapp. l'Hér.

- 1) **Toxicodendron** T. (sc. Rhus) L. (Sumachineen, XXII. 5) m. v. radicans L. „Giftbaum“, wurzelnder Gift-Sumach (*τοξικόν* Pfeilgift, *δένδρον* B.). 2) **Toxic.** pinnatum Mill. (Terebinthaceen Amyrideen, VIII. 1) Giftbalsambaum, s. *Amyris toxicifera* L. (*Elemifera* fol. pinn. Hort. Cliff.). 3) **Toxic.** G. (Sapindac.). 4) **Tox.** Thb. (Euphorbiac.).
- Tozzia** Mich. (Scrophularin., XIV. 2) Tozzi's- od. Alpen-Hahnenkamm (n. d. Arzt u. Prof. Luc. Tozzi in Neapel, † 1717), *T. alpina* L.
- 1) **Trachēlium** (sc. Campanula) L. (Campanulaceen, V. 1) „Halskraut“-Glockenbl., fr. gantêlée, gant de Nôtre-Dame u. trachéliion, e. throatwort (v. *τραγάλλιος* Genick). 2) **Trachelium** L. (Campanulaceen, V. 1) „Halskraut“, fr. trachéliion u. herbe aux trachées, z. B. Zier. *T. coeruleum* L. m. v. fl. alb. Hort. (Nordafr.), fr. Trachélie bleue.
- Tradescantia** L. (Commelyneen, VI. 1) „Tradescantie“, Blumenschilf, *T. virginica* L. m. v. v. (Ephemérum *T. phalangioides* Moris.), fr. Ephemère d. Virginie, e. virginian spider-wort, Ampelpfl. *T. guianensis* Miq., discolor l'Hér. m. v. varieg. Hort. (Bras.), zebrina Hort. etc. (n. d. Gärtn. Tradescant Vat. u. Sohn, unt. Karl I. v. Engl., Museum Tradesc. 1656).
- Tragacantha** L. (zu *Astragalus* Rchb.) (Legumin. Astragaleen, XVII. 4) „Bocksdorn“-Traganth (v. *τραγάος* Bock, *άκανθα* Dorn — Blattstiele dornig, Wst. d. ausfluss. Gummi bockshornförmig!), z. B. *argentea* Mill., *Astr. verus*, *creticus* etc.
- Tragium** Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Bocksdolde“ (s. eb. — Bocksgeruch d. Pfl.), *T. tauricum* Ledeb.
- Tragopogon** T., L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Bocksbart“, Haferwurz, fr. barbe de bouc (- de dieu), e. goat-beard (s. eb. u. *πάγων* Bart), z. B. *pratensis* L., fr. vignette, *T. porrifolius* L., fr. salsifis, e. salsify, etc. (— Samenkronen u. Kelchzipfel langhaarig!).
- Tragopyron** (-um) M. B. (Polygonaceen, VIII. 3) „Bockswitzen“ (s. v. u. *πυρός* Weizen — analog *Fagopyrum* Buchweizen), z. B. *grandiflorum* M. B. (Polygonum gr. W.) etc.
- Tragoselinum** T., Mch. (Umbelliferen, V. 2) „Bockssilje“, grosse Bibernelle (s. v. u. *Selinum*), *T. magnum* Mch. (*Pimpinella* m. L.), *T. Angelica* Lam. (*Aegopodium Podagraria* L.).
- 1) **Tragus** Hall. (Gräser, XXIII. 1) Stachelgras (gr. *τραγάος* Bock u. Spelzgrütze etc.), z. B. *racemosus* Desf. (*Cenchrus* r. L., Lappago r. Schreb.). 2) **Tragus** (sc. *Salsöla*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) Bocksmelde, i. q. *Salsöla* Kali L. gem. Salzkraut.
- Trametes** (st. *Tremates*) Kumm. (Pilze, XXIV. 4) „Löcherpilz“ (v. *τράμη* i. q. *τρήμα* od. *τρήμη* Loch), z. B. *pini*, *suaveolens* etc., s. *Polyporus* L.
- Trapa** L. (Halorangeen, IV. 1) Wassernuss, Drabe, fr. corniole, écharbot, marron d'eau, e. water-nut (- caltrop) (n. d. franz. trape, lat. calcitrapa Fussangel — Stacheln d. Nussfrucht!), *T. natans* L., s. g. Jesuitenmütze, fr. tribule aquatique. — *Trapacæe* Rchb.
- Trauensteineria** Rchb. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Trauensteiner's“-O. (n. Jos. Trauensteiner, schr. d. Weiden Tyrols, Innsbr. 1842), *T. globosa* Rchb. (*Orchis* gl. L.).
- Tremandra** R. Br. (Tiliac. Tremandreen, VIII. 1) „Lochanthere“, Vierkapsel- od. Zellen-Anthere (*τρήμα* Bohrloch, *άνθη*, -*δος* Mann, Staubbeutel — diese springen durch ein Loch auf), s. *Tratrathæca* Sm. — *Tremandræe* R. Br. (zu *Tiliacæe* Rchb.).
- Tremella** Dill. (Pilze, XXIV. 7) „Zitterpilz“, fr. tremelle (v. *tremulus* zitternd dem. -mellus), z. B. *lutescens* Pers., *Nostoc* L. Schleimling (Nost. commune Vauch.). — *Tremellini* Fr.
- Trevirania** W. (Gesneriaceen, XIV. 2.) „Treviranie“ (n. d. Prof. L. Chr.

- Treviranus in Bonn, s. d. Aut.), Treibh. T. coccinea W., s. Cyrilla pulchella l'Hér.
- Trianea** Karsten (Hydrocharideen, XXII. 8) „Trianie“ (n. Dr. J. Triana, schr. mit Planchon Prodr. Flor. Novo-Granatensis, Paris 1862), Aquarien: T. bogotensis Karst.
- Trianthema** L. (-um Gaudich.) (Portulacaceen, V. 1 od. X. 2) „Dreiblume“ (τρία in comp. τρι- drei, άνθημα Blume — zu drei in d. Achseln!), z. B. crystallinum Vahl (Papularia cr. Forsk.), decandrum L. (Zaleya dec. Burm.) etc. — Trianthenemäe Rchb.
- Trias** Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Dreiecksblumen“-O. (τρία: Dreiheit — d. offn. Blumen bilden ein Dreieck), z. B. oblonga u. ovata Ldl. (Ostind.).
- Tribulus** T., L. (Rutaceen Zygophylleen, X. 1) Burzeldorn, „Dreispietz“ D., fr. tribule od. herse (τριβόλος dreispitzig — d. Fr. m. 3 od. 4 Stacheln!), z. B. Fischeri Kellogg, terrestris L., s. g. Teufelsdorn.
- Trichera** Schrad. (Dipsaceen, IV. 1) Grindrose (τρι- drei u. χήρα od. -η Wittwe? Wst. v. θοιξ, τρίχος Haar — d. ganze Pfl. haarig), z. B. arvensis Schrad. (Scabiosa a. L., Knautia a. Coult.).
- Trichilia** (-lia) L. (Hesperideen Meliaceen, XVI. 5) „Dreilipp“ (τρι- u. χείλος Lippe od. τρίχα dreifach — Narbe u. Kapsel!), T. moschata Sw. „Moschusholz“, alliacea Forst. (Dysoxylon a. Blum.).
- Trichocladus** Pers. (Hamamelideen, XXII. 1) „Haarweig“-Lorbeer (θοιξ, τρίχος Haar, κλάδος Ast etc. — weichwoll. Str.), T. crinitus Pers., s. g. Stellmacherholzbaum (Str. Cap), s. Dahlia cr. Thb.
- Trichoderma** Pers. (Pilze, XXIV. 4) „Haarhaut“, Deckschimmel Leun. (s. eb. u. θέμα Haut — d. Sporengehäuse ein Haargeflecht! Wst.), z. B. viride Pers., varium Ehrbg. s. laeve Pers.
- Trichodium** Mchx., Schrad. (Gräser, III. 2) Straussgras (τριχώδης voller-Haare — näml. d. Blütenstand!), z. B. caninum Schrad. = Agrostis can. L.
- Tricholoma** DC. (Pilze, XXIV. 4) Haarsäumling (s. v. u. λῶμα Saum — d. Manschette randständ., flockig), z. B. equestre „Ritterschwamm“, pomonae, tigrinum etc. (essb.), s. Agaricus L.
- Trichomanes** R. Hedw. (sc. Asplenium) L. (Farne, XXIV. 1) Frauenhaar, Becherfarn D. etc., fr. trichomane, e. tricomanes (trich-) (θοιξ, τρίχος Haar, μανός dünn — dünne, zarte Zweige etc., ihres Aussehens wegen geg. d. Ausfallen d. Haare, Plinius), Zier. T. spicatum R. Hedw. s. spiciferum Desv. (elegans Hook.) (Guin.), s. Feea polypodina Bory.
- Trichonema** Ker (Irideen, III. 1) „Haarfaden“-Schwertel (s. v. u. νῆμα Faden — lineargeteilte Narbe des fadenf. Griffels), T. Bulbocodium Ker, Columnae Rchb. (Romulea s. Ixia Col. R. u. S.).
- Trichopilia** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Haarkappen“-O. (s. v., πύλον klein. Filzhut — Antheren mit einer Haarbüschelkappe), z. B. Treibh. coccinea Ldl., suavis ds., etc.
- Trichosacme** Zucc. (Asclepiadeen, V. 2) „Haarspitze“ (s. v. u. ἀκμή Spitze — bez. d. Nebenkronen!), Treibh. lanata Zucc.
- Trichosanthes** L. (Cucurbitaceen, XVI. 1 od. XXI. 9) Haarwimperblume, fr. trichosanthe (s. v. u. άνθη Bl. — wimperig gefranste Kronzipfel), z. B. anguinea L. s. colubrina Jacq. (Cucumis a. L.).
- Tricoceae** Endl., Kl. der Schneller od. Springfrüchtler Leun. „Dreikornfrüchtler“ (τρι- u. κόκος Korn).
- Tricyrtis** Hook., Wäll. (Melanthaceen, VI. 3) „Dreihöckerlilie“ Rmpl., -blume Vilm. (τρι- u. κυρτός bucklig — d. 3 äuss. Blumenblätt. an d. Basis sackhöckerig), Zier. T. hirta Hook. (Jap.), fr. Tr. hérissée, e. rugged Tr.

- Tridax** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Dreibiss“, Dreispalt D. (s. v. u. *δάκος* Biss v. *δάκνω* beisse — Strahlbl. dreizahnig), z. B. Procumbens L. (Aster americ. proc. Houst.), s. *Balbisia elongata* W.
- Tridentea** Haw. (Asclepiad., V. 2) „Dreizahn“-Wachspfl., „Dreizack“ D. (tridens, -tis Dreizahn etc. — bez. d. Zipfel d. äuss. corona staminea), z. B. *gemmiflora* u. *moschata* Haw.
- Trientalis** Rupp, L. (Primulaceen, VII. 1) Siebenstern, „Dreifaltigkeitsblume“ (schwerl. v. triens, -ntis Drittel, sond. triens „Dreiwesen“ st. trinitas Dreifaltigkeit), T. europaea L.
- 1) **Trifolium** Ser., Mch. (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Schabziegerkr., blauer Steinklee (deter. v. trifolium, sogl.), T. coeruleum Mch., s. *Melilotus coer.* Desr. u. *Trigonella* L. 2) **Trifolium** DC., Rchb. (sect. v. *Trifolium* L.), z. B. *repens*, hybridum etc.
- Trifolium** T., L. (Legum. Loteen Trifolieen, XVII. 4) „Dreiblatt“, Klee, fr. trèfle, e. trefoil u. clover, auch shamrock (tri-drei u. folium Blatt), z. B. wild u. geb. T. pratense L., s. g. deutscher Klee, fr. mignonet od. rougerole (tremone), e. purple-wort (-grass), T. repens L. weisser od. s. g. Stein-Klee (auch als Zier. m. v. purp. s. atro-purp.), fr. triolet, e. white clover od. honey-stalk, T. incarnatum L. „Inkarnatkl.“, Zier. T. aurantiacum Boiss. Schaf- od. Bienenkl., fr. tr. orange, T. rubens L. gross. Ähren-, Fuchs- od. Katzenkl., fr. tr. rouge, m. v. fl. albo Hort., wild T. arvense L. s. lagopus (*Lagopodium* Ger.), s. g. Hasenpfötchen, fr. piéd-de-lièvre, e. hare-foot od. trinity-grass, etc. — Trifoliæe (sc. Lotæe) Rchb.
- Triglochin** L. (Juncaceen, VI. 3) „Dreizack“, Salzbinse Leun., Kröten-gras, fr. trocart (troscart) u. mille-greux, e. toad-flax (*τρι-* u. *γλωζιν* od. -ίς Spitze — bez. d. Kapsel!).
- Trigonella** L. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Bockshorn-Klee, fr. trigonelle, eig. „Dreieckchen“ (dem. v. trigonum Dreieck — wegen d. kleinen Kiels wie dreieckige Blüte), T. coerulea DC., s. *trifolium* c. Mch. s. *Melilotus coer.* Pers., Schabzieger-Kl., T. foenum graecum L. „griechisches Heu“ (offiz. *Foeni graeci semina*).
- Trillium** Salisb. (Melanthaceen od. Smilaceen, VI. 3) „Dreiblatt“ od. „Dreifaden“ (contrah. aus trifolium od. trilicium, licium Faden od. Trum — überh. dreizähl. Blütenteile), Zier. *grandiflorum* Sal. (Nordamerika), sessile L. (*Solanum virgin. triphyllum* Pluk.) etc.
- Trinia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Trinie“, Erddolde. Blumenkohldolde, Scherbet O. W. (n. d. russ. Staatsr. Frhrn. v. Trinius, † 1844, s. d. Aut.), T. glauca Dumort. s. vulgaris DC., s. *Pimpinella* gl. L.
- Triodia** P.-B., R. Br. (Gräser, III. 2) (zu *Festuca* L.) „Dreizahngras“, Haarscheide (*τρι-* u. *δόντις* Zahn — d. Spitzen d. unt. Kronspelzchen), T. decumbens R. Br. (*Sieglingia* d. Bernh., *Tridens* d. Röm.), s. *Festuca decumbens* L.
- Triönum** (sc. *Hibiscus*) L. (Malvac., XVI. 8) Stunden-Eibisch (-blume), Wetterröschen Rmpl., fr. fleur changeante od. -d'une heure (von *Triönes*, -num Siebengestirn — Wtst.: dreiteil. Blätter!), s. *Hibiscus mutabilis* s. *ternatus* Cavend. (*Ketmia Triönum* Scop.).
- Triostemum** L. (Lonicereen, V. 1) „Dreiknochenkern“, Dreistein D. (*τρι-* u. *δαστέον* Knochen — drei knochenharte Beerenkerne!), z. B. *hirsutum* Roxb., *Emodorum* Spr. s. *himalayanum* Wall. (Nepal, *Emodi montes*, Himalaya u. *δαρσον* Gabe).
- Triphasia** Lour. (Aurantiaceen, V. 1 od. VI. 1) „Dreifaltigkeits“-Orange (*τριφάσιος* dreifach — näml. Blätt., Kelch u. Krone), z. B. *monophylla* DC. (Timor), *aurantiöla* Lour. s. *trifolia* DC. (*Limonia* tr. L.).
- Tripinnaria** Pers. (Gesneriaceen, XIV. 2) Kürbis- od. Calabassenbaum

- D. (tri u. pinna Feder — d. Blätt. dreifach gefiedert), *T. africana* Spr. (Crescentia pinnaria Jacq., Tanaëcium Sw. „Langstiel“).
- Triplaris** L. (Polygonaceen, XXII. 8) Ameisenbaum v. Guiana, s. g. „langer John“ Leun. (v. triplus dreifach — bez. d. Blütheile u. dreikant. Frucht), *T. americana* L. s. *pyramidalis* Jacq.
- Tripleurospermum** Schultz-Bip. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Dreirippensamen“ (πλευρά Rippe, σπέρμα Samen), *T. inodorum* Sch.-Bip., s. *Matricaria inod.* L. (*Chryanthemum in.* L. etc.).
- Tripolium** Dod., Besl. (sc. Aster) L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Strandaster (gr. τριπόλιον, ob von τριτόλος fruchtbar? Wtst.: v. πολεῖω od. πολέω wende um — wechselt dreimal d. Farbe!), *T. vulgare* Besl. = *Aster Trip.* L. 2) **Trip.** (sc. Mesembryanthemum) L. (Crasulaceen, XII. 4) asterblüt. Zaserblume.
- Tripsacum** L. (Gräser, XXI. 3) Löchergras D. (löcher. Spelzen!) (v. τριβω zerreibe od. mahle — bez. d. Samens zu Mehl? — ungewiss!), z. B. *cylindricum* Mchx., *Zier. monostachyum* Mchx. (Südcarol.), s. *Reana luxurians*, *Teosinte* (auch als Futtergr.) (*Euchlaena lux.* Schrad.).
- Trisepalae** Bartl. Ord. d. Dreikelchblättrigen (sepala Kelchzipfel).
- Trisetum** Pers. (zu Avēna) Rchb. (Gräser, III. 2) „Dreiborstengras“ (sēta Borste), z. B. *lobatum* Trin. (*Trisetaria l.* Poir.), s. *Reboulia gracilis* Kth.
- Tristania** R. Br. (Myrtaceen, XVIII. 2) Lorbeermyrte (n. d. franz. Bot. Jean de Tristan, schr. üb. d. Fl. v. Orleans 1810), z. B. *laurina*, conferta, macrophylla etc. R. Br. (Neuholl.), s. *Melaleuca* L.
- Triteleia** Hook., Lindl. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Dreifaltigkeitslilie“ (τέλειος od. -λεος vollendet — Blüt. doldig in dreiblättr. Hüllen), *Zier. uniflora* Lindl. (Südam.), *grandiflora* Ldl.
- Triticum** T. (Gräser, III. 2) Weizen, fr. froment, e. wheat (v. trītus zerrieben, gemahlen), cult. *T. vulgare* L. Winter- od. Kolben-W. (β. hibernum L.), fr. vulgär rascalade, Sommer- od. Bart-W. (α. aestivum L.), fr. from. barbu (marsais, marsage), wild *T. repens* L. Queckengras, fr. chiendent, panic rampant, e. quick-grass etc.
- Tritoma** Ker (Liliaceen, VI. 1) „Dreischnitt“-L., fr. tritome (gr. τριτόμοος dreimal geschnitt. — bez. d. Narben u. Kapseln), *Zier. T. Uvaria* Gawl. m. v. v., fr. tr. faux Aloës, *Aletris à grappes* „Trauben“-L. (Südafr.), s. *Veltheimia speciosa* Roth (*Aletris Uvaria* L., Aloë Uv. L., *Kniphofia aloëdes* Mnch.), *T. Burchelli* Herb. (*Tritomanthe* B. Lk.), *T. glauca* Hort. m. v. *recurvata* Hort. (Südafr.) etc.
- Tritomanthe** Hoffing., Lk. (Liliaceen, VI. 1), s. *Tritoma* Ker (so eben), *T. media* Lk. (*Aletris sarmentosa* W.).
- Tritonia** Ker (Irideen, III. 1) „Triton's“-Schwertel (v. Triton Wassermolch, mit feuerrotem Bauch — weg. d. Blumenfarbe, Wtst. Tubiform d. Blumen, Meergott Triton auf d. Muschel blasend), *Zier. T. aurea* Pappe (*Babiana aur.* Ker), *croceata*, *purpurea* etc.
- Trollius** Gesn., L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Troll“- od. Troddelblume, Kugelranunkel etc., fr. trolle, boule d'or, e. globe-flower (trollius latinis. Troddel od. Troll — Blumenform), wild u. *Zier. T. europaeus* L. m. v. v., *T. asiaticus* L. m. v. v. etc.
- Tropaeolum** L. (Geraniaceen od. Tropaeoleen, VIII. 1) Kapuzinerkresse, Spornblume, fr. fleur en capuchon (capucine), e. yellow-lark, indian cress (- nasturtium) (v. τροπαιον Trophäe od. Siegeszeichen — Schildform d. Blätt. u. Helmf. d. Blumen), *Zier. T. majus* L. m. v. v. (z. B. king of the Tom-Thumb, „König der Zwerge“, v. ruby-king etc.), *T. canariense* Hort. Kanarienvogelrebe, *T. minus* L., e. dwarf ind.-cress, m. v. v. (z. B. *coccinea* Hort.), *peregrinum* Jacq. (*aduncum* Sm.), Balkons: *T. Lobbianum* Paxt. m. v. *Lily Smith*, Spaliere:

- T. pentaphyllum* Lam. (Chymocarpus pent. D. Don), tricolōrum Sw. (coccinēum Miers) etc. — Tropaeolēae DC. (zu Geraniacēae) Rchb.
- Troperaria** pestifera autt., s. Elodēa canadensis Mchx. „Wasserpest“ (s. Elodēa Rich.).
- Tsuga** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Abietineen, XXI. 9) Schierlings- od. Hemlockstanne, e. hemlock-spruce-fir (vaterl. Name), *Ts. canadensis* Carr. (*Abies Tsuga* ds., *Abies can.* Mchx. etc.).
- 1) **Tsutsui** Kämpf. (Ericaceen Rhodorac., X. 1) japan. Rhododendron (Name in Japan u. China). 2) **Tsutsui** G. Don (subgen. v. *Azalea* L.), z. B. *A. amoena* Lindl. (Bürgeri Miq.), *indica* L.
- Tuber** Mich., L. (Pilze, XXIV. 4) Trüffel, fr. truffe, e. truffle od. earthnut, auch sow-bread „Saubrot“ (tuber Knolle — Knollenform d. Pilzes unter Moos od. Laubabfall).
- Tuberaria** Dun., DC. (sc. *Cistus*) L. (Cistineen, XIII. 1) Knollen- od. Trüffelcist (s. eb. — Wurzelknollen), *T. variabilis* Willk. (*Cistus guttatus* L., *Helianthemum gutt.* Mill.).
- Tubiflorae** Endl., Bartl., Ord. od. Kl. d. „Röhrenblütigen“ (tūbus Röhre, florēo blühe).
- Tulbaghia** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Tulbagh's“-Lilie (n. d. holländ. Gouv. am Cap, Tulbagh, † 1771), z. B. *alliacea* L. (inodōra G.), *violacea* Harv. (Cap), Heisteri Fabr. (*Agapanthus umbellatus* l'Hér.).
- Tulipa** T., L. (Liliaceen, VI. 1) „Tulpe“, veralt. „Tulipane“, fr. tulipe, e. tulip (v. tulipan türk. d. Turban, gr. *τολίπλη*, pers. dolbend, dalmat. duplant), Zier. *T. Gesneriana* L. (*hortensis* Hort., Asien) m. v. v. (z. B. *suaveolens* Roth s. Duc van Thol, v. *turcica* Roth, monströse od. Papagei-T.), *T. praecox* Ten., *oculus solis* St. Amans, *persica* W. (*patens* Ag., *sibirica* Patrín, *tricolor* Ledeb., *Browniana* Hort.), *Clusiana* DC., fr. T. de l'Ecluse, auch wild *T. sylvestris* L. (*florentina odorata* Hort.), fr. Avant-pâques.
- Tulipifera** (sc. *Liriodendron*) L. (Magnoliaceen, XIII. 6) „Tulpenbaum“, fr. tulipier (s. eb. u. fēro trage).
- Tulostoma** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Schwielenmund“, Stielbovist Kumm. (*ύλος* Schwiele etc., *στόμα* Mund — d. Peridium am Scheitel m. offn. Mund), z. B. *mamosum* Zitzen-St. Kumm., s. *Tylostoma* Pers.
- Tunica** Scop. (Caryophyllen od. Sileneen, X. 2) Felsennelke, „Frieslein“ O. W. (*tunica* Hemd — vierblättr. allg. Hülle der Blüten), wild u. Zier. *T. Saxifraga* Scop. m. v. *flore pleno*, s. *Dianthus* u. *Gypsophila* L.
- Tupa** Sweet, D. Don (Lobeliaceen, V. 1) Chili-Lobelia (Name d. Pfl. in Peru-Chili), z. B. *Feuillei*, *blanda*, *ignescens* etc., s. *Lobelia amplexifolia* Hortul.
- Tupistra** Ker (Acoraceen od. Liliaceen, VI. 1) „Hammerkalmus“ (v. *τυπίς*, *-ίδος* Hammer — Blumenform, Wtst. Name d. Pfl. auf Amboina), z. B. *squalida* Ker u. *macrostigma* Bak.
- Turgenia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Turgenie“, Zwiesel O. W. (nicht etwa v. *turgeo* schwelle an, sond. v. d. russ. Staatsr. Dr. Alex. Turgeneff in Moskau), *T. latifolia* Hoffm. (*Caucalis* l. L.).
- Turpethum** (sc. *Convolvulus*) L. (Convolvulac., V. 1) „Turbith“-Winde, ostind. Purgierwurzel, fr. turbit, e. turbith od. gut-wort (arab. *turbid* Wtst.), s. *Ipomoea Turp.* Rchb.
- Turrita** Wallr. (zu *Arabis*) Rchb. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) turmkrautart. Gänsekresse, fr. plateau (*turrītus* m. Turm verseh., getürmt), *T. major* Wallr. (*Arabis Turr.* L. s. *rugosa* Mnch.), s. *Turritis ochroleuca* Lam.
- Turritina** Rich. (zu *Arabis*) Rchb. Turm-Gänsekresse (s. eb.), z. B. *auriculata* Lam., *stricta* Huds. etc.

- Turrītis** Dill. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) Turmkraut, fr. turritte (-rette) (v. turris, -ītis Turm — turmart. Habitus d. Pfl.), z. B. *glabra* L.
- Tussilāgo** T., L. (Compos. Eupatorineen od. Tussilagineen, XIX. 2) „Hustwurz“, Huflattich, fr. tussilage u. taconnet, auch pas d'âne, e. horse-shoe od. colt's-foot (v. tussis Husten u. ago vertreibe), Zier. T. nivea Vill. (Petasites nivēus Baumg.), fr. t. blanc de neige, Warmh. T. fragrans Vill. (Nardosmia fr. Rchb., T. suaveolens Desf. etc.) s. g. Winterheliotrop, fr. héliotrope d'hiver. — Tussilaginėae Less., DC.
- Tweedia** Hook. u. Arn. (Asclepiadeen, V. 2) „Tweedie's“-Wachspfl. (n. John Tweedie, Samml. in Buenos-Ayres), Zier. *coerulea* Hook. (Buen.-Ayr.) s. Oxypetalum coer. Decsn.
- Tydaea** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Tydeische“ Prachtblume (ob v. Tydeus, Vat. d. Diomedes, Myth.?), z. B. *picta* Decsn. (Mex.) m. v. v. u. Blendlingen (z. B. *ocellata*, v. *splendidiissima* u. *reticulata*, Lindenl, pardina, Blendl. Beelzebuth, compacta, floribunda etc.).
- Tylophōra** R. Br. (Asclepiad., V. 2) „Warzenträgerin“ (τύλος Warzenhöcker, φορός tragend — d. Blättchen d. Nebenkronen dick, fleischig), z. B. *grandiflōra* u. *barbata* Spr. (zu Hoya Spr.).
- Tylostōma** Pers., s. Tulostōma Fr.
- Typha** (Tīpha) L. (Typhaceen, XXI. 3) Rohr- od. Teichkolbe, fr. roseau u. masse d'eau (massette), e. reed-club, mace-reed „Keulen“- od. „Kolbenriet“ (gr. τέφρη Pfl. z. Ausstopfen, od. v. τίφος Teich — Standort!), Zier. T. latifolia L., fr. roseau de Passion etc., e. great cat's-tail, T. angustifolia L., fr. m. à feuilles étroites, e. Red-mace, etc. — Typhaceae DC. (zu Aroideae DC.).
- Typhula** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Fadenkeulchen Kumm. (dem. v. Typha, Rohrkolbe), z. B. *Todēi*, *filiformis* etc.
- Udōra** Nutt. (Hydrocharideen, III. 1) Wasserquirl (v. udor Nässe — Standort), z. B. *occidentalis* Koch, s. Hydrilla Rich. (Elodea Ad., Martia Spr.), *verticillata* Casp. etc.
- Udhēa** Kth. (Compositen) „Uhde's“ Blattpfl. (n. Kunth's Freunde Uhde ben.), Zierblattpfl. U. pinnatifida u. bipinnatifida Kth. (Mex.).
- Ulex** L. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) Stachelginster, Gaspeldorn, Hecksame, fr. argousier, e. gorse (-ze), z. B. Zier. *europaeus* L. m. v. v. (fl. pleno, vernalis u. nanus Hort.) (wie Ilex v. ec od. ac celt. d. Spitze).
- Ulmāria** T. (sc. Spiraea) L. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) Ulmen- od. Sumpfpierstaude, s. g. Mehlkraut od. Johanniswedel, fr. ulmaire (-mère) od. ormière, reine des près Wiesenkönigin, e. common meadow-sweet, U. pentapetala Gilib. (Spir. Ulm. L.) u. *Filipendula* A. Br. (Spir. Fil. L.). — *Ulmāriae* Vent.
- Ulmus** L. (Urticac. Ulmaceen, V. 2) „Ulme“, Ulmenbaum, Ruster, fr. orme od. iprēau, e. elm (d. celt. elm, lat. ulmus), z. B. *campestris* L. m. v. v. (z. B. *suberosa* Loud. Korkruster od. Yper, auch als Art U. *suberosa* Mnch.), *effusa* W. Weiss- od. Flatter-R., *montana* Sm. m. v. v. (z. B. *pendula* Hort.), *americana* L., etc.
- Uva** L., Lmx. (Ulvaceen od. Hautalgen, XXIV. 3) Haut- od. Blasen- alge, Ylle, Wassergallert D. (v. d. celt. ul Wasser), z. B. U. *lactuca* L. Meerlattich od. s. g. Watt, fr. ulve, laitue d'anguille etc., s. Tremella Schreb. — Ulvaceae Ag., Endl.
- Ulvina** Kütz. (Algenpilze, XXIV. 3) Kahm (s. eb.), z. B. *aceti* Ktz. s. g. Essigmutter.
- Umbellatae** L. „Doldenpflanzen“, fr. ombellées i. q. Umbelliferae Juss., DC., fr. ombellifères (umbella Schirm v. umbra Schatten u. fero führe, trage).

- Umbelliflorae** DC., Leun., Ord. d. „Schirmlblütler“ Leun. (s. eb. u. floreo blühe).
- Umbilicus** DC. (Crassulaceen, X. 4) „Nabelkraut“, fr. nombril de Venus, e. Venus-navel-wort (umbilicus Nabel), s. Cotylédon L.
- 1) **Uncaria** Roxb., Schreb. (Rubiaceen, Cinchonac., V. 1) Gambir- od. „Hakenstr.“ (v. uncus Haken — d. alt. Blattstiele hakig), z. B. aculeata u. inermis W., s. Nauclea L. 2) **Unc.** Burch. (Bignoniaceen, XIV. 2) (— hakig gekr. Kapsellappen!).
- Unedo** (sc. Arbütus) L. (Ericaceen, X. 1) echter Erdbeerbaum, fr. arbousier (Plinius v. unus ein u. edo esse — unum tantum edo, Frucht ungesund, Wtst.), s. Arb. serratifolia Lodd.
- Ungnadia** Endl. (Sapindac. Hippocastaneen, VII. 1) „Ungnad's“-Rosskastanie (n. Chr. Sam. Ungnad, Gesandt. Rudolfs II., schr. de Malo Persica, Frankf. a. O.), Treibh. U. speciosa Endl.
- Unifolium** Hall., Gm. (Smilacineen, VI. 1) „Einblatt“, Schattenbl. (unum u. folium), s. Majanthemum bifolium Schmidt (Convallaria bif. L.) (— nur 1 gross. Stengelblatt).
- Uniola** L., Mchx. (Gräser, III. 2) „Einspelz“-Dord, Spitzgras D., Küstenhafer (v. unus ein — meist nur 1 Staubgef. d. Blüte), Zier. U. latifolia Mchx. (Nordam.).
- Unōna** L., Schreb. (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 6) „Einheitsbaum“, fr. unone (v. uno vereinige — Staubgef. mit d. Stempeln, Wtst. analog Anona), z. B. discreta L., concolor etc., s. Uvaria L.
- Unxia** L. f., W. (Compos. Millerieen, XIX. 4) „Riech“- od. „Pomadengkraut“ (v. ungo, unxi etc. salbe — riecht stark nach Kampher), z. B. camphorata W. etc., s. Villanova etc. Lag., Spr.
- Urania** Schreb. (Musaceen, VI. 1) „Himmelsbaum“, Reise- od. Wanderb. (Urania, Muse d. Sternkunde, Himmlische — Schönh. d. Gew.'s), U. speciosa W. s. Ravenala madagasc. Sonner.
- Urvia** Desv. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Hasenschwanz“, Hasenfussklee (v. οὐρά Schwanz, Wtst. n. d. indisch. Namen!), U. lagopus Desv., s. Lespedezia Nutt.
- Urceola** Roxb., Rich., Vand. (Apocyneen, V. 1) malay. Krugbaum, ostind. Federharzb., Kautschukranke (v. urceolus klein. Krug — Form d. Blume), U. elastica L. (Tabernaemontana el. Spr.).
- 1) **Urceolaria** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) Krug-Narzisse (s. eb. — Saum d. Blüte krug- od. glockenförm.), z. B. pendula Herb. (aurēa Endl.). 2) **Ure.** W. (Rubiaceen, V. 1) (— Blüt. krugf.). 3) **Ure.** Feuill. (Bignoniaceen, XIV. 2).
- Urceolina** Rchb. (Amaryllideen, VI. 1) Krug-Narzisse (s. eb.), s. Urceolaria Herb.
- Urēdo** Pers. (Staubpilze, XXIV. 4) Staub- od. Zellenbrand, fr. urēde od. bullaire, e. blast od. blight (lat. urēdo v. uro brenne), z. B. segētum u. sitophila Pers. Schmier- od. Faulbrand, Kornfäule. — Uredinēae Rchb. „Brandpilze“.
- Urēna** L. (Malvac., XVI. 8) Malabar-Malve, Stachelkopf (malab. Name uren), z. B. sinuata u. lobata L. etc. s. Hibiscus u. Pavonia.
- Urginēa** Steinh. (Liliaceen, VI. 1) „Urginee“, Meerzwiebel (n. d. Araberstamm Ben Urgin, Wtst. v. urgeo drücke — d. Sam. zusammengedr., während v. Scilla kuglig), U. maritima St. (Scilla mar. L.).
- Urinaria** (sc. Phyllanthus) L. (Euphorbiaceen, XXI. 3) „Urinkraut“ (Ostind.) (urina Urin od. Harn).
- Uromyces** Lév., Lk. (Brandpilze, XXIV. 4) „Schweifspore“, „Brandpilz“ (v. οὐρά Schwanz, μύκης Pilz, od. v. uro brenne — Brandpilz!), z. B. rubigo Lk. Getreidebrand.
- Uropedium** Lindl. (Orchid. Cyripedieen, XX. 1) (zu Cyripedium L.)

„Schwanzschuh“ (s. eb. u. *πέδιον* dem. *πέδη* Fussfessel, Schuh), Warmh. U. Lindenii Ldl. (Neugran.).

Uropetalum Ker (-lon Burch.) (Liliac., VI. 1) „Schwanzzipfel“-Lilie (zu *Lachenalia* Spr.) (s. v. u. *πέταλον* Kronblatt — d. Perigon tief sechsteilig, Staubf. im Schlund, Wtst.), U. *hyacinthoides* Spr. (*Scilla* *hyac.* L.), s. *Polemannia hyacinthiflora*.

1) **Urospermum** Juss., Desf. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schwanzsamen“ (s. v., *σπέρμα* S. — dies. m. lang. Pappus), s. *Arctotis* L., *Tragopogon* L. u. *Arnopogon* W. 2) **Urosp.** Nutt. (Umbellifer., V. 2), U. *aromaticum* Nutt., s. *Spermatura* Rchb. (*Myrrhis* Moris.).

Urtica T., L. (Urticaceen, XXI. 4) „Brenn“-Nessel, fr. ortie, e. nettle (v. uro brenne), z. B. U. *urens* L. kleine Br. od. Heiternessel, fr. ort. grièche, cult. u. wild dioeca (-oica) L. grosse Nessel, geb. U. *nivæa* L. s. g. Ramie (*Rameum majus* Rumph., *Boehmeria ramiflora* Jacq.), *arboræa* L. (Boehm. arb. Jacq.), heterophylla (Faserpfl. Südind.³s) etc. — Urticacæe Rchb., -cæe DC., Bartl., -ticae Juss., -cinae Bartl., DC., Ord. d. Nesselgewächse.

Urvillaea H. B. K. (-æa Kth.) (Sapindaceen, VIII. 1) „Urvillee“ (n. d. franz. Seefahr. Capit. Dumont d'Urville, s. d. Aut.), z. B. *ulmacæa* Kth., s. *Koelreuteria triphylla* Pers.

Usnæa Dill., Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Teller-, Wickel- od. Bartflechte (Paxton v. d. arab. achneh), s. Oschnah Avicenna, U. *barbata* Dill. (Lichen b. L.) etc. — Usneacæe Eschw., Rchb.

1) **Usteria** Cav. (Scrophularineen, XIV. 2) Kletter-Usterie, U. *scandens* Cav. (n. P. Usteri in Zürich, Annal. d. Bot. 1791—95), s. *Maurandia semperflorens* Jacq. 2) **Ust.** W. (Gentianeen od. Carisseen, V. 1) Usteri's-Enzian. 3) **Ust.** Dennst. (Euphorbiaceen, XXI. 1) Usteri's-Wolfsmilch.

Ustilago Lk. (Staubpilze, XXIV. 4) Flug- od. Staubbrand, fr. nielle (v. ustus verbrannt — Brand auf allerlei Gräs. u. and. Pfl.). — Ustilaginæe Tul., DC. „Brandpilze“.

Utricularia L. (Lentibularien, II. 1) „Wasserschlauch“, -helm, fr. utriculaire, mille-feuille des marais (v. utriculus Schlauch — als Anhängsel an d. Wurzeln), z. B. *vulgaris* L., *major* u. *minor* L., etc., s. *Lentibularia maj.* Riv. u. *Millefolium aq. Lob.* — Utriculariæe Seub.

1) **Uvaria** L. (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 6) „Trauben“-Flaschenbaum, fr. uvaire (v. uva Traube — traubenständ. Beeren), z. B. *guianensis* (Aberomoa Aubl., *Cananga* Juss.), *javanica* L. (*Unona discreta* L.) etc. 2) **Uvaria** (sc. *Tritoma* Ker etc.) (Liliaceen, VI. 1) Traubenlilie, U. *longifolia* autt., s. *Trit. Uv.* (*Aloë* s. *Veltheimia Uvaria*) — dicht traub. Blütenstand.

Uvularia L. (Melanthaceen, VI. 1) „Zäpfchenkraut“, Affenblatt, fr. uvulaire „Traubenblume“ Wolff, Kronlilie Perring (v. uvula Zäpfchen — Mittel geg. d. betr. Krankh., Wtst. d. Blüt. als kleine Trauben, dem. uva), Zier. *grandiflora* Sm. s. *lanceolata* Ait. etc., s. *Streptopus* etc.

Vaccaria Med., Bernh. (zu *Saponaria* L.) Rchb. (Sileneen, X. 2) „Kuhnelke“, -kraut (v. vacca Kuh), V. *vulgaris* Host., s. *Lychnis Vacc.* Scop. (Sapon. Vacc. L.).

Vaccinium L. (Siphonandrac. Vaccinieen, VIII. 1) Heidel-, Bick- u. Preisselbeere od. Preissel O. W., fr. airelle, raisin de bois, e. bilberry (blea-), whortle-berry u. whurt (v. *vaccinus* — d. Kuh betr.? od. st. *baccinium* v. *bacca* Beere? — ungewiss), z. B. V. *Myrtillus* L. gem. Heidelb., fr. myrtille od. airelle, V. *vitis* *Idaea* L. Preisselbeere, fr. air. rouge, e. red-bilberry, V. *Oxycoccus* L. (Schollera

- Ox. Roth) u. macrocarpum Ait. gem. u. amer. Moosbeere (cranberry) etc. — Vacciniëae DC., Rchb.
- 1) **Vahlia** Thb., Schreb. (Lytharieen od. Saxifrageen, V. 2) „Vahlie“ (n. d. ber. Bot. Vahl, s. d. Aut.), z. B. *V. capensis* Thb. (*Russelia* cap. L.). 2) **Vahlia** Dahl (Büttneriaceen, V. 1).
- Vaillantia** R. u. S., DC. (*Valantia* T., L.) (Rubiaceen od. Stellaten, XXIII. 1) „Vaillant's“- od. Kreuz-Labkraut (n. d. franz. Bot. Seb. Vaillant, s. d. Aut.), *V. Cruciata* R. S. (*Galium* Cr. Scop., *V. ciliata* Presl).
- Valeriana** L., Neck. (Valerianeen, III. 1) „Baldrian“, Speerwurz, fr. valérianes, e. valerian od. marum u. spear-wort (v. valère kräftig sein? od. latinis. Baldrian, dem Gott Baldur geweihte Pfl. am Hochzeitstag? nicht etwa n. Horat. Valeriani, schr. Cat. pl. horti Firmani 1812), Zier. *V. macrosiphon* Hort. (*Centranthus* m. Boiss.) m. v. v., *V. Cornucopiae* L., *V. rubra* L. α. m. v. v. (*Centranthus ruber* DC.) Gartenbaldrian, fr. v. des jardins, e. red valerian, *V. angustifolia* Mill. s. *rubra* L. β. (Centr. ang. DC.), *V. officinalis* L. Wiesen-B., fr. herbe aux chats, e. shop-valerian, *V. Phu* L. röm. B. od. Theriakwurzel, fr. grande val., e. cut-finger, etc. — Valerianeae DC.
- Valerianella** T., Lois., Bert. (Valerianeen, III. 1) Rapünzchen, Ackerod. Feldsalat, Nisschen od. Nissel O. W., fr. valerianelle, bourcette, mâche etc., e. rampion (dem Valeriana, wozu früher geh.), *V. olitoria* Mnch. (*Fedia* ol. Mnch., Vahl), s. *Valeriana Locusta* v. *olitoria* L.
- Vallisneria** Mich. (Hydrocharideen, XXII. 3) „Vallisnerie“, Schraubestengel, -lilie (n. d. Prof. Ant. Vallisneri in Paris, † 1730), *Aquar. V. spiralis* L.
- Vallöta** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Vallot's“-Narzisse (n. d. franz. Bot. Pierre Vallot, schr. Hist. de la bot. en Bourgogne, Dijon 1828), *V. purpurea* Herb. (*Cyrtanthus* p. Herb., *Amaryllis* p. Ait. s. speciosa l'Hér., *Crinum* spec. L.).
- Valoradia** Hochst. (Plumbagineen, V. 1) „Valorado“-Bleiwurz (n. d. Nam. Valorado? Wst. abyss. Name), Zier. *V. plumbaginoides* Hochst. (*Plumbago* Larpentae).
- Vanda** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Vanda“-O., Schleuderstendel Leun. (v. Vanda, dem Sanskrit-Nam. d. urspr. bek. Art. d. Geschlechts), Warmh. scripta Sw. (*Cymbidium* scr. Sw.), Roxburghii R. Br. (Nordind.). — Vandäae Lindl.
- Vandellia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Vandellie“ (n. d. Prof. Dom. Vandelli z. Lissabon, s. d. Aut.), z. B. *pratensis* L. (*Matourea* pr. Aubl.) etc., s. *Hornemannia* W. s. *Tittmannia ovata* Rchb. u. *Torenia diffusa*.
- Vangueria** Juss. (-guiera Pers.) (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Zwiebelbaum v. Madagascar (aus voavango madagassisch, fr. vanguier), *V. edulis* Vahl (*Vavanga* ed. ds.) etc.
- Vanilla** Plum., Sw. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Vanille“, fr. vanille (-llier), e. vanilla (v. d. span. vaynilla, dem. v. vayna, lat. vagina Scheide od. Schote — Form d. Frucht), *V. aromatica* Sw., s. *Epidendron Vanilla* L.
- 1) **Varēca** autt. (Tange, XXIV. 3) „Vareke“ (v. Varec od. Varech, Nam. d. Seeauswurfs, besond. d. gem. Blasentangs etc.). 2) **Varēca** Roxb. (Violarieen, V. 1) Stachelfrucht, z. B. *lanceolata* Roxb. etc., s. *Hydnocarpus* Vahl, etc. 3) **Var.** G. (Passifloreen, XVI. 2) (auf Ceylon walvareka), *V. zeylanica* G.
- Variolaria** Pers., Ach. (Flechten, XXIV. 3) Blatternflechte, fr. vario-laire (v. variöla Pocke od. Blatter — Ähnl. d. Fruchtlager damit).

- Varronia** Jacq., L. (Asperifolien Hydrophylléen, V. 1) „Varronie“, fr. monjoli (n. d. röm. Schriftst. üb. Landbau M. T. Varro, 116—26 v. Chr.), z. B. floribunda Desv. (Cordia salviaefolia H. B. K. s. Humboldtii R. u. S.), lineata Jacq. (Lantana corymbosa L. f.) etc.
- Vasculares** DC. (sc. Cryptogämae L.) Gefäss-Kryptogamen (v. vasculum dem. vas, -sis Gefäss).
- Vateria** Rheed., L. (Tiliac. Elaeocarpeen, XI. 1) „Vaterie“, ostind. Copalbaum (n. Abr. Vater, Prof. in Wittenberg, † 1751), V. indica L. (Elaeocarpus copalliföerus Vahl, Retz).
- Vatica** L. (Tiliaceen, XI. 1) „Seher“- od. Prophetenstr. (v. vates, -is Weissager etc. — dient in China bei relig. Gebräuchen), V. chinensis L.
- Vanathes (-us)** Haw. (Crassulaceen, V. 5) Schriftblume od. „V-Blüte“, s. Grammanthes DC. (d. Buchstaben V u. ἄνθη Bl. — Zeichen auf d. Kronblättern).
- Vaucheria** DC. (Ulvaceen, XXIV. 3) „Vaucherie“ (n. d. Prof. u. Pred. J. P. Vaucher in Genf, † 1841), V. sessilis Lyngb., s. Eccoptosperma Vauch. u. Conferva L. — Vaucherieäe Kütz.
- Vella** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) Velarkressa (v. veler, d. celt. Wort für Kresse), z. B. annua L. (Nasturtium sylvestre Bauh.) etc. — Velläe Rehb.
- Veltheimia** Gled. (Liliaceen, VI. 1) „Veltheimie“ (n. d. Bot. F. A. Graf v. Veltheim, † 1801), Stuben V. viridiflora Gled. (Aletris cap. Murr.), Gärten: V. Uvaria Gled. (Tritöma Uv. Ker etc.) etc.
- Venidium** Less., DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Aderstengel“-Bärenohr (v. vena Ader u. εἶδομαι gleiche), Zier. V. calendulacäum Less. (Südafri.) m. v. multiflorum Hort., etc.
- 1) **Ventenata (-tia)** Koel. (zu Avēna L.) Rehb. (Gräser, III. 2) „Ventenat's“ Hafergras (n. d. franz. Bot. Ventenat, s. d. Aut.), V. bromoides u. avenacäa Koel. (Avena tenuis Mch. u. Trisetum striatum Pers.). 2) **Ventenatia** Sm. (Plumbagineen, XX. 2), s. Stylidium Sw. 3) **V. P. Br.** (Ternstroemiaceen, XIII. 1). 4) **V. Cav.** (Epacrideen, V. 1), s. Styphelia Sm., Astrolöma R. Br. u. Melichrus R. Br.
- Veratrum** T., L. (Melanthaceen, XXIII. 1) Niesswurz, Germer, fr. varaire od. veratre, e. paddock-pipe (padow-) (v. veräre weissagen — Bedeutung d. Niessens!, Paxton: v. vere wirklich u. ater, -trum schwarz — d. Wurzel! — unsicher), Zier. V. album L. m. v. viridiflorum M. u. K. Brechwurz, fr. éllebore blanc, V. nigrum L., fr. varaire noir, e. dark-flowered Ver.
- Verbascum** Mch., L. (Scrophularineen od. Solaneen, V. 1) Wollkraut, Kerze, fr. molène, e. mullein, wool-blade etc. (n. Tournefort st. barbascum v. barba — bärtige Staubfäden), z. B. V. Thapsus L. Königskerze, fr. bouillon blanc, e. high-taper (torch-weed etc.), Zier. V. phoenicäum L.
- Verbena** T., L. (Verbenaceen, XIV. 2) Eisenkraut, fr. verveine, e. vervain od. vervine (Mejer: eig. Ferbena v. ferrum, Wtst. celt. ferfaen v. fer wegführen u. faen Stein — geg. Steinbeschwerden, viell. auch v. verbum Wort, weil man bei ihm schwor — ungewiss!), Zier. V. triphylla L. (Lippia s. Aloysia citriodora Pers.) Citronenstr., V. hybrida Hort. m. v. v. (z. B. v. striata Hort., fr. verv. italiennes), V. Aubletia L. s. grandiflora Mch., longifolia Lam., pulcherrima Hort. Vilm., venosa Gill., pulchella Sweet m. v. Mahoneti Hort. (geranifolia Hort., tenera Spr.) etc. — Verbenäe Rehb., -nacäe Juss.
- Verbesina** L. (Compos. Heliantheen od. Anthemideen, XIX. 2) „Verbesine“ (einige Ähnl. m. Verbena), z. B. V. vernatifida Cav. (Mex.).
- Vernicia** Lour. (Euphorbiaceen od. Sumachineen, XVI. 4 od. XXII. 5)

- „Firnissamen“-Wolfsmilch (v. vernix, -icis Firniss — Öl aus d. Samen!), *V. montana* Lour., s. *Dryandra cordata* L. u. *Vernix* Thb.
- Vernix** Thb. (sc. *Rhus*) L. (Terebinthaceen Sumachineen, XVI. 4 od. XXII. 5) „Firnissumach“, fr. vernis (so eben), s. *Vernicia montana* Lour.
- Vernonia** Schreb. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Vernonie“, Wurmkrout, -töter, fr. vernonie (n. d. Bot. u. Reis. in Nordam. W. Vernon), Zier. *V. praealta* W. u. *novaeboracensis* W. (*Aster gigantēus* Hort., *Chrysocōma* gig. Walt.) etc., s. *Acaricida* s. *Conyza anthelmintica* W.
- Veronica** T., L. (Scrophularineen, II. 1) Ehrenpreis, fr. véronique u. thé d'Europe, e. broom-lime od. speed-well (n. *Veronica* i. e. vera unica sc. virgo od. Wtst. v. *ῥέρον* bringe u. *ρίζη* Sieg), wild *V. Chamaedryis* L. Bathengel, Denk' an mich, Männertreu etc., fr. *V. Germandrée* etc., e. wild-gamander, bird's-eye etc., Zier. *V. Lindleyana* Past., *V. decussata* Ait. s. *myrtiformis* (eleg. Hstr. m. viel. Blendl.), Treibh. *V. hybrida* Hort. m. v. blue Gem, Stuben *V. speciosa* Hook. m. v. rubra, etc. — *Veronicēae* Benth.
- Verpa** Sw. (Pilze, XXIV. 4) „Fingerpilz“, Eichelschwamm (*verpa* i. q. *Phallus* männl. Glied), *V. digitaliformis* u. *conica*, s. *Phallus conicus* Müll.
- Verrucaria** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) „Warzenflechte“ (*verruca* Warze — Form d. Fruchtkörper).
- Verschaffeltia** Herm. Wendl. (Palmen, XXII. 3) „Verschaffelt's-P. (s. d. Aut.), Treibh. *V. splendida* H. Wendl., *melanochaetes* Wendl. „schwarzborstige“, etc., s. *Regelia* Planch. u. *Stevensonia* H. Wendl.
- Verutina** Cass., DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) grossdornige Flockenblume (v. véru Wurfspieß), s. *Centaurea Verutum* L. (*Crocodilium* Pers.) — d. Anthodschuppen langdornig!).
- 1) **Vesicaria** Lam. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Blasenschötchen“ (v. vesica Blase), z. B. *V. utriculata* Lam., s. *Alyssum Vesicaria* u. *utriculatum* L. 2) **Vesicaria** L., Pers. (zu *Trifolium* L.) (Leguminos. Trifolieen, XVII. 4) Blasenkelchklees, z. B. *fragiferum* L. u. *vesiculosum* Savi.
- Vesicastrum** Ser (zu *Trifolium* L. sect.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Blasenkelchklees (s. eb., deter.).
- Vestia** W. (Cestraceen od. Solaneen, V. 1) „Vest's“ Hammerstrauch (n. d. Prof. Lor. v. Vest in Grätz, schr. Manuale bot. 1805), *V. lycioides* W., s. *Cantua ligustrifolia* Juss. s. *foetida* Pers.
- 1) **Viborgia** (Wib.-) Roth (Compos. Inuleen, XIX. 2) Kopfkraut (n. d. dän. Bot. Erich Nilsen Wiborg, † 1822), *V. Acmella* L. u. *s. parviflora* H. B. K., s. *Galinsogea* Rz. Pv. 2) **Viborgia** Mnch., Thb. (Wib.-Thb. u. -quia Orteg.) (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Wiborg's“ Ginster, Zier. *purpurea* Mnch. (*Cytisus* purp. Scop.), *austriaca* Mnch. (*Cytis. aust. L.*), s. *Crotalaria* L.
- Vibrio** Ehrbg. (Vibrionen od. Bakterien) „Zittertierchen“ (v. vibro vibriere od. zittere).
- Viburnum** L. (Caprifoliaceen, V. 3) Schlingstrauch, Schlinge Grck., Schneeballenstr., Mehlbeerstr., fr. viorne, e. snow-ball od. wayfaring-tree „Wanderbaum“ (v. viēo binde, flechte — biegsame Zweige — ungewiss!), Zier. *V. Opulus* L. (*lobatum* Lam.) m. v. fl. pleno (*rosae-florum* sterile Hort.), s. *Opulus glandulosa* Mnch., s. g. Wasserholder, fr. obier d'Europe, e. marsh-elder, *V. Lantāna* L. Mehlbeerstr., *V. prunifolium* L. (*Lentago* Dur.) etc., Stuben *V. Tinus* L. (*Laurus* T.). — *Viburnēae* Bartl.
- Vicia** T., L. (Legumin. Viciēen, XVII. 4) „Wicke“, fr. vesce, e. vetch od. fitch (celt. gwig, gr. βικιά od. -ov, Paxton u. Wtst. v. viēo binde od. vincio unwickle — weg. d. Wickelranken). — *Viciēae* Rchb.

- Vicioïdes** Mnch. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Zitterlinse (v. *Vicia* u. *είδομαι* gleiche), *V. hirsuta* Mnch. (*Vicia* h. Koch, *Ervum* h. L.).
- Victoria** Schomb., Lindl. (Nymphäaceen, XIII. 1) „Victoria“-Wasserlilie (n. d. Königin Victoria v. Grossbrit., geb. 1819), *V. regia* Ldl. s. *regalis* Schomb. (in Guiana „Irupé“ Leun.).
- Victoralis** (sc. *Allium*) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Siegllauch“, Netzweibellauch, Allermannsharnisch (v. *Victoria* Sieg — d. Wurzel verleiht Sieg, Talisman, Wtst. häuf. auf d. Berge St. Victoire, Mons *Victoralis*, in der Provence).
- Vidua** Coult., DC. (Dipsaceen, IV. 1) „Wittwenblume“ (*vidua* v. *viduus* leer, d. Wittwe — Wtst. d. Grübchen d. Involucellumröhre fehlen!), Zier. *V. atro-purpurea* Coult., s. *Asterocephalus* s. *Scabiosa* L.
- Vieusseuxia** Lar. (nicht *Viess.*-Dietr.) (Irideen, XX. 2) „Vieusseux“ Schwertel (n. M. Vieusseux, Arzt in Genf), z. B. *V. aristata* Lar., *tricuspis* Thb. etc.
- 1) **Villarsia** Vent. (Gentianeen, V. 1) Seekanne, Teichenzian, Tauche etc., fr. Villarsie (n. d. franz. Bot. Villars, s. d. Aut.), wild u. Zier. *V. Nymphoides* Vent. (Schweykertia N. Gm., *Limnanthemum nymphaeoides* Lk. etc.), *chilensis* Lodd. etc. 2) **Vill.** Guett. (Compositen).
- Vilmorinia** DC. (Leguminos. Glycineen, XVII. 4) „Vilmorin“'s Schamblume (n. d. Bot. Vilmorin, s. d. Aut.), s. *Clitoria multiflora* Sw.
- Vinca** L. (Apocynen od. Contorten, V. 1) Sinngrün, „Winke“ O. W., fr. *pervenche* (*Pervinca* Scop.), e. winter- od. ever-green, periwinkle, virginian bower (v. *vinco* besiege — nämll. d. Winter, od. Wtst. v. *vincio* binde — lange, biegs. Stengel), wild. u. Zier. *V. minor* L. m. v. v., *major* L. m. v. v., *V. herbacea* W. K., *rosa* L. (*Lochera* r. Rehb., *Catharanthus* r. G. Don), e. old-maid, etc.
- Vincetoxicum** Mnch. (sc. *Asclepias*) L. (Asclepiadeen, V. 2) Hundswürger, Schwalbenwurz, Giftwurz, fr. *asclepiade dompte-venin*, e. swallow-wort (v. *vinco* überwinde, *τοξικόν* Pfeilgift — nämll. als Gegengift).
- Viniferae** Juss., DC. (sc. *Palmae*) Weinpalmen (*vinum* Wein u. *fëro* trage).
- Viola** T., L. (Violarieen, V. 1 od. XIX. 6) „Veilchen“, fr. violette, e. violet, heart's-ease „Herzlust“ (lat. *viola* dem. v. *ἴον* Veilchen), wild u. Zier. *V. odorata* L. März-V. m. v. v. (z. B. fl. plen. Hort., v. *alba*, v. *sempervirens* Hort. s. *italica* Voigt, v. *praecox* Hort., v. *rossica* (z. B. the Czaar u. Victoria Riesen-V.), *V. tricolor* L. Stiefmütterchen, s. g. *Pensée*, fr. herbe od. fleur de la Trinité, e. pansy od. paunce, heart's-ease, m. v. *hortensis* Hort. (*grandiflora* u. *perennis* Hort.), *V. altaica* Ker s. *pura* Hort., fr. *Pensée vivace bleue*, *V. canadensis* L., *cornuta* L. Horn-V., *calcarata* L., fr. violette éperonnée, long-spurred-violet „Langsporn“-V., u. a. m. — *Violaceae* Rehb., -lëae ds., -lariëae Endl., DC., Bartl.
- Viorna** (sc. *Clemätis*) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) Haargriffel-, „Wegzier“-Waldrebe (N.-Amer.), fr. *Clématide Viorne*, e. road-ornamenting Cl., purple-climber etc. (v. *via* Weg u. *orno* ziere).
- Virgaurea** T., DC. (*Virga-aurëa* T.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Goldrute“, fr. bose od. bosée (*virga* Rute, *aurëus* golden), s. *Solidago* *Virga-aurëa* L.
- 1) **Virgilia** Cav., Pers. (Cassieen *Cäsalp.*, X. 1) Gelbholz v. Cumberland (n. d. ält. röm. Dicht. *Virgil*), *V. lutëa* Lam. (*Cladrastis tinctoria* Raf.) etc., s. *Sophora*, *Podaliria* etc. 2) **Virgilia** l'Hér. (Compos. Astereen, XIX. 2) *Virgil's-Aster*, s. *Aster Amellus* L.
- Viscaria** Riv., Röhl. (sc. *Lychnis*) L. (Sileneen, X. 2) „Pechnelke“, klebrige Lichtnelke, fr. *atrape-mouche* u. *Bourbonnaise*, e. clammy-Lychnis (v. *viseum* Leim — klebr. Stengel), wild u. Zier. *V. vul-*

- garis Röhl. s. purpurēa Wimm. m. v. fl. plen. u. albo Hort., alpina Fries, oculata Lindl., coeli-rosa v. aspēra Poir., fr. V. à fleurs oculées, e. oculate rock-Lychnis, etc., s. Lychnis L.
- Viscum** T., L. (Loranthaceen, XXII. 4) Mistel, urspr. Misle Mej., Leim-beere od. Vogelleim, fr. gui od. gillon, e. mistle-toe (missletoe od. mistle-tow) (viscum gr. ἴζος; Leim, celt. gui od. gwid Strauch).
- Vismia** Vand., Pers. (Hypericaceen, XVIII. 4) Gummistrauch, fr. gomme-gutte od. scammonée jaune (n. d. Lissabonner Kaufm. Visme ben.), V. guianens. Vand. — Vismiēae Chois.
- Visnāga** Lam. (sc. Ammi Rchb., sc. Daucus L.) (Umbellifer., V. 2) „Visnage“, s. g. Zahnstocher, fr. visnage u. herbe aux curedents (aux geneives) (Wtst. st. Bisnaga = bis acutum doppelt spitz — zu Zahnstochern), V. daucoides G. (Südeur., Levante).
- 1) **Visnēa** Schreb. (Sapotac. od. Lucumeen, XI. 3) Wagenholzbaum (Wtst.: Ableit. wie Vismia), V. Mocanera W. (Mocanēra canariens. L. f.). 2) **Visnēa** Steud. (Amaryllideen).
- Vitalba** (sc. Clemätis) L. (Ranunculaceen Clematideen, XIII. 3) gem. Waldrebe, „Weissrebe“, Teufelszwirn od. Hexenstr., fr. Clématide des haies, viorne des pauvres, e. bend-with, wild Climber (vitis Rebe u. albus weiss).
- Vitellaria** G. (Sapotac. od. Lucumeen, XI. 3) Butterbaum v. Sudan (v. vitellus Eigelb), V. paradoxa G.
- Vitex** L. (Verbenaceen, XIV. 2) Müllen- od. Pfefferstrauch, Mönchs- od. Klosterpfeffer, Keuschlamm (-baum D.), fr. petit-poivre, gatilier etc., e. chaste-lamb-tree (v. viēo biege — d. biegs. Zweige zu Körben etc.), V. agnus-castus L., s. Wallrothia Leucoxyton Roth.
- Viticella** Dill. (sc. Clemätis) L. (Ranuncul. Clematid., XIII. 3) violette, blaue od. ital. Waldrebe, fr. vignette od. Clématide viticelle, e. vine-bower-Cl. od. red-flowered lady's-bower (ital. viticella = kleiner Weinstock), Zier. v. coerulea Sweet u. V. multiplex G. Don.
- Vitis** L. (Vitaceen od. Ampelideen, V. 1) Weinstock, -rebe, fr. vigne, e. vine (v. d. celt. gwid = bester Baum, Paxton, v. viēo binde? — lat. vitis Rebe), V. vinifera L. m. zahlr. v. v. edler W., V. indīca L. (vinifera sylvestris Pluk.), V. cordifolia s. cordata Mchx. (incisa Jacq.), e. heart-shaped vine od. chicken-grape „Hühnchentraube“ (in Amer. frost- od. wintergrape), V. hederacēa Ehrh. (Hedera s. Cissus u. Ampelopsis quinquefolia autt.) wilde od. Jungfernebe, V. arborēa L. s. caroliniana (Frutex scandens Pluk.), V. Labrusca L. Sommerrebe od. nördl. Fuchsrebe, V. rotundifolia Mchx. s. vulpīna Torr. u. Gr. südl. Fuchsrebe, V. riparia Mchx. Uferrebe (odoratissima Don) etc. — Vitacēae i. q. Viniferae Rchb. = Sarmentacēae DC. Weinrebengew. Leun.
- Vittadinia** Rich. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Vittadini's“-Baldgreis (n. Dr. C. Vittadini in Mailand), z. B. Ampel V. trilōba Hort. (Neuholl.), s. Erigēron quercifolius A. Gray.
- Voandzeia (-zoua)** P. -Thou. (Cassieen Geoffreen, X. 1) „Voandzoue“ (n. d. madagass. Nam. voandzou geb.), V. s. Glycīne subterranea L. unterird. Süssbohne od. Erdnuss.
- Vochysia** Juss., Lam. (-chya Vand.) (Onagreen Vöchysiaceen, I. 1) prachtblumig. „Wotschibaum“ Hb. (Nam. in Guiana vöchy), V. guianens. Aubl., s. Cucullaria excelsa W. — Vochysiēae DC., -siaceae Mart. (zu Calyciflorae Bartl.).
- 1) **Vogelia** Hornem., Med. (Crucifer. Nucamentaceen, XV. 2) „Vogelie“ od. „Neslee“ (n. d. ält. Bot. Mart. Vogel, Herausg. v. Jung's Botanophysica 1678), V. paniculata Horn. (Neslea p. Desv.) s. sagittata Bernh. 2) **Vogelia** Gm. (Amaryllid.). 3) **Vog.** Lam. (Plumbagineen).

- Voglĕra** Fl. Wett. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Vogler's“ od. deutscher Ginster (n. ein. Bot. Vogler, s. d. Aut.), *V. spinosa* Fl. Wett., s. *Genista germanica* L.
- Vohiria** Juss., Pers. (**Voyra** Aubl.) (Gentianeen, V. 1) „Vohirie“ (guian. Name d. Pfl.), *V. coerulĕa* u. *rosĕa* Aubl., s. *Lita coer. u. ros. W.*
- 1) **Volkameria** L., Pers. (Verbenaceen, XIV. 2) „Volkamerie“ (n. d. Stadtrat J. G. Volkamer in Nürnberg, † 1693), Warmh. Stub. *V. fragrans* Vent. s. *japonica* Jacq., s. *Clerodendron fr. Hortul. (Rhododendron villosum Roth)*. 2) **Volk.** Burm. (Capparideen). 3) **Volk.** P. Br. (Ericaceen).
- Volvaria** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Scheidenpilz“ (v. *volva* Hülle etc. — d. Perithecium in besond. warzig. Hülle).
- Volvox** L. (Protococcaceen od. Urkornalgen) Kugeltierchen, -alge (v. *volvo* wälze), *V. globator* L.
- Voyra** Aubl. s. *Vohiria* Juss.
- 1) **Vriesĕa** Hassk. (Scrophularineen, XIV. 2) „Van-Vriese's“-Blume (n. d. Prof. W. Van Vriese in Amsterd., s. d. Aut.). 2) **Vriesia** Lindl. (Bromeliaceen, VI. 1) „Vriesie“, Zier. *V. Glazoviana* u. *psittacina* Lindl., s. *Tillandsia* etc.
- Vulneraria** Mnch., Lam. (sc. *Anthyllis* L. u. sect. v. *Anth. Rchb.*) (Legumin. Anthyllideen, XVII. 4) „Wundklee“, fr. *vulneraire*, e. wound-wort od. lady's finger (v. *vulnus*, -ĕris Wunde), s. *Vuln. rustica* T. m. v. fl. albo, *V. tetraphylla* L., etc.
- Vulparia** Rchb. (sect. v. *Aconitum* L.) (*Ranunculac.*, XIII. 3) „Fuchstod“-Eisenhut (*vulpes*, -is Fuchs).
- Vulpia** Gm. (Gräser, III. 2) „Fuchsschwingel“, Mäusehafer, fr. *vulpin*, queue de rĕnard, e. fox-tail (Wtst. n. d. Apoth. *Vulpinus* in Pforzheim, schr. 1786 *Spicil. Fl. Stuttgardensis*), *V. myurus* Gm. u. *sciuroides* Rchb., s. *Festuca* etc.
- Vulvaria** (sc. *Chenopodium*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) „Schamkraut“, stinkend. Gänsefuss, fr. *vulvaire*, Stinkmelde Wolff, s. *Chenopodium olidum* Curt. (*vulva* Scham od. Gebärmutter).
- Wachendorfia** Burm., L. (Commelyneen, III. 1) „Wachendorfie“ (n. d. holl. Bot. Is. Eb. Wachendorf), Stuben: *W. thyrsiflora* L. u. *hissata* Thb., etc., s. *Dilĕtris* u. *Erythrobulbus* Pluk.
- 1) **Wahlenbergia** Schrad. (Campanulaceen, V. 1) Epheu- od. Zwergglocke (n. Wahlenberg, s. d. Aut.), Topf: *W. grandiflora* Schrad. (*Platycodon* gr. DC., *Campan.* gr. Jacq.), wild *hederacea* Rchb. 2) **W.** Blum. (Rubiaceen). 3) **W.** P. Br. (Terebinthaceen).
- 1) **Waitzia** Wendl. (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Waitz“-Strohblume (n. d. Bot. K. F. Waitz in Altenburg, † 1848), Zier. *aurĕa* Steetz (Neuholl.), s. *Leptorrhynchus aur. Benth.* (*Helichrysum elegans* Hort., *Morna el. Hort. s. nitida* Ldl.), *W. grandiflora* Thomps., *corymbosa* Wendl. m. v. v. 2) **W.** Rchb. (Irideen).
- Waldschmidtia** Neck. (Gentianeen, V. 1) Seekanne, Tauche etc. (n. ein. Bot. Waldschmidt), *W. nymphoides* Wigg., s. *Limnanthemum*, *Villarsia*, *Schweykertia* etc.
- 1) **Wallichia** Roxb. (Palmen, VI. 2) „Wallich's“-P. (n. Dr. Nath. Wallich, Insp. d. bot. Gart. zu Calcutta, s. d. Aut.), z. B. *caryotoides* Rxb. (*Harina car. Ham.*). 2) **W.** DC. (Theaceen od. Geraniac. *Wallichieen*, XVI. 2) „Wallich's“ *Geranium*. — *Wallichieae* sc. *Geraniaceae*) Rchb.
- Waltheria** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Waltherie“ (n. d. Prof. A. F. Walther in Leipzig, † 1746), z. B. *americana* L. u. *indica* L., s. *Malvinda ulmifolia* Burm., *W. Astropus* Spr. (*Astrop. tomentosa* Spr.).

- Warszewiczella** Van Houtt. (Orchid. Vandeem, XX. 1) „Warszewicz“-O. (n. d. Bot. u. Reis. in Centralamer. 1845/53 Warszewicz, s. d. Aut.), s. *Zygopetalum* Hook.
- Washingtonia** Winslow (Conif. Cupressineen, XXI. 9) „Washingtonie“, *W. californica* Winsl. = *Wellingtonie* (n. G. Washington, dem Befreier v. Nord-Amer.), s. *Wellingtonia* Lindl. s. *Sequoia gigantēa* Endl.
- Watsonia** Ker, Mill. (Irideen, III. 1) „Watson's“-Schwertel (n. d. Lond. Apoth. W. Watson, s. d. Aut.), z. B. *plantaginēa* Ker, *humilis* Mill. etc., s. *Gladiolus* etc.
- Weigēla** Thb. (-lia Pers.) (Caprifoliaceen, V. 1) „Weigel's“-Rose (n. d. Prof. in Greifswald E. Weigel, s. d. Aut.), *Zier. W. rosēa* Thb. m. v. v. (*Diervilla* ros. Ldl.), *amabilis* Van Houtt. (*Diervilla coraeensis* Thb. s. *grandiflōra* Sieb. u. Zucc.) m. v. v., *W. japonica* Thb. s. *arborēa* Hort.
- Weingärtneria** Bernh. (Gräser, III. 2) Silbergras, Bunke O. W. (n. d. Conrect. Weingärtner in Erfurt, s. d. Aut.), *W. canescens* Bernh., s. *Corynephorus* can. P.-B. (Aira can. L.).
- Weisia** Spr. (*Weissia* Hedw.) (Moose, XXIV. 2) „Weiss“-M. (n. d. Prof. F. W. Weiss in Götting., s. d. Aut.) — *Weisiaceae* Schimp.
- Welfia** H. Wendl. (Palmen) „Welfen“-P. (n. d. Dynastie der Welfen ben.), z. B. *W. Georgii* H. Wendl., *regia* ds. (Neugran.).
- 1) **Wellingtonia** Lindl. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) *California-Ceder* (n. d. Herzog v. Wellington ben.), *W. gigantēa* Ldl. *Mammuthskiefer* od. *californ. Riesentanne*, s. *Sequoia gig.* Ldl. (*Washingtonia californica* Winslow). 2) **W. Meisn.** (Sapindaceen).
- Welwitschia** Rchb. (Gnetaceen, XXI. 9) „Welwitsch's“ Wunderpfl., *W. mirabilis* Rchb. (Westafr.) (n. d. österr. Arzt u. Reis. für Portugal in Südafr. Dr. Franz Welwitsch), s. *Huegelia* Benth.
- Westringia** Sm. (Labiaten, XIV. 1) *Zwergrosmarin* (n. J. P. Westring, schr. Schwedens Färbeflechten, Norrköping 1805), *Warmh. W. rosmarinifolia* Sm. (*Cunila fruticosa* W.) (Neuholl.).
- Whitlavia** Harv. (Hydrophylléen, V. 1) „Whitlaw's“-Wasserblatt (n. ein. eifr. Bot. Whitlaw ben.), *Zier. grandiflōra* Harv. m. v. v. (z. B. *alba* u. *gloxinioides* Hort.) (Californ.).
- Wibelia** Hoppe, Röhl. (nicht *Wiebelia* Fl. Wett.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Wibel's“-Pippau (n. d. Arzt etc. Wibel in Wertheim), *W. apargioides* Röhl. u. *graveolens* Fl. Wett. (*Barkhausia grav.* Rchb.).
- Wiborgia** s. *Viborgia*.
- Wigandia** H. B. K. (Hydroleaceen, V. 1) „Wigand's“-Blattpfl. (n. Joh. Wigand, Bisch. v. Pommern 1540—87, schr. üb. preuss. Pflanzen), *Zier. W. caracasana* Kth. s. *macrophylla* Hort. (Neugran.), *Vigieri* u. *urens* Kth., s. *Hydrolēa* L.
- Wiggersia** Fl. Wett. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Wigger's“-Wicke, *Zaun-* (n. d. Götting. Prof. F. H. Wiggers), *W. sepium* Fl. Wett., s. *Vicia sepium* L.
- 1) **Willemetia** Neck. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) „Willemet's“-Pippau (n. P. R. Willemet, s. d. Aut.), *W. apargioides* Cass. (*Wibelia* ap. Röhl.) u. *hieracioides* Monn., s. *Crepis*. 2) **W. Märk.**, Gm. (Chenopodiaceen, V. 2) *Sand-Willemetie*, *W. arenaria* Gm., s. *Kochia* ar. Roth. 3) **W. A. Brong.** (Rhamnaceen, V. 1), *W. africana* A. Brong., s. *Ceanothus* afr. L.
- 1) **Wintēra** L. (Dilleniaceen, XIII. 4) echter Winter-Rindenbaum (n. Capt. Winter, Drake's Begleiter 1578), *W. aromatica* L. (*Drimys Winteri* L. f.), s. *Winterana* ar. Soland. u. *Tasmania* ar. R. Br. 2) **Winterania** L. (Hesperideen od. Guttiferen, XI. 1) *Kaneelzimmt*, *W. Canella* L., s. *Can. alba* Murr. (*Winteranus Cortex* d. Offizinen).

- Wistaria** Nutt. (Leguminos. Glycineen, XVII. 4) „Wistar's“ - Süßbohne (n. Casp. Wistar, Prof. in Pennsylvania, † 1818), Zierkletterstr. *W. chinens.* DC. (Glycine chin. Sims) m. v. fl. albo Hort., *W. frutescens* DC. (Glyc. frut. L., *Apios* fr. Pursh, *Anonymus* fr. Walt., *Thyranthus* frut. Elliott) s. *speciosa* Nutt. m. v. v. (z. B. *magnifica* Fl. d. Serr.).
- Witheringia** Schreb., l'Hér. (Solaneen od. Polemonieen, V. 1) „Witheringsblume“ (n. d. Arzt u. Bot. Withering, schr. 1776 Flora v. England, s. d. Aut.), *W. solanacea* l'Hér. u. *superba* ds. (*Cantua splendens* Lam.).
- 1) **Witsenia** L., Schreb. (Irideen, III. 1) „Witsen's“ - Schwertlilie (n. d. holl. Liebh. d. Bot. Witsen ben.), *W. corymbosa* Gawl. (*Nivenia* cor. Bak.). 2) **Wits.** Thb. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Witsen's“ - Salatmalve, *W. indica* Gm., s. *Melochia odorata* L.
- Wittelsbachia** Mart. (Ternstroemiaceen, XVI. 8) Schneckensamen-Baumwollenbaum (n. d. bairischen Dynastie Wittelsbach ben.), *W. insignis* Mart., s. *Cochlospermum hibiscoides* Kth. u. *Bombax* L.
- 1) **Woffia** Mich., Hork. (Lemnaceen, II. 1) „Wolff's“ - Wasserlinse (n. d. Prof. Kasp. Friedr. Wolff, † 1794), *W. Michellii* Hork. = *Lemna arrhiza* L. 2) **Woffia** Spr. (Apocynaceen, V. 1) brasil. Wolfsstrauch, *W. brasiliensis* Spr. (nach demselben).
- Woodsia** R. Br., Spr. (Farne, XXIV. 1) „Woods“ - Wimper- od. Schildfarn, Hüllchenteller-F. (n. d. engl. Bot. Jos. Woods, s. d. Aut.), *W. pubescens* Spr., *hyperborea* R. Br. etc., s. *Ceterach*, *Acrostichum* etc.
- Woodwardia** Sm. (Farne, XXIV. 1) „Woodward's“ - F. (n. d. engl. Bot. Thom. Jenk. Woodward, schr. m. Goodenough üb. engl. Algen), *Zier. radicans* Sm., *caudata* Sw. (*Doodia* c. R. Br.) (Neuholl.).
- 1) **Wormia** Rottb. (Dilleniaceen, XIII. 5) „Wormius“ - Dillenie (n. d. dän. Philos. Olaus Wormius ben.), *W. triquetra* Roxb. (*Dillenia dentata* Thb.). 2) **Wormia** Vahl (Myrobaleen).
- Wredowia** Eckl. (Irideen, III. 1) „Wredow's“ - Schwertel (n. d. Bot. Wredow, schr. ökon.-techn. Flora Mecklenburgs, Lüneburg 1811), z. B. *pulchra* Eckl. (Cap).
- Wulfenia** L., Jacq. (Scrophularineen, II. 1) „Wulfen's“ - Hahnenkamm (n. F. X. v. Wulfen, Geistl. u. Prof. in Klagenfurt, † 1805), z. B. *carinthiaca* Jacq. s. *obliqua* Wall. (*Paederota Wulfenia* Lam.).
- Wurmbëa** Thb., Schreb. (Melanthaceen, VI. 1) „Van Wurmb's“ - Schwarzblume (n. F. Van Wurmb, Sekr. d. Akad. d. Wiss. zu Batavia), *W. campanulata* W. (*Melanthium Wurmbëum* autt.), *purpurea* Ait. (*Melanth. spicatum* Van Houtt.).
- Xanthe** W., Schreb. (Guttiferen Garcinieen, XI. 1) Gelbwurz, Gelbmilcher D., „Gelbgummistrauch“ (*ξανθός*; gelb — solcher Saft d. Str.'s), *X. parviflora* W. (Schlingstr. Guiana), *scandens* W. (*Quapoya* sc. Aubl.) etc., s. *Clusia micro-* u. *macrocarpa* Spr.
- Xanthium** T. (Compos. Ambrosiaceen, XXI. 5) Spitzklette, Klettenwurzel, Klisse O. W., fr. gloutron, tignon, plante à jaunir (gr. *ξανθίου* Kraut z. Gelbfärben v. *ξανθός*), *X. strumarium* L. Kropfklette Wolff, fr. lalpourde, *X. fruticosum* L. (*Franseria* Cav. *artemisifolia* L., *Ambrosia arborescens* Mill.).
- Xanthoceras** Bung. (Sapindaceen, XXIII. 1) „Gelbhorn (s. v. u. *κέρως* Horn — zwisch. d. Kronblätt. 5 gelbe Hornrüsen), z. B. *sorbifolia* Bung.
- Xanthochymus** Roxb. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 5) Cambodscha-Stalagmit (Cambogia-), eig. „Gelbsaft“ (s. v. u. *χυμός* Saft, „Chy-

- mus⁴), *X. pictorius* Roxb. Maler-Gummiguttb., *X. ovalifolius* Roxb. (Warmh.).
- Xanthorrhiza** Marsh. (Ranunculaceen, V. 7) „Gelbwurz“ (s. v., *ῥίζα* Wurzel — diese gelb u. zum Gelbfärben), geb. u. wild *X. apuifolia* P'Hér. s. tinctoria Woodh. (Str. Nordam.).
- Xanthorrhoea** Sm. (Commelyneen od. Asphodeleen, VI. 1) „Gelbfluss“, Harzaffodil Leun., -lilie D. (s. v., *ῥοία* od. *ῥοή* Fluss — gelbes Harz tritt aus), *X. resinosa* Sm., *arborea* R. Br., s. g. Grasgummi-
baum, *hastilis* Sm. etc.
- Xanthosoma** Schott (Aroideen, XXI. 1) „Gelbleib“, -narbe (s. v., *σῶμα* Leib — d. Narbe m. gelb. Klebmasse überzogen), Zier. *X. sagittifolium* Schott (Arum s. *Caladium* sag. Vent.), *pubescens* Pöpp., Endl. (Calla od. *Calad. pub.*).
- Xanthoxylon** L. (-um Kth.) (Zanthox.- H. B. K.) (Terebinthac. Xanthoxyleen, XXII. 12) „Gelbholz“, fr. clavier, e. tooth-ache-tree, s. g. Zahnwehholz (s. v., *ξύλον* Holz), *X. fraxinæum* W. s. americanum Mill. (ramiflorum Mchx.) gem. Zahnwehholz (in Amerika prickly-Ash), s. *Fagara* Schreb.
- Xenopoma** W. (Scrophularineen od. Labiaten, XIV. 1) „Fremdentrank“, s. g. Königs- od. Mandarinthee D. (*ξένος* fremd, *πῶμα* od. *πόμα* Trank), *X. obovatum* W. (Str. China).
- Xeranthemum** T., L. (Compos. Cynarcephaleen, XIX. 2) Strohlume, Spreu-, Papierbl., fr. xeranthème, e. amarinth the everlasting, silberknap (v. *ξηρός* trocken, *άνθημον* Blume), Zier. *X. annuum* L. Papierbl. Rmpl. m. v. v. (z. B. *imperiale*, *violacæum*, *atro-purpureum*, *grandiflorum*, *flora roseo pleno*), *X. inodorum* Mch., *ornatum* Cass., *radiatum* Lam. etc., s. *Elī*- s. *Helichrysum* W.
- Ximenesia (-zia)** Cav. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Ximenesie“, fr. *ximénésie* (n. d. span. Apoth. Jos. Ximenes, s. d. Aut.), Zier. *encelioides* Cav. (Mex.), s. *Coreopsis* u. *Simsia* R. Br.
- Xiphidium** Löffl., Schreb. (Hämodoraceen od. Commelyneen, III. 1) „Schwertblatt“, Scheidenlilie D., fr. *glaiwane* (*ξίφος* Schwert, *εἶδομαι* gleiche — bez. d. Blätter), z. B. *floribundum* Sw. s. *album* W. (*albidum* Lam.), s. *Ixia* *Xiphidium* Löffl. m. v. *coeruleum* Aubl.
- Xiphium** Mill. (sc. Iris) L. (Irideen, III. 1) spanische Schwertlilie, fr. u. e. *xiphion* (*ξίφιον* dem. v. *ξίφος* Schwert — näml. d. Blätter), s. *Xiphium vulgare* Hort.
- Xiphophyllum** (sc. Serapias) L. f. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Schwertblatt“-O. (*ξίφος* u. *φύλλον*), s. *Serapias ensifolia* L. (*Cephalanthera* *Xiphoph.* Rehb. f.).
- Xōra** Sw. (Rubiace. Coffeaceen, V. 1) westind. Kaffeestr. (v. *ξωρός* lauter, rein), *X. americana* Sw., s. *Coffea occidentalis* Jacq. (*Tetramerium odoratissimum* G.).
- Xylocarpus** Schreb., Kön. (Hesperideen Meliaceen, VIII. 1) „Holzfrucht“-Mannabaum (*ξύλον* Holz, *καρπός* Frucht — holzige Kapsel), *X. Granatum* Kön. „Grenadillenholz“ (*Granatum litoræum* Rumph.).
- Xylomelon (-um)** Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Holzapfel“ (s. v., *μῆλον* lat. *mālum* Apfel — d. holz. Frucht verkehrt birnförmig), z. B. *piriforme* Sm. (B. Neuholl.), s. *Hakea* Pers. u. *Banksia* G. *pirif.* (*Conchium* *pyrifforme* W.).
- Xylon** T., Mch. (Malvaceen, XVI. 8) Baumwollenstaude, fr. u. e. *xylon* (*ξύλον* Holz u. Baumwolle), s. *Gossypium* L.
- Xylophylla** L. (Euphorbiaceen, V. 3) „Holzblatt“ (s. v., *φύλλον* Laub — blattart. verbreit. Holzweigmasse), *X. arbuscula* W., s. *Phyllanthus speciosus* s. *latifolius* autt.
- Xylopia** L. (Annonaceen, XIII. 6) Bitterholz (*Xylopicron* Pluk.) (st.

- ξυλόπιζρον abgekürzt. Paxton, πικρὸς bitter — sehr bitt. Holz), X. glabra L. u. muricata L.
- Xylopleurum** Spach (zu Oenothēra L.) (Onagrarien, VIII. 1) „Holzrippe“, Prachtnachtkerze (s. v., πλευρον Rippe — achtrippige holzige Kapsel), Zier. X. Nuttallii Spach, s. Oenoth. speciosa Nutt.
- Xylostēon** Ad. (-stēum T., Mnch.) (sc. Lonicēra L.) (Lonicereen, V. 1) Heckenkirsche, Ahl-, Hunds-, Zaunkirsche, „Beinholz“ Vilm. (ξύλον u. ἰστίον Knochen — Holz knochenhart), fr. camérisier (lat. Chamaecerāsus), chèvre des buissons od. des haies, e. fly-honey-suckle, bony-wooded-h.-s., s. Lonicēra vulgaris Roehl. s. dumetorum Mnch. (Chamaecerāsus Xylostēon Med.), Zier. X. cordatum Mnch. (Lonic. tatarīca Lam., Chamaec. tat. Med.), ciliatum Pursh, pyrenaicum T., canadense Duham. (Lonic. coerulēa L.) etc.
- Xyris** L. (Commelyneen Xyrideen, III. 1) „Scheer“- od. Scharfblatt, Degenkraut D., Stinkschwertel Wolff, fr. u. e. xyris (v. ξυρὸς od. -ον Scheermesser — scharfe, schwert-fadenf. Blätter), X. brasiliensis Hort. (Abildgaardia monostachya Vahl, Cyperus m. L.). — Xyridēae Kth.
- Xysmalobium** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Staubhülse“, Schabsel- (v. ξίσμα Geschabtes, Mulm u. λόβιον Hülse — d. Frucht mit grob. Staub bestreut), X. grandiflorum R. Br. etc. (Cap), s. Asclepias.
- Yucca** L. (Liliaceen, VI. 1) Palmlilie, Bajonettblume Leun., Schilf-Aloe, Brotwurz etc., e. Adam's-needle (vaterl. Name d. Pfl.), Zier. Y. aloifolia L. m. v. variegata Hort., gloriosa L. (Faserpfl. Südind.'s), recurvata Haw. (recurvifolia Salisb.), pendula Carr. (reflexa Hort.), filamentosa L. (concava Hort.) s. g. Seidegras, e. silk-grass, fiaccida Carr. (glaucescens Haw.) etc.
- Yulan** Desf. (sc. Magnolia) (Magnolieen, XIII. 6) schönste od. Lilien-Magnolie (chines. Name yu-lan „Lilie“), s. Magnolia conspicua Salisb. (Gwillimia Yulan Rottl.).
- Zabala** umbraculifera Hort. (Palmen, VI. 1) Schirm- od. Zwerg-P. (vaterl. sabal), s. Corypha minor Lam. (Rhapis acaulis W. etc.) u. Sabal Ad.
- Zacintha** (bess. -ynthia) T. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Zakyntos-Rainkohl (v. Ζάκυνθος Insel Zante, eine d. jonisch. Inseln), Z. verrucosa G. Warzenkraut Wolff, s. Lapsana Zac. L.
- Zamia** L. (Cycadeen, XXII. 12) Zapfenfarn, -palme, Keulen- D. (v. ζαμία Schaden, Plin. nennt so gewisse Tannenzapfen, die auf d. Baum selbst verderben, Wtst.), z. B. cycadifolia Jacq., Z. furfuracea Ait. (Palmifolia Ehret.) etc., s. Zaluzania u. Bertiera.
- Zannichellia** L. (Fluvialen od. Potamogeen, XXI. 1) Fadenblatt, Flutstengel, Halde O. W. (n. Hieron. Zannichelli, Apoth. zu Venedig, † 1729).
- Zantedeschia** Spr. (Aroideen, XX. 9) s. g. Calla (n. d. ital. Bot. Franc. Zantedeschi, schr. üb. Pfl. um Brescia etc., 1824), Zierpfl. Z. aethiopica Spr. = Richardia Kth. s. Calla aeth. L.
- Zanthorrhiza** s. Xanth.-; **Zanthoxylon** s. Xanth.-
- Zappania** Scop. (Verbeneen, XIV. 2) „Zappa“-Verbene (n. d. ital. Bot. P. A. Zappa, Vorst. d. bot. Gartens z. Pavia), Z. mexicana Lam. (Priva m. Pers., Blairia m. G.) etc., s. Lippia u. Verbena.
- Zasmidium** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Krepelwollen“-P. (v. ζάσμα od. ζάσμα Krepelwolle, είδομαι gleiche).
- Zauschneria** Presl (Onagrarien, VIII. 1) „Zauschner's“ Nachtkerze (n. d. Prof. Zauschner in Prag, † 1799), Z. californica Presl.

- Zěa** L. (Gramineen Olyreen, XXI. 3) Mays od. Welschkorn (gr. ζέα od. ζέα ein Getreide), Z. Mays L., fr. maïs, millet gros, e. maize, indian u. turkey-corn, Zier. v. fol. vittatis Hort. „Bandmays“, fr. m. à feuilles rubanées, e. striped-leaved Japan Maize.
- Zedoaria** (sc. Curcūma) Rosc. (Scitamineen, I. 1) Zittwer-Curcume, fr. zédoaire (v. d. arab. djetuar), Z. officinalis u. rotunda Offiz., s. Curcuma aromatica Salisb.
- Zenobia** D. Don (Ericaceen, X. 1) Zenobia-Torfheide, s. g. Gränke Grck. (Ζηνοβία Königin v. Palmyra, in Fesseln beim Triumphinzug in Rom, wie Andromeda in Fesseln lag), Z. speciosa Don, s. Andromeda cassinaefolia Vent. s. speciosa Mchx.
- Zeocrithon** (nicht -ton) P.-B. (sc. Horděum) L. (Getreide, III. 2) Bartod. Reisgerste, fr. rizon d'Allemagne, e. sprat-barley (v. ζέα Getreide u. ζουθή Gerste), Z. commune P.-B. u. secalinum P.-B. (Hordeum capense s. pratense autt.).
- Zephyra** D. Don (Liliaceen, VI. 1) Zephyrllilie (ζέφυρος Westwind — schön azubl. duft. Bl.), Z. elegans Don.
- Zephyranthes** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Zephyrblume“ (s. eb. u. ζουθή — schöne, duft. Bl.), z. B. grandiflora Ldl. etc.
- Zerumbet** autt. (Cannaceen, I. 1) wild. od. Block-Ingwer (vaterl.), Z. specios., s. Amomum Zer. L., s. Renealmia nutans R. Br.
- Zeugites** Schreb. (sc. Aplūda) L. (Gräser, XXI. 3 od. XXIII. 1) „Ehe“ od. Zwittergras (ζεγγίτης angejocht — jed. Ährchen 1 sitz. ☉ u. ☽ gestielte ♂ Blüten!), Z. americana Schr.
- Zichya** v. Hüg. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) „Zichy's“-Bohne (n. d. österr. Gräfin Molly Zichy, Liebh. d. Bot.), z. B. tricolor u. villosa Ldl. etc., s. Kennedyya.
- Zieria** Sm. (Rutac. Diosmeen, IV. 2) „Zier'sstr.“ (n. d. poln. Bot. J. Zier, schr. mit Dickson Cryptogamia etc.), z. B. Smithii Andr. s. lanceol. R. Br., etc., s. Boronia Sm.
- Zilla** Forsk. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) „Zille“ (arab. Name), z. B. myagroides Forsk., s. Bunias aegyptiaca s. spinosa L. (Myagrūm spin. Lam. etc.). — Zillēae Rchb.
- Zingiber** G. (Scitamineen, I. 1) „Ingwer“, fr. gingembre, e. ginger (ind. gingi, Wurz v. Zindschi, westl. v. Pondichery), Z. officinale Rosc. — Zingiberacēae DC.
- Zinnia** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Zinnie“ (n. d. Prof. J. G. Zinn in Göttingen), Zier. Z. elegans Jacq. m. v. v. (z. B. nana fl. pl. etc.), Haageana Reg. (aurēa Hort.) m. v. v., s. Sanvitalia mexic. Hort., Z. multiflora L. (hybrida Sims.) m. v. v. etc.
- Zizania** L. (-jum G. Fr.) (Maisgräser, XXI. 6) Wasserreis, -kappengras D. (gr. ζιζάνιον i. q. Lolium Lolch), Z. aquatica L., fr. risave, s. Hydropyrum esculentum Lk.
- Ziziphora** L. (Labiaten, II. 1 od. XIV. 1) „Zizikraut“ D., „Flusssträgerin“ (zizi d. Indier, gr. ζιζύβος od. ζιζύβα Vliess, φορός tragend), z. B. capitata L. (Clinopodium fistulosum Pluk.).
- Zizyphus** T., L. (Rhamnaceen, V. 1) Jubenbaum, Judendorn, Brustbeerstr. Rmpl. (phöniz. zizuf, gr. ζιζύβον lat. jujuba), Z. Jujuba W. Dornkirsche, fr. pommier d'Inde, Z. spina Christi W. (Oenoplia spinosa Bauh.) etc., s. Rhamnus Ziz. L. (Jujuba aculeata Burm.).
- Zoophthalmum** P. Br., DC. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) Tierauge (ζωον Tier, ὀφθαλμὸς Auge etc. — kreisr. Samen m. linear. Nabel umgürt.), Z. urens DC. (Dolichos. s. Strizolobium ur. Adans.).
- Zostěra** L. (Potamoogen, XX. 9) „Wasserriemen“, Wier. O. W., fr. atomère (v. ζωστῆρος, -ήρος Gürtel — Form d. Blätter), Z. marina u. oceanica L. s. g. Seegräs, fr. foin de mer, e. ore-weed, slank etc., s. Kerněra ocean. W. u. Phycagrostis major Caulini autt. „Tanggras“.

- Zozimia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Zozima's“-Dolde (n. d. Gebrüdr. Zozima, Herausg. gr. Classiker), *Z. orient.* H. s. *absinthifolia* DC.
- 1) **Zuccagnia** Thb., Röd. (Liliaceen, VI. 1) Zipfelblatt-Lilie (n. d. ital. Bot. Att. Zuccagni in Florenz), *Z. viridis* Thb., s. *Uropetalon vir.* Ker (Lachenalia v. Thb. etc.). 2) **Zucc.** Pers. (Cäsalpinieen, X. 1).
- Zuccarinia** Blum., Spr. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1), z. B. *macrophylla* Blum., ornata Spr. (*Jackia* orn. Wall.) (B. Malacc.) (s. d. Aut.).
- 1) **Zygia** P. Br., Juss. (Mimoseen, XXIII. 1) „Joch“-Mimose (*ζυγὸν* Joch — verwachs. Staubgef. etc.), s. *Inga marginata* W. 2) **Zygia** G. Fr. (i. q. Acer — jochart. Flügelfrüchte).
- 1) **Zygödon** Hiern (g. n.) (Rubiaceen, V. 1) „Jochzahn“, Doppelzahn. 2) **Zygod.** Hook. (Moose) Paarzahn-M. (s. eb. u. *ῥόδων* Z.).
- Zygopetalum** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Jochkronblatt“ (s. v., *πέταλον* — Perigonbl. u. Fuss d. Columna verw.), z. B. *crinitum* Lodd. (Mackai Hook., Südam.), s. *Odontoglossum* u. *Eulophia* R. Br.
- Zygophyllum** L. (Sapindac. od. Rutaceen, X. 1) „Jochblatt“, Bohnenkapper D., z. B. *Z. Fabago* L. (*Capparis* Fab. Dod.), *coccinëum* L. s. *desertorum* Forsk. etc. (*φύλλον* Laub — d. Blätter jochart. gegenüber).

Übersicht der nicht näher ausgeführten Synonyme des Buches.

- | | |
|--|---|
| Aberemoa Aubl. s. <i>Cananga</i> Rumph. u. <i>Uvaria</i> L. | Aeschynomëne DC. s. <i>Daubentonia</i> DC. |
| Acanthospöra Spr. s. <i>Gunnera</i> manic. L. | Aeschynomëne Cav. s. <i>Piscidia</i> L. |
| Acaricida W. s. <i>Vernonia</i> Schreb. | Aethionia D. Don s. <i>Schmidtia</i> Mnch. |
| Aceranthus Morr. s. <i>Epimedium</i> L. | Akeesia Tuss. s. <i>Blighia</i> Kön. |
| Acia Schreb. (<i>Acioa</i> Aubl.) s. <i>Dulacia</i> Neck. | Alibertia Rich. s. <i>Genipella</i> Rich. |
| Acia W. s. <i>Couepia</i> Aubl. | Alicastrum P. Br. s. <i>Brosimum</i> Schreb. |
| Acianthëra Scheidw. s. <i>Centranthëra</i> Scheidw. | Alismorehis A. Rich. s. <i>Centrosia</i> Rich. |
| Aerodryon Spr. s. <i>Cephalanthus</i> L. | Alphitomorpha Wallr. s. <i>Erysibe</i> Rehent. |
| Actinella Pursh s. <i>Helenium</i> lanatum Spr. | Amica nocturna Rumph. s. <i>Polianthes</i> L. |
| Actinodaphne Nees s. <i>Litsaea</i> Lam. | Ammannia L. s. <i>Cornelia</i> vertic. Andr. u. <i>Ludwigia</i> L. |
| Actinophyllum R. S. s. <i>Sciadophyllum</i> P. Br. | Ambora Juss. s. <i>Mithridatea</i> Comm. |
| Aculeosa Pluk. s. <i>Roëlla</i> L. | Ambora St. Vinc. s. <i>Monimia</i> P.-Thou. |
| Adhatoda Herm. s. <i>Justicia</i> Adh. L. | Ambulia Lam. s. <i>Lindernia</i> All. |
| Adamsia W. s. <i>Puschkinia</i> Adams | Amphinomia DC. s. <i>Connarus</i> L. |
| Adamsia Fisch. s. <i>Gëum</i> L. | Anadophyllum Catesb. s. <i>Podophyllum</i> L. |
| Adenötus Lour. s. <i>Elaeocarpus</i> L. | Anchietea St. Hil. s. <i>Noisetia</i> H. B. K. |
| Adyseton (-um) Adans. s. <i>Koniga</i> R. Br. | Andrachne L. s. <i>Cluytia</i> Ait. |
| Aegicëras G. s. <i>Rhizophöra</i> L. | Angioptëris Hoffm. s. <i>Clementëa</i> DC. |
| Aegiphila W. s. <i>Knoxia</i> L. | Angostura R. S. s. <i>Galipëa</i> Aubl. |
| Aegoceratos Raj. s. <i>Hugonia</i> L. | Anguillaria R. Br. s. <i>Pleea</i> Rich. |
| Aegopögon Hb. s. <i>Chrysürus</i> P.-B. | Angularia R. Br. s. <i>Melanthium</i> L. |
| Aerua (-va) Juss. s. <i>Iresine</i> Spr. | |

- Anisophyllum** Forsk. s. *Boerhavia* Vahl
Anneslea Andr. s. *Euryale* Salisb.
Anogeissus Wall. s. *Leiocarpus* DC.
Anonis Mart. s. *Podaliria* Dietr.
Anonyma Mer. s. *Costus arab.* L.
Anonymus Walt. s. *Liättris odorat.* W.
Anonymus Pluk. s. *Spermacoce* L.
Anredëra Juss. s. *Basella* L.
Antirrhoea Gm. s. *Cunninghamia* Schreb.
Antrophÿum Kaulf. s. *Hemionitis* L.
Apama Lam. s. *Bragantia* Pers.
Aplopappus DC. s. *Leucopsis* DC.
Aquilicia Cav. s. *Leea* Blum.
Argolasia Pursh s. *Conostylis* Pursh
Argolasia Juss. s. *Lanaria* Ait.
Arthrostemma Pav. s. *Monochaetum* DC.
Asaphes Spr. s. *Morina* L.
Asjogam Rheed. s. *Jonesia* Roxb.
Asperella Hb. s. *Elÿmus* L.
Asteriscus Mnch. s. *Nauplius* Cass.
Astrolöma R. Br. s. *Ventenatia* Cav.
Aströpus Spr. s. *Waltheria* L.
Atrodactÿlis Forst. s. *Pandänus* L. f.
Aubletia G. s. *Mangium* Rumph.
Avicennia L. s. *Mangle* Sloan.
Azorella Cav. s. *Bolax* Comm.
- Bactyrilobium** W. s. *Cassia* L.
Bacckea L. s. *Cedrëla* Lour.
Balbisia W. s. *Tridax* L.
Balsamëa Gled. s. *Opobalsänum* L.
Banara Aubl. s. *Boca* Fl. Flum.
Banava Camell. s. *Münchhausia* L.
Bandura Burm. s. *Nepenthes* L.
Bardäna Fenzl. s. *Cucurbita dipsacëa* Ehrbg.
Barnadesia L. f. s. *Diacantha* Lag
Batis Jacq. s. *Bucephälon* Plum.
Baumgartenia Spr. s. *Borya* R. Br.
Benthamidia Spach s. *Cornus* L.
Bergëra L. s. *Murraea* L.
Bergëra L. f. s. *Papaya* T.
Berkheya W. s. *Cullumia* R. Br.
Bertiera aut. s. *Zamia* L.
Biglandularia Seem. s. *Rosanowia* Reg.
Blackwellia Comm. s. *Homalium* Jacq.
Bombonaxa s. *Carlodovica* Rz. Pv.
Bonduccella L. s. *Bonduc* Plum.
Bon-hopas Ostind. s. *Mithridatea* tox. Dietr.
Borbonia autt. s. *Liparia* L.
Brasenia Pursh s. *Hydropeltis* Mchx.
- Buceaferrea** Mich. s. *Ruppia* L.
Bunchosia DC. s. *Malpighia* L.
Buphäne Herb. s. *Brunswigia* Heist.
Bupleurifolia Pluk. s. *Corymbium* L.
Burtonia R. Br. s. *Gompholobium* Sm.
Byrsonima DC. s. *Malpighia* L.
- Cahuchu** W. s. *Castillöa* Cerv.
Calamaria Dill. s. *Isoetes* L.
Calomeria Vent. s. *Humea* Sm.
Calorophus autt. s. *Restio* L.
Calydermos Rz. Pv. s. *Nicandra* Ad.
Camptospermum Spr. s. *Fusisporium* Lk.
Candalia aut. s. *Coccocypselus* P. Br.
Canthium Lamb. s. *Plocäma* Ait.
Capimoga Aubl. s. *Homalium* Jacq.
Carpopögon Roxb. s. *Mucuna* Aubl.
Cartesia Cav. s. *Stokesia* P'Her.
Cassipourea Aubl. s. *Legnötis* Sw.
Castanea peruv. Clus. s. *Rhizobölus* G.
Castorëa Plum. s. *Duranta* L.
Catesbaea Lam. s. *Scolosanthus* Vahl
Cavemyce Ach. s. *Baeomyce* Pers.
Centella L. s. *Hydrocotÿle* L.
Cephaloceräsus Pfeiff. s. *Pilocerëus* Lem.
Ceratosperrum Pers. s. *Diötis* Schreb.
Chaenanthëra Rich. s. *Charianthus* Don
Chaixia Lap. s. *Ramondia* Rich.
Chalcas Lour. s. *Murraya* L.
Chamaejasme Pluk. s. *Houstounia* L.
Chamaelëdon Lk. s. *Loiseleuria* Desv.
Chamaerëpes Spr. s. *Chamorchis* Rich.
Chamaerrhododendron Duham. s. *Rhodora* L.
Chamaerrhödos Don s. *Sibbaldia* L.
Chamira Thb. s. *Heliophila* L. f.
Chimatobia Mey. s. *Monëses* Salisb.
Chondrodendron R. P. s. *Menispermum* L.
Chorisma Lindl. s. *Jenkinsonia* Sweet
Chorispora DC. s. *Diptychocarpus* Reg.
Chrysangia Lk. s. *Musschia* Don.
Chuquiraga Juss. s. *Johannia* W.
Chymocarpus D. Don s. *Tropaeölum* L.

- Cichlanthus** Blum. s. *Dendrophthöë* Blum.
Cipadessa Blum. s. *Lansium* Rumph.
Cipura Aubl. s. *Marica* Schreb.
Coa scandens Plum. s. *Hippocratea* L.
Cochliopetalum Bew. s. *Pitcairnea* l'Hér.
Codium Ag. s. *Lamarckia* Olivier
Cola Baub. s. *Sterculia* L.
Collomioides DC. s. *Hügelia* Benth.
Colobium Roth s. *Thrinicia* Roth
Colyris Vahl s. *Dischidia* R. Br.
Conchium Sm. s. *Hackea* Wendl.
Conchium W. s. *Xylomelon* Sm.
Coniandra Schrad. s. *Rhynchocharpa* Schrad.
Conobea Spr. s. *Collinsia* Nutt.
Coutoupita Aubl. s. *Lecythis* W.
Crantzia Lag. s. *Moricandia* DC.
Critonia P. Br. s. *Kuhnia* L. f.
Cryphiospermum P.-B. s. *Caesulia* Roxb.
Cryptospermum Pers. s. *Opercularia* Rich.
Cryptostömum W. s. *Moutabëa* Aubl.
Ctenium Spr. s. *Chloris* Sw.
Cucifera Pers. s. *Hyphaena* G.
Cucurbitifera Pluk. s. *Marmelos* L.
Cusparia St. Hil. s. *Galipëa* Aubl.
Cybelion Spr. s. *Jonopsis* Hb. Kth.
Cyclophorus Desv. s. *Niphobölus* Kaulf.
Cymbachne W. s. *Rottboella* L.
Cynorrhinchium Pluk. s. *Penstemon* Ait.

Daltonia Spr. s. *Neckëra* Hedw.
Damaïs Balf. f. s. *Paederia* L.
Debraea R. S. s. *Ditmaria* Spr.
Decadiantha Rchb. s. *Hügelia* R. Br.
Declieuxia Schldl. s. *Knoxia* L.
Delilia Spr. s. *Milleria* L.
Dens leonis Pluk. s. *Hyosëris* L.
Desvauxia R. Br. s. *Centrolëpis* Lab.
Diascia DC. s. *Hemimëris* L.
Diastella Salisb. s. *Leucospermum* R. Br.
Dichelostemma Sm. s. *Brodiaea* Sm.
Dieliptëra Juss. s. *Hygrophila* R. Br.
Diconangia Mitch. s. *Itëa* L.
Didymocarpus W. s. *Streptocarpus* Lindl. u. *Klugia* Endl.
Diphyes Blum. s. *Bolbophyllum* P.-Thou.

Douma Duham. s. *Hyphaena* G.
Dracaenopsis DC. s. *Dracaena australis* autt.
Dracophyllum Lab. s. *Epacris* Forst.
Drakena Clus. s. *Dorstenia* L.
Drepania Juss. s. *Tolpis* G.
Dryobalanus G. f. s. *Dryobalanops* G. f.
Duabanga Kurz s. *Lagerstroemia* L.
Dufourëa Sommerf. s. *Sphaerocephalon* Pers.

Eceoptosperma Vauch. s. *Vaucheria* DC.
Echinoïdes Riv. s. *Lycopsis* L.
Echinolÿtrum Desv. s. *Dichostylis* P.-B.
Edechia Löfl. s. *Laugieria* Spr.
Elaeodendron DC. s. *Crocoxylon* Eckl.
Elÿna Schrad. s. *Kobresia* W.
Embela Retz. s. *Salvadöra* L.
Enargea Schreb. s. *Callixëne* Juss.
Encelia Kth. s. *Pallasia* Ait.
Endoptëra DC. s. *Nemauchenus* Cass.
Engelmannia Pfeiff. s. *Cuscutina* Pfeiff.
Enneapogon Desv. s. *Pappophorum* Schreb.
Erigonum Mchx. s. *Chrysosplenium* Walt.
Erisma Rudg. s. *Ditmaria* Spr.
Erythrobulbus Pluk. s. *Wachendorfia* L.
Erythrodanum P.-Thou. s. *Nertëra* Soland.
Erythropäalum Blum. s. *Mackaya* Arn.
Esenbeckia St. Hil. s. *Evodia* Forst.
Euchroma Nutt. s. *Castilleja* Mut.
Eulophia R. Br. s. *Zygopetalum* Hook.
Eumorpha DC. s. *Calliopsis* Sweet
Euphoria DC. s. *Nephelium* L.
Evosmia Hb. Bpl. s. *Euosma* W.

Fagotriticum Act. Stockh. s. *Fagopyrum* T.
Favonium G. s. *Didelta* l'Hér.
Fëa Bory s. *Trichomanes* L.
Fernandezia Lodd. s. *Lockhartia* Hook.
Fernandezia Rz. Pv. s. *Dichaea* Lindl.

- Fernelia** Comm. s. *Coccoeypselum* P. Br.
Fisakaki Kämpf. s. *Eurya* Thb.
Fischeria G. Don s. *Codonopsis* Wall.
Fissilia Lam. s. *Olax* L.
Fissurina Fée s. *Graphis* Ach.
Flabellaria Cav. s. *Hiraea* Jacq.
Flaveria Juss. s. *Milleria* *Contra-
yerva* L.
Flaveria Lag. s. *Nauenburgia* W.
Flemingia Roxb. s. *Millingtonia* Ham.
Floerkia Nutt. s. *Nectris* Pursh
Flotovia Spr. s. *Johannia* W.
Forgesia Juss. s. *Desforgesia* Lam.
Fortunaea Lindl. s. *Platycahya* Sieb. u. Zucc.
Franoeuria DC. s. *Duchesnia* Cass.
Franklinia Marshal s. *Gordonia* Ellis
Franseria Cav. s. *Xanthium* L.
Fugosa Juss. s. *Cienfuegosia* Cav.
- Gabertia** Gaud. s. *Grammatophyl-
lum* Blum.
Galedupa Lam. s. *Milletia* Wight u. Arn.
Garciana Dietr. s. *Philydrum* Banks
Garuga Roxb. s. *Kunthia* Dennst.
Gastrochilus Don s. *Sarcochilus* R. Br.
Gaya Spr. s. *Lasiopetalum* Sm.
Geissorhiza R. Br. s. *Lapeyrousia* Gawl.
Gerardia L. s. *Rehmannia* Bung.
Germanea Poir. s. *Calceolus* Benth.
Geryonia Schrk. s. *Bergenia* Mneh.
Glaucena Burm. s. *Murraya* L.
Glechon Spr. s. *Glecoma* L.
Globba Spr. s. *Hura* Kön.
Glyce Spr. s. *Koniga* R. Br.
Glycosmis Corr. (-*osmida* Spr.) s. *Cookia* Sonner.
Gomphia DC. s. *Correa* Sm.
Gomutus Rumph. s. *Sagus* ds.
Gouania DC. s. *Retinaria* G.
Grindelia W. s. *Donia* Hook.
Griselinia Forst. s. *Scopolia* ds.
Guatera Marcgr. s. *Icaco* Plum.
Guanabanus Plum. s. *Canangha* Rumph.
Guapurium Spr. s. *Klaprothia* H. B. K.
Guarea L. s. *Eluteria* P. Br.
Guarea Spr. s. *Epicharis* Blum.
- Guepinia** Desv. s. *Teesdalea* R. Br.
Gunthera Reg. s. *Gutierrezia* Lag.
Gymnosporangium Oerst. s. *Roestelia* Lk.
Gymnostömum Hedw. s. *Schistostega* Web. u. M.
- Hallia** Thb. s. *Hedysarum* Thb. u. *Crotalaria* L.
Hamelia Jacq. s. *Duhamelia* Pers.
Harrachia Jacq. s. *Crossandra* Sm.
Hartmannia Spach s. *Oenothera* L.
Hartogia L. s. *Bucco* Wendl. u. *Eriostemon* Sm.
Hedwigia Sw. s. *Knorria* Moç. Sess.
Heleochlóa Host. s. *Crypsis* Ait.
Helicia Lour. s. *Rhopala* G.
Hemizonia Gray s. *Hartmannia* DC.
Heridium Pers. s. *Hystrix* Spr.
Hermiöne Haw. s. *Narcissus* L.
Herpestes Pursh s. *Monnieria* Pers.
Heterandra Sm. s. *Boronia* Sm.
Higginsia (O'Higg.-) R. P. s. *Euosma* W.
Hipposëris Cass. s. *Centroclinium* Endl.
Hoitzia Spr. s. *Loeselia* L. u. *Can-
tua* Juss.
Holmskioldia Retz. s. *Hastingia* Sm.
Holoregmia Nees s. *Martynia* L.
Homoplitis Trin. s. *Pollinia* L.
Hoodia Sweet s. *Scytanthus* Hook.
Hookeria Kth. s. *Brodiaea* Sm.
Hoplismenus P.-B. s. *Oplismenus* Kth.
Hornemannia W. s. *Vandellia* L.
Huttia aut. s. *Calectasia* R. Br.
Hydnocarpus Vahl s. *Vareca* Roxb.
Hydrocarya Spr. s. *Hedycarya* L.
Hydrogeton Pers. s. *Ouvirandra* P.-
Thou.
Hymenospöron Spr. s. *Dioclea* Kth.
Hymenothecium Lag. s. *Chrysurus* P.-B.
Hypaelyptum Vahl s. *Hypoelytrum* Rich.
Hypoëstes Hook. s. *Eranthemum* R. Br.
- Jacapucaya** Marcgr. s. *Lecythis* Ollaria L.
Jaumea Pers. s. *Kuhnia* L. f.
Ipomeria Nutt. s. *Ipomopsis* Rich. u. *Gilia* R. u. P.

- Ipo-toxicaria** Pers. s. *Mithridatëa* Dietr.
Iroucana Aubl. s. *Casearia* Jacq.
Isocarpa R. Br. s. *Calea* ds.
Ivira Aubl. s. *Sterculia* L.
Ixina L. s. *Krameria* Löfl.

Kosaria Forsk. s. *Dorstenia* L.
Krigia Schreb. s. *Hyosëris* L.

Labillardiera R. u. S. s. *Billardiera* Sm.
Lablavia Adans. s. *Lablab* Savi
Lagascëa W. s. *Noccea* Cass.
Lasthenia Hort. s. *Monolopia* DC.
Lauremburgia Berg. s. *Serpicula* L.
Lechea L. s. *Gaura* Lam.
Legonidium Rumph. s. *Vitex* Negundo L.
Legousia Dur. s. *Prismatocarpus* l'Hér.
Leptanthus Mchx. s. *Pontedëra* L. u. *Schollëra* W.
Leptocödon G. Don s. *Codonopsis* Wall.
Leptoglossis Benth. s. *Nierembergia* R. u. P.
Leptostegia Don s. *Onychium* Kaulf.
Leptostemma Blum. s. *Dischidia* R. Br.
Lessertia DC. s. *Colutea* L.
Lidbeckia Berg. s. *Cotula* L.
Lindelofia Lehm. s. *Omphalödes* T.
Linkia Pers. s. *Desfontainea* R. u. P.
Linnophila R. Br. s. *Hottonia* L.
Linociera R. Br. s. *Chionanthus* L.
Liriöpe Lour. s. *Ophiopögon* Curt. u. *Sansevieria* Thb.
Lithagrostis G. s. *Coix* L.
Lobularia Hoffm. s. *Pulmonaria* ds.
Loxidium Vent. s. *Swaintonia* Salisb.
Loxonia Jack s. *Klugia* A. Juss.
Ludwigiaria DC. s. *Ludwigia* L.
Luschia Don s. *Cleyëra* Thb.
Lydaea Mol. s. *Kageneckia* R. u. P.
Lygistum L. s. *Petesia* L.

Macrostëma Pers. s. *Calboa* Van Houtt.
Mahuria Aubl. s. *Bonnetia* Schreb.
Malanea Lam. s. *Cunninghamia* Schreb.
Mallingtonia W. s. *Millingtonia* Roxb.

Manglietia Burm. s. *Michelia* L.
Manulea L. s. *Cheiranthus* L.
Marcetia DC. s. *Rhexia* L.
Martia Spr. s. *Udora* Nutt.
Matourea Aubl. s. *Vandellia* L.
Mauria Kth. s. *Cambessedea* W.
Mayëpe Aubl. s. *Chionanthus* L.
Megastachya R. u. S. s. *Sclerochlöa* P.-B.
Melichrus R. Br. s. *Ventenatia* Cav.
Meliosma Blum. s. *Millingtonia* Roxb.
Melistaureum Forst. s. *Samyda* L.
Mentzelia L. s. *Microsperma* Hook.
Mesosphærum P. Br. s. *Bystropögon* l'Hér.
Messerschmidia L. s. *Tournefortia* L.
Meteorina Cass. s. *Calendula* L.
Metnam Forsk. s. *Passerina* L.
Meyëra Spr. s. *Caesulia* Roxb.
Micadamia R. Br. s. *Butyrospermum* DC.
Micrelium Forst. s. *Eclipta* L.
Micrococcus Cohn s. *Monas* Ehrbg.
Microcos G. s. *Grewia* L.
Micropyrum Gaud. s. *Nardurus* Rehb.
Microtea Sw. s. *Schollera* Rohr.
Miegia Pers. s. *Ludolfia* W.
Milnaea Roxb. s. *Lansium* Blum.
Mindium Juss. s. *Michauxia* l'Hér.
Misandra Comm. s. *Gunnera* L. u. *Bonapartea* R. u. P.
Mnasion W. s. *Rapatea* Aubl.
Mocanëra L. f. s. *Visnea* Schreb.
Mocinna Lag. s. *Galinsoga* R. u. P.
Modira canni Rheed. s. *Hugonia* L.
Momisia Dietr. s. *Celtis* T.
Monbretia Bak. s. *Houttuynia* Thb.
Monerma P.-B. s. *Lepturus* R. Br. u. *Nardus* Lob.
Monetia Spr. s. *Camphorosma* L. f.
Monnina Spr. s. *Jackia* Blum.
Monopsis Salisb. s. *Holostigma* Spach
Monotöca R. Br. s. *Styphelia* Sm.
Moquilea Mart. s. *Dulacia* Neck.
Moschifëra Mol. s. *Moscharia* R. u. P.
Mosigia Spr. s. *Moscharia* R. u. P.
Mourera Aubl. s. *Lacis* Schreb.
Mühlenbergia Schreb. s. *Dilepörum* Mchx.
Mutella aut. s. *Drummondia* DC.
Myconia Lap. s. *Ramondia* Rich.
Myxotrichum Kze. s. *Oncidium* Fr.

- Nacibea* Aubl. s. *Manettia* L.
Nama Don s. *Hydrolea* Vahl.
Nasmythia Huds. s. *Eriocaulon* L.
Natia Adans. s. *Cenchrus* L.
Nematostigma A. Dietr. s. *Libertia* Spr.
Nephrosperma Balf. f. s. *Oncosperma* Blum.
Neuroplatyceros Presl s. *Platyce-rium* Desv.
Nigrina Thb. s. *Chloranthus* Sm.
Nivenia Bak. s. *Witsenia* L.
Norna Wahlbg. s. *Calypso* Salisb.
Nothoscorodum Kth. s. *Millea* Cav.
Nothria Berg. s. *Frankenia* L.
Nugaria DC. s. *Nuga* L.
Nux americana Comm. s. *Melicocca* Juss.
Nymphanthus Lour. s. *Phyllanthus* L.
- Obanna* Kämpf. s. *Erianthus* P.-B.
Ochrosia Burm. s. *Cerbera* L.
Ocotea Kth. s. *Nectandra* Berg.
Odonia Bertol. s. *Collaea* DC.
O'Higginsia R. u. P. s. *Euosma* W.
Okëa aut. s. *Eriostemon* Pers.
Omphalostigma Griseb. s. *Petasostylis* Lindl.
Omphelandria P. Br. s. *Omphalea* L.
Opoidea Lindl. s. *Galbanum* Don
Ormocarpum P. Br. s. *Müllera* L. f.
Ornithopodium Bauh. s. *Ornithopus* L.
Orthopogon R. Br. s. *Oplismenus* Kth.
Orthoscëlis Spach s. *Heliophila* Lam.
Ortiga Feuill. s. *Loasa* Adans.
Oscillatoria Vauch. s. *Oscillaria* Bosc
Osterdikia Burm. s. *Cunonia* R. Br.
Oudemansia T. u. B. s. *Helictères* Krz.
Ontea Aubl. s. *Macrobium* L.
Oxyria Cambd. s. *Donia* R. Br.
- Pachyne* Salisb. s. *Phajus* Lour.
Palovia Aubl. s. *Dimorpha* Sm.
Panicastrella Mchx. s. *Cenchrus* L.
Panke Mol. s. *Gunnëra* R. u. P.
Papia Mnch. s. *Orvala* DC.
Papularia Forsk. s. *Trianthema* L.
Parivoa Aubl. s. *Dimorpha* Sm.
Patma Blum. s. *Rafflesia* Arnold
- Pavonia* Cav., R. Br. s. *Goethëa* Mart. u. *Guazuma* L.
Pectis L. s. *Jacobaea* Plum.
Pedilea Lindl. s. *Dienia* Lindl.
Pekea Aubl. s. *Caryocar* L. u. *Rhizobölus* G.
Peltaria L. s. *Heliophila* L.
Pelvu Rheed. s. *Carreya* Roxb.
Pentaphylloides Pluk. s. *Sibbaldia* L.
Perigara Aubl. s. *Gustavia* L.
Periphragmos R. u. P. s. *Cantua* Juss.
Periströphe Nees s. *Justicia* Roxb.
Peroa Pers. s. *Leucopogon* R. Br.
Perpensum T. s. *Gunnëra* L.
Pfaffia Spr. s. *Iresine* Spr.
Pharmacëum L. f. s. *Loeflingia* L.
Phebalium Vent. s. *Eriostemon* Sm.
Phyllaurëa Lour. s. *Codiaeum* Rumph.
Phyllöma Haw. s. *Lomatophyllum* W.
Phrynium W., Roxb. s. *Maranta* L. u. *Thalia* L.
Phycagrostis autt. s. *Zostëra* L.
Pilosa autt. s. *Heliophila* L.
Pinastella Dill. s. *Hippuris* L.
Pineda R. u. P. s. *Homalium* Pers.
Piperodendron Heist. s. *Schinus* L.
Pitonia DC. s. *Quinquina* Condam.
Plaso Rheed. s. *Butea* Roxb.
Platëra Roxb. s. *Hoppëa* Roxb.
Platycentrum DC. s. *Davya* DC.
Platychilum Delaun. s. *Goodia* Salisb.
Plectanthëra Mart. s. *Luxembourgia* St. Hil.
Podothëca Cass. s. *Podosperma* Lab.
Poivrea DC. s. *Combrëtum* Lam.
Polemammia s. *Uropetälum* Ker.
Polyactidium DC. s. *Stenactis* Cass.
Pollichia Schreb. s. *Neckeria* Gm.
Polyparea Lour. s. *Houttuynia* Thb.
Polypëra aut. s. *Polysaccum* DC.
Polyphragmon Krz. s. *Helospöra* Jacks.
Polysiphonia Spr. s. *Ceramium* Lyngb. u. *Hutchinsia* Ag.
Polystachia Hook. s. *Cranichis* Sw.
Poppia Hort. s. *Luffa* T.
Porcellia R. u. P. s. *Orchidocarpus* Mchx.
Portulacaria Schreb. s. *Claytonia* L.
Posidonia Kön. s. *Kernëra* W.
Pothos Sims s. *Symplocarpus* Salisb.

- Pourretia** R. u. P. s. *Guzmania* R. u. P., *Puya* Mol. u. *Bromelia* L.
Prescottia Spr. s. *Microstylis* Nutt.
Procris Comm. s. *Boehmera* Lk. (-ia Jacq.).
Psilothonna E. Mey. s. *Gamolëpis* DC.
Psychotröphum P. Br. s. *Psychotria* L.
Psygnium Presl s. *Drynaria* Bory
Pterocephalus Spr. s. *Knautia* palæst. L. f.
Pteronia Röd. s. *Thalia* L.
Ptesia Sw. s. *Petesia* L.
Ptilomëris Hort. s. *Shortia* Hort.
Pultenaea Andr., Sm. s. *Ocyclobium* Andr. u. *Mirbelia* Sm.
Pultenia Andr. s. *Pultenaea*!
Purshia DC. s. *Kunzea* Spr.
Putoria Pers. s. *Ernodëa* Sm.
Pixidanthëra Mchx. s. *Diapensia* L.
- Quinaria** Lour. s. *Cookia* Sonner.
Quiva Cav. s. *Cupania* Plum.
- Raconbea** Aubl. s. *Homalium* Jacq.
Rafnia Thb. s. *Crotalaria* L.
Randalia Petiv. s. *Eriocaulon* L.
Randia Houst. s. *Gardenia* L. f.
Rapourea Aubl. s. *Camax* Schreb.
Raznmovia Spr. s. *Humëa* Sm.
Reboulia Kth. s. *Trisëtum* Pers.
Renealmia R. Br. s. *Zerumbet* autt.
Renggeria Meisn. s. *Schweiggera* Mart.
Resteria Rumph. s. *Commersonia* Forst.
Retanilla DC. s. *Molinaea* Comm.
Rhodëa Endl. s. *Orontium* L.
Rhytidophyllum Van Houtt. s. *Ophi-anthe* Hanst.
Robergia Schreb. s. *Cnestis* Jacq. u. *Connarus* DC.
Rodriguezia R. u. P. s. *Pleurothallis* R. Br.
Rocperia Spr. s. *Roëlla* L.
Rourea Aubl. s. *Cnestis* Jacq.
Rubioides Soland. s. *Opercularia* Rich.
Rubiöla T. s. *Crucianella* L.
Rumea Poit. s. *Bessëra* Schult.
Rumia Hoffm. s. *Cachrys* L.
Rumphia Pers. s. *Tamarindus* Spr.
- Saccochilus** Blum. s. *Saccolabium* ds.
Saguërus Roxb. s. *Sagus* Rumph.
Salmia W. s. *Carlodovica* R. u. P.
Samara L. s. *Memecylon* Burm.
Sampaca Rumph. s. *Liriodendron* Liliifëra L.
Sanamuuda Breyn. s. *Passerina* L.
Santia Savi s. *Polypögon* Desf.
Saouari Aubl. s. *Caryocar villosum* Pers.
Sapröma Brid. s. *Bruchia* Schwägr.
Seabrita (-tes) L. s. *Nyctanthes* L.
Scaevöla L. s. *Buglossum* Rumph.
Scalia Sims s. *Podolëpis* Lab.
Schizodium Lindl. s. *Disa* Berg.
Schmidelia L. s. *Ornitrophe* Comm.
Schoepfia W. s. *Codonium* Vahl
Schradëra aut. s. *Croton* L.
Schufia Spach s. *Fuchsia* Plum.
Sclerostylis Blum. s. *Glycosmis* Corr.
Scleroxylon W. s. *Sideroxylon* ds.
Securigëra DC. s. *Securidaca* Mill.
Securilla Pers. s. *Securidaca* Mill. u. *Bonaveria* Scop.
Sedoides Herm. s. *Crassula centauroid.* L.
Seguine autt. s. *Dieffenbachia* Schott.
Septas cap. L. s. *Crassula umb.* Jacq.
Sessëa R. u. P. s. *Cestrum* L.
Sethia St. Hil. s. *Erythroxydon* L.
Simsia R. Br. s. *Ximenesia* Cav.
Siphocampylos Pohl s. *Centropögon* Benth.
Sirium Roxb. s. *Santalum* L.
Sloanea L. s. *Oxyandra* DC. u. *Echinocarpus* Blum.
Smegmadermos R. u. P. s. *Smegmaria* W.
Solenandra Vent. s. *Blandfordia* Andr.
Solenia W. s. *Cyrtanthus* Schreb. u. *Posoqueria* Aubl.
Sonneratia L. s. *Mangium* Rumph.
Sophronia Lindl. s. *Sophronitis* ds.
Spadonisma DC. s. *Moquinia* ds.
Spananthe Jacq. s. *Hydrocotyle* W.
Sparganophörus Lag. s. *Coelestina* Cass.
Spathiphyllum Schott. s. *Stenospermatium* ds.
Spathularia Pers. s. *Spatulëa* Fr.
Spermatura Rehb. s. *Urosperma* Nutt.

- Spiranthēra** St. Hil. s. *Terpnanthus* Mart.
Sphaeralcēa Spach s. *Malva* miniat. Cav.
Sphaerocarpa DC. s. *Centropōgon* Benth.
Sphaerocarya DC. s. *Retinaria* G.
Sphaerophysa DC. s. *Colutea* casp. M. B.
Stackia insignis autt. s. *Decaisnēa* Hook. f.
Stachelina L. = *Centaurēa*, sect. *Cyānus* Rchb.
Stachelina Crantz s. *Bartsia* L.
Stachelina Walt. s. *Liātris* G.
Stadmannia Spr. s. *Melicocca* Juss.
Staurophōra W. s. *Lunularia* Mich.
Stemodiakra P. Br. s. *Scordium* Sloan.
Stenhammēra Rchb. s. *Pulmonaria* L.
Stereocaulon Schreb. s. *Sphaerocephalus* Pers.
Steris Burm. s. *Hydrolēa* Vahl
Stevensonia H. Wendl. s. *Ver-schaffeltia* ds.
Sticta Hoffm. s. *Pulmonaria* Hoffm.
Streptium Roxb. s. *Blaeria* L. u. *Tortūla* Roxb.
Stroemia Vahl s. *Cadaba* Forsk.
Stylis Poir. s. *Stylidium* Sw.
Stylophōrum Nutt., Spr. s. *Chelidonium* L. u. *Meconopsis* Vīg.
Stylosanthes Schreb. s. *Hedysārum* hamat. L.

Tangu Pluk. s. *Cyminosma* G. u. *Caryophyllus* aromatic. L.
Tambourissa Bak. s. *Mithridatea* Comm.
Tapinia Dietr. s. *Montbretia* Réd.
Tapogomea Aubl. s. *Cephaelis* Sw.
Tasmania R. Br. s. *Wintēra* L.
Tatarica Clus. s. *Crambe* T.
Telfel Tavail Alp. s. *Cynanchum* viminale L.
Tenorēa Spr. s. *Buprestis* ds.
Tetragonocarpus Comm. s. *Tetragonia* L.
Tetramerium G. s. *Xora* Sw.
Tetrodontium Brid. s. *Tetraphis* Hedw.
Teucris u. *Teucropsis* Benth. s. *Teucrium* L.
Theodōra Med. s. *Bonduc* Plum.
Thibaudia Hb. s. *Lussacia* Spr.
- Thlaspidioides** Barrere s. *Dodonaea* L. u. *Staphylo-dendron* Pluk.
Thomasia Gay s. *Lasiopetalum* Sm.
Thyr sine Gled. s. *Cytinus* L. u. *Hypocistis* T.
Tigarea Pursh s. *Kunžēa* Spr.
Timbuleta Forsk. s. *Dodartia* L.
Timonius Bak. s. *Helospōra* Jacks.
Timonius Rumph. s. *Erithālis* Forst.
Tittmannia Rchb. s. *Vandellia* L.
Toddalia Juss. s. *Scopolia* Sm.
Togularia aut. s. *Ceranium* Reinw.
Tomex L. s. *Callicarpa* L. u. *Kaempferia* Houst.
Trachylobium aut. s. *Hymenaea* L.
Trachymene Grah. s. *Hūgelia* Rchb. u. *Didiscus* DC.
Trachytella DC. s. *Calligōnum* L.
Tragia L. s. *Mercurialis* L.
Traunsteinēra Rchb. s. *Nigritella* Rich.
Trembleya DC. s. *Jacobia* ds.
Tribrachia Lindl. s. *Bolbophyllum* P.-Thou.
Trichogyne DC. s. *Ifloga* Cass.
Trichophyllum Nutt. s. *Helenium* Spr.
Trichostōmum Hedw. s. *Ceratōdon* Brid.
Trieyla Lam. s. *Bougainvillēa* Comm.
Trigōnis Jacq. s. *Cupania* L.
Trioptēris Banks s. *Hiraea* Jacq. u. *Tetraptēra* Cav.
Tripterella Elliot s. *Burmannia* L.
Trisetaria Poir. s. *Trisētum* Pers.
Tromsdorffia Mart. s. *Liebigia* Endl.
Trophis L. s. *Bucephalum* Plum.
Turbith Tausch. s. *Libanotis* Scop.
Turnēra L. s. *Chamaecistus* Sloan.
Turpinia Vent. s. *Dalrymplea* Spr.
Turpinia Spr. s. *Poiretia* Vent.
- Ubiun** Rumph. s. *Stemōna* Lour.
Uricia Hortul. s. *Lepechinia* W.
- Verēa** W. s. *Crassula* *Cotylēdon* Jacq. u. *Kalanchoē* Adans.
Vermicūla Col. s. *Scleranthus* L.
Villanova Lag. s. *Parthenium* L. u. *Unxia* W.
Villaresia F. Müll. s. *Chariessa* Becc.
Viminaria Lk. s. *Daviesia* Sm.

- Viraya** Gaudich. s. *Leptorrhynchus* Benth.
Vouapa Aubl. s. *Macrolobium* L.

Walkera W. s. *Meesia* Hedw.
Walkeria Ehret. s. *Nolana* L. u. *Teganum* Schmidel
Wallisia Schwägr. s. *Schlimmia* Planch.
Wallrothia Roth s. *Vitex* L.
Wangenheimia Mnch. s. *Cynosurus* L.
Warneria Mill. s. *Hydrastis* L.
Weinmannia Cunn. s. *Caldcluvia* G. Don

Wendlandia W. s. *Cocculus* DC.
Wickstroemia Schrad. s. *Haemochäris* Sal. u. *Gordonia* Spr. (*Lindleya* Nees).
Willdenowia Thb. s. *Restio* L.
Willughbeia Roxb. s. *Fagraea* Thb.
Winterana Soland. s. *Wintëra* L.

Ximenia Poir. s. *Balanites* DC.
Xylosma Schreb. s. *Myroxylon* L. f.

Zaleya Burm. s. *Trianthema* L.
Zaluzania aut. s. *Zamia* L.
Zornia Gm. s. *Dicerma* DC.
Zygotrichia Brid. s. *Tortula* Hedw.
-

B. Deutsch-, Trivial- und Fremdnamen der technischen, merkantilen und besonders wichtigen sonstigen Pflanzen und ihrer Produkte nach wissenschaftlicher Benennung.¹⁾

- Aaspflanze** Stapelia.
ABC-Pflanze Spilanthes Acmella.
Achiar (köstl. Konfekt aus Wurzelspross.) Bambusa arundinacëa.
Abthon (Erauenhaar) Trichomänës.
Acajou (echte) Anacardium orientale, (Mahagoni) Swietenia, (falsche) Strychnos Nux vomica.
Ackernuss (Erdkastanie) Bunium Bulbocastanum.
Adamsapfel Citrus Limetta.
Adlerholz Aquilaria, (echtes) Aloëxylon, (unecht.) Excoecaria Agalöchum.
Advokatobaum Persëa gratissima.
Affenblatt Uvularia.
Affengesichtbaum Rottlera s. Croton.
Afrikaner Tagëtes patula.
Agrume Citrus decumana, medica u. aurantium.
Ahlbeere (Alantb. Mej.) Ribes nigrum.
Ahle (Ahlkirsche) Prunus Padus.
Alber (e. abele-tree) Populus (Pappel).
Alereobaum Fitzroya patagonica.
Alhenna Lawsonia alba u. inermis.
Alkana Anchusa tinctoria, (echte) Alhenna.
Almrausch Rhododendron ferrugineum.
Aloëholz Aloëxylon (s. Adlerholz).
Alpbalsam (Alpenröschen) s. Almrausch.
Alpenbitter (Iva) Achillea moschata.
- Alpranke** (Bittersüss) Solanum Dulcamara.
Amarant-Cayenneholz Nissolia.
Amarelle Cerasus acida.
Ameisenbaum Cecropia u. Triplaris americ.
Amelkorn (Blicken) Olÿra latifolia.
Amerikagras Stenotaphrum s. Americanum complanatum.
Ammern (Emmer, Ehmer) Triticum dicoccum u. Olÿra.
Ammoniakpflanze Dorëma armenica.
Amstel (Wielandskr.) Thalictrum.
Ananaskirsche Physalis s. Atröpa edulis.
Angelikabaum Aralia spinosa.
Angosturarinde Galipea officinalis.
Angurien (Wassermelone) Cucumis Citrullus.
Anis Pimpinella Anisum.
Anke Pinguicula.
Ankerblume Rhexia.
Anthophyllus Offiz. (Mutternelke) Eugenia Caryophyllus.
Antillen-Ebenholz Byra Ebënum.
Antoniblüh Philadelphus Coronarius.
Antscharbaum (-gift) Antiäris Toxicaria.
Apfel (amerikan.) Pirus coronaria L.
Apfelmelone Cucumis Dudaim.
Apostenkraut Knautia (Scabiosa) arvensis.
Arabisch-Gummi Acacia arabica, gummifera etc.

1) Der Kürze wegen sind nur die der Erklärung bedürftigsten aufgenommen.
D. Verf.

- Arbe** (Arve) *Pinus Cembra*.
Arbuse (fr. arbouisse) s. Angurien.
Arghel-Blätter *Solenostemma Arghel*.
Arlitze (Elzbeere) *Sorbus torminalis*.
Armleuchterbaum s. Ameisenb.
Arrow-Root (ostind.) *Dioscorea*, (tahit.) *Tacca*, (westind.) *Maranta arundinacea*.
Asa foetida *Ferula* s. *Scorodosma Asa foetida*.
Asand (Stinkasand) s. eb.
Aschitze *Sorbus Aria* u. *Aucuparia*.
Atlasholz *Ferolia guianensis*.
Augenwurz *Athamanta*.
Austerbaum *Rhizophora Mangle*.
Ayrshire-Rose (Schling-) *Rosa repens* s. *capreolata* u. *rubifolia*.
- Bacille** (Meerfenchel) *Crithmum maritimum*.
Badeschleim *Oscillatoria*.
Badian (Sternanis) *Illicium anisatum*.
Bajonettblume *Yucca*.
Bärentatze *Clavaria Botrytis*.
Balsam (arab.) *Amÿris Katarif*, (Copaiva-) *Copaifera* off., (Gilead-) *Balsamodendron gileadense*, (Meca-) *B. Opobalsamum*, (peruvian.) *Myrospermum*, (Tolu-) ebenso.
Balsamapfel (Springgurke) *Momordica Elaterium*.
Balsamholz (peruv. Balsam) *Myroxylon peruiferum*.
Balsampflaume *Myrobalanus* s. *Spondias*.
Balsternaken (Pastinak) *Pastinaca*.
Bambuspalme (stiellose Wein-) *Raphia*.
Banane (Pisang) *Musa*.
Bandgras *Phalaris arundinacea picta*.
Baniane *Ficus indica* u. *benjamina*.
Barille *Salsola Kali* u. *Soda*.
Bartsch (Bärenklau) *Acanthus* u. *Heraclëum*.
Bartgerste *Hordeum Zeocritnon*.
Barthengel (Frauenbiss etc.) *Teucrium*.
Batate (echte) *Batatas*, (falsche) *Helianthus tuberosus*.
Batava (Palmwein) *Oenocarpus Batava* Mart.
- Bathengel** (Gamander - Ehrenpreis) *Veronica Chamaedrys*.
Batunge (Vatunge) *Betonica L.* (*Stachys* Bet.).
Bauernrose (Gicht-) *Paeonia*, (Centifolie) *Rosa Cent.*
Bauernschminke *Lithospermum arvense*.
Baumbinse (Palmgras) *Prionium*.
Baumcactus *Peireskia*.
Baummoos *Thamnum*.
Becherfarn *Trichomanes*.
Behemüsse (-öl) *Guilandina Moringa*.
Beisskohl (römisch-) *Beta Cicla*.
Benzoe (echte) *Styrax Benzoin*.
Bergmotten (Citronen) *Citrus medica*.
Bergthee *Gaultheria*.
Bernitze (Himbeere) *Rubus idaeus*.
Bernsteinbaum *Pinites succinifer*.
Bertram (deutsch., s. g. Dorant) *Achillea Ptarmica*, (gemeiner, s. g. Mutterkr.) *Chrysanthemum Pyrethrum*.
Bertramswurz *Anacyclus* u. *Pyrethrum*.
Besinge (Knöppel-) *Fragaria collina*.
Betelnüsse *Arca Catêchu*.
Bethlehemstern *Ornithogalum*.
Bettlersläuse *Torilis Anthriscus* u. *Galium Aparine*.
Bettstroh (Frauen-) *Galium verum*.
Beutling *Pleurospermum*.
Bezette *Croton tinctorium*.
Biberbaum *Magnolia*.
Bickbeere (Heidel-) *Vaccinium Myrtillus*.
Bienenheide (Sumpfporst) *Ledum palustre*.
Bilimbi od. **Blingingbaum** *Averrhoa Bilimbi*.
Bigarrado (Warzen-Pomeranze) *Citrus aurantium vulgare*.
Birzstrauch (Wachsbeer-) *Myricaria*.
Bitterholz *Quassia amara* u. *Xylopicron*.
Bitterlinge *Polygalæae*.
Bitterpilz (Dickfuss) *Bolëtus pachypus*.
Bitterschwamm (Schwefelkopf) *Hypophoma fascicularis*.
Blacke *Homogyne*.
Blaugummibaum (Fieber-) *Eucalyptus globulus*.

- Blauholz (Campeche-)** *Haematoxylon campechianum*.
Bläuling *Amethystea coerulea*.
Blicken (Amelkorn) *Olyra latifolia*.
Block-Ingwer *Amomum Zerumbet*.
Blumenkohl *Brassica oleracea botrytis*.
Blutholz s. Blauholz.
Blutwurz *Tormentilla*.
Boa- od. **Bohon-Upas** *Antiäris toxicaria* (Antschar).
Bocksdorn *Astragalus* u. *Lycium* (Teufelszwirn).
Bockskraut *Androsaemum hircinum*.
Bocksweizen *Atraphaxis*.
Bohnenkapper *Zygophyllum Fabago*.
Bolle (Sommerzwiebel) *Allium Cepa*.
Borstenglocke *Campanula Cervicaria*.
Botrys mexicana Offiz. = *Chenopodium ambrosioides*.
Bouquetwicke *Lathyrus latifolius*.
Bourbonthee *Angraecum*.
Brachschötchen *Calepina*.
Brasilienbaum *Melastoma Acinodendron*.
Brasilienholz (rot.) *Caesalpinia brasiliensis* u. *echinata*, (gelb. od. braun.) *C. Sappan*, (ostind.) *Pterocarpus Draco*.
Bratenkraut (Garten - Thymian) *Thymus vulg.*
Brätling (Milchpilz etc.) *Galorhoeus*.
Brauerkraut (Sumpfporst) *Ledum palustre*.
Braunholz *Caesalpinia Sappan*.
Bränewurz *Asperula cynanchica*, (Bräunenblume) *Prunella*.
Brautpflanze *Talinum*.
Brechhülse *Ilex vomitoria*.
Brechnuss *Strychnos nux vomica*, *Jatropha* u. *Janipha*.
Brechwurzel *Cephaelis* s. *Ionidium Ipecacuanha*.
Breiapfel *Achras Sapota*.
Brennbohne *Mucuna*.
Brennpalme *Caryota urens*.
Brennwinde *Loasa*.
Broccoli (Spargelkohl) *Brassica olerac. asparagoides*.
Brotnussbaum *Brosimum Alicastrum*.
Brombeerraute *Vepris*.
Bruchkraut *Herniaria* u. *Sanicula*.
Brunnenbaum *Tetracera potatoria*.
Brustbeere *Sebestena* u. *Zizyphus vulg.*
Buceoblätter *Diosma* (Barosma).
Bufbohne (Sau-) *Vicia Faba*.
Büffelgras *Aristida purpurea*.
Büffelhornholz *Burchellia capensis*.
Bügelholz *Celastrus*.
Bügelholzbirne *Salacia*.
Bulte *Ballota*.
Büngel *Callitriche*.
Büschelglocke *Campanula glomerata*.
Bunke (Silbergras) *Weingärtneria* s. *Corynephorus*.
Burgel *Peplis*.
Butterbaum *Bassia butyracea* (Pilippe, *Pentadesma butyr.*), (Sudan-) *Vitellaria paradoxa* u. *Micadania* s. *Butyrospermum Parkii*.
Butterblume *Caltha*, *Ranunculus* u. *Ficaria*.
Butterfass (gross.) *Nuphar lutëum*.
Butter- od. **Ölnuss** *Juglans cinerea* u. *Rhizobolus* s. *Pekea butyrosa*.
Butterpilz *Bolëtus lutëus*.
Butter- od. **Schmeerwurz** *Pinguicula*.
Byzantinernuss (-hasel) *Corylus Colurna*.
Cacaomalve *Abroma*.
Cacaopflaume *Icacina* (Icaco).
Caesumniarwurz (Block-Ingwer, s. d.).
Cajaputölbaum *Melaleuca Leucadendron*.
Cahnea- (Cahinea-) Wurzel *Chiococca anguifuga* etc.
Calabasse *Cucurbita Lagenaria*.
Cambogia- od. **Cambodscha-Stalagmit** *Xanthochymus*.
Camote (Batate, s. d.).
Campecheholz s. Blauholz.
Canariengras (-samen) *Phaläris canariensis*.
Cantaluppe (Prescott) *Cucumis Melo* var.
Caoutschukbaum *Siphonia elastica* s. *Hevea guianensis*, (ostind.) *Urceöla* s. *Tabernaemontana elast.* u. *Ficus elast.* u. *religiosa*.
Cap-Eisenholz *Gardenia*.
Capuzinerpulver *Verätrum Sabbadilla*.
Caraghen *Sphaerococcus crispus*.

- Carabou** s. Nimbobaum.
Cardobenediktenkraut Centaurēa Benedicta.
Cardun od. **Cardy** (Chardonna) Cynāra Carduncūlus.
Carfiol (Blumenkohl, s. d.).
Cascarillenrinde Clutia Eluteria.
Cassavebrot (-wurz) Dioscorēa u. Jatrōpha Manīhot.
Cassonade (Moscovade) Sacchārum.
Cayennekirsche Eugenia Michellii Lam.
Cayennepfeffer Capsicum baccatum.
Ceder (Libanon-) Pinus Cedrus L., (rote od. virginische) Juniperus virginiāna,
Cedernholz (Cigarrenkisten-) Cedrēla odorata.
Cedrat-Citron Citrus medīca.
Cedronbohne Simarūba ferruginēa.
Centunnodia Offiz. = Polygonum aviculare.
Chamburu (gift.) Carīca digitata.
Champagnerröschen Rosa pulchella (R. provincialis v.)
Champignon Psalliota s. Agaricus campestris.
Chinaäpfel (Apfelsinen) Citrus aurantium sinensis.
Chinabeere Sarcocēphalus.
Chinagrass Urtica nivēa u. Boehmeria utilis.
Chinarinde (echte) Cinchona officin., (unechte) s. Chinawurzel, (bras.) Evodia febrifuga.
Chinarose Hibiscus rosa chinensis.
Chinawurzel Smilax China.
Chokoladenbohne TheobromaCacāo.
Chokoladenstrauch Ribes aurēum.
Christblume Hellebōrus niger.
Christusauge Aster alpinus.
Christusdorn Paliūrus (Rhamnus s. Zizyphus) spina Christi u. Gleditschia triacantha.
Christuspalme (Wunderbaum) Ricinus communis.
Christwurz (Niess-) Hellebōrus.
Cibebe (Zibebe, grosse Rosinen) Vitis vinifera.
Cigarrenkistenholz s. Cedernholz.
Cigarrenpalme (Roll-) Licuāla.
Cinae (sc. semina) Offiz. Artemisia contra etc.
Citron Citrus medīca.
Citronenkraut Melissa offic. u. Artemisia Abrotānum (Stabwurz).
Citronenstrauch Lippia citriodora (Verbena triphyllos).
Coca (-blätter) Erythroxylon Coca.
Cocoholz Swartzia tomentosa.
Coko (Kalo etc.) Caladium esculentum.
Colombowurz Menispermum palmatum (Cocculus palmatus).
Coloquinte Cucumis Colocynthis.
Colsat fr. = Kohlsaar Brassica campestris.
Condori- od. **Corallenholz** Adenanthera Pavonia u. Erythrina Corallodendron.
Contrayerva Dorstenia Contrayerva u. Milleria Contr.
Copaivabalsam Copaifera.
Copalbaum (echter, ostind.) Vateria indica, (unecht, od. Copalgummi) Rhus Copallinum, (amerik.) Hy-menaea.
Corallenbäumchen (-kirsche) Solanum Pseudo-Capsicum.
Corallenholz s. Condoriholz.
Corallenschwamm s. K.
Cubacedernholz s. Cedernholz.
Culilawarinde (unecht, Zimmet) Cinnamomum syntoc s. spurium.
Curaregiftbaum Hippomäne Manicella u. Strychnos Tiente etc.
Cussave s. Cassavebrot.
Cymbelblume Nolana, -kraut Linaria Cymbalaria u. Cephalanthera.
Cypressenkraut Santolina Chamaecyparissus.
Dammarharz Pinus Dammara (Agäthis).
Darrgras Holcus u. Hierochlōa.
Dattelpflaume Diospyros Ebēnum.
Deckschimmel Trichoderma.
Degent (schwarzer, Birkenrindenöl, Oleum rusci Offiz.) Betula alba.
Delebpalme Borassus Aethiopum.
Denkmein (Gedenkemein) Ompalodes verna.
Dintenbaum (ostind.) Semecarpus.
Dochtmalpighe Thryallis.
Dohr (Löwenzahn) Leontodon.
Donnerkraut Sedum Telephium.
Donrian (Flöhkraut) Pulicaria.
Doradille Ceterach officinarum.
Dorant Achillēa Ptarmica u. Antirrhinum.
Dornkirsche Zizyphus Jujuba.

- Dötterlein** (Finkensamen) *Neslea*.
Drabe (Wassernuss) *Trapa*.
Drachenblut *Pterocarpus Draco* u. *Calāmus Dr.*
Drachenzurz *Arum Dracuncūlus* u. *Calla palustris*.
Dragon (Esdragon) *Artemisia Dracuncūlus*.
Drehling (-wurz) *Spiranthes*, (Austernpilz) *Pleurōtus ostreatus*.
Drehstamm *Kielmeyera*.
Dreifaltigkeitsblume *Trientalis europaea* u. (Stiefmütterchen) *Viola tricolor*.
Drosselbeere (Vogel-) *Sorbus Aucuparia*.
Drosswurz *Scrophularia*.
Drunt (Leinkraut) *Linaria*.
Dubenwok (Schafthalm) *Equisētum*.
Duhn (Pinselgras) *Penicillaria*.
Dumpalme (Ast-) *Hypphaena*.
Dungras (Woll-) *Eriophōrum*.
Durchwachs *Bupleurum*.
Durian (Zibethbaum) *Durio Zibethinus*.
Dürlitze (Herlitz, Cornelkirsche) *Cornus mas*.
Dürrbusch *Xerophyta* u. *Xerothermum*.
Durra (Sorgho, Mohrrirse) *Sorghum vulgare*.
Duvok s. Dubenvok.
Ebenholz (schwarz.) *Diospyros Ebēnum*, (Madagascar-) *Milletia leucantha*, (westind.) *Aspalāthus Ebēnus* (Amerimnon Eb.).
Eberich (Weidenröschen) *Epilobium*.
Eberraute (-reis, Stabwurz) *Artemisia Abrotānum*.
Eberwurz (Karlsdistel) *Carlina*.
Edelpilz (Stein-, Herrn-) *Bolētus edulis*.
Edelweiss *Gnaphalium Leontopodium*.
Egelfelberich *Lysimachia Nummularia*.
Ehegras *Apluda*.
Emmer (Emmer) s. Ammern.
Eibenzypresse *Taxodium*.
Eichenholz (afrik.) *Oldfieldia*.
Eichhase *Polypōrus umbellatus*.
Eierbaum *Hernandia ovigera*.
Eierfrucht (-pflanze) *Solanum Melongēna* s. *insanum* (Trongum hortense).
Eierschwamm *Cantharellus cibarius*.
Einblatt *Parnassia palustris*.
Einknolle *Monorchis*.
Einkorn (St. Peters-) *Triticum monococcum*.
Eintagblume *Lysimachia nemorum* u. *Tradescantia virginica*.
Eisenhart (-kraut) *Verbena*.
Eisenholz (asiat.) *Metrosidēros vera*, (austral.) *Stadmannia australis* u. (Schwarzholz) *Acacia Melanoxylon*, (Cap-) *Gardenia Rothmanni*, (Ceylon-) *Mesua ferrēa*, (Cochinch.-) *Baryxylum rufum*, (Jamaika-) *Fagāra Pterōta*, (Java-) *Cryptocarya ferrēa*, (indisch.) *Manglilla Chrysophyllum* u. *Sideroxylon*, (Intsi-) *Acacia Intsia*, (- Isle de France od. Bourbon) *Cossinia borbonica*, (Maba-) *Ferreola Maba* s. *buxifolia*, (weiss.) *Sideroxylon cinereum*.
Eiskraut *Mesembryanthemum crystallinum*.
Elemiharz *Amýris elemifera* (Icariba) u. *Icaica*.
Elephantenapfel *Feronia elephantum*.
Elephantenbaum *Phytelēphas* od. *Elephantusia*.
Elephantenfuss *Testudinaria elephantipes*.
Elephantenläuse *Anacardium orientale*.
Elephantenrüssel (Gemshorn) *Martynia*.
Elfenbein (vegetabil.) *Phytelēphas macrocarpa* u. *Manicaria saccifera* (Pilophora).
Eller (Erle) *Alnus*.
Else (Eller, Erle) s. eb.
Elsbeerbaum (Arlesbeerb.) s. Arlitz.
Elsebeere (Traubenkirsche) s. Ahle (Ahlkirsche).
Emmer (Emmer) s. Ammern.
Enfer (Ingwer) *Zingiber officinale*.
Engelsblume *Trollius*.
Engelwurz *Angelica* u. *Archangelica* (Erzengelw.), auch *Gentiana cruciata* (Sibyllen-).
Englisches Gewürz *Myrtus Pimenta*.
Englischer Spinat *Rumex Patientia*.
Entwin (Gicht- od. Zaurrübe) *Bryonia*.

- Enzian** (weisser) *Laserpitium latifolium*.
Erdbeerbaum *Arbutus* u. *Benthamia*.
Erdbirne (Topinambur) *Helianthus tuberosus*.
Erde (japanische) *Mimosa Catēchu* (Terra s. *Succus Catechu* Offiz.).
Erdeichel *Arachis hypogaea* u. *Lathyrus tuberosus*.
Erdkastanie *Carum* s. *Bunium Bulbo-castānum*.
Erdmandel *Cypērus esculentus*.
Erdmāuse s. Erdeichel.
Erdnuss s. Erdeichel u. *Voandzoua* s. *Glycine subterranea*.
Erne *Lavatēra*.
Escariol = breitblättr. *Endivie*.
Eschlauch (Schalotte) *Allium ascalonicum*.
Esdragon s. *Dragon*.
Esparterogras (Halfa) *Macrochlōa*.
Esicot (Schusserbaum) *Gymnocladus*.
Essigbaum (Essig- od. Hirschkolbe) *Rhus typhina*.
Essigrose (Zucker-) *Rosa gallica*.
Espeln (welsche) *Azarölus*.
Estragon s. *Esdragon*.
Faamblätter (Bourbonthee) *Angraecum*.
Fadenblatt *Zannichellia*.
Fadenseide (Flachsseide) *Cuscūta*.
Fallkraut *Arnica montana*.
Faseln *Dolichos* u. *Phaseolus* (Bohne).
Fassholz *Bauhinia*.
Faulbrand (Schmier-) *Urēdo sitophila*.
Federharzbaum s. *Caoutschukb.*
Feigbohne *Lupinus* u. *Thermopsis* s. *Podalyria* (Fuchsbohne).
Feigwurz (Feigwarzenkr.) *Ficaria ranunculoides*.
Feinchen (Feinstrahl) *Stenactis*.
Felbrich (Gilbweiderich) *Lysimachia*.
Feldohmkraut *Aphānes arvensis*.
Feldsalat (Nisschen, Nissel etc.) *Fedia* s. *Valerianella olitoria*.
Feldspinat *Blitum bonus Henricus*.
Fenchelholz *Laurus Sassāfras*.
Fennich *Panicum* u. *Setaria* (Borstengras), welscher *F. Panicum italicum*.
Fernambukholz *Caesalpinia echinata*.
Festblume *Ketmia rosēa*.
Festholz (Wagen-) *Visnea Mocanēra*.
Fettbaum *Sapium*.
Fettmännchen od. **Schmalzkraut** s. *Feldsalat*.
Feuerblume (Klatschrose) *Papāver Rhoeas*.
Feuerkraut (*Herba ignis* Offiz.) *Baeomyces ignifērus*.
Feuerschwamm (Zunder-) *Polypōrus igniarius*.
Ficatin (Rosen-Sissuholz) *Dalbergia latifolia*.
Fieberbaum (blauer) *Eucalyptus globūlus*.
Fieberholz *Swietenia febrifuga*.
Fieberkraut (Helmkr.) *Scutellaria* u. (Mutterkr.) *Matricaria Parthenium*.
Fiebertnuss *Ignatia amara*.
Fieberrinde s. *Chinarinde*.
Fingerpilz *Verpa* u. *Xylaria* (Holzp.).
Finkensamen *Neslea*.
Fioringras *Agrostis alba* s. *stolonifera*.
Firnissbaum (Hindostan. Kheu) *Melanorrhoea usitata*.
Firnissumach *Rhus Vernix*, (japan.) *Rhus vernicifera*.
Fischfänger *Piscidia Erythrina*.
Fischkörner (Kokkels-) *Anamirta Coccūlus*.
Fischtöter s. *Fischfänger*.
Fisetholz (Fustel-, Fustik-) *Rhus Cotinus* u. *Broussonetia tinctoria*.
Flaschenbürste (Schönfaden) *Callistemon*.
Flatterrose s. *Essigrose*.
Fleischblume *Sarcanthemum*, (*Kukkslichtnelke*) *Lychnis flos cuculi*.
Flieder *Sambucus*, (spanisch.) *Syringa*.
Fliegenfalle *Apocynum androsae-mifolium* u. *Dionaea*.
Fliegenholz *Quassia amara*.
Fliegenpilz (-schwamm) *Amanita muscaria*.
Flittergras (Liebes-) *Eragrostis*.
Flöhkraut *Erigēron*, (-Knöterich) *Polygōnum Persicaria*, (-Alant) *Inūla Pulicaria*.
Flohsamen *Plantago Psyllium* u. *arenaria*.

- Flohtöter** Pyrethrum.
Fluttgras *Glyceria fluitans*.
Forle (Föhre, Kiefer) *Pinus silvestris*.
Franzosenholz (Pocken-, lignum sanctum) *Guayacum officinale*.
Franzosenkraut *Erigéron canadense* u. *Galinsoga parviflora*.
Frauenbiss (Bathengel etc.) *Teucrium*.
Frauenhaar (-gras) *Gynerium*, (-farn) *Adiantum Capillus Veneris* u. *Trichomanes*, (Zartriet) *Isolëpis gracilis*.
Frauenminze *Tanacëtum Balsamita*.
Frauenstroh *Galium verum* (Labkraut).
Frauenthräne *Ophrys muscifera* etc.
Freisaunkraut (Stiefmütterchen) *Viola tricolor*.
Friedlos (Gilbweiderich) *Lysimachia vulg.*
Frieslein *Tunica*.
Froschlattich (Laichkr.) *Potamogeton*.
Frühmorchel (Stock-) *Helvella*.
Fuchsbohne *Podaliria s. Thermopsis*.
Fuchshirse (welsch. Fennich) *Panicum italicum*.
Fünfing *Spergella nodosa*.
Fungus chirurgorum Offiz. (Bovist) *Lycoperdon*.
Fungus melitensis Offiz. (Hundsruete) *Cynomorium coccineum*.
Fustelholz (Fustik-) *Broussonetia tinctoria*.
Futterhahnenkopf (Esparsette) *Onobrychis*.
Futternessel *Trophis s. Bucephalon*.
Futtertrespel *Festuca gigantea* (Bromus gig.).

Galei (Geisraute) *Galëga*.
Galgaut *Alpinia Galanga*.
Gallertflechte *Collëma* u. *Leptogium*.
Gallertmoos s. Caraghen.
Gambianuss (Erdmandel) *Arachis hypogaea*.
Gambirstrauch *Nauclea Gambir* u. *Uncaria*.
Gambobanf *Galphimia Hibiscus*.
Gamsennach *Azalea procumbens*.
Ganiterbaum *Elaeocarpus*.
Gänserich (Gänsekr.) *Potentilla anserina*.
Gartenrapunzel *Oenothëra biennis*.
- Gartheil** (Stabwurz etc.) *Abrotanum*.
Gauchblume *Orchis militaris*.
Geferkraut *Polycnemum*.
Geier (Gersch etc.) *Aegopodium Podagraria*.
Geiferwurz Pyrethrum.
Gelbbeeren (Dinte-) *Rhamnus catharticus*.
Gelblolz *Caesalpinia Sappan*, *Rhus Cotinus*, *Broussonetia tinct.* u. *Xanthoxylon*, (Cumberland-) *Virgilia*, (Stachel-) *Toddalia*.
Gelbkraut *Reseda luteola*.
Gelbmilcher *Xanthe*.
Gelbschote (chines.) *Gardenia grandiflora*.
Gelbwurz *Xanthe*, *Xanthorrhiza*, *Lilium Martagon*.
Geleukwurz *Convallaria Polygonatum*.
Gerbermyrte (-strauch) *Coriari myrtifolia*.
Germisell *Berberoa*.
Gessel (Feigwurz, s. d.).
Getreidebrand *Uromyces*.
Getreiderost *Puccinia graminis*.
Gewürz (engl.) *Eugenia s. Myrtus Pimenta*.
Gewürzdlolde *Sison Amomum*.
Gewürznelke (-näglein) *Eugenia caryophyllata* od. *Caryophyllus aromaticus*.
Gichtbeere (Ahl-, Alant-, s. d.).
Gichtschwamm *Amanita phalloides*.
Giersch s. Geier.
Giftbaum s. Antschar, (surinamischer -) *Tephrosia*.
Giftheil *Aconitum Anthora*.
Giftlilien *Colchicaceae*.
Giftmischer *Antidesma*.
Giftstiller (-mischer, s. eb.).
Gifttäubling (Speiteufel) *Russula emetica*.
Giftwicke *Coronilla varia*.
Gilbkraut *Glaucium*.
Gilbwurz *Amomum Curcuma*, *Asphodelus*.
Gilgen (Kraftblume) *Panacratium*.
Gillen *Anthëmis*.
Gilzgras *Sesleria*.
Ginsengwurz (Panacee) *Panax Ginseng*.
Gletsch (Wachtelweizen) *Melampyrum*.
Glinze *Ranunculus*.
Glockenheide *Erica carnea*, *Teträlix* etc.

- Glockenrebe** *Cobaea scandens*.
Glotzblume s. Engelsblume.
Glucke *Sparassis crispa*.
Götzenholz *Kigelia*.
Goldbart *Pollinia gryllus*.
Goldorange *Aucuba japonica*.
Goldwurz (Schöllkr.) *Chelidonium*,
 (Türkenbund) *Lilium Martagon*.
Gonne (Gänsekresse) *Arabis*.
Gottheil *Prunella*, (Gnadenkr.) *Gratiola offic.*
grains d'Avignon *Rhamnus infectorius*.
grameu majus Offiz. (Sandsegge) *Carex arenaria*.
Granatillbaum *Croton Tiglium*.
grannum Paradisi Offiz. *Amomum gr. Par.*
Gränke (Torfheide) *Andromeda*.
Grante *Arctostaphylos* (Bärentraube).
Grasgummibaum *Xanthorrhoea arborea*.
Grasrost s. Getreiderost.
Graswurz (Quecke) *Triticum repens*.
Greisenbart *Tillandsia*.
Greiskraut *Senecio* u. *Erigeron*.
Grenadillen *Passiflora edulis* u. *quadrangularis*.
Grenadillenholz *Xylocarpa Granatum*.
Crete (faule) *Sium Falcaria* (Falc. Rivini).
Greusel (Flutquendel) *Montia*.
Grieholz (blaues Sandel-) *Gulandina*.
Grieswurz *Cissampelos Pareira* (P. brava).
Grindkraut (-rose) *Scabiosa*.
Grindwurz (Sauerampfer), *Rumex Acetosa*.
Guakobaum (Stinkapfel) *Crataeva gynandra*.
Guatemalagrass s. Teosinte.
Guernsey-Lilie *Nerine* s. *Amaryllis sarniensis*.
Guianagrass *Pariäna*.
Guiana-Seifenbaum *Talisia*.
Gujavenbaum (Guy-, Kuj-) *Psidium*.
Guineagrass (gross. Fennich) *Panicum maximum*.
Guineakorn s. Durrha.
Guineapfeffer *Hablitzia* (Habzelia).
Gummi animae Offiz. *Hymenaea Courbaril*.
Gummi arabicum Off. *Mimosa nilotica* W. u. *Acacia arab.*, *gummifera* etc.
Gummibaum *Ficus elastica* u. *australis*.
Gummiguttbaum (*gummi guttae* Offiz.) *Stalagmites cambogioides* u. *Hebradendron*.
Gummiguttstrauch *Vismä*.
Gummi Kino *Pterocarpus senegalensis*.
Gummilackbaum *Ficus religiosa* u. *Aleurites laccifera*.
Gummi Myrrhae (Myrrhe) *Amÿris Kataf.*
Gummi (Senegal-) *Acacia senegalensis* W.
Gummi-Traganth *Astragalus creticus*.
Gundram (-tram, Gundermann) *Glechöma*.
Gurkenbaum *Parmentiera*.
Gurkenkraut *Borago officinalis*.
Gutta-Gambir *Nauclea Gambir*.
Gutta-Percha *Isonandra Gutta*.
Guyavebaum s. *Gujavenbaum*.
Haargurke (Stichling) *Sicyos angulata*.
Haberwurz (Hafer-) *Scorzonera* u. *Tragopogon*.
Habichtspilz (Hirschschwamm) *Hydnum imbricatum*.
Hadjilidj-Gewürz *Balanites aegyptiaca*.
Hagedorn (Hagen) *Crataegus Oxycantha*.
Halde (Flutstengel etc.) *Zannichellia*.
Halfa (Espanterogras) *Macrochloa tenacissima*.
Hallimatsch *Armillaria mellea*.
Hammelmöhre (Pastinak) *Pastinaca sativa*.
Hauf (virginischer) *Acnida cannabina*.
Haufblume *Phelipaea* s. *Orobanche*.
Haufnessel *Urtica cannabina* u. *Galeopsis Teträhit*.
Haufftod s. *Haufblume*.
Harfenstrauch (Mottentod) *Plectranthus*.
Harmelraute *Peganum Harmala*.
Harnkraut (Bruch-) *Herniaria*.
Hartholzbaum (Hopfenbuche) *Ostrya*.
Hartriegel *Cornus* u. *Ligustrum*.

- Härtling** Hypoxis.
Harzlilie Xanthorrhoea.
Hasebisch (Molak) Cannabis sativa.
Hasenglöckchen Endymion s. Agra-
 phis.
Hasenkohl Oxälis Acetosella.
Hasenpflöthen Trifolium Lagöpus.
Haspel (Meerzwiebel) Scilla.
Hechel Scandix, (Hau-) Ononis.
Hederich Raphanistrum, Erysimum
 u. Sinäpis arvensis.
Heidecker (-egger) Tormentilla.
Heilglöcklein Cortüsa Matthioli.
Heiligenpflanze Artemisia Santo-
 lina.
Heilwurz Athamanta Libanotis.
Heister (fr. hêtre) Carpinus.
Heimlockstamme (Schierlings-) Abies
 Tsuga.
Henna (Alhenna, s. d.).
Herkuleskolben Treisia clava,
 (-keule) Lagenaria vulg. var. cla-
 vata.
Herlitzte (Durlitzte, Cornelkirsche)
 Cornus mas.
Hermel Anthémis.
Herrpflanz s. Edelpflanz.
Herz (thränendes, -blume) Dicentra
 s. Dielytra u. Capraria s. Teedia.
Heuschreckenbaum (Locust-) Hym-
 enaëa Courbaril, (s. g.) Robinia
 Pseud-Acacia.
Hexenzwirn Lycium barbärum,
 (-strang, Teufelszwirn) Clemätis
 Vitalba.
Hickorynussb. Carya alba, amara etc.
Himmelfahrtsblume Gnaphalium
 dioecum.
Himmelsleiter Polemonium coeru-
 lëum.
Himmelsschlüssel Primüla veris.
Hirschbrunst Elaphomyces.
Hirschschwamm s. Habichtspflanz.
Hirsengras Holcus Sorghum u. Mi-
 lium.
Hirtenadel (Reiherschnabel) Ero-
 dium cicutarium.
Hirundinaria Offiz. = Cynanchum
 Vincetoxicum.
Hisparilla Ernodëa.
Hockenblatt Streptöpus amplexi-
 folius.
Hohllauch (Winterzwiebel) Allium
 fistulosum.
Hohlwurz Corydälis cava u. Aristo-
 lochia.
Holzäpfel (neuholl). Xylomëlum.
- Holzäpfel** Xylosma.
Holzblatt Xylophylla.
Holzäpfel Xylaria.
Honigäpfel (Johannis-) Malus prae-
 cox Pall.
Honigblume Melianthus major etc.
Hörlitzte s. Herlitzte.
Hornbaum (Hainbuche etc.) Car-
 pinus Betülus.
Hornfruchtstrauch Thamnëa.
Hornschwanz Ceratochlöa s. Bro-
 mus unioloides.
Höswurz Gymnadenia (Orchis, Sa-
 tyrium etc.).
Hundebeere Lonicëra nigra.
Hundetrage (Gundelrebe) Glechöma
 hederacëa.
Hundsgras (Knaul-) Dactylis.
Hundskohl Apocynum u. Mercuria-
 lis Cynocrambe s. perennis.
Hundswolle (-würger) Apocynum.
Hundswurz Anacamptis pyrami-
 dalis.
Husarenknopf (Parakresse) Spi-
 lanthes.
Hygrometer-Griffel Erodium grü-
 num.
- Jakobslauch** (Winterzwiebel) Allium
 fistulosum.
Jakobsblume Sprekelia formosissüma.
Jakobsstab Asphodëlus luteus.
Jakobszwiebel (-lauch, s. d.).
Jagarazucker (-palme) Borassus
 flabelliformis.
Jamaika-Pfeffer Myrtus Pimenta.
Jambusenbaum Eugenia Jambos.
Jasmin (deutsch.) Philadelphus Co-
 ronarius, (Cap-) Gardenia florida,
 (Carolina-) Gelsemium.
Javabalsam Protium javan. (Amÿris
 Protium).
Jehovahblümchen Saxifräga punc-
 tata u. umbrosa.
Je länger je lieber (Geisblatt) Loni-
 cëra Caprifolium.
Jerichorose Anastatica hierochun-
 tica.
Jerusalemblume Lychnis chalde-
 donica.
Jerusalemäpfel (violette) Pru-
 nus domestica var.
Jesuitenpulver (Chinarinde) Cin-
 chöna off.
Jesuitentheo Chenopodium ambro-
 sioides.

- Ignose** (Yamswurz) *Dioscorëa alata*.
Ignatiusbohne *Strychnos Ignatii*.
Ilmenbaum (Feldilme) *Ulmus campestris*.
Immergrün (Sinn-) *Vinca*, (Steinbrech-) *Aizoon*, (- kriechendes) *Epigaea repens*.
Immerschön (Sand-) *Helichrysum* s. *Gnaphalium arenarium*.
Immortelle *Gnaphalium*, *Helichrysum*, (Strohl.) *Xeranthemum*, (rote) *Gomphrena*.
Indig (echter) *Indigofera*, (deutsch.) *Isatis tinctoria*, (roter, s. g. *Persio*) *Lecanora tartarea*.
Insektenpulver (pers. etc.) *Pyrethrum roseum*.
Instrumentenholz. *Maurocenia*.
Johannisblutkr. *Scleranthus perennis*.
Johannisbrot s. *Sodbr.*
Johannislauch s. *Hohllauch*.
John (langer) *Triplaris americana*.
Irländisches Moos s. *Caraghen*.
Juckhaarbohne *Dolichos puriens* (*Strizolobium*).
Judasbaum *Cercis Siliquastrum*.
Judasohr *Exidia auricula Judae*.
Judenbart *Diptera sarmentosa*.
Judendorn *Zizyphus Lotus* u. *Jujuba*, auch *Rosa canina*.
Judemanna *Alhagi*.
Judemuss *Staphylea pinnata*.
Judenpappel *Kerria japonica*.
Jujubenbaum (-dorn) *Zizyphus Jujuba*.
Jungfernkraut (s. g. *Metterich*) *Matricaria Parthenium*.
Jungfernmilch-Pfl. *Benzoïn officinale*.
Jungfernrebe (-wein) *Ampelopsis quinquefolia*.
Jüngling *Athanasia*.
Jute *Corchorus textilis* s. *capsularis* u. *olitorius*, auch *Hibiscus* s. *Abelmoschus tetraphyllos*.
Juvia-Nüsse (bras., Rahm-) *Bertholletia excelsa*.
Iva (Alpenbitter) *Achillea moschata*.
Ivenblatt *Melissa officinalis*.
Ixiole *Trichonema*.
Käsebaum *Bombax*.
Kahm *Ulvina*.
Kaiserling (-schwamm) *Amanita caesarea*.
Kajaputöl. s. *Cajaput*.
Kalabasse s. *Calabasse*.
Kalliaturoholz *Pterocarpus Draco*.
Kalo (*Tarro*) *Colocasia*, *Caladium esculentum*.
Kameelheu (Blumenbinse etc.) *Butomus umbellatus*.
Kampher (*Kamfer*) *Laurus* s. *Persia Camphora*.
Kandel (*Teichrose*) *Nymphaea*.
Kaneelzimmert *Winterania Canella*.
Kannenkraut *Equisetum arvense*.
Kanonienbaum *Cecropia*.
Kaoutschuk. s. *Caoutschuk*.
Kappengras *Zizania*.
Kapperi *Capparis*, (deutsche) *Caltha palustris*.
Kapura (*Sumatra-Kampher*) *Dryobalanops Camphora*.
Kapuzinerpilz *Bolëtus scaber*.
Karambolabaum *Averrhoa*.
Kari-kari (*Beissbeere*) *Capsicum annum*.
Karse *Lepidium*.
Kartoffelbovist *Scleroderma*.
Kartoffelfäule *Fusisporium solani*.
Kartoffelkrankheit (*Trockenfäule*) *Peronospora infestans* s. *effusa*.
Kartoffelkrätze *Protomyces solani*.
Kasi-kari (*Speise*) s. *Kari-kari*.
Kassavi s. *Cassavebrot*.
Kastoröl *Ricinus communis*.
Katechu (vgl. *japan. Erde*) *Arëca Catechu*.
Katzenbaldrian *Valeriana officinalis*.
Katzeneier *Bovista* (*Lycoperdon*).
Katzenklee (*Hasenpfötchen*, s. d.).
Katzenkorn (*Mäusegerste*) *Hordëum murinum*.
Katzenkraut (-gamander) *Teucrium Marum*, auch *Nepeta Cataria*.
Katzenpfötchen *Gnaphalium* s. *Antennaria* (*Pes Cati*).
Katzensteert *Equisetum arvense*.
Katzenrübling *Sedum acre* (*Vermicularis*).
Kaublatzbaum *Erythroxylon Coca*.
Kaupflanze s. *ABC-Pfl.*
Keileken (*Holder*) *Sambucus nigra*.
Kelchblumenstrauch *Calycanthus*.
Kelke *Tofieldia*.
Kelp *Fucus serratus* etc.
Kerbelrübe *Chaerophyllum bulbosum*.
Kerbuzel (*Gemüse-Portulak*) *Portulaca oleracea*.

- Kermesbeere** (-saft, granum u. succus Chermes Offiz.) *Quercus cocifera* (Kermeseiche).
Kermesspinat *Phytolacca esculenta*.
Kern-Eisenholz *Metrosidēros*.
Kettenhülse (Schnur-) *Sophōra japonica*.
Keulenbaum *Casuarīna* u. *Scytalia*.
Keuschlamm *Vitex agnus castus*.
Kieher (-erbse) *Cicer*, *Lathyrus* u. *Orōbus*.
Kiebitz *Fritillaria Meleagris*.
Kiebitzfett *Pinguicūla*.
Kiebbeere (Galle) *Juniperus communis*.
Kieselholz (Antillen-) *Acacia Sideroxylon*.
Kilte (Nachtviole) *Hesperis*.
Kino (-Gummi) *Drepanocarpus* s. *Pterocarpus senegalens.* (erinacēa) u. *Orucaria*, (Kinobaum) *Eucalyptus resinifera*.
Kirsche (amerik.) *Malpighia glabra*, (Kirschpflaume) *Prunus cerasifera* (*Myrobalānus Hort.*).
Klasper (Täschelkraut) *Thlaspi*.
Klättertopf (Klapper) *Rhinanthus* s. *Alectorolophus*.
Klebe (Krebsdistel) *Onopordon*.
Kleberich (Pechnelke) *Viscaria* (*Lychnis V.*).
Kleber (Klebkraut) *Galium Aparīne*.
Klebglocke *Eutōca viscida* (*Cosmanthus v.*).
Kleeseide *Cuscūta Epithymum*.
Kleetenfel *Orobanche minor*.
Kleiderbaum (Platane) *Platanus vulgaris* Spach.
Kleiderbesen s. *Durrha*.
Kleppel *Knautia* s. *Scabiosa arvensis*.
Klettenwurzel (Spitzklette) *Xanthium*.
Kletterrose *Atragēne*.
Kleber (Honigklee) *Melilotus*.
Klingholz *Baphia nitida*.
Klisse s. *Klettenwurzel*.
Klöwen (Klaunzwiebel) s. *Hohlauch*.
Knackbeere *Paederia*.
Knackelbeere *Fragaria viridis* s. *collina*.
Knebel (Mastkraut) *Sagīna*.
Knebelbart *Hugonia Mystax* u. *Aegoceras*.
Knoblauchbirne *Crataeva Tapia*.
Knopfkraut *Galinsoga*.
Knopfwurz (Kugeldistel) *Echinops*.
Kölbel (Wiesenknopf) *Sanguisorba*.
Kölle (Bohnenkraut etc.) *Saturcja*.
Kölme (Schönminze) *Calamintha*.
Königin der Nacht *Cerēus grandiflorus*.
Königsholz s. *Tembesubäum*.
Königsrinde s. *Chinarinde*.
Königsstab s. *Jakobsstab*.
Königsthee *Xenopōma*.
Köhl (caraibischer) *Caladium esculentum*, (römisch.) *Beta Cicla*.
Kohlportulak *Portulāca oleracēa*.
Kohlrabi *Brassicā oleracēa gongylodes*.
Kohlreps *Brassica Napus* s. *campestris*.
Kohlrübe (Erdkohlraube) *Brassicā Napus esculenta* s. *rapifera*.
Kohl Saat (fr. colsat) s. *Kohlreps*.
Kokkelskörner *Menispermum* s. *Anamirta Cocculus*.
Kolbenbaum s. *Essigbaum* (*Hirschkolbe*).
Kollerwurz (gelbe Nixblume) *Nuphar lutēum*.
Kölmar (Gauchheil) *Anagallis*.
Kolumbinfarbe *Roccella tinctoria*.
Kopfbeere (Brechwurz) *Cephaelis*.
Kopfkraut *Galinsoga* u. *Viborgia*.
Köpernikel *Meum Mutellina*.
Körfel *Chaerophyllum*.
Kornährenholz (*Palmyra*-) *Sebipira*.
Kosten (Ferkelsalat) *Hypochoeris*.
Kotbaum *Coccoladia*.
Krähenaugen *Strychnos nuxvomica*.
Kränelpilz *Rhymovis*.
Kraftwurzel s. *Ginseng*.
Krammetsbeere *Juniperus communis*.
Kranichbeere (Moos-) *Vaccinium Oxycoccus*.
Kratzbeere (Bocks-) *Rubus caesius*.
Kräuselbeere (Stachel-) *Grossularia*.
Krebwurz (Natter-) *Polygōnum Bistorta*.
Kreen (Meerrettig) *Armoracia* (*Cochlearia*).
Kreiken (Kriechen etc.) *Prunus insititia*.
Kreissig *Barbaraea*.
Kremling *Galorrhoeus*.
Krempelwollpilz *Zasmidium*.
Kren (russ. chren) s. *Kreen*.
Krenzholz (*Mistel*) *Viscum*.

- Kreuzstrauch** *Baccharis*.
Kriechen s. Kreiken.
Kröulein (Kronwicke) *Coronilla*.
Kronbeere (Preissel-) *Vaccinium vitis Idaea*, (amerik.) *V. Oxycoccos*.
Kropfkraut (Braunwurz) *Scrophularia*.
Krösling (Mousseron) *Agaricus prunulus* s. *Collybia esculenta*.
Krötengras *Triglochin*.
Krötenschwamm *Coprinus fimetarius*.
Krullfarn *Adiantum*.
Krümling (Knorpelsalat) *Chondrilla*.
Krummholz *Pinus pumilio*.
Krupbohne (Zwerg-) *Phaseolus vulgaris*.
Kubeben (Schwanzpfeffer) *Piper Cubeba*.
Kuhbaum *Galactodendron utile*.
Kuhblume *Caltha pal.* u. *Taraxacum offic.*
Kuhkrätze *Mucuna urens*.
Kuhpilz s. Edel- (Stein- etc.).
Kujavenbaum s. Gujavenb.
Kümmelraute *Jambolifera*.
Kümmmerflug *Melothria cucumerina*.
Kukuksblume *Lychnis flos cuculi*, *Fumaria bulbosa*, *Orchis morio* u. a.
Kukukskresse = Wiesenschaumkraut.
Kukukspilz (-speichel) *Spumaria*.
Kukuruz (Welschkorn) *Zea Mäys*.
Kunigundenkraut (Wasserdost) *Eupatorium*.
Kunkelrübe s. Kerbelrübe.
Kuntschut *Sesamum orientale*.
Kupferkeule (Kolbe) *Typha latifolia*.
Kurkume (Gilbwurz) *Amomum Curcuma* s. *Curc. longa*.
Kusso *Brayera anthelmintica*.
Kutte *Cotoneaster*.
- Lablab** *Dolichos Lablab*.
Lachenknoblauch *Teucrium Scordonium*.
Lachenriet *Scirpus* s. *Trichelostyles*.
Lackmus *Croton tinctorium*, (-flechte) *Rocella tinctoria*.
Lakritzensaft (succus Laquiritiae) s. sogl.
Lakritzenstrauch (Süßholz-) *Glycirrhiza*.
- Lactucarium** (Gift) *Lactuca virosa*.
Lambertsness *Corylus tubulosa*.
Landnams Spieknarde s. Kreuzstrauch.
Latsche (Knieholz, Krumm-, s. d.), (Stechsalat) *Lactuca sativa*.
Laubenbohne *Teramnus*.
Laubheide *Clethra alnifolia*.
Lauchhederich (-kraut) *Alliaria offic.*
Läusekörner (Kokkels-, s. d.) u. *Delphinium Staphisagria*.
Läusesamen (-salbe, -pulver) *Veratrum Sabadilla*.
Lawrancerose (Liliput-) *Rosa minima*.
Lazarobirne *Pirus Pollveria* L.
Lebensbaum *Thuja* s. Biöta.
Leberbalsam *Erinus alpinus* u. *Ageratum*.
Lederapfel (Rabau, Reinette etc.) *Pirus Malus* var.
Lederzucker (Althäa-Paste) *Althaea officinalis*.
Leimbaum (vegetab. Leim) *Combrätum obtusifolium*.
Leinwandbaum *Lagetta*.
Leistenholz s. Kreuzstrauch.
Lenne (Lönne, Spitzahorn) *Acer platanoides*.
Lettich (Hufblattich) *Tussilago*.
Leuchterbaum *Rhizophora Mangle*.
Leuchterblume *Ceropegia*.
Lianen *Asclepiadæae*, *Paulliniæae* etc.
Lichte (Lichtnelke) *Lychnis* s. *Melandyrum*.
Liebe (brennende -) *Lychnis chalcidonica*.
Lieber'scher Thee (herba Galeopsisidis Offiz.) *Galeopsis ochroleuca* s. *grandiflora*.
Liebesapfel (Tomate) *Solanum Lycopersicum*.
Liesch (-gras, Lische) *Phleum*, (Blumen-, Wasser-) *Butömus*, (Fass-) *Sparganium*, *Typha* u. *Sagittaria*.
lignum sanctum s. Franzosenholz.
Lilak *Syringa vulgaris*.
Lilashwamm *Cortinarius traganus*.
Liliputrose s. Lawrancerose.
Limette (Limone) *Citrus medica* *Limetta*.
Liquiritiae (sc. radix u. succus) s. Lakritzen-.
Litschiplaume *Dimocarpus Litchi*.

- Locustbaum (-holz)** *Hymenaea*
Courbaril.
Löwe s. *Lenne.*
Lohblüte *Aethalium septicum* s.
flavum.
Lontar (Fächelpalme) *Borassus fla-*
belliformis.
Lorbeerkirsche = *Kirschlorbeer*
(Lauro-Ceräsus).
Lorbeermyrte *Tristania.*
Lorbeerrose (*Oleander*) *Nerium.*
Lorbeersehneeball *Viburnum Tinus.*
Lorbeerweide *Salix pentandra.*
Lorchel *Helvella.*
Lotuspl. (ägypt. Bohne) *Nymphaea*
Lotus, (ostind.) Nelumbium spe-
ciosum.
Lotusstrauch (*Lotophagendorn*) *Zi-*
zýphus Lotus.
Loxarinde s. *Chinarinde* *Cinchona*
offic.
Ludwigsblume *Ketmia liliiflora*
Hort.

Maba (Ölpalme) *Elaeis guineensis.*
Maba-Eisenholz *Ferreöla Maba.*
Macassarölbaum *Schleichera tri-*
juga.
Maceronkraut (*Myrrhen-*) *Smyr-*
nium.
Macis (*Muskatenblume*) *Myristica*
moschata.
Mädchenblume s. *Jungfernkraut.*
Maderaholz (-*mahagoni*) *Laurus*
indica.
Mädesüß *Spiraea Ulmaria* u. *Fili-*
pendula.
Maguayholz *Fourcroea gigantea.*
Mägdeheil (gross.) *Senecio nemo-*
rensis, (klein.) Sen. vulgaris.
Magnatentrüffel *Rhizopogon mag-*
natum.
Mahagoniholz (echtes) *Swietenia*
Mahagoni, (falsches) s. Madera-
holz, (afrik.) Khaga senegalensis.
Maitrank s. *Waldmeister.*
Malabar-Malve *Urëna.*
Malaccabohne (-*nuss*) *Anacardium*
orientale.
Malaguetta-Pfeffer *Amomum Mala-*
guetta.
Maldivische Nuss *Lodoicëa Sechel-*
larum.
Maludenwurz *Conioselinum tata-*
ricum.
Mammibaum *Mammaea americana.*

Mammuthsbaum (-kiefer) *Sequoia*
s. Wellingtonia californica.
Mancinellenbaum *Hippomäne Man-*
cinella.
Mandarin-Orange *Citrus nobilis.*
Mandarin-Thee *Xenopoma.*
Mandeln (grüne) *Pistacia vera.*
Manioccamehl (*Maniok*) s. *Cassave-*
brot.
Mangofruucht (-*pflaume*) *Mangifera*
indica.
Mangostane *Garcinia Mangostana.*
Manilahanf *Musa troglodytarum*
textaria.
Maniok *Jatrophä Manihot.*
Manna (*Briançon-*) *Larix decidua*
s. Pinus Larix, (-Esche) Fraxi-
nus Ormus, (-gras, -grütze) Gly-
ceria fluitans, (-klee, Wüsten-
mannä) Hedysarum Alhagi, (-Ta-
mariske) Tamärix gallica.
Mannabaum *Melia Azadirachtha.*
Männertreu *Omphalodes verna* u.
Veronica Chamaedrys.
Manschettenpilz *Amanita vaginata.*
Marasche (*Maraschino*) *Ceräsus*
acida.
Marbel (*Hainsimse*) *Luzula.*
Marienbalsamb. *Chloromyron ver-*
ticillatum.
Marienblatt *Tanacetum Balsamita.*
Marienblümchen (*Masliebchen*) *Bel-*
lis perennis.
Marienglocke s. *Mariette.*
Mariengras s. *Bandgras* u. *Holcus*
odoratus.
Marientröpfchen (*Bluts-*) *Dianthus*
carthusianorum.
Mariette *Campanula Medium.*
Markgrafepulver *Paeonia officin.*
Marmeladendosenb. *Duroia eriopila*
s. Genipa Merianae.

Maronen (*Kastanien*) *Castanea vesca.*
Maronenpilz *Bolëtus badius.*
Maruru *Victoria regia.*
Masakua *Sorghum cernuum.*
Maskenblume *Mimulus.*
Mastixb. *Pistacia Lentiscus* u. *Schi-*
nus Molle.
Mastixkraut (*Katzen-*) *Teucrium*
Marum.
Mate (*Paraguay-Thee*) *Ilex para-*
guariensis.
Maulbeerfrucht *Ficus Sycomorus.*
Maulwurfskraut *Euphorbia La-*
thyris.

- Mäusedarm** (Vogelmeier) *Stellaria media*.
- Maye** (Wasser- od. Ruchbirke) *Betula odorata*.
- Meccabalsam** *Amÿris Balsamodendron Opobalsamum*.
- Mechoacanawurz** *Convolvulus Mechoacanna*.
- Meergras** (Mooskraut) *Selaginella*.
- Meerhirse** *Lithospermum*.
- Meerlattich** (s. g. Watt) *Ulva lactuca*.
- Meerwatt** *Bryopsis*.
- Megelkraut** (Bibernelle) *Poterium Sanguisorba*.
- Mehlbeere (-birne)** *Sorbus Aria*.
- Mehlkraut** (Wiesenkönigin) *Spiraea Ulmaria*.
- Mehltau** *Erysibe communis*.
- Meier** (Meierich, -kraut) *Stellaria media*, (Waldmeister) *Asperula odorata*.
- Meister** *Asperula*.
- Meisterwurz** *Astrantia major* u. *Imperatoria*.
- Melonenbaum** *Carica Papaya*.
- Menderle** *Eranthemum*.
- Merian-China** *Meriana* s. *Tocoyena*.
- Meteorpapier** *Conferva rivularis*.
- Meter** *Melissa*.
- Metterich** s. *Jungfernkraut*.
- Miere** (rote) *Alsine rubra* etc., (Vogel-) *Stellaria media*.
- Milchbaum** s. *Kuhbaum*.
- Milchbusehsalat** *Taraxacum offic.*
- Milchglöckchen** *Leucojum vernum* u. *Campanula rotundifolia*.
- Millgras** (Hirse) *Milium*.
- Milzwurz** *Blechnum Spicant.*
- Mirabelle** *Prunus syriaca*.
- Mohar** (Guineagrass, s. d.).
- Mohrhirse** s. *Durrha*.
- Molak** s. *Haschisch*.
- Moltebeere** *Rubus Chamaemorus*.
- Moluchiagewürz** *Corchorus olitorius*.
- Molukken-Croton** *Croton Tiglium*.
- Mombiupflaume** *Spondias* s. *Myrobalanus Mombin*.
- Monatsrose** *Rosa damascena* s. *semperflorens*.
- Mönchs-Rhabarber** *Rheum raphaniticum*.
- Mongrovebäume** *Rhizophoreae*.
- Monke** (Schafrapunzel) *Jasione*.
- Moorkönig** (Läusekraut) *Pedicularis palustr.*
- Moorsimse** *Rhynchospora*.
- Moos** (amerik.) *Tillandsia*, (isländ.) *Cetraria*, (schwed.) *Lecanora tatar.*, (indisch.) *Moxa*.
- Moosbeere** *Vaccinium Oxycoccus* u. *macrocarpum*.
- Mooskraut** s. *Meergras*.
- Morelle** s. *Marasche*.
- Morgenblatt** s. *Marienblatt*.
- Morgenröschchen** *Silene Armeria*.
- Moscatello** *Cucumis Melo* var.
- Moschusblume (-pflanze)** *Mimulus moschatus*.
- Moschuskraut** *Adoxa moschatellina*.
- Moschuswurz** (Sunn) *Sumbulus moschatus*.
- Mostrich** (fr. moutarde) *Sinapis nigra* etc.
- Mottenkönig (-tod)** *Plectranthus* s. *Ocimum*.
- Mottenkraut** *Chenopodium Botrys*, *Ledum palustre*, *Tinearia* s. *Helichrysum creticum*.
- Moxa** (Hüftwolle d. Japanesen) *Artemisia vulg.*
- Müllen** *Vitex*.
- Mummel** (Nixblume) *Nuphar*.
- Mundubi** *Arachis hypogaea*.
- Münzkraut** (Pfennig-) *Lysimachia Nummularia*.
- Muscardine** (Seidenraupenpilz) *Botrytis Bassiana*.
- Muskatnuss** *Myristica moschata* s. *officin.*
- Muspflanze** s. *Moluchiagewürz*.
- Musseron** (Krösling, fr. mousseron od. muceron) *Agaricus prunulus* (*Collybia esculenta*).
- Mutterkorn** (*Secale cornutum* Offiz.) *Sclerotium clavus*.
- Mutternelke** (Gewürz-) *Caryophyllus aromaticus* s. *Eugenia Caryophyllus*.
- Mutterwurz** *Ostericum palustre* (*Angelica pratensis*) und *Mëum*.
- Myrrhenkraut** *Smyrniun perfoliatum* s. *Dioscoridis*.
- Myrrhenstrauch (-Gummi)** *Amÿris Katak* s. *Balsamodendron myrrha* Ehrbg.
- Nabelkraut** *Omphalodes* u. *Cotyledon Umbilicus*, auch *Hydrocotyle*.
- Nachthyazinthe** (*Tuberos.*) *Polianthes tuberosa*.
- Nagasbaum** (ceyl. Eisenholz) *Mesua ferræa*.

- Nagelbohne** *Dolichos* u. *Unguicularia*.
Nagelkraut *Hieracium Pilosella*, *Paronychia* u. *Polycarpon*.
Näglein *Syringa*, (Gewürz-) s. Mutternelke.
Nanibaum (asiat. Eisenholz) *Metrosideros vera*.
Nanking - Baumwolle *Gossypium religiosum*.
Napoleonsweide (Trauer-) *Salix babylonica*.
Nardoo (Nahrung d. Neuholländ.) *Marsilea salvatrix*.
Natte mehrere Kirschensorten.
Negerkorn (Mohrhirse) s. Durrha.
Nelkenöl s. Mutternelke.
Nelkenpfeffer (Jamaika-, s. d.).
Nepenthe antiquorum s. Haschisch.
Nepte *Nepeta*.
Neroli-Öl (*oleum neroli* Offiz.) *Citrus aurantium* (flores).
Nesselthee (obsol.) (flores *Urticae mortuae* Offiz.) *Lamium album*.
Neunkraft (Pestilenzwurz) *Tussilago Petasites* L.
Nicke (Nicksalat) *Prenanthes*.
Niesekraut *Ptarmica*.
Nil-Lilie *Nelumbium speciosum*.
Nimbobaum *Olea malabarica*.
Nissel (Nisschen etc.) s. Feldsalat.
Nixblume s. Mummel.
Nixkraut *Najas*.
Nolde *Sherardia*.
Nopal *Cactus Opuntia* (Op. *coccinellifera*).
Norfolkfichte *Araucaria excelsa*.
Nusskiefer (Pinie) *Pinus Pinä*.
- Oea (Oka)** *Oxalis tuberosa*.
Ochsenauge (Wiesen - Wucherbl.) *Chrysanthemum Leucanthemum*.
Ochsenbrot *Theobroma* s. *Bubroma Guazuma*.
Ohmkraut *Alchemilla Aphanes* L.
Oleaster (Ölweide) *Elaeagnus*.
Olibanum (Weihrauch-Wachholder) *Juniperus lycina* L.
Ölbeerbaum = Traubenkirsche, *Prunus Padus*.
Ölnuss (Butter-) *Juglans cinerea*.
Ölsenich *Peucedanum palustre* s. *Thysselinum (Selinum) pal.*
Ölweide s. *Oleaster*.
Opfersilje s. *Ölsenich*.
Opium *Papaver somniferum*.
Orakelblume *Thespis*.
- Orseille** (-Erde) *Lecanora parella*, (Lackmus-) *Roccella tinctoria*.
Osagendorn (-orange) *Maclura aurantiaca*.
Osehar *Calotropis procera*.
Osterblume (weisse u. gelbe) *Anemone nemorosa* u. *ranunculoides*, u. *Narcissus Pseudo-Narc.*
Ostheimer Kirsche *Prunus Chamaecerasus*.
Ostritz (Meisterwurz) *Imperatoria*.
Oswego-Thee *Monarda didyma*.
Otterwurz = Natterwurz *Polygon. Bistorta*.
Ottig s. *Kunigundenkraut*.
Oxelbirne *Sorbus intermedia* s. *scandica*.
- Pack-Choi** (Schangton-Kohl) *Brassica chinensis* var.
Packmoos s. *amerikan. Moos* = *Tillandsia*.
Padmapflanze s. *Nil-Lilie*.
Päde (Quecke) *Triticum repens*.
Palisanderholz *Jacaranda brasiliensis*.
Pallisadenholz *Camax fraxinea*.
Pallisadenpalme *Euterpe*.
Palmgras s. *Baumbinse*.
Palmilie *Yucca*.
Palmweide (Sohl-) *Salix caprea*.
Palmryahol *Sebipira*.
Panpasgras (Frauenhaar) *Gynorium argentum*.
Panacee s. *Ginsengwurz*.
Panamaholz (-rinde) *Quillaja saponaria*.
Panke *Panke tinctoria*.
Pantoffelblume *Cypripedium Calceolus*.
Pantoffelholz *Quercus Suber*.
Pantöffelchen *Calceolaria* u. *Aquilegia*.
Papageiholz *Fissilia psittacorum*.
Papau *Asimina*.
Papierblume *Xeranthemum annuum*.
Papierlilie *Papiria* s. *Gethyllis*.
Papierstrauch (ostind.) *Scaevola*.
Pappelrose (Rosenpappel) *Althaea rosea* u. *Malva Alcea*.
Paprika (span. Pfeffer) *Capsicum annuum*.
Paradiesapfel s. *Liebesapfel*, (Johannisapfel) *Pirus Malus praecox*.
Paradiesblume *Melia Azederach*.

- Paradiesfeige** s. Banane.
Paradieskörner *Amōmum granum paradisi*.
Paraguay-Thee s. Mate u. Cassīne Gongonha.
Parakresse (Fleckblume) *Spilanthes*.
Parasolpilz *Agaricus* s. *Lepiōta procera*.
Pareira brava Offiz. s. Grieswurz.
Parmaine = Reinettenapfel.
Passecarne-Gemüse *Lacis foeniculacēa*.
Pasteke (Wassermelone) *Cucūmis Citrullus*.
Pasternak s. Balsternaken (*Pastinak*).
Paternosterbaum (-erbse) *Melia Azedarach* u. *Epicharis* Blum., (-strauch) *Abrus precatorius* u. *Cedrēla*, auch *Osteospermum*.
Patschouly *Pogostēmon Patchouly*.
Pavettastrauch *Rutidēa coriacēa*.
Pecco-Thee *Thea sinensis* Sims
Pechtanne (Edel- etc.) *Abies pectinata*.
Peitschenaectus (Schlangen-) *Cerēs flagelliformis*.
Peltsche *Coronilla Emērus*.
Pelzsame *Tarchonanthus*.
Pentaphyllum Offiz. = *Potentilla reptans*.
Peperlepeb s. Kerbelrübe.
Pepperling (Milchpilz) *Galorrhoeus*.
Perdrigon (Damastpflaume) *Prunus domestica* var.
Perette *Citrus Limetta*.
Perlenschwamm *Amanita rubescens*.
Perllauch (-zwiebel, Porrée) *Allium Porrum*.
Perlmoos s. Caraghen.
Persio (roter Indig) *Lecanōra tartarēa*.
Perubalsam *Myroxylon peruiferum*.
Peruspinat *Chenopodium Quinoa*.
Pestilenzwurz (Pest-) *Tussilago Petasites*.
Peterskorn (Ein-) *Triticum monococcum*.
Peterskraut (Wand- etc.) *Parietaria*.
Petersilje (*Pedarsil* Karl's d. Gr.) *Petroselinum sativum*.
Peterstrauch (Schnee- od. Wachsbereen-) *Symphoria* s. *Symphoricarpus*.
Petsai (Schangtonkohl) *Brassica chinensis*.
- Pfaffenkappe** (Kapuzinerkresse) *Tropaeolum*.
Pfaffenkind *Arum maculatum*.
Pfaffenschuh (Frauen-) *Cypripedium Calceolus*.
Pfahlrohr *Arundo Donax*.
Pfauengerste *Hordĉum Zeocorithon*.
Pfebe (Melone) *Cucūmis Melo*.
Pfefferbaum (Klosterpfeffer) *Vitex agnus castus*.
Pfefferkraut (Bohnen-) *Saturĉja*, (Kresse) *Lepidium*.
Pfefferling (Pfüfferling) *Merulius Cantharellus*, *Bolĉtus piperatus* u. *Galorrhoeus*.
Pfefferriesel (Pfaffenhütchen) *Evoņymus*.
Pfefferstrauch (Kellerhals etc.) *Daphne Mezerĉum*.
Pfefferwurz (Kalmus) *Acōrus Calāmus*.
Pfeifenbinse *Molinia coerulĉa*.
Pfeifenkopfstrauch *Aristolochia Siphon*.
Pfeifenstrauch, s. eb. u. *Philadelphus Coronarius*.
Pfeilgift (Wurare) *Paullinia* s. *Cururu scandens*.
Pfeilrohr s. Pfahlrohr.
Pfeilwurz (arrow-root) *Maranta arundinacēa*.
Pfennigkraut *Thlasi arvense*, (Münz-) *Lysimachia Nummularia*.
Pferdebohne *Vicia Faba minor*.
Pferdesaat *Oenanthe*.
Pfüfferling s. Pfefferling.
Pfingstrose (Putennie, Gichtrose) *Paeonia officinalis*.
Pflaumenpilz *Clitopilus*.
Pichurienbohne *Nectandra Puchury*.
Pilau (Reis) *Orĉza sativa*.
Pilgerflasche *Lagenaria* var. *Gurda*.
Pillenbaum *Cleome*.
Pinanguuss *Arĉca Catĉchu*.
Piniennuss *Pinus Pinĉa*.
Pinke (Nelkengras) *Statice Armeria*.
Pisang s. Banane.
Pium (neuseeländ.) *Dacrydium cupressinum*.
Pockenholz s. Franzosenholz.
Pockenwurz *Smilax China*.
Pohon Upas s. Boa od. Bohon-Upas.
Polierblattb. *Trachytella aspera* (*Calligonum asp.*).

- Polstermoos** s. amerik. Moos, Til-landsia.
Pomacocoholz (Cayenne-Eisenholz) Swartzia tomentosa.
Pomadenkraut *Unxia camphorata*.
Pompelmus (Pumpelmus) *Citrus decumana*.
Pomponrose (Provencer-) *Rosa centif. var. provincialis* Mill.
Ponceau (Klatschrose etc.) Papäver *Rhoas*.
Porrée *Allium Porrum*, vgl. Perllauch.
Porselein *Honkenya s. Halianthus peplodes*.
Portulakspinat *Sesuvium*.
Porzellanbaum *Portulacaria*.
Porzellanblümchen *Saxifraga umbrosa, (-blume) Hoya carnosa*.
Porzellanthee *Lithospermum officinale*.
Prairiegras *Spartina cynosuroides*.
Prairierose *Rosa setigera* Mchx.
Preissel *Vaccinium*.
Preisselbeere *Vacc. vitis Idaea*.
Prescott s. *Cantaluppe*.
Presiljenkraut *Ocimum*.
Pressheide *Sympiëza*.
Priestley's Materie *Protococcus viridis*.
Puffbohne *Vicia Faba (F. vulgaris)*.
Pulque (Getränk aus d. Gipfelsprosse) *Agave mexicana*.
Pulverflasche *Lagenaria vulg. var. pyrotheca*.
Pulverholz (Faulbaum) *Rhamnus Frangula*.
Pumpelmus s. *Pompelmus*.
Purgierbaum *Croton Tiglium*.
Purgierkörner, s. eb.
Purgierkraut (Gnaden-) *Gratiola officinalis*.
Purgiernuss *Glycine subterranea*.
Purgierpflaume *Spondias Myrobalanus*.
Purgierraute *Crowea latifolia*.
Purgierstrauch *Daphne s. Thymelaea*.
Purgierwinde *Convolvulus Scammonia*.
Purpurrose s. *Essigrose*.
Putennie s. *Pfingstrose*.
- Quantel** *Amelanchier*.
Quecke (Queckengras) *Triticum repens*.
- Quellenbaum** *Phytocrëne gigantëa* etc.
Quellgras *Catabrosa s. Glyceria aquatica*.
Quellmoos (Hüll-) *Fontinalis*.
Quercitronholz *Quercus discolor s. tinctoria*.
Quinoapflanze s. *Peruspinat*.
Quinquina Piton *Cinchona floribunda*.
Quitscheren (Quitze, Vogelbeere) *Sorbus Aucuparia*.
Quittenmispel *Cotoneaster vulgaris*.
- Raban** s. *Lederapfel = Reinette*.
Radieschen *Raphanus sativus Raddiola*.
Raffel (Nelkenwurz) *Gëum urbanum*.
Rahl = *Raden Agrostemma Githago*.
Rahle *Teesdalëa*.
Rahmapfel (Flaschen-) *Anona*.
Rahmbeere (Bocks-) *Rubus caesius*.
Rahmnüsse (brasil.) *Bertholletia excelsa*.
Rambourapfel = *Reinette* u. *Pfundapfel*.
Ramëe (Ramie, engl. Chinagrass) *Boehmeria utilis s. Catirus ramiflorus*.
Rampe (Rempe etc.) *Diploaxis*.
Rampen (Knoblauchskraut) *Alliaria officinalis*.
Ramsch (Bärenlauch) *Allium ursinum*.
Ramsel *Polygala*.
Ramselwurz s. *Rampen*.
Rande *Linnaea*.
Ranunkelstrauch *Kerria japonica (Corchorus jap.)*.
Rapontika s. *Rhapontikwurz*.
Raps (Reps, Rüb- od. Kohlsaart) *Brassica Napus*.
Rapüntchen (Rapünzchen) s. *Feldsalat*.
Rapunzel *Phyteuma, Fedia s. Valerianella* u. *Campanula Rapunculus*.
Raspelbaum *Flindersia*.
Raspelstrauch *Tetracëa*.
Rasselblume *Catananche coerulea*.
Rasselbüchse *Hura crepitans*.
Rasselhülse *Psophocarpus*.
Rasselnuss *Hernandia sonora*.
Ratanhiawurzel *Krameria triandra*.
Rauhbeere (Rauch-) *Ribes Grossularia*.

- Raupengras** *Joachimia* s. *Beckmannia erucaeformis*.
Raupenklee *Scorpiurus vermiculatus*.
Rauschbeere *Empetrum* u. *Vaccinium uliginosum*.
Rauschhülse *Strizolobium* s. *Dolichos pruriens*.
Ravenmagras (Zucker-) *Erianthus Ravennae*.
Raygras (engl.) *Lolium perenne*, (franz.) *Arrhenatherum*, (ital.) *Lolium italicum*.
Rebenpilz (Weinstockschimmel) *Oidium Tuckeri*.
Rebling (Wildrebe) s. *Jungfernrebe*.
Relesaft *Achillea Millefolium*.
Regenrose (Ringel-) *Calendula* s. *Tripteris*.
Reglise (Althäe) *Althaea officinalis*.
Reiherbusch s. *Flaschenbürste*.
Reineclaud *Prunus insititia italica*.
Reinette *Pirus Malus dasyphylla*.
Reischker s. *Reizker*.
Reisebaum (Wander-) *Urania speciosa* s. *Ravenalia*.
Reisgerste *Hordium Zeocrithon*.
Reismelde s. *Peruspinat*.
Reispapierpfl. (chines. Reis-) *Aralia papyrifera*.
Reithgras (Schilf) *Calamagrostis arundinacea* s. *silvatica*.
Reizker *Russula* u. *Galorrhoeus insulsus* etc.
Remontanterosen *Rosa hybrida* Hort.
Remontantnelke *Dianthus semperflorens*.
Rempe (Hundsrauke) *Erucastrum*.
Remse *Hutchinsia*.
Remtiermoos (-flechte) *Cladonia rangiferina*.
Resina elastica Offiz. (Federharz) s. *Caoutchuk*, *Res. Guajacis Ligni sancti* = *Guajacum* off., *Res. Sandarac* = *Thuja articulata*.
Rhabarber (Mönchs-Rh.) *Rheum Rhabonticum*.
Rhapontikwurzel *Oenothera biennis*.
Rhodiserholz *Aspalathus Ebënus*.
Riechkraut *Unxia camphorata*.
Riesenbaum *Adansonia*.
Riesenkamm (Süssdolde) *Myrrhis odorata*.
Riet (Riedgras) *Carex*, *Riet Heleo-*
- chäris* u. *Scirpus*, (Rieth, Schilfrohr) *Phragmites*.
Rindgras (Vieh-) *Poa*.
Rindgift *Bucida*.
Ringpilz *Psalliotia*.
Rips (Reps, Raps) *Brassica Napus*.
Rispelgras *Poa*.
Ritschgras *Koeleria*.
Ritterkreuz *Horminum pyrenaicum*.
Ritterschwamm *Tricholoma*.
Roccambole (Rocken-) *Allium Ophioscorodon*, *Schlangenlauch*.
Rocket (Meersenf) *Cakile*.
Rodel (Läusekraut) *Pedicularis*.
Röhrenmama *Ornus europaea*.
Römersalat (Strunk-) *Lactuca sat. romana*.
Rosarium = *Rosengarten*.
Rose (japan.) *Camellia jap.*, (*Jericho-*, s. d.).
Rosenapfel *Jambusa vulg.* u. *Dillenlia*.
Rosenholz *Cytisus canariensis*, (*Ficatin-*, s. d.).
Rosenlorbeer = *Oleander Nerium Oleander*.
Rosenwurz *Rhodiola*.
Rosinen (Cibeben, Korinthen) *Vitis vinifera*.
Rosmarinapfel, *Sorte v. Traubenapfel Diel-Lucas*.
Rossfenchel *Phellandrium* u. (*Sau-*) *Peucedanum*.
Rosskopfstau *Carlina acaulis*.
Rosskümmel *Phellandrium* u. *Siler*.
Rossmalve (-pappel) *Malva sylvestris*.
Rossmünse (-minze, Ziest) *Stachys*.
Rosswiecke *Astragaloides*.
Rost *Coniomyces* (Staubpilze, *Aecidium*, *Puccinia* etc.).
Rotang (Palnried) *Calamus Rotang*.
Rotbuche (Wald-) *Fagus sylvatica*.
Rotdorn *Crataegus Oxyacantha flore rubro*.
Rotholz (afrik.) *Baphia nitida*, (*Bra-*) *silien-*, s. d.).
Rotrindenholz *Samadera indica*.
Rottanne *Pinus Abies* L. s. *Abies excelsa* Rich.
Rotwurz *Tormentilla*.
Roucou *Bixa Orellana*.
Rousselette = *Birnsorte*.
Rübe (weisse, Wasser-, Stoppel-, Teltower) *Brassica Rapa esculenta*.
Rübenkohl (Rübsamen, Rübsen)

- Brassica Rapa oleifera s. campestris.
 Ruckel Bellidiastrum.
 Ruhrbirne Pirus s. Sorbus torminalis.
 Ruhrkraut Gnaphalium u. Inula dysenterica.
 Ruhrrinde Simaruba officinalis.
 Ruku s. Roucou.
 Runkelrübe Beta, (Zucker-) Beta Cicla.
 Runzelblume Aletris.
 Russling s. Lohblüte.
 Russtau Cladosporium Fumago, (Schwärze) Stemphylium ericetorum.
 Rutabaja (schwed. Kohlrübe) Brassica Napus var.
 Ryegras s. Raygras (e. rye-grass).
- Sabadillsamen Veratrum Sabadilla.
 Sabinebaum (Sade-, Seven-) Juniperus Sabina.
 Sabudu Sorghum saccharatum.
 Sadebaum s. Sabineb.
 Sämsblätter (Sennes-) Cassia Senna.
 Säckelblume (Seckel-) Ceanothus.
 Saftgrün (Kreuzdornbeere) Rhamnus catharticus.
 Sagapenum (Teufelsdreck) Ferula persica.
 Sagobaum Caryota urens, (-farn) Cycas u. Zamia, (-palme) Sagus farinifera etc., (Portland-Sago) Arum maculatum.
 Sagueer (Zuckerpalme) Arenga.
 Salap (Salep) Orchis Morio etc., (tahitisch.) Tacca.
 Salbenbaum Amyris u. Myroxylon.
 Salbenschwamm s. Lohblüte.
 Salbnuss (Behen-) Guilandina Moringa.
 Salde Ruppia.
 Sallholz (ostind. Dammar-) Shorea robusta.
 Salme (Keilmelde) Obione.
 Salweide (Sohl-) s. Palmweide.
 Salzbinse Triglochin maritimum.
 Salzmiere s. Porselein, Honckenya s. Halianthus.
 Salzpungen Samolus Valerandi.
 Sambac (arab. Jasmin) Jasminum Sambac.
 Sammetblume Tagetes.
 Sammetgras Lagurus.
 Sammetnelke Lychnis Coronaria L.
- Sammetpappel Althaea officinalis.
 Sandaracharz Thuja articulata.
 Sandbeere (Bärentraube) Arbutus s. Arctostaphylos uva ursi.
 Sandbüchsenbaum Hura crepitans.
 Sandelholz (rot.) Pterocarpus santalinus, (gelb.) Santalum album, (Senegal-) Drepanocarpus senegal., (weiss.) Siritum.
 Sand-Luzerne Medicago falcato-sativa.
 Santelholz (-baum) s. Sandel-.
 Sappel Isnardia.
 Sapotillbaum s. Breiapfel.
 Sappanholz Caesalpinia Sappan.
 Sarana (essb. Serenna) Liliun kamschatscense.
 Sargasso Sargassum bacciferum.
 Saribupalme Corypha rotundifolia.
 Sarsaparill (Sassa-) Smilax Sarsaparilla.
 Sassafras Laurus Sassafras.
 Satanspilz Bolētus sanguineus s. Satanas.
 Satinetholz Ferialia guianensis s. Chloroxylon Swietenii.
 Saubeere Solanum nigrum.
 Saubrot (Erdscheibe) Cyclamen.
 Sauer (-klee) Oxalis.
 Sauerdattelb. Tamarindus.
 Sauerwurz Calymenia s. Oxybaphus P'Her.
 Saufenehel (Ross-) Peucedanum.
 Saug (Bienen-) Lamium.
 Saul s. Salholz (Schiffsholz b.).
 Saupilz (Schuster-) Bolētus luridus.
 Saurebe Solanum Dulcamara.
 Sauwurz Bryonia alba.
 Savoyerkohl (Wirsing) Brassica oler. sabauda.
 Scarlet-Pelargonien Pelargonium inquinans, zonale u. Blendlinge beider.
 Schabenkraut Verbascum Blattaria.
 Schabziegerklee Trifolium coeruleum s. Trigonella (Melilotus) coer.
 Schachblume (Kaiserkrone) Fritillaria.
 Schachtkohl (Spurre) Holostemum umbellatum.
 Schafeuter Bolētus ovinus.
 Schafkraut (Scharf-, Schärfling) Asperugo procumbens.
 Schakarillrinde Croton Eluteria.
 Schamblume Clitoria.
 Schamkraut Chenopodium Vulvaria s. olidum.

- Schangtonkohl** s. *Petsai*.
Scharbockskraut s. Feigwurz.
Scharfblatt *Xyris*.
Scharlacheiche s. Kermesbeere (-eiche).
Scharlachkraut (Scharlei) *Salvia Horminum*.
Scharte (blaue) *Serratula tinctoria*, (gelbe) *Genista tinct.* (Färbeginster).
Scheiberich (Sumpfschirm) *Helosciadium*.
Scheidenlilie *Xiphidium*.
Scheinbeere (canad. Bergthee) *Gaultheria*.
Schellackbaum *Croton lacciferum*, *Ficus religiosa* u. *indica*.
Schellbaum *Ahovia major* (*Cerbera Ahovia*).
Schellenblume *Adenophora* s. *Campanula*.
Schelmenkraut *Gentiana asclepiadæa*.
Scherbet *Trinia*.
Scheuerkraut *Equisetum hiemale*.
Schierlingstanne s. Hemlockstanne.
Schiffchenblume *Lembotropsis*.
Schildblume *Chelone*.
Schimmel *Hyphomycetes* (*Mucor* u. *Ascophora*).
Schirmpalme *Corypha* u. *Livistona*.
Schirmtanne *Sciadopitys*.
Schlafkraut *Teucrium Chamaedrys*.
Schlaflinse (Blasenstr.) *Colutea*.
Schlangenaugelein s. Scharfkraut.
Schlangeneactus s. Peitschencact.
Schlangengiftkraut *Monnieria trifolia*.
Schlangengras *Plantago coronopifolia*.
Schlangenholz *Strychnos colubrina* u. *Ophioxylon* s. *Tiovanna*.
Schlangenkraut *Calla palustris*.
Schlangenmoos *Lycopodium clavatum*.
Schlangenwurz (ind.) *Ophiorrhiza Mungos*, (virgin.) *Serpentaria*, (Natter-) *Polygonum Bistorta*.
Schlauchfaden (Schimmel) *Ascophora mucedo*.
Schleimapfel *Crataeva Marmelos*.
Schleimling *Tremella Nostoc L.*
Schleuderstendel *Vanda*.
Schlinge *Viburnum*, (Baum-) *Periplöca*.
Schlingrose *Rosa repens* s. *caprolata* u. *rubifolia*.
- Schlippen** (Natterwurz) *Polygonum Bistorta*.
Schlutte (Judenkirsche) *Physalis Alkekengi*.
Schmack (Sumach, Gerber-) *Rhus Coriaria*.
Schmalzblume *Caltha palustris*.
Schmalzkraut s. Feldsalat.
Schmalzling (Butterpilz) *Bolëtus lutëus*.
Schmeerwurz (Stick-) *Tamus communis*.
Schmelche s. Pfeifenbinse.
Schmergel s. Feigwurz.
Schmerle (Kopfrieter) *Schoenus*.
Schmerling *Bolëtus granulatus*.
Schmiele (Schmielenhafer) *Aira flexuosa*.
Schmierbrand *Urëdo sitophila* u. *Tilletia*.
Schminkbeere (Erdbeerspinat) *Blitum*.
Schminkbohne *Phaseolus vulgaris*.
Schminke (Steinsamen) *Lithospermum*.
Schminkläppchen s. Bezetten.
Schminkwurz *Anchusa tinctoria*, *Henna* u. *Polygonatum*.
Schmirbel s. Schminkbeere.
Schneekensamen *Cochlospermum* s. *Wittelsbachia*.
Schnee (roter) *Protococcus nivalis*.
Schneebeerenstrauch s. Peterstr.
Schneeflockenbaum *Chionanthus*.
Schneeholder s. Peterstrauch.
Schneerose *Rhododendron ferrugineum*, (Christblume, s. d.).
Schnellepheu (Sommer-) *Mikania scandens* od. *Senecio mikanoides*.
Schmurrhülse *Sophora japonica*.
Schönfaden s. Flaschenbürste.
Schönfuss *Bolëtus calopus*.
Schöneube *Eccremocarpus*.
Schotendornbaum (Gummi-) *Acacia arabica* etc., (gemeiner) *Robinia Pseud-Acacia*.
Schotenweiderich (Weidenröslein) *Epilobium*.
Schraubenbaum (-palme) *Pandanus*.
Schraubenmalve *Helictëres*.
Schriftblume *Grammanthes gentianoides*.
Schulmeisterpilz s. Parasolpilz.
Schüchel (Schotenklee) *Lotus*.
Schuppenapfel *Anöna*.
Schuppenschwamm *Pholiota mutabilis*.

- Schusserbaum** *Gymnocladus* s. *Guilandina*.
Schüsselflechte *Parmelia*.
Schusterpilz s. Saupilz.
Schüttgelb *Genista tinctoria*, *Rhamnus catharticus* u. *Betula pubescens*.
Schwalbenwurz *Asclepias* u. *Cheledonium*.
Schwammkürbis *Luffa*.
Schwanenblume (Wasserviole etc.) *Butōmus umbellatus*.
Schwanzpfeffer (*Cubebe*) *Saururus*.
Schwarzbeere = Heidelbeere.
Schwarzerle (Faulbaum) *Rhamnus Frangula*.
Schwarzkümmel (echt.) *Nigella*, (falsch.) *Agrostemma Githago* s. *g. Raden*.
Schwarzmundbeere *Melastoma malabathricum* etc.
Schwarztanne s. Rottanne.
Schwarzwurz (Hafer-, s. d.), (Beinwell, *Consolida major* Offiz.) *Symphytum officinale*.
Schwefelkopf *Hypholoma fascicularis*.
Schweinegummi *Marila racemosa* etc.
Schweinekraut s. Schlangenkraut.
Schweinesalat *Aposëris* od. *Hypoëris*.
Schwimmblatt *Salvinia natans*.
Schwindelkörner *Coriandrum sativum*.
Schwindelkraut *Doronicum Pardalianches*.
Schwängel (-gras) *Festuca*, (Manna-) s. Fluttgras, (-schilf) *Scolochlōa festucacea*.
Sclerotien = Hartpilze.
Sebesten *Cordia Sebestena*, (-baum, Holder) *Sambucus nigra*.
Seebälle *Zostera marina* (Seegras).
Seegras (unecht. Rosshaar, fr. crin végétal) *Chamaerops humilis*, (Seebälle, s. eb.).
Seelenholz (mexik.) *Xylostem mexicanum*.
Seetraube *Ephedra* u. *Coccoloba uvifera*.
Seewier s. Seebälle.
Seide (Flachsseide) s. Fadenseide.
Seidelbeere *Solanum Dulcamara*.
Seiden-Eisenholz *Sersalisia*.
Seidengras *Yuca*.
Seidenstrauch *Asclepias syriaca*.
Seifenschwamm *Tricholoma saponaceum*.
Semde (Schnabelsamen) *Rhynchospora*.
Semen *Cataputiae minoris* Offiz. = *Euphorbia Lathyris*, - *Cataputiae majoris* Off. = *Ricinus communis*, - *Coccognidii* Off. = *Daphne Mezerium*, - *Cocculi* Off. = *Menispermum Cocculus*, - *Contrae* s. *Cynae* Off. = *Artemisia judaica* s. *contra*.
Semmelpilz *Polyporus confluens*.
Seemst *Lycopodium Selago*.
Senegal-Gummi *Acacia senegalensis*.
Senegawurz *Polygala Senega*.
Senfkraut (Barbenhederich) *Barbarea*.
Sengel *Aposëris*.
Sennesblätter *Cassia Senna*, (unechte) *Bauhinia porrecta* (*Sennae spuriae* Off.).
Senwurz *Senecio*.
Serbet (verdünnt. Veilchensyrup) *Viola odorata*.
Serblensalat (Wurmsamen) *Artemisia contra*.
Serenna s. *Sarana*.
Serge (Pfefferkraut) *Saturēja*.
Serradella *Ornithopus sativus*.
Sermel (Milchkraut) *Glaux*.
Sesam (orient.) *Sesamum orientale*.
Sevenbaum s. *Sabinebaum*.
Shebaum (Butterb.) *Micadania* s. *Butyrospermum*.
Sibyllenwurz (Sybillen-) *Gentiana cruciata*.
Siebengezeit *Melilotus coeruleus* s. *Schabziegerklee*.
Siegmarswurz *Malva Alcea*.
Siegwurz (Allermannsharnisch) *Gladiolus communis*.
Silberbaum *Elaeagnus argentea* u. *Protëa*.
Silberblatt *Lunaria*.
Silberfaru *Gymnogramma*.
Silberfichte (-baum) *Protëa*.
Silberregen (Traubenkirsche etc.) *Prunus Padus*.
Silberscharte *Jurinëa*.
Silberwurz *Dryas octopetala*.
Silling (Zaunlilie) *Anthericum*.
Simarube *Quassia Simaruba*, (-baum) *Bursëra gummifera*.
Siriblätter (Kaupfeffer) *Piper betle*.
Sissuholz s. *Ficatinholz*.

- Sitter** (Sumpfwurz) *Epipactis*.
Skaumonium *Convolvulus Scammonia*.
Skorpionenschwanz *Heliotropium*.
Sodlbrot (Johannis-) *Ceratonia Siliqua*.
Sodomsapfel *Solanum Sodomaeum*.
Sohlweide s. Palmweide.
Sojabohne *Dolichos hispida* s. Soja.
Sommereiche *Quercus pedunculata*.
Sommerepheu s. Schnellepheu.
Sommerlinde (holländ.) *Tilia grandifolia*.
Sommerrebe *Vitis Labrusca*.
Sommerthürchen *Leucojum vernum*.
Sommerwurz (Ervenwürger) *Orobancha*.
Sonche (Saudistel etc.) *Sonchus*.
Sommengüsel (-röschen) *Helianthemum* (*Cistus*).
Sonnenwurz s. Sommerwurz.
Sorgho s. Durraha.
Spaltglocke *Scaevola*.
Spanisches Rohr *Calamus Rotang*, (falsches) *Arundo Donax*.
Spargelbohne (-erbse) *Lotus* s. *Tetragonolobus siliquosus*.
Spargelkohl s. Broccoli.
Spargelsalat *Lactuca angustana*.
Sparz s. Spargelbohne.
Specklilie *Lonicera Periclymenum*.
Speckmelde *Mercurialis annua*.
Speerwurzel *Valeriana*.
Speierling (Sperberbaum) *Sorbus* s. *Cornus domestica*.
Speiteufel *Agaricus emeticus* (*Russula em.*).
Speiwurzel *Pyræthrum*.
Spelle *Moehringia*.
Sperkling *Spergularia*.
Sperwe = Rosskastanie.
Spettel (Leimkraut) *Silene*.
Spierapfel s. Speierling.
Spike (Spiköl) *Lavandula Spica*.
Spillbaum (Spindel-) *Evonymus europaeus*.
Spille od. **Spilling** (catalonische Pflaume) *Prunus lutæa*, (Kriecher) *Prun. insititia*.
Spinat (gem.) *Spinacia oleracea*, (neuseeländ.) *Tetragonia expansa*, (engl.) *Rumex Patientia*.
Spinning *Scheuchzeria*.
Spinnenkraut *Anthericum* s. *Phalangium*.
Spitzblume *Ardisia*.
- Spitzenbaum** *Lagetta lintearia*.
Spitzmorchel *Morchella conica*.
Spleißse *Lobelia*.
Sporkelblume (Knoten-) *Leucojum vernum*.
Sporublume *Centranthus* (*Valeriana rubra* etc.) u. *Tropaeolum*.
Spreublume (Stroh-) *Xeranthemum*.
Spurre s. Schachtkohl.
Spritzgurke (Spring-) *Momordica Elaterium*.
Stabwurz (Eberraute etc.) *Artemisia Abrotanum*.
Stachelkausel *Urena*.
Stachelsamen *Acanthospermum* s. *Xanthioides*.
Staubflechte *Lepraria Jolithus* etc.
Ständling *Liparis*.
Stäubling (Bärlapp) *Lycopodium*, (*Bovist*) *Lycoperdon*.
Staudich *Kochia*.
Stechkörner *Carduus Marianus* (*semina* etc.).
Stechkraut (Mariendistel) s. eb. u. *Silybum Marianum*.
Stechwinde *Smilax Sarsaparilla*.
Steckenkraut *Ferula*.
Steinbeere (Brom-, Him-) *Rubus*.
Steineiche (Winter-) *Quercus Robur L.* s. *sessiliflora* Sm.
Steineppich *Bubon macedonicum*.
Steinklee *Melilotus* u. *Trifolium repens*.
Steinmispel *Cotoneaster vulgaris* (*Mespilus Cot. L.*).
Steinmorchel (Speise-) *Helvella esculenta*.
Steinmuss *Pterocarya* s. *Parinarium*.
Steinpilz s. Edelpilz.
Steinröschen (Zeiland) *Daphne Cneorum*.
Steinsalat (Hasenlattich) *Phoenixopus muralis*.
Steinweichsel (Weichselholz) *Prunus Mahaleb*.
Stellmacherholz *Trichocladus crinitus*.
Stelzenbaum s. Leuchterbaum.
Stendeln *Orchidæae*.
Stephanskörner *Delphinium Staphisagria*.
Sternanis *Illicium anisatum* od. *Skimmia fragrans*.
Sternblume *Aster*, *Narcissus poeticus*, *Stellaria*.

- Sterndistel** *Centaurēa Calcitrāpa*.
Sterndolde (Strenze) *Astrantia*.
Sternhlocke *Campanūla patūla*.
Sternhyazinthe (Zille etc.) *Scilla bifolia*.
Sterukopf s. Grindrose.
Sternschnuppe s. Schleimling.
Stiebling s. Haargurke.
Stiekwurz s. Schmeerwurz.
Stielnuss (Süss-) *Hedycarya*.
Stielpfeffer *Piper Cubēba*.
Stinkapfel *Crataeva Papia*.
Stinkasant *Ferula Asa foetīda*.
Stinkbaum *Foetīdia mauritiana* u. *Anagāris*.
Stinkbohne (-frucht) *Scorodocarpus* s. *Ximenia*.
Stinkholz *Olax zeylanica*.
Stinkkraute *Tiorēa foetīda*.
Stinkwaeholder s. *Sabinebaum*.
Stocklaek *Croton laccifērum*.
Stockmorehel s. Frühmorchel.
Stockrose (s. g. Gartenmalve) *Althaea rosēa* s. *Malva arborēa*.
Stockschwamm s. Schuppenschw.
Storax *Styrax officinalis*.
Strandkiefer *Pinus halepensis*.
Strandling *Corrigiōla litoralis* u. *Litorea lacustris*.
Strausskirsche *Solanum*.
Streitkolbenbaum *Casuarīna*.
Strenze s. Sterndolde.
Strickgras (Seil-) *Restio*.
Strohblume *Xeranthēmum*, (Immortelle) *Gnaphalium* u. *Helichrysum*.
Strunksalat (Römer-) *Lactuca sat. romana*.
Strunkschwamm s. Glucke.
Stückelalgen *Diatomēae* (*Bacillaria* etc.).
Studentenblume *Syringa*, *Dianthus barbatus*, *Tagētes* u. a.
Studentenkraut *Chenopodium scoparium* (*Kochia scop.*).
Studentenmelke (Bart-) *Dianthus barbatus*.
Studenteuröschen (Herzblatt) *Parnassia palustris*.
Stundenblume *Hibiscus* s. *Ketmia Triōnum*.
Succade *Citrus decumāna*.
Südseemyrte *Leptospermum scoparium*.
Süssholz (*radix Laquiritiae*) *Glycirrhiza glabra*.
- Süssklee** (Manna-) *Hedysārum Alhagi*.
Sumpfeeder *Taxodium* s. *Cupressus disticha*.
Sumpfheide *Erica Tetrālix*.
Suum *Sumbūlus moschatus* u. *Crotalaria juncēa*.
Suppenlauch (Schnitt-) *Allium Schoenoprāsium*.
Sybillenwurz s. *Sibyllenwurz*.
Sycomore *Ficus Sycomōrus*, (-Platane) *Platānus*, (unechte S.) *Melia Azedarach*.
Tabak *Nicotiana Tabācum* etc.
Tabakir (Bambuszucker) *Bambusa arundinacēa*.
Tabakspfeife *Aristolochia Siphon*.
Tabakswurz *Levīsta (-stia)*.
Tabascher s. *Tabakir*.
Tacamahae-Harz *Elaphrium* u. *Inophyllum*.
Tafelfichte *Myrrhis odorata*.
Tafeltuchbaum *Ricinus Mappa*.
Talgbaum (-beereub.) *Stillingia sebifera* u. *Croton sebifērum*.
Talglorbeer *Tetranthēra* s. *Litsēa citrifolia*.
Tangu-Gewürznelke *Jambolifera pedunculata*.
Tapioeca (-oka) *Jatropha Manihot*.
Tarant *Sweetia*, (blauer) *Gentiana Pneumonanthe*.
Tarro (Kalo, Colo) *Caladium esculentum* s. *Colocasia esculenta*.
Tartar *Crambe tatarica*.
Tartschenflechte *Cetraria*.
Tassenblume *Scyphanthus elegans*.
Taubenäpfel = zugespitzte Rosenäpfel.
Taubeere s. *Kratzbeere*.
Täubling s. *Speiteufel*.
Tauche (Seekanne) *Limnanthemum* etc.
Tausend schön (Masliebchen) *Bellis perennis*, (Bartnelke) *Dianthus barbatus*, auch *Amarantus* u. *Polygala*.
Teakholz (afrik.) *Oldfieldia*, (ind.) *Tectonia*.
Teckholz s. eben.
Teltower Rübe *Brassica Rapa esculenta teltoviensis*.
Tembesubäum (Königsholz) *Fagraea* (Fragr.) *peregrina*.
Teosinte (Guatemalagrass) *Euchlaena gigantica* s. *Reana luxurians*.

- Terpentin** (gem.) *Pinus sylvestris*, (Bordeaux-) *Pinus Pinaster*, (venetian.) *P. Larix*, (attisch. od. franz.) *P. halepensis*, (canad.) *Abies canadensis*, (cypr. od. von Chios) *Pistacia Terebinthus*, (strassb.) *Pinus Picēa* s. *Abies pectinata*.
- Tertianfieberkr.** (*Tertianaria*) *Scutellaria galericulata*.
- Teufelsabbiss** *Scabiosa Succisa* L.
- Teufelsauge** *Adonis*.
- Teufelsdorn** *Tribulus terrestris*.
- Teufelsdreck** *Ferula Asa foetida*.
- Teufelshand** *Lycopodium Selago*.
- Teufelskrallen** *Phyteuma spicatum*.
- Teufelspuppe** s. *Schlutte*.
- Teufelswirn** *Lycium barbārum*.
- Thee** (chines.) *Thea chin.*, (Blankenheimer, s. Lieber'scher), (mexik.) *Chenopodium ambrosioides*, (kuril.) *Epilobium angustifol.*, (*Sideritis herba Off.*) *Stachys Ochroleuca*, (*Sideritis herb. flore luteolo Liv.*) *Stachys recta*, (Paraguay-) s. *Mate*.
- Theemyrte** *Leptospermum scoparium*.
- Theerose** *Rosa fragrans* Röd. u. *indica Thea* Hort.
- Theriaki** (d. Opiumfresser) *Papāver somniferum*, (*Theriakwurzel*) *Valeriana Phu*, (echte) *Archangelica officinalis*.
- Thränenschwamm** (Haus-) *Merulius lacrymans*.
- Threm** (Trehm) *Platanthēra* (Breitkölbchen).
- Timotheusgras** *Phlēm pratense*.
- Tintenbeere** *Ligustrum vulgare*.
- Tintenholz** (indian.) *Terminalia Catappa*.
- Tintenwurzel** *Morinda royoc*.
- Toddy** (Blütenspindel-saft) *Kokoks-u. Fächerpalmen*.
- Totenbeinbaum** s. *Stinkapfel*.
- Totenblume** *Calendula off.* u. *Ta-gētes*.
- Tolldoecke** *Isopȳrum thalictroides*.
- Tollkorn** (Taumel-) *Lolium temulentum*.
- Tolte** (Milchsalat, -distel) *Mulgedium*.
- Tolubalsam** *Myroxylon toluiferum*.
- Tomate** s. *Liebesapfel*.
- Tongabohne** (Tonka-) *Dipteryx Tonga* etc.
- Tonkaythee** = chines. Thee, schlechteste Sorte.
- Topfbaum** *Lecȳthis Ollaria*.
- Topflorbeer** s. *Talglorbeer*.
- Topinambur** (Erdbirne, s. d.).
- Tournesol** *Croton tinctorium*.
- Träubel** (Traubenhyaicinthe) *Muscari*.
- Traubenbaum** *Coccolōba*.
- Traubeneiche** s. *Steineiche*.
- Traubenpilz** s. *Rebenpilz*.
- Traubenschimmel** *Botrytis*.
- Tremse** (Flockenblume) *Centaurea*.
- Trespe** (Dord) *Bromus*, (canad.) *B. purgans*.
- Tresterschimmel** *Stemphylium*.
- Treufkraut** (Wand-, Glas-) *Parietaria*.
- Trichterling** *Clitocybe*.
- Triftwurz** (Rapunzel, s. d.).
- Tripmadam** *Sedum reflexum* u. *album*.
- Troddeblume** *Soldanella alpina*.
- Trollblume** s. *Engelsblume*.
- Trommelbaum** *Mithridatēa* s. *Am-bōra*.
- Trompetenbaum** *Cecropia* u. *Bignonia Catalpa*.
- Trompetenblatt** (Wasserkrug) *Sarracenia*.
- Trompeten-Jasmin** *Teōma*.
- Trompetenzunge** *Salpiglossis*.
- Trossnarzisse** (Dolden-) *Narcissus Tazetta*.
- Trunkelsbeere** *Vaccinium uliginosum*.
- Tubanbaum** s. *Gutta-Percha*.
- Tuberose** (weisse) *Polianthes tub.*, (blaue) *Agapanthus umbellatus*.
- Tuneserblume** s. *Afrikaner*.
- Tupelobaum** *Nyssa aquatica*.
- Turbanheliotrop** *Tiaridium* s. *Heliotr. indicum*.
- Turbankapsel** *Tiarella*.
- Turbithwurzel** s. *Turpethrinde*.
- Turnip** (Weissrübe etc.) *Brassica Rapa*.
- Turpethrinde** *Convolvulus* s. *Ipomoea Turpethum*.
- Tusearora-Reis** *Hydropȳrum palustre*.
- Uchtblume** *Bulbocodium*.
- Ulluco** (peruv. Nahrungsmittel) *Tropaeolum tuberosum*.
- Uniformstrauch** *Amorpha*.

- Unser-Herrgotts-Bärtlein** *Spiraea Ulmaria*.
Unter-Artischoke s. Erdbirne.
Unter-Kohlrabi *Brassica Napus* s. Napobrassica.
Upasbaum s. Boa- od. Bohou-Upas, (-strauch, Upas Tiente) *Strychnos Tiente*.
Urinkraut *Phyllanthus Urinaria*.
Urkorn s. Schnee (roter).
- Vanille** *Epidendron Vanilla* (V. aromatica).
Veil (gelbe Viole) *Cheiranthus Cheiri*.
Veilchenmoos (-stein) *Lepraria Jolithus*.
Veilchenwurz *Viola* (*Jonidium* s. *Pombalia*) *Ipecacuanha*, (florent.) *Iris florentina*.
Venusfliegenfalle *Dionaea muscipula*.
Venskamm (Nadelkerbel) *Scandix pecten*.
Vennsspiegel *Campanula* (*Specularia* s. *Prismatocarpus*) *Speculum*.
Vereinsblütler *Compositae*.
Vergissmeinnicht *Myosotis palustris* etc., (Garten-) s. Denkmein, (Männertreu) *Veronica Chamæadrys*.
Vermainkraut (Vernein-) *Thesium*.
Vexiernelke (Sammet-, s. d.).
Victoriastaude (-stengel) *Rhœum undulatum*.
Vierling *Moenchia*.
Vietsbohne *Phaseolus vulgaris*.
Visetholz s. Fisetholz.
Vogelkopf *Passerina*.
Vogelpfeffer *Ornithöphe* s. Schmiedelia.
Vogelpflaume s. Ahle.
Vollfarn *Ceterach officinarum* (*Grammitis C.*).
- Wabel** (Wachsblume) *Cerinte*.
Wachs (japan.) *Rhus succedana*.
Wachsbaum *Myricaria*.
Wachsbeerentrauch s. Peterstr.
Wachsblume *Cerinte* u. *Hoya carnosa*.
Wachspalme *Ceroxylon andicola*.
Wachspflanze *Asclepias* u. *Hoya*, (ägypt.) *Secamone*.
Waid (s. Indig, deutsch.).
Walch (wilder Weizen) *Aegilops*.
- Waldmeister** (Maitrank) *Asperula odorata*.
Waldvöglein *Cephalanthëra* (*Serapias* etc.).
Waldwolle s. Wiesenwolle (Wollgras).
Waldwurz (*Fichtenspargel*) *Monotropa Hypopitys*.
Walpurgiskraut *Osmunda regalis* u. *Botrychium Lunaria*.
Wampee *Cookia*.
Wandelblume *Cineraria*, (*Widerstoss*) *Silene inflata*.
Wandelklee *Hedysarum* s. *Desmodium gyrans*.
Wandelröschen *Lantana Camara*.
Wanderbaum *Urania speciosa*.
Wauzenkraut *Actaea Cimicifuga* u. *Ledum palustre*.
- Warzenbrand** *Aecidium*.
Warzenkraut *Zacintha verrucosa*.
Wasserbaum *Tetracera potatoria*.
Wasserbirke s. Maye.
Wasserfaden (-heede) *Conferva*.
Wasserhelm *Utricularia*.
Wasserklette s. Pestilenzwurz.
Wasserknoblauch *Teucrium Scordium*.
Wasserkrug s. Trompetenblatt.
Wasserliesche *Alismacæae*.
Wasserlölch (-reis) *Zizania aquatica* s. *Hydropyrum esculentum*.
Wasserpest *Elodea canadensis* etc.
Wasserreis s. (-lölch).
Wasserriemen s. Seebälle (-gras).
Wasserscheere *Stratiotes aloides*.
Wasserwegerich (Froschlöffel) *Alisma Plantago*.
- Wasserzinken** (Igellock) *Ceratophyllum*.
Watt *Ulva lactuca*.
Wantistrauch *Broussonetia papyrifera*.
Wegtritt (Vogelknöterich) *Polygonum aviculare*.
Weiberkrieg (Hauhechel) *Ononis spinosa*.
Weichselholz (-kirsche) s. Steinweichsel.
Weihnachtsrose s. Christblume.
Weihrauch (echt. indisch.) *Juniperus Lycia*, (gem.) *Abies excelsa* (*Pinus Abies L.*).
Weihsprossen (Eisenkraut, -hart, s. d.).
Weinblume (Nachtkerze) *Oenothera*.

- Weinpalme** *Mauritia vinifera*, *Borassus flabelliformis*, *Raphia* s. *Sagrus vinifera* u. *Oenocarpus*.
Weinraute *Ruta graveolens*.
Weinrose *Rosa rubiginosa*.
Weisseeder *Libocedrus*.
Weissebern (Masholder) *Acer campestre*.
Weisstanne (Edel-) *Abies pectinata* (*Pinus Picea* L.).
Weissviole *Arabis alpina*.
Weisswurz *Convallaria Polygonatum*.
Wendich (Brachschötchen, s. d.).
Wergtang *Sphaacelaria Scoparium*.
Weterröschchen s. Stundenblume.
Weymouthskiefer *Pinus Strobus*.
Wicke (ewige) *Lathyrus latifolius*, (span.) *L. odoratus*.
Widerstoss *Statice* u. *Silene inflata* etc.
Widerthon *Polytrichum*.
Wielandskraut (Wiesenraute) *Thalictrum*.
Wier s. Seegrass (-bälle).
Wiesengeld s. Pfennigkraut (Münz-).
Wiesenhafer (franz. Raygr., s. d.) u. (Hafergr.) *Avena pratensis*.
Wiesenkohl *Cirsium oleraceum*.
Wiesenkönigin s. Mädesüss.
Wiesenwolle (Wollgras) *Eriophorum*.
Wilhelm (wohlriech.) *Dianthus proflifer* s. *Tunica prolifera*.
Windapfel *Melodinus*.
Windfahne (-halm) *Apera spica venti*.
Windhafer (Flug-) *Avena fatua*.
Windschock (Repsdotter, Hederich) *Rapistrum* s. *Myagrum perenne*.
Winke (Sinngrün) *Vinca*.
Winteraster *Pyrethrum* s. *Anthemis artemisifolia*.
Winterbeere *Prinos verticillata*.
Winterblume *Gnaphalium arena-rium*, *Gomphrena* u. *Eranthemis hiemalis*.
Wintereiche s. Steineiche.
Wintergrün (Sinn-) *Vinca*, u. *Pyrola* (*Piröla*).
Winterheliotrop *Tussilago* s. *Nardosmia fragrans*.
Winterkraut s. Speckmelde.
Winterkresse *Erysimum Barba-raea* L.
Winterlevoje *Matthiöla incana*.
Winterlinde (Stein-) *Tilia microphylla* s. *parvifolia*.
Winterling *Eranthemis* s. *Helleborus hiemalis*.
Winterrinde (Wintere) *Drimys Winterana* (*Wintera aromatica* Off.) u. *Canella alba* s. *Winterana* G. (*Winterania Canella* L.).
Wirrschwamm *Daedalea quercina*.
Wirsing s. Savoyerkohlrabi.
Witschen *Aspaläthus*.
Wittwenblume *Vidua* s. *Scabiosa atro-purpurea*.
Wolfsbeere (Ein-) *Paris quadrifolia*.
Wolfsrauch *Lycoperdon*.
Wolfswurz *Aconitum Lycoctonum*.
Wollblume *Verbascum* u. *Anthyllis*.
Wucke (Wuke) s. Unter-Kohlrabi.
Wunderblumenstrauß *Pisonia*.
Wunderklee (Stein-) *Melilotus officinalis*.
Wundkraut *Sedum Anacampseros* s. *rotundifolium*, (heidn.) *Solidago Virgaurea*.
Wurara-Pfeilgift *Paullinia australis* s. *toxicaria*.
Wurmfarn *Aspidium Filix mas*.
Wurmmoos (-knotentang) *Sphaerococcus* s. *Ceramium Helminthochortos*.
Wurmkraut (Rainfarn) *Tanacetum vulgare*.
Wurmlattich *Virca* s. *Helminthia echioides* (*Picris ech.*).
Wurmsamen (Zittwer, semina Cinae Off.) *Artemisia judaica* L. (*Contra* u. *vermifuga*) u. *A. Santonica* (*Santonicae*, *Contrae* s. *Cynae semina* Off.).
Wurstkraut *Origänum Majorana*.
Wurzelbaum *Rhizophora Mangle*.
Würger (Hunds-) *Cynanchum*.
Würzkraut *Saturja Thymbra*.
Wüsten-Manna *Tamärix gallica*.
Yamswurzel *Dioscorea sativa* u. *bulbifera*.
Yukkawurzel (Stärke-) *Jatropha Manihot*.
Zalmbaum (ägypt.) *Ximenia* s. *Balanites aegypt.*
Zahnkorallen s. Pfingstrose.
Zahnwehholz (Gelb-) *Xanthoxylon* s. *Fagara piperita*.

- Zapfenfarn** (Sago-) *Zamia lanuginosa*.
Zapfenholz (Faulbaum) *Rhamnus Frangula*.
Zapfenkraut s. Affenblatt.
Zauke (Maiblume) *Convallaria majalis*.
Zaun-Ananas *Bromelia Pinguia*.
Zäunling (Geisblatt) *Lonicera*.
Zaunrebe (Wild-) s. Jungfernrebe.
Zebraholz *Omphalobium Lambertii*.
Zedrach *Melia Azadirachtha*.
Zehrwurz *Arum maculatum* u. *Caladium esculentum*.
Zeiland (Seidelbast etc.) *Daphne*.
Ziellernuss *Corÿlus tubulosa*.
Ziegenbart *Spiraea Aruncus* u. *Sp. Ulmaria*, (Korallenschwamm) *Clavaria*.
Ziegenlippe *Bolëtus subtomentosus*.
Zier (Schminkwurz) *Anchusa tinctoria*.
Zigeunerkrant *Lycopus europaeus*.
Zille (Meerzwiebel) *Scilla*.
Zimmetbaum (Ceylon-) *Laurus* s. *Persëa Cinnamomum*, (Cassien-) *Persëa Cassia*.
Zimmeterdbeere *Fragaria elatior*.
Zindel *Cicendia*.
Zinken s. Wasserzinken.
Zinnkraut (Scheuer- etc.) *Equisetum arvense*.
Zipollen (Sommerzwiebel) *Allium Cepa*.
Zitteralge s. Schleimling.
Zittwer (deutsch.) *Acörus Calämus*, (-Ingwer) *Amomum Zedoaria*.
Zittwersamen s. Wurmsamen.
Zittwerwurzel (Block-Ingwer, s.d.).
- Zottelblume** (Zotten-) = Bitterklee (Fieber-).
Zuckererbse *Pisum sativum arvense*.
Zuckerpflaume *Hedycrëa* s. *Licania*.
Zuckerrose s. Essigrose.
Zuckerrübe *Sium Sisärum*, (Runkel-) *Beta vulgaris rapacea* u. *B. Cicla rapacëa*.
Zuckertanne *Pinus Lambertiana*.
Zuckerwurzel (-rübe) *Sium Sisärum* u. *Pastinäca sativa*.
Zunderholz *Agave americana*.
Zunderschwamm *Polypörus igniarius* u. *fomentarius*.
Zürbelkiefer (-tanne) *Pinus Cembra* (Zutsche).
Zutsche, s. eben.
Zwang (Krähenfuss) *Coronöpus*.
Zweckenbaum s. Zapfenholz.
Zweiblatt *Listëra bifolia* u. *Majanthëmum bifolium*.
Zwergglocke *Wahlenbergia hederacëa*.
Zwerg-Lerkoje *Cheiranthus* s. *Matthiöla fenestralis*.
Zwergmispel *Cotoneaster* u. *Pirus Chamaemespilus*.
Zwenke *Bromus* s. *Brachypodium*.
Zwetsche (-tschge) *Prunus domestica* s. *oconomica*.
Zwiebelbaum (Madagascar-) *Vangueria*.
Zwiesel *Turgenia*.
Zwillingspflaume *Dimocarpus Litchi* s. *Sapindus edulis*.
Zwirnhülse *Xysmalobium* s. *Asclepias*.
Zymbelblume *Nolana*.
Zymbelkraut s. Cymbelkr.

III. Botanische Litteratur.

a. Die Autoren nebst Personalien und wichtigsten Werken.

- Abel**, Reiter u. Abel, Besch. d. in Deutschl. seltner wildwachs. u. einiger naturalis. Holzarten, Stuttg. 1803. — **Abēla** Salisb.
- Ach.** = **Acharius**, schwed. Bot., † 1819, schr. *Methōdus Lichēnum*, *Lichenographia* etc. — **Acharia** Thb.
- Adams**, russ. Bot. u. Reis. in Sibirien 1800 u. Kauskasus 1805—06. — **Adamsia** Fisch., Willd.
- Ad.** = **Adanson**, franz. Bot. u. Reis., † 1806, schr. *Hist. d. l. Bot. et plan des familles natur. etc.* — **Adansonia** L.
- Afz.** = **Afzelius**, schwed. Prof. u. Reis. in Sierra Leone, † 1837, *Afz. u. Elgenstierna, Genera plant. Guineensium*, Upsalae 1801. — **Afzelia** Sm. Ehrh.
- Ag.** **Agd.** = **Agardh**, C. A., schwed. Prof. u. Bischof, † 1859, *Dispositio Algarum Sueciae*, 1810—12, *Lehrb. d. Botanik*, Kopenh. 1831—32 u. a. — **Agardhia** Spr. — **Agardh**, D. G., *Theoria systematis pl.*, Lundae 1858.
- Ahnfelt**, Nils Otto, schwed. Bot., *Genera plant. Guineensium* etc. 1804. — **Ahnfeltia** Ag.
- Ait.** = **Aiton**, Aufs. d. Kew-Gärten bei London, † 1793, *Hortus Kewensis*, Ed. II., 1814. — **Aitonia** L. f.
- Albertini** v. aus Neuwied, † 1831, *Dissert. üb. Pilze, Alb. u. Schweiniz, Conspect. fungorum in Lusatae superioris agro Niskiensi cresc.*, 1805. — **Albertinia** Spr., -niēae DC.
- Aldrovandi**, Ulyss., Prof. z. Bologna, † 1605, *Dendrologiae libri II*, 1690; *Pomarium curiosum*, Bononiae 1692. — **Aldrovanda** Monti.
- Alfld.** = **Alefeld**, Dr., Arzt u. Bot. z. Nied.-Ramstadt (Gr. Hessen), † 1865, schr. *üb. d. Fam. d. Pyrolaceae*, Halle 1856, *Bienenflora Deutschl.'s*, 1863; *landw. Flora*, Berl. 1866.
- All.** = **Allioni**, Prof. zu Turin, † 1804; *Rariorum Pedemontii stirpium specimen*, 1755; *Flora Pedemontana*, 1785 u. a. — **Allionia** L.
- Alpin**, Prosper (Alpinus), Reis. im Orient, † 1617. *De plantis Aegypti*, Vened. 1592. — **Alpinia** L.
- Ammann**, J., *Stirpium rarior. in imper. Rhuteno etc. Petropoli*, 1739. **Ammannia** L. — **Ammann**, A., *die Pflanzenkrankh.*, Stuttg. 1867.
- Anderson**, mehrere engl. Bot., **Anderson Thom.**, *Dir. d. bot. Gart. in Calcutta*, schr. *Fl. Adenensis* 1860, *Ceylon Acanthaceae* etc., **And.**, Will., *Bot. d. Cook'schen Expedition.* — **Andersonia** R. Br. — **And.**, James, † 1809 in Madras.

- Andersson**, N. J., schr. Monogr. *Andropogonearum* (I. Anthistiriäe), Holmiae 1856, Mon. *Salicum* etc. Holm. 1867 u. a.
- Andreü** (Andreae), J. G. R., Apoth. in Hannover, † 1793, Briefe aus d. Schweiz m. Kupf., Zürich etc. 1776. — *Andreaea* Hedw.
- Andr.** = **Andrews**, H., Pflanzenmaler in Lond. The botanist's repository etc. 1799—1811. — *Andrewsia* Spr. — **Andrews**, C., *Geraniums*, a Monogr. London 1805—06.
- Andrz.** = **Andrzejowsky**, russ. Bot., Prof. in Wilna, † 1868, *Czackia*, genre determ. etc. 1818, *Diction. glossologiae bot.* 1827 u. a. — *Andreoskia* DC.
- Angreville**, J. E. d', schr. *La flore Vallaisanne*, Genève 1863.
- Ant.** = **Antoine**, Franz, Dir. d. k. k. Gart. z. Schönbrunn, schr. die Coniferen, Wien 1840—47, d. Wintergarten etc. 1852. — *Antonia* Endl.
- Arn.** = **Arnott** (Walker-Arnott), Prof. z. Glasgow, † 1868, *Tent. method. muscorum*, 1825; *Pugillus plant. Indiae orient.*, 1836. — *Arnottia*, Rich. — **Arnott**, A., neue indische Pfl. — **Arnott**, G., üb. *Torreya*.
- Arrabida**, Antonio de, Bisch. in Brasil, schr. *Fl. Fluminensis* (Fl. v. Rio-Janeiro).
- Arrude**, de Camara, schr. 1810 üb. brasil. Pflanzen. — *Arrudēa* Camb.
- Ascherson**, Ferd. Mor., Prof. in Berlin, schr. *de fungis venenatis*, Berlini 1828, *pharmaz. Bot. in Tabellen* 1831. — **Ascherson**, P. u. Kanitz, *Catal. pl. Serbiae, Bosniae etc. Claudiopoli* (Klausenburg) 1877. — **Ascherson**, P. Fr. Aug., *Custos d. k. Herbar. z. Berlin*, schr. *Fl. d. Prov. Brandenb. etc.*, Berl. 1866.
- Askenasy**, E., Prof. in Heidelb., schr. üb. *Pfl.-Physiologie in d. bot. Zeitg.* 1877, *Beitr. z. Kenntniss d. Chlorophylls*, u. a.
- Asso**, Ignacio, span. Bot., schr. *Pl. hispaniensium Epistōlae*, Zaragossae 1793 (Briefe an Clusius). — *Assonia* Cav.
- Athanasius**, E., schr. *Hist. radicis Scillae marinae*, Halae 1794. — *Athanasia* Cass.
- Aubert**, C. M., Aubert du Petit-Thouars, s. *Pet.-Thou.* — *Aubertia* Bory.
- Aubl.** = **Aublet**, franz. Bot. u. Reis. in Guiana, † 1778, schr. *Hist. des pl. d. l. Guiane Franç.*, 1775. — *Aubletia* Schreb. L. f. etc.
- Aubenton** s. Daubenton.
- Auer**, A., schr. d. Entdeckung des Naturselbstdrucks, Wien 1854.
- Awd.** = **Auerswald**, Bernh., Lehr. u. Mykologie in Leipzig, † 1870, A. u. Rossmässler, *bot. Unterhalt. etc.*, Lpz. 1858, A. *Anleit. z. Botanisieren*, Lpz. 1860.
- Babington**, Prof. z. Cambridge, schr. *Fl. Bathoniensis* 1834, *Manual of brit. bot.* Lond. 1843, *Primitiae Fl. Sarnicae* (Fl. d. engl. normänn. Canalinseln, 1839).
- Bachmann** s. Rivinus.
- Bail**, schr. *Mykolog. Studien*, d. wichtigst. Sätze d. neueren Mykologie, Jena 1861 u. a. m.
- Bak.** = **Baker**, J. G., *Syst. Iridearum*, 1877, *Fl. of Mauritius and t. Seychelles*, Lond. 1877; *bed. Liliaceen-Kenner in Kew bei London*.
- Balf.** = **Balfour**, J. H., a manual of bot., illustr. etc., Lond. 1851, t. *botanist's companion with a glossary of bot. terms*, Edinb. 1860. — *Balfouria* R. Br., *Balfourodendron* (g. n.). — **Balfour f.**, J. B., *aspects of t. phaenogam. veget. of Rodriguez*, Linn. Soc., 1876, *accounts of some exper. on Dionaea*, Edinb. 1876.
- Baranetzky**, Prof. in Kiew, üb. *tägl. Periodicität im Wachstum d. Internodien* u. a. (*Bot. Zeitg.* 1877 etc.).
- Barckhausen**, G., *Fasc. Plant. ex Flora comit. Lippiaci*, Goetting. 1775. — *Barckhausia* Mnch.

- Barker-Webb**, schr. m. Berthelot Hist. nat. des Iles Canaries etc., Paris 1835—41. — *Barkeria* Lindl.
- Barnéoud**, Monogr. d. Plantaginées, Paris 1845, B. u. Brongniart, Mém. sur l. fam. des Rhannées, Par. 1826, u. a.
- Barrelier**, Jacq. (Barrelierus Jacobus) Barrelieri Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observ., Parisiis 1714. — *Barleria* L.
- Bartling**, Fr. G., Prof. in Götting., † 1875, B. u. Wendland, Beitr. z. Bot. 1824—25. — **Bartling**, Fr. Th., Ord. nat. plant. 1830. — *Bartlingia* Rehb.
- Barton**, Benj. Smith, Prof. in Philadelphia, † 1815, Fl. Virginica, Elements of Botany u. a. — *Bartonia* Pursh. — **Barton**, J., lecture sur la géogr. des plant., trad. p. Marschall, Brux. 1829.
- Bartsch**, schr. Fl. d. Umgeg. v. Ohlau in Schlesien, Ohlau 1854. — **Bartsch**, Joh. von Königsberg, Bot. u. Reis. in Surinam, † 1738. — *Bartschia* L.
- Bary** s. de By, **de Bary**, H. A., s. 1872 Prof. in Strassb., ber. Kryptog., s. 1867 Red. d. Bot. Zeitg., schr. naturw. Elementarb. d. Bot., Strassb. 1878 u. v. a.
- Batalin**, Gegner Darwin's, schr. üb. Mechanik d. Bewegung insektenfress. Pfl. (in d. Flora 1877).
- Bateman**, James, schr. Orchidaceae of Mexico and Guatemala, 1873—43, u. a. — *Batemania* Lindl.
- Batsch**, Prof. in Jena, † 1802, schr. Elenchus Fungorum 1783—89, Dispos. Gen. pl. Europae, Jenae 1794, Bot. für Frauenzimmer, Weimar, 3. A. 1804, u. a. — *Batschia* Mehx., Thb.
- Battarra**, J. A., † 1789, schr. Fungorum agri Ariminensis Hist., Faventiae 1755. — *Battarraea* Pers.
- Bauhin**, Casp. u. Joh., Brüder, Bot. d. 16. Jahrh.'s, schr. Kräuterbücher, unvollend. C. Bauhinus, Prodrum. theatri bot., Basil. 1671, J. Bauhin, Hist. plant. univers., lang nach s. Tod! — *Bauhinia* L., Plum.
- Baumgarten**, Bot. u. Reis. in Siebenbürgen, Arzt, † 1843, schr. Fl. Lipsiens. etc., Lips. 1790, Enumer. stirpium Transsilvaniae indigen. 1816. — *Baumgartenia* Spr.
- Beal**, amerik. Bot., schr. Carnivorous plants (Proceed. of t. Amer. Assoc. 1876).
- Beauv.** (P.-B.) s. Palisot de Beauvais.
- Beccari**, O., bot. Reis. in Borneo u. Sumatra, schr. Malesia raccolta etc. alle piante dell' Archipelago Indo-Malese e Papuano, Genova 1877 u. Beitr. im Giornale bot. Italian.
- Béchamp**, Prof. d. Chemie in Montpellier, üb. Gährungs- u. Seidenraupenpilze in Comptes rendues s. 1865.
- Bechstein**, Forstrat in Meiningen, † 1822, schr. Forstbotanik, 5. A., 1843.
- Beckmann**, Joan., Lexicon botanicum, Göttingen 1801. — *Beckmannia* Host.
- Beilschmied** s. Wickstroem.
- Bellardi**, Prof. in Turin, † 1826, schr. De Mimosa sentiente, 1764, Appendix ad Fl. Pedemont. 1792. — *Bellardia* All.
- Bellenden-Ker**, schr. Iridearum genera, Brux. 1827. — *Bellendōna* R.Br., Keria DC.
- Beltramini** de Casati, schr. i licheni Bassanesi etc., Bassano 1858.
- Bemmelen**, J. A. v., schr. Repertorium annum liter. Botanicae period., Harlem 1873.
- Bennet**, John Jos., Vice-Präs. d. Lond. Linn. Soc., schr. Pl. javanicae etc. 1838. — *Bennetia* Gray.
- Benth.** = **Bentham**, G., Präs. d. Lond. Linn. Soc., schr. Labiatarum

- Gen. et Spec. 1832—36, Fl. Hongkong. Lond. 1861, handb. of t. brit. Fl. 1865, **B. u. Hooker**, genera plantar., Lond. 1862—67. — *Benthamia* Lindl., *A. Rich.*
- Berg**, O., Florae Brasil. Myrtographia, Lips. 1858, - mantissa I u. II ad revisionem Myrtacearum Americ., Hal. 1859—60.
- Berg.** = **Bergius**, Prof. in Stockh., † 1790, schr. Deser. plant. ex Capite Bonae spei, 1767.
- Berk.** = **Berkeley**, engl. Kryptog., **B. u. Broome**, viele mykolog. Beitr. in Zeitschr., z. B. essb. Pilze v. Feuerland, Introd. to crypt. bot., Lond. 1857, brit. Fungi etc. — *Berkeleya* Grev.
- Berlandier**, J. L., † 1851 in Mexiko, schr. Grossulariae etc., Genf 1828. — *Berlandiera* DC.
- Bernh.** = **Bernhardi**. Prof. in Erfurt, † 1850, schr. Catal. pl. Horti Erfurt. 1799, Anleitg. etc. 1804 u. a. — *Bernhardia* W.
- Bertoloni**, Prof. in Bologna, † 1869, schr. Fl. ital. 1838—54, Fl. ital. cryptog. 1858—67. — *Bertolonia* Spr., DC.
- Besler**, Bas., Apoth. z. Nürnberg, † 1629, schr. Hort. Eystettens. (bisch. Gart. z. Eichstädt), Norimb. 1613. — *Besleria* L.
- Besser**, W. v., Prof. z. Krzeminec in Volhynien, † 1842 als Dir. in Kiew., schr. Primitiae Fl. Galiciae Austriae utriusq., 1809. — *Bessera* Spr. u. *Besseria* Schult.
- Betke**, E. F., Animadvers. bot. in Valerianas, Rostocki 1826, Monogr. d. Brombeerstr. Mecklenburgs, 1850. — *Betkea* DC.
- Biasoletto**, Dr., schr. üb. Hydrodictyon, Rapport s. l. travaux d. l. sect. bot. des naturalistes à Pise, u. a. — *Biasolettia* Koch.
- Bieb.**, **M. B.** = **Marschall v. Bieberstein** (Biberstein), russ. Bot., † 1826, Pfl. d. Kaukasus u. Südrusslands. — *Biebersteinia* Steph., DC.
- Bigelow**, Prof. z. Boston (N.-Amer.), Florula Bostoniens. 1814, American Medical Bot. 1817—21. — *Bigelovia* Sm., DC., Nees.
- Billardier**, J. J. (vgl. Labillardier), Icones plant. rarior. Syriae etc. Dec. I, Paris 1791. — *Billardiera* (-deria) Sm.
- Billot**, C., schr. Annotations à la Flore d. l. France et d. l'Allemagne, Haguenau 1855. — *Billotia* Collad.
- Bischoff**, G. W., Prof. in Heidelb., † 1854, schr. d. Kryptog. Deutschlands 1828, Lehrb. d. Bot. 1834—40, Handb. d. bot. Terminologie u. Systemkunde 1844, u. a. — *Bischofia* Blume.
- Bivona-Bernardi**, Antonio, † 1834 in Messina, schr. Sicular. plant. Centuria I et II, Stirpium rar. Siciliae etc. 1813—16. — *Bivonaea* DC., -vonina (-nēa) Spr., Raf. u. *Bernardia* Mich.
- Blackwell**, J., schr. Collect. stirpium etc., 5 B. — *Blackwellianum* herbarium emend. et auct., Norimb. 1757—73.
- Blandow**, Apoth. z. Waren (Mecklenb.), † 1810, schr. Mecklenburgs Moose, 1809. — *Blandovia* W.
- Bl. Fing.** = **Bluff u. Fingerhuth**, Compend. Flor. German. 1825—33.
- Blume**, Dr. C. L., Prof. z. Leyden, schr. Mus. bot. Lugduno-Batav. 1849—56, Neesia, gen. pl. javan. 1834, Rumphia s. comment. bot. de plantis Indiae Orient., Lugd.-Bat. 1836, Fl. Javae etc., Brux. 1829. — *Blumēa* DC., -mia Spr.
- Blytt**, Prof. z. Christiania, † 1862, schr. mit A. de Candolle üb. d. Einwander. d. alpinen Pfl. nach d. Eiszeit (t. immigration of t. Norwegian Flora etc.), Christiania 1876. — *Blyttia* Endl., Walk.-Arn.
- Boccone**, S. P., schr. Icon. et descr. rarior. plant. Siciliae etc. (52 T.), Oxford 1674 (Museo di piante rare della Sicil., Malta etc., Venetiae, ed. II, 1697). — *Bocconia* L., Plum.
- Boerhave**, Prof. z. Leyden, † 1738, schr. Index pl. . . in horto academ. 1710 u. Index alter etc. 1720. — *Boerhavia* L.

- Böhm, J.**, Pfl. Physiol. z. Wien, schr. üb. Chlorophyll 1857, Ursache d. Saftsteigens 1863, Stärkebildg. 1876 etc.
- Böhmer**, Prof. z. Wittenberg (Boehmērus), schr. Fl. Lipsiae indigēna, Lips. 1750, de pl. fasciatis 1752, Lexic. rei herb. cont. etymologiam nominum, Lips. 1802. — *Boehmeria* Jacq. (-ra Lk.).
- Bojer**, Wenzel, von Prag, † 1865 auf Mauritius, schr. Hort. Mauritianus, 1837. — *Bojeria* DC.
- Boissier**, Edm., Genfer Patrizier, Reis. im Orient, B. u. E. u. F. **Buhse**, Aufz. d. in Transkauk. u. Persien ges. Pfl., Moskau 1860 (in De Cand.'s Prodromus). — *Boissieria* Domb.
- Bolle**, Dr. C., Vors. d. Vereins f. Gartenbau in Preussen, Herausg. d. „Deutscher Garten“, Monatsschr., Berlin. — *Bollēa* Rehb. f.
- Bolton**, Jam., Bot. in Edinb., schr. Filices brit., Leeds 1785, Hist. of fungusses (deutsch v. Willdenow) 1795—1820. — *Boltonia* Schreb., l'Hér.
- Bongard** u. C. A. Meyer, Verz. d. am Saisang-Nor u. Irtisch ges. Pfl., Petersb. 1841, B. Monogr. des Espèces d'Eriocaulon du Brésil, Petersb. Akad. 1831. — *Bongardia* Rauw.
- Bpl. = Bonpland**, Aimē, franz. Bot. u. Reis. (Begl. v. A. v. Humboldt 1799), † 1858, schr. Plant. équinoxiales réc. au Mexique u. Monogr. des Mēlastomes. — *Bonplandia* W. u. Ztschr. *Bonplandia*, v. Seemann, Hannov. 1853—59.
- Borkhausen**, Assess. d. Ob.-Forst-Coll.'s z. Darmst., schr. Forstbot. od. Beschr. d. in Hess.-Darmst. wachs. Holzarten, Frankf. 1790, Rhein. Museum 1793, Bot. Wörterb., 2 B., Giess. 1797. — *Borkhausia* Böhm. (-senia Fl. Wett.).
- Boreau**, Alex., von Saumur, schr. Fl. du Centre d. l. France, 3. Aufl. 1857, u. a. — *Boreaua* Spach.
- Bornet**, Prof. z. Cherbourg, Kryptog., B. u. Thuret, Recherch. s. l. fécond. des Floridées 1867 u. s. l. gonidiēs des lichens (Ann. d. Scienc. nat. XVII).
- Bory de St. Vincent**, franz. Bot. u. Reis., schr. Exped. scient. de Morée, 1832, nouv. Fl. du Peloponnèse et des Cyclades, 1838. — *Borya* W., Lab., R. B.
- Borszczow**, E., d. pharmaz. wicht. Ferulaceen d. casp. Wüste, etc., Untersuchungen üb. d. Gummiharze *Asa foetida*, *Ammoniacum* u. *Galbanum* (8 kol. T.), Petersb. Akad. 1860, d. arabo-casp. Calligoneen (ds. 1860).
- Bosc**, Prof. z. Paris, schr. Mém. s. quelques espèces de champignons d'Amer. 1814, s. l. diff. esp. de chênes etc. en France 1808. — *Boscia* Lam., Thb.
- Bosch**, R. B. van den, schr. Hymenophyllacēae Javanicāe, Amsterd. Akad. 1861. — *Bosquiāa* Bak.
- Bosse**, Oldenb. Hofgarten-Insp., † 1864, schr. Vollst. Handb. d. Blumen-gärtnererei, 3. A., Hannov. 1859, u. a.
- Bot. Reg.**, Botanisches Register (botanical register), angef. v. Bell.-Ker, fortgef. v. Edwards u. Lindley, Lond. 1815—47.
- Bouché**, P. Fr., Garten-Bes. z. Berlin, † 1856, schr. Garteninsekten, 1833 u. 34, d. Zimmer- u. Fenstergarten, 5. A., Stuttg. 1821, Gartenbotanik; **Bouché**, P. Fr. u. C. **Bouché**, d. Blumenzucht etc., 2. A., Berl. 1854/56.
- A. Br. = Braun**, Alex., Geh. Reg.-Rat, Dir. d. k. bot. Gartens, Prof. in Berlin, † 1877, schr. Vieles üb. Kryptogamen, Pfl.-Physiol., Verjüngung in d. Natur u. a. m. — *Braunia* Schimp.
- Brefeld**, Docent d. Bot. z. Würzburg, schr. Pilze etc. — *Brefeldia* Rostaf.
- Bretschneider**, E., schr. Botanicum Sinicum, notes on etc., Lond. 1882, u. a.

- Breyn(e)**, Jak., schr. Exoticar. plant. Centuria etc., Gedani 1678; Breynii Prodröm. rar. pl., Gedani 1739. — Breynia Plum., Schreb.
- Bridel-Brideri**, S. El. v., † 1828, schr. Muscologia recentiorum etc., Gothae 1797—1822, Bryologia universal., Lips. 1826/27. — Bridelia W.
- Brignoli** a Brunnhof, Prof. z. Modena, † 1857, schr. Horti Mutinensis Hist. 1842, Catal. pl. etc. 1817, u. a. — Brignolia Bertol.
- Brongniart**, M. A. Th., Prof. z. Paris, † 1876, schr. Hist. des végët. fossiles, 1828—44, chronol. Übers. d. Vegetationsperioden etc. (deutsch v. K. Müller, Halle 1850), Enumér. des genres de plantes, Par. 1859. — Brongniartia H. B. K.
- Broome** s. Berkeley.
- R. Br. = Brown**, Robert, d. grösste Bot. Englands, schr. Vermischte bot. Schriften (deutsch v. Nees), Fl. Novae-Hollandiae, Lond. 1810, u. a. m. — Robertia DC., Mer.
- P. Br. = Browne**, Patrik, irisch. Bot., schr. Pfl. von Jamaika. — Brownea L., Jacq.
- Bruch**, Apoth. z. Zweibrücken, † 1847, **Br.** u. **Schimper**, Bryologia europaea, 1837 f. — Bruchia Schwägr.
- Brückmann**, F. E., schr. notae et animadv. in Bauhinii prodrömum, Wolfenbütt. 1737, - idem in Pisonis et Bontii libros de Indiae etc., das. 1737, - idem in Ruppil Fl. Jenens., - Konokarpodendron (Artischoke) u. a.
- Brunfels**, O., aus Mainz, † 1534 in Bern, d. erste deutsche Bot., Herb. vivi Icones 1530. — Brunfelsia L.
- Buch**, Leop. v., schr. allgem. Übers. d. Flora auf d. canar. Inseln, Berl. 1819.
- Buchanan**, später Lord Hamilton, schott. Bot. u. Reis. in Indien. — Buchanania Roxb., Spr.
- Buchenau**, Fl. v. Bremen, 1877, Flora der Maulwurfshügel u. a.
- Buek**, M. D., Med.-Assess. z. Frankf. a. O., † 1856, schr. Index gen. et spec. ad Decandolli Prodrömum etc., Berol. 1840 u. 42. — Buekia Kth.
- Bulliard**, Pet., franz. Pilzforscher, † 1793 z. Paris, schr. Fl. Paris. 1776—80, Hist. d. pl. vénën. d. l. France, Diction. d. l. Bot., 1797. — Bulliarda DC., Neck.
- Bunge**, A. v., Enum. pl. Chinae borealis, Petersb. 1838, Plantar. Mongholico-Chinens. Dec. I, Anabasearum Revisio, Petersb. 1862, u. a.
- Burm.** = **Burmman**, Joh., Linné's Patron, schr. Fl. Zeylanica (The-saurus zeyl.), Amsterd. 1737, Rar. African. plant. Decades X, Amstelod. 1738, u. a. — **Burmman f.**, Prof. in Amsterd., schr. Fl. Ind. m. Prodröm. 1734—93, Fl. Capens., Lugd. Bat. 1768. — Burmannia L.
- Buxbaum** aus Merseburg, Reis. in Kleinasien, Akad. in Petersb., schr. Plantar. minus cognit. Centuriae, compl. plantas circa Byzantium, 1728—40. — Buxbaumia Hall., L.
- By de** s. Bary de.
- Cäsalpinus**, Andr., Prof. z. Pisa, päbstl. Leibarzt etc., † 1603, schr. de plantis libri XVI etc. — Caesalpinia L.
- Camb.** = **Cambessèdes** von Montpellier, † 1863, schr. Enumer. plant. quas in Balearibus etc., 1827, u. a. — Cambessedia DC. (-ëa Kth.).
- Camerarius**, Joachim, schr. Hort. medicus et philos. etc., Francof. 1588, Matthioli Krentterbuch, neue Aufl.; — Opuscula botanici argumenti, ed. J. Chr. Mikau, Prag 1797. — Cameraria L.
- Campdera**, schr. Monogr. du genre Rumex, Paris 1819. — Campderia Bull., Lag.
- Cand.** = **Candolle**, de, s. DC. de Candolle.

- Carlowitz**, G. Frhr. v., k. Kammerh. in Dresden, schr. Modifik. d. v. Truchsess. Kirschen-Systems 1819, Catalog d. Dresdener Obstbaumschule. — Carlowitzia Mnch.
- Carmichaël**, schott. Bot., † 1827, schr. Fl. insulae Tristan da Cunha. — Carmichaëlia R. Br.
- Carr.** = **Carrière**. M. E. A., Chef des Pépinières im naturh. Museum v. Paris, Red. d. Revue horticole etc., schr. Traité général des Conifères, Paris 1860.
- Carter**. Reis. im Somali-Land (Afr.), Entd. von Boswellia-Arten in d. sechziger Jahren.
- Casearius**, Joh., Mission. in Cochinchina (17. Jahrh.), schr. d. Text zu d. ersten Bänden d. Hort. malabaricus. — Casearia Jacq.
- Caspary**, R., Prof. d. Bot. z. Königsberg, schr. de nectariis, Bonn 1848, üb. d. Flora v. Preussen, 1863, üb. Blüten sprossen auf Blättern, 1874, u. a. — Casparya Kth.
- Cassebeer**, schr. Entwicklung d. Laubmoose, Frankf. 1823. — Cassebeera Kaulf.
- Cass.** = **Cassini**. Henri, franz. Bot., schr. Synanthereen, 1826—34. — Cassinia R. Br.
- Car.** = **Cavanilles**, Prof. d. Bot. z. Madrid, † 1804, schr. Monadelphiae classis Dissertt. X, Icones et descr. plantar. etc., 1791—1801. — Cavanillœa Gu., Thb., Cavanillesia Rz. Pv.
- Catesby**, M., schr. Hortus Britanno-Americanus (trees, shrubs etc.), Lond. 1763, Naturg. v. Carolina etc. — Catesbaea Gron., L.
- Celakowski**, Pfl.-Physiolog, schr. z. B. üb. terminale Ausglieder., Prag 1875, üb. Asclepias etc., 1877, u. a.
- Celsius**, Olaus, schr. Hierobotanicon, Upsaliae 1745—47. — Celsia L.
- Cesati**, Bar. v., Prof. in Neapel s. 1868, C., Passerini u. Gibelli, Compend. de Flora italiana, Mail. s. 1869. — Cesatia Endl.
- Chabrius**, Herausg. von J. Bauhin's Hist. pl. univers., 1650—51 (vgl. Bauhin). — Chabraea DC.
- Chaix**, Dom., † 1800, Pfarr. bei Gap (Dauphinée), schr. Fl. d. Dauphinée. — Chaixia Lap.
- Cham.** = **Chamisso**, Adelb. v., Dicht. u. Bot., † 1838 als Custos d. bot. Inst.'s zu Berlin, schr. Übers. d. nützl. u. schädl. Gew. etc., 1827. — Chamissoa H. B. K.
- Champin**, Aimé, der Weinstock, seine Kultur u. Veredelung, deutsch v. Dr. L. Rösler, Wien 1882.
- Chaptal**, Comte de, Rozier etc., Traité théor. etc. sur la cult. de la Vigne. — Chaptalia Vent.
- Chavannes**, Ed., Introd. à la Flore helvétique de Mr. Gaudin, 1830; Monogr. d. Antirrhinées 1833.
- Cherler**, Prodrômus Hist. plant. universalis J. Bauhini, 1619; Bauhinus, J., et Cherler, hist. pl. univ., rec. Chabraeus et Graffenried (3 vol. c. m. fig.), Ebrodun. 1650—51. — Cherleria L.
- Chev.** = **Chevalier**, † 1840 z. Freiburg i. Br., schr. Hist. des Graphidées 1824, Fungor. et Byssor. illustr. 1837. — **Chevallier**, A., schr. du Café etc., Paris 1862. — Chevallieria Gaud., Chevalliera Beer.
- Choisy**, Prof. in Genf, schr. versch. Monogr. u. Plantae javanicae etc., 1858. — Choisia Spr. (-sya Kth.).
- Christ**, J. L., Handb. d. Obstbaumzucht, Frankf. a. M. 1797, Pomol. Handwörterb., Lpz. 1802 u. a., † 1813. — Christia Mnch.
- Cienkowski**, L., Prof. z. Charkow, schr. üb. Myxomyceten, Monaden, Rahmhaut etc. — Cienkowskia Rostaf.
- Clayton**, J., schr. Fl. virginica, Ed. Gronovius, Lugd.-Bat. 1762. — Claytonia L.

- Clusius** (de l'Ecluse, Charles), Prof. d. Bot. z. Leyden, † 1609, schr. Hist. plantar. rarior., 1601. — *Clusia* L.
- Clutius** (Auger od. Oulger Cluyt), Aufs. d. bot. Gart. z. Leyden, † 1650, schr. Hist. nucis medicae Maldivensium (Borassus flabelliformis). — *Clutia* Boerh., *Cluytia* Ait.
- Coëmans**, Eug., Abbé in Gent, Paläontolog, schr. Monogr. du genre *Pilobölus*, Brux. Acad. 1861.
- Cohn**, F. J., Prof. z. Breslau, ber. Pfl.-Physiol. u. Kryptog., schr. de cuticula, Vrat. 1850, Wachst. d. Pfl., 1850, Haush. d. Pfl., Lpz. 1854, die Menschheit u. d. Pflanzenwelt, Bresl. 1851, s. 1870 Beitr. z. Biologie d. Pfl.
- Colebrooke**, engl. Beamt. in Ostind., schr. Fl. v. Indien, Terebinthineen etc., † 1837 in Lond. — *Colebrookia* Rxb., Sm., Ham., Don.
- Colla**, A., schr. Plantae rarior. in region. Chilens. a Bertero delectae, Taurini. — *Collaea* DC., Spr.
- Colladon**, Arzt u. Bot. z. Genf, † 1862, schr. Hist. nat. des Casses et des Sénéés etc., 1816. — *Colladonia* DC.
- Colonna**, Fab. (Columna), schr. Phytobasanos (Pfl.-Probiestein), Neap. 1592. — *Colonna* Cav., -něa Buchoz u. *Columnēa* L., Plum.
- Commelyn** (-lin), Kasp., Prof. d. Bot. z. Amsterd., † 1731, schr. Fl. Malabarica 1696, Horti med. Amstel. pl. rarior. et exot., Lugd.-Batav. 1706. — *Commelēna* L.
- Comm.** = **Commerson**, franz. Bot. u. Reis. in Madagaskar, † 1773 auf Isle de France. — *Commersonia* Forst.
- Cooper**, Dan., schr. Fl. metropolitana, Lond. 1833—35. — *Cooperia* Hook.
- Corda** von Prag, ber. Mykolog, Reis. in Texas, † 1849, schr. Icones Fungorum etc., 1837—54, Deutschl.'s Algen, Nürnberg. 1839, Prachtflora europ. Schimmelbildungen, Lpz. u. Dresd. 1839, u. a. — *Cordaea* Nees.
- Cornu**, franz. Mykolog, schr. Monogr. d. Saprolegnien (Ann. d. Scienc. nat. 1872). — *Cornuvia* Rostaf.
- Cornutus**, J., schr. Canadensium plant. historia, Par. 1635. — *Cornutia* L.
- Corr.** = **Correa** de Serra, port. Bot., † 1823, schr. Observat. carpologicae, 1809. — *Corrēa* Sm.
- Coss. Germ.** = **Cosson** u. **Germain**, schr. Observ. s. q. plantes critiques des environs de Paris, 1840.
- Coulter**, Thom., irisch. Arzt in Genf u. Reis. in Mexiko, † 1843 in Dublin, schr. Mém. s. l. Dipsacées, 1823. — *Coulteria* Kth.
- Courtois**, Prof. in Lüttich, schr. Expos. organor. propag. etc., Gaadae 1822. — *Courtoisia* Rehb. (-sēa Kth.).
- Cramer**, J. Chr., schr. Dispos. Syst. plantarum, Marb. 1803.
- Crantz**, Prof. d. Bot. in Wien, † 1799, schr. Stirpes austr. 1762—67, Class. Umbelliferar. emend. 1767, Cl. Cruciformium, Lpz. 1769. — *Crantzia* Vahl, Nutt. u. Scop.
- Cratevas** (-teuas), Rhizotome od. Wurzelsammler, wahrsch. um 100 v. Chr., Fragmente, herausg. v. Anguillara, u. ein klein. ungedr. Werk. — *Crataeva* L.
- Cuming**, Hugh, Reis. in Süd-am. u. auf d. Philippinen, Samml. neuer Orchideen u. Cacteen etc., † 1865 z. London. — *Cumingia* D. Don.
- Cunningham**, A., Samml. für d. Kew-Gärten, in Neuholl. ermord.; schr. üb. d. Vegetat. v. Neuholland, Fl. ins. Novae Zeelandiae Praecursor etc. — *Cunninghamia* Rich., Schreb.
- Cupani**, F. F., schr. Hort. catholicus principis Catholicae, ducis Misilmeris etc., Neap. 1696. — *Cupania* L., Plum.

- Curtis**, W., Apoth. in London, † 1799, schr. Fl. Londinensis 1777—98, t. bot. Magazine, fortg. v. d. Gebr. Hooker, 1787—1870, British grasses etc. — *Curtisia* Ait.
- Cusson**, Pierre, Prof. z. Montpellier, † 1783, schr. Umbelliferen u. a. — *Cussonia* Thb.
- Cürrie**, P. F., schr. Anleit. d. wildwachs. Pflanzen zu bestimmen, Gör-litz 1823.
- Cyrillo**, Domen., Prof. z. Neapel, schr. Pl. rar. regni Neapolit. fasc. I, Napoli 1788.
- Cyrillus**, Patriarch v. Alexandrien, † 444, schr. de plantar. et animalium proprietate liber nunc primum in lucem editus, Romae 1590. — *Cyrilla* L.
- Dahl**, A., † 1789, schr. Observ. bot. circa syst. veget. divi a Linné, Havniae 1787. — *Dahlia* Cav.
- Dalechamps**, J., schr. Hist. nat. plant. in libros XVIII digesta, Lugd. 1587. — *Dalechampia* L.
- Dampier**, W., Weltreis. u. Samml., schr. in Ray's Hist. plantarum, 1704. — *Dampiera* R. Br.
- Darwin**, Erasm., Arzt etc., schr. Phytonomia etc., 1800. — *Darwinia* Rudg. — **Darwin**, Charles, † 1882, ber. engl. Naturf., Begründ. d. Descendenz-Theorie, schr. on t. origine of species, 1859, Befrucht. d. Orchideen etc. durch Insekten, 1862, Klimmpflanzen, 1865, Variieren durch Domestikation, 1868, u. a. m.
- Daubenton** (d'Aubenton), † 1800, Prof. zu Paris, schr. m. Desfontaines Beob. d. endogenen Wachstums d. Dattelpalme. — *Daubentonia* DC.
- de By** = **de Bary**, s. *Bary*.
- Deesn.** = **Decaisne**, Dr. M. J., Prof. am Jard. des Plantes in Paris, Morren u. Decsn., üb. japan. Pfl. in Gent, Loranthaceen, Brux. 1840, Sur le Dioscorea batatas, 1855, Jardin fruitier du Museum (pomol. Prachtw.) u. a. — *Decaisnea* Hook. f.
- DC.** = **de Candolle**, Aug. Pyrame, Prof. z. Genf, ber. Gründ. eines neuen Syst.'s, † 1841, schr. Prodrömus syst. natur. Regni Vegetab. I—XVI, 1824—64. **DC.** u. **Duby**, Bot. gallica, 1830. **DC.** u. **Rédouté**, pl. crasses, Mem. s. l. Crassulacées, 1828, u. a. — *Candollea* Lab., Rich. — **A. DC.** = **de Candolle**, Alphonse, Sohn, Prof. in Genf, Forts. d. Prodrömus, 1841—64, Introd. à l'étude etc. (deutsch von Bunge), 1844, Géographie bot. etc. u. a.
- Delarbre**, Abbé, schr. Fl. der Auvergne, 2. A., 1800, † 1841. — *Larbræa* St. Hil.
- Delessert**, franz. Bot., † 1847, schr. Icones selectae plantar. etc., 1820 bis 1846. — *Lessertia* DC.
- Delile**, franz. Bot. b. Bonaparte's Exped. n. Ägypten 1798, schr. üb. d. Pfl. Ägyptens (Ann. de l'Acad. Par.). — *Delilia* Spr.
- Delise**, † 1841, schr. Hist. des Lichens. — *Delisaea* (-sea) Spr.
- Delpino**, F., schr. Rivista bot. dell'anno 1877, Milano 1878.
- Denham**, Major u. Capt., Clapperton, Narrative of travels (Anhang v. R. Brown), Lond. 1826. — *Denhamia* R. Br.
- Dennstedt**, schr. Schlüssel zu d. Hort. ind. Malabaricus (dreif. Register), Weimar 1818.
- de Not.** = **de Notaris**, Guis., s. 1872 Prof. in Rom, schr. Micromycètes etc., Musci italici etc. — *Notarisia* Colla.
- Deppe**, Ferd., † 1828 in Mexiko, **Schiede** u. **Deppe**, Plantae Mexicanae. — *Deppæa* Cham., Schldl.

- Desf.** = **Desfontaines**, René, franz. Bot. u. Reis. in Algier, † 1833, schr. Fl. atlantica etc., Choix de plant. d'instit. de Tournefort 1808, Hist. d'arbres et d'arbrisseaux, Par. 1809, u. a. — *Desfontainia* (-nesia) R. P.
- Desm.** = **Desmazières**, franz. Bot., † 1862, schr. Agrostographie du Nord de la France, üb. Pilze, 1826, u. a. — *Desmazierella* Libert.
- Desv.** = **Desvaux**, Prof. z. Angers, † 1856, schr. Journal de Bot. appliq. à l'agric., pharmacie etc., 1813—14, Fl. d'Anjou, 1827, u. a. m. — *Desvauxia* R. Br.
- Dickson**, engl. Kryptogamist, schr. Fasc. Plant. cryptog. Britanniae, 1785—1801. — *Dicksonia* l'Hér.
- Dieffenbach**, E., Weltreis., schr. travels in New-Zealand w. contr. to theology, botany etc., Lond. 1843. — *Dieffenbachia* Schott, Endl.
- Dierbach**, Prof. in Heidelb., † 1845, schr. Fl. Heidelbergens., 1819—20, Fl. mythologica, 1833, u. a.
- D.**, **Dietr.** = **Dietrich**, D., Prof. z. Jena, schr. Laubmoose v. Deutschl., 1823 f., Fl. Jenensis 1826, Filic. Jen. 1827, Synops. plant., Vimaræ 1839—52 (5 B.). — **Dietrich**, F. Gottl., schr. Vollst. Lexik. d. Gärtneri m. Vorrede v. Sprengel, Weimar 1802—18, Nachtr. bis 1840. — *Dietrichia* Tratt. — **Dietr.**, A., Linné's Spec. plant. 5. A. (bis *Dianthia*), Berl. 1831—33, Fl. regni Borussiae (12 B.), Berl. 1833—44, Bot. f. Gärtneri (3 B.), Berl. 1837—39.
- Dill.** = **Dillen** (*Dillenius*), † 1747, deutsch. Bot. in Engl., schr. Hort. Elthamens. 1732, Moose etc. — *Dillenia* Thb.
- Dillwyn**, engl. Confervenkenner, schr. Brit. Confervæ, Lond. 1809. — *Dillwynia* (-winia, -nea) Sm.
- Diosc.** = **Dioscorides**, Pedanos, griech. Nat. u. Arzt, † 64 n. Chr., schr. Materia medica. — *Dioscorca* Plum., L.
- Dippel**, L., Prof. am Polytechn. z. Darmst., schr. d. Mikroskop u. seine Anwend. etc., Braunschw. 1867—72, d. Entstehung d. Milchsaffgefässe, Rotterd. 1865 (gekr. Preisschr.), d. Blattpfl. etc. 2. A. 1882, u. a.
- Ditmar**, Senator in Rostock, schr. Pilze in Sturm's Flora v. Deutschl. 1817. — *Ditmaria* Spr.
- Dodoens** (*Dodonaeus*), Rembert, Leibarzt Kais. Maximil. II., † 1585, schr. Cruydeboek m. Kupfern, umgearb. Hist. stirpium. — *Dodonaea* L. (-nea Plum.).
- Don**, D. u. G. **Don**, erst. Bibliothekar d. Linné'schen Ges., † 1841 (— *Donia* R. Br.), d. letzt. engl. Bot. u. Reis., † 1856. — **D. Don**, schr. Prodr. Fl. Nepalensis u. a. — **G. Don**, *Dichlamydeae* plant. 1831—38. — *Donia* Hook.
- Donati**, ital. Bot., † 1763, schr. üb. venetian. Pflanzen. — *Donatia* Forst.
- Donn**, J., schr. Hort. Cantabrigiensis etc., London 1815.
- Downing**, Landsch.-Gärtner u. Pomolog in Nordamer., † 1853, schr. the fruits and fruit-trees of America, N.-York, 2. A., 1878.
- Dozy**, F., Muscor. frondos. novae spec. ex Archipelo Indico et Japonia, Lugd.-Bat. 1844. — **D. u. Molkenboer**, Fl. crypt. v. Nederland, 1845.
- Drejer**, † 1842 in Kopenh., schr. Fl. excurs. Hafniensis 1838, *Symbolæ Caricologiae* 1844 u. a.
- Dryander**, schwed. Bot., Biblioth. von Sir J. Banks, † 1810 in London, schr. Cat. bibl. nat. Josephi Banks, Lond. 1796—1800. — *Dryandra* L., Thb., R. Br.
- Duchesne**, Prof. z. Paris, † 1827, schr. Man. bot. d. pl. utiles 1764, Hist. d. Fraisiers, 1766. — *Duchesnea* Sm.
- Dufour**, franz. Arzt u. Bot., † 1865, schr. s. l. champignons comestibles etc. — *Dufourea* Ach.
- Duhamel** du Mouceau, franz. Nat., † 1781, schr. Traité des arbres fruitiers, Par. 1768. Deutsch: *Pomona gallica*, Nürnberg. 1771—83, auch

- neu von Poiteau u. Turpin 1808—35, l. phys. d. arbres, u. a. — *Duhamelia* Pers., *Hamelia* Jacq.
- Dum.** = **Dumont** de Courset, fr. Gartenautor, schr. le botaniste cultivateur etc., 1802. — *Coursetia* DC. — **Dumont** d'Urville, schr. Enum. pl. in insulis Archipelagi et Oriente lectar., Par. 1822. — *Dumontia* Lamx. Ag.
- Dumortier**, belg. Bot. in Tournai, schr. Florula belg. 1827, Syllabus Jungermanniarum, 1831, Observ. s. l. Graminées belg., Tourn. 1823. — *Dumortiera* Nees.
- Dunal**, Prof. z. Montpellier, schr. Solaneen, Cistineen etc. in De Candolle's Prodrumus, Mon. d. Anonacées, 1817 u. a. — *Dunalia* Spr.
- Duperrey**, schr. Voyage autour du monde p. Duperrey etc., Par. 1828. — *Duperreya* Gaud.
- Durante**, Cast., schr. Herbario nuovo, Veneti 1636, Hortulus sanitatis, in's Teutsche, Frankf. 1609. — *Duranta* L.
- Durieu** de Maisonneuve, Dir. d. botan. Gart. in Bordeaux, schr. Fl. d'Algerie, Catal. d. grains etc. dans l. jard. d. Bordeaux 1863—69, Plant. d. l. Gironde etc. — *Durieua* Merat.
- Dur.** = **Duroi** (Du Roi), Arzt u. Dendrolog z. Braunschweig, † 1785, schr. d. Harbke'sche wilde Baumzucht etc., 1771—72 u. a. — *Duroia* L.
- d'Urville** s. *Dumont* d'Urv. — *Durvillaea* Bory.
- Duschak**, M., z. Botanik d. Talmud, Pest 1870.
- Duval-Jouve** J., Insp. Acad. Strassb., schr. üb. Equisetaceen u. Gramineen. — *Duvalia* Haw. — **Duval**, L. J., Herausg. von Richard, Analyse d. fruit, Par. 1808, Kryptog. d. Fl. v. Regensb., † 1828. — *Duvalia* Nees.
- Duvau**, A., Kunth's Freund, schr. üb. Veronica u. verwandte Sippen. — *Duvaua* Kth.
- Ebermayer**, Dr. E., Prof. in München, schr. Physiologische Chemie d. Pfl., Berl. 1882. I. B.
- E. Bot.**, Englische Botanik (Paxton's Magaz. of Botany, 1834—49).
- Ecklon**, Apoth. u. Reis. am Cap 1823—27, schr. m. Zeyher Enum. plant. Africae, † 1868. — *Ecklonia* Hornem.
- Edwards**, S., the botanical register, s. Bot. Reg., Lond. 1815 (78 col. Taf.). — *Edwardsia* Salisb.
- Ehrbg.** = **Ehrenberg**, Prof. in Berl., † 1876, schr. Sylvae mycol. Bero-linenses 1818, Passat-Staub etc., Nova gen. plant. u. a. — *Ehrenbergia* Spr.
- Ehrh.** = **Ehrhart (-hardt)**, Linné's Schüler, Apoth. in Hannov. u. Stockh., † 1795, schr. Beitr. z. Naturk. etc., 1787—92. — *Ehrharta* Sm., Thb., *Ehrhardia* Scop.
- Eichelberg**, naturgetr. Abbild. u. Beschr. aller in- u. ansländ. Gew. f. Handel u. Industrie (72 col. T.), Zürich.
- Eichler**, A. W., Prof. in Berl., Dir. d. k. bot. Gart., vollend. Martius Fl. brasiliens. s. 1840, schr. üb. Entw. d. Blatts, Marb. 1861, üb. Phanerog., Kiel 1878 n. A. Braun's Syst., Syllabus d. Vorles. üb. spez. u. mediz.-pharm. Bot., Berl. 1880. — *Eichleria* (g. n.).
- Elkan**, Arzt in Königsb., † 1851, schr. Monogr. Papaveracearum, Regio-mont. Borussiae, 1839.
- Elliot**, Steph., amer. Bot., schr. Botany of South-Carolina (Fl. Caroli-niens.). — *Elliotia* Nutt., Mühlbg.
- Ell.** u. **Sol.** = **Ellis u. Solander**, erst. Kaufm. in Lond., † 1776, schr. üb. Korallen. — *Ellisia* L. — **Ellis**, W., Mission. d. Südsee u. v. Mada-gask., führte Orchid. u. *Ouvirandra fenestralis* ein, † 1872.
- Glaser, Botan. Taschenwörterbuch. 27

- Elsner, M., schr. Synops. Fl. Cervimontanae (Hirschberg, Schles.), Vratisl. 1839. — *Elsneria* Walp.
- E. M. = Ernst Meyer, Prof. in Königsberg, † 1858, schr. Entwicklung d. Botanik etc., Königsb. 1844. — *Ernestia* DC.
- Ender, Regel u. Ender, Allgem. Gartenbuch, Zürich 1868.
- Endl. = Endlicher, Steph., Prof. etc. in Wien, ber. Gründ. eines nat. Systems, † 1849, schr. Fl. Posoniae 1830, Prodr. Fl. Norfolkicae 1832, Enchirid. bot. 1841, m. Fenzl Sertum Cabulicum u. a. — *Stephania* W., Lour.
- Engelmann, G. schr. t. Oaks of t. United States, t. American Junipers etc., St. Louis 1877, u. a. — *Engelmannia* Pfeif.
- Engler, A., Antherenbild. d. Metaspermen (Pringsh. Jahrb. 1875), Monogr. d. Araceen, 1878, u. a.
- Eschweiler, Prof. z. Regensb., † 1831, schr. Syst. Lichenum etc., 1824, de fructu Rhizomorphae, 1822, u. a. — *Eschweilera* Mart.
- Esper, Prof. z. Erlangen, Entomolog etc., † 1810, schr. Icones Fuco- rum, Nürnberg. 1797—1802. — *Espëra* W.
- Ettinghausen u. Pokorny, schr. d. wiss. Anwend. d. Naturselbstdrucks. Wien 1856.
- Fabricius, Ph. K., Prof. z. Helmstädt, † 1774, schr. Primitiae Fl. Buti- bacensis, Wetzlar 1743, Enum. meth. pl. Horti med. Helmstadiensis 1759. — *Fabricia* G., Thb.
- Fechner, C. A., schr. Nanna od. üb. d. Seelenleben d. Pflanzen, Lpz. 1848, Z. Erklär. volkst. deutscher Pfl.-Namen, 1871. — **Fechner**, G. Th., schr. Einige Ideen z. Schöpfungs- u. Entwickl.-Geschichte d. Organismen, Lpz. 1873.
- Fée, Ant. Laur. Apoll., Prof. z. Strassb., † 1874, schr. Essai s. l. Cryptog. des écorces exot. offic., Par. 1824—37, Mémoir. lichénogr., 1838, s. l. fam. d. fougères 1844—66, u. a. — *Feaea* Spr. u. *Feea* Bory.
- Fenzl, Prof. in Wien, schr. Illustr. et descr. plantar. nov. Syriae et Tauri occid., 1843, Illustr. Bot., Pest 1857, u. a. — *Fenzlia* Benth., Arn.
- Ferrari, J. B. (Ferrarius), schr. Hesperides s. de malorum aureorum cultura, Romae 1646, de florum cult. libri IV, Rom. 1633, etc. — *Ferraria* L.
- Feuillee (Fevillée), L., franz. Jesuit, † 1732, schr. Pfl. v. Peru u. Chili, Arzneipfl. v. Peru etc., deutsch v. Huth, Nürnberg. 1756. — *Fevillëa* L.
- Ficinus, M., schr. de triplici vita etc., Salerni 1511. — **Ficinus**, H., schr. Fl. Dresdensis 1816, m. C. Schubert Fl. d. Geg. um Dresd. 1821—23. — *Ficinia* Schrad.
- Fiek, E., Fl. v. Schlesien pr. u. östr. Anteils, Bresl. 1881.
- Fingerhuth (s. Bluff u. Fing.), Arzt in Esch bei Euskirchen, schr. Tentam. Florulae Lichenum Efficaciae 1829.
- Fintelmann, Karl Jul., schr. Lehrb. für Obstbau u. Pomologie (in d. Handbibliothek f. Gärtner), Berl. 1839.
- Fischer, F. E. L. v., Prof. z. Petersburg, † 1854, schr. Sertum Petro- politanum 1846—69, üb. Balsampappeln, u. a. — *Fischëra* G. Don, Spr. u. Sw.
- Flk. = Flockerke, H. G., Prof. z. Rostock, † 1835, schr. Deutsche Liche- nen, de Cladoniis 1828. — *Floerkëa* Spr.
- Fl. Bat., Flora Batava s. Kops.
- Fl. Cestr., Flora Cestrîca (v. Chester, Nordamer.) v. W. Darlington, Philad. 1837.
- Fl. Flum., Flora Fluminensis (v. Rio-Janeiro), v. Bisch. Antonio de Arrabida (s. Arrabida).

- Fl. Metrop.**, Fl. Metropolitana (Fl. d. Hauptstadt, nänl. London, s. Cooper Dan.), Lond. 1833—35.
- Fl. Mex.**, Fl. Mexicana v. Moçino u. Sessê, s. d.
- F. M.** = **Friedr. Meyer**, Prof. z. Götting., s. Meyer.
- Fl. Per.**, Fl. Peruviana v. Ruiz u. Pavon, s. d.
- Fl. Wett.**, Flora (ökon.-techn.) der Wetterau, v. Gärtner, B. Meyer u. J. Scherbius, Frankf. a. M. 1799—1801.
- Flügge**, Arzt in Hamburg, † 1816, schr. üb. Gräser u. Plan d. bot. Gart. b. Hamb. 1810. — Flueggēa W., Rich.
- Focke**, W. O., Arzt in Bremen, schr. üb. d. Kartoffelkrankh. im J. 1845, Brem. 1846, Pflanzen-Mischlinge, Berl. 1881, üb. d. Begriff Species u. Variet., Jena 1875, u. a. — Fockēa Endl.
- Fontenelle**, Julia de, schr. m. H. Tollard Manuel de l'arboriste etc., Paris 1824. — Fontenellea St. Hil.
- Forsk.** = **Forskäl**, Pet., dän. Reis. in Arabien, Prof. in Kopenhagen, † 1763, schr. Fl. aegyptio-arabica, Ed. Niebulr, Havniae 1775, Icones rerum nat. etc., 1776. — Forskaelia L.
- Forst.** = **Forster**, Georg, † 1794, u. J. R., Begleit. Cook's auf d. Weltreise, schr. Characteres generum plant. q. in itinere etc. collegerunt, Lond. 1776, Florula insular. austral., 1786, d. Brotbaum etc. — Forstēra L.
- Forsyth**, W., schr. a treatise of fruit-trees, Lond. 1833. — Forsythia Vahl.
- Fortune**, Rob., Samml. in Japan u. China für England 1843—62, verpfl. d. Thee an d. Himalaya etc. — Fortuna Lindl.
- Fothergill**, J., Arzt in Upton, † 1780. — Fothergilla L.
- Fougeroux**, franz. Bot., † 1789, schr. Commentationes botanicae. — Fougeria Mch., Fougerouxia DC.
- Fourcroy**, A. F., schr. Recherches s. l. pollen du Dattier d'Egypte. — Fourcroea Vent.
- Fraas**, K., Dir. d. Tierarzneischule in München, schr. Synops. plant. Florae classicae 1845, Wurzelleben d. Kulturpfl. etc., 1872, u. a.
- Francis**, schr. British Ferns etc., 1837, t. little Engl. Flora, 1839, Grammar of Botany, 1840.
- Frank**, Georg, Kräuter-Lexikon, 6. A., Lpz. 1766, urspr. Flora G. Franci, Argentor. 1685 (Lexic. pl. hactenus usual.).
- Frank**, A. B., Prof. in Berlin, schr. Beitr. in Cohn's Beitr., Pringsh. Jahrb., Herausg. v. Leunis' Synops., 3. A., etc.
- Fresenius**, Arzt u. Dozent am Senckenberg'schen med. Inst. z. Frankf. a. M., † 1866, schr. Mikroskop. Organismen, Taschenb. b. Excursionen, Flora v. Ägypt. u. Abessinien, u. a. — Fresenia DC.
- Fr.** = **Fries**, El. Magn., Prof. in Upsala, schr. Syst. mycolog. 1821—29, Elenchus fungorum, Lichenographiae Europae reform., Summa veget. Scandinaviae 1846—49 u. a. — Friesia Spr. — **Fr. f.** = **Fries**, Th., Sohn, Prof. in Upsala, bes. Lichenolog., schr. Lichenes arctoi etc., 1860, Lichenogr. scand. seit 1871.
- Frölich**, Arzt z. Ellwangen, † 1841, schr. de Gentiana libellus 1796, Hieracium (in De Candolle's Prodromus) u. a. — Froelichia Juss., Vahl, Mart.
- Frühlingsblumen** von Aglaja v. Enders m. Einleit. v. Prof. Dr. Willkomm, 2. Lief. m. 71 Abb. (Farbdr.), Lpz. 1882.
- Fuchs**, L. v., schr. Effigies d. plant. etc., Lyon 1549, de hist. stirpium commentarii, Lugd. 1551. — Fuchsia Plum.
- Fuckel**, Apoth. z. Östrich a. Rh., ber. Kryptogamist, † 1876, schr. Enum. fungor. Nassoviae, 1860, Symbolae mycologicae, 1869/70, u. a. — Fuckelia Nitzschke.

- Fuhlrott**, C., schr. Jussieu's u. De Candolle's nat. Pflanzensyst., Bonn 1829.
- Fuller**, A. S., schr. Small Fruit Culturist, 1867, deutsch v. Hofgärtner H. Maurer in Jena (bespr. d. besten amerik. Obstsorten).
- Funk**, H. Chr., Apoth. z. Gefrees a. Fichtelgeb., † 1839, schr. Deutschlands Moose, Kryptog. d. Fichtelgebirges, 1806—38. — *Funkia* Spr.
- G.** = **Gärtner**. Jos., Prof. in Petersb., dann Arzt in Calw (Würtemb.), † 1791, schr. de fruct. et seminib. pl., Lpz. 1788—91, *Carpologia s. descr. et icones etc.*, Lps. 1805. — Gaertnēra L., Lam. — **G. f.** = **Gärtner**, K. F., Sohn, † 1850, Arzt in Calw, schr. *Supplem. Carpo-logiae* u. a.
- Galeotti**, H. W., † 1858, Hauptred. d. *Journal d'Horticult. prat. d. l. Belgique*, **Martens** u. **Galeotti**, *Ericen v. Mexiko*.
- Grek.** = **Gareke**, Prof. u. Custos d. k. Herbariums z. Berlin, schr. *Fl. v. Halle*, 1848, *Fl. v. Nord- u. Mitteldeutschl.*, 14. A., 1882, j. Herausg. der *Linnaea*.
- Gardner**, G., schr. üb. *Peltophyllum etc.*
- Garidel**, P. J., schr. *Hist. nat. des plant. q. naissent en Provence*, Aix 1715. — *Garidella* L.
- Garovaglio**, S., schr. *Alcuni discorsi sulla botanica*, Pav. 1862.
- Gaudichaud**, Beauprē, franz. Bot. u. Reis. um d. Welt m. L. de Freycinet, † 1864, schr. *Bot. du voyage autour du monde par Vaillant 1836/37*, Par. 1840. — *Gaudichaudia* H. B. K.
- Gaud.** = **Gaudin**, Pred. z. Noyon, Cant. Waadt, † 1833, schr. *Agrostologia helvetica*, Paris 1811, *Synops. Fl. helvet.*, 1836 (herausg. v. Monnard). — *Gaudinia* P.-B.
- Gauthier**, Hugues, Arzt in Quebec, schr. *Catal. des pl. usuelles de la France*, 1760. — *Gaultheria* L.
- Gawl.** = **Gawler** s. *Bellenden-Gawler-Ker*.
- Gay**, Claude, Mitgl. d. Instituts z. Paris, † 1874, schr. *Hist. física y política de Chile etc. et Atlas*, 1845—53. — *Gaya* Kth., Spr., **Gaud.** — **Gay**, Jacq., † 1864, schr. *Monogr. der Büttneriaceen, Xeranthemum etc.*
- Geiger**, Prof. in Heidelberg, † 1836, schr. *Pharmazeut. Bot.* (2. A., *Nees v. Esenb. u. Dierbach*, 1839/40), *de Calendula off.*, 1818. — *Geigēra* Less. (-ia Griseb.).
- Gemari**, P., schr. *Cryptog. vasculares Ligusticae*, 4. A., Turin 1856.
- Germain** (s. *Cosson*), **Germain** de St. Pierre, Art in Paris, schr. *Guide de Botaniste*, 1852, *Nouv. Dictionn. de Bot.*, 1870, u. a. — *Germa-nea* Lam.
- Gesner**, Conr., Arzt in Zürich, † 1565, ber. *Bot. d. Mittelalters*, schr. *Hist. plant., de rariss. et admirandis herbis, de Styrpium collectione*, u. a. — *Gesnēra* L. (-ria Pers.).
- Geyer**, K. Andr., durchforschte 1834—45 d. *Flora d. nordamer. Union*, red. in Meissen d. *Chronik d. Gartenwesens*, † 1853.
- Geyler**, Th., s. 1867 Dozent am *Senckenberg-Inst. zu Frankf. a. M.*, schr. üb. *Sphacelarien etc.* (*Pringsh. Jahrb.* 1865) u. a.
- Gibelli** (s. *Cesati*), Assist. am bot. Garten z. Pavia, schr. *Sugli org-reprod. del gen. Verrucaria*, Milano 1865.
- Gihoul**, L., schr. *Culture forestière des arbres résineux conifères etc.*, Bruxelles 1847.
- Gilibert**, J. Em., Prof. z. Wilna, dann in Lyon, schr. *Fl. lithuanica inchoata etc.*, Grodno 1781, *Exercit. phytologica*, Lugd. Gallor. 1792, u. a. — *Gilibertia* Gm.

- Gillen**, Arn. (Gillenius), schr. Hortus etc., Cassellis 1627 u. 32. — *Gillenia* Mnch.
- Gillies**, schott. Arzt u. Bot. zu Meudoza in Chili. — *Gilliesia* Lindl.
- Gingins** de Lassaraz, Bar. v., schr. Violariées (in Soc. nat. II, Genève 1823), Hist. nat. des Lavandes, Genf 1826. — *Ginginsia* DC.
- Giseke**, P. D., Prof. z. Hamburg, † 1796, schr. Index Linnaeanus etc., Icones plant. — *Gisekia* L.
- Gleditsch**, J. G., Prof. z. Berlin, † 1786, schr. Methodus fungorum, Berol. 1753, Bot. medica u. a. — *Gleditschia* L.
- Glehn**, P. v., schr. Verz. d. im Witim-Olemkaland von Poljakov u. Bar. v. Maydell ges. Pfl. (Act. Hort. Petropol. 1876).
- Gloxin**, B. P., Arzt in Colmar, schr. Observations bot., Strassb. 1785. — *Gloxinia* l'Hér.
- Gm.** = **Gmelin**, Sam. Gottl., Prof. z. Petersb., Reis. mit Pallas 1763—74 durch d. russ. Reich, † 1774 in d. Krim, schr. Hist. fucorum 1768, Reise durch Russl. 1774. — **Gmelin**, Ph. Fr., † 1768, Prof. z. Tübingen, schr. Otia bot., Tüb. 1760. — **Gmelin**, J. G., Prof. in Petersburg u. Reis. nach Kamschatka, † 1755 in Tübingen, schr. Fl. sibirica, 1747—49, Reise durch Sibirien, 1733—43, u. a. — *Gmelina* L. — **Gmelin**, Joh. Fr. (Sohn v. Ph. Fr.), Prof. in Göttingen, † 1804, Herausg. v. Linné's Werken u. Onomatologia bot., 1772—78 (10 T.). — **Gmelin**, C. Chr., Arzt z. Karlsruhe, † 1837, schr. Fl. Badensis, Alsatica etc., 1805—26, 4 B.
- Gochnat**, Fr. C., schr. Tentamen medico-bot. de Cichoriaceis, Argentor. 1808. — *Gochnatia* H. B. K.
- Goebel**, Fr., Pharmaz. Waarenkunde (m. Ill.), Eisenach 1827—30. **G.** u. **Kunze**, dass. m. Kupf., 1827—34.
- Godet**, Bot. z. Neufchatel, Reis. im Kaukasus, schr. Fl. du Jura 1853, Pl. vénénées du cant. d. Neufchâtel. — *Godetia* Lindl., Spach.
- Goepfert**, H. R., Prof. in Breslau, ber. Paläontolog, † 1884, schr. foss. Farne, foss. Fl. d. Gypsform., Tertiär-Fl. v. Schlesien, üb. d. Riesen d. Pflanzenreichs, Berl. 1869, d. foss. Coniferen, 1850, u. a. — *Goepertia* Schldl.
- Goethe**, W., schr. Mith. aus d. Pflanzenwelt (Acta Leopold. 1827/28).
- Goiran**, A., schr. Nomi volgari adoperati in Italia a designare le principale piante di bosco, Verona 1877.
- Good.** = **Goodenough**, Dr. Sam., engl. Bot., † 1827, schr. Observ. on t. brit. Fuci, 1795. — *Goodenia* Sm., *Goodenovieae* R. Br.
- Gordon**, G., Oberaufs. d. Vers.-Stat. Chiswick, schr. üb. Coniferen (the Pinetum), 1858, m. Nachtr. 1862. — *Gordonia* Ellis.
- Gottsche** (s. Lindenber), Arzt in Altona, schr. m. Lindenber u. Nees Synopsis Hepaticarum, 1844—47. — *Gottschœ* Nees.
- Gouan**, Prof. d. Bot. z. Montpellier, † 1821, schr. Fl. Monspellica, Lugd. 1765, Hort. reg. Monspeliensis, 1768, Illustr. et observat. bot., 1773, u. a. — *Gouania* Jacq.
- Grabowski**, Apoth. in Schlesien, † 1842, schr. m. Wimmer Fl. Silesiae 1827—29, Fl. v. Oberschles., 1843. — *Grabowskia* Schldl.
- Grah.** = **Graham**, John, † 1839 in Bombay, schr. Catal. of t. pl. growing in Bombay etc., 1839. — **Graham**, Rob., Prof. in Edinburg, † 1845, schr. Fl. v. Schottland. — *Graemia* (*Grahamia*) Hook., *Meuziesia* *Grahamia* Hook.
- Gray**, Asa, Prof. z. Cambridge in Nordamerika, schr. Elements of bot., 1836, Bot. of t. United-States, 1845, u. a. — *Asagraea* Lindl.
- Grev.** = **Greville**, Rob. Kaye, engl. Krypt., mit Hooker Icones Filicum, 1826—31, Scottish Cryptog. Flora, Edinb. 1822—29, Algae brit., Fl. Edinensis u. a. — *Grevillea* R. Br. — **Greville**, Charl., engl. Blumist d. vor. Jahrh.'s, † 1809.

- Grew**, Nehem., schr. t. anatomy of plants, Lond. 1682. — *Grewia* Juss. — **Grew**, *Algae brit.*, 1830.
- Griffith**, W., Arzt in Ostind., Forscher in Indien u. Afghanistan, gab heraus *Icones plant. Asiaticarum* (üb. 600 Taf.), Calcutta 1847—54. — *Griffithia* Ag. u. *Larix Griffithii* Hook.
- Grindel**, schr. *Pharmaz. Bot.* 1802, bot. Taschenb. f. Liv-, Cur- u. Esthland, Riga 1803. — *Grindelia* W.
- Grisebach**, Prof. z. Göttingen, schr. *Gen. et Spec. Gentianearum*, 1839, *Grundr. d. syst. Bot.*, Götting. 1854, *Fl. of t. brit. West-India*, *Catal. pl. Cubensium, Spicilegium Fl. Rumelicae et Bithynicae*, Braunsch. 1843, u. a.
- Gronovius**, Senator z. Leyden, † 1762, schr. *Fl. virginica*, Lugd.-Bat. 1762, *Fl. orientalis*. — *Gronovia* L.
- Günther**, Joh. Chr., † 1833 in Breslau, schr. m. Wimmer u. Grabowski *Fl. v. Schlesien*. — *Guntheria* Spr., *Günthera* Andrz.
- Guépin**, Jean Pierre, Arzt in Angres, schr. *Fl. de Maine et Loire m. Suppl. I u. II*, 1850—56. — *Guepinia* Fr.
- Gümbel**, Th., schr. *d. Moosflora der Rheinpfalz etc.*, Landau 1857 u. *Herbar. vivum muscorum et lichenum etc.*
- Guettard**, Et., franz. Pfl.-Physiolog, schr. *Observ. sur l. plant.*, Paris 1747, üb. *Lebenskraft etc.*, 1748. — *Guettarda* L.
- Guilandinus** s. *Wieland*.
- Gunner**, Prof. d. Bot. in Kopenh., † 1773, schr. *Fl. Norvegica, Nidrosiae et Hafniae* 1766—72. — *Gunnera* L.
- Gussone**, Giov., Prof. in Neapel, † 1866, schr. *Florae Siculae Prodr.* 1827/28, *Plantae rariores etc.*, 1826 u. a. — *Gussonia* Spr.
- Haenke**, Thadd., aus Böhmen, Reis. in Südam., Mexiko, auf d. Philippinen etc., † 1817 in Bolivia; *Presl's Reliquiae Haenkeanae etc.*, Prag 1826 f. — *Haenkea* Salisb.
- Hagen**, C. G., Prof. in Königsb. 1749—1829, schr. *Preussens Pfl.*, Kön. 1818 (*Chloris borussica*, *Regiom.* 1819). — *Hagenia* Lam., *Eschw.*
- Hales**, Steph., † 1768, schr. 1727 *d. ber. Statik d. Gewächse*. — *Halesia* L.
- Hall**, H. C. v., *Elementa botanices, Groningae* 1834.
- Haller**, Albr. v., Prof. in Göttingen 1736—39, k. brit. Leibarzt etc., † 1777 in Bern, schr. *Fl. jenensis H. B. Ruppil aucta etc.*, Jen. 1745, *Enum. plant. Horti Goett.* 1753, *Biblia bot.*, Zürich 1771—72, *Icones pl. Helvet.*, Bern 1795, u. a. — *Halleria* L. — **Haller** f., † 1823 in Bern, schr. *Tentam. Synopsis Potentillarum*, Bern 1820.
- Hallier**, E., Prof. in Jena, Herausg. v. *W. Koch's Taschenb. d. deutsch. u. schweiz. Flora* (7. umg. A., Lpz. 1878), *d. pflanzlichen Parasiten d. menschl. Körpers*, 1866, *Phytopathologie*, 1868, *Schlechtendal's Flora v. Deutschl.*, 5. A., 1880.
- Ham.** = **Hamilton**, W. Lord (s. *Buchanan*), schott. Bot. u. Reis. in Westind., schr. *Prodr. plant. Indiae occident.*, Lond. 1825, üb. *Hort. Malabaricus*. — *Hamiltonia* Roxb. — **Hamilton**, Arth., schr. üb. *Scutellaria*, 1832.
- Hampe**, E., schr. *Relation üb. d. v. Beyrich in Nordamer. gesamm. Laubmoose*, *Handb. f. pharmaz. Bot.*, Nürnberg. 1804. — **Hampe**, Apoth. z. Blankenburg am Harz, *Icones musc. nov. etc.*, Bonn 1844, *Fl. hercynia*, Halle 1873.
- Hampel**, W., gr. Schaffgott'sch. Gart.-Insp. z. Koppitz, schr. *d. moderne Teppichgärtnerei*, Berl. 1880.
- Hanstein**, Joh. v., Prof. in Bonn, † 1880, schr. üb. *Keimentw., Rinde, Marsilia u. a.*, Herausg. d. „*Bot. Abhandl.*“.

- Happe**, A. F., schr. Conspect. praecipuar. plant. earumq. florum et fructuum etc., Berol. 1790—94.
- Hartig**, Th., Forstr. u. Prof. z. Braunschweig, ber. Pfl.-Physiolog. — **Hartig**, Rob., Prof. z. Neust.-Ebersw., schr. d. Krankheiten d. Waldbäume, 1874.
- Harting**, Pieter, Prof. in Utrecht, schr. Anatomie d. Cacteen, Kartoffelkrankh., 1851, u. a.
- Hartinger**, A., Atlas d. Alpenflora, Wien 1883, 17. Lief.
- Hartmann**, K. J., schwed. Arzt u. Bot., † 1849, schr. Handbok i Skandinav. Flora, 1829, 9. A. 1864, Svensk och Norsk Exc. Flor., 1846. — **Hartmannia** DC., Spach.
- Hartweg**, K. Th., v. Karlsr., Reis. in Mex. 1836—40, Insp. d. Schwetzing. Gart., Bentham's Plantae Hartwegianae. — **Hartwegia** Lindl.
- Hartwig**, J., Garteninspector in Weimar, d. illustr. Hausgärtner, 10. A. 1885.
- Harvey**, W., Prof. d. Bot. in Dublin, † 1866, schr. Nereis Boreali-Amer., Washington 1852—57, Thesaurus Capensis, 1859—63, u. a.
- Hassearl (-karl)**, Jul. C., aus Cassel, für Holland Leit. d. bot. Gart. z. Buitenzorg auf Java, siedelte dort s. 1854 d. Chinabaum an, schr. Pl. javanicae, Filices jav. Horti Bogotiensis descr., Amstelod. 1858, Commelinaceae indicae etc., Vindob. 1870.
- Haw.** = **Haworth**, Adr. Hardy, engl. Bot., † 1833, schr. üb. Saftpfl., Norimb. 1819, Monogr. Narcissorum, 1831. — **Haworthia** Duv.
- Hayne**, Prof. d. Bot. in Berl., † 1832, schr. Dendrol. Fl. d. Gärten Berlins, 1822, Arzneigew., Berl. 1843—46, u. a. — **Haynea** Spr., W.
- Hedw.** = **Hedwig** aus Siebenbürgen, Prof. z. Leipzig, schr. classische Schriften üb. Moose, Filicum genera etc., Lips. 1799, u. a. — **Hedwigia** Ehrh.
- Heer**, Osw., Prof. z. Zürich, Paläontolog, † 1883, schr. Urvelt der Schweiz, 1864, 2. A. 1879, Pfahlbauten, d. Tertiär-Fl. d. Schweiz, Fl. foss. arctica u. a.
- Hegetschweiler**, schr. Beitr. z. Aufzähl. d. Schweizerpfl., Zürich 1831, Fl. d. Schweiz (fortg. v. Osw. Heer), † 1839. — **Salix Hegetschweileri** Heer.
- Heiberg**, 1866—68 Red. d. dän. Botanisk Tidsskrift, † 1875, schr. Diatomacæae danicae, 1863.
- Heister**, Prof. d. Bot. z. Helmstädt, † 1758, schr. Indices plantar. etc., Systema pl., 1748, u. a. — **Heisteria** L.
- Heller**, schr. Fl. Wireeburgensis, Würzb. 1810—11. — **Helleria** Mart.
- Henckel** v. Donnersmark, schr. Nomenclat. bot., Halle 1821. — **Henckelia** Spr.
- Henderson**, E. G., Patriarch d. Handelsgärtn., † 1880, 94 J. alt. — **Henderson**, J., engl. Bot., † 1866. — **Hendersonia** Berk.
- Henkel**, J. B., Prof. z. Tübingen, † 1871, schr. m. Hochstetter Synops. d. Nadelhölzer, Stuttg. 1865. **Henkel**, J. Fr., schr. Flora Saturnians, d. Verwandt. d. Pfl. u. d. Mineralr.'s, Lpz. 1755.
- Henslow**, schr. on the origin of the prevailing systems of phyllotaxis (Linn. Soc. I. 2). — **Henslowia** Hook. f., **Henslovia** Planch.
- Herb.** = **Herbert**, W., engl. Pfarr. u. Bot., † 1847, schr. Amaryllideen. — **Herbertia** Sweet.
- Herbich**, Fr., schr. Stirpes rarior. Bucovinae, Stanislawow, 1853, Fl. d. Bukowina, Lpz. 1859. — **Herbichia** Zawadski.
- Herit.** od. **l'Hér.** = **l'Héritier**, Bot. u. Inst.-Mitgl. z. Paris, † 1800, ermord., schr. Stirpes novae, Geraniologia 1788, Sertum anglie., 1788, u. a. — **Heritiera** Ait., Schrk.
- Herm.** = **Hermann**, P., Prof. in Leyden, Reis. auf Ceylon, † 1695, **Hermannia** Paradisus Batavus etc., Lugd.-Bat. 1705. — **Hermannia** L.

- Heufler**, L. v., d. Hypneen Tirols, Wien 1860. — *Heuferia* Awd.
- Heyder**, Ed., ält. Rath etc., rief d. Pomol. Institut. v. Proskau u. Geisenheim ins Leben. — *Heyderia* C. Koch.
- Heynhold**, Nomenclator bot. hortensis, 2 B., Lpz. 1840 u. 46.
- Hil.** od. **St. Hil.** = **Saint-Hilaire**, A. de, fr. Bot. u. Reis. in Brasil., schr. Voyage dans l. distr. des diamans du Brésil etc., Paris 1833 — *Hilairia* DC., *Hilaria* H. B. K.
- Hill**, John, engl. Arzt u. bot. Autor in Lond., † 1775, schr. Hort. Kewensis 1768, Herbar. brit., 1769, u. a. — *Hillia* L., Jacq.
- Hirschfeld**, Prof. in Kiel, schr. d. ber. Theorie d. Gartenkunst, 1777 bis 1782, Handb. d. Fruchtbaumzucht, Braunsch. 1788. — *Hirschfeldia* Mnch.
- Hochstetter**, W., Univ.-Gärt. in Tübingen, schr. m. Henkel üb. Coniferen. — *Hochstetteria* DC.
- Hoffm.** = **Hoffmann**, G. F., Prof. z. Götting., dann Staatsr. in Petersburg, † 1826, schr. Enum. Lichēnum, Deutschlands Flora, 1791 f., Vegetabilia cryptog., Erlang. 1787—90. — *Hoffmannia* Sw., W. — **Hoffmann**, Herm., Prof. in Giessen, namh. Mykolog, schr. Mykol. Ber. 1870—71, Index fungorum, 1863, üb. therm. Constanten etc., 1875, Lehrb. d. Bot., Darmst. 1857, u. a.
- Hoffmg.** = **Hoffmannsegge**, Graf v., in Dresden, † 1849, schr. m. Link Fl. portugaise, Berl. 1809—40. — *Hoffmannseggia* Cav.
- Hofmeister**, W., Prof. in Heidelb., dann Tübing., † 1877, namh. Pfl.-Physiolog, mit Irmsch, Pringsheim u. J. Sachs Herausg. d. Handb. d. physiol. Bot., schr. Beitr. z. Kenntniss d. Gefässkrypt. (18 T.), Lpz., Allg. Morphologie etc., Lpz. 1868, u. a.
- Holmskiöld**, dän. Bot. aus Nyborg, † 1794, schr. Beata ruris otia fungis Danicis impensa, Havniae 1790—91. — *Holmskiöldia* Retz.
- Hook.** = **Hooker**, W. J., s. 1839 Dir. d. Kew-Gärt. b. London, † 1865, schr. Niger-Flora, Lond. 1849, Fl. boreali-amer., Lond. 1829, Hooker u. Greville Icones Filicum, 1829—31, Hooker u. Taylor Muscol. brit. 2. A., 1827, Herausg. d. Lond. Bot. Magazine u. Journal of Botany. — *Hookeria* Sm. — **Hooker f.** Hooker, Jos. Dalt., Sohn u. Nachfolg. d. vor. in Kew, Reis. im Himalaya, Hook. u. Thomson Fl. Indica, Lond. 1855, Introd. ess. on t. Fl. of New-Zealand, Lond. 1853, on t. bot. of t. antarctic voyage of t. ships Erebus u. Terror, Fl. Nova-Zelandiae, Lond. 1853, Fl. of India 1873, Synops. Filicum, 1874.
- Hoppe**, Prof. in Regensb., † 1846, Herausg. d. Regensb. Flora, schr. Caricologia germ. (in Sturm's Flora, Regensb.). — *Hoppēa* W. Rehb., Dietr.
- Hornemann**, Prof. in Kopenh., † 1841, schr. Fl. Dänemarks, Hort. bot. Hafniensis, 1813 f., Nomencl. Fl. Dan., u. a. — *Hornemannia* W.
- Hornschuch**, Prof. in Greifswald, schr. üb. d. Metamorph. nieder. Organismen, 1820. — *Hornschuchia* Blum.
- Horsfield**, Thom., schr. Pl. Javanicae rarior. etc., elabor. J. Bennett et R. Brown, Lond. 1838—52, üb. Rhus u. a. — *Horsfieldia* Blum.
- Hort.** = Hortulorum, kleiner od. gewöhnlicher Gärten.
- Hortulan.** = Hortulanorum der Gärtner.
- Hort. Kew.** = Hortus Kewensis, Pfl.-Catalog der Kew-Gärten b. London v. Hooker u. Walker-Arnott, 1847.
- Hort. Mal.** = Hortus Malabaricus (im 17. Jahrh. angef. v. Joh. Cassearius).
- Host**, Leibarzt z. Wien, † 1834, schr. Fl. austriaca, Icones graminum austr., Salix, u. a. — *Hosta* Jacq., *Hostea* W., *Hostia* Mnch.
- Houston**, W., Reliquiae Houstonianae s. plantar. in Amer. meridionali collectar. Icones, Lond. 1781. — *Houstonia* L.

- Houtt.** = **Van Houtte**, L., Herausg. d. Flore des Serres u. jardins de l'Europe, Gent, schr. pl. des serres et de pleine terre, Gand 1847, † 1876 in Gent.
- Houttuyn**, Arzt u. Bot. z. Amsterdam, schr. natürl. Gesch. d. Pfl., Tiere u. Miner. nach Linnaeus, 1774—83. — *Houttuynia* Thb., Schreb.
- How.** = **Howard**, John Elliot, schr. Illustr. of the Nueva Quinologie of Pavon, 1862. — *Howardia* Wedd.
- Hudson**, W., Apoth. in London, † 1793, schr. Fl. Anglica, 3. A., 1798. *Hudsonia* L.
- Hübner**, J. G., Pflanzenkunde, Potsd. 1867 (m. Holzschn.).
- Hügel**, K. Ans. Frhr. v., Reis. in Asien, schr. üb. Kaschmir u. d. Sihksreich, 1837—41, Enum. pl. Novae-Hollandiae, üb. d. Südsee etc., 1860, üb. Kabul etc., † 1872 in Brüssel. — *Huegelia* Rehb.
- Hb.**, **Humb.** = **Humboldt**, Al. v., ber. Naturf. u. Reis. in Asien und Amerika, † 1859, schr. Fl. Fribergensis etc., 1793, Pl. équinoxiales, 1805—18, Kosmos u. a. — *Humboldtia* Vahl, Rz. Pv.
- H. B. K.** = **Humboldt**, **Bonpland** u. **Kunth**. Synops. plantar. q. in itinere ad plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland von Kunth, Paris 1822.
- Jack**, W., schott. Bot. u. Reis. in Sumatra, † 1822, schr. Descr. of Malayan plants, 1820. — *Jackia* Walt. — **Jack** u. **Etheridge**, plants in the lower Old-Red etc., 1877.
- Jackmann**, James, Hand.-Gärtn. in d. Grafsch. Surrey, erzielte besondere Clematis-Varietäten u. Blendlinge.
- Jackson**, G., schott. Bot., schr. in Linn. Soc. Transactions. — *Jacksonia* R. Br.
- Jacq.** = **Jacquin**, Nic. Jos. Bar. v., österr. Arzt, Bot. u. Reis. in Westind., † 1817, schr. Observationes bot., 1764, Fl. austriaca, Hort. Vindobonensis, Icones plant. rar., Collectanea etc. — *Jacquinia* L.
- Jäger**, G. F., schr. üb. Missbildungen etc., Stuttg. 1814, de quibusd. Pini sylv. monstros, 1828, u. a. — *Jaegeria* H. B. K. — **Jäger**, A., musci cleistocarpi, St. Gallen 1869. — **Jäger**, H., u. **Beissner**, die Ziergehölze etc., 2. A., Weim. 1883.
- Jaubert**, Graf v., m. **Spach** Illustrationes plant. orientaliū. — *Jaubertia* Spach.
- Jaume**, St. Hilaire, schr. Pl. de la France décr. et peintes d'après nature, 1808. — *Jaumea* Pers.
- Ideler**, G. F., schr. wirthsch. Gärtnerei, 2. Th., Berl. 1798—99. — *Ide-leria* Kth.
- Jessen**, Prof. d. Bot. in Berlin, schr. deutsche Exc.-Flora, Hannover 1879, Bot. d. Gegenw. u. Vorzeit, Lpz. 1864, u. a.
- Johnson**, Thom., Herausg. von John Gerarde's „the Herball“, 1633. — *Johnsonia* R. Br.
- Irmisch**, schr. z. Morphologie d. Orchideen, 1853, Beitr. z. vergleich. Morphol. d. Pfl. (8 T.), Halle 1854, u. a.
- Isnard** (Ant. Danty d'Isnard), Prof. z. Paris, † 1724. — *Isnardia* L., *Dantia* P.-Th., DC.
- Jühlke**, Franz, Hofgart.-Dir. in Berlin, Herausg. v. Schmidlin's Blumenzucht im Zimmer, 4. A., 1880, Garten-Buch f. Damen, 3. A., 1874, u. a.
- Jung**, Dr. Joach. (*Jungius*), in Lübeck 1587—1657. — *Jungia* G., L. — **Jung**, W., schr. Fl. d. Herzogt.'s Nassau, 1832.
- Jungermann**, Prof. in Giessen, schr. Fl. v. Altorf, 1615, Fl. v. Giessen, 1623. — *Jungermannia* L. u. Nees.

- Junghans**, P. C., *Icones plantar. offic. ad vitam impressae*, Halae 1788, *Icones pl. rar.* 1792. — *Junghansia* Gm. (nicht *-hausia*!).
- Junghuhn**, Fr., holl. Reis. in Java s. 1835, schr. *javan. Balanophoreen*, 1840, *Nova genera et species plant. Florae javanicae*.
- Juss.** = **Jussieu**. *Ant. Laur. de*, s. 1770 Prof. am Jardin de plantes z. Paris, ber. *Bot. u. Begründ. d. natürl. Syst.'s*, † 1836, schr. *Genera plant. secundum ord. nat. disposita* 1789, *Principes d. l. méth. nat. d. vég.* 1824, u. a. — *Jussiaea* St. Hil., *Jussieua* L., *Jussieuaea* Rottl. — **Jussieu**, Bernard de, 1699—1777, *Onkel des vorig.*, s. 1759 im k. Gart. z. Trianon, *Zusammenstell. d. Pfl. darin in 65 Ord.* — **Juss.**, Joseph de, *Condamine's Reisebegleit. u. Samml. in Südamer.*, 1735. — **Juss.**, Antoine de, *Arzt u. Prof. am bot. Gart. z. Paris*, † 1758. — **Juss.**, Adrien de (**A. Juss.**), d. Brud. *Ant. Laur.'s*, † 1853, schr. *Euphorbiacearum genera* 1824, *Elementarcur.* 1840 (deutsch v. Schmidt), u. a.
- Kämpfer**, Engelbr., *Leibarzt in Lippe*, Reis. in Japan, † 1716, schr. *Amoenitatum exoticar. fasc. V*, 1712 (deutsch Lemgo 1717—19), *Icones select. q. in Japonia collegit etc.*, Lond. 1791. — *Kaempferia* L. (-ra Spr.).
- Kalm**, Pet., *Linné's Schüler*, Reis. in Nordamer., † 1779, *Prof. z. Åbo in Finnland*, schr. *Fata botanices in Finnland*, 1758, *Fl. fennica*. 1765, u. a. — *Kalmia* L.
- Kanitz**, A., schr. *Gesch. d. ungar. Bot. etc.*, Halle 1865, *Haynaldia* n. g. in *Magyar Növentanidapok*, 1877, u. a.
- Karsten**, H., schr. *Auswahl neuer etc. Gew. Venezuela's*, Berl. 1848, *Fl. Columbiae specim.*, Berl. 1858. — **Karsten**, P. A., schr. *Fungi novi Fennici*, Helsingfors 1868.
- Kaulfuss**, Prof. in Halle, † 1830, schr. *Enum. Filicum quas etc.*, 1824, d. *Wesen d. Farnkräuter*, Lpz. 1827, u. a. — *Kaulfussia* Blum., *Nees*.
- Kemmler**, C. A. (u. v. Martens), *Flora v. Württemberg u. Hohenzollern*, 3. A., 1883.
- Kerner**, J. S., schr. *gift. u. essb. Schwämme*, Stuttg. 1786. — *Kenera* Mea u. W. — **Kerner**, A., *Abbild. aller ökon. Pfl., Primulaceen d. östr. Alpen* (*Östr. Bot. Zeit.* 1875), *Gesch. d. Aurikel* u. a.
- Kew-Gardens** s. *Hort. Kew*.
- Kieck**, J., schr. *Récherches s. l. Flore cryptog. des Flandres*, Brux. 1840—55.
- Kieser**, D. G., *Elemente d. Phytotomie*, Jena 1815. — *Kieseria* Reinw.
- Kirschleger**, Prof. in Strassb., schr. *Fl. d'Alsace*, 1852—58, *Fl. vogëso-rhénane*, 1870, u. a.
- Kitaibel**, Prof. z. Pest, † 1818, schr. *Descr. et Icon. pl. rarior. Hungariae*, Wien 1803—12. — *Kitaibelia* W.
- Kittel**, M. B., *Taschenb. d. Flora Deutschlands*, 1837 u. 47. — *Kittelia* Rehb.
- Klatt**, F. W., schr. *Plantae Muellerianae*, *Monogr. Gen. Sisyrhinchium, Revisio Iridearum* (in d. *Linnaea*), 1864—66, u. a. — *Klattia* Bak.
- Klein**, J. H., dän. Reis. in Ostind., 1750—98. — *Kleinia* L. — **Klein**, J. Th., schr. *Dubia circa pl. marinas etc.*, *Petrop.* 1760. — **Klein**, M., schr. *Abh. üb. Ratanhia*, Stuttg. 1819, u. a.
- Klobisch**, R., schr. *deutsche Waldbäume u. ihre Physiognomie* (16 T., 88 Holz.), Leipzig 1857.
- Klotzsch**, Apoth. u. *Custos d. k. Herbariums z. Berlin*, † 1860, schr. *Begoniaceen etc.* (12 T.), Berl. 1855, *Herbar. vivum mycolog.* 1855—59, fortg. v. *Rabenhorst*, *Klotzsch u. Garcke*, d. *bot. Ergebnisse d.*

- Reise d. Prinz. Waldemar etc., Berl. 1862, u. v. a. — Klotzschia Cham.
- Knab**, Mich., Verw. d. Frhrn. v. Stieber in Vorchheim b. Nürnberg, schr. Hortopomologium od. Garten-Peltzbuch, 1620.
- Knapp**, Joh. Leonh., † 1845, Herausg. d. Journal of t. naturalist, Lond. 1819, schr. Gramina britann. 2. A. 1840. — Knappia Sm. — **Knapp**, Jos. Herm., schr. Prodr. Fl. Nitriensis, Vindob. 1865.
- Knaut**, Chr., Prof. z. Halle 1654—1716, schr. Method. pl. genuina, Lips. 1716. — Knautia Coult.
- Knight**, Thom. Andr., † 1838, Präs. d. Lond. Gartenb.-Ges., schr. üb. Degenerieren d. Obstsorten. — Knightia R. Br.
- Kniphof**, J. H., Botanica in originali s. Herbar. vivum. Centuria X., Halae 1763 (100 kol. Taf.).
- Knorr**, G. Wolfg., schr. Thesaurus rei bot. hortensiq., Norimbergae 1759—72. — Knorria Sternb., Göpp.
- Knowles** u. Westcott, Herausg. d. Floral Cabinet, Lond. 1837—40, schr. t. Birmingham bot. garden, 1836—37.
- Kny**, L., Prof. in Berlin, schr. Pflanzenleben d. Meeres, Berl. 1875, Fl. d. ozean. Inseln, 1867, bot. Wandtafeln etc., 1876—85 (70 T. in Farbdr.), u. v. a.
- Koch**, W. D. J., Prof. z. Erlangen, † 1849, schr. Synops. Fl. germ. et helvet. od. Taschenb. d. deutsch. u. schweiz. Flora, Leipz. 6. A., 1865, Röhling's Fl. Deutschl.'s m. Mertens bearb. 1823—39 (5 B.), u. a. — Kochia Roth. — **Koch**, K. od. C., Prof. in Berlin, Reis. im Kaukasus, † 1879, schr. Hort. dendrolog. etc., Berl. 1873, Dendrologie etc., Erlang. 1869, d. bot. Gärt. Berlins, 1860, u. a.
- Koeler**, Prof. z. Mainz, schr. Descr. graminum, 1802. — Koeleria Pers.
- König**, Joh. Gerh., dän. Nat. u. Reis. in Ostind., † 1785 in Tranquebar. — Koenigia L. — **König**, Sam. Fr., de Lamio Plinii, Argentor. 1742. — **König**, Em., schr. regnum vegetabile quadripartitum, Basil. 1708. — **König**, K., Geistl., schr. Führer durch d. Pfalz, 1841.
- Kbr.** = **Körper**, Prof. z. Breslau, Kryptog., schr. Syst. Lichenum Germ., Bresl. 1855, Parerga lichenologica, 1855 u. 59, u. a. m.
- Körnike**, Prof. z. Poppelsdorf b. Bonn s. 1867, schr. Mon. de Eriocaulaceis, Berol. 1856, Mon. Marantacearum, Mosk. 1859, Mon. d. Rapataceen (in d. Linnaea, 1872), u. a.
- Körte** s. Schweigger.
- Kohl**, schr. Taschenwörterb. d. bot. Kunstausrücke für Gärtner. Berl. 1883.
- Kops**, schr. mit Van Hall, Miquel etc., Fl. Batava etc., Amsterd. 1860—1860 (üb. 1000 kol. T.). — Kopsia Blum., Dumart.
- Kosteletzky**, schr. Allg. mediz.-pharmaz. Flora (6 B.) Mannheim, Clavis analyt. in Floram Bohemiae phanerogamam, Prag 1824. — Kosteletzky Presl, J. Eck.
- Kotschy**, östr. Reis. im Orient, schr. Vegetat. d. Isthmus v. Suez, Wien 1858, de plantis nilotico-aethiopicis Knoblecherianis, Wien 1864, plantae Binderianae nil.-aeth., Vienn. 1865, d. Libanon u. seine Alpenflora 1864, u. a. — Kotschya Endl.
- Kratevas** s. Cratevas.
- Krause**, Abbild. u. Beschr. aller Getreidearten, Leipz. 1834—37 (8 H.).
- Krebs**, J. L., vollst. Beschr. u. Abbild. d. sämmtl. Holzarten d. mittl. u. nördl. Deutschl.'s (139 kol. T.), Brschw. 1826—35.
- Krempelhuber**, A. v., Salinen- u. Forstmeist. z. München, schr. Lichenflora Bayerns 1861, Gesch. u. Liter. d. Flechten 1867—70, d. Flechten als Parasiten d. Algen (in der Flora, 1871), u. a.
- Kroker**, Ant. Joh., Arzt in Breslau, † 1823, schr. Fl. Silesiaca renovata 1787—1823. — Krokeria Mnch.

- Krombholz**, J. Vinc. v., † 1843 in Prag, gab heraus *Abbild. essb. u. schädli. Schwämme*, Prag 1831—47 (10 H., 2000 kol. Fig.).
- Krüger**, Dr. M. Sal., schr. *Bibliographia bot. od. Handb. d. bot. Literatur m. biogr. Skizzen*, Berl. 1841. — *Kruegeria* Neck.
- Küchenmeister**, Arzt in Dresd., schr. 2. Abt. d. menschl. Parasiten (pflanzl. Par.), Leipz. 1858.
- Kühn**, Jul., Prof. in Halle, schr. d. Krankheiten d. Culturgew., Berl. 1858, u. a.
- Kützing**, E. T., Prof. an d. Realsch. z. Nordhausen, namh. Algolog, schr. *Synops. Diatomacearum 1834*, *Algarum aq. dulc. Decas*, *Phycologia germ.*, 1846, *Grundz. d. philos. Botanik*, Lpz. 1851—52, u. a.
- Kuhn**, Adam, Bot. in Pennsylvanien, Linné's Schüler. — *Kuhnia* L. f. — **Kuhn**, Max, Bot. bes. *Farnkenner z. Berlin*.
- Kummer**, Paul, schr. Führer in d. Pilzkunde, Zerbst 1871, *Kryptog. Charakterbilder*, 2. A., Halle 1883, *deutsche Blumenwelt in Charakterbildern*, 2. A., Halle 1883.
- Kth.** = **Kunth**, Prof. in Berlin, Assist. A. v. Humboldt's u. Bonpland's bei Herausg. d. in Amerika ges. Pflanzen, † 1850, schr. *Fl. Berlinens.*, *Handb. d. Bot.*, *Synops. Pl. aequinoct. orbis novi*, Par. 1822. — *Kunthia* Hb.
- Kuntze**, Dr. O., schr. „Um d. Erde“, Lpz. 1831, *Phytogeogenesis*, Lpz. 1884.
- Kze.** = **Kunze**, Prof. u. Dir. d. bot. Gart. z. Leipzig, † 1851, *Deutschland's Schwämme in getrockn. Exempl.* 1816, K. u. Schmidt, *Mykol. Hefte* 1817—23, *Anal. pteridographiae* 1837, d. *Farnkr. in kol. Abb.*, 1840—51, *Schkuhr's Riedgräser* 1840—50, u. a. — *Kunzia* Spr.
- Kurz**, S., schr. *Forest Flora of British Burma* (*Asiat. Soc. of Bengal*, 1877), on *Pandanophyllum* etc., *Calcutta* 1863, *Sketch etc. of t. Nicobar Islands* 1875, t. *forest of Pegu*, 1875.
- Lab.** = **Labillardier**, J. Houtte de, bot. Reis. im Orient u. in Neuholland, † 1834, schr. *Icones pl. Syriae rar.*, 1791—1812, *Novae-Hollandiae plant. specimen*, *Sertum austro-caledonicum*, Par. 1824—25. — *Labillardiera* R. S., *Billardiera* Sm., -*deria* Spr.
- Lag.** = **Lagasea**, span. Bot., † 1839 zu Barcelona, schr. *Amenidades natur. de las Españas* etc., 1811, *Elenchus plant. etc.*, 1816, *Umbelliferae*, 1826, u. a. — *Lagasea* W., -*cia* Cav.
- Laharpe**, Pablo J. de, schr. *Monogr. d. Juncaceen*.
- La Llave**, span. Arzt u. Bot. in Mexiko, schr. mit Juan Lexarca *Novorum vegetab. descr.*, Mexici 1824/25.
- Lam.** = **Lamarek** (La Marck), J. B. v., *Nat. in Paris*, † 1829, schr. *Fl. Franç.*, *Hist. nat. d. vég.*, 1802, *Encycl. méth. botanique*, 1783 bis 1817 (13 B. m. Atl.). — *Lamarckia* Mch., *Rich.*, -*kea* Pers.
- Lamb.** = **Lambert**, Aylmer Bourke, schr. *Descr. of gen. Pinus*, Lond. 1803. — *Lambertia* Sm. — **Lambert**, G., schr. *de geogr. plant. in Wetteravia et Marchia Brandenb. indegenarum*, Berol. 1849.
- Lamx.** = **Lamouroux**, Prof. z. Caen, † 1825, schr. *Diss. s. plus. espèc. de Fucus*, 1805, *Thalassiphytes* etc., *Hist. d. polypes corallig. etc.*, 1816. — *Lamourouxia* H. B. K.
- Langsdorff** in Brasil., mit Fischer Reis. um d. Erde unt. Krusenstern, schr. *üb. Cainca-Wurzel* (*Chiococca scandens*). — *Langsdorffia* Mart., W.
- Lantzius-Beninga**, S., schr. d. unterscheid. Merkmale d. Pfl.-Fam. u. -Geschl. (I. Dially- u. Gamopetalen), Gött. 1866.
- Lap.** = **Lapeyrouse**, Ph. Picot (La Peyrouse) Bar. de, † 1818 in Toulouse, *Figures d. l. Fl. des Pyrénées* 1813 u. *hist. abrég. d. pl. des Pyrénées*, 1813—18. — *Lapeyrousia* Thb., *Gawl.*

- La R.** = **La Reina**. schr. Buch d. Tierheilkunde (Albeiteria), 2. A., 1552.
- Lasch**, Apoth. z. Driesen in d. Neumark, † 1863, sammelte Schwämme für Rabenhorst's Fungi europaei, mit Baenitz Herbarium norddeutsch. Pfl., 1860. — *Laschia* Corda.
- Lauche**, W., k. pr. Gart.-Insp. d. Gärtner-Lehranst. b. Potsdam, s. 1877 Geschäftsf. d. deutsch. Pomol. Vereins, † 1883, schr. deutsche Pomologie u. deutsche Dendrologie, 2. A., 1883.
- Lawrence**, Marie, Pfl.-Malerin, a collect. of Roses from nature, 1796—99. — *Lawrencia* Lyngb. (*Laurencia*).
- Lawson**, J., schr. Diss. sistens Nihil officinale, Lugd.-Bat. 1737. — *Lawsonia* L.
- Laxmann**, Erich, Past. in Sibirien, dann Prof. u. russ. Hofrat, † 1796, schr. sibir. Briefe, Götting. 1769, Beitr. z. Flora u. Fauna Russlands (in Nov. comm. acad. Petropol.). — *Laxmannia* Forst., R. Br.
- Lebr.** = **Lebreton**, F. Man., schr. De botanica à l'usage des amateurs etc., Par. 1787. — *Lebretonia* Schrk.
- Lechenault** s. *Leschenault*.
- Lecoq**, Henri, Prof. z. Clermont-Ferrand, **L.** u. **Juillet** schr. Dict. rais. des termes de bot., 1831, **L.** u. **Lamotte** schr. Catal. rais. d. pl. vascul. du Plateau central d. l. France, 1847, u. a. — *Lecokia* DC.
- Ledebour**, K. F. v., Prof. z. Dorpat, † 1851 zu München, schr. (mit Meyer u. A. v. Bunge) Fl. altaïca, 1829—34, Icones Fl. ross., Fl. rossica, 1842—53. — *Ledebouria* Roth, Lk.
- Leers**, Apoth. z. Herborn im Nassau'schen, † 1774, schr. Fl. Herbornensis, 1775. — *Leersia* Sw., Sol.
- Lehm.** = **Lehmann**, J. C. G., Prof. in Hamburg, † 1860, schr. Monogr. gen. Primularum, 1817, Potentillar., 1820, Novarum Stirpium pugillus, 1828—57, Plantae novae in horto Hamb., u. a. — *Lehmannia* Spr. — **Lehmann**, C., schr. Plantae Preissianae s. Enum. pl. in tot. Australasia occid. collect. de L. Preiss, Hamb. 1844—48.
- Lej.** = **Lejeune**, Hospitalarzt in Verviers, † 1858, schr. Fl. des environs de Spa, 1811—13 (mit Lindenberg), mit Courtois Compend. Fl. belgicae, Leodii 1828—36. — *Lejeunia* Gottsch., Lindenb.
- Leitgeb**, Prof. in Graz, schr. Pflanzenphysiologie, Lebermoose, Jena 1874, u. a.
- Lefieur**, Graf, Intend. d. Staatsgärten, † 1849 in Versailles, schr. Pomone française etc.
- Lem.** = **Lemaire**, Charl. Ant., Red. d. Jardin fleuriste u. Horticulteur Universel, Red. d. Illustr. horticole v. Ch. Verschaffelt, † 1871.
- Lenné**, Pet. Jos., Gen.-Dir. d. k. Gartens z. Berlin, Begründ. d. Lenné'schen Gartenschule, † 1866. — *Lennæa* Klotzsch.
- Leroy**, André, franz. Pomolog, Herausg. d. Dictionnaire de Pomologie s. 1866.
- Lerz**. schr. Handb. d. Gartenkunde (2 Th. in 4 B.), 5. A., Jena 1849.
- Leschenault** de la Tour, bot. Reis. in Südas. u. Südamer., † 1826 in Paris, schr. üb. d. Veget. v. Neuholl., Par. 1824 (in Peron's Voyage de decouvertes 1800—1804). — *Leschenaultia* R. Br.
- Less.** = **Lessing**. Chr. Fr., schr. Synops. gen. Compositarum, Berol. 1832, u. de gen. Cynarocephalorum, Berol. 1832, Synanthereen d. Berliner Herbarium. — *Lessingia* Cham.
- Lesson**, R. P., Naturf. b. d. antarkt. Exped. d. Capt. Duperrey 1826, schr. Fl. Rochefortine etc. — *Lessonia* Bory.
- Lestiboudois**, Fr. Jos., Prof. in Lille, † 1815, schr. Botanographie belgique, 1781, De viribus plant. Duaci (Douai), 1783. — *Lestiboudesia* P.-Thou.
- Leunis**, Joh., Prof. in Hildesheim, † 1875, Synops. d. Pfl., 3. A. v. A. B. Frank 1882.

- Lev.** = Leveillé. Arzt in Paris, † 1870, namh. Mykolog, Icones d. champignons de Paulet 1855 u. zahlr. Abh. über Pilze. — Leveilléa Decsn.
- Lex.** = Lexarza s. La Llave.
- Leysser**, F. W. v., † 1815, schr. Fl. Halensis 1783—96, 2. A. — Leysera L., Leyssera DC.
- Lib.** = Libert, Mar. Anna, Kryptog. z. Malmedy, † 1865, schr. Mém. s. des cryptog. observ. aux environs de Malmédy, 1826. — Libertia Spr. u. Libertella Desm.
- Liboschitz**, Arzt in Petersburg, † 1824 in Wien, schr. m. Trinius Fl. des environs de St. Petersb. et Moscou, 1811, Descr. de mousses etc., 1811.
- Libri de re rustica** (Cato, Varro, Columella, Palladius), Basel 1535.
- Lichtenstein**, schr. Index alph. gener. bot. quotquot a Willdenow in Spec. pl. et Persoonio in Synopsi pl. rec., Helmst. 1814.
- Liebe**, Th., schr. geogr. Verbreit. d. Schmarotzerpfl., Berl. 1862, Grundr. d. spez. Bot., Berlin 1866 etc.
- Liebig**, Lud. Leop., ber. Gärtn. in Dresden, † 1872, erzog mit Traugott Seidel zuerst Camellien, Azaleen, Rhododendron, Eriken etc. in Massen. — Liebigia Endl.
- Liebmann**, Reis. in Mexiko, Prof. in Kopenh., † 1856, schr. Mexicos Bregner, Kopenh. 1849, Mexicos Halvgraes (Cyperaceae), 1850, l. chènes de l'Amér. trop. (v. Oersted fortg.). — Liebmannia Menegh.
- Liegel**, Dr. G., Pomolog in Braunau (Oberösterr.), schr. syst. Anleit. z. Kenntn. d. Pflaumen, Passau 1847, u. a.
- Lightfoot**, John, Pfarrer z. Gotham (Engl.), † 1788, schr. Fl. Scotica, Lond. 1772. — Lightfootia Schreb.
- Liljeblad**, Sam., schwed. Bot., † 1815, schr. Utkast til en Svensk Flora etc., 1792, Coloniae pl. in Suecia, Upsal. 1819.
- Lindblad**, Adolf, Dozent in Upsala, schr. Synops. Fungorum in Suecia, 1853, Monogr. Lactoriorum Sueciae, u. a. — Lindbladia Fr.
- Linden**, Jean Jules, v. Luxemb., Reis. u. Orchideen-Zücht. in Brüssel, s. 1870 Bes. d. Handelsgärtnerei v. Ambros. Verschaffelt in Gent. — Lindenia Benth.
- Lindenber**, Amtm. z. Bergdorf, † 1851, L., Gottsche u. Nees v. Esenb., Synops. Hepaticarum, Hamb. 1844—47, Mon. d. Riccien, 1836, u. a. — Lindenbergia Lk.
- Lindl.**, Ldl. = Lindley, John, Prof. z. London, † 1865, schr. Synops. of t. Brit. Flora, 1829, t. fossil Fl. of Gr.-Britain, 1831—37, Sertum Orchidacearum, 1838, t. Flower-Garden, 1850—53, u. a. — Lindleya Hb. Kth., Nees.
- Lindsay**, Arzt in Dumfries, schr. a popular hist. of brit. Lichens, 1858, Contrib. to New-Zealand Botany, 1868. — Lindsaya Dry.
- Lk.** = Link, H. F., zuletzt Prof. in Berlin, † 1851, schr. Diss. bot., 1795, Element. philos. bot., Berl. 1837, Handb. d. nutz. etc. Gew., 1829—33, Icones pl. select. Horti Berol. 1820—28, Hort. reg. bot. Berol. 1827—33, u. v. a. — Linkia Mich.
- Linke**, J. R., schr. Analyt. Pflanzenschlüssel z. Bestimm. d. deutsch. Pflanzengeschlechter, Lpz. 1863. .
- L.** = Linné (Linnaeus), Karl Ritter v., ber. Prof. d. Naturg. u. Systemgründ. d. Bot. z. Upsala in Schweden, † 1778, schr. Systema naturae etc., 8. A. v. Gmelin, Lpz. 1788—93, Genera plantar., 8. A. v. Hänke 1791, Species plant., 4. A. v. Willdenow, Syst. vegetabilium, 16. A. v. Sprengel 1825—28, u. s. f. — Linnaea Gronov. — **L. f.** = Linné filius, Carl v., des vor. Sohn, schr. Decas I u. II plantar. rarior. Horti Upsal., Nova graminum genera, Method. muscor. ill., Ups. 1781.

- Lipp**, J. J., schr. *ΓΥΓΧΕΙΟΙΔΙΟΝ ΒΟΤΑΡΙΖΟΝ*, Vindob. 1765.
- Lobel** (Lobelius), eig. Matth. de l'Obel aus Flandern, Bot. Jakobs I., † 1616 bei London, schr. *Plantar. s. Stirpium Hist.*, Antwerp. 1576, *Icones etc.* 1581. — *Lobelia* L.
- Lodd.** = **Loddiges**, Conr., ber. Züchter z. Hackney b. London, † 1820, Herausg. d. *Botanical Cabinet*, 1818—24. — *Loddigesia* Sims.
- Logan**, James, Statth. v. Pennsylvan., † 1736, schr. de plantar. generatione, Lugd.-Bat. 1739. — *Logania* R. Br.
- Loeßling** (**Löffling**), schwed. Bot. u. Reis., † 1756, schr. *Iter Hispanicum*, Stockh. 1758. — *Loeßlingia* L. — *Loeßlingia* Röm.
- Loesel** (Loeselius), Joh., Prof. in Königsb., † 1655, schr. *Fl. prussica*, 1703, *Plantae in Borussia nascent.*, 1654. — *Loeselia* L.
- Loew**, E., d. bot. Unterr. an höher. Lehranstalten, Bielefeld u. Lpz. 1876, method. Übungsbuch, Berl. 1875, Artikel in d. *Centralorg. f. d. Interessen d. Realschulwesens in Berlin*, üb. 2 krit. *Hyphomyceten*, Berl. 1874, u. a.
- Lois.** = **Loiseleur-Deslongchamps**, Arzt in Paris, † 1849, schr. *Fl. gallica*, 1828, *Manuel d. plant. us. indigènes*, 1819, *Herbier général de l'amateur*, 1816—27. — *Longchampia* DC., *Loiseleuria* Desv.
- Lonicer** (**Lonicærus**), schr. *Kreuterbuch, künstl. Conterfeyung d. Bäume, Stauden, Kreuter etc.*, Item *Gethieren etc.*, Frankf. 1609, 2. A., 1630, Dasselbe herausg. v. Uffenbach, Ulm 1716 u. Augsb. 1733. — *Lonicera* L.
- Lorentz**, s. 1870 Prof. z. Cordova in Südamer., schr. *Moosstudien*, bryolog. *Notizenb.*, üb. *Laubmoose etc.*
- Lorinser**, G. u. F., schr. *Taschenb. d. Flora Deutschl.'s u. d. Schweiz*, 2. A., Wien 1851, d. wichtigst. essb., verdächt. etc. *Schwämme*, 3. A., Wien 1881 (Dr. F. W. Lorinser).
- Lond.** = **Loudon**, John Claud., schr. *Hort. britann.*, 3. A., 1839, *Arboretum u. Fruticetum brit.*, 1838, t. *Gardener's Magazine*, 1826—43. — *Loudonia* Ldl. — **Loudon**, Mrs., the ladies' companion to the flower garden, Lond. 1849.
- Lour.** = **Loureiro**, portug. Mönch, schr. *Fl. cochinchinensis*, 1790. — *Loureira* Cav., *Lourea* Neck.
- Lowe**, Rich. Thom., schr. *Primitiae Faunae et Florae Maderae*, 1831, a *manuel Fl. de Madeira*, 1863. — *Lowea* Ldl. — **Lowe**, E. J., schr. *Ferns, brit. and exotic*, 1856—60, beautiful leaved plants, London 1864, u. a.
- Lozano**, Pedro, schr. *descripcion chorograf. del terreno, rios, arboles etc.*, del gran Chaco, Gualambo etc., Cordoba 1733. — *Lozania* Seb., Mut.
- Lucas**, Dr. Ed., ber. *Pomolog Deutschl.'s*, Vorst. d. *Gartenbau-Schule z. Hohenheim*, schr. d. *Lehre vom Obstbau*, 6. A., u. v. a.
- Ludwig**, Chr. Gottl., Prof. z. Leipz., † 1773, schr. *Definit. generum plant.*, ed. Böhmer, Lps. 1769. — *Ludwigia* L. — **Ludwig**, Chr. Fr., Prof. in Leipz., † 1823, schr. de plant. munimentis, 1776, *Handb. d. Bot.*, 1800. — *Ludwigia* DC. (?)
- Luerssen**, Prof. z. Neust.-Eberswalde, schr. *Grundz. d. Bot.*, 1877 u. 1879, *Repetit. f. Studierende*, Lpz. 1877, Herausg. v. Rabenhorst's *Kryptogamenflora*, u. s. f.
- Lugo**, N. Benitez de, u. Germ. Wildpret, schr. *Catálogo de las plantas etc. de la Orotava en Teneriffé*, 1879. — *Lugoa* DC.
- Luizet**, Gabr., fr. *Pomolog u. Zücht.* (bes. *Pfirsiche*), schr. *Traité de cult. et de taille des arbres fruitiers*, † 1876.
- Lumnitzer**, Steph., † 1806 z. Pressburg, schr. *Fl. Posoniensis*, 1791. *Lumnitzera* Jacq., Willd.

- Lund, Dr. P. W., schr. Bemerk. üb. Weg- u. Unkrautpflanzen Brasiliens, 1838 (in Kroyer's naturw. Tidsskrift, II. 1, 1838). — Lundia Schum., DC.
- Lyngb. = Lyngbye, Pred. auf Seeland, † 1837, schr. Tent. Hydrophytologiae danicae, Kopenh. 1819. — Lyngbya Ag.
- Maack, Dir. d. Gymn. z. Irkutsk, Reis. i. Amurland. — Maackia amurens. Rupr.
- Mackay, Dr. J. T., Dir. d. bot. Gart. d. Trinity-College z. Dublin, † 1862, schr. Fl. hibernica 1825 u. 35. — Mackaya Arn.
- Magnol. P. (Magnolius), schr. Hort. reg. Monspeliens., Monsp. 1697. — Magnolia L.
- Magnus, P., Prof. in Berlin, schr. üb. d. Gatt. Najas, 1870, M. u. A. Braun üb. Adventivknospen an Blätt. (Verh. d. bot. Ver. d. Mark Brandenburg., 1874).
- Malpighi, Marcell., ital. Arzt u. Bot., 1623—94, schr. Anatome Plantar., Lond. 1675, Opera posthuma, Lond. 1697. — Malpighia L.
- Manetti, Dir. d. bot. Gart. in Mailand. — Manettia L., Mut., Manetti-Rose (R. chin. Jacq. var.).
- Manger, H. L., Pomolog u. Architekt Friedr.'s II. in Potsd., schr. Vollst. Anleit. z. syst. Pomologie 1780—83.
- Maregrav, G., Ingenieur u. Reis. in Afrika, † 1644 in Guinea, Guil. Pisonis et G. Maregravii, Hist. nat. Brasiliae, Amstelod. 1684. — Maregravia (-fia) L.
- M. B. = Marschall v. Bieberstein, s. Bieberstein.
- Marsh. = Marshal, Humphrey, schr. Besch. d. wildw. Bäume u. Staudeng. in Nordamer., Lpz. 1738. — Marshalia Schreb.
- Martens, G. v., Kanzl.-Rath in Stuttg., schr. Monogr. d. Gartenbohnen, 1860, m. Schübler Fl. v. Württemb., 1834.
- Martin, A., D. Pflanzennamen d. deutsch. Flora etym. erklärt, Halle 1851.
- Mart. = Martins, C. F. Ph. v., aus Erlangen, Reis. in Brasil., dann Prof. in München, † 1868, schr. Hist. nat. Palmarum, 1823—50, Spix u. Mart., Reise in Bras. 1824—31, Fl. Brasiliens., 1837—40. — Martusia Schult.
- Mas, Alphonse, Obstzücht. z. Bourg, † 1875, s. 1863 Herausg. d. pomol. Werkes le Verger, s. 1874 m. Pulliat v. le Vignoble.
- Mass. = Massalongho, Prof. z. Verona, † 1860, schr. üb. Flechten u. foss. Pfl. — Massalonghia Kbr.
- Masson, schwed. Reis. u. Samml. am Cap 1786—96 (Orchideen für Lindley), schr. Stapeliae novae. — Massonia L.
- Maurer, L. H., Obstz. in Jena, schr. d. Beerenobst unsrer Gärten, Monogr. d. Stachelbeeren, Herausg. d. Cultur- u. Fruchtsträucher v. Fuller (— „d. Fuller Deutschlands“, Rümpler).
- Maximowicz, russ. Reis. um d. Erde, s. 1853 Conserv. am bot. Gart. z. Petersb., schr. Diagn. plant. nov. asiat. (Mélanges biolog. 1877), Primitiae Fl. Amurensis (Petersb. Akad. 1858). — Maximoviczia Rupr.
- Mayer, schr. Pomona francaonica (d. Obstsorten Franksens, m. Abb.), 1750. — Mayer, J., schr. üb. einheimische Giftgew., üb. essbare Schwämme, Berl. 1801.
- Med. = Medicus, F. K., Reg.-Rath u. Dir. d. Schwetzinger Gartens, † 1808, schr. Philos. Bot., Mannh. 1789—91, üb. Pfl.-Physiol. u. Anatomie, Lpz. 1803, Nordamerik. Bäume etc., 1792, u. a. m. — Medicusia Mnch. — Medicus, Dr. W., schr. unsre essb. Schwämme, 5. A., Kaiserslaut. 1884.

- Mejer**, Dr. L., in Hannover, schr. üb. d. Deutung d. Pflanzennamen (d. Natur, Halle, Nr. 52, 1881).
- Meisner**, C. Fr., Prof. in Basel, schr. Plantar. vasc. genera etc., Lpz. 1837, Mon. gen. Polygoni, 1825, u. a. — *Meisneria* DC.
- Meister**, G., 1682—87, Reis. in Ostind. u. Japan, Samml. f. d. Prinzen v. Oranien, 1689 in Dresden, schr. indianischer Kunst- u. Lustgarten, Dresd. 1690. — *Meisteria* Scop.
- Meneghini**, Prof. z. Pisa, Algolog, schr. Conspect. Algolog. Euganeae, Paduae 1837, Synops. Desmidiarum, Alge italiane e dalmatiche, 1842—46, u. a.
- Mer.** = **Merat**, F., franz. Arzt u. Bot., † 1851, schr. Nouv. Fl. des environs de Paris, 6. A., 1841, Rêvue de la Fl. Parisienne 1843, Elémens de bot., 6. A., 1829, u. a. — *Meratia* Lois., Cass.
- M. K.** = **Mertens** u. **Koch**, d. erste Prof. in Bremen, † 1831 (s. Koch, Prof. in Erlang.). — *Mertensia* H. B. K.
- Mett.** = **Mettenius**, Prof. z. Lpz., † 1866, schr. Filices Horti bot. Lipsiens. 1856, Rhizocarpeen, Hymenophyllaceen etc.
- Metzger**, Joh., Gart.-Insp. in Heidelb., dann Dir. d. Landw. Anstalt z. Karlsruhe, † 1852, schr. Europäische Cerealien, Mannh. 1824, Landw. Pflanzenk., 1841, Gartenbuch, 5. A. 1876. — *Metzgeria* Raddi.
- Meyen**, Prof. in Berlin, † 1840, schr. Neues Syst. d. Pfl.-Physiologie, Berl. 1837—39, Beitr. z. Bot. ges. auf d. Reise um d. Erde, Grundr. d. Pflanzengeogr., Berl. 1836, u. a. — *Meyenia* Benth.
- E. Mey.** = **Meyer**, **Ernst** H. Fr., Prof. in Königsberg, † 1855, schr. Preussens Pfl.-Gattungen etc., 1839, Comment. de plant. Africae australioris, ges. v. Drege, Lpz. 1835—37, Gesch. d. Bot., 1854—57, u. a. m. — *Ernestia* DC. — **G. Mey.** = **Meyer**, **Georg** F. W., Prof. in Göttingen, † 1856, schr. üb. Flechten, Fl. hannoverana, Götting. 1849. — **C. Mey.** = **Meyer**, **Carl** Ant., Reis. in Sibir., dann Dir. d. Bot. Gartens z. Petersb., † 1855, schr. Pflanzen am Kaukasus etc., 1831, Fl. altaica, Fl. Prov. Tambow, Wiatka etc. — *Meyera* Schreb. (-ia) DC.
- Mchx.** = **Michaux**, André u. Andr. François (Vater u. Sohn), franz. Reis., d. erst. † 1804 auf Madagaskar, schr. Hist. d. chênes de l'Amérique u. Fl. boreali-americana; **Mchx. f.**, schr. Hist. des arbres forest. de l'Amér. septentr., Paris 1810—13. — *Michauxia* l'Hér. (Mchx. sen.).
- Mich.** = **Micheli**, Insp. d. Gr. Gartens z. Florenz, † 1737, d. grösst. Kryptog. s. Z., schr. Nova pl. genera, 1729, Catal. pl. Hort. Florentini (Op. posthum. 1748). — *Michelia* L.
- Michelis**, F., schr. d. Gedanke in d. Gestaltg. d. Pflanzenreichs, Bonn 1871.
- Miers**, J., Reis. in Südamer., † 1879, schr. Neue Sippe Brasil's, do. Chili's, Cruikshanksia Miers u. a. — *Miersia* Lindl.
- Mikan**, J. C., schr. Delectus Flora et Faunae Brasiliensis, Viennae 1825. — *Mikania* W.
- Mikosch**, schr. üb. Knospendecken dicotyl. Hölzer, Wien 1876, üb. Chlorophyll., 1878, u. a.
- Milde**, Prof. z. Breslau, † 1871, schr. Mon. d. Equiseten, Dresd. 1865, d. höh. Sporenpfl. Deutschl.'s u. d. Schweiz, Farne etc., Bryologia silesiaca od. Laubmoose Nord- u. Mitteldeutschl., Lpz. 1869, u. a.
- Mill.** = **Miller**, Ph., kenntnisr. engl. Gartenbot., † 1771, schr. Darstell. d. Linné'schen Sexualsystems (deutsch u. lat. v. Borkhausen, Frankf. 1804), t. Gardener's Dictionary od. Gartenlexikon (deutsch v. Huth, 2. A. 1769—76, 9. A. 1807). — *Milleria* L.
- Miltitz**, v., † 1840 in Dresden, schr. Handb. d. bot. Litteratur, 1829 (v. M. u. Reichenbach: Bibliogr. bot.).

- Miq.** = **Miquel**, Prof. in Utrecht, † 1871, schr. üb. jav., sumatr. u. jap. Flora, Genera Cactearum, 1837, d. Casuarineen in De Candolle's Prodrumus, d. Chloranthaceen etc. in Martius' Fl. brasil., u. a. — **Miquelia** Nees.
- Mirbel** (Brisseau-Mirbel), fr. Pfl.-Physiol., † 1854, Mitarb. v. Lamarek (Naturg. d. Pfl.). — **Mirbelia** Sm.
- Moç.** = **Moçino** (u. Sessé), Bearb. d. Fl. Mexicana, † 1819. — **Mocinia** DC.
- Mneh.** = **Mönch** (Moench), Prof. in Marburg, † 1805, schr. Enum. pl. indig. Hassiae praesert. inferioris, 1777, u. a. — **Moenchia** Ehrh., Roth.
- Mössler**, Joh. Christ., schr. Taschenb. d. Bot., Hamb. 1805, Handb. d. Gewächskunde (3. A. v. L. Reichenbach, Altona 1833—34). — **Moesslerera** (-ia) Rehb.
- Mohl**, Hugo v., schr. Vermischte Schrift. bot. Inhalts, Tübingen 1845, Anat. u. Physiol. d. veg. Zelle, 1851, u. a. — **Mohlana** Mart.
- Molina**, J. Ign., Missionär u. Samml. in Chili, schr. Naturb. v. Chili (deutsch v. Brandis, 1786), Saggio sulla Storia nat. del Chili di G. J. Molina, 2. ed., Bologna 1810. — **Molina** Rz. P.v., **Molinia** Schrk.
- Mont.** = **Montagne**, Akad. in Paris, † 1866, schr. Fl. Boliviens., 1839, Cryptog. guyan., 1855, Sylloge cryptog. etc., 1856. — **Mont.** u. **Rob.** = **Montagne** u. **Robin**, Ch. (Prof. in Paris), **Sagra** u. **Montagne**, s. d. — **Montagnaea** (-tanoa) La Ll.
- Monti**, Gius., Prof. z. Bologna, schr. Catal. Stirpium agri Bononiensis Prodr., 1719. — **Montia** L.
- Moç.-Tand.** = **Moquin-Tandon**, Dr. Alfr., Zool. u. Bot. z. Paris, schr. Elém. d. tératolog. végét., 1841, Chenopodearum monogr., 1846. — **Moquinia** DC., A. Spr.
- Morandi**, J. B., schr. Hist. botanices practicae s. plantar. q. ad usum medicinae pertinent deser., Mediolani 1761.
- Morel**, Charl., schr. Orchideenkultur, Leyden 1856. — **Morelia** A. Rich.
- Moretti**, Gius., Prof. z. Batavia, † 1853 z. Pavia, schr. viele Monogr., il botanico ital., 1826, u. a. — **Morettia** DC.
- Morison**, Rob., Prof. z. Oxford, † 1683, schr. Hort. reg. Blesensis (Blois), 1679, Plant. hist. univ., 1680. — **Morisonia** L.
- Morren**, Charl. Fr. Ant., Prof. z. Lüttich, Herausg. d. Annales d. l. Soc. Royale d'Horticulture, mit Van Houtte in Gent Hort. belge bis 1839, s. 1851 Belgique horticole, † 1858. — **Morrenia** Lindl. — **Morren**, Ed., Prof. in Lüttich, Herausg. d. la Belgique hortic., Liège 1850—70, schr. üb. insektentötende Pfl. (in Bull. Acad. roy. Belge 1875), u. a.
- Mougeot**, A., schr. mit **Schimper** Monogr. des Plant. fossiles etc. des Vosges, Strassb. 1840. — **Mougeotia** Ag. u. Kth.
- Mühlenberg**, Geistl. in Pennsylv., † 1817, schr. Catal. Plant. Americ. septentr., 2. A. 1818. — **Muehlenbergia** Schreb.
- Müll.** = **Müller**, O. Fr., dän. Staatsr., † 1784, schr. Fl. Fridrichsdalina, Strassb. 1767, Mitarb. v. Oeder's Fl. danica. — **Muelleria** L. f. — **C.** od. **K. Müller**, Dozent z. Halle, Herausg. d. „Natur“, schr. Bot. Reisen um d. Welt, 2 B., Lpz. 1856/57, Buch d. Pflanzenwelt, 2. A. 1869, Synops. muscor. frondos., 1849—51, de Muscor. Ceylon. collectione, 1863, u. a. — **Herm. Müller**, Reallehrer z. Lippstadt, schr. Geogr. d. Laubmoose v. Westfalen, Blumenbefrucht. durch Insekten, 1873, u. a., † 1883. — **F. Müll.** = **Müller**, Ferd. Bar. v., Bot. z. Melbourne in Australien, schr. Fragm. phytogr. Australiae, Descr. notes on Papuan plants, Melbourne 1877, t. plants indig. to t. colony of Victoria, Melb. 1860—62, mit **Bentham** Herausg. d. Fl. australis (bereits 6 B.). — **N. J. C. Müller**, schr. Unters. üb. d. Molekular-

- kräfte im Baum (Heidelb. Bot. Unters., IV, 3—5), üb. Einwirk. d. Lichts u. d. strahl. Wärme etc., Heidelb. 1876. — **J. B. Müller**, schr. bot. prosod. Wörterb. nebst Charakter. d. wicht. nat. Pflanzenfam., Brilon 1840, Fl. Waldeccens. et Itterensis, Brilon 1841, etc.
- Münchhausen**, O. v., Landdrost. in Kalenberg, † 1774, schr. d. Mutterkorn als Pilz, Hausvater für Baum-Gärtner etc., Hannov. 1765—74, 6 B. — Muenchhausia L., DC.
- Mulder, N.**, Catal. plant. prope urbem Leidam nasc., Lugd.-Bat. 1817.
- Munk**, d. elektr. u. Bewegungerssch. am Blatte d. Dionaea muscipula, Lpz. 1876.
- Munting**, de vera antiquor. herba britann., Amstelod. 1631, Aloidarium, 1680. — Muntingia L., Plum.
- Murr.** = **Murray**, Linné's Schüler, Prof. z. Göttingen, † 1791, schr. Prodr. design. stirpium, Goett. 1770, Opuscula, Apparatus medicaminum, 1772—96, 6 B., u. a. — Murraya L., Kön.
- Musaeum Zeylanicum** s. Catal. plant. in Zeylania sponte nascentium, Lugd.-Bat. 1726.
- Mutel, A.**, schr. üb. neue Orchideen, Fl. Française destinée aux herbarisations, Par. 1834—37.
- Mut.** = **Mutis**, Freund Linné's, Prof. in Madrid, † 1808 z. Santa-Fé in Südamer. — Mutisia L. f.
- Naccari**, Prof. in Chioggia, schr. Algologia adriatica, Bologna 1828, Fl. Veneta etc., Venez. 1826—28.
- Nägeli**, Dr. K., Prof. in Zürich u. s. 1857 in München, schr. Cirsien d. Schweiz, üb. Algen, Beitr. z. wiss. Bot. s. 1858; N. u. **Schwendener**, d. Mikroskop, Lpz. 1865—67, Bot. Mitteilungen, u. a. — Naegelia DC., Reg., Ldl.
- Nathusius**, Gottlob, ber. Obst- u. amer. Gehölzzüchter z. Althaldesleben b. Magdeburg. — Nathusia Hochst.
- Naud.** = **Naudin**, Charl., Mitglied d. Instituts in Paris, Gartenbau-Schriftst., schr. z. B. üb. Cucurbitac., 1860/61, Melastomacearum in mus. Paris. Monogr., 1849—53, mit **Decaisne** Manuel de l'amateur des jardins, 4 B.
- Naumburg**, Jos. Sam., Prof. z. Erfurt, schr. Lehrb. d. Bot., 1798. — Naumburgia Mch., W.
- Neandri**, Joh., Tabacologia, Lugd. Bat. 1626.
- Neck.** = **Necker**, Dr. N. J. v. (de Necker) von Lille, † 1793 in Mannheim, schr. üb. Moose, Elem. stirpium Palatinarum, 1768—69 collectarum, Elem. bot., 3 B., 1791. — Neckera Hedw.
- N.** ab **Es.** = **Nees v. Esenbeck**, Chr. Gottfr., Prof. in Bresl., † 1858, schr. üb. Algen u. Pilze, Farne, Lebermoose, mit Weihe d. deutsch. Brombeerstr., m. Walker-Arnott u. De Candolle Fl. Peninsulae Ind. Orient. — **N. M.** = **Nees u. Martius**. — Esenbeckia St. Hil., Kth., Blum. — **Nees v. Esenbeck**, Th. Fr. L. jr., d. vor. Bruder, Prof. z. Bonn, † 1837, schr. Syst. d. Pilze, Plantae officinales fortg., Genera pl. Fl. German. fortg. v. Puterlick, **Nees v. Es.**, Th. u. **Sinning**, Samml. schön blüh. Gew. f. Blumen- u. Gartenfreunde (100 kol. Taf.), Düsseldorf. 1825. — Neesia Spr. (od. sen.?).
- Neill**, Dr. Patrick, Secr. d. Garten-Ges. z. Edinb., schr. üb. Algen, t. fruit-, flower- and kitchengarden, Edinb. 1840, † 1851. — Neillia D. Don.
- Neilreich, A.**, schr. d. Vegetationsverh. v. Croatien, Wien 1863, Nachtr. z. Fl. v. Nied.-Östr., Wien 1866, u. a.
- Nestler**, Prof. in Strassb., † 1832, schr. Index plant. in horto acad. Argentiniensi etc., 1818, u. a. — Nestlera DC.

- Neubert**, Dr. W., Bot. in Tübing. u. Stuttg., s. 1848 Herausg. d. Deutsch. Magaz. f. Garten- u. Blumenk. (üb. 33 Jahrg.).
- Neuenhahn**, d. Blumenzwiebelgärtner, 2 B., Lpz. 1804.
- Neuwied**, Max Prinz v., 1813 Reis. in Brasilien, schr. Reise nach Bras. v. 1813—17, Frankf. 1819 u. 20, Abbild. z. Naturg. Bras., Weimar 1823—31 u. Beitr. z. Nat. Bras., Weimar 1824—34.
- Newmann (Neumann)**, E., schr. Hist. of british ferns, Lond., 4. A. — *Neumannia* Brongn., Rich.
- Nicot**, Jean, franz. Gesandt. in Portugal, führte 1560 Samen u. 1564 das Rauchen d. Tabaks in Europa ein. — *Nicotiana* L.
- Niebuhr**, Karsten, mit Forskal Reis. im Orient, 1762—65, schr. Fl. aegypto-arabica, † 1815. — *Niebuhria* DC.
- Nieremberg**, Joh. Euseb., Prof. z. Madrid. † 1563, schr. Hist. naturae maxime peregrinae. — *Nierembergia* R. P.
- Nitschke**, Th., Prof. in Münster, schr. *Pyrenomycetes Germaniae*, Bresl. 1867—69, u. a. — *Nitschkea* Otth.
- Nitzsch**, C. L., schr. üb. Infusorien. — *Nitzschia* Hass.
- Niven**, Ninian, schr. t. visitor's companion to t. bot. gard. Glasnevin, Dublin 1838. — *Nivenia* R. Br., Becc.
- Nocca**, Domenico, Prof. z. Pavia, schr. *Ticinensis horti acad. pl. selectae*, Ticini 1800, u. a. — *Nocca* Cav., *Noccae* W., Rehb.
- Nöggerath** u. C. G. Nees v. Esenbeck, Rhizomorphen in d. Steinkohlenklüften, Nögg. üb. foss. Baumst., Bonn 1821.
- Noisette**, Ph., Obergärtin. z. Paris (Obstbau-Schule Fontenay-aux-Roses), schr. le Jardin fruitier, 1813 f., † 1849. — *Rosa Noisettiana* (sc. indica, Noisette-R.). — *Noisette*, Claude (Bruder), Gärtin. in Amerika. — *Noisettia* H. B. B.
- Noll**, F. C., d. Thal v. Orotava auf Teneriffa etc., Bresl. 1872.
- Nolte**, Prof. in Kiel, schr. *Novitates Fl. Holsaticae*, 1826. — *Zostera Noltei* Hornem.
- Nordmann**, A. v., schr. *Symbölae ad Cryptogamas Trans-Caucasi* 1849. — *Nordmannia* Fisch., Mey., *Abies* s. *Picea Nordmanniana* Loud.
- Nor** = **Noronha**, span. Bot. u. Reis. n. d. Philippinen, † 1787 auf Isle de France, schr. Prodr. phytologicus ined. — *Noronhia* Thouars.
- Not** = **de Notaris**, Gius., s. 1872 Prof. in Rom, † 1877, schr. *Syllab. muscorum* etc., 1838, *Fl. Ligustica* 1844, *Musci italici* 1863, *Desmidiaceae italiche* 1867, *Briologia italiana* 1869, u. a. — *Notarisia Colla* etc.
- Nutt** = **Nuttall**, Prof. z. Philadelphia u. Reis. in Nordwest-Amerika, † 1859, schr. t. *Genera of N.-Americ. plants*, 1818, *N.-Amer. Sylva*, 1842—54. — *Nuttallia* Dicks.
- Nyl** = **Nylander**, W., Prof. z. Helsingfors in Finnland, g. 1823, schr. *Prodr. Lichenogr. Galliae et Algeriae* 1857, *Lichenes Scandinaviae*, 1861, *Lich. Novae-Caledon.* 1868, u. a. — **Nylander**, A. E., schr. *Alands laf-vegetation* 1856, u. a.
- Nym** = **Nyman**, C. F., schr. *Sylloge Fl. Europaeae, Oerebroae* 1854—65 (Örebro in Schweden).
- Oberdiek**, J. G. C., Pred. u. Superintend. z. Jeinsen (Hannov.), schr. (holländ.) üb. d. Erfrieren d. Obstbäume etc. (deutsch 1872), Beitr. z. Hebung d. Obstkultur v. Oberdiek u. Lucas, 1875, u. a., † 1879.
- Oeder**, G. Chr. v., Landvogt in Oldenburg, † 1791, Herausg. d. *Fl. danica* 1761—1871 (16 B., wird fortg.), *Elementa botanicae* 1764—66. — *Oedera* Crantz.
- Oersted**, Andr. Sandöe, Prof. d. Bot. z. Kopenh., † 1872, schr. *Syst. d. Pilze, Lichenen u. Algen* (deutsch v. Grisebach u. Reinke, 1873),

Palmae centro-american., Kopenh. 1858, Myrtaceae centr.-amer., plantae novae cent.-am. etc.

- Oliver**, D., schr. Fl. of tropic Africa, Lond. 1877, Guide to t. roy. bot. gardens Kew, Lond. 1865, u. a. — Oliveriana (g. n.) Rehb. f.
- Oliv.** = **Olivier**, Prof. z. Aalfort, † 1814 z. Lyon, Reis. mit Brugière n. Ägypt. u. Persien, schr. Voyage dans l'Empire Othoman etc., 1801—07. — Oliviera Vent.
- Orbigny**, Alcide, schr. Voyage en l'Amérique mérid. pend. 1826—33 par Alcide d'Orbigny. — Orbignya Mart.
- Ort.** = **Ortega**, Casimir Gomez, span. Bot. u. Dir. d. bot. Gart. z. Madrid, † 1818, schr. Tabulae bot. 1773, u. a. — Ortega L. (-gia Löfl.). — **Ortega**, José, Apoth., † 1761.
- Osbeck**, Pehrson, schwed. Bot., Almosenler in Ostind. u. China, † 1805 Probst in Gothland, schr. Dag-bock ofve en ostindisk resa. — Osbeckia L.
- Otto**, K. Fr. Ed., g. 1812, Red. d. Hamb. Gart.- u. Blumen-Zeitg., Reis. n. Cuba etc., schr. Reise-Erinnerungen an Cuba, Nord- u. Südamer. 1838—41. — **Otto**, Christoph Fr., k. pr. Gart.-Dir. z. Berlin 1805—43, mit Dietrich Begr. d. Allg. Gartenzeitg., 1833, schr. Pl. rar. in horto Berolin. — Ottonia Miq., Spr., Ottoa Kth. — **Otto**, E. v., schr. Addidamente z. Flora d. Quadergebirgs in Sachsen, Lpz. 1854.
- Otth.** Gust., Pilzforsch. d. Schweiz. — Otthia Nitschke.
- O. W.** s. Wünsche.

- P.-B.** = **Palisot de Beauvais**, Akad. z. Paris, Reis. in Afrika u. Nordamerika, schr. Essay d. nouv. Agrostographie, 1812, Fl. d'Oware et de Bénin en Afrique, 1804—07, Muscologie 1822.
- Pall.** = **Pallas**, k. russ. Staatsr., † 1811 in Berlin, schr. Reise durch d. russ. Reich 1771—76, Fl. rossica 1784—1815, Specim. Astragalorum, 1802, u. a. — Pallasia L., Ait.
- Pancovii** Thom. herbarium portatile od. behendes Kräuter- u. Gewächsbuch, Cöln a. d. Spree 1673. — Pancovia W.
- Panz.** = **Panzer**, Arzt in Hersbruck, † 1829, schr. Revis. d. Gräsergatt. 1813, ostind. Brotbaum, Nürnberg. 1783. — Panzera W., Gm.
- Pappe**, Dr., schr. Synops. pl. phan. agro Lipsiensi indigenarum, Lpz. 1828. — **Pappe**, Dr. med. L. in Hamb., Capreisend. 1830—54, schr. Silva Capensis, a descr. of t. South-African forest-trees, Cape-Town 1854, **P.** u. **Rawson**, Synops. Filicum Afr. austr. 1858. — Pappae Eckl.
- Paracelsus** 1493—1541, eig. Theophrastus Bombastus v. Hohenheim, Paracelsi Theophr. paragraphorum libri XIV, Argentorati 1536. — Theophrasta (-stea) L.
- Parlatore**, Filippo, Prof. z. Florenz, schr. Rar. plant. in Sicilia etc., Fl. Panormitana 1839, Fl. italiana 1848—69, u. a.
- Parnell**, Rich., schr. t. grasses of Scotland, Edinb. 1842, t. grasses of Britain, 1845.
- Passerini**, Giov., Prof. in Parma, schr. Fl. Italiae superioris etc., 1844, Esposizione florale univ. di Amsterdam, Milano 1865, u. a., s. Cesati.
- Passow**, schr. d. Pflanze u. d. Luft, Stralsund 1861, Grundr. d. Bot., Strals. 1861.
- Pasteur**, Louis, Akad. z. Paris, schr. Gährungspilze etc. (in Comptes rendus u. Ann. de chimie).
- P. M. E.** = **Patze**, **Meyer** u. **Elkan**, schr. Flora d. Prov. Preussen, 1850 (Patze, C., Stadtrat in Königsb.).
- P. Br.** = **Patrick Browne**, irisch. Bot., † 1790 (schr. d. Pfl. v. Jamaika in t. civil and natur. history of Jamaica, 1756). — Brownea Jacq.

- Paullini**, C. F., schr. *Sacra herba s. nobilis Salvia descripta*, Aug. Vind. 1688. — *Paullinia* L.
- Pv.** = **Pavon** (Ruiz u. Pavon), Reis. in Peru u. Chili 1777—88, Herausg. d. *Flora Peruviana*. — *Pavonia* Cav.
- Paxton**, Jos., engl. Bot., schr. *A Pocket bot. dictionary*, 2. A., Lond. 1853, Herausg. d. *Magazine of Bot.* 1834—49 u. *Flower-Garden* 1850—52. — *Paxtonia* Lindl.
- Payen**, franz. Bot., schr. *sur la nature etc. de la Canne à sucre*. — *Payena* Kurz.
- Payer**, franz. Bot., schr. *Fam. d. Nitrariées, Morées et Anacardiées*, 1844, des *Ficoidées et d. Cactées*, 1851, *Bot. cryptog.*, Paris 1850.
- Pepin**, Pierre Denis, Ob.-Gärt. d. Par. Mus., schr. *Beitr. in Bon Jardinier, Revue hortic. etc.*, † 1876.
- Pereboom**, N. E., schr. *Materia vegetabilis systemati pl.*, Lugd.-Bat. 1787/88.
- Perleb**, C. J., Prof. in Freiburg i. Br., schr. *de horto Friburgensi* 1829, *Lehrb. d. Naturg. d. Pflanzenreichs*, Freib. 1836, *Clavis classium etc.*, Friburg. 1838. — *Perlebia* Mart., DC.
- Perring**, W., Insp. d. Bot. Gart. in Berl., *Mitherausg. d. Gart.-Zeitg.* (Berl. 1885, IV. J.).
- P.**, **Pers.** = **Persoon**, geb. z. Capetown, † 1837 z. Paris, Arzt u. Bot., schr. *C. a Linné Syst. Veget.*, *Syn. meth. fungorum*, Gött. 1801 etc. — *Persoonia* Sm., Mchx.
- Petermann**, W. L., d. Pflanzenreich in vollst. *Beschr. all. wicht. Gew.* (282 T.), Lpz. 1857, *Taschenb. d. Bot.*, Lpz. 1842, *Deutschl.'s Flora* (100 T.), Lpz. 1846—49.
- P.-Th.** od. **Pet.-Th.** = **Petit-Thouars**, L. M. Aubert du, Dir. d. *Baum-schule z. Paris*, † 1831, schr. *Hist. d. végét. rec. dans l. îles austr. d'Afrique*, 1806, *Arbres fruitiers*, 1815, *les Orchidées d'Afr.*, 1822, u. a. — *Petitia* Schreb., Jacq., *Thouarsia* Vent., *Aubertia* Bory.
- Pet. gaz.** = **Petiver**, schr. *Gazophylacium („Schatzkammer“)* s. *Opera hist. naturalem spectantia*, Lond. 1764. — *Petivëra* (-ia) L., Jacq.
- Pfeffer**, Prof. in Tübing., schr. *Osmotische Unters.*, Lpz. 1877, *period. Beweg. d. Blattorg.*, Lpz. 1875, u. a.
- Pfeiffer**, Dr. L., Arzt u. Bot. z. Cassel, † 1878, schr. *Enum. diagn. Cactearum etc.*, Berol. 1837, *Fl. v. Niederhessen*, 1847—55, *Synonyma bot. generum etc. ad finem* 1858, *Kassel* 1870, *Nomenclator bot.*, 4 B., Kassel s. 1872.
- Planchon**, J. E., Prof. z. Montpellier, s. 1845 Herausg. d. *Flore des Serres et d. jardins de l'Europe*, Gand (Gent).
- Planer**, Prof. z. Erfurt, schr. *Fl. v. Erfurt*, Übers. v. Linné's *Gener. plant.*, 2 Th., Gotha 1785. — *Planëra* Gm., Mchx.
- Plenk**, J. J., *Anfangsgr. d. bot. Terminologie*, Wien 1798.
- Plinius** (C. *Plinius secundus*), † 79 n. Chr., röm. Naturf., schr. *Hist. naturalis*, 37 B. (herausg. v. Detleffen, Berl. 1866—71). — *Plinia* L.
- Plinius indicus** s. *Rumpf* (*Rumphius*).
- Plum.** = **Plumier**, Charl., franz. Reis. in Westind., † 1704 in Cadix, schr. *Filicetum amer.*, Paris 1703, *Plant. amer. quas olim Car. Plumierus detexit etc.* (herausg. v. Burmann, Amsterd. 1755—60). — *Plumiera* T. (-meria) L., Pers.).
- Pöpp.** = **Pöppig**, Dr. Ed. Fr., Reis. u. Prof. in Leipzig, † 1868, schr. *Nova gen. et spec. pl. q. in regno Chilensi etc. legit Ed. Poeppig et cum Steph. Endlicher descr.*, Lps. 1835—45, 3 B.
- Pohl**, deutsch. Bot. u. Reis. in Brasil., dann Prof. in Wien, † 1834, schr. *Tent. Fl. Bohemiae*, 1810—15, *Plant. Brasil. icon. et descr.*, Lpz. 1835—45, 3 B. — *Pohlia* Hedw., *Pohlana* Mart.

- Poir.** = **Poiret**, J. L. M., franz. Bot., † 1834 in Paris, schr. Voyage en Barbarie, 1789, Hist. philos. d. pl. d. l'Europe, 1825—29. — *Poirertia* Vent., Cav.
- Poit.** = **Poiteau**, M. A., franz. Zücht. u. Reis. auf St. Domingo, gründ. 1829 d. Revue horticole, Paris, Red. d. Ann. d. l. Soc. centr. d'Horticult., P. u. **Turpin**, Fl. Paris., 1808—13, P. u. **Risso**, hist. nat. des orangers, 1818—19, † 1854. — *Poitea* DC. (-tea Vent.).
- Pollich**, Arzt u. Bot. z. Kaiserslautern, † 1870, schr. Hist. pl. in Palatinatu etc., 1776/77, Gründ. d. Pfälz. Ges. Pollichia. — *Pollichia* L., Roth, Med.
- Pollini**, C. (Pollinius), schr. Fl. Veronensis, Veron. 1822—24. — *Pollinia* Spr.
- Pontedera**, J., schr. Anthologia s. de floribus natura l. III, Patav. 1720. — *Pontederia* L.
- Pott**, Hofr. in Braunschweig, † 1805, schr. Index herbarii mei vivi (herausg. v. Helwig, Braunschw. 1805). — *Pottia* Ehrh.
- Prantl**, Prof. z. Aschaffenburg, schr. Lehrb. d. Bot., Lpz. 1874 u. 76, Mitth. in Dr. Leimbach's deutsch. bot. Monatsschr. u. a.
- Pratt**, Anne, schr. t. flowering plants, ferns, grasses and sedges of Gr.-Britain (7 H.), Lond. 1861.
- Preiss**, Balth., Prof. in Prag, schr. Rhizographia, Prag 1823. — *Preissia* Nees.
- Presl**, Prof. in Prag, † 1852, schr. Deliciae Pragenses 1822, Reliquiae Haenkeanae, redig. Prag 1825, Fl. sicula, 1826, Tent. Pteridographiae, 1836, Hymenophyllaceae, 1843, Epimeliae bot., 1849, u. a. — *Preslea* (-laea) Mart., -lia Opiz.
- Preuss**, Apoth. u. Sanitätsr. z. Hoyerswerda, † 1855, schr. üb. Pilze in Sturm's Fl. Deutschl., Übers. untersucht. Pilze etc., Halle 1851. — *Preussia* Fock.
- Pringsheim**, N., Prof. in Berl., Herausg. d. Jahrb. d. wiss. Bot. s. 1857, namh. Pfl.-Physiolog etc.
- Pritchard**, Steph. F., schr. alphab. list of indig. et exotic pl. at St. Helena, Capetown 1836. — *Pritchardia filifera* J. Lind.
- Pritzel**, Cust. d. k. Bibl. z. Berlin, † 1874, schr. Anemonar. Revis. 1842, Icon. bot. index etc., 1855, Thesaurus liter. bot. omn. gent., 2. A. 1872.
- Pulteney**, Rich., schr. Hist. and biogr. sketches of t. progress of Botany in England, Lond. 1790. — *Pultenaea* Sm.
- Pursh**, F., engl. Bot. u. Reis., † 1820 in Canada, schr. Fl. Americae septentrionalis, Lond. 1816. — *Purshia* Spr., DC.
- Pynaert**, Ed., belg. Gärtn. aus Gent, schr. Manuel d. l. cult. forcée des arbres fruitiers, 1861, Mitred. d. Fl. d. Serres, v. Abbé Dupuy's Abeille pomologique etc.
- Quer**, schr. üb. d. Literat. d. Botanik Spaniens, 1762. — *Queria* Löffl.
- Rbh.** = **Rabenhorst**, Ludw., ber. Kryptog. in Meissen, schr. Fl. lusatica, 1839—40, üb. Algen, Moose, Lebermoose etc., z. B. in Deutschlands Kryptogamenflora (2 B., Lpz. 1844—53), Herausg. d. Hedwigia s. 1852. — *Rabenhorstia* Fr.
- Raddi**, Gius., ital. Bot. u. Reis. in Brasil., † 1829, schr. Jungermannioogr. etrusca, 1820, Pl. brasil. etc., I. Filices, 1824. — *Raddisia* u. *Raddia* Leand., *Raddiana* Raf.
- Rademacher**, Jac. Corn., schr. Naamenlyst der planten op het eiland Java, Batav. 1780—82. — *Rademachia* Thb.

- Radlkofer**, L., Prof. in München, schr. Krystalle pfl. u. tier. Ursprungs, Sapindaceen, 1875, d. Befrucht. d. Phanerogam., Lpz. 1856, u. a.
- Raf.** = **Rafinesque-Schmalz**, Prof. in Nordamer. u. Reis., † 1840, schr. Medic. Fl. of t. United-States, 1830, New Flora and Bot. of N.-Amer., 1836.
- Rafn.** dän. Bot., schr. Entwurf einer Pfl.-Physiologie, Kopenh. 1798 (deutsch v. Markussen). — *Rafnia* Thb.
- Ram.** = **Ramond**, Bar. v. (R. de Carbonnières), Prof. u. Staatsr., † 1827 z. Paris, schr. Observ. d. l. Pyrénées, 1789, Voyage au Sommet du Mont Perdu, 1807. — *Ramondia* Rich.
- Ratzeburg**, Prof. z. Neust.-Eberswalde, † 1871 z. Berlin, schr. d. Unkräuter v. Deutschl., 1859, (Brand u. Ratzeb.) die deutsch. Giftgew., 1838 (2. Abt. Kryptog. v. Phoebus). — *Ratzeburgia* Wall.
- Rauwolff**, Leonh., Arzt u. Reis. im Orient, schr. Fl. orientalis (Besch. d. Reise im Morgenland). — *Rauwolfia* L. u. D. Don
- Ray** (Wray) od. **Rajus**, engl. Pred. u. Naturf., † 1705, schr. Catal. pl. c. Cantabrigiam nasc., 1660, Pl. Angliae, 1670, Hist. plant., 1686—1704, Method. plant., gramin., juncor. etc., Lond. 1703. — *Rajania* L.
- R. Br.** = **Rob. Brown**, s. d.
- Ré**, Giov. Francesco, † 1833 in Turin, schr. le Iride coltivate, Padovae 1823, Fl. Segusiana, 1805, Fl. Torinese, 1825. — Rea Bert. u. Reana Brign. — **Ré**, Filippo, † 1817 in Reggio, schr. Saggio teoretico-pratico sulle malattie delle piante, 1807.
- Rebender**, C., schr. de olei resinaeq. proferendorum organis etc., Bonn 1865.
- Rebentisch**, Arzt z. Landsberg a. d. W., † 1810, schr. Prodr. Fl. neu-marchicae, 1804, Index pl. c. Berolin. nasc. 1805.
- Red.** = **Redouté**, Pierr. Jos., Cabinetsmal. Ludw. XVI, † 1840, schr. Liliacées, Par. 1802—07, **R. u. Thory**, l. Roses 1817—20, Choix d. plus belles fleurs, 1827, u. a. — *Redoutea* Vent.
- Reg.** = **Regel**, Dr. Ed. v., 1837—39 in Bonn, Fl. Bonnensis, 1842 in Berlin, dann Dir. d. bot. Gart. in Zürich, gab 1843 mit Osw. Heer d. Schweizer Gart.-Zeitschr., 1852 d. Gartenflora heraus, 1855 Dir. d. bot. Gartens in St. Petersburg (v. Trautvetter's Nachf.), schr. mit E. Ender Zimmergärtnerei 1863, m. Herder Index seminum q. hort. bot. imper. Petropol. etc. offert, 1860—62, Tent. Fl. ussuriensis, Fl. v. Ostsibir. u. Turkestan, Dendrologie Russl.'s, u. a. — *Regelia* Planch.
- Reichard**, Joh. Jac., Arzt u. Bot. z. Frankf. a. M., † 1789. — *Reichardia* Roth.
- Reichardt**, H. W., Cust. am bot. Cabin. z. Wien, schr. üb. Gefässbild. d. Farne, 1859. — **Reichardt**, Ed., de plantar. partibus anorganicis, 1856.
- Rehb.** = **Reichenbach**, G. Ludw., Prof. etc. z. Dresden, vorz. Florist. Gründ. eines Systems, Herausg. v. Mössler's Handb. d. Gewächsk., 2. A., 1827—39, schr. Iconogr. bot. 1823—32, u. a. — *Reichenbachia* Spr. — **Reichenbach**, A. L., schr. Bot. f. Damen, Lpz. 1854. — **Rehb. f.** = **Reichenbach filius**, H. Gust., s. 1864 Prof. etc. z. Hamburg, schr. Xenia orchidaceae od. Beitr. z. Orchideenkunde, Lpz. 1858, Beitr. z. syst. Pflanzenk., Lpz. 1871, u. a. — **Reichenbach, v.**, schr. d. Pflanzenwelt in ihrer Bezieh. z. Sensivität u. z. Ode, Wien 1858.
- Reimar (-us)**, Herm. Dietr., schr. Diss. animadv. quasd. de Opii etc. usu exhib. 1784. — *Reimaria* Flügge.
- Reinw.** = **Reinwardt**, Prof. z. Leyden, Reis. in Indien, † 1854, schr. üb. d. Veget. d. Inseln im indisch. Archipel, Berl. 1828. — *Reinwardtia* Spr., Dumort.
- Relhan**, R., schr. Fl. Cantabrigiensis, Cantabr. 1820. — *Relhania* Gm., l'Hér.

- Reneaulme**, Paul de (Renealmus), † 1624 in Blois, schr. Specim. Hist. plant., Parisiis 1611. — *Renealmia* R. Br.
- Req.** = **Requien**, Bot. in Avignon, z. B. Helxīne Req. — *Requienia* DC.
- Retz.** = **Retzius**, Prof. in Lund, † 1821, schr. Fl. Scandinaviae Prodr. Ed. 2, Lps. 1795. — *Retzia* L., Thb.
- Rheede**, Heintr. van Rheede tot Drakenstein, Gouvern. v. Malabar, schr. Hort. ind. malabar., Amsterd. 1678—1703. — *Van Rheedia* Plum., *Rheedia* Pers.
- Rich.** = **Richard**, L. Cl. Mar., Prof. d. Bot. z. Paris, für Ludw. XVI. Reis. u. Samml. in Guiana, † 1821, schr. Analyse du fruit 1803, Comment. de Coniferis et Cycadeis (publ. p. A. Richard, 1826), de Musaceis (do. 1831), Fl. boreali-amer. 1803, u. a. — *Richardia* Kth., Houst. — **Rich. f. od. A. Rich.** = **Achilles Richard** Sohn, Prof. z. Paris, † 1852, schr. Nouv. élém. d. bot. et physiol. vég. 1819 (deutsch v. Kittel), Botanique médicale 1823 (deutsch v. Kunze u. Kummer), Monogr. d. Orchidées (Herausg. von d. Vaters Werken).
- Risso**, J. A., Prof. z. Nizza, † 1845, schr. Hist. nat. de l'Europe mérid. 1826—28, (mit Poiteau) Hist. nat. des Orangers, Fl. de Nice, 1844, u. a.
- Rivière**, A., Chef d. Luxembourg-Gartens z. Paris, † 1877, schr. unvollend. ill. Werk üb. Obstbaumkultur, üb. Orchideen, u. a. — *Riveria* H. B. K.
- Riv.** = **Rivinus** (Bachmann), Prof. z. Leipzig, † 1723, schr. Introd. general. in rem herbar. 1690, Ordo plantar. 1690—99. — *Rivina* L. (-nia) Juss.
- Robin**, Jean, Henri IV. Gärtn., schr. mit Vallet 1608 le jardin du Roy très chretien Henri IV. — *Robinia* L. — **Robin**, Vespas. Sohn, Arborist am Jard. d. Plantes, schr. Enchiridion du Jard. royal, führte Pseud-*Acacia* Tourn. (*Robinia* L.) ein. — **Rob. u. Raf.** = **Robin** u. **Rafinesque**, schr. Fl. of Louisiana, N.-York 1817. — **Robin**, Charl., Prof. d. Med. z. Paris, schr. Hist. nat. d. végét. parasites sur l'homme et l. anim. vivantes, 1853.
- Rochel**, Ant., † 1847 in Graz, schr. Plantae Banatus rarae, 1828, u. a. *Rochelia* Lam., Don.
- Roehl.** = **Roehling** (**Röhling**), Pfarr. z. Messenheim (Hessen), † 1813, schr. Fl. Deutschlands, 2. A., Frankf. 1812 (neu v. Mertens u. Koch, 3 A., 1823—39), Deutschl.'s Moose, Brem. 1800, u. a.
- R. S. od. R. u. Sch.** = **Römer**. J. J. u. **Schultes**, erst. Prof. in Zürich u. Landshut, † 1819, **R. u. Schultes**, Herausg. v. Car. a Linné Syst. veget., 16. A., 1817—30. **R. u. Usteri**, Magaz. f. Bot. 1785—90, **Römer**. J. J., Archiv f. Bot., 1796—1805, Fl. Europaea, Nürnberg. 1797, Collectanea ad rem bot. spect., Turici 1809. — *Roemeria* Med., Thb. — **Römer**, F. A., Bergr. z. Clausthal, schr. Algen v. Deutschl., 1845, Versteiner. d. Harzgeb.'s, 1843. — *Roemeria* Raddi.
- Roep.** = **Roeper** (**Röper**), Prof. z. Rostock, schr. Enum. Euphorbiarum etc., 1824, zur Flora Mecklenburgs, 1843—44, Vorgefasste botan. Meinungen verteid., Rostock 1860. — *Roepera* A. Juss. (-ria) Spr.
- Roscoe**, W., Gelehrt. b. Liverpool, † 1831, schr. üb. Scitamineae, 1828. — *Roscoea* Sm.
- Rossmässler**, E. A., † 1856, schr. mikroskop. Blicke etc., Lpz. 1852, d. Wald (illust. Werk), Lpz. 1863, u. a.
- Rostafinski**, Thom. v. aus Warschau, s. 1869 Prof. z. Strassb., schr. Syst. d. Mycetozoen, Strassb. 1873, Fl. Polonicae Prodr. 1873, u. a.
- Rostkovius**, Mediz.-R. in Stettin, schr. üb. Pilze in Sturm's Flora 1840, mit **Schmidt** Fl. Sedinensis, 1828. — *Rostkovia* Desv.
- Rostrup**, Seminarlehr. auf Fünen, schr. üb. Brandpilze, blütenlose Pfl. etc., m. Deichmann **Branth** *Lichenes Daniae* etc., 1870.

- Roth**, A. W., Arzt z. Vegeſack b. Bremen, † 1834, ſchr. Bot. Abhandl., Nürnberg. 1787, Catalecta bot. etc., 1797—1806, Tentam. Fl. German. 1788—1800, Manuale bot. 1830, u. a. — *Rothia* Pers., Schreb., Lam.
- Rxb.** = **Roxburgh**, W., Reis. in Ostind., Arzt u. Dir. d. bot. Gart. in Calcutta, † 1815, Oberbot. in Edinburgh, ſchr. Pl. of t. coast of Coromandel 1795—1819 (herausg. v. Banks), Fl. indica, 1832 (3 B.).
- Royle**, John Forbes, Dir. d. bot. Gart.'s z. Saharumpore in Ostind., dann Prof. in Lond., † 1858, ſchr. üb. indische Pfl., an essay on t. antiquity of Hindoo-medicine, Lond. 1837, on Caoutshouc and Sarsaparilla, Lond. 1838, u. a. — *Roylea* Wall.
- Rudbeck**, O., ſchwed. Prof. d. Bot. in Upsala, ſchr. Propagatio plantarum, Ups. 1686. — *Rudbeckia* L.
- Rudolphi**, Fr., ſchr. üb. Algen (in *Plantae Ecklonianae*). — *Rudolphia* W.
- Rücker**, Sig., ber. engl. Blumist, bes. Orchideen, Camellien u. Azaleen, † 1875. — *Rückeria* DC.
- Ruellius**, J., ſchr. de natura stirpium, Fol., Basileae 1543. — *Ruëllia* L.
- Rümpler**, Th., Gen.-Secr. d. Gartenbau-Ver.'s z. Erfurt, ſchr. d. Zimmergärtneri, Berl. 1877, Vilmorin's Blumengärtn., 2. A., 1878, Ill. Gartenbau-Lexikon, Berl. 1880—82.
- R. P.** = **Rz. Pv.** = **Ruiz** u. **Pavon** (s. Pavon), span. Bot., d. erst. † 1815 in Madrid, beide 1779—88 Reis. durch d. span. Amerika, ſchr. Quinologia 1792, Fl. Peruviana et Chilens., 1798—1802. — *Ruizia* Cav., Schreb., Pers.
- Rumpf** (**Rumphius**) aus Hanau, lang auf Amboina (Molukken), gen. *Plinius indicus*, † 1702, Burmann's Herbar. amboinense 1741—55 als dess. Nachlass. — *Rumphia* L.
- Rupp**, Bernh., ſchr. Fl. Jenensis, Tref. 1718. — *Ruppia* L.
- Rupr.** = **Ruprecht**, F. aus Prag, Reis. im Kaukasus, 1860—61, dann Cust. etc. in St. Petersburg., † 1870, ſchr. Flores Samojedorum 1845, Algae Ochotenses 1850, Fl. ingrica 1860, u. a. — *Ruprechtia* E. Mey.
- Russell**, Patrick, Roxburg's Vorgäng. b. d. Exped. in Coromandel. — *Russellia* Jacq., Schreb. — **Russell**, Lord John, Herz. v. Bedford, legte an Arboretum Woburnense (bes. Weiden-Cultur). — *Bedfordia* DC.
- Saccardo**, P. A., Herausg. d. *Michelia*, Commentar. mycol. etc. (Jahrg. 1874—82), Berlin.
- Sachs**, Jul., s. 1868 Prof. z. Würzb., namh. Pfl.-Physiolog, ſchr. Lehrb. d. Bot., 4. A., Lpz. 1874, Gesch. d. Bot. 1875, Arb. d. bot. Institut. in Würzburg s. 1873, u. a.
- St. Hil.** = **Saint Hilaire** s. Hilaire.
- Sadler**, J., ſchr. de Filicibus veris Hungariae, Transsylvaniae, Croatiae et Litoralis hung., Budae 1830. — *Sadleria* Kaulf.
- Sagra**, Dir. d. bot. Gart. in Havannah, u. **Montagne**, ſchr. üb. Pfl. v. Cuba in Hist. phys., polit. et natur. de l'île de Cuba p. Ramon de la Sagra etc., 1823—35 (bearb. v. A. Richard). — *Sagraea* DC.
- Sal.** = **Salisbury**, Rich. Auth. (eig. Markham), Gärtn. u. Mitgl. d. Linné'schen Ges. in London, † 1829, ſchr. Icones Stirp. rar., 1791, Paradisus Londinens. 1806—07, üb. Zapfenbäume etc., 1816. — *Salisburya* Sm.
- Sanio**, Dr. C., Pfl.-Anatom, ſchr. Unters. üb. d. Epidermis u. Spaltzellen d. Equisetac., Halle 1858, üb. Holzzellen (Bot. Zeit. 1863), Florula Lycensis, Hal. 1858, u. a.
- Sassi**, ital. Prof. d. Bot., ſchr. üb. Lebermoose (*Dichlamys* etc.). — *Sassia* Mol., Juss.

- Sauvages**, Prof. z. Montpellier, † 1767, schr. Syst. d. Pfl. nach d. Blättern. — *Sauvagea* Neck., -vagesia Jacq.
- Savi**, Gaët., Prof. z. Pisa, † 1844, schr. Fl. Pisana 1798, *Materia med. veget. toscana*, 1805, *Bot. etrusca* 1808—25, *Fl. italiana* 1818—24, u. a. — *Savia* Raf.
- Schacht**, Herm., Prof. in Bonn, † 1864, *Lehrb. d. Pfl.-Physiol. u. Anatomie*, Berl. 1856—59, *d. Spermatozoïden im Pflanzenr.*, 1864, u. a.
- Schaeffer**, J. Chr., Superintend. z. Regensb., † 1790, *Fungor. Bavariae et Palatin. Icones*, 1762—74. — *Schaefferia* Jacq.
- Schärer**, Pred. in Belp (Cant. Bern), † 1853, schr. *Lichenum helvet. spicilegium*, 1823—42. — *Schaereria* Kbr.
- Schauer**, J. K., schr. *Chamaelauciae*, *Comm. bot. Vratisl.* 1841, *de Regelia*, *Beaufortia et Calothamno*, Vrat. 1843, u. a.
- Scheele**, Adolf, Pfarr. u. Bot. b. Hildesheim, † 1864, schr. *Fl. von Texas*.
- Scheidw.** = **Scheidweiler**, M. Jos., aus Köln, † 1861 z. Gent, 1838 *Red. d. Horticole belge*, schr. *les plantes et leur vie*, *Cours raisonné d'agricult. etc.*, Bruxell. 1841—43, *Bearb. d. Cacteen u. a.*
- Schenk**, A., Hofr., s. 1868 Prof. in Leipzig, schr. *mehrerer üb. foss. Flora*, *Algolog. Mitteilungen*, Fl. v. Würzburg, 1848, u. a.
- Scheuchzer**, schweiz. Bot., schr. *Herbarium diluvianum*, Tiguri 1719, *Agrostogr. Helvet. Prodr.*, Zür. 1708, u. a. — *Scheuchzeria* L.
- Schiede** u. **Deppe**, *Samml. v. Plantae mexicanae*, beschr. v. Schlechtendal u. Chamisso, **Schiede** schr. *de plantis hybridis sponte natis*, Cassel 1825. — *Schiedea* Bartl.
- Schimper**, Prof. in Strassburg, † 1880, **Sch. u. Mugeot**, schr. *Mon. d. pl. foss. des Vosges*, Strassb. 1840, *Sch. Synops. muscorum europ.*, 1860, *Traité de palaeontologie végét.*, Paris 1869—74, u. a.
- Schinz**, S., *Primae lineae bot. ex tab. phytogr. J. Gesneri*, Zür. 1875.
- Schk.** = **Schkuhr**, Chr., *Univ.-Mechanik. z. Wittenberg*, † 1811, schr. *Enchiridion bot.*, 1805, *kryptog. Gewächse*, 1809, *Deutschlands Kryptogamen*, 1810—47, u. a. — *Schkuhria* Roth.
- Schldl.** = **Schlechtendal**, D. F. Leonh. v., Prof. etc. z. Halle, † 1866, schr. *Fl. v. Deutschl.*, Jena 1841—64, *Hort. Halensis*. 1841—53, *Fl. Berolinensis* 1823—24, mit v. Mohl *Herausg. d. Bot. Zeit.* — *Schlechtendalia* Less.
- Schleicher** in Bex, schweiz. Bot., schr. *Fl. d. Schweiz od. Catal. Pl. in Helvetia etc.*, 4. A., 1821. — *Schleichera* W.
- Schleiden**, M. J., Prof. z. Jena, dann Dorpat, s. 1866 *Staatsr. a. D. in Dresd.*, **Schl. u. Nägeli**, *Zeitschr. f. wiss. Bot.*, Zürich 1844—46, *Schl. üb. Ernähr. d. Pfl.*, 1846, *Grundr. d. Bot.*, 2. A., 1850, u. a. — *Schleidenia* Endl.
- Schlotheim**, E. F. v., *Kamm.-Präs. in Gotha*, † 1832, schr. *Petrefaktenk.*, 1820, *Nachtr. z. Petr.* 1822—23. — *Schlotheimia* Brid.
- Schmidel**, C. C., Prof. z. Erlangen, schr. *Dissertationes etc.*, *Icones plant. et analyses partium* (2. A. v. Bischoff), Norimb. 1782. — *Schmidelia* L.
- Schmidlin**, schr. *Blumenzucht im Zimmer*, 4. A., Berlin 1880 (illustr. Prachtausg.). Vgl. *Schüle* sen.
- Schmidt**, J. A., schr. *Anleit. z. Kenntn. d. natürl. Fam. d. Phanerogamen*, Stuttgart 1865, *Beitr. z. Flora d. Capoverdischen Inseln*, Heidelberg 1852. — **Schmidt**, Fr. Wilibald, Prof. in Prag, † 1796, schr. *Fl. bohemica inchoata*. — *Schmidtia* Tratt. — **Schm. u. Kze.** = **Schmidt u. Kunze**, schr. *Mykolog. Hefte*, 1817—23, u. *Deutschlands Schwämme etc.*, 1816—18. — **Schmidt**, F., *Reis. im Amurland (bot. Teil) od. Florula Amgungo-Burejensis et Fl. Sachalina*, Petersb. 1868.

- Schmitz**, J. Jos., Lehr. an d. Ritt.-Akad. z. Bedbury, † 1845, **Schm.** u. **Regel**, Fl. Bonnensis, 1841. — *Schmitzomia* Fr.
- Schnizlein**, A., Prof. z. Erlangen, † 1868, schr. Fl. v. Baiern, 1847, Iconogr. famil. nat. regni veget., Bonn 1843—70.
- Schoepf (Schöpfung)**, Joh. Dav., schr. *Materia med. americ. etc.*, Erlangae 1787. — *Schoepfia* Schreb., DC.
- Schomburgk**, Sir Rob., engl. Reis. u. Consul in St. Domingo, dann Siam, Einführ. v. *Victoria regia*, † 1865 z. Berlin, schr. *Descr. of brit. Guiana*, 1840, Reis. in Guiana u. a., 1841. — *Schomburgkia* Lindl., DC.
- Schott**, H. W., Dir. d. k. k. Gärten zu Schönbrunn, † 1865, **Sch.** u. **Endlicher**, schr. *Meletemata bot.* 1832, **Sch.** üb. Aroideen, Rutaceen u. Farne. — *Schottia* (-tia) Jacq.
- Schousboe**, dän. Bot. in Tanger, schr. *Pfl. v. Marokko*, 1791—93. — *Schousboea* W.
- Schouw**, Prof. in Kopenh., † 1852, schr. *Gründg. einer allg. Pflanzengeogr.* (deutsch Berl. 1823). — *Schouwia* DC.
- Schrad.** = **Schrader**, Prof. in Göttingen, † 1836, schr. *Sertum hannoveranum 1795—98*, Herausg. d. *Journals f. Botanik*, 1799—1810, *Fl. germanica*, Götting. 1806, *Spicileg. Fl. Germ.*, Hort. Goetting. 1809, *Anim. ad Floram Capensem*, 1832. — *Schradera* Vahl, Sw.
- Schrk.** = **Schrank**, P. F. v., Jesuit u. Prof. z. München, † 1835, schr. *Bair. Flora*, 1789, *Primit. Fl. Salisburgens.*, 1792, *Fl. Monacens.*, 1811—18, u. a. — *Schrankia* W., Scop.
- Schreb.** = **Schreber**, J. C. Dan. v., Prof. z. Erlangen, † 1810, schr. *Beschr. d. Gräser m. Abb.*, 1769—1810, *Spicileg. Fl. Lipsicae*, 1771, *Linnaei genera plant.*, 1789—91. — *Schrebera* L., Roxb.
- Schubert** (Edel u. Roth), schr. *Plantar. species q. per Aegyptum, Arabiam et Syriam coll.* (v. A. Schenk in Würzb., 1840), *Naturgesch. d. Pflanzenreichs in kolor. Bildern* (v. Hochstetter bearb.). — *Schubertia* Mart., Mirb.
- Schübler**, Gust., Prof. in Tübingen, † 1834, schr. *Characteristica Cerealium*, 1818, üb. *Agrikulturchemie* (2. A., 1833), **Sch.** u. **Martens**, *Fl. v. Württemberg*, 1834, u. a. — *Schueblers* (-ia) Mart.
- Schüle**, W. sen., Dir. d. k. Gartenbau-Schule Hohenheim, schr. 3. Ausg. v. Schmidlin's wicht. Futter- u. Wiesengräsern. — **Schüle**, W. jr., s. 1879 *Dir. d. k. Obst- u. Gartenbau-Schule z. Grafen-Brumath*, *Red. d. Zeitschr. f. Wein-, Obst- u. Gartenbau*.
- Schult.** = **Schultes**, Prof. in Landshut, † 1821, schr. *Österreichs Fl.*, 1814, *Baierns Fl.*, 1811, *R. u. S.* (Römer u. Schultes), 16 A. v. *Linné's Syst. veget.* — *Schultesia* Mart., Spr.
- Schultz**, C. Fr., Arzt z. Neubrandenburg, † 1765, schr. *Prodr. Fl. Stargardiens.*, Berl. 1816—19. — *Schultzia* Spr. — **Schultz**, C. H., gen. *Schultzenstein*, Prof. z. Berl., *Förd. d. Gartenbaus*, † 1871, schr. *Nat. d. lebenden Pflanze*, 1825—28, *Tanacetaceae*, 1844, *Pfl.-Physiol.*, z. B. *neues Syst. d. Pfl.-Morphologie*, 1847, u. a. — **Schultz**, C. H., gen. *Bipontinus*, Arzt u. Bot. in Deidesheim (Rheinpfalz), † 1867, schr. *Anal. Cichoriacearum Palatin.*, 1841, u. a. — **Schultz**, Fr. W., *Brud. d. vor.*, Arzt in Weissenburg, † 1869, schr. *Fl. d. Pfalz etc.*, *Grundz. d. Phytostatik etc.* (*Pollichia*, J. 1863).
- Schulzer** v. Müggenburg, österr. Hauptm. in Slavonien, schr. *Icon. Hymenomyc. Hungariae*, 1874, **Sch.**, **Kanitz** u. **Knapp**, schr. d. bish. bekannt. *Pfl. v. Slavonien*, 1866. — *Schulzeria* R. S.
- Schum.** = **Schumacher**, Prof. in Kopenh., † 1830, schr. *Kjovenhanske Fl.*, 1804, *Medicinsk Plantelaere*, 1825—26.
- Schwägrichen**, schr. *Hist. muscor. hepaticor. Prodr.*, Lps. 1814, *Specim.*

- muscor. frondos. I, Berlin 1830, Herausg. v. Winkler's Giftgew. Deutschlands, Leipz. 1854. — *Schwaegrichenia* Spr.
- Schwalbe**, C. G., schr. de China officinarum, Leyd. 1715. — *Schwalbea* L.
- Schweigger**, de plantar. classificatione nat., Regiomontani 1820. — *Schweiggera* Spr., (-ia) Mart.
- Schweinfurth**, G., schr. novae species aethiop., Flora der Soturba an der nubischen Küste, 1868.
- Schwendener**, s. 1867 Prof. in Basel, jetzt z. Berl., schr. Unters. üb. Flechten-Thallus, 1860, Algentypen d. Flechten-Gonidien (neue Flecht.-Theorie), 1869, S. u. Nägeli, Mikrosk. 1865—67, Neue mechanische Theorie d. Blattstellung, Lpz. 1878, u. a.
- Schweykert**, J. M., Catal. pl. horti bot. Carlsruhani etc., Carlsru. 1791. — *Schweykerta* W.
- Scop.** = **Scopoli**, zul. Prof. z. Pavia, † 1788, schr. Fl. carniolica, 2. A., 1772, Fundament. bot., Viennae 1786, Deliciae Flor. et Faun. Insubrica, 1786—88. — *Scopolia* (-la) Jacq., L. Sm., Forst., *Scopolina* R. S.
- Scott**, J., schr. Orchardist, 2. A., Lond.
- Secretan**, L., Landammann v. Waadt, † 1839 z. Lausanne, schr. Mycogr. Suisse, 1833.
- Seemann**, Dr. Berth. aus Hannover, Gärt. u. Reis., 1863 Red. d. Journ. of Botany in Lond., † 1872 in Centr.-Amer., Herausg. d. Bonplandia, Hannov. 1853—62, schr. d. Palmen, 2. A., 1863, Fl. Vitiensis 1865—68, u. a.
- Seguerii** bibliogr. bot. Access. **Brumaldi** bibl. bot., 3 p., Hag.-Comit. 1770.
- Seliger**, schles. Pfarr. u. Bot., † 1812, schr. Bryologie. — *Seligeria* Schimp.
- Sendtner**, Prof. z. München, † 1859, schr. d. Solaneen (in Martius' Fl. brasil.), üb. d. klimat. Verbreit. d. Laubmoose durch d. östr. Küstenländer, üb. d. Vegetationsverh. Südbayerns etc. — *Sendtnera* Endl.
- Senebier**, J., schr. Physiologie végétale, Genève 1801. — *Senebiera* Poir.
- Ser.** = **Seringe**, Prof. z. Lyon, † 1858, schr. (in de Cand.'s Prodr.) Aconitum etc., Mélanges bot., Genève 1824—26, Elémens d. Bot., üb. Cerealien (in Fl. d. jard. et des grand. cultures, Lyon 1845—49), u. a. — *Seringea* (-ia) Gay, Spr.
- Sessé**, Dr. Mart., Mitherausg. d. Fl. mexicana (v. Moçino u. Sessé), mex. Botaniker. — *Sesséa* R. P.
- Seub.** = **Seubert**, Hofr. u. Prof. am Polytechn. z. Carlsruhe, † 1878, schr. Fl. azorica, 1844, Elatinear. Monogr., 1845, Lehrb. d. gesammt. Pflanzenk., 5. A., 1870, schr. in Martius' Fl. brasil. u. a.
- Shaw**, Thom., Geistl. u. Reis. in Nordafr., † 1751, Prof. z. Oxford, schr. Pfl. d. Levante etc., Oxf. 1733. — *Shawia* Forst.
- Sheppard**, schr. on trees, their uses and biography, Lond. 1848. — *Sheppardia* Nutt.
- Sibth.** = **Sibthorp**, John, Prof. z. Oxford, † 1796, schr. Fl. graeca, Lond. 1810—40 (durch Smith herausg.), Fl. Oxoniens. 1794. — *Sibthorpia* L.
- Sickler**, J. V., schr. d. Teutsche Obstgärtner od. gemeinnütz. Magaz. d. Obstbaues, Weimar 1794—1804 (22 B. m. kol. Taf.).
- Siebold**, Ph. Fr. v., ber. Ethnogr. u. Erforsch. d. japan. Reichs, † 1866 z. München, schr. Synops. plant. oecon. regni japonici, 1827, Fl. japonica, 1835—44 (mit Zuccarini).
- Siegesbeck**, Dr. J. G., Prof. in St. Petersburg., schr. Botanosophiae verioris brev. sciagraphia, Petrop. 1737. — *Siegesbeckia* L.

- Simler**, R. Th., Leitfaden f. d. bot. Formenlehre, Zür. 1871, bot. Taschenbegleiter d. Alpenclubisten, Zür. 1871.
- Sims**, John, engl. Bot. z. London, † 1838, setzt. d. bot. Magazin v. W. Curtis fort bis 1826. — *Simsia* R. Br.
- Sinning**, s. Nees v. Esenbeck, Th.
- Sismonda**, E., Elementi di storia nat. Botanica, Torino 1858.
- Sloane**, H., schr. Catal. pl. ins. Jamaicae, Lond. 1696. — *Sloanea* L.
- Smee**, Alfr., Besuch. ber. Gewächsh., schr. My Garden (viel übersetzt), Abh. üb. d. besten Obstsorten Englands, 1874, † 1877.
- Sm.** = **Smith**. Jam. Edw., Präs. d. Linné'schen Ges. z. London, † 1828, schr. Plant. icon. hactenus ineditae etc., 1789—91, Bot. Gramm. z. Erläut. d. Jussieu'schen Systems, Weimar 1822, (mit Sowerby) Engl. Bot., 1790—1814, Fl. britica, Exotic Bot., u. a. — *Smithia* Ait., Schreb., Dry. — **Smith**, W., Prof. in Cork, † 1857, schr. Synops. of t. brit. Diatomaceae, Lond. 1853—56.
- Sol.** = **Solander**. Biblioth. am Brit. Mus. z. London, † 1782, schr. (m. Ellis) üb. Corallen. — *Solandra* L., Sw.
- Solms-Laubach**, Herm. Graf zu, s. 1879 Prof. d. Bot. in Göttingen, bed. Mykol. u. Bryol., schr. de Lathraeae positione etc., 1865, Tent. Bryologiae Algarviae, 1868, üb. monocot. Embryone etc., 1878, u. a.
- Sonder**, Med.-R. in Hamb., schr. Fl. Hamburg. 1851, d. Algen d. trop. Australiens 1871, (m. Harvey) Fl. Capens.
- Sonnerat**, fr. Reis. in Ostind., † 1814, schr. Voyage à la Nouv. Guinée, do. aux Indes orient. et à la Chine, 1806. — *Sonneratia* L. f., DC.
- Sowerby**, Jam., engl. Maler u. Naturf., † 1822, lief. Engl. Bot. or col. fig. (Text v. Smith), t. Ferns of Gr.-Britain (Text v. Ch. Johnson), Grasses of Gr.-Brit., u. a. — *Sowerbaea* Sm.
- Soyer-Willemet**, Oberbibl. z. Nancy, † 1867, schr. Observ. sur quelq. pl. de France, 1828, Abhandl. in Mém. d. l. Soc. nat. de Nancy. — *Soyeria* Monn.
- Spach**, Ed., schr. (mit d. Grafen Jaubert) Illustr. plantar. oriental., Revis. Populorum, do. Grossulariae, do. gen. Acerum et sp. Hippocastani 1834 (in Ann. d. Sc. nat.). — *Spachea* A. Rich.
- Spenner**, Prof. z. Freiburg i. Br., schr. Fl. Friburgens., 1825—29, Handb. d. angew. Bot., 1834—36, u. a. — *Spennera* DC.
- Spiegel**, A. (Spigelius), schr. Isagoges in rem herbar. libri II, Lugd.-Bat. 1633. — *Spigelia* L.
- Splitzgerber**, F. L., schr. Observ. de Bignoniaceis surinam., Amsterd. 1841, Obs. de Voyria, Enum. Filicum etc. Surinamens. etc.
- Sporleder**, F. W., schr. Verz. der in d. Grafsch. Wernigerode wildw. Phanerog. u. Gefässkrypt., Wernig. 1868. — *Sporledera* Hemp.
- Spr.** = **Sprengel**. Curt (Konr.), Prof. etc. z. Halle, † 1833, schr. Anleitung z. Kenntn. d. Gew., Halle 1802—04, Hist. rei herbar., 1807—08, Gesch. d. Bot., 2 T., Altenb. u. Lpz. 1817/18, Plant. umbellif. Prodr. 1813, Linnaei Syst. Veget. 16. A., Spr. (Schrader u. Link), Jahrb. d. Gewächsk., 1818—20, Fl. Halens., 1832, u. a. m. — *Sprengelia* Sm.
- Spring**, Dr. A. F., Prof. in Lüttich, † 1872, schr. Monogr. d. Lycopodiacees 1842 u. 49 (Bearb. ders. in Martius Fl. bras.).
- Spruce**, R., Palmae Amazonicae (Linn. Soc. Journal).
- Stackhouse**, John, engl. Bot., † 1819 z. Bath, schr. Nereis brit., 2. A., Oxf. 1816. — *Stackhousea* (-ia) Sm.
- Steetz**, J., schr. Enum. Compositarum q. in Australia annis 1833—41 colleg. L. Preiss, üb. d. Tremandreen etc., Hamb. 1853.
- Steph.** = **Stephan**. Fr., Prof. in Moskau, † 1817, schr. Enum. Stirpium agri Mosquensis 1792, Icones pl. Mosq. 1795. — *Stephania* W., Lour.
- Stephenson**, J. u. **Churchill**, J. M., schr. Medical botany (new ed. by Burnett, Lond. 1834—36).

- Sternb.** = **Sternberg**, Graf v., Vorst. d. k. Böhm. Ges. d. Wiss., † 1838, schr. Revis. Saxifragarum, Geognost.-bot. Darstell. d. vorweltl. Flora, 1820—28. — **Sternbergia** Waldst., Kit.
- Stedel.** E. Th., † 1856, schr. Nomencl. bot., Ed. 2, Stuttg. u. Tübing. 1840/41. — **Stuedelia** Spr. — **Stuedel**, E. G., schr. Synops. pl. glumacearum, Stuttg. 1855/56.
- Stev.** = **Steven**, Univ.-Kanzl. in Moskau, † 1863, schr. Verz. d. Pfl. auf d. taur. Halbinsel, Mosk. 1857. — **Stevenia** Adams.
- Stoll**, Oesterr.-Ungar. Pomologie, I u. II, Äpfel u. Birnen, Wien 1883 (80 Farbdr.-Abb.).
- Strasburger**, Ed., s. 1869 Prof. in Jena, j. Bonn, schr. üb. Azolla, d. Coniferen u. Gnetaceen, 1872, d. Angio- u. Gymnosperm., Jena 1879, u. a. m.
- Strumpf**, Ferd. L., schr. d. officin. Gewächse in d. nat. Pflanzenfamilien, Berl. 1840. — **Strumpfia** Jacq., Schreb. (-phia Pers.)
- Sturm**, Jak., Entomolog u. Bot., Herausg. v. Deutschlands Flora in Abbild. n. d. Nat., Nürnberg. 1798—1855. — **Sturm f.** Joh. W. Sohn, setzte d. Werk fort (Mitarb. v. Martius), † 1865. — **Sturmia** G., Hoppe, Rchb.
- Suard**, franz. Bot., schr. Catal. d. pl. vascul. du dép. d. l. Meurthe, Nancy 1843. — **Suardia** Schrk.
- Suck.** = **Suckow** (Succovius), s. 1774 Prof. in Heidelberg, † 1813, schr. üb. Calamiten, Ökonom. Botanik, 1777, Anfangsgr. d. theor. u. angew. Bot., 2. A., 1797, u. a. — **Succovia** Mnch. (-ovia Med.). — **Suckow**, Fr. W. L., Arzt u. Cust. d. Museums in Mannheim, schr. Fl. Mannheimens., 1821.
- Sullivant**, Bryolog z. Columbus (Ohio), † 1873, schr. Musci Alleghanienses 1846, Icones muscorum, d. Moose in Ch. Wilke's Unit. States Exploring Expedition, 1859, Musci Cubenses etc., New-York 1861.
- Sulzer** s. Kalchbrenner. — **Sulzeria** R. S.
- Suter**, schr. Fl. Helvetica, Turici 1802. — **Sutera** Roth, (-ia DC.).
- Sw.** = **Swartz**, Olof, schwed. Bot. u. Reis. in Westind., † 1818, schr. Nova gen. et sp. plant. etc., 1788, Icones pl. incognit. Fl. Indiae occidentalis, 1797—1806, Summa veget. Scandinaviae, 1814, u. a. — **Swartzia** W., (-zia Rchb.).
- Sweert**, schr. Florilegium, tract. de floribus et aliis Indicis plantis, Francof. 1612. — **Sweetia** L.
- Sweet**, Rob., engl. Bot., schr. Geraniaceae, Lond. 1820, Hort. suburb. Londinens. 1818, Hort. britannicus, 3. A. v. G. Don 1839, Fl. australasica 1827/28. — **Sweetia** DC.
- Tabernaemontanus** (v. Bergzabern), Jac. Theod., Arzt u. Bot., † 1590, schr. Kräuterbuch m. viel. Abb. — **Tabernaemontana** L.
- Targioni-Tozzetti**, Bot. in Florenz, † 1783, schr. Fl. v. Italien, 1763. — **Targionia** Mich.
- Taschenberg**, schr. Handb. d. bot. Kunstsprache, Halle 1843, u. a.
- Tausch.** = **Tauscher**, Ign. Fr., Prof. in Prag, † 1848, schr. Herb. Fl. Bohemicae univ., Hortus Canalius, 1823, Pl. select. Fl. Bohem., 1837. — **Tauscheria** Fisch.
- Taylor** s. Hooker. — **Tayloria** Hook. — **Taylor**, Thom., Bot. in Nordamer., schr. de Marchantieis.
- Ten.** = **Tenore**, Michele, Prof. in Neapel, † 1861, schr. Fl. Napolitana, 1811—38, u. v. a. — **Tenorea** Bert. (-ia Spr.).
- Thal.** Joh., Arzt in Nordhausen, schr. Sylva Hercynia u. Hort. medic. et philos., † 1583. — **Thalia** L., Schreb.
- Théis**, A. de, schr. glossaire de botanique etc., Paris 1810.

- Th. Fr.** s. Fries, Th. Magn. Sohn, Fr. f.
- Theophrastus** von Eresus, ber. griech. Philosoph etc., † 288 v. Chr. z. Athen, Theophrasti Eresii de histor. plantar. libri X (zuerst Amsterd. 1634). — Theophrasta (-stea) L.
- Thevenot**, übers. 1695 des Indienfahrers Kosmas „christl. Topographie“ aus d. 6. Jahrh. — Thevenotia DC.
- Thom.** = **Thomas**, Eman. nebst Brüdern, Schweizer Sammler z. Haller's Zeiten, schr. Catal. d. pl. suisses q. se vendent chez Em. Thomas à Bex (Cant. de Vaud), 1818. — **Thomasia** Gay. — **Thomas**, O., schr. Guide pratique de pomologie etc., Nancy 1876.
- Thomé**, Prof. Dr., Lehrb. d. Bot., Braunschw. 1872 u. 76, d. Flora v. Deutschl., Oesterr. u. d. Schweiz in Wort u. Bild (3 B., 600 T.), Gera 1885.
- Thomson**, Rob., schr. Catal. of fruits cultiv. in t. Garden of t. Hortic. Soc. of London etc., † 1869. — **Thomsonia** Wall.
- Thory**, s. Redouté. — **Thory**, Claud. Ant., schr. Hist. de Grosseillers, Par. 1829, Monogr. s. l. genre Rosier 1820, u. a.
- Thou.** = **Thouars (Du Petit-Thouars)**, s. Pet.-Th. — **Thouarsia** Vent.
- Thouin**, André, Prof. d. Agrikult. z. Paris, † 1824, schr. s. l. cult. d. Dahlia, 1804, Cours d. cult. et d. naturalisation d. végétaux, 1827. — **Thouinia** Poit.
- Threlkeld**, Dr. med. u. Bot. z. Dublin, schr. Synops. Stirpium Hibernicorum, † 1728. — **Threlkeldia** R. Br.
- Thb.** = **Thunberg**, ber. schwed. Bot. u. Reis. in Ceylon, Japan etc., 1743—1828, Schül. u. Nachfolg. Linné's z. Upsala, schr. Fl. japonica, 1794—1805, Fl. Capens. 1807—13. — **Thunbergia** L.
- Thuret** s. Bornet. — **Thuret**, Gust. z. Antibes, † 1875, Entd. d. Geschlechtigk. d. Tange, schr. s. l. Fécond. d. Fucacées, 1853—57.
- Thurmant**, J., schr. Essai de Phytostatique appliqué à la chaine de Jura, Bern 1849; dessen Boden-Nomenclatur.
- Tiedemann**, F., Gesch. des Tabaks u. andr. ähnl. Genussmittel, Frankfurt a. M. 1854. — **Tiedemannia** DC.
- Timm**, J. C., schr. Fl. Megapolitanae Prodr., Lips. 1788. — **Timmia** Hedw.
- Tineo**, V., schr. Catal. pl. horti reg. Panormit., 1827, Pl. rarior. Siciliae etc., Panorm. 1846.
- Tode**, Pred. u. Bot. im Mecklenburgischen, † 1797, schr. Fungi Mecklenb. selecti 1790—91. — **Todea** W.
- Tommassini**, Ritter v., k. k. Hofr. z. Triest, schr. Fl. v. Südistrien (Östr. Bot. Zeit. 1873). Sulla veget. dell' isola di Veglia, Triente 1875. — **Tommassinia** Bertol.
- Tornabene**, Fr., schr. Ricerche bibliografiche sulle opere botaniche del secolo XV, Catania 1840.
- Torr. Gr.** = **Torrey**, John u. **Gray**, Asa (s. Gray), **Torr.**, J., schr. a Fl. of t. north- and middle section of t. United States, 1824, u. v. a. — **Torreya** Van Houtt., Spr., Raf.
- T. od. Tourn.** = **Tournefort**, ält. franz. Bot. u. Reis., 1656—1708, Vorarb. Linné's, schr. Institutiones rei herbariae (ed. A. de Jussieu, Lugd. 1719), Hist. d. pl. d. Paris (2. A. v. Jussieu, 1725), Elémens de Bot. 1797, Voyage du Levant, 1717, u. a. — **Tournefortia** W., R. Br., Hook.
- Tragus (Bock)**, Hier., † 554, einer d. ält. deutsch. Bot., schr. New Kreuterbuch etc., Strassb. 1551. — **Tragia** Plum.
- Trattinick (-nik)**, L., Prof. in Wien, schr. d. essb. Schwämme Österreichs, Wien 1809, Archiv d. Gewächsk., Wien 1812—14, Genera pl. method. nat., Wien 1802, u. a. — **Trattinickia** Pers., W., Mart.

- Trautvetter (-wetter)**, E. G., schr. *Salicetum Comment.*, 1836, Middendorfs Reise in Nordsibir. 1843—44. — **Trautvetter**, E. R. v., schr. *Plantar. messes a. 1874 in Armenia a Radde et in Daghestania a Becker factas commentatus est Trautv.*, *Plantae Sibir. boreal. a Czekanowski et F. Mueller a. 1874—75.*
- Trentepohl**, Pred. im Oldenburgischen, schr. *Beitr. zu Roth's Cataloga bot. u. Bot. Bemerkungen.* — *Trentepohlia* Mart., Roth, Ag.
- Trev.** = **Treviranus**, zul. Prof. in Bonn, † 1864, schr. *üb. Pfl.-Physiologie (z. B. Phys. d. Gew., Bonn 1835—38).* — *Trevirania* W.
- Trevisan**, Vict., Graf in Venetien, Akad. zu Padua, schr. *Lichenotheca Veneta s. 1869, Prosp. della Fl. Euganea, 1842, u. a.*
- Trew (Treu)**, Chr. Jak., Arzt in Nürnberg., schr. 1769 *Hort. nitid. superbiens floribus etc., Norimb. 1750—72, Pl. select. quar. imagines Elrextius Londini pinx., Norimb. 1750—73.* — *Trewia* L.
- Triana**, J. et J. E. **Planchon**, schr. *Prodr. Florae Novo-Granatensis, Par. 1862.*
- Trin.** = **Trinius**, Frhr. v., † 1844 als Staatsr. z. Petersburg, bes. *Agrostograph, schr. Fundam. Agrostogr. 1820, Species graminum etc., 1828—36, u. a.* — *Trinia* Hoffm.
- Triumfetti**, J. B., schr. *de ortu et vegetatione plantarum, Romae 1685.* — *Triumfetta* L.
- Tschudi (-dy)**, v. u. Sohn, Schweiz. Nat., schr. *de Coniferis.* — *Tschudya* DC.
- Tul.** = **Tulasne**, L., Ren. u. Charl., Gebrüd. im Dep. Indre et Loire, erst. Naturalist am Mus. z. Paris b. 1872, schr. *üb. Leguminosen u. zahlr. mykol. Abh.* — *Tulasnodea* Fr.
- Turezaninow**, N., schr. *Fl. Baicalensi-Dahurica, 1835, Animadversiones etc., 1858.* — *Turezaninovia* DC.
- Turner**, W., engl. Arzt, schr. *neues Herbarium, 1551.* — *Turnera* L. — **Turner**, Dawson, reich. Bankier z. Yarmouth, † 1856, schr. *Synops. of t. brit. Fuci, Muscol. hibern. spicilegium.*
- Turpin**, fr. Pflanzenmaler, † 1840 zu Paris, lief. *Cactées 1830, Fl. usuelle, 1834, Iconogr. végét. 1841, u. a.* — *Turpinia* H. B. K., Vent.
- Turra**, Antonio, ital. Bot., schr. *Istoria del arbore della China, Fl. italicae Prodr., Vened. 1780.* — *Turraea* L.
- Tuss.** = **Tussae**, F. Rich. de, fr. Bot., schr. *Fl. Antillarum, Par. 1808—26, 4 B.* — *Tussaca* Rehb.
- Uechtritz**, R. v., schr. *d. wicht. Ergebnisse d. Durchforsch. d. schles. Phanerogamen-Flora im J. 1876.*
- Ulloa**, A. de, schr. *Physik. Nachrichten von Süd- u. Nordamer., Lpz. 1781.* — *Ulloa* Pers.
- Ulrich**, W., *Internationales Wörterb. d. Pflanzennamen, Lpz. 1872 (lat., deutsch, fr. u. engl.).*
- Unger**, Prof. in Wien, † 1870, schr. *Synops. plantar. fossil., Lips. 1845, Gen. et spec. pl. foss., Wien 1840, mit St. Endlicher Grundz. d. Bot., Wien 1843, d. Pfl. u. d. Luft, Wien 1853, d. versunk. Insel Atlantis, d. phys. Bedeut. d. Pflanzenkultur, Wien 1860, u. a.*
- Ungnad**, Chr. Sam., schr. *de Malo persica, Frankf. a. O. 1757.* — *Ungnadia* Endl.
- Urville** s. *D'Urville.* — *Urvillaea* H. B. K.
- Usteri**, P., Herausg. d. *Annalen d. Bot., Zürich 1791—95, u. a. m.* — *Usteria* W.

- V.** = **Vahl**, Mart., Linné's Schüler, Prof. in Kopenhagen, † 1804, schr. *Symbolae bot.* 1790—94, *Eclogae americ.* 1796—1807, *Enum. plant.* 1804—06. — **Vahlia** Thb., Schreb.
- Vaill.** = **Vaillant**, Seb., fr. Bot. u. Reis., Prof. z. Paris 1714, schr. *Bot. Parisienne* (300 Fig. p. Aubriet), Par. 1727. — **Vaillantia** R. S., DC.
- Valentini**, M. B., *Hist. simplicium reform. etc.*, acced. C. B. Valentini (fil.) *India literata*, Francof. 1716. — **Valentini**, Chr. B., *Tournefortus contract. etc.*, Lugd.-Bat. 1715. — Nach Jessen: **Valentini**, Bernh. 1657—1729, Prof. z. Giessen, schr. *Museum Museumum etc.*, Francof. a. M. 1704—14 (spät. lat. *Hist. simplic. reform. etc.*), *Prodr. Hist. nat. Hassiae, Gissae* 1707, u. a. — **Valentinia** Sw.
- Vand.** = **Vandelli**, Domin., portug. Bot., Prof. z. Lissabon, schr. *Pfl. v. Brasilien.* — **Vandellia** L.
- Van Houtte**, Herausg. d. *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, Gent, s. 1845, später *Planchon etc.*
- Van Hulle** von Gent, (mit Pynaert etc.) Herausgeb. d. *Bulletins mensuels du cercle d'Arboriculture en Belgique* s. 1855.
- Van Rheede** s. *Rheede*.
- Vater**, A., schr. *Catal. pl. Horti Wittenbergensis*, Wittenb. 1722. — **Vateria** ind. *Rheed.*
- Vaucher**, Pred. u. Prof. z. Genf, † 1841, schr. *Hist. d. Conferves d'eau douce*, 1803, *Monogr. d'Orobanches*, u. a. — **Vaucheria** DC.
- Veitch**, John Gould, schott. Gärtner u. Reis. in Japan u. Austral. bis 1866, führte neue Gartenpfl. ein, † 1870. — **Veitchia** u. **Colëus Veitchii**. — **Veitch**, James u. Söhne, *Handelsg.-Firma* in Chelsea (Engl.).
- Velley**, Thom., engl. Offizier, † 1806, lief. *Coloured figures of marine plants*, Bathon 1795. — **Velleja** Sm., Lab.
- Vent.** = **Ventenat**, Prof. in Paris, † 1805, schr. *Principes de Bot.*, 1795 (deutsch A. v. Haller, 1802), *Choix de pl. etc.*, 1803, *Jard. d. Malmaison*, 1803—04, u. a. — **Ventenata** Koel. (-tia) Sw., P. Br.
- Venturi**, Ant., schr. *studi micologici*, Brescia 1842, *i miceti dell'agro Bresciano*, Besc. 1845. — **Venturia** de Not.
- Verschaffelt**, Ch., *Gart.-Liebh.* in Gent, veranl. d. *Ersch. d. Illustration horticole* (redig. v. Lemoine), † 1880. — **Verschaffeltia** H., Wendl.
- Vesling**, schr. *Veslingii J. de plantis Aegypt. observ. ad Pr. Alpinum, Patavii* 1638. — **Veslingia** Fabr.
- Vest de**, schr. *Manuale bot., stirpes tot. Germaniae phaneroz.*, Klagenfurt 1805. — **Vestia** W.
- Vicat**, P. R., schr. *Hist. d. pl. vénéneuses d. l. Suisse*, Yverdon 1776. — **Vicatia** DC.
- Vietz**, lief. *Abb. aller mediz.-ökon.-technol. Gewächse etc.*, 6 Bde., Wien 1800—6.
- Viguier**, A., schr. *Hist. nat. d. pavots et d'argêmones*, Montpellier 1814. — **Viguiera** Kth. (-ia) Less.
- Vill.** = **Villars**, Dan., Arzt u. Prof. z. Strassb., † 1814, schr. *Hist. d. pl. du Dauphiné*, 1786—89, *Catal. d. pl. etc. de Strassb.*, 1807, u. a. — **Villarsia** Vent.
- Vilm.** = **Vilmorin**, L., fr. Gärtn., schr. *Essai d'un catal. méth. et synonyme des Froments*, Par. 1850, *Illustrierte Blumengärtnerei*, 2. Ausg. (m. II. Suppl.) v. Dr. Grönland u. Th. Rümpler, Berlin 1873. — **Vilmorinia** DC. — **Vilmorin** u. **Andrieux**, ber. Paris. Gärtner-Firma.
- Vis.** = **Visiani**, R. de, schr. *pianti fossili della Dalmazia*, *Recens. altera plantar. minus cogn. q. Hort. Patavinus colit*, 1858, *Pl. quaed. Aegypti et Nubiae*, Patavii 1836.

- Vittadini**, namh. Mykolog z. Mailand, † 1865, schr. Mon. Tuberacearum, 1831, do. Lycoperdineorum, 1842, Funghi mangerecci, 1835, u. a. — *Vittadinia* Rich.
- Viviani**, D., schr. Fl. Italicae fragmenta, Genuae 1808. — *Viviania* Cav., G. Don.
- Vöchting**, schr. üb. d. Bau d. Melastomaceen (Hansteins Abh. III), üb. Organbildung im Pflanzenr., Bonn 1878, u. a.
- Vogel**, B. C., schr. de gen. plant., Altorphii Noric. 1768, d. amerik. Agave, Nürnberg. 1800. — *Vogelia* Horn., Gm. — **Vogel**, Mart., Schül. v. J. Jung, gab dess. Botanico-physica heraus, 1678. — **Vogel**, Th., schr. (zu Meyen's Beitr.) üb. Leguminosen.
- Vogler**, nass. Hofr. z. Weilburg, † 1816, schr. üb. Farbebpl. (Krell'sche Annal. s. 1784). — *Voglera* Fl. Wett.
- Voigt**, F. G. u. F. S., schr. Handwörterb. d. bot. Kunstsprache, Jena 1803, Handb. d. prakt. Bot., Jena 1850. — *Voigtia* Spr.
- Voit**, Dr., Arzt u. Bryolog in Schweinfurt. — *Voitia* Hornsch.
- Volkamer**, schr. Fl. Norimbergensis, 1700. — *Volkameria* P. Br.
- Vriese**, G. H. de, schr. Plantae Preissianae, Amsterd. 1845, Pl. Indiae Batavae Orientalis, Lugd.-Bat. 1857, Goodenoviae 1854, u. a. — *Vriesia* Lindl.
- Wagner**, Herm., schr. Führ. ins Reich d. Kryptogamen, Bielefeld 1852, Malerische Bot., 2 B., Lpz. 1861, Deutsche Flora (nach Benthams Handb. d. brit. Fl.), 1869, u. a.
- Wahlbg.** = **Wahlenberg**, Prof. in Upsala, Thunberg's Nachf., † 1851, schr. Fl. lapponica, 1812, Fl. Carpathorum principal., 1814, Fl. suecica 1831—33, u. a. — *Wahlenbergia* Schrad., Dietr.
- W. K.** = **Waldstein u. Kitaibel**, Waldstein-Wartenberg Graf Ad., a. dess. Kosten d. Descr. et Icones plantar. rarior. Hungariae (s. Kitaibel) herauskamen. — *Waldsteinia* Kit., W.
- Waldner**, schr. Deutsche Farne, m. Berücks. angrenz. Gebiete (12. u. 13. H., Heidelb. 1883).
- Walker-Arnott**, G. A., Pugillus plantar. Indiae Orient., 1836, u. a., s. Arnott. — *Walkera* Schreb., (-ia) Ehret.
- Wall.** = **Wallich**, Nathanael, V.-Präs. d. Linné'schen Ges. z. London, schr. Tent. Fl. Nepalensis ill., Calcutta 1824—26, Pl. asiat. rarior., 1830—32. — *Wallichia* Roxb.
- Wallr.** = **Wallroth**, Arzt in Nordhausen, † 1857, schr. Rosae plantar. generis hist. succincta, Nordh. 1828, Fl. Cryptog. German. (in Bluff u. Fingerhuth's Fl. germ., 1831—33), Annus bot., 1815 (in Sprengels Fl. v. Halle), Beitr. z. Bot., Lpz. 1842, u. a. — *Wallrothia* Spr., Roth.
- Walpers**, Dozent zu Berlin, † 1863 (Selbstmord), schr. Repert. bot. syst., 1842—48 (später als Annales botanices syst.), Animadv. crit. in Leguminosae Capenses u. a.
- Walter**, Thom., Farmer in Carolina, schr. Fl. Caroliniana, Lond. 1788.
- Walther**, G. F., Prof. in Leipzig, † 1746. — *Waltheria* L., Spr.
- Warner**, Rob., schr. üb. d. Kultur der Orchideen. — *Warneria* Mill.
- Warszewicz**, J. v., poln. Flüchtling, Reis. f. Van Houtte in Gent s. 1850, † 1866, Insp. d. Bot. Gartens z. Krakau. — *Warszewiczella* Van Houtt.
- Watson**, P. W., engl. Bot., schr. Cybele brit., Lond. 1847—52, Dendrolog. brit., 1825, üb. d. geogr. Verbr. d. Gew. Gr.-Brit. (deutsch v. Beilschmied, Bresl. 1838). — *Watsonia* Mill. — **Watson**, H. C., üb. seltene brit. Pfl., 1835—37.

- Webb**, John, amer. Beerensamml. u. Culturist v. Cranberry (*Oxycocc. macroc.*) in N.-Amer. — *Webbia* DC.
- W. M.** = **Weber** u. **Mohr** (erst. Prof. z. Kiel, † 1823), bot. Taschenb., 1807, W., Hist. Musc. hepat., 1815, Hort. Kiliens., 1822. — *Webera* Hedw., Schreb.
- Weddel**, Hugh Algernon, Reis. in Peru u. Bolivia, schr. Mon. v. Cinchona, Fl. v. Süd-am., Alpenfl. d. Cordilleren u. a. — *Weddellia* Tul.
- Wedel**, G. W., schr. Opiologia, Jenae 1674, de Corchoro, Jen. 1695, de Oenanthe Theophrasti, 1710. — *Wedelia* Jacq.
- Weigel**, Prof. in Greifswald, schr. Observ. bot., 1762, Fl. Pomerano-Rugica, 1769. — *Weigela* Thb., (-ia) Pers., Schreb.
- Weihe**, Arzt z. Herford, † 1834, **W. N.** od. **W. E.** = **Weihe** u. **Nees** v. **Esenbeck**, d. deutsch. Brombeerstr., 1822—27, W., deutsche Gräser etc., 1823—30. — *Weihea* Spr., Eckl.
- Weinmann**, J. G., Apoth. z. Regensburg, schr. Phytanthozoa-Iconogr., Regensb. 1737—45. — *Weinmannia* L. — **Weinmann**, s. 1823 Gart.-Insp. z. Paulowsk b. Petersb., schr. Elenchus pl. hort. imp. Pawloskii et agri Petropolitani, 1824, Hymeno- et Gasteromycet., etc., 1836.
- Weis**, F. G., schr. Pl. cryptog. Florae Goettingensis, Gott. 1770. — *Weisia* Hedw.
- Weitenweber**, Arzt z. Prag, Red. d. Zeitschr. Lotos. — *Weitenwebera* Kbr.
- Wenderoth**, Prof. z. Marburg, † 1861, schr. Lehrb. d. Bot., 1821, Fl. Hassiaca, 1846, d. Pflanzengart. d. Univ. Marburg, 1850, u. a.
- Wendland**, J. Christoph, Gart.-Insp. zu Herrenhausen b. Hannover, † 1828, **W.** (u. **Schrader**) Sertum Hannoveran., Hort. Herrenhusanus 1789—1801, *Ericarum* Icon. et descr., 1793—1823, u. a. — *Wendlandia* W., Bartl. — **Wendland**, **H. Ludolf**, Sohn u. Nachf., † 1869, **W.** (u. **Bartling**), Beitr. z. Bot. 1824—25, Index Palmarum, 1854. — **Wendland**, **Herm.** (d. vorig. Sohn u. Nachf.), **H. Wendl.** (u. **O. Drude**), *Palmae australasiae* (Linnaea 1875).
- Westcott**, Freder. (s. Knowles), mit Knowles d. bot. Gart. v. Birmingham, 1723.
- Wibel**, Arzt z. Wertheim in Franken, schr. Primitiae Fl. Werthemensis, 1799. — *Wibelia* Pers., Röhl.
- Wickstroem**, schwed. Bot., schr. Jahresber. üb. d. Fortschritte d. Bot. (deutsch v. Beilschmied), 1820—46, **W.** och **N. J. Anderson**. Årsberättelse om bot. arbeten etc., Stockh. (Jahrg. 1837—56), Stockholms Flora, 1840. — *Wickstroemia* Schrad., Spr.
- Wiegand** s. *Wigand*.
- Wieland**, Melch. (*Guilandus*), Prof. z. Padua, † 1590, schr. De Stirpium aliquot nominibus vetustis epistolae, Basil. 1557, Papyrus, Vened. 1572. — *Guilandina* Juss.
- Wiesner**, J., Prof. in Wien, schr. üb. Chlorophyllbildung, Imbibitionswasser u. s. f., Wien 1875 f.
- Wigand**, Joh., Bischof v. Pommersanien 1540—87. — *Wigandia*, **H. B. K.** — **Wigand**, **Alb.**, s. 1851 Prof. in Marburg, schr. bot. Unters., d. Baum etc., Braunschw. 1854, Lehrb. d. Pharmakognosie, 2. A., 1872, üb. Darwinismus, Genealog. d. Urzellen, 1872, d. bot. Gart. z. Marb., 2. A., u. a. m.
- Wiggers**, Prof. d. Pharmazie in Göttingen, schr. Handb. d. Pharmakognosie, Gött. 1864. — **Wiggers**, **F. H.**, schr. Primitiae Fl. Holsaticae, Kiel 1780. — *Wiggersia* Fl. Wett.
- Wight**, R., Dir. d. bot. Gart. z. Madras, schr. Contrib. to the Bot. of India, 1834, *Spicilegium Neilgherense*, Madras 1846—50, **W.** u. **Walker-Arnott**, Prodr. Fl. Peninsulae Indiae orientalis, Lond. 1834. — *Wightia* Spr.

- W.** od. **Willd.** = **Willdenow.** Prof. z. Berlin, † 1812, hervorr. Botaniker, schr. Anleit. z. Selbststud. d. Bot. (4. A. v. Dietrich, 1832), Fl. Berolinensis Prodr., 1787, Hort. Berolin., 1816, Caricologia, 1805, Berlin. Baumzucht, Berl. 1811, u. a. — *Willdenowia* Thb.
- Willemet**, P. R., schr. Herbar. Mauritanum, Lpz. 1796. — *Willemetia* Neck., Gm., A. Brong.
- Willieh**, J. Fr., schr. Scholia in Vergilii opuscula de re hortensi, Basel 1548. — *Willichia* L., Spr. — **Willieh**, Chr. L., schr. Illustrat. bot., Gotting. 1766.
- Willkomm**, Moritz, s. 1873 Prof. in Prag, schr. Führer in's Reich d. deutsch. Pfl., Lpz. 1862, (m. Lange) Prodr. Fl. Hispanicae, Stuttg. 1877, Atlas d. Bot. 1873, u. a.
- Wilson**, W., engl. Bryolog, † 1871, schr. Bryologia brit., 3 A., 1855. — *Wilsonia* R. Br.
- Wimmer**, Fr., Schulr. u. Gymn.-Dir. z. Breslau, † 1868, schr. (m. Grabowski) Fl. Silesiae 1827—29, Salices europaeae 1866, d. Pflanzern., 9. A., Bresl. 1868, u. a.
- Winckler**, Ed., sämmtl. Giftgew. Deutschl.'s (96 kol. T.), Berl. 1832, Handb. d. pharmaz. Bot., Lpz. 1846. — **Winckler**, Emil, Gesch. d. Bot., Frankf. a. M. 1854.
- Wirtgen**, Rector u. bed. Bot. z. Coblenz, † 1870, schr. Fl. d. Reg.-Bez. Coblenz, 1841, Leitf. f. d. Unterr., 2. A., 1846, Fl. d. preuss. Rheinprov. 1857, Fl. d. preuss. Rheinlande 1870, u. a. — *Galium Wirtgenii* Schultz.
- Withering**, Arzt z. Birmingham, † 1799, schr. a bot. arrangement of t. veget. in Gr.-Britain, 5. A., 1812. — *Witheringia* l'Hér., Schreb.
- Wittmack**, Prof. in Berl., schr. Musa Ensete, Beitr. z. Kenntn. d. Bananen, Halle 1867, mit Perring Herausg. d. Gart.-Zeitg. s. 18:2, schr. üb. vergl. Kulturen m. nord. Getreide (Landw. Jahrb. 1876), üb. eine neue Ölsaart 1877, üb. Carica Papaya (Sitz-Ber. d. Bot. Ges., Berl. 1878), u. a. m.
- Wist.** = **Wittstein**, schr. Etymolog. Handwörterb. d. Pflanzenk., Ausbach 1852, 2. A. Erlangen 1856.
- Wolf**, Casp. Fr., Prof. d. Akad. z. St. Petersburg., schr. Theoria generationis u. Nov. comment. acad. Petropolit., † 1794. — *Wolfia* Spr.
- Woods**, Jos., schr. Bemerk. üb. d. europ. Gräser (in Linn. Transactions, 1838), u. a. — *Woodsia* R. Br., Spr.
- Woronin**, M., russ. Bot., schr. üb. Synchronitium, üb. d. Bau des Stammes v. Calycanthus (Bot. Zeit.), u. a. — *Woroninia* Cornu.
- Wrangel**, F. A., schwed. Bot., schr. Abh. üb. Cardamine parviflora L., Stockh. 1823. — *Wrangelia* Ag.
- Wredow**, schr. Ökon.-techn. Flora Mecklenburgs, Lüneburg 1811, d. Gartenfreund (5. A. v. C. Helm, Berl. 1837). — *Wredowia* Eckl.
- Wright**, Will., schott. Arzt u. Bot., schr. A bot. account of t. Quassia Simaruba, Edinb. 1778. — *Wrightia* R. Br.
- O. W.** = **Wünsche**. Dr. O., Oberlehr. am Gymn. z. Zwickau, schr. Schulflora v. Deutschl., Lpz. 1877, Excurs.-Fl. d. Königr. Sachsen, Lpz. 1869, Neubearb. v. Schmidlin's Anl. z. Bot., 3. A., 1882.
- Wulfen**, Francis Xaver de, Jesuit u. Prof. z. Klagenfurt, † 1805, schr. Cryptog. aquat. 1803, Pl. rar. descr. 1805. — *Wulfenia* L., Jacq.
- Wulff**, Joh. C., schr. Fl. borussica. — *Wulfia* DC.
- Wydler**, H. in Bern, De Candolle's Conservator, schr. üb. Blüten-Antholysen, Regensb. 1859, üb. dichasiale u. sympodiale Verzweig. vegetat. Achsen (Flora, 1876), u. a. — *Wydleria* DC., Lindl.
- Ximenes**, Jos., span. Apoth. — *Ximenesia* Cavend. — **Ximenes** (-nez), Franz, span. Mönch, schr. üb. mediz. Pd. od. Quatro libro . . . que Fr.

Hernandez etc., Mex. 1605 (später Fr. Hernandez, Opera quum edita tum inedita etc., Madr. 1790). — *Ximenia* Schreb.

Young, Edw., schr. treatise on Opium, Lond. 1753, Farne von Wales.
— **Young**, Arth., landw. Autor, † 1820, schr. Travels during 1787—89.
Youngia Meyen, Cass.

- Zalheimb**, J., schr. de Saccharo deque viribus ejus atq. usu, 1772.
Zaluzanski, Adam, böhm. Bot. d. 16. Jahrh.'s, dess. Pfl.-Syst. in Zalu-
zanii Methodi herbariae libri tres, 1598 u. 1604. — *Zaluzanskia* Neck.,
Zaluzania Pers.
Zanardini, Giov., Mitgl. d. Instit. z. Venedig, schr. Synops. Algarum
etc., 1841, Iconogr. phycolog. adriat. et mediterranea 1862—76, u. a.
— *Zanardinia* Zanard.
Zannichelli, schr. istoria delle piante che nascono ne' lidi intorno a
Venezia, Vened. 1735. — *Zannichellia* L.
Zanoni, G., schr. istoria botanica, Bologna 1675, Rarior. stirpium hist.
ed. C. Montius, Bonon. 1742. — *Zanonia* L.
Zenker, Prof. in Jena, † 1837, schr. Fl. v. Thüringen 1836—48, merkan-
tile Warenk. 1831—35, u. a.
Zeyher, bad. Geh.-Rat u. Dir. d. Schwetzing. Gart.'s, † 1843, s. Ecklon.
— *Zeyhera* Spr., (-ia) Mart.
Zimmermann, F. J. v., schr. Grundr. d. Phytologie, Wien 1831.
Zinn, J. G., Prof. in Götting., schr. Catal. pl. Horti acad., Gött. 1757,
Observ. bot., Gött. 1753. — *Zinnia* L.
Ziz, J. B., Hess. Darmst. Med.-R. z. Mainz, † 1829. — **K. Z.** = **Koch**
u. **Ziz**, Samml. d. rhein. Flora s. Koch. — *Zizia* Koch.
Zobel, Prof. d. Forstsch. z. Weisswasser in Böhmen, † 1865, Bearb.
v. Corda's Icon. fungorum, Prag 1854.
Zoega, J., schr. Fl. islandica. — *Zoega* L.
Zollikofer, schweiz. Bot., schr. Alpen-Flora, St. Gallen 1828. — *Zolli-
kofera* DC.
Zorn, B., schr. Botanologia medicin. od. Anweisung u. s. w., Berl.
1714. — *Zornia* Gm.
Zuccagni, Attil., Gart.-Insp. z. Florenz, schr. Synops. pl. Horti Floren-
tini, Florenz 1793. — *Zuccagnia* Thb., Red., Pers.
Zucc. = **Zuccarini**, Prof. z. München, † 1848, schr. Fl. d. Umgeg. v.
München, 1829, Naturg. d. Pflanzenr.'s, 1843, Mitarb. v. Siebold's
Fl. japonica. — *Zuccarinia* Blum., Spr.
Zuchold, E. A., schr. Additamenta ad Pritzelii Thesaurum etc., 2 Fasc.
1852 u. 66.
Zwackh, W. v., schr. Enum. Lichenum Fl. Heidelbergensis 1862. —
Zwackhia Kbr.
Zwinger (**Zvinger**), schr. Theatrum botanicum d. i. vollk. Kreuterbuch
etc., Basel 1696. — *Zwingera* Schreb.

b. Geographische Botanik oder die Autoren und botan. Werke nach den Ländern alphabetisch zusammengestellt.¹⁾

I. Europa.

- a) **Im Allgemeinen:** Batsch, Fries, Hepp, Nyman, Poirer, Risso (Süd-E.), Römer, J. J., Schimper, Wimmer.
- b) **Deutschland:** Abel u. Reiter, Albertini etc. (Lausitz), Alefeld, Ascher-son, F. A. (Brandenburg), Barkhausen (Lippe), Bartsch (Schles.), Bayrhofer (Taunus), Becker I (Plauen), Becker II (Mecklenb.), Berthold (Westf.), Besler (Bayern), Bischoff, Blandow (Meckl.), Bluff etc., Bönninghausen (Westf.), Böhmer (Sachs.), Boll (Meckl.), Bossler (Els.-Lothr.), Cafisch (Südostd.), Detharding (Meckl.), Dierbach (Heidelb.), Dietrich, A. (Preuss.), Dietrich, D. N. F., Dillen (Gies- sen), Döll (Baden), Dösch u. Scriba (Gr. Hess.), Ehrenberg (Berl.), Elsner (Schles.), Endlicher (Pos.), Fabricius (Gr. Hessen), Ficinus (Dresden), Fiek (Schlesien), Fingerhuth (Eiff.), Flörke, Fl. Wett. (Hessen), Flotow (Schlesien, Brandenburg, Pommern), Fuckel (Nas- sau), Fürnrohr (Regensburg), Funk, Garcke, Gmelin, F. Ch. (Bad- en), Göppert (Schles.), Grabowski u. Günther (Schlesien), Hagen (Pr.), Hallier-Koch, Hayne (Pr.), Hampe (Harz), Heller (Würzb.), Hepp (dsgl.), Hoffmann I u. II, Hoppe, Höfle (Bodens.), Hübener, Jessen, Jung (Nass.), Jungermann (Giess.), Kabath (Schles.), Karsch (Westf.), Kirschleger (Els.), Kittel, Koch, Körber, König, K. (Pfalz), Kreppehuber (Bayern), Krocker (Schles.), Kützing, Kunth (Berl.), Kunze, Lachmann (Braunschweig), Lambert (Brandenb.), Langenthal (Nordd.), Leers (Nassau), Leysser (Halle), Lösel (Pr.), Lumnitzer (Pos.), G. Meyer (Hannov.), A. Meyer (Oldenb.), Milde, Münch (Hess.), H. Müller (Westf.), J. B. Müller (Waldeck), Murray, Necker (Mannh.), Nees u. Weihe, Nolte (Holst.), v. Otto (Sachs.), Patze etc. (Pr.), Pollich (Pfalz), Planer (Erfurt), Rabenhorst (Laus.), Ratze- burg, Rebentisch (Neumark), Regel (Bonn), Röhring, Römer, F. A., Röper (Meckl.), Rostkovius (Stett.), Roth, Rupp (Jena), Schäffler (Bay.), Schenk (Würzb.), Schkuhr, Schlechtendal (Halle etc.), Schmidt u. Kunze, Schmitz u. Regel (Bonn), Schneider (Laus., Magdeb.), Schnittpahn (Hess.), Schnizlein (Bay.), Schrader (Hannov), Schrank (Bay. etc.), Schreber (Leipz.), Schübler u. Martens (Württ.), Schultes (Bay.), Schultz (Stargard), Schultz, F. (Pfalz), Schummel (Schles.), Schwabe (Anh.), Schweykert (Carlsr.), Sendtner (Südbay.), Seubert (Südd.), Sonder (Hamb.), Sporleder (Harz), Spenner (Freiburg), Sprengels (Halle), Sturm, Suckow (Mannh.), Thomé, Timm (Meckl.), Tode (dsgl.), Uechtritz (Schles.), Valentini (Hess.), Vater (Wittenb.), Volckamer (Nürnb.), H. Wagner, Wallroth, Weber (Kiel), Weigel (Pomm.-Rüg.), Weihe u. Nees, Weis (Gött.), Wenderoth (Hess.), Wendland (Hann.), Wessel (Ostfriesl.), Wibel (Wertheim), Wiggers (Holst.), Willdenow (Berl.), Wimmer etc. (Schles.), Wirtgen (Rh.-Pr.), Wünsche (Sachs.), Wredow (Meckl.), Wulff (Pr.), Zenker (Thür.), Zeyher (Schwetzingen), Zinn (Gött.), Ziz (Rheinl.), Zuccarini (Münch.), Zwackh (Heidelb.).
- c) **Österreich-Ungarn:** Andrä (Banat, Siebenb.), Baumgarten (Siebenb.), Besser (Galiz.), Crantz, Dolliner (Nied.-Östr.), (Ettinghausen (Tyr.), Herlich (Bukow.), Heussler (Tyrol), Host, Jacquin, Kalchbrenner

1) Das Nähere s. in dem Autorenverzeichnis.

- (Ung.), Kanitz (Donaul.), Kitaibel (Ung.), Knapp (dsgl.), Kosteletzky (Böhm.), Maly (Steierm.), Menyharth (Ung.), Neilreich (Croat.), Ott (Böhm.), Pohl (dsgl.), Pokorny, Presl. (Böhm.), Rochel (Banat), Sadler (Ung.), Schultes, Schulzer v. Muggenbourg (Ung.), Kanitz u. Knapp (Slavon.), Scopoli (Kärnth. etc.), Tausche (Böhm.), Thomé, Tommassini (Istr.), Trattinick, Visiani (Dalm.), Wahlenberg (Karpath.), Waldstein (Ung.).
- d) **Schweiz**: Andreaä, d'Angreville (Wallis), Chavannes, Christener, De Candolle, Ducommun, Gaudin, Godet, Gremlı, Haller, Heer, Hegetschweiler, Höfle (Bodens.), Koch-Hallier, Milde, Nägeli u. Schwendener, Schärer, Scheuchzer, Schleicher, Secretan, Suter, Thomas I u. II, Thomé, Vicat, Vogel, Zoilikofer.
- e) **Niederlande u. Belgien**: Boerhave (Nied.), Crepin (Belg.), Dumortier (Belg.), Hannon (dsgl.), Kickx (Fland.), Lejeune (Belg.), Lestiboudois (dsgl.), Libert (do.), Morren (do.), Westendorp (do.).
- f) **Dänemark**: Heiberg, Holmskiold, Hornemann, Lyngbye, O. F. Müller, Oeder, Rostrup, Schumacher.
- g) **Skandinavien mit Lappland**: Acharius, Agardh, Blytt (Norw.), Düben u. Ihrmann (Schwed.), Fries I u. II, Gunner (Norw.), Hartmann (Schwed.), Liljeblad (dsgl.), Lindblad (do.), Nylander, Retzius, Swartz, Thedenius (Schwed.), Wahlenberg (Lappl.), Wahlberg (Gothenb.).
- h) **Grossbritannien**: Aiton, Babington (norm. Ins.), Bentham, Berkeley, Bolton, Curtis, Dickson, Dillen, Dillwyn, Don, Engl. Botany, Edwards (bot. Regist.), Endlicher (Norfolk), Francis, Goodenough, Grew, Greville (Schottl.), Hassall, Hill, Hooker u. Taylor, Howe (Derbysh.), Hudson, Knapp, Lightfoot (Schottl.), Lindley, Lindsay, Loudon, Lowe, Newman, Parnell (Schottl. etc.), Pratt, Ray (Rajus), Relham (Cambridge), Smith, W., Smith, J. E., Sowerby, Stackhouse, Symons (brit. Ins.), Threlkeld (Irl.), Turner, Watson, Wilson, Withering.
- i) **Frankreich**: Balbis, Barrelier, Bastard, Boreau, Bosc, Bulliard, Castagne, Chaix, Cosson u. Germain, de Candolle u. Duby, Delarbre, Desmazieres, Desvaux, Duhamel, Dujardin, Durieu, Garidel, Gauthier, Godet, Godron u. Grenier, Gouan, Guépin, Jaune St. Hilaire, Lamarck, Lapeyrouse (Pyren.), Lecoq, Lelieur, Leroy, Leson, Loiseleur, Merat, Nylander (Gall. u. Algerien), Poiteau (Par.), Ramond (Pyren.), Soulavie (Südfr.), Soyer-Willemot, Suard, Thuiller (Par.), Tournefort, Vaillant, Ventenat (Malmaison), Vigneux (Par.), Villars (Dauph., Strasb.).
- k) **Spanien u. Portugal**: Asso, Barrelier, Bernal (Aragon.), Cambesedes (Balear.), Colmeiro, Figueiredo (Port.), Hoffmannsegge u. Link (Port.), Lagasca, Lapeyrouse (Pyren.), Loefling, Ramond (Pyren.), Solms-Laubach (Algarvien), Webb, Willkomm u. Lange.
- l) **Italien**: Allioni (Piem.), Balbis (Turin), Barrelier, Battarra (Rimini), Bellardi (Piem.), Beltramini (Bassano), Bernardi (Sicil.), Bertoloni, Bivona-Bernardi (Sic.), Boccone (Sic. u. Malta), Brignoli (Modena), Cesati, Cupani, Donati (Venet.), Gasparrino (Palermo), Gennari (Ligur.), Gussone (Sic.), Meneghini (Eugan. etc.), Micheli (Florenz), Monti (Bologna), Moretti, Nocca (Tessino), de Notaris, Parlatore (Sic. etc.), Passerini (Ob.-It.), Presl (Sic.), Ré (Segus., Turin), Savi (Etrur.), Scopoli (Insubr.), Tenore (Neap.), Todaro (Palerm.), Trevisan (Venet.), Turra, Viviani, Zannichelli (Vened.), Zanardini (adr. u. Mittelm.), Zuccagni (Florenz).
- m) **Türkei, Griechenland u. s. f.** (Balkanhalbinsel): Ascherson u. Kanitz (Bosn., Serb. etc.), Bory de St. Vincent (Pelop., Cyklad.), Bux-

baum (Constantinop.), Dumont d'Urville (Archipel etc.), Kanitz (Bulg.), Olivier (Türk.), Sibthorp (Griech.).

- n) **Russland u. Kaukasusländer:** Adams (Sibir., Kauk.), Marschal von Bieberstein (Südr., Kauk.), Fischer, F. E. L. (Petersb.), Fischer v. Waldheim (Mosk.), Gilibert (Litth.), Gmelin, S. G. (Russl., Krim), Grindel (Ostseep.), Kalm (Finnl.), Karsten (desgl.), Kühlwein, Laxmann, Ledebour, Liboschütz (Petersb., Mosk.), C. A. Meyer (Kaukasus etc.), Pallas, Rostafinski (Polen), Stephan (Mosk.), Steven (Krim), Weinmann (St. Petersb.).

II. Asien und indischer Ocean.

- a) **Orient (Levante) und Arabien:** Alpinus (Orient), Anderson (Aden), Billardier (Syr.), Boissier (Pers.), Botta (Yemen), Buhse (Armenien), Endlicher u. Fenzl (Kabul), Fenzl (Syr., Taurus), Forskål (Arab. etc.), Griffith, Gronovius (Orient), Labillardier s. Billardier, Olivier (Pers.), Shaw (Levante), Schubert (Arab. etc.), Tournefort (Levante), Trautvetter, E. R. v. (Armen., Kauk.).
- b) **Sibirien, Nordost- u. Centralasien:** Adams (Sib.), Bongard u. C. A. Meyer, Bunge (Altai), Glehn, A. v. Humboldt, Ledebour (Altai), Maximowicz (Amur), Regel (Turkest.), Ruprecht, Schmidt, F. (Amur), Trautvetter, E. G. (Nordsib.), Turczaninow (Baikal, Daurien).
- c) **Ostindien u. Sundainseln:** Anderson (Ceyl.), Arnott-Walker, Beccari (Malayen-Archipel), Bennett (Java), Blume (dsogl.), Bosch (dsogl.), Burmann, Colebrooke, Commelyn, Choisy (Java), Don D. (Nepal), Dozy (ind. Archipel), Dumont d'Urville (Ost. Archip.), Graham (Bombay), Hasscarl (Java), Hermann (dsogl.), Hooker, J. D. (Himalaya), Hooker u. Thomson (Ind.), Horsfield (Java), Houstoun (Süd-asien), Humboldt (Mitt.- u. Südas.), Jack (Sumatra), König, J. G. (Ostind.), Kops (Java), Kurz (Birma), Leschenault (Südas.), Miquel (Sundains. etc.), Moritz (Java), Museum Zeylaicum (Ceyl.), Nees, Walker-Arnott u. de Candolle (Ostind.), Reinwardt (ind. Archip.), Rheede (Ostind.), Roxburgh (dsogl.), Royle, Scheffer (Java), Sonnerat (Ostind.), Steetz (Südas.), Sweet (dsogl.), Thwaites (Ceyl.), Valentini M. B. (Ind.), de Vriese (Ostind., Java), Wallich (Nepal etc.), Wendland jr. (Südas.), Wight (Ind.), Zollinger (ind. Archip.).
- d) **Ostasien mit Philippinen und Molukken:** Bentham (Hongkong), Blanco (Phil.), Bretschneider (China), Dozy (Japan), Fortune (Chiua, Japan), Hance (Hongkong), Kaempfer (Japan), Lehmann (Ostas.), Loureiro (Cochinchina), Maximowicz (Amurl.), Miquel (Japan etc.), Noronha (Phil.), Regel (Ussuri), Rumpf (Rumphius) (Mol.), Schmidt, F. (Amur), v. Siebold u. Zuccarini (Jap.), Sonnerat (China etc.), Suringar (Jap.), Thunberg (dsogl.), Zuccarini s. v. Siebold.
- e) **Indischer Ocean:** Balfour f. (Rodriguez), Bojer (Mauritius), Commer-son, Baker (Maurit. u. Seychellen), Duncan (Maurit.), Reichardt (Ins. St. Paul).

III. Afrika nebst Inseln:

Afzelius (Sierra Leone), Alpin (Ägypt. etc.), Bergius (Cap), Burmann (Cap), Burmann f., Delile (Ägypt.), Durieu (Algerien), Ecklon u. Zeyher (Cap), Forskål (Ägypt. etc.), Foureroy (dsogl.), Fresenius (Ägypten u. Abyssinien), Hieron (trop. Afr.), Hooker, W. J. (Niger), Kirk (Südafrika), Kolbe (Cap), Kotschy (Ägypten), Nylander (Alger), Oliver (trop. Afr.), Olivier (Ägypt.), Palisot de Beauvais (Oware u. Benin), Pappe (Cap), Petit-Thouars, Poiret (Berberei), Schmidt, J. A. (Capoverde), Schousboe (Marokko), Schrader (Cap),

Schubert (Ägypt. etc.), Schweinfurth (nub. Küste), Sonnerat (Guinea), Thunberg (Cap), Vesling (Ägypt.), Willemet (Marokko). — **Afrik. Inseln:** Baker (Seychellen), v. Buch (canar. Ins.), Carmichael (Tristan d'Acunha), Commerson (Madagaskar), Desfontaines (atl. Ozean), Lowe (Madeira), Lugo (Teneriffa), Petit-Thouars (afr. Ins.), Schmidt, J. A. (capoverd. Ins.), Seubert (Azoren).

IV. Amerika.

- a) **Südamerika:** Aublet (Guiana), Bancroft (dsgl.), Berg, O. (Bras.), Bonpland, Bosc, Colla (Chili), Feuillée (Peru, Chili), Fl. Peruviana v. Ruiz u. Pavon (do.), Gay Cl. (Chili), Gillies (do.), A. de St. Hilaire (Bras.), Hieronymus (Patagon.), Humboldt, Karsten, Leschenault, Lund (Bras.), Marcgrav (do.), Martius (do.), Michaux, Miers (Bras., Chili), Mikan (Bras.), Molina (Chili), Montagne (Bolivia, Guiana), Pöppig u. Endlicher (Chili), Pohl (Bras.), Raddi (do.), Ruiz u. Pavon (Peru, Chili), Schöpf, Schomburgk (Guiana), Spring (Bras.), Ulloa, Vandelli (Bras.), Wagoner (Venezuela).
- b) **Westindien u. Mittelamerika incl. Mexiko:** Amson, Bateman (Guatemala, Mex.), Bonpland, P. Browne (Jamaika), Desfontaines (atl. Ins.), Desportes (St. Domingo), Grisebach (Westind.), Hamilton (do.), Hartweg (Mex.), La Llave u. Lexarza (do.), Liebmann (do.), Humboldt, Bonpland u. Kunth (Mex. etc.), Plumier (Westind.), Sloane (Jamaika), Swartz (Westind.), Tussac (Antillen).
- c) **Nordamerika:** Amson, Arthur (Jowa), Barton (Virgin.), M. v. Bieberstein, Bigelow (Boston), Bosc, Catesby (Carolina), Clayton (Virg.), Desfontaines (atl. Ins.), Elliott (Carol.), Engelmann (Union), Asa Gray (Texas, Neu-Mex.), Gronovius (Virg.), Hampe, Harvey, Marschal, Medicus, Michaux, Mühlenberg, Nuttall, Pursh, Rafinesque, Richard, Robin u. Rafinesque (Louis.), Schöpf, Sullivant, Torrey u. Gray, Tuckermann, Ulloa, Walter (Carol.), Webb.

V. Australien und Südsee:

- R. Brown (Neuholl.), Dieffenbach (Neuseel.), Forster (Australoz.), Gris mit Brongniart (Neucaled.), Hombron u. Jacquinet (Südsee-Ins.), Hooker, J. D. (Neuseel.), Kny (Australozean), Labillardier (Neuh. u. Neucal.), Leschenault (Neuh.), Lindsay (Neuseel.), F. v. Müller (Austr. u. Papualand), Seemann (Fidschi-Ins.), Sonder (trop. Austr.).

c. Spezialbotanik oder botanische Monographien, Dissertationen und andere Spezialschriften nach dem Inhalt alphabetisch geordnet.¹⁾

Acanthaceae, Ceylon-, Anderson.
 Acanthion u. Acanthus terms, Yates.
 Acerum Revisio, Spach.
 Achilleis, de -, Meckel u. Willdenow (1789).
 Achlya prolifera, Pringsheim.

Aconiti generis Monogr., Reichenbach.
 Aconito, de - observ., Koelle.
 Aconitum, Seringe.
 Aconitum, Esquisse d'une Monogr. du genre - (sans nom).

1) Das Nähere siehe in dem Autorenverzeichnis.

- Actinea**, Jussieu.
Adventivknospen, Magnus u. A. Braun.
Aegagropila Sauteri, Lorenz.
Agaricorum Monogr., Persoon, — (nach d. Lamellen geordn.), Otto, J. G. (1816).
Agave americana, Vogel, — (notes on -), Engelmann, G. (St. Louis 1875).
Agave et Fourcroya, Zuccarini.
Agaven-Studien, Koch, K.
Agrikulturpflanzen, Ernährung der -, Walz.
Agrostographiae fundamentum, Trinius.
Agrostographie du Nord de la France, Desmazières.
Agrostogr., essai de nouv. -, Palisot-Beauvais.
Agrostographia Helvet., Scheuchzer.
Agrostologie helvet., Gaudin.
Akazie, Cultur der -, J. G. Hess.
Algae britann., Grew.
Algae brit., fresh-water -, Hassall, — Cooke, M. C. (Lond., 13^o kol. T.).
Algae japonicae, Suringar.
Algae ochotenses, Ruprecht.
Algarum species, Kützing (Lips. 1849).
Algarum Sueciae Dispos., Agardh.
Algarum Synopsis, Zanardini.
Algarum unicellarum g. n., A. Braun.
Alge, eine neue parasitische, J. Kühn (Halle 1879).
Algen, über einzellige -, Nägeli, — Neill, (Befr., Vermehr. etc. vieles) Pringsheim.
Algen Deutschlands, Rabenhorst (Kryptog.-Flora, Lpz. 1844—53).
Algen v. Deutschland, Römer, F. A.
Algen, die - des süßen Wassers, Nees sr. (Hamb. 1814).
Algen, die - in Plantae Ecklonianae, Rudolphi.
Algen, die - des trop. Australiens, Sonder.
Algen, mikroskopische -, Cohn, F. (viele Schriften).
Algenflora v. Württemberg, Kirchner, O. (1880).
Algenkunde, Beitr. zur -, v. Suhr.
Algensysteme, neuere -, Nägeli.
- Algentypen** der Flechtengonidien, Schwendener.
Alge italiche e dalmatiche, Meneghini.
Algologia adriatica, Naccari.
Algologiam etc. (Contributiones ad -) Reinsch (1875).
Algologische Mittheilungen, A. Schenk (1857).
Algues, Brébisson, — (Physiol. des -) Derbès u. Solier.
Allii species, Treviranus.
Aloë, amerikanische -, Major (Schlesw. 1668).
Aloës et Mesembryanthemi Mon., Salm-Dyck.
Aloldarium, Munting.
Aloide, de -, de Bergen.
Alpenflora, Atlas der -, Hartinger Ant. (Wien, I—XXVII).
Alpenflora des Libanon, Kotschy.
Alsodeiarum Ill. et Descr., Oudemans.
Amarantorum Hist., Willdenow.
Amaryllideen, Herbert.
Ammoniacum et Asa foetida, Borszczow.
Amazonenpalmen, Spruce.
Anabasearum Revisio, Bunge.
Anacardiées, Payer.
Ananascultur, Gontois.
Anaphytose (Pflanz.-Verjüngung), Schultz, C. H. (Berl. 1843).
Anatomie d. Pfl. (gekr. Preisschr.) Rudolphi, — Grundzüge der -, Kieser.
Anatomy of plants, Grew.
Anatomie u. Physiologie d. Pfl., Schacht, — Unger (1855).
Andropogonearum Mon. (Anthistirieae), Andersson.
Anemonearum Revisio, Pritzel.
Anémones, s. q. nouv. esp. des -, Jussieu.
Angio- u. **Gymnospermen**, Strasburger.
Anonacées, Dunal.
Antholysi, de -, Engelmann, G. (Francof. 1832).
Anthospermeae, Cruse.
Antirrhineae (Mon.), Chavannes.
Antrocephalus (Lebermoos), Lehmann.
Araceae (Monogr.), Engler.
Armeriae, de gen. -, Ebel, W. (Königsb. 1840).

- Aroideen**, Schott, — Petri, Fr. (Berol. 1863).
- Arbres et arbrisseaux**, Desfontaines.
- Arbres fruitiers**, Petit-Thouars.
- Arboriculture fruitière**, Pynaert.
- Arnicae vires**, Collin.
- Artemisia glomerata**, Batka.
- Artemisiarum Mon.**, de Besser.
- Artemisiis**, de -, Stechmann.
- Artischoke**, Brückmann.
- Arzneimittellehre** (Lehrb.); Buchheim, R. (Lpz. 1859), — (Grundzüge der -), Binz (3. A., 1879).
- Arzneigewächse**, Hayne.
- Arzneikräuter-Wiss.** (2. A., 1770), Schäffer.
- Arzney- u. techn.-wicht. Pfl. geschl.**, Berg, O. (Berlin 1845).
- Asa foetida et Ammoniacum**, Borszczow.
- Asaro**, de -, Scheffler.
- Ascomyceten**, Bauke (1877).
- Asperifoliae nuciferae**, Lehmann.
- Astragalorum Spec.**, Pallas.
- Astrantia** (Mon.), Stur.
- Atropa Belladonna**, Thunberg u. Lindbohm.
- Aufstufung**, wirthsch. Bedeut. der -, Uhlig, C. (Dresd. 1875).
- Aurikel**, Gesch. der -, Kerner.
- Avellana Mexic.**, Spies u. Brückmann.
- Azolla**, Strasburger.
- Azolla nilotica**, Decaisne u. Mettenius.
- Azollen**, Beitr. z. Kenntn. der -, Meyen.
- Balanophoren**, zur Kenntn. der -, Göppert.
- Balanophorae javanicae**, Junghuhn.
- Balanophoreae**, O. Beccari.
- Balsaminearum**, de floribus etc. -, Roeper (1830).
- Balsamum de Mecca**, Nicolai.
- Bambuseae**, Ruprecht (1839).
- Bastardbefruchtung**, Wichura, — F. v. Gärtner.
- Bastarderzeugung**, Wiegmann, — F. v. Gärtner (1849).
- Batis maritima** L., Torrey.
- Batrachium**, Rossmann.
- Baumfarne**, Wagener.
- Baumpflanzung in d. Städten**, Finetmann, L. (Bresl. 1877).
- Baumschnitt** (Darstellung), Lucas (1879).
- Baumschule**, die -, H. Jäger (1868).
- Baumzucht**, Harbke'sche wilde -, du Roi (1795—1800), neu v. Pott (1874).
- Bäume Mecklenburgs**, Becker, H. Fr.
- Bäume. unsere - und Sträucher**, B. Plüss (1884).
- Beaufortia et Regelia**, Schauer.
- Beerenobst d. Gärten**, Maurer (1867).
- Befruchtung etc.**, Treviranus (1844).
- Befruchtungslehre**, Corda.
- Befruchtungsorgane**, v. Gärtner.
- Befruchtungstheorie**, Hartig.
- Befruchtung durch Insekten**, Sprengel, — H. Müller.
- Begoniaceen**, Klotzsch.
- Begoniaceés**, Mem. sur la fam. d. -, de Candolle, A.
- Bepflanzung d. Strassen etc.**, Jablanzky (Wien 1879).
- Betulacearum Mon.**, Regel.
- Bicornes**, Klotzsch.
- Bienenflora**, Alefeld (1863).
- Bignoniaceae surinam.**, Splitgerber.
- Biologie**, allgem., d. Pfl., Agardh, C. A. (1832), — (Beitr. z.), Cohn, F. (Br. 1875—85).
- Birkenfamilie in Italien**, Schouw.
- Birnen-Classification**, Jahn.
- Blattpflanzen**, Dippel.
- Blattstellung** (Wechsel etc.), Schwendener (1879—83).
- Blätterschwämme** (Eintheil.), Tode.
- Blaugummibaum**, v. Hamen (1876).
- Blumengärtner**, praktischer (4. A.), Gruner, — Förster, C. F.
- Blumengärtnerei**, Bosse.
- Blumenstudien**, Reichel.
- Blumenzucht in ihr. ganzen Umfange**, Bouché.
- Blumenzwiebelgärtner**, Neuen-
- Blütenanalyse**, Wydler. [hahn.
- Bohnen** (Garten-), Martens.
- Boletus suaveolens**, Enslin.
- Boopis** et Acicarpha, Jussieu.
- Borbonia**, Thunberg u. v. Hartmann.
- Boswellia**-Arten (Entd.), Carter.
- Boswellia**, Colebrooke.
- Botrychiorum Mon.**, Milde, J. (Vindob. 1869).
- Botrydium**, ein neues -, Kützing.
- Bouvardia**, Schlechtendal.
- Brandpilze**, Rostrup, — de Bary (Berl. 1853).

- Brand-**, Rost- und Mehlthauptilze um Wien, Voss, W. (1876).
- Braya**, Sternberg u. Hoppe.
- Briologia italiana**, de Notaris.
- Brombeersträucher**, deutsche -, Weihe u. Nees v. Esenb.
— Mecklenburgs, Betsche.
- Brotbaum**, ostind. -, Panzer.
- Brunia**, Thunberg u. Nyblaeus.
- Bryologia Algarviae**, Solms-Laubach, Gr. v.
— britannica, Wilson.
— europaea, Bruch u. Schimper.
— germanica, Nees, Hornschuch u. Sturm (Nürnb. 1823—31).
— mosquensis (Florula), Fischer v. Waldheim.
— silesiaca, Milde, J. (Lpz. 1869).
— universalis, Bridel-Brideri.
- Bryologie**, skandinavische -, Berggren.
- Bryologische Notizen aus d. Rhön**, Geheeb (1870—71).
- Bryoniae albae, de radice** -, Schwägrichen und Trautmann.
- Bryophyllum calycinum**, Berge, H. (1876).
- Butyrospermum**, Kotschy.
- Büttneraceés**, J. Gay.
- Büttneriarum in Nova-Hollandia** Mon., Steetz.
- Buxbaumia** (Blasia, Jungermannia), de -, Schmidel.
- Bysorum et Fungorum Ill.**, Cherler.
- Cacao** u. Chokolade, Mitscherlich.
- Cactaeae in horto Dyckensi**, Salm-Dyck.
- Cactearum Enumeratio**, Pfeiffer.
- Cactearum Genera**, Miquel.
- Cacteen**, Anatomie der -, Harting, — Schleiden.
— Bearb. der -, Scheidweiler.
- Cactées et Berbérinées** (Organogénie), Payer.
- Café, du** -, Chevallier (1862).
- Café, de** - (chocolateae, herbae theae ac nicotianae natura), Meisner, 1721.
- Caínea** (Chiococca), Langsdorff.
- Calamites**, Ettinghausen.
- Calendula officinalis**, Geiger.
- Calligoneae arabo-caspicae**, Borszczow.
- Calothamnus**, Schauer.
- Calycanthus**, Stammbildung des -, Woronin.
- Cambium** u. Dickenwachsth., Schumann, C. (1873).
- Camellia et Thea**, Synops., Seemann (1859).
- Camellien**, üb. -, Berlièze (Berlin 1838).
- Camphrier**, sur le -, Vriese.
- Canne à sucre**, Payen.
- Cantua**, Jussieu.
- Caoutschouk** u. Sassaparille, Royle.
- Capparideae, Calycereae etc.**, Walpers.
- Capsici**, Mon. gen. -, Fingerhuth (1832).
- Cardamine parviflora**, Wrangel.
- Carica Papaya**, Wittmack.
- Caricologia**, Willdenow.
- Caricologia germanica**, Hoppe.
- Caricologiae Symbolae**, Drejer (Lips. 1844).
- Caricum distigmat.** Synopsis, Fries.
- Carex Hist. d. - Schkuhr**, de la Caruivorous plants, Beal. [Vigne.
- Carpologia**, Gärtner.
- Casses et Sénéés**, Colladon.
- Cassia Filipendula**, de Candolle.
- Cassiengruppe Senna**, Batka (Prag 1873).
- Cassiniaceen**, Schultz-Bipontinus.
- Castanea vesca s. vulgaris**, Haynald, J. L.
- Casuarineen**, Miquel.
- Casuarinis**, de -, Stache.
- Catalpa**, über -, Bolle, C.
- Catechino**, de -, Zwenger.
- Cedri mont. Libani etc.**, Trew.
- Cerastien**, drei -, Stein, B. (1878).
- Ceratophylleae**, Schleiden.
- Céréales de la Suisse**, Mon., Seringe (Bern 1818).
- Cerealien**, europäische, Metzger.
- Cerealium characteres**, Schübler.
- Chaerophyllum bulbosum**, Londez, — nitidum, Ascherson.
- Chamaelauciae**, Schauer (Vratisl. 1841).
- Chamaerops excelsa**, Gay.
- Champignons**, Palisot, Tulasne, — (böhm.), v. Leonhardi (1863).
— comestibles, Dufour, — (Hist. d. com. et vénén.), Roques.
— hypogées, Tulasne, — (aus Columbien etc.), A. Braun (1858).
— Icones et Classific. d. -, Leveillé,

- Champignons**, de la France, Bulliard.
 — quelq. esp. de l'Amér., Bosc.
- Characeen**, europ. -, Sydow, — die, Afrikas, A. Braun (1868).
- Charen** (Befrucht.), de Bary (1871), — (Keimung), de Bary (1875).
- Chênes de l'Amérique**, Michaux.
 — de l'Amér. tropic., Liebmann.
 — de France, Bosc.
- Chenopodearum** Mon., Moquier-Tandon.
- China**, della arbore -, Turra.
China officinalis, Schwalbe.
- Chinabäume**, Weddell.
- Chinarinde**, chem. Unters. der -, Cothenius.
- Chinin** u. Chinarinden, Binz, C. (1880).
- Chionyphe**, Thienemann.
- Chloranthaceae**, Miquel.
- Chloris protogaea**, Unger.
- Chlorophyll** (Entsteh.), Wiesner, — Böhm, J. A. (1857), — Mikosch, — Haberlandt, — (Untersuch.), Pringsheim (1876—81).
- Chlorophylle** (Réch. microsc. s. l.), Gris, A. (1857).
- Chocolata inda**, Norimb. 1644, Colmenerus, A., — Ledesma.
- Chocolatae de potu**, Linné u. Hoffmann.
- Chrysanthemum indicum**, Rupprecht.
- Cichoriacearum** Palatin. Anales, Schultz-Bipontinus.
- Cichoreis**, de -, Gochnat.
- Cienta aquatica**, Wepfer.
- Cienta virosa**, de -, Thomé.
- Cienkowskia**, Baillon.
- Cinchona**, Weddell.
- Cinchonae** Mon. Tent., Rohde, — (Mon. d. Gatt.), Kuntze (Lpz. 1878).
- Cirsien** der Schweiz, Nägeli.
- Cistacearum** Consp. Mon., Spach (1836), — (Organogr.), Spach (1837).
- Cistinées**, St. Hilaire.
- Cladonia**, Dufour.
- Cladoniis**, de -, Floerke.
- Claytonia cubensis**, Bonpland.
- Clusiaceae**, Baillon, — (Hyperic. etc.), Müller, K. (1882).
- Coenogonium Linkii**, Schwendener.
- Coffea**, de -, Georgii, — Abendroth, — Marcus.
- Colocasia odora** etc. (note s. l.), Brongniart.
- Commelinaceae indicae**, Hasscarl.
- Compositae Australiae**, Steetz.
- Compositarum** Synops., Lessing.
- Confervae britann.**, Dillwyn.
- Conferves d'eau douce**, Vaucher.
- Coniferae**, Traité gén., Carrière.
- Coniferarum** Synops., Endlicher (Sangalli 1847).
- Coniferen**, Antoine, Fr. (Wien 1840, 54 T.).
- Coniferen**, Cycadeen etc. (Commentar), Richard.
- Coniferen**, Hochstetter u. Henckel. — Strasburger, — Fam. der -, Courtin (Stuttg. 1858). — (geograph. Verbreit.), Beinling (Bresl. 1858). — (männl. Blüte), Zeile. — (Morphologie), Zuccarini. — einige, des cilicischen Taurus, Antoine u. Kotschy. — fossile, Goepfert.
- Coniferenblätter**, Berthold (Bresl. 1875).
- Conifères** (Pinetum), Gordon. — resin., Cult. forest., Gihoul.
- Coniferis**, de -, v. Tschudi. — de - et pice conficienda, Axt.
- Corallines**, s. les -, Trevisan.
- Corchoro**, de -, Wedel.
- Coton**, cult. d. -, Aubry le Comte.
- Cranberry** (Oxycoccus), Webb.
- Crassulacées**, de Candolle.
- Crataegus et Mespilus**, Koch, K. (1854).
- Crotonis** Monogr., Geiseler.
- Cruciformium** Classis, Crantz.
- Cruikshanksia**, Miers.
- Cryptogamae aquaticae**, Wulfen.
- Cryptogamae britann.**, Dickson.
- Cryptogamae guianenses**, Montagne. — italicae, Bertolini. — Trans-Caucasicae, Nordmann. — vasculares Ligusticae, Genari.
- Cryptogamarum** botanice, Payer. — german. Flora, Wallroth.
- Cryptogamia**, Schrader.
- Cryptolepis**, Falconer.
- Cucurbitacées**, Naudin, — (la vrille d. -), Chatin, A. (1866). — nouvelles, Cogniaux, — (s. la constit. de l'androcée etc.), Bailon, L. (1873).

- Cuscutae** genus, Engelmann, G.
Cycadearum Monogr., Miquel (Trajecti 1842).
Cycadeen nymejanske, Samm.
Cycadées, de pl. -, Lehmann.
Cynanchum, Thunberg u. Almer.
Cynarocephalorum Syn., Lessing.
Cynoglossa, de -, Schreck.
Cyperacearum Collectio, Lager u. Reuter.
Cyperaceen, Nees v. Esenbeck (Zeichn. dazu, Putterlick).
Cyperacées de Mex., Liebmann.
Cypero esculento, de -, Preuschen.
Cyperographia synoptica, Kunth.
Cyperus, Fenzl.
Cyrtandraceae, Jack, W.
Czackia, Andrzejowsky.
- Dahlia**, sur la cult. de -, Thouin.
Damenbotanik, Boitard, — Reichenbach, A. L., — Lindley, J.
Daphne, Thunberg u. Wickstroem.
Darlingtonia californ., Torrey J. (Washingt. 1853).
Dattelpalme, Pollen der -, Fourcroy.
 — (Wachstum), Daubenton.
Dattier, le -, Delchevalerie (Gand, 1873).
Degenerieren d. Obstsorten, Knight.
Delphinis, quibusd. addit. Aconito, de -, Reichenbach.
Dendrologie, Aldrovandi, — Koch, K.
 — britische, Watson.
 — deutsche, Lauche.
 — Russlands, Regel.
Desmidiacées italiche, de Notaris.
Desmidiearum Syn., Meneghini.
Diagramme der Rhoeadineen, Schmitz, Fr. (Halle 1878).
Diatomaceae danicae, Heiberg.
Diatomacearum brit. Syn., Smith, W.
 — Synops., Kützing.
 — (Conjug.), Thwaites.
Diatomaceen, Pfitzer, — (Bau u. Nat.), Weiss, A. (1871), — pelagische d. Ostsee, Engler (1883).
Dichlamydeae plantae, G. Don.
Dickenwachstum d. Holzkörpers, Kny, L. (1882), — d. Stengels, Nägeli, C. (1864).
 — u. Cambium, Schumann (1873).
Dionaea (Monogr.), Ellis.
- Dionaea muscipula** (elektr. Beweg.), Munk.
 — (Notice s. l. g.) Dumortier (1837).
 — (some experim.), Balfour f.
Dioscorea batatas, Decaisne.
Diplolaena, Desfontaines.
Dipsacées, Coulter.
Disporum gen., D. Don.
Dracaena, Thunberg u. Dalman, — Berthelot.
Drachenbäume (Wachstum), Wosidlo, — (im Allgem.), Koch, K. (1855).
Dracunculis, de -, Besser, W. S.
Drosera (Tentakeln), Darwin, Fr.
Droseracées, St. Hilaire.
- Echites**, Thunberg u. Hast.
écorce, l', Vesque.
Edgeworthia, Falconer.
Elatinearum Mon., Seubert.
Elektromotor. Wirkung an Pfl., Kunkel.
Embryonen monocotyl. -, Solms-Laubach.
Ephen-Luftwurzeln, Schuch.
Epidermis-Funktionen, Desrousseaux.
Epilobium, Mon. d. Gatt., Haussknecht, C. (Jena 1884).
Equisetaceen, Duval-Fouve.
 — (Schutzscheide), Pfitzer.
Equiseten (Monogr.), Milde (Dresd. 1867).
Equisetenzellen, Holzzellen etc., Sanio.
Equisetum, Wickstroem.
Erdäpfel (Abh.), Ludwig, J. A. J.
Erdbeerentreiberei, Gontois.
Erfrieren der Obstbäume, Oberdieck.
Ergot of t. Rye, Quekett.
Ericarum Icones et Descr., Wendland.
Eriocaulacearum Monogr., Körnicke.
Eriocaulon du Bresil (Mon.), Bonnard.
Ernährung d. Pfl., Schmacher.
Erysimum, Gay, J.
Essbare Schwämme, unsre -, Medicus W.
Essb. u. schädliche Schwämme in Abbild., Krombholz.
Eucomium rosae, Strauss.
Euphorbiacearum genera, Jussieu, A. de.

Euphorbium Enumeratio, Roeper.
— Pharmacographia, Landsberg.

Faëce cerevisiae, de -, Bail.

Farbverhältnisse d. Blüten, Schüb-
ler (1833).

Färbepflanzen, Vogler.

Farne, Deutschlands-, Waldner.

— fossile -, Goepfert.

— Lebermoose u. Algen, Nees v.
Esenbeck sr.

— Pflanzengr. der -, Luerssen
(Berl. 1874).

Farnflora von Chili, Sturm, J. W.

Farnkräuter, Kultur der -, Courtin,
— Plaschnik, — (in kol. Abb.),
Kunze, G. (1849—51).

— (Entwickl.-Gesch.), Leszczy-
Suminski, — Kny.

— (Wesen der -), Kaulfuss, —
(Cultur u. Wachstum), Sadebeck
(1877).

— (Wachstum u. Bau), Stenzel
(1859—61).

Farsetia (Mon.), Fournier.

Fasergewebe des Leins, Hanfs etc.,
Reissek (1852).

Fenster- u. Zimmergarten, Bouché.

Ferns, british, Newmann, — brit.
and exotic., Lowe.

— of Derbyshire, Howe.

— of Great-Britain, Sowerby u.
Johnson.

Ferulaceen der caspischen Wüste,
Borszczow.

Fettpflanzen, Säurebildg. d. -, de
Vries (1884).

Ficoidées et Cactées, Payer.

Ficus, Thunberg u. Gedner.

Fieberheilbaum, v. Hamm (1876).

Fieberrinde (Abh.), Säm-Dyck.

Filices brasilienses, Raddi.

— britann., Bolton.

— Deckenianae, Kuhn, M. (Lps.
1867).

— javan. Horti Bogot., Hasscarl.

— jenenses, Dietrich, D.

— Lechnerianae Chil. et Peruv.,
Mettenius, G. (Lpz. 1856—58).

— verae Hungariae etc., Sadler.

— Musci frondosi et hepatici, Weber
u. Mohr (1807).

Filicetum americ., Plumier.

Filicium Afric. austr. Syn., Pappe
u. Rawson.

— berolinens. Syn., Strepel.

Filicium Enumeratio, Kaulfuss.

— Icones, Hooker u. Greville (Lond.
1831).

— semina, Wolff.

— Synopsis, Hooker f.

Flachsbau, der -, Giersberg (Lpz.
1877).

Flechten, Meyer, G. F. (Entwickl.,
Metamorph. u. Fortpfl.).

— Normann, — d. Grossh.'s Hes-
sen, Friedrich, C. (Riga 1878).

— u. fossile Pfl., Massalongho.

— Geschichte der -, Wallroth.

— Europa's (getrockn.), Hepp.

— morphol. Grundr. d. Fam. d. -,
Montagne.

— der Wetterau, Theobald.

— (Plaudereien), Stitzenberger.

— (als Parasiten der Algen), Krem-
pelhuber

— Gesch. u. Liter. d. -, Krempel-
huber.

— von Nordamerika, Tuckermann.

Flechten-Theorie (Abwehr der
Schwendener'schen) Körber (1874).

Flechten-Gonidien, Bornet u. Thu-
ret.

Flechtensystematik, Stitzenberger.

Fleischfressende Pflanzen, Rees u.
Will, — Pfeffer, W. (1877).

Fleurs, fruits et feuillages choisis
de l'île de Java (Abb.), Bertha
Hoola van Nooten.

Flora medica, Chiaie.

Florideen-Befruchtung, Bornet u.
Thuret.

— (Befr., Unters. üb.) Schmitz, Fr.
(Berl. 1883).

Flower-Garden, Lindley.

Forest-Flora of British-Burma,
Kurz, S.

Forest-trees, Torrey-Bigelow.

Forstbotanik, Bechstein, — Reum,
— Seutter.

— beschreibende -, Behlen, —
Hessens, Borkhausen.

Forstbotanische Beiträge, Will-
komm.

Forstflora von Deutschl. u. Öster-
reich, Willkomm.

Forstl. Culturpfl. Deutschl. (Natg.),
Hartig, Th. (1851).

Forsttechnologie, Völker.

Forstmänner, Bot. f., Doebner
(Aschaff. 1853).

Fortpflanzungsorgane d. Crypto-
gamen, Wurm, F.

- Fossile Pflanzen** (Synopsis), Unger.
 — Pfl. von Dalmatien, Visiani.
 — (Herbarium diluvianum), Scheuchzer.
 — (végét. fossiles, prodrome d'une hist. d. -), Brongniart.
Fougères de l'Amérique, Plumier
 — sur la fam. des -, Fée.
Fraisiers, hist. d. -, Duchesne.
Frankeniacees, St. Hilaire.
Frauenzimmer, Bot. für -, Batsch,
 — Rousseau, J. J.
Fraxinellae, pl. fam. -, Nees u. Martius.
Froments (Catal. meth.), Vilmorin.
Fruchtbäume u. Sträucher, Dochnahl.
Fruchtbaunzucht (Handb. d. -), Hirschfeld.
Frühlingsblumen (Abb.), Aglaja v. Enders.
Fruit-culturist, small -, Fuller.
Fruit-Flower- and Kitchen-garden, Neill.
Fruit-Manual, Hogg, R.
Fruitiers, arbres -, Petit-Thouars u. Luizet.
 — — culture forcée des -, Py-naert.
 — — Traité des -, Duhamel.
Fruits and Fruit-trees of America, Downing.
Fruit-trees (a treatise), Forsyth.
Fruits cultured (Catal.), Thomson.
Fuci brit., Goodenough, — (Syn.), Turner.
Fucoideae, Früchte der -, Link.
Fucorum Hist., Gmelin, F. G.
 — Icones, Esper.
Fucus, Diss. s. plus. espèces d. -, Lamouroux.
Fumaria, de -, Riecke.
Fumariaceen, Crucifer. etc., Eichler (1865).
Fungli mangerecci, Vittadini, — Agrumicoli, Penzig (Padova 1882).
Fungi novi fennici, Karsten.
 — venenati, Ascherson.
Fungis, de -, Seyffert.
Fungorum agri Arimin. Hist., Battarra.
 — Bavariae etc. Icones, Schäffer.
 — Elenchus, Batsch, — Fries.
 — Icones, Corda-Zobel.
 — Index, Hoffmann, H.
 in Suecia Syn., Lindblad.
 — Methodus, Gleditsch.
Fungorum Nassov. Enum., Fockel.
 — Synopsis, Persoon.
 — et Byssorum Illustr., Chevalier.
Fungusses, british -, Bolton-Willdenow.
Futter- u. Wiesengräser, d. wicht. -, Schmidlin-Schüle.
Gardner's Magazine, Loudon.
Gartenbau-Lexikon, illustriertes -, Rümpler.
Gartenbau, der -(Ausstellungsber.), Fenzl (Wien 1874).
Gartenbotanik, Bouché.
Gärten, bot. (ihre Aufgabe etc.), Kerner, A. (1874), — (u. deren Verwalt.), Schauer, C. (1833).
Gartenbohnen (Monogr.), Martens.
Gartenbuch, allgem. -, Regel u. Ender, — (deutsches), Walter (3. A., Stuttgart 1820).
Gartenbuch, Metzger, — Ritter, J. A. (1850).
 — für Damen, Jühlke.
Gartenfreund, Wredow (G. A. Gärdt u. Neide, Berl. 1859).
Gartenkunde, Handb. der -, Lerz.
Gartenkunst, Siebeck, — der ital. Renaissance-Zeit, Tuckermann (1884).
 — Theorie der -, Hirschfeld.
Gartepflanzen (Bestimmen der -), Berger, E. (1855).
Gährungspilze, Pasteur.
 — u. Seidenraupenpilz, Béchamp.
Gasteromyceetes (et Hymeno-), Weinmann.
Gentiana, de - libellus, Frölich (1796).
Gentianae fauce de (barbatae), Nees u. Prinz Max v. Wied.
Gentianearum, fam. de char. -, Grisebach (Berl. 1836).
 — genera et spp., Grisebach.
Gefäßbildung d. Farne, Reichardt.
Gefäßskryptogameu, Hofmeister, — Sadebeck, R.
 — Westphalens, Berthold, — der Schweiz, Bernoulli (1857).
Gefäßpfl. d. bot. Gart. zu Salzburg, Aberle (Wien, I, 1877).
Generationswechsel d. Pfl., Celakowski (1874).
Georginen, Gerhard.
 — (Nelken u. Hortensien), Gluthorst.

- Geometr.** Anordn. d. Blätt. u. Blü-
tenst., Bravais, L. u. A. (deutsch
von Walpers, Bresl. 1839).
- Gemüsegärtner**, der, H. Jäger (1871).
- Geraniaceae**, Sweet.
- Geraniis**, de - (Specimen bot.),
Burm.
- Geraniologia**, l'Héritier.
- Geraniums** (Mon.), Andrews.
- Geschlecht d. Pfl.**, Lehre von d. -,
Treviranus.
- Gesneraceae**, Hanstein.
- Getreidearten** (Abbild. u. Beschr.),
Krause.
— (Cerealien), Metzger.
- Getreide** (Culturen mit nordischem),
Wittmack (1876).
- Gewächse für Handel u. Industrie**,
Eichelberg.
- Gewächshauspflanzen** (Verzeich-
niss), Ventenat.
- Giftgewächse**, deutsche, Brandt u.
Ratzeburg.
— (Pinakothek), Schenk u. Gün-
ther.
— Deutschlands, Brandt, Phoebus
u. Ratzeburg.
— — Winckler, Emil.
— einheimische (u. essb. Schwäm-
me), Mayer, J. C. A.
- Giftgräser** (intoxicating grasses),
Hance.
- Giftige u. essbare Schwämme**, Ker-
ner, J. S.
- Giftpflanzen** Deutschl.'s, Gressler.
— (Abbild. u. Beschr. v. 48 Ar-
ten), Juch.
— von Neufchatel, Godet.
— der Schweiz, Hegetschweiler.
— die wichtigsten d. deutschen -,
Buhle.
- Giftpflanzenbuch**, Berge u. Riecke.
- Giftpilze** Schlesiens, die -, Schum-
mel.
- Gladiolus**, notice sur le -, Niccles,
— (europ. Arten), Dietrich (Ber-
lin 1832).
- Globulariées**, Willkomm.
- Glumacearum** Synops., Steudel.
- Gnetaceen**, Strasburger.
- Goethea**, Nees v. Esenbeck u. Mar-
tius.
- Goodenovieae**, Vriese, — R.
Brown, Hooker u. Lindley.
- Granina** brit., Knapp.
— austral. (Icones), Host.
- Gramineae**, Nees v. Esenbeck sr.
u. Fr. Nees.
- Graminearum Africae australioris**
Mon. ill., Nees v. Esenbeck.
- Graminées belges**, Dumortier.
- Gramineen**, Duval-Jouve, — (Blü-
tenbau), Cruse, W., — (Nerva-
tion), v. Ettinghausen (1865), —
(Bestäubung), Hildebrand, F.
(1872).
- Gramineus** Hort. Woburnensis -,
Sinclair.
- Graminum** Descr., Koeler.
— nn. gg., Linné f.
— spp., Trinius.
- Graphidées**, Hist. de -, Chevalier.
- Gräser**, Fluegge, — belg., Hall,
— deutsche, Weihe.
— (Beschr. u. Abbild.), Schreber,
— europ., Woods.
- Grasses**, the - of Great-Britain,
Sowerby u. Johnson.
—, the - of Scotland, Parnell, — of
Britain, ders.
- Gräsergattung**, Revision der -,
Panzer.
- Gras-** u. Kleesamen, Wittmack
(Berl. 1873).
- Griffel** u. Narbe (anatom. Bau),
Behrens (Göttingen 1875).
- Grosselliers**, Hist. des -, Thory.
- Grossulariæ**, Berlandier.
- Grossulariarum** Revisio, Spach.
- Harzpflanzen** (végétaux résineux),
Duplessy.
- Haselstrauch**, Palandt.
- Hausgarten**, der -, H. Jäger (2. A.,
1885).
— der - auf dem Lande, Heinrich.
- Hausgärtner**, der, illustr., J. Hart-
wig (10. A., 1885).
- Haushalt** d. Pfl., Cohn.
- Hausschwamm**, Bourwieg.
- Hédéracées** etc., notice s. l., Mar-
chal, E. (Brux. 1880).
- Hedysari** spp. (Mon.), Basiner.
- Hefe**, Brefeld, — (Morph. u. Bio-
log.), Schumacher (Wien 1874).
- Heiden**, Waitz.
- Heiden-** u. Wiesenvegetation, Drude
u. Wendland.
- Heliophüleen**, Revision der -, Son-
der.
- Heliotropiorum** Mon., Lehmann.
- Helleborus niger**, Schobinger.

- Hemerocallis**, Schlechtendal.
Hepaticae Europae etc., Jack, J. B. (1877).
Hepaticarum Evol. hist., Kny. — Synopsis, Gottsche, Lindenberg u. Nees.
Hepaticorum muscor. Hist. Prodr., Schwägrichen.
Hepaticologia germ., Hübener (Mannh. 1834).
Herbar schlesisch. Pilze, Schneider, W. G.
Hermannia, Thunberg u. Daudenelle.
Hesperiden Nürnbergs etc., Volckamer.
Hesperides, Ferrari.
Hieracien der Schweiz, Christener.
Hieraciorum Symbolae, Fries.
Hieracium, Frölich.
Hierobotanicon, Celsius.
Himbeeren, Myatt.
Hippocastani Revisio, Spach.
Hirsen-Bestandtheile, Jenisch.
Höhere Sporenpfl., Farne etc., Milde.
Holzarten d. mittleren u. nördl. Deutschl. (Abb.), Krebs. — Gesch. d. vorzügl. (syst. Abh.), Burgsdorf. — indische, Brandis.
Holzpflanzen Österreichs, die -, Pokorny, — (Anat. u. Physiol. d. -), Hartig, Th. (1878).
Hopfenbau, Saher (1861).
Hornschuchia, Nees v. Esenbeck sr.
Hortipomologium (Gart.- u. Peltzbuch), Knab, Mich. u. Dümler.
Hortus gramineus, Sinclair.
Houttonyia et Saururus, Meyer, E. H. F.
Hoya carnosa, Tassi.
Hybridae pl. sponte nasc., Schiede.
Hydrillen, Caspary.
Hydrodyction, Biasoletto.
Hydrophytes d. l. Belgique, Morren.
Hydrophytologiae danic. Tentam., Lyngbye.
Hydropyrum, Münter.
Hymenomycetes Hung. (Icones), Schulzer.
Hymenomycetorum Hung. Icones, Kalchbrenner.
Hymeno- et Gasteromycetes, Weinmann.
Hymenophyllaceae, Presl. — Javanicae, Van den Bosch.
- Hymenophyllaceen**, Mettenius.
Hyphomyceten (zwei krit.), Loew.
Hypneen Tyrols, Heuffer.
Hypochoerideae, Schultz-Bipontinus.
- Jardin**, le - botan. d. l. faculté d. médec. de Paris, Baillon (1884).
Jardin fruitier, Noisette.
Indische Holzarten, Brandis.
Infusorien, Nitzsch.
Infusorienstaub, Ehrenberg.
Insectivorous plants, Ch. Darwin (London 1875).
Insektenfressende Pfl., Batalin, — Cohn, F., — Cramer, C. (Zürich 1877), — Stein, B.
Insektentödtende Pfl., Morren, Ed. (1875 u. 77).
Inulinvorkommen, Kraus.
Iride, de, Ekmann. — coltivate, Ré.
Iridearum genera, Bellenden-Ker. — Revis., Klatt. — Syst., Baker.
Iris indica sp., D. Don.
Juncaceen (Mon.), Laharpe, — (klein. Beitr.), Buchenau (1870). — am Cap, Mon., Buchenau (1875).
Juncus, de - (Mon. gen. Junci), Rostkovius (Berol. 1801).
Juncorum, Cyperor. et Gramin. Meth., Rajus.
Jungermannia, Endlicher.
Jungermanniarum Syllabus, Dumortier. — Synops., Eckart, — Herbarii Montagneani spp., Nees u. Montagne (1836).
Jungermanniographia etrusca, Raddi.
Juniperus americ., Engelmann.
- Kaffee** u. Kaffeebaum (gründl. Nachr. von -), La Roque.
Kartoffelkultur etc., Regel, E. (1865).
Kartoffelkrankheit, Harting, — Decken-Himmelreich (Ratibor 1855). — von 1845, Focke, — (Ursache etc.), de Bary (Lpz. 1861).
Kartoffeln (Monogr.), Putsche-Bertuch, — (Zersetz. durch Pilze), Reinke u. Berthold (1879).
Kartoffelpflanze, Schacht (1856), — Preiss, B. (1844).

- Keimen** etc. d. Pfl., Wolff, E., — Fleischer, — (Mono- u. Dicot.), Hanstein (1870).
- Keimung** v. *Triticum* u. *Secale*, Just, L. (1870).
- Kernobstsorten**, deutsche -, Diel.
- Kernpilze** Deutschlands, Nitschke.
- Kirschen-System** (Modifik.), v. Carlowitz.
- Klimmpflanzen**, Darwin, Ch.
- Kohlarten**, kultiv. - (syst. beschr.), Metzger, J.
- Konokarpodendron**, Brückmann.
- Korkeiche** (*Chêne liège*), C. de Candolle.
- Kork** u. verkorkte Gewebe, v. Höhnel, 1877.
- Korkkryptogamen**, Fée.
- Korkentwick.** auf Rinde, H. Mohl (1836).
- Krankheiten** der Kulturgew., Kühn. — der Waldbäume, Hartig, R.
- Kräuterkunde**, Vorles. über die -, Link.
- Krebs** d. Apfelbäume, Goethe, R. (Berl. 1877).
- Kresse**, Assimilation der -, Morgan.
- Kryptogamen**, A. Braun. — der belg. Flora, Westendorp. — Deutschl.'s, Bischoff, — Schkuhr, — O. Wünsche (Lpz. 1875). — des Fichtelgebirges, Funk. — der Göttinger Flora, Weis. — Führer in d. Reich der -, Wagner, H.
- Kryptogamen-Flora** Deutschlands, Rabenhorst, — von Schlesien, Cohn, F. (1877—79).
- Kryptogamen**, Millardet. — von Malmedy, Libert. — der Niederlande, Dozy. — des Taunus, Bayrthoffer.
- Kryptogamenk.** (Elementarcurs.), Helmert u. Rabenhorst (1828).
- Kryptog.** Gewächse v. Deutschl. u. der Schweiz, Bischoff (1828).
- Kryptogamische** Giftgew. Deutschlands, Phoebus.
- Krystalle** in Pflanzenzellen, Holzner (Münch. 1864).
- Küchergarten** in Böhmen, Mehler.
- Kulturpflanzen** (Ursprung), Goeze.
- Labiatarum** gg. et spp., Bentham, — Schreber.
- Labiatis**, de pl. -, Koch, W. D. J.
- Lactariorum** Sueciae Mon., Lindblad.
- Lamio** Plinii, de -, König, S. Fr.
- Landschaftsgärtnerei**, Petzold (Lpz. 1862).
- Landwirtschaftl.** Pflanzenkunde, Langenthal (Jena 1851—55). — Metzger.
- Landw.** Flora, Alefeld (1866).
- Lardizabaleae**, Decaisne.
- Lathraea**, Solms-Laubach, Gr. v.
- Laubhölzer**, die - Deutschlands im Winter, Willkomm (Dresd. 1859).
- Laubmoose** (Entwickl.), Cassebeer. — Lorentz, — neue, Dozy, — preuss., Ebel. — Nord- u. Mitteldeutschl.'s, Milde. — Westphalens, Müller, H. — d. österr. Küstenlande, Sendtner.
- Laurinarum** Syst., Nees v. Esenbeck sr.
- Lavandes**, Gingins.
- Lebermoose**, Leitgeb, — (Bemerk. üb.), Bischoff, G. W. (1835). — Farne u. Algen, Nees v. Esenbeck sr. — u. Flechten der Rinde Pao Pereira, v. Flotow. — Sassi, — (Naturg. d. europ. etc.), Nees v. Esenbeck sr. (1833—38). — (Oelkörper der -), Pfeffer, W. (1874).
- Lecidea**, v. Flotow.
- Leguminosae** capenses (Anim. crit.), Walpers.
- Leguminosarum**, de generibus -, Bentham, G.
- Leguminosen** (Blumenf.), Brown. — (Beitr.), Meyen u. Vogel, — Tulasne.
- Leguminosae**, la graine des -, Chalon, J. (1875).
- Libanon-Alpenflora**, Kotschy.
- Lichen** esculentus, Pallas u. Eversmann. — islandicus, Cramer u. Reisse, — Ebeling.
- Lichenen** Deutschlands, Floerke. — Schlesiens, v. Flotow.
- Lichenenflora** Bayerns, Krempelhuber. — von Würzburg, Hepp.
- Lichenes** arctoi, Fries f., — Meyen u. J. v. Flotow. — Americae septentr., Tuckermann. — Daniae, Rostrup, Deichmann u. Branth.

- Lichenes** Scand. et Novae-Caled., Nylander.
- Licheni** Bassanesi, Beltramini.
- Lichenographia** Europae reform., Fries.
- Galliae et Algeriae Prodr., Nylander.
- Lichenogr.** (Mémoires), Fée.
- Lichenologica** Parerga, Körber.
- Lichenologie** (d. neuer. Fortschr.), Bentzel-Sternau (1859).
- Lichenotheca** Venet., Trevisan.
- Lichens**, british -, Lindsay, — english -, Smith u. Sowerby. — History of the -, Delise.
- Lichenum** Eiffliae Florulae Tent., Bluff u. Fingerhuth.
- Enumer., Hoffmann, G. F.
- Germanor. Syst., Körber.
- Heidelb. Enum., Zwackh.
- Helvet. Spicilegium, Schärer.
- Histor. Tent., Hagen, — Luyken.
- Method., Acharius.
- Systema, Eschweiler.
- Licht** (rotes u. blaues, Wirk. auf d. Protoplasma), Luerssen.
- Lichtes**, die Wirk. des - auf Gew., Glocker (1820), — Pringsheim (1881), — auf eine Pfl., Schmidt, P. (1870).
- Liliacées**, Rédouté.
- Lilium** sarniense (Guernsey-Lilie), Berry.
- Lolium** temulentum, Roeper, J. (1873).
- Loniceren**, die - des russ. Reichs, Kirillow (Dorp. 1849).
- Loranthaceen**, Decaisne, — de Candolle.
- Luftwurzeln** d. Epheus, Schuch.
- Lupine**, weisse (Anbau der -), Wulffen.
- Lychnophora** Mart., Schultz-Bipontinus.
- Lycoperdineorum** Mon., Vittadini.
- Lycopodiaceés** (Mon.), Spring, — Strasburger (1873).
- Lythrum** Salicaria, Freyer.
- Macrozamia** Preissii, Heinzl.
- Mais**, vorl. Mitteil. üb. den -, Körnicke, Fr. (1872).
- Malpighiacées**, Mon., A. de Jussieu (1843).
- Malus** persica (Pflrsich), Ungnad.
- Mannae** excorticatio, Ledel.
- Marantearum** Mon., Körnicke, — (Morph. u. Syst.), Eichler (1884).
- Marattiacées**, de Vriese u. Harting (1851), — Jonkman (Utrecht 1879).
- Marchantia** polymorpha, Mirbel.
- Marchantieae**, Taylor.
- Marsilia**, Hanstein (1864), — u. Pilularia, A. Braun (1870—72).
- Maulbeerbaumzucht** u. Seidenraupe (aus d. Chines.), Stuttg. 1837, — Pathe (Berl. 1865).
- u. Seidenbau, Rammow (Berl. 1845).
- Maulwurfshügel-Flora**, Buchenau.
- Medicago**-Arten Linné's, die -, Urban, J. (1883), — (Keimung), Urban (1873).
- Medical** botany, Stephen u. Churchill, neu: Burnett.
- Flora of the United States, Rafinesque.
- Medizinische** Pflanzenkunde, Ximenez, — Zorn.
- Mediz.-ökon.-techn.** Gewächse (in Abbild.), Vietz, — Bischoff (1843 u. 47).
- -pharmazeut. Botanik (Handb.), Winckler, Ed., — Schleiden.
- — (Handb.), Luerssen.
- — Flora, Kosteletzky.
- Weer**-Botanik, Charla.
- Meeres**-Algen, Pringsheim, — Langenbach (1873).
- Melastoma** et Rhexia, Humboldt u. Bonpland.
- Melastomacearum** Mon., Naudin.
- Melastomaceen** (Bau), Vöchting.
- Melastomacées**, de Candolle.
- Melastomes** (Mon.), Bonpland.
- (the malayan spp.), Jack, W.
- Melocacti** gen. (Mon.), Miquel.
- Mémoires** lichenogr., Fée.
- Menschliche** Pflanzenparasiten, Küchenmeister.
- Mentharum** Rhenanarum Herbar., Wirtgen.
- Menyanthes** trifoliata, Thunberg u. Kjellmann.
- Meratia**, Punica et Calycanthus, Nees v. Esenbeck.
- Merkantile** Warenkunde, Zenker.
- Mesembryanthemum** (Entw. etc.), Hagen, C. (1873).
- Mesembryanthemi** et Aloës Mon. Salm-Dyck.

- Metamorphose** (Essai s. l. m. d. pl.), Goethe (übers. v. Fr. Soret) (1831).
- Metamorphose** d. nied. veget. Organismen, Hornschuch.
- Michelia**, Comment. mycol., Saccardo.
- Micologia Italiana**, Bibliogr. della -, Saccardo, Penzig u. Pirota.
- Micologiei studi**, Venturi.
- Micromyces**, de Notaris.
- Mikroskopische Blicke** in d. inneren Bau etc., Rossmässler.
- Milchbehälter** der Pfl., Schmalhausen.
- Milchsaffbehälter**, David.
— (Entstehung der -), Dippel.
- Mimosa sentiente**, de -, Bellardi.
- Mirabilis Jalapa**, Finger, F. (Bonn 1873).
- Missbildungen** etc., Zuccarini.
— d. Gewächse, Jäger, G. F. (Stuttgart 1814).
- Monadelphiarum** class. Diss., Cavanilles.
- Monotropa**, Hypopithys et Neottia etc., Drude, O. (1873).
- Moose**, Dillen, — Necker.
- Moose Deutschlands**, Funk (1820), — Roehling, — K. Müller (1853).
— Mecklenburgs, Blandow.
— Ehrenbergs aus Ägypten, Lorentz.
— Tent. meth., Walker-Arnott.
— u. Farne, Hedwig.
— Lebermoose u. Algen Deutschlands, Rabenhorst.
- Moosflora** d. Rheinpfalz, Gumbel (1857).
- Moosstudien**, Lorentz, — (Allgäuer Alp.), Molendo.
- Morchel** (Gemeingefährl. d. essb.), Ponfick.
- Morées**, Payer.
- Morphio**, de -, Kindscher.
- Morphologie** der Gewächse, Hofmeister, — (neues Syst. d. -), Schultz, C. H. (Berl. 1847).
— d. Pfl., vergleichende -, Irmisch.
- Mousses** (Réch. anat. u. morph.), Schimper (1848).
- Musa** Ensete, Wittmack.
- Musae paradisiacae** Diss., Tilesius.
- Muscaviense Arboretum** (Park v. Muskau), Petzold et Kirchner (Gotha 1864).
- Musci Alleghanici**, Sullivant.
- Musci cleistocarpi**, Jäger, A.
— cubenses Wrightiani, Sullivant.
— exotici, Hooker, W. J. (Lond. 1818).
— italici, de Notaris.
— hepatici, Weber.
- Muscologia britann.**, Hooker u. Taylor (Lond. 1818).
— german., Hübener.
— hibern. Spicileg., Turner.
— recentior, Bridel-Brideri.
- Muscologie**, Palisot de Beauvais.
- Muscorum europaeorum** Synops., Schimper.
— Historia, Dillen.
— Method. illustr., Linné f.
— Physiologia, Necker (1774).
— Syllabus, de Notaris.
- Muscorum frondosorum** n. g. halicense, Lobarzewski.
— — Synops., K. Müller (Berol. 1849—51).
— — Suecica Dispos. syst., Swartz.
— — Specimen, Schwägrichen.
— hepaticorum Hist., Weber.
— — Hist. Prodr., Schwägrichen.
— — novorum Icones, Hampe.
- Mycetozoen**, Syst. der -, Rostafinski, — de Bary (1864).
- Mycographia Suisse**, Secretan.
- Mycologia europaea**, Persoon (Lpz. 1822—28).
- Mycologiae Symbolae**, Fockel.
— Systema, Fries.
- Mykologie**, Bail (1867).
— allgem. - (Handb.), Bonorden,
— (Beitr. z.), Fresenius, G. (1863).
- Mykologische** Abhandlungen, Tulasne.
— Beobachtungen (Gastero- u. Hymenomyc.), Schmitz, J.
— Berichte, Hoffmann, H.
— Hefte, Kunze u. Schmidt.
— Skizzen, Sorokin.
- Mutterkorn**, v. Münchhausen, — (l'ergot du seigle, Mém.), Fée.
— (Verhütung etc.), Kühn (Halle 1863).
- Myrtaceae** centro-amer., Oersted.
- Myrtacearum** americ. Revis., Berg.
— xerocarpicarum etc., Schauer (1840).
- Myrtographia brasiliensis**, Berg.
- Mythologische** Flora, Dierbach.
- Myxogasteres** Fruct., Bail, Th. (1859).
- Myxomyceten**, Cienkowski.

- Nadelhölzer**, Synops. d. -, Henkel.
Najas (Mon.), Magnus.
Narcissorum Mon., Haworth.
Nectar, du - (appareils sécrétaires), Desvaux.
Nectarien, Bedeutung der -, Kurr.
Nectariis, de -, Weihe, — (Bed. z. Befrucht.), Würz u. Kurr.
Nelken (oeillets), Ardène.
Nelkentheorie, Rudolphi (2. A., 1799).
Nelkenzucht, Behr u. Münzel, Lpz. 1810.
Nepenthes destillatoria, Moore.
Nereis britann., Stackhouse.
Nessel, d. (als Textilpfl.), Bouché, C. B., u. H. Grothe (Berl. 1877).
Neuen schönsten Pfl., die - (der Gewächsh.), H. Jäger (1873 u. 81).
Nihil officinale, Lawson.
Nitrariées, Payer.
Noix vomique, Desportes.
Nopaleen, Martius.
North-American Sylva, Nuttall.
Nostocaceen, insb. Rivularien, de Bary (1863).
novae spp. aethiop., Schweinfurth.
Nutzbare Gewächse (Handb.), Link. — u. schädli. Gew., Chamisso.
Nutzbaumpflanzungen, Fintelmann (Potsd. 1856).
Nützliche u. schädli. Schwämme, Lenz.
Nützliche Pflanzen (Handb.), Duchesne.
Nutzpflanzen, die - Griechenlands, v. Heldreich (Athen 1862), — (tabell. Übers. d. wicht.), Goetze, E. (1883).
Nymphaea (Mon.), Lehmann. — semi-aperta, Sturm, J. W.
Oaks of the United States (Eichen d. V. St.), Engelmann.
Obstarten, Amoureux.
Obst- u. Weintraubenarten Württembergs, Berg.
Obstbau (deutsch. Magaz.), Bertuch. — Bivort, — Harlin, — (Vervollk.) Borchers. — (Lehre von d.), Lucas, E.
Obstbäume (Erzieh. junger - u. d. künstl. Baumformen), Lucas, E. (1875).
Obstbäume (Erfrieren der -), Oberdieck, — (Schutz der - gegen Krankh.), Lucas, — Klotz (Danz. 1879).
Obstbaumschnitt, d. -, H. Jäger (Lpz. 1860), — u. franz. Obstbaumzucht, Meyer, J. G. (1871 bis 1874).
Obstbaumzucht, Christ, — Fintelmann, — Henders. — Rivière, — (d. Ganze der -), Röver. — vollständ. Anleitg. d. -, Rubens. — (in Töpfen u. Kübeln), Rivers (Weimar 1864).
Obstgärtner, d. deutsche -, Sickler. — d. - im Zimmer, Diecker (Potsd. 1826).
Obst- u. Beerenfrüchte Deutschl.'s, die -, Calwer.
Obstkunde, syst. Handb. der -, Dittrich. — Joss. — Joss.
Obstnamen, Etymologie d. -, Oberdieck.
Obstsorten, bessere zusammengest., Pochhammer. — die besten - Englands, Smee. — Degenerieren der -, Knight.
Oeillets (Nelken), Ardène.
Oelsaat, neue -, Wittmack.
Oekonomische Flora Deutschlands, Moser, H. C.
Oekon.-technische Flora, Schmidt (Jena 1827).
Oekonomische Pfl. (in Abbild.), Kerner, A.
Oekonomische Pflanzenkde., Whistling.
Oenanthe Theophrasti, Wedel.
Offizinelle Gew., Anleit. z. Kenntn. der -, Kunth.
Olea europaea, Lehr.
Olei resinaeque proferendorum organa, Rebender.
Olive and its products, Bernays (1872).
ombellifères, les pl. -, Gandy.
Ombellifères, Mém. s. les -, de Candolle.
Onagaires, de Candolle.
Onagrearum Synops., Mon., Spach (1835).
Ophioglosseen Deutschlands, Milde (Breslau 1858).
Opii usu, de -, Reimar. —
Opiologia, Wedel.
Opium, treatise on -, Young.

- Opora**, Zeitschr. f. Obstbau, Zittau 1834—35.
- Orangenbäume** (nederlantje Hesperides), Commelin.
- Orangers**, Hist. nat. des -, Poiteau u. Risso.
- Orchardist**, Scott.
- Orchidacea** (Xenia), Beitr. z. Orchideenkunde, Reichenbach f.
- Orchidaceae**, the - of Mexico, Bateman.
- Orchidacearum** Sertum, Lindley.
- Orchidee**, de -, Carpow.
- Orchideen** (Befrucht.), Darwin, Ch. — (Cultur), Warner, — Morel. — epiphytische, Pflzer. — neue, Mutel. — (Morphologie der -), Irmisch. — tropische, Josst. — Zwiebelgew. u. Baumfarne, Wagener.
- Orchidées d'Afrique**, Petit-Thouars. — (Mon.), Richard f., — Rivière.
- Organographie** d. Pfl., Stein, — de Candolle-Meissner. — Agardh (übers. v. L. Meyer) (Kopenh. 1831).
- Organologische Studien**, Auerbach, L. (Bresl. 1879).
- Orobanchen-Cultur**, Tittelbach u. Caspary. — (z. Kenntn. der -), Schultze, F. W.
- Orobanches**, germin. des - (Mon.), Vaucher.
- Osmundae**, gen. Mon., Milde (Vind. 1868).
- Oxalis**, amerik. Arten von - (Mon.), Zuccarini.
- Oxalisarten** (Lebensverh.), Hildebrand, F. (Jena 1884).
- Palmae amazonicae**, Spruce. — australasicae, Wendland und Drude. — centro-americanae, Oersted.
- Palmarum** anatome, Wossidlo. — index, Wendland. — Hist. nat., Martius.
- Palmen**, Naturgesch. der -, Seemann (Lpz. 1857), — (Vegetationsorgane der -), Karsten, H. (1847).
- Pandanophyllum**, Kurz, S.
- Papaveris** gen. (Mon. Tent.), Elkan (Regiom. 1839).
- Papaveraceen** (Diagramm der -), Beneke, F.
- Papierstaude** (de Papyro frutice), Hahn.
- Papyrus**, sur le -, Malherbe, — Wieland (Guilandus).
- Parera** lichenologica, Körber.
- Paronychiaceen**, Baptista.
- Paronichiées**, de Candolle.
- Parthenogenesis** d. Pfl., A. Braun, — Regel (1859).
- Passiflora mauritiana**, Petit-Thouars.
- Passiflorées** et Cucurbitacées, Dutailly (1879).
- Pavots** et argémones, Hist. n. des -, Viguier.
- Pedicularibus**, de -, Richers.
- Pelargonien**, Reider, — -Kultur, Klier.
- Pelorien** (bei Labiaten), Peyritsch, — (ad indolem) Ratzeburg (1826).
- Peltophyllum**, Gardner.
- Peruviani corticis**, de usu -, Tretzel.
- Petrefaktenkunde**, Schlotheim.
- Pflanzenanatomie** (Anatome plantarum), Malpighi. — (Beitr. z. vergleichend.), Westermaier (1881). — (Beiträge zur -), Medicus, — (Grundriss), Kiefer.
- Pflanzenbau** und Leben, Thomé (1834).
- Pflanzenbewegung**, Wiesner (1881).
- Pflanzen-Einwanderung** d. norw. Flora, Blytt. — -Ernährung etc., Schultz von Schultzenstein. — — Wolff, Em. — -Erzeugung, Logan. — -Früchte, Watzel. — -Familien, deutsche -, Hoffmann, H. — -Geographie, Meyen, —, A. v. Humboldt. — — Atlas der -, Rudolph. — -Krankheiten (Handb.), Sorauer, — (sulle malattie delle piante), Ré, — Ammann (Stuttg. 1867), — (Atlas der -), Zimmermann, O. E. R. (Halle 1885).
- Pflanzenmissbildung**, Unger (1849).
- Pflanzennamen-Deutung**, Mejer.
- Pflanzen-Pathologie**, Meyen, — Unger. — -Physiologie (Entwurf), Rafn, — (Grundz.), Frank, A. B. (1882). — — neues System d. -, Meyen. — — Treviranus.

Pflanzen-Physiologie, Reum.
 — -Schutzmittel (de pl. munimentis), Ludwig.
 — -Stacheln, Delbrouck, — (Haare u. Dorne), Suckow (1875).
 — -Symmetrie, Schneckenburger.
 — -Zeugung, neue Theorie der -, Endlicher (Wien 1838).
Pflanzliche Parasiten des Menschenkörpers, Hallier.
Pflammen, Günderode u. Höpfner.
 — Anleit. z. Kenntn. der -, Liegel.
Pfropfens, Mon. des -, Berg (1824).
Phaenologie, Beitr. z. -, Egon Ihne (ph. Beob. in Europa), 1879 bis 1882, — H. Hoffmann (Giessen 1884).
Phallus impudicus (germinat.), Oschatz (Vrat. 1842).
Phanerogamen-Befruchtung, Radlkofer.
Pharmakognosie, Wigand, — (Handb.), Wiggers, — (d. Pflanzenr.), Berg, O. (Berl. 1857).
Pharmazeutische Botanik, Grindel, — (Handb.), Nürnberg. 1804.
 — — Geiger-Nees v. Esenbeck u. Dierbach, 1840.
 — Warenkunde, Goebel u. Kunze.
 — (pharm.-veget.) Rohwaren., Dietrich, F. D., u. Krumbholz (Jena 1846).
Phormium tenax, Gillet.
Phyceae novae, Areschoug.
Phycologia adriat. et mediterr. (Icon.), Zanardini.
 — germanica, Kützing.
Phycoxanthin, Reinke, J. (1876).
Phylloglogiae elementa, Drejer.
Physiologie u. Anatomie d. Pfl., Schacht.
 — der Gewächse, Treviranus.
 — u. Pathologie d. Pfl., Meyen, — Unger.
Physiologie végétale, Senebier, — de Candolle-Röper.
 — nouv. syst., Raspail, —, Eléments, Richard, A.
Physiologische Botanik (Handb.), Hofmeister u. Irmisch, etc.
 — Pflanzenchemie, Ebermayer, — Untersuchung., Pfeffer, W. (1873).
Phythanthozoa (Icon.), Weimann.
Phytochemia, Koch (Jena 1834).
Phytopathologie, Hallier.
Phytostatik (Jura), Thurmann, — (Pfalz), Schultz, Fr. W.

Phytotomie. Elemente der -, Kieser, — Meyen.
Pierrea, Hance.
Pili plantarum (Pflanzenhaare), Bahrdt.
Pilobolus (Mon.), Coëmans.
Pilularia, Agardh u. Leche, — u. Marsilia, Hanstein.
Pilze, v. Albertini u. v. Schweiniz (Consp. fungorum etc., Lps. 1805), — (Abhandl.), Léveillé, — Brefeld (Meth. z. Unters., 1874), — Harzer, — (Befrucht.), Karsten, H., — Syst. der -, Nees jr., Henry u. Bail (Bonn 1837-58), — essb. -, Berkeley u. Broome, — (als Krankheitserreg.), Haupt, W. A. (1877), Winter, G. (1878), Hartig, R. (1880), — (verbreit. deutsche), Lösecke u. Bösemann (1872), — (in ök.-chem.-toxicol. Hins.), Boudier (deutsch Husemann, 1867), — Flechten u. Algen, Syst. der -, Oersted (deutsch Grisebach u. Reinke), — (in Sturm's Flora Deutschl.), Ditmar, — Rostkovius (1840), — Preuss (Übersicht, 1851), — Flechten u. Myxomyceten, de Bary (1866), — (der Insektenkrankh., Seidenraupe etc.), Lebert, H. (1858). Pilzepizootien, Bail (1869). — Pilzkunde, Führer in die -, Kummer (1871). — Pilzsammler, Hahn, G. (1883).
Pinetum (üb. Coniferen), Gordon.
Pinus g., Lambert.
Piperaceae (Bemerk.), Kunth.
Pipere, de -. Heister (1740).
Pistill (Entwick.-Gesch. des -), Buchenau (1857).
Plantae aquaticae, Chatin.
 — diaphoreticae (Syn.), Rosenthal.
 — officinales (Forts.), Nees v. Esenbeck jr.
 — parasiticae, Chatin.
Plantagineen, Leydolt.
Plantaginées, Barnéoud.
Plantarum Papilionacearum Mon. med., Ebermaier (1824).
Plantarum. de anima -, Valentin, Fr. (Regium. 1758).
Plantes fossiles des Vosges, Mougeot u. Schimper.
Poirrier. sur la cult. du -, Desfontaines.

- Pollens**, Schutzm. des -, Kerner, A. (1873).
Polline, de plantar. -, Fritzsche (1833).
Polygoni Monogr., Meisner.
Pomarium Bononiae, Aldrovandi.
Pomologen (Leitf. f. angehende -), Lucas (1879).
Pomologie (bonnes poires), Baltet.
Pomologie, Diction. de -, Leroy, — guide pract., Thomas.
Pomologie, syst. Anleitung d. -, Manger.
 — deutsche -, Lauche.
 — Handb. d. -, Hinkert.
 — österr.-ungar., Stoll.
Pomologisches Handwörterbuch, Christ.
Pomona austriaca, Kraft, J.
 — franconica, Mayer, — gallica, Poiteau u. Turpin.
Pomone française, Lelieur.
Populorum Revisio, Spach.
Portulacae, Revis. d. -, de Candolle.
Potentillarum Synops., Haller f. — Monogr., Lehmann.
Primeln, vergl. Anatomie der -, Kamienski.
 —, die - der europ. Gärten, Stein, B. (1882).
Primulaceae d. österr. Alpen, Kerner, A.
Primularum Monogr., Lehmann.
Propagatio plantarum, Rudbeck.
Proteaceae, fossile -, Ettinghausen.
Protoplasma, Velten, — (Studien üb. -), Strasburger (1876).
 — (Struct. u. Beweg.), Frommann, C. (1880), — Hanstein (1880).
Pteridographia americ., Petiver.
Pteridographiae Tentamen, Presl.
Puccinia rosae et rubi, Schwabe.
Punica, Meratia et Calycanthus, Nees v. Esenbeck sr.
Pyrenomycetes, Sollmann.
Pyrenomycetes German., Nitschke (Bresl. 1867—70).
Pyrola et Chimophila, de -, Radius.
Pyrolaceae, Alefeld.

Quassia Simaruba, Wright.
Quercitronrinde, Hamburger, Z. S. (1879).
Querschnitte von 100 Holzarten, Nördlinger (1876—80).
Quinologia, Ruiz u. Pavon.
- Rankenbildung**, Warming.
Ranunculaceae Candollii, Schlechtendal.
Rapateacearum Monogr., Körnicke.
Ratanhia, de -, Klein.
Reana luxurians, Baillon.
Rebschulen (bei Heidelb.) (1875).
Regelia, Beaufortia etc., Schauer.
Reis (Rayss), Besch. des -, Raewolf, 1783.
Résédacées (Mon. d. -), Müller, Jean.
Restio, Thunberg u. Lundmark.
Rhabarbari, de eximia etc., Gerber.
Rhabarbaro, de -, Ziervogel.
Rhabarbersorten, Myatt.
Rhabarberwurzel, Calau.
Rhamnées, Barnéoud u. Brongniart.
Rheum off. botanices, Scheltema.
Rhizocarpeen, Mettenius.
Rhizographia, Preiss (Prag 1823).
Rhizomorpha, Eschweiler.
Rhodoreae et Rhododendreae, Seidel.
Rhododendro chrysantho, de -, Zahn.
Rhododendron arboreum var. roseum, Edwards.
Rhus (Mon.), Horsfield.
Riccien (Mon.), Lindenberg.
Riedgräser, Schkuhr.
 — die - Württembergs, Fleischer.
Riesen, die - der Pflanzenwelt, Mielck, — Göppert.
Rosae pl. g., Hist. succincta -, Wallroth.
Rosarum Mon., Crépin (1880).
Rose, Hist. n. d. l. -, Guillemeau.
Rose, die -, Cohn, F. (1863).
Rosen, die - (nach d. Nat. gez.), Rössig, — (25 Grupp.), Selbstherr.
Roses from nature, a collection, Lawrence.
Rosier genre (Mon.), Thory.
Rostpilzformen d. deutsch. Coniferen, Rees.
Rubiaceae capenses, Cruse.
Rubiacearum Sect. Anthospermae, Cruse.
Rubiaceen d. trop. Afrikas, Hiern.
Rumex (Mon.), Campdera.
Rutacene, Farne etc., Schott u. Endlicher.
- Saccharum** etc., Zalheimb.
sacra herba (nobilis Salvia), Paulini.

- Saftbewegung** u. Function, Cotta.
Saftpflanzen, Haworth.
Saftsteigen (Ursachen), Böhm, J.
Salices europaeae, Wimmer.
Salicetum (Comm.), Trautvetter.
Salicium Monogr., Anderssen, N. J. (Holm. 1867).
Salix (Mon.), Host.
Salvia, Etlinger.
Salvinia natans, Duvernoy, — Bischoff, — Juranyi (1873).
Samenschalen d. Scrophular., Bachmann (1881).
Sapindacearum foss. Mon., Massalongo.
Sapindaceen, Radlkofer.
Saprolegniaceen, Cornu.
Saprolegnien, Walz.
Sarsaparilla et Caoutschouc, Royle.
Sassafras arbor, Trew.
Sassaparillae radix, Hilmziker.
Saururus et Houttounia, Meyer, E. H. F.
Saxifraga (Ind. crit.), Engler.
Saxifragearum Revis., Sternberg.
Schachtelhalme v. Esthl., Lievl. etc., Klinge, M. (1882).
Schachtelhalme (Stud. üb. -), Griesmann (1883).
Scheitelwachstum der Wurzeln, Schwendener (1882).
Schimmelbildungen, europäisch. -, Cornu.
Schimmel- oder Algengattungen, Carus.
Schmarotzergew. u. Krankheiten, Regel.
Schnarotzerpflanzen (geogr. Verbreit.), Liebe.
Schmarotzerpilze d. Menschenkörpers, Hallier, — Gruby.
Schmetterlingsblütigen, Fam. d. -, Eisengrein.
Schutzscheiden, Schwendener (1882).
Schwämme Bayerns (Abb.), Schäfer-Persoon (Erlang. 1800).
 — Deutschlands, Schmidt u. Kunze, — (getrockn.), Kunze.
 — essbare, Persoon (deutsch von Dierbach) (1822).
 — die essbar. - Oesterr., Trattinick, — Corinser, — d. - Frankreichs u. Deutschlands, Cordier.
 — (Samml. für Rabenhorst's Fungi europ.), Lasch.
Schwärmsporen (Einfluss d. Lichts auf d. -), Stahl.
Schwarzkiefer, Höss.
Scilla, Corvinus, — marit., Athanasius, — Gugubauer.
Seitamineae, Roscoe.
Seitaminearum Mon., Horaninow.
Scutellaria, Hamilton.
Secretionsorgane, Reinke.
Seigle ergoté (Traité), Read.
Selbstbefruchtung (Gesetz d. Vermeid. d. -), Thomé (1870).
Senega, de radice -, Hellmuth.
Sénés (et Casses) Colladon.
Semperviven, neue -, Lehmann u. Schnittspahn.
Simarubées, Planchon (1847).
Sisyrinchium (Mon.), Klatt.
Smilacae (Bemerk.), Kunth.
Smilacae, structura, Beining (1850).
Solanacearum Ordo, Stromeyer.
Solaneen, Dunal, — Sendtner.
Sorghii vulgaris (seminum anal.), Werner.
Spargel (Anl. z. Erzieh.), Nebbien.
Spermatozoïden im Pflanzenreich, Schacht.
Sphacelarien, Geyler, — Magnus, P.
Spiraea, du g., Cambessèdes (1824).
Spongia marina, de -, Uhle.
Sporangium d. Gefässkryptogam., Mohl, H. (1837).
Stachelbeeren (Mon.), Maurer.
Stacheln u. Dorne, Delbrouck (1873).
Stapelia, eine europ. - Mikan.
Stärkebildungsfermente, Baranetzky (Lpz. 1878).
Sternanis, de Vriese.
Sternkräuter, Fam. d. -, Willemet.
Stirpes Austriae, Crantz.
Strelitzia, Assimilation d. -, Holle.
Stylidium graminifolium, Morren.
Styrace, de -, Will.
Succinorum Hist., Sendel.
Succulentarum pl. Hist., Bradley.
Synanthereen, Cassini.
 — des Berlin. Herbariums, Lessing.
Tabaci Hist., Antz.
Tabaco, de -, Milchsack.
Tabacologia, Neander.
Tabak (Anbau), v. Babo u. Hofacker.
 — u. ähnliche etc., Tiedemann.
Tabakskultur in Holland, Schwab.

- Tamus Elephantipes** (Mittelstock), Enderle.
Tanacetaceae, Schultz v. Schultzenstein.
Tanaceteeen, Schultz-Bipontinus.
Tange (Abb.), Kützing.
Technische Pflanzen Deutschlands, Calwer, - Vietz.
Teppichgärtnerei, Hampel.
Teratologie der ovula, Peyritsch.
 — Grundlegung der -, Wigand.
Tératologie végét. Elem., Moquin-Tandon.
 — (Essai hist.), Kirschleger.
Terebinthineen, Colebrooke.
Tertiärflora etc., Weber u. Wessel.
 — der Schweiz, Heer.
Thallassiophytes, Lamouroux.
Thé, cult. du -, Aubry le Comte.
Thea, de -, Genge.
Thee, der - (Mon.), Houssaye.
Thymelearum Syn., Meisner.
Tiliarum, Rev. g. -, Spach (1834).
Torfmoose (Entw.-Geschichte d. -), Schimper (1858).
Torreya, G. Arnott.
Traubenkrankh., die -, Dorner, J. (Pest 1853).
Traubensorten (vorz. Württemb.), Single.
Tremandrearum Syn., Schuchardt.
Tremandreen, Steetz (Hamb. 1853).
Trichome u. Stacheln, Uhlworm (1873).
Trichostomaceae europ., Lindberg.
Tuberaceae (Trüffelpilze, Mon.), Vittadini.
Tuberibus terrae, de -, Brückmann.
Tüpfel (Entst. u. Bau), Dippel, L.
Turgor (d. Zellen), Vries.
Turneraceen Mon., Urban, J. (1833).

Umbelliferae, Lagasca.
Umbelliferarum Cl. Emend., Crantz.
 — Prodr., Sprengel.
 — spp. minus cognitae, Sprengel.
Umbelliferen, Cusson.
Umwandlung v. Atheren in Carpelle, H. Mohl (1836).
Unkraut- u. Wegpfl. Brasiliens, Lund.
Unkräuter von Deutschland, die -, Ratzeburg.
Unorganische Pflanzenbestandteile, Erdmann.
Uredinen, de Bary (Berl. 1865—66).

Urticées (Mon.), Weddell.
Ustilagineen, de Bary (1832).

Valerianas, in -, Betcke.
Valerianeen (Mon.), Dufresne, — u. deren Gebrauch, Ebers (1858).
Valerianées, de Candolle.
Vallisneria spiralis, Müller, J. Fr. (Bonn 1875).
Vegetationsorg. d. Phanerog. u. Farne, de Bary (1877).
Vénéneuses, pl. - de la Suisse, Vicat.
Verbasci g. Prodr., v. Berchtold u. Pfund (1840).
Verbreitungsmittel, Hildebrand (1873).
Veredlung d. Obstes, Keyser.
Verger, le -, Mas Alphonse.
Verjüngung (Anaphytose), Schultz, C. H. (1851).
Veronica u. verwandte Sippen, Duvan.
Vermehrung, üb. ungeschlechtl. - d. Phanerogamen, Baum, O. E. (1850).
 — der Gramineen, Hildebrand.
Verpflanzen der grossen Bäume, Reinecken, R. (1877).
Verrucaria, Gibelli.
Vigne, cult. de la -, Chaptal.
Vignoble, Pulliat.
Violacées, St. Hilaire.
Violariées, Gingins.
Visnea Mocanera, Schacht.
Vorwelt, Flora der -, Corda.
Voyria, Splitgerber.

Wachsüberz. d. Epidermis, de Bary.
Wald, der - im Haushalt d. Natur, Weber, R. (1874).
Waldbau, Cotta (5. A., 1832), — Gwimmer (2. A., 1841).
Waldbäume, deutsche -, Klöbisch, — (Krankh. d.), Hartig, R. (1874).
Waldерziehung, Schultze (Lpz. 1839).
Waldes, des deutschen - Vergangenheit u. Zukunft, H. Hoffmann (1871).
Warenkunde, merkantile -, Zenker.
Weg- u. Unkrautpfl. Brasiliens, Lund.
Weiden Tyrols, die -, Trauensteiner.
Weinbau-Kalender, v. Babo.
 — -Katechismus, Dochnahl.

- Weinbau-Schule**, Dornfeld.
 — Siebenbürgens, Fabini.
 — (theor.-prakt. Abh.), Chaptal, Rozier, Parmentier u. Dussieux.
Weinstock etc., Champin.
Weintraubenarten (u. Obst-) Württembergs, Berg.
Wiesen- u. Heidenvegetat., Drude u. Wendland.
Winden, das - d. Pfl., Schwendener (1883).
Winterflora, H. Jäger (1880).
Wintergarten, der -, Antoine, — Schmidlin, E. (1847).
Wintergärtner, Dietrich, F. G. (3. A., 1808).
Wurzel-Ausscheidung, Walser.
Wurzelkraft, Lehre v. d. -, Brosig, M. (Breslau 1876).
Wurzelleben der Kulturpflanzen, Fraas (1870).
Wurzelverwachsungen, Franke, M. (1881).
- Xenia orchidacea**, Reichenbach f.
Xeranthemum, Gay, J.
- Zapfenbäume**, Salisbury.
- Zea Mays**, de pl., Marabelli (1793).
Zelle, die - als Elementarorg., David, G. (1873), — u. Zellkern, Auerbach, L. (1874).
Zellenstreckung u. Turgor, Vries.
Zellhülle (neuere Theorie), Dippel, L.
Ziergärtnerei. Katechismus der -, H. Jäger (Lpz. 1877).
Ziergehölze, Jäger, H., u. Beissner.
Zierpflanzen, Samml. von -, Labram.
Zimmer-Blumenzucht, Schmidlin. — u. Fenstergarten, Bouché.
Zimmergarten, Keller.
Zingiberaceis, Observ. de -, Hall.
Zoophytes, Hist. nat. d. -, Dujardin.
Zoosporen u. Algen, Walz.
Zuckerahorn, v. Paschwitz.
Zuckerrübe (Anat. u. Entw.), Droyssen, K. (1877).
Zwergbaumzucht, Liebitzer.
Zwergmandeln, Schlechtendal.
Zwiebelblumen (Traité d. fleurs à oignon, Harlem 1760), Kampen.
Zwiebelgew., Biolog. d. -, Berg, E. v. (1837), — lilienartige u. Prachtg., Kreysig (1836).

d. Nomenklatur und Wörterbücher der Botanik.

- Balfour**, the botanist's companion with a glossary of botan. terms, Edinb. 1860.
Beckmann, Lexic. botanicum, 1801.
Bischoff, Handb. der bot. Terminologie, 1844; d. bot. Kunstsprache in Umrissen, Nürnberg. 1822; d. beschreib. Bot. (1839, u. von J. A. Schmidt herausg. 1857).
v. Böninghausen, Nomenclator bot., 1821.
Borkhausen, bot. Wörterbuch (2 B.), 1797 (Nachtr. v. Dietrich).
Böhmer, Lex. rei herbariae, cont. etymol. nominum, 1802; Comment. bot. -liter. de plantis in memoriam cultorum nominatis, Lps. 1799.
Bulliard, Dict. elem. d. bot., refondu p. Richard, Paris 1802.
Deunstedt, Nomencl. bot. (I. Pl. phanerog.), 1810.
Dierbach, Repertorium bot., Lemgo 1831.
Dietrich, A., u. de Vriese. Kunstvoordenleer d. Pflanzen, Amsterdam 1834.
Dietrich, A., Terminologie d. phanerog. Pfl., 2. A., 1838.
Doehmahl, Fr. J., Biblioth. hortens. (1750—1860, versch. Werke), 1861.
Fechner, Erklär. volkst. deutsch. Pflanzennamen, 1871.
Gérardin, Dict. raisonné de Bot., Paris 1822.
Gesner, C., Catal. plant., Namensbuch all. Erdgewächse (Lat., Gr., Dtsch. u. Frz.), Zürich 1542.
Germain, Nouv. Dict. de Bot., 1870.

- Gmelin**, J. Fr., Onomatologia bot. (9 Bde.), 1772—78.
- Hayne**, Termini bot. iconib. ill., bot. Kunstspr., Berlin 1799.
- Henckel v. Donnersmark u. Willdenow**, Nomencl. bot., 2. A., Halle 1821.
- Heynold**, Nomencl. bot. hortens., alfab. synon. Aufzähl. der in Europa kult. Gew., 1840 u. 46.
- Index d. Kunstvoordenleer d. Planten**, Amst. 1836 (s. Dietrich, A., u. de Vriese).
- Johrenius**, Vademecum bot., Colbergae 1710.
- Jürgens**, etym. Fremdwörterb. d. Pflanzenk., 1878.
- Kachler**, Grundr. d. Pflanzenk. in Gestalt eines Wörterb.'s d. betr. Sprache, Wien 1830.
- Kohl**, Taschenwörterb. d. botan. Kunstausdr., Berl. 1883.
- Kyber**, Lex. rei herbar. trilingue, Argentor. 1553.
- Langenthal**, Terminol. d. beschr. Bot. u. lat. Wörterb., 1845.
- Lecoq u. Julliet**, Dict. des termes de bot., Paris 1831.
- Leroy**, Diction. de Pomologie, s. 1866.
- Lüder**, Nomencl. bot. stirpium Marchiae Brandenb., Berl. 1786.
- Martin**, A., d. Pflanzennamen d. deutsch. Flora, Halle 1851.
- Mejer**, üb. d. Deutung d. Pflanzennamen („Natur“), 1881.
- Müller**, J. B., bot. prosodisch. Wörterbuch, 1842.
- Nennich**, allg. Polyglotten-Lex. d. Naturg. (20 Spr.), Hamb. (20 Thlr.)
- Oberdieck**, Etymologie d. Obstnamen, Bresl. 1866.
- v. Perger**, Studien üb. d. deutsch. Namen d. in Deutschl. heimischen Pfl., Wien 1858.
- Paxton**, Jos., a Pocket bot. dictionary, 2. A., London 1853.
- Pfeiffer**, Nomencl. bot. (4 Bde.), 1872.
- Plenk**, Anfangsgr. d. bot. Terminologie, Wien 1795.
- Räuschel**, Nomencl. bot. omnium a Linnaeo descr. plant., Lps. 1797.
- Reichenbach**, Repert. rei herb. s. Nomencl. gen. plant., Dresd. 1841.
- Römer**, J. J., Vers. eines Wörterbuchs d. bot. Terminologie, Zürich 1816.
- Schliekum**, Taschenwört. d. bot. Kunstausdr. (Lpz. 1875).
- Studel**, E., Nomencl. bot., 1840 bis 1841, cryptog., Stuttg. 1824.
- Théis**, A. de, Glossaire de bot. ou Dict. etymol. etc., Paris 1810.
- Voigt**, Handwörterb. d. bot. Kunstsprache, Jena 1803.
- Walpert**, Gu. G., Repertor. botanices syst. (Lps. 1844—48).
- Walpert**, H., Synonyme u. syn. Wörterb. d. deutsch. Pflanzennamen (1852).
- Willdenow**, s. Henckel v. Donnersmark.
- Wittstein**, etym.-bot. Handwörterbuch, 2. Aufl., 1856.

e. Botanische Litteratur und Geschichte.

- Haller**, A., Bibliotheca bot., Tiguri 1771—72.
- Jessen**, Bot. d. Gegenw. u. Vorzeit, 1864.
- Krüger**, M. S., Bibliographia bot., Handb. d. bot. Literatur etc., 1841.
- Meyer**, E., Geschichte d. Botanik, 1854—57.
- v. Miltitz u. Reichenbach**, Biblioth. bot., Berlin 1829.
- Pritzel**, Thesaurus lit. bot. omn. gent., 2. A., 1872.
- Pulteney**, Gesch. d. Bot. (bes. in Engl.), aus d. Engl. v. Kühn, Lpz. 1798.
- Pulteney**, esquisses hist. et biogr. des progrès de la bot. en Angleterre, 1809.
- Willkomm**, gegenw. Stand d. bot. Wissensch., 1863.
- Winekler**, Emil, do., Frankf. a. M., 1854.
- Zuchold**, Additamenta ad Pritzel Thesaurum, 1852 u. 66.

IV. Die wichtigsten essbaren und giftigen Schwämme.

a. Essbare.

- Agaricus procērus** (Lepiota procēra) Parasolpilz, s. g. Schulmeister.
- Agaricus mutabilis** (Pholiota m.) Schuppenp. od. Stockschwamm.
- Amanita vaginata** Wulstscheide, s. g. Manschettenpilz.
- Am. caesarēa** (Agaricus caesarēus) Kaiserschwamm.
- Armillaria** Armbandpilz, z. B. meliā Honiggelbling, s. g. Hallimasch, straminea strohgelber, robusta etc.
- Bolētus edulis** Edel- od. Herrenpilz, Steinpilz.
- Bolētus bovinus** Kuhpilz.
- Bolētus lutēus** Butterpilz.
- B. granulatus** s. g. Schmerling, bekörnter Röhrenpilz Kumm.
- B. ovinus** (Polyporus ov.) Schafkutter.
- B. scaber** Birken- od. Kapuzinerp.
- B. rufus** rotbrauner Röhrenpilz Kumm.
- B. castanēus** kastanienbrauner R.
- B. asprellus** rauhschuppiger R.
- B. elegans** schöner R.
- B. flavidus** gelblicher R.
- B. subtomentosus** s. g. Ziegenlippe.
- B. badius** s. g. Maronenpilz.
- Bovista plumbēa** Bleikugel, s. g. Katzeneier.
- Calocēra furcata** u. viscosa Gabel- u. klebriges Schönhorn.
- Camarophyllus** Garnelenpilz, z. B. virginēus Jungfernp., caprinus Ziegenp., ovinus Schaf-G., pratensis Wiesen-G. etc.
- Cantharellus** Faltenpilz, z. B. eibarius Galling, guter Eierschw., Pfifferling etc.
- Clitocybe** Trichterling, z. B. odōra Duftp., suaveolens Wohlgeruchp., fragrans Anisp.
- Clitocybe dealbata** verfärbender Tr. Kumm., opipāra prächtiger, gibba buckliger etc.
- Clitopilus** Pflaumenpilz, z. B. pinalis wohlschmeck., Prunulus wahrer Pfl., Oreella rötlicher Pfl.
- Clavaria** „Keulenpilz“, Korallenschwamm, s. g. Ziegenbart, z. B. delicata zarter, flava eigentl. Ziegenb., Botrytis Trauben-K., coralloides Bärentatze, aurēa Gold-K., abietina Tannen-K., digitella s. anomala Finger-K., amethystina Amethyst-K. etc.
- Collybia** „Pfeennigpilz“, z. B. oreades Krösling od. Herbstmousseron, tenacella zäher, esculenta essb., porrea Zwiebel-Pf., crassipes s. fusipes Dickfuss, erythropus Rotfuss etc.
- Cortinarius** „Spinnwebschleier“-Pilz, z. B. castanēus.
- Entolōma** Schleierpilz, z. B. rhodopolium Rosen-.
- Galorrhoëus** „Milchpilz“, Pfefferling, Brätling, Kremling etc., z. B. deliciosus köstlicher, acris scharfer, rubellus rötlicher, volēmus Birnen-M., seriflūus Serum-M., mitissimus mildester, glycosmus Wohlgeruch-M., piperatus weiss. Pfefferp., Kuhpilz etc.
- Helvella** Falten-, Stock- od. Frühmorchel, s. g. Lorchel, z. B. esculenta Speise-Helvelle, crispa krause, etc.
- Hydnum** Stachelpilz, z. B. coralloides Korallen-St., diversidens ungleichzähniiger, imbricatum

- dachziegelschupp., Hirschschw., Habichtsp., *Erinaceus* Igel etc.
- Hypolöma* „Gewebsaum“, z. B. *lateritium* Bitterschw.
- Lepiöta* Ringpilz, z. B. *excoriata* geschundener, *procära* Parasolp. (*Agaricus procärus*), *erinäa* Hermelinp., *granulosa* bekörnelter m. v. *amianthina* u. v. *carcharias*, *clypeolaria* schildförm. etc.
- Limacium* „Schneckenpilz“, z. B. *eburneum* knochenweiss., *discoideum* scheibiger etc.
- Lycoperdon* Staubpilz, Bovist, z. B. *gemmatum* stachelwarziger, m. v. v. (*perlatum*, *furfuraceum* etc.), *gigantem* Riesenbovist, *caelatum* s. *areolatum* getäfelter, s. g. Hasenbovist.
- Marasmius* „Schwindpilz“, z. B. *scorodonius* Lauchp.
- Morchella* Morchel, z. B. *deliciosa* köstliche, *esculenta* Speise-M., *conica* Spitz-, *patula* Glocken-, etc.
- Plenrötus* „Seitenstiel“-P., z. B. *ostreatus* Austerp. s. g. Drehling, *ulmarius* Ulmenp.
- Polyporus* „Porenpilz“, z. B. *confluens* Semmelpilz, *sulphureus* schwefelgelber, *frondosus* laubart., *umbellatus* doldiger s. g. Eichhase, *ovinus* Schafeuter (*Boletus* ov.) etc.
- Psalliöta* Ringpilz, z. B. *campestris* (*Agaricus* c.) ächter Champignon, *sylvatica* kreideweiss., *arvensis* Schaf-Champignon.
- Rhynovis* Krämpelpilz, Deichselp., z. B. *involuta* wahrer Kr., *atroto mentosa* schwarz-filzig.
- Russula* Reizker, Täubling, z. B. *aurata* goldgelber, *lutea* gelber, *xerampelina* hochofter, *integra* unschädl., *alutacäa* ledergelber, *virescens* grünend., *lactea* milchweiss., *vesca* Speisep.
- Rhizopögon* Wurzeltrüffel, z. B. *Magnatum* Magnaten-, *nivëus* schneeweiss.
- Sparassis* Glucke, z. B. *crispa* krause, *brevipes* kurzstielige.
- Tricholöma* „Haarsäumling“, Ritterschwamm, z. B. *equestre* eig. Ritterschw., *prasinum* lauchgrüner, *pomönae* Obstb., *Columbetta* Tauben-, *tigrinum* Tiger-, *gambosum* Huf-, *saponacëum* Seifenschwamm, *nudum* nackter etc.
- Tuber* Trüffel, z. B. *cibarium* Speise-, *pallidum* bleiche, *fuscum* braune, *albëdum* weisse etc.

b. Giftige.

- Amanita* Wulstpilz, z. B. *muscaria* (*Agaricus muscarius*) Fliegenpilz, *pantherina* Pantherschw., *rubescens* Perlen-, *phalloides* Gichtschw., *solitaria*, *verna*, *excelsa*, *aspëra* etc.
- Boletus Satänae* Satanspilz, luridus Sau- od. Schusterpilz, *lupinus* Wolfs-, *piperatus* Pfefferpilz, *pachypus* Dickfuss od. Bitterpilz, *radicans* wurzelnder, *calopus* Schönfuss-Röhrenpilz.
- Cantharellus* Faltenp. z. B. *aurantiacus* falsch. Eierschw.
- Cortinarius* *traganus* Bocksgeseruchp., Lilaschwamm.
- Galorrhoeus insulsus* (*Agaricus* ins.) weismilchender Reizker, geschmackloser Milchp., *torminosus* Birken-Reizker (-Rietsch Kumm.), *fuliginosus* Russ-M., *chrysoorrhoeus* Goldfuss-M., *thejogalus* Schwefel-M., etc.
- Gomphus glutinos.* schmier. „Keilpilz“, Schleimschw. (*Agaricus* glut.).
- Hypolöma* „Gewebsaum“, z. B. *fascicularis* Schwefelkopf, Bitterschwamm.
- Russula* Reizker, Täubling, z. B. *emetica* Speiteufel, *furcata* Gabel-R., *rubra* roter, *heterophylla* (*furcata* var.).
- Tricholöma* „Haarsäumling“ z. B. *impolitum* glanzloser, *urens* brennend., *rutilans* rötlicher.

V. Übersicht

des von **Bartling** und **Bischoff** verbesserten **de Candolle'schen Systems** (nach **Leunis-Frank's Synopsis des Pflanzenreichs**).

A. Plantae vasculares, Gefäßpflanzen.

A. Phanerogamae L., Phanerogamen oder Samenpflanzen.

I. Kl. *Dicotyledonëae* Juss.

1. Unterkl. *Choristopetalae* DC. (*Polypetalae* Juss.)

1. Ord. **Leguminosae** Juss.: 1. Fam. Mimosëae R. Br., 2. F. Caesalpinieëae R. Br., 3. F. Swartziëae DC., 4. F. Papilionacëae L. (Leguminosae J.) (Phyllobolëae u. Sarcobolëae).
2. Ord. **Rosiflorae** Bisch.: 5. Fam. Chrysobalanëae R. Br., 6. F. Amygdalëae Bartl. (Drupacëae DC.), 7. F. Spiraeacëae Kth., 8 F. Sanguisorbëae Lindl., 9. F. Rosacëae Spenn., 10. F. Pomacëae Lindl.
3. Ord. **Terebinthinae** Bartl. Balsamgew.: 11. F. Cassuviëae R. Br., 12. F. Connaracëae R. Br., 13. F. Amyridëae R. Br., 14. F. Aurantiacëae Corr. (u. Olacinëae Endl.), 15. F. Zygophylleëae R. Br., 16. F. Rutacëae Bartl., 17. F. Diosmieëae A. Juss., 18. F. Xanthoxylëae A. Juss., 19. F. Simarubëae DC., 20. F. Ochnacëae DC.
4. Ord. **Tricoccae** Bartl. Schneller: 21. F. Staphyleacëae Lindl., 22. F. Hippocrateacëae Kth., 23. F. Celastrinëae R. Br., 24. F. Pittosporëae R. Br., 25. F. Aquifoliacëae DC., 26. F. Rhamnëae R. Br., 27. F. Bruniacëae R. Br., 28. F. Empetrëae Nutt., 29. F. Euphorbiacëae Juss., 30. F. Stackhousëae R. Br.
5. Ord. **Malpighiinae** Bartl.: 31. F. Rhizobolëae DC., 32. F. Hippocastanëae DC., 33. F. Sapindacëae Juss., 34. F. Erythroxylëae Kth., 35. F. Coriariëae DC., 36. F. Acerinëae DC., 37. F. Malpighiacëae Juss.
6. Ord. **Ampelidëae** Bartl.: 38. F. Cedrelëae R. Br., 39. F. Meliacëae Juss., 40. F. Leeacëae Bartl., 41. F. Sarmentacëae Vent. Reben.
7. Ord. **Gruinales** Bartl. Schnabelpfl.: 42. F. Oxalidëae DC., 43. F. Linëae DC., 44. F. Geraniacëae DC., 45. F. Tropaeolëae Juss., 46. F. Hydrocerëae Blum., 47. F. Balsaminëae A. Rich.
8. Ord. **Columniferae** Bartl.: 48. F. Malvacëae Bartl., 49. F. Dombeyacëae Kth., 50. F. Hermanniacëae Kth., 51. F. Büttne-Glaser, Botan. Taschenwörterbuch. 31

- riacēae R. Br., 52. F. Sterculiacēae Kth., 53. F. Tiliacēae Kth., 54. F. Dipterocarpēae Blum.
9. Ord. **Lamprophyllae** Bartl.: 55. F. Chlaenacēae P.-Th., 56. F. Ternstroemiacēae DC., 57. F. Camelliacēae DC. (Theacēae Rchb.).
10. Ord. **Myrtinae** Bartl.: 58. F. Myrtacēae R. Br., 59. F. Lecythidēae Rich., 60. F. Melastomacēae Don, 61. F. Memecylēae DC.
11. Ord. **Calycanthinae** Bartl.: 62. F. Calycanthēae Lindl., 63. F. Granatēae Don.
12. Ord. **Calyciflorae** Bartl.: 64. F. Combretacēae R. Br., 65. F. Vochoysiācēae Mart., 66. F. Rhizophorēae R. Br., 67. F. Philadelphēae Don, 68. F. Onagrariae Juss., 69. F. Lythriarīēae Juss., 70. F. Haloragēae R. Br.
13. Ord. **Succulentae** Bartl. (Corniculatae Rchb.): 71. F. Cunoniacēae R. Br., 72. F. Saxifragēae Vent., 73. F. Crassulacēae DC. (Sedēae Rchb.), 74. F. Ficoīdēae Juss. (Aizoīdēae Spr.), 75. F. Nitrariacēae Lindl.
14. Ord. **Caryophyllinae** Bartl. Wendl.: 76. F. Silenēae Bartl. Nelken, 77. F. Alsinēae Bartl. Mieren, 78. F. Portulacēae Bartl., 79. F. Paronychiēae St. Hil. (Illecebrēae DC.), 80. F. Scleranthēae Lk., 81. F. Phytolaccēae R. Br., 82. F. Amaranthacēae R. Br., 83. F. Chenopodiācēae DC. (Atripliciēae Rchb.).
15. Ord. **Guttiferae** Bartl.: 84. F. Garciniēae Bartl. (Clusiēae Rchb. Canellēae DC.), 85. F. Hypericīnēae DC., 86. F. Frankeniācēae St. Hil. Salzpfl.
16. Ord. **Cistiflorae** Bartl.: 87. F. Tamariscīnēae Desv., 88. F. Parnassīēae Rchb., 89. F. Droseracēae DC., 90. F. Sarraceniēae Turp. Kannenträger, 91. F. Sauvagesiēae Bartl., 92. F. Violariēae DC., 93. F. Cistinēae DC., 94. F. Bixinēae Kth., 95. F. Margraviēae Juss., 96. F. Flacourtiācēae Rich.
17. Ord. **Peponiferae** Bartl.: 97. F. Nopalēae DC., 98. F. Grossulariēae s. Ribesiācēae DC., 99. F. Escalloniēae R. Br., 100. F. Cucurbitacēae Juss., 101. F. Loasacēae Juss. Brennwinden, 102. F. Turneracēae DC., 103. F. Malesherbiācēae Don, 104. F. Passiflorēae Juss., 105. F. Papayacēae Mart. Melonenbäume, 106. F. Homalinēae R. Br., 107. F. Samydēae Gärt. Birkenpflaumen.
18. Ord. **Rhoeadae** Bartl.: 108. F. Cappariidēae Vent., 109. F. Cruciferae Juss. (Siliquosae, Latiseptae s. Siliculosae, Angustiseptae, Nucamentaceae, Lomentaceae), 110. F. Papaveracēae DC., 111. F. Fumariācēae DC., 112. F. Resedacēae DC., 113. F. Polygalēae Juss. Bitterlinge, 114. F. Tremandracēae R. Br.
19. Ord. **Hydropeltidēae** Bartl.: 115. F. Nymphaeacēae Bartl., 116. F. Nelumbonēae Bartl., 117. F. Cabombēae Rich. Haarnixen.
20. Ord. **Polycarpiacae** Bartl.: 118. F. Ranunculacēae Juss., 119. F. Paeoniācēae Bartl., 120. F. Dilleniācēae DC., 121. F. Magnoliācēae DC. (Illiciēae DC. Rchb.)
21. Ord. **Trisepalae** Bartl.: 122. F. Anonacēae Rich., 123. F. Myristicēae R. Br. Muskatnussartige.
22. Ord. **Cocculinae** Bartl.: 124. F. Menispermēae Juss., 125. F. Berberidēae Vent.
23. Ord. **Umbelliflorae** Bartl. Schirmblüter: 126. F. Hamamelidēae R. Br. Zaubersträucher, 127. F. Hederacēae A. Rich. (Cornēae DC.), 128. F. Araliācēae Juss., 129. F. Umbelliferae Juss. (Umbellatae L.) (Orthospermae, Campylospermae, Coilospermae).
24. Ord. **Loranthae** Bartl.: 130. F. Loranthacēae Don Mistelartige.

2. Unterkl. **Gamopetalae** DC. (**Monopetalae** Juss.)

25. Ord. **Ligustrinae** Bartl. (Oleaceae Lindl.: 131. F. Oleinae Lk. (Oleinae u. Fraxinae), 132. F. Jasminae R. Br.
26. Ord. **Rubiaceae** Bartl. (Rubiaceae Juss.): 133. F. Viburninae Bartl. Holdergew., 134. F. Caprifoliaceae Bartl. (Lonicerae R. Br.), 135. F. Cinchonaceae Lindl. (Coffeina u. Cinchona), 136. F. Stellatae L. (Ophiorrhizae, Hameliaceae, Genipae), 137. F. Lygodysoideaceae Bartl. Stinkschlingsträucher.
27. Ord. **Contortae** Bartl.: 138. F. Loganinae R. Br., 139. F. Apocynae R. Br., 140. F. Asclepiadaceae R. Br., 141. F. Gentianinae Juss.
28. Ord. **Tubiflorae** Bartl.: 142. F. Boraginae Juss. (Asperifoliae scharfblättr. u. Tournefortia), 143. F. Hydrophyllae R. Br., 144. F. Solanaceae Rchb. (Solaninae Beeren-, Datura Kapselfr.), 145. F. Cuscutae Presl, 146. F. Convolvulaceae Vent., 147. F. Hydroleaceae R. Br. Klebergew., 148. F. Polemoniaceae Vent.
29. Ord. **Labiatiflorae** Bartl. (Personatae u. Nuculiferae): 149. F. Bignoniacae R. Br., 150. F. Acanthaceae R. Br., 151. F. Labiatae Juss., 152. F. Verbenaceae Juss., 153. F. Selagininae Juss., 154. F. Myoporinae R. Br., 155. F. Sesaminae DC., 156. F. Cyrtandraceae Jacq., 157. F. Gesneriaceae Rich., 158. F. Orobanchinae Juss., 159. F. Scrophularinae R. Br. (Personatae u. Rhinanthaceae Juss.) (Verbascinae, Antirrhinae, Veronicae, Rhinantha, Crescentiaca), 160. F. Lentibulariae Rich. (Utriculariinae Seub.)
30. Ord. **Myrsininae** Bartl. Myrrhen: 161. F. Primulaceae Vent., 162. F. Ardisiaceae Juss.
31. Ord. **Styracinae** Bartl.: 163. F. Sapotae R. Br. DC., 164. F. Ebenaceae Juss., 165. F. Styracinae Rich.
32. Ord. **Ericinae** Bartl.: 166. F. Epacridae R. Br., 167. F. Ericinae R. Br. (Arbutinae, Ericinae, Pirolinae, Rhododendrinae s. Rhodoraaceae), 168. F. Monotropinae Nutt. Ohnblätter, 169. F. Vaccininae DC.
33. Ord. **Campanulinae** Bartl.: 170. F. Campanulaceae DC., 171. F. Lobeliaceae Juss., 172. F. Stylidinae R. Br., 173. F. Goodevinae R. Br.
34. Ord. **Compositae** Bartl.: 174. F. Synantherinae Rich. (Cassiniaaceae Sch. Bip. Syngenesia L.) Röhrenbeutelige (Corymbiferae Vaill. DC. od. Radiatae Juss., Cynarocephalae Juss. s. Capitatae L., Cichoriaceae Rchb. s. Ligulatae L.), 175. F. Ambrosiinae Lk. Spitzkletten, 176. F. Calycerinae R. Br. Kelchhornartige.
35. Ord. **Aggregatae** Bartl.: 177. F. Valerianinae DC., 178. F. Dipsacinae DC., 179. F. Globulariinae DC., 180. F. Plumbagininae Vent., 181. F. Plantaginae Vent.

3. Unterkl. **Monochlamydeae** DC. (**Apetalae** Juss.)

36. Ord. **Proteinae** Bartl.: 182. F. Proteaceae R. Br., 183. F. Aquilariinae R. Br. Adlerhölzer, 184. F. Thymelaeinae Juss., 185. F. Elaeagninae R. Br., 186. F. Santalaceae R. Br., 187. F. Laurinae Vent.
37. Ord. **Fagopyrinae** Bartl.: 188. F. Nyctagininae DC., 189. F. Polygoninae Juss., 190. F. Begoniaceae R. Br.
38. Ord. **Urticinae** Bartl.: 191. F. Urticinae Bartl., 192. F. Artocarpinae

- Bartl. (Morëae, Artocarpëa u. Platanëae), 193. F. Monimiëae Juss. Trommelbaumartige.
39. Ord. **Iteoidëae** Bisch. Weidenartige: 194. F. Balsamiflûae Blum., 195. F. Salicinëae Rich.
40. Ord. **Amentacëae** Bartl. Kätzchenträger: 196. F. Ulmacëae Mirb., 197. F. Juglandëae DC., 198. F. Cupulifërae Rich., 199. F. Betulacëae Bartl., 200. F. Myricëae Rich., Gageln, 201. F. Casuarinëae Mirb. Keulenbäume.
41. Ord. **Conifërae** Bartl.: 202. F. Taxinëae Rich., 203. F. Cupressinëae, Rich., 204. F. Abietinëae Rich., 205. F. Cycadëae Rich. Zapfenpalmen.
42. Ord. **Piperinae** Bartl.: 206. F. Chloranthëae R. Br. Pflaumenpfefferartige, 207. F. Piperacëae Rich., 208. F. Saururëae Rich.
43. Ord. **Aristolochiëae** Bartl.: 209. F. Taccacëae Presl Arrowrootgew., 210. F. Asarinëae R. Br., 211. F. Cytinëae Brongn. Hypocistgew., 212. F. Balanophorëae Rich. Kolbenschosser.
44. Ord. **Ceratophyllinae** Bisch.: 213. F. Ceratophyllëae Gray, 214. F. Nepenthëae Lindl. Kannenträger.

II. Kl. *Monocotyledonëae* Juss.

1. Unterkl. *Symphysogynae* A. Rich. (verwachsenweibige).

45. Ord. **Hydrocharidïnae** Bisch. Nixenkräuter: 215. F. Hydrocharidëae DC.
46. Ord. **Scitaminëae** Bartl. Gewürzlilien: 216. F. Musacëae DC., 217. F. Cannacëae Ag., 218. F. Amomëae Rich. (Zingiberacëae Ingewergew.).
47. Ord. **Orchidïnae** Bisch.: 219. F. Orchidëae Juss. (phyllocaulae, gymnocaulae, exoticae s. epiphytae).
48. Ord. **Ensatae** Bartl. Schwertblättrige: 220. F. Bromeliacëae Lindl. Ananasingew., 221. F. Amaryllidëae R. Br. (ohne u. mit Nebenkronen), 222. F. Iridëae R. Br., 223. F. Haemodora-cëae R. Br. Blutwurzarzt., 224. F. Hypoxidëae R. Br. Härtlinge, 225. F. Burmanniacëae Bartl.

2. Unterkl. *Eleutherogynae* A. Rich. (freiweibige).

49. Ord. **Liliacëae** Bartl.: 226. F. Dioscorëae R. Br. Yamswurzelart., 227. F. Smilacëae R. Br., 228. F. Colchicacëae DC., 229. F. Asphodelëae Bartl. Affodillilien (Zwiebelknollige u. Faserknollige).
50. Ord. **Palmae** Bartl.: 230. F. Palmae L. (Coryphëae Fächer-, Phoenicëae Fieder- u. Calamëae Rotangpalmen).
51. Ord. **Aroidëae** Bartl.: 231. F. Typhacëae DC. Rohrkolben, 232. F. Pandanëae R. Br. Palmkolben, 233. F. Orontiacëae Bartl. Kalmusgew., 234. F. Callacëae Bartl.
52. Ord. **Helobiae** Bartl. Sumpflilien: 235. F. Butomëae Rich. Blumenbinsen, 236. F. Alismacëae Rich. Froschlöffel, 237. F. Juncaginëae Rich. Binsenartige, 238. F. Podostemëae Rich. Stiefaden, 239. F. Najadëae A. Rich. (Potamogëae DC.) Najaden od. Laichkräuter, 240. F. Lemnacëae DC. Wasserlinsen.
53. Ord. **Juncinæ** Bartl. Gras- od. Schilflilien: 241. F. Commelynacëae R. Br., 242. Xyridëae Kth Degenkräuter, 243. F. Restiacëae R. Br. Strickgräser, 244. F. Juncacëae Binsen od. Halbgräser.

54. Ord. **Glumacëae** Bartl. Balg- od. Spelzblütige: 245. F. Cyperacëae DC. (Cyperëae, Scirpeae Simsen, Caricëae Seggen), 246. F. Graminëae Juss. Gräser (Süssgr.-) (Rispengräser u. Ährengr.-).

B. Cryptogamae L. (Acotyledonëae Juss.) Kryptogamen oder Sporenpflanzen.

III. Kl. *Cryptogamae vasculares, Gefässkryptogamen.*

55. Ord. **Goniocaulae** DC. Gliederfarne: 247. F. Equisetacëae DC. Schaft- halme.
56. Ord. **Filicëae** DC. Farne: 248. F. Rhizocarpëae Batsch Wurzel- od. Wasserfarne, 249. F. Isoëtëae Bartl. (Selaginellëae Frank), 250. F. Lycopodiacëae DC. Bärlappe od. Moosfarne, 251. F. Ophioglossëae R. Br. Natterzungen, 252. F. Filices Juss. Farnkräuter, Wedel- od. Laubfarne (Marattiacëae Kaulf., Osmundacëae R. Br., Schizaeacëae Mart., Gleicheniacëae Kze., Cyatheacëae R. Br. Baumf., Parkeriacëae Hook., Polypodiacëae Mett.).

B. Plantae cellulares, Zellenpflanzen.

IV. Kl. *Cryptogamae cellulares, Zellenkryptogamen.*

a. Foliosae, beblätterte.

57. Ord. **Muscëae** DC. Moose: 253. F. Musci Juss. Laubmoose (M. frondosi, Bryëae Schimp. (a. Stegocarpi Deckelfrücht., b. Cleistocarpi Schliessfrücht., c. Schistocarpi C. Müll. Spaltfrücht.), 254. F. Sphagnacëae C. Müll. (Sphagnëae Schimp.) Torfmoose, 255. F. Anthocerotëae Nees Fruchthornmoose, 256. F. Ricciacëae Rchb., 257. F. Hepaticëae Juss. Lebermoose.
58. Ord. **Siphonocaulae** Bisch. Röhrenalgen: 258. F. Characëae Rich.: Armleuchter.

b. Aphyllae, blattlose.

59. Ord. **Algëae** Bartl.: 259. F. Lichënes DC. (a. Gymnocarpi, b. An- giocarpi, c. Collemacëi, d. Byssacëi), 260. F. Algae DC. (a. Floridëae Ag. s. Rhodospermëae Harv. Blüten- od. Rot- tange, b. Fucoïdëae Ag. s. Melanospermëae Harv. Leder- od. Schwarzotange, c. Confervacëae Ag. Fadenalgen, d. Siphon- nëae Grev. Schlauchalgen, e. Palmellacëae Näg. Zitteralgen, f. Conjugatae Vauch. Jochalgen, g. Diatomacëae Harv. Stückelalgen, h. Phycochromacëae Rabenhorst Phycochrom- haltige).
60. Ord. **Fungëae** Bartl. (Mycëtes Spr.) Pilze: 261. F. Hymenomycëtes Fr. Hautp. (Hutp.), 262. F. Pyrenomycëtes Fr. Kernp., 263. F. Gasteromycëtes Fr. Bauchp., 264. F. Hyphomycëtes Fr. Fadenp., 265. F. Coniomycëtes Fr. Staubpilze (Brand, Rost etc.).

Nachzutragen:

- S. 4: **antidrom** (Gegens. zu homodrom) gegenläufig (s. homodromia).
 „ 11: **convergens** zusammenneigend, „convergent“.
 „ 13: **delphinialis** aus der Dauphinée (Frankr.).
 „ 15: **dipyrenus** mit zwei Steinkernen (näml. drupa).
 „ 15: **divergens** auseinanderlaufend.
 „ 17: **eximius** aussergewöhnlich, ausgezeichnet.
 „ 23: **homodrom** gleichläufig (s. sogl.).
 „ 26: **latipes** breitfüssig, -stielig.
 „ 34: **orthostichus** m. senkr. Blattzeile (Blattstellung).
 „ 34: **ortus** Aufgang, Entstehung (v. orior 4).
 „ 35: **parallelinervius** parallel- od. streifennergig (Blatt).
 „ 38: **phycoanthinum** Tangelbstoff (*φύκος* u. *ξανθός*).
 „ 38: **pinax** (*πίναξ*, -ακος) Brett, Tafel, Gemälde.
 „ 40: **polypyrēnus** mit vielen Steinkernen (s. pyrēna).
 „ 42: **quintuplinervius** fünfnervig (näml. Blatt).
 „ 44: **rhachis** Blattspindel d. Fiederblätter (*ράχις* Rückgrat).
 „ 54: **triplinervius** dreinervig, -rippig (Blatt).
 „ 383: **Coir** (Roya, Kokosfaser) *Cocos nucifera*.
 „ 383: **Copra** (Kopperah, Kokosnusskerne) *Cocos nucifera*.

Wesentlichere Druckfehler.

- | | |
|---|---|
| <p>S. 57: visigēnus st. vitigēnus.
 „ 75: Kletten = Labkraut st. Kletten-Labkr.
 „ 85: Bainster st. Banister.
 „ 99: Butaceae st. Rutaceae.
 „ 99: arobescens st. arborescens.
 „ 130: Botrytus st. -tis.
 „ 184: Glycesia st. -ceria.
 „ 190: -ähren = Acanthus st. -ähren-Acanth.
 „ 222: Kiefer st. Kieser.
 „ 244: <i>Avxia</i> st. <i>Avxia</i>.</p> | <p>S. 264 unten: „Muschia“ st. „Muschesche’s“.
 „ 266 oben: berry-Myrte st. -myrtle.
 „ 273 oben: Noissetia XXI. 6. st. XIX. 6.
 „ 287: hermesina st. kermesina.
 „ 288: <i>πελεκος</i> st. -χυς.
 „ 294 unten: <i>φοίνυξ</i> st. <i>φοίνιξ</i>.
 „ 298 oben: Strombus st. Strobos.
 „ 299 unten: Plantaneen st. Plat.-blättrig.
 „ 316 unten: kochblättrig st. kahlblättrig.
 „ 386: Coriari st. -ria.</p> |
|---|---|

Werke zur Botanik

aus dem Verlage von

T. O. Weigel in Leipzig.

Aus der reichen Sammlung der zumeist wissenschaftlich gehaltenen Werke meines Verlags hebe ich **einige** hervor, welche auch von **allgemeinerem Interesse** sind.

Zu den **Tafelwerken älteren Ursprungs** bemerke ich, dass die **Farben der kolorierten Abbildungen** nicht mittels der Druckpresse, sondern **mit der Hand aufgetragen** sind, wodurch die Abbildungen ein wirklich künstlerisches Gepräge erhalten. Hinsichtlich der Schönheit und Naturtreue überragen diese handkolorierten Werke die Erzeugnisse der Druckpresse natürlich ganz ausserordentlich.

Briefe über Humboldt's Kosmos. Ein Kommentar zu diesem Werke für gebildete Laien, bearbeitet von *B. von Cotta, Julius Schaller, W. C. Wittwer* und *H. Girard*. 4 Teile mit Supplement (Biographie Humboldt's, herausgegeben von Dr. Wittwer), **also 5 Bände**, mit Karten, lith. Tafeln und vielen Holzschnitten. Ermässigtter Preis (früher 46 *M* 50 *ſ*)

☞ 10 Mark. ☞

Ein vortrefflicheres, gediegeneres Werk kann für so mässigen Preis schwerlich geboten werden.

In einer kleinen Anzahl von Exemplaren sind noch vorhanden:

Deutschlands Flora oder Botanisches Taschenbuch. Von **G. F. Hoffmann**. 2 Teile in 3 Abteilungen. Mit 38 handkolorierten Kupfern. 1800—1804. Ermässigtter Preis (früher 18 *M*) 4 *M* 50 *ſ*

Deutschlands Gräser und Getreidearten zu leichter Erkenntnis nach dem Wuchse, den Blättern, Blüten und Früchten zusammengestellt und für die Land- und Forstwirtschaft nach Vorkommen und Nutzen ausführlich beschrieben von Dr. **Carl F. W. Jessen**. Mit 208 Holzschnitten. 1869. 5 *M* 40 *ſ*

Taschenbuch für Gartenfreunde. Eine Erläuterung von 1960 Zierpflanzen nach natürlichen Familien geordnet und mit Nachweisungen zu ihrer Kultur versehen von **H. G. L. Reichenbach**. 1827. Ermässigtter Preis (früher 3 *M*) 1 *M*

- Doblhoff, Über die Drainage. Ein Beitrag z. wissensch. Begründ. u. z. prakt. Ausführg. dieses Systems andauernder Bodenverbesserung etc. 1851. 75 *ſ*.
- Drejer, S., *Symbolae caricologicae* etc. Mit 17 Taf. u. 3 Tab. 1844. 15 *M*.
- Hedwig, R. Ad., *Observationum botanicarum Fasc. I.* Mit 11 kolor. Tafeln. 1802. 3 *M*.
- Hoffmann, G. F., *Deutschlands Flora*, od. botan. Taschenbuch. 2 Teile mit 38 kol. Tafeln. 1800—1804. 3 *M*.
- v. Holleben, Aufforstung verödeter Muschelkalkberge unter Anknüpfung an d. Verhältn. im Fürstent. Schwarzburg-Rudolstadt. 2. Aufl. 1862. 1 *M*.
- Jacquin, Nic. Jos., *Plantarum rariorum horti Caesarei Schönbrunnensis descriptiones et icones*. Mit 500 kolor. Taf. 4 voll. 1797—1804. 240 *M*.
- *Oxalis*. Monographia, iconibus illustrata. Mit 81 kolor. Tafeln. 1794. (Einziges noch vorhand. Expl.) 120 *M*.
- Ledebour, C. Fr., *Icones plantarum novarum vel imperfecte cognitarum, florum Rossicam, imprimis Altaicam, illustrantes*. 5 tomi. Mit 500 kolor. Tafeln. 1829—1834. 225 *M*.
- v. Martius, C. Fr. Ph., *Genera et species palmarum quas in itinere per Brasiliam annis 1817—1820 suscepto collegit etc.* 3 voll. Mit 245 kol. Taf. u. d. Portr. d. Verf. 1823—1840. 1000 *M*. Mit schwarzen Kupfern 600 *M*.
- *Nova genera et species plantarum, quas in itinere etc.* 3 voll. Mit 300 kolor. Tafeln. 1823—1829. 300 *M*.
- *Icones plantarum cryptogamicarum, quas in itinere etc.* Mit 76 kolor. Tafeln. 1828—1834. 120 *M*.
- *Reise in Brasilien*, auf Befehl Sr. Maj. Max Joseph I. Königs v. Bayern, in den Jahren 1817—1820 gemacht u. beschrieben von Dr. J. v. Spix u. Dr. C. v. Martius. 3 Teile. Mit Atlas. 1823—1831. gr. 4. 100 *M*.
- *Pflanzen u. Tiere d. trop. Amerikas*. Mit 4 lith. Tafeln. 1831. 4 *M* 50 *ſ*.
- Mettenius, G., *Beiträge z. Botanik*. I. Heft. 6 lith. Taf. 1850. 2 *M* 40 *ſ*.
- Paykull, *Fauna Sueciae insulae*. 3 tomi. 1798—1800. 6 *M*.
- Persoon, C. H., *Commentarius ad Jac. Chr. Schaefferi fungorum Bavaricae indigen. icones etc.* 1800. 8 *M*.
- *Mycologia Europaea etc.* I. II. III. 1. M. 30 kol. Taf. 1822—1828. Kart. 24 *M*.
- Petzholdt, Alex., *Beitrag z. Kenntnis der Steinkohlenbildung etc.* Mit 1 Tafel. 1882. 1 *M* 50 *ſ*.
- Pohl, J. E., *Plantarum Brasiliae icones etc.* 2 tomi. Mit 200 kolor. Tafeln. gr. fol. 1827. (1830) et 1831. In Mappen. 240 *M*.
- *Dasselbe*. Pracht-Ausg. auf grossem Papier. 400 *M*.
- *Reise im Innern von Brasilien*, in den Jahren 1817—1821 unternommen. 2 Teile. 1837. 50 *M*.
- Reinsch, P. F., *Contributiones ad algologiam et fungologiam*. I. Mit 131 Tafeln. 1875. Kart. 60 *M*.
- *Neue Untersuchungen über d. Steinkohle des Carbon, des Dyas u. Trias*. Mit 94 Tafeln. 1881. Kart. 50 *M*.
- *Mikrophotographien üb. d. Structurverhältnisse u. Zusammensetzung d. Steinkohle des Carbon etc.* 73 phot. Darstellgn. nebst einem landschaftl. Titelbilde. 1882. In Mappe. 60 *M*.
- *Dünnschliffe hierzu*. I. Serie zu 24 Stück 64 *M*. II. Serie zu 12 St. 36 *M*.
- Schäffer, J. Chr., *Fungorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur, icones, nativis coloribus expressae*. Ed. nova comm. aucta a C. H. Persoon. 5 tomi. Mit 330 kolor. Tafeln. 1800. 108 *M*.
- Schmidel, C. Chr., *Icones plantar. Editio secunda*. 3 manipuli mit 75 kolor. Tafeln. 1793—1797. 60 *M*.
- *Vorstellung einiger merkwürdiger Versteinerungen etc.* Mit 24 kolor. Tafeln. 1793. 10 *M*.
- *Descriptio itineris per Helvetiam, Galliam et Germaniae partem anno MDCCLXXIII et MDCCLXXIV instituti*. Mit 2 Tafeln. 1794. 1 *M*.
- Swartz, Ol., *Observationes botanicae, quibus plantae Indiae occidentalis etc. illustr. etc.* Mit 11 Taf. 1791. 2 *M*.
- *Flora Indiae occidentalis etc.* 3 Tle. mit 29 kol. Tafeln. 1797—1806. 15 *M*.
- *Icones plantarum incognitarum, quas in India occident. detexit atque delin.* Ol. Swartz. Fasc. I. Enth. Bog. A. B. mit 13 kolor. Taf. 1794—1800. 9 *M*.
- *Dispositio systematica museorum frondosorum Sueciae*. Mit 9 kolor. Tafeln. 1779. 4 *M*.
- Wulfen, Xav., *Plantarum rariorum descriptiones*. 1805. 1 *M*.
- *Cryptogama aquatica*. Mit 1 Tafel. 1803. 2 *M* 25 *ſ*.

