

Oui, mais elles poussent continuellement, ce qui les maintient toujours à la même longueur.



Fig. 56. — L'Écureuil.
Rongeur. — Long. 0m, 25.



Fig. 57. — Le Loir.
Rongeur. — Long. 0m, 16.



Fig. 58. — Le Lérot.
Rongeur. — Long. 0m, 15.

Les principaux rongeurs de nos contrées sont l'Écureuil (fig. 56), agile comme un singe, si gai, si joli, si vif, en été du moins, car en hiver il dort dans son nid; le Loir (fig. 57) et le Lérot (fig. 58), qui sont plus petits que lui, mais qui ne sont pas moins jolis, et hibernent* encore mieux. Puis les



Fig. 59. — Le Campagnol. Rongeur.
Long. 0m, 08.



Fig. 60. — Le Lièvre. Rongeur.
Long. 0m, 65.

Rats, les Mulots, les Souris et les Campagnols (fig. 59), à qui leurs rapines* ont donné une si détestable réputation; le Lièvre (fig. 60) et le Lapin, bien connus de tout le monde;



Fig. 61. — La Marmotte
(Alpes). Rongeur. —
Long. 0m, 35.



Fig. 62. — Le Castor
(Amérique du Nord).
Rongeur. — L. 0m, 80.



Fig. 63. — Le Porc-épic
(Italie et Afrique). Ron-
geur. — Long. 0m, 65.

la Marmotte (fig. 61), commune dans les Alpes*, et célèbre surtout par son sommeil hivernal.

Il faut encore compter le Castor (fig. 62) dont on trouve quelques individus sur les bords du Rhône*; mais c'est dans l'Amérique du Nord que l'on rencontre surtout ce gros ron-