



46







Tan from Countway Lib.
OCT 31 1999

赤水玄珠第二十八卷痘疹心印

新安生生子孫一奎著



異痘須知

夫痘有似凶而吉有似吉而凶者不可不知

天根痘

諸痘不起壯而天庭或曉星起灌者乃精氣外生故曰天根十有九生

天空痘

諸痘壯氣而天庭或曉星不壯者乃血不灌頂也故曰天空十無一生

明朗痘

諸痘不起而太陽獨起者吉日為明太陽之謂也

明蝕痘

諸痘起壯而太陽

海溢痘

諸痘不起而耳後方員一寸獨起此名曰宿海溢是腎經旺也可治

海枯痘

諸痘起而耳後方員一寸獨不起

又云

有根痘

凡痘出頭面多四肢密者十分危險若

無根痘

或灰白不起者腎水絕也不治

抱鼻痘

面部俱稀而鼻梁左右密如蚕種者此

單瑣口

諸痘獨大者名曰單瑣口

雙瑣口

名曰雙瑣口皆惡候也

猪頭痘

出而頭窩太多者急用山豆根玄參

逆痘

上少下多者名曰逆痘此無大害

兩頭痘

初標時看自脊而上自臍而下俱有而

鬼捏痘

傷痕一一般故名鬼捏不治

鬼痘

者名曰鬼痘又曰無頭痘五日之內可

者腎敗也

左耳

齒乾如不急救

地角方員畧有數粒圓如珠者十有十

痘生蓋腎為根本此

諸痘俱好而地角方員陷伏乾枯

面部俱稀而鼻梁左右密如蚕種者此

面部俱稀而鼻梁左右密如蚕種者此

諸痘獨大者名曰單瑣口

名曰雙瑣口皆惡候也

出而頭窩太多者急用山豆根玄參

桔梗甘草生地芩歸山查木通荆芥牛

子水煎遲則毒

結于喉而死

上少下多者名曰逆痘此無大害

初標時看自脊而上自臍而下俱有而

傷痕一一般故名鬼捏不治

者名曰鬼痘又曰無頭痘五日之內可

救五日之外難救蓋氣血下行不能上
升急用升麻川芎白芷蘘葉前胡甘草
桔梗防風當歸芎藭尖姜水煎服如不治
曲池生毒一月見骨而死若身上四肢
稀少者不可
遂作鬼痘看

賊痘

痘初出便如綠豈過一日便如黃豈大
再一日又如員服大名曰賊痘其痘根
巢與頂全無血色形雖起照按至虛軟
至四五日上下出血而死但此諸痘
獨大其大甚速者就昇

蛇皮痘

頭面遍身無空地平塌而色白者
名蛇皮必乾枯不能作漿至十一二
日必死
初標紅潤至四五日變暗伏不起將
至粟疔以名為藥惡急用杖夫重為上

藥患痘

九焦痘

當額地閣顛骨背耳後手足皆
二箇黑陷者名曰九焦痘不治

伏陰痘

痘不貫膿而瀉膿血
故名伏陰急宜溫裏

空倉痘

痘雖肥滿而內實乾枯全無血水
乃空倉也決死之症

石白痘

痘中有凹而四弦特起明亮好看內實
漿板不化以手摸之其硬如石因形狹
石旧故名之以此

症斷不可治

菜萸痘

痘不甚起而中亦有凹四弦皆有縐紋
以其形似菜萸故名之也若得根窠紅

活者服內托散去防風白芷頂中發黑
點者保元湯加芎藭身壯熱者入酒炒

虫痘

痘瘡痒甚者不必夏月中蠅生蛆雖寒
月亦有用簪挑去而愈或謂用柳條鋪

下令兒卧於上則蛆自出以蓋毒留
皮膚延綿日久臍膚熱腐故耳譬之
草為螢朽木生

血疱痘

血疱痘者血協熱毒而自漿也刺胞血
疣紅者尚可治急與犀角地黃湯加白
芍以制血解毒血黑者不治身熱者小
柴胡湯加生地血漿不能收靨者紫草
煎湯調下

血靨痘

痘出稀少四五日胖如碗豆六七日血
靨而乾亦似丹砂九日而痧落以氣血
充足毒少故隨出隨愈不及釀

白漿痘

痘初起發瘡頭便帶白漿者以疫癘痘
也但有以便不可治主七日死
若瘡起發根窠四畔只發一二粒損

漏瘡痘

瘡出頭有孔膿水漏出堆聚乾
如天疱瘡及癩頭之形者或清或濁

疔痘

無事自破水去而乾黑者以毒氣
為傳染相似俗名漏瘡未用能治者
起腫時痘上有小疔不黑不白名曰疔

疔痘

疔皆膿理不密而有疔是痘大泄元氣急
用保元湯加丁香香薷
其孔一密而痘自起矣

隱血斑

其形如豆壳灰白全無血色擦破而後
血出亦無膿血故曰隱血斑也不治

赤萍瘡

痘已出齊或未齊如赤萍微高起
若爬出有血急以解毒并發藥救之如
成爛痘則

紫萍瘡

痘已出齊紫色不起不毒藥如
浮萍貼在肉上者不治

白萍瘡

同上

草尾珠

其痘遍身俱陷惟髓骨一團飽滿如珠此症可治補托灌膿即痊矣

黑痘

盧廉夫曰黑痘多屬血熱黑痘本為惡証世醫恒棄而不治然形狀多端犹可解救須當辨而治之但血不活者則難救矣

一痘紫黑或黑點子隱在皮膚之間者無比

散或人牙散用猪尾血三五滴酒調下小兒

三分大人五分

一初出便是黑點急用紫草茸二三錢醇酒

半盞煎至三分

一其形如痣皮膚發青紫紋者服透肌散或

加防風荆芥

一形如牽牛而色紫敗又黑痕併黑靨者並

用蟬退二十五箇紫草茸一錢水煎服

一痘黑如煤炭血不紅活者用活血散一錢

酒煎紫草湯下

一痘黑而皮膚皆黑成片者化毒湯加蟬退

地骨皮酒炒黃芩

一痘黑大而軟者氣弱而熱毒盛也用保元

加紫草

一痘焦黑潮熱煩躁者小無比散并水磨犀

角調下一錢

氣血兩敗痘

近看猶如水蓼花 遠望胭脂
紫可誇 臨漿清水不成膿

古聖神農 無治法

復出痘

先見標一二點于面部或口唇上下如
常起脹貫漿收靨不知者以為痘本稀
少故也然以火照之紅點隱然藏于
皮膚之內急用內托解散則痘復出不
然順下決發一毒不急散
其毒而發其痘即死

雲翼子二十八般異痘姑錄于后以備參看

一彤雲繞頂

遍身痘好但頭頂一片紅赤

一紫雲灌頂

遍身痘好但頭頂紫乾隔衣不

一烏紗覆頂

其症必咽喉啞塞鼻氣大粗乃

一梨花漫頂

血衰氣敗而元陽脫也不治

一雲掩天庭

用保元湯加天雄
統或可救
遍身磊落光澤惟額上一片血

瘡如雲者乃心家客熱甚也急
磨犀玳

一紫萍鋪額

其症熱甚咽喉悶亂發狂用示
無比散加玄參升麻犀角

一烏紗落額

不治

一灰撲印堂

與症心家少血也若兼腹脹咽
乾用保元湯加白芍涼血解毒

好湯

楊花撲面

用內托散

赤珠繞唇

此乃脾經極熱也用

烏飯沾唇

此証必聲啞神昏目精不轉四肢厥冷喉响如鋸三朝七日乃

也

霞錦穿胃

此因火毒深盛

紫雲佈胃

此症血枯氣滯毒來攻胃也其症必咬牙戰掉口唇焦裂頃刻

命傾

黑棋排胃

三朝决死

柳絮

此乃血氣枯弱也保元湯

桃花

此症清火解毒可生

紫葢

背 不治

黑砂

背 不治

雪鋪

此血已枯

赤鱗

此症必大便秘小便淋瀝乃胃家熱甚也用五苓甘露以和解

黑段

此症必肚內膨脹聲音

白梨

此血衰敗也半月

葡萄

此症必紅紫一片若葡萄者兩日命終

一爛粟居

遍身俱好惟臀上一片如粟壳

一榴花散野

諸痘俱好惟四肢紅赤而唇口崩裂者乃心脾肺三經熱也頭

涼血清火解毒

一黑珠遍躰

四肢枯黑如火燒紫頭口中涎出氣冷朝夕死矣

一楊花墮枝

手足獨灰白者氣凝血滯也八珍湯加附子治之

婦女痘

童女出痘與童男相同無以議也但天癸通者則

治法不能不異且夫發熱之初適遇經水如期

而至則熱隨血解痘出亦輕不須服藥若過三

四日而熱不止痘不出者以熱入血室血必

行為內動中虛之患宜涼血地黃湯加入參治

之

一非經行之期於發熱之際而經忽至者此毒火

內熾逼血妄行之故必痘多而毒盛急用涼血

解毒湯倍加連翹牛旁使熱得清毒得解痘得

出經得止始無他變遲則內虛痘必陷矣柳花

散佳

一正當起發灌漿之時適遇經行過三日不止痘

應起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌
或灰白或黑陷此為經血去多陰血虧耗必為
陷伏壞症矣急以八物湯去地黃加黃耆木香
熟附子以調元氣或葫荑酒噴之使痘起發灌
漿或出增痘者為吉若寒戰咬牙喘急腫滿手
足厥冷者為內脫不治之症矣

一起發灌漿之時經水適來忽口瘡而不能言者
乃血入少陰不能上榮於口也宜先以當歸養
心湯立之俟其能言後以大補湯治之或猪心

血調服亦可

經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神志
言語狂妄如見鬼神尋衣撮空此行經之後血
室空虛天行邪熱乘虛而入犯於衝脉蓋肝藏
血開竅於目神思昏者魂亂也目妄見者視亂
也妄言者肝移熱于心也宜瀉肝散或小柴胡
湯加生地丹皮

一正直崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘此必
不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯八物

湯加木香黃芪官桂主之使裏氣充足毒無晉
停更能飲食則可保全否則倒塌不治矣
一向來經閉不通血海乾涸適逢出痘毒氣拂鬱
於衝任之間二陽之併發其熱必甚若攻擊之
則血妄行不止痘亦不出為喘急為腫脹為陷
伏矣須調其心脾使毒得發洩庶可以保其生
以歸脾湯逍遙散治之脾和食進然亦方可收
功

一痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如

若當此時忽見行經者人但知厭

痘殊不知此乃本身之血不為之厚相功

裏虛防生陷伏之變急宜救裏解毒大補功

之

一妊婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則血氣衰敗

痘必不能起發灌漿命其危矣故孕婦出痘深

為可慮蓋痘之用藥多主溫補如半夏肉桂之

類皆妊婦所忌而烏附又非痘家所宜凡遇此

症者不問輕重悉以清熱安胎為主不可觸動

其胎宜安胎散加黃芩芍藥主之血動者四物湯加芩連治之及單胎散佐之身熱足冷腹脹者八物湯加木香脾氣虛不進飲食毒發不出者四君子湯加木香糯米紫草胎動不安者安胎散加砂仁痘出稠密者參芪內托散加紫草芍藥當歸單身熱有外邪無內症者參蘓飲加木香更以如聖散為主隨症加減如初發熱加升麻葛根連翹痘出太甚加酒炒黃芩大力子山查連翹不起發加大力子白芍藥口渴以麥冬知母天花粉痰多加半夏所謂可換而換者乎無擾故雖有胎不忌半夏也

一痘正在起發灌漿之時忽遇坐草分娩之期與氣血俱虛之候宜大補湯加熟附子主之以補氣血固表裏若產後小腹急痛者此血未盡也黑神散畧與行之不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者此脾胃內虛外作假熱也夫補湯加熟附一二劑更用四君子湯加黃芪當歸陳皮木香多服止者吉不止者凶

一疹後十日或半月之間適逢出痘以無胎孕繫累只以大補氣血為主以大補湯或八物湯去芍藥痘出多加連翹大力子大便自利者加肉荳蔻只照常一躰用藥施治不必妄為而多疑之反致誤事

一痘疹要訣曰姪婦出痘收靨之時胎落者多無事若發熱初出之時胎落者猶或可救若時當起脹灌膿而有犯以者多死蓋血氣衰敗無以逐其毒也

一痘已出未出不起不發隱在皮膚并治麻症斑症用梅花一兩桃仁二錢絲瓜五錢辰砂二錢甘草二錢為末每服五分參蘓湯下

一痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢川山甲一兩仙靈脾五錢射香一錢為末每服三五分咬牙寒戰加人牙二三厘內托散送下

快斑散

貫衆 赤芍藥 各一兩 甘草 升麻 枳殼 炒各五錢
右為末每服一錢水一盞竹葉七片煎至五

分溫服看大小與之按貫衆主腹中諸熱邪
毒其性微寒凡痘瘡煩渴咽燥喘急大便秘
小便赤澀目赤皆裏熱也急宜服之

西來甘露飲

清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不
退痘色紅紫口渴大便結燥服之即能紅潤
亦治疹家煩熱口乾咳嗽疹色枯燥或譫語喘
急睡卧不安

絲瓜藤

霜降後三日近根二尺剪斷將根頭

一節倒揀入新瓦瓶中上以物掩之勿使灰塵
入次日以好新罈一隻將瓶中之汁傾在罈
中仍將藤照前插入瓶內三日後汁收盡將罈
封固收藏听後取用○若發熱煩躁口渴未見
紅點將茜根一兩水煎濃汁二酒盃挽絲瓜藤
汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕○若已見
標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯冲服便
見紅潤○若夾斑者犀角紫草茜根煎湯冲服
寒月用酒煎冲服○蓋此汁極能解毒清熱尤

治天行時疫每以生姜汁少許加蜂蜜調勻服之有神功

渾元汁 即紫河車不拘男女初胎者尤妙入新瓦罐內封固其口上以碗覆埋於土中久則化而為水是也

專治氣虛血熱痘色紅紫乾枯黑陷等症以紫汁清而補之其效立見氣虛甚者人參紫草煎濃湯沖入服之 已上二方有力之家可多收貯愈久愈佳臨症極便勝如積金寶造浮屠也

李氏敗毒散 治初熱壯盛等症

即前敗毒散加升麻荆芥牛蒡子蟬退山查地骨皮薄芎紫蘓紫草 減獨活柴胡茯苓人參

右姜一片水煎臨服加葱白汁五茶匙 如熱甚加柴胡黃芩 夏加香薷 冬加麻黃

瀉加猪苓澤瀉

蘓解散 治痘初壯熱頭疼腰疼腹疼作脹一切熱毒甚者

紫蘓 葛根 防風 荆芥 白芷 蟬退
紫草 升麻 牛蒡子 木通 甘草 各等分

加灯心葱白各七根水煎热服

升麻葛根湯 治初热壮盛疑似未明服此或痘

已出而表热甚不退 李氏加紫蘇五分笋尖

山查牛子各一钱冬月加麻黄一钱令痘易出

易欵

和解湯

解表和中

升麻

乾葛

各一钱半

白芍

一钱

人参

防风

各七分

川芎

八分

甘草

五分

姜一片水煎服

解毒疎痘湯

預服解热去毒

已出解热毒斑疹

又治紅紫口乾壯热譫語

防风

荆芥

羌活

柴胡

川芎

白芷

當歸

連翹

黄芩

黄連

麻黄

紫草

蝉退

右姜葱水煎服

加味葛根湯

治痘失表發熱譫語

升麻

葛根

赤芍

甘草

桔梗

柴胡

荆芥

防风

連翹

牛旁子

木通

右水煎服

大灵丹 治壯熱顛狂驚搐譫語紅紫斑焦乾陷

一切惡症

白滑石

飛過三兩

雄黃

飛過

犀角

各三錢

辰砂

飛過三錢

半牛黃

水片

各一錢

射香

五分

右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷灯草

牛子紅花紫草黃連各三錢水二碗煎至半

碗細絹濾去渣加蜜四兩同熬滴水成珠和

前藥丸如小龍眼大金箔為衣每用一九灯

心湯下暑月冷水化下

無比散 初熱服之甚能稀痘 又治痘夾黑點

子 及黑陷黑痘等症

辰砂

一錢

水片

射香

牛黃

各五分如無牛黃用牛胆南星

代之

膩粉

二錢

一方有蟾酥

右研細末一歲兒服一子大者五分刺猪尾

血三兩點新汲水調和送下取下惡毒如爛

魚腸葡萄穗狀即愈

小無比散 治痘壯熱口渴小水澁大便秘口氣

蒸煩躁不寧或焦紫或紅斑自發熱至起壯時

有熱者皆可用痘後餘熱亦可用

桂府滑石

飛過六兩

石膏

飛過一兩

粉草

寒水石

各五錢 鬱金 蟬肚小者 草湯 煮乾為末 一錢

右俱製淨末和

勻每五歲者服二錢大人再加 冬月灯心

湯下 夏月井水調下 熱甚不解者井水

磨犀角汁調下 若紅紫頂陷不起加川山

甲末一分射香半分紫草煎湯加酒一二匙

調下即起

天無比散 治熱毒大甚驚狂譫語引飲痘疹紅

紫黑陷

桂府滑石 飛過六兩 粉草 一辰 砂 飛三錢 雄黃 飛一錢

末每三五歲服一錢 十歲服二錢發熱之

初用敗毒散調下亦能 稀痘 若報痘後用

灯心湯下

退火回生散 治痘熱甚發渴紅紫黑陷

滑石 錢 辰砂 一分 冰片 三厘 右末冷水調下

得睡少時神安氣靜痘轉紅活

龍腦膏 痘毒出不透心煩狂亂如見鬼神或已

出未出留伏黑惡毒等症

冰片 研末新宰猪心血和丸員眼核大小

兒服半丸 大人服一丸 凡狂妄煩躁者
心經毒盛也紫草湯下 昏瞽不醒者伏熱

在心經也并花水下 血疱漿不固者紫草

湯下 漿坐疱陷者温酒化下

天真膏 治黑陷乾枯紅紫及斑不退用此救之

十全四五

初生小兒解下黑糞用磁罐收貯加水銀二兩

射香一錢黃蠟封口埋於土中愈久愈妙久

則化而為水每遇前症看見大小熱毒盛者

量與二三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之

立時紅潤活澤真秘方也較之天靈蓋枯臭

無益之物萬々矣緣此糞原係母之真血所

化蓋以血補血且入土日久又得陰氣多故

能解毒 百日內小兒熱而煩躁啼哭不止

用少許點入眼角二三次便能神安氣和而

睡蓋又能清心熱也

猪尾膏 治全龍腦膏但此二方俱以龍腦為劑

虛寒者不可用惟實熱則有功

凡痘過服熱藥昏昧不知人事者取猪尾血以
龍腦和為丸負眼按大溫酒化下

之使毒活動化漿而達於外也

按猪尾乃動物取其血用

一凡痘倒靨心神不安者片腦五分辰砂一錢猪
尾血爛研膏用木香磨湯化下

一凡痘不化漿倒靨者片腦一分猪尾血一錢同
研新汲水調下

威靈龍腦散 治痘黑陷

威靈仙 一錢炒為末

片腦 一分

右用溫水調下取

瘡痍為効

獨聖散 痘不起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅
活起發有起死回生之功又名奪命丹

川山甲 酒炒成珠一錢取前足及嘴角者佳

麝香 一分

右末每小兒三分大者五分用木香煎湯入
少酒調下 熱甚者紫草湯下

朱杏庄方內加炒紅麴川烏炒焦各五分名曰一
七金葱湯下

大成散 治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切

不起發之症俱可用之

川山甲酒炒一兩 甘草末錢三 雄黃 硃砂各一錢半

紫草錢三 射香分二 右每五歲兒用二分冷症熱

酒調下 熱症紫草湯下 寒者加入治中

散內用 熱症加入小無比散內

人牙散 治痘不起發黑陷或紅紫黑斑咬牙寒

戰 人牙自落者不拘多少火煨存性滓入菲菜汁內大牙二次小牙二次研極細

木入射香一分或加紅麴二分 右用雞冠血調成膏好酒半

盞人乳半盞入葱白一撮煎湯送下

凡服牙齒不可過多每服止三分多則陽氣盡出

於表恐痘斑爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡

泄急以四君子加芎歸服之

無憂散 治臨危痘症寒戰咬牙

人牙如上製一錢 雄黃 珍珠各五分 一方有牛黃五

分 右末每服三五分多則一錢荔枝煎湯下

無價散 治黑陷欲死者 一方加射香冰片許少

用無病小兒糞臘月將傾銀確二箇上下合定

鹽泥固濟火煨通紅取出為末蜜水調服一錢

烏金膏 治癰熱至七日已前或因風寒痘不起
癰或紅紫或驚搐俱可用

姜蚕 酒洗 全蝎 去足尾 甘草 紫草 白附子

味苦內白者真 麻黄 各五錢 川山甲 炒末二錢半 蝉退 去頭足酒

洗淨 右為末將紅花紫草各一兩好酒二鍾

熬去大半去渣入蜜五兩慢火同熬滴水成

珠為度丸如龍眼核大每服一九灯心湯化

下

紫金散 治出不快及倒靨 亦治遠年不愈惡

瘡 紫草 蛇退 炒焦 牛旁子 炒各五錢

右為細末每服一錢水半鍾煎減半溫服

連翹升麻湯 治痘一癰密如針頭形勢重者當

輕其表而涼其內 連翹 升麻 黃芩

葛根 各一錢 麥門冬 去心二錢 右水煎服

清地退火湯 治痘帶熱而出名為火裏苗急用此方以退其熱則後無青黑變陷

之 地骨皮 地膚子 各一錢 牛旁子 紫草

葛根 各八分 連翹 六分 當歸 五分 木通 三分 蟬退 二分

右加姜一片水煎服 如熱不退再服一劑

或為末灯心湯服

紫草透肌湯 治痘熱而出不快及頂陷者

紫草錢一升麻分五牛子 防風 荆芥 黃耆各八

分三甘草分五木香分五 右姜水煎服 如色紫腹

痛加蟬退一錢

化毒湯 治痘已出而熱毒未解宜清熱涼白毒

一解不致黑陷血一涼不致紅紫

紫草 升麻 甘草 蟬退 地骨皮 黃芩

酒木通 各等分水煎服

解毒散 治毒先發腫者名為痘母後發者十方

九死先發者吉 金銀花兩五 甘草兩一 木通

防風 荆芥 連翹 牛子各三錢

右用酒水各一鍾煎服 如泄加訶子荳蔻

痘紅者加炒黃芩為藥 瘡痒者加歸身生

地或加何首烏尤佳 疼痛者加赤藥

透骨解毒湯 治寒戰咬牙

紫草 甘草 當歸 防風 陳皮 赤芍

右等分水煎服

消毒飲 痘已出上焦熱胸膈不快及痘後癩毒
麻疹熱毒 荆芥 牛子各二錢 甘草一錢

右姜二片水煎服

如聖湯 痘已出身熱如火

紫草 升麻 葛根 白芍 甘草 木通

猴梨 各等分加姜一片葱白三莖水煎熱服

心煩加麥冬赤茯苓煩渴加生脉散 七八

九日身如火者加酒炒黃芩地骨皮

四聖散 黑陷倒靨不起發不紅活小便不利

紫草 黃耆 甘草 木通 右水煎服 熱

甚色紫倍加紫草芩連紅花大便秘加枳殼

如常加糯米

加味四聖散 痘出不快及變陷倒靨小便赤身

熱未退或復冒風者

紫草 黃耆 人參 甘草 川芎 蟬退

木通 木香 大便秘加枳殼 不秘加糯米

百粒水煎服

涼血解毒湯

痘出熱不退紅不分地或痘苗乾枯黑陷急用此方可起壯灌漿

紫草錢一 生地 紫胡分冬 牡丹皮分七 赤芍

蘇木 防風 荆芥 蒲連 木通分各三 牛子

分四 天麻 紅花 甘草分各 二姜一片灯心二十

根糯米百粒水煎服

惺惺散 治痘頭痛壯熱喘急此攻毒散熱之劑

人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗 細辛

川芎分各五 薄荷 一方無川芎加天花粉

姜三片枣一枚水煎

內托散 痘不起發根窠 紅或灰白色 咬牙寒戰等症

人參 黃耆 甘草 川芎 當歸 防風

白芷 桔梗 白芍 厚朴 木香 肉桂

右姜一片枣一枚水煎服 色紅紫者去肉

桂木香加紫草蟬退 漿不滿水酒各半煎

服 色淡白者去防風白芷加糯米 大便

燥加人乳

蟬退膏

蟬退酒洗去頭足 當歸 防風 甘草 川芎

荆芥穗 升麻 白芍分各 右為末煉蜜丸

芡實大每服一九薄苛湯化下

粉紅丸 又名溫驚丸 治痘後癩癩症

牛膽南星 四辰砂半一錢 天竺黃 錢五 冰片 分五

胭脂丕 錢一 右為末牛膽汁和為丸雞豈子大

每服一九小者半丸沙糖溫水化下

大保元湯 治頂陷根窠雖紅而皮軟薄血有餘

而氣不足 黃芪 錢三 人參 半一錢 甘草 川芎 各一

官桂 分一 加姜枣水煎服 如氣不行加木

香減去桂 若不食加人乳半鍾 又方加

白何首烏黑豈蒸過用

生脉健脾湯 治漿既成皮軟色白乃氣不足也

甲則血生是 黃芪 一錢 人參 錢一 炙甘草 官

桂 各三分 當歸 川芎 白芍 白朮 各八分 茯苓

分五 紫草 分四 姜一片紅枣一枚糯米五十粒或

加酒洗紅花三分

通天散 治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參 陳皮 桂枝 各八分 川芎 熟地 芍藥

錢各一 當歸 紫草 錢各半 紅花 木香 分各三 甘草

六知母分八荔枝殼十箇右用鷄汁一鍾棗三枚

糯米一撮煎服初服到頸再服到臍三服到

脚神効

升天散 即灌膿起頂散治痘灰白或紅紫黑陷

乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

人參分六黃芪 山查分各八白朮土炒當歸 川芎

橘紅分各五甘草分三淫羊藿 川山甲土炒黃分各二分

肉桂三厘以引經之 木香分二姜一片棗一枚

水煎服 或為末服亦可 如嘔吐生姜湯

下 瀉米飲下 肚痛神麩煎湯下 煩躁

麥門冬湯下 渴用麥冬五味煎湯下 吐

瀉藿香陳皮湯下 痘不成漿多服數帖無

妨

補漿湯 痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿三分多人參分八川山甲土炒黃芪一分錢

枸杞子錢一川芎分五當歸分八甘草分五木香

分二白朮土炒山查分八陳皮分五官桂三厘

黃荳粒三十筍尖箇三加姜棗糯米水煎服 一

方有白芷防風

補元湯 治痘頂充滿而根盤不聚色不紅活乃

氣有餘而血不足也

川芎 當歸 白芍 酒炒 熟地 各一錢 紫草

紅花 各酒洗七分 陳皮 甘草 各三分 白朮 土炒一錢半

酒水各半盞糯米五十粒棗二枚煎服

活血散 治痘色淡白

當歸 赤芍 酒炒 紫草 川芎 紅花 各五錢

血竭 一錢 木香 二錢 右為末每五歲者服一錢

十歲已上者服二錢好酒調下 熱極血焦

不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散 治氣血俱虛灰白色不灌膿回漿者

紫河車 一具焙為末 龜板 酥炙五錢 一方有鹿茸五錢

右末每服五七分或一錢氣虛者保元湯下

血虛芎歸紫草煎湯下

渾元散 治全上

紫河車 一具分作五七塊 用白糯米三合水淘淨入

無油銚內同炒以米黃色為度同為末每用

五七分見大者一錢極補氣血能助灌漿如神緣糯米性溫得紫河車之氣純化為河車故其補功最速譬之造酒米從麴化意也極妙絕

異功散

此方調順陰陽充實表裏凡痘灰白痒

瀉寒戰泄瀉腹脹並宜服之非虛寒者不可輕

用人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮

半夏 厚朴姜制 木香 丁香 肉果 大附

子 官桂 右姜枣水煎服

丙助丹

黃耆酒炒 人參酒炒 白朮 茯苓 當歸 陳皮

半夏 厚朴 肉桂 山查 姜三片 枣一枚

糯米五十粒水煎服 如不食加人乳一盃

痒甚加大附子 寒戰不止加附子 防風

渴加麥冬 瀉加澤瀉 猪苓 不止加訶子 肉

果

助陽丹 痒塌不起根 窠不紅

黃耆 人參 白芍 各酒炒 甘草 三川芎

當歸

各一錢

紅花

五分

陳皮

八分

官桂

二分

姜棗水煎

服

如食少加山查厚朴各五分餘加全煎

回生起死丹 治痘灰白寒氣逆上不食腹脹嘔

吐肚痛泄瀉清水手足俱冷

丁香

九枚

乾姜

一錢

水煎熟服被蓋片時令脾胃

溫煖陰退陽回痘自紅活

治中散

虛寒瀉利不進飲食

黃芪

人參

茯苓

白朮

川芎

當歸

肉桂

各五錢

肉果

麵包

煨熟

丁香

一錢半

木香

三錢

末每五歲用五分好熱酒調下衣被蓋煖

少頃痘變紅活而起

和中湯

虛吐不止即鎮胃止吐湯加人參

人參

茯苓

甘草

各五分

白朮

半夏

各八分

陳皮

藿香

砂仁

各一錢

生姜水煎服

藿香正氣散 治初熱乾嘔

藿香

紫蘓

大腹皮

陳皮

桔梗

甘草

茯苓

半夏

厚朴

白芷

右姜棗煎服

定痛散 傷寒肚痛及冷氣痛

神麴 香附各一錢 山查二錢 良姜 當歸

甘草各五分 姜三束二水煎服 手足逆冷加

大附子二分

桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝 炙甘草各一錢 白芍藥酒炒二錢 姜三片束

二枚水煎服

黃連湯 治熱毒在胃腹痛時或欲吐此藥能升

降陰陽 黃連 炙甘草 乾姜 桂枝各二錢

半夏 人參各八分 棗二枚水煎服

益黃散 胃冷嘔吐而利

陳皮 青皮各二錢 丁香五分 木香三分 訶子七分

右水煎服 一方無木香有荳蔻一錢

堅腸湯 治痘泄瀉不止

黃芪 白朮 肉果炮去油各一錢 山查七分 川芎

陳皮各五分 升麻三分

加牙棗三枚水煎服

豆蔻丸 治痘灰白泄瀉清水不止 又方止用

龍骨訶子肉菟三味治同

木香 砂仁 龍骨 訶子肉 肉果 麩煨各五錢

赤石脂 枯礬 各七錢半 右末麵糊丸黍米大每

服三十九米飲下

加味犀角飲 痘已出不勻心煩壯熱口舌生瘡

犀角 牛子 荊芥 甘草 防風 升麻

桔梗 麥冬 水煎服

犀角地黄湯 治諸失血

犀角 磨汁 赤芍藥 生地 丹皮 各等分水

煎服

二寶散 治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴亂

語 犀角 玳瑁 二味磨汁頓服即愈

斬關散 痘紫發熱鼻紅不止

地黃 丹皮 黃芩 各五分 升麻 三分 藕節

茅根 各一錢 菖荳 四十九粒 水煎服

梔子仁湯 煩躁謔語驚狂發斑

梔仁 黃芩 石膏 各二錢 知母 杏仁 各一錢半

大青 柴胡 荳豉 赤芍 各一錢 升麻 八分

甘草分五

水煎服

人參白虎湯

暑盛煩渴痘出不快又解麻痘斑

痘等熱毒

人參分五

石膏分四

錢

知母

半一錢

炙甘

草分三

加粳米一撮水煎服

竹葉石膏湯

治痘不惡寒壯熱煩渴小水赤澀

石膏

知母

甘草

麥冬

竹葉

右水煎服

麥門冬湯

治斑疹煩渴吐瀉及痲後餘熱

麥冬

人參

甘菊

赤芍

赤茯苓

升麻

各

甘草

分五

石膏

錢三

水煎服

生脉散

止煩渴首尾通用

人參

五味子

麥冬

水煎當茶飲

參苓白朮散

治痘已痲未痲身熱不退煩渴不

止此藥極能清神生津乃治脾虛之聖藥也

人參

白朮

茯苓

甘草

乾葛

木香

麥冬

藿香

各等分水煎服

柴胡麥門冬湯

治痘壯熱經日不退

柴胡

麥門冬

甘草

人參

玄參

龍胆

草 水煎服熱退即止 一方無人參

涼膈散 上兩積熱口舌生瘡煩渴

連翹 薄荷 黃芩 梔子 甘草 大黃

朴硝 各等分水煎服 如痰火嗽加桔梗竹

葉蜜一匙

四順飲 治大便秘

大黃 當歸 芍藥 甘草 各等分水煎服

通幽湯 大便秘結

當歸 紅花 生地 熟地 桃仁 升麻

甘草 火麻子 水煎服

通腸散 大便秘結

枳殼 當歸 大黃 各一錢 芝麻 錢三 牛膝 分

水煎服

葱白湯 治頭疼

連翹 葱白 生姜不拘多少水煎帶溫服

當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 黃芪 黃芩 黃連 黃柏 生地

熟地 各等分水煎服

甘露飲 治牙根腫痛腐爛口臭牙疳出血喉舌

生瘡 天冬 麥冬 生地 熟地 黃芩

枳殼 石斛 茵陳 枇杷葉炙去毛 甘草

各等分水煎服

吹口丹 治口疳

黃連 青黛 孩兒茶 冰片 為末吹之

赴筵散 口瘡神効

薄荷 黃柏 等分為末入青黛少許搽之

牙疳方 痘後餘毒攻牙根疳腐 大宜服甘露

人中白煨三錢 枯礬二錢 鹽梅七箇煨存性 射香一分

白礬子灰一錢 五穀二錢 焙乾 為細末先將葱

茶洗去腐肉須見鮮血然後搽藥

鈎藤湯 痘後口噤僵直遠臍腹痛

鈎藤 紅花 木香 川芎 當歸 白芍

甘草 白朮 青皮 黃連 官桂 生姜

各等分水煎不拘時服

消風散 治痰盛驚搐譫語狂急口張目作上視

羌活 獨活 姜蚕 藿香 枳壳 防風

天麻 地骨皮 蝉退各八分 前胡一錢半 柴胡

黃芩 天花粉 桔梗 茯苓 荊芥 紫草

牛子各一錢 人參 川芎各七分 甘草四分

姜枣水煎服

瓜蒌散 治痘熱極生風發搐

瓜蒌根二錢 白姜蚕一錢 慢火全炒老黃色為

末每服二三分薄芎湯下

保命丹 一切驚風發熱

天麻 鬱金 全蝎去尾各五錢 防風 甘草三錢

青黛三錢 白附子炒 姜蚕炒 薄芎五錢 大半夏

炒取湯浸 晒乾又用 姜汁浸晒 乾又炒 南星製全上各一兩 辰砂飛五錢為衣

射香五分 鈎藤 牛黃二錢 蝉退 茯神

桔梗各五錢 右末煉蜜為丸芡實大每服一九

灯心湯下

蟬花散 治痘發熱發痒抓破

蟬退 地骨皮各一兩 為末每服二三匙白酒

服二三次

回漿散 治痘不收漿結痂

何首烏 白芍 黃耆 人參 甘草 白朮

白茯苓 姜水煎服

象牙散 治同上

人參 黃芪 白朮 各一錢 甘草 七分 茯苓 一錢半

何首烏 二錢 右加糯米二錢 水煎調下

象牙末 一錢

參升麻湯 治溫毒發斑

玄參 升麻 甘草 水煎服

面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮

喉痛 升麻 五錢 犀角 射干 黃芩 人參

甘草 各二錢半 右水煎服

陰毒升麻湯 治陰斑

升麻 當歸 川椒 鱉甲 雄黃 甘草

右水煎服

四聖膏 治痘疔挑破以尖點之

七粒珍珠火上燒 碗蓋七七鍋內炒 男髮

不拘灰多少 加入胭脂真箇好

二聖散 治同上

雄黃 錢二

紫草 錢三

右研末用油胭脂調下

敷方 痂後痘疔潰爛成坑內見筋骨以藥敷之

赤石脂 膩粉 黃柏 抗粉 炒 血竭 各一錢

飛丹 炒 八髮灰 分五 乳香 沒藥 各三錢 冰片 三厘

伏龍肝 錢 蜜陀僧 飛過二錢 有臭氣加阿魏三

四分 右為細末綿帛篩過敷之外用膏藥貼

內服人參敗毒散加川山甲蟬退連翹

人參敗毒散 治餘毒癰腫

人參 赤茯苓 羌活 獨活 前胡 薄荷

柴胡 枳殼 川芎 桔梗 分 甘草 半

牛旁子 防風 荆芥 連翹 金銀花 防敗

散毒 頭上加白芷升麻 上身倍加桔梗

手加薄荷 腰加杜仲 腿足加牛膝木瓜

金花散 痘後肥疔疥癬等瘡以能收水解毒

黃丹 黃柏 黃芪 黃連 大黃 輕粉

射香 右為細末濕瘡乾摻燥用臘猪油熬化

調敷

必勝膏 治腫毒

馬齒莧搗汁

猪脂膏

石蜜

三味熬膏塗

之即消

三莖散

痘後癩毒初起紅腫

黑豆

赤莖

菘莖用

醋浸研漿時時以鷺翎刷上隨手可消

敗草散

治斑爛不止

爛茅草

不拘多少用夏年蓋墻屋者經露風

霜年久感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取來晒乾或焙乾為極細末敷瘡上

或攤在蓆上令兒坐卧於上即愈

又方

荔枝殼微燒存性

草紙燒灰存性

多

年敗茅

三味共為細末或搽或摻自能收水

結痂

又方

黃莖壳燒白灰為末摻之

如痘風癬以

莖殼煎湯洗

綿璽散

治爛瘡

治身及肢節疔腫瘡膿水不

絕

璽子不拘多少將生明礬末裝入漏火上

燒令汁乾枯為末摻之

秘傳茶葉方 痘爛遍身無皮膿水流 出粘指衣

被 茶葉要多揀去粗梗入滾水一漂即撈起

再揀去梗濕鋪床上用草席隔一層令兒睡

上一夜則膿皆乾

乳香韶粉散 痂欲落不落用此薄塗當滅癩痕

又治熱痘瘋遍身膿水不絕

乳香錢三 韶粉錢一 輕粉錢一 右末猪油拌鷄

翎敷上

地黃散 痘毒入眼腫痛赤綫或白膜遮睛

