

東
醫
寶
鑑
卷
十
二

省中醫學委員會書簽

編號 11-189 $\frac{6}{16}$



御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚奉教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者小腸一日死腸兩頭見者可連續之先以針縛如法連續之斷腸便取雞冠血塗其際勿令氣泄
推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以漬納之且作粥清稍飲之二十餘日乃吃糜粥百日後乃可進飯(病源)○金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不得多飲粥則血溢出殺人也又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹葷皆使瘡痛衝發甚者即死(聖惠)○凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則凝入心則死(丹心)

不治證

十不治證凡被傷入於肺者縱未即死二日難過○左脇下傷透內者○腸傷斷一半可醫全斷不可治○小腹下傷內者○證後繁多者○脈不實重者○老人左股墜碎者○傷破陰子者○血出盡者○肩內耳後傷透於內者皆不必用藥(得效)○凡金瘡傷天窗(穴名)眉角腦後臂裏跳脈脾內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五臟六腑俞皆死處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸聲口急唾出兩手妄舉皆不治(聖惠)

金瘡脈候

金瘡出血太多其脈虛細者生數實者死○金瘡出血脈沈小者生浮大者死研刺出血不至脈來大者七日死滑細者生(脈經)○金瘡出血虛細則宜實大則傾(得效)○傷雖淺命脈虛促可慮傷至重命脈和緩永無慮也○血出甚者脈不要洪大只要平正重實(得效)

腸肚傷治法

肚破腸出在外若腸全斷難蓄不斷者可治○腸及肚皮破者麻線為線或桑白皮共茸為線以花蕊石散付線上從裏縫之腸子則以清油熬活放入肚內乃縫肚皮不可縫外重皮留皮開用藥榜待生肉(得效)○傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散(即芎歸湯)與服用手摩去膏不妨此是閉肉放心去之然後推腸入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘澀(得效)

金瘡先宜調血

大凡金瘡及折傷墮內損者必有瘀血傷積先宜逐去瘀血若亡血過多則調養氣血為主(正傳)○花蕊石散奪命散雞鳴散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可選用(方) 諸

止血生肌合瘡藥

傷至重者海味中鹹白鯉成片鋪在傷處以帛托定血立止(得效)○止血收口方白膠香老松皮白芷血竭為末付之單血竭未付之尤妙○黃丹滑石末付之夏月以薄荷葉貼之一日一次以藥水湯洗(得效)○金傷散糝付神效(集要)○金瘡血不止黃丹白礬末糝之又下子蠶蛾燒灰付之(聖惠)○下蠶室瘡不合取所割勢火煨為末酒調服昔有一人自割喉勢瘡久不合用此方不數日而愈(入門)

石者其上自出(聖惠)

箭鏃及金刃中骨脈不出

白斂半夏等分為末每取一錢淡薑湯調服日三至二十日自出(入門)○箭鏃及針入肉不出象牙屑和水塗其上又螻蛄取汁頻塗又鼠膽塗之又好

石者其上自出(聖惠)

救急方

金瘡及諸傷重補悶欲死取牛一隻剖腹納其人于牛腹浸熱血中可甦如傷腹用血竭末醋湯調飲出血而愈或戰陣砲矢所傷血流滿體氣貫胸膈悶絕者亦甦(入門)○傷重者絕不自醒熱尿多灌即甦童尿尤好(丹心)

熱尿多灌即甦童尿尤好(丹心)

活血散

治刀鎗傷腹裂腸出者黃芪當歸川芎白芷續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各等分右為末每三錢溫酒調服日三立驗(入門)

花蕊石散

治一切金刃所傷及打撲損傷牛馬咬踢或至死者急於傷處糝藥其血化為黃水再服藥使活更不疼痛如藏府有瘀血內損煩悶欲死服此藥則化為黃水或吐出或下泄出花蕊石四兩硫黃一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾安四方磚上以炭火從已午時煨至經宿候冷取出研細每取一大匙童尿入酒煎熱調服(入門)

奪命散

治金刀所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀積心腹痛二便不通水蛭以石灰拌炒焦五錢大黃黑牽牛頭末各二兩右為末每取二錢熱酒調下過數時無效再用一服以下惡血為度(得效)

雞鳴散

治金刃傷打撲傷血瘀凝積燥渴欲絕大黃酒蒸五錢當歸尾三錢桃仁二粒研右對作一貼酒煎雞鳴時服次日下瘀血即愈治折傷亦妙(三因)

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅鬱欲死大黃一兩當歸二錢半麝香火許右為末每三錢熱酒調下(聖惠)

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能轉側水蛭炒烟盡別研三錢柴胡連翹當歸槿各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一錢麝香火許右除水蛭麝香外餘藥對作一貼酒水相半煎去滓入蛭麝調服空心兩貼立愈(東垣)

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴胡一錢半穿山甲炒研瓜蒞根甘草各一錢桃仁十個為泥紅花五分右對作一貼酒水相半煎服(寶鑑)

半煎去滓入蛭麝調服空心兩貼立愈(東垣)

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴胡一錢半穿山甲炒研瓜蒞根甘草各一錢桃仁十個為泥紅花五分右對作一貼酒水相半煎服(寶鑑)



金傷散

治一切金瘡重午日早朝使四人各出四方採草木莖葉各半把至日午時入石灰一斤搗極爛罨大桑木三兩株作孔納藥實築以桑皮蔽之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填固至九月九日午時取出陰乾百日搗羅為末如遇傷慘之神效(御藥)

單方凡二十四種

新汲水

人破金瘡及損傷腸出以新汲水噴之令身噤勝自入也(本草)

石灰

瘡金瘡甚良人為金刃所傷以石灰末裹之定痛止血神效○又石灰和雞子白火煨為末付瘡立差(本草)

葛根

瘡金瘡止痛為末付之又濃煎取汁服之(本草)

桑白皮

可以縫金瘡取生皮作線縫腹破腸出者唐安全藏剖腹用此法便愈○神效○又桑葉為末乾之○金瘡止痛桑柴灰付之佳(本草)

蜈蚣

針入肉不出蜈蚣腦不出蜈蚣搗取汁滴上三五度自出

蜚蠊

箭鏃入骨不可拔微熬巴豆與蜚蠊同研勻塗傷處待極癢便撼動拔之立出後以生肌膏貼之○出箭鏃方蜚蠊全者麝香火許同為末撥動箭頭藥瘡肉自出(本草)

旋葡根

即旋花根也合金瘡續斷筋取根搗汁滴瘡中滓封瘡上炊(本草)

蝙蝠

主金瘡出血內漏取二枚燒為末每一錢和水服令一日服盡當下如水乃血消也(本草)

蔥

治金瘡因驚出血不止取蔥炙熱按取汁付之血即止○金瘡中風水腫痛蔥莖葉煨研罨付立愈(本草)

小麥

主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去滓令極冷使人含喫瘡上又喫其背腸漸自入勿令眾人見(本草)

石榴花

治金瘡血流不止石榴花和石灰搗為末糝之血便斷(本草)

鼠腦

治箭鏃及針刀在咽喉胸膈諸隱處不出取生鼠腦及肝搗付之即出(本草)

血竭

瘡金瘡止血止痛生肌最妙刮屑付之但性急不可多用(入門)

壁錢

主金瘡血不止取汁點瘡上良(本草)

紫檀香

治金瘡急刮紫檀末付之止血止痛至妙(本草)

琥珀

止血生肌合金瘡作末付之○中營箭悶絕琥珀末一錢童尿調服妙(本草)



南京中医药大学图书馆藏

蛇含草 主金瘡搗付之佳。○又云蛇含膏連已斷之指(本草)

熟艾 搗金瘡止血止痛易合。或煎湯或熏烟亦好(俗方)

藍葉汁 金瘡血悶取藍汁飲之(本草)

擲撲墮落壓傷

凡墮壓死者急安好處以袖掩其口鼻上一食頃候眼開光與熱小使飲之若初覺傷人如僧打生令一人將其頭髮按放低以半夏末或皂角末吹入鼻內如活即以薑汁香油打之(綱目)○若取藥不及急吹開口以熱小便灌之利去瘀血(得效)○卒墮擲壓倒打死心頭溫者有蘇木活血黃連降火白朮和中以童便煎服妙傷在上宜飲韭汁(丹心)○凡擲打壓傷或從高墮下皆驚動四肢五藏必有惡血在內專怕惡心先用通二便藥和童便服之立效大小腸俱通利則自解煩悶攻心之患矣(得效)○凡傷損專主血論肝主血不問何經所傷惡血必歸於肝流於腸胃於腹而作脹痛實者下之宜通導散桃仁承氣湯(方見寒門)奪命散(方見上)○虛者復元活血湯(方見上)當歸鬚散調之(入門)○凡出血已多而又嘔血不止者難治宜用蘇木煎湯調蚌霜散服之(入門)○諸傷疼痛宜乳香定痛散乳香散雙烏散尋痛丸陣王丹補損當歸散(諸方)○蘇合香丸

上有傷或打破或金刀傷用藥糊角縛不使傷風慎之(得效)

通導散 治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此下瘀血大黃芒硝各二錢當歸蘇木紅花桃仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘草各五分右對作一貼水煎空心服(醫鑑)○一名大成湯(醫林)

當歸鬚散 治打撲損傷致氣凝血結胸膈脇痛當歸尾一錢半芍藥烏藥香附子蘇木各一錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草五分右對作一貼酒水相半煎服(入門)

蚌霜散 治傷損大吐血蚌粉百草霜各等分右為末每二錢糯米飲調服(入門)

乳香定痛散 治諸傷損疼痛白芷當歸生半牡丹皮赤芍藥川芎乳香沒藥白朮甘草各等分右為末每二錢溫酒釀便各半調勻服之(入門)○一名活血止痛散(醫鑑)

乳香散 治打撲傷損痛不可忍白朮炒當歸炒白芷桂皮乳香沒藥甘草各等分右為末每二錢溫酒調下(得效)

雙烏散 治諸傷百損久得時常疼痛者及新破傷作痛亦宜川烏草烏各炮各三錢當歸白芍藥蘇木大黃生乾地黃紅翅炒各五錢麝香少許右為末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無害但草烏生

青蒿 生按付金瘡止血止痛生肌最妙(本草)

小蘗 主金瘡血不止按葉封之(本草)

車脂 針入肉不取出車脂攤紙上隔一夜不出取車脂攤紙上隔



用恐太猛所以
畧炮(入門)

尋通丸

治諸傷止痛清心行氣活血如神草烏生用乳香火熨沒藥火熨五靈脂各三錢生麝香少許右為末酒糊丸如指頭大朱砂為衣每丸薄荷湯薑汁磨化服(得效)

陣王丹

治諸折傷止血定痛大黃一兩石灰六兩右同炒紫色為度去火毒搗篩為末敷傷處妙(入門)

補損當歸散

治墮撲折傷疼痛叫號服此藥不復大痛三日筋骨相連川芎一兩半桂心川椒當歸甘草各七錢半附子炮澤蘭各二錢半右為末每二錢溫酒調服效如神(哥方)

打撲傷消腫滅癥

凡關毆被打成破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯(方見寒門)熱散取汁外用或傷服上青黑不散大黃為末生薑汁調付患處即消名將單膏(醫鑑)○散被毆癥痕亦合跌打油清酒各一椀同煎數沸服之服了以火燒熱地上一夜痛止腫消無痕有被傷者仇家陰令街王極大者切作片瓦上焙乾為末臨臥酒調二錢服一夜消盡無痕(聖惠)

脈候及不治證

凡打撲損傷內有瘀血其脈堅強者生小弱者死(脈經)○打撲傷損去血過多脈當虛細並不治(與上下不治證參看)○入門○如傷藏府致命處一觀其脈虛促危矣(得效)

單方

凡十七種

蒲黃

治撲損瘀血在內煩悶蒲黃末三錢熱酒調下(得效)

生龜

治撲損跌折取血和酒飲之內生研厚塗傷處立效(本草)

鼠屎

治落傷筋骨痛不可忍取屎燒為末豬脂調急裹之不過半日愈(本草)

荷葉

治打撲落傷惡血攻心悶亂乾葉燒為末熱重尿調下二錢日三○未展荷葉為末童便調服利下惡物(綱目)

麻根

主打撲落傷跌折有瘀血痛不可忍取根及葉搗取汁飲或煮服之非時則取乾麻煮汁飲(本草)

稻稈灰

治墮落撲損痛楚稻稈燒灰和糟酒淋灰取汁乘溫淋洗痛處立差(本草)

芥子

撲損瘀血作痛芥子和生薑研微煖塗貼患處即效(本草)

白楊樹皮

治撲損瘀血痛不可忍取樹皮酒漬服之(本草)

蟻螯

主打撲跌折血在腸下墜滿痛取汁和酒服又研付傷處(本草)

胡桃

壓撲傷損胡桃肉搗爛和溫酒頓服便差(本草)



蔥白 治打撲傷損痛不可忍取蔥白入爐火煨乘熱擘開其中有津便將瘡損處冷則易熱者須更痛定(本草)○又蔥白破糖等分爛研付之痛立止且無癰痕(丹心)

人尿 主撲損落傷瘀血攻心暈絕熱尿等服一二升即甦童子尿尤佳(本草)

烏雞 被壓窄墮舟船車轆馬蹏牛觸胸腹破漏四肢摧折氣悶欲死烏雞一隻合毛杆一升下和香酒升得所以新布搗病處取藥塗布上晷定乾則易覺寒振欲吐不可去藥須更復上一雞神效(本草)

草

烏鴉羽 治墮落損傷瘀血脹心面青氣短取右翅羽七枚燒灰和酒服當吐血便愈(本草)

大膽 治撲損刀箭傷內有瘀血取胆熱酒調服瘀血盡下(本草)○大尿燒存性為末熱酒調下二三錢亦有奇效(俗方)

酒糟 主打撲墮落損傷瘀血腫痛酒糟和醋滓蒸溫熨之效(俗方)

水蛭 主墮撲落傷折傷內有瘀血水蛭炒為末入麝香火許每一錢熱酒服當下瘀血(本草)

骨折筋斷傷

凡脚手各有六出向四折骨每手有三處出向脚亦三處出向手掌根出向其骨交互相錯或出向則是出鎖骨之外須是搦骨於鎖骨下歸窠若出外則須搦入內若出內則須搦入外

方入窠向只用手拽難入窠十有八九成痼疾也(得效)○骨節損折肘臂腰膝出向蹉跌須用法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用手法(得效)○搦骨歸窠用竹一片(生柳木片尤佳)板夾定一邊不用夾須存曲直處時時拽屈拽直不熱則愈後曲直一得(得效)○凡骨碎者須用麻藥(即草烏散)與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不衝破肉或有粉碎者與細骨去免膿血之禍且以藥水一日一洗莫令臭穢(得效)○凡骨碎者用接骨藥肉上化開糊骨上然後夾定外用夾骨法活血散接骨丹二生膏糯米膏內服麥斗散沒藥降聖丹接骨散自然銅散接骨紫金丹○淋洗用蔓荊

散(諸方)

艸烏散

即麻藥也凡骨節出向用此麻之然後用手整頓皂角木蠶子紫金皮白芷半夏烏藥當歸川芎

者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處然後或用刀割開或剪去骨鋒以手整頓骨節歸原用夾夾定然後醫治如剪鐵入骨不出亦用此藥麻後或鉗出或鑿開取出然後取鹽湯或鹽水與服立醒(得效) 夾骨法 小蝦蟆四五個皮硝三分生薑一兩酒糟一椀腫者加紅內消即紅何首烏也同搗敷折傷之處(入門)

活血散

治折傷菜豆粉炒紫色新汲水調成膏厚付折傷處

接骨丹

當歸七錢半川芎沒藥骨碎補各五錢川烏煨四錢古文錢三個火煨醋淬七次乳香二錢半木香一錢黃松香脂也六兩香油一兩半右為末和油成痛攤油紙貼患處如骨碎筋斷用此復續



如初
回春

二生膏

治折傷手足生地黃一斤生薑四兩右搗爛入酒糟一斤炒熱布裏層傷處廢之傷筋損骨處
可忍神效(膏鑑)○傷損臂曰脫出腫痛生地黃搗爛攤油紙上次搽木香末一層又攤地黃紙
患處明日痛即止(得效)○治折傷斷筋碎骨生地黃搗取汁好酒和服
日二三次最妙又搗爛蒸熟封傷處一月筋骨連續蓋地黃屬骨(種杏)

糯米膏

治撲傷筋斷骨折糯米一升皂角切碎半升銅錢百個
同炒至焦黑去錢右為末酒調膏貼患處神效(綱目)

麥斗散

治跌傷骨節土蠶一個瓦上焙巴豆一個去殼半夏一個生乳香沒藥各半分自製銅火煨醋淬
七次用些火右為細末溫清酒調服一蘆如重車行十里之久其骨接之有聲初跌之時須整理
如舊以綿衣蓋覆方服藥勿
轉動端午日製尤妙(回春)

沒藥降聖丹

治打撲閃胸筋斷骨折痛不可忍生乾地黃川芎各一錢半自製銅火煨醋淬十二次
每服一丸水酒各半盞入蘇木一錢
同煎去蘇木調藥空心熱服(丹心)

接骨散

治骨折乳香沒藥各二錢半自製銅煨淬別研五錢滑石一兩龍骨赤石脂各一錢半麝香火許
右為末好醋浸潤煮乾炒燥為末臨睡服時入麝香和勻溫酒調下一錢若骨已接去龍骨赤石
脂而服極效(丹心)○一方將藥除麝香浸酒煮乾為末黃蠟五錢熔化乃入麝
和勻作丸彈子大每一丸酒煎以東南柳枝攪散空心熱服名曰接骨丹(入門)

自然銅散

治打撲筋骨折傷乳香沒藥蘇木真降香(無則紫檀代之)川烏松明節自然銅火煨醋淬七
次各五錢地龍油炒龍骨生水蛭油炒焦各二錢半血竭一錢半土狗五個酒浸焙右為末每
五錢好酒調下自頂心尋病至下兩手兩足周遍百身
病人自覺藥力習習往來遇病處則風颯有聲得效)

接骨紫金丹

治跌打骨折瘀血攻心發熱昏暈土鼈(二方用土狗)自然銅火煨醋淬七次別研骨碎補
大黃血竭當歸尾乳香沒藥礪砂各一錢右為末每服八釐熱酒調服其骨自接(入門)

蔓荊散

治打落筋骨折傷瘀血結痛頑荊葉(無則荊芥代之)蔓荊子白芷細辛防風川芎桂皮丁香皮
羌活各一兩右為粗末每一兩入鹽一匙連鬚蔥白五莖漿水五升煎七沸淋洗痛處冷則易(心)丹

單方凡十
四種

上海校經山房石印

上海校經山房石印

赤銅屑

治打撲墮落骨折傷取赤銅大煨醋淬七次或九次細研溫酒調一字或半錢服直入骨損處

自然銅

療傷損骨折火煨醋淬三次研細水飛同當歸沒藥各半錢溫酒調服仍以手摩痛處(本草)○此藥新火煨者有毒若不折骨不碎骨則不可用自然銅(丹心)

合歡皮

主骨折專能接骨取皮炒黑色四兩芥子炒一兩右末酒調二錢服以滓罨傷處(本草)

續斷

治撲損瘀血能續筋骨煮汁內服外搗付之(本草)

白蠟

屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛接骨續筋補虛與合歡皮同用極神效(丹心)

蟹

脚中髓及腦并殼中黃並能續斷折筋骨取碎之微齋瘡跌折骨破血結取汁和熱納瘡中筋節連○筋骨折傷生縛炒罨良(本草) 虫 蝟 酒服又搗付傷處(本草)

人中白

治閃挫跌撲傷骨極重人中白煨末溫酒調五分服(入門)

生粟

主筋骨折碎血瘀腫痛細嚼生粟塗付之粟楔尤好三個共一窠居中者(本草)

烏雄雞

主跌折骨傷骨痛取血和酒服仍破腹罨傷處炒(本草)○又取骨末一兩自然銅末四錢和勻溫酒調下二錢空心(綱目)

瘡傷斷耳鼻方

治擦落耳鼻用油髮灰未乘急以所落耳鼻蘸髮灰綴定以綿帛縛定有人為驢所咬下處其血即止仍用蒲黃杏仁鴨砂火許為末蜜調嚙化而愈(綱目)○自行顛仆穿斷舌心血出不止取火醋以雞翎刷所斷定外用蠶蠟包縛完固數日如故(入門)○一人落馬被所佩鎖匙傷破陰囊二丸脫落懸挂未斷痛若無任諸藥不效予教人漫漫托上多取壁錢敷貼傷處日漸就安其囊如故(醫鑿)

杖傷

凡杖舉即用童使好酒各一鍾合而溫服免血攻心甚妙實者雞鳴散(方見上)下之虛者當歸鬚散(方見上)如柴胡羌活煎服仍用蔥白搗爛炒熱搭杖處冷則易止痛散瘀如神(種杏)○又片豆腐鹽水煮熟鋪杖處其氣如蒸其腐即紫復換貼以色淡為度漬爛者亦宜(種杏)○痛甚者內服乳香定痛散(方見上)隨以熱酒盡量而飲外貼黃蠟膏(方見諸瘡)有血於壅腫先刺出惡血然後乃貼

青藥

(入門)○杖傷只是血熱作痛用涼藥去瘀血為先須服雞鳴散之類外貼以五黃散或大黃黃柏為末生地黃汁調付之○又野苧根嫩者洗淨同鹽搗付神炒(丹心)○又鳳仙花科連根葉搗爛

貼患處

乾則易一夜血散即愈(醫鑿)○又菜豆粉微炒雞子清調付之(醫鑿)○杖瘡宜服乳香散化瘰散補氣生血湯烏龍解毒散(諸方)○大概通滯血皆以酒化服蓋血滯則氣壅於氣壅於氣壅於則經

化瘰散

補氣生血湯烏龍解毒散(諸方)○大概通滯血皆以酒化服蓋血滯則氣壅於氣壅於則經

旋菖根

即旋花根也瘡被研筋斷搗根搗中

生地黄

主屬骨若傷損骨碎生地黄黃

牡鼠

瘡折傷筋骨生搗付傷處三

高莖子

主打落折傷取子微炒為末酒服上



絡滿急故腫且痛凡打撲着肌肉須腫痛者以經絡傷氣血不行故如是(本草)○凡杖瘡愈乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者死(入門)

五黃散

治杖瘡止痛黃丹黃連黃芩黃柏大黃乳香各等分右為末新水調成膏以緋絹攤貼傷處日三易(精要)

乳香散

治杖瘡腫痛自然銅煨醋淬七次當歸各五錢當香四錢乳香沒藥各三錢右末每三錢溫酒調下(精要)

化瘀散

治杖打重血上攻心煩悶蘇木當歸尾各三錢大黃紅花各二錢右為末每三錢溫酒重便調和服(醫鑑)

補氣生血湯

治杖瘡潰爛久不愈人參白朮茯苓芍藥當歸陳皮香附子貝母桔梗熟地黃甘草各一錢右對作一貼酒水相半煎服(醫鑑)

烏龍解毒散

治人受杖責後疔甲爛肉疼痛難忍不能起動服此痛止便能動履其效如神水日四服成稀水用醬大輕輕點上不多時其疔甲化爛取去一日一換貼膏藥化盡死肉不數日復平如故矣

(回春)

打著不痛方

未打之前先取白蠟一兩細切入碗內滾酒泡服則雖打著不痛名奇杖散(醫鑑)

單方

種

治杖瘡皮不破而內損者羅

薤菖根

治杖瘡腫痛不可忍細研取

沒藥

一錢熱酒調服炊(本草)

飴糖

治打損瘀血飴糖煎和酒服能下惡血(本草)

人咬傷

人咬傷成瘡過板或盤甲燒灰油調付(綱目)

諸獸傷

虎傷

人被虎咬先飲清油一碗又白礬為末納傷處又砍糖水調服一二碗并塗傷處(入門)○虎傷人但飲酒常令大醉當吐毛瘡取青布繫捷燒一頭納竹筒中向瘡口令烟熏之佳(本草)○虎傷人但飲酒常令大醉當吐毛

馬糞

治杖傷入風疼痛馬或驢溼糞替換熱熨日五十遍極效(本草)

鼠

治打傷瘡生鼠一枚和腸肚油半斤煎令焦黑收之以雞羽蘸付瘡上妙(本草)



青海大學圖書館藏書

出良(本草)○虎犬吠人并產取汁飲一升日三滓付傷處(本草)○虎狼傷人生雞肉食之
又生葛汁飲之又洗瘡又婦人月經赤衣燒為灰和酒服(本草)○乾薑末納瘡妙(本草)
熊傷 熊傷人燒青布取烟熏瘡口令毒出(本草)○又者葛根取濃汁以洗瘡十度并搗葛根為末調
根汁服日五(本草)○熊傷人萌翟剉水漬取汁飲滓付瘡上○熊虎傷煮生鐵令有味洗之

虎爪甲傷嚼生
粟付之(本草)

馬驢咬踢傷

馬咬踢傷益母草搗爛和醋炒付(本草)○又馬鞭梢燒灰塗之○獨類葉子燒灰貼亦
或浸之(本草)○驢或馬咬人或骨刺傷取其尿洗瘡以糞塗之又飲糞汁佳(本草)
取人尿或馬尿燒灰為末付之(入門)○嚼生粟付之(綱目)○又取雞冠熱血塗瘡中

牛傷

牛觸腸出不損者急送人以桑白皮尖或生白麻為線縫合肚皮縫上糝血竭末或百草霜末血
皮自合吃羊肉羹
立活勿封庵恐內作膿(入門)○腸破腸出臭穢急以香油摸腸用手送入煎人參地骨皮湯洗之
十日愈(入門)

犬傷

凡春夏初交犬多發狂但見其尾直下不捲口中流涎舌黑者即是狂犬若被其傷乃九死一生之
患急用針刺去血以人小便洗淨用胡桃殼半邊以人糞填滿掩其瘡上著艾灸之殼焦糞乾則易
之灸之百壯次日又灸百壯灸至三五百壯為佳(千金)○風狗咬傷即先口噙漿水洗淨或以熱人
尿淋咬處嚼生薑擦之又用葱白嚼爛塗之又杏仁嚼爛付之以帛繫定或同馬蘭根研細蔥湯洗後
塗之尤佳(綱目)○於患人頂心中有一紅髮即當拔去後服藥快效(十三方)○一方斑貓二十一
個去頭翅足以糯米一勺先將貓七個同炒不令米赤去貓再入七個同炒貓色變去之又入七個同

炒米出青烟去貓取米研為粉冷水入清油火許空心調服(二勺分三服)火頃又進一服以小便利
下惡物為度否則再用一服利後腹痛急以冷水調青靛服或服黃連湯以解其毒否則有傷不可便
食熱物

(綱目)

犬咬毒防再發

風狗咬急用斑貓七個去頭翅足為末温酒調服其毒必從小便中出可將尿缸或清水
令患人尿其中停半日見濁氣凝結如狗形則毒已出如不見狗形須服七次方可無狗
形乃不再發極驗若小便澀益元散(方見暑門)水調服最妙(十三方)○狂犬咬先口噙漿水洗淨
用玉真散(方見風門)乾貼之更不再發神效(丹心)○又仍殺所咬犬取腦付傷處後不復發(本
草)○刺火傷或經久復發無藥可療雄黃明者五錢麝香五分右為末酒
調二錢服後必使得睡切勿驚動任其自醒須利下惡物乃效(綱目)

狂犬傷出毒法

宜用扶危散○防風五錢大黃黑丑頭末各三錢斑貓一錢麝香三分雄黃二錢半右為
末每二錢滾水調服惡物從小便而出(入門)○狂犬傷蚯蚓糞封之出犬毛神效(本

狂犬傷出毒法

宜用扶危散○防風五錢大黃黑丑頭末各三錢斑貓一錢麝香三分雄黃二錢半右為
末每二錢滾水調服惡物從小便而出(入門)○狂犬傷蚯蚓糞封之出犬毛神效(本



南京

蚰蚋 ○又生麻油研豆豉為膏丸如彈子大常常搗拭所咬處却搥開看
豉丸內若有狗毛茸草然此毒氣已出搗至無茸毛方乃痊可(十三方)

扶危散 治風狗咬斑貓七日內用七個七日外每日加一個十日十個百日百個去翅足糯米同炒
石一兩雄黃一錢麝香一字右為末溫酒調服不飲酒者未飲下毒從大小便出即愈(普靈)

狂犬毒入心 狂犬咬眾治不差毒攻心煩亂喚已作大聲天靈蓋燒灰為末水服一錢以活正(本草)
犬咬人久不差口吐白沫者為大毒入心叫喚似大聲天靈蓋燒灰東流水調服一錢(本草)

頭骨虎牙虎脰骨為末酒調二錢服之(本草)
草 ○狂犬咬人發狂如犬叫蝦蟇膾食之又虎

禁忌法 被狂犬咬人終身禁食大肉及蠶蛹此毒再發則不可救三年之內亦忌食一
切毒物及房事常食杏仁以防其毒(十三方) ○犬咬傷人忌飲酒(丹心)

單方 凡六

白礬 狗咬白礬末納瘡
中止痛速愈(本草)

杏仁 殺狗毒作粥常食之又搗
爛貼傷處最佳(本草)

草麻子 主犬咬傷取五十粒去
殼研為膏付之(綱目)

蟾蜍 即蝦蟇也主狂犬咬發狂欲死作膾食之
日知又取後兩腿搗爛酒調服亦佳(本草)

針灸法 狂犬咬人當先針刺去惡血仍灸瘡中十壯自後日灸一壯至百日乃止忌飲酒(資生) ○被狂犬
咬者無出於灸只就咬牙跡上灸之一日三壯灸至一百二十日乃止常食韭菜永不再發(千金)

貓傷 人為貓所傷取薄荷葉細嚼付之
又虎骨虎毛燒為末塗之(雜方)

鼠咬傷 取貓毛燒灰入麝香少許津唾調付
(入門) ○又麝香塗之差(本草)

諸蟲傷

蛇咬傷 中蛇咬毒昏困五靈脂五錢雄黃二錢半為末酒調二錢灌之以滓付患處即甦(綱目) ○又五
靈脂雄黃貝母白芷等分為末熱酒調二錢服亦良(丹心) ○治蛇毒無如雄黃若被諸蛇咬取

雄黃細末貼瘡口立效(綱目) ○又蒿苴取汁和雄黃作餅子候乾為末貼瘡口毒水流腫痛即消
(綱目) ○卒被蛇傷白礬火上焙汁滴咬處立差無白礬則速作艾炷灸五壯良(綱目) ○毒蛇螫欲

上海校經山房石印



死雄黃乾薑等分為末付傷處(本草)○中蛇毒眼黑口噤欲死蒼耳嫩葉一握搗取汁溫酒和灌之
 滓付瘡上(本草)○又白芷末麥門冬湯調服滓付傷處(綱目)○又細辛白芷各五錢雄黃二錢麝
 香少許為末每二錢溫酒調服(綱目)○又貝母為末酒調令病人盡量飲之少頃自傷處流
 出却以滓付患處即甦(綱目)○又白礬甘草等分為末每二錢冷水調下(綱目)○毒蛇螫急以
 人尿洗出血次取口中唾塗之又以牙並封傷處又取人屎厚付布裹即消(丹心)○急發好解
 令毒氣不隨血走或清油亦可(入胃)○凡蛇毒取獨頭蒜或小蒜或苦苣或水蓼或豆葉或
 搗飲汁以滓付傷處(本草)○又絲瓜根洗淨搗研生酒調吃一醉立已(海上)○又鷄黃及此
 灰飲服滓付之(本草)○又蚯蚓或蝦蟆搗付之(本草)○牛耳中垢猪耳中垢取付之猪鬃灰付
 之(本草)○被蛇咬人忌食酸物梅子犯之必大痛(綱目)○蜈蚣制蛇毒為末付(本
 草)○辟蛇法殺羊角燒之蛇即遠去又小袋盛雄黃帶之蛇遠避之養鴉辟蛇(本草)
蝎螫傷 蝎有雌雄雄螫痛在一處并泥付之雌者痛牽諸處取瓦屋溝下泥付之無雨時翻水從屋上淋
 下取泥用(本草)○蝎螫痛不可忍冷水清之即不痛水微煖復痛即易薪水(本草)○蝎螫
 半夏生一字雄黃一字巴豆一個右同研付之(綱目)○又白礬半夏為末醋調貼之痛止毒出
 效○又驢耳中垢或猫屎塗之蜘蛛取汁付之又地上磨生薑塗之又薄荷細嚼付之又白礬
 滴傷處
 滴傷處

蜈蚣咬傷 蜈蚣咬人傷痛取蜘蛛安咬處當自吸毒如此而痛未止更易生者如蟹蚤死即投水中救活
(綱目)○蛇含草按付之又蝮牛取汁滴入咬處又烏雞血及屎塗之○桑白皮汁或獨頭蒜
 研塗之又入頭垢塗之不痛不癢○又清油點蝮取烟
 熏之又鹽湯漬之又黃蠟火上溶汁滴患處(本草)

蜘蛛咬傷 蜘蛛咬人腹大如孕一身生絲羊毛飲之未幾日而平(本草)○蜘蛛咬遍身成瘡取好酒飲
 化水點咬處即差(本草)○蜘蛛咬人瘡中出絲屢有死者惟飲羊乳可制其毒(本草)○又藍汁一
 碗入雄黃麝香末各一錢和之細飲其汁並點咬處有人被斑蜘蛛咬腫痛垂死得此方即愈只服藍
 汁亦好(本草)○蜘蛛傷土蜂燒末油和付之又取土蜂窠土醋調塗之穴土居赤黑色者是蜂也
 本草○又多取人尿灌甕中坐浸其身防蛛毒入內(本草)○又烏雞尿浸酒服又取冠血塗之(本
 草)○薤白或非白搗付之又雄黃末付之又桑白皮
 汁塗之又蔓菁子研油付之又小薊汁飲之(本草)

蚯蚓傷 有人中此毒腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈○有人跌立溼地中其毒先飲鹽
 湯一盃次以鹽湯浸其足即愈(本草)○蚯蚓咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身愈(本
 草)○蚯蚓吹瘡雞屎付之○蜘蛛咬鳴屎付之
 又老茶葉細末油調付蜘蛛即蚯蚓也(綱目)

又老茶葉細末油調付蜘蛛即蚯蚓也(綱目)

蠅 此蟲又名八角虫隱於壁間以尿射人遍身生瘡如湯火傷烏雞翎燒灰雞子清調塗之(綱目)
蠅 尿瘡如熱沸而大繞腰匝不可瘡虫如小蜈蚣色青黑長足取扁豆葉授付即差(本草)

○又鹽湯淋漬瘡上數日愈又犀角水磨塗之上行水磨塗之又雞屎塗之又胡燕窠中土猪脂苦酒和塗之又雞腸草授付之又薄荷和醋貼之○蜂房為末猪脂和付○按芋並擦之即愈○

蜂叮傷 蜂螫人嚼青蒿汁之○又薄荷授付之○蜂房為末猪脂和付○按芋並擦之即愈○
醋磨雄黃塗之又清油擦之○人頭垢及鹽擦之又醫塗之又冬瓜葉授付之(本草)

蠶咬傷 屋上爛茅和醬汁研付○麝香蜜調塗之○芒汁飲之又塗之芒近蠶種則蠶不生(本草)

蝸牛傷 人為蝸牛虫所咬毒遍身者
蓼子汁浸之即差(本草)

蝮蛇傷 蝮蛇咬人石灰醋和塗之○柳葉燒灰以泔水和浸洗以泔付之(本草)

壁鏡傷 壁鏡咬毒人必死桑灰淋濃汁調白礬末塗之○又醋磨雄黃塗之(得效)

夏月諸瘡傷辟蠅蛆法 夏月諸般傷損潰爛蛆虫極臭不可近蛇退燒存性一兩蟬殼青黛各五錢細辛二錢半右為末每三錢黃酒調下服一名曰蟬花散又寒水石治夏月諸瘡臭

爛○一人夏月收麥被驟跑倒又咬傷二三處至五七日膿潰臭惡蛆虫極臭藥不能救一道人見之傳以此方修合服之蛆皆化水而出蠅亦不敢近旬日良愈(回春)

雜色蟲傷 夏月有雜色毛蟲極毒觸人生瘡癢痛骨肉皆爛或一梳清油半盞同搗厚付傷處經一宿取團於傷處搓轉其毛皆出在上上痛立止神效(綱目)○又蒲公英根並白汁付之(綱目)○毒蛇尿

草木著人似刺割便腫痛肉爛若著手足指節墮落研砒礬和膠清塗之(本草)○蛇骨刺人毒腫痛燒死鼠為末付之(本草)○諸蟲毒傷青黛雄黃等分為末新汲水調下二錢又外塗之(本草)

人被天蛇毒似癩而非癩天蛇即草間黃花蜘蛛也人被其毒因為露水所濡乃成此疾遂者秦皮汁一斗飲之差(本草)○諸毒蟲傷大紙撒蘆香油燒火吹滅以烟熏之即愈(綱目)○五毒蟲毛螫亦痛不止馬齒莧授付之(本草)○蛇蝎蜘蛛咬生雞卵輕敲一小孔合咬處立差(本草)○諸蟲咬磨

香塗之又小蘆或藍葉搗汁飲又付之(本草)

發刺傷 竹木刺入肉不出羅麥濃煎取汁飲日三(本草)○又鹿角燒為末水和塗立出(本草)○又乾羊屎燒灰和猪脂塗之不覺自出(本草)○又人頭垢塗之即出又烏雞維生搗卷之亦出(本草)○

又白梅肉嚼封之刺即出又栗楔生嚼卷之亦出又蜈蚣研付之炒又蟻蟻生研卷之亦出又蟻蟻碎付之刺即出又牛膝根搗爛塗之亦出又魚鱗取付瘡上四邊向爛刺即出(本草)○魚骨在肉中不



出嚼吳茱萸封之骨當爛出又取海鱗皮煮汁服又魚狗烏燒為末和飲頓服又
象牙末厚塗自軟出(本草)○鐵棘竹木刺入肉不出鼠腦厚塗之即出(本草)
灸法 凡蛇虺蜈蚣毒蟲咬傷於傷處灸五壯或七壯即愈(丹心)○被
惡蛇螫即貼蛇皮於螫處艾火灸其上引出毒氣即止(本草)

解毒

蠱毒畜養家 凡有蠱之鄉見人家門限屋梁無灰塵潔淨者其家必畜蠱當用心防之(易簡)○蠱
蠱而能變化人有造作故事以酒肉祭之取出放毒於飲食中入其毒心悶腹痛面黃或吐
鮮血或下膿血病人所食之物皆化為虫侵蝕臟腑蝕盡則死急者十數日便死緩者延月死後
病氣流注染著傍人故謂之蠱注(千金)○中蠱者面色青黃是蛇毒面色赤黃是蜥蜴毒面色
青白若內脹滿吐出血科斗形者是蝦蟆蠱面色多青或吐如蛻蝦形者是蛻蝦蠱(病源)

辟蠱毒法 如入蠱鄉飲食即潛於初下筋時收藏一塊在手儘吃不妨火頃却將所藏一塊潛埋於公行
廐以筋築桌而後食如是
則蠱不能為害(易簡)

驗蠱毒法 令病人朝起取井華水唾水中唾如柱脚直下沉者是蠱也浮者非蠱也(三因)○嚼生黑豆
不腥嚼白菘味甘皆中蠱無異(三因)○入蠱鄉遇飲食以犀角攪之白沫棘起者是蠱也否
則非也(綱目)○又煮一雞卵去皮日夕含口中勿令破夜吐出著霜露中朝看色
大青者是蠱也(得效)○中蠱者大便黑如漆或堅或薄或微赤者是蠱也(千金)

蠱毒中毒脈候 凡中蠱毒脈類如釵股(直指)○人為百病所中傷脈浮洪而疾
者生微細者死○又脈洪大而遲者生微細而數者死(脈經)

送蠱法 人中蠱毒當服藥如知蠱主姓名便呼取蠱本即愈(本草)○欲知蠱主姓名取敗鼓皮燒為末飲
調服一錢病人須臾自知蠱主姓名令取蠱本即愈(本草)○中蠱毒下血如猪肝臟府敗壞惟
待死裏荷葉密安病人臥席下勿令知病者自呼蠱主姓名令取去即愈(本草)○有將士先
得疾下血言中蠱家人密以藜荷葉置臥席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小小走(本草)

蠱毒治法 人中蠱毒則心腹切痛如有物咬面色青黃或吐血或下血不即治蝕五藏盡則死宜服太乙
紫金丹玉樞丹萬病解毒丸雄營丸雄屬散辰秋丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或飲下之而愈

門入

太乙紫金丹 一名紫金錠一名萬病解毒丹治蠱毒桃生毒狐狸鼠毒惡菌河豚死牛馬肉毒山嵐瘴氣
毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蚊蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅茅大戟洗

毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蚊蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅茅大戟洗

毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蚊蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅茅大戟洗

毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蚊蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅茅大戟洗

毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蚊蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅茅大戟洗

毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蚊蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅茅大戟洗



焙一兩半續隨子去皮油一兩麝香三錢右為末糯米粥和勻搗千餘杵每一料分作四十錠每服半錠重者一錠並用薄荷湯化下○修合時宜端午七夕重陽日或遇天德月德日在淨室焚香齋戒勿令婦人孝服人雞犬見之○自縊落水鬼迷驚死心頭溫者並冷水磨灌即醒蛇犬諸惡虫傷以酒化服水磨塗傷處(入門)

玉樞丹

一名追毒丹治法服法同上○即上太乙紫金丹加入雄黃一兩朱砂五錢也製法同

萬病解毒丸

治蠱毒桃生毒葯毒草毒畜獸毒蚊蛤一兩半山茨菰一兩大戟七錢半山豆根續隨子末皮油各五錢朱砂雄黃各二錢麝香一錢全蝎五枚右為末糯米糊丸分作三十丸每服

一丸薑汁蜜水磨下并水研付所傷處(得效)

雄礬丸

治蠱毒及蟲蛇毒即蠟礬丸(方見癩疽)加雄黃等分作丸梧子大每七丸熟水吞下(入門)

雄麝散

治五種蠱毒雄黃麝香等分為末取生羊肺如指大以刀開裏藥吞之(丹心)

辰砂丸

治蠱毒從酒食中著者辰砂雄黃赤足蜈蚣續隨子各一兩麝香二錢半右為末糯米飯和丸芡實大每一丸以酒化下端午日合○一名丹砂丸(三因)

保靈丹

治蠱毒諸毒一切藥毒神效朱砂一兩山豆根五錢雄黃黃丹麝香黃藥子續隨子去皮別研巴豆去皮不去油斑貓去頭足翅各二錢半赤足蜈蚣二條一生一炙糯米半生半炒為末作糊右

於端午重陽臘日修合為末不令雞犬婦人見之用糯米稀糊和丸芡實大陰乾磁盒收貯每一丸茶清吞下不得嚼破須臾將毒物或吐或利藥丸凝血並下以水洗盡收之一丸可救三人若急則擇吉

日精潔修合(得效)

獨勝散

治蠱毒及藥毒虫蛇諸毒大甘草節麻油浸年歲愈多愈妙右取甘草嚼下或以水煎服神效(得效)

國老飲

治蠱毒白礬甘草等分為末清水調下取吐黑涎或瀉下即安(得效)

金蠶蠱毒

南方奇金蠶其蠶金色食以蜀錦即其遺糞置飲食中以毒人人死蠶喜能致他財使人暴富而遭之極難水火兵刃所不能害必多以金銀置蠶其中投諸路隅人或收之蠶隨以往謂之嫁金

蠶(瓊鎖)○人中金蠶蠱毒先嚼白礬味甘不流涎嚼黑生豆不醒者是也石榴根皮濃煎汁飲之吐出活虫即愈(得效)

挑生毒

嶺南有挑生毒乃挑毒於飲食中以害於人其候初覺胸腹作痛次則漸加攪刺滿十日則物生能動在上則胸痛在下則腹痛在上者胆礬末五分投熱茶內化服探吐之在下者礬金末二錢米飲



調服瀉下惡物後以四君子湯去甘草煎服調理(得效)○有人忽肋下腫起頃刻間大如碗此中挑
生毒也按五更菜豆細嚼試之若香甜則是也升麻為細末取冷熱水調二大錢連服之洞泄出莖數
莖根鬚皆具腫則消縮仍
服平胃散調補(得效)

禁忌法

凡中蠱之人用藥已差自後飲食永不得吃冷若飲
食帶冷則鬼氣乘之毒虫復生竟不能救(入明)

灸法

灸蠱毒法於足小指上灸三壯即有物出酒飯得之隨酒戰
出肉菜得之隨肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上出(千金)

吐蠱藥

凡中蠱煮甘草湯服之當吐出(本草)○又升麻一兩水煮取濃汁服入口即吐蠱出(本草)○
中蠱下血如雞肝四藏悉壞惟心未毀只待死馬蘭根為末水和服一二錢即吐出(本草)

○又王瓜取根葉搗汁服當吐下(本草)○又治五種蠱毒馬兜鈴根為末一兩水煎頓服蠱毒即出
未快再服(本草)○又榭木北陰白皮濃煎取一升空心服即吐蠱出(本草)○又蠟皮燒為末水
服一錢當吐蠱(本草)○又苦瓠一枚水煮取汁服立吐即愈(本草)○又人頭
垢米飲或酒化服即吐蠱(本草)○又瑞胞湯摩如雞卵許服之即吐蠱(本草)

下蠱藥

凡中蠱毒商陸末和水服即下蠱(本草)○又特隨 去皮研為末和水服一錢即下利蠱蟲
若未出蠱(本草)○牽牛子取頭末二錢和水服當瀉出毒蟲(本草) 玃猫一枚去頭足翅研為末和飲

通治單方

凡十
二種
凡中蠱毒不拘多少以麻油紙撒燒存性為末新汲水調一
錢頻服雖面青脈絕昏迷口噤吐血者服之即甦(得效)

凡中蠱毒取汁
飲之(本草)

藍葉

凡中蠱毒取汁
飲之(本草)

薺尾

治同上搗取汁飲之末
服煎服並佳(本草)

鯨魚皮

治同上燒為末和水服
治中蠱吐血(本草)

蜈蚣

治同上炙為末和
飲服亦佳(本草)

胡荽根

治蠱毒搗汁半升和酒服盡立下又取胡
荽子研水煮取汁冷服半升日二(本草)

桔梗

治同上濃煎服之又與藜荷
同煎飲數升即愈(本草)

蝮根

十四枚中蠱吐血下血如爛肝醋一升漬
之胡死但飲其汁已死者皆可活(本草)

蝮根

重者亦甦(本草)



大蒜 治同上或小時並常食之治蠱毒(本草)

狐 治同上五藏及腸治如食法和五味煮作羹食之去蠱毒炙食亦良有人病蠱夢道人示須云以大狗犬似貓非貓烹而食之其病自消覺而有狐入其室殺而烹食遂差白氏六帖云青丘狐食之令之不蠱(夷)

蠱(夷)

獺肝 主蠱毒燒服之(本草)○中蠱人常服燒酒與大蒜最妙(俗方)

救諸中毒方

抑論中毒之證辨其自戕被害何物之中審其遠近久則不救又手足面青過時者亦不救治法上宜吐之急以香油多灌一作桐油鵝翎探吐之下以解毒丸散漿利之緊急只以生油煎甘草湯調服利之亦可(入門)○人遇事急智盡術窮或為人所陷始自服毒宜急救之大法甘草兼豆能解百毒又法不問何毒多灌香油吐利即安(醫鑑)

解毒丸

治飲食中毒并百物毒救人於必死取板藍根四兩貫衆去毛青黛甘草各一兩右為末磨丸梧子大以青黛別為衣稍覺精神恍惚是中諸毒急取十五丸爛嚼新水送下即解(三因)

砒礞毒

得之則易治於酒中得之則其毒散歸百脈故難治在膈上則瓜蒂散吐之(方見吐門)在腹中則萬病解毒丹下之(入門)○急取黑鉛四兩磨水一椀灌服即解○如無黑鉛取青藍汁一椀灌服○或香油一二升灌服又取地漿三碗和鉛粉頻灌服旋刺猪狗羊雞鴨熱血飲之又人糞汁灌之(諸方)○又白扁豆青黛甘草各一錢巴豆去殼一個(二云半個)為末炒糖大一塊水化調一盞飲之毒隨利下(得效)○又臘月猪膽水和服之立解(種杏)○又稻稈灰和水淋取汁冷服一碗毒隨利下(醫鑑)○又冷水研菜豆取汁飲而解之(本草)○又藍根炒糖搗爛和水服(綱目)

菌莖毒

山中有毒菌人煮食無不死地生者為菌木生者為樛江東人名為草○夜中光者若不熟者煮訖照人無影者欲爛無虫者皆有毒不可食○冬春則無毒秋夏有毒者因蛇虫毒氣熏蒸所致也○人中其毒地漿飲之又人糞汁飲之又馬蘭根葉搗取汁服之又人頭垢和水服以吐為度又六畜及鴉鴨之屬刺取熱血飲之又油煎甘草冷飲只多飲香油亦好(本草)○中蠱毒吐下不止細茶芽(即雀舌茶)為末新汲水調服神效又荷葉搗爛和水服(綱目)○養頭煮汁飲即愈(綱目)○楓樹菌食之令人笑不止而死飲地漿最妙人糞汁飲之餘藥不能救(本草)

河狹毒

諸魚中河狹最毒其卵最毒人中其毒必死急取蘆葦根搗取汁飲之或人糞汁或香油多灌吐出即愈又白礬末白湯調下大棗三枚解之○川椒閉口者有毒人誤吞之便氣欲絕或下

川椒毒

白沫身體冷痺宜急治之飲井水一二升便差○又桂皮煎湯飲之又地漿飲之又濃煎黑豆汁飲之又人尿飲之(本草)

上海校經山房石印

狼毒 杏仁研水和取汁服之又蓋葉汁飲之又白斂為末和水服又占斯取汁飲(本草)

躑躅毒 梳子煎取汁飲之又甘豆湯煎湯服之(本草)

甘遂毒 黑豆煎汁飲之(本草)

半夏毒 生薑汁飲之又乾薑煮汁服(本草)

芫花毒 桂皮煮汁飲又甘草或防風煎汁服(本草)

莨菪毒 人中此毒則衝心大煩悶眼生星火狂亂奔走見鬼拾鐵水研菜豆汁飲之甘草薺芫煎汁飲之又犀角磨水服之又蟹汁服之又甘豆湯濃煎服之(本草)

苦瓠毒 食苦瓠吐利不止飲黍穰灰汁解之(本草)

石藥毒 人服諸石藥中毒人參煮汁服又腐脂服之又白鴨屎為末和水服之(本草)

艾毒 艾葉久服亦有毒毒發則熱氣冲上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者甘豆湯冷服之藍葉汁菜豆汁飲之(本草)

海菜毒 凡海中菜多食損人令腹痛發氣吐白沫飲熱醋即安凡海菜傷皆同此法(本草)

馬毒 開刺死牛馬中毒通身生紫泡俱潰叫痛急服紫金錠吐瀉即愈(入門)○凡人體有瘡馬汗馬氣白沫並能為害○馬汗入人瘡毒氣攻作心悶欲絕燒粟稈灰濃淋作汁熬煮蘆瘡於灰汁中須臾血入肉中一夜即死(本草)○馬汗入肉毒氣引入如紅線先以針刺瘡口出血烏梅和核爛研醋調塗之(綱目)○又馬齒莧取汁飲之(本草)○馬汗及毛入瘡腫痛以冷水浸瘡數易飲好酒立愈(本草)○鹽涎馬汗入瘡腫痛生烏頭末付瘡上良久黃水出立安又白礬枯黃丹炒等分調貼瘡上(本草)○馬毒瘡婦人月經血塗之又生粟及馬齒莧搗付之(本草)

諸獸肉毒 解六畜肉毒犀角濃磨汁一碗服之(本草)○食馬獸六畜肉中毒水浸豆豉絞取汁數升服之(綱目)○食自死六畜肉中毒黃柏末二三錢水調服不解再服(入門)○食自死鳥獸肝

中毒取人頭垢一錢熱湯化服(本草)○食諸肉中毒或吐下血胡荽子一升煮取汁停冷每服半升日二又胡蔥一升煮取汁冷服半升又生韭汁飲之又燒猪骨末和水服又犬屎燒灰和酒服(本草)

上海校經山房石印

南京中醫藥大學圖書館藏

1961

南京中醫藥大學圖書館藏

凡肉或密器蓋之福宿者名為鬱肉又茅屋漏水沾濕脯名為濕脯皆有毒害人黑豆濃煎汁飲數升又燒犬屎末和酒服又搗韭取汁服一二升又多飲人乳汁又燒人屎和酒服(本草)○食狗馬肉及肝中毒先剉頭髮令寸長拌好土作溲泥二升合和飲之須史髮皆貫所食甘出即愈又人乳汁一二升亦立愈(本草)○食馬肉中毒欲死香豉二兩杏仁三兩和蒸一炊久熟杵服日三升去皮服水取汁飲一二升又多飲清酒即解濁酒即加(本草)○食馬肝中毒人頭垢和水服又雞屎三升研和水服(本草)○食狗肉不消心下堅脹口乾發熱妄語煮蘆根取汁飲之又杏仁(升)去皮服水煮甘草汁服一二升(本草)○食生肉中毒地漿飲之(本草)

犀角

多服則令人煩麝香一

諸禽肉毒

食鵝鴨肉中毒糯米泔或溫酒飲之又梳米水研取汁飲一盞(本草)○食雉肉中毒吐下血未和水服一錢或以水濃磨取汁飲○食中毒箭死鳥獸肉及野鳥肉中毒狸骨燒灰和水

服又黑豆汁藍汁飲之(本草)

諸魚毒及蟹毒

食魚中毒飲冬瓜汁最驗又海獺皮煮汁飲之又濃煎橘皮汁飲之又鮫魚皮燒灰和水之亦良又黑豆汁豉汁並解之(本草)○食蟹中毒生藕汁冬瓜汁煮蒜汁飲之並佳又紫蘇葉煮汁飲之子汁飲

中食蟹蟹解之食鱸鱖中毒豉一合投新汲水半碗取濃汁頓服即愈○多食生膾不消胸膈不快瓜帶散(方見吐門)吐之若日久成癰病大黃朴硝陳皮各三錢水煮頓服下之(綱目)○又方取水中

腦立消萬物腦能消毒所以食膾食魚頭羹也(本草)○食膾不消結即出(本草)

芥果毒

食果中毒猪骨燒灰和水服又桂皮濃煎取汁飲之又服菰帶散吐之即愈○食雜芥果子過多腹脹氣急桂心為末飯九菜豆大以水吞下十九丸未愈再服(本草)○又桂心末五錢麝香一錢

飯九菜豆大白湯下十五丸即效名曰桂香丸(入門)○食銀香中香香油多飲吐之又地盤藍汁甘草汁飲之○治芥毒石首魚炙食或煮汁服自消(本草)○食桃得病取桃鳥燒為末和水服之即愈

菜蔬毒 食諸菜中毒發狂悶煩或吐下葛根濃煎汁服生汁尤佳又烏雞屎燒為末和水服又香油多飲升煎服吐即愈(本草)

即愈(本草)

升煎服吐即愈(本草)

即愈(本草)



燒酒毒

過飲燒酒中毒則面青口噤昏迷不省甚則腐腸穿脇遍身青黑或吐下血死在須臾初覺後脫衣推身裏轉之無數吐之即甦又以溫湯裸體浸灌常令溫煖若灌冷水即死又取生芥及雙梅

豆腐毒

過食豆腐腹脹氣塞欲死新汲水多飲即安若飲酒即死(俗方)○中豆腐毒令人生瘡噫氣遺精白濁蘿蔔煎湯飲之又杏仁水研取汁飲之(入門)

麩毒

人食熱麩多中毒蘿蔔搗取汁飲之又赤小豆末和水服即愈(本草)

服藥過劑或中毒煩悶欲死

屏角以水濃磨取汁服又葛根搗取汁飲之或水煮取汁服之又青蘘子飲之又地骨皮煮取汁飲之又生雞卵取黃吞之又地漿飲之又胡椒粉和服之又梗米

政汁飲之(本草)

通治百物毒

人中諸物毒服萬病解毒丹最妙○又細茶白礬每取三錢末新水調服即效名礬茶散(丹心)○又五倍子為末好酒調下三錢在上即吐在下即瀉(丹心)○又大甘草為極細

末微炒量病人酒量多火好酒調服須更大吐瀉雖瀉不可飲水飲水則難救(丹心)○臘雪水解一切毒取飲之(本草)○又甘草薺芩煎湯服之入口便活(本草)○解諸藥毒殺諸虫毒青魚雄黃等

分為末新水調下一錢(得效)○又蠶退紙燒灰新水調下一錢神效(直指)○又白扁豆為末新水調下二三錢得利即安(得效)○又犀角以水濃磨取汁服能解百毒(本草)○又葛根汁又藍葉汁

又人糞汁又地漿飲之(本草)○又香油多飲之或吐或下神效(本草)○又黑豆汁飲之又白狗屎絞汁服或燒灰和水服(本草)○甘豆湯解毒第一(本草)

甘豆湯

甘草黑豆皆解百藥百物毒各取五錢作一貼水煎取汁溫冷任意服之神效或加竹葉或加薺芩尤效(本草)

水毒

江南溪澗中有虫名為短狐亦名射工一名蟻其中無目利耳能聽在水中聞人聲輒以口中毒射人故謂之射工又含沙射人之影故謂之射工其虫其毒寒熱悶亂頭目俱痛亦如中尸卒不能語

又有水毒虫一名溪濕其病與射工相似但有瘡為射工無瘡為溪濕○又有沙虱乃毒蛇鱗中虫也夏月蛇為虱所苦倒身江灘刷其虱虱入沙中行人中其毒如瘡如針孔粟粒四面有五色文須剝去

小肉即愈不然三兩日死○射工溪濕皆能殺人治法取湯數斛以蒜五升投湯中溫浴之體身發赤癢者水毒又消水毒飲子並主之(入門)

消水毒飲子

吳茱萸半升生薑犀角升麻陳皮各一兩烏梅七個右剉水七碗煎至二碗分二服(入門)

救急



十件危病

華佗云人有急病疾如風雨命醫不及須臾不救視其橫天實可哀憐予選十件危病三十妙方以救之不可不知○又云人有急病疾如風雨須臾不救命在頃刻世人纔見一時氣絕便以為死更不知有可救之理可救之方故以所歷經驗數方錄梓以廣其傳便可對證尋方服藥急救庶幾倉卒無夭橫之患矣○一霍亂吐瀉(詳見霍亂門)○二纏喉風閉塞(方見咽喉門)○三吐血

血(方見血門)○四中砥礪毒(方見解毒門)○五尸厥○六中惡客忤○七脫腸

○八惡魔鬼打○九孕婦橫逆產(方見婦人門)○十胎衣不下(方見婦人門)

中惡

凡中惡客忤鬼氣之證凡人暮夜或登廁或出郊野或游空冷屋室或行人所不至之地忽覺身寒

但腹中不鳴心腹俱煖切勿移動其屍即令親戚眾人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香等物候其

方可移動(華佗)○先用蘇合香丸(方見氣門)薑湯或溫酒化下三九蘇省後用他藥○神效

尤好(方見邪祟)且用朱犀散備急丸(方見卒死)○急取半夏末或皂角末吹兩鼻中○神效

者一日亦可活(得效)○又取故汗衣須用內衣久遭汗者佳男用女衣女用男衣燒灰為末每

百沸湯調下(得效)○又麝香一錢研和醋二合服之便差又取蔥黃心刺鼻中入深四五寸合

出血即活又生薑汁醇酒各半蓋同煎百沸灌服之又白犬斷頭取獻血一升灌之又韭汁口鼻中又

菖蒲搗取汁灌之又桃梟酒磨服之又黃丹

一錢蜜三合和服口瘡者折齒灌之(本草)

鬼擊鬼打鬼排此等病皆得之無漸卒者人如刀刺狀胸腹疔

朱犀散犀角五錢朱砂麝香各二錢半右

脈候中惡之脈緊細易治浮大難痊(得效)○脈至如喘名曰暴厥暴厥者不知與人言(內經)○寸口脈

沈大而滑沈則為實滑則為氣實氣相搏血氣入藏即死入府即愈此為卒厥不知人何謂也師曰唇

尸厥

絕脈動如故或脈無倫序或乍大乍小或微細不見而心胸煖者是也(仲景)○尸厥者即中惡之類

凡吊死問疾或入墓登冢卒中邪惡與藏氣相忤忽然手足逆冷頭面青黑牙關緊急頭旋暈倒昏不

知人或錯言妄語急取蘇合香丸三九溫酒或薑湯灌下又煎還魂湯灌之又故汗衣燒灰末二錢百

沸湯調灌又菖蒲汁灌口中(丹心)○血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則

死○邪客於手足少陰太陽足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而

形無知也其狀若尸名曰尸厥以竹管吹其兩耳即甦(內經)○尸厥之證卒死脈猶動四肢逆冷腹中氣走如雷鳴聽其耳中如微語聲者是也急用硫黃散末屋散(方見上)又附子炮一枚為末分二服酒煎灌之無則薑汁半盞酒一盞煎百沸灌下(入門)

還魂湯

一名追魂湯主中惡尸厥暴死客忤鬼擊飛尸奄忽口噤氣絕麻黃三錢杏仁二十五粒各一錢右剉作一貼水煎灌服口噤者幹開口灌之藥下立甦(仲景)○凡尸厥者

硫黃散

治尸厥奄然死去不省人事命在頃刻硫黃一兩煇硝半兩右細研如粉分作三服每服用酒一盞同煎覺煇起傾於盞內蓋著候溫灌服之如人行五里又進一服不過三服即甦(得效)

鬼魔

人眠睡則魂魄外遊為鬼邪所魔屈其精神弱者魔久不得寤乃至氣絕所以須傍人助喚并以方聲使令人叫喚如不醒乃鬼魔也到客舍館驛及久無人居冷房睡中為鬼物所魔但聞其人叱咤亦不得近前急喚多殺人但痛咬其足跟及大拇指甲邊并多唾其面即活如不醒者移動處坐於徐鼻中(得效)○鬼魔卒死及卒中鬼擊血漏腹中煩滿欲死雄黃末吹入鼻中又酒調一錢服日三能

化血為水(本草)○又生韭汁灌口中及耳鼻中薤白汁亦可又東向桃柳枝各七寸煎湯灌下又伏龍肝末二錢并水調灌服更吹入鼻中又羊糞燒烟熏鼻中即甦(諸方)○夢中被刺殺或被打諸般

不祥忽然吐衄下血甚者九竅皆出血宜以升麻獨活續斷地黃各五錢桂皮一錢右為末每二錢白湯調下日三(入門)

雄朱散

治鬼魔牛黃雄黃各一錢朱砂五分右為末每挑一錢於床下燒之次挑一錢以酒調灌(入門)

鬱胃

人平居無疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口啞不能言或微知人惡聞人聲但如眩暈移時方寤此由汗出過多血火氣并于血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽

白薇湯

白薇當歸各一兩人參半兩甘草二錢半右為麤末每五錢水煎溫服(本事)

倉公散

藜蘆瓜蒂雄黃白礬各等分右為末取火許吹入鼻中(本事)

客忤卒厥諸證 客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛服滿氣衝心胸不即治亦殺人取百草霜五錢鹽一錢和研溫水調下(本草)○又取鹽雞子大青布裏燒赤研納酒中頓服

當吐惡物又取細辛桂心為細末納口中又銅器或瓦器盛熱湯用厚衣襯腹上於衣上熨之冷則易便愈又至寶丹方見風門蘇合香丸以薑汁或溫酒或童尿調灌諸方○又熟艾一兩水煎取汁頻服即差本草○帝曰厥令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也岐伯曰陰氣盛於上即下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知

卒死

各門內證治之○凡卒急之證有氣厥血厥痰厥食厥中風中寒中暑中瀆之類皆詳見人內經○至聖來復丹方見寒門通治諸厥危急之疾得效
帝曰人有卒然暴死暴病者何也火師答曰三虛者其死暴疾也得三實者邪不得傷人此所謂三虛者乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷是為三虛逢年之歲過月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之是為三實○三虛相搏則為暴病卒死○雷公問曰人不病而卒死何以知之帝曰赤色出兩額大如拇指者病氣入於藏府者不病而卒死矣雷公曰病小愈而卒死者何以知之帝曰赤色出兩額大如拇指者病雖小愈必卒死黑色出於庭庭謂額也○大如拇指必不病而卒死靈樞○凡卒死者張目開手散遺尿為虛宜補氣目閉口噤手拳為實宜發表綱目○人見五色非常之鬼遂令暴死者皆自逐

精神不守神光不聚故耳非外所侮乃元氣極虛之候也正傳○凡暴亡不出一時可救之雖氣絕絕四肢冷若心腹溫鼻微溫目中神彩不轉口中無涎舌與陰卵不縮者皆可活也遺篇○救卒死或常居寢臥奄忽而絕急割取雄雞冠血頻塗其面乾復塗之并以灰營死人一周本草○狐胆主暴亡臘月取者尤佳若有人卒死未移時者溫水研灌人口中即活本草○清心丸至寶丹方見和灌服蘇合香丸方見氣門○至聖來復丹方見寒門備急丸皆主卒死以薑汁或溫酒或童尿調

錢溫酒調灌即甦諸方○驚怖卒死者以溫酒灌之即活綱目○驚怖

備急丸

主諸卒死暴疾百病及中惡客忤鬼擊鬼打面青口噤奄忽氣絕大黃乾薑巴豆霜各一兩右為末蜜和搗千杵作丸小豆大卒死者取三丸熱酒吞下口噤則以酒化灌之下咽即活或溫水下亦得仲景○張易老又名獨行丸乃急劑也丹心

脫陽證

凡人因大吐大瀉之後元氣不接四肢逆冷面黑氣喘冷汗自出外腎縮搐不省人事須臾不救與傷寒陰陽易同證宜急服大固陽湯○又桂枝二兩對好酒煎取汁服又連鬚蔥白三七莖以酒煮

煎服陽氣即回又生薑一兩研酒煎服亦效又蔥鹽爛搗炒熟臍下氣海即愈得效

大固陽湯

大附子一枚炮切作八片白朮乾薑炮各五錢木香二錢半右對作一帖水煎去滓放冷灌服須臾又進一服神效得效

救自縊死

自縊死者自旦至暮雖已冷必可活自暮至旦則難治心下若微溫者一日已上猶可活當徐徐抱下解之不可截斷繩子令安臥被中急須按定其心却熱正喉嚨令一人以手掌掩其口鼻勿



令透氣氣急則活又令一人以脚踏其兩肩以手挽其鬢常令弦急勿使緩緩一人以手據按胸上數
摩動之一人摩捋臂脰屈伸之若已強直漸漸強屈之如此一炊頃雖得氣從口出呼吸眼開仍按
勿止(仲景)○又法用手厚裹衣物緊填穀道抱起解繩放下捺其項痕仍搗藥入鼻及以竹管吹其
兩耳待其氣回方可放手若便後分泄氣則不可救矣(山居)○急刺雞冠血滴口中即活(醫方)○
又取雞尿白如棗大酒和灌鼻中尤妙(本草)○又以藍汁灌之又取梁上塵如大豆許細竹管吹
人各一管同時極力吹兩耳鼻中即活又取半夏末或皂角末或細辛末吹入鼻中得嚏即愈須臾
與溫粥清令喉潤漸漸嚥下乃止(本草)○五絕者一日自縊二日墻壁壓三日
溺水四日鬼魔五日產乳皆取半夏末吹鼻中心頭溫者雖一日皆可活(本草)

救溺水

凡溺水死者一宿尚可救急急拯出先以刀挖開口放筋一枚含之使可出口然後解去衣服
灸臍中二三壯令兩人以筆管吹其兩耳又取皂角末綿裹納下部須臾出水即愈又取鴨血
灌入口中又將醋半盞灌鼻中又用蘇合香丸三九薑湯調灌又萬病解毒丹一錠冷水磨化灌下即
甦溺死縊死皆效(入門)○又法取麻中熟灰熱沙亦可一二石埋其身只出頭面水出七孔即活
(仲景)○又法將牛一頭將死者腹橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐而行則水自下亦活(得效)

○又法以生人倒駝死人即負持走吐水便活○又法以酒壘一個以紙錢一把燒壘中急以壘覆
死入面上或臍上冷則
再換水出即活(入門)

救凍死

人遇寒凍死四肢強直口噤只有微氣者用大釜炒灰令煖囊盛尉心上冷則易口開氣出然後以
溫粥清稍稍灌之或溫酒或薑湯灌之即甦若不先溫其心便將火炙則冷氣與火爭必死矣(綱
目)○又法用氈或薦裹死人以索繫定於平穩處令兩

救餓死

人對面輕輕旋轉往來如得甦法四肢溫和即活(得效)
○又法用氈或薦裹死人以索繫定於平穩處令兩

攪腸沙

此證心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂之攪腸沙數日乃與稠粥軟飯則自然生活(類聚)
○又法用氈或薦裹死人以索繫定於平穩處令兩

湯試之

如吐即是也(得效)○治法蠶退紙燒為末熱酒調服立效又多飲鹽湯吐之亦愈(得效)○
○又法以手蘸溫水於病者膝灣內打拍有紫黑點處以針刺去惡

惡血

合聚指頭血出為好(入門)○又法以手蘸溫水於病者膝灣內打拍有紫黑點處以針刺去惡
血即愈(丹心)○患痛之人兩臂腕中有筋必致黑

入井塚卒死

凡入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無毒若徘徊不下則有毒當先以酒數升酒其中停久
乃入(本草)○夏月淘井多致殺人五六月尤甚古塚中及深井中皆有伏氣若入則令人冒

色角

凡入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無毒若徘徊不下則有毒當先以酒數升酒其中停久
乃入(本草)○夏月淘井多致殺人五六月尤甚古塚中及深井中皆有伏氣若入則令人冒

色角

凡入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無毒若徘徊不下則有毒當先以酒數升酒其中停久
乃入(本草)○夏月淘井多致殺人五六月尤甚古塚中及深井中皆有伏氣若入則令人冒

色角

凡入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無毒若徘徊不下則有毒當先以酒數升酒其中停久
乃入(本草)○夏月淘井多致殺人五六月尤甚古塚中及深井中皆有伏氣若入則令人冒

色角

凡入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無毒若徘徊不下則有毒當先以酒數升酒其中停久
乃入(本草)○夏月淘井多致殺人五六月尤甚古塚中及深井中皆有伏氣若入則令人冒

悶奄忽而死即取井水噴其面并冷水調雄黃末一二錢服之轉筋入腹痛欲死者使四人捉住手足灸臍左邊二寸十四壯又用生薑一兩對酒五盞濃煎頓服又醋煮衣絮令熱徹溼裏轉筋處又濃煎鹽湯浸手足洗胸脇間即甦(入門)○新城縣人家有枯井一口有客人兩者於五月間因失鈔餘疑在井中一人先下井中寂然無聲又一人繼下亦久不出傍人怪之與家主議用繩吊縛水版令人踏下井看之其人亦無聲即牽上井則其人昏迷不省用冷水救甦更用雞犬縛繩下試亦皆死焉遂拆毀井畔見兩人身尸用繩吊縛上來看審則身尸青黑了無傷痕此其中毒而死也治法同上(類聚)

蛇人七竅

夏月因熱就涼睡有蛇入人耳鼻口中挽不出急以刀傷蛇尾納川椒(云胡椒)二粒裹著即出又以艾炙蛇尾即出又割母猪尾頭滙血入口中并孔中亦出後取雄黃末調人參湯服制

蛇毒(丹心)○人卒為蛇繞不解以熱湯淋之無湯則令人尿之即解(綱目)

針灸法

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡俱竭令人身脈皆動而形無知其狀若尸名曰尸厥灸刺隱白後刺涌泉後刺厲兌後刺火商後刺神門(內經)○尸厥當刺期門巨闕中極僕參(綱目)

數金門○卒厥尸厥百會灸四十九壯氣海丹田灸三百壯覺身體溫煖即止○中惡客忤卒死灸臍中百壯○中惡取人中中腕氣海○卒死灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各三壯即差又灸手足兩爪後二七壯○諸卒死及魔死急於人中及兩脚大姆指內離爪一韭葉許各七壯即活(綱目)○卒被鬼擊如中箭用桃皮一片安痛上取一匙頭安桃皮上用艾胡桃大安匙頭灸之即愈(入門)

怪疾

有二十條

怪疾異常

怪證異於常患之病故謂之怪疾

肉癥

肉癥者思肉不已食訖復思白馬尿三升空心飲當吐肉不吐者死(本草)

酒癥

一人病心痛此人好酒初飲二三碗必奔走三五十次其酒稍散方復飲至前量至明朝嘔青黃水數口夜變魚腥臭六七日始安戴人(張子和也)以藥吐之乃吐虫一條青黃色長六七寸寸目鼻俱全狀如蛇醺乾以視人乃酒癥也(綱目)○一男自幼喜飲酒日飲一二升無酒色長六寸寸目鼻食日就瘦弱家中設策令人用手巾縛住手足却取生酒一罈於口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲就飲堅不與之須臾口中忽吐出一塊直下墜中以物蓋覆猛火燒滾約乾一半却開取之其物如猪肝狀約三兩重周圍有小孔如針眼不可數計棄之於江自後雖滴酒不能飲矣(得效)

髮癥一人有飲油五升以來方始快意常吃則安不飲則病此是髮入胃化為虫雄黃羊兩為末水調服虫自出投沸油中棄之江中病即愈(得效)○一道人心腹煩悶彌二歲甄立言診曰腹有蠱誤食

髮癥

虫自出投沸油中棄之江中病即愈(得效)○一道人心腹煩悶彌二歲甄立言診曰腹有蠱誤食



髮而然令但雄黃一劑火噴吐一蛇無目燒之有髮氣乃愈(入門)○一人患腰痛牽心每發則欲絕眾以為向癘徐文伯視之曰此髮癩也以油投之即吐物如髮稍引之長三尺頭已成蛇能動徐門上滿盡惟一髮而已(入門)○一婦人病胸膈不利口流涎沫自言咽下胃中常有雷聲心膈發痛須發昏針灸藥餌三載不愈戴人用痰藥一涌而出雪白虫一條長五六寸有口鼻牙齒入於延中者惡而斷之中有白髮一莖此髮癩也(子和)

雞癩

諸澄為吳郡太守李道念到郡澄見謂曰汝有重病答曰舊有冷病今五年矣澄謂謂曰汝病非冷非熱當是食白瀟雞子過多所致令取蒜一升煮服之乃吐一物如升大有涎裏之爛者是雞癩翅羽爪距悉具能行走澄曰此未盡令更服藥又吐如向者十三頭而安(醫說)

蛟龍癩

春秋二時龍帶精入芥菜中人偶食之得病發則似癩面色青黃腹滿痛不可忍名為蛟龍病癩飴糖粳米杏仁乳餅煮粥食之三升日三服吐出蛟龍子有兩頭可驗(仲景)

蛇癩

華佗行道見車載一人病噎塞食不下呻吟佗曰餅店家蒜薑大酢三升飲之當自痊如言服之果蛇肉不消而致斯病但揣心腹上有蛇形也視之果然用硝黃合而服之微利即愈(入門)

蠶癩

人食蠶肉不消成癩伏在皮下揣見頭足時時轉動作痛白馬尿飲之即消昔有人與奴俱得此病奴先死剖其腹得蠶置庭中有乘白馬客來看其馬放尿蠶上即便消化其主知其奇效取飲之即愈○白雞雞一隻勿與食令飢過一宿明日以猪脂煎飯喂之取其屎熬乾為末白湯調下一錢日三服須消盡乃止好了殺雞食之(種杏)

蛤精疾

一人患脚跟腫痛諸醫莫識徐之才曰蛤精疾也由乘船入海垂脚水中而得為剖出二蛤而愈(入門)

眼見五色物

一人酒色過度眼見空中有五色物稍近變成一美婦人亭亭而立徐之才曰此色慾多太虛所致乃處補藥飲之數劑而愈(入門)

視物倒植

一人因大醉極吐熱睡至次早眼中視物皆倒植醫者診其脈左關浮促遂用瓜蒂藜蘆平旦吐之視物如常蓋傷酒吐時上焦反覆致倒瞻府故視物皆倒法當復吐以正其胆則自愈(入門)

四肢堅如石

寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之一似鍾磬聲日漸瘦弱吳茱萸木香等分對煎湯飲之自愈(得效)

化生鰕魚

口鼻腥臭水流以碗盛之有鐵色鰕魚如粳米大走躍不住以手捉即化為水此肉壞也任意食雞肉自愈(得效)

腹如鐵石

腹中如鐵石膈中水出旋變作虫行之狀遠身嘔吐痛癢難忍搔掃不盡用濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮末入麝香少許水調服之而痊(得效)

遍身波浪聲

遍身忽皮底渾渾如波浪聲癢不可忍搔之血出謂之氣奔人參苦棧青鹽細辛各一兩對作四貼每一貼水煎服便愈(得效)

身出斑毛

眼赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃目中熱毒氣結於下焦白礬滑石各一兩為末水煎服不住乃安(得效)

十指斷環

手十指節斷環惟有筋連無節肉虫出如燈心長數尺餘過身綠色名曰血餘赤茯苓胡黃連煎湯飲之自愈(得效)

有蟲如蟹

有虫如蟹走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化雷九雄黃各一兩為末搽於猪肉片火上炙熟食之自安(得效)

肉出如錐

遍身忽然肉出如錐既癢且痛不能飲食此名血壅若不速治潰而膿出赤皮葱燒灰和水淋洗吃鼓湯自安(得效)

毛竅血出

遍身毛竅節次血出若不出皮脚腫如鼓須更眼鼻口被氣脹合此名脈溢飲生薑汁一盞即安(得效)

身生猫眼瘡

面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛癢不常久則透脛名曰寒瘡多吃魚雞韭葱等物則自愈(得效)

口鼻氣出不散

口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸至肩胸與肉相連堅勝金鐵多因瘧後得之煎澤瀉湯日飲三五日乃愈(得效)

渾身生燈泡

渾身生瘡如甘棠梨每個破出水內有石一片如指甲大癩復生抽盡肌膚肉不可治三稜蓬朮各五兩為末分三貼酒調服自愈(得效)

人身作兩

人自覺其形作兩人並臥不辨真假不語問亦無對乃是離魂辰砂人參白茯苓濃煎湯服之真者氣爽假者化也(得效)

生瘡如櫻桃

項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛乳自消(得效)

四肢節脫

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘆二兩經一宿焙乾高末每二錢酒調下愈(得效)

身腫如蛇狀

身上及頭面肉上浮腫如蛇狀取兩滴階墻上苔痕一錢水化開塗蛇頭立消(得效)

身有光色

頭面發熱有光色他人手近之如火燒人用蒜汁半兩酒調服如蛇狀遂安(得效)



南京中醫藥大學圖書館藏

雜方

救荒辟穀方

粒食者生人所資數日之絕便能致命本草有不飢之文而醫方不言斯術者以其涉在奇非庸俗所能遵也遂使荒饑之歲餓死橫路良可哀哉今路載其易為者云若值奔竄在無人

之鄉及墜墮溪谷空井深坑之中而四顧迥絕無可以藉口者便須飲水服氣其法如左(千金)

嚙津服水法

飢餓欲死便開口以舌攪上下齒取津液而嚙之一日得三百六十嚙便佳漸輕乃可至于自然不飢三五日小疲極過此便漸輕強若有水處卒無器便以左手掬水呷曰丞務吏之

賜真之根正赤黃行無過城下諸醫以自防呪畢三叩齒右手指三叩左手如此三遍便飲之有孟器貯水尤佳如法日服三升便不飢(千金)

服六天氣法

六天氣服之令人不飢人有急難阻絕之處如龜蛇服氣則不死陵陽子明經言春食朝露日欲出時向東氣也夏食正陽南方日中氣也秋食飛泉日欲沒時向西氣也冬食沆瀣北

方夜半氣也并天玄地黃之氣是為六氣皆令人不飢延年無疾○一云平明為朝霞日中為正陽日入為飛泉夜半為沆瀣并天玄地黃為六氣○昔有人墮穴中其中有蛇每日作此氣服之其人終蛇

時節飢時便服日日如之久漸有驗似能輕舉啟蟄之後人與蛇一時躍出焉(千金)

斷穀不飢藥

餌松柏葉法

周行山澤間取松柏葉細切和水服一合一日二三升最佳○終南山有一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃合國取獲則乃一婦人言我是秦宮人闖東賊至秦主出降驚走

入山飢無所食有一人老公教我食松柏葉初時苦澁後稍便吃遂不復飢冬不寒夏不熱自秦時至漢成帝時已三百餘年矣(千金)

黃精

久服斷穀不飢甘美易食根葉花實皆可服餌或蒸熟或晒乾丸散隨宜凶年之時可代糧(本草)

天門冬

取根蒸熟去皮食之甚香美荒年取啖之足以斷穀止飢(本草)

朮

取朮作丸散久久服餌可以代糧○一人避亂山中飢因欲死有人教以服朮遂不飢數十年還鄉里顏色如故(本草)

薯蕷

取根蒸熟食之或搗粉作麪食之凶年可以充糧不飢最佳(本草)

旋菴根

蒸熟食之斷穀不飢處有之可服飢(本草)



葛根

採取作粉餌之可
斷穀不飢(本草)

何首烏

取根蒸曝丸散任意亦
可生啖可休糧(本草)

百合

林根蒸煮食之甚益
人可休糧(本草)

松葉

守中不飢斷穀所宜取細切如粟和水或米飲服之或和大豆末食之可作避地術之陰莖搗末和水服亦佳○松白皮蒸熟食之辟穀不飢○松脂一斤白茯苓四兩為末每晨和水服或蜜丸服之

可辟穀長生終
年不食(本草)

柏葉

服法同松脂久服
斷穀不飢(本草)

榆白皮

荒歲人食之以當糧
搗末和水服(本草)

白茯苓

善能斷穀不飢○大麥麩(火麥亦可)一斤茯苓末四兩以生牛乳和為方寸餅子煮熟飽食可
百日不飢○又白茯苓末四兩白麩二兩右水和得所以黃蠟代油燂成煎餅飽食一頓便絕食

三日後飲脂麻湯
少潤腸胃(本草)

橡實

去皮煮食最益人實中令不
飢可多取備歉歲(本草)

蠟

仙經斷穀最為要用令人但嚼食方寸者終日不飢也○用黃蠟炒糯米嚼食充飢可辟穀不飢食胡
桃肉即解○白麩一斤黃蠟為油作煎餅飽食可百日不飢○合松脂杏仁棗肉茯苓等分為末作丸

服五十九便不飢○古人荒歲多食蠟
以度飢當大棗咀嚼即易爛(本草)

栗

煨熟食之令人
耐飢(本草)

藕

蒸食可休糧食之最佳○蓮子去皮心蒸熟為
末蠟蜜為丸日服二十九令人不飢(本草)

海松子

食之不飢
(本草)

大棗

久服不飢
(本草)



菱芡 菱仁或芡仁皆可休根○今多蒸曝取仁為粉
蜜和食之可以代糧不飢斷穀長生(本草)

芋 煮熟食之可以當糧
食而度飢年(本草)

烏芋 作粉食之或煮熟食令人
不飢荒歲可充糧(本草)

桃膠 補中不飢以桑灰漬之服餌身
輕百病愈數月斷穀(本草)

胡麻 九蒸九曝熬搗餌之斷穀不飢長生○又合白大豆棗同
蒸曝作團食令不飢斷穀○胡麻休糧人重之(本草)

白脂麻 仙方蒸曝服餌
以辟穀(本草)

榛子 久食令人不
飢(本草)

大麻子 令人不飢○麻子二升大豆一升熬令香搗末蜜丸日二服令不飢○
又麻子一升白羊脂七兩蠟五兩白蜜一合和搗蒸食之不飢(本草)

黑豆 炒熟以棗肉同搗之為麩可以代糧○左元放救荒年法擇取雄黑豆三七粒生者熟按之令煖氣
徹豆心先一日不食次早以冷水吞下魚肉菜果不復經口渴則飲冷水初雖小困十數日後體力
壯健不復思食矣(本草)○仙方修製大
豆黃末服餌之可辟穀度飢歲(本草)

粳米 荒年穀貴無以充糧取粳米一升酒三升漬之出曝乾又漬又曝酒盡乃止稍稍食之渴飲冷水辟
三十日足一斛二升辟周年○又大米三合炒過以黃蠟二兩榕銚內入米炒令乾任便食之數日
不飢如食胡桃二
個即思食(本草)

糯米 若遇凶年穀貴取糯米一斗淘洗百蒸百曝搗末日一
倉以冷水得三十日都盡則可終身不食不飢(本草)

青粱米 青粱米一斗以苦酒一斗漬之三日出百蒸百曝好裹藏之遠行一倉十
日不飢重倉九十日不飢○青粱醋拌百蒸百曝可作糗糧辟穀(本草)

蔓菁子 取子用水煮三遍令苦味盡暴乾搗末水服二錢日三久漸增服
可以辟穀○又蔓菁取苗葉莖根四時長服可以備飢歲(本草)

荏子 服食斷穀○可蒸令熟烈日乾之當
口開吞取米食之亦可休糧(本草)



南京中醫藥大學圖書館藏

辟穀絕食方

年荒穀貴或遠方水火不便或修行人欲休糧宜服此黑豆五升淘洗蒸三遍曬乾去皮為末大麻子三升(二作五升)湯浸一宿漉出曬乾蒸三遍令口開去皮為末用糯米湯合

搗勻成團如拳大再入甑蒸之從夜至子任火至寅取出磁器盛蓋勿令風乾每服一二塊以飽為度不得吃一切物第一頓七日不食第二頓七七日不食第三頓一百日不食第四頓永不飢吞龍涎更不憔悴如渴則飲大麻汁以滋潤藏府若要吃物服葵菜湯解之

千金麩

蜜二斤白麩六斤香油二斤白茯苓四兩甘草二兩生薑去皮四兩乾薑炮二兩右為末拌勻作塊甑內蒸熟陰乾為末每取一大匙冷水調下可經百日不飢其麩於絹袋盛之可留至十年

(類聚)

辟穀不飢方

甘菊花白茯苓黃蠟松脂蜂蜜等分為末先煉蜜次下藥和勻丸如彈子每一丸白湯嚙下(類聚)

避難大道丸

黑豆一升去皮貫眾甘草各一兩茯苓蒼朮砂仁各五錢剉碎用水五盞同豆慢火熬爛至水盡揀去藥取豆搗如泥作芡實大磁器密封每嚙一丸則忘食苗葉可為終日飽雖具

草殊木素所不識亦無毒甘甜與進飯糧一同○一方黑豆一升貫眾一斤細剉同煮豆香熟反覆令展盡餘汁釀去貫眾只取黑豆空心日啖五七粒任食草木無妨忌魚肉菜果及熱湯數日後不復思食(入門)

諸法

取水火法

陽燧向日然而為火許慎云陽燧金也取金盃無緣者熟摩令熱日中時向日以艾承之則然得火也○日者大陽真火以水精珠或心凹銅鏡向日射之以艾承接其光聚處火出故知之

方諸大蚌也向月承取水二
三合如朝露主明目(本草)

磁石指南

以磁石磨針鋒則能指南其法取新纈中獨縷以半芥子許蠟綴于針腰無風處垂之則針常指南以針橫貫燈心浮水上亦指南然常偏兩位不全南向也蓋丙為大火庚辛金受其制故

如是物理相
感綱(本草)

不畏寒

欲不畏寒取天門冬白茯苓等分為末酒服二錢日再則大寒時單衣汗出(本草)

香身法

茅香苗葉可煮作湯浴令人身香去惡氣煮服之亦可零陵香亦香身飲浴皆佳(本草)



令人勇 服天雄令人武勇○取天雄三枚納雄維勝中搗爛生食之令人勇(淮南子)

去鬼通神 神辟眾惡(本草)安息香燒去鬼來

見鬼方 要見鬼者取生麻子石菖蒲鬼白等分為末蜜丸彈子大每朝向日服一丸服滿百日即見鬼(本草)

隱形法 白大胆和通草桂心作末蜜和為丸服能令人隱形青犬尤效(本草)

令夫婦相愛 夫婦不和取鴛鴦肉作羹曬私與食之即相憐愛○五月五日取布穀鳥脚腦骨帶之亦令夫妻即相愛(本草)

去妬方 蕙苾仁天門冬赤黍米等分蜜丸男婦服之皆不妬忌○又鷓鴣肉食之亦不妬忌(入門)

去衣油及衣垢 東壁土可除油污衣勝石灰滑石○合歡皮及葉可洗衣垢又梅葉搗碎湯洗衣垢效脫又芋煮汁洗垢衣白如玉又赤小豆粉解油衣粘綴甚妙○又皂角湯去垢最效(本草)

軟玉法 蟾蜍肪塗玉則刻之如蠟但不可多得取肥者對煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特雕琢非人功者多是昆吾刀及蟾蜍肪所刻也(本草)

爛石法 地榆根燒灰能爛石○蟾蜍尿取以塗石亦能爛石(本草)

香譜 通旁

文苑 和四香凝
沈香 二兩
白檀 五錢
降真 五錢
沈香 一分

新料 花百
白檀 一分
降真 五錢
沈香 一分

笑蘭 碎
白檀 五錢
降真 五錢
麝香 一錢

清遠 雲
白檀 三錢
沈香 五錢
麝香 一錢

錦囊 寶
腦子 一錢
零陵 五錢
麝香 一錢

醒心 真清
藿香 一分
麝香 一錢



上海校經山房石印

凝和 麝香 丁香 白檀 甲香 沈香 甘松 一錢 一錢 一兩 一錢 一錢 一分

右為末用蜜少許拌勻如常法燒之文房中(必用)

瑞雲香 酸棗仁一升水和研汁一椀煎成膏香附子白芷各三兩白檀茅香艾納香(即松木上青)衣也(草豆蔻丁香各一兩木香五錢龍腦一錢右為末以酸棗仁膏搜和入麝香和勻作合)

不黏手得所為蓮子大每燒一丸青烟直上三尺許結成毬子于空中移時不散(必用)

芙蓉香 沈束香白檀各二兩零陵香甘松香茅香各一兩丁香三乃子八角各七錢小腦五錢白芨四兩(或五兩)右研為末水和攪作條如筋子大陰乾燒之此芙蓉小柱法也

聚仙香 蜜熾硝各五錢龍腦麝香各一錢白芨三兩右七料為末分兩包取銚子安於火上入攪油蘇合

安息蜂蜜熔化於令微温乃入一包香末及腦麝熾攪令十分和勻用一包乾末作粉摻手塗擦竹心上陰乾燒之(一名清遠香(中朝傳習))

淹藏果實法 臘雪水淹藏一切果實良(本草) 糟藏物不敗可淹瓜果(本草)

香肥皂 沈香白檀丁香零陵香三乃子各一兩小腦三錢麝香一錢右為末入皂角末五兩黑糖二兩或三兩於火上熔化拌和香末作丸彈子大凡盥洗時用此搓洗手面去垢膩俗名香飛露(唐方)

辟蚤虱 芎藭甚去蟲殺蚤虱可辟去之(○)百部根殺虱煮湯洗之(○)青蒿殺虱煎湯洗之(○)水銀殺皮膚中虱唾研塗之(○)篋虱輕粉亦同(本草)(○)凡人洗濯衣服於粉緞內入水銀火許研

勻搥衣其後虱永不生(醫林)(○)帶砒礬辟蚤虱(本草)(○)壁虱蜈蚣焯燒煙熏之即去(○)青鹽水通洒床(○)蠅上即絕(得效)

辟蚊蠅 五月取浮萍陰乾燒烟去蚊子(○)百部根殺蠅(○)藍漆殺蠅作末和飯中蠅食之盡死(○)鱧蠅魚乾者燒室中蚊化為水(○)五月五日取蝙蝠曬乾和桂皮乳香為末燒之去蚊(本草)(○)木蠹

子川芎雄黃為末燒之蚊速去(必用)

辟蠹 鱧蠅魚燒熏乾中斷蛀虫置骨箱中斷白魚免諸虫咬衣服燒熏諸竹木辟蛀虫(○)芸薹辟蠹置書中無蠹患(○)薺菜花紉去席下辟蠹(本草)(○)楔植置衣箱中殺虫魚(本草)(○)烏賊骨投井中

蟲盡死

(本草)

殺禽獸賊鼠 狼毒殺飛鳥走獸亦殺鼠(○)馬刀殺禽獸賊鼠(本草)



殺魚 巴豆殺蟲魚。川椒殺一切魚。取皮按水中可取。

集鼠 蟹燒之致鼠。蟹黃并熬燒烟。可以集鼠於度。

黏瓦石 榆白皮淫搗如糊。用黏瓦石極有力。

獸食物即醉 虎食狗則醉。貓食薄荷即醉。

解鬱食 凡久閉空房不宜輒入。先以香物及蒼朮皂莢之類。

解烟熏 居民逃避石室中。賊以煙火熏之。欲死迷悶中。摸索得一束蘿蔔。嚼汁下咽而甦。

枸杞子酒 能補益。枸杞子五升清酒二斗。研搗浸七日。取。

地黃酒 糯米一斗。生地黃三斤。細切同蒸爛。熟入白麴如。

天門冬酒 補益。天門冬去皮心。搗取汁二斗。漬麴二升。麴發以糯米二斗。準家釀。

戊戌酒 糯米三斗。蒸熟。黃雄大一隻。去皮腸。煮一伏。時候極爛。搗為泥。連汁與飯同拌勻。

神仙固本酒 能變白髮。返老還童。牛膝八兩。何首烏。龍末六兩。枸杞子。搗碎。四兩。天門冬。麥門冬。生地黃。

蒲萄酒 蒲萄熟者。按取汁。同糯米飯。白麴和釀之。

蜜酒 好蜜二斤。水一碗。白麴一升。半好乾。酵三兩。右先熬蜜。

雞鳴酒 右先將黏米三升。淨淘。水六升。同下。鍋煮。作粥。夏攤冷。春秋溫。冬微熱。麴。麥芽。皆搗細。末同。錫。

白花香 糯米一斗。百度洗淨。浸一盆。水中。過三日。蒸熟。以所浸水洗之。

黃昏時候。安排了。來朝。便飲。饗頭。春。必用。



煮酒 好清酒一瓶入黃蠟二錢胡椒研一錢緊封口置一撮溼米於其上重湯煮之其米成飯即成矣取出放冷用(俗方)

作酒本 白米一升洗淨浸水中冬十春秋五夏三日待水透心潤溼取米蒸爛熟入麴少許以手按實分調勻納紅中封口冬置溫處夏置涼處待消化過此日造者非神麴也或云此日辦麴并至

造神麴法 六月六日謂諸神集會之晨故名為神麴如過此日造者非神麴也或云此日辦麴并至

汁一升三合○青龍即青虎即帶麴白麴二十五斤○勾陳即蒼耳自然汁一升○滕陵即野麥自然汁一升○小豆煮熟搗如泥一升右共修合三伏內用上寅日踏極實為度○又云或甲寅戌寅庚寅日乃三時

也○神麴六神之曲也必六物備可謂之神也(丹心)

百藥煎法 五倍子二斤半烏梅肉白礬各四兩酒白麴四兩右將水紅蓼十二兩煎水去渣入馬糞曬乾聽用染鬚者加綠礬四兩(入門)

造豉法 以大豆為黃蒸(即未醬)每一斗加鹽四升川椒四兩同淹春秋三日夏二日冬五日即成半熟既潔且精

造飴糖法 以糯米煮粥候冷入麥芽末候熟取清再熬如琥珀色者謂之膠飴可入藥其牽白堅強者謂之飴糖不入藥只可啖之而已(入門)

造半夏麴法 以皂角煮汁去渣煉膏和○火痰老痰以竹瀝入薑汁和○淫疫寒痰以生薑濃煎湯加枯白礬三分之一和(如半夏三兩枯白礬一兩)造麴如前法○又以霞天膏(方見吐門)加白芥子三分之一薑汁薑湯竹瀝造麴能使痰積沈疴隨大小便出(丹心)

造海粉法 紫海蛤一斤火煨紅童便淬過凡三次為末却用黃熟瓜菓同爛搗千百杵作餅子麻繩穿貫懸當風處吹乾為末聽用(醫鑿)

造輕粉法 食鹽綠礬各等分同放鍋中煮令黃色取起為末名曰黃麴以此麴一兩入水銀二兩拌勻同入瓦罐內上用鐵燈盞蓋定外用黃泥如法固濟勿令泄氣候乾用炭火旋旋燒上頻頻以水滴鐵燈盞內候罐通紅則內藥盡升上罐

造熟地黃法 抹生地黃不拘多少以水浸之沈者名地黃半浮半沈者名天黃浮水上者名天黃其人黃天黃及細根搗取汁其地黃浸之以柳木甌或瓦甌盛地黃蒸熟取出晒乾又浸汁中一宿

口候冷拆開即成輕粉入藥聽用(入門)

滴鐵燈盞內候罐通紅則內藥盡升上罐

口候冷拆開即成輕粉入藥聽用(入門)



又蒸之出晒乾如此九蒸九晒蒸時每以糯米清酒酒之十
分爛熟色如為金色則成矣乃晒收之入藥聽用(俗方)

煮鹿角膠霜法

取鹿角鋸斷一寸長置長流水中浸三日洗刷去垢膩入砂鍋內以清水(江水尤佳)
過不露角以桑葉塞口以桑柴火煮之旋旋添熱水勿令火歇如是三日候
膠膠霜收取聽用入藥○勿用活蠟蜂捉住後以針刺破眉間以物輕輕敲其

取蟾酥法

五月五日取活蟾蜍捉住後以針刺破眉間以物輕輕敲其
背則自汁自出以竹篾刮下塗油紙上陰乾用之(綱目)

曬乾人乳法

人乳數碗入瓦盆內莫攪動四圍晒乾刮取之
又晒又刮直至乳盡以薑汁拌晒用之(醫鑿)

酒煮蠟法

黃蠟十兩於銀石器內溶化作汁用重綿濾去滓以清酒一
升煮蠟溶滾取起候冷其蠟自浮於水上酒取用(得效)

製牛膽南星法

南星為末臘月取黃牛胆汁拌勻入胆
內封口掛當風處陰乾聽用(丹心)

陰煉秋石法

人尿多聚置大盆中以新水相和攪轉百匝放令澄清辟去清水只留濁脚又以新水同攪
水多為妙又傾去清水如此十餘次直候無臭氣水香為止鋪厚紙於篩內傾在紙上滲去
清水晒乾為末以初男乳汁和勻如膏烈日中暴乾如此九度

色如粉白蓋假太陽氣也謂之陰煉秋石能滋陰降火(入門)

陽煉秋石法

人尿多聚置盆中入皂角汁火許以殺其穢攪百餘遭直候小便澄清白濁皆定辟去清水
只取濁脚又入水攪百餘匝更澄清去水取濁更以布濾去滓取濃汁入淨鍋內熬乾刮下

搗篩再入鍋以清水煮令化乃於箕箕內布厚紙兩重傾汁于其上淋過去水再入鍋熬乾又用湯煮
化布紙淋汁如色未潔白更准丁淋候色如霜雪即止因入固濟砂盒內敲口火煖成汁傾出候瑩白

玉色即止細研入砂盒內固濟頂火四兩養七晝夜久養火尤善謂之陽煉秋石治諸般冷疾久年虛
損服之皆愈○煉秋石謂之取龍虎水法龍屬木虎屬金即童男童女之稱擇年方十三四十五六無

疾病未破陰陽者各置淨室精潔飲食用磁缸收貯小便積至一二
石煉用但功力甚大故只取無病人小便積多亦可煉用(入門)

茯苓造化糕

白茯苓蓮肉山藥芡仁各四兩為細末粳米二升搗為粉砂糖一斤刮為雪右和勻入甌
中以竹刀劃為片子以粗布覆甌蒸熟取出晒乾任意食之若覆木蓋則不熟矣(集醫)

秘傳三仙糕

人參山藥蓮肉白茯苓芡仁各四兩為細末粳米二升搗為粉砂糖一斤刮為雪右和勻入甌
升粳米七升各碼作末右和勻蒸出晒乾再為末每取一大匙白湯調下(袖珍)

造煎藥法

白薑五兩桂心二兩丁香胡椒各一兩半已上另為細末大棗蒸去核取肉為膏二鉢(一鉢
為三升)阿膠煉蜜各三鉢右先熔膠次入棗蜜消化乃入四味藥末攪勻煎微溫下篩貯器



待凝取用

(俗方)

六香膏

治冬寒凍傷皸瘃白檀香沈末香丁香零陵香甘松香八角香各一兩為粗末入三升蜜中

末七兩或十兩攪勻再下疎篩貼器中用之。其

衣香

茅香蜜炒一兩白芷五錢沈末香白檀香零陵香甘松香八角香丁香三乃子各二

十香膏

沈香丁香白檀甘香鬱金各五錢粗剉入麻油一斤中浸七日却入鐺內慢火養五日

後乃入乳香木香白膠香龍腦蘇合油木各五錢麝香末二

琥珀膏

琥珀一兩丁香木香各七錢半木通桂心當歸白芷防風松脂朱砂木鼈子各五錢麻油一斤

脂熔化濾去滓再熬下黃丹一斤以柳篋不住手攪令黑色

神仙太乙膏

玄參白芷當歸肉桂赤芍藥大黃生地黃各一兩對浸麻油二斤春五夏三秋七冬十日

救苦膏

治風溼痠疼川烏炮三錢牛漆黃丹乳黃另研各五錢白芷貝母白芨白斂各二錢槐潤一錢

右末和勻以香油燒潤火上熔化每

玉容膏

一名玉容西施膏塗燥瘰癧黃者當歸白芷川芎麝香等陵香白檀香香附子白斂白芍藥白芨杏

仁各一兩瓜一兩瓜一個龍腦二錢清油四斤黃蠟一斤右除龍腦並剉浸油中春五夏三秋七冬十

雲母膏

雲母煨硝甘草各四兩槐枝柳枝陳皮桑白皮側柏葉水銀各二兩川椒白芷沒藥赤芍藥肉桂

龍胆合散乳香附子茯苓高良薑各五錢黃丹十四兩清油二斤半右除雲母煨硝血竭沒藥乳香麝

味細末以柳木篋不住手攪直至膏凝滴水中成珠為度傾在磁器



臘享膏

治凍瘡臘猪脂猪油各二兩半香油二合半海松子油一合明松脂黃蠟各三兩七錢半右各煉去滓熔化成膏待凝臍器中塗之(俗方)

神異膏

露蜂房杏仁各一兩黃耆七錢半蛇退鹽水洗淨玄參各五錢亂髮雞子大香油十兩黃丹五兩入蜂房地退攪熱至紫黑色又濾去滓慢火熬下黃丹急攪干

餘轉滴水不散膏即成矣磁器收貯用治諸般癰毒(正傳)

萬應膏

大黃黃芩各二兩白敏黃蠟各一兩黃柏芍藥白芷黃耆木鼈子仁杏仁當歸白芷生地黃芩玄參沒藥乳香各五錢黃丹一斤香油二斤八兩右十四味對浸油三宿慢火熬以柳枝攪以白芷焦黃色為度綿濾去滓入黃丹再熱滴水成珠乃入乳沒蠟熔化

攪勻收貯磁器埋土中十日取出攤用治一切癰腫久瘡(精義)

善應膏

黃丹八兩白膠香乳香沒藥並另研當歸白芷杏仁大黃草烏川烏赤芍藥橫柳生乾地黃川芎瀝青另研亂髮各一兩右香油一斤浸藥三宿慢火熬入乳沒膠香十

上慢火熬却入黃丹以柳篋不任手攪滴水成珠不散乃入乳沒膠香十分攪勻成器沈水中三日取出聽用治諸般惡瘡腫毒及諸傷(得效)

白龍膏

白敏白敏白芷黃耆商陸根柳白皮桑白皮各一兩輕粉五錢另研乳香二兩另研定粉黃蠟各八兩杏仁油一斤(無則代香油)右七味對浸三日捺熬令白芷黃色去滓下黃蠟乳香令熔化

出火再濾微冷下輕粉定粉急攪至冷收貯攤緋帛上貼之治諸般惡瘡久瘡腫毒(精義)

靈應膏

白麥飯石火煨醋淬十餘次研令極細鹿角燒存性白敏並為細末右取石末白敏末各二兩鹿角末四兩並要極細不細則反痛取好米醋入銀石器煎令魚眼沸却入三味藥末竹篋子不住

手攪熬一二時稀稠得所傾出候冷先以猪蹄湯或藥水洗去膿血挹乾搗翎拂藥塗四圍凡赤處盡塗之但留一□如錢大以出膿血如藥乾以醋拂溼初便一日洗換十日後兩日一換其效如神治癰疽惡瘡癩癧結核乳癰(精要)

核乳癰(精要)

爐灰膏

治癰疽惡瘡內點去瘀肉最妙用響糖爐內灰(無則桑柴灰代之)一升半風化石灰一升炒紅以箕子盛貯用滾湯三碗慢慢淋自然汁一碗許銅鍋盛慢火熬如稀糊先下巴豆末次下蟾酥

各二錢白丁香末五分石灰炒一錢攪勻再熬如乾麩糊取起候冷磁罐盛貯勿令泄氣每用時以簪頭挑火許放指甲上研呵氣調勻如泥用針撥開患處以藥點之勿點好肉及眼上(入門)

造黃丹法

黑鉛一斤土硫黃硝石各一兩先熔鉛成汁下酸點之滾沸時下硫黃一小塊續下硝石許沸定再點醋依前下少許硝石已消沸定黃亦盡炒為末成丹矣入藥又炒令色變細研水飛二

通用之(入門)

取竹瀝法

以烈火逼之竹兩頭以器承瀝收合綿濾去滓砂瓶收貯暑月以冷水沈冷以防瀝酸寒月置

傷(丹心)

溫處勿令凍

造紅燒酒法

凡燒酒煮取時先將紫草細切納於缸中一瓶燒酒則紫艸五錢或七錢為準乃承取熱燒酒於紫草缸中停久則其色鮮紅可愛(俗方)

辟果樹上烏鳥法

取生人頭髮掛樹上則烏鳥不敢來食其實矣○有人逃走取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣(本草)

鹿角粥

大能補髓腦牙益益精血固元氣每白粥一碗入鹿角霜粉五錢白鹽一匙攪勻服(活心)

山芋粥

能潤肺益氣山芋生者去皮於石上或新瓦上細磨如泥二合蜜二匙牛乳一鍾約半升)於慢火上同炒令極熟乃投白粥一碗中攪勻服之不極熟則辣喉(活心)

避難止小兒哭法

用綿作一小球畧使滿口而不致閉其氣以甘草煎湯或甜物皆可漬之臨時鑲置兒口中使嚙其味兒口有物實之自不能作聲而綿軟不傷兒口蓋不幸而遇禍難啼聲

不止恐為賊所聞棄之道傍哀哉用此法活人甚眾不可不知(入門)

東醫寶鑑雜病篇卷九終



訂正東醫寶鑑雜病篇卷之十

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚奉 教撰

婦人

求嗣

生人之道始於求子求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或大或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕(丹心)○求嗣之道婦人

經調男子要神足又寡慾清心為上策寡慾則不妄交合積氣儲精待時而動故能有孕是以慾寡則神完不惟多子抑亦多壽(入門)○男子陽精微薄則雖遇血海虛靜流而不能直射子宮多不感胎

蓋因平時嗜慾不節施泄太多宜補精元兼用靜工存養無令火動候陽精充實依時而合(入門)○男子精微弱而澀為無子精氣清冷也不宜攝精起石固(脈經)○女宜鼓動微陽五子衍宗丸(入門)○男子精

斯丸○婦人無子多由血種玉湯先天歸一湯神仙附益丹調經養血丸溫經湯○婦人陰血衰弱雖母丸濟陰丹勝金丹調經種玉湯先天歸一湯神仙附益丹調經養血丸溫經湯○婦人陰血衰弱雖

投真精不能攝入子宮雖交不孕雖孕不育是以男女配合必當其年(入門)○無子婦人瘦怯者乃子宮乾澀宜滋陰養血四物湯(方見血門)加香附黃芩肥或軀脂滿溢子宮

宜行溼燥疾南星半夏川芎滑石防己羌活或痰湯(方見痰門)(丹心)

相女法

未笄之婦陰氣未完慈盛之婦所生多女性行和者調經易決性行妬者月水不勻相貌惡者刑重顏容美者福薄太肥脂滿子宮太瘦子宮無血俱不宜子不可不知(入門)

脈法

求嗣之脈專責於尺○右尺偏旺火動好色○左尺偏旺陰虛非福○惟沈滑勻易為生息○微澀精清兼遲冷極○若見微濡入房無力○女不好生亦尺脈濇(回春)○男子脈微弱而澀為無子精氣

清冷也(脈經)

固本健陽丹

凡人無子多是精血清冷或房勞過傷以致腎水欠旺不能直射子宮故爾豈可專責於母血之不足虛寒耶熟地黃山茱萸各三兩巴戟二兩克絲子續斷酒浸連志製蛇床子炒各

一兩半白茯苓神山藥酒蒸牛膝酒洗杜仲酒洗切酥炒去絲當歸身酒洗肉蓯蓉酒浸五味子益智仁鹽水炒瘦茸酥炙各一兩加枸杞子三兩人參二兩右為末蜜丸梧子大空心鹽湯或溫酒下五七十

丸臨臥再服(回春)

續嗣丹

無子宜服山茱萸天門冬麥門冬各二兩半破故紙炒四兩克絲子枸杞子覆盆子蛇床子巴戟熟地黃韭子炒各一兩半龍骨黃芪杜仲山藥當歸瑣陽各一兩人參杜仲各七錢半陳皮白朮

各五錢黃狗外腎酥炙二對為末用紫河車一具蒸製同門冬地黃爛搗他藥並為細末
煉蜜和勻搗干杵作丸梧子大每取百丸空心及臨臥以溫酒或鹽湯任意吞下(入門)

溫腎丸

服之有子山茱萸熟地黃各三兩巴戟二兩免絲子當歸鹿茸益智杜仲生乾地黃茯苓神山蘇
志續斷蛇床子各一兩右為末蜜丸梧子大空心溫酒下五七十九丸精不固倍鹿茸加龍骨

(入門)

五子衍宗丸

治男子無嗣枸杞子九兩免絲子酒浸製七兩覆盆子五兩車前子三兩五味子一兩
為末蜜丸梧子大空心溫酒吞下九十九丸臨臥鹽湯吞下五十九丸春丙丁巳年夏戊巳辰

丑未秋壬癸亥子冬甲乙寅卯須上旬晴日合忌見僧尼寡女孝子六畜不淨之物(廣嗣)○慣遺精者去車前子代蓮子(入門)

陽起石丸

治丈夫精冷真精氣不濃不兆因是以無子陽起石火煨研免絲子酒浸製鹿茸酒蒸焙
炮韭子炒肉從蓉酒浸各一兩覆盆子酒浸石斛桑寄生沈香原蠶蛾酒炙五味子各五錢各
為末酒煎糯米糊和丸梧子大

空心鹽湯下七九十九丸(得效)

玉鑰啟榮丸

治婦人無子香附子搗去皮毛醋水浸三日炒乾細末十五兩當歸二兩白芍藥川芎赤石
脂藁本人參肚丹皮白茯苓白薇桂心白芷白虎玄胡索沒藥各一兩右除石脂沒藥外餘
藥剉酒浸三日焙乾為末足十五兩重羅極細入別研赤石脂沒藥末煉蜜和丸彈子大每取一丸空

心雞未鳴時先以溫茶或薄荷湯漱口後細嚼溫酒或白湯送下以乾物壓下服至一月即效(廣嗣)
○一名女金丹無挂心有熟地黃治婦人無子或無痰火等疾經候亦調容顏不減但久無孕乃子宮
有陰無陽不能生發宜服此鼓動微陽一月即效或赤白帶下崩漏及血風血氣虛勞諸證無所不至

真女中金丹

(入門)

益斯丸

經補受補者服七日即交合孕後勿服香附子白薇半夏白茯苓杜仲厚朴當歸秦艽各二兩防
風肉桂乾薑牛膝沙參各一兩半細辛人參各二錢三分右為末煉蜜和丸梧子大空心酒下五

七十九丸

煖宮益斯丸

婦人無子者服之厚朴一兩二錢半吳茱萸白茯苓白芩白薇石菖蒲白附子桂心人參沒
藥各一兩細辛乳香當歸酒浸牛膝酒洗各七錢半右為末蜜丸小豆大酒下一二十九丸壬

子日修合○一名壬子丸(集畧)

百子附歸丸

久服有孕及治月水參差不調四製香附末十二兩(製法見胞門)川芎白芍藥當歸熟地
黃阿膠珠陳艾葉各二兩右為末用石榴一枚連皮搗碎煎水打糊和丸梧子大每百丸空



心醋湯下(廣嗣)○一名百子建中丸無石榴一味始終忌鐵(廣嗣)

琥珀調經丸

治婦人胞冷無子能令經正香附米一斤分作一包用童便水醋各浸九日和淨熟艾四兩

一兩右為末醋糊和丸梧子大每百丸空心以艾醋湯吞下(入門)

加味養榮丸

治經服來前外潮內煩咳嗽食火頭昏目眩帶下血風血氣久無嗣息一切瘵疾

香附子各一兩半陳皮貝母白茯苓麥門冬各一兩阿膠七錢甘草五錢黑豆炒去皮四十九粒右為末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下七九十九丸忌食諸血(入門)

加味益母丸

服之百日有孕益母草半斤加當歸赤芍藥木香各二兩右為末蜜丸梧子大白湯下百丸(入門)

濟陰丹

治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任虛損胞內宿挾疾病經候不調或崩漏帶下三十

澤蘭各四兩入參栝樓蠶退石斛蘼本秦艽甘草各二兩當歸桂心乾薑細辛牡丹皮川芎各一兩半木香白茯苓京墨桃仁各一兩川椒山藥各七錢半糯米炒一升大豆黃卷炒半升右為末煉蜜和勻兩作六丸每一丸細嚼

溫酒或醋湯送下(局方)

勝金丹

治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸疾牡丹皮藜本人參當歸白茯苓赤石脂白芷肉桂

白薇川芎玄胡索白芍藥白朮各一兩沈香甘草各五錢右為末蜜丸彈子大每一丸空心溫酒嚼下服二十九丸

調經種玉湯

治婦人無子多因七情所傷致經水不調不能受孕熟地黃香附子炒各六錢當歸身酒洗

吳茱萸川芎各四錢白芍藥白茯苓麥門冬心服待經至之胡索牡丹皮乾薑炒各三錢官桂熟艾各二錢右剉分作四貼每一貼入薑三水煎空心服待經至之胡索牡丹皮乾薑炒各三錢官桂熟艾各二錢

先天歸一湯

當歸酒洗一兩二錢白朮炒白茯苓生地黃酒洗川芎各一兩人參白芍藥牛膝酒洗各

八錢縮砂炒香附子牡丹皮半夏各七錢陳皮六錢甘草四錢右剉分作十貼薑三水煎空心服渣再煎臨臥服經未先行先服五貼經行後服

神效附益丹

香附米一斤童便浸透水洗露一宿再浸再露再晒如此三次用好醋浸透一宿晒乾為末

蓋母草十二兩東流水洗淨烘乾為末右別以香附四兩艾葉一兩煮取汁用三分醋七



分和前二末為丸梧子太空心臨臥淡醋湯下七丸
十九不惟治婦人百病而生育之功效如神(醫鑿)

調經養血丸

治經脈不調久不受孕香附子十二兩酒醋鹽湯重便各浸三日焙當歸酒洗白芍歸酒洗
生乾地黃酒洗牡丹皮酒洗各二兩川芎白茯苓白芷乾薑炒肉桂紅花桃仁沒藥等分
炒河膠珠各一兩玄胡索六錢蓬朮煨醋炒甘草炙各五錢茴香炒二錢
右為末醋糊和丸梧子大空心白湯或溫酒下百凡有孕勿服(回春)

溫經湯

治衝任虛損月事不調或前或後或多或少或火或逾月不至或一月再至或曾經半產血閉留
口乾燥五心煩熱小腹冷痛久不受胎(方見胎門)○一名調經散(正傳)○一名溫經湯

一方

男子陽旺則能直射子宮種子之仙方也又治男子精冷無子兔絲子酒浸煮製細末養非病者
梧子大每七十九空心溫酒送下用之屢驗年至五十及陽痿者每兔絲子末一斤加天雄四兩
裹煨熟去皮臍切作四片童便浸透慢
火焙乾為末同丸服之尤效(種杏)

又方

食令人有子(本草)○男子無嗣者多矣臍中有效(綱目)○雀肉久
戊戌酒治婦人久冷無子飲之最驗(方見雜方)

胎孕

凡欲求嗣必先視其婦之經脈調否其或未調必以藥而調之經脈既調宜以人事副之按其法而行
之庶不失其候也蓋婦人月經方絕金水繞生此時子宮正開乃受精結胎之候故合太和之時過此
佳期則子宮閉而不受胎矣(正傳)○月經行後一日三日五日交會者成男二日四日六日交會者
成女過此則不孕矣亦要在子時後方可也(正傳)○婦人經水來時有兩日半淨者三日而淨者亦
有女人血旺氣盛六七日淨者但觀寶田經水之顏色何如耳乃以潔白之物或綿或帛夾之於戶口
取而目之金色者佳期也鮮紅者未淨不及也淺淡者始淨一日二日精勝其血則為男子四日五
此時交合無不成矣(回春)○夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子四日五
日六日血脈已旺精不勝血則為女子乃二物相薄長先身生謂之神又謂之精道與釋二門謂之本
來面目是也(東垣)○欲求子者但待婦人月經絕後一日三日五日擇其旺相日如春甲乙夏丙丁
秋庚辛冬壬癸以生氣時夜半後乃施瀉有子皆男必壽而賢明二日四日六日施瀉有子必女過六
日後勿為施瀉
可也(得效)

陰陽交合避忌

凡男女交會當避丙丁日及拉望晦朔大風大雨大霧大寒大暑大雷電大霹靂天地晦冥
日月薄蝕虹霓地動則損人神不吉損男百倍令女得病有子必癩痴頑愚瘡毒孽孽孽孽
盲眈多病短壽不孝不仁又避日月星辰火光之下神廟佛寺之中井窰圍廁之側塚墓尸柩之傍皆
所不可夫交合如法則有福德大智善人降詔胎中仍令性行調順家道日隆若不如法則薄福愚痴



惡人來詭胎中令性行凶險所作不成家道
日否禍福之應有如影響可不戒哉(千金)

十月養胎 婦人懷胎一月之時足厥陰脈養○二月足少陽脈養○三月手心主脈養○四月手少陽脈養○五月足太陰脈養○六月足陽明脈養○七月手太陰脈養○八月手陽明脈養○九月足少陰脈養○十月足太陽脈養○諸陰陽各養三十日活兒手太陽火陰不養者下主月水上為乳注活

陰脈養○四時之令始于春木故胎養始於肝胆也(良方)○妊婦不可灸刺其經必墮胎(百病回春)○胎養母○四時之令始于春木故胎養始於肝胆也(良方)○妊婦不可灸刺其經必墮胎(百病回春)○胎養母○四時之令始于春木故胎養始於肝胆也(良方)○妊婦不可灸刺其經必墮胎(百病回春)

一月 足厥陰脈養胎夫人之有生也母之養室方開父之精潮適至陰幕既翕如布袋絞紐血精血乘衝氣自然旋轉不息如蛻蝦之滾真吞啖含受成一團圓旋幾九日一息不停然後陰陽大定老橫胎包外似纏絲瑪瑙其中自然虛成一竅空洞虛圓與雞子黃中一穴相似而團圓之外氣自凝結為胎衣初薄漸厚如彼米飲豆漿面上自結一皮中竅日生從無入有精血日化從有入無九日之後次九

又九凡二十七日即成一月之數竅自然凝成一粒如露珠然乃大極動而生陽天一生水謂之胚此月經閉無潮無痛飲食稍異平日不可觸犯及輕率服藥(入門)

二月 足少陽脈養胎又三九二十七日即二月數此露珠變成赤色如桃花瓣子乃太極靜而生陰二生火謂之暉此月腹中或動或不動猶可狐疑若吐逆思酸名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一藏之虛如愛酸物乃肝藏正能養血而虛也(入門)

三月 似以成人形鼻與雌雄二器先就分明其諸全體隱然可悉斯謂之胎乃太極之乾道成男坤道成女也此時胎最易動苓朮丸(方見下)頻服最妙(入門)

四月 手少陽三焦脈養胎是月男女已分始受水精以成血脈形像具六府順成若胎動下血宜用安胎飲(方見下)○(入門)

五月 足太陰脾脈養胎始受火精以成陰陽之氣筋骨四肢已成毛髮始生(入門)


六月 足陽明胃脈養胎始受金精以成筋口目皆成若胎動宜安胎飲(入門)

七月 手太陰肺脈養胎始受木精以成骨皮毛已成避其魂能動左手(入門)

八月 手陽明大腸脈養胎始受土精以成皮膚形骸漸長九竅皆成避其魂能動右手(入門)

九月 足少陰腎脈養胎始受石精以成皮毛百節畢備三轉其身(入門)

上海校經山房石印



十月 足太陽膀胱脈養胎受氣足五藏六府齊通納天地氣於丹田使關節人神皆備待時而生○惟手
而天○一云延月而
產必生貴子(入門)

妊脈 婦人足少陰脈動甚者妊子也(內經)○全元起作足少陰王米本作手少陰全本為是動甚者動
搖太甚也(綱目)○陰搏陽別謂之有子註曰陰謂尺中也搏謂搏觸於手也尺脈搏擊與寸口俱
別陽氣挺然則為有妊之兆何者陰中有別陽故也(內經)○經脈不行已經三月者尺脈不至者是
胎也(回春)○脈滑疾重以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也○婦人
三部脈浮沉正等按之無絕者妊娠也(脈經)○妊娠八月(二月六月)脈
實大牢強弦緊者生沉細者死○妊婦脈細勻易產大浮緩氣散難產(脈經)

驗胎法 婦人二三月經不行疑是兩身却疑血滯心煩寒熱恍惚
宜用神方驗胎散驗之(海藏)○艾醋湯亦可驗(醫鑿)

神方驗胎散 真雀腦酒一兩當歸全用重一兩者只用七錢右二味細末分作二服濃煎好艾湯
下或好酒調下二三時間覺腹筋微動仍頻即有胎也動罷即愈如不是胎即不動如不覺
效再煎紅花湯調下
必有神效(海藏)

艾醋湯 驗胎有無以好醋煮艾葉服半盞
腹中大痛是孕不痛無孕(醫鑿)

辨男女法 婦人有孕令人摸之如覆杯者則男也如肘頭參差起者女也(脈經)○婦人有娠左乳房有核
是男右乳房有核是女也(醫鑿)○遺孕婦面南行遠復呼之左回首者是男右回首者是女○
看妊婦上圍時夫從後急呼之左回首者是男右回首者是女蓋男胎在左則左重故回首時慎護重
處而就左也女胎在右則右重故回首時慎護重處而就右也推之於胎其義亦然胎在左則血氣護
胎而就於左故脈亦從之而左疾為男左為女也陰陽之理自然如是(脈經)

脈法 婦人妊脈四月欲知男女法為女左疾為男右疾為女俱疾為生二子謂俱滑而疾也(脈經)○尺脈左
偏大為男右偏大為女左右俱大產二子(脈經)○左手沈實為男右手浮大為女左右手俱沉實
稔生二男左右俱浮大稔生二女(脈經)○男女之別以左右取左
疾為男右疾為女沈實在左浮大在右右女左男可以預剖(脈訣)

雙胎品 成胎以精血之後先分男女者褚澄之論也愚竊惑焉東垣曰經斷後一二月精勝血者成男四
路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其子此萬
物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

物之資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交構胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系

在下在有兩歧一達於左一達於右精勝其血及剛日陽時感者則陽為主受氣於左子宮而男形
成精不勝血及柔日陰時感者則陰為主受氣於右子宮而女形成矣或曰分男分女吾知之矣其
有雙胎者何也曰精氣有餘歧而分之血因分而攝之故也若夫男女同孕者剛日陽時柔日陰時
則陰陽混雜不屬左不屬右受氣于兩歧之間者也亦有三胎四胎五胎六胎者猶是而已或曰其
男不可為父女不可為母與男女之兼形者又若何而分之耶曰男不可為父得陽氣之成者也
可為母得陰氣之塞者也兼形者由陰為駁氣所乘而為胎不一以女兼男形者有二一則男胎
遇女為夫一則可妻而不可夫又有下為女體上具男之全形此又駁之甚者也或曰駁氣所乘
於陰而所成之形又若是之不同即予曰陰體虛駁氣易於乘也駁氣所乘陰陽相混無所屬
屬左不可屬右受氣於兩歧之間隨所得駁氣之輕重而成形故所兼之形有不可得而
為生二女不爾男作女生也此
乃男女兼形之說也(綱目)○又法左右尺脈俱沉實為生二男不爾女作男生左右尺脈俱沉
為生二女不爾男作女生也此

轉女為男法

懷娠三月名曰始胎血脈不流象形而變是時男女未定故服藥方術轉令生男也(得效)○
始覺有孕以谷置孕婦床下勿令知之若不信待雞抱卵以谷懸窠下則一窠盡是雄雞可驗
(入門)○石雄黃一兩絳囊或帶孕婦左腰間○弓弩弦一枚絳囊或帶孕婦左臂一云弓弩弦縛腰
中滿三月解之○萱草花一名宜男姓婦佩之雄雞長尾拔三莖置孕婦臥席下勿令知○取夫頭髮
手足爪甲鋪孕婦席
下勿令知(良方)

惡阻

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也(綱目)○婦人不能食無寒熱名曰娠於法六十日當有此證
設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之註曰絕者絕其醫治候其自安也仲景○娠者稟受法弱
便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食鹹酸甚者或作寒
熱心中潰悶嘔吐痰水恍惚不能支持榮氏謂之惡阻(良方)○惡阻者或大吐或時吐清水惡聞食
味由于子宮經絡絡於胃口故逢食氣引動精氣衝上必食吐盡而後精氣乃安亦有誤交合而子宮微
感者過百日即愈(入門)○娠之初經脈內閉有養胎息腸胃阻滯如散入焦膈者素有痰飲則飲與
血搏食飲輒吐頭目旋暈情聞食氣喜吹酸鹹四肢倦怠多臥少起厥厥困憊名曰惡阻已產之後胞
外餘血敗瘀流利名曰惡露蓋惡者不善不淨之義阻者阻節之阻血搏痰飲富漸消之露者露水之
露當急逐之由是而知胎前日惡阻產後日惡露古人命名之意深有以也(易簡)○惡阻謂有孕而
惡心阻其飲食者是也多從痰治肥者有痰瘦者有熱(丹心)○瘦人熱肥人痰俱宜二陳湯一方見
疾門)加竹茹生薑煎加苓連日久水漿不入口吐清水宜參橘散白朮散保生湯○惡阻宜用半夏
茯苓湯苓連半夏湯歸原散竹茹湯(綱目)○懷孕愛吃一物乃一藏之虛如血氣弱不能榮肝肝虛
故愛吃酸物(丹心)○妊婦惡食但
以所思之物任意與之必愈(局方)

東晉書... 卷之... 婦人... 惡阻... 轉女為男法... 中醫學...

二陳湯

婦人月事不行全不入食日就瘦弱全似虛勞然而穀雖不入果子雜物常喜食之却只是有孕
平(直指)○大全方論半夏動胎而不用仲景方皆用半夏豈不知此而用乎
予治阻病果用半夏薑製炒黃用之未嘗動胎經云有故無殞是也(丹心)

參橘散

治惡阻病嘔吐痰水全不入食橘皮赤茯苓各一錢半麥門冬白朮厚朴人參甘草各
錢右剉作一貼入薑七片青竹茹雞子大煎服(拔萃)○一名人參橘皮湯(聖惠)

白朮散

治惡阻吐清水十餘日粥藥不入白朮五錢人參二錢半丁香
一錢二分甘草五分右剉作一貼入薑五片水煎服(良方)

保生湯

治婦人月經不行身無病似病脈滑大而六脈俱勻乃孕婦之脈也精神如故惡聞食氣或但嗜
一物或大吐或吐時清水此名惡阻宜服此白朮香附子烏藥橘紅各二錢人參甘草各一錢右
剉作一貼薑三
煎服(良方)

半夏茯苓湯

治惡阻病嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多臥火起百節煩疼羸瘦痰盛半夏
錢半赤茯苓熟地黃各一錢橘紅旋覆花人參白芍藥川芎桔梗甘草各七分右剉作一貼
入薑七片水
煎服(丹心)

芩連半夏湯

治惡阻病胸背滿痛黃芩一錢二分半白朮半夏各一錢赤茯苓七分半黃連陳皮當
歸梔子枳殼香附人參蒼朮縮砂甘草各五分右剉作一貼入薑七片水煎服(永類)

歸元散

治惡阻全不入食白朮白茯苓陳皮各一錢半半夏一錢人參川芎當歸芍藥丁香甘草各
五分桔梗枳殼各二分半右剉作一貼入薑五棗二水煎服(綱目)○一名復元散(醫鑑)

竹茹湯

治惡阻青竹茹麥門冬各三錢前胡二錢橘皮
一錢蘆根半握右剉作一貼水煎服(聖惠)

(丹)

一果

然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯下抑青丸(方見大門)三十粒數服而愈之

(心)

妊娠禁忌

受孕之後大忌男女交合(入門)○妊婦切忌飲酒及以酒調藥服酒散百脈致成諸疾止用水
煎服為好(得效)○受孕之後切宜避忌胎殺所避如鄰家繕修亦宜避之經云刀犯者形必傷
泥犯者寢必塞打擊者色青黯繫縛者
相拘攣甚至母殞驗者反掌(得效)

飲食禁忌

食驢馬肉過月難產○食大肉令子無聲○食兔肉令子缺唇○食無鱗魚難產○食螃蟹令
子橫生○食羊肝令子多厄○食雞肉及卵合糯米食令子生寸白虫○食鴨肉及卵令子倒



生心寒○食雀肉飲酒令子多淫無恥或生雀子班○食鼈肉令子項短縮頭○食薑芽令子多指○食薏苡墮胎○食麥芽消胎氣○食莧菜墮胎○食蒜消胎氣○食鮎魚令子生疳食瘡○食山羊肉令子多病○食諸般菌草

藥物禁忌

歌曰羌(羌青)斑(斑貓)水蛭及蟲虫○烏頭附子與天雄○野葛水銀並巴豆○牛膝薤白連蜈蚣○三稜代赭羌花麝(麝香)○大戟蛇蛻黃雌雄(雌黃雄黃)○牙硝芒硝○桂皮○槐花牽牛皂角同○半夏南星與通草○瞿麥乾薑蟹甲爪○硃砂乾漆兼桃仁○根莫用好(正傳)○又忌躑躅花蜈蚣牛黃藜蘆金箔銀箔胡粉蚘蝎飛生蟬殼龍腦蟹反鬼箭羽精雞馬刀衣魚大葶神麴

姙娠將理法

衣母太溫○食母太飽○飲母太醉○勿妄服湯藥○勿妄用鍼灸○勿舉重登高涉險○勿勞力過傷○勿多睡臥須時時行走○心有大驚子必癲癩(入門)○臨月不可沈睡○勿

胎漏胎動

胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱四物湯(方見血門)加阿膠珠白朮條芩縮砂香附炒黑艾葉少許加糯米煎服(正傳)○犯房下血者真漏胎也八物湯(方見虛勞)加阿膠艾葉救之(入門)○胎漏胎動皆下血而胎動有腹痛胎漏無腹痛此為異耳胎漏宜清熱胎動宜行氣(入門)○胎漏者自入門下血尿血者自尿門下血(入門)○胎動不安者由衝任經虛受胎不實故也亦有飲酒房室而傷者有觸犯而傷者有喜怒而傷者有服熱藥而傷者因母病而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動致母疾者但當安胎其母自愈(良方)○孕婦內傷勞役以致小腹常墮甚則子宮墮出者氣陷也宜用補中益氣湯(方見內傷)○孕婦內傷勞者八物湯加酒炒黃芪為君防風升麻為使(入門)○胎漏胎動皆令墮胎胎漏宜用枳殼湯小膠艾湯膠艾芎歸湯膠艾四物湯當歸寄生湯桑寄生散○胎動不安宜用杜續丸當歸地黃湯安胎散安胎飲黃苓湯內補丸聖獨散知母丸生地黃粥蔥薤白湯(諸方)

枳殼湯

治胎漏下血白朮三錢半枳殼黃芩各一錢七分半右剉作一貼水煎服(保命)

小膠艾湯

治胎動下血阿膠珠二錢艾葉四錢右剉作一貼水煎服(入門)

膠艾湯

治胎漏安胎極妙熟地黃艾葉當歸川芎阿膠珠甘草炙黃芪各一錢右剉作一貼水煎服日二次(正傳)○局方無黃芪有白芍藥

膠艾芎歸湯

治胎動下血在八九月內者及治半產後因續下血不絕者向膠珠艾葉川芎當歸各二錢甘草炙一錢右剉作一貼水煎服○胎動腹腹或下黃汁如漆如豆汁者野苳根金銀花根

各五錢水酒相
半煎服(入門)

膠艾四物湯 治胎漏腹痛熱地黃當歸川芎白芍藥阿膠珠條苓白朮縮砂艾葉
香附子炒各一錢右剉作一貼入糯米一撮水煎空心服(回春)

當歸寄生湯 治胎漏下血人參桑寄生熟地黃續斷各一錢半當歸
川芎白朮艾葉各七分半右剉作一貼水煎服(得效)

桑寄生散 治胎漏及經血妄行桑寄生續斷川芎當歸白朮香附子阿膠珠條
神各一錢人參甘草各五分右剉作一貼入薑三片水煎服(入門)

杜續丸 治胎動不安腰痛以此防其欲墮杜仲炒續斷各二兩
右為末棗肉和丸梧子大米飲下五七十九(入門)

當歸地黃湯 治胎痛熱地黃四錢當歸二錢右
剉作一貼水煎空心頓服(正傳)

安胎散 治因驚胎動腹痛下血熱地黃三錢川芎枳殼各一錢
半糯米一合右剉作一貼薑三棗二水煎服(正傳)

安胎飲 治胎動不安五六個月常服數帖甚妙白朮二錢條苓一錢半當歸白芍藥熟地黃縮砂研陳皮
各一錢川芎紫蘇葉各八分甘草四分右剉作一帖水煎服(醫鑿)○一方有人參無熟地黃代

生地黃(入門)○胎不安加阿膠胎痛加縮砂○黃芩安胎者降
火也縮砂安胎者行氣也若血虛而胎不安阿膠主之(丹心)

黃芩湯 治胎動不安黃芩白朮縮砂當歸各
一錢半右剉作一帖水煎服(得效)

內補丸 治衝任脈虛補血安胎熱地黃二兩當歸一兩微炒
右為末蜜丸梧子大空心溫酒下五七十九(本事)

獨聖散 治因墮胎傷損致胎動不安腹痛不可忍縮砂不以多火熨斗內慢火炒去皮右為末每二錢熱
酒調下須臾覺腹內極熱胎已安矣神效不食酒者未飲調下(正傳)○胎痛用縮砂以能止痛

行氣安胎
也(丹心)

知母丸 治妊娠日月未足而欲產者腹痛知母為末蜜丸
梧子大米飲下三五十丸日三服不拘時(綱目)

生地黃粥 治胎漏糯米二合煮粥臨熟入生
地黃汁一合調服空心(入門)

蔥粥 治胎動糯米作粥入蔥白
三五莖再煮食之(入門)



蔥白湯 治胎動不安腰痛搶心或下血蔥白濃煮汁飲之 主安胎若胎死即出(海藏)

佛手散 一名立效散治胎動不安 腹痛(方見下) (綱目)

一方 古方治胎動不安一月用烏雞雞三月用赤雄雞十月用猪腰子餘月用鯉魚煮汁入藥煎服神效(入門)

又方 孕婦為夫所困胎動氣欲絕 竹瀝飲一升立愈(本草)

又方 妊婦月數未足而似欲產腹痛者槐子蒲黃等分 為末蜜丸梧子大酒下三十九丸以止為度(丹心)

半產 墮胎乃血氣虛損不能榮養而自墮猶枝枯則果落藤萎則花墮有因勞怒傷情內火使動亦能墮胎 猶風撼其木人折其枝也火能消物造化自然病源乃謂風俗傷於子腸此未得病情者也夫抵屬產 屬熱當視其輕重而治之(丹心) ○正產一證正如果中稟熟其殼自開兩無所損半產則比之 研粟碎其膚殼損其皮膜然其取得其實以其胎藏傷損胞系斷去而後胎墜下大抵半產須加十倍

調治○復有市井村落之間恣情妄作偷生不正或多男女厭於養育往往以草葯毒之驚兒敗血不 下衝心悶亂喘汗交作死者罔記須以解毒行血葯亟救之宜用白扁豆散(得效) ○婦人受孕過三 五七陽月必墮宜服苓朮湯安胎丸以清其熱若氣血不足則預服八物湯(方見虛勞)以防墮落○

半產多在三五七月內若前次三個月而墮則其後必如期復然凡半產後須多服養氣血固胎元之 藥以補其虛厥後有胎先於兩個月半後即服清熱安胎藥數帖以防三月之墮至四個月半後再服 八九貼防過五月又至六個月半後再服五七貼以防七月及至九個月可保無虞(入門) ○半產宜 用金匱當歸散芎歸補中湯安胎湯(諸方)

金保胎丸 五味安胎丸和痛湯(諸方)

白扁豆散 治毒藥攻胎藥毒衝心口噤握拳自汗不省其脈浮而軟十死一生 白扁豆生為末新汲水調下二三錢即甦口噤者幹開灌之(得效)

苓朮湯 治懷孕四五六月常墮不安者內熱甚故也子苓三錢白朮一錢半右剉作一貼水煎服○苓朮湯 乃安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服緩則五日十日一服安胎易產所生之兒又無 胎毒蓋妊孕脾土運化遲滯則生溼溼則生熱故以黃芩清熱以養 血白朮健脾以燥溼安胎丸金匱當歸散皆此方而推之也(入門)

安胎丸 治同上即苓朮湯材為末粥丸梧 子大白湯下五七十九丸(入門)

金匱當歸散 孕婦宜常服養血清熱素慎半產者宜服以清其源而無後患也黃芩白朮當歸川芎白芍 藥各一兩右為末每三錢溫酒調下或酒糊和丸米飲下五七十九丸(入門) ○婦人有孕則

東晉寶鑑雜考 卷十 上海校經山房石印



碍脾運化遲而生溼淫而生熱古人用白朮黃芩為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥溼黃芩清熱故也况
娠娠賴血培養此方有當歸川芎芍藥以補血尤為備也服此藥則易產所生男女兼無胎毒則胎疹
亦稀無病易育而聰明智慧
不假言矣累試累驗(丹心)

五味安胎丸 素慣半產者宜服之養血清熱當歸川芎條芩白芍藥各一兩白朮五錢右為末酒糊和丸梧子大茶湯任下五七十九(回春)

芎歸補中湯 治懷孕氣血虛弱不能榮養以致胎漏每數月而墮黃芪當春白朮杜仲白芍藥各六錢乾薑阿膠珠川芎五味子木香人參甘草各五分右剉作一貼水煎服(入門)○十方無本

(正傳)

安榮湯 治胎氣不固時常小產宜以此預防固胎熟地黃白芍藥川芎當歸阿膠珠香附子桑寄生白芍黃芩縮砂各一錢糯米百粒右剉作一貼水煎服(正傳)

千金保胎丸 凡婦人受胎經三月而墮者雖氣血不足乃中衝脈有傷中衝即陽明胃脈供養胎孕至此時必須謹節飲食絕色慾戒惱怒服此藥庶免半產之患矣杜仲薑汁炒白朮土炒各二兩當歸酒洗熟地黃薑汁炒阿膠蛤粉炒成珠條芩炒益母草續斷酒洗香附米以酒醋鹽水童便各侵一包經三日焙乾各一兩川芎艾葉醋煮陳皮各五錢縮砂二錢半右為末以棗肉和丸梧子大每百

丸空心米飲吞下(醫鑿)

和痛湯 治小產心腹痛當歸川芎白芍藥酒炒熟地黃各一錢三分玄胡索一錢澤蘭香附子青皮各八分桃仁紅花各五分右剉作一貼以水一鍾童便清酒各半鍾煎服(醫鑿)

一方 婦人每懷孕至三個月必墮不肯服藥子以四五年老母雞煮湯入紅穀小黃米煮粥食之不數日而胎固至月滿而生男(回春)

又方 婦人有孕至三個月左右必墮予教以濃煎白朮湯調黃芩末一錢服三四十貼遂得保全蓋孕至三月正屬相火所以易墮不然何以黃芩白朮為安胎妙藥耶(丹心)

脈法 半產漏下革脈主之弱則血耗立見傾危(脈訣)○火陰脈浮而緊緊則疝腹中痛半產而墮傷(脈經)

卒墮胎 孕婦六月七日暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也○胎漏者徐徐下水今暴下而多故知墮胎也(脈經)

察色驗胎生死 胎動不安甚者每以母形色察之母面赤舌青者母活子死面青舌赤口中沫出者母死子活唇舌俱青兩邊沫出者母子俱死(良方)○孕婦腹痛胎不動欲知生死以手摸之令在何面冷者為死溫者為生(脈經)○胎死腹中則產母面青指甲青唇舌青口臭如兩臉微紅則母活子死(丹心)○孕婦舌黑者子已死矣全以古為證驗佛手散救之(方見下)○回春



欲產候 妊婦月滿脈離經（離經脈見下）設腹痛引腰脊為欲產也（脈經）○孕婦臍腹俱痛連腰引痛眼

中水火此是兇轉蓋腎繫於腰胞繫於腎故也（正傳）○孕婦八月腹痛或作或止名曰弄胎非正

產之候或腹雖痛而腰不甚痛非正產之候胎高未陷下者非正產之候穀道未挺進者非正產之候

水漿未破血未出者非正產之候漿血雖出而腹不痛非正產之候且令扶行執忍不可坐（良方）

○凡孕婦直待胎氣陷下子逼腹戶腰重痛極腹中

生火穀道挺進此正欲產之候方上草用力（良方）

脈法歌曰欲產之婦脈離經沈細而滑也同名夜半覺痛應分誕來日午後定知生（脈訣）○離經

轉急如切繩轉疎者即產也（脈經）○離經

六至沉細而滑陣痛連腰胎即時脫（丹心）

保產 難產之婦皆是八九個月內不能謹慾以致氣血虛故也（丹心）○大凡生產自有時候功不可

催生滑胎等藥又不可坐草早及令坐婆亂用手法（良方）○世之難產者多見於富貴家之

貧賤辛苦者無有也古方有瘦胎飲即枳殼散）本為湖陽公主作也以其奉養厚而氣血盛故製此力

以耗其氣實非極至之論也一婦人苦於難產後遇胎孕則觸而去之予以大紫蘇飲加補氣藥與

十數貼後得男而甚快因名其方曰達生散（丹心）○懷孕之婦不曾行動舒伸忍痛曲身側臥故子

在腹中不能轉動以致有橫生逆產甚則子死腹中慎之（丹心）○凡月數滿足方覺腹痛不可驚動

大早令產母恐怖蓋恐則氣怯怯則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難產急服紫蘇飲（方見下）以寬

瘦胎令易產

孕婦氣血虛弱者九十月之際不謹守養者及婦人過於安逸或肥膩以致氣血凝滯而不能

轉運者宜用達生散瘦胎枳甘散救生散佛手散益母丸縮胎丸束胎丸神寢丸則自然易產

達生散

孕婦臨月服二十餘貼易產無病大腹皮酒洗二錢甘草炙一錢半當歸白朮白芍藥各一錢人

尤佳（丹皮）○一

名縮胎飲（丹心）

瘦胎枳甘散 孕婦八九月內胎氣壅滿宜常服之滑胎易產枳殼五兩甘草一兩右為末每二錢白湯點服或加香附一兩尤妙(入門)一名滑胎枳殼散(本事)一名枳殼六一散(直指)

救生散 孕婦臨月服之瘦胎易產勝於枳殼散人參訶子肉神麩麥芽白朮橘紅各等分右粗末每三錢水煎服(拔萃)

佛手散 孕婦臨月服之則縮胎易產自無難產之患當歸六錢川芎四錢右剉作一貼水煎熟入酒少許再煎溫服若加益母草三錢尤妙(回春)一名芎歸湯即芎歸等分也(時)

益母丸 催生神效益母草於五月五日六月六日花正開時收採陰乾不犯鐵器搗為末蜜丸(保命)一丸白湯化下或丸如梧子每取五七十九丸溫酒或白湯下(種杏)一名返魂丹(保命)

治橫逆產產後百病(入門)

縮胎丸 孕婦八九個月用之縮胎易產黃芩夏一兩春秋七錢冬五錢炒赤茯苓七錢半白朮二兩陳皮三兩右為末粥丸梧子大白湯下五七十九(丹心)

束胎丸 令縮胎易產白朮枳殼各等分右為末以水浸燒餅和丸梧子大八月每服五十九丸白湯下(保命)

神寢丸 能瘦胎易產枳殼二兩孔香一兩右為末以煉蜜丸梧子大酒下三十九丸一名寢生丸(得效)

十產候 十產候者一曰正產二曰坐產三曰臥產四曰橫產五曰逆產六曰偏產七曰礙產八曰盤腸產九曰熱產十曰凍產(良方)又有傷產催產(回春)

正產 正產謂月數已滿忽然臍腹陣痛胎孕溢下盤水淋下用力一努其兒遂生(良方)

坐產 謂臨產孕婦疲倦久坐椅褥兒抵生路不能下生當於高處懸吊手巾令產婦攀引輕輕屈足兒即順生(良方)

臥產 謂產母臥定背脊着席體不屈曲則兒不失其道自然易產(良方)

橫產 謂兒先露手或臂者治法當令產母仰面安臥收生之人徐徐先推兒下截令直上沖通以手中指摩其肩推上而正之漸引手攀其耳令頭正候兒身正門路順却服催生葯安詳上草自然易產(傳)

逆產 逆產者先露足橫產者先露手坐產者先露臂皆用力太早之過也若先足先露者用細針刺兒手之踏蓮花生急以鹽塗兒脚心因急極之併以鹽摩母腹上則自然正生矣(正傳)

併以鹽摩母腹上則自然正生矣(正傳)



偏產

謂兒頭偏柱一傍○雖逼近產門初非露正頂止露額角者治法令產母仰臥收生之人輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正向產門一遍即下○又有兒頭後骨偏柱穀道者當以綿衣多覆令

熱裏手急於穀道外傍徐徐推之漸漸近上令頭正然後上草即產(正傳)

礙產

謂兒頭雖正產門已露其頂而不能生下者此因兒轉之時臍帶攀掛兒肩致不能生治法令產母仰臥收生之人輕輕推兒近上徐徐通手以中指按兒兩肩理脫臍帶候兒身正順用力

(正傳)

盤腸產

謂孕婦臨產時子腸先出兒即隨產治法頂上貼如聖膏(方見下)自然收縮即以水洗去如腸頭為風吹乾不能收入以磨刀水微溫潤腸煎好磁石湯一盃產母飲之則其腸自收○又法以

溫湯潤其腸令產母仰臥以言安慰卻用好醋半盞新汲水七分調和忽喫產母之面或背則收每一喫一縮三縮腸已盡收矣(正傳)

熱產

臨產時當盛暑宜居深幽靜室日色遠處開窗戶多貯清水照水以防發熱之患(正傳)

凍產

謂嚴冬解產宜密閉房戶內外生火常令暖氣如春仍厚覆下體常使溫和免致難產(正傳)

傷產

傷產者過月而產有經一二年至三四年而產者或倉皇用力太早斃水先下敗血裹住宜用勝金散或新汲水磨京墨服之墨裹兒即出(入門)

催產

臨產日久產母因倦宜服催生藥以助血氣令兒速生(回春)

交骨不開難產

難產垂死及矮石女子交骨不開者用龜殼散兜腦丸來麴散加味芎歸湯(入門)○凡產時交骨不開者陰氣虛也亦用加味芎歸湯(回春)○產前軟胯方烏梅生薑甘草各等分

劉煎服便令跨骨軟

催生如聖散

治難產及漏血胎乾者立效黃蜀葵子研為末每取二錢以酒調濾去渣溫服(丹心)○一方用蜀葵花為末熱酒調下一錢即效(正傳)○歌曰黃葵子炒百餘粒研爛酒調濟寬急

若患臨危難產時免得全家俱哭泣(正傳)

催生丹

治產難及橫產逆產臘月兒腦一個取髓去皮膜研如泥乳香細末二錢半丁香細末一錢麝香二分半右拌勻和丸雞頭實大(即芡仁)陰乾油紙裹每取一丸溫水磨化服即產隨男左女右

手握藥出是驗須臾日合炊(良方)



神效乳珠丹

催生神效又治子死腹中不下明乳香研細取猪心血和丸芡實大朱砂為衣晒乾每一丸冷酒化下未下再服端午日或歲除夜收合尤妙(綱目)

如神散

催產極驗臨產時令人取路傍草鞋一隻取鼻絡小耳繩燒灰溫酒調服即產得左足者生男右足者生女護者兒死側者有驚自然理也○一名神驗散(得效)

二退散

治產難吐退全者一條蠶退紙方圓一尺右燒存性為末溫酒調下(丹心)

三退散

治難產及橫逆產或子死腹中蛇退全者一條蟬退全者十四枚男子頭髮雞子大右俱燒存性為末分二服溫酒調下(入門)○一名催生散(丹心)○一名蛇退散(得效)

三退六一散

催生神效益元散一兩男子頭髮雞子大香油熬化蛇退全者一條蟬退全者五枚穿山甲一片右各燒存性為末用鹽水煎入髮灰調服立下(入門)○一名滑胎散(丹心)

兔腦丸

治產難日久血乾宜用此滑之臘月兔腦髓一枚鼠內腎一部母丁香益母草各一錢乳香二錢半麝香二分半右為末兔髓和丸芡實大珠砂為衣油紙裹陰乾每一丸醋湯化下即產男

女右手握藥出是驗(入門)

龍蛻散

催生秘傳蟬退一兩大蛇蛻一條並燒存性滑石冬葵子微炒各一兩右為末每一錢順流水微溫調服不可使熱湯(得效)

黑神散

治產難及橫逆產凡坐草日久漿水多下則其血必乾子道艱澀如舟坐灘須湯水而後可通服此藥再固其血則如魚得水決自轉生百草霜白芷各等分右為末每取二大錢清酒壺便各半盞入麝香少許同煎沸熱服不過再服即驗(良方)○一法服此藥後外用蔥白二斤搗爛鋪於小腹上取急水灘頭沙一斗炒熱布裹於臍上輕輕揉捺即產(入門)○一名催生如神散一名神應黑散

(丹心)

黑龍丹

治產難及死胎不下胎衣不下產後兒枕痛血迷血暈一切危急垂死者灌藥得下無不活神驗不可言五靈脂當歸川芎良薑熟地黃各一兩右剉碎盛磁盆紙筋鹽泥固濟炭十斤煨候冷取出

却入薑汁童便溫酒中細研服之(丹心)○一方靈脂當歸川芎良薑生乾地黃各一錢入雞子殼內鹽泥固濟火煨百草霜一兩硫黃乳香各二錢琥珀花蕊石各一錢製法同上(正傳)

錢琥珀花蕊石各一錢製法同上(正傳)

催生散

治產難白芷炒黑百草霜滑石各等分右為末歸湯煎水調下二三錢(正傳)

勝金散

治產難及橫逆產鹽豉一兩以青布裹了燒存性入麝香一錢右末秤鍾燒紅淬酒調下一錢(良方)



霹靂丹

治臨產驚然氣瘳目翻口噤面黑唇青口中沫出子母俱殞兩臉微紅子死母活急用此救之
退一條蠶退紙並燒存性各二錢男子頭髮燒灰路上左脚草鞋燒存性各二錢乳香五分
二錢半水銀七分半二物入銚中火上熔化結砂子研細右為末以豬猪心血和凡梧子太

金箔為衣每取二三丸倒流水送下如不下化開灌之(入門)一名霹靂奪命丸(正傳)

龜殼散

治產難日久垂死及矮石女子交骨不開者龜殼一個生男女婦人頭髮一握
燒存性川芎當歸各一兩右為末每三錢水煎服良久生胎死胎俱下(入門)

來麩散

治臨產用力太過氣衰脈微精神昏暈口噤面青不省人事木香神麩陳皮麥芽黃耆何陽白芍藥各一錢芒根甘草各三錢糯米一合加生薑三片煎服連用為妙或幹開口灌下(入門)

加味芎歸湯

治臨產交骨不開難產即上龜殼散方也(回春)

催生宜用滑利藥

凡催生多用滑利迅速之藥如兔腦髓筆頭灰弩牙蛇退之類是也○若水血多下子道血凝滯者牛膝蔥白桂心生薑之類是也○若觸犯惡氣心煩躁悶而難產者宜麝香朱砂乳香竹茹之類是也(正傳)○難產日久漿水多下胞乾兒不得下香油清蜜各一椀火上微沸調滑石末一兩攪服之外以油蜜摩母臍腹上即驗(醫鑿)○油蜜童尿和服最治難產和益母膏尤妙○榆白皮湯亦可用(丹心)

榆白皮湯

治產難胞乾不下榆白皮冬葵子瞿麥各二錢牛膝麻仁去殼各一錢半木通一錢右剉作一貼水煎服

禳法

臨產之初先脫產婦尋常所穿衣以籠籠頭及籠口則易產勿令產母知(得效)○臨產取赤馬皮鋪之合產母坐其上則催生易產○又法取鰻鼠皮毛(即飛生也)產母手持之即產又海馬或石燕子兩手各把一枚(即驗(本草))

外貼法

凡難產催生內服湯丸外用藥付貼庶有十全之效宜如神丹如聖膏立聖丹偶仙丹諸方)

如神丹

巴豆三枚草麻子七粒並去殼入麝香少許捏作餅子貼臍中分產即以溫湯洗去歌曰巴三草七粒脫衣袂細研如泥入麝香捏作彈丸臍下貼須臾子母便分張(正傳)

如聖膏

治難產及死胎不下分危急者巴豆十六個去殼草麻子四十九粒去殼麝香二錢同搗如泥攤絹帛上貼臍上一時產下即洗去(入門)○一方草麻子去皮一兩雄黃二錢同研成膏塗母右脚心錢產速洗去否則賜出用此膏

立聖丹

治橫逆產惡候及死胎不下神驗寒水石四兩內二兩生用二兩煨赤研為細末入朱砂末如深桃花色每用三分井水調如薄糊用紙花剪如杏葉大攤貼臍心候乾再易不過三上便產(綱

塗頂上賜自入亦名如聖膏(得效)

右脚心錢產速洗去否則賜出用此膏

塗頂上賜自入亦名如聖膏(得效)

立聖丹

治橫逆產惡候及死胎不下神驗寒水石四兩內二兩生用二兩煨赤研為細末入朱砂末如深桃花色每用三分井水調如薄糊用紙花剪如杏葉大攤貼臍心候乾再易不過三上便產(綱



遇仙丹

治法同上卑麻子十四粒去殼朱砂雄黃各一錢半蛇蛻一條燒右為末藥水飯和丸彈子於臨

下死胎

須參攷上驗胎生死條治之○胎死則母舌必黑外證指甲青黑心腹脹悶口中極臭平胃散之

死若出生者安雙瓜一升大甘草五錢半生半炒東流水十盞煎至三盞去滓入阿膠二兩半生半炒

升醞酒二升右合煎取二升分溫兩服即下(良方)○死胎不下宜用佛

佛手散

治胎傷心腹痛口噤欲絕用此探之胎不損則痛

香桂散

下死胎肉桂一兩麝香一錢右為末

桂香丸

飯丸菜豆大白湯下十五丸(入門)

奪命丸

治胎死腹中搶心悶絕欲死或食惡物或誤服草藥傷動胎氣胎未損服之可安胎已死服之可

服三丸或丸如彈子大淡醋湯化下一丸○即仲景方桂枝茯苓丸也治婦人宿有癥病而孕胎及三

用桂枝茯苓丸丹

烏金散

治難產胎乾子死危急者先進佛手散探之的知胎死

一方

死胎不下取烏雞一隻去尾細剉水三升煮取二升去雞用手巾蘸湯摩臍下即出

胞衣不下

凡產後胞衣不下稍久則血流入胞中胞為血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤宜急斷臍帶

只要產母心懷安泰勉進粥飯終身不礙矣累試有驗(良方)○胞衣不下切不可令坐婆妄用手法探

塞故不能下須更衝上逼心則死急服奪命丹貼如聖膏(方見上)○胞衣不下宜用黑龍丹(方見上)花蕊石散牛膝湯三退欵返魂丹(方見上)一字神散



奪命丹

治產後血入胞衣服滿衝心日久不下危急者附子炮五錢牡丹皮乾漆炒各一兩右為末以醋一升入大黃末一兩熬成膏和丸梧子大酒下五十九(丹心)

花藥石散

胞衣不下惟花藥石散最為要緊若胎衣上衝至死但心頭鑣急以童便調一錢服之取大便下如豬肝或化為黃水而出其胞衣即下(方見諸傷○良方)

牛膝湯

治產後胞衣不下腹滿即殺人服此即爛下滑石末二錢木通當歸牛膝瞿麥各一錢半冬葵子二錢右剉作一貼水煎服(局方)

三退飲

治胞衣不下神效蛇退一條全者蠶退紙一方蟬退四十九個右並燒存性為末順流水調下立出(正傳)

一字神散

治胞衣不下鬼白黃色研如粉不用羅過以手指搽之每服二錢溫酒一盞同煎至八分服之立生如神此方救人幾萬數(得效)

一方

治胞衣不下猪脂白蜜清油各半蓋於火上熔化溫分二服便下極驗一云但多服猪脂亦佳(書)○又方取三姓家雞卵三枚三姓家水各一匙三姓家鹽各一撮相和頓服仍探口令嘔

(俗方)○又方童尿一升生薑蔥白各三錢右煎數沸熱服之(本草)○又以蔥白濃煎湯熏洗下部即下(俗方)

穰法

胞衣不下取產母視覆井口上勿令產母知之立下(本草)○又法取初洗免湯一盞服之勿令產母知立下(回要)

產前諸證

有子痲子煩子腫子淋子嗽子痲子瘧子懸感寒孕婦不語兒在腹中哭孕婦腹中鐘鳴

子痲

妊婦中風項背強直筋脈攣急口噤語澀痰厥昏迷時作時止或發搐不省人事名曰子痲亦曰免暈甚則角弓反張宜用羚羊湯輕者四物湯(方見血門)加葛根牡丹皮秦艸細辛防風竹瀝(入門)

羚羊角湯

羚羊角獨活酸棗仁五加皮各一錢二分防風薏苡仁當歸川芎茯神杏仁各七分木香甘草各五分右剉作一貼薑三水煎服(正傳)

子煩

妊婦心煩躁悶謂之子煩多於受胎後四五月間相火用事或值天令君火大行暑熱之時俱能發煩躁或胎動不安宜用竹葉湯竹瀝湯(入門)

竹葉湯

白茯苓二錢麥門冬黃芩各一錢半防風二(回春)剉作一貼入青竹葉七片水煎服日二(回春)

竹瀝湯

赤茯苓一兩右剉以水一升半煎至半去滓和竹瀝一合服○又竹瀝細細飲之最妙(本草)

子腫

孕婦因胎中有水多於五六個月以致遍身浮腫腹脹喘急或腹大異常高過心胸氣逆不安若不治必損其胎宜用鯉魚湯因常食鯉魚粥又茯苓湯防已湯全生白朮散亦佳○或頭面不腫兩脚微浮甚則自脚面腫至膝腿足指間有黃水出者謂之子氣亦曰

脫脚平胃散(方見五藏)加赤茯苓桑白皮煎服(入門)



鯉魚湯

治子腫白朮赤茯苓各二錢白芍藥當歸各一錢半橘紅五分右剉作一貼先取鯉魚一個修事如食法水煮熟取青汁一盞半入藥及薑七片煎至一盞空心溫服以水盡腫消為度(良愈)

茯苓湯

治子腫當歸川芎白芍藥熟地黃白朮赤茯苓澤瀉條苓梔子炒各門冬厚朴甘草各七分右剉作一貼薑五片水煎服(醫案)

防己湯

治同上桑白皮赤茯苓紫蘇葉各二錢防己一錢半木香五分右剉作一貼入薑五片水煎服(綱目)

全生白朮散

治同上白朮一兩生薑皮大腹皮陳皮茯苓皮桑白皮各五錢右為末每二錢米飲調下(正傳)

一方

治子腫山梔子仁炒為末每一錢米飲調服治子氣(入門)

子淋

婦熱積膀胱或胎氣壅滯小便淋瀝作痛名曰子淋又謂之子滿宜澤瀉湯安榮散地膚子湯葵子茯苓散或胎氣壅滯小便淋瀝作痛名曰子淋又謂之子滿宜澤瀉湯安榮散地膚子湯葵子茯苓散

一證胎婦稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之因思胞為胎所壓轉在一邊胞系不通耳胎若舉起懸在中央胞系得疎則水道自行宜用參朮飲空心煎飲隨以指探吐候氣定更與

又吐小便立通悉試皆效(丹心)○妊婦胞轉不得尿管氣丸(方見虛勞)主之即八味丸(仲景)

澤瀉湯

治子淋澤瀉桑白皮赤茯苓枳殼檳榔木通各一錢半右剉作一貼入薑五片空心煎服(正傳)

安榮散

治同上人參川芎麥門冬木通滑石當歸燈心甘草各一錢右剉作一貼水煎空心服(得效)

地膚子湯

治同上地膚子車前子各一錢半如母黃芩枳殼赤茯苓白芍藥各一錢升麻通草甘草各七分右剉作一貼水煎服(正傳)

葵子茯苓散

治孕婦小便不利冬葵子赤茯苓各等分右為末每二錢米飲調下(仲景)

忘憂散

治子淋琥珀為末每半錢取薑草根一握煎湯調下(正傳)

參朮散

治孕婦轉胞尿閉四物湯(方見血門)材各一錢加人參白朮半夏陳皮各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三水煎飲後探吐之又與又吐小便立通神效(丹心)

一方

治轉胞尿閉蔥白細切和鹽炒熱熨臍下立通(入門)

一法

治轉胞尿閉脹急令產婆香油塗手自產門入托起其胎則尿出如注服急即解(丹心)○又法將孕婦倒置起則尿自出亦效(丹心)



子嗽 姪娘外感風寒久嗽不止謂之子嗽宜紫菀湯百合散馬兜鈴散天門冬散(諸方)

紫菀湯 治姪娘咳嗽胎不安紫菀天門冬各二錢桔梗一錢半杏仁桑白皮甘草各一錢右剉作一貼入竹茹羅子大水煎去滓入蜜半匙每一沸溫服(綱目)

百合散 治子嗽百合紫菀葶貝母白芍芍藥前胡赤茯苓桔梗各一錢甘草五分右剉作一貼入薑五水煎服(得效)

馬兜鈴散 治子嗽氣壅喘急陳皮大腹皮桑白皮紫蘇葉各一錢二分馬兜鈴桔梗人參貝母五味子甘草各七分半右剉作一貼入薑三片水煎服(良方)

天門冬飲 治子嗽天門冬紫菀葶知母桑白皮各一錢半五味子桔梗各一錢右剉作一貼水煎服(正傳)

一方 治子嗽貝母去心熟炒黃為末以砂糖屑拌和作丸櫻桃大常用含化神效(得效)

子痢 姪娘下痢赤白腹中疴痛裏急後重名曰子痢宜當歸芍藥湯白朮湯雞黃散鴨子煎○姪娘泄瀉宜用訶朮散大甯散

當歸芍藥湯 治子痢白芍藥白朮各一錢半當歸白茯苓澤瀉瀉條苓各一錢木香檳榔黃連甘草各七分右剉作一貼水煎服○白痢腹痛去苓連加乾薑(正傳)

白朮湯 治孕婦下痢膿血白朮當歸黃芩各三錢右剉作一貼水煎服(正傳)

雞黃散 治子痢烏雞卵一個傾出清留黃黃丹一錢入雞子殼內攪勻厚紙糊口鹽泥固濟火煨研為末右每取二錢水飲調下一服愈者是男二服愈者是女(本事)

鴨子煎 治同上生薑年火者百錢年老者二百錢搗取自然汁鴨子一個打破入薑汁內攪勻右同煎至八分入蒲黃三錢再煎五七沸空心溫服立效(本草)

訶朮散 治姪娘泄瀉由食生冷當風涼所致訶子皮白朮各一錢半陳皮良薑木香白芍藥酒炒肉豆蔻煨甘草炙各一錢右剉作一貼薑五水煎服(正傳)

大甯散 治姪娘下痢赤白或泄瀉腹痛垂死者黑豆三十五粒鶯粟殼二兩半生半炒甘草二兩半生半炒右為粗末都作一貼入薑三片同煎空心服神效(綱目)

子瘧 姪婦患瘧寒熱往來謂之子瘧宜醒脾飲子露薑飲(方見瘧門)驅邪湯濟生石膏湯

醒脾飲子 治子瘧寒瘧厚朴草豆蔻研各五錢乾薑三分甘草二分右剉作一貼入薑五棗二同煎空心服(入門)

驅邪湯 治姪娘感冷發瘧良薑白朮草果檳榔紅藿香縮砂白茯苓各一錢甘草五分右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服(丹心)



濟生石膏湯 治妊婦熱瘧渴飲無度石膏二錢生地黃一錢半黃芩麥門冬人參知
母乾薑各一錢甘草五分右剉作一貼入烏梅一個同煎服(丹心)

子懸 妊婦胎氣不和逆上心胸脹滿疼痛謂
之子懸宜用紫蘇飲蔥白湯(本事)

紫蘇飲 治子懸及臨產驚惶氣結難產最妙紫蘇葉二錢半人參大腹皮川芎陳皮白
芍藥當歸各一錢甘草五分右剉作一貼入薑四片葱白三莖水煎服(良方)

蔥白湯 治子懸蔥白二十莖即二握右以水一升半於銀
石器內煮至半取汁頓服食蔥盡即愈(良方)

感寒 孕婦傷寒產前安胎產後補血為主治法無犯胃氣及上二焦為三禁調不可汗不可下不可利小便
也但當和解小柴胡湯主之(方見寒門)一名三禁湯(保命)○妊婦感冒風寒頭痛煩燥宜用蘇散

黃龍湯 保嬰白朮散蔥白湯○孕婦熱病發黑斑用梔子大青湯○熱病
護胎方取浮萍朴硝大黃蛤粉藍根等分為末貼臍上安胎極妙(得效)

芎蘇散 川芎紫蘇葉白芍藥白朮麥門冬陳皮乾葛各一錢甘
草五分右剉作一貼入薑五蔥白三莖水煎服(濟生)

黃龍湯 治孕婦感寒寒熱如瘧柴胡四錢黃芩人參
甘草各一錢右剉作一貼水煎溫服(得效)

保安白朮散 治孕婦傷寒安胎白朮黃芩各等分剉研瓦上同炒香右為
末每三錢薑三棗一水煎調下或同煎服亦可最妙(寶鑒)

蔥白湯 妊婦傷寒當發散宜用此蔥白十莖生
薑切二兩右剉水煎連服取汗(活人)

梔子大青湯 治妊婦熱病發癡黃芩升麻梔子各二錢大青杏
仁各五分右剉作一貼蔥白三莖同煎服(綱目)

孕婦不語 內經曰人有重身九月而瘖此為何病岐伯對曰胎之絡脈絕也胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎
繫舌本故不能言無治也當十月復淫曰分娩則自能言勿藥可也○孕婦瘖症不能言四物湯

(方見血門)加大黃芒硝各一錢水煎去滓入蜜少許
沉吟時時呷服心火下降肺金自清則能言矣(入門)

兒在腹中哭 兒在腹中哭者母臍帶上疙瘡乃兒口中含者因妊母登高取物脫出兒口以作此聲也含姪
母曲腰向地拾物使兒復得含入口中則其聲即止(正傳)○一方黃連濃煎汁令母呷服亦

止(得效)○又方多年空屋下鼠穴
中土一塊令妊婦嚼之即止(丹心)

孕婦腹中鐘鳴 孕婦腹中作鐘鳴取多年空屋下鼠穴
中土為末酒服或乾嚼之即止(入門)



產後諸證

有兒枕腹痛血暈血崩血喘咳嗽逆產後不語產後見鬼諸妄產後發熱產後乳懸證下乳汁產後陰脫產後鬱冒產後風症產後頭痛產後心腹腰痛產後嘔逆產後淋瀝遺尿產後泄痢

產後秘結
產後浮腫

兒枕痛

胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破血下若敗血不下則成塊作痛不可忍乃血瘀也宜用失笑散紫金丸三聖散黑龍丹(方見上)花築石散(方見諸傷)起枕散立效散(良方)○時歸湯如二

枝蓬朮玄胡索牡丹皮桃仁紅花煎服即效(良方)

失笑散

治產後兒枕膈腹痛欲死百藥不效五靈脂蒲黃炒各等分右為末每二錢和醋熬成膏入水一盞煎至七分熱服立效(局方)

紫金丸

治同上右以失笑散末和醋熬膏丸如櫻桃大每二九童便溫酒各半盞調服(良方)

三聖散

治產後兒枕痛不可忍當歸一兩玄胡索桂心各半兩右為末每二錢童便或熱酒調下(正傳)○一名玄胡索散(得效)

起枕散

治兒枕痛極苦當歸白芍各二錢川芎一錢半白芷桂心蒲黃牡丹皮玄胡索五靈脂沒藥各七分右剉作一貼水煎入好醋空心服(醫鑿)

立效散

治兒枕痛五靈脂炒為末每二錢溫酒調下(良方)

一方

治兒枕痛百藥不效螃蟹一個燒存性研為末空心溫酒一盞調服立止生男用犬臍蟹生女用團蜻蟹○一方螃蟹爛搗和酒服(種杏)○又方真蒲黃一錢白湯調下又大斧燒赤投酒中溫服

(本
草)

血暈

產後血暈由氣血暴虛血隨氣上迷亂心神故眼前生花甚者悶絕口噤神昏氣冷宜用清魂散(良方)○產後血暈有二有下血多而暈者但昏悶煩亂而已當補血宜用芎歸湯(方見下)有下血火

而暈者乃惡露上搶於心心中下滿急神昏口噤絕不知人當破血行血宜奪命散花築石散(方見諸傷)(良方)○產後血暈宜用四味湯荆芥散醋墨法(諸方)

清魂散

治產後血暈荆芥穗五錢川芎二錢半人參澤蘭葉各一錢二分半甘草一錢右為末以溫酒熱湯各半盞調二錢灌之下咽即甦(良方)

奪命散

治血暈譫妄沒藥血竭各等分右為末每二錢以童便好酒各半盞煎數沸調服神效○一名血竭散(丹心)

四味湯

治產後血暈當歸玄胡索血竭沒藥各一錢右粗末童便煎服(丹心)○或細末每二錢童便調下名曰四味散(入門)



南京中醫藥大學圖書

荊芥散 治血暈如神荊芥搗為末每二錢童便一盞調熱服口噤幹開灌之(湯液)

醋墨法 防血暈墨半錠燒赤投醋中研細每五分淡醋湯調下即效(良方)

一方 醋破血暈取美清醋煎稍稍舍之即愈又以醋嗅其面醒來與醋細呷之又炭火沃鐵常聞其聲(良方)○又乾漆或舊漆器燒烟熏鼻即醒(良方)○又韭菜細切或瓶中以熱醋沃之向產婦面

熏其氣即醒(良方)○產婦房中常得醋氣為佳酸益血故也(本草)○又治血暈悶絕紅花一兩酒煎服即醒(本草)

又方 治產後忽昏悶不省人事者暴虛故也生雞卵三枚吞之若未醒童便一升飲之又產後血崩不止是謂重傷宜大劑芍歸湯(方見下)加芍藥煎服救之若小腹滿痛是肝氣已壞為難

血崩 治(得效)○產後血崩不止四物湯(方見血門)加蒲黃生地黃汁阿膠蘆根陳艾白芷煎服(良方)○產時下血過多危宜用濟危上丹(得效)○小產後下血不止宜用補氣養血湯○血崩宜五灰散十灰丸(方並見血門)

濟危上丹 治產時下血過多虛極生風唇青肉冷汗出目瞑命在須臾切不可用正風藥亟投此乳香硫黃五靈脂太陰玄精石陳皮桑寄生何膠卷柏各等分右將前四石藥研微火炒再研細方入後四藥為末以生地黃汁和丸梧子大溫酒下二三十丸(得效)

補氣養血湯 治小產後下血不止人參黃耆當歸白朮白芍芍藥酒炒艾葉何膠川芎青皮香附子炒縮砂研甘草炙各一錢右剉作一貼水煎服(回春)

一方 治產後血崩取木耳一斤或半斤者燒存性為末入麝香末一錢煨椒殼末二錢右和勻每取一錢以烏梅煎湯調下即止(丹心)

衄血 產後口鼻黑色起及鼻衄者名曰胃絕肺敗此證不可治急用荊芥散(方見上)及覆法(良方)○產後氣血散亂入於諸證不得還元故口鼻黑色起及變鼻衄名曰胃絕肺敗宜用犀角地黃湯救之(方見血門)

覆法 急取緋線一條並產母頂心髮兩條緊繫產母手中指節即止(良方)

喘嗽 產後喘極危多死也(產寶)○產後喉中氣急喘促者因所下過多藥血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘此名孤陽絕陰為難治宜用大劑芍歸湯小參蘇飲(綱目)○產後喘急命在須臾宜用奪命散(方見上)童便好酒各半盞調和熱服惡血即下喘自定或用獨參湯亦可(方見氣門)

門○或人參茯苓水煎服○產後咳嗽多是瘀血入肺二母散感冒宜旋覆花湯(入門)

○或人參茯苓水煎服○產後咳嗽多是瘀血入肺二母散感冒宜旋覆花湯(入門)

○或人參茯苓水煎服○產後咳嗽多是瘀血入肺二母散感冒宜旋覆花湯(入門)

○或人參茯苓水煎服○產後咳嗽多是瘀血入肺二母散感冒宜旋覆花湯(入門)



二母散 治產後惡露流入肺經咳嗽知母貝母白茯苓人參各一錢桃仁杏仁各二錢右剉作一貼水煎服(聖惠)

小參蘇飲 治產後敗血入肺面黑發喘欲死者蘇木二兩剉水二椀煎至一椀調人參細末二錢服之(雲岐)

旋覆花湯 治產後感冒風寒咳嗽痰或旋覆花赤芍藥荆芥穗半夏夏翹五味子麻黃赤茯苓杏仁前胡甘草各一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服(三因)

咳逆 產後咳逆不止欲死肉桂五錢剉薑汁三合右同煎溫服二合以手炙火摩背上令熱時塗藥汁盡為妙(良方)○一方煎壁鏡窠三五個取汁熱呷即差(良方)

產後不語 由敗血干心心氣閉塞故舌強不語宜七珍散四味散(方見上)○痰熱迷心不語者宜孤鳳散○產後失聲言不出者宜茯苓補心湯(方見血門)○入門)

七珍散 治產後不語人參生地黃石菖蒲川芎各二錢細辛防風辰砂各一錢右為末每一錢薄荷湯調服○加甘草一錢名曰八珍散(產寶)

孤鳳散 治產後閉目不語白睛為細末每一錢熱水調下不以時(產寶)

產後見鬼謔妄 產後見鬼言語顛倒此由敗血干心也蘇合香丸一錢童便調服即醒小調經散亦佳(方見下)加龍腦少許服之○瘀血迷心言語謔妄昏暈宜八物湯(方見虛勞)去芍藥加琥

珀柏子仁遠志朱砂金銀煎服交感地黃煎丸亦妙(入門)○產後昏冒不省瞑目無所知蓋因血暴亡心神無所養故也甚則循衣摸空錯語失神宜生地芩連湯(方見血門)全生活血湯(方見胞門)

甯神膏 茯苓散散柏子仁散(諸方)

交感地黃煎丸 治產後眼見黑花發狂如見鬼狀或中風角弓反張或下血如豚肝狀臍腹痛結為癥瘕生地黃二斤洗搗以布裂汁留滓生薑二斤洗搗以布裂汁留滓以生薑汁炒地黃洋

以地黃汁炒生薑澤各至乾燥為末為度蒲黃炒四兩當歸玄胡索琥珀各一兩右為末蜜丸彈子大當歸酒化下一丸(局方)

甯神膏 治產後亡血心神昏悶言語失常不得睡臥酸棗仁炒人參赤茯苓各一兩琥珀七錢半朱砂乳香各五錢右為末燈心大棗煎湯調下一錢或蜜丸彈子大薄荷湯化下一丸(入門)

茯苓膏 治產後心虛怔忡不定言語錯亂人參當歸山藥甘草各一錢半遠志茯苓桂心麥門冬各七分半右剉作一貼入薑三棗二水煎服(正傳)

柏子仁散 治產後謔言妄語皆心血虧欠心神不守所致柏子仁遠志人參桑寄生防風琥珀當歸熟地黃甘草各等分右剉每五錢先以白羊心一枚煮汁取二盞乃入藥煎至一盞去渣溫服(正傳)

傳)



產後發熱 產後血虛熱入血室以致發熱煩躁晝輕夜重或譫語如見鬼或往來寒熱宜用柴胡四物湯涼血飲○有惡露不盡者必大小腹有塊作痛宜黑神散○有傷飲食者當消導○有感風寒者當發散○有蒸乳者乳必脹痛但捏去乳汁自愈(醫鑿)○產後因傷寒熱病熱入血室或有瘀血直藥調

○有蒸乳者乳必脹痛但捏去乳汁自愈(醫鑿)○產後因傷寒熱病熱入血室或有瘀血直藥調

○有蒸乳者乳必脹痛但捏去乳汁自愈(醫鑿)○產後因傷寒熱病熱入血室或有瘀血直藥調

柴胡四物湯 治產後發熱及熱入血室柴胡生地黃各二錢川芎赤芍芍藥歸黃各一錢

涼血地黃湯 治產後發熱生地黃三錢赤芍芍藥當歸川芎各一錢半右剉作一貼水煎服(補珍)

牛黃膏 治產後熱入血室朱砂鬱金各三錢牛黃二錢半牡丹皮二錢甘草一錢龍腦五分右為末蜜丸皂子大每一丸井水化下(玉機)

芎歸調血飲 治產後去血過多以致發熱心煩腹痛頭暈眼花或口噤神昏當歸川芎白朮白茯苓熟地黃陳皮使香附烏芍乾薑益母草牡丹皮甘草各七分半右剉作一貼入薑五棗二煎服

醫鑿

黑神散 治產後惡露不下以致發熱煩躁當歸熟地黃白芍藥酒炒肉桂甘草炙各五錢沉香棕櫚友蒲黃沒藥各二錢半乳香一錢半赤芍藥一錢血竭五分右為末每二錢好溫酒調下(醫鑿)

柴胡破瘀湯 治產後因傷寒熱病熱入血室或惡露不下者柴胡黃芩半夏甘草赤芍藥當歸生地黃各一錢桃仁五靈脂各五分右剉作一貼水煎服(入門)

柴胡地黃湯 治產後熱入血室寒熱譫妄如見鬼柴胡生地黃各二錢人參半夏黃芩各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服(得效)

柴胡防歸湯 治產後發熱不因亡血蓄血傷食蒸乳四證外果條風寒表證則用此當歸三錢川芎一錢半柴胡人參各一錢半夏陳皮防風各八分甘草五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎

服(入門)

竹葉防風湯 治產後傷風頭痛發熱青竹葉二十四片防風人參桂枝桔梗前胡陳皮赤茯苓各一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服(入門)

熟地黃湯 治產後虛渴天花粉二錢人參麥門冬各一錢半熟地黃一錢甘草五分右剉作一貼入糯米百粒薑三棗二水煎服(得效)

人參當歸散 治產後亡血生內熱煩渴當歸熟地黃白芍藥人參麥門冬各一錢桂皮五分右剉作一貼先以梗米一合青竹葉十片水二盞煎至一盞去米葉乃入前藥及薑三棗二再煎服(入門)



一方 治產後發熱煩渴生藕汁飲一升合生地黃汁尤妙(本草)
又竹瀝飲一盃甚妙(丹心) ○婦人月經水飲之最妙(俗方)

產後乳懸證

詳見乳部

下乳汁

產後乳汁不行有二有氣血盛而壅閉不行者有氣血弱而枯涸不行者壅閉則宜用通乳湯(一方並見乳部) ○猪蹄粥(良方) ○產後乳脈不行身體壯熱宜用下乳汁治法當

參考乳部用之

玉露散

涼膈壓乳下乳汁桔梗川芎白芷各一錢赤芍藥一錢半人參赤茯苓甘草各一錢當歸五分右剉作一貼水煎服(良方)

猪蹄粥

治乳無汁猪蹄四隻治如食法右水二斗煮取一斗去蹄入土瓜根通草漏蘆各三兩剉煮取六升去滓入葱豉及小米煮作稀粥食之(本草)

一方

下乳汁立效蒿苳子糯米各一合右細研水一碗攪勻入甘草末一錢煎頻頻呷服妙(雲岐) ○又麥門冬末二錢酒磨犀角汁一盞調服又赤小豆煮汁飲又鯉魚羹食之(本草)

又方

治乳無汁野猪脂每取一匙和一盞溫酒服日三乳即下且多可供五兒臘月脂尤佳(本草) ○每酒煮服良(俗方)

產後陰脫

產後陰門脫出蓋努力太過所致若脫肛狀逼迫腫痛清水續續小便淋露宜用當歸黃芪飲外洗患處即入又枳殼二兩煎湯溫浸良久自入(丹心) ○產後陰戶突出四物湯(方見血門) 加龍骨

(無則用五倍子) 連用二貼外以香油和湯洗患處且取如聖膏(方見上) 貼頂上(入門) ○產後陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸用四李蔥入乳香末同搗成餅安於陰戶兩傍良久即愈(入門) ○子宮大痛不可忍五倍子白礬等分煎湯熏洗又為末糝之(入門) ○產後玉門不斂宜用硫黃湯 ○一法香油五斤煎熱盛盆坐其中一食頃以皂角末吹鼻作嚏即收(丹心) ○又取大紙蘸蘸油點火吹滅以煙熏產母鼻

即上(良方)

當歸黃芪飲

治產後陰脫黃芪酒炒三錢人參當歸升麻各二錢甘草一錢右剉作一貼水煎服日三(丹心)

硫黃湯

治產後玉門不斂硫黃四兩吳茱萸克絲子各一兩半炒床子一兩右研每五錢水一碗煎湯乘溫頻熏洗患處自斂(正傳)



陰脫治驗 一婦人產後陰戶中下一物如合鉢狀有二歧此子宮也必氣血弱而下墜遂用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日已收但乾破一片如掌大落在席上其婦恐腸破裂哭泣予思之此其腸胃乃糟粕也肌肉破尚可補完若氣血充破必可生滿用補中益氣湯(方見內傷)去柴胡連進二三大劑一響而收後以四物湯加入參百餘貼連服三年後復生子(丹心)

又法 臨產驚動用力太過以致盲膜有傷陰戶中垂出肉線一條長三四尺牽引心腹痛不可忍以手觸動則痛苦欲絕先服失笑散(方見上)數貼仍用生薑三斤淨洗不去皮搗爛清油二斤拌勻炒熟以油乾為度却用款絹五尺摺作數層令婦人輕輕或起肉線使之屈曲作一團納在水盂口却用筒袋兜裏油薑令稍溫付在肉線上熏之覺薑冷又用熨斗火熨之如薑氣已盡又用新者如此熏熨一日一夜其肉線已縮夜半再用前法越兩日肉線盡入腹中其病全安却再服失笑散芎歸湯調理不可切斷肉線即不可治矣(得效)

鬱冒 婦人經月適下而發其汗則鬱冒不知人何也師曰經水下去故為裏虛而發其汗則表亦虛此為表裏俱虛故令鬱冒也(脈經)○急門○

凡產後發熱若舌蹇唇急手指微動便急作風症瘵之宜歸荊湯獨活酒(直指)○產後中風名所養故也(眼目合眼)之病悉屬於陰亡血補血又何疑焉全生活血湯主之(方見胞門)○東垣

產後風症 曰毒風口喙牙緊手足痲痺欲死宜愈風散歸荊湯如口喙反張涎潮者為症宜交加散豆淋酒(紫湯入門)○產後症血氣大虛不宜發表但用防風當歸散最妙(綱目)○產後風病宜用血風湯

歸荊湯 治產後風症荊芥穗微炒當歸身尾各等分右為末每三錢豆淋酒調下(入門)

獨活酒 治產後風症獨活白鮮皮各五錢右劉酒二斤煎取一升分二服(本草)

愈風散 治產後中風荊芥穗略炒為末每三錢豆淋酒調下(得效)○一名舉卿古拜散(產寶)

交加散 治產後症生地黃一斤生薑十二兩各搗自然汁以生地黃汁炒生薑滓以生薑汁炒生地黃滓合焙乾為末每三錢溫酒調服(入門)

豆淋酒 治產後風黑豆一升炒熟乘熱投三升清酒中密封隨量飲之(本草)

紫湯 治同上黑豆二合炒香熟以酒一盞煮取七分去豆空心頓服(良方)

風必當大補氣血然後治痰切不可作中風治而用發表出汗之藥八物湯(方見虛勞)加減用之為可(丹心)○產後汗多風入成症者難治(入門)

風必當大補氣血然後治痰切不可作中風治而用發表出汗之藥八物湯(方見虛勞)加減用之為可(丹心)○產後汗多風入成症者難治(入門)

風必當大補氣血然後治痰切不可作中風治而用發表出汗之藥八物湯(方見虛勞)加減用之為可(丹心)○產後汗多風入成症者難治(入門)

風必當大補氣血然後治痰切不可作中風治而用發表出汗之藥八物湯(方見虛勞)加減用之為可(丹心)○產後汗多風入成症者難治(入門)



防風當歸散 治產後症防風當歸川芎熟地黃各一錢半右剉作一貼水煎服(海藏)

血風湯 治產後諸風掣急或痿弱川芎當歸熟地黃白朮白心(心)防風五錢右以一半為細末溫酒調下二錢以一半

產後頭痛 凡產後發熱身痛頭疼不可便作感冒治之此等多是血虛或敗血作梗宜玉露散(方見上)四物湯加柴胡煎服(良方) 產後頭痛宜用一奇散(即芎歸湯也)加荆芥穗(錢)煎服

(雲岐) 一婦產後患頭痛與心痛互作苦極欲死用黑龍丹(方見上)一丸下如蝗蟲子惡物三升許即愈(良方)

產後心腹腰脇痛 產後心腹疼痛全是瘀血宜八味黑神散四味散(方見上) 失笑散(方見上) 入兩

患四物湯倍芎歸加鬼箭羽紅花玄胡索各一錢煎水調沒藥散服之即效(保命) 產後左脇痛宜養血佐肝丸右脇痛宜推氣養血丸(醫鑿) 冬月解產臍下痛宜羊肉湯(仲景) 產後血癥痛無定處童尿三升生地黃汁生藕汁各一升生薑汁二升右先煎三味約三分減一分乃下薑汁慢火煎如稀錫每取一合溫酒調服(良方)

八味黑神散 治產後惡露不盡心胸膈腹撮痛及血迷血暈滿黃赤芍藥乾薑肉桂當歸熟地黃甘草各一兩黑豆四兩炒右為末每二錢童便溫酒調下(局方) 本方加百草霜五錢又名烏金散(得效)

桃仁湯 治產後惡露方行忽然斷絕腰腹重痛或流注腿股作痛桃仁蘇木生地黃各五錢蟲水蛭並宜取五香連翹湯(方見癰疽) 去大黃水煎入竹瀝服之(良方)

桃桂當歸丸 治產後惡露方行忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆痛狀如錐刺桂心赤芍藥各五錢當歸桃仁沒藥各二錢半蟲水蛭並炒各三十枚右為末醋麴糊和丸碗豆大醋湯下三十丸(良方)

沒藥 治產後血瘀作痛沒藥三錢蟲蟲炒二錢水蛭炒一錢麝香一字右為末每取二錢服之(保命)

養血佐肝丸 治產後左脇脹悶一塊痛臥不著席香附醋炒一兩當歸川芎白芍藥酒炒陳皮半夏油炒白朮炒青皮油炒神曲炒蘿蔔子炒牡丹皮紅花白茯苓各一兩柴胡酒炒桃仁炒各八錢



北京大學中藥研究所藏書

草龍胆酒洗六錢三稜蓬朮並醋炒各五錢右為末酒糊和丸梧子大空心白湯下百丸(醫鑿)

推氣養血丸

治產後右脇膨脹有塊如豎弦一條若冷便疼便香附二兩當歸川芎白芍藥酒炒白朮各一兩三稜蓬朮並醋炒各一兩

錢麥芽炒肉桂各六錢木香三錢右為末醋糊和丸梧子大空心以米飲吞下百丸(醫鑿)

羊肉湯

各二月解產寒氣入產門臍下脹痛手不可近此寒病也羊肉四兩當歸陳皮各二兩生薑一兩右對水三碗酒一盞煎至一碗去滓分二次溫服(正傳)

產後嘔逆

產後腹脹滿悶嘔吐不定此由敗血入脾胃故不能飲食也宜用抵聖湯香靈丸(正傳)

抵聖湯

治產後嘔逆惡心不能飲食赤芍藥半夏澤瀉藜蘆人參陳皮各一錢半甘草五分右對作一貼入薑七片水煎服(濟生)○一名拒勝湯(正傳)

香靈丸

治產後嘔逆不止丁香辰砂別研各六分五靈脂一錢右研勻用狗胆或猪胆和丸芫實大以生薑陳皮煎湯磨化一丸服之(本事)

產後淋瀝遺尿

婦人產理不順致傷遺尿無時宜用參朮膏(丹心)○產後淋瀝宜用茅根湯(三因)○產後遺尿宜桑螵蛸散黃芪芍藥湯(三因)

參朮膏

治產後浮腫成淋人參二錢半白朮二錢黃芪一錢半陳皮桃仁白茯苓各一錢甘草五分右對作一貼水煎猪羊浮後入藥再煎去滓溫服空心○一產婦因收生者不謹損破尿管而致淋瀝不禁遂為廢疾因思肌肉在外而破尚可補完診其脈虛甚試與峻補服

參朮膏至一月而女蓋血氣驟長其脬自完恐稍遲亦難成功(丹心)

茅根湯

治產後淋白茅根四兩白茯苓二兩芫實子人參各一兩蒲黃桃膠滑石甘草各五錢芣貝五個石首魚頭中石十六個右為末每二錢木通湯調下或為麤末三錢燈心同煎服亦可(三因)

桑螵蛸散

治產後淋數及遺尿桑螵蛸十五個炒鹿茸酥炙黃芪各一兩半牡蠣粉人參赤石脂厚朴各一兩右為末空心以米飲調下二錢(雲岐)○又桑螵蛸酒炒為末薑湯調下二錢亦效(綱目)

目)

黃芪芍藥湯

治產後遺尿不禁黃芪當歸尾白芍藥各一錢半白朮一錢人參陳皮各五分甘草三分右對作一貼水煎空心服(三因)

產後泄痢

產後泄瀉宜的奇散○產後月內痢宜鴨子煎(方見上)又四物湯加桃仁黃連木香主之(八因)○當歸芍藥散亦可(方見通治)

的奇散

治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉下青黑色物是驗大劑芥穗於盞內煎火燒存性不得犯油火入麝香火許研為末每一錢沸湯一二呷調服神效得效



產後大便秘結

產後有三種疾鬱胃則多汗汗多則大便難蓋新產血虛多汗出致胃燥亡津液故大便秘結宜蘇麻粥(方見大便)及滋腸五仁丸(正傳)○產後大便不通腸滿氣急難以坐臥取

麥藥末酒調下一合神效(丹心)

滋腸五仁丸

治產後陰血虛耗大便閉澀橘紅末四兩杏仁桃仁各一兩柏子仁五錢松子仁二錢半郁李仁一錢右各別研為膏合橘紅末蜜丸梧子大末飲下五六十九丸(正傳)

產後浮腫

經散小調經散正脾散(良方)○產後浮腫必大補氣血為主四君子湯(方見氣門)加蒼朮散

大調經散

治產後腫滿喘急尿澀黑豆炒一兩茯苓神五錢琥珀一錢右為末烏豆紫蘇葉煎湯調下二錢(良方)

小調經散

治產後浮腫當歸一兩桂心赤芍各五錢沒藥琥珀甘草各二錢細辛麝香各一錢右為末每一錢溫酒入薑汁調服(良方)

正脾散

治產後通身浮腫蓬朮炮便香附子陳皮茴香甘草炙各等分右為末每一錢燈心木通煎湯調下(正傳)

五味白朮散

治產後腫宜補中導水行氣白朮三錢陳皮一錢半木通川芎赤茯苓各一錢右剉作一貼入水煎吞下與點丸(方見火門)二十五丸(丹心)

澤蘭散

治產後風腫木腫澤蘭防己各等分右為末每一錢溫酒或醋湯調下(丹心)

產後脈法

婦人產後之脈洪實不調者死沈微附骨不絕者生○診婦人新產脈沈小者生實大堅強急者死(脈經)○新產之脈緩滑吉實大弦急死來侵又云沉細附骨不絕生(脈訣)

產後治法

產後當大補氣血為先宜用補虛湯雖有雜症以末治之○又云胎前母滯產後母虛產後切不可發表又不可用芍藥以性味酸寒能代生發之氣故也(丹心)○產後必先逐瘀補虛為主瘀消然後方可行補如不遂逐瘀服參芪之屬或致瘀血攻心即危(入門)○產後用補虛湯如發熱輕則加茯苓湯滲之重則加乾薑或問大熱用乾薑何也曰此非有餘之邪乃陰虛生內熱耳蓋乾薑能入肺分利肺氣又能入肝經引眾藥生血然必與補陰藥同用之此造化之妙非天下之至神其能與於此哉(丹心)○大抵產病天行則用增損柴胡(即小柴胡湯也)雜病則用加減四物(即四物湯也)四物加減法春倍川芎夏倍

也)四物加減法春倍川芎夏倍

巧藥秋倍地黃冬倍當歸(綱目)

補虛湯

人參白朮各一錢半當歸川芎黃芪陳皮各一錢甘草七分右剉作一貼入薑三片水煎服熱輕倍加茯苓熱重加酒芍熱甚加乾薑炒黑引諸藥入肝經生血(入門)

產後虛勞

產後未滿月不宜多用七情勞倦行動或作鍼工恣食生冷黏硬之物及犯觸風寒當時未覺厥後即成羸勞凡產後滿百日乃可交合不爾至死虛羸百病滋長慎之(良方)○產後勞傷過度名曰羸勞去川芎加續斷牛漆鱧甲桑寄生桃仁為粗末先將猪腎一對薑一片棗三枚水三盞煎見虛勞)去川芎加續斷牛漆鱧甲桑寄生桃仁為粗末先將猪腎一對薑一片棗三枚水三盞煎

一盞半入前藥末三錢及蔥白三寸為梅一個荆芥五穗再煎至七分去滓空心溫服(入門)○產後羸勞宜用當歸羊肉湯當歸建中湯(方見虛勞)增損四物湯人參蠶甲散熟地黃散(方見虛勞)

當歸羊肉湯

治羸勞肥羊肉四兩當歸川芎黃芪各一兩二錢半生薑一兩半右剉水九盞煎至三盞分三服(良方)○一方無羊肉代以猪肉腎一雙(入門)

增損四物湯

治產後亡血榮衛虛損乍寒乍熱四物湯去熟地黃加人參乾薑甘草等分煎服(濟生)

人參蠶甲散

治產後羸勞黃芪蠶甲各一錢二分半牛膝一錢人參桂心桑寄生當歸白茯苓各一錢藥桃仁熟地黃麥門冬甘草各七分半續斷五分右剉作一貼空心水煎服(得效)

熟地黃散

治產後氣血未復而有房事勞損下血頭目沉重熟地黃一錢半當歸蠶甲微炒鹿角膠珠半右剉作一貼入青竹茹一錢水煎服(正傳)

過月不產

妊娠之婦有按月行經而胎自長者有三五個月問其血入下而胎不墮者或及期而分娩或逾月而始產其理何歟曰其按月行經而胎自長者名曰盛胎蓋其婦氣血充盛養胎之外其血尤有餘故也其有數月胎而血大下者謂之漏胎蓋因事觸動經脈故血下而未傷於子宮故也雖然孕中失血胎雖不墮其氣亦虧多致逾月不產予曾見有十二三月或十七八月或二十四五個月生者往往有之俱是氣血不足胚胎難長故爾凡十月之後未產者當服大補氣血之藥以培養之庶分娩之無虞也(正傳)○過月不產用八物湯(方見虛勞)加黃芪鹿角膠珠煎服峻補之(正傳)○又方四物湯(方見血門)○加香附桃仁枳殼縮砂紫蘇蘇葉水煎服即產(良方)

妊通治

宜用芎歸湯四物湯(方見血門)保安丸富歸芍藥散益母丸(方見上)益母膏

芎歸湯

治產前產後諸疾及血暈不省橫生逆產死胎不下血崩不止臨月服之則縮胎易產產後服之則惡血自下川芎當歸各五錢右剉作一貼水煎服日二三○又治半產去血多產後去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多及一切去血過多眩暈悶絕不省人事者連進數服即甦(得效)○當歸六錢川芎四錢名佛手散(方見上)

保安丸

治產前產後諸疾生乾地黃剉為末馬鳴退炙(即蠶退紙)各一兩赤茯苓牡丹皮白芍藥各七錢半川芎細辛人參肉桂當歸牛膝白芷木香薰木麻黃澤蘭葉附子炮甘草炙寒水石煨防風

芎歸湯

治產前產後諸疾及血暈不省橫生逆產死胎不下血崩不止臨月服之則縮胎易產產後服之則惡血自下川芎當歸各五錢右剉作一貼水煎服日二三○又治半產去血多產後去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多及一切去血過多眩暈悶絕不省人事者連進數服即甦(得效)○當歸六錢川芎四錢名佛手散(方見上)

保安丸

治產前產後諸疾生乾地黃剉為末馬鳴退炙(即蠶退紙)各一兩赤茯苓牡丹皮白芍藥各七錢半川芎細辛人參肉桂當歸牛膝白芷木香薰木麻黃澤蘭葉附子炮甘草炙寒水石煨防風

芎歸湯

治產前產後諸疾及血暈不省橫生逆產死胎不下血崩不止臨月服之則縮胎易產產後服之則惡血自下川芎當歸各五錢右剉作一貼水煎服日二三○又治半產去血多產後去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多及一切去血過多眩暈悶絕不省人事者連進數服即甦(得效)○當歸六錢川芎四錢名佛手散(方見上)

保安丸

治產前產後諸疾生乾地黃剉為末馬鳴退炙(即蠶退紙)各一兩赤茯苓牡丹皮白芍藥各七錢半川芎細辛人參肉桂當歸牛膝白芷木香薰木麻黃澤蘭葉附子炮甘草炙寒水石煨防風

芎歸湯

治產前產後諸疾及血暈不省橫生逆產死胎不下血崩不止臨月服之則縮胎易產產後服之則惡血自下川芎當歸各五錢右剉作一貼水煎服日二三○又治半產去血多產後去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多及一切去血過多眩暈悶絕不省人事者連進數服即甦(得效)○當歸六錢川芎四錢名佛手散(方見上)

保安丸

治產前產後諸疾生乾地黃剉為末馬鳴退炙(即蠶退紙)各一兩赤茯苓牡丹皮白芍藥各七錢半川芎細辛人參肉桂當歸牛膝白芷木香薰木麻黃澤蘭葉附子炮甘草炙寒水石煨防風

芎歸湯

治產前產後諸疾及血暈不省橫生逆產死胎不下血崩不止臨月服之則縮胎易產產後服之則惡血自下川芎當歸各五錢右剉作一貼水煎服日二三○又治半產去血多產後去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多及一切去血過多眩暈悶絕不省人事者連進數服即甦(得效)○當歸六錢川芎四錢名佛手散(方見上)



桔梗蟬退各五錢石菖菟沉香各二錢半
右為末蜜丸彈子大酒下一丸(御院)

當歸芍藥散 治妊娠心腹痛及泄痢產前產後通用白芍藥二錢半川芎澤瀉各一錢半當歸
赤茯苓白朮各七分半右剉作一貼水煎服或為細末溫酒調下二錢(局方)

益母丸 一名濟陰丹治產前產後一切諸病及難產橫逆能行血養血安胎
順氣又能活血行氣有補陰之妙故命名益母(方見上)○丹心

益母膏 一名返魂丹通治妊娠諸病及催生神效又治橫生逆產及死胎不出胞衣不下益母草
午日不犯針器採取洗淨搗取汁銀石器熬成膏石每取一大匙溫酒或白湯化下(丹心)

斷產 婦人產有艱難或一歲一產可以此小間之四物湯加芸苔子一撮煎於經行後空心服(丹心)
有宿疾終不可保胎者牛膝四分瞿麥桂心蟹爪各二分為末空心溫酒調服以下之免害其母(丹心)

門)○妊婦因疾病胎不能安可下之法麴四兩水二大盞煎取一盞去滓分三服即下(良方)○
方麥芽神麴各半升和水煮服之即下神效(良方)○又方附子二枚為末醋調塗母右足去之大(良方)

(良方)○斷子法用白麴麴一升好酒五升打作糊煮至二升半以絹濾去渣作三服候月經將來日
晚下吃一服次日五更吃一服天明吃一服月經即行終身絕子(丹心)○又方故蠶紙方圓一尺燒

存性為末酒飲調服終身不復懷孕(良方)○又方油
煎水銀空心服如棗核大一丸水斷不損人(良方)

寡婦師尼之病異乎妻妾 宋褚登療師尼寡婦別製方蓋有謂也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂
是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞史公倉公傳載濟北王侍人韓女

病腰痛背寒熱衆醫多以為寒熱倉公曰病得之欲男子不可得也何以知之診得其脈肝脈弦出寸
口是以知之蓋男子以精為主婦人以血為主男子精盛以思室婦人血盛以懷胎如厥陰脈弦出寸

口又上魚際則陰盛可知故知褚氏之言有謂矣(寶鑒)○寡婦師尼鬱抑成病其證惡風體倦乍寒
乍熱面赤心煩或時自汗肝脈弦長而出寸口宜柴胡抑肝湯芙蓉散抑陰地黃丸越鞠丸(方見諸

聚)○每日上午神思昏憤怕見明處惡聞人聲至午後方可頭昏腹痛驚惕稍涉勞動與月經來時
其證尤劇此不得遂志之故也宜清神養榮以四物湯加人參茯神陳皮柴胡羌活香附子甘草煎服

○或有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣服
遲伏或如雀啄顏色不變者宜茯神黃芪湯(入門)

柴胡抑肝散 治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂以致寒熱類瘧柴胡二錢青皮一錢半赤芍藥牡丹皮
各一錢地骨皮香附子梔子蒼朮各七分川芎神麴炒各五分生地黃連翹各三分甘草二

分右剉作一貼
水煎服(入門)

芙蓉散 治男無室女無夫思慾動火以致胸痛自汗頰赤服亂用芙蓉葉有
花帶花有子帶子採一朵搗爛和井水濾去渣服之即效(入門)

抑陰地黃丸 治寡婦勞證生乾地黃二兩赤芍藥一兩柴胡黃芩秦艸
各五錢右為末蜜丸梧子大烏梅湯下三五十丸(入門)

茯神黃芪湯 茯神菴活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菴
蒲黃芩各一錢甘草五分右剉作一帖水煎服(入門)

藏燥證 婦人藏燥悲傷欲哭象如神靈所燒存性未飲調服(入門)
之(仰景)○有自哭自笑者紅棗燒存性未飲調服(入門)

甘麥大棗湯 甘草一兩小麥三合大棗七枚右剉作一貼水
二升煎至一升溫服產前產後皆可用(仲景)

治驗 鄉里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有祟祈禳
請禱皆不應予急治甘麥大棗湯服三貼而愈(本事)

臨產預備藥物 芎歸湯○四物湯○催生丹○香桂散○紫蘇飲○花蕊石散○失笑散○奪命散○三
散○益母丸○返魂丹○如神散○涼血地黃湯○黑龍丹○霹靂丹○催生如聖散○桑

角地黃湯○如聖膏○生蔥○生薑○草麻子○海馬○石燕子○猪脂○香油○益母草○白
阿膠○雞卵○清酒○米醋○竹瀝○紅花○荆芥○蒲黃○陳艾○生地黃○滑石○麝香○朱砂

○皂莢
鱗鼠皮

婦人雜病 婦人者陰血之所集常與溼居十五以上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿容月水去留前
後交牙瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論所以婦人別立方者以其氣血不調胎產生

崩傷之異故也婦人之病與男子十倍難療以其嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以疾妬憂志慈戀
愛憎深著堅牢情不自抑所以為病根深也(聖惠)○七癩八癢九種心痛十二帶下共三十六病雖

有名數莫詳證杖推原其理無非血病(得效)○婦人氣盛於血所以無子且變生諸證頭暈膈滿宜
抑氣散異香四神散(入門)○婦人虛勞宜用滋陰百補丸人參荊芥散逍遙散加味逍遙散滋血湯

滋陰地黃丸茯神湯三合湯○身有血線宜橘桂丸○百病通治宜神仙聚寶丹濟陰丹(方見上)益
母丸益母膏(方並見上)○茯苓補心湯治虛勞熱嗽無汗(方見血門)滋陰至寶湯治虛勞熱嗽有

汗(回春)

抑氣散 香附子四兩陳皮二兩茯神甘草各一
兩右為末每二錢沸湯點服(入門)

異香四神散 香附子四錢陳皮三錢烏藥二錢甘草一錢右
剉作一貼水煎服(濟陰)

滋陰百補丸 治氣血不足乍寒乍熱不思飲食羸瘦無力四製香附末八兩(四製法詳見胞門)益母草
末四兩當歸三兩川芎熟地黃白朮各二兩白芍藥一兩半白茯苓人參玄胡索各一兩甘



北京中醫藥大學圖書館藏

草五錢右為末蜜丸梧子大或酒或醋湯或白湯下五七十丸(入門)

人參荊芥湯

治血風體痛寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿或月水不調臍腹痛疔痛瘰癧成塊人參關公使乾地黃柴胡鱉甲酸棗仁炒枳殼羚羊角白朮各七分半桂心川芎當歸防風桂丹皮各

藥甘草各五分右對作一貼入薑三片煎服(入門)

逍遙散

治月經不調及血虛五心煩熱寒熱如瘧白朮芍藥白茯苓柴胡當歸麥門冬各一錢甘草薄荷各五分右對作一貼入薑三片水煎服(入門)

加味道遙散

治血虛煩熱潮熱盜汗痰嗽似勞白芍藥白朮各一錢二分知母地骨皮當歸各一錢白茯苓麥門冬生地黃各八分梔子黃柏各五分桔梗甘草各三分右對作一貼水煎服(入門)

滋血湯

治婦人心肺俱損血脈虛弱皮聚皮落或月水愆期當歸芍藥山藥黃芪熟地黃各一錢半人參川芎白茯苓各七分半右對作一貼水煎空心服(丹心)

滋陰地黃散

治虛勞吐血咳嗽唾白發熱痰嗽盜汗心喘或經水不調不通熱地黃薑汁浸焙四兩山藥更白茯苓牡丹皮澤瀉各一兩半右為末蜜丸梧子大空心鹽湯吞下百丸(醫鑿)

丸梧子大空心鹽湯吞下百丸(醫鑿)

茯神湯

治婦人風虛勞與鬼交○有所見言語譫亂白茯神一錢半白茯苓人參石菖蒲各一錢赤芍藥五分右對作一貼水煎空心服(醫鑿)

三合湯

治婦人虛勞針灸不效者白朮當歸芍藥黃芪白茯苓熟地黃川芎各一錢柴胡人參各七分半黃芩半夏甘草各五分半右對作一貼入薑三棗二水煎服(保命)○即八物湯合小柴胡湯三方合劑也一名

三方合劑也一名三分散(入門)

橘歸丸

治婦人肌膚手足俱有血線路比怒氣傷肝血常失經故也橘紅四兩當歸二兩右為末蜜丸梧子大溫酒下五七十丸(入門)

神仙聚寶丹

治經候不調及血氣攻注腹痛積聚成塊及婦人諸疾琥珀當歸各一兩沒藥乳香各二錢半辰砂木香麝香各一錢右為末滴水為丸每兩作十五丸每一丸溫酒磨下(局方)

滋陰至寶湯

治婦人諸虛百損五勞七傷經脈不調寒熱羸瘦當歸白朮各一錢白茯苓陳皮知母貝母便香附地骨皮麥門冬白芍藥酒炒各八分柴胡薄荷甘草各五分右對作一貼薑三水煎


服(醫鑿)

安產室

妊娠八月便寫產圖一本貼掛產母房內北壁上隨月換圖不用入節之日只於朔日貼之(良方)○又貼催生符借地法



安產方位圖



產圖及催生符借地法並
以朱書於產母房內北壁
上先貼產圖次貼催生符
次貼借地法讀呪借地法
三遍而止



安產藏胎衣方 凡月德安產室
月空藏衣為準

凡逐月安產藏胎衣並向月德月空方位所有十三神殺並須避忌若交得次月即換次月產圖有人
從入節日作產圖者非也假如正月十四日立春若姪婦十三日臥乳豈可作去年十二月用也必依
每月朔日用之乃是若依節氣更換則天德月德所在差矣○凡產訖藥沃污穢不淨之水並隨藏衣
之方所向不拘遠近棄之切忌閉肚方(良方)○如正月月德在丙可安產室月空在壬可藏胎衣餘
做此
良方)

床房一
局方)

日遊胎殺所在 甲己日在門○乙庚日在碓磨礮○丙辛日在井竈○丁壬日在廚解○戊癸日在巷○
子丑日在中堂○寅卯辰酉日在竈○巳午日在門○未申日在籬下○戌亥日在房○

胎殺所在不宜修整鄰家興動孕婦當避縱不墮胎
令兒破形色青體學竅塞或至夭殞可不戒之(局方)

房中日遊神所在 房內東○六戌六己日在房中○庚子辛丑寅日在房內西○甲辰乙巳丙午丁未日在
房內東○六戌六己日在房中○庚子辛丑寅日在房內西○甲辰乙巳丙午丁未日在房內南○凡遊神所在忌安床

帳致重物於床中必
主傷產墮胎(局方)

推婦人行年法 逐一排行年吉凶于後按石
件七神詳斷吉凶(局方)

宜 宜 生 禍 絕 閉 八 反 懸
臥 著 氣 害 命 壯 在 支 尸
方 衣 方 方 方 方 方 月 方
坤 離 兌 巽 甲 乙 丙 丁 戊

十三歲 庚申 西南黃衣 坤 離 巽 辛 甲 正七月辰

十四歲 己未 正南赤衣 離 坤 兌 壬 癸 正八月卯

十五歲 戊午 正北黑衣 坎 乾 艮 癸 壬 正九月寅

十六歲 丁巳 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 正十月丑

十七歲 丙辰 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 正十一月子

十八歲 乙卯 西北黑衣 乾 坎 震 丙 丁 正十二月亥

十九歲 甲寅 正西白衣 兌 巽 離 丁 丙 正七月辰

二十歲 癸丑 東南黃衣 巽 兌 坤 戊 乙 正八月卯



二十一歲 壬子 西南黃衣 坤 離 巽 辛 甲 三十九 寅 申

二十二歲 辛丑 正南赤衣 離 坤 兌 壬 癸 四十九 丑 申

二十三歲 庚寅 正北黑衣 坎 乾 艮 癸 壬 五十九 寅 申

二十四歲 己卯 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 六十九 卯 申

二十五歲 戊辰 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 七十九 辰 申

二十六歲 丁巳 西北白衣 乾 坎 震 丙 庚 八十九 巳 申

二十七歲 丙午 正西白衣 兌 巽 離 丁 丙 九十九 午 申

二十八歲 乙未 東南青衣 巽 兌 坤 庚 甲 十 未 申

二十九歲 甲辰 西南黃衣 坤 離 兌 辛 乙 十一 辰 亥

三十歲 癸卯 正南赤衣 離 坤 兌 壬 癸 十二 卯 亥

三十一歲 壬寅 正北黑衣 坎 乾 艮 癸 壬 十三 寅 亥

三十二歲 辛丑 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 十四 丑 酉

三十三歲 庚子 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 十五 子 申

三十四歲 己亥 西北白衣 乾 坎 震 丙 庚 十六 亥 申

三十五歲 戊戌 正西白衣 兌 巽 離 丁 丙 十七 戌 午

三十六歲 丁酉 東南黃衣 巽 兌 坤 庚 甲 十八 酉 午



三十七歲 丙申 西南黃衣 坤 離 巽 辛 甲 正 七 辰

三十八歲 乙未 正南赤衣 離 坤 兌 癸 癸 二 八 卯

三十九歲 甲午 正北黑衣 坎 乾 艮 癸 壬 三 九 寅

四十歲 癸巳 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 四 十 丑

四十一歲 壬辰 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 五 十 子

四十二歲 辛卯 西北黃衣 乾 震 坎 丙 丁 六 十 亥

四十三歲 庚寅 正西白衣 兌 巽 離 丁 丙 正 七 辰

四十四歲 己丑 東南黃衣 巽 兌 坤 庚 乙 二 八 卯

四十五歲 戊子 西南黃衣 坤 離 巽 辛 甲 三 九 寅

四十六歲 丁亥 正南赤衣 離 坤 兌 癸 癸 四 十 丑

四十七歲 丙戌 正北黑衣 坎 乾 艮 壬 壬 五 十 子

四十八歲 乙酉 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 六 十 亥

四十九歲 甲申 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 正 七 辰

一生氣方 產婦宜向之坐臥及床帳 向之開門大吉(局方)

二反支月 遇此月即鋪灰用牛皮或馬驢皮 訖鋪草勿令惡血污地吉(局方)

三禍害月 不得於其上產又不得向之 大小便避之大吉(局方)



四絕命方

不得於其上產又不得向之
大小便避之大吉(局方)

五懸尸方

過此日產不得攀繩宜懸
臨月及滿月並不得向之大小便

六閉肚方

及棄不淨之水謹之吉(局方)

七八症方

產帳不得向之開門
忌之大吉(局方)

小兒初生救急

凡十條

小兒

初生氣欲絕不能啼必是難產或冒寒所致急以綿絮包置懷中勿斷臍帶且將胞衣置櫃中燒
之仍作大紙撒煎油點火於臍帶下熏之令火氣入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須令氣回啼哭如常

方可斷臍
帶(三因)

小兒

陳皮板柳甘草炙各五分右剉水煎取汁以綿蘸入兒口中(入門)

小兒

初生有即死者急看兒口中懸雍前脣上有泡如石榴子以指
搗破出血以帛拭去髮灰粉之若惡血入口中即死(入門)

小兒

初生忽患撮口不飲乳名曰馬牙不治則百無一生便看兒齒齦上有小泡子如粟米狀急以針挑
出血用墨磨薄荷汁斷母髮少許裹手指蘸墨遍口內擦之勿飲乳一時許即差(入門) 俗呼此
泡為齒囊以針或指爪搔

破點生蜜亦效(俗方)

小兒

初生殺道無孔不得大便急用金玉簪尖看其的處刺穿作孔以
蘇合香凡少許作銀納孔中或以油紙糊住不令再合(俗方)

小兒

初生不飲乳不小便大蔥白一寸四破之
以乳汁煎銀石器灌入口中立效(得效)

小兒

初生嘔吐不能飲乳乃穢惡入口用黃連枳殼赤茯苓等分為末蜜丸
梧子大乳汁調一丸灌入口中又木瓜生薑煎湯灌口中亦效(入門)

小兒

初生大小便不通腹脹氣欲絕急令婦人以溫水漱口了嘔吐兒前後心並臍下手足心共七處每
一處凡啞三五次漱口更嘔取紅赤色為度須臾自通不爾則死(三因) 〇又蔥白汁乳汁各半調
勻抹兒口中與乳

吮下即愈(回春)



小兒

初生小便不通急用生地龍數條蜜少許同研勻敷陰莖上內用蠶退紙燒灰入末砂龍腦麝香各少許麥門冬燈心煎湯調灌口中即通(入門)

小兒

初生大便不通先以硬蔥夫紐入肛門內如不下用朱砂丸米砂水飛南星胞巴豆霜各等分右為末糊丸黍米大薄荷煎湯灌下一丸即通(田方)

小兒

初生撮口不乳飲取牛黃二分半調竹瀝灌入口中妙○又方赤足蜈蚣除去頭足炙焦研如粉每五分以豬乳調之搗口急以亂髮纏指頭蘸薄荷汁或并華水塗之(得效)

小兒

初生口內白屑滿舌上不能吹乳謂之鵝口急以亂髮纏指頭蘸薄荷汁或并華水塗之(得效)雄黃三錢鵬砂二錢甘草一錢龍腦二分半為末蜜水調塗或乾糝之效(湯氏)○又方

小兒

初生遍身無皮但是紅肉以白早米粉撲之候生皮乃止(入門)

小兒

初生遍身如魚泡如水晶碎則水流以蜜調成膏貼顛門上(入門)

小兒

初生鼻塞不通乳不得下取猪牙皂角草烏各等分右為末葱涎汁調塗臍腹上仍以蚊床子燒烟微熏之妙(入門)

小兒

初生發驚乃胎驚也末砂雄黃各等分右為末取火許豬乳汁調抹口中即效入麝香少許尤妙(丹心)

小兒

初生遍體發丹毒赤腫遊走若入腹入腎則必死名曰赤遊乃胎毒也宜以細針或砂針隨赤暈周匝刺出惡血最妙仍以芭蕉汁齊蟻汁塗之○又赤小豆末和雞子白塗之○又地龍糞二分煨硝

小兒

一分冷水調和塗之○又溝渠中小蝦搗爛付之(本草)

單方

凡五十種

朱砂

治產後敗血入心如見鬼祟朱砂一二錢乳汁三四匙調和納活地龍一條子藥衰轉取去地龍入好酒與乳汁和合七分蓋重湯溫分二三服神效(良方)

大斧

治產後血癥痛取斧燒赤淬酒中取酒飲如鐵杵或秤錘皆可燒赤淬酒飲之(本草)

甚妙

難產三日不下伏龍肝細末一錢酒調服(丹心)

朴硝

治死胎不下朴硝細研半兩童便調服即效煨硝亦可(丹心)

伏龍肝

治橫逆產及子死腹中不出其母氣欲絕取伏龍肝一二錢以水調下其兒當頭戴土出



石燕子

主難產孕婦臨產兩手各把一枚立驗(本草)

羌蔚

即益母草也主產前產後百病能行血養血採取莖葉搗取汁於銀石器熬成膏和酒服之最治難產及死胎胞衣不下或搗取汁一小盞和酒一合溫服(本草)○天行不息所以生生而不窮也

子活血行氣有補陰之功命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛(丹心)

當歸

治婦人百病又治產後腹痛當歸末三錢水煎服名獨聖湯(良方)○血刺痛用當歸乃和血之藥若血積刺痛宜用桃仁紅花當歸頭(丹心)

芍藥

主婦人諸疾並產前後諸病又治血虛腹痛酒水煎服(本草)

兩以酒煮服醋煮亦良(本草)

熱之藥可養胎殊不知產前宜清熱養血令血循經而不妄行故能養胎也必取細挺沈實者用之芩朮丸是也(丹心)

紅花

主產後血暈口禁悶絕紅花一兩酒二盞煎至一盞分二服立效(十三方)

當歸一兩右為末每二錢童便或熱酒調下(得效)

蘇木

治產後血暈及惡露不下痛悶欲死蘇木一兩剉酒水煎服(本草)

鯉魚鱗

治產後血痲痛取鱗燒灰研酒服一錢能破滯血(本草)

痛小產下血過多而心痛者亦然取墨炒為末醋湯調下(良方)

蛇蛻

治產不順手足先見者蛇蛻一條全者燒灰入麝香一字面東酒服一錢更以餘滓塗兒手足即順生(本草)

藕汁

主產後煩悶及血上衝心痛生藕汁飲二升凡產後忌生冷惟藕不忘者為其能破血故也(本草)

柑子皮

主產後浮腫酒煎服之當公云產後肌浮柑皮酒服是也(本草)

桃仁

主婦人產後百病又治暑月產乳取涼大多成腹中積聚桃仁一千二百枚去皮尖雙仁蒸搗細末以清酒一斗半研如麥粥入磁缸中密封口重湯煮一伏時取出溫酒和服一匙日再名曰桃仁煎

生地黃

治妊娠胎漏血不止胞乾即死取生地黃汁一升酒五合煮三五沸服二三次(本草)

蒲黃 治產後出血太多發渴真蒲黃一錢白湯調下如渴甚井水調下(本草)

艾葉 使婦人有胎又能安胎止腹痛白朮湯生艾汁服之又治胎動不安或腰痛下血不止艾葉湯

黃芩 產前安胎黃芩白朮妙藥也○黃芩安胎者降火下行也○條芩安胎聖藥也俗人妄

玄胡索

主產後血暈及惡血衝心或兒枕痛欲絕為末酒服一錢立止○又玄胡索桂心各半兩或煎服或為末服並佳(本草)

桑寄生

治胎漏不止能安胎令胎牢固或煎服或為末服並佳(本草)

桑螵蛸

主妊婦小便數不禁石為末每二錢空心未飲調下(得效)

烏賊魚肉

主絕嗣無子久食令人有子○此魚腹中有墨主婦人血崩心痛甚者名曰殺血心

淡菜

主產後血結腹痛或因產瘦瘠血氣積聚可煮久食之(本草)

蒲萄根

治孕婦子上衝心取根濃煮汁飲之即下而其胎亦安(本草)

上

上海交經山房石印

(千金) 〇產後陰腫痛桃仁細研塗之又和五倍子枯白礬為末研桃仁為膏塗之(正傳)

大麻根 催生令易產麻根以下亦妙(本草)

神麩 落胎服下鬼胎取末二錢和水服又濃煎取汁服(本草)

醋 治孕婦胎死不出醋三升煮黑豆一升取汁服二升兒立出(本草)

葱白 治胎動不安或胎上搶心煩悶葱白大者二十莖濃煮汁飲之胎未死即安已死即出神效(本草)

馬齒莧 主產後血痢腹痛搗取汁三合煎一沸下蜜一合攪服之(本草)

雞子 主產後血暈風痙身強直口目喎斜雞子三個取清調荜末二錢調下(本草)

鹿角膠 能安胎止痛炒成珠作末以米飲調下二錢(本草)

鹿角 主死胎不出鹿角細屑一兩水一盞煮白五莖豆豉半合同煎服立出(本草)

貓頭骨 治難產催生甚驗貓頭骨免頭骨各一個火煨研為末每二錢芍歸湯煎水調下即產狸頭骨尤妙(正傳)

羊腎 主產後虛羸瘦弱無力羊腎一雙炮熟細切和五味作羹或作粥食良(本草)

蜜等分以猪肝煮水調服即效(入門)

榆白皮 療胎死腹中或母病欲去胎榆白皮煮汁服二升即下(本草)

甘竹根 治胎動不安甘竹根煮汁服之(本草)

瞿麥 破胎墮子。治產難經日不出或子死腹中母欲死用瞿麥煮取濃汁服之(見本草)

水銀 治胎死腹中不出其母氣絕取水銀二兩吞之立出(本草)

胡麻油 胡麻即黑荏子也主胞衣不下注搗榨取油飲之即下(本草)

黑豆 孕婦月數未足子死腹中母欲悶絕服之即下(本草)

大麥蘗 能催生落胎取蘗一兩水煎服即下(本草)

冬葵子 主難產取子一合搗碎水煮服即下(本草)

鱉羹 主產後有血塊腹痛搗取汁和童便尿溫服惡血盡下(本草)

阿膠 治難產困乏明膠二兩好酒一升半微火令溶入生雞子一枚鹽一錢攪勻溫頓服便產(良方)

兔頭骨 主催生落胎並產後惡血不下兔頭骨和毛髓燒為灰作末酒下一錢妙(本草)

猪腎 治產後勞骨節痛汗不止猪腎細切望稀腫和五味入米煮作粥食之(本草)

麝香 療產難又催生墮胎令產易取麝香一錢水調下(本草)

芒根 治妊婦胎動欲墮腹痛不可忍芒根二兩對銀石器酒水相半煎服妙(時後)

車前子 治難產及橫逆產不得出炒為末酒服二三錢(本草)

大黃 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中成塊大黃一兩為末醋半升同熬成膏丸如梧子大以溫



醋化五丸服之良久

血下即愈(本草)

桂心 治產後血痕痛悶欲絕桂心為末狗胆

汁和丸櫻桃大熱酒磨下二丸(本草)

針灸法

男子無嗣者以鹽填臍艾炷灸之連日灸至二三百壯必效(綱目)○婦人絕嗣灸關元三十壯

二寸子戶一名氣門(得效)○灸子宮三七壯或針入二寸穴在中極傍左右各開三寸(綱目)○

子取陰交石門關元中極涌泉築寶商丘陰廉(甲乙)○催生難產及下死胎取大衝(綱目)○

氣即瀉立甦如子狗母心生下兒手心有針痕子頂母心兒人中有針痕向後則枕骨有針痕其

也神效(綱目)○一婦人產後暴卒其母為灸會陰三陰交合數壯而甦其母蓋名醫也(綱目)○

橫生逆產諸藥不效急於產母右腳小指尖頭上灸三壯即產亦治胞衣不下醫鑑云即(綱目)○

效)○胞衣不下取三陰交中極照海內關崑崙(綱目)○產後血暈取三里三陰交陰交神門(綱目)○

(綱目)○產後陰下脫灸臍下橫紋二七壯又取照海(良方)○婦人無子或產後久不再孕取神門

一條長同身寸之四寸令婦人仰臥舒手足以所量秤心自臍心直垂下盡頭處以墨點記後以此

心平摺橫安前點處兩頭盡處是穴按之自有動脈應手各灸三七壯神驗即上所云胞門子戶也

(鑿)

鑿)

鑿)

鑿)

東醫寶鑑雜病篇卷十終

上海校經山房石印

上海醫藥大學圖書館藏