

頭痛

心腹諸痛


腰痛

疝氣

淋瘕

小便閉瘕

醫宗必讀



頭痛

經曰風氣循風府而上則為腦風新沐中風則為首風首風之

狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其

風日則病少愈風府者督脉穴入項髮際一寸太陽之脉連于

沐則腠開風客乃為首風風傷衛則汗出而惡風風為陽邪故

先風一日則病發先甚者亦先衰故至其風日則病少愈也

頭痛數歲不已當犯大寒內至骨髓髓以腦為主腦逆故頭痛  
齒亦痛名曰厥逆髓以腦為主者諸髓皆屬于腦也大寒入髓  
則腦痛其邪深故數歲不已髓為骨之充齒

雲間李中梓士材父著

門人李玄度公超父叅

姪孫李廷芳蘅伯父訂

頭痛

者骨之餘也故頭痛齒亦頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨  
痛是邪逆于上故各厥逆  
陽頭痛巨陽病也太陽之脈交巔上其支別者從巔至耳上角  
其直行者從巔入絡腦下虛少陰腎虛也土實巨陽膀胱實  
也腎虛不能攝巨陽之氣頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生者  
故虛邪上行而為頭痛也  
腎之外候腎氣虛故耳鳴也九竅不利者氣虛不能達也腸胃  
者七衝門之道路氣之所以往來者也氣虛則不能止升于巔  
頂故頭痛甚則腦盡痛手足寒至節死不治  
三陽受邪伏而不  
去久則陽氣敗絕

故手足之寒  
上至于節也

愚按經之論頭痛風也寒也虛也運氣論頭痛十條傷寒論太  
陽頭痛一條皆六氣相侵與氣氣相薄經氣逆上于于清道不  
得運行壅遏而痛也頭為天象六府清陽之氣五藏精華之血  
皆會于此故天氣六淫之邪人氣五賊之變皆能相害或蔽覆

雖不相薄成熟然邪客于脉外則血泣脉寒卷縮緊急外引小  
絡而痛得溫則痛止此虛痛也因風痛者抽掣惡風因熱痛者  
煩心惡熱因濕痛者頭重而天陰轉盛因痰痛者昏重而欲吐  
不休因寒痛者絀急而惡寒戰慄氣虛痛者惡勞動其脉大血  
虛痛者善驚惕其脉芤頭痛自有多因而古方每用風藥何也  
高巖之上惟風可到味之薄者陰中之陽自地升天者也在風  
寒濕者固爲正用卽虛與熱者亦假引經須知新而暴者但名  
頭痛深而久者名爲頭風頭風必害眼者經所謂東風生于春  
病在肝目者肝之竅肝風動則邪害空竅也察內外之因分虛  
寔之證胸中洞然則手到病去矣

風溼挾熱頭痛上壅損目及腦痛偏正頭痛年深不愈並以清

之痛甚加細辛痰厥頭痛太陰脉緩清空膏去羌活防風加半夏天麻陽明頭痛發熱

而渴加白芷腎厥頭痛即經所謂下虛上實其脉舉之則弦按

之則堅玉真丸來復丹傷食頭痛胸滿噦酸噫敗卵臭惡食雖發熱而

身不痛香砂想木丸傷酒頭痛葛花解醒湯怒氣傷肝沉香降氣散蘇子降氣湯頭痛

九竅不利屬氣虛補中益氣湯加芍藥川芎細辛眉尖後近髮際曰魚尾魚尾

上攻頭痛屬血虛四物湯加薄荷動作頭痛胃熱也酒炒大黃五心煩

頭痛清空膏加麥門冬丹麥上熱頭痛目赤下與足大便微秘既濟解毒湯

偏頭風半邊患虛右屬氣熱 草薢子五錢去殼大棗十

五枚去核其搗研如泥塗綿紙上用筋一隻捲之去筋納鼻中

雷頭風

頭痛而起核塊或頭中如雷鳴

震為雷君仰盂用青荷葉者象震之形

與色也

清震易

有因痰火耳如雷鳴

熟牛膝一兩大黃煨二兩天麻黃芩各六錢薄荷葉三錢

甘草三錢水泛棗豆大臨

臥茶吞二錢取利為度

真頭腫

手足青至節且發

腦為髓海受邪則死灸百會穴猛進

大刺參

大頭痛

頭大如斗此感天地非時之氣甚而潰裂出膿此邪客天行時疫也

上焦

上焦

普濟消毒飲子

輕者名發頤腫在兩耳前後

甘桔湯加薄荷荆芥鼠粘子連翹黃芩

眉稜骨痛外挾風寒內成鬱熱上攻頭腦下注目睛眉骨作痛

有屬心肝壅熱者有風痰上攻者有濕氣內鬱者

選奇湯戴元

禮云眼眶痛者二證俱屬肝經肝虛見光則痛

生熟地黃丸肝經停

飲痛不可開畫靜夜劇導痰

脈候寸口緊急或短或弦或浮皆頭痛 浮滑為風痰易治

短澁為虛難治 浮弦為風 浮洪為火 細或緩為濕

少宰蔣恬蒼頭痛如破昏重不寧風藥血藥攻藥久治無功余

田尺微寸滑腎虛水泛為痰也地黃四錢山藥丹皮澤瀉各一

錢茯苓三錢沉香八分日服四貼兩日輒減六七更以七味丸

人參湯送五日其痛若失

清空膏 用溪白東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連者勿用太陽厥陰巔頂痛宜來復丹等亦非此

藥所 能治

羌活

防風 各一兩

柴胡 七錢

川芎 五錢

甘草 炙一兩

白虎湯見中

安神散 治鬱熱頭痛

黃耆 羌活

生地黄酒潤 柴胡

每服五錢水二鍾煎范鍾半加葛荆子五分川芎三分煎至一鍾臨臥熱服

透頂散 治新久偏正頭風及夾腦風

細辛表白者 瓜蒂七個 丁香三粒 糯米七粒 水片

麝香各一分半 荆水麝研極細將前味研勻另自治為末然後

入乳鉢內與水麝和勻磁瓶密固用一大豆許隨患人左右

搗之良久出涎碗許則安

頭痛

四



大川芎丸 治風寒痰飲偏正頭疼

川芎 二兩 天麻 四兩 爲末密丸每丸一錢 每服一丸食後茶酒下

玉壺丸 治風痰吐逆頭痛目眩胸滿吐涎

南星 生 半夏 生各一兩 天麻 牛兩 白麩 三兩

爲末水丸桐子大每服三十丸用水一碗先煎沸下藥煮候

藥浮卽熟漉起生薑湯下

玉真丸 腎虛逆上頭痛謂之腎厥

硫黃 二兩 石膏 煨亦 半夏 湯洗 硝石 研各一兩

爲末生薑汁丸桐子大陰乾每服二十九薑湯下炙關元百

壯寒甚者去石膏用鍾乳粉

沉香 二錢 八分

砂仁 七錢 五分

甘草 炙五錢 五分

香附 鹽水炒去毛 六兩二錢半

為極細末每服三錢淡薑湯下

蘇子降氣湯

虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛

蘇子 炒研

半夏

湯泡各二錢半

前胡

去蘆

甘草

炙

厚朴

薑製

陳皮 去白各一錢

當歸

去蘆一錢半

沉香

七分

水二鍾生薑三片煎一鍾服

虛寒者加桂五分黃者一錢

既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛煩悶不得安臥下體寒足熱尤甚大便微秘

大黃

便通者勿用

黃連

酒炒

黃芩

酒炒

甘草

炙

桔梗

各二錢

柴胡

升麻

連翹

當歸身

各一錢

水二鍾煎一鍾食後服

頭痛

五

神芎散 治風熱上攻頭痛鼻塞

青黛 二錢五分

蔓荆子

川芎 各一錢二分

鬱金

芒硝 各一錢

石膏 一錢三分

細辛根 一錢

薄荷葉 二錢

紅豆 一匙 為細末搗

茶調散 治風熱上攻頭目昏痛

黃芩 酒浸炒 二兩

川芎 一兩

細茶 三錢

白芷 五錢

薄荷 三錢

荆芥穗 四錢

為細末每服三錢

送下巔頂及腦痛加細辛葉木蔓荆子各三錢

菊花散 治風熱頭痛

甘菊花

去蒂 旋覆花 去梗

防風

枳殼 去一 羌活

蔓荆子

石膏

甘草

炙各一錢五分

水二鍾薑五片煎一鍾服

治偏正頭風鼻流鼻涕服

茯苓

甘草 炙

細辛 各二兩

犀角

梔子 各一兩

阿膠 炒一兩半

麥門冬 去心三兩

為細末 蜜丸彈子大每服二丸食後茶送

清震湯

治頭面眩瘖或聞雷聲

升麻

蒼朮 泔浸各四錢

青荷葉

一個全用

水二鍾煎八分食後服

黑錫丹

治真頭痛

沉香

附子 製

葫蘆巴

肉桂 各五錢

茴香

破故紙

肉豆蔻

金鈴子

木香 各一兩

黑錫

硫黃

與黑錫結砂子各一兩

為末研勻酒煮麪糊九桐子大陰乾

每服五錢空心薑鹽湯送下

一方有陽起石五錢巴戟一兩

普濟消毒飲子

治大頭瘟

脚甚者宜夜刺之

黃芩

黃連各八分

人參五分

橘紅

玄參

甘草

生各四分

連翹

牛旁子

板藍根

馬尾勃各二分

白殭蠶炒

升麻各二分

柴胡

桔梗各五分

薄荷六分

水二鍾煎一鍾服便秘加酒煨大黃一錢

選奇湯 治眉稜骨痛

防風

羌活各三錢

黃芩酒炒一錢

甘草三錢夏生冬炙

每服三錢水煎服

生熟地黃丸

治肝虛頭痛目暗

石斛 枳殼

生地黃

熟地黃各半 甘菊去蒂

杏仁酪四

防風 為木蜜丸 桐子 每服三錢 以黑豆三升炒令烟盡 悴好酒

導痰湯 每用半 鍾食前送下 赤茯苓 去皮 橘紅 各

經曰厥心痛與背相控善嘔如從後觸其心僂僂者腎心痛也  
腹脹胸滿心痛尤甚胃心痛也如以錐針刺其心心痛甚者脾  
心痛也色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也即若徒居心  
痛間動作痛益甚色不變肺心痛也 陽明有餘上歸于心滑

則病心疝心痛引少腹滿上下無定處漫便難者取足厥陰心

痛腹脹嗇然大便不利取足太陰心痛短氣不足以息取手太

陰心痛引背不得息取足少陰

兩章論心痛凡十種皆他藏  
痛于之而痛非本經自痛也

愚按內經之論心痛末有不兼五藏為病者獨詳於心而畧于

胸腹舉一以例其餘也心為君主義不受邪受邪則本經自病

各真心痛必死不治然經有云邪在心則病心痛喜悲時眩仆

此言炮絡受邪在府不在藏也又云手少之脉動則病隘乾  
心痛渴而欲飲此言別絡受邪在絡不在經也其絡與府之受  
邪皆因怵惕思慮傷神滯血是以受如持虛而方論復分九種  
曰飲曰食曰熱曰冷曰氣曰血曰悸曰蟲曰疰苟不能徧識病  
因將何以爲治耶胃屬濕土列處中焦爲水穀之海五藏六府  
十二經脉皆受氣于此壯者邪不能干弱者着而爲病偏熱偏  
寒水停食積皆與真氣相搏而痛肝木爲乘爲賊邪腎寒厥逆  
爲微邪挾他藏而見證當與心痛相同但或滿或脹或嘔吐或  
不能食或吞酸或大便難或瀉利面浮而黃本病與客邪必參  
雜而見也胸痛卽膈痛其與心痛別者心痛在岐骨陷處胸痛

則胸痛引背脇肝實則胸痛不得轉側此又以胸屬肝也夫胸  
中實肺家之分野其言心者以心之脈從心系却上肺也其言  
肝者以肝之脈貫膈上注肺也脇痛舊從肝治不知肝固內舍  
於脇何以異于心肺內舍膈脇哉若謂肝經所過而痛何以異  
于足少陽手心主所過而痛者哉若謂經脈挾邪而痛何以異  
于經筋所過而痛者哉故非審色按脈熟察各經氣變卒不能  
萬舉萬當也且左右肺肝氣血陰陽亦有不可盡拘而臨證者  
可無詳察耶腹痛分爲三部臍以上痛者爲太陰脾當臍而痛  
者爲少陰腎少腹痛者爲厥陰用及衝任大小腸每部各有五  
賊之變七情之發六氣之害五運之邪至紛至博苟按其氣血



傷寒內傷外感而為之調劑無不切中病情矣

心痛有停飲則惡心煩悶時吐黃水甚則搖之作水聲或胃丹

湯食積則飽悶噎氣如敗卵得食輒甚香砂枳木丸火痛忽增

忽減口渴便秘清中湯外受寒內食冷草豆蔻丸虛寒者歸脾湯加氣

墜及刺而痛沉香降氣散死血脈必澀飲下作呃手拍散甚者心痛

而煩發熱動悸此為虛傷妙香散蟲痛面上白瘰唇紅能食或食

後即痛或痛後即能食或口中沫出上半月蟲頭向上易治下

半月蟲頭向下難治先以雞內金汁或蜜糖飲之引蟲頭向上隨

紅烏梅九左無蛇蟲噁心痛有休止或吐蛇蟲蘇合香丸動則惡心嘔吐

鬼疰心痛昏憤妄言蘇合香丸厥心痛金鈴子散寒厥心痛木附子湯

有咳二陳湯加薑汁

胸膈左痛多留血代式常湯右痛多厥氣二陳湯左為肝邪枳芎散

右為肝移邪于肺推氣枳寒理中湯加枳殼死血日輕夜重或午後熱

脉滑或花桃仁承氣湯痰飲導痰湯食積有一條扛起者是

也枳朮丸加吳茱萸肝火盛龍骨虛冷理中湯送肝脉軟補肝湯

驚傷胸膈痛桂枝散

腹痛芍藥甘草湯稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已

化土此伸景妙方也脉緩傷水加桂枝生薑脉洪傷金加黃芩

大棗脉濇傷血加當歸脉弦傷氣加芍藥脉遲傷火加乾薑綿

綿痛而無增減欲得熱手按及喜熱飲食其脉遲者寒也香砂理中

心腹痛

湯冷痛用溫藥不效大便秘者當微利之藿香正氣散加時痛

時止熱手按而不散脉大而數者熱也大金花丸或黃連解毒湯暑痛香薷

飲溼痛小便不利大便溏脉必細緩胃苓痰痛或眩暈或吐冷

涎或下白積或小便不利或得辛辣熱湯則暫止脉必滑輕者

湯加枳殼葶藶汁重者用礞石滾痰丸食積痛甚大便後減其脉或沉滑平胃散

山查麥芽砂仁木酒積痛葛花解醒湯加氣滯必腹脹脉沉

香甚者加大黃順氣死血作痛痛有定在而不移脉滿或芤虛者四物湯料加

散桃仁承氣湯或用丹皮香附穿山甲降香疝痛心腹懊憹往

花蘇木玄胡索當歸尾桃仁如童便韭汁酒來上痛有休止或有塊耕起腹熱善渴面色乍青乍白乍赤

吐清水者蟲也或雜汁吞萬應丸下之乾霍亂一名攪腸沙疝

或板湯吞烏梅丸安之

痛則不通者。有以痛隨利減者。互相傳授。以爲不易之法。不知形實。實便閉不通者。乃爲相宜。或形虛。脈弱。食少。便泄者。豈在濕治。經曰。實實虛虛。損不足而益有餘。如此死者。醫殺之耳。真知痛而張閉者。多實。愛熱者。多虛。飽則甚者。多實。飢則甚者。多虛。脈實氣粗者。多實。脈虛氣少者。多虛。新病年壯者。多實。久病年衰者。多虛。補而不效者。多實。攻而愈劇者。多虛。痛在經者。脈多。甚大。痛在藏者。脈多。沉微。必以望聞問切四者。詳辨則虛實灼然。實者固可通利。虛者安可通利乎。故表虛而痛者。陽不足也。非溫經不可。裏虛而痛者。陰不足也。非養營不可。上虛而痛者。以脾傷也。非補中不可。下虛而痛者。脾腎敗也。非溫補命

門不可亦洗痛無補法則殺人慘于利器矣

脈候弦為痛為食 瀆為痛 短數為痛 大為病久 痛甚

著脈必伏 細小沉遲者生 實大浮長滑數者死 大痛而

喘入中黑者死 寸口脈弦脇下拘急而痛其人惡寒

醫案

給諫章魯齋暑月自京口歸邑心中大痛吳門醫者令服香薷  
飲痛勢轉增余曰寸口弦急痰食交結也服香砂二陳湯兩貼  
痛雖畧減困苦煩悶更以胃苓湯加半夏二錢大黃三錢下黑  
屎數枚痛減三四仍以前湯用大黃四錢下膠痰十數碗始安  
孝廉李長蘅吳門舟次忽發胃脘痛用順氣化食之劑弗效余

縣令章生公在南都應試時八月初五。心口痛甚。至不能飲食。朱診之。寸口濇而軟。與大劑歸脾湯。加入參三錢。官桂一錢。生公云。痛而驟補。實所不敢得。無與場期。碍乎。余曰。第能信而服之。可以無礙。恐反投破氣之藥。其礙也必矣。遂服之。不踰時而痛減。更進一劑。連飲獨參湯兩日而愈。場事獲竣。

海上太學喬憲。嘔鬱。恚之餘。胸腹脹痛。先服消痰疎氣化食之劑。不效。服大黃下之。不效。更以人參補之。又不效。迎余診之。脈弦而數。此內有鬱熱爲寒。涼飲食壅之而痛。用黃連三錢。梔子一錢。五分。橘紅白蔻各二錢。鈎藤木香各八分。官桂二錢。煎成。加薑汁半鍾。二劑。痛止。四劑之後。加乾薑人參而霍然。

大史焦滿園當臍切痛作氣食療之無功余診之曰當臍者少陰腎之部位也况脉沉而弱與氣食有何干涉非徒無益反害真元以八味丸料煎飲不十日而健復如常

京卿胡慕東名少腹作痛連于兩脇服疎肝之劑一月以來日

甚一日余診之左關尺俱沉遲治以理中湯加吳茱萸一劑知十劑起矣

加味七氣湯 治七情鬱結心腹作痛

蓬朮

青皮

香附

醋 各錢半

玄胡索

錢一 薑黃 錢一

草豆蔻 八分

三稜

炮七分

桂心

五分

益智仁

七分

陳皮 八分

藿香 七分

炙甘草 水二鍾煎一鍾食前服

死血

加桃仁紅花

手拈散

治血滯心腹作痛

桃仁承氣湯見傷寒 小胃丹見腫脹 胃苓湯 代抵當湯見泄瀉 行瘀

血如血老而甚者去歸地加蓬木

生地黃 當歸尾 穿山甲各三錢 降香一錢五分 肉桂去皮一錢

桃仁去皮尖炒二錢 大黃去皮三錢 芒硝八分

水二鍾煎一鍾血在上食後服血在下食前服

清中湯 治火痛

黃連 梔子炒各二錢 陳皮 茯苓各一錢半 熟半夏一錢

草豆蔻 甘草炙各七分 水二鍾薑三片煎八分食前服

草豆蔻丸 治客寒犯胃心腹作痛熱者亦可服

草豆蔻一錢半煨 吳茱萸 益智仁 殭蠶炒各八分 當歸身

醫宗公積 卷八 心腹痛 十一



青皮 各六分

神麩

薑黃 各四分

生甘草 三桃仁七個 去皮

熟半夏 錢一

澤瀉 一錢

麥芽 炒一錢半

炙甘草 六分 柴胡 四分

人參

黃耆

陳皮 各八分

為末水丸每服三錢食遠白湯下

大柴胡湯 見傷寒

加味歸脾湯 治心虛悸動而痛

人參

黃耆 炙

白木 炒

當歸

茯苓

酸棗仁 各一錢半

遠志肉 八分

木香

甘草 炙各五分

龍眼肉 二錢

大棗 二枚

煨薑 三片

菖蒲 八分

桂心 五分

水一鍾煎一鍾食後服 亦有加柴胡山梔者

沉香 見頭二易見虛理易見傷少不效 治心氣不足恍惚虛

人參

桔梗

甘草

各五錢

木香

各二錢半

長砂

另研

麝香

一錢 另研

為細末每服三錢或湯或酒調下

金鈴子散

治熱厥心痛或作或止

金鈴子

玄胡索

各二兩

為末每服三錢酒

調下痛止與香砂枳木丸

木附湯

治寒厥心痛脉微氣弱

附子

炮一兩

白朮

炒四兩

甘草

炙一兩

為末每服三錢用水一鍾半薑五片棗一枚煎一鍾食前服

蕪荑散

蟲咬心痛貫心則殺人宜亟服之

蕪荑

雷丸

各五分

乾漆

炒至烟盡一兩

為末每

服三錢酒調服

烏梅丸

見傷寒

剪紅丸

見反胃

蘇合丸

見中風

醫心方

心腹痛

三

補肝湯

山茱萸

甘草

桂心各三兩

桃仁

細辛

栝子仁

茯苓

防風各一兩

大棗二十枝

水九碗煎四碗分三服

柴胡疎肝散

柴胡

陳皮

醋炒各二錢

川芎

芍藥

炒枳殼各一錢半

甘草炙五錢

香附一分五分

水二鍾煎八分食前服

推氣散 治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃

枳殼炒

桂心忌火各五錢

甘草炙二錢

為細末每服三錢薑湯調下

導痰湯 治痰飲壅塞為痛

熟半夏 四兩 天南星 炮去皮

枳實 炒去殼

赤茯苓 去赤皮 各一兩

甘草 炙五錢

每服四錢水一碗薑十片煎八分食遠服

龍薈丸

當歸

草龍膽

梔子

黃連

黃柏

黃芩 各一兩

大黃

蘆薈

青黛 各五錢

木香 二錢五分

麝香 五分

細末蜜丸如棗豆大每服三錢生薑湯下

黑錫丹 見頭痛

葛花解醒湯 見吐瀉

桂枝散 驚氣傷肝脇中疼痛

枳殼 二兩

桂枝 三兩

細末每服二錢薑棗湯調下

卷八

心腹痛

去

芍藥甘草湯一名戊巳湯治腹痛如神

芍藥四錢 甘草二錢 水二杯煎一杯服酸以收之甘以緩之

霍香正氣散方見中風十味香薷飲見類中風

大金花丸加梔子去大黃各黃連解毒湯又名梔子金花丸

黃連黃檗 黃芩 大黃各等分 為末水丸每服白湯下二錢

水香順氣散水香 厚朴 薑製 香附 枳殼 凝炒 砂仁 各一錢 甘草 炙 五 治氣滯腹痛 檳榔 青皮 醋炒 陳皮

水二鍾薑三片煎一杯食前服

萬應丸 取蟲積如神

黑丑取頭末 大黃 檳榔各八兩 雷丸醋煮 木香各一兩

沉香五錢 將黑丑大黃檳榔一處為末以大皂角苦練皮

內經云太陽所至為腰痛

足太陽膀胱之脈所過還出別下項循肩膊內挾脊抵腰中故為病項

按挾脊痛腰似折髀不可以曲是經虛則邪容之痛病生矣邪者風熱溼燥寒皆能為病大抵寒溼多而風熱少也

云腰者腎之府

轉搖不能腎將憊矣此言房室勞傷腎虛腰痛是陽氣虛弱不能運動故也憊猶言敗也

愚按內經言太陽腰痛者外感六氣也言腎經腰痛者內傷房

慾也假令作強伎巧之官謹其閉摯封藏之本則州都之地真

氣布濩雖六氣苛毒弗之能害惟以欲竭其精以耗散其真則

腎藏虛傷膀胱之府安能獨足于是六氣乘虛侵犯太陽故分

別施治有寒有溼有風有熱有淫閉有瘀血有滯氣有痰積皆

標也腎虛其本也標急則從標本重則從本標本不失病無遁

寒感寒而痛其脈必緊腰間如水得熱則減得寒則增五積散去枯梗

加吳茱萸或薑附湯加  
肉桂杜仲外用摩腰膏  
兼寒濕者五積散加  
蒼朮麻黃

溼傷溼如坐水中腎屬水久坐水溼或傷雨露雨水相得以致

腰痛身重脉緩天陰必發滲溼湯  
腎著湯兼風濕者獨活寄  
生湯

風有風脉浮痛無常處牽引兩足五積散加防風全  
蝎或小續命湯杜仲薑汁

炒為末每服一錢酒送治腎氣腰痛兼治風冷或牛膝酒

熱脉洪數發渴便閉甘豆湯加  
續斷天麻

閃挫或跌撲損傷乳香趁痛散及黑神  
和復元通氣散酒調不效必有惡血四物  
湯加

桃仁穿山勞役負重而痛  
十補湯下  
青莪丸

甲大黃瘀血脉濇轉動若錐刀之刺大便黑小便  
或黃或黑宜輕夜重

調榮活絡飲或桃  
仁酒調黑神散

仁酒調黑神散或烏藥順氣散或烏藥順氣散

痰積脉滑二陳湯加南星尿有力者二陳湯加六黃

腎虛腰肢痠弱脚膝酸軟脉或大或細之無力痛亦攸給以臨

隱而不甚分寒熱二候脉細而軟力怯氣小便清利腎丸

鹿茸羊脉大而軟小便黃虛火炎六味丹溪云久腰痛必用

官桂開之方止

五積散見類小續命湯見中

獨活寄生湯治腎虛受風受濕腰腿拘急筋骨攣痛行步艱難

獨活 桑寄生 杜仲炒去

秦艽 茯苓 桂心

人參名一 甘草 當歸 芍藥 地黃各一

腎丸 腰痛 六



水二鍾生薑五片煎八分食前服如無寄生續斷代之

牛膝酒

干膝

川芎

羌活

地骨皮

五加皮

薏苡仁

甘草

海桐皮

生地黄

右為粗末絹袋盛入

好酒二升浸二七日每服一杯日三四杯令酒氣不絕為佳

腎着湯

治腎虛傷濕腰中如帶五干錢腰冷如坐水中不渴小便自利此証名為腎着

乾薑

茯苓

甘

白朮

每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

溲瀝湯

治寒溼所傷身體重差如坐水中小便赤澁大便澀

蒼朮

白朮

草

茯苓

乾薑

商工

各二

各一兩

去皮

各一兩

附子尖

烏頭尖

南星各二錢半

硃砂

雄黃

樟腦

丁香

各一錢半

乾薑

麝香

五分半

為細末密丸龍眼大每用一丸生薑汁化開如厚粥火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡即烘綿衣裏緊腰熱如火間一日用一丸

甘豆湯 治風熱腰痛二便不通

黑豆二合

甘草二錢

水二鍾生薑七片煎服間服

敗毒散

敗毒散 風熱証通用

羌活

獨活

前胡

柴胡

人參

茯苓

甘草炒

枳殼

桔槩

芎藭各等

每服三錢生薑五片煎服

乳香越痛散 治打墜腰痛

虎胥骨

酒炙

敗龜

酒炙各二兩

麒麟竭

赤芍藥

當歸

沒藥

防風

自然銅

煨醋淬研

附子

炮 辣桂

白芷

蒼耳子

炒微

骨碎補

各三兩炒

牛膝

天麻

檳榔

五加皮

羌活

各一兩

為末

每服一錢酒調下加全蝎更妙脚氣通用

黑神散

黑豆

炒去皮半升

熟地黄

酒浸

當歸

酒潤

肉桂

乾薑

炒黑

甘草

炙

芍藥

蒲黃

各四兩

為

細末每服二錢童便半鍾酒少許煎服

復元通氣散

治一切氣滯及閃挫腰痛

大茴香

炒

穿山甲

炒各二兩

玄胡索

白牽牛

炒 橘紅

甘草

炙各一兩

木香

忌火一兩五錢

為細末每服二錢熱酒調下

補骨脂四兩 杜仲薑汁炒

為末胡桃肉三十個研膏入  
蜜少許九柳子大每服四錢酒送

橘核酒 治跌打損傷瘀血作痛

橘核炒去皮 研細末每服二錢酒調下

調榮活絡飲 治失力腰閃或跌撲瘀血

大黃 當歸 牛膝酒洗 杏仁去皮炒 赤芍藥

紅花 羌活 生地酒洗各一錢 川芎一錢五分 桂枝三分

人參順氣散 水鍾半煎八分食前服

白芷 陳皮 枳殼 甘草 麻黃去節 烏藥 水二鍾煎一鍾服

烏藥順氣散

白朮 茯苓 人參 各一兩 甘草 五錢 為末服三錢水一鍾煎七分

二陳湯 見中

無比山藥丸

治腎虛腰痛

赤石脂 煨

扶神 去皮

山茱萸 去核

熟地黄

酒煮 巴戟 去心

牛膝 酒浸

澤瀉 各二

杜仲 薑汁

鬼絲子

酒浸 山藥 各三

北五味 六兩

肉蓯蓉 酒浸

為細末蜜丸 桐子大 每服三錢 酒下

六味丸 八味丸 見虛

補陰丸

龜板 酒炙

黃蘗 酒炒

知母

側柏葉

枸杞子

五味子

杜仲 薑汁

砂仁 各五

甘草 二兩

猪脊髓地黃膏為丸 每服五錢 淡鹽湯下

內經曰任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚任脈起于中

毛際循腹裏上關元總諸陰之會故諸種疝証無不由任脈以上

為之原諸經為之孤耳七疝詳列于後瘕聚者女子之疝也○

從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝既上衝心又不得大小

○肝所生病為狐疝卧則入腹立則出腹入囊似狐之晝出穴

器上抃少腹者乃肝經之部分是受疝之處也一切疝也○三陽

證非肝木受邪即肝木自病此言狐疝乃肝經自病也

為病發寒熱其傳為癰疝三陽者手太陽小腸足太陽膀胱足

肝為夫婦且支脈出氣衝繞毛際故三陽皆能病○黃疝之至

疝也癰者頑痺不仁羣左種大如升如斗者是也

也大而虛積氣在腹中有死氣名曰厥疝黃疝上脈也肝木葉

逆也言厥逆上升也肝部應春於象○脾傳之腎病名疝瘕少

為木皆主上升怒則氣上故為厥疝○脾傳于所勝則脾失運化之

腹寬熱而痛出白理受所不勝之邪傳于所勝則脾失運化之

常入遇寒水之藏則稽留成有形之瘕瘕者

郵方書所云狀如黃少者是也。有氣不得申，曰寤。氣聚而漏，曰精。自出經曰寸口脈沉而弱，痲少復痛。又曰脈急者痲痲少。

痛。○足陽明之筋病，痲痲腹筋急。又曰肝脈滑甚為嘔痲。定陽

明病痲痲，又曰肝滑為嘔痲，則知此證所。脾脈微大為痲氣。

未乘胃也。痲者曩大膿血甚，則下膿血也。滑甚為嘔痲，內則暴膿血，外則小便閉。

愚按內經所謂任脈為病，內結七痲，證之原也。所原也。所謂衝

痲，孤痲，癩痲，厥痲，痲痲，痲痲，痲痲，分言七痲之狀也。巢氏不

能詳考內經原具七痲，乃強分厥癩寒氣盤肘，狼自附於內經

之七痲，不乃妄乎。宜張子和非之曰：此俗工所立謬名，似矣。及

其立論，但辨陰器與小腸膀胱腎子不相干，專屬肝經受病，竟

不知任脈為七痲之原，亦不知經文自有七痲散見于各論之

其立論，但辨陰器與小腸膀胱腎子不相干，專屬肝經受病，竟

內經相矣。耶且執病在下者引而竭之。不問虛實。概與攻下。其禍有不可勝言者。豈待下後始補而可回其生乎。學者但當以內經爲正。不當惑于多岐。毋濇以爲痼証。皆始于淫熱益大勞。則火起于筋。醉飽則火起于胃。房勞則火起于腎。大怒則火起于肝。火鬱之久。淫氣便盛。濁液凝聚。并入血隊。流于厥陰。肝性急速。爲寒所束。且其痛甚。此亦補前人未備之一端。不可守爲揆度也。故夫治寒則多痛。熱則多縱。淫則腫墜。虛者亦腫墜。在血分者不移。在氣分者多動。蓋畢丸有兩左丸屬水。水生肝木。木生心火。三部皆司血。統納左之血者肝也。右丸屬火。火生脾土。土生肺金。三部皆司氣。統納右之氣者肺也。是故諸寒收



引則血泣而歸肝下注于左丸諸氣憤鬱則濕聚而歸肺下注

于右丸且罨丸所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入

絡也故患左丸者痛多腫少患右丸者痛少腫多此確然者耳

衝疝氣上冲心二便不通巢氏狼治法木香散

狐疝卧則入腹立則出腹子和赤仲景治狐疝時上時下者殊

散或用牡蠣六兩鹽泥固濟炭三觔煨至火盡取二兩乾薑一

兩焙為細末二味和勻水調得所塗痛處小便大利即愈

癰疽陰囊腫大如升如斗甚而如栲栳大者三層茵香丸荔枝散宣兜丸地黃膏

子木腎不痛南星半夏黃栢蒼朮枳實山查白芷神效雄梛葉不

子晒乾為末酒糊丸鹽湯下用馬鞭草搗塗效張子和亦

者有癰疝

癥疝脾傳腎少腹熱痛出白即巢氏之癥疝也丹溪所謂內鬱淫

熱者與此疝相似烏頭施子湯或加丹溪云陽明受淫熱傳入

太陽發熱惡寒小腹悶痛施子桃仁枳實山查

癥疝足陽明筋病內有膿血即巢氏之疝疝也宜用甘草茯苓白

木枳殼山查插核荔枝核

癥疝內有膿血小便不道加味通心散或五

巢氏七疝厥咳逆心癥氣乍滿心下寒寒飲食腸氣乍滿乍盤

旁勞疝疝下有積氣引痛大便難

子和七疝寒囊冷硬如石陰莖不舉或連水囊腫陰汗出或筋

陰莖腫脹或潰膿或痛而裏急節縮血滲膠囊結成癰腫膿少

或莖中痛挺縱不收白物隨溲而下

血氣上連腎下及囊或因怒哭  
多則氣脹怒哭罷則氣散  
狐卧則入小腹立則歸囊中  
出八上下與狐相似也

囊大如升斗不  
痛不痺淫症也

小腸氣小腸之病小腹引睪丸必連腰脊而痛小腸虛則風冷

乘間而入邪氣既入則厥而上冲肝肺控引睪丸上而不下

練膏吳茱萸陳皮馬齒花醋炒各一兩芫花醋炒五錢醋炒丸  
每服一錢加至二錢酒送 又方益智術各五錢大荷山菜

黃牛膽續斷川芎胡蘆巴防風牽牛炒甘草各二錢半  
為細末每服三錢水煎空心連滓服白湯調下亦得

膀胱氣小腹腫痛不得小便是也  
五苓散 兩分三服葱白一  
莖茴香一錢煎八分水一鍾

煎七分服三服盡下小  
便如墨汁續用礪砂丸

脈緩弦急搏皆病脈視在何部而知其藏  
尺部脈滑為寒疝

東垣曰滑脈寸上見者為大熱陽與陽併也尺  
部見滑為大寒丙丁不勝壬癸從寒水之化也

至七里覺腹痛之甚半月後右丸腫大漸如斗形腹中醫者皆  
與肝經之劑及溫熱之品半載無功歸而就商于余余曰嗜火  
酒則溼熱滿中涉大水則濕寒外束今病在右正是脾肺之溼  
下注罌丸以胃苓湯加梔子枳殼黃柏茴香十劑而畧減卽以  
爲丸服至十八劑全安經今十五年不再發

文學賂元賓十年患痼形容枯槁余取之左脇有形其大如箕  
以熱手握之漑漑有聲甚至上攻于心悶絕者久以熱醋熏炙  
方甦余曰此經所謂厥疝也用當歸四逆湯月月積形衰小更  
以八味丸間服喜真遵信余言半載無間積塊盡消嗣後  
木香散 治肝邪上厥痛悶欲絕

不復  
患矣

木香

陳皮

良薑

乾薑

訶子

枳實

各一錢半

草豆蔻

黑牽牛

川芎

各一錢

水二鍾煎一鍾空心服

蜘蛛散

仲景以之治狐疝

蜘蛛

十四枚

桂

五分

右爲末每服一錢

雷公元蜘蛛勿用五色者身上有刺毛者薄小者須用

屋西南有網身小兒大腹內

有蒼黃膿者注去頭須微炒研

二層茴香丸

治一切疝如神癩疝尤爲要藥第一料

大茴香

許鹽五錢炒和鹽研

川棟子

去核炒

沙參

木香

各一兩

右爲細末水煮米糊爲丸桐子大每服三錢空心鹽湯下日

共前藥六味重五兩半為末糊丸服法如前若未愈服第三料

照前二方加白茯苓四兩附子製一兩

共前三味重十兩糊丸服法同前但每服三錢雖三十年之

久大如栲栳者皆可除根

荔枝散 治陰丸腫大痛不可忍

荔枝核十四枚燒灰存性用新者大茴香炒沉香 木香

青鹽錢各一食鹽錢各一川棟肉 小茴香各二錢

為末每服三錢空心熟酒調服

宣胞丸 治外腎腫痛

黑丑半生半熱 木通 青木香盞七枚同炒

為末酒糊丸桐子大每服二錢鹽湯下

地黃膏子丸

治男婦奔豚氣塊小腹  
甚澤而痛上冲心腹

血竭

沉香

木香

廣茂炮

玄胡索

人參

蛤蚧

當歸

川芎

川棘子炒

續斷

白朮炒

全蝎

茴香炒

柴胡

吳茱萸

沒藥

青皮

肉桂

已上分兩無定  
數隨証加減用

右為細末地黃膏子丸如桐子大空心溫酒下二十九日加

一九至三十九

當歸四逆湯

當歸尾七分

附子炮

官桂

茴香炒

柴胡

各三

各三寫二

川苦棟散

木香

川棟

巴豆拌炒去豆

茴香

鹽炒去鹽

等分爲末每服二錢空心食前酒調下

水香棟子散

疝氣久不愈者服甚神效

石菖蒲

一兩炒

青木香

一兩炒

革解

五錢

荔枝核

二十枚炒

川棟子

三十個巴豆二十枚同炒黃赤色去巴豆不用

爲細末每服二錢入麝香少許空心炒茴香鹽酒調下

烏頭梔子湯

治內有鬱熱外爲寒束

川烏頭

炮

梔子仁

炒各三錢

水二鍾煎一鍾空心服

加味通心散

治疝癰疝內有膿血小便不通



瞿麥穗

木通去皮

梔子去殼

黃芩

連翹

甘草

枳殼去穰

川棟子去核 歸尾

桃仁去皮尖炒

山查 等分爲末每服三錢燈心二十莖卓前草干

莖煎湯心調服

五苓散

見傷寒

礪砂丸

木香

沉香

巴豆肉

各一兩

青皮

二兩

銅青

五錢研

礪砂

一錢研

右二香及青皮三味同巴豆慢火炒紫色去巴

豆爲末入礪砂銅青同研勻蒸餅和丸桐子大每服七丸至

十九丸鹽湯空心下日二服

羊肉湯 治寒疝腹痛裏急

五兩集生肉一 水八碗煮取三碗溫服

內經曰脾受積溼之氣小便黃赤甚則淋

此言溼傳膀胱而成淋也土受溼浸積久

則鬱而為熱脾者主轉輸水

○風火鬱于上而熱其病淋

此言熱傳

膀胱熱輸于膀胱林證乃伴

膀胱而成淋也少陽胆為相火主風曰鬱于上

者火邪類歸心經心移熱于膀胱而淋証伴矣

愚按內經言淋溼與熱兩端而已病源論謂膀胱與腎為表裏

俱主水水入小腸與胞行于陰為溲便也若飲食不節喜怒不

時虛實不調藏府不和致腎虛而膀胱熱腎虛則小便數膀胱

熱則水下澁數而且澀則淋溼不宣小腹弦急痛引于臍分石

淋勞淋血淋氣淋膏淋冷淋六種石淋者有如沙石膀胱蓄熱

而成正如湯瓶久在火中底結白碱也勞淋者因勞倦而成多

屬脾虛血淋者心主血心遺熱于小腸搏于血脉血入胞中與

溲俱下氣淋者肺主氣氣化不及州都胞中氣脹少腹滿堅溺  
有餘瀝膏淋者滴下肥液極類脂膏冷淋者寒客下焦水道不  
快先見寒戰然後成淋更有過服金石入房太甚改精強閉流  
入胞中亦有淫痰日久注滲成淋由是則致淋之故殆有多端  
若不取其本未有獲痊者也

石林清其積熱滌去沙石則水道自利宜神效琥珀散如聖散  
獨聖散隨證選用

勞林有脾勞腎勞之分多思多慮負重遠行應酬紛擾勞于脾  
也宜補中益氣湯與五苓散分進專因思慮者歸脾湯苦強力入

房或施泄無度勞于腎也宜生地黃丸腎虛而寒者金匱腎

或黃耆湯

紅花牛膝丹皮血虛者六味丸如倒補藥車前子白芍藥或人參湯送益元散血色鮮紅心與小

腸實熱脈必數而有力丹皮白芍藥木通澤瀉黃芩面色黑

黯面色枯白尺脈沉遲下元虛冷也金匱腎氣丸或用漢椒根四五

錢水煎冷服然有內熱過極反兼水化而色黑者不可便以為

冷也須以脈證詳辨之

氣淋有虛實之分如氣滯不通驕下妨悶而痛沉香散石菴散

氣虛者八珍湯加杜仲

膏淋以淋非淋小便色如米泔或如鼻涕此精濁俱出精塞溺

道故欲出不快而痛鹿角霜丸大沉香散沉香丸海

冷淋多是腎虛肉苁蓉丸澤瀉

淋症

胞中膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣風寒濕邪氣  
客于胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通小腹膀胱按之  
內痛若沃以湯澁下小便以足太陽經其直行者上交巔入絡  
腦下灌鼻則為清涕也腎着湯腎湯巴戟丸  
**脈候**少陰脈數婦人則陰中生瘡男子則氣淋盛大而實者生  
虛小而澁者死

醫西案

邑辛巖知非患淋經年痛如刀鋸凡清火疎利之劑計三百貼  
病勢日甚歲暮來就診余曰兩尺數而無力是虛火也從來醫  
者皆泥痛無補法愈疎通則愈虛愈虛則虛力愈熾遂以八味

不可救矣。知非疑懼。復來商之。余曰：若不宜溫補。則服藥後病勢必增。今既減矣。復何疑乎？朝服補中益氣湯。晚服八味丸。逾月而病去。其丸更倍用。參耆十四日而霍然矣。

大司寇杜完三夫人。淋瀝兩載。靡藥不嘗。卒無少效。余診之。見其兩尺沉數。為有瘀血。停留法當攻下。因在高年。不敢輕投。但于補養氣血之中。加琥珀牛膝。此等緩劑。須以數十劑收功。而夫人躑躅急求。功再劑不效。輒欲更端。遂致痼疾。

神效琥珀散 治水道澀痛頻下沙石

琥珀 桂心 滑石 水飛 大黃 微炒 葵子

賦粉 木通 木香 磁石 煨酒炒 七次研

等分爲細末每服二錢燈心葱白煎湯調服

如聖散 治沙石淋

馬蘭花

麥門冬

去心

白茅根

車前子

甜葶藶

微炒

檀香

連翹

各等分

右爲末每服四錢水煎服

如渴加黃芩同煎入燒鹽少許服

獨聖散

治沙石淋

黃蜀葵

花子俱用炒一兩

爲細末每服一錢食前米飲調服

補中益氣湯

見虛癆

五苓散

見傷寒

歸脾湯

方見虛癆

金匱腎氣丸

方見重脰

鹿茸去毛 酥炙

黃芩去朽 心

括藟各一兩

人參

一兩二錢五分

石葦去毛

當歸焙各 五

赤芍藥

戎鹽研

蒲黃

甘草

各七錢五分

車前子

滑石

各二兩

為末蜜丸梧子大每服二錢食前鹽湯下。

黃耆湯

治腎虛勞淋

黃耆二兩

人參

五味子

白茯苓

旱蓮子

磁石

煨醋 碎

滑石

各一兩

桑白皮

七錢五分

枳殼

麩炒

黃芩

各半兩

每服三錢水一鍾煎七分服。

六味地黃丸

八珍湯

四物湯

俱見 虛勞

沉香散

治氣淋臍下妨悶小便大痛



沉香

石葦 去毛

滑石

當歸

王不留行

瞿麥 各半

葵子

赤芍藥

白朮 各七錢半

甘草 錢二

為末每服二錢大麥湯空心調服以利為度

石葦散

石葦 去毛

赤芍藥 各五錢

白茅根

木通

瞿麥

芒硝

葵子

木香 各一兩

滑石 三兩

每服四錢水一鍾煎六分服

瞿麥湯

瞿麥穗

黃連 去鬚

大黃 蒸

枳殼

當歸

羌活 去蘆

木通

牽牛

延胡索

桔梗

鹿角霜丸

鹿角霜

白茯苓

秋石各等分

為細末糊丸梧子大服五錢米飲下

大沉香散 治膏淋臍下妨悶

沉香

陳皮

黃耆各七錢

瞿麥二兩 枯白皮

葶子炒

滑石各一兩

黃芩

甘草炙各五錢

為末每服二錢食前米飲調服

沉香丸

沉香

肉苳蓉酒浸切焙 荆芥穗

磁石煨醋粹七次

黃耆

滑石各一兩

林症

七

為不蜜九梧子大每服二錢酒送下

海金沙散

海金沙

滑石 各一兩

甘草 二錢五分

研末每服二錢燈心湯調送

兎絲子丸

兎絲子

酒蒸焙搗

桑螵蛸 各五錢

澤瀉 二錢五分

為末蜜丸梧子大每服二錢空心米飲下

肉蓯蓉丸

肉蓯蓉

酒蒸焙

熟地黃

酒煮杵膏

山藥 炒黃

石斛 去根

牛膝 酒浸焙

官桂

去皮忌火

欖榔 各五錢

附子 炮去皮

黃耆 各一兩

黃連 去鬚七錢五分

澤瀉散 治冷淋脹滿澀痛

澤瀉

雞蘇

石葦去毛 赤茯苓

蒲萸

當歸

琥珀另研

檳榔各一兩 枳殼

麩炒桑螵蛸五錢

官桂

七錢五分

為細末。每服二錢。木通湯調服。

腎著湯

見腰

腎瀝湯見痺

巴戟丸

治胞痺

巴戟

去心兩半

桑螵蛸

切破麩炒

杜仲

去皮酥炙

生地黄

附子

炮去皮臍

肉苁蓉

酒浸去甲

續斷

川藥

各一兩

遠志

去木三錢

石斛

去根

鹿茸

酥炙

兔絲子

酒浸另搗

山茱萸

去核

北五味

龍骨

官桂

各七分半為末

林症

林十品木  
各上石

東青

相亮

海子

及諸

山萊黃

紫正利

紫骨

因葵蓉

志甲  
面長

國

田黃

紫志

存檢

四輝

兩半  
志心

冬輝

夢林

林下

紫黃

椰子

出生

四拍水

銷帆

習香

良類

習氣

良疾

官林

立石  
士變

魚味末

瓜列之

趁木

紫紫

紫紫

當靈

無匪

蘇林

一財

紫紫

紫紫

畢靈

解粉

百葉

紫紫

紫紫

紫紫

畢靈

紫紫

經云肝足厥陰之脉過陰器所生病者閉癯又云督脉者女子

入繫廷孔

廷正也。直也。言正中。之直。孔即溺竅也。

其孔溺孔之端也

前陰中讀管。女人溺孔在

之下也。孔之上際謂之端。乃督脈外起之所。此證以女子為言。然男子溺孔亦在橫骨下中央。但為宗筋所函。故不可見耳。

其男子循莖下至篡與女子等。此生病不得前後

莖陰莖也。不得前後二便。

俱閉也。此雖督脈所生而實亦衝任之病。蓋此三脈皆出陰中而上行。故其為病如此。

又云三焦下踰在

於足太陽之前。少陽之後。出于臍中。外廉名曰委陽。是足太陽

絡也。三焦音足少陽太陰之所將。太陽之別也。上踝五寸別入

貫腸出于委。並太陽之正。入絡膀胱。約下焦。實則閉癯。虛則遺

溺。此言三焦下踰之所行。與所主之病也。將。領也。三焦下踰即足太陽之別。絡故自踝上五寸。別入膀胱。以出于委陽穴。

並太陽之正脉。入絡膀胱。以又云膀胱不利為癯。不約為遺溺。約。束下焦。而其為病如此。

卷八 小便閉癯

不約者不能  
約束收攝也

愚按閉與癰二證也。新病為溺閉，蓋滴點難通也。久病為溺癰。

益屢出而短少也。閉癰之病，內經分肝與督脉三焦與膀胱四

然太陽膀胱，但主藏溺。其主出溺者，皆肝經及督脉及三焦

然考膀胱為州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。夫主氣化

陰肺經也。若使肺燥不能生水，則氣化不及，州都法當清

金澤車前紫苑麥門冬如脾濕不運而精不上升，故肺不能

主水法當燥脾健胃蒼朮白朮茯苓半夏之類如腎水燥熱，膀胱不利，法當

滋腎滌熱黃柏知母茯苓澤瀉通草之類夫滋腎瀉膀胱名為正治，清金潤燥

名為隔三之治，德胃燥醒名為隔五之治。又或有水液只滲大

茯苓諸藥通分劑而已，或有

者非與純陰之劑則陽無以化

上焦者梔子黃芩中焦者黃連為藥下焦者黃芩知母

有大虛者非與溫補之劑則水不能行

如金匱腎氣丸及如東補中益氣湯是也

垣治一人小便不通目突腹脹皮膚欲裂服淡滲之藥無效東

垣曰疾急矣非精思不能處思至夜半曰吾得之矣膀胱為津

液之府必氣化而能出服淡滲而病益甚是氣不化也無陽則

陰無以生無陰則陽無以化淡滲氣薄皆陽藥也孤陽無陰欲

化得乎以滋腎丸羣陰之劑投之即愈丹溪嘗曰吾以吐法通

小便譬如滴水之器上竅閉則下竅無以自通必上竅開而下

竅之水出焉氣虛者補中益氣湯先服後吐血虛者歸湯先

服後吐痰多者二陳湯先服後吐氣閉者香附木通探吐更有

小便閉癰



瘀血而小便閉者。牛膝、菴仁為要藥。別錄云：小便不利，審是氣虛，獨參湯如神。由是觀之，則受病之源自非一途。若不從望聞問切察之，明審之，置而浪投藥劑，幾何不以人命為戲耶。

娠娠小便不通。孕婦胎滿壓胞，多致小便閉塞，宜升舉其氣。

補中益氣 伸景用八味丸酒服。或令穩婆手入產戶托起其

胎弱出如注。 或令孕婦眠于榻上，將榻倒豎起，胎即不壓而

溺出，勝于手托多矣。或各有所因者，並依證施治。

產後小便不通。陳皮去白為末，空心酒調二錢，外用鹽填臍

中，却以葱白皮十餘根作一縛，切作一指厚，安臍上用。大艾炷

病，葱餅上以火炙之，覺熱氣入腹內即通。此唯氣壅者宜之，若氣虛源涸或有他因

若更審

郡守王鏡如痰火喘嗽正甚時忽然小便不通白服車前木通  
茯苓澤瀉等藥小腹脹悶點滴不通余曰右寸數大是金燥不  
能生水之故惟用紫菀五錢麥門冬三錢北五味十粒人參二  
錢一劑而小便湧出如泉若淡滲之藥愈多則反致燥急之苦  
不可不察也。

先兄念山謫官浙江按察鬱怒之餘又當盛夏小便不通氣高  
而喘以自知醫服胃苓湯四貼不效余曰六脈見結此氣滯也  
但用枳殼八錢生薑五片急火煎服一劑稍通四劑霍然矣  
孝廉命彥直修府志勞神怱然如喪神守小便不通余診之曰  
寸微而尺鼓是水涸而神傷也用地黃知母各二錢人參丹參

各三錢。茯苓一錢。五分。黃柏一錢。二劑稍減。十劑而安。

入正散 治心經邪熱燥渴。煩躁。小便不通。

瞿麥

篇蓄

車前子 滑石

甘草炙

山枝仁

木通

大黃

麴裏蝦 各等分

右為末。每服二錢。水一鍾。入燈心煎至七分。食後臨卧服之。

五苓散

方見泄瀉

大通湯

治小便不通。小腹痛甚。

木通

滑石

各五錢

牽牛

取頭末 二錢半

右作一服。水二鍾。燈心十莖。葱白一莖。煎至一鍾。食前服。

通心飲

治心經有熱。唇焦面赤。小便不通。

牛膝湯 治血結小便閉塞中痛

牛膝 五錢 當歸 三錢 水鍾半煎八分服日三服

金匱腎氣丸 治腎虛小便不通或過服涼藥而愈甚者每服

三錢淡鹽湯送下

琥珀散 治老人虛人心氣閉塞小便不通

用琥珀為末每服一錢人參湯下極效

利氣散 治老人氣虛小便不通

黃耆 炙 陳皮 去白 甘草 各一錢 水一鍾煎七分服

參耆湯 治心虛客熱小便澀數

赤茯苓 一錢 生地黃 黃耆 桑螵蛸 微炙 地骨皮 各一錢

小便閉塞

人參

五味子

兔絲子

酒浸

甘草

各五分

水一鍾煎七分。入燈心二十一莖。一沸服。

清肺散

治渴而小便閉澀。

茯苓

二錢

猪苓

三錢

澤瀉

瞿麥

琥珀

各五分

燈心

一分

蒲蓄

木通

各七分

通草

二分

車前子

一錢

水二碗煎至一碗服。

滋腎丸

治陰虛小便閉

黃蘗

酒洗

知母

酒炒各二兩

肉桂

二錢

右為末。熟水為丸。如芡實大。每服百丸。加至二百丸。百沸湯

空心服。

共... 濟下毒

滑石散 治男婦轉胞。小腹急痛不得小便。

寒水石 二兩 葵子 一合 滑石 亂髮灰 車前子

木通 去皮節 各一兩 水十碗煎至五碗每服一碗。一日服盡即利。

洗方 治胞轉小便閉先用。

良薑 五錢 葱頭 二十枚 紫蘇 二兩

煎湯密室內薰洗。小腹外腎肛門留湯再添蘸綿洗以手撫

臍下拭乾。被中仰坐垂腿自舒其氣次用。

蜀葵子 二錢 赤茯苓 赤芍藥 白芍藥 各五錢

每服三錢煎取清汁調蘇合丸三并研細青鹽五分。食前服。

又法 炒鹽半。筋囊盛熨小腹。

小便閉癰

葱熨法 治小便閉。小腸脹不急。治殺人。用葱白三觔切細炒。

熟絹包分兩袋更替熨臍下即通。

又法 以自爪甲燒灰水服。

塗臍方 治小便不通。

大蒜

獨顆者一枚 梔子 七枚

鹽花 少許

右搗爛綿紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通。

又法 治小便閉垂死者神效。

桃枝

柳枝

木通

川椒

白礬

枯各一兩

葱白 七個

燈心 一握

水三十碗煎至十五碗用磁瓶熱盛一半藥汁薰外腎周廻。

經云脉熱病者小便先黃又云胃氣盛則身已前背熱消穀

饑溺色黃又云加氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變又

云冬脉不及令人眇清香痛小便變上二改言肝胃有實熱下

者皆能令小便黃赤也厥陰之勝肱脇氣并化而為熱小便黃赤此運氣

也少陰司天熱淫所勝病溺色變又云少陽之勝溺赤善驚又

曰陽明司天燥氣下臨暴熱至陽氣鬱發小便變此皆運氣之

中氣不足溲便為之變此言脾虛也

愚按小便黃赤人皆以下焦有熱清之利之而已矣寧知內經

藏府寒熱之別有如是耶故一切證候莫不有五藏六府之分

虛實寒熱之別苟不詳察其不禍人者幾希矣



火府丹 治心肝有熱小便黃赤。

黃芩 一錢五分

生地黃 三錢

木通 四錢

水二鍾煎一鍾空心服

涼胃湯

脾胃有熱消穀善饑渴色黃赤。

黃連 一錢二分

甘草 四錢

陳皮 二錢 茯苓 四錢

水二杯煎一杯食遠服

加味補中益氣湯

治脾肺虛小便黃赤。

人參 一錢

白朮 一錢

黃耆 一錢二分

甘草 三分 當歸 五分

陳皮 六分

升麻 三分

柴胡 一分

茯苓 二錢 車前子 一錢

水二鍾煨薑三片棗一末煎人少服。

溫腎湯

治尺脉虛瀉足脛逆冷小便黃赤。

附子 二錢

肉桂 一錢

熟地 二錢 茯苓 五錢

牛膝 一錢三分

醫宗必讀卷之