

刺灸通論



杭州圖書館

醫學綱目卷之七

弘前醫學書院

陰陽臟腑部

大法

靈石針之要易陳而難入針解云易陳者易言也難入者難著于人也粗守形

上守神粗守形者守刺法也上守神者守神氣也神氣者正邪委會也神者正氣也容者未睹其疾惡知其

原未睹其疾者先知邪正何經之疾也惡刺之微在速遲

速遲者疾者先如何經之病所取之處也守四肢而不知血氣

徐之意也粗守關上守機粗守關者守四脈而不知血氣

也機之動不離其空知氣之虛實用空中之機清淨以微

針以得氣審意其來不可逢氣盛不其往不可追氣虛不

守氣勿失也其來不可逢氣盛不其往不可追氣虛不

知機之道者不可掛以髮言氣易不知機道扣之不發言

知補瀉之意血氣已盡而氣不下也知其往來要與之期知其往來者知氣

與之期者知氣粗之闕乎冥冥不知氣妙哉上獨有之者

盡知針往者為逆言氣之虛也來者為順言氣之平明知

醫學綱目卷七

逆順正行無問言知所取迎而奪之惡得無虛追而濟之

惡得無實迎之隨之言知所取以意和之針道畢矣迎而奪之者瀉

補也難經云所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來也追而濟之者

其逆順而取之故曰迎隨又云迎而奪之者瀉其之往來也隨

而濟之者補其母也假令心病瀉手心主俞是謂凡用針

者虛則實之氣口虛而當補之也素云宛陳則除之去血脈也邪

之氣口盛而當瀉之也素云宛陳則除之去血脈也邪

盛則虛之諸經有盛者皆瀉其大要曰徐而疾則實徐內

出也素云徐出疾而徐則虛疾內而徐出也素云言實與

針而疾按之疾而徐則虛疾內而徐出也素云言實與

虛若有若無言實者有氣虛者無氣也素云言實與虛者

察後與先若云若存言氣之虛實補瀉之先後也為厄與

實若得若失言補者似然若有得也瀉則恍然若有失也

若得若失素云為虛與實者勿虛實之要九針最妙素

失其法若得若失者離其法也素云補瀉之時以針為之與氣開閉相合也

為其各有補瀉之時以針為之素云補瀉之時以針為之與氣開閉相合也

瀉曰迎之必持而內之放而出之排陽得針邪氣得泄按而引針是謂內溫血不得散氣不得出也 補曰隨之意若

忘之若行若按如蚊虻止如留如還去如弦絕今左屬右其氣故止外門已閉中氣乃實必無留血急取誅之持針之道堅者爲寶正指直刺無針左右神在秋毫屬意病者審視血脉者刺之無殆方刺之時必在懸陽及與兩衛神屬勿去知病存亡血脉者在胸橫居視之獨澄切之獨堅

刺之而氣之不至無問其數刺之而氣至乃去之勿復

針針各有所宜各不同形各任其所爲刺之要氣至而有效效之信若風之吹雲明乎若見蒼天刺之道畢矣邪氣來也緊而疾穀氣來也徐而和並見九針十二原并小針解

凡刺之屬三刺至穀氣邪僻妄合陰陽易居逆順相反浮沉異處四時不得稽留淫泆須針而去故一刺則陽邪出

醫學綱目卷七

再刺則陰邪出三刺則穀氣至穀氣至而止所謂穀氣至者已補而實已瀉而虛故以知穀氣至也 所謂三刺則

穀氣出者先淺刺絕皮以出陽邪再刺則陰邪出者少益

深絕皮致肌肉未入分肉間也已入分肉之間則穀氣出

故刺法曰始淺刺之以逐邪氣而來血氣後刺深之以致

陰氣之邪最後刺極深之以下穀氣此之謂也故用針者

不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工也並見

終始官
針二篇

右候氣有二一曰邪氣二曰穀氣凡刺氣至則候邪氣

盡盡則穀氣至至則止針矣所謂邪氣者曰緊而疾曰

補而未實瀉而未虛也所謂穀氣者曰徐而和曰補而

已實瀉而已虛也

觀其色察其目知其散復一其形聽其動靜上工知相五色于目有知

調尺寸小大緩急也。知其所病也。知其邪正者。正邪之風也。右主推之。左
持而御之者。言持針而氣至而去之。言補瀉氣調

已上見針解。凡將用針。必先眡視脈氣之劇易。乃可以
治也。

素五臟已定。九候已備。後乃存針。王註云。先定五藏之脈
存意於用。次循九候之診。然後乃
針之法。黃帝問曰。經言氣之盛衰。左右傾移。以上調下

以左調。右有餘不足。補瀉於榮。俞余知之矣。此皆榮衛之
傾移。虛實之所生。非邪氣從外入於經也。余願聞邪氣之
在經也。其病人何如取之。奈何岐伯對曰。夫聖人之起度
必應於天地。故天有宿度。地有經水。人有經脈。天地溫和
則經水安靜。天寒地凍。則經水凝泣。天暑地熱。則經水沸
溢。卒風暴起。則經水波涌而隴起。夫邪之入於脈也。寒則
血凝泣。暑則氣淖澤。虛邪因而入客。亦如經水之得風也。

醫學綱目卷七

經之動脈。其至也。亦時隴起。其行於脈中。循循然。其至寸
口中手也。時大時小。大則邪至。小則平。其行無常處。在陰
與陽。不可為度。從而察之。三部九候。卒然逢之。早過其路。
帝曰。候氣奈何。岐伯曰。夫邪去絡。入於經也。舍於血脈之
中。其寒溫未相得。如涌波之起也。時來時去。故不常在。故
曰。方其來也。必按而止之。止而取之。無逢其衝而瀉之。真
氣者。經氣也。經氣太虛。故曰。其來不可逢。此之謂也。靈樞
來不可逢者。氣
盛不可補也。故曰。候邪不審。大氣已過。瀉之則真氣脫
脫。則不復。邪氣復至。而病益畜。故曰。其往不可追。此之謂
也。靈樞云。其往不可追
也。者。氣虛不可瀉也。不可掛以髮者。待邪之至時而發
針瀉矣。言氣易失也。若先若後者。血氣已盡。其病不可
下。故曰。知其可取。如發機。不知其取。如叩鐘。故曰。知機道
者。不可掛以髮。不知機者。扣之不發。此之謂也。帝曰。補瀉

奈何岐伯曰此攻邪也疾出以去盛血而復其真氣此邪
新客溶溶未有定處也推之則前引之則止逆而刺之溫
血也刺出其血其病立已邪之新客來也未有定處推之
則前引之則止逢而瀉之其病立已俱難合
真邪論

右候邪氣新客經脈而取之之法也言邪之初客經脈
其寒溫未相搏如涌波之起也時來時去故不當在欲
取之者必於三部九候之間診察以待之儻於一部一
候見其如涌波之來則按而止之然後取之不可逢其
衝來使瀉之故曰其來不可逢其或候氣不審至於涌
波之大氣已過去而瀉之則真氣脫邪氣復至而病益
蓄故曰其往不可追也凡診三部九候而待邪至之機
以發刺者必專心致意故曰知機道者不可掛以髮也
所謂涌波者脈浮大也三部九候非寸關尺乃面有三

入醫學綱目卷七

四

部手有三部足有三部合三部為九部也

帝曰善然真邪已合波隴不起候之奈何岐伯曰審捫循
三部九候之盛虛而調之察其左右上下相失及相減者
審其病藏以期之不知三部者陰陽不別天地不分地以
候地天以候天人以候人調之中府以定三部故曰刺不
知三部九候病脈之處雖有大過且至工不能禁也誅罰
無過命曰大惑反亂大經真不可復用實為虛以邪為真
用針無義反為氣賊奪人正氣以從為逆榮衛散亂真氣
已失邪獨內著絕人長命予人天殃不知三部九候故不
能長久因不知合之四時五行因加相勝釋邪攻正絕人

長命

難合真
邪論

右候邪客已久真邪已合而取之之法也言取邪之新
客者但候波隴之脈來處取之今真邪已合波隴不起

而不知邪客之處也故又必當捫循三部九候之盛虛視其盛處瀉之虛處補之左右相失而左大右細者瀉左補右上下相失而上大下小者瀉上部補下部上下大者補上部瀉下部左右上下皆相減而細者審其何臟之減以其減臟日時之衰者補其所減經減臟日時之盛者瀉其所勝經候邪去真復而止故曰刺不知三部九候病脉之處則誅罰無過反亂大經用實爲虛以邪爲真真氣已失邪獨內著絕人長命也

上工救其萌芽必先見三部九候之氣盡調不敗而救之故曰上工下工救其已成救其已敗救其已成者言不知三部九候之相失因病而敗之也知其所在者知診三部九候之病脉處而治之故曰守其門戶莫知其情而見邪形也八正神

醫學綱目卷七

難言上工治未病中工治已病者何謂也然所謂治未病者見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣無令得受肝之邪也故曰治未病焉中工見肝之病不曉相傳但一心治肝故曰已病也七難

自篇首至此乃察病用針切要之旨學者當潛心體認之醫而不知此非工也噫今世稍知穴法便自驕滿由不知粗守形上守神之論也可慨哉

靈夫氣之在脉也邪氣在上針解云言邪氣之中人濁氣也高故邪氣在上

在中言水穀皆入於胃其精氣上注于肺濁瀦于腸胃若寒暑不適飲食不節而病生於腸胃故命曰濁氣在

也清氣在下言清濕地氣之中人也必從足始故曰清氣在下針陷脉則邪氣出

取之中脉則邪氣出取之陽針大深則邪氣反沉言浮淺

欲深刺也深則邪氣入故曰反沉言經絡各病各

有所宜甲乙經宜各不同形各以任其所宜見小針解及

素病有浮沉刺有深淺各至其理無過其道過之則內傷不及則生外壅壅則邪從之淺深不得反為大賊內動五藏後生大病故曰病有在毫毛腠理者有在皮膚者有在肌肉者有在脉者有在筋者有在骨者有在髓者云云刺要

論 病在脉調之血病在血調之絡病在氣調之衛病在肉調之骨肉病在筋調之筋病在骨調之骨燔針劫刺其下及與急者主註云調筋法也病在骨焯針藥熨調骨法也病不知所痛兩躄為上身形有痛九候莫病則繆刺之刺絡脉也痛在於左而右脉病者巨刺之刺經脉也見調經論篇

靈手屈而不伸者其病在筋伸而不屈者其病在骨在骨守骨在筋守筋終始篇

難言刺榮無傷衛刺衛無傷榮何謂也然針陽者臥針而刺之刺陰者先以左手攝按所針榮俞之處氣散乃納針

是謂刺榮無傷衛刺衛無傷榮也見七十難

素刺骨者無傷筋刺筋者無傷肉刺肉者無傷脉刺脉者無傷皮刺皮者無傷肉刺肉者無傷筋刺筋者無傷骨刺

骨無傷筋者針至筋而去不及骨也刺筋無傷肉者至肉而去不及筋也刺肉無傷脉者至脉而去不及肉也刺脉

無傷皮者至皮而去不及脉也林註云此謂淺深不刺皮無傷肉者病在皮中針入皮中無傷肉也刺肉無傷

筋者過肉中筋也刺筋無傷骨者過筋中骨也此之謂反也戒其大深也刺齊論

九鍼之要官針最妙九鍼之宜各有所為長短大小各以施也不得其用病弗能移疾淺針深內傷良肉皮膚

病深針淺病氣不瀉反為大膿病小針大氣瀉太甚害病大針小氣不泄瀉亦復為敗失針之宜大者

為小者不移已言其過請言其所施官針

靈一曰鏡針長一寸六分頭大末銳去瀉陽氣九針十二切○紫古云平半寸長一寸六分其頭大末銳主熱在頭分宜此

甲一者天天者陽也五臟之應天者肺也肺者五臟六腑

之蓋也皮者肺之合也人之陽也故為治鏡針鏡針者取

法於巾針去末半寸卒銳之長一寸六分大其頭銳其末

令無得深入而陽氣出主熱在頭身者故曰病在皮膚無

常處者取之鏡針於病所膚白勿取

靈二曰貞針長一寸六分針如卵形楷摩分間不得傷肌

肉以瀉分氣九針十二原紫古云其身長針針如卵形肉分氣病宜此

甲二者地地者土也人之所以應土者肉也故為之治貞

針貞針者取法於紫針必箭其身而貞其末其鋒如卵長

一寸六分以瀉肉分之氣令不傷肌則陽氣得瀉故曰病

醫學綱目卷七

在分肉間取以貞針

靈三曰鍤針長三寸半鋒如黍粟之銳主按脉勿陷以致

其氣九針十二原紫古云脉氣虛少者宜此

甲三者人也人之所以成生者血脉也故為之治鍤針鍤

針者取法於黍粟大其身而員其末如黍粟之銳長三寸

五分令可以按末勿陷以致其氣使邪氣獨出故曰病在

脉氣少當補者取以鍤針針于井榮分輸

靈四曰鋒針長一寸六分刃三隅以發痼疾九針十二原紫古云渴熱

泄痼疾

甲四者時也時者四時八風之客於經絡之中為痼病者

也故為之治鋒針鋒針者取法於紫針箭其身而鋒其末

刃三隅長一寸六分令可以瀉熱出血發泄痼疾故曰病

在五臟固居者取以鋒針瀉于井榮分輸取以四時也

靈五曰鈹針長四寸廣二分半末如劍鋒以取大膿九十二原鈹音皮紫古云一名破針用以破癰腫血膿

甲五者音也音者冬夏之分分子于午陰與陽別寒與熱爭兩氣相搏合為癰膿者也故為之治鈹針鈹針者取法於劍令其末如劍鋒廣二分半長四寸可以取大膿出血故曰病大膿血取以鈹針

靈六曰貞利針長一寸六分大如釐且貞且銳中身微大以取暴氣九針十二原紫古云尖如毫且貞且利中身微大調陰陽去暴氣

甲六者律也律者調陰陽四時而合十二經脈虛邪客於經絡而為暴痺者也故為之治貞利針貞利針者取法於釐針且貞且銳中身微大長一寸六分以取癰腫暴痺令尖如釐微大其末反小其身令可深內也故曰病痺氣暴發者取以貞利針

八醫學綱目卷七

靈七曰毫針長三寸六分尖如蚊虻喙靜以徐往微以久留之而養以取痛痺九針十二原紫古云尖如蚤虱喙調經絡去痛痺

甲七者星也星者人之七竅邪之所客於經舍於絡而為痛痺者也故為之治毫針毫針者取法於毫毛長一寸六分令尖如蚊虻喙靜以徐往微以久留正氣因之真邪俱往出針而養生以治痛痺在絡也故曰痺病氣通而不去者取之毫針

靈八曰長針長七寸鋒利身薄可以取遠痺九針十二原痺深居骨解腰脊節腠之間者

甲八者風也風者人之股肱八節也八正之虛風傷人內舍於骨解腰脊節腠之間為深痺也故為之治長針長針者暴針也長七寸長其身而鋒其末令可以取深邪遠痺故曰病在中者取以長針秦巨其切

九曰大針長四寸尖如挺其鋒微員以瀉機關之水也

十二原案古云一名焮針針風虛合于骨解皮膚之間者

甲九者野也野者人之節解皮膚之間也淫邪流溢於身如風水之狀而滯不能過於機關大節者也故為之治大針大針者取法於鋒針其針微員長四寸以瀉機關內外取大氣之不能過於關節者也故曰病水腫不能過關節者取以大針

黃帝問曰刺有五邪何謂五邪伯高曰病有持癰者有容

大者有狹小者有熱者有寒者是謂五邪刺五邪法未詳凡刺

癰刺用鈹針無迎隨易俗移性不得膿脆道更行去其鄉

不安處所乃散亡諸陰陽過癰者取之其輪瀉之凡刺

大邪用鋒針日以小泄奪其有餘乃益虛剽其通針其邪

肌肉親視之無有反其真刺諸陽分肉之間凡刺小邪

醫學綱目卷七

用真針日以大補益其不足乃無害視其所在迎之界遠

近盡至其不得外侵而行之乃自費刺分肉之間凡刺

熱邪用鑱針越而蒼出游不歸乃無病為開通關門戶使

邪得出病乃已凡刺寒邪用毫針日以溫徐徃徐來致

其神門戶已閉氣不分虛實得調其氣存也刺節真邪論

凡刺

靈凡刺有九日應九變一曰輸刺輸刺者刺諸經榮輸藏

腧也二曰遠道刺遠道刺者病在上取之下刺府輸也三

曰經刺經刺者刺大經之結絡經分也四曰絡刺絡刺者

刺小絡之血脉也五曰分刺分刺者刺分肉之間也六曰

大寫刺大寫刺者刺大膿以鈹針也七曰毛刺毛刺者刺

浮痺皮膚也八曰巨刺巨刺者左取右右取左九曰焮刺

焮刺者刺燔針則取痺也凡刺有十二節以應十二經一曰偶刺偶刺者以手直心若背直痛所一刺前一刺後

以治心痺刺此者傍針之也 二曰報刺報刺者刺痛無常處也上下行者直內無拔針以左手隨病所按之乃出針復刺之也 三曰恢刺恢刺者直刺傍之舉之前後恢筋急以治筋痺也 傍之舉之者謂直刺入筋轉針頭從傍挑舉其筋也 四曰齊刺齊刺者直入一傍入二以治寒氣小深者或曰三刺三刺者治痺氣小深者也 五曰揚刺揚刺者正內一傍內四而浮之以治寒氣之博大者也 六曰直針刺直針刺者引皮乃刺之以治寒氣之淺者也 七曰輸刺輸刺者直入直出稀發針而深之以治氣盛而熱者也 八曰短刺短刺者刺骨痺稍搖而深之致針骨所以上下摩骨也 九曰浮刺浮刺者傍入而浮之以治筋急而寒者也 十曰陰刺陰刺者左右率刺之以治寒厥中寒厥足踝後少陰也 十一曰傍針刺傍針刺者直刺傍刺各一以治留

入醫學綱目卷七

十

痺久居者也 十二曰贊刺贊刺者直入直出數發針而淺之出血是謂治癰腫也 凡刺有五以應五藏一曰半刺半刺者淺內而發針無針傷肉如拔毛狀以取皮氣此肺之應也 二曰豹文刺豹文刺者左右前後針之中脉爲故以取經絡之血者此心之應也 三曰關刺關刺者直刺左右盡筋上以取筋痺慎無出血此肝之應也或曰淵刺一曰豈刺 四曰合谷刺合谷刺者左右雞足針于分肉之間以取肌痺此脾之應也 五曰輸刺輸刺者直入直出深內之至骨以取骨痺此腎之應也 見官針篇 標幽賦 拯救之法妙用者針容歲時於天道定形氣於予心春夏瘦而淺刺秋冬肥而刺深不窮經絡陰陽多逢刺禁既論藏府虛實須向經尋原夫起自中焦水初下漏太陰爲始至厥陰而方終穴出雲門抵期門而最後正經

十二別絡走三百餘支正側偃伏氣血有六百餘候手足三陽行走頭而頭走足手足三陰足走腹而胸走手要識迎隨須明逆順況夫陰陽血氣多少爲最厥陰太陽少氣多血太陰少陰少血多氣又有氣多血少者少陽之分氣盛血多者陽明之位先詳多少之宜次察應至之氣輕滑慢而未來沉濇緊而已至既至也量寒熱而留疾未至也據虛實而清氣氣之至也若魚吞釣餌之浮沉氣未至也似閉處幽堂之深邃氣速至而效速氣遲至而不治觀夫九針之法毫針最微七星可應衆穴主持本形金也有蠲邪扶正之道短長水也有決凝開滯之機定刺象木或斜或正口藏比火進陽補羸循機捫而可塞以象土實應五行而可知然而一寸六分包含妙理雖細擬於毫髮同貫多岐可平五藏之寒熱能調六府之實虛拘攣閉塞遣八

邪而去矣寒熱痛痺開四關而已之凡刺者使本神朝而後入既刺也使本神定而氣隨神不朝而勿刺神已定而可施定脚處取氣血爲主意下手處認水土是根基天地人三才也湧泉同璇璣百會上中下三部也大包與天樞地機陽蹻陽維并督脉主肩背腰脚在表之疾陰蹻陰維任帶衝主心腹脇肋在裏之危二陵二蹻二交似續而交五大兩間兩商兩井相依而列兩支足見取穴之法必有分寸先審自意次觀肉分或屈伸而得之或平直而安定在陽部筋骨之側陷下爲真在陰分鄰臍之間動脉相應按五穴定一穴而必端取三經用一經而可正頭部與肩部詳分督脉與任脉異定明標探本論刺深刺淺之經住痛移疼取相交相貫之逕豈不聞藏府病而求門海俞募之微經絡滯而求原別交會之道更窮四根三結依標本

而刺無不痊但用八法五門分主客而針無不效八脉始
終連八會本是紀綱十二經絡十二原是爲樞要若一日
刺六十六穴之法方見幽微一時取十二經之原始知要
妙詳夫補瀉之法非呼吸而在手指速效之功要交正而
識本經交經繆刺左有病而右畔取瀉絡遠針頭有病而
脚上針巨刺與繆刺各異微針與妙刺相通觀部分而知
經絡之虛實視浮沉而辨藏府之寒溫且夫先令針耀而
慮針損次藏口內而欲針溫目無外視手如握虎心無外
慕如待貴人左手重而切按欲令氣散右手輕而徐入不
痛之因空心恐怯直立側而多暈背目沉指坐臥平而勿
昏至推于十十變定孔穴之開闔論其五行五藏察時
日之旺衰伏如橫應若發機陽交陰別而定血暈陰躄
陰維而下胎衣痺厥偏枯迎隨裡經絡接續漏崩帶下溫

入醫學綱目卷七

主

補使氣血依歸靜以久留停針候之必准者取照海治喉
中之閉塞端的處用大鍾治心性之呆痴大抵疼痛實瀉
痒麻虛補體重節痛而俞居心下痞滿而井主心脹咽痛
針太衝而立除脾痛胃疼瀉公孫而立愈胸滿腹痛刺內
關脇疼肋痛針飛虎筋攣骨痛而補魂門體執勞嗽而瀉
魄戶頭風頭痛刺申脉與金門眼癢眼疼瀉光明與地五
瀉陰郄止盜汗併小兒骨蒸刺偏歷利小便蕪大人水蠱
中風環跳而宜刺虛損天樞而可取由是午前卯後太陰
生而疾溫離左酉南月死朔而速冷循捫彈努留吸母以
堅長爪下伸提疾呼子而噓短動退空歇迎奪右而瀉涼
推內進搓隨濟左而補煖慎之大凡危疾色脉不順而莫
針寒熱風陰饑飽醉勞而切忌望不補而晦不瀉弦不奪
而朔不濟精其心而求其法無灸艾而壞其肌正其理而

求其源免投針而失其位避矣處而和四肢四十有九禁刺處而除六俞三十又二抑又聞高皇抱疾而未瘥李氏刺巨闕而得甦太子暴死爲屍厥越人針維會而復醒肩井曲池甄權刺臍痛而復射懸鍾環跳華陀刺蹠足而立行秋夫刺腰俞而鬼免沉痾王纂針交俞而妖精立出刺肝俞與命門使瞽士視秋毫之末刺少陽與交別俾聾夫聽夏蚋之聲嗟夫去聖逾遠斯道漸墜或不得意而散其學或眩其能而犯禁忌庸愚智淺難契於玄言至道淵深得之者有幾偶述斯言不敢示諸明達者焉庶幾乎童蒙之心啓

通玄賦 必欲治病莫如用針巧運神機之妙工開聖理之深外取砭金能蠲邪而扶正中含水火善回陽而倒陰原夫絡別支殊經交錯綜或溝渠溪谷以歧異或山海丘

陵而隙共斯流派以難揆在條綱而有統理繁而昧縱補瀉以何功法捷而明自迎隨而得用且如行步難移大衝最奇入中除脊膺之強痛神門去心性之呆痴風傷項急始求於風府頭眩目暈要覓於風池耳閉須聽會而治也眼痛則合谷以推之胸結身黃取湧泉而即可腦昏目赤瀉攢竹以偏宜但見若兩肋之拘攣仗曲池而平掃治半身之不遂作環跳以長驅牙齒痛呂細堪治頭項強承漿可保太白宣導於氣衝陰陵開通於水道腹膨而脹奪內庭以休遲筋轉而疼瀉承山之在早大抵脚腕痛崑崙解愈股膝疼陰市能醫癩發顛狂兮憑後谿而療理瘧生寒熱兮仗間使以扶持期門罷胸滿血崩而可用勞宮退胃翻心痛以何疑考夫大敦去七疝之偏疼王公謂此三里却五勞之羸瘦華老言斯固知腕骨祛黃然谷瀉腎行間

治膝腫腰疼尺澤去肘疼筋緊目昏無見二間宜取鼻寒
不聞迎香可引肩井除兩臂之難任攢竹療頭疼之不忍
咳嗽寒痰列缺堪治眇職冷淚臨泣尤准完骨將腿痛以
祛殘腎俞把腰疼而瀉盡以見越人治屍厥於維會隨手
而甦文伯瀉死胎於三陰交應針而墮聖人於是察麻與
痛分實與虛實則自外而入也虛則自內而出之是故濟
母以裨其不足奪子而平其有餘觀二十七之經絡一一
明辨據四百四之疾症件件皆除故得天柱都無躋斯民
於壽域幾微已判彰往古之玄書抑又聞心胸病求掌後
之大陵脊背患責肘前之三里冷痺腎俞取足陽明之土
連膺腹痛瀉足少陰之水脊間心後者針中渚而立痊脇
下肋邊者刺陽陵而卽止頭項痛擬後路以安然腰脚疼
在委中而已矣夫用針之士於此理苟明者焉收祛邪之

醫學綱目卷七

功而在乎揜指

海兩脇痛少陽丘墟 心痛少陰太溪湧泉足厥陰原穴

腰痛崑崙及委中出血 喘滿痰實口中如膠足少陰

太溪 嘔噦無痰手厥陰太陵 熱無度不可止陷谷出

血 骨節疼痛實無所知三稜刺絕骨出血 小腸疝氣

足厥陰太衝 血衄不止大小便血婦人血不足刺足太

陰井 喉閉手足少陽井并少商手足太陰井 大煩熱

不止晝夜無度刺十指間出血謂八關大刺 陰頭中痛

不可忍卒疝痛婦人陰中痛俱刺足厥陰井 眼大眦痛

刺手太陽井小骨痛刺少陰井 骨熱不可治者板齒乾

燥灸骨會大維

接經 手足經同

經曰留瘦不移節而刺之使十二經無過絕假令十二經

中是何經絡不通行當刺不通凝滯俱令氣過節無問其數以平為期如諸經俱虛補十二經如諸經俱實瀉十二經補當隨而濟之瀉當迎而奪之

又補母亦名隨而濟之瀉子亦名迎而奪之又隨呼吸出納亦名迎隨也

右大接經從陽引陰從陰引陽皆取十二經井穴

並見中風

門針
次條

脉之所居深不見者刺之微內針而久留之以致其脉氣也脉淺者勿刺接絕其脉乃刺之無令精出獨出其邪氣耳

病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深刺之痒者陽也淺刺之病在上者陽也在下者陰也病先起于陰者先治其陰而後治其陽病先起于陽者先治其陽而後治其陰 春氣在毛夏氣在皮秋氣在分肉冬氣在筋骨此病各以其時為齊故刺肥人者秋冬之齊瘦人者春夏之齊

醫學綱目卷七

五

難言春夏刺淺秋冬刺深者何謂也然春夏者陽氣在上人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣亦在下故當深取之春夏各致一陰秋冬各致一陽者何謂也然春夏溫必致一陰者初下針沉之至腎肝之部得氣引持之陰也秋冬寒必致一陽者初內針淺而浮之至心肺之部得氣推內之陽也是謂春夏必致一陰秋冬必致一陽

難七十

垣夫陰病在陽者是天_外風寒之邪乘中而外入在人之背上府俞藏俞是人之受天_外寒邪亦有二說中於陽則流於經此病始於外寒終歸外熱故以治風寒之邪治其各藏之俞非止風寒而已六淫濕暑燥火皆五藏所受乃筋骨血脉受邪各有背上五藏俞以除之傷寒說從仲景中八風者有風論中暑者治在背上小腸腑中濕者治在

胃脘中燥者治在大腸脘此皆六淫客邪有餘之病皆瀉其背之腑脘若病久傳變有虛有實各隨病之傳變補瀉不足只治在背府脘 陽病在陰者病從陰引陽是水穀之寒熱感則害人六府又曰飲食失節及勞役所傷陰火乘於坤土之中致穀氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升滋於六府之陽氣是五陽之氣先絕於外外者天也下流伏於坤土陰火之中皆先由喜怒悲憂恐為五賊所傷而後胃氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當從胃脘合三里穴中推而揚之以伸元氣故曰從陰引陽若元氣愈不足治在腹上諸府之募穴若傳在五藏為九竅不通隨各竅之病治其各藏之募穴於腹故曰五藏不平乃六府元氣閉塞之所生也又曰五藏不和九竅不通皆陽氣不足陰氣有餘故曰陽不勝其陰凡治腹之募皆為元氣不

足從陰引陽勿誤也若錯補四末之俞錯瀉四末之俞皆非也錯瀉者差尤甚矣按岐伯所說只取穴於天上天上者人之背上五藏六府之俞不當瀉而瀉豈有生者乎與言及此寒心徹骨若六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病苟錯取穴於胃之合及諸腹之募者必危亦岐伯之謂下工可不慎哉

刺虛實

虛實法

素曰刺法言有餘瀉之不足補之何謂有餘何謂不足岐伯對曰神有有餘有不足氣有有餘有不足血有有餘有不足形有有餘有不足志有有餘有不足夫心藏神肺藏氣肝藏血脾藏肉腎藏志而此成形志意通內連骨髓而成身形五藏五藏之道皆出於經隧以行血氣血氣不和百病乃變化而生是故守經隧焉 神有餘則笑不休神

不足則悲血氣未并五藏安定邪客於形洒淅起於毫毛未入於經絡也故命曰神之微神有餘則瀉其小絡之血出血勿之深斥斥推也小絡孫絡也針經曰經脈為裡無支而橫者為絡絡之別者為孫絡也

中其大經神氣乃平神不足者視其虛絡按而致之刺而利之無出其血無泄其氣以通其經神氣乃平帝曰刺微奈何曰按摩勿釋著針勿斥移氣於不足神氣乃得復

氣有餘則喘咳上氣不足則息利少氣血氣未并五藏安定皮膚微病命曰白氣微泄氣有餘則瀉其經隧無傷其經無出其血無泄其氣不足則補其經隧無出其氣問曰

刺微奈何對曰按摩勿釋出針視之曰我將深之適人必革精氣自伏邪氣散亂無所休息氣泄腠理真氣乃相得血有餘則怒不足則恐血氣未并五藏安定孫絡水溢則經有留血血有餘則瀉其盛經出其血不足則視其虛

經內針其脉中久留而視脉大疾出其針無令血泄問曰刺留血奈何對曰視其血絡刺出其血母令惡血得入於經以成其疾形有餘則腹脹溼瘦不利不足則四肢不用血氣未并五藏安定肌肉蠕動命曰微風形有餘則瀉其陽經不足則補其陽絡問曰刺微奈何對曰取分肉間無中其經無傷其絡衛氣得復邪氣乃索志有餘則腹脹食泄不足則厥血氣未并五藏安定骨節有動志有餘則瀉然筋即然筋即然客穴問曰刺未并奈何對曰即取之無中其經邪所乃能立虛問曰虛實之形不知其何以生對曰血氣已并陰陽相傾氣亂於衛血逆於經血氣離居一實一虛夫五藏之虛實皆生於血氣之盛而實也不足者血氣離去其藏衰而虛也經氣未并五藏安定者五藏之血氣未并為實未離為虛者安定其睛而陰陽均平久留者一邪初客之時故當即治若其初不治則漸并漸離而虛藏所離之血氣有并歸於實藏所以

陰陽相傾而不均平衛亂榮逆而三候不一實藏自實虛藏自虛而一實一虛也然所謂一盛一虛者不獨五藏也凡陰陽表裏上下經絡皆然也故病有陽盛陰虛陰盛陽虛有經滿絡虛絡滿經虛者所謂無實實虛虛損不足益有餘者海藏所謂上熱未除中寒復生之類皆治一實一虛宜究心焉

血并於陰

并於陰乃為臯中

熱也

血并於上氣并於下心煩惋善怒

血并於下氣并於上亂而善忘問曰血并於陰氣并於陽如是血氣離居何者為實何者為虛對曰血氣者喜溫而惡寒寒則泣不能流溫則消而去之是故氣之所并為血虛血之所并為氣虛問曰人之所有者血與氣耳今夫子乃言血并為虛氣并為虛是無實乎對曰有者為實無者為虛故氣并則無血血并則無氣今血與氣相失故為虛焉絡之與孫脉俱輸於經血與氣并則為實焉血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死問

大醫學綱卷七

大

曰實者何道從來虛者何道從去虛實之要願問其故對曰夫陰與陽皆有俞會陽注於陰陰滿之外陰陽均平以充其形九候若一命曰平入夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒問曰風雨之傷人也奈何對曰風雨之傷人也先客於皮膚傳入於孫脉孫脉滿則傳入于絡脉絡脉滿則輸于大經脉血氣與邪并客於分腠之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不可按之按之則痛問曰寒濕之傷人也奈何對曰寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊禁血泣衛氣去故曰虛虛者聶辟聶謂聶駝辟謂聶也氣不足按之則氣足以溫之故快然而不痛問曰陰之生實奈何對曰喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走之故曰實矣問曰陰之生虛奈何對曰喜則氣下悲則氣消

滑則脉虛空因寒飲食寒氣充滿則血泣氣去故曰虛矣
問曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰虛則內寒
予已聞之矣不知其所由然也對曰陽受氣於上焦以溫
皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒
氣獨留于外故寒慄問曰陰虛生內熱奈何對曰有所勞
倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣
薰胸中故內熱問曰陽盛生外熱奈何對曰上焦不通利
則皮膚緻密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄越故外熱
問曰陰盛生內寒奈何對曰厥氣上逆寒氣積於胸中而
不瀉不瀉則溫氣去寒獨留則血凝泣凝則脉不通其脉
盛大以瀉故中寒問曰陰與陽并血氣以并病形已成刺
之奈何對曰刺之者取之經隧取血於營取氣於衛用形
哉因四時多少高下問曰血氣以并病形以成陰陽相傾

補瀉奈何對曰瀉實者氣盛乃納針針與氣俱內以開其
門如利其戶針與氣俱出精氣不傷邪氣乃下外門不閉
以出其疾搖大其道如利其路是謂大瀉必切而出大氣
乃屈問曰補虛奈何對曰持針勿置以定其意候呼內針
氣出針入針空四塞精無從去方實而疾出針氣入針出
熱不得還閉塞其門邪氣布散精氣乃得存動氣候時近
氣不失遠氣乃來是謂追之

調經論

補瀉法

帝曰不足者補之奈何岐伯曰必先捫而循之切而散
之推而按之彈而怒之抓而下之通而取之外引其門以
閉其神呼盡內針靜以久留以氣至焉為故如待所貴不知
日暮其氣以至適而自護候吸引針氣不得出各在其處
推闔其門令神氣存大氣留止故命曰補 吸則內針無
令氣忤靜以久留無令邪布吸則轉針以得氣故候呼引

針針盡乃去大氣皆出故命曰瀉

雜合真邪論

補法左手插穴右手置針於穴上令病人咳嗽一聲撚針入透於腠理後令病人呼氣一口隨呼針至分寸待針沉緊時轉針頭向病所以手循捫經絡覺氣至却因針頭向下覺針沉緊令病人吸氣一口急出其鍼急閉其穴虛羸氣弱痺麻者補之

瀉法先以左手插穴右手置針於穴上令病人咳嗽一聲撚針入于腠理復令病人吸氣一口隨吸氣入針至分寸覺針沉緊轉針頭向病所若覺氣退便轉針頭向下以手循取經絡覺針沉悶令病人吹氣一口徐出其針不閉其穴命之曰瀉豐肥堅硬疼痛者瀉之

右以病人氣之呼吸醫人針之出納分補瀉令病人吸氣而入針氣與針同入為補令呼氣出針針與氣同出

為瀉呼氣氣出而入針為瀉吸氣氣入而出針為補也

論何謂補瀉當補之時何所取氣當瀉之時何所置氣然當補之時從衛取氣當瀉之時從榮置氣其陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰而後瀉其陽榮衛通行此其要也

七十
六難

針有補瀉何謂也然補瀉之法非必呼吸出入針也然知其為針者信其左不知為針者信其右當刺之時必先以左手厭按其所針榮膺之處彈而努之爪而下之其氣之來如動脈之狀順針而刺之得氣因推而內之是謂補動而伸之是謂瀉不得氣乃與男外女內不得氣是謂十死

不治也

七十
八難

右以鍼之推內動伸分補瀉也從衛取氣者謂淺內針待衛氣至漸漸推內進至深也從榮置氣者謂深內針

待榮氣至却漸動伸退至淺也蓋補者針入腠理得氣後漸漸作三次推內進至分寸經所謂徐內疾出世所謂一退三飛熱氣榮榮者是也瀉者直針入分寸得氣後漸漸作三次動伸退出腠理經所謂疾內徐出世所謂一飛三退冷氣沉沉者是也

經言能知迎隨之氣可令調之調氣之方必在陰陽何謂也然所謂迎隨者知榮衛之流行經脉之往來也隨其逆順而取之故曰迎隨調氣必在陰陽者知其內外裏隨其陰陽而調之故曰調氣之方必在陰陽七十難

右以迎隨分補瀉也然迎隨之法有三此法以針頭迎隨經脉之往來一也又瀉子爲迎而奪之補母爲隨而濟之二也取前法呼吸出納針亦名迎隨三也又針頭之隨者謂榮衛之流行經脉之往來手之三陰從胸走

醫學綱目卷七

主

手手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹也迎者以針頭斜迎三陰三陽之來處針去也隨者以針頭斜隨三陰三陽之往處針去也

夫行針者當刺之時口溫針煖先以右手揣按其所鍼榮俞之氣彈而怒之抓而下之捫而循之通而取之隨病人咳嗽一聲右手持針而刺之春夏二十四息秋冬三十六息徐出徐入氣來如動脉之狀補者隨經脉推而內之左手閉針孔徐出針而疾按之瀉者迎經脉動而伸之左手閉針孔疾出針而徐按之隨而濟之是謂補迎而奪之是謂瀉

右合迎隨推內動靜二法言補瀉也

靈補須一方實深取之稀按其痛以極出其邪氣一方虛淺刺之以養其脉疾按其痛毋使邪氣得入 脉實者深

刺之以泄其氣，脈虛者淺刺之，使精氣無得出，以養其脈，獨出其邪氣。終始

右以淺深分補瀉，淺為補，深為瀉也。

竇凡補瀉，非必呼吸出內，而在乎手指何謂也？故動搖搖進，退搖盤彈，撚指循捫，攝按抓切者是也。動者如氣不行，將針伸提而已。退者為補瀉，欲出針時各先退一頭許，然後却留針方可出之，此謂之退也。搓者，凡令病人覺熱，外向臥針，似搓線之狀，勿轉太緊，治寒向裏臥，依前轉法以為搓也。進者，凡不得氣，男外女內者，及春夏秋冬各有進退之理，此謂之進也。盤者，為如針腹部于穴內，輕盤搖而已，此謂之盤也。搖者，凡瀉時欲出針，必須動搖而出者是也。彈者，凡補時用大指甲輕彈針，使氣疾行如瀉不可用也。撚者，以手撚針也，務要記左右左為

醫學綱目卷七

主

外右為內也。循者，凡下針於所部分經絡之處，用手上下循之，使氣血往來，經云推之則行，引之則止。捫者，凡補者出針時，用手捫閉其穴是也。攝者，下針時如氣澁滯，隨經絡上用大指甲上下切其氣，血自得通行也。按者，以手按針，無得進退，如按切之狀也。抓者，凡下針用，手指作力置針有准也。切者，凡欲下針，必先大指甲左右于穴切之，令氣血宣散，然後下針是不傷榮衛故也。問穴各有兩如補瀉，只刺病所，取兩穴俱刺，即曰不然，隨病左右而補瀉之，左則左補，右則右補。問針經云，灸幾壯，針訖而後灸，何也？曰針則針矣，則灸若針而弗灸，若灸而弗針。

難言有見如入，有見如出者，何謂也？曰謂左手見氣未至，乃內針，針入見氣盡，乃出針，是謂有見如入，有見如出也。

王註謂此法取有其
經者未然見八十難

靈所謂氣至而有效者瀉則益虛虛者脉太如其故而不
堅也堅如其故者適雖言快病未去也補則益實實者脉
大如其故而益堅也大如其故而不堅者適雖言快病未
去也故補則實瀉則虛痛雖不隨針病必衰去終始

素刺虛者須其實刺實者須其虛針解云刺實須其虛者
為針陰氣盛至針下寒
乃去針也刺虛須其實者為針陽氣盛至針
下熱乃去針也王註云要以氣至而有效也

靈三脉動于足大指之間必審其實虛虛而瀉之是謂重
虛重虛者病益甚凡刺此者以指按之脉動而實且疾者
疾瀉之虛而徐者則補之反此者病益甚其動也陽明在
上衝陽脉也厥陰在中脉也少陰在下脉也

難言東方實西方虛瀉南方補北方何謂也然金木水火
土當更相平東方木也西方金也木欲實金當平之火欲

八醫學綱目卷七

重

實水當平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實
土當平之東方者肝也則知肝實西方者肺也則知肺虛
瀉南方火補北方水南方火者木之子也北方水者
木之母也水勝火子能令母實母能令子虛故瀉火補水
欲令金不得平木也經曰不能治其虛何問其餘此之謂
也七十五難金不得
平木不字衍文

素上實下虛切而從之索其經絡脉刺出其血以見通

靈一經上實下虛而不通者此必有橫絡盛加於大經令
之不通視而瀉之此所謂解結也邪之所在皆為不足

故上氣不足胸為之不滿耳為之苦鳴頭為之苦傾目為
之暝中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則乃
為痿厥心倦補足外踝下留之上氣不足推而揚之下
氣不足積而從之陰陽皆虛火自當之

甲內傷不足三陽絡主之

陰陽不相移虛實不相傾取之其經終始

難言虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之何謂也曰

虛者補其母實者瀉其子當先補之然後瀉之不實不虛

以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故

言以經取之也六十九難

右自篇首分陰陽臟腑虛實而施補瀉法者皆謂陰陽

相移虛實相傾而血氣所離之經為虛所并之經為實

故一實一虛而用針補虛瀉實矣若陰陽不相移虛實

不相傾則血氣未離并無虛經無實經但取本經自病

不於他經補瀉也

刺五亂

靈帝曰經脉十二者別為五行分為四時何失而亂何得

而治岐伯曰五行有序四時有分相順則治相逆則亂帝

曰何謂相順對曰經脉十二者以應十二月十二月者分

為四時四時者秋冬春夏其氣各異榮衛相隨陰陽已和

清濁不相干如是則順之而治帝曰何謂逆而亂對曰清

氣在陰濁氣在陽榮氣順脉衛氣逆行清濁相干亂于胸

中是為大惋故氣亂于心則煩心密嘿俯首靜伏亂于肺

則俛仰喘喝接手以呼亂于腸胃則為霍亂亂于臂脛則

為四厥亂于頭則為厥逆頭重眩仆帝曰五亂者刺之有

道乎岐伯曰氣在于心者取之手少陰主之輸氣在于肺

者取之手太陰榮足少陰輸氣在于腸胃者取之足太陰

陽明不下者取之三里氣在于頭者取之天柱太杼不知

取足太陽榮輸氣在于臂足取之先去血脉後取其陽明

少陽之榮輸帝曰補瀉奈何對曰徐入徐出謂之導氣補

瀉無形謂之同精是非有餘不足也亂氣之相逆也五亂

邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其擊邪

素肝病者兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目眈眈無見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者脅者肝之野怒者肝之用肝實則氣并其經故脇痛

靈邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之其輸也

素心病者胃中痛脇支痛脇下痛膺背脊甲間痛兩臂內痛虛則胸腹大脇下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者胃者心之野背有胃者心之府小腸經所過心實故氣

靈邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善

醫學綱目卷七

五

饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有熱有寒皆調于三里

素脾病者身重善饑肉痿足不收行善癢脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者

靈邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外俞背三節五藏之傍以手疾按之快然乃刺之取

之缺盆中以越之

素肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀膺跗足皆痛虛則少氣不能報息耳聾隘乾取其經太陰足太陽之外厥陰內血者

靈邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難有背脛項痛時眩取之湧泉崑崙崑崙視有血者盡取

刺太肝

素腎病者腹大脛腫喘咳身重寢汗出憎風虛則胸中痛
大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者已上靈
出五邪

篇素出藏
氣法時篇

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒即泄當
臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉邪氣藏府
病形篇腹

中腸鳴氣上衝胸端不能久立邪在大腸刺盲之原巨虛

上廉三里四時
氣篇

胃病者腹脹脹胃脘當心而痛上支兩脇膈噎不通飲食

不下取之三里同上五
邪篇

飲食不下膈塞不通邪在胃脘

在上脘則刺抑而下在下脘則散而去之同上四
時篇

小腸病者小腸痛腰脊控牽而痛時窘之後當耳前熱若

寒甚若獨肩熱其及手小指次指之間熱若脉陷者此

其候也手太陽病也取之巨虛下廉同上邪
氣篇

小腹控牽

醫學綱目卷七

五

引腰脊上衝心邪在小腸病者小腸者連臍系屬于脊貫

肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃燥肝散于胃結于臍

故取之盲原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨

虛下廉以去之按其所過之經而調之同上四
時篇

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩

上熱若脉陷及足小指外廉及脛踝後皆熱若脉陷取委

中央同上邪
氣篇

三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即

為脹候在足太陽之外大絡大絡在太陽少陽之間亦見

于脉取委陽小腹痛腫不得小便邪在三焦約取之太陽

大絡視其脉絡與厥陰小絡結而血者腫上及胃脘取三

里同上四
時篇

臍病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之噤中

十二經
病

哕然數唾在足少陽之本末亦視其脉之陷下者灸之

其寒熱者取陽陵泉

同上邪氣篇

善嘔嘔有苦長太息心中

澹澹恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆

則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以

閉膽逆却調其虛實以去其邪

同上四邪篇

靈寸口主中人迎主外兩者相應俱往俱來若引繩大小

齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是者名曰平人

人迎大一倍于寸口病在足少陽一倍而躁病在手少陽

人迎二倍病在足太陽二倍而躁病在手太陽人迎三倍

病在足陽明三倍而躁病在手陽明盛則為熱虛則為寒

緊則為痛痺代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊痛則

取之分肉代則取血絡且飲藥陷下則灸之不盛不虛以

經取之名曰經刺人迎四倍且大且數者名曰溢陽溢陽

醫學綱目卷七

支

為外格死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏府之

病

禁服

人迎一盛瀉足少陽而補足厥陰二瀉一補日

一取之必切而驗之踈取之上氣和乃止人迎二盛瀉足

太陽而補足少陰二瀉一補二日一取之必切而驗之踈

取之上氣和乃止人迎三盛瀉足陽明而補足太陰二瀉

一補日二取之必切而驗之踈取之上氣和乃止

終始篇

寸口二倍病在足少陰二倍而躁在手少陰寸口三倍病

在足太陰三倍而躁在手太陰盛則脹滿寒中食不化虛

則熱中出糜少氣溺色變緊則痛痺代則乍痛乍止盛則

瀉之虛則補之緊則先刺而後灸之代則取血絡而後調

之陷下則徒灸之陷下者脉血結于中中有著血而寒故

宜灸之不盛不虛以經取之寸口四倍者名曰內關內

關者且大且數死不治必審察其本末之寒溫以驗其藏府之病通其榮輸乃可傳于大數大數曰盛則徒瀉之虛則徒補之緊則灸刺且飲藥陷下則徒灸之不盛不虛以經取之所謂經治者飲藥亦曰刺灸脉急則引脉大以弱則欲安靜用力無勞也禁服 脉口一盛瀉足厥陰而補

足少陽二補一瀉日一取之必切而驗之疎而取之上氣和而止脉口二盛瀉足少陰而補足太陽二補一瀉二日一取之必切而驗之疎而取之上氣和乃止脉口三盛瀉足太陰而補足陽明二補一瀉日二取之必切而驗之疎而取之上氣和乃止所以日二取之者太陰主胃大富于穀氣故可日二取之也終始 人迎與脉口俱盛三倍以

上命曰陰陽俱溢如是者不開則血脉閉塞氣無所行流淫于中五藏內傷如此者因而灸之則變易為他病矣上

肺手太陰之脉是動則病肺脹滿膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而脊此為臂厥是主肺所生病者欬嗽上氣喘渴煩心胃滿臍臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍于人迎虛者則寸口反小于人迎也

脾足太陰之脉是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心中急痛寒瘧瘡癢泄水閉黃疸不能臥強立股膝內腫厥足大指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反

小于人迎也

大腸手陽明之脉是動則病齒痛頰腫是主津液所生病者目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指不用氣有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

胃足陽明之脉是動則病洒洒振寒善呻數欠顏黑病至則惡人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為鬲厥是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎唇脣頸腫喉痺大腹水腫膝膺腫痛循膺乳氣街股伏兔胛外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于胃則消穀善

醫學綱卷七

无

饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

心手少陰之脉是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

腎足少陰之脉是動則病饑不欲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起目眈眈如無所見心如懸若饑狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是為骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣隘乾及痛煩心心痛黃疸腸

辨脊痠股內後廕痛痿厥嗜臥足下熱而痛爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

小腸手太陽之脉是動則病噤痛領腫不可以顧肩似拔臚似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頰有臚肘臂外後廕痛爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

膀胱足太陽之脉是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲脘如結喘如裂是爲踝厥是主筋所生病者痔瘡狂顛疾頭顛項痛目黃淚出軌衄項背腰尻脘喘脚皆痛小指不用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱

醫學綱目卷七

則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

心主手厥陰心包絡之脉是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則臂背反滿心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于人迎虛者寸口反小于人迎也肝足厥陰之脉是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癩疝婦人少腹腫甚則噤乾面塵脫色是主肝所生病者胃滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癆爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

三焦手少陽之脉是動則病耳聾渾渾焯焯噤腫喉痺是

主氣所生病者汗出目銳背痛頰痛耳後有膈肘臂外皆痛小指次指不爲用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

膽足少陽之脉是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛領痛目銳背痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾瘰癧汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

俱見經脉篇

難言脉有是動有所生病一脉輒變爲二病者何也然經言是動者氣也所生病者血也邪在氣氣爲是動邪在血

《醫學綱目》卷七

三

血爲所生病氣主响之血主濡之氣留而不行者爲氣先病也血滯而不濡者爲血後病也故先爲是動後所生也

二難十

右十二經爲病通表裏而言若其病或見于表或爲疼痛或爲癱瘓者但當于其所痛之分野求其經脉屬何經而鍼灸之也另立經脉分野圖于左

頭部

顛足太陽厥

頭角直耳上中是

中行前直鼻上顛後直

第二行足太陽一寸五分各

第三行足少

斷兩傍爲頭第三行

面部

額足少陽

鼻足太陽明太陽

人中督脉手

唇足陽明督脉

唇內足厥陽

承漿足陽明任脈

上齒足陽明

下齒手陽明

舌足太陰少陰

目內眦手足陽明手足太陰

目銳眦足少陽手足太陽

眉至額直鼻而上督脈直目內眦而上足太陽

直目瞳子而上足少陽

頰直目瞳子而下足陽明

直目眦而上手足少陽

耳手足少陽手太陽

頰車足少陽陽明

頸項部

項中間

拔項大筋中足太陽

當完骨下手少陽項大筋之前耳之後也

當耳下足少陽

當曲頰下手太陽

曲頰前一寸手陽明

挾喉兩旁動脈足太陽陽明

缺盆中任脈

咽手太陰少陰足太陰

喉臑足少陰陽明

醫學綱目卷七

三

喉嚨後足厥陰

肩

前廉手陽明

後廉手太陽

上廉手少陽

背部

中行督脈

第二行足太陽

第三行足太陽

膺輸部

中行任脈

第二行足少陰

第三行足陽明

第四行足太陽

腹部

中間行任脈

第二行足少陰

第三行足陽明

第四行足太陽

腋下

中間手厥陰

前手太陽

後手太陰

脇部

腋直下髀樞足少陽

臑部

自肩至肘曰臑

前手太陽

後手太陽

外手太陽

內手少陰

內前手太陰

內後手少陰

臂部

上手陽明

下手太陰

外手少陽

內手厥陰

內上手太陰

內下手少陰

醫學綱目卷七

三

股脛部

前足太陽

後足太陽

外足少陽

內足厥陰

內前足太陰

十二經別終

靈手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入于魚際其病實則手銳掌熱虛則欠故小便遺數取之去腕半寸別走陽明也

足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所別也

手少陰之別名曰通里去腕一寸半別而上行循經入于心手少陰之本屬目系其實則支膈虛則不能言取之掌後一寸別走太陽也

足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者并經上走于心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉滯虛則腰痛取之所別也

手心主之別名曰內關去腕二寸出于兩筋之間循經以上繫于心包絡心系實則心痛虛則爲頭項強取之兩筋間也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者徑脛上辜結于莖其病氣逆則辜腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所別也

手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡有髃實則節弛肘廢虛則生肱小者如指痲疥取之所別也

足太陽之別名曰飛陽去踝七寸別走少陰實則靴室頭背痛虛則靴舄取之所別也

手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂乘有髃上曲頰偏齒其別者入耳合於宗脉實則齟齬虛則齒寒痺隔取之所別也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痺痒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也

手少陽之別名曰外關去腕二寸外透臂注胸中合心主病實則肘攣虛則不收取之所別也

足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿躄坐不能起取之所別也

任脉之別名曰尾翳下鳩尾散于腹實則腹皮痛虛則痒搔取之所別也

督脉之别名曰長強挾脊下項散頭上下當肩脾左右別走太陽入貫鬻實則項強虛則頭重取之所別也

脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布胸脇實則身盡痛虛則百節盡皆縱此脉若羅絡之血者皆取之脾之大絡也 凡此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求

之上下入經不同絡脉異所別也

俱出經脈篇

素黃帝曰余聞繆刺未得其意敢問何也岐伯對曰夫邪之客於形也必先舍於皮毛留而不去入舍於孫脉留而不去入舍於絡脉留而不去入舍於經脉內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入極於五藏之次也如此則治其經焉今邪客於皮毛入舍於孫絡留而不去閉塞不通不得入于經流溢大絡而生奇病也夫邪客大絡者左注右右注左上下左右與經相干而布於

入醫學綱目卷七

圭一

四末其氣無常處不入於經俞命曰繆刺帝曰願聞繆刺以左取右以右取左柰何其與巨刺何以別之岐伯曰邪客於經左盛則右病右盛則左病亦有移易者左痛未已而右脉先病如此者必巨刺之必中其經非絡脉也故絡病者其痛與經脉繆處故命曰繆刺

調經篇云身形有痛九候莫病則繆刺之痛在干左而右脉病者巨刺之盖身形有痛邪在絡脉故繆刺絡脉于井穴也病在於左而右脉病則知邪偏入半邊經脉而半邊經脉偏盛并引其無病者半邊亦痛故宜刺經脉於左邊偏盛者之榮俞也

帝曰願聞繆刺柰何取之何如岐伯曰邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無積者刺然骨之前出血如食頃而已不已左取右右取左病新發者取五日已

邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛
手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痛壯
者立已老者有頃已左取右右取左比新病數日已邪
客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉
交者各一痛男子立已女子立頃已左取右右取左邪
客於足太陽之絡令人頭項痛刺足大指爪甲上與肉
交者一痛立已不已刺外踝下三痛左取右右取左如食
頃已邪客于手陽明之絡令人氣滿胃中喘息而支肘
胸中熱刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痛左取
右右取左如食頃已邪客於掌臂之間不可得屈刺其
踝後先以指按之痛乃刺之以月死生爲數月生一日一
痛二日二痛十五日十五痛十六日十四痛邪客於足
陽蹻之脉令人目痛從內眦始刺外踝之下半寸所各二

痛左取右右取左如行十里頃而已人有所墮墜惡血
留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下
傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脉出血刺足跗
上動脉不已刺三毛上各一痛見血立已左刺石右刺左
邪客于手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大指次
指爪甲上去端如韭葉各一痛立聞不已刺中指爪甲上
與肉交者立聞其不時聞者不可刺也耳中生風者亦刺
之如此數左刺右右刺左凡痺往來行無常處者在分肉
間痛而刺之以月死生爲數用針者隨氣盛衰以爲痛數
針過其日數則脫氣不及日數則氣不瀉左刺右右刺左
病已止不已復刺之如法月生一日一痛二日二痛漸多
之十五日十五痛十六日十四痛漸少之邪客於足陽
明之絡令人軌衄上齒寒刺足中指次指爪甲上與肉交

者各一瘡左刺右右刺左 邪客於足少陽之絡令人脇痛不得息欬而汗出刺足小指次指爪甲上與肉交者各一瘡不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右右刺左病立已不已復刺如法 邪客於足少陰之絡令人嗑痛不可肉食無故善怒氣上走貴上刺足下中央之脉各三瘡凡六刺立已左刺右右刺左左刺右右刺左唾時不能出唾者刺然骨之前出血立已左刺右右刺左邪客於足太陰之絡令人腰痛引少腹控眇不可以仰息刺腰虎之解兩胛之上是腰俞以月死生爲瘡數發針立已左刺右右刺左 邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引脇而痛刺之從項始數脊椎挾脊疾按之應手如痛傍刺之三瘡立已 邪客於足少陽之絡令人留于樞中痛髀不可舉刺樞中以毫針寒則久留針以月死生爲數

立已治諸經刺之所過者不病則繆刺之 耳聾刺手陽明不已刺其通脉出耳前者 齒齲刺手陽明不已刺其脉入齒中者立已 邪客于五藏之間其病也脉引而痛時來時止視其病繆刺之手手足爪甲上視其脉出其血間日一刺一刺不已五刺已繆傳引上齒齒唇寒痛視其手背脉血者出之足陽明中指爪甲上一瘡手大指次指爪甲上各一瘡立已左取右右取左 邪客于手足少陰太陽足陽明之絡此五絡皆會于耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一瘡後刺手大指內側去端如韭葉後刺手心至少陰銳骨之端各一瘡立已不已以竹管吹其兩耳鬢其左角之髮方一寸燔治飲以美酒不能飲者灌之立已

凡刺之數先視其經脉切而從之審其虛實而調之不調者經刺之有痛而經不病者繆刺之因視其皮部有血絡者盡取之此繆刺之數也

俱出繆刺論

靈黃帝曰願聞奇邪而不在經者岐伯曰血絡是也帝曰刺血絡而仆者何也血出而射者何也血少黑而濁者何也血出清而半爲汁者何也發針而腫者何也血出若多若少而面色蒼蒼者何也發針而面色不變而煩惋者何也多出血而不動搖者何也願聞其故岐伯曰脉氣盛而血虛者刺之則脫氣脫氣則仆血氣俱盛而陰氣多者其血滑刺之則射陽氣畜積久留而不瀉者其血黑以濁故不能射新飲而液滲于絡而未和于血也故血出而汁別焉其不新飲者身中有水久則爲腫陰氣積于陽其氣因于絡故刺之血未出而氣先行故腫陰陽之氣其新相得

八醫學綱目卷七

五

而未和合因而瀉之則陰陽俱脫表裏相離故脫色而蒼蒼然刺之血出多色不變而煩惋者刺絡而虛經經虛之屬于陰者陰脫故煩悶陰陽相得而合爲痺者此爲內溢於經外注於絡如是者陰陽俱有餘雖多出血而弗能虛也帝曰相之奈何岐伯曰血脉者盛堅橫以赤上下無常處小者如針大者如筋則其瀉之萬全也故無失數矣失數而反各如其度黃帝曰針入而肉著者何也岐伯曰熱氣因于針則針熱熱則肉著于針故堅焉

血絡論○經脉篇云諸刺絡脉爲痺也又云其小而短者少氣甚者瀉之則悶甚則仆不得言悶則

急坐之也

右刺藏府經絡四病各不同十五絡病至淺在表也十二經病次之六腑病又次之五臟病至深在裏也故治法有難易焉至於絡又各不同十五絡之絡乃陰經別

走陽經陽經別走陰經而橫貫兩經之間所謂橫者爲絡與經相隨上下者也繆刺之絡乃病邪流溢大絡不得入貫經俞而其痛與經脈繆也乃絡病經不病者也血絡之絡及皮膚所見或赤或青或黑之絡而小者如針大者如筋也以淺深言之血絡至淺繆刺者次之十五絡近裏而貫經俞也

四海

胃者水穀之海其輸上在氣衝下在三里水穀之海有餘則腹滿不足則饑不受穀食

衝脈者爲十二經之海其輸上在于大杼下出于巨虛之上下廉血海有餘則常想其身大怫然不知其所病血海不足亦常想其身小狹然不知其所病

膻中者氣之海其輸上在于柱骨之上下前在于人迎氣海有餘者氣滿胃中悅息面赤氣海不足則氣少不足以

入醫學綱目卷七

五九

言

腦爲髓之海其輸上在于其蓋下在風府髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安臥審守其輸而調虛實

刺寒熱

入治寒熱法

杭州圖書館