LOTREA

Barbatula quignardi (Bacescu-Mester, 1967)

Klasea: Actinopterygii
Ordena: Cypriniformes
Familia: Balitoridae

Banaketa

Pirinioetako ibaietako espeziea da. Bidasoa eta Nerbioi ibaien artean eta Ebro ibaiaren arroan dago. Orbigo (Duero arroa) eta Saja (Kantabria) ibaietan sartua.



Deskribapena

Luzera <21 cm.
Normalki 10 eta 15 cm. artean.
Gorputz zilindrikoa, isatsaren aldea izan ezik, itxura konprimatuagoa duela.



Bere tamaina txikiak, bere koloreak eta ibaiaren ohean geldirik egoteak oharkabean igarotzea eragiten du.

Iraute egoera

Espainian: kaltebera

Nafarroako ornodun basatien erregistroan "interes berezikotzat" jotzen da.
Aragoiko espezie mehatxatuen katalogoaren eranskinean "interes berezitzat" jotzen da.

Mehatxuak

1-Espezie exotiko harrapariak.



2-Ibaien kutsadura



3-Habitataren suntsiketa





Elikadura

Gauez elikatzen da batez ere. Uretako ornogabeak eta lehorteak jaten dituzte.

Ekologia

Harri, legar edo hareazko hondoetan bizi diren arrain bentonikoak dira. Ur lasterrak, sakonera eskasekoak eta argiak nahiago dituzte. Taldetan edo sardatan elikatzen da.

Ugalketa

Apirila eta ekaina bitartean emeak 1 mm-ko diametroa duten 700 eta 5.000 arrautza artean erruten ditu hondoan edo landaretzaren artean.
Heldutasun sexuala 2-3 urterekin lortzen du.

Egilea: María José Calvo

Bibliografia

-Antón, 2006. Peces fluviales de Bizcaia. Distribución , demografía y nicho ecológico con aplicaciones de gestión. UPV/EHU
-Doadrio, 2011.Ictiofauna Continental Española. Bases para su seguimiento. DG Medio Natural y Política Forestal. Madrid
-Sostoa, A. de., Maceda, A., Figuerola, B., Canyelles, A., Cardoso, C., Monroy, M., Caiola, N., 2011. Desarrollo y aplicación de un índice de integridad biótica para la cuenca del Ebro basado en el uso de los peces como indicadores biológicos. Confederación Hidrográfica del Ebro. Universitat de Barcelona.