



漢書門類			
一	二	三	四
四	六	九	二
冊	架	函	號

內閣文庫			
函	架	冊	號
101	12463	44	33
17	301	90	


內閣文庫			
番號	漢	12463	
冊數	44 ( 33 )		
函號	301	90	



大學東  
校典藉  
局之印



赤水玄珠幼科三十二卷目錄  
外腎光腫門  
痢門



瘡門

吃坭

吃生米門

耳門

龜胸魚背門

虫門

赤水玄珠

三十二卷目錄

赤水玄珠 卷三十二 目錄

痔門

癩門

耳門

齒門

目門

口門

鼻門

舌門

喉門

目錄終

赤水玄珠幼科第三十二卷

新安生生子孫一奎著輯

外腎光腫門

小兒陰腫多由甘肥不節濕熱下流或啼哭怒氣不順或失坐冷地皆能致之  
丹溪謂脫囊腫大墜下不收以紫蘇莖葉為末水調荷葉包之又謂一人傳此方用野白紫蘇為

赤水玄珠 卷三十二

未濕則乾，搽乾則香油調敷。雖皮潰而核欲墜，悉有神功。

菝仁丸 治怒氣不順，啼哭鬱氣結於肝經，發為

陰腫，或為偏墜，或水竇不通，亦能發腫。此方主

之。菝仁去皮 桂心 黑荳微炒 白蒺藜炒研

牡丹皮 大黃各等分 右為末，煉蜜丸。麻子大

每服五丸，或七丸。青皮、木香、葱白煎湯入鹽

少許送下。或煎大流氣飲，研青木香送下。

丹溪 用木通、甘草、黃連、當歸、黃芩煎服。

牡蠣散 小兒外腎腫大，莖物光明。

牡蠣煨為細末，以津唾調塗腫處，即消。

又方 加地龍末一分。如外腎熱者，以鷄子清調敷。

又方 治小兒外腫。菝仁研如泥，津唾調敷。

青木香丸 寬中快胃，腹脇疼痛，心下堅痞，腸中

水聲，陰腫偏墜。

黑荳炒一兩 青木香 補骨脂炒 萹澄茄

栝柳各四 先将栝柳用粟米包外再以湿纸裹煨令焦去飯取栝柳全前藥為末滴水丸荒荳大每服二十九白湯下

又方 治偏墜 防風 牡丹皮

為末酒調服一二錢立効 或白湯入鹽下

又方 治偏墜 五苓散內加防風牡丹皮極効

有熱者服三黃丸

三白散 膀胱蘊熱風濕相承發為陰腫小便不利

白荳炒二兩 素白皮 白朮 木通 陳皮各五錢

右為末每二錢姜湯調服

蟬退散 陰囊忽腫或坐地多時感受風濕或為

虫蟻所吹

用蟬退五錢水一碗煎湯薰洗腫處腫消痛止

須洗二三次後服五苓散以燈心湯調服

又方 葱地上蚯蚓糞為末煎甘草汁調敷腫上

或薄荷汁調亦妙

痢門

小兒痢疾外感少而內傷多故曰無積不成痢也

但當審諦新久虛實若新起而腹痛手不可近  
後重裏急日夜頻逆小水短少稠粘之物若膿  
若血不計遍數者急宜下之下後看輕重再為  
調補噤口者審其從時令之氣而來必發熱  
用參敗毒散加陳倉米有熱毒薰蒸胃口虛  
而不納穀或乾噦嘔惡者以辰砂益元散用生  
姜汁調燈心湯送下若痢久而腸胃虛弱者但  
當補養氣血蓋虛回而痢自止也脾胃健飲食  
進痢自旋止日數雖多而無誤於事也小便不

利者當利之清六九佳  
人參敗毒散治四時不正之氣發為寒熱瘧痢  
或遍身作痛嘔噦惡心噤口方見丹毒赤遊  
加陳皮姜莖  
香脯小兒刮腸下痢噤口不食閉口合眼至重  
山危困精猪肉一兩批膩粉將猪肉於炭  
火上慢炙旋鋪膩粉令勻成脯每以少許與吃  
如味知吃且放鼻邊自然要吃此方治胃口有  
毒食之神効

赤火...

百一選方 治噤口痢

遵肉去壳留心碾為末每服半錢陳米飲調下  
此是毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食

山藥散 噤口痢

乾山藥一兩半炒熟 半生用 為末白湯調二錢服之

嘔噦立止

茅花湯 吐血下血鼻衄血痢黑痢

茅花一大把水煎服無花用根代之

枳殼寬腸散 順氣治痢

甘草錢灸六 枳殼炒二兩 四錢 為末每服一錢空

心白湯調下

烏梅湯 治下痢津液少臟腑虛燥煩渴引飲及

諸病後煩渴引飲無度

烏梅肉微炒 五錢 白茯苓 木瓜各一兩 右每三

錢姜一片水煎服

清六丸 治血痢小水短少及洩瀉 此方專清

六府濕熱故名清六內用紅麴者以其能消食

積而化淤血也

桂府白滑石飛過六兩 炙甘草一兩 紅麴炒五錢

右滴水為丸，灯心湯下，二十九

芍藥湯 治赤白膿血裏急後重腹中疼痛，劉守

真云行血則便膿自愈，調氣而後重自除，此方

是也 白芍藥二錢 當歸一錢 酒連 酒苓各錢

木香 枳榔各五分 肉桂四分 甘草二分 水煎服

小水短少，日夜後重者，加只壳升麻桃仁各一

錢，滑石三錢，若積滯重而熱盛者，加大黃一

錢

保和丸 食積痢腹疼，不知餓，用此消之

山查 神麴各二兩 陳皮 半夏各一兩 蘿蔔子

連翹炒各五錢 右末仍以神麴為丸，荒荳大每

服一錢，白湯下

小香連丸 裏急後重腹疼赤白痢

黃連吳茱萸各一兩，全炒只用連 木香二錢 訶子煨去核五錢

右為丸，麴糊為丸，荒荳大每三十九丸，米飲下

地榆散 治赤痢無糞，鮮紅點滴而下

地榆炒蜜 訶肉煨 甘草各一分



為末每服一錢米飲調下

地榆飲 熱痢腹痛赤白頻併

地榆 錢二 甘草 白芍藥 當歸 各一錢 枳壳 一炒

黃連 吳茱萸 炒一錢 水煎服

茯苓白朮散 治寒痢所下清白如魚凍者脾弱

不思飲食

茯苓 錢三 白朮 人參 木通 只壳 甘草

肉果 煨 桂心 各一錢半 訶肉 錢二 陳皮

每三五錢燈心煎服

朴附丸 治寒痢滑洩不禁

厚朴 制 大附子 炮 乾姜 炮 陳皮 各等

為末粟米糊為丸每服五七分或一錢米飲下

又木香 錢一 黃連 吳茱萸 炒三錢 粟壳 去蒂萼蜜 炒二錢

薑蚕 錢一 甘草 錢二 右剉以生姜三錢全炒

爆乾為末米飲調下 赤生地黃湯下 白烏

梅湯下 如有熱小柴胡湯解之

養臟湯 治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦

裏急後重腹臍疝痛脫肛 如臍疝滑洩夜起

及日久虛寒加大附子三片

栗壳蜜炒 人參 當歸 肉桂 肉果煨

白木 訶肉煨 炙甘草各一錢 木香 芍藥各一錢

每三五錢水煎服忌酒麵生冷

胃風湯 風冷乘虛干於腸胃水穀不化泄瀉腹

脇虛滿腸鳴痞痛下如莖汁或純瘀血

白朮 芍藥 川芎 人參 當歸 肉桂

茯苓各一分 每服三錢入粟米一錢水煎服

芍藥栢皮丸 一切膿血惡痢窘痛

白芍藥 黃栢各一兩 當歸 黃連 枳壳各五錢

為末滴水丸荒豈大白湯下

三黃熟艾湯 積熱下痢赤色及治傷寒四五日

大下熱利諸藥不効者

黃連 黃芩 黃栢各七錢 熟艾半雞子大

每服三錢水煎服

噤口痢 人參 黃連各一錢 石蓮子三分

為末擦牙關二三次日即能食 右丹溪用人參

黃連二味煎濃服之但得一呷入腹即愈此加

石蓮子亦有理

荳蔻散 嬰孩腸胃脆弱糟粕不聚瀉痢不止或

赤或白冷熱不調日夜頻併愈而又發神效

但忌葷腥生冷

肉荳蔻個煨一 胡粉錢炒二 龍骨錢生一 枯礬錢一

為末每服一錢米飲調下或以薄糊丸麻子大

每服五六十丸 議曰胡粉即真鉛粉也出韶

州者名韶粉出定州者名定粉摠名光粉其性

滯故用以滯其腸令不虛滑荳蔻溫臟之藥安

和腸胃龍骨白礬瀉腸止痢凡虛滑日夜無度者服之隨時痊愈

神効雞青丸 嬰孩一切痢疾不拘冷熱皆効

大木香錢二 生黃連分五 肉荳蔻生一個大者

右為粗末取雞子青搜和作餅慢火炙黃色變

紅者稍乾擘破碾為末白麵糊為丸麻子大每

三五丸米飲下 此方功在雞子青

大効至聖千金飲子 治先吐後瀉後又變痢臍

腹疝痛脇肋脹滿受濕虛鳴膿血五色相雜或

蘇火散

如豈汁或如瘀血日夜無度食少肌羸

大黃芪蜜炙 甘草 陳皮 粟壳蜜炙 木香

白芍藥 地榆蜜炒 黑荳炒 當歸 枳壳炒

烏梅 淮東 白朮 訶肉煨 黃連各等分

每三五錢水煎服

大艾煎丸 小兒虛痢大渴不止

艾葉燒存性 乾葛粉 胡粉炒 海螵蛸

龍齒各等分 為末煉蜜為丸雞頭子大每服一

丸至二丸米飲下

木菟麵 噤口痢一粒飯不食宜此效

白朮五錢 肉果炮二枚 木香二錢 右為末白麵

一兩水搜作餅切作條子水煮熟用葱白生姜

鹽各少許和汁與吃看所入多少仍用雞青丸

調理

炒鷄子 治休息痢及疴瀉日久不愈

鷄子一枚先用黃膈如指大一塊銚內溶化入

鷄子拌炒熟空心食之大効

剪紅丸 治痢鮮血

赤水後珠

三正卷

七

精製錄

側栢葉 槐花 枳壳各 荆芥穗各等

醋糊丸糯米湯下

瘧門

小兒瘧痢治同大人惟劑輕小耳當於大人科參治茲但收集數方以備緩急不重論也緣其症不外於外感內傷二者而已外感有六經之形症用和解六經之劑治之內傷有胸腹胞滿昏輕夜重之標準只以二陳湯加健脾消導之劑不治之蓋無痰不作瘧也數發之後乃為截之虛

弱者補之然初發二三日之間必須導痰運脾和解為主切不可遽投補截設汗不週頭疼未徹則表邪未及解也苟痰不清胸腹不暢則內傷未及鏷也補之截之是閉其邪而塞其去路其變也曷勝言哉和解入終之劑詳於大人仲第八卷中清脾飲 治瘧瘡熱而不寒或熱多寒少膈滿不能食口苦舌乾煩渴小便黃赤太便秘不利上青皮 厚朴制 白朮 草果煨 柴胡 茯苓 半夏 黃芩 甘草各等分 生姜三片

赤水

三子

十一

水煎服

養胃湯 外感風寒內傷生冷溫中快胃山嵐瘴

氣寒嘔逆

人參

蒼朮

厚朴

半夏

藿香

草果

煨去壳

茯苓

各五分

陳皮

七分

甘草

二分

姜三

片朮

一枚

烏梅

一枚

煎服

香葛飲

嬰孩夾食夾驚傷寒四時瘟疫瘧疾

香附子

炒

紫蘇葉

各一兩

橘紅

青皮

葛根

各五錢

炙甘草

二分

每三五錢

姜葱

白煎服

露星飲

治久瘧成癆以此截之

秦艽

柴胡

白朮

茯苓

檳榔

常山

酒炒

一次

黃芩

甘草

半夏

麴

官桂

各等分

右用酒醋水各半碗

煎七

分露

一宿

臨發

五更服之

鬼哭飲

截瘧

常山

制

大腹皮

白茯苓

鱉甲

醋炙

甘草

垂柳枝各七條水煎臨發空心五更服

南斗散 痰瘕

常山制

白芷

南星

生各等分

酒煎臨

發五更服

白木截瘕飲

虛弱入瘕脾虛嘔吐不思飲食不

拘寒熱極効

白木

一半生用一半炒用四錢

橘紅

麦芽

各二錢烏梅

姜五片

水煎臨發日五更服

何首烏丸

治久瘕陰虛熱多寒少以此補而截之

何首烏

為末鱉血為丸黃荳大辰砂為衣臨

發五更白湯送下二九

截法不拘寒熱瘕端陽日製

菝葉尖

東南方者

半夏

四十九粒為末

搗桃葉

尖為丸

雄黃為衣曬乾貯瓶中封固臨用取一

九綿裹塞鼻中男左女右

鱉甲飲子

瘕久不愈腹左有塊名曰瘕母

鱉甲

醋炙

白木

黃芩

草果

枳郎

芎藭

橘紅

甘草

厚朴

白芍藥分

姜東煎服

青黃散

消瘰母如神

青黛

澄去灰土

雄黃

研細飛過

各等分

為極細末每一歲用一分空心及夜淡

醋湯調下塊消其八即止屢驗屢効

銅壁山人治瘰母用月蟾丸

木香

人參

黃芪

當歸

桔梗

黃連

三稜醋煨

莪朮全上

鱉甲醋炙

乾蟾

煨

史君子

苦棟根皮

訶子肉

夜明沙

枳實

綠礬

醋煨各等分

為末

醋糊丸陳米飲下

又截法

寒多熱少者俱以平胃散加常山草果

截之此肉傷瘰

熱多寒少者俱以白虎湯加

常山草果截之

寒熱相半者俱以小柴胡湯

加常山草果截之此外感瘰

益吃坭門

小兒吃坭乃胃中熱丹溪用石膏黃芩陳皮茯苓

白朮煎服而愈徐氏用宣治一兒食泥土困睡

洩瀉遍身如疥此脾經內外疳也以六君子湯



肥兒丸而愈

吃生米門

吃生米者此胃中有虫亦宜健脾清熱肥兒丸佳  
盖吃泥吃米皆疳之漸當於疳門尋治大蘆薈  
丸等方酌而用之毋使臨期軟掌也

蒼朮丸

治吃生米

蒼朮

米泔浸一宿為末

餅糊為丸梧子大每服五十丸米飲下一日

又三服

耳門

生生子曰小兒耳疾多屬風熱上壅亦有因於沐  
浴水入耳中水濕停以搏於氣血醞而為熱化  
為膿汁

湯氏云耳有五般常出黃膿者為停耳出紅膿者  
為膿耳出白膿者為纏耳疳臭者為伍耳之內  
虛鳴出青膿者為震耳症雖五般病源一也皆  
由風水入耳而因有積熱上壅而成若不早治  
久則成聾宜胆脂膏治之仍服化痰退熱等劑  
即愈也

孫季子朋來曰此五者不可謂全無分別詳其名  
觀其色其間必有說也愚僭剖之停耳者為水  
濕之氣久停耳中與氣血搏擊醞為熱膿蓋脾  
主濕又脾之色黃以始為停濕所致故曰停耳  
膿耳者心主血脉血熱化為紅膿心之色赤故  
曰膿耳纏耳者肺主氣肺之色白肺氣不利纏  
壅上焦化為白膿故曰纏耳伍耳者耳內疳臭  
蓋耳為腎之外候小兒腎未充足偶為氣忤逆  
於經隧心主臭心氣不得下降腎氣不得上通

故醞而為疳臭也震耳者易曰震為雷或為雷  
聲震動故耳中虛鳴肝之色青故出青膿也此  
因五臟有所感觸隨臟為名故有此五色之相  
應也既有此五臟之因須推五臟之治庶為治  
本若謂症雖五般病源一也則予未敢首肯  
蔓荊子湯治內熱耳出膿汁

升脉 木通 麥門冬 赤芍藥  
生地黃 前胡 甘菊 甘草 赤白  
皮 赤茯苓 蔓荊子 各等分 姜黃煎

赤水法付 三十一卷 十一

食後服

清上散 治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡癩

方見風熱門

當歸龍會丸 治肝膽風熱耳中鳴出青膿名曰

震耳太便秘小便黃常服宣通血氣調順陰陽

當歸 龍胆草 柴胡 青黛

梔子 各一兩 胆星 射香 五分 大黃 蘆會

酒苓 黃柏 酒連 各一兩 木香

右煉蜜丸小豆大每二十九丸姜湯送下

清黃散 治耳出黃膿名曰瞎耳內有風熱外為

水濕所干醞火而成

防風 滑石 飛五錢 甘草 梔子 酒炒

藿香 酒連 錢二 右為末白湯調二錢食後

清心丹 治耳出紅膿名曰膿耳及舌上生瘡如

楊梅狀者 朱砂 辰砂 飛各

黃連 酒炒 滑石 飛六錢 甘草 辰砂 飛各

薄荷 犀角屑 錢二 右為末每用一錢五分

蜜拌薄荷湯下夜再服

赤水法朱

清白散 治肺熱痰火上壅耳出白膿名曰纏耳

兼治咳嗽

素白皮 炒蜜

地骨皮 各三錢

甘草 一錢

貝母 二錢

寒水石 煨三錢

天花粉

酒苓

天門冬 各一錢五分

右為末以蜜水

調食後服或白通草煎湯下尤妙

交感丹 治耳中府臭名曰伍耳或怒氣上逆上

下不得宣通遂成聾瞶

香附子 童便浸透 炒三錢

茯神

黃連 各二錢

桂心 一錢 甘菊花 一錢 右為末每一錢五分

燈心湯調下

禹糧丸 治聾耳出膿水

禹餘糧 煨醋淬 七次

海驃峭 去背上硬骨

百草霜

伏龍肝 各二錢五分

大附子 去皮臍生 用一枚

右末

以綿裹如負眼棧大安耳內日再易之如不瘥

乃有虫也

龍骨散 治諸膿耳

枯礬

龍骨

胆脂 各一錢

射香

許少

為細末先以棉裹杖子拭去耳中膿再吹一字  
入耳中日再加海蝶蛸一錢尤妙  
羊角散 治耳內膿汁不乾

山羊角燒存性為末每吹二三分入內一日二  
次三日全瘳

滋陰地黄丸 治耳虛鳴膿汁不乾腎陰不足

熟地黄一兩 白茯苓四錢 山茱萸五錢 甘菊四錢

牡丹皮四錢 何首烏黑豆蒸三次 黃柏各四錢

煉蜜丸梧子大每三五十九

龜胸龜背門

古方皆屬之於肺謂受邪喘久所致又乳母多食  
辛熱貽毒於兒感之於肺由肺脹大而胸高滿  
如龜狀也蓋胸膈之上乃肺之分野又肺主皮  
毛若背受風邪客於脊骨故背高而倭僂又或  
兒坐太早亦能致之然此多成痼疾致之古法  
惟有百合丹枳壳防風丸及灸肺俞膈俞二穴  
而已別無治法

百合丹 胸高脹滿其狀如龜

赤水法味 八十二卷

二十

神效

天門冬

杏仁

百合

川大黃煨

天門冬

杏仁

百合

木通

栝白皮

甜葶藶

軟石膏

右為末煉蜜丸荒荳大每服五丸白湯臨睡服

枳壳防風丸

治客風入背如龜高聳

枳壳

防風

獨活

前胡

麻黃

當歸

大黃煨各一錢

麵糊丸黍米大米飲下

松蕊丹

初生不暇護背為客風吹脊入於骨內

或坐早所致

松花

枳壳

防風

獨活各一兩

麻黃

前胡

川大黃

桂枝各五錢

右末煉蜜丸黍米大每十丸米飲下

灸法

肺俞穴 第三椎下兩傍各一寸半

萬俞穴 第七椎下兩傍各一寸半 以小兒

中指量中節為一寸 每灸艾炷如小麥粒大

各灸三五壯

龜尿法 點背腫高處節間

取烏龜置於新荷葉上用鏡照之其尿自出鍼

點脊俞中若龜尿不出用猪毛挿入鼻中其尿

赤水

卷

頁

赤水玄珠

三十一卷

三十一

即出

虫門

小兒好食肥甘生冷傷於脾胃脾胃既傷則不能  
 運化精微而生濕熱濕熱久則生虫也發則腹  
 中疼痛上下往來無有休止或亦攻心則合眼  
 啼哭撲手仰身神思悶亂嘔噦涎沫或吐清水  
 四肢羸困面色青黃飲食難進不生肌膚或寒  
 或熱沉沉嘿嘿不的知其病之所在不早療則  
 腹中子母轉轉相生虫長一尺足能殺父觀周

歲已前小兒鮮有此苦者良由飲乳不食肥甘  
 生冷虫無從而生也即是現之虫之生於濕熱  
 肥甘也不亦明乎予故述此生虫之源以為令  
 之為乳母者姑息之戒  
 化虫丸 虫咬心痛來去不定不思飲食

鶴虱

栝榔

胡粉

苦楝根

取東行小枝各

錢五

明礬

半枯半生 三錢五分

右末

麵糊丸 荒豈大

三歲者服三十九丸白湯入香油二滴吞下食前  
 服如有小虫皆化為水大虫即從大便而下初

赤水玄珠

三十一卷

三十一

服甚効

史君子丸 小兒五疳脾胃不和心腹脹時或痞

痛不進飲食漸至羸瘦

厚朴

陳皮

史君子肉

湯浸去黑衣各一兩

甘草

川芎

各二錢五分

白芍藥

五錢

右為末煉蜜丸

皂子大三歲已上九米飲下

烏梅丸

治蛔厥當吐令反靜而復煩此為臟寒

細上入其藟須臾復上得食而嘔又煩蛔聞食

當自吐及治久痢

烏梅 三個

乾姜 炮一兩

黃連 二兩

川椒

當歸

各四錢

細辛

人參

大附子

炮去皮臍

桂枝

黃柏 各七錢

右末用酒浸烏梅肉下

宿蒸飯搗為丸麻子大每十九丸日二次忌生冷

楨榔丸

楨榔

鶴虱

貫衆

乾漆

子肉

燕萸

雷丸

雄黃 飛

史君

錫灰

川練子肉

木香

黃丹

錫灰

輕粉 少許

巴霜 二個

右為末酒

煮麵糊為丸黍米大五更早用猪肉葱油煎將

赤水

三十三卷

三十三



肉細嚼勿吞下但只引車頭向上便將肉汁調  
 化虫散或吞棋榔丸至巳時取下虫方進飲食  
 化虫散 先將猪肝油炙令兒聞其香味引虫頭  
 向上則藥可行 雷丸 鶴虱 甘草  
 大黃生各一錢 史君子肉十枚 右末用猪肉煮  
 汁調五更服

疳門

生生子曰小兒疳症最為重候顧疳字從甘明其  
 嗜食甘肥成積生虫損傷脾胃脾胃一虛百病

蜂起古稱五疳言五臟之疳也五疳之外其名  
 甚都如曰疳氣曰疳虛曰疳熱曰疳瘵曰疳露  
 曰腦疳曰脊疳曰無辜之類不勝枚舉蓋脾胃  
 虛則停積則生熱或瀉或痢或風或癰生疳  
 生虫二十已下其病為疳二十已上其病為癆  
 症雖多種源一而派殊也而治總在脾胃為重  
 五臟皆受氣於脾胃賴坤元以資生也又有乳  
 母未斷乳時先躑身孕兒飲孕乳久為魁病以  
 其疳成肉消顙大髮穗腿枯形肖傀儡若魁然

赤水

卷

四

也又有母躰虛弱氣血不足乳汁不充強餵粥  
飯耗傷形氣皆成疳兆楊錢二公治論極正採  
錄於左以為法眼

楊氏倓子曰疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱  
冷者虛中之冷積者虛中之積治熱不可妄表  
過涼治冷不可峻溫驟補治積不可用霸峻取  
錢氏仲陽曰小兒初病為肥熱疳熱則涼之久病  
為冷瘦疳冷則溫之小兒易虛易實過寒則生  
冷過溫則生熱峻取則重傷脾胃上醫處其消

積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶持之病家調  
節乳食以裨養之使營衛調和臟腑充實若或  
過焉君子未保其往也積者疳之母由積而虛  
謂之疳極凡有積者無不壯熱脚冷若積而虛  
甚則先扶胃使胃氣充實方與微利急以和胃  
之藥扶虛救裏如白苳菴蘿蔔子砂仁蓬朮消  
積等劑疎利之藥也脇腹癢痛亦虛中之積先  
寒後熱飲水不食或飲水而致喘嗽凡熱疳以  
胡黃連丸冷疳以木香丸冷熱疳以通神丸主

乏疔在外耳鼻生瘡者以蘭香散諸瘡白粉散  
主之

銅壁中人曰凡治疔不必細分五疔但虛則補之  
熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治利積則  
治積虫則治虫不出集聖丸一方加減用之屢  
試屢驗矧此方收聚藥品極為工緻誠醫中之  
王道疔門之火東也紫幼科者則亦當知其所  
首哉  
生熟地黃丸 治肝疔白膜遮睛合面而卧肉色

青黃髮穗筋青 腦熱羸瘦 生地黃 熟地黃 各五錢

川芎 赤茯苓 黃連 杏仁

半夏 天麻 甘草 當歸 枳壳 炒

地骨皮 各二錢 右每三五錢姜三片黑豈

二十粒水煎服

地黃丸 腎疔極瘦遍身瘡疥發寒熱時頭熱脚

冷 熟地黃 山藥 山茱萸 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各三錢 右末蜜

丸梧子大每服十五丸白湯下

赤水... 卷...

又方治全上... 無山菜萸茯苓澤瀉加史君子

川練子

茯苓丸 茯苓神 蘆會 琥珀 黃連

赤茯苓 錢各三 鈞藤鈞 遠志 乾蟾

煨 射香 許少 石菖蒲 錢各一 右粟米糊丸

麻子大 每下二十丸薄荷湯下

神効換肌丸 脾疝肌瘦潮熱盜汗飲食易傷臟

腑糟粕飲食不化頭大腹急

黃連 炒 驚甲 醋 肉果 煨 訶肉 煨 二錢 五分

射香 五厘 分 麦芽 炒 神麴 史君子肉 煨 各五錢

右末麵糊丸麻子大米飲下看大小服

靈脂丸 脾疝食疝

白豆寇 麦芽 五靈脂 砂仁

蓬木 煨 青皮 陳皮 史君子 各二錢

乾蟾 煨 三 右末米糊丸麻子大米湯下

清肺湯 肺疝咳嗽氣逆多啼忙熱惡寒

桑白皮 蜜炒 紫蘇 前胡 黃芩

當歸 麥門冬 連翹 防風 桔梗

赤水... 卷...

茯苓 生地 甘草 各五分 每五錢水

煎服

黃連肥兒丸 治一切疳及疳眼赤腫昏暗雀盲

或經月眼合不開

黃連 燕蕒 麦芽 神麴 各五

青皮 史君子肉 各二錢 右各炒為末

猪胆汁丸 麻子大每十五丸米湯下

大蘆會丸 治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 白燕蕒 蘆會

木香 青皮 雷丸 者白 鶴虱 各

射香 錢二 右末粟米飯丸 荒荳大米飲下 二三

十九

香薷丸 疳瀉 黃連 姜汁炒 肉果 煨

木香 訶肉 砂仁 茯苓 右末飯丸

麻子大每二十九米飲下

加味肥兒丸 治諸疳身黃肚急痞塊洩瀉瘦弱

胡黃連 史君子肉 三稜 莪木 各

木香 香附 青皮 炒 陳皮 檳榔

麦芽炒 神麴炒各一兩 川黃連 蘆會各五錢

右末神麴糊為丸荒荳大米飲空心下三五

丸小兒無熱去胡黃連 泄瀉加人參茯苓

肉果

加味胡黃連丸 治疴疾一切虛痢諸藥無功此

方極效

胡黃連 蘆會 川黃連 肉果 桂心

人參 辰砂 史君子 木香 釣藤

龍齒 茯苓各等分 射香少許 右末用獾猪

胆汁二枚取汁和藥全勻却裝入胆袋內以繩

扎之更入葶藶子二錢微炒黃丹一錢二味研

末入前藥和勻搗五百杵丸荒荳大米飲吞下

五七丸治一切十二種疴痢無毒疰亦佳

蚶蚩丸 治無毒諸疴一服虛熱退二服渴止三

服瀉利佳 蟾蜍一隻打死置桶中取糞虫入

桶一日一夜將虫取起以布袋盛安急流水中

一宿取出瓦上焙為末入射香一字飯為丸麻

子大每三五七丸米飲下 此方極驗

赤水後珠

三上卷

七

木香丸 治疝痢冷熱不調五色雜下裏急後重

黃連錢二 木香 厚朴制 砂仁 夜明

沙 訶肉各一錢 右末粳米飯丸麻子大每

服二三十丸艾姜湯下

十全丹 治下寒嘔露 我木煨 川芎 五靈脂

青皮 陳皮 蘆會各五錢 木香 史君

白豆仁 檳榔 蘆會各五錢 木香 史君

子 乾蟾灰各二錢 右末猪胆汁浸糕糊丸

麻子大每服二三十丸米飲下有熱薄荷湯下

五疝良方 治疝

黃連 蕪荑 神麩 麦芽 陳皮

木香 乾蟾煨存性各一兩 檳榔二枚 史君子

肉果二枚 射香一字 右末以猪胆汁二枚入好

酒打糊為丸芥子大米飲下二三十丸

天麻丸 治肝疝風疝疝眼

青蘘 黃連 天麻 五靈脂 川芎

夜明沙炒 蘆會各二錢 龍胆草 防風

蟬退各一錢五分 全竭各二枚 射香少許

乾蟾頭錢灸 右末猪胆汁浸糕丸麻子大每

二十九薄荷湯下

地黄清肺飲 肺熱疳積蝕為穿孔鼻或生瘰肉

或鼻生瘡

素白皮蜜炒 紫蘇下前胡 防風

赤茯苓 當歸 連翹 桔梗

天門冬 生地 甘草各二錢 水煎食後

服次服化膿丸

化膿丸 蕪荑 蘆會 青黛 川芎

蝦蟆灰 白芷 胡黃連各一分 右末猪

胆汁浸糕糊丸麻子大每服二三十丸食後卧

服以杏仁湯吞下其鼻常用熊胆泡湯小筆蘸

洗俟前藥各進數服却用青黛川歸赤小豆瓜

蒂地榆黃連蘆會各等分雄黃少許為細末吹

入收功

下虫丸 治疳蛔諸虫

木香 菴仁去皮 蕪荑炒 桮柳各一錢

鶴虱錢炒 輕粉五錢 乾蟾皮三錢 史君子肉五枚

赤水



赤石脂

白苦練根皮酒浸 貫衆各二錢 右末麵糊丸

麻子大每三十九空心清肉汁下 治疔勞脊

勞加川歸黃連各二錢五分

龍胆丸 治腦疔熱餅瘡

龍胆草 升麻 苦練根皮 防風

赤茯苓 蘆會 油髮灰各二錢 青黛

黃連各三錢 右末猪胆汁浸糯米丸麻子大每二

十九薄荷湯下食後仍以蘆會末吹入鼻中

驚血煎 治疔勞

蕪荑 柴胡 川芎各一兩 人參五錢 胡連

川連各二錢 史君子一枚 右用驚血下蓋吳茱

萸一兩拌二連淹一宿次早炒乾去茱萸只用

二連俱為末粟米糊丸麻子大每二三十丸白

湯下

驚甲丸 治無辜疔腹中毒起四肢瘦削

驚甲醋炙 黃連 枳壳 夜明沙各炒

訶肉一枚一熟 射香二分 蝎虎錢一 右末

蜜丸荒荳大每服五丸米湯下日三服

赤石脂

三十二卷

廿二

梅肉丸 諸疳煩渴飲水不休 下日 黃連 炒各

定粉 龍胆草 烏梅肉 黃連 炒各

煉蜜丸 黍米大每二十丸 白湯下 射香 少

五疳消食丸 治五疳个痢殺腹臟虫療疳勞及

走馬牙疳唇爛肚大青筋此藥大能健脾進食

華顏色長肌肉 麥芽 史君子 黃連 蕪荑 炒各

陳皮 龍胆草 右末粟米糊丸如粟

米大每服二三十九丸空心米飲下不拘時

蘭香散 治小兒走馬疳牙齦潰爛以至崩砂出

血齧落者 輕粉 蘭香子 各一 蜜陀僧 炒醋淬

右末傳齒及齦立効 鴨嘴胆礬 匙上 射香 少

傳齒立効散 右研極細末以少許傳牙齒齦上

又方用蟾酥一字加射香傳之

地骨皮散 治腎疳齦腭牙齒肉腐臭鮮血常出

生乾地黄 真地骨皮 比細辛 各二

錢五

赤火法味

三年

錢半

錢半

錢半

錢半

錢半

錢半

赤水五錢

五倍子炒焦 二錢

亦可服

右末每以少許傳之頻用効

大効史君栝柳丸 嬰孩食肉太早損傷脾胃水

穀不分積滯不化傳為疳候

肉果 栝柳 宣連 胡連

陳皮 青皮 川練肉炒 神麴

蕪荑皮炒去 麥芽炒 木香 夜明沙炒

蘆會 川芎各一錢 射香字一 右末雄猪胆

汁薄荷汁為丸麻子大每三五十九米飲下

肥肌丸 一切疳氣肌瘦躄弱神困乏力常服殺

虫消疳開胃進食

黃連 香附酒炒 陳皮各二錢半 川練子肉炒

川芎各五錢 木香二錢 右末紅麴糊為丸麻子

大每服三五十九米飲下

通神丸 治冷熱疳

胡連 川連各二錢 木香 蕪荑炒

丁香 肉果生 史君子肉根各一錢 大蟾蜍

煮爛一雙劉水 右末膏和丸麻子大每十五九米

赤水五錢

六三十一條

廿四

赤水玄珠

入三升

廿五

飲下  
取交妳一切疳毒

夜明沙錢五精猪肉三兩碎切全入瓶水煮爛與

覓食之汁亦飲之取下腹中胎毒次用生姜

四兩和皮切炒黃色再用黃連一兩二味為細

末煮麵糊為丸黍米大米飲下三五十九

布袋丸 諸疳面黃腹大飲食不潤肌膚此方

予平日用加阿魏五錢極効  
夜明沙 蕪荑 史君子肉各二兩 白朮

甘草各 茯苓 人參 蘆會各五錢

右末餛餅為丸彈子大每十九以生絹袋盛用

精猪肉二兩全入瓦甌煮極爛聽兒食肉飲汁

其藥取起懸於風處次日再用

如聖丸 冷熱疳瀉極神効  
胡連 川連 蕪荑 史君子肉各一兩

射香分五 蟾蜍煮成膏 右末以膏和為丸麻

子大每三十九人參湯下

肉末散 肉疳而瘡侵入口鼻

赤水玄珠

入三升

廿五

東肉二枚入青礬如椀大火煨存性為末入射  
香少許香油調塗

煮肝散 疳眼翳膜羞明不見物

夜明沙 蛤粉 穀精草 各一 右末每

服一錢五七歲二錢用雄猪肝如匙大一塊批

開摻葉在內攤勻麻扎定米泔水半碗煮肝熟

撈肝將汁傾在碗內將目薰之其肝分作三次

食之即將肝汁送下三次不拘時如大人雀目

空心食之至夜便能見物如患久不效再製服

即見效

黛連蘆會丸 小兒食甘甜飲食則生虫生疳

以此治之

胡連 蘆會 川連 史君子 各五

神麴 兩 炒 一 阿魏 青黛 各一 射香 許

右末糊先黍米大米飲下

四味肥兒丸 嘔吐不食腹脹成疳作瀉不正或

食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱

瘦怯遍身生瘡小便澄白腹大青筋一切疳候

赤水玉珠 三十一 十六

川連 燕萸 神麴 麦芽各等

右末糊丸桐子大每二三十九白湯下

銅壁山人黃公集聖丸治一切疝症附加減法

於後屢試屢驗

蘆會 五靈脂 夜明沙炒 砂仁

橘紅 木香 川芎 煨 史君子肉各錢

川連 川芎 乾蟾各錢 當歸 青皮

錢各一 因於虛者加人參二錢白朮三錢去

莪朮青皮 因於熱者加龍胆草二錢去砂仁

莪朮 因於吐瀉下痢者加白朮二錢肉果煨

訶肉各一錢五分去青皮莪朮 因於積痛者

加煨三稜川練子肉小茴香各二錢去當歸川

芎 因於癰者加鱉甲醋炙三錢 因於虫者

加白蕪萸一錢五分川練子肉二錢去當歸川

芎 因於渴者加人參白朮各二錢去莪朮砂

仁 右為細末用雄猪胆汁二個和麵糊為丸

看大小服米飲送下 予按此方乃十全丹去

栳榔白草仁加黃連夜明沙砂仁尤為有理方

名十全功收十全也茲改集聖者集治疔之聖  
品也此方不熱不寒補不致滯消不致耗至穩  
至安故有屢試屢驗之語云

又猪肝散 治疔積疔而躰羸弱不經下者用此  
補而下之 後再以參苓白朮散之類調理  
雄猪肝不見水者四兩用竹刀批開將新荷葉  
晒乾為末二錢摻入肝內重湯煮熟以肝與兒  
食之空心服至巳午時取下惡物從大便而出  
不動臟腑極佳極佳

癩門

錢仲陽云凡治五癩皆隨臟治之每臟各有一獸  
之形証並用五色丸治之此治小病者發而重  
者死病甚者亦死若反折上窺其声如犬症屬  
肝也目瞪吐舌其声如羊症屬心也目直腹痛  
其声如牛症屬脾也驚跳反折手縱其声如鷄  
症屬肺也肢躄如尸口吐涎沫其声如猪症屬  
腎也

生生子曰參前論雖以五獸配為五臟亦是以意

測之耳觀其茲用五色丸醫治之且謂發重者  
及病甚者皆死再無別治法豈謂一五色丸悉  
能之耶抑謂此病為不治之症殆無可奈何耶  
將為畧之耶改之上古未有五獸之分惟朱丹  
溪乃曰癩症大率屬痰與驚不必分五等尋痰  
尋痰分多少而治無有不愈有熱者以涼藥清  
其心有痰者可用吐法吐後以東垣安神丸及  
平肝之藥青黛柴胡川芎之類丹溪此論亦極  
當理

癩病與急慢多相似而實非癩發時驀然仆地  
作聲作搐或目上視醒吐涎沫急慢症則不然  
也蓋驚發後即止癩發或一年一度或一季一  
度或一月一度或三五日再發或受驚而再發  
或勞心勞力而再發驚則無此之頻也  
癩有陰陽若病初作時先身熱開目瘳癡驚啼  
叫喊而後發脉浮者為陽癩仆地多仰內在六  
府外在皮膚故易治若病先身冷目半開不瘳  
瘳不啼叫而作脉沉者為陰癩驀然墜伏此內



在五臟骨髓故難治

夫陽癇不因吐下由其內有痰熱客於心胸之間因聞大驚而作若熱盛雖不聞驚亦自作也陰癇其始也亦本於痰熱醫以寒涼藥攻下太過損傷脾胃乃變而為陰非癇本有陰寒症也戴原禮曰癇有五無非痰涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引胃背僵直吐乳吐沫食頃乃甦宜星香散加全蝎  
孫季子朋來曰凡治驚風顛癇之症而辰砂雄

黃金泊水銀鉛粉等劑不可以久服也緣此皆治有餘之症驚搐初發胃氣尚壯痰邪方盛非此慄悍疎利之劑為之先鋒不可以祛去也稍久則不宜用蓋小兒臟府脆弱易致虛耳前劑皆傷脾者丹溪云氣虛之人有痰胃氣亦賴所養卒不可便攻攻反易生而多惟健脾胃以全運化之職則新痰不生兼佐之以消痰之劑則風自定故不專以鎮心攻痰為仗且心者一身之主神明出焉智慧之所由生也鎮心之劑

過多則神志奪而聰明窒塞內經曰主不明則  
 十二官危余往見多服驚風鎮心之藥者驚  
 定之後痴呆愚鈍寡言寡笑靈覺寂無愀然可  
 憫詎思前藥之所誤哉幼之心當知所慎又  
 有食癩原從飲食過傷而得後復傷飲食則發  
 其外症嘔吐酸氣或大便餽臭治法先當吐其  
 食俟定後宜以下積藥看輕重下之積去則不  
 復發  
 五色丸又名五癩丸

硃砂錢五 雄黃 珍珠各一兩 各為細末  
 再以鉛二兩入銚溶化投汞二錢五分攪硬研  
 末和勻煉蜜為丸麻子大每服三四丸薄荷湯下  
 牛黃丸 治風癩因汗出解脫風邪乘虛迷悶搗  
 掣涎潮屈指如箕數  
 胆星 全蝎焙 蟬退各二錢半 防風 白附子  
 天麻 射香 姜蚕各一錢五分 右末棗肉  
 為丸水銀五分研細入藥丸如茱萸大每服二  
 丸荆芥生姜湯下

赤水

消風丸 治風癰先宜用此

胆星 羌活 獨活 防風 天麻

人參 荆芥 川芎 細辛各一錢

右末蜜丸梧子大每二九薄荷紫蘇湯化下

比金丸 治驚癰先宜用此

人參 琥珀 茯苓 遠志去心姜汁炒

硃砂 天麻 石菖蒲 川芎 南星

青黛各一錢射香 右末蜜丸梧子大每二九

薄荷湯下

化風丹 涼風化痰退熱定搐

胆星 羌活 獨活 防風 天麻

人參 川芎 荆芥 粉草各一錢全蝎

右末蜜丸皂角子大每二九薄荷湯化下

妙聖丸 治食癰因驚而傷食吐乳發熱大便臭

代赭石煅醋淬二錢半 巴霜三錢 雄黃 全蝎

辰砂 輕粉 射香各一錢 杏仁炒二錢

為末束肉為丸梧子大每十二丸木賊湯下

斷癰丹 治癰瘡後復發症候多端連綿不止

黃芪蜜炙 鈞藤 細辛 甘草炙各五錢

蛇退酒炙二寸 蟬退個四 牛黃錢一 右末束肉為

丸麻子大人 參湯下 每服十數丸看兒大小

茯神湯 治胆氣虛寒頭疼目眩心神恐懼不能

獨處或是驚癩 茯神 酸束仁炒 黃芪 栢子仁

白芍藥炒 五味子各一兩 桂心 熟地

人參 炙甘草各五錢 右每五錢水煎服

養心湯 治心血虛怯驚癩或驚悸怔忡盜汗無

寐發熱煩躁

黃芪 茯苓 茯神 半夏麩 當歸

川芎 官桂 栢子仁 酸束仁 五味

子 人參各三錢 炙甘草五錢 姜棗煎服

妙香散 治心氣不足驚癩或精神恍惚虛煩少

寐盜汗等症 辰砂錢三 射香錢一 木香煨二錢半 茯苓

山藥 茯神 遠志 黃芪炒各兩 桔梗

炙甘草 人參各五錢 右末每服下錢温酒

本草綱目 卷之...

或白湯下

五癩丸得効方

露蜂房焙

石綠略

桂心

遠志肉

人參各五錢

硃砂錢一

右末粥先梧

桐子大每二三十九白湯下

參星湯

虛而癩久不愈者

人參錢五

南星炮

為末每服一錢看大小姜枣湯下日二次

銅壁中人治諸癩發歇無時

乾地龍

錢五

虎睛對一

人參

天竺黃

代赭石

煨醋

辰砂

鐵粉各二錢

輕粉五分

雄黃錢五分

金銀箔各三十片

牛黃錢一

琥珀錢三

腥星 遠志

右菖蒲

白附子各三錢


姜蚕錢一

右末蒸餅糊為丸菖蒲大菖蒲紫蘇湯下

### 大宮詹少溪吳馭閣校

示水法採

四



大宮...  
 本末...  
 題...  
 全...  
 終

