

術運
子心胃痛
三癩症

川
房亦
十腹痛

口
癩證
九腰痛

大
驚悸
十脇痛

子
怔忡
十腎痛

二
虛煩
十肩背痛

三
不寐
十脚氣

十癩症

甲子年
負翁記

壽世保元
茂卷之伍

較正醫林狀元壽世保元戊集卷之五

廣順堂藏板

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

衞運

脈風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脈則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其黑暈言其轉冒言其昏眩暈之與冒眩其義一也其狀目閉眼眩身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取輒也風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是可不推尋致病之因乎治法隨機應敵其

問以升降鍾墜行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而脫也識者將有採薪之憂

暈化痰湯 主方治眩暈之總司也

陳皮去白 半夏姜汁炒 白茯苓去皮各一分半 枳實炒 川芎 黃芩酒炒各八分

白芷 細辛 南星姜汁炒 防風各七分 羌活七分 甘草三分

右剉一劑生薑三片水煎服以此作丸亦可○氣虛加人參七分白朮去蘆

一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加黃連薑炒七分

一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無方言語心神顛倒目不敢開如在

風雲中頭苦裂身重如山四肢厥冷不得安睡此乃胃氣虛損停痰而致也

半夏白朮天麻湯方見頭眩

一論勞役之人饑寒眩暈者脉虛弱也

中益氣湯方見內傷 依本方加半夏天麻白芍熟地黃○一眩暈屬氣虛有

濕痰者依本方去柴升加白茯苓川芎半夏天麻桔梗白芷

○一論陰虛火動眩暈者脉必數也

清離滋坎湯 方見勞瘵 依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷脉沉

參附湯 人參五分 大附子炮三錢

右剉一劑生薑十片水煎熱服

○一論眩暈之症因氣虛痰火炎上故也

清陽除眩湯 人參六分 白朮去芦一錢 白茯苓一錢 陳皮一錢 半夏湯泡一錢

天麻八分 檳榔八分 甘草四分 旋復花八分 右剉一劑生薑三片水煎服

○一論肥白人日常頭眩眼花卒時暈倒者名曰痰暈

清痰祛眩湯 南星姜泡 半夏姜汁 天麻 蒼朮米泔浸 川芎 茯苓

桔梗 枳殼去穢 烏藥 酒芩 羌活各八分 甘草三分 陳皮

右剉生薑水煎臨服入竹瀝薑汁全服

○一論體虛之人一時為寒所中口不能言眩暈欲倒手足厥冷

貴附湯 乾薑一兩 大附子生去皮 脂一枚

右剉每五錢水煎溫服

○一論一切失血過多眩暈不醒者

白歸湯 川芎 當歸各等分

右剉水煎溫服○虛甚加炮過大附子

○一論氣血兩虛而挾寒作頭目眩暈者

十全大補湯 方見補益 依本方如有痰加陳皮半夏

○一治一人形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足脉痺口乾

引飲六脉洪數而虛予以為腎經虧損不能納氣歸原而頭暈不能攝水歸

元而為痰陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣湯合地黃丸料 治之而愈

○一人氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無予以為腎家不

能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈八味丸方見補益

○一人形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或執從眼起左

三脉洪而有力予為足三陽虧損用補中益氣湯加麥門五味及加減八味而愈

○一大方痰暈湯 半夏法製一錢橘紅一錢赤茯苓一錢黃芩酒洗七分白朮五分

川芎五分黃連五分黃柏酒炒七分薄荷五分石膏一錢甘草炙五分

知母七分 右剉一劑生薑三片水煎臨臥服

○一生員形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口乾引

飲六脉洪數而虛余以為腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源

而為痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六味丸料治之而

愈其後或勞役或入房其病即作用前藥而愈

○一孟都憲氣短痰壅服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無余以為醫

家不能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

○一孫都憲形體豐厚勞神善怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹

起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂足三陰虧損用補中益氣加麥

門五味

門五味及加減八味丸而愈

十全大補湯

見補益

補中益氣湯

見內傷

八味丸

見補益

麻木

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也脉浮而緩屬濕
爲麻痺脉緊而浮屬寒爲痛痺脉澁而芤屬死血爲木不知痛癢內經曰風
寒濕三氣合而爲痺故寒氣盛者爲痛痺濕氣勝者著痺河間曰留着不去四
肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入
深榮衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不榮故爲不仁矣夫所謂不仁者或
周身或四肢唧唧然麻木不知痛癢如繩扎轉初解之狀古方名爲麻痺者
是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分爲
二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有
曰虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法

宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

○一論麻木遍身手足俱麻者此屬氣血兩虛宜

加味八仙湯

當歸酒洗

川芎

熟地黃各七分

白芍酒炒

人參六分

白朮

去芦二錢

陳皮八分

半夏曲七分

白茯苓去皮一錢

柴胡四分

川羌活五分

防風

五分

秦艽六分

牛膝六分

甘草炙三分

桂枝三分

右剉一劑生薑一片棗一枚水煎食遠服○氣虛加黃芪蜜炒八分

○一論麻是渾身氣虛也

加減益氣湯

黃芪蜜炒

人參

白朮去芦

陳皮

當歸各一錢

升麻

柴胡

木香各五分

香附

青皮去穰

川芎各八分

桂枝三分

甘草三分

右剉一劑生薑棗煎服

○一論十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也

補中益氣湯 依前方去青皮川芎桂枝加麥門冬羌活防風烏藥共十四味

○一論木是濕痰死血也

雙合湯

當歸

川芎

白芍

生地黄

陳皮

半夏

姜汁各一錢

紅花

三分 桃仁 去皮 尖分

白芥子

一錢 甘草 三分

白茯苓

去皮 一錢

右剉一劑薑十片水煎熟入竹瀝薑汁同服

○一論手足麻痺因濕所致也

香蘇散

方見感冒

依本方加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜

○一論感風濕手膊或痛或木或遍身麻木

五積散

方見中寒

○一論婦人七情六鬱氣滯經絡手足麻痺宜

開結舒經湯

紫蘇

陳皮

香附

白烏

川芎

蒼朮

米泔浸

羌活

南星

半夏

當歸

各八分

桂枝

四分

甘草

三分

右剉生薑三片入薑汁竹瀝服

○一論口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻

止麻消痰飲

黃連

半夏

瓜蒌仁

黃芩

白茯苓

桔梗

枳殼麩炒 陳皮 天麻 細辛 南星 甘草

右剉生薑三片水煎服○血虛加當歸○氣虛加人參○亦有十指麻木胃中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子行經中死血者四物湯加紅花桃仁韭菜忌生冷魚腥發風發熱之物

○一論十指麻木疼痛不仁

大附子木香各等分每服三錢薑三片水一碗煎七分服

○一論婦人遍身麻木痺謂之不仁皆因血分受風濕所致用祛風散送下五補丸

祛風散 生川烏 白朮去芦 白芷各三錢 甘草二錢

右為細末酒調吞下五補丸

五補丸 黃芪蜜炒 人參五錢 附子一個 當歸三錢 白芍酒炒 五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五七十九丸祛風散送下

○一論不仁者謂不柔和也痛痒不知針灸不知是也經曰諸虛乘寒而鬱膏不仁蓋其血氣虛弱不能周流於一身於是正氣為邪氣所伏故肢體頑麻

不知痛痒寒過厥如死屍而鬱且昏也用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯
入薑汁設或身汗如油喘不休喘而直視水漿不入者此為命絕也

一論風熱血燥皮膚瘙痒頭面手足麻木

河涼潤燥湯

當歸酒洗

生地黄各一錢半黃連

黃芩

白芍煨

天麻

防風

羌活

荆芥各八分

細辛六分

甘草五分

右判水煎食遠服麻甚加川烏炮三分

一論面上木處可將桂枝為末用牛皮膠和少水化開調敷之厚一二分若

脚底硬木處可將牛皮膠鎔化入生姜汁調和仍入南星末五錢和勻用厚

紙攤貼二三分乘半熱裹貼脚底上用溫火烘之此外治法也

一治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃熱傷元氣也

黃芪八錢人參五錢

白芍三錢

柴胡五分

升麻二錢

五味子十個

生甘草七錢

炙甘草二錢

右判水煎稍熱空心服

一治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉

洪大

黃芪

三錢

當歸

二錢

蒼朮

四錢

陳皮

五錢

藁本

二錢

黃稻

酒炒

柴胡 三錢 升麻

知母

酒炒

五味子

一錢

生甘草

二錢半

右每劑錢水煎空心服少待以早飯壓之

○一治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

黃芪

一兩

白芍

二兩半

橘皮

一兩半

澤瀉

五錢

炙甘草

一兩

右剉水煎溫服

癲狂

癲脉浮大滑者生沉小緊急不治○狂脉實大生沉小死○癲脉虛可治實則

內經曰巨陽之厥則頭重足不能行發為眴仆眴搖其目而暴仆也是蓋陽氣逆亂

故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癇之類也又曰陽明之厥則癲

疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌踰

垣上屋罵詈不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結于

中而為之耳此則癲狂之候也曰癲曰狂分而言之亦有異乎難經謂重陰者癲重陽者狂素問註云多喜為癲多怒為狂然則喜傷於心而怒傷於肝乃二臟相脊餘之症難經陰陽之說恐非理也大抵狂為痰火實盛癲為心血不足多為求望高遠不得志者有之癩病獨主乎痰因火動之所作也治法癩者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三証者若神脫而目證如愚癡者縱有千金我酬吾未如之何也已矣○癲者喜笑不常顛倒錯亂之謂也○狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也又云狂者狂亂而無正定也○讖語者合目自言日用常行之事為讖也又蓄血症則重復語矣○鄭聲者聲顛無力不相接續造字出於喉中為鄭聲也○陰附陽則狂陽附陰則癲脫陰者目盲脫陽者見鬼

○一論癲者心血不足也此方主癲狂喜笑不常

養血清心湯

人參

白朮

去芦

白茯苓

去皮

遠志

去心

酸棗仁炒

川芎 各一錢

生地黃仁石菖蒲仁當歸

一錢半

甘草

五分

麥門冬

去心

一錢

右判一劑水煎服

○一論狂者痰火實盛也宜後清心滾痰丸主之若風熱實盛者宜

防風通聖散

方見中風

依本方加牡丹皮生地黃桃仁主之治一切大風癲狂之疾

○一論喜笑不休者心火之盛也

以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次啜之以

釵探吐執痰次服

黃連解毒湯

方見感冒

依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許

○一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也

加味逍遙散

當歸

白芍炒

白朮去芦

白茯苓

去皮 柴胡

生地黃

遠志

去心 桃仁

去皮 蘇木

紅花

甘草

右判一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地辰砂水煎服

○一論發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心苦參主心

腹結氣故足以治時熱狂言

苦參丸 苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸薄荷湯送下

○一論一切癩癩風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室

女經脉通行驚邪蘊結頓服比比經効

抱膽丸 水銀二兩一錢 硃砂 兩餅 鉛一兩半 乳香一兩餅

右將鉛入銚內水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木棍研勻丸如芡

實大每一丸空心并花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再服一丸除

根○一方薄荷湯化下亦可

○一論癩狂失心不寐此方用硃砂能鎮心安神酸使可收引故棗仁能斂神

歸心香可使利竅故乳香能豁達心志許學士加人參亦謂人參能寧心耳

寧志膏 辰砂一兩 酸棗仁炒五錢 乳香五錢 加人參一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下

○一論癩狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰

白金丸 白礬三兩 鬱金七兩

石為末米糊丸每服五十九溫水送下

○一論癩狂五癩驚悸一切怪症此皆痰火實盛也

清心滾痰丸

大黃消痰黃芩四兩

石錢煨五沉香一錢

牙皂五錢犀角五錢

右為細末水丸每服四五十丸滾水送下

朱砂五錢

射香五分

○一論心風者何蓋君火在心因怒發之相火助盛痰動于中脇氣上攻迷其

心竅則為癩為狂所怒之事膠固於心輒自談失其條序謂言之心風與風

何干也若痰不盛者則有感亦輕

○一論久患心風癩狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定

此藥大能安神養血寧心定志

紫河車一具長流水洗淨慢火焙乾為末煉蜜為丸空心酒送下

○一人癩狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之即愈

○一人氣心風即痰迷心竅發狂作用真花藥石煨黃酒淬一次為細末每服

錢黃酒調下

○一論癲狂五癩眩暈時作時止痰涎壅盛心神昏憤此屬氣血虛而挾風痰鬱火也

驅風豁痰湯 人參 白朮去苦 白茯苓去皮 半夏姜炒 陳皮 枳實

懷生地黃 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 桔梗去芦 南星 天麻

瓜蒌仁 白附子 僵蠶 黃連姜炒 黃芩酒炒 遠志甘草水泡去心

甘草 右剉一劑生薑五片水煎溫服

○一癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定一切真氣虛損用

紫河車入補藥內服之大能安神養血寧志治健忘驚悸怔忡不寐以六味

丸加遠志石菖蒲人參白茯苓當歸酸棗仁炒

○一治心志狂惑

用無灰酒一碗真麻油四兩共和勻楊枝二十條逐一條攪二下攪遍

楊枝直候油酒相和如膏煎至八分狂者強灌之令熟睡或吐或不吐覺

來即醒

一治狂言鬼語

用蝦蟆一个燒為末酒調服

一治癲狂諸病

何軍湯

大黃 四兩酒浸一宿

右用水三升煎之分作三服

癲狂病者多怒為癲多喜為狂癲者精神不守言語錯亂妄見妄言登高罵詈是也狂之病始發少卧少飢自賢自貴妄笑妄動登高而歌棄衣而走是也癲病者賊邪之病於肝狂病者賊邪之升於心也此皆實症宜瀉而不宜補故用大黃瀉之取其苦寒無物不降可以瀉實又必數日後方可與食但得寧靜便為言此不可見其瘦弱減食以溫藥補之及飲食飽之病必再作戒之戒之緩與之食方為得體故曰損其穀氣則病易愈所以然者食入于陰長氣于陽故也又宜滾痰丸下之

一治癲狂不止得之驚憂極者用甜瓜蒂半兩為末每服一錢并水調一盞

投之即大吐後就睡勿令驚起神効

一治邪狂癲癩不欲眠妄行不止用白雉雞二隻煮熟五味調和作羹食

一治因驚憂失心或思過多氣結不散積有痰涎留灌心包窒塞心竅以致
狂言妄叫呼奔走

朱丸

朱砂一錢 礞石一錢

雄黃二錢 明淨者研

白附子一錢

右和勻以猪心血和為丸如梧子大另用朱砂為衣每服三粒用人參膏蒲
煎湯送下常服一貼能安魂定魄補心益智

一牧童小子平白口中胡說一片鬼話令人驚駭予診之脉洪大此實熱也
以蚯蚓數條研爛并水調服立愈

癇證

虛弦為驚為風癇

證者發則仆地悶亂無知嚼舌吐沫背反張目上視手足搐搦或作六畜聲
者是也蓋癇疾之原得之于驚或在母腹之時或在有生之後必以驚恐而
致疾蓋恐則氣下驚則氣亂恐氣歸腎驚氣歸心併於心腎則肝脾獨虛肝

虛則生風脾虛則痰畜極而通其發也暴故令風痰上湧而癩作矣內經曰
然所以令人仆地者厥氣併于上上實下虛清濁倒置故令人仆地悶亂無
知者濁邪干乎天君而神明壅閉也舌者心之苗而脾之經絡連于舌本陽
明之經絡入上下齒縫中故風邪實于心胸則舌自挺風邪實于陽明則口
自噤一挺一噤故令噤舌吐沫者風熱盛于內也此風來潮洶之象背反張
目上視者風在太陽經也足太陽之經起于睛明挾脊而下風邪于之則實
而勁急故目上視而背反張也手足搐搦者屬肝木肝木主筋風熱盛于肝
則一身之筋牽攣故令手足搐搦也搐者四肢屈曲之名搦者十指開握之
義也或作六音聲者風痰鼓其氣鼓而聲自變也譬之弄笛焉六孔閉塞不
同而官商別異是也

天癩之爲病角弓反張手足搐搦口吐涎沫俗云猪圈風也亦因金衰木旺生
風外由驚邪入內以致之蓋癩病一月數發者易治周年一發者難治虛實
之判也實則卽攻虛者先補可也治法當先以瓜蒂散吐之用甜瓜蒂爲末

每服一錢并水調一盞投之即或大吐後熟睡勿令驚起即効後以湯藥
一論癩症宜下宜吐茶子喜湧而能吐頑痰宜取一升搗爛煎湯服得効
一論諸癩神智不寧時發狂躁多言好怒面容不澤

神至寶湯

生地黄

姜汁炒五錢

橘紅

貝母

白茯苓

去皮

黃連

遠志

去心

石菖蒲

酸棗仁

炒

枳實

炒

瓜蒌仁

天花粉

甘草

少許

右剉生薑三片水煎服

一論癩者痰涎壅併然也

減導痰湯

主方神効

南星

姜製半夏

陳皮

去白

白茯苓

去皮

瓜蒌仁

枳實

炒

桔梗

山梔子

黃芩

各一錢

黃連

姜炒

甘草

木香

五分

辰砂

五分

為末

右剉一劑生薑煎入竹瀝薑汁磨木香調

辰砂末同服

一論癩屬氣血虛而兼痰火者此攻補兼

施平肝解鬱清火化痰除癩之症

清心抑氣湯

當歸 酒洗

白朮 去芦

白芍 酒炒

白茯苓 陳皮

半夏 姜汁

枳實 麩炒

竹茹

石菖蒲

黃連 姜炒

香附 炒各

麥門冬 心去

川芎

人參

遠志 去心

甘草 各四分

右到一劑生薑煎服

○一論大人小兒忽然昏暈倒地五疇之症

朱砂

水飛用猪心一個剖開入砂水五錢濕布包煨火炙熟取砂淨入後藥心于病人空心食

南星 沸湯浸三次

巴豆仁

五錢石灰一碗炒組入仁在內灰冷取仁將灰又炒又以仁入內再取出用草帚搥去油灰不用

全蝎

去頭足尾炙二錢

龍膽草

兩右為末麩糊丸如梧子大每服五十九丸薑湯下

○一論風癩搐搦心志發狂棄衣而走登高而歌或數日不愈踰垣上屋妄言

罵詈不避親疎安見鬼神一切潮熱及風中厥逆牙關緊急並可治之

三聖散

防風 兩

去芦三

瓜蒂 兩

藜蘆

去苗加減或一兩或半兩或二兩

右為粗末每服五錢用蘆汁二盞煎三沸瀉於大碗中再用蘆二盞煎瀝三

沸卻入先前藥同熬三沸澄清候温徐徐投下不必盡劑吐如吐不止煎葱

白湯嚥三五口立解如不吐再加服之○如服藥多不吐出涎再飲藜蘆汁鹽湯各一兩盞投之如不出以光釵喉中探引即出矣須用白盆一個黑盆不見涎形狀吐出青黃涎沫二三升爲効吐罷之後吃微溫白粥一二頓此三聖散汗吐下三法俱行防風發汗瓜蒂下泄藜蘆瀉吐凡用法則禁忌症候小者勿服病久雖合吐勿服○吐血人勿服○主病不正勿服○衆口不能正勿服○先正病人心神居淨室中善待病者二人溫克和柔善誘患人則効矣隄防吐後眩暈跌撲呼叫病人諸狂必捐吐瀉罷可與水水及新水降心火勿食熱物

一論諸風癱瘓不能言語怔忡健忘恍惚去來頭目眩暈胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏倦心氣不足神志不寧驚恐憂慘虛煩少睡或發癲狂小兒驚癇風搖大人暗風羊癲風癲發叫如雷其効如神

金保命丹 侍御何中震經驗

朱砂二錢 珍珠一錢 膽星三錢 甘草

麻黃 根白附子 炮雄黃

薄荷各一錢 防風 琥珀 金箔 牛黃各一錢 僵蠶炒 犀角鈔

麥門冬法相殼 去穰 桔梗去芦 地骨皮 神曲炒 白茯苓去皮 白朮去芦

人參各三錢 遠志去心 柴胡三錢 天麻一錢 膽礬一錢 水片少許 黃芩七錢

麝香少許 紫河車七錢 天竺黃三錢 荆芥七錢 蠅退七錢 川芎 牙皂各一錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣用蠟包裹用時取開每服一九薄

荷煎湯下不拘時服忌猪羊肉蝦米核桃動風之物

○一參伯王播庵公子患癩七年諸醫罔效召余治以追風祛痰丸安神丸二

藥兼進牛載而愈逾四年未發復因不善保守病發如前差役復求余治余

以此方製藥一料投之輒效迄今數載不發氣體已復原矣曩辱公優渥

贈余扁曰醫士無雙余因此方屢驗故更一字名曰

醫癩無雙丸 南星一兩 半夏一兩 日透二味用白礬皂角生姜煎湯浸一乾去礬皂姜不用

川芎三錢 當歸身酒軟 石膏各兩 天麻七錢 僵蠶五錢 懷生地黃酒洗

荆芥穗五錢 川獨活五錢 烏犀角五錢 辰砂五錢 揀參 白茯苓去皮木

遠志甘草水麥門冬去心陳皮去白白朮去油黃芩三錢川黃連去毛

白附子煨三錢酸棗仁三錢珍珠三錢甘草三錢金箔三十片真牛黃

右為細末好酒打稀糊為丸如梧桐子大金箔為衣每服五十九空心白湯

送下最能祛風化痰降火補益養血理脾寧心定志輕者牛料奏効重者

○一兒十五歲御女後復勞役考試失意患癩症三年矣遇勞則發用十全大

補湯加味歸脾湯之類更以柴河車生研如膏入蒸糯米飯為丸如梧子大

每服百丸日三四服而痊後患遺精盜汗發熱仍用前藥及六味丸而愈此

方治癩不拘老幼皆効

清心滾痰丸 治諸風癩癩有殊効

○一治驚癇方 白礬一兩生牛枯一兩糖二兩

右為末麵糊為丸如黍米大硃砂為衣每服二十九薑湯送下

健忘

健忘者陡然而忘其事也盡心方思量不來為事有始無終言談不知首尾皆主於心脾二經益心之官則思脾之官亦主思此由思慮過妄傷於心則血耗散神不守舍傷於脾則胃氣衰弱而慮愈深二者皆令人事則卒然而忘也蓋心生血因血少而不能養其真臟或停飲而氣鬱以生痰氣既滯脾不得舒是病皆由此作治之必須養其心而理其脾土凝神定智之劑以調理亦當以幽閑之處安樂之中使其絕於憂慮遠其六慾七情如此日漸安矣

○一論思慮傷脾不能攝血致血妄行或吐或下或健忘怔忡驚悸不寐發熱盜汗或心脾傷痛嗜睡少食大便不調或血虛發熱或肢體痠痛婦人月經不調赤白帶下或肺熱內熱或癩癧流注不能消耗潰斂或思慮傷脾而作瘰癧

歸脾湯 主方

黃芪 蜜炒

人參

白朮 去芦

白茯苓

去皮 當歸 酒洗

遠志

甘草水 龍眼肉

酸棗仁 炒

木香

甘草 炙

右判薑棗煎服加柴胡附子各加味歸脾湯口神不寧而健忘倍酸棗仁茯苓

神當歸加柏子仁

一論諸虛健忘及驚悸怔忡等症

減補心湯

人參

白茯苓

陳皮

白芍

酒炒

遠志

甘草泡

酸棗仁

炒

生地黃

白朮

當歸

甘草

麥門冬

酒炒

黃柏

酒炒

石菖蒲

知母

右劉薑蜜煎服

一論寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱療唯

乾除驚悸定怔忡育養心神大補元氣讀書勞神勤攻勞心並宜服之

王補心丹

大甲丞松石劉公傳加石菖蒲百部杜仲甘草

懷生地

天門冬

麥門冬

當歸

柏子仁

酸棗仁

五味子

人參

遠志

甘草水

白茯苓

去皮

立參

丹參

桔梗

各五錢

一方加酒炒

黃連

二兩

石為細末煉蜜為丸如梧桐子大朱砂為衣每服二三十丸臨卧燈心竹葉

煎湯送下燈心藥湯亦可口如飲食不思大便不實恐不宜也又當服後方

安神定驚丸 功同補心丹

人參 五錢

白朮 去芦炒

白茯苓 去皮

遠志 甘草水

石菖蒲 九節者各等分

石菖蒲 去毛

酸棗仁 炒

麥門冬 去心

牛黃 另研

辰砂 錢半 水飛為衣

右為細末圓眼肉四兩熬膏和煉蜜三四兩為丸如梧桐子大辰砂為衣每

服三十丸清米湯下不拘時日三服

○一論凡人多識不忘者心血足而無蔽也若心血不足邪氣蔽之則傷其虛

靈之體而學問易忘矣龜介蟲之靈物也龍鱗蟲之靈物也假二物之靈以

養心之靈欲其同氣相求云爾遠志辛温味厚辛温可使入心味厚可使養

陰菖蒲味辛氣温味辛則利竅氣温則通神以之而治易忘斯近理矣

聰明丸 春元周用廷經驗

敗龜甲 炙酥

龍骨 入雞腹中 煮一宿

遠志 去心苗

石菖蒲 九節者各等分

右為末每服一錢酒調下日三服

○一論讀書辛苦而有房勞者

當歸

生地黃

白朮

玄參

川芎

白芍

白茯苓

黃柏

知母

麥門冬

山梔

甘草

右剉一劑生薑煎服

一論癩狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定一切真氣虛損

用紫河車入補藥內服之大能安神養血寧志治健忘驚悸怔忡不寐用大

味丸加遠志石菖蒲人參白茯苓當歸酸棗仁炒

一論諸虛健忘等症以十全大補湯去川芎黃芪肉桂加陳皮遠志石菖蒲

麥門冬酸棗仁黃柏知母

驚馬悸

寸口脈動而弱動為驚弱為悸口中驚悸脈必大稍飲食之悸沉伏動滑

驚悸即動悸也動為病惕然而驚悸之為病心下怯怯如人所捕皆心虛膽

怯之所致也又曰驚者恐怖之謂悸者怔忡之謂怔忡健忘驚悸三症名異

而病同又云驚悸者驀然而跳躍驚動如有欲厥之狀有時而厥者是也屬血虛時覺心跳者亦是血虛蓋人之所主者心心之所養者血心血虛神氣不守此驚悸之警端也

○一人聞聲即驚醫者令患人坐於堂上使兩人扶之醫自堂下以小凳木槌手擊而以舌吾擊楚亦常事耳爾何必驚且擊且言患者視之久而驚遂定此深得乎治之法也

○一治驚悸怔忡健忘不寐屬心血虛者

補心湯 主方

當歸二錢

川芎七分

白芍炒二錢

生地黄二錢

白朮去一錢

遠志去八分

白茯苓二錢

酸棗仁炒八分

麥門冬去一錢

黃連去一錢

升炒玄參五錢

甘草炙三

右剉一劑水煎溫服○一方加柏子仁

○一論血虛心神不安驚悸怔忡不寐遺精

安神鎮驚丸

當歸酒洗一兩貝母去心一兩川芎七錢生地黃酒洗一兩五錢麥門冬去心一兩酸棗仁炒五錢

白芍酒炒一兩遠志去心七錢陳皮去白一兩白茯苓去皮七錢黃連姜汁炒五錢甘草三錢

朱砂研末水飛一兩右為末煉蜜為丸如菜豆大每服五十丸食遠棗湯送下

一論七情六慾相感而心虛夜多夢寐睡臥不寧恍惚驚悸痲痺屬心氣虛

者

無氣安神湯 當歸一錢二分人參 黃連姜汁炒生地黃 麥門冬去心酸棗仁炒

遠志各一錢黃芪蜜炒膽星錢淡竹葉錢甘草六分白茯苓去皮心一錢二分

右到一劑生姜一片棗一枚水煎服

一論小兒大人被驚神不內守痰迷心竅恍惚健忘諸癩痲風心風等症

神醒心丸

南星末五兩川黃連末一兩五錢先以姜汁拌內蒸半日入南人參末五錢

製遠志末五錢飛過辰砂研七錢五分琥珀七錢五分酸棗仁炒研末

右用雄豬心血三個入竹瀝打麵糊為丸如梧桐子大金箔為衣每服五十

女食遠白湯送下小者三十九

○一論異夢多驚有二法一於醫中戴羅大靈砂一囊一於枕中置真麝香一

囊皆能杜絕異夢而療夜魘

○一論夜夢○陰盛夢大水恐懼○陽盛夢大火燔灼○陰陽俱盛夢相殺○

上盛夢飛○下盛夢墮○飽夢與人食○饑夢取人食○心實夢燔灼○心

虛夢被火陽物堅○肝虛夢細草茫茫○肝實夢伏樹下不敢起○脾虛夢

飲食不足○脾實夢築牆蓋屋○肺虛夢白物斬血籍○肺實夢兵刃血戰

○腎虛夢舟船溺水○腎實夢伏水中若有所畏

怔忡

天怔忡者心中不安惕惕然如人將捕是也屬血虛有慮便動屬虛時作時止

者痰因火動瘦人多血少肥人屬痰

怔忡者心胸燥動謂之怔忡此心血不足也多因富貴戚戚貧賤不遂所願而

論世保元
一論血虛火盛怔忡心慌恍惚煩燥不寧
養血清心湯

當歸酒洗 川芎七分 白芍酒炒 生地黄酒洗 黃連姜汁炒 片苓去朽

梔子炒八分 酸棗仁炒 遠志去心 麥門冬各錢 甘草三分 右剉一劑生薑煎服

一論心煩懊憹驚悸怔忡心中氣亂此血虛而火盛也

朱砂安神丸

朱砂另研水飛 當歸酒洗 生地黄酒洗 黃連酒洗 甘草炙

一方加人參白朮茯神酸棗仁炒麥門冬去心各等分爲末煉蜜爲丸如

黍米大每服五十九丸食遠米湯送下

一論思慮則心跳者是心中無氣少血故作怔忡也

四物安神湯 當歸酒洗 白朮去皮 白芍酒炒 生地黄酒洗 熟地黄 黃連姜炒

辰砂研承臨 白朮去芦 酸棗仁炒 人參 麥門冬去心 烏梅一个 梔子

竹茹 右剉一劑煎服

論心氣怔忡而自汗者不過一二服而愈

參歸腰子

人參 五錢

當歸身 五錢

猪腰子 一對

右先以腰子用水二碗煮至一碗半將腰子細切入二味藥同煎至八分吃腰子以藥汁送下如吃不盡腰子同上二味藥渣焙乾為細末山藥糊為丸如梧子大每服三十九丸米湯送下

○論精神虛憊恍惚不寧心思昏憤氣不足健忘怔忡

加味寧志丸

人參

白茯苓

遠志

石菖蒲

酸棗仁

朱砂

黃連

黃連

去毛

栝子仁

當歸

生地黃

木香

朱砂

朱砂

朱砂

朱砂

牛一牛人藥半為衣

右為細末煉蜜為丸如茶豆大半饑時麥門冬去心煎胡荽

虛煩

夫虛煩者心胸煩擾而不寧也多是體虛攝養有乖榮衛不調使陰陽者二氣有所偏勝也或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛內經曰陽虛則外寒陰虛則內

熱陽盛則外熱陰盛則內寒令人虛煩多是陰虛生內熱所致虛勞之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後虛煩之症却無霍亂臨病宜審之○巢氏病原曰心煩不得眠者心熱也但虛煩不得眠者膽冷也

一論病後虛煩不得眠及心膽虛怯觸事易驚短氣悸之或復自汗等症

溫膽湯 半夏湯泡七錢 竹茹 枳實炒各三錢 陳皮四錢 茯苓去皮二錢

甘草炙三錢二分 石剉分二劑 薑棗煎服 一方加酸棗仁遠志去心五味子熟地黃人參各等分

一論大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不

惡寒身不痛不可汗下宜服

芡葉石膏湯 方見傷寒

不寐

不寐有二種有病後虛弱及年高陽衰不寐者有痰在膽經神不守舍亦不

寐虛者用六味君子湯加炒酸棗仁黃芪痰者用溫膽湯減竹茹一半加南星炒酸棗仁傷寒不寐者當求之本門

一論心膽虛弱晝夜不眠百方無効服此如神

同枕無憂散

人參錢五半夏煨枳實炒竹茹

陳皮 枳石膏錢三白茯苓去

麥門冬去心

酸棗仁炒

甘草各一分

右剉一劑龍眼五個水煎服

一論勤攻勞心痰多少睡心神不足

養心湯

人參 麥門冬去心黃連炒

白茯苓去白茯神去當歸酒酸棗仁炒

白芍酒

遠志去栝子仁 陳皮 甘草 右剉蓮肉五個去心水煎溫服

安神復睡湯

當歸 川芎 白芍酒 熟地黄 益智仁 遠志甘草水

酸棗仁炒

山藥 龍眼肉各等分 右剉姜棗煎服

一論心氣不足恍惚多忘或勞心膽冷夜卧不睡此藥能安神定智

加味定志丸

人參三白茯神去木 遠志甘草水石菖蒲二酸棗仁炒栝子仁二

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大朱砂乳香爲衣每服五十九臨臥棗湯送下
睡法

睡不厭蹴覺不厭舒漱者曲膝卷腹以左右肋側卧修養家所謂獅子眠是也如此則氣海深滿丹田常暖腎水易生益人多矣舒体而卧則氣宣而寐蓄神散而不潛故卧惟覺時可舒体耳○西山蔡季通引千金方睡訣云睡則必側覺正而伸早晚以時先睡心後睡眼晦菴以爲此古今未發之妙

二論膽虛睡卧不安心多驚悸

酸棗仁 二兩炒令香熟

右爲末每服二錢不拘時竹葉湯調下

二治心下怔忡眠倒即大聲打鼾睡即醒不寐余以

羚羊角烏犀角各用水磨濃汁入將所用或用養心湯或復睡湯內服之立

効蓋打鼾者心肺之火也

二治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕狀頭目不清

人參

枳殼

五味子

桂心 各三

栝子仁 二
甘菊花

白茯苓

枸杞子 各三
山茱萸 五
熟地黃 錢
石為末 每服一錢 溫酒

厥症

厥陽厥脈滑而沉實陰厥脈細而沉伏

氣虛則發厥血虛則發熱厥者手足冷也氣屬陽陽虛則陰寒之故發厥也血

屬陰血虛則陽寒之故發熱也氣虛發厥者當用溫藥血虛發熱者不宜用

涼藥當用溫養氣血之藥以補之宜養陰黃芪建中湯之類是也又有一種

病實熱者極而手足厥冷所謂熱深厥亦深此當用涼藥須以脈別之此最難辨

○一論陽厥者是熱深則厥深蓋陽極則發厥也急宜六乙順氣湯治之

○一論陰厥者如得之身冷脈沉四肢厥逆足踰卧唇口青或自利不渴小便

色白宜四逆理中湯之類仍速灸關元百壯鼻尖有汗為度

○一論痰厥者卒然不省人事喉中有水鷄聲者是也用水鷄白礬等分研末

吹鼻即以香油一盞入姜汁少許灌之立醒或燒竹瀝姜汁灌之亦可

○一論虺厥者乃胃寒所致經曰虺者長蟲也胃中冷即吐虺宜理中湯加炒川椒五粒檳榔五分吞烏梅丸

○一論氣厥者與中風相似但風中身溫氣中身冷以霍香正氣散加南星木香烏藥如有痰以四七導痰湯主之

○一論暴怒暴死者名曰氣厥蓋怒則氣上氣上則上焦氣實而不行下焦氣逆而不吸故令暴死氣上宜降之

五磨飲子

木香

沉香

檳榔

枳實

白烏藥

右五件等分白酒磨服立効

建中湯

見汗証

六一順氣湯

見傷寒

四逆湯

見中寒

理中湯

見中寒

霍香正氣散

見霍亂

四七湯

見諸氣

導痰湯

見痰飲

心胃痛

脈沉細而遲者易治浮大弦長者難治

胃脘痛者多因縱恣口腹喜好辛酸恣飲熱酒煎燂復食寒涼生冷朝傷暮損
日積月深自鬱成積自積成痰痰火煎熬血亦妄行痰血相雜妨碍升降故
胃脘疼痛吞酸噯氣膈雜惡心皆膈噎反胃之漸者也俗醫以燥熱之藥治
之以火濟火悞矣古方有九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰
痃曰去來痛失所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥治之乎須分新久若明知
身犯寒氣日得寒物而於初得之時當用溫散溫利之藥若病久則成鬱矣
鬱則成熱宜用炒山梔為君熱藥為之嚮導則邪易伏病易退病安之後若
縱恣不改病必再作難治矣此病雖日久不食不死必須待服藥數劑痛定
過一日漸而少食方得痊安其有真心痛者大寒觸犯心君又曰汚血衝心
手足青過節者且發又死又發且死非藥所能療焉

○一論胃脘積有鬱熱刺痛不可忍者此方治胃痛之主方也

清熱解鬱湯

山梔仁

炒黑二錢

乾薑

炒黑五分

川芎

一錢

黃連

炒一錢

香附

炒一錢

枳殼

去穢炒一錢

蒼朮

米泔浸七分

陳皮

五分

甘草

三分

右剉一劑生薑三片水煎熱服服後戒飲食大牛日再服一劑神效如痛甚加薑汁二三匙入藥同服

○一論諸積氣為痛心膈痛腹痛血痛腎氣痛脇下痛大便不通氣噎宿食不消等症

神保丸 木香二錢 胡椒二錢 全蝎全者七枚 巴豆十枚去心研末

右為末入巴豆霜再研湯浸蒸餅為丸如麻子大朱砂三錢為衣每服三七

粒○心膈痛柿蒂燈心湯下○腹痛柿蒂煨薑煎湯下○血積痛炒薑醋湯

下○肺氣盛者白礬蛤粉各一錢黃丹一錢同研為散煎桑白皮糯米飲調

三錢下○氣喘桑白皮糯米飲下○腎氣痛脇下痛炒茴香酒下○大便不

通蜜調檳榔末一錢下○氣噎木香湯下○宿食不消茶下或酒漿飲在下

○酒麪熱毒過度痰飲致臂痛柿蒂湯下○諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治

獨此藥能去之○有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不瘥乃流人背

脊久之又注右脇攣痛甚苦乃合服之一投而瘥再服除根

○一論治心胃刺痛并兩脇肋痛嘔吐胸痞大便堅六脉數或發熱口乾

柴胡 黃芩 赤芍 厚朴 枳實 梔子 鬱金

黃連 半夏 青皮 大黃 芒硝 甘草

右劉生薑三片水煎熱服

一治心氣及胃脘諸痛鬱火所致者

肥梔子去殼十五枚
姜汁炒黑 撫芎一錢
童便炒 香附童便炒

右劉水煎三滾入薑汁三四匙再煎一滾去渣入百草霜二匙調和服之

一治心胃痛不可忍者或心神恍惚

梔子炒黃連炒三味 停用茯苓茯神減半水煎服立止

一治因食多煎炒燒餅米挫熟麪之類以致熱鬱胃脘當心而痛或嘔吐不
已漸成番胃

黃連六錢 甘草一錢 右劉水煎溫服立止

一治胃脘心氣作痛有熱者 酒餅炒 梔子炒 石膏煨各三錢

右劉水煎一服立止

一論男婦小兒常慣心腹作痛宜服此藥一料以拔病根永不再發此藥能

清痰涎消食積酒積茶積肉積一切諸積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈
雜噯氣嘔吐吞酸脾疼諸痛神効

價金丹 白朮去苦三兩 炒 枳實炒 蒼朮米泔浸炒 猪苓一兩 麥芽 神曲

半夏湯泡各兩 赤茯苓去皮 澤瀉 川芎 黃連陳土炒 白螺螄殼煨谷七錢

砂仁 草豆寇 黃芩陳土炒 青皮去穢 萊服子炒 生薑各五錢

陳皮去白 香附子炒 瓜蒌仁 檳榔各三錢 川厚朴炒 木香二錢 甘草二錢

右為細末青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作糊為丸如梧子大每服七十丸冬

至百丸米湯送下○吞酸加吳茱萸湯泡寒月用五錢熱月用二錢半○久

病挾虛加人參扁豆石蓮肉各五錢○時常口吐清水加炒滑石兩半 煨五錢

一論胃脘痛屬寒者

胡三建湯 丁香 良薑 官桂各一錢五分

右剉一劑水一碗煎七分用胡椒五十粒炒為末調入藥內頓服○一方用

良薑末三分米湯調下立止

○一治心胃刺痛不可忍皆胃中冷氣所致者

乾薑炒 官桂 蒼朮米泔炒 半夏姜汁炒

右剉生薑煎服

○一論一切氣痛心痛肚疼及冷氣痛

豆蔻一兩 吳茱萸四兩 胡椒一兩

右為末每服五分輕者三分用飛過鹽三分溫酒調服

○一論氣自腰腹間攻心痛不可忍腹中冰冷自汗如洗手足攣急厥冷

山梔子大者四十九個 大附子一枚泡

右為粗末每服二三錢酒煎六分入鹽一捻溫服

○一治諸般心腹氣痛或瘀血作痛

桃靈丹 桃仁五錢 五靈脂五錢火

右為末醋糊為丸如梧子大每服二十丸酒下或醋湯下

○一人心胃刺痛手足稍冷出汗指甲青白藥不効余用當歸三錢煎湯外用

水磨末香沉香烏藥檀殼磨濃調服立止

一論寒邪冷氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背脊甚則經年不瘥

附九 西園公履驗

川烏頭

泡去皮 附子

三乾薑炮

官桂

二川椒

去目微炒

赤石脂

二兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十九丸溫水下覺至痛處即止若不
加至五十九丸以至為度若是朝服無功覺至午後再進二十九丸若久心痛每
服三十九丸至五十九丸盡一劑終身不發治心痛徹背如神

一論心腹疼痛每作必胸滿嘔吐厥冷面赤唇麻咽乾口燥寒熱不時而脈
洪大屢服寒涼而損氣之故內真寒而外假熱也且脈弦而洪有怪狀乃脾
氣虧損肝脈乘之而然當煖補其胃

中益氣湯

方見內傷

依本方加半夏茯苓吳茱萸

一婦人胃脘當心而痛劇右寸關俱無左雖有微而似絕手足厥冷病勢危
篤察其色眼胞上下青黯此脾虛肝木所勝用參朮茯苓陳皮甘草補其中

氣用木香和胃以行肝氣用吳茱萸散脾胃之寒止心腹之痛急與一劑候

滾先服前熱再進諸病悉愈何可泥其痛無補法而反用攻伐之藥禍不淺

○一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛年久不愈諸藥不應余用歸脾加炒山梔而愈

○一唐儀部胸內作痛月餘復亦痛左關弦長右關弦緊此脾虛肝脉所乘以

補中益氣加生夏木香二劑而愈又用六君子湯二劑而安此面色黃中見青

○一論有蟲者必面上白斑唇紅又痛後便能食時作時止是也用二陳湯加

苦練參根皮煎服上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治或曰痛而

久卧不安自按心腹時大叫或青或黃唇緩目無睛光者此蟲痛也

○一治蛔蟲作痛神方

用苦練根上皮洗淨白水煎露一宿次日早燒猪肉一塊嗅其氣然後服

藥其法上半月服其蟲盡下

○一治寸白蟲作痛

用酸石榴東南根二兩檳榔五錢大黃五錢白水煎露一宿次日五更分

服末服先燒些猪肉嗅其氣不可食其藥上半月服之立効

○一論胃冷蠱蟲上攻心痛嘔吐四肢冷

烏梅丸 當歸四錢 人參六錢 炮薑一兩 肉桂六錢 大附子炮六錢

細辛六錢 川椒去目炒 黃連酒炒一兩 黃柏酒炒六錢

右為末烏梅三十箇去核搗攔入蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心鹽

湯送下烏梅用好醋漬一宿去核於五升米飯上蒸熟杵如泥和藥令相得

納日中杵三千下入蜜和為丸又治胃腑發咳而嘔嘔甚則長蟲出

○一論蟲攻心痛并腹中有塊按之不見往來痛無休止

化蟲丸 鶴虱三錢 胡粉炒 白礬枯 苦練根皮去淨 檳榔各五錢

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸米飲入直芝麻油一二點拌勻

服之其蟲小者化為水大者自下

○一婦年四旬心胃刺痛時止不思飲食食則即吐手足厥冷胸中痞悶

口乾作渴余曰此胃中有蟲也以二陳湯加檳榔根實為梅花椒炒黑乾姜

苦練根皮生薑煎一服打下蟲一大碗遂止

○一論急心痛

玄靈散

五靈脂

去砂

玄胡索

炒 莪朮

火煨

良薑

炒 當歸

各等分

右為末每服二錢熱醋湯調下

○一論諸氣心痛不可忍者

絳雪散

白礬

一兩

朱砂

一錢

金箔

三片

右為末每服一錢五分輕者一錢空心白湯調下

○一論心疾方

白礬

一兩

白礬

一錢五分

右為細末薑汁打麵糊為丸如黃豆大每服一丸溫酒送下

○一治心胃氣痛如神

用生礬枯礬等分為末麵糊為丸如櫻桃大每服三丸燒酒送下立止

○一治心胃刺痛黑砂糖半鍾熱燒酒調服

○一治心氣痛五靈脂一錢枯礬二分為末溫酒調下

一治心胃痛至死用良薑末三分米湯調下立已

一徐四可治胃脘痛用炒鹽一錢生薑七片水煎一鍾溫服立止

一論心腹痛不問寒熱新久一服立止
官桂五分 白芍二錢 甘草五分

右剉水煎服。如感冒寒邪加香蘇散有熱加芩連。如大便秘及下痢初

起任服涼藥不通腹痛不止加大黃枳殼立効

一治胃脘痛甚諸藥不効者
黃連六錢 大附子炮去皮臍一錢

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎稍熱服

一治心疼黃荊子炒焦為末米飲調下

又方蜜一鍾酒一碗同蜜煎滾調枯礬末一錢溫服出汗

一治諸血諸氣痛不可忍及心脾氣血諸痛又治血滯腰痛

三香沉麝丸

朱砂 血竭 沒藥 各一分
沉香 一分
木香 半分
麝香 半分

右生為末磁器煮生甘草膏丸如皂角子大每服一丸姜鹽湯嚼下口煩人

產後氣血痛並下之亦治脚痛血滯腰痛用續斷牛膝桃仁炒煎溫湯送下
○血暈用乳香泡湯研化服

腹痛

心腹痛不得息脉細小遲者生脉大而疾者死

大腹痛寒氣客於中焦于脾胃而痛者有宿積停於腸胃者有結滯不散而痛者有痛而嘔者有痛而瀉者有痛而大便不通者有熱痛者有虛痛者有實痛者有濕痰痛者有死血痛者有蟲痛者種種不同治之皆當辨其寒熱虛實隨其所得之証施治若外邪者散之內積者逐之寒者溫之熱者清之虛則補之實者瀉之泄則調之閉則通之血則消之氣則順之蟲則追之積則消之加以健理脾胃調養氣血斯治之要也

○一論風寒外感飲食內傷七情惱怒過度肚腹疼痛初起者

行氣香蘇散方見飲食

世保元
一論外中寒邪內傷冷物肚腹綿綿痛不已而手足厥冷者

積散 方見中寒

一論肚腹疼痛有寒有熱有食有氣治一切肚腹痛之總司也

鬱導氣湯

蒼朮

米泔浸一錢

陳皮 五分

香附

童便浸一錢

白芷

一錢

川芎

一錢

白茯苓

去皮一錢

乾薑

炒五分

滑石

一錢

山梔仁

炒一錢

神曲

炒一錢

甘草

少許

右剉一劑水煎溫服

一論綿綿痛無增減脉沉遲者寒痛也

桂湯

乾薑

肉桂

良薑

各七分

枳殼

去穢炒

陳皮

砂仁

厚朴

煨

吳茱萸

炮各一錢

香附

一錢五分

木香

五分

甘草

三分

右剉生薑煎服○痛不止加玄胡索茵香乳香○寒極手足冷加附子去吳

茱萸良薑○泄瀉去枳殼

一論乍痛乍止脉數者火痛也

芩湯

黃連

白芍

梔子

枳殼

去穢

厚朴

去皮

香附 撫芎 各一錢 木香

砂仁

同香 各五分 甘草 三分

右判一劑生薑一片水煎痛甚不止加玄胡索

○一論肚腹滿硬痛久不止大便實脉數煩渴者積熱也

枳實大黃湯

枳實

大黃

檳榔

川厚朴 各一錢

甘草 三分 木香 五分 另研

右判一劑水煎溫服

○一論痛不移處者是死血也

活血湯

當歸尾

赤芍

桃仁 去皮尖

牡丹皮

玄胡索

烏藥

香附子

枳殼 去穢 各錢 紅花

官桂 各五分

木香 五分 另磨汁

川芎

分甘草 二分

右判一劑生薑一片水煎服

○一論小便不利而痛腹中鈎引脇下有聲者是濕痰也

二陳湯加減 方見痰飲

○一論以手按之腹軟痛止者是虛痛也

溫中湯

良薑

官桂

益智仁

砂仁

木香 另研 香附米

厚朴煨陳皮

小茴香酒炒當歸

甘草各等分

玄胡索

右判一劑生薑煎服

一論食積腹痛其脉弦其痛在上以手重按愈痛甚欲大便利後其痛減者

加味平胃散

蒼朮

米泔浸炒一錢

陳皮

一錢

厚朴

姜炒八分

半夏

姜炒八分

川芎

五分

香附

一錢

枳實

麸炒一錢

木香

三分

神曲

炒一錢

山楂

一錢

乾薑

七分

甘草

三分

右判一劑生薑三片水煎溫服

一論時痛時止面白唇紅者是蟲痛也

梅湯

烏梅

花椒

檳榔

枳實

木香

香附

砂仁

川練子去核

肉桂

厚朴去皮

姜炒

乾薑

甘草

各等分

右判一劑生薑一片水煎服

二仙丸

治蟲痛

雄黃

白礬

檳榔

各等分

右為末飯丸如黍米大每服五分食遠白水下○乾嘔者不吐不泄而但痛

也有時者淡食而饑則病厚味而飽則否也浮○經曰腹疾乾痛有時當爲

○一孩子腹中作痛看看至死腹中揣摸似有大小塊諸醫不効予只令人慢

慢以手搓揉痛處半日其蟲自大便出而愈

○一婦人腹痛如錐刺每痛至死不敢着手六脉洪數此腸癰毒也

用穿山甲炒白芷貝母殭蚕大黃合一大劑水煎服打膿血自小便中出即愈

○一李儀部常患腹痛治以補中益氣加炒山梔即愈

○一朱太守因怒腹痛作瀉或兩脇作脹或胸乳作痛或寒熱往來或小便不

利飲食不入嘔吐痰涎脾思不清此肝木乘土用小柴胡加山梔炮姜茯苓陳

皮製黃連一劑即愈製黃連即黃連吳茱萸等分用鹽水拌濕器一二日同炒焦取連用

○一人內停飲食外感風寒頭疼發熱惡心腹痛予以藿香正氣散加香附川

芎一服而止次日病悉除惟腹痛不止以手重按其痛稍止此客寒乘

虛而作也以香砂六君加木香炮姜服之睡覺病減六七去二香再服即愈

○一嬪人臍腹疼痛不省人事只此一服立止人不知者云是心氣痛誤矣予

○一嬪人臍腹疼痛不省人事只此一服立止人不知者云是心氣痛誤矣予

用柏五零脂木通去皮三味等分每服五錢醋水各半盞煎至七分去渣服
一論白芍藥味酸微寒補中焦之藥得炙甘草爲輔治腹中之痛聖藥也○
如夏中熱腹痛少加黃芩○若惡寒腹痛只少加肉桂一錢白芍三錢甘草
一錢五分此三味爲治寒腹痛此仲景神品藥也○如深秋腹痛更加桂二
錢○如冬月大寒腹中冷痛加桂枝二錢五分水二盞煎服

腰痛

溪曰脉必沉而弦沉爲滯弦爲虛瀯者是瘀血緩者是濕滑者伏者是痰大
者是腎虛也

入腰乃腎之府動搖不能腎將備矣因嗜慾無節勞傷腎經多有爲喜怒憂思
風寒濕毒傷之遂至腰痛或引於脊項旁及一脇下不可俯仰此由腎氣虛
弱所致宜滋腎調氣病可除矣

一論常常腰痛者腎虛也此方主之

開腎湯

當歸酒洗

白芍酒炒

生地黄

熟地黄

陳皮

小茴鹽酒炒

人參

五分破故紙酒炒

牛膝去苦酒洗

杜仲去粗皮酒炒

白茯苓去皮各一分

甘草三分

黃柏

去皮酒炒

知母酒炒各七分

甘草三分

右剉一劑棗二枚水煎服○痛甚者加乳香砂仁沉香去芍藥生地陳皮○

如常服合丸藥俱為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸米湯下酒亦可

○一論腰膝濕熱作痛者

清熱勝濕湯

蒼朮米泔浸

黃柏鹽水炒

羌活

白芍酒炒

陳皮去白

牛膝

去芦酒洗

杜仲姜汁炒

威靈仙

木瓜

澤瀉各五分

甘草三分

右剉生薑二片水煎服○痛甚者加乳香沒藥為末各五分○水濕停下入

黑丑檳榔各五分○血痛加歸尾桃仁去皮尖各一錢紅花酒洗五分○倦

怠脚如沙墜加蒼朮防已薏苡仁白朮各五分○冷風作痛加熟附子一錢

虎脛骨末五分去黃柏澤瀉各三分○游走而痛加紫金皮川烏○濕熱加

炒梔子○氣不順加烏藥○酸軟加牛膝當歸地黄○腎虛加破故紙炒分

世傳一
一論氣滯腰痛并閃挫腰痛腎虛腰痛

安散 當歸 官桂 玄胡索 杜仲 小茴香 木香 黑丑

右為細末每服二匙空心溫酒調下一方去黑丑以酒煎服

一論腰痛神方 魚鱧炒成珠好酒一碗淬入內溫熱通口連渣服

一論此方專滋腎水壯元陽益筋骨又能烏鬚治腎虛腰痛足膝痛神效

可娥丸 破故紙酒炒 川草薺童便浸 杜仲姜汁炒 牛膝去芦酒洗

黃柏鹽炒 知母酒炒 各四兩 胡桃肉去皮泡八兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服八十丸空心酒送下

一論腎氣虛弱肝脾之氣襲之令人腰膝作痛屈伸不便冷痺無力夫腎水藏也虛則肝脾之氣湊之故令腰膝實而作痛屈伸不便者筋骨俱病也經曰能屈而不能伸者病在筋能伸而不能屈者病在骨故知骨伸不便為筋骨之病也冷痺者陰邪實也無力者氣血虛也

獨活寄生湯 方見中濕

○一論元氣虛弱腰痛白濁以

補中益氣湯方見內傷依本方加黃柏知母白芍俱酒炒牛膝去苦酒洗杜仲

○一論腎經虛損腰腿遍身疼痛

壯腎散 扶溝何晴歡傳

仙靈脾酒浸五兩遠志去心四兩巴戟去心六兩杜仲酒炒五兩破故紙酒炒五兩

肉苁蓉酒浸六兩青鹽八兩大茴香五兩小茴香炒五兩

右為末每服二錢用猪腰切開搽藥末在內紙裹火煨熟細嚼酒下

○一論腰痛人皆作腎虛治諸藥不効者此瘀血痛也

大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆大于鍋內炒黃色投水二碗煎至

五更初頓服天明取下腰間瘀血用盆器成如鷄肝樣痛即止

○一治腰痛不能轉側點藥後少頃復舊神効

雄黃二錢 黃丹一錢 燄硝一錢 去黃丹名火龍丹

右為細末令患人仰睡以銀簪蘸藥點眼大角頭少詳一二次神効要天月

○一治腰痛良方 杜仲姜酒炒 破故紙炒 五小茴香酒炒 人參三分

右為末用猪腰子二个切開入藥蒸熟帶水渣同食即愈

○一治腰痛秘方 王景明傳

當歸酒洗 杜仲酒炒 大茴香 小茴香鹽酒炒 羌活 獨活

石到一大劑用頭生酒浸一宿次日早濾汁溫熱服之用渣將酒再煎

補遺

青娥丸 馬伏所秘傳 治諸虛百病大補之聖藥也素患腰痛者殊効

仙茅四兩酒浸洗 白芍神去皮 破故紙四兩酒浸一日 懷生地黃酒浸砂鍋內

川杜仲去皮姜汁 天門冬去心 兔絲子酒炒搗 當歸酒洗 肉蓯蓉酒洗去

懷熟地黃酒洗淨 甘枸杞子四兩 小茴香鹽酒炒 黃精酒蒸 巴戟鹽水淘去

青鹽四兩水洗去 牛膝酒洗去 揀參二兩 瑣陽三兩 鹿茸酥炙

川草薺童便浸七日長流水 核桃肉去殼一百五

右為細末好酒打糊為丸如梧子大每服百丸空心鹽湯好酒任下忌三百

○一治一切腰痛如神 宋東園傳

黑丑半生半炒為細末水和丸如梧子大硫黃末為衣每服五十丸九空志

脇痛

脈雙弦者肝氣有餘兩脇作痛

夫脇痛者厥陰肝經為病也其症自兩脇下痛引小腹亦當視內外所感之邪

而治之若因暴怒傷觸悲哀氣結飲食過度冷熱失調顛仆傷形或痰積流

注于脇與血相搏皆能為痛此內因也若傷寒少陽耳聾脇痛風寒所襲而

為脇痛此外因也治之當以散結順氣化痰和血為主平其肝而導其滯則無不愈矣

○一論左脇下痛肝積屬血或因怒氣所傷或跌撲閃挫所致而為痛也

疎肝飲 主方

黃連 吳茱萸煎 炒三錢

柴胡

當歸 酒洗各一錢五分 青皮 去穢

桃仁 研如泥

枳殼 炒各一錢

川芎

白芍 酒炒各一錢

紅花 五分

右剉一劑水煎食遠服

○一論右脇痛者肝邪入肺也
推氣散

片薑黃 枳殼炒各一錢 桂心少 甘草炙五分 一方加廣陳皮五分 半夏一錢

右剉一劑生薑三片水煎食遠服

○一論左右脇俱痛肝火盛而木氣實也

柴胡歸芎湯 柴胡 川芎 白芍 青皮去穢 枳殼炒各一錢五分

龍膽草 甘草 香附子 當歸 木香 砂仁各五分

右剉一劑薑一片水煎溫服

○一論因內有濕熱而脇痛甚伐肝入之氣瀉肝火之要藥也

當歸 龍膽草 山梔子 黃連 大黃酒浸炒

蘆薈 香黛各五分 木香二錢 麝香五分 柴胡五錢 青皮去穢醋炒

右為細末神麩打糊為丸如梧桐子大每服二十九姜湯送下

○一論勞傷身熱脇痛者脉必虛也

補中益氣湯 方見內傷 依本方加川芎白芍青皮木香砂仁小茴 枳殼去黃

〇一論左脇下有塊作痛不移者是死血也

活血湯 方見腹痛 依本方加青皮去烏藥

〇一論男子房勞兼怒風府脹悶兩脇脹痛此色慾損腎怒氣傷肝

六味地黃丸料加柴胡當歸一劑而安 方見補益

〇一嬾人口苦脇脹此肝火也用小柴胡湯加梔子黃連少愈更以四君子湯

加當歸白芍柴胡調脾胃而痊

臂痛

臂為風寒濕所搏或睡後手在被外為寒邪所襲遂令臂痛及乳頰以臂枕見

傷于風寒而致臂痛者悉依後方對症用之

〇一論有因濕痰橫行經絡而作臂痛者

二米湯 蒼朮 米泔浸 白朮 去芦 南星 陳皮 白茯苓 去皮 香附

酒芩 威靈仙

羌活

半夏

甘草各二兩

右剉一劑生服

一論臂痛因于寒者

五積散 方見中寒

一論臂痛因于氣者

烏藥順氣散 方見中風

一論臂痛因于濕者

胸痺湯 當歸 赤芍 黃芪 羌活 姜黃 防風 甘草 各等分

右剉生薑五片煎服

一論臂冷痛起手甚艱或一臂痛或兩臂俱痛者

五積交加散 葉主簿得効

五積散合人參敗毒散加木瓜薑棗煎服未効再加半膠可服烏藥順氣

散加羌活木瓜

一論凡臂軟無力不任重者乃脈腎虛風邪客滯于榮衛之間使氣血不

能周養四肢厥有此症肝主項背與臂脾腎主腰膝與脚膝其一臟若偏虛則隨其所主而病焉今此病症乃肝氣偏虛宜補肝腎六味丸主之

○一男子年六十餘素善飲兩臂作痛咯服祛風治痿之藥更加麻木發熱體軟痰湧腿膝拘痛口噤語澁頭目暈重口角流涎身如虛行搔起白屑始信謂余曰何也余曰臂麻體軟脾無用也痰涎自出脾不能攝也口斜語澁脾氣傷也頭目暈重脾氣不能升也痒起白屑脾氣不能營也遂用補中益氣加神麴半夏茯苓三十餘劑諸症悉退又用參朮煎膏治之而愈

肩背痛

○一論脉洪而大脉促上緊者肩背痛沉而滑者痰竊也

豁痰湯 半夏製 梔子炒 陳皮 海桐皮 枳殼各入 桔槁 赤芍

蒼朮製 香附製 茯苓去皮 川芎 薑黃各五 甘草二分

石劉一劑生薑煎服○如痛甚頭刺加朴硝二錢

○一論肩背痛不可回顧者太陽氣鬱而不行也以風藥散之脊痛腰強腰似折項似拔此足太陽經不通行以

羌活勝濕湯 藁本一錢防風一錢羌活一錢獨活一錢川芎一錢蔓荊子六分甘草一分

右剉一劑水煎服○身痛腰沉經中有濕寒加防已一錢輕者炮附子重者

炮川烏各五分

○一論背心一點痛者痰氣之所聚也

參合湯 陳皮 半夏製茯苓去皮烏藥 枳殼 殭蠶炒川芎 白芷

麻黃 桔梗 乾薑 紫蘇 香附 蒼朮 甘草 羌活各等分

右剉薑棗煎服

○一論風熱乘肺肩背強直作痛

提肩散 防風 羌活 藁本 川芎 白芍炒黃連酒炒黃芩酒炒各四分

右剉一劑生薑三片煎服○濕加蒼朮防已薏苡仁各五分○氣虛加人參

○汗多加黃芪蜜炒一錢○血虛內芎歸地黃

○一治肩背痛汗出小便數而少風熱乘肺肺氣鬱甚也當瀉風熱則愈以

通氣防風湯 防風 羌活 陳皮 人參 甘草各五分 藁本

青皮各三分 白豆寇 黃柏各二分 升麻 柴胡 黃芪蜜水炒各一錢

右剉一劑水煎食後溫服○如面白脫色氣短者不可服

○一論體虛人背惡風或夏月怕脫衣及嬾入產後破冷風吹八經絡故常

冷痛或手足冷至骨者又治腰痛及一切冷痺痛又治濕氣

禦寒膏

用生薑八兩取自然汁入牛膠三兩乳香沒藥末各錢五分銅杓內煎化

就移在滾水內須以柳條攪至成膏又入花椒末少許再攪勻用皮紙將

紙作殼子看痛處癩狹貼患處用鞋烘熱熨之候五七日脫下或不起小瘰

痛風

夫痛風者皆因氣体虛弱調理失宜受風寒暑濕之毒而四肢之內肉色不

其病書靜夜劇其痛如割者為寒多腫滿如刺者為濕多或汗出若水遂成斯疾久而不愈令人骨節蹉跌肢脛消瘦者為難瘳矣予考痛風脉理多端有旦定而夜甚脉弦而緊者是痛風也脉沉而伏中氣也不可一刺而治臨症當審辨矣曰痺者謂風寒濕三氣合而成痺故曰痺痺筋骨掣痛也曰著痺著而不行也曰行痺走痛不定也曰周痺周身疼痛也皆邪氣有餘之候耳

一論痛風腰背手足肢節疼痛乃血虛氣弱經絡枯澁塞滯而然也午後夜甚者血弱陰虛午前早上甚者氣滯陽弱痛甚者乃曰白虎歷節風走注風

膝大脛瘦曰鶴膝風是也

五秦苳湯

當歸 二錢

赤芍 酒炒 七分

蒼朮 童便浸 一錢

黑狗脊

去根 三錢 芎藭 七分

羌活 一錢 五分

秦苳 去芦 一錢 五分

川獨活 一錢

五加皮 二錢

黃連

姜汁炒 二錢 杜仲 每兩用小筒一錢 鹽一錢

錢水三鍾拌炒 二錢

生甘草 三分

黃芩 酒炒 一錢 五分

黃柏

酒炒 一錢 牛膝 去芦 酒浸 一錢 五分

人參 二錢

黃芪 酒炒 一錢

紅花 酒洗 八分

石剉桃枝七根每長一寸半燈心七根水煎服入童便好酒各二盞空心

溫服渣再煎服忌酒麪鯉魚濕熱羊鵝○如天將作雨陰晦時日而預先覺痛甚者加防風天麻升麻○午後夜甚者血弱陰虛加升麻五分牡丹皮一錢○早上午前甚者氣滯陽弱加連翹沉香竹瀝乳汁○痛甚者倍羌活紅花酒炒黃芩涼血則痛止○此症乃筋與骨症幼者乃外淫侵入大人及年近衰者不蓋養而得蓋筋屬肝血骨屬腎水內損所致耳

一論濕熱作痛不拘上下用之蒼朮妙于燥濕黃柏妙于去熱二物皆有雄壯之性亦簡易之方也加牛膝則治濕熱于流兩脚麻木或如火燎之熱者

二妙散

米泔浸黃柏乳汁浸透

右爲末

少三錢用酒調下痛甚加生薑汁熱服

一論

凝滯筋絡拘攣肢節疼痛行步艱難活血理氣第一品也

舒筋散

玄胡索炒

當歸

辣桂各等分

右爲末

每服二錢酒調下玄胡索活血除風理氣

十全大補湯

治勞倦遍身疼痛加半夏薑製倍桂

一婦人年七十餘遍身作痛筋骨尤甚不能伸屈遍身作痒如蟲行口乾目赤頭暈痰壅胸膈不利小便短赤夜間殊甚用六味地黃丸料加山水煎服
二論瘀血濕痰蓄于肢節之間筋骨之會空竅之所而作痛也肢節沉重者是濕痰晚間病重者是瘀血也

吐痛湯 乳香 沒藥 地龍酒炒 香附童便浸 桃仁 紅花 羌活

當歸 甘草節 牛膝酒浸 五靈脂酒淘去土 右剉水煎溫服

一論寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛

續斷丸 黃芪兩 人參兩 白茯苓兩 山茱萸肉兩 薏苡仁兩 續斷兩 防風錢

桂心兩 山藥兩 白朮錢 熟地黃兩 牡丹皮兩 麥門冬兩 石斛兩 鹿角膠

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒下

一論人手足不能屈伸周身疼痛

消風飲 薛用徐培鶴試驗

陳皮 白朮去芦 當歸 酒洗 白茯苓去皮 防己 獨活 木瓜酒洗 秦艽絡

半夏煨牛膝去川芎各八分玄胡索 羌活 枳殼去甘草三分防風各五分

右剉一劑生薑煎不拘時服口氣虛加入參八分

○一論一切遍身骨節疼痛或流注作痛不可忍者神效

人參 白朮去白茯苓去當歸 川芎 天麻 陳皮 甘草 赤芍

防風 羌活 生地黃 獨活 南星 黃芩 右剉生薑煎服

○一論風濕相搏一身盡痛以益氣湯加羌活防風藁本蒼朮治之如病去勿

再服以諸風藥損人元氣而益其病故也

○一男子兩膊痛不可忍者 臨川徐擴吾試效

黃芪蜜炒一兩 杜仲酒炒一兩 蒼朮米泔製一兩 當歸身一兩 洗一牛膝去秦艽一兩

獨活一兩 杜仲酒炒五錢 熟地黃一兩 桑寄生一兩 小茴鹽酒炒五錢 官桂三錢

右為細末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服百丸空心酒下

○一論雷火鍼 蒼朮五錢 川芎三錢 硫黃二錢 川山甲二錢 蔓荊子三錢

皂角三錢 射香五分 雄黃一錢 艾葉不拘

右為末紙捲如指大以草紙七層貼患處將藥燃起淨之知痛則止

一論灸法治諸風惡毒冷痺麻木腫痛或遍身骨節痛始覺腫痛灸之無不即愈

蒼朮兩羌活兩獨活錢五蛇床子錢五荆子錢五川山甲五錢雄黃三錢硫黃三錢

右為末炒熟以絹包熨患處法以醋拌炒作餅燒秤撻放餅上用絹包熨之

一論雷火鍼法

呪曰

天火地人三昧真火鍼天天開鍼地地裂鍼鬼鬼滅鍼人人得長生百病

消除萬病消滅攝過

右法可遇患人應痛處針之用紙三層或五層量病加減襯帛於痛處穴上

將桃針向燈火點着隨後念呪三遍針疾立愈其針用五月五日東引桃枝

削去皮兩頭如雞子樣長五七寸用尖

一人每勞肢休時痛或用清痰理氣之劑不勞常痛加以導濕臂痛漫腫形

體倦怠內熱盜汗脉浮大按之微細此陽氣虛寒用補中益氣加附子一錢

人參五錢腫痛悉愈又以十全大補百餘劑而康

○一人形体豐厚筋骨軟痛痰盛作渴喜飲冷水

或用愈風湯天麻丸等藥痰

熱益甚服牛黃清心丸更加散体痺麻余以為

胆腎俱虛用補中益氣湯加

減八味丸三月餘而痊已後連生七子壽踰七

旬外科精要云凡人久服加

減八味丸必肥健而多子信哉

○一治白虎歷節風走注疼痛兩膝熱腫

虎

脛骨

酥炙

黑附子

炮製去皮
臍各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下七日再服

脚氣

脉弦者風濡弱者濕洪數者熱遲瀼者寒微滑者

虛牢堅者實結則因氣散則

因憂繫則因怒細則因悲

脚氣者濕熱在足而作氣痛也濕熱分爭濕勝則

令人增寒熱勝則令人壯熱

此其為証亦有兼頭痛者頗類傷寒惟其得病

之始本於脚氣為異耳又不

可以脚腫爲拘亦有痛而不腫者名曰乾脚氣亦有緩縱不隨者名曰緩風亦有疼痛不仁者名曰濕痺亦有轉筋變急者名曰風毒此在醫者體會而辨証爾各有治法不同大抵脚氣之疾壅疾也喜通而惡塞故孫真人曰脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殞故脚氣之人皆不得大補亦不得大瀉是方也木通防已檳榔通劑也可以去濕然川芎能散血中之氣犀角能利氣中之血先痛而後腫者氣傷血也重用川芎先腫而後痛者血傷氣也重用犀角若大便實者加桃仁小便澀者加牛膝有熱加苓連時熱加石膏有痰加竹瀝全在治法切勿拘也凡脚氣攻心喘急不止嘔吐不休皆死水犯火故也

一論專治脚氣增寒壯熱者此濕熱在足而作氣痛也

已飲 蒼木熅水 白木 黃柏酒炒 防已 生地黃酒浸 川芎 檳榔

木通 犀角 甘草梢 右剉水煎空心服

一論脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先服此藥導之次用當歸痛湯服愈

不活導痰湯 羌活 御活各一錢 當歸一錢 防風炒 大黃酒浸一分 枳實炒

右剉水煎服

○一論濕熱脚氣為病肢節煩痛肩背沉重胸脇不利兼遍身疼痛下注足脛

腫痛脚膝生瘡赤腫及裏外生瘡膿水不絕或腫或痛並宜服

當歸拈痛湯 羌活 茵陳各一錢 防風去芦 猪苓 苦參 白朮去芦各五分

葛根四分 黃芩酒澤瀉 當歸酒洗 知母去毛 人參 蒼朮米泔浸炒四分

升麻 甘草各一錢 右剉水煎空心服

○一論三陽經脚氣流注脚踝上焮熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風用

人參敗毒散各一錢方見感冒門加蒼朮米泔浸炒大黃酒蒸各二錢作

一劑生薑煎空心服皮膚搔痒赤疹加蟬退

○一論風濕流注經絡間肢節緩縱不隨老人脚膝疼痛不能履地

七聖散 川牛膝酒浸 杜仲姜酒炒 續斷 川草薺 防風 川獨活 甘草各

右焙乾為末每服二錢酒調服

一治脚氣止痛奇方 乳香 沒藥 天麻 白附子 僵蠶

右剉各等分爲細末每服五分空心酒調服

一治濕氣攻注腰脚痛行步不得

當歸酒洗 肉桂 玄胡索 草薺 沒藥各三兩 杜仲酒炒 一兩五錢

右爲細末每服三錢空心温酒調下

一治脚氣浮腫 川牛膝去芦酒洗 威靈仙 一錢 漢防已一錢 五加皮一錢

蒼朮米泔水洗 二川獨活 一錢五分 當歸身 一錢 川黃柏益酒炒 一錢

右剉一劑生薑煎熟入酒一杯同服

一人有氣如火從脚下入腹者此虛極也蓋火起於九泉之下也此病十不

救一治法以四物湯加黃柏知母降火之藥服之外以大附子爲末津調貼

脚心湧泉穴以引火下行

一按此條言猶有未盡者如果勞怯陰虛之人有此固當作陰虛治若其實

之人有此則是濕鬱成熟之候也予嘗昌雨途行衣濕得此症以後所製加味

二妙丸一料服之而愈後醫數人皆驗若誤作陰虛治則成痿痺矣

○一治足跟痛有痰者有血熱

血熱四物湯加黃柏知母牛膝有痰唾者五積散加木瓜

○一論兩足濕痺疼痛或如火燎之熱從足跗熱起漸至腰膝或麻痺痿軟乃

濕熱為病皆貪酒嗜慾乘風所致然耳

加味二妙丸 蒼朮泔製酒浸兩黃柏酒浸兩牛膝去芦一兩當歸尾酒洗一兩車前一兩

防己一兩 龜板酥炙一兩或去龜板加熟地黃一兩亦可

右為細末好酒打糊為丸如梧桐子大每服七十九空心鹽薑湯下

○一治一切寒濕虛冷脚氣腫痛焦枯經年臥床不能動履者獨活寄生湯各

等分入好酒煮熟飲之効方見中濕門

○一論男婦五勞七傷腎氣衰敗精神耗散風濕流注脚膝酸疼行步艱辛飲

食無味耳焦眼昏皮膚枯燥嬾人臑冷無子下部穢惡腸風痔漏吐血瀉血

諸氣並皆治之

進地仙丹 西園公屢驗

黃芪炒一兩

人參一兩

白茯苓去皮一兩

白朮去苦二兩

大附子炮去皮四兩

覆盆子二兩

何首烏二兩

川烏炮一兩

白附子炮二兩

牛膝酒浸四兩

肉蓯蓉酒浸四兩

川草薢二兩

兔絲子酒浸二兩

烏藥二兩

天南星炒一兩

防風二兩

骨碎補去毛炒二兩

赤小豆二兩

木鱉子去殼二兩

羌活二兩

川椒去目炒四兩

地龍去土三兩

金毛狗脊去毛二兩

甘草一兩

右為細末酒煮麩

糊為丸如梧桐子大每服三四十九丸空心溫酒送下陶隱

君以此地仙丹編入道藏經時有人母幼年時得風氣疾久治不瘥五十餘

年隱居修合日進三服諸病頓愈髮白返黑齒落更生人常言看方三年無

病可治治病三年無藥可用噫有是哉余近苦脚膝酸痛服經進地仙丹三

日而愈由是知天下無不可治之病醫書無不可用之方特在於遇醫之耳

十四味輕脚丸

脚氣通用

當歸酒洗一兩

川芎一兩

一兩

草薢鹽水煮一兩

木香七錢

海桐皮七錢

細辛一兩

牛膝酒洗一兩

枳殼一兩

一兩

蒼朮米泔浸炒七錢

防風七錢

石楠藤一兩

麻黃七錢

杜仲姜炒一兩木香七錢威靈仙七錢羌活一兩薏苡仁一兩乳香五錢

續斷酒洗七錢檳榔一兩五加皮七錢獨活七錢五靈脂七錢沒藥七錢

右為細末酒浸雪膏為丸如梧桐子大每服五十九丸下或枳殼木瓜湯下

○一論寒濕脚氣痠痛不仁兩尺脉來沉細者此痺症也內經曰寒氣勝者為

痛痺濕氣勝者為著痺今疼痛不仁是寒而且著也兩尺主兩足脉來沉者

為裏遲者為寒是方也用桂附溫其寒蒼朮制其濕甘苓脾家藥也扶土氣

之不足制濕氣之有餘然必冷服者欲桂附之性行于下而不欲其橫行也

六物附子湯

白茯苓去皮三錢大附子炮去皮桂心防已各四錢白朮去蘆甘草炙一錢

右剉水煎空心服

○一論兩膝腫痛脚脛枯細者名鶴膝風也或痢後不謹感風寒濕或涉水履

霜以致兩足痛痺如刀剔處咬之狀膝腫大不能行動

補中益氣湯去棗升陳皮加兩子牛膝杜仲防風羌活川芎白芍熟地黃

薛防已生薑棗子煎服

○一論兩腿酸軟或赤或白足跟患腫或痛或痒後痛或如無襪或如破裂口
哺至夜痛脹痛熾熱以補中益氣湯加入八味丸料補其肝腎

○一論兩足心發熱作痒以滾湯浸漬漬而出水肌体骨立作渴吐痰此脾腎
虛而水泛為痰也以補中益氣湯兼進六味丸久而元氣復而諸症愈

○一論脚發熱則咽喉作痛內熱口乾痰涎壅上此腎經虧損火不歸經以補
中益氣湯加麥門五味及加減八味丸而愈

○一論兩腿逸則筋緩痿軟而無力勞則作痛如針刺脉洪數而有力或腎肝
陰虛火動之象也用六味丸而愈

○一論八味丸治脚氣足少陰經脚氣入腹腹脹痛上氣喘急下腎經虛寒所致
也此証最急以腎水乘心火死不旋腫八味丸方見補益

○一論八味丸治脚弱加續斷車釐老人加牛膝鹿茸○治鶴膝風加牛膝人參鹿茸
○一人以兩足發熱或脚跟作痛用六味丸及四物湯加麥門五味玄參治之

愈後因勞發熱惡寒作渴煩燥用當歸補血湯而安

○一人足熱口渴吐痰頭暈服四物湯加黃連黃柏飲食即減痰熱甚用十

全大補湯加麥門五味山藥山萸而愈

○一論風濕氣足脛腫痛用此熏洗立効

防風 荆芥 苦參 番白草 地榆 青藤 麻黃

蒼耳草 蒼朮 生蔥 炒鹽 威靈仙 各一兩

右用水一桶煮熟于桶內薰蒸痛處置微汗待湯稍温再洗痛處二三次覺痛

減如貧者只用桃柳榆槐桑椿六件木枝煎水洗亦効

○一論凡人患寒濕脚氣疼痛不仁者內服煎劑外宜以此湯薰洗之益壅痰

○一椒湯洗去 用川椒一兩葱一握生薑如掌大一塊水一盆煎湯洗之

○一治遠行脚打成泡 用水調生麵糊貼過夜間乾不可窳破

○一論兩足痛如刀割不可忍者

先用生薑切片醃香油擦痛處隨用薑火燒熟搗爛敷患處須臾薑乾而痛止神効

○一論脚氣冲心 用白礬三兩煎水浸洗兩足良久自愈

○一論脚走急跛石塊脚底墊腫不能行步痛不可忍者

用燒紅磚一塊將草鞋浸於尿缸內一宿或半日取來放在紅磚上將腫脚底立在草鞋上火過尿氣入皮裏即消此病諸方不載如早不治爛入

脚底俗曰捲

○一治脚氣腫痛鶴膝風不能動履

用真生薑汁一碗入牛膠一兩熬成膏入乳香沒藥末各一錢攪勻絹帛

攤貼腫消痛止次日將滾水入藥碗內去水又攤又貼効不可言

補中益氣湯

見內傷

六味丸

八味丸

俱見補益

當歸補血湯

見發熱

十全大補湯

見補益

補遺

○一論鶴膝不能動履腫痛難富及麻木風濕屬虛寒者宜之

神仙風藥酒

秦歸身一兩 大川芎一兩 片白朮去芦九錢 白茯苓去皮五錢 大川烏錢五

軟防風五錢 荆芥穗五錢 羊角天麻錢五 全蝎炒三錢 香白芷七錢

北細草五錢 何首烏五錢 新草烏五錢 威靈仙五錢 金釵石斛五錢

川牛膝去芦五錢 川獨活五錢 羌活三錢 麻黃節二錢 石楠藤五錢

薏苡仁酒洗一兩 川乾薑五錢 赤桂五錢 尖檳榔五錢 宣木瓜五錢

真石乳五錢 明沒藥二錢 川續斷五錢 白蒼朮米泔炒兩 嫩黃芪五錢

兩頭尖五錢 南木香二錢 漢防已五錢 桑寄生五錢 赤茯苓一兩

骨碎補五錢 甘草節五錢 虎脛骨煨乳浸五錢

右合一處用生頭酒五斤文武火熬熟去火毒早晚飲酒隨量

○一治男婦風濕相搏腰膝痛或因坐臥濕地雨露所襲遍身骨節疼痛氣逆白

秘傳藥酒方 白芷 桔梗 白芍 川芎 麻黃 茯苓

半夏 肉桂 甘草略一兩 陳皮 厚朴姜汁炒 枳殼炒 牛膝二兩

杜仲酒炒三兩 木瓜一兩 兩檳榔五錢 烏藥二兩 防己一兩 獨活一兩 當歸兩

蒼朮 米泔浸炒四錢

右各剉一麻布袋盛用無灰好酒三斗將藥袋懸浸於堦內密封固堦口放鍋內煮一時久然後取出過三日後去藥隨量飲之渣晒乾為末酒糊為丸如梧桐子大每服七八十九空溫酒下○腿膝疼痛加川烏虎脰骨○腰痛加破故帛肉蓯蓉枸杞子

疾秘傳藥酒方 治脚膝腫痛并手足痛

五加皮 八兩 川牛膝 去芦 杜仲 酒炒 當歸 懷生地黃 各三兩 地骨皮 二兩

右剉散用好酒一壘入藥重湯煮二炷香土埋三日出火毒隨量飲之

一婦人下體腫痛用人參敗毒散加蒼朮黃柏威靈仙痛減又以四物湯加

蒼朮黃柏防己紅花澤瀉

一秘方治脚氣腫痛用木瓜為末好酒調敷患處立止

一治兩脚俱是疔瘡腫毒骨痛用獨蒜切片鋪放痛處每蒜一片用艾二壯

去蒜再換再灸痛自愈

癩疝

內經曰肝脉大急沉皆為疝心脉滑搏急為心疝肺脉沉搏為肺疝又三陽急為瘕三陰急為疝

夫疝者由榮衛虛弱寒濕不調致令邪氣乘虛入于心腹中遂成諸疝發則小腹疼痛或遠膈逆上捨心甚則手足厥冷或大小便閉結其諸疝因邪氣留滯乃成積聚令人羸瘦少氣酒浙寒熱嗜臥飲食不養肌膚或腹滿嘔泄遇寒則痛又有癩人小腹腫痛攻及二腿者亦疝氣也

○一論疝氣者陰腫腹痛也

川練子 小茴香

破故布

青鹽

山茱萸

酒蒸去核

吳茱萸

三稜

莪朮

通草

橘核

荔枝核

甘草

各等分

右剉水煎空心服立効收功加馬蘭花蒼朮○如夏秋之月暑入膀胱疝氣作痛加黃連香菇扁豆不通滑石車前子

一論疝氣腫痛大便閉結或小便赤澀或有寒有熱兼治之神方也

川練子酒蒸去核取肉胡蘆酒炒小茴鹽酒炒青鹽黑丑搗碎木香大黃

滑石木通吳茱煨炒烏藥車前子七等分右剉水煎空心服

一治疝氣小腸氣南塘姪試効猪苓澤瀉蒼朮赤茯苓

桂皮川木通白芍川練子烏藥青皮紫蘇玄胡索

馬蔴花橘核仁三十个尖檳榔甘草各等分右剉生薑煎服

一論治七疝及奔豚小腸氣臍腹大痛

疝湯知府劉永山傳二方玄胡索小茴香炒川練子人參

大附子炮山梔子炒木香各等分全蝎炒

右為細末每服三錢空心溫酒調服

秘方 治症同前 青鹽二錢木通甘草各一錢川烏炮三錢燈草一錢

右剉一劑水煎空心溫服

一論治外腎腫痛諸般疝氣不論新久一服如神予嘗用此丸治患疝氣

已歷十餘年服至一料除根永不復發

木香金鈴丸 嚴副使方 木香 乳香 沒藥 大附子麩裏火煨

小茴鹽酒炒 川練肉 玄胡索 全蝎 人參各等分

右為細末好酒打糊為丸如梧子大每服百丸空心熱酒送下一服立止

○一論疝氣發於寒月者寒邪入膀胱也

加減五積散方見中寒 依本方加玄胡索專治醉飽後色慾不節觸傷小腹致

成疝氣其症自小腹連兩脇下心頭吊痛額出微汗宜之

○一論疝氣其症發於暑月者暑氣入膀胱也

加減香苓散 枳殼 陳皮 香附 蒼朮 麻黃 香茹 猪苓 澤瀉

車前子 三稜 木通 滑石 莪朮 川練子 玄胡索真甘

右剉薑蔥煎熱服○專治偏墜氣初起增寒壯熱發表輕者一服而愈

○一論疝氣偏墜疼痛腎虛者久服除根

六味地黃丸方見補益 全料內加

人參三兩 甘枸杞子三兩 巴戟肉三兩 懷生地黃六兩
煎一兩桂一兩酒二碗

破故帛二兩水三碗大小茴香各一兩青藍三錢煎水
一碗半同拌巴戟炒帛其四味同炒同用之

右為細末酒打麩糊為丸如梧子大每服百丸淡鹽湯下

○一論狐疝者晝則氣出而腎囊腫大令人不堪夜則氣入而腫脹皆消稍無

疾苦蓋狐之為物也晝則出穴而溺夜則入穴而不溺以斯症肖之故曰狐

疝夫晝陽也夜陰也晝病而夜否者氣病而血不病也

申益氣湯方見內傷依本方加酒炒黃柏知母

○一論癩疝者頑疝也罌丸雖大而無疾苦也此以父子相傳得於有生之初

已然非若有生之後三因所致之疾也故不必主治

○一論諸疝疼痛

猪苓 澤瀉 木通 赤茯苓 胡蘆巴 川練肉 海藻

牽牛 巴戟 桂竹茹 右剉水煎空心服

○一論治疝氣 許碧芷傳

檳榔一兩 木通一兩 橘核 川練子 小茴香 白茯苓 白朮 猪苓

澤瀉各一兩 右剉水煎空心服

○一治偏墜氣痛用江子殼橘核角茴三味同炒至褐色去殼將三味搗爛頭

酒煎服立愈

○一論治偏墜氣 猪懸蹄燒存性為末每服三錢黃酒調服

○一論治小腸偏墜氣 猪毛燒灰每服二錢空心熱酒送下一方加小茴炒

○一治疝氣偏墜腫痛不可忍槐子一錢炒為末入鹽三分空心熱酒送下立

○一治陰囊風痒 浮萍煎水洗之如成瘡用黃連輕粉鷄蛋先燒灰將末擦之即已

○一治陰囊痒不可忍者 猪肉湯加胡椒煎湯洗之立已

○一治陰囊腎疝肛門瘙痒抓破出血好了又痒者 人言醞醋二碗熬至一碗洗患處立已

○一治外腎腫大疼痛者 大黃末醞醋調敷患處立消

○一周少峰親家患疝氣偏墜腫痛不可忍者遇一秀才傳一方用黃土水和

作乾泥拍作大餅火炷架于火上烘熱熨痛處冷則再易立愈

一外腎因撲損而傷辜丸偏大有時疼痛者中有瘀血名曰血疝宜於夜分之時自以一手托其下一手按其上由輕至重丸弄百迴彌月之間瘀血盡散陳氣皆行誠妙術也雖年深日久無不愈之

一治外腎着驚縮上者 麝香二錢 朝腦三錢 高莖子一茶匙

右用高莖葉搗爛為膏貼臍上

一治疝氣 戴耕愚傳 荔枝核三錢燒存性 小茴炒 一川練肉 橘核一錢

右為末鹽酒調服看時令先要發散寒暑

一治疝氣偏墜 車左源傳 蒼朮一斤童便 各浸三日炒乾一兩

右為末酒糊為丸每服百丸空心送下

一治外腎腫大麻木痛硬及奔豚疝氣偏墜

製金鈴丸

川練子不蛀者四十九箇去皮核切片分七製○七個用小茴香一錢

分慢火同炒并用茴香○破故布 錢五分同炒并用故布○斑猫不用○巴豆肉十四個切作四段同炒去巴豆不用○藟藟子二錢五分同炒并用牽牛○鹽一錢同炒并用鹽○斑猫十四箇去翅同炒

大茴香炒 青木香 南木香 辣桂 二錢五分各

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九食前鹽酒下積日計功打墜
瘀血症本方加玄胡索半兩略炒沒藥為末酒調下

○治腎大如斗不過三服除根 舶上小茴香 青皮 荔枝核各等分

右劉散炒黃出火毒為細末酒調二錢日進三服

○治疝氣外腎腫脹神效

器散

小茴香炒 川山甲炒 全蝎 南木香各等分

右為末每服二錢酒調服一服立效

痿痺

痿者手足不能舉動是也又各軟風下身瘦弱不能趨步及手戰搖不能握物此症屬血虛血虛乃陰虛陰虛主內熱熱則筋弛故履艱難而手足軟弱此乃血氣兩虛風濕之症古方通用風藥治之非也獨東垣丹溪二先生治法始合經意而以清燥湯主之丹溪又分血熱濕痰氣虛血虛瘀血等法濕熱用東垣健步丸燥濕降陰火加蒼朮黃柏黃芩牛膝之類濕痰二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃柏竹瀝姜汁氣虛四君子加蒼朮芩黃之類而虛四物湯加黃柏蒼朮煎送補陰丸亦有食積死血妨碍不得下降者宜從食積死血治之他如潛行散二妙散虎潛丸皆治痿之妙藥也

已論六七月間濕合大行了能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源則腎虧痿臂之病大作腰下痿軟癱瘓不能動履

清燥湯

黃芪蜜水炒 錢五分

蒼朮米泔浸 錢一錢

白朮去芦炒 陳皮

澤瀉各五分

人參 白茯苓去皮

升麻各三分

麥門冬去心

當歸身酒洗 生地黃

神麴炒 猪苓各二分

黃柏酒炒

柴胡

黃連各一分 五味子九分

甘草炙二分

右剉一劑水煎空心溫服

○一論此藥能去風順氣活血壯筋又治痲後脚弱緩痛不能行履名曰痲風

或兩脚腫痛足脛枯細名曰鶴膝風兼治一切痲痺痿軟風濕挾虛之候

大防風湯

當歸酒洗 川芎七分 白芍酒炒 熟地黃錢一錢 黃芪蜜水炒 人參五分

防風一錢 牛膝酒洗 杜仲姜炒 甘草炙五分 大附子七錢 白朮去芦 羌活五分

右剉一劑生薑五片棗一枚水煎溫服

○按右四物以補血參芪朮草以補氣羌防以散風濕以利關節牛膝杜仲以

補腰腎以附子行參芪之氣而走周身脉絡益治血氣兩虛挾風濕而成痲

痺不能行者之聖藥也觀其治痲後風可見突然可以治不足之痿弱而不

可治有餘之風痺也

論五子益腎養心丸治精血虧損下部痿軟無力不能履步 方見補益

養血壯筋健步丸 治症同前

白芍 酒炒一兩 錢山藥 兩 五味子 一兩 破故指 鹽水炒一兩 人參 一兩

黃芪 鹽水炒兩 熟地黃 四兩 枸杞子 一兩 牛膝 去芦酒炒一兩 兔絲子 酒煨一兩

當歸 酒洗兩 白朮 去芦炒兩 杜仲 姜汁炒兩 虎脛骨 酥炙兩 龜板 酥炙兩

蒼朮 炙兩 黃柏 鹽水炒兩 防風 六兩 羌活 酒洗三錢 漢防已 五錢

右爲細末用猪脊髓七條煉蜜爲丸如梧子大每服百丸空心鹽湯下

一治一切麻痺痿軟風濕血虛之候又治痢後脚軟緩痛不能行履名曰痢

風或兩脚腫痛足脛枯細名曰鶴膝風以十全大補湯去肉桂加防風羌活

牛膝杜仲大附子煨

一人兩足痿弱不能動止子用 鹿茸 人參各五分

右剉一劑水煎空心溫服連進數服而愈

一治兩足痿弱不能行者

用新磚火燒紅以好醋澆之候溫布包烙脚上遍處立能行動

○一治腎氣虛憊腰膝酸痛行步無力

起痿丹 兔絲子酒洗炒爛搗餅 肉蓯蓉酒浸 川草薢 破故布酒炒

防風酒洗 胡蘆巴酒炒 沙苑蒺藜炒 川牛膝酒洗 杜仲酒炒 防風酒洗

甘枸杞子略 河間方去拘 杞子加桂減半

右為末酒煮猪腰子搗爛和丸如梧子大每服七八十九空心酒下

消渴

消渴脉數大者活虛小病深厄難脫

夫消渴者由壯盛之時不自保養狂情縱慾飲酒無度善食膾炙或服丹石遂

使腎水枯竭心火大燔熾三焦猛烈五臟乾燥由是渴利生焉口煩渴口燥

渴口強中二證者消渴也多渴而利燥渴者由熱中所作但飲食皆作小便

自利不渴令人虛極短氣強中者陽具不交而精益自出凡消渴之人當防

患癰疽所怕者一飲酒二房勞鹹食及麪俱可忌也大抵脉大者易治細小者難醫也

一論消渴引飲無度脉實者是也

黃連 牛乳汁 生地黃汁 生藕汁各等分

右二味及汁為膏入和牛乳黃連在膏和蜜為膏徐徐於舌上以白湯些少送下或將前二味藥和汁為丸如梧子大每服五十九白湯送下一日進十

一論治三消總治之方服之立應

人參 白朮去苦 白茯苓去皮 當歸酒洗 生地黃銹 黃柏酒炒 知母去皮

黃連 麥門冬去心 天花粉 黃芩各八分 桔梗五分 甘草三分右剉一劑水煎服

大池膏 治三消如神 天花粉 黃連各半斤 人參 知母去殼

白朮炒去苦各四兩 五味子三兩 麥門冬去心 人乳 藕汁

懷生地黃汁二碗 牛乳各二碗 生薑汁三酒杯

右先將天花粉七味切片用米泔水十六碗入砂鍋內浸半日用桑柴火慢熬

至五六碗滷清又將渣搗爛以水五碗煎至二碗同前汁又煎去二三碗再
人生地等汁慢熬如錫加白蜜一斤煎去沫又熬如膏自收入磁罐內用水
浸三日去火毒每用二三匙安舌咽之或用白湯送下

○一論消渴口乾心熱用天花粉一味水煎當茶服之立效

○一論治消渴神効用纈絲湯如無纈絲湯却以原蠶繭殼絲綿煎湯皆可

代之無時飲之極効蓋此物屬火有陰之用大能瀉膀胱中伏火引陰水上

潮于口而不渴也

○一論陰虛火盛煩渴引飲無度

養血清火湯 當歸一錢 川芎八分 白芍一錢 生地黃酒洗一錢 麥門冬一錢 石蓮肉五分

天花粉七分 知母一錢 黃連八分 烏梅肉五分 黃柏五分 薄荷五分 甘草五分

右剉水煎溫服

○一治消渴病通用

地黃膏 生地黄 東如碗大一把洗切研細以新水一碗調開入冬蜜一碗

同煎至半取出人參五錢白茯苓去皮二兩為末拌和磁器蜜收用匙挑服夏月可加五味子麥門冬

一治消渴

玉泉丸 人參 黃芪半生半蜜炙 白茯苓 乾葛 麥門冬 烏梅肉

甘草兩 天花粉五錢 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸温湯嚼下

一人消渴引飲無度或合食蕤苳或炒或作羹無八鹽日兩三次其渴遂止

一人消中日夜尿七八升者鹿角燒令焦為末以酒調服五分每日三漸加至方寸匕

一治消渴 天華散 天花粉兩 生地黃兩 麥門冬五錢 五味子五錢 粉葛五錢 甘草五錢

右剉糯米一撮水煎服

一論腎水枯竭不能運上作消渴恐生癰疽

參芪救元湯 黃芪蜜炒 人參 粉草炙 麥門冬去心 五味子各等分

右剉水煎入朱砂少許不拘時服

一論常人平日口乾作渴因飲酒食炙燥補劑房勞凡若此類過多致令昏

水枯竭不能上制心火故有此症後必有痘發也宜先服此以絕其源及痘後服此尤有益也

八味丸

懷生地黃酒浸一兩 山藥一兩 牡丹皮八錢 澤瀉酒浸一兩 肉桂五錢

山茱萸去核一兩

白茯苓去皮八錢

五味子微焙一兩五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五六十丸五更時淡鹽湯送下溫酒亦可

○一論心腎不交消渴引飲有人病渴用渴藥累年不愈用加減八味丸而愈

其疾本以腎水枯竭不能制心火上炎是以生渴此藥降心火生腎水

○一人不時發熱日飲冷水數說寒藥三劑燥渴益甚形體日瘦尺脈洪大而

數時或無力士大僕曰熱之不熱責其無火寒之不寒責其無水又云倏熱

往來是無火也時作時止是無水也法當補腎用加減八味丸不月而愈

○一治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形

體憔悴寢汗發熱五臟齊損以六味丸加肉桂一兩五味子四兩

○一人形體魁偉冬月飲水自喜甚實余曰此陰虛也不信一日口舌生瘡或

用寒涼之劑肢體倦怠發熱惡寒以六味丸補中益氣湯而愈

一 肺熱內熱不時而熱作渴痰唾小便頻數而作口舌生瘡此下焦陰火也

瘧病

瘧字之誤也強瘧者堅強而勁直頸項急而背反張也此以風寒濕三者客于太陽傷其筋筋牽而急故令瘧也然得之風濕者令人有汗而不惡寒名曰柔瘧昔人以桂枝加葛根湯主之是也得之寒者令人無惡寒名曰剛瘧昔人以葛根湯主之是也是方也有麻附黃杏仁則可以發表散寒有桂枝芍藥則可以解肌驅風有防風防已則可以驅邪勝濕有人參甘草則可以益氣柔筋有川芎黃芩則可以和陰去熱有附子之熱可以溫經而亦可以去濕者也

二瘧歌

原來瘧病屬膀胱

口噤如痲身反張

此是傷風感寒濕

故分兩症有柔剛

無汗為剛須易識

惟有葛根湯第一

有汗為柔見的端

桂枝葛根湯救急

二症皆宜續命湯

剛瘧去桂用麻黃

柔瘧去麻當用桂

只依此法最為良

小續命湯

麻黃去節

人參

黃芩酒炒

白芍酒炒

川芎酒洗

防已

杏仁尖去皮

桂枝

甘草各一錢

防風

大附子炮去皮各五分

右剉生薑大棗水煎服

葛根湯

葛根

麻黃

桂枝

芍藥

甘草

右剉生薑大棗水煎服

○一論剛柔二症頭搖口噤身反張手足攣搐頭面赤項強急與喫癎同治法

如聖飲

柴胡

黃芩

半夏

赤芍

川芎

甘草

右剉生薑水煎服。有汗是柔瘧加白朮桂枝。無汗是剛瘧加麻黃蒼朮

○口噤咬牙大便實加大黃利之

白芷

當歸

防風

羌活

烏藥

○一論瘧病有二般熱惡寒頭項強腰脊反張口噤面赤癎癎如癎有汗柔

瘧無汗各剛以補中益氣湯去黃芪柴胡加川芎白芍熟地白茯苓。剛瘧

身熱面赤脉緊加防風羌活黃芩乾葛去白朮。柔瘧身不熱手足冷脉沉

細加熟附子羌活。風痰瘧加羌活防風瓜瓞仁枳實桔梗片苓竹瀝薑汁

去人參白朮。破傷風瘧加蠶蠶全蝎防風羌活南星瓜蒌枳實黃芩桔梗

竹瀝薑汁人參○汗吐下多發瘧者本方倍人參黃芪當歸生地荆芥白朮

濁症

脉兩尺脉洪數必便濁失精

精之主宰在心精之藏制在腎凡人酒色無度思慮過情心腎氣虛不能管攝
往往小便頻數便濁之所由生也因小便而出者曰尿精因見聞而出者曰
漏精心不足而挾熱者為赤濁心不足而腎冷者為白濁陰不升陽不降上
下乖揆是以有清濁不分之症大率多是濕痰流注直燥中宮之濕兼降火
升舉之法此為至要之語也

○一論便濁之症因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便溺赤白渾濁不清也
宜燥中宮之濕用升麻柴胡提氣使大便潤而小便長不宜用寒涼傷血之

主方

陳皮八分 半夏八分 茯苓一錢 蒼朮米泔浸七分 黃柏酒炒七分 柴胡七分

升麻三分 白朮五分 神曲炒五分 牡蠣五分 梔子炒一分 蛤粉二分

滑石 一錢 甘草 三分 右剉一劑生薑三片白果九枚水

前空心服渣再煎服忌煎炒辛辣物

○一論心中煩燥思慮憂愁拘鬱小便赤濁或有沙膜夜裏遺精遺瀝疼痛便

赤如或酒色過度上盛下虛心火上炎肺金受尅故口苦咽乾漸成消渴四

肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白五心煩燥此藥溫平清心養神秘精

清心蓮子飲

石蓮肉

人參各二錢五分

黃芪蜜炙

赤茯苓各二錢

麥門冬去心

地骨皮

黃芩各一錢五分

車前子一分

甘草三分

熟加柴胡薄荷各錢五分

右剉一劑燈草十根生薑三片水煎空心服○上盛下虛加酒炒黃柏知母各一錢

○一論心經伏暑小便赤濁而有熱也

加味四苓散

人參減半

白朮去苦

赤茯苓去皮

猪苓

澤瀉

香薷

石蓮肉

麥門冬

去心各等分

右剉水煎空心溫服

○一論小便白濁頻數無度凝白如油光彩不定凝腳澄下凝如膏糊此真元

不足下焦虛寒之所致也

葶藶飲

益智仁

川葶藶

石菖蒲

烏藥

一方加茯苓甘草

右剉各等分一劑水煎入鹽一捻空心溫服○腎虛加牛膝杜仲山藥○便赤加澤瀉麥門冬

○一論白濁初起或半月者下焦虛熱之所致也

滋腎散 川草薺 麥門冬法遠志法黃柏酒炒 兔絲干酒炒 五味子酒炒各等分

右剉一劑竹葉三片燈草一團水煎空心服

○一論赤白濁乃水火之不分也

水火分清散 益智仁 葶薺 石菖蒲 赤茯苓 車前子 猪苓

白朮去芦 澤瀉 陳皮 枳殼麩炒 麻黃各等 甘草三分

右剉半水半酒煎空心服久病去麻黃易升麻

○一治遺精白濁

五環丹 第靈膏傳 五色龍骨 左顧牡蠣 蓮花鬚 芡實

石菖蒲 五味子 黃柏酒炒各 一方用石蓮子去石菖蒲

右為細末用金櫻子煎汁為糊入目內搗干餘下成劑為丸如梧子大每服

五十九鹽湯下乾物壓之

○一治遺精白濁 山藥 一兩 黃柏 酒炒 二兩 牡蠣 火煨醋淬 七次 五錢 白茯苓 一兩

○右共為細末酒糊為丸如梧子大每服五十丸空心水酒送下

○一論白濁憂泄遺精及滑出而不收者

樗根丸 樗根白皮 有莖 黃柏 炒 蛤粉 青黛 乾薑 滑石 各等

右為末水和為丸如梧子大每服百丸空心温酒送下虛勞四物湯下

○一論白濁經年不愈或時憂遺形體瘦弱當作心虛治之

定志丸 遠志 甘草 石菖蒲 人參 白茯苓 黃柏 蛤粉

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服三十九空心米湯下

○一治小便白濁出髓條者

人參 白米 白茯苓 青鹽 破故布 大茴香 益智仁 酸棗仁

左顧牡蠣煨各 右為末酒糊為丸如梧子大每服三十九温酒米飲任下

○一論瘦人陰虛火動患赤白濁下

清離滋坎湯

方見勞瘵

依本方加草薺牛膝山梔篇蓄赤芍藥

○一論久患白濁不止而作頭昏者以益氣湯加白茯苓半夏

○一論發熱口乾小便頻濁大便閉結盜汗遺精甚至廢寢用當歸六黃湯二

劑盜汗頓止用六味丸二便調和用十全大補湯及前丸兼服月餘悉愈

○一論肥人濕痰患赤白濁者

二陳湯

方見痰飲

依本方加蒼朮白朮人參當歸生地麥門冬山梔

黃柏草薺牛膝篇蓄

○一論肝腎脾肺虛損赤白濁久不愈者六味丸補中益氣湯早晚兼服

六味丸

方見補益

補中益氣湯

方見內傷

依本方加白茯苓半夏

○一人久患白濁發熱體倦用補中益氣加炮薑四劑白濁稍止再用六味地

黃丸兼服諸症悉愈

○一人患頭暈白濁余用補中益氣湯加茯苓半夏愈而復患腰痛用山藥山茱

五味草薺遠志頓愈又因勞心盜汗白濁以歸脾湯加

五味子而愈後不時眩暈用八味丸全愈

補遺

○一治遺精白濁 木賊 小川芎各五錢 粉葛居其中兩蛇退一寸半

頭向 上者 挂壁顯神通 右用酒煨空心服

○一治赤白濁 陳雲岳傳 木通去節七錢 滑石三錢 粉草四錢 黃荊子一

右到水煎空心服立已

遺精

遺精白濁當驗於尺結乳動緊三症之的

夢泄者其候有三年少壯盛驟墮逾弱強制情慾不自知覺此泄如瓶之滿而溢也是以無不藥可也或心氣虛不能主事此泄如瓶之側而出也人多有之其病猶輕則以和平之劑治之真元久虛心不攝念腎不攝精此泄如虛瓶而漏者也其病最重須作大補湯丸治之不可緩也

○一論心所慕而作夢遺此君火動而相火隨之治在心

黃連清心湯 黃連 生地黃 當歸 人參 遠志 去心

白茯苓性皮 酸棗仁炒 石蓮肉 甘草
 右到水煎服加麥門冬九錢
 魯濟秦興主驗方 治遺精

人參 石蓮肉 蓮鬚 芡實 麥門洗 白茯苓 遠志洗 甘草

右到水煎溫服○一方加石棗栢子仁石菖蒲黃柏酒炒

○一論心神寧靜則精固君相火息則溺清有是証者始因撓乎心搖乎精而然也龍雷火動其水濁而不澄尾閤不噤即精關弛而不同治宜補心寧神 滋陰固本

益腎固真湯

黃芪蜜炒一分 人參三錢 白芍酒炒一錢 白茯苓去皮木一錢 五味子十二粒夏用十六粒

當歸身酒炒一錢 白朮酒炒去芦一錢 麥門冬三錢 巴戟肉三錢 益智仁一錢

酸棗仁炒一錢 山藥一錢 澤瀉一錢 升麻五錢 黃連酒炒一分

黃芩一錢 黃柏酒炒七分 知母一錢 蓮花蕊一錢 甘草稍生一分

右到分作三劑水煎空心服

○一論心神不安腎虛每自泄精等症

靈補固精丸

黃柏酒炒

知母酒炒

牡蠣煨

龍骨煨

次寶蓮酒炒

白茯苓

去皮 遠志

山茱萸肉各三兩

右為細末煮山藥糊為丸如梧桐子大每服五十九米湯送下

○一論夜夢遺精或滑精虛損之極久不能止者

滋補湯

人參

白朮去苦 炒

白茯苓去皮

當歸酒炒

川芎

白芍

酒炒

杜仲酒炒 熟地黃酒蒸

牛膝酒洗

天門冬去心

甘枸杞子

龍骨煨

麥門冬酒洗

蓮蕊

破故帛酒洗

金櫻子去毛 炒

牡蠣煨

遠志

甘草水 泡去心

甘草炙各等分

右為末山藥末打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心酒下

○一論男子發熱遺精或小便不禁俱屬脾胃虧損

補中益氣湯

方見內傷

合六味丸方見補益

二方合作湯劑水煎服以滋化源

○一論嗜慾無度夢遺精滑晝夜長流百方罔効病將垂危者

玉堂丸

扶溝何晴嶽傳

蓮鬚色黃者

石蓮肉淨肉

芡實淨肉

麥門冬

水潤去心

用公猪肝一个入家蓮肉帶心皮一斤入砂鍋內水煮爛去肚將蓮肉曬

乾同前藥為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心蓮耆煎湯送下其効如神

○男子水藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交

獾猪腰一枚以刀開去筋膜入大附子末一錢七以濕紙包煨熟空心稍

熱服之便飲酒一二鍾多亦甚妙三五服効

○一論養元氣生心血健脾胃滋腎水止盜汗除遺精降相火壯元神

養心滋腎丸 臨川徐紹志傳

人參一兩 芡實去殼一兩 酸棗仁炒二兩 天門冬去心二兩 遠志甘草水泡去心二兩

當歸酒洗一兩 蓮蕊一兩 栢子仁去油炒二兩 石菖蒲去毛六錢 懷熟地黃酒蒸二兩

遼五味子一兩 麥門冬去心二兩 知母去毛酒炒二兩 白芍鹽酒炒一兩 白茯苓去皮木一兩

蓮肉去皮心一兩 牡蠣火服一兩 懷山藥炒一兩 懷生地黃酒洗二兩 黃柏去皮鹽水炒二兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十丸空心塩湯下

○一論神者精氣之空也神以御氣氣以攝精故人寤則神棲于心寐則神棲

于腎心腎神之舍也昔之所為夜之所夢男子夢交而精泄女子夢交而精出是皆不知清心寡慾之道者也斯人也神不守舍從欲而動晝有所感夜夢隨之心不攝念腎不攝精久而不已遂成虛損或有神氣委靡念慮猖狂風邪乘其虛鬼氣干其正與妖魅交通者是又難狀之疾也以

鎮神鎖精丹主之

人參

白茯苓

遠志

甘草水

柏子仁

白龍骨

酸棗仁

炒各一兩

石菖蒲

去毛一兩

牡蠣

煨各一兩

辰砂

水飛五錢為衣

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸棗湯下

○ 一治精滑久不愈

牡蠣煨砂鍋內醋淬七遍為

末醋糊為丸如柏子大每服五十九粒白湯下

○ 一治心虛夢泄

用白茯苓去皮一味為末米飲空心調下

○ 一治遺精虛漏小便餘滴及夜多小便者

用益智仁二十

四個水煎入鹽少許同服

○ 一夢泄不止脉弦而大

石蓮肉

六分

甘草

一兩右為細末每服二錢食前燈心湯下

○ 一人勞則遺精齒牙即痛用補中益氣加半夏茯苓芍藥并六味地黃丸

愈更以十全大補加麥門五味而痊

○一人白濁夢遺口乾作渴大便閉澀午後熱甚用補中益氣加芍藥玄參并加減八味丸而愈

○一人莖中痛出白津小便閉時作痒用小柴胡加山梔澤瀉炒蓮木通瞿麥茯苓二劑頓愈又兼六味地黃而痊

○一人便血精滑發熱○一男子尿血發熱○一男子發熱遺精或小便不禁俱屬腎經虧損用地黃升益氣湯以滋化源並皆得愈

○一人午後有熱遇勞遺精其齒即痛此脾腎虛熱先用益氣湯送六味丸更以十全大補湯而愈

○一人夢遺精滑氣血虛損用十全大補湯加山茱山藥五味麥門補中益氣湯見內傷六味丸八味丸十全大補湯俱見補益

諸淋

詠盛大而實者生虛細而瀆者死

天淋者有力淋之別氣砂血膏勞是也皆由高梁之味濕熱之物或燒酒炙肉之類過多或用心太過房勞無節以致心腎不交水火無制而成五淋之症名雖有五大醫病熱者居多故有新久虛實之不同耳學者審症而變通焉慎毋膠柱以調瑟也

論氣砂膏勞血五淋

○氣淋為病小便澀滯常有餘瀝不盡也○砂淋為病陰莖中有砂石而痛澀不得卒出砂出痛止也○膏淋為病屬濁如膏也○勞淋為病遇勞房即痛痛以氣衝也○血淋為病遇熱則發甚則尿血候其鼻準色黃者知其難也○一論心經蘊熱臟腑閉結小便赤澀閉不通及熱淋尿淋○如酒後恣飲而得者則小便將出而痛既出而痒以此藥王之

八正散

大黃 蘼麥 木通 滑石 菴蓄 梔子 車前子 甘草

右剉一劑燈草水煎空心服

○按右方治諸淋屬實熱宜之

○一治五淋神方

海金沙散

當歸酒洗雄黃

川芎去芦

大黃酒浸

木香

海金沙

各等分

右為細末每服一錢五分臨臥酒調服兩服見效

○按右方治諸淋不問虛實宜之

○一治淋瀝疼痛兼紅淋

滋陰清火散

當歸

生地黄

熟地黄

黃柏酒炒知母酒炒

黃芩

黃連

桑白皮

木通

右剉水煎空心溫服

○一治諸淋久不止者

加味滋陰散

當歸

川芎

白芍

熟地黄

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮

甘草各五分

升麻

柴胡

牛膝去

黃柏酒炒

白朮去

蒼朮

知母酒炒

右剉水煎露一宿空心服

○一論諸淋多屬膀胱之氣虛弱不能運用水道而成諸淋也宜

補中益氣湯殊効方見內傷

○一論下淋久不止乃元氣下陷故也宜

補中益氣湯 方見內傷 依木方參芪減半加川芎白芍熟地生薑茯苓牛膝

栢知母蒼朮水煎露一宿空心服

○一論縱慾強留不泄淫精滲下而作淋者

益元固精湯 人參 白茯苓 蓮蕊 巴戟 升麻 益智仁

黃柏 酒炒各二錢 山藥 澤瀉各五分 甘草 稍二錢 剉空服

○一治小便淋瀝不通 又治老人虛寒者患死血作淋痛不可忍者宜

六味地黃丸 方見補益 依本方倍茯苓澤瀉又治小便頻數不禁去澤瀉

○一治苦病淋瀝而莖中痛不可忍者

六君子湯 方見補益 加黃栢知母滑石石菴琥珀水煎服

○一治冷淋諸藥不効者

四君子湯 方見補益 加猪苓澤瀉不通連進二服又以鬼絲子研極細用雞

管吹入小便孔內極効

○一治心經積熱小便澀及五淋

火府丹 生地黃一兩 青木通一兩 黃芩炒各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九丸木通煎湯送下加甘草亦

許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時已十月余謂心經

有伏熱與火府丹數服而渴止食進此本治淋用以治渴可謂通變也

○一李司馬莖中作痛小便如淋口乾唾痰此思色精降而內敗用補中益氣

湯六味地黃丸而愈

○一儒者發熱無時飲水不絕每登廁小便澀痛大便牽痛此精竭復耗所致

用六味丸加五味子及補中益氣其謹守得愈若肢體畏寒喜熱飲食用

○一治老人陰痿思色精不出內敗小便水道澀痛如淋用八味丸加中前牛

○一老人精已竭而復耗之大小便牽痛愈愈便則愈痛愈痛以八味丸

補遺

○一治血淋 芎膠 砂三猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 車前子 五錢

右列水煎服

關格

夫關格者謂格中覺有所碍欲升不升欲降不降飲食不食此為氣之橫格也必用吐其氣之橫格必在吐出痰也有痰以二陳湯探吐之吐中便有降有氣虛不運者補氣藥中升降

丹溪曰此症多死寒在上熱在下也寒在胸中遏絕不入無人之理故曰格在下焦填塞不通無出人之由故曰關格則吐逆關則不得小便

丙經云人迎與氣口俱盛四倍以上為關格關格之脉羸不能極於天地之精氣則死矣

一論關格上焦痰壅兩手脈盛是也

枳縮二陳湯

枳實

二錢炒砂仁七分

白茯苓

去心

陳皮

蘇子

瓜蒌仁

厚朴

姜炒川芎

八分

木香

五分

香附

炒

沉香

甘草

右判一劑生薑三片水煎入竹瀝磨沉木香服

○一陰陽關格前後不通尋常通利大府小水自行中有轉胞一症諸藥不効
失救則脹滿悶亂而死予嘗以甘遂末水調敷臍下內以甘草煎湯飲之
及藥汁至臍二藥相反胞自轉矣小水來如湧泉此救急之良訣也

遺溺

夫尿者賴心腎二氣之所傳送膀胱為傳送之府心腎氣虛陽氣甚冷致令膀胱傳送失度則必有遺尿失禁之患矣經云膀胱不利為癃不約為遺尿也
大宜溫補清心寡慾又有產後不順致傷膀胱及小兒胞冷俱能令人遺尿
失禁各須隨症治之

○一論小便不禁出而不覺者是有熱不禁者用

五苓散方見中者依本方去桂加黃柏黃芩黃連梔子山茱萸肉五味子水煎服

○一論小便不禁虛弱者用

五苓散 方見中醫 依本方合四物湯方見 補益加山茱萸肉五味 子共十一味 水煎空心服

○一治腎氣不足小便頻數日夜百餘次

縮泉散 烏藥 益智仁 各等分

右為細末山藥糊為丸如梧子大每服七十九空心鹽湯下

○一治遺尿不禁 雞脬脛一具并腸乾去穢淨不用水洗男用雌雞女用雄雞

右為細末每服二錢空心滾白湯下二三服即愈

○一治遺尿失禁 益智仁七箇桑螵消七箇為末酒調服用熟白果 七箇送下

○一治夜多小便 益智仁二十四箇研碎入鹽同煎服

○一治小便多者 葶藶夜煎服之用不夜起

○一治夜多小便 用胡桃灰火煨熟臨臥溫酒嚙下

○一治小便內虛熱者頻數不禁 用六味地黃丸服効

○一氣不足脉微而瀉小便頻數用小茴香不拘多少同鹽炒為末取糯米糕

一片炙軟熱蘸藥吃立効

○一治小便頻數用猪尿胞洗淨以糯米煮爛入椒少許同煮去米只用胞吃
 ○一治小便遺尿失禁多是氣虛以益氣湯去柴胡加茯苓熟地黃肉桂益仁
 ○一治小便頻數或勞而益甚屬脾氣虛弱以益氣湯加山藥五味子
 ○一論身體虛瘦夜常遺尿失禁

人參八分 白朮一錢 山藥一錢 益智仁七分 山茱萸七分 當歸一錢

白芍一錢 黃芪一錢 甘草一分 酸棗仁七分 右剉一劑水煎服

○一論身體虛瘦遺尿失禁

補中益氣湯方見內傷 依本方去柴胡加山藥一錢益智仁七分山茱萸

○一論關格上焦痰壅兩手脉盛是也

○一人因勞發熱小便自遺或時不利余作肝火陰挺不能約制午前用補中

益氣加山藥黃柏知母午後服地黃丸月餘諸症悉退此症若服燥劑而頻

數或不利用四物麥門五味甘草若數而黃用四物加山茱萸柏知母五味

麥門若肺虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰挺痿痺而頻數丸而愈

○一論腎與膀胱俱虛冷氣乘之不能約制故遺尿不禁或睡中自出

加味地黃丸

懷生地黃酒蒸四兩 懷山藥

二兩 牡丹皮一兩 白茯苓一兩

山茱萸

酒蒸去核 破故帛炒二兩

益智仁

一兩 人參一兩

肉桂五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心鹽湯下

○一小便桶內起泡盈桶此腎水衰也用紅雞冠花為末每服三錢空心調酒

小便閉

小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於小腸入泡者為小便腎與膀胱既熱熱入於泡熱氣大盛故結澀令小便不通小腹脹滿氣急甚者水氣上逆令心急腹滿乃至於死診其脉緊而滑直者不得小便也

○一論膀胱有熱小便閉而不通也

導水散

當歸 蘆麥

車前子

滑石

赤茯苓

澤瀉

猪苓

木通 黃連 知母

石蓮子去殼 黃柏酒炒 山梔子 甘草

右剉燈草煎空心溫服

○一論小便不通百法不能奏效服此無不愈

禹功散

陳皮

半夏

姜製 赤茯苓

猪苓

澤瀉

白朮炒

木通

條芩

升麻

二分 甘草

三分 山梔子

炒各一錢

右剉一劑水二鍾煎至一鍾不拘時服少時以雞翎探痰吐之得解而止妙在吐譬如滴水之器閉其上竅則澀拔之則水通流洩矣

○一論溲溺不通匪細故也期朝不通便令人嘔名曰關格又曰不通而死矣

○一見嘔症便不可救經曰出入廢則神机化滅升降息則血氣孤危此之謂也

○一論小便閉塞用涼藥過多而不通者是元氣虛而不能輸化也以

補中益氣湯主之

○一論小便淋瀝不通以六味丸倍茯苓澤瀉

○一論小便不通先將麝香半分填患人臍中上用蔥白四環各搗爛成餅封

于臍上用布帶縛住良久下用皂莢燒烟薰入陰中其水竇自通婦人亦用皂莢煎湯薰洗便處即通

一論小便不通膀胱熱者

朴硝為細末每服二錢大茴香煎酒調下

一論小便不通腹脹

土茯苓炒黃為末黃酒調下

一論小便不通用豬膽投熱酒中服之立通

又方用蚯蚓研以冷水慮濃汁服半碗立通大解熱疾不知人事欲死者服之立效

一論小便不通臍下滿悶者

海金沙一兩 臘茶五錢

右為細末每服三錢生薑甘草稍煎湯調下

一論小便不通兩尺脈俱沉微乃陰虛故也曾服通滑寒涼之藥不効者用

大附子一枚重二兩者炮去皮臍鹽水浸澤瀉二兩二味剉作四劑服水

二盞燈心七根煎合遠服

一論小便不通體腫喘嗽用補中益氣湯金匱腎氣丸兼服

一論小便不通服涼藥過多脹滿幾死以附子理中湯加琥珀末調服立通

一婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息以脾系了戾故不溺故致此病

名曰轉脬但利小便則愈八味丸主之 方見補益

一治男子消渴小便反多婦人轉脬小便不通宜服八味丸又治婦人

五齋云治老人陰痿思色精不出內敗小便道澀痛如淋八味丸加車前子

石老人精已竭而復耗之大小便牽痛愈痛愈愈便則愈痛此藥最効

八味丸 見補益

一治小便不通用螻蛄一箇焙熟嚼吃黃酒送下立通

一治小便不通并傷寒禱症而不可以藥通利者用此藥立通

以皮硝煎化用青布蘸水搭臍上并小便上熱則易之

一治小便不通已經七八日遍身手足腫滿諸醫罔効余以紫蘇煎湯入大

脚盆內令病人坐上薰蒸冷則添滾湯外用鹽炒熱熨臍上遍身 手處良久

便通腫消而愈

一治小便不通小腹脹滿不急治即殺人

連根蔥白一斤搗爛炒熟以布裹分作兩處更替灸臍下即通加些麝香

一治小便不通諸藥不効或轉胞至死此法用之小便自出

猪尿胞一箇傾出尿用鵝毛管去頭尾插入竅孔內線扎定以口吹氣令

滿胞用線管下再扎住將管口放在小便頭上向竅孔解後下線手搓其

氣透裏自然小便即出効

大便閉

脈多沉伏而結陽結脈沉實而數陰結脈伏而遲或結老人虛人便結麻雀啄者不治

大陰陽二氣實乎不偏然後津液流通腸胃潤溢則傳送如經矣攝養乖理三

焦氣滯通掉不行遂成閉結之患有五曰風閉氣閉其患熱閉寒閉濕閉是

也更有發汗利小便及媼人產後亡血走耗津液往往皆能令人閉結燥則

順之澁則活之閉則通之寒則溫之熱則清之此則一定之法也

一論大臟濕熱大便閉結不通用大黃皮硝牙皂三味各等分水煎一瓣立

又方用大黃末三錢皮硝五錢用好燒酒一碗化服之立通

又方用皮硝五錢熟酒化開澄去渣加香油三四茶匙温服立通

一論凡大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治在幽

門以辛潤之專治大腸血少結燥不通

腸湯 通幽湯去大黃火麻仁

當歸一錢五分 生地黃 熟地黃 二錢 桃仁一錢五分 紅花五分 升麻 一錢 甘草五

大黃錢一 火麻仁錢一 右剉水煎去渣調檳榔末二錢稍温服

一論大便閉結至極昏不知人事用大田螺二三枚以鹽一小撮和壳生搗

碎置病人臍下一寸三分用寬帛緊繫之即通

一論大便閉結

牙氣丸 木香 檳榔 火麻仁 枳壳

右將枳殼每個切作四片用不蛀皂角三寸生薑五片巴豆三枚略搥碎不

去壳油用水一盞將枳殼同煮熟濾去三味不用只將枳壳剉細焙乾為末

入前三味末煉蜜為丸蜜湯下不拘時服

○一治大便不通 烏柏木方停一寸劈破以水取小半盞服之立通不用
多吃煎極補

○一人大小便不通閉數日不通用商陸搗爛敷臍上立通

○一論自汗大便秘結不通且便於老人并日久不能服藥者

蜜導法 蜜煉如飴乘熱撚如指長二寸兩頭如鏡納谷道中長久下燥糞者加皂角末少許更効

香油導法 用竹管蘸蔥汁深入大便內以香油一半溫水一半同入猪尿

胞內撚入竹管將病人倒放脚向上立時即通

○一論自汗小便利而不大便燥硬不可攻以此方導之

猪膽導法 猪膽一枚傾去一小半仍入好酒醋在內用竹管相接套入谷

道中以手指撚之令膽汁直射入內少許即通酸苦益陰以潤燥也

○一論大便不通并傷寒雜症用藥不行者

粟米水煮至熟入火麻仁微炒不拘多少入粥內再煮二三沸飲湯即通

○一論虛弱老人大便秘澁不通

潤腸丸 杏仁炒去皮尖 枳殼炒去穰 火麻仁炒 陳皮炒各五錢 阿膠炒 防風各二錢五

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十九白湯送下

○一老儒素有風熱飲食如常大便十七日不通肚腹不脹兩尺脉洪大而虛

此陰火內燦津液用六味丸二十餘劑至三十二日始欲去用猪胆潤而通利如常

○一婦人年七十有三痰喘內熱大便不通兩月不寐脉洪大重按散亂此屬

肝肺腎虧損朝用六味丸夕用逍遙散各三十餘劑計所進諸藥百餘碗復始

痞悶乃以猪膽汁導而通之用十全大補調理而安若服前藥飲食不進諸症復作

○一治老人大便閉澁連日不通

火麻仁一盞半研水浸取汁芝麻半盞炒研水浸取汁荆芥穗一兩桃仁

去皮尖炒研一兩入鹽少許同煎服之立効

○一治大便常閉結宜久服

活血潤燥丸

當歸酒洗一兩 懷生地黃一兩 懷熟地黃一兩 火麻仁一兩 枳壳炒七錢 杏仁去皮五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十九空心溫水送下

○一治大便不通

大黃

皮硝

牙皂

右三味各等分水煎一服立通

一便閉

○一論大小便不通關格不利燒皂角細研粥飲下三錢立通

○一方用不蛀皂角安瓦上燒着置馬桶內坐上薰其糞門自通

二便閉結甚難醫 急炒鹽來塞滿臍 蒜片覆鹽推艾熨

利便良方少人知

○一論蔥豉餅專治老人大小便不通

生薑一蔥白根葉一鹽大莖一豆豉一餅一又方用

右搗爛安臍中須烘熱臍中以帛扎定良久氣透即痛或再換一餅又方用

蜂蜜一鍾入皮硝二錢滾湯二茶鍾化下

○一治大小便不通

用礬末一匙安臍中冷水滴之冷透腹內自然通如是曾灸無臍孔即於

灸盤上用紙作圈子籠灸盤着糞末在內仍以水滴之若倉卒無糞以鹽

燒過入臍內蒜片上灸之

○一論關格脹滿大小便不通

獨蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通冷即易腹滿不能服藥者用之

○一論大小便不通者此氣閉也

鐵脚丸

皂角去皮子炙不拘多少為細末酒打麪糊為丸如梧子大每服三十九酒送下

○一論大小便不通此方治之殊効

蝸牛膏

用蝸牛三枚去殼搗為泥加麝香少許納臍中以手揉按之立通或用田螺亦可

○一治大小便不通

六七月間尋牛糞中有大蟻蛭不拘多少用線串起陰乾收貯用時取一

箇要全者放淨磚上四面以炭火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半

截小便閉用下半截各為細末新汲水調服二便俱閉者則全用之

○一治大小便不通

猪牙皂角末猪膽汁調竹管吹入糞門○小便不通吹入馬口驗

一人大小便不通十餘日腹脹欲死諸醫用硝黃牽牛等藥無効予以冬
子一劑水煎服立通

一論大小便不通垂危者

危散 苦瓜蒂五錢 川烏炮 草烏炮 香白芷 牙皂炮 細辛各三錢 麝香少許
錢胡椒一錢

右為細末用小竹筒將藥少許吹入肚內即通神速

一論臟腑實熱或小便不通或大便不通或大小便不通

聖散 大黃六錢 滑石三錢 皂角三錢

右為細末溫酒送下如大便不通依前分兩如小便不通黃三石六角如前

如大小便俱不通黃石均分角亦如前

一治大小便不通百方不効肚腹脹痛咽喉飽塞或痰壅盛氣喘傷寒結胸

臥不倒床水米不下死在須臾此幽門氣閉不通用甘遂五分麪裹火煨熟

取出為末入麝香三厘用飯搗為丸淡姜湯下立通或小便不通或大便不

通或大小便俱不通者皆効

痔漏

沉小實者易治浮洪而軟弱者難愈

痔漏之原由乎酒色過度濕而生熱克乎臟腑溢于經絡墜于谷道之左右
衝突為痔久而成漏者也痔輕而漏重痔實而漏虛治痔之法不過涼血清
熱而已至於治漏初則宜涼血清熱燥濕久則宜澁竅殺虫而兼乎溫散也
或曰痔漏火是根原何故而用溫澁殊不知痔止出血始終是熱漏流膿水
始是濕熱終是濕寒不用溫藥何以去濕而散寒乎非止痔漏百病中多有
始熱而終寒者如瀉痢如嘔吐初作則腸胃氣實而熱久作則腸胃氣虛而為寒矣

一論痔瘡腫痛初起立効

風辟毒湯

黃連

一錢

黃芩

一錢

連翹

一錢

赤芍

一錢

枳殼

一錢

炒

大黃

酒蒸一分

苦參

一錢

黃柏

一錢

槐花

一錢

右剉水煎空心服為末水丸用溫水下亦可

一論內經曰二陰皆屬腎雖見症於大腸實陰虛而火盛也

毒養榮湯

當歸一錢 芍藥二錢 生地黄酒洗二錢 黃連酒炒一錢 黃芩一錢

黃柏酒炒二分

知母一錢

連翹二錢

升麻五分

荆芥一錢

槐芎二錢

皂角子二錢

皂角刺二錢

天花粉二錢

黃芪一錢

人參七分

甘草節一錢

右剉一劑水煎空心熱服遠酒色則全愈

一論千金不換刀圭散治痔漏百發百中方見中風

一論專治通腸痔漏

生蓮瀉散

蓮瀉焙一兩

當歸五錢

五倍子五錢

黃連五錢

乳香五錢

沒藥五錢

礬紅四錢

黑丑頭末

炒一兩

錦紋大黃

半生半熟一兩

右共九味為細末欲服藥前一日勿食晚飯次日空心用淡猪肉汁一鍾好酒

一鍾半和猪肉汁前秤藥一錢二分調服午後于淨黃土上疎宣時見出為

驗或如爛杏五色相雜亦為驗矣如散藥難服用酒糊丸如菜豆大每服一

錢五分淡猪肉湯下此方神効不可輕忽切忌燒酒色慾發物魚羊犬肉

一論治痔漏

反丸

刺蝟皮一箇連刺 當歸酒洗 槐角酒浸炒

黃連酒炒 核桃十個內取隔 地骨皮酒炒乾 甘草蜜炙 乳香二錢

石為細末醋糊為丸如梧子大每服二十五丸白湯或酒早晚二服一月後

論凡人衣食豐饒患痔必于於飲食色慾所致及有乘酒犯房欲要除根

必須服此滋陰補內之藥大成醇酒厚味寡慾可也

避固本丸 懷生地黃六兩 山藥四兩 山茱萸肉四兩 白茯苓去皮 澤瀉二兩

牡丹皮三兩 黃連淨四兩 人參三兩 黃柏去皮四兩 知母去毛三兩 當歸二兩

天花粉二兩 皂角二兩 槐角三兩

石各為細末用雄猪大臟一段去脂油灌藥末于內兩頭用絲線縛住用糯

木二升者飯將半熟撈起去湯將藥腸盤藏于飯中如蒸飯至熟待冷些取

出去兩頭無藥線縛之腸將藥腸入淨石臼內杵爛揀出腸渣筋如不粘加

三飯杵之為丸如梧桐子大晒乾每服百丸空心白滾水下

○一論痔漏多年不瘥者神方也

收功補漏丸 臨川徐學韋驗 白茯苓_姓赤茯苓_姓 破故布_{四兩}

右藥俱不犯鐵器於石臼搗成塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取出水籠

蒸熟晒乾為末酒糊為丸如梧子大每服二十九丸緩後加至五十丸止空心

溫酒送下予嘗以此方加入全料六味地黃丸同作處同丸服治年久漏不愈者一料全愈

○一論漏瘡先須用補藥以補氣血用參芪歸朮為主入劑服之外以附子為

細末津調作餅子如銅錢厚以艾多灸之漏大者艾炷亦大漏小者艾炷亦

小灸令微熱不可令痛餅乾即易之再和再灸又以補氣血藥作膏貼之

○一論痔瘡膿血淋漓口乾作渴輔熱便血自汗盜汗以益氣湯加茯苓半夏

炮乾薑脾胃漸省後用六味丸兼進而愈

○一治連花痔瘡 余紹輝傳効

黃連 三錢 烏梅 三十箇 大黃 二錢 穿山甲 炒三錢 石剉一劑水煎空服

補遺

一治痔漏熱症有瘀血作痛取出惡物通利大小腸

川芎 白芷 赤芍 枳殼 阿膠炒 莪朮 生地黄

茯神 木通 五靈脂 桃仁 大黃 白茯苓 甘草

右判一劑生薑三片蜜三匙水煎食前服以利為度

一治痔漏脫肛便血方

川黃連多用酒浸約三兩許淨四兩 枳殼去穢麩防風去苦當歸全用四兩

右四味為細末以前浸黃連酒和麪糊為丸如梧桐子大每服七八十丸

心米飲或沸湯送下忌煎炒酒麪羊雞魚腥之物

肌散 五倍子炒黃色 乳香 沒藥 孩兒茶各一錢 白礬五五分

共為細末每次用竹管吹入漏瘡口內

一治痔谷道中蟲痒不止川水銀棗膏各二兩同研和搥如棗形狀薄綿

片裏納下部明目蟲出若痛者加用三分作丸

體氣

香散 內閣秘傳

琥珀

乳香各一錢五分

三寶香三錢

白芷三錢

當歸

蛤粉 各一錢五分

枯礬三錢

蜜蛇僧五分

細末洗

淨腋下每日擦之有加銅綠者

一治體氣方

蜘蛛一箇生捉大者將瓦焙益一箇一盛一蓋泥封固火

煨輕粉一錢枯丁

一錢赤石脂一錢先服通熱後用自已小便洗以此之

一治體氣并口齒惡臭方

丁香 五錢

藿香葉

零零香

甘松 略三

香附

白芷

當歸

桂心

檳榔

益智仁 各

麝香

白豆蔻 去殼

兩

右為細末煉蜜為丸 秤下下丸如梧子大每噙五丸至二十日身體馨香

一治體氣方

枯礬

輕粉二分

蛤粉二分

蜜陀僧五分

右為細末研勻每以少許擦之

一治腋氣方

龍丸

當歸酒洗一兩

懷生地一兩搗爛

白茯苓去皮二兩

甘枸杞子炒一兩

石蓮肉炒一兩

丁香三錢蓮肉焙五錢

木香五錢

青木香五錢

乳香五錢

水片另研京墨錢

右為細末用陳米飯

荷葉包燒過搗爛入地黃為丸如黃豆大麝香一分黃

酒化為衣每服三四十九臨卧半飢半飽用砂仁一二分炒入黃酒內送下

婦人加烏藥醋炒三錢香附米童便炒三錢

以後藥

人參

當歸

生地黃

乳香

沒藥

官桂

木香各一錢青皮

陳皮

麝香八味川酒浸過

白芷

良薑

麻黃

米殼

甘草各一錢

右劉水煎服出汗外用枯礬川椒各一兩為末擦腋下終身忌鯉魚羊肉出

大小便不可與女人同則

二治胡臭神方

真輕粉研細先用水洗令淨次擦上藥立愈每三日擦一次擦一月而斷

根何以知其根也其患人多是油耳若病根一去則油耳自愈此為驗也

○一治腋氣五更時用猪精肉二大片以甘遂末一兩拌之挾腋下至天明

生甘草一兩煎湯飲之良久瀉出穢物須在荒野之處則可恐穢氣傳人

也依法三五次即愈虛弱者間日為之其他蜜陀僧胡粉之類皆塞嚴以法其未甘

○一論體氣秘方專治五膈五噎痞塞諸虛百損五勞七傷體氣口氣頹氣

切諸般臭氣初服一七百體遍香若常服身體康健壯陽滋腎補益丹田其功不可盡述

透體氣香丸 沉香 木香 丁香 藿香 沒藥 甘松

零零香 縮砂 丁皮 官桂 白芷 細茶 檳榔

香附子 人參 酪一 乳香 檀香 三合 細辛 孩兒身

白豆蔻 益智仁 當歸 川芎 烏藥各五錢 麝香各錢 薄荷

右先將大粉草半斤剉片水煮汁去渣將汁熬成膏將前藥為末煉蜜并

搗和為丸如芡實大清晨嚙化一九黃酒送下忌生冷毒物解之

沐浴方 防風 荆芥 細辛 當歸 羌活 獨活 白

皂角 藁本 番白草 水紅花 川芎 甘松 藿香

右判水煮沐浴令人香肌膚去風癬

脫肛

脈小而緩者易愈

夫脫肛者乃虛寒下脫其病或因腸風痔漏久服寒涼或勞而下脫或因久痢裏急窘迫而脫也又有產婦用力過多及小兒呼號努氣久痢不止風邪襲虛而脫也夫脫肛者肛門番出也蓋肺與大腸為表裏肛者大腸之門肺實熱則閉結虛寒則脫出腎主大便故肺腎虛者多有此症若大腸濕熱用升陽除濕湯若血熱用四物加條芩槐花血虛四物加白朮茯苓兼痔加黃連槐花升麻虛弱用補中益氣湯加芍藥腎虛六味地黃丸主之

升陽除濕湯

自下而上者引而竭之

升麻

柴胡

防風

麥芽

澤瀉

蒼朮

陳皮

神曲

猪苓

甘草

右判水煎空心溫服口胃寒腸鳴加升麻

論脫肛乃脾肺虛寒下脫肛門番出也

提氣散

黃芪蜜炒

人參

白朮去苦炒

當歸身

白芍炒

乾姜

柴胡

升麻

炙甘草

羌活

右剉水煎服

洗法

用五倍子三錢白礬一塊水煎溫洗以芭蕉葉或荷葉緩緩托之

一方以蜘蛛七個燒存性為末每少許香油調敷

一方以生蜘蛛搗搭臍上即收

一方以死鼈頭一枚燒令烟盡搗末敷上以手按按之

一方以烏龍尾即架土塵灰同鼠糞和之燒烟于桶內令坐其上薰之數遍即上不脫為効

一治大便秘脫肛翻出腫痛有欬生栢勒子川黃連各一兩燒酒二盞每早空服

一論脫肛者肛門翻出虛寒脫出也益氣湯去柴胡加生地白芍茯苓栢栢

炒乾姜七盞煎服

一治脫肛氣熱者宜

能膽五分

片腦一分

孩兒茶二分

右為末以人乳調搽肛上熱汗自下而肛收矣

諸虫

脈沉實者生虛大者死口尺脈沉而滑者為寸白虫口慳蝕陰症脈虛小者生

勁急者死

外臺云蟲脈當沉弱而弦今反洪大即知蛔蟲甚也

九蟲行狀

一曰伏蟲長四寸為群蟲之長

二曰虵蟲又曰長蟲動則吐清水出則心痛貫心則殺人

三曰白蟲長一寸又曰寸白蟲相生子孫轉大長至四五寸或因臟腑虛弱而

動或因食甘肥而動其發動則腹痛發作腫聚去來上下痛有休息亦攻心

痛口喜吐痰及吐清水貫傷心者死

四曰肉蟲狀如爛杏令人煩滿

五曰肺蟲狀如蠶令人嗽而聲嘶

艾葉人雄黃末入管中薰下部令烟入即愈

○一治下部蟲痒大棗蒸取膏以水銀和捻長三寸以綿裹宿納下部中明日

蟲皆出又治痔漏

○一治蟲已蝕下部肛盡腸穿者取長股蝦蟆背背者一枚雞骨一分燒為灰

合吹下部令深大効

○一論頰人陰中生瘡如蟲咬痛用

桃葉搗爛綿裹納陰戶中一日換三次即安

○一治頰人陰蝕瘡陰戶中有細蟲其痒不可當食入臟腑即死令人發寒熱

與勞症相似用

猪肝切作大片以花椒葱拌猪油煎乾待冷納陰戶中少頃取出再換一

片其蟲入肝盡出再用後方洗之

洗楊散

五倍子

花椒

蛇床子

苦參

白礬

葱

各等分

右水煎盡洗神効

廣順堂梓行

武職精 武官千 武職

引其鑑入魂畫出再引影以那

器刑也亦久矣以器刑也半那

或變亦那

之官處人創到到到到到

測樂器器器器器器器

一命幾入空中小察眼端

合火不暗余察天咬

一當滿白到不暗其

端皆也人守其端

一當其端其端入其

其來人其其其

六曰胃蟲狀如蝦蟇令人嘔逆吐喜噦

七曰弱蟲狀如瓜瓣又名腐蟲令人多唾 八曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴

九曰燒蟲形至細微狀如菜蟲居洞腸之間因臟腑虛弱而致發動則為痔瘡

疥癬因人瘡處以生諸癰疽癬瘦疔齩蟲無所不為

穀道蟲者由胃弱腸虛而蟻蟲下乘也穀道肛門大腸之候蟻蟲者九蟲之內

一蟲也在乎腸間若臟腑氣爽則不安動胃弱腸虛則蟻蟲乘之輕者或痒

或蟲從谷道中溢出重者侵食肛門紫爛

一論諸般痞積面色痿黃肌體羸瘦四肢無力皆緣內有蟲積或好食生米

或好食壁泥或好食茶炭鹹辣等物者是蟲積只此一照除根

指迷七氣湯 青皮 去穢 陳皮 三稜 醋炒 莪木 醋炒 香附 益智仁

藿香 官桂 桔梗 大黃 檳榔 甘草

右剉水煎露一宿五更空心溫服不得些小飲食不然則藥力減而蟲積不

行矣服藥頃肚腹必痛當下如魚凍或長蟲或血蟻至日午蟲積不盡方用

溫粥止之後復退黃丸一料全愈

黃丸 平胃散 六兩 綠礬 一兩

右用醋糊為丸如梧子大每服六十九滾湯送下忌生冷發氣濕麵等物

應丸 治諸蟲 大黃 八兩 黑牽牛 四兩 枳殼 四兩

右為細末用苦練根皮一斤皂角不蛀者十錠用水二大碗煎成膏復和煎

三味藥為丸如梧子大外用沉香水香雷丸各二兩為末先用沉香為衣後

用水香雷丸為衣每服三九四更時分用 水送下

一論虬蟲或心如刺口吐清水用艾取汁宿食但取肥香脯一方寸片

先吃令蟲聞香然後飲汁當下蟲

一論小兒諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹痛唇口紫黑腸頭濕爛

化蟲丸 青黛 蘆薈 胡黃連 黃芩 蝦蟆 灰川芎 白芷 各等

右為細末猪鬃浸蒸糕丸如麻子大每服二十九食後即時杏仁湯送下

一治下部生蟲蠶蝨肛爛見五臟