


丹溪先生心法

附錄

三





丹溪先生心法

附 錄

(三)

朱震亨撰
程充編訂

丹溪先生心法卷四

痿五十六

○痿證斷不可作風治。而用風藥。有濕熱。濕痰。氣虛。血虛。瘀血。濕熱。東垣健步丸。加燥濕。降陰火。蒼朮。黃芩。黃柏。牛膝之類。濕痰。二陳湯加蒼朮。白朮。黃芩。黃柏。竹瀝。姜汁。氣虛。四君子湯加黃芩。黃柏。蒼朮之類。血虛。四物湯加黃柏。蒼朮煎。送補陰丸。亦有食積死血。妨碍不得下降者。大率屬熱。用參朮四物湯。黃柏之類。

〔附錄〕謹按五痿等證。特立篇目。所論至詳。後代諸方。獨於此證。蓋多缺略。攷其由。皆因混入中風條內。故也。丹溪先生痛千古之弊。憫世之罹此疾者。多誤于庸醫之手。有志之士。必當究其心焉。夫陳無澤。謂痿因內藏不足所致。誠得之矣。然痿之所不足。乃陰血也。而方悉是補陽補氣之劑。寧免實實虛虛之患乎。且無釋以三因立方。可謂諸方之冠。其餘此證。尤且未明。況求於他者乎。

【附方】健步丸 東垣方

防己酒洗一兩

羌活

柴胡

滑石炒

甘草炙

瓜蒌根酒洗以上各半兩

澤瀉

防風各三錢

苦參酒洗

川烏各一錢

肉桂五分

右為末。酒糊為丸。梧桐子大。每服七十九。葱白煎。愈風湯下。見中風類。

補陰丸 見諸虛類。

清燥湯 治濕熱成痿。以燥金受濕熱之邪。是絕寒水生化之源。源絕則腎虧。痿厥之病大作。腰已下痿。

軟癱痿不能動。

黃芪一錢五分。 蒼朮一錢。

白朮

橘皮

澤瀉各半錢。

人參

白茯苓

升麻各三分。

麥門冬

歸身

生芩

曲末

豬苓各二分。

酒柏

柴胡

黃連各一分。

五味子九箇。

甘草炙二分。

右每服半兩。水煎。空心服。

厥五十七 附手足十指麻木

○厥逆也。手足因氣血逆而冷也。因氣虛為主。有因血虛。氣虛脈細。血虛脈大。熱厥脈數。

外感脈沉實。有痰脈弦。因痰者。用白朮。竹瀝。氣虛。四君子。血虛。四物。熱厥。用承氣。外感。用

雙解散加姜汁酒。有陰厥陽厥。陰衰於下則熱。陽衰於下則寒。

○手足麻者屬氣虛。手足木者。有濕痰死血。十指麻木。是胃中有濕痰死血。

〔附錄〕厥者甚也。短也。逆也。手足逆冷也。其證不一。散之方書者甚多。今姑撮大概。且如寒熱厥逆者。則爲陰陽二厥也。陽厥者。是熱深則厥。蓋陽極則發厥也。不可作陰證。而用熱藥治之。精魂絕而死矣。急宜大小承氣湯。隨其輕重治之。所謂陰厥者。始得之。身冷脈沉。四肢逆。足踈臥。唇口青。或自利。不渴。小便色白。此其候也。治之以四逆。理中之輩。仍速灸關元百壯。又尸厥。飛尸卒厥。此卽中惡之候。因冒犯不正之氣。忽然手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不守。或錯言妄語。牙緊口噤。或昏不知人。頭旋暈倒。此是卒厥。客忤。飛尸。鬼擊。吊死。問喪。入廟登塚。多有此病。以蘇合丸灌之。候稍甦。以調氣散和平胃散服。名調氣平胃散。痰厥者。乃寒痰迷悶。四肢逆冷。宜姜附湯。以生附湯。以生附代熟附。虻厥者。乃胃寒所生。經曰。虻者。長蟲也。胃中冷卽吐虻蟲。宜理中湯。加炒川椒五粒。檳榔半錢。吞烏梅丸。効。虻見椒則頭伏故也。氣厥者。與中風相似。何以別之。風中身溫。氣中身冷。以八味順氣散或調氣散。如有痰。以四七湯導痰湯服之。

【附方】 八味順氣散 見中風類
調氣散

白豆蔻

丁香

檀香

木香各二錢

藿香

甘草炙各八錢

砂仁四錢

右爲末。每服二錢。入鹽少許。沸湯點服。

平胃散

蒼朮泔浸五斤

厚朴姜制炒

陳皮各三斤

甘草炒三十兩

右爲末。每服五錢。姜三片。棗一箇。煎服。入鹽一捻。沸湯點服。亦得。

四七湯

厚朴二兩

茯苓四兩

半夏五兩

紫蘇二兩

右每服四錢。水一鍾。姜七片。棗一箇。煎服。

承氣湯 見痢類

四逆湯 理中湯 姜附湯 並見中寒類

烏梅丸 見心痛類

導痰湯 見痰類

痙五十八

○痙。切不可作風治。兼用風藥。大率與癰病相似。比癰爲甚。爲虛。宜帶補。多是氣虛。有火。兼痰。宜用

人參。竹瀝之類。

〔附錄〕古方。風痙曰痙也。經云。諸痙項強。皆屬於濕土。是太陽傷濕也。又云。諸暴強直。皆屬於風。是陽明內鬱。而陰行於外。又曰。陽痙曰剛。無汗。陰痙曰柔。有汗。亢則害。承乃制。故濕過極。反兼風化制之。然

兼化者虛象實非風也。

【附方】

葛根湯 治瘧病無汗而小便少反惡寒者名剛瘧。

葛根四錢。

麻黃三錢。

桂枝二錢。

芍藥二錢。

甘草三錢炙。

右咬咀水二鍾生姜三片棗一枚煎服覆取微汗。

桂枝加葛根湯 治瘧病有汗不惡寒者服之此名柔瘧。

葛根四錢。

生姜三錢。

桂枝

芍藥

甘草各二錢。

右作一服水二鍾棗一箇煎服。二瘧皆可用小續命湯加減服。若胸滿口噤咬齒脚攣臥不着中者。

以大承氣湯下之無疑矣。

小續命湯 見中風類。

大承氣湯 見痢類。

癩五十九

○驚與痰宜吐。大率行痰爲主用黃連南星瓜蒌半夏尋火尋痰分多分少治之無不愈者。分痰與

熱。有熱者以涼藥清其心。有痰者必用吐藥。吐後用東垣安神丸。大法宜吐。吐後用平肝之劑。青黛、柴胡、川芎之類。龍會丸正宜服之。且如癩因驚而得。驚則神不守舍。舍空而痰聚也。

戴云癩者俗曰猪癩風者是也。

〔附錄〕癩症有五。馬、牛、雞、豬、羊。且如馬癩。張口搖頭。馬鳴。牛癩。目正直視。腹脹。雞癩。搖頭反折。喜驚。羊癩。喜揚目吐舌。豬癩。喜吐沫。以其病狀偶類之耳。非無痰涎壅塞。迷悶孔竅。發則頭旋顛倒。手足搖擗。口眼相引。胸背強直。叫吼吐沫。食頃乃甦。宜星香散加全蝎三箇。

【附方】

續命湯 主癩發頓悶無知。吐沫出。四體角弓反張。目反上。口噤不得言。

竹瀝一升二合。

生芩汁一升。

龍齒末。

生姜

防風

麻黃去節各四兩。

防己

附子炮各二兩。

石膏

桂二兩。

右十味。水一斗。煮取三升。分三服。有氣加紫蘇、陳皮各半兩。

○但小兒癩。千金有風、食、驚三種。本事方又有陰陽癩、慢脾風、三證。慢脾即食癩。宜醒脾丸。人參散。

古方三癩丸 治小兒百二十種驚癩。

荊芥穗二兩。

白礬一兩。牛生半枯。

右爲末。麵糊爲丸。黍米大。朱砂爲衣。姜湯下二十丸。如慢驚。用來復丹。急驚。三癩丸。食癩。醒脾丸可也。
本事人參散 治慢脾風。神昏痰盛。

人參半兩。

圓白大南星一兩。切片。以生姜汁并漿水各半。陰滿煮。帶性晒。

右爲末。每服一錢。水一盞。姜三片。冬瓜仁搗細少許。同煎。取半盞。作兩三次灌下。

專神丹 清熱養氣血。不時潮作者可服。

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

茯神

荊芥

殭蠶炒

獨活

遠志去心

犀角

麥門冬去心

酸棗仁炒

辰砂各半兩。另研

半夏

南星

石膏各一兩

甘草炙

白附子

川芎

鬱金

牛黃各三錢

珍珠三錢

生芩

黃連各半兩

金箔三十片

右爲末。酒糊丸。空心服五十丸。白湯下。

東垣安神丸

黃連一錢五分。酒洗

朱砂一錢。水飛

酒生芩

酒歸身

灸甘草各五分。

右除朱砂水飛外。四味搗爲末。和勻湯浸。蒸餅丸如黍米大。每服十五丸。食後津嚥下。

星香散 見中風類。

顛狂六十

○癲屬陰。狂屬陽。癲多喜而狂多怒。脈虛者可治。實則死。大率多因痰結於心胸間。治當鎮心神。開痰結。亦有中邪而成此疾者。則以治邪法治之。原病式所論尤精。蓋爲世所謂重陰者癲。重陽者狂是也。大概是熱。癲者神不守舍。狂言如有所見。經年不愈。心經有損。是爲眞病。如心經蓄熱。當清心除熱。如痰迷心竅。當下痰寧志。若癲哭呻吟。爲邪所憑。非狂也。燒蠶紙酒水下方寸匕。卒狂言鬼語。針大拇指甲下。卽止。風癲引脇痛發則耳鳴。用天門冬去心。日乾作末。酒服方寸匕。癲證春治之。入夏自安。宜助心氣之藥。陽虛陰實則癲。陰虛陽實則狂。狂病宜大吐下則除之。

【入方】 治癲風。

麻仁四升。

右以水六升。猛火煮至二升。去滓。煎取七合。旦空心服。或發或不發。或多言語。勿怪之。但人摩手足須定。凡進三劑愈。

又方 治狂邪發無時。披頭大叫。欲殺人。不避水火。

苦參不以多少。

右爲末。蜜丸如梧子大。每服十五丸。煎薄荷湯下。

驚悸怔忡六十一

○驚悸者。血虛驚悸。有時。以朱砂安神丸。痰迷心膈者。痰藥皆可。定志丸加琥珀、鬱金。怔忡者。血虛怔忡。無時。血少者多。有思慮便動。屬虛。時作時止者。痰因火動。瘦人多因是血少。肥人屬痰。尋常者多是痰。真覺心跳者。是血少。四物朱砂安神之類。假如病因驚而得。驚則神出其舍。舍空則痰生也。

戴云。怔忡者。心中不安。惕惕然如人將捕者是也。

〔附錄〕驚悸。人之所主者心。心之所養者血。心血一虛。神氣不守。此驚悸之所肇端也。曰驚曰悸。其可無辨乎。驚者。恐怖之謂。悸者。怔忡之謂。心虛而鬱痰。則耳聞大聲。目擊異物。遇險臨危。觸事喪志。心爲之忤。使人有惕惕之狀。是則爲驚。心虛而停水。則胸中滲漉。虛氣流動。水既上乘。心火惡之。心不自安。使人有怏怏之狀。是則爲悸。驚者。與之豁痰定驚之劑。悸者。與之逐水消飲之劑。所謂扶虛。不過調養心血。和平心氣而已。

【入方】治勞役心跳、大虛證。

朱砂

歸身

白芍

側柏葉炒。五錢

川芎

陳皮

甘草各二錢

黃連炒一錢半

右爲末。豬心血丸服。

【附方】

養心湯 治心虛血少驚悸不寧。

黃耆炙

白茯苓

茯神

半夏曲

當歸

川芎各半兩

遠志去心姜汁炒

辣桂

柏子仁

酸棗仁炒

五味

人參二錢半

甘草炙四錢

右每服三錢。水煎。姜三片。棗一箇。食前服。治停水怔忡。加檳榔。赤茯苓。

寧志丸 治心虛血虛多驚。若有痰驚宜吐之。

人參

白茯苓

茯神

柏子仁

琥珀

當歸

酸棗仁溫酒浸半日去殼隔紙炒

遠志各半兩炒

乳香

朱砂

石菖蒲二錢半

右爲末。煉蜜丸如梧子大。服三十丸。食後煎棗湯吞下。

朱雀丸 治心病怔忡不止。

白茯神二兩。

沉香五錢。

右爲末。煉蜜丸。小豆大。服三十丸。人參湯下。

加味四七湯 治心氣鬱滯。豁痰散驚。

半夏二兩半。

白茯苓

厚朴各一兩半。

茯神

紫蘇各一兩。

遠志炒。

甘草炙。半兩。

右每服四錢。生姜五片。石菖蒲一寸。棗一箇。水煎服。

朱砂安神丸

朱砂五錢。水飛過。另研。

黃連酒洗。六錢。

甘草炙。二錢半。

生芩一錢半。

當歸二錢半。

右四味爲末。蒸餅丸。如黍米大。朱砂爲衣服。服二十九丸。或五十九丸。津下。

定志丸 見健忘類。

健忘六十二

○健忘精神短少者。多有痰者。

戴云。健忘者。爲事有始無終。言談不知首尾。此以爲病之名。非比生成之愚頑。不知人事者。
〔附錄〕健忘者。此證皆由憂思過度。損其心胞。以致神舍不清。遇事多忘。乃思慮過度。病在心脾。又云。

思傷脾亦令朝暗遺忘治之以歸脾湯須兼理心脾神寧意定其證自除也

【附方】

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯神

黃耆

圓眼肉

酸棗仁炒各一兩

人參

木香各半兩

甘草炙二錢半

右每服四錢姜三片棗一枚水煎服

定志丸 治心氣不定恍惚多忘

遠志二兩

人參一兩

菖蒲一兩

白茯苓三兩

右爲末煉蜜丸如梧子大朱砂爲衣服二十九米湯下

痛風六十三 附肢節痛

○四肢百節走痛是也他方謂之白虎歷節風證 大率有痰 風熱 風濕 血虛 因於風者小續命湯 因於濕者蒼朮白朮之類佐以竹瀝 因於痰者二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮 因於血虛者用芎歸之類佐以紅花桃仁 大法之方蒼朮川芎白芷南星當歸酒黃芩 在上者加羌活威靈仙桂枝 在下者加牛膝防己木通黃柏 血虛格致餘論詳言多用川芎當歸佐以桃仁紅花薄桂威靈仙治痛風取薄桂味淡者獨此能橫行手臂領南星蒼朮等藥至痛處

又方 治上中下疼痛

南星姜制

蒼朮泔浸

黃柏酒炒各二兩

川芎一兩

白芷半兩

神麴炒一兩

桃仁半兩

威靈仙酒拌三錢

羌活三錢走骨節

防己半兩下行

桂枝三錢行臂

紅花酒洗一錢半

草龍膽半錢下行

右爲末。麴糊丸。梧子大。每服一百丸。空心白湯下。

張子元。血氣虛有痰。白濁。陰火。痛風。

人參一兩

白朮

熟苜

黃柏炒黑各二兩

山藥

海石

南星各一兩

瑣陽半兩

乾姜燒灰半兩。取其不走。

敗龜板酒炙二兩

右爲末。粥丸。一云酒糊丸。

臂痛方

蒼朮一錢半

半夏

南星

白朮

酒芩炒

香附各一錢

陳皮

茯苓各半錢

威靈仙三錢

甘草少許。別本加羌活一錢

右呶咀作一服。入生姜二三片。

二妙散 治筋骨疼痛因濕熱者有氣加氣藥。血虛者加補藥。痛甚者加生姜汁。熱辣服之。

黃柏炒。

蒼朮米泔浸炒。

右二味爲末。沸湯入姜汁調服。二物皆有雄壯之氣。表實氣實者加酒少許佐之。若痰帶熱者。先以舟車丸或導水丸神芎丸下伐後。以趁痛散服之。

趁痛散

乳香

沒藥

桃仁

紅花

當歸

地龍酒炒。

牛膝酒浸。

羌活

甘草

五靈脂酒淘。

香附童便浸。

或加酒芩炒酒柏。

右爲末酒調二錢服。

八珍丸 治痛風走注脚疾。

乳香

沒藥

代赭石

穿山甲生用各三錢。

羌活

草烏生用各五錢。

全蝎二十一箇炒。

川烏生用一兩不去皮尖。

右爲末醋糊丸如梧子大。每二十一丸溫酒送下。

四妙散 痛風走注。

威靈仙酒浸五錢

羊角灰三錢

白芥子一錢

蒼耳一錢半一云蒼朮

右爲末每服一錢生薑一大片搗汁入湯調服。又二妙散同調服。

又方 治酒濕痰痛風

黃柏酒炒

威靈仙酒炒各五錢

蒼朮

羌活

甘草三錢

陳皮一錢

芍藥一錢

右爲末每服一錢或二錢沸湯入姜汁調下

治氣實表實骨節痛方

活石六錢

甘草一錢

香附

片苓各三錢

右爲末姜汁糊丸如梧子大每服五七十丸白湯吞下

又方

糯米一盞

黃躑躅根一握

黑豆半合

右用酒水各一碗煎徐徐服之大吐大瀉一服便能行動

治食積肩腿痛

龜板酒浸一兩

酒柏葉

香附半兩

辣芥子

凌霄花

右爲末。酒糊丸。如梧子大。煎四物湯加陳皮、甘草湯下。

【附方】

控涎丹 治一身及兩脇走痛。痰挾死血者。

甘遂 麩裹煨

大戟 制

真白芥菜子 炒各等分

右爲末。加桃仁泥糊丸。如梧子大。每服五七丸。漸加至十丸。臨臥姜湯下。

龍虎丹 治走注疼痛。或麻木不遂。或半身痛。

草烏

蒼朮

白芷 各一兩。礪粗末。并發酵。重過入後藥。

乳香

沒藥 各二錢。另研

當歸

牛膝 各五錢

右爲末。酒糊丸。如彈大。每服一丸。溫酒化下。

〔附錄〕遍身骨節疼痛。晝靜夜劇。如虎嚙之狀。名曰白虎歷節風。並宜加減地仙丹。或青龍丸。乳香丸等服之。

又有痛風。而痛有常處。其痛處赤腫灼熱。或渾身壯熱。此欲成風毒。宜敗毒散。凡治臂痛。以二陳湯

加酒炒黃芩、蒼朮、羌活。

○如肢節痛。須用羌活。去風濕亦宜用之。如肥人肢節痛。多是風濕。與痰飲流注經絡而痛。宜南星、半夏。如瘦人肢節痛。是血虛。宜四物加防風、羌活。如瘦人性急燥而肢節痛。發熱。是血熱。宜四物

湯加黃芩、酒炒黃柏。如肢節腫痛、脈滑者、當用燥濕。宜蒼朮、南星、兼行氣藥、木香、枳殼、檳榔、在下者加漢防己。若肢節腫痛、脈澁數者、此是瘀血、宜桃仁、紅花、當歸、川芎、及大黃、微利之。如倦怠無力、而肢節痛、此是氣虛、兼有痰飲、流注、宜參、朮、星、半。丹溪無肢節痛條、此文又純似丹溪語、姑書以俟知者。

小續命湯 地仙丹 並見中風類。

舟車丸 見中濕類。 導水丸 見痢類。

神芎丸 見發熱類。 敗毒散 見瘟疫類。

乳香丸

白附子炮。

南星

白芷

沒藥

赤小豆

荊芥

藿香去土。

骨碎補去毛。

乳香另研各一兩。

五靈脂

川烏炮、去皮臍尖。

糯米炒、各二兩。

草烏頭炮、去皮尖。

京墨煨、各五兩。

松脂牛兩、研。

右爲末、酒糊丸、梧子大、每服十丸至十五丸、冷酒吞下、茶亦得、不拘時、忌熱物。

癘風六十四 附身上虛痒。

○大風病是受得天地間殺物之風、古人謂之癘風者、以其酷烈暴悍可畏耳、人得之者、須分在上在下。

夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳蟲於穀道中出所出雖有上下道路之殊然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意看其疙瘡與瘡若上先見者上體多者在上也若下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫或從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之緩多忽之雖按此法施治病已全然脫體若不能絕味絕色皆不免再發再發則終不救矣某曾治五人矣中間惟一婦人得免以其貧甚且寡無物可喫也餘四人三兩年後皆再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人免於死非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病外又是百餘貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈

醉仙散

胡麻仁

牛旁子

蔓荊子

枸杞子各半兩同炒黑色

防風

瓜蒌根

白蒺藜

苦參各半兩

右爲末每一兩半入輕粉二錢拌勻大人每用一錢空心日午臨臥各一服茶湯調下喫後五七日間先於牙縫內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下臭屎爲度量大小虛實加減與之證候重而急者須先以再造散下之候補養得還復與此藥喫須斷鹽醬醋諸般肉魚腥椒料水果煨燒炙燂及茄子等物只宜淡粥煮熟時菜并烏梢菜花蛇用淡酒煮熟食之以助藥力也

再造散

錦紋大黃一兩

皂角刺一兩半，獨生經年黑大黃

鬱金牛兩生

白牽牛頭末六錢，半生半炒，一本無此二味

右爲細末，每服二錢，一云五錢，臨臥冷酒調服，一云日未赤，面東服，以淨桶伺候，泄出蟲，如蟲黑色，乃是多年，赤色是爲方近，三四日又進一服，真候無蟲則絕根矣，後用通五散調理，可用三稜針刺委中出血，終身不得食牛馬驢騾等肉，大忌房事，犯者必不救。

黃精丸

蒼耳葉

紫背浮萍

大力子各等分

烏蛇肉中牛酒浸去皮骨

黃精倍前三味，生搗汁和四味研細焙乾

右爲末，神麴糊丸如梧子大，每服五七十九丸，溫酒下，一方加炒柏、生芩、甘草節。

又方

蒼耳葉

浮萍

鼠粘子

烏蛇肉等分

右用豆淋酒炒等分爲末，每服一二錢，豆淋酒調下。

治麻風脈大而虛者

苦參七錢半

蒼耳

牛旁子

酒蒸柏一作酒柏各二兩

黃精

浮萍各一兩

右爲末用烏蛇肉酒煮如無蛇以烏鯉魚亦可糊丸服之候脈實再用通天再造散取蟲

治麻風

四物湯加羌活防風陳皮甘草

又方

大黃

黃芩

雄黃三兩

右爲末用漳樹葉濃煎湯入藥蒸洗

〔附錄〕此疾非止肺臟有之以其病發於鼻從俗呼爲肺風也鼻準腫赤脹大而爲瘡乃血隨氣化也氣旣不施則血爲之聚血旣聚則使肉爛而生蟲也生蟲者厥陰主之以藥緩疎之煎局方升麻湯下瀉青丸餘病各隨經治之

【附方】

凌霄花散 治癘風

蟬殼

地龍炒

殭蠶炒

全蝎各七箇

凌霄花半兩

右爲末每服二錢酒調下於浴室內常在湯中住一時許服藥効

東坡四神丹 治大風

羌活

玄參

當歸

熟芫

右等分。煉蜜丸。梧子大。每服七十九。

浮萍散 治癩及風癬。

浮萍一兩。

荆芥

川芎

甘草

麻黃去根節。已上各半兩。或加當歸。芍藥。

右爲末。每服一兩。水二盞煎。入葱白。豆豉亦可。汗出則愈。

通聖散 見斑疹類。

局方升麻湯

熟半夏

茯苓

白芷

當歸各三錢

蒼朮

乾葛

桔梗

升麻各一兩

熟枳殼

乾姜各半錢

大黃蒸半兩

芍藥七錢半

陳皮

甘草各一兩半

右咬咀。每服四錢。生姜燈心同煎。食前服。

瀉青丸 見中風類。

○身上虛痒。血不榮於腠理。所以痒也。

右用四物湯。加黃芩煎。調浮萍末服之。

又方

凌霄花末一錢。酒調下。

纏喉風喉痹六十五 附咽痛咽瘡

○喉痹。大概是痰熱。重者用桐油探吐。一方射干逆流水吐之。又方李實根皮一片。噙口內。更

用李實根研水敷項上一週。遭用新探圍中者纏喉風。屬痰熱。戴云。謂其咽喉裏外皆腫者是也。用桐

油。以鵝翎探吐。又法。用燈油脚探吐。又用遠志去心爲末。水調傅項上一遭。立効。亦可吐。咽喉生

瘡。痛是虛熱血虛。多屬虛火游行。無制客於咽喉也。用人參荊芥。蜜炙黃柏。虛火用人參。竹瀝。血虛。

四物加竹瀝。實熱者黃連。荊芥。薄荷。硝。蜜。姜汁調。噙化。治咽喉。用倒滴刺根淨洗。入些少好酒同研

滴入喉中。痛立止。喉痹風熱痰。先以千縉湯。後以四物加黃芩。知母。養陰則火降。又方。豬牙皂角爲

末。和霜梅噙。又方。木鱉子用鹽水浸。噙一丸。又方。茜草一兩。一服。降血中之火。又方。焰硝半

錢。枯礬半錢。礪砂一錢爲末。杜仲。牛膝搗汁調。喉閉。或有中垂一絲。結成小血珠。垂在咽喉中。用杜牛

膝根。卽鼓槌草直而獨條者。搗碎。用好米醋些小和研。取汁三五滴。滴在鼻中。卽破。喉痛。必用荊芥。陰

虛火炎上。必用玄參。又喉痹。陳年白梅。入抽涎令化。噙梅於口中。

【入方】

雄黃解毒丸 治纏喉急喉風。雙鵝腫痛。湯藥不下。

雄黃一兩。

巴豆去油十四箇。

鬱金一錢。

右爲末。醋糊丸如菉豆大。熱茶清下七丸。吐出頑涎卽甦。大効。如口噤。以物斡開灌之下咽。無有不活者。

潤喉散 治氣鬱夜熱。咽乾硬塞。

桔梗二錢半。

粉草一錢。

紫荷車四錢。

香附三錢。

百藥煎一錢半。

右爲末。傅口內。

又方 喉痛。

鵬砂

膽礬

白殭蠶

陳霜梅

右爲末和噉。

頭風六十六

○屬痰者多。有熱。有風。有血虛。在左屬風。荆芥。薄荷。屬血虛。川芎。當歸。在右屬痰。蒼朮。半夏。屬熱。酒苓爲主。又屬濕痰。川芎。南星。蒼朮。偏頭風。在左而屬風者。用荆芥。薄荷。此二味。卽是治之主藥。右君

臣佐使之分。凡主病者爲君而多。臣次之。佐又次之。須要察其兼見何症而佐使之。如有痰。卽以二陳湯治痰而佐之。他症皆倣此。又須察識病情。全在活法。出入加減。不可執方。

【入方】

酒片苓一兩

蒼朮

羌活

防風各五錢

細辛二錢

蒼耳三錢

右爲末。每服三錢。生姜一大片。同搗勻。茶湯盪起服之。

又方

酒片苓五錢

蒼朮二錢半

羌活

蒼耳

川芎

生甘草

酒黃連各一錢半

半夏麴炒三錢半

右爲末。服法同前。

又方

酒片苓一兩

蒼朮

羌活

川芎各五錢

蒼耳

細辛各三錢

右爲末。服法同前。

又方 濕痰頭風

片苓酒炒三錢

蒼朮酒炒一兩

川芎

細辛各二錢

甘草一錢

右爲末服法同前

瘦人搖藥

軟石膏

朴硝各五錢

腦子

荊芥

檀香皮

薄荷各一錢

白芷

細辛各二錢

右爲末搖鼻內

頭痒風屑髮黃

用大黃酒浸炒爲末茶調服

一粒金搖鼻方 治偏頭風

蕞撥不以多少研細用獾猪膽汁拌勻再入膽內懸陰乾

蕞木

玄胡索

白芷

川芎各一兩

青黛二兩

右爲末入製蕞撥末一兩半用無根水丸每用一粒長流水化開噴鼻以銅錢二三文口咬定出涎

治頭風

烏頭尖七箇

荊芥

防風

甘草

蔓荊子

台芎

桔梗

麻黃

右爲末茶調。

一人頭風鼻塞。

南星

蒼朮

酒芩

辛夷

川芎

右爲末茶調。

〔附錄〕頭風用熱藥多。間有挾熱而不勝熱劑者。宜消風散。茶調散服之。頭風發動。頂後兩項筋緊。吊起痛者。看其人挾寒挾虛。宜三五七散。頭風九月。取菊花作枕。最良。素問論頭風者。本於風寒入於腦髓耶。本事方論婦人患頭風者。十居其半。或者婦人無巾以禦風寒焉耳。男子間有患者。若經年不愈者。宜灸顛會、百會、前頂、上星等穴。差。

【附方】

消風散

荆芥穗

甘草炙

川芎

羌活

人參

茯苓

防風

白殭蚕炒

藿香

蟬退去土炒各二兩

厚朴姜製半兩

陳皮去白半兩

右爲末。每服二錢。荊芥湯或茶清調下。

茶調散

薄荷去梗不見火八兩。

川芎四兩。

羌活

甘草

白芷各二兩。

細辛去葉一兩。

防風二兩半。

荊芥去梗四兩。

右爲細末。每服二錢。食後茶清調下。常服清頭目。

三五七散

細辛一斤半。

乾姜炮二斤。

防風四斤。

山茱萸去核。

茯苓各三斤。

附子三十五箇炮去皮臍。

右爲細末。每服二錢。溫酒食前調下。

頭眩六十七

○頭眩。痰挾氣虛併火。治痰爲主。挾補氣藥及降火藥。無痰則不作眩。痰因火動。又有濕痰者。有火痰者。濕痰者多宜二陳湯。火者加酒芩。挾氣虛者相火也。治痰爲先。挾氣藥降火。如東垣半夏白朮天麻湯之類。眩暈不可當者。以大黃酒炒爲末。茶湯調下。火動其痰。用二陳加黃芩、蒼朮、羌活。散風行濕。左手脈數熱多。脈濇有死血。右手脈實有痰積。脈大是久病。久一作虛。久病之人。氣血俱虛而

脈大痰濁不降也。昔有一老婦患赤白帶一年半。頭眩坐立不得。睡之則安。專治赤白帶。帶愈其眩亦安。

〔附錄〕眩者言其黑暈轉旋。其狀目閉眼暗。身轉耳聾。如立舟船之上。起則欲倒。蓋虛極乘寒得之。亦不可一途而取軌也。又風則有汗。寒則製痛。暑則熱悶。濕則重滯。此四氣乘虛而眩暈也。又或七情鬱而生痰。動火隨氣上厥。此七情致虛而眩運也。淫慾過度。腎家不能納氣歸元。使諸氣逆奔而上。此氣虛眩運也。吐衄漏崩。肝家不能收攝榮氣。使諸血失道妄行。此血虛眩運也。要尋致病之因。隨機應敵。其間以升降鎮墜行汗爲最。不可妄施汗下。識者將有採薪之憂。有早起眩運。須臾自定。日以爲常者。正元飲下黑錫丹。傷濕頭運。腎著湯加川芎。名除濕湯。疎風川芎茶調散。有痰。青州白丸子。

【附方】

頭運方 利痰、清熱、降火。或滾痰丸亦可。

南星五分製。

半夏一錢。

桔梗七分。

枳殼一錢。

陳皮一錢。

甘草五分。

茯苓一錢。

黃芩七分。

右作一服。生姜七片。水煎。食後服。

香橘飲 治氣虛眩暈。

木香

白朮

半夏麴

橘皮

茯苓

砂仁各半兩

丁香

甘草炙二錢半

右剉散水二盞。生姜五片煎服。加當歸、川芎、官桂治血虛眩暈。

白附子丸 治風痰上厥眩暈頭疼。

全蝎半兩炒

白附子炮

南星炮

半夏

旋覆花

甘菊

天麻

川芎

橘紅

殭蠶炒

乾姜生各二兩

右爲末。生姜半斤取汁。打糊丸。梧子大。煎荊芥湯下五十丸。

人參前胡湯 治風痰頭暈目眩。

半夏麴

木香

枳殼炒

紫蘇

赤茯苓

南星炮

甘草炙各五錢

人參三錢

前胡五錢

橘紅五錢

右剉散。每服五錢。生姜五片水煎服。

芎朮除眩散 治感濕感寒頭重眩暈。

附子生

白朮

川芎各半兩

官桂

甘草炙各二錢半。

右剉每服三錢姜七片水煎服。

茯苓桂枝白朮甘草湯 治氣上冲胸戰搖眩暈。

茯苓一兩。

桂枝七錢半。

白朮

甘草炙各半兩。

右剉每服四錢水煎服。風症加川芎細辛。濕症加川芎蒼朮。

寒證加乾姜良姜。

半夏白朮天麻湯 見頭痛類。

正元散

紅豆炒三錢。

人參二兩。

肉桂半兩。

附子炮去皮尖。

川芎

山藥姜汁炒。

烏藥

乾葛各一兩。

川烏炮去皮臍半兩。

乾姜炮三錢。

白朮

甘草炙。

茯苓各二兩。

陳皮二錢。

黃耆炙一兩半。

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗一箇入鹽少許煎服。

黑錫丹

肉桂半兩。

沉香

附子炮去皮臍。

故紙

胡蘆巴酒浸炒。

茴香炒。

肉豆蔻麩裏煨。

陽起石研細水飛。

金鈴子蒸去皮核

木香各一兩

硫黃

黑錫去滓各二兩

右用黑蓋或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並杵羅爲末一處和勻自朝至暮以研至黑光色爲度酒糊丸如桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十粒空心鹽姜湯或棗湯下女人艾棗湯下

腎著湯 見腰痛類

川芎茶調散 見頭痛類

頭痛六十八

○頭痛多主於痰痛甚者火多有可吐者可下者 清空膏治諸頭痛除血虛頭痛不可治出東垣試效方 血虛頭痛自魚尾上攻頭痛用芎歸湯古方有追涎藥

〔附錄〕頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎 陽明白芷 少陽柴胡

太陰蒼朮 少陰細辛 厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是濕痰宜半夏蒼朮 如瘦人是熱宜酒製黃芩防風 如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷 如氣虛頭痛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安神湯 如風熱在上頭痛宜天麻蔓荊子台芎酒製黃芩 如苦頭痛用細辛 如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸用芎酒黃芩 如頂顛痛

宜藁本、防風、柴胡、東垣云：頂顛痛須用藁本，去川芎。且如太陽頭痛、惡風、脈浮緊，川芎、羌活、獨活、麻黃之類為主。少陽頭痛，脈弦細，往來寒熱，柴胡為主。陽明頭痛，自汗發熱，惡寒，脈浮緩長實，升麻、葛根、石膏、白芷為主。太陰頭痛，必有痰，體重，或腹痛，脈沉緩，以蒼朮、半夏、南星為主。少陰頭痛，足寒氣逆，為寒厥，其脈沉細，麻黃、附子、細辛為主。厥陰頭痛，或吐痰沫，厥冷，其脈浮緩，以吳茱萸湯主之。血虛頭痛，當歸、川芎為主。氣虛頭痛，人參、黃芪為主。氣血俱虛頭痛，調中益氣湯內加川芎。三分蔓荊子，三分細辛，二分其效如神。又有痰厥頭痛，所感不一，是知方者驗也。法者用也。徒知體而不知用者，弊體用不失，可謂上工矣。

【附方】

清空膏 治偏正頭痛、年深不愈者。又治風濕熱、頭上壅、及腦痛、除血虛頭痛不治。

川芎五錢

柴胡七錢

黃連酒炒

防風

羌活各一兩

炙甘草一兩五錢

細挺子黃芩三兩，去皮，一半酒制，一半炒。

右為末，每服二錢，熱盞內入茶少許，湯調如膏，抹在口內，臨臥少用白湯送下。如苦頭痛，每服加細辛

二分。痰厥頭痛，脈緩，減羌活、防風、川芎、甘草，加半夏一兩五錢。如偏正頭痛，服之不愈，減羌活、防

風、川芎一半，加柴胡一倍。如發熱、惡熱而渴，此陽明頭痛，只與白虎湯，加好吳白芷。

安神湯 治頭痛、頭旋、眼黑。

生甘草

炙甘草各二錢

防風二錢五分

柴胡

升麻

酒生芎

酒知母各五錢

酒柏

羌活各一兩

黃芪二兩

右剉每服五錢水煎加蔓荊子五分川芎三分再煎臨臥熱服

徹清膏

蔓荊子

細辛各一分

薄荷葉

川芎各三分

生甘草

炙甘草各五分

藁本一錢

右爲末茶清調下二錢

順氣和中湯 治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃芪一錢半

人參一錢

甘草炙七分

白朮

陳皮

當歸

芍藥各五分

升麻

柴胡各三分

細辛

蔓荊子

川芎各二分

右作一服水煎食後服

不臥散 治頭痛

豬牙皂角一錢

玄胡

青黛些少

右爲末吹鼻中取涎。

半夏白朮天麻湯 治脾胃證已經服疎風丸下二三次元證不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開頭苦痛如裂四肢厥冷不得安臥。

黃柏二分酒洗

乾姜三分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮各五分

炒神曲

白朮各一錢

麥芽

半夏湯洗

陳皮各一錢半

右每服五錢水煎熱服。

芎歸湯 見腸風類。

調中益氣湯 見脾胃類。

治頭痛

片苓酒浸透晒乾爲末茶清調 治諸般頭痛亦治血虛頭痛。

治頭痛連眼痛 此風痰上攻須用白芷開之。

雨前茶

川芎

白芷

防風

藁本

細辛

當歸

治頭痛如破

酒炒大黃半兩一半茶煎

眉眶痛六十九

○眉眶痛屬風熱與痰。作風痰治類痛風。

【入方】

黃芩酒浸炒

白芷一本作白朮

右爲末茶清調二錢

又方

川烏

草烏二味爲君童便浸炒去毒

細辛

羌活

黃芩

甘草等分爲佐

右爲細末茶清調服一本加南星

〔附錄〕痛有二證。眼屬肝有肝虛而痛。纔見光明則眶骨痛甚。宜生熟地黃丸。又有眉稜骨痛。眼不可開。晝靜夜劇。宜導痰湯。或芍辛湯入牙茶。或二陳湯吞青州白丸子良。

【附方】

還奇方。治眉骨痛不可忍。大有効。

羌活

防風各二錢

甘草二錢夏月生冬炒

酒黃芩一錢冬月不用有熱者用

右每服三錢水煎食後溫服

生熟地黃丸

生芩

熟芩各一兩

玄參

金釵石斛各一兩

右爲末蜜丸

導痰湯 見痰類

芎辛湯

附子生去皮臍

烏頭生

天南星

乾姜

甘草炙

川芎

細辛等分

右剉每服四錢姜五片芽茶少許煎服

青州白丸子 見和劑及瑞竹堂方

四神散 治婦人血風眩暈頭痛

菊花

當歸

旋覆花

荆芥穗

右等分爲細末每服二錢葱白三寸茶末二錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

心脾痛七十

○心痛即胃脘痛。雖日數多。不喫食。不死。若痛方止。便喫物。還痛。必須三五服藥後。方喫物。痛甚者。服必伏。用溫藥附子之類。不可用參朮。諸痛不可補氣。大凡心膈之痛。須分新久。若明知身受寒氣。口喫寒物而得病者。於初得之時。當與溫散。或溫利之藥。若曰病得之稍久。則成鬱。久鬱則蒸熱。熱久必生火。原病式中備言之矣。若欲行溫散。溫利。寧無助火添病耶。古方中多以山梔子爲熱藥之向導。則邪易伏。病易退。正易復而病安。然病安之後。若縱恣口味。不改前非。病復作時。反咎醫之失。良可嘆哉。一方用山梔子炒去皮。每服十五枚。濃煎湯一呷。入生姜汁令辣。再煎小沸。又入川芎一錢。尤妙。山梔子大者。或七枚。或九枚。須炒黑。大概胃口有熱而作痛者。非山梔子不可。須佐以姜汁。多用台芎開之。病發者。或用二陳湯加川芎。蒼朮。倍加炒梔子。痛甚者。加炒乾姜從之。反治之法也。輕者。川芎一兩。蒼朮一兩。山梔子炒去皮二兩。姜汁蒸餅糊丸。梧桐子大。服七八十丸。熱辣姜湯下。重者。桂枝。麻黃。石礮各等分。姜汁和蒸餅丸。桐子大。服五十丸。熱辣姜湯下。一本。輕者散之。麻黃。桂枝之類。重者加石礮。川芎。蒼朮。炒山梔子去皮作丸服。凡治此證。必要先問平日起居何如。假如心痛。有因平日喜食熱物。以致死血留於胃口作痛。用桃仁承氣湯下之。切記。輕者用韭汁。桔梗。能開提其氣。血藥中兼用之。以物柱按痛處。則止者。挾虛。以二陳湯加炒乾姜和之。有虫痛者。面上白斑。唇紅。能食。屬虫。治以苦練根。錫灰之類。痛定便能食。時作時止者。是虫。上半月虫頭向上。易治。下半月虫頭向下。難治。先以肉汁及糖蜜食下。

則引虫頭向上。然後用藥打出。練樹根皮、檳榔、鶴虱。夏取汁飲。冬濃煎湯。下萬應丸最好。脈堅實不大便者。下之。心痛。用山梔并劫藥止之。若又復發。前藥必不効。可用玄明粉一服立止。左手脈數熱多。脈濇有死血。右手脈緊實痰積。弦大必是久病。胃脘有濕而痛者。宜小胃丹下之。

【入方】

黃連炒

山梔炒

吳茱萸湯洗各五錢

荔枝核燒存性三錢

滑石五錢

右爲末。姜汁和丸服。

又方

山梔子仁炒黃色

右爲末。姜湯調粥丸。亦得。冷痛者。加草豆蔻仁炒末。姜汁炊餅丸服。

又方

白朮五錢

白芍

砂仁

半夏

當歸各三錢

桃仁

黃連

神麩炒

陳皮各二錢

吳茱萸一錢半

殭蚕

人參

甘草各一錢

右爲末蒸餅丸服

又方

白朮三錢半

白芍炒

陳皮

歸尾各二錢半

人參

黃連炒一錢半

吳茱萸半錢

右爲末蒸餅丸

又方 治氣實心痛者

山梔子炒焦六錢

香附一錢

吳茱萸一錢

右爲末蒸餅丸如花椒大以生地黄酒洗淨同生姜湯煎送下二十丸

又方

胡椒

華撥各半兩

右爲末以醋調捏作團子吞之

又方 治心痛亦治哮喘 又見痰類

半夏切碎香油炒

右爲末姜汁炊餅丸姜湯下二三十丸

又方

黃荊子炒焦爲末米湯調下亦治白帶
一人脈澁心脾常痛

白朮一兩

半夏一兩

蒼朮

枳實

神麴

香附

茯苓

台芎各半兩

右爲末神麴糊丸

治死血留胃脘作痛者

玄胡一兩半

桂

滑石

紅花

紅麴各五錢

桃仁三十箇

右爲末湯浸蒸餅和丸

治痰飲積胃脘痛

螺螄殼牆上年久者燒

滑石炒

蒼朮

山梔

香附

南星各二兩

枳殼

青皮

木香

半夏

砂仁各半兩

右爲末生姜汁浸蒸餅爲丸菘豆大每服三四十丸姜湯下
春加芎夏加黃連冬加吳茱萸半兩有痰者用明礬溶開就丸如雞頭大熱姜湯吞下一丸
青黛亦治心痛
藍葉槌碎取汁姜汁和服亦

可如無葉處。用水一小瓶。用藍安在刀頭。火中燒紅。淬水服。

○治脾痛。用海粉。佐以香附末。用川芎、山梔、生姜汁煎辣湯。調服爲佳。又方。治脾痛氣實者。可用牡蠣煨爲粉。用酒調一二錢服。有脾痛。大小便不通者。此是痰隔中焦。氣聚下焦。

〔附錄〕夫心痛。其種有九。一曰虫痛。二曰疰痛。三曰風痛。四曰悸痛。五曰食痛。六曰飲痛。七曰寒痛。八曰熱痛。九曰來去痛。其痛甚。手足青過節者。是名真心痛。且發夕死。夕發旦死。非藥物所能療。若蚘虫攻噉心痛。令人惡心而吐。用川椒十粒煎湯。下烏梅丸。良。有腎氣上攻。以致心痛。用生韭研汁。和五苓散爲丸。空心茴香湯下。時作時止。或飲湯水。咽下而作噦者。是有死血在其中。以桃仁承氣湯下之。草豆蔻丸。多治氣餒弱人心痛。妙。

【附方】

草豆蔻丸 治客寒犯胃痛者。宜此丸。熱亦可服。止可一二服。

草豆蔻 一錢四分。麴裹煨。去皮。

益智

橘皮

殭蚕

人參

黃芪各八分。

吳茱萸湯洗去苦八分。

生甘草三分。

炙甘草三分。

歸身

青皮各六分。

神麴炒。

姜黃各四分。

澤瀉一錢。小便數者減半。

桃仁七箇。去皮尖。另研。

麥芽炒。一錢五分。

柴胡四分。詳脇下加減用。

半夏洗一錢

右除桃仁另研餘爲末浸蒸餅丸如桐子大服三十丸白湯下食遠旋斟酌多少用之

丁香止痛散 治心氣痛不可忍

良姜五兩

茴香炒

甘草各一兩半

丁香半兩

右爲末每服二錢沸湯點服

失笑散 治心氣痛不可忍小腸氣痛

蒲黃炒

五靈脂酒研淘去砂土各等分

右先以醋調二錢煎成膏入水一盞煎食前熱服

二姜丸 治心脾疼溫養脾胃冷食所傷

乾姜炮

良姜

扶陽助胃湯 治寒氣客於減胃胃脘當心而痛得熱則已

乾姜炮一錢半

揀參

草豆蔻

官桂

白芍各一錢

陳皮

白朮

吳茱萸各五分

附子炮二錢

益智五分

右剉作一服水煎生姜三片棗二枚有積聚備急丹良

烏梅丸 治胃冷。蚘虫攻心痛。嘔吐。四肢冷。

烏梅三百箇。

黃柏炙。

細辛

肉桂

附子炮各六兩。

黃連十六兩。

人參六兩。

蜀椒炒。去閉口者及目。

當歸各四兩。

乾姜炮一兩。

右爲末。取烏梅肉和蜜丸。桐子大。每服五十丸。空心鹽湯下。

桃仁承氣湯 見吐血類。

小胃丹 見痰類。

五苓散 見中暑類。

脇痛七十一

○脇痛。肝火盛。木氣實。有死血。有痰流注。肝急。木氣實。用蒼朮、川芎、青皮、當歸之類。痛甚者。肝火盛。以當歸龍會丸。姜汁下。是瀉火之要藥。死血。用桃仁、紅花、川芎。痰流注。以二陳湯加南星、蒼朮、川芎。肝苦急。急食辛以散之。用撫芎、川芎、蒼朮。血病。入血藥中行血。治咳嗽脇痛。以二陳湯加南星、香附、青皮、青黛。入姜汁。脇痛有瘀血。行氣藥中加桃仁不去尖。并香附之類。有火盛者。當伐肝木。左金丸治肝火。有氣鬱而胸脇痛者。看其脈沉澁。當作鬱治。痛而不得伸舒者。蜜丸。龍會丸最。快。脇下有食積一條扛起。用吳茱萸炒黃連。控涎丹。一身氣痛及脇痛。痰挾死血。加桃仁泥丸服。

右脇痛用推氣散出嚴氏方。左脇痛用前藥爲君加柴胡或小柴胡亦可治。

【入方】

小龍會丸

當歸

草龍膽酒洗

山梔炒

黃連炒

川芎各半兩

大黃煨半兩

蘆會三錢

木香一錢

一方有黃芩柴胡各半兩無大黃木香一方有甘草柴胡青皮無當歸梔子

右爲末入麝香少許粥糊丸如棗豆大每服五十丸姜湯下仍以琥珀膏貼痛處。龍會丸亦治有積因飲食大飽勞力行房脇痛。

當歸龍會丸 治內有濕熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處却以生姜汁吞此丸。痛甚者須炒令熱服。

草龍膽

當歸

大梔子

黃連

黃芩各一兩

大黃

蘆會半兩

木香一錢半

黃柏一兩

麝香半錢

右十味爲末麵糊丸。一方加柴胡川芎各半兩又方加青黛半兩。蜜丸治脇痛。麴丸降肝火。

抑青丸 瀉肝火

黃連半斤

右爲末蒸餅糊丸服。

〔附錄〕脇下痛發寒熱小柴胡湯。肥白人因氣虛而發寒熱脇下痛者補虛用參、芪、退熱用柴胡、黃芩、調氣止痛用青木香、青皮。瘦人脇下痛發寒熱多怒者必有瘀血宜桃仁、當歸、紅花、柴胡、青皮、大黃、梔子、草龍膽。

【附方】

推氣散 治右脇疼痛脹滿不食。

枳殼

桂心

片子姜黃各半兩一本作礪蜜

甘草炙一錢半

右爲末每服二錢姜棗湯調下酒亦可。

枳芎散 治左脇痛刺不可忍者。

枳實炒

川芎各半兩

粉草炙一錢半

右爲末每服二錢姜棗湯下酒亦可。

十棗湯 治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可用。

甘遂

芫花慢火口紫色

大戟各等分

右爲末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢人實更加一錢量虛實加減。

控涎丹 見痛風類。

小柴胡湯 見瘧類。

琥珀湯 見積聚類。

腹痛七十二 附腹中窄狹 絞腸沙

○腹痛有寒 積熱 死血 食積 濕痰 脈弦 食 脈滑 痰 一作清 清痰多作腹痛 台芎 蒼朮 香附 白

芷爲末 以姜汁入湯調服 大法之方若此 腹痛者 氣用氣藥 如木香 檳榔 香附 枳殼之類 血用血藥

如當歸 川芎 桃仁 紅花之類 初得時 元氣未虛 必推蕩之 此通因通用之法 久必難 壯實與初病 宜下

虛弱衰與久病 宜升之消之 腹中水鳴 乃火擊動其水也 用二陳湯加黃芩 黃連 梔子 亦有臟寒而鳴

者 凡心腹痛者 必用溫散 此是鬱結不行 阻氣不運 故痛 在上者多屬食 食能作痛 宜溫散之 如乾

姜 炒蒼朮 川芎 白芷 香附 姜汁之類 不可用竣利藥攻下之 蓋食得寒則凝 熱則化 更兼行氣快氣藥助

之 無不可者 一老人腹痛 年高不禁下者 用川芎 蒼朮 香附 白芷 乾姜 茯苓 滑石之類

戴云 寒痛者 綿綿痛而無增減者是 時痛時止者是 熱也 死血痛者 每痛有處不行移者是也 食積者

甚欲大便 利後痛減者是 濕痰者 凡痛必小便利

【入方】 治酒積腹痛者 寬氣緊要

檳榔

三稜

莪朮

香附

官桂

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

茯苓

木香

右爲末。神麴糊丸。每服五十丸。白湯下。

〔附錄〕或曰。痰豈能痛。曰。痰因氣滯而聚。既聚則礙其路道不得運。故作痛也。諸痛不可用參。芪。白朮。蓋補其氣。氣旺不通而痛愈甚。白芍藥。只治血虛腹痛。諸痛證不可用。以酸收斂。臍下忽大痛。人中黑色者。多死。

○絞腸沙作痛。以樟木煎湯大吐。或白礬調湯吐之。鹽湯亦可探吐。宜刺委中出血。腹痛須用芍藥。惡寒而痛。加桂。惡熱而腹痛者。亦加黃柏。凡腹痛以手重按者。屬虛。宜參。朮。姜。桂之屬。凡腹痛以手不可按者。屬實。宜大黃。芒硝下之。凡肥人腹痛者。屬氣虛兼濕痰。宜參。二朮。半夏。如感寒而腹痛。宜姜。桂。嘔者。丁香。如傷暑而腹痛。宜玉龍丸。如飲食過傷而痛者。宜木香。檳榔丸下之。如稟受弱。飲食過傷而腹痛者。常補脾胃而消導。宜參。朮。山查。麴孽。枳實。木香。如癱撲損傷而腹痛者。乃是瘀血。宜桃仁承氣湯。加當歸。蘇木。紅花。入酒。童子便煎服下之。有全不思食。其人本體素弱而腹冷痛者。以養胃湯。仍加桂。茱萸。各半錢。木香三分。又或理中湯。建中湯。皆可用。內加吳茱萸。良。

【附方】

玉龍丸 又名黃龍丸 見中暑。

木香檳榔丸 見痢類。

桃仁承氣湯 見吐血類。

養胃湯 見瘧類。

理中湯 見中寒類。

小建中湯

芍藥三兩。

甘草一兩。

生姜一兩半。

大棗六箇。

桂枝去皮一兩半。

膠飴半斤。舊有微澹或嘔者去膠。

右剉。每服五錢。水盞半。姜三片。大棗一箇。煎八分。去滓。下飴膠兩匙許。再煎化。溫服。

○腹中窄狹。須用蒼朮。若肥人自覺腹中窄狹。乃是濕痰流灌臟腑。不升降。燥飲用蒼朮。行氣用香附。

如瘦人自覺腹中窄狹。乃是熱氣薰蒸臟腑。宜黃連、蒼朮。

腰痛七十三 附腎著

○腰痛主濕熱。腎虛。瘀血。挫閃。有痰積。脈大者腎虛。杜仲、龜板、黃柏、知母、枸杞、五味之類爲

末。猪脊髓丸服。脈澁者瘀血。用補陰丸加桃仁、紅花。脈緩者濕熱。蒼朮、杜仲、黃柏、川芎之類。痰積

作痛者。二陳加南星、半夏。腰曲不能伸者。針人中。凡諸痛皆屬火。寒涼藥不可峻用。必用溫散之藥。

諸痛不可用參。補氣則疼愈甚。人有痛。面上忽見紅點者。多死。

戴云濕熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是也腎虛者疼之不已者是也瘀血者日輕夜重者是也
【入方】 治濕痰腰痛大便泄。

龜板一兩炙。

蒼朮

椿皮

滑石半兩。

白芍酒炒。

香附各四錢。

右為末糊丸如內傷白朮山查湯下。

又方 治腰腿濕痛。

龜板酒炙。

黃柏酒炙。

蒼朮

蒼耳

威靈仙酒浸各一兩。

扁柏半兩。

右為末酒糊丸每用黑豆汁煎四物湯加陳皮甘草生姜煎湯下。

久腰痛必用官桂以開之方止腹

脇痛亦可。

又方

龜板酒炙一兩半。

炒柏

白芍一兩。

陳皮

威靈仙

知母

蒼朮

蒼耳

右為末調服。

又方

龜板酒炙半兩

酒炒柏四錢

青皮三錢

生甘草一錢半

右爲末。姜一大片。同前藥末一錢。研勻。以蒼耳汁盪起煎。令沸服之。

摩腰膏 治老人虛人腰痛。并婦人白帶。

附子尖

烏頭尖

南星各二錢半

雄黃一錢

樟腦

丁香

乾姜

吳茱萸各一錢半

朱砂一錢

麝香五粒大者

右爲末。蜜丸如龍眼大。每用一丸。姜汁化開如粥厚。火上頓熱。置掌中。摩腰上。候藥盡粘腰上。烘綿衣包縛定。隨即覺熱如火。日易一次。

〔附錄〕腰者。腎之外候。一身所恃以轉移闔闢者也。蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊。腎氣一虛。凡衝寒受濕。傷冷蓄熱。血滯氣滯。水積墮傷。與失志作勞。種種腰疼。疊見而層出矣。脈若弦而沉者爲虛。沉者爲滯。滯者瘀。血緩者爲濕。滑與伏者是痰。

○氣痛。一身腔子盡痛。皆用少許木香於藥內行氣。若寒濕腰痛。見熱則減。見寒則增。宜五積散加吳茱萸半錢。杜仲一錢。若濕腰痛。如坐水中。或爲風濕雨露所著。濕流入腎經。以致腰痛。宜滲濕湯不効。宜腎著湯。腎虛腰痛。轉側不能。以大建中湯。加川椒十粒。仍以大茴香鹽炒爲末。破開猪腰子。作薄片。勿令斷。層層散藥末。水紙裏煨熟。細嚼酒喫下。閃挫腰痛。宜復元通氣散。酒調服。或五積散加牽

牛頭末一錢。或桃仁七枚。

【附方】

青娥丸。治腎虛腰痛。益精助陽。

破故紙四兩。炒。

杜仲四兩。炒。去絲。

生薑二兩。半炒。乾。

右爲末。用胡桃肉三十箇。研膏入蜜。丸桐子大。每服五十丸。鹽酒下。

獨活寄生湯。治腎氣虛弱。爲風濕所乘。流注腰膝。或攀拳掣痛。不得屈伸。或緩弱冷痺。行步無力。

獨活一兩。

桑寄生如無。以續斷代之。

細辛

牛膝

秦艽

茯苓

白芍

桂心

川芎

防風

人參

熟苳

當歸

杜仲炒。

甘草炙。各二兩。

右剉。每服三錢。水煎。空心服。下利者去地黃。血滯於下。委中穴刺出血。妙。仍灸腎俞。崑崙。尤佳。

治腰疼

黑丑四兩。牛生半炒。

右研細。取頭末水丸。桐子大。硫黃爲衣。每服三十丸。空心鹽酒送下。四服卽止。

補陰丸。見諸虛類。

五積散 見脚氣類。

大建中湯 見斑疹類。

復元通氣散 見氣類。

○腎著爲病。其體重。腰冷如冰。飲食如故。腹重如物在腰。治宜流濕。兼用溫暖之藥以散之。
腎著湯 治腎虛傷濕。身重腰冷。如坐水中。不渴。小便自利。

乾姜炮。

茯苓各四兩。

甘草炙。

白朮各二兩。

右咬咀。每服五錢。水煎。空心服。

滲濕湯 治寒濕所傷。身體重著。如坐水中。

蒼朮

白朮

甘草炙各一兩。

茯苓

乾姜炮各一兩。

橘紅

丁香各二錢半。

右每服五錢。水一鍾。生姜三片。棗一枚。煎服。

疝痛七十四 附木腎 腎囊濕瘡

○疝痛。濕熱痰積流下。作病。大概因寒鬱而作。卽是痰飲食積并死血。專主肝經。與腎經絕無相干。大不宜下。痛甚者不宜參朮。癩濕多。疝氣宜灸大敦穴。在足大指爪甲後一韭葉聚毛間。是穴。食積與死血成痛者。梔子。桃仁。山查。枳子。一作枳實。吳茱萸。並炒。以生姜汁順流水煎湯調服。一方加茴香。

附子。却有水氣而腫痛者。又有挾虛者。常用參朮爲君。佐以疎導之藥。其脈沉緊。豁大者是。按之不定者。屬虛。必用桂枝、山梔炒、烏頭細切炒。右爲末。姜汁糊丸。每服三四十丸。姜湯下。大能劫痛。戴云。疝本屬厥陰肝之一經。余常見俗說小腸膀胱下部氣者。皆妄言也。

【入方】 治諸疝。定痛速効。

枳實十五片。一作橘核。

山梔炒。

山查炒。

吳茱萸炒。各等分。

濕勝加荔枝核炮。

右爲末。酒糊丸服。或爲末。生姜水煎服。或長流水調下。一二錢空心。

守効丸 治癩之要藥。不痛者。

蒼朮

南星

白芷散水

山查各一兩

川芎

枳核又云枳實炒

半夏

秋冬加吳茱萸。衣鉢有山梔。

右爲末。神麩糊丸服。又云。有熱加山梔一兩。堅硬加朴硝半兩。又或加青皮。荔枝核。

又方 治諸疝。發時服。

海石

香附

右爲末。生姜汁調下。亦治心痛。

又方 治陽明受濕熱傳入太陽惡寒發熱小腹連毛際間悶痛不可忍。

山梔炒

桃仁炒

枳子炒

山查

右各等分研入姜汁用順流水盪起同煎沸熱服一方加茱萸。

橘核散

橘核

桃仁

梔子

川烏細切炒

吳茱萸

右研煎服。橘核散單止痛。此蓋濕熱因寒鬱而發用梔子仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱。況二藥皆

下焦之藥而烏頭又爲梔子所引其性急速不容胃中留也。

又方 治疝劫藥。

用烏頭細切炒梔子仁炒等分爲末或加或減白湯丸。

又方 治疝。

枇杷葉

野紫蘇葉

椒葉

水晶葡萄葉

右以水煎熏洗。

腎氣方

茴香

破故紙

吳茱萸鹽炒各五錢

胡蘆巴七錢半

木香二錢半

右爲末。蘿蔔搗汁丸。鹽湯下。

積疝方

山查炒一兩

茴香炒

柴胡炒三錢

牡丹皮一錢

右爲末。酒糊丸。如桐子大。服五六十丸。鹽湯下。

○疝病黃病久者。皆好倒倉。

又方 治疝痛

山查炒四兩

枳實炒

茴香炒

山梔炒各二兩

柴胡

牡丹皮

桃仁炒

八角茴香炒一兩

吳茱萸炒半兩

右爲末。酒糊丸。桐子大。服五十丸。空心鹽湯下。

又方 治疝作痛

蒼朮鹽炒

香附鹽炒

黃柏酒炒爲君

青皮

玄胡索

益智

桃仁爲臣

茴香佐

附子鹽炒。

甘草爲使。

右爲末。作湯服後。一痛過。更不再作矣。

又方 治癩疔

南星

山查

蒼朮二兩

白芷

半夏

枳核

神麩一兩

海藻

昆布半兩

玄明粉

茱萸二錢

右爲末。酒糊丸。

一人疝痛作。腹內塊痛止。疝痛止。塊痛作。

三稜

莪朮醋煮

炒麩

姜黃

南星各一兩

山查二兩

木香

沉香

香附各三錢

黃連用茱萸炒去茱萸用五錢淨

蘿蔔子

桃仁

山梔

枳核炒各半兩

右爲末。姜汁浸。蒸餅爲丸。

○予嘗治一人。病後飲水。患左丸痛甚。灸大敦穴。適有摩腰膏內用烏附、丁香、麝香。將與摩其囊上。橫骨端。火溫帛覆之。痛即止。一宿腫亦消。予舊有柑橘積。後因山行饑甚。遇橘芋食之。橘動舊積。芋復滯氣。

卽時右丸腫大寒熱先服調胃劑一二貼次早注神思氣至下焦嘔逆覺積動吐復吐後和胃氣疎通經絡而愈。

〔附錄〕木腎者心火下降則腎水不患其不溫真陽下行則腎氣不患其不和溫溫其和安有所謂木強者哉夫惟嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作痛頑癩結硬勢所必至矣不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪邪氣內消榮衛流轉益如寒谷回春蓋有不疾而速不行而至者矣。

【入方】 治木腎。

楮樹葉又云楊樹雄者晒乾爲末酒糊丸桐子大空心鹽湯下五十丸。

又方 治木腎不痛。

枸杞子

南星

半夏

黃柏酒炒

蒼朮鹽炒

山查

白芷

神麴炒

滑石炒

昆布

吳茱萸

右爲末酒糊丸桐子大空心鹽湯下七十丸。

治小腸氣又木腎偏墜。

黑牽牛一斤用豬尿胞裝滿以線縛定口子好酒米醋各一椀於砂鍋內煮乾爲度取出黑牽牛用

腎囊濕瘡
青紅娘子各十九箇。於鐵鍋內炒燥。去青紅娘子。將牽牛碾取頭末四兩。另入猪苓、澤瀉、細末各二兩。醋糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心鹽酒送下。不可多服。多服令人頭眩。如頭眩。可服黑錫丹。

蜜陀僧

乾姜

滑石

右爲末。擦上。

又方 先用吳茱萸煎湯洗。

吳茱萸半兩

寒水石三錢

黃柏二錢

樟腦半兩

蛇牀子半兩

輕粉十盞

白礬三錢

硫黃二錢

檳榔三錢

白芷三錢

右爲末。麻油調搽。

又方 治腎上風濕瘡及兩腿。

全蝎一錢

檳榔一錢

蛇牀子一錢

硫黃一錢

右四味。研如細末。用麻油調入手心。擦熱吸三口。用手抱囊一頃。次擦藥兩腿上。

耳聾七十五

○耳聾皆屬於熱。少陽厥陰熱多。當用開痰、散風熱、通聖散、滾痰丸之類。大病後耳聾。須用四物湯。

降火。陰虛火動耳聾者亦用四物湯。

○因鬱而聾者以通聖散內大黃酒煨再用酒炒二次後入諸藥通用酒炒。耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星桔梗青皮荆芥不愈用四物湯妙。耳鳴必用龍會丸食後服。氣實人檳榔丸或神芎丸下之。聾病必用龍會丸四物湯養陰。濕痰者神芎丸檳榔丸。耳濕腫痛涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥羌活服。腦多射少濕加枯礬吹。耳內閨閨然亦是陰虛。戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也。

【入方】

草麻子四十九粒

棗肉十箇

右入人乳汁搗成膏石上略晒乾便丸如指大綿裹塞於耳中。

又方

鼠膽汁滴入耳中尤妙。

又方

將龜放漆卓上尿出用綿漬之捏入青葱管中滴入耳中。

〔附錄〕耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通乎耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血風邪襲虛使精脫腎憊則耳轉而聾又有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞損而聾者蓋

十二經脈上絡於耳。其陰陽諸經適有交并。則臟氣逆而爲厥。厥氣搏入於耳。是謂厥聾。必有眩暈之證。耳者。宗脈之所附。脈虛而風邪乘之。風入於耳之脈。使經氣痞而不宣。是謂風聾。必有頭痛之證。勞役傷於血氣。淫慾耗其精元。瘦悴力疲。昏昏曠曠。是爲勞聾。有能將息得所。血氣和平。則其聾暫輕。又有耳觸風邪。與氣相搏。其聲嘈嘈。眼見光。爲之虛聾。熱氣乘虛隨脈入耳。聚熱不散。濃汁出。爲之膿耳。人耳間有津液。輕則不能爲害。若風熱搏之。津液結韌成核。塞耳。亦令暴聾。爲之聤耳。前是數者。腎脈可推。風則浮而盛。熱則洪而實。虛則濇而濡。風爲之疎散。熱爲之清利。虛爲之調養。邪氣屏退。然後以通耳調氣安腎之劑主之。於此得耳中三昧。

【附方】

和劑流氣飲 治厥聾。

方見氣類內。加菖蒲、生姜、葱同煎服。治聾皆當調氣。

桂星散 治風虛耳聾。

辣桂

川芎

當歸

細辛

石菖蒲

木通

白蒺藜炒

木香

麻黃去節

甘草炙各二錢半

南星煨

白芷梢各四錢

紫蘇一錢

右剉。每服二錢。水煎。葱二莖。食後服。

地黃丸 治勞損耳聾。

熟苧

當歸

川芎

辣桂

兔絲子

川椒炒

故紙炒

白蒺藜炒

胡蘆巴炒

杜仲炒

白芷

石菖蒲各一錢半

磁石火燒醋淬七次。研水飛一錢二分半。

右爲末。煉蜜丸如桐子大。服五十丸。葱白溫酒下。

益智散 治腎虛耳聾。

磁石制如前

巴戟去心

川椒各一兩炒

沉香

石菖蒲各半兩

右爲末。每服二錢。用猪腎一枚細切。和以葱白少鹽。并藥濕紙十重裹煨令熟。空心嚼。以酒送下。

芎芷散 治風入耳虛鳴。

白芷

石菖蒲炒

蒼朮

陳皮

細辛

厚朴

半夏

桂

木通

紫蘇莖葉

甘草炙各二錢半

川芎五錢

右剉散。每服三錢。姜三片。葱二枝。水煎。食後臨臥服。

耳鳴方

草烏燒

石菖蒲

右等分爲末。用綿裹塞耳。一日三度。

耳鳴暴聾方

川椒

石菖蒲

松脂各二錢半

山豆肉半錢

右爲末。溶蠟丸如棗核大。塞入耳。

蔓荊子散 治內熱耳出濃汁。

甘草炙

川升麻

木通

赤芍

桑白皮炒

麥門冬去心

生芩

前胡

甘菊

赤茯苓

蔓荊子

右等分。每服三錢。姜三片。棗一枚。煎。食後溫服。

又方 治耳內出膿。

真龍骨

枯白礬

赤小豆

黃丹

烏賊骨

麝脂一錢一分

右爲末摻耳。

又方 治耳內膿出或黃汁。

石膏新瓦上煨。

明礬枯。

黃丹炒。

真蚌粉。

龍骨各等分。

麝香少許。

右爲末綿纏竹筴拭耳換綿蘸藥入耳。

聾耳方 治風熱搏之津液結鞣成核塞耳。

生豬脂。

地龍。

釜下墨等分。

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿裹入耳令潤卽挑出。

耳爛 貝母爲末乾糝。

桃花散 治耳中出膿。

枯礬。

乾臙脂各一錢。

麝香一字。

右爲末綿杖子蘸藥燃之。

通聖散 見斑疹類。

懷痰丸。

大黃半斤。

黃芩半斤。

青礬石二兩。

沉香五錢。

右爲末。水丸。桐子大。

龍會丸 見脇痛類。

檳榔丸 見痢類。

神芎丸 見痛風類。

涼膈散 見自汗類。

鼻病七十六

○酒渣鼻。是血熱入肺。治法。用四物湯加陳皮。又云。柏皮。紅花。酒炒黃芩煎。入好酒數滴。就調炒五靈脂末。同服。格致論中。於上藥有茯苓。生姜。氣弱者加黃芪。

【入方】

用桐油入黃連末。以天吊藤燒灰。熱傳之。一云用桐油入天吊藤燒。油熟。調黃連末拌傳之。

又方

用山梔爲末。蜜蠟丸。彈子大。空心嚼一丸。白湯送下。

治鼻中癰肉。胃中有食積。熱痰流注。治本當消食積。

蝴蝶礬二錢。

細辛一錢。

白芷五錢。

右爲末。內鼻中。

治鼻淵

南星

半夏

蒼朮

白芷

神麴

酒芩

辛夷

荊芥

右水煎食後服。

〔附錄〕酒查者此皆壅熱所致。夫肺氣通於鼻。清氣出入之道路。或因飲酒。氣血壅滯。上焦生熱。邪熱之氣。留伏不散。則為之鼻瘡矣。又有肺風不能飲而自生者。非盡因酒瘡耳。宜一味浙二泔。食後用冷飲。外用硫黃入大菜頭內。煨碾塗之。若鼻尖微赤及鼻中生瘡者。辛夷碾末入腦射少許。綿裏納之。或以枇杷葉拭去毛。剉煎湯候冷。調消風散食後服。一方以白鹽常擦妙。又以牛馬耳垢傅妙。

【附方】

白龍丸末。逐日洗面。如澡豆法。更罨少時。方以湯洗法。食後常服龍虎丹一貼。方見和劑風門。

白龍丸

川芎

藁本

細辛

白芷

甘草各等分。

右為細末。每四兩入煨石膏末一斤。水丸。

又方。黃柏、苦參、檳榔等為末。付以豬脂調。尤妙。

又方 以青黛、槐花、杏仁研付之。

又方 以杏仁研乳汁付之。

鉛紅散 治風熱上攻、面鼻紫赤刺癢、俗呼肺風。

舶上硫黃

白礬 各半兩

右爲末。黃丹少許。染與病人面色同。每上半錢。津液塗之。臨臥再塗。兼服升麻湯下瀉青丸服之。除其根本也。一方見癩風類。

輕黃散 治鼻中瘰肉。

輕粉一錢

雌黃半兩

杏仁一錢 湯浸去皮尖雙仁

麝香少許

右於乳鉢內先研杏仁如泥。餘藥同研細勻。磁合蓋定。每有患者。不問深淺。夜臥用筋點糝米許。絳鼻中。隔夜一次。半月効。

消風散 見中寒類。

眼目七十七

○眼黑睛有翳。皆用黃柏、知母。眼睛痛。知母、黃柏瀉腎火。當歸養陰水。眼中風淚出。食後吞龍會丸數粒。日三次。冬月眼暴發痛。亦當解散。不宜用涼藥。

【入方】

神効七寶膏 治暴發眼熱壅有翳膜者。

麩仁去油心膜

白鵬砂

朱砂

片腦

蜜調成膏點眼。

爛眶眼

薄荷

荊芥

細辛

右爲粗末。如燒香狀燒之。以青碗塗蜜少許於內。覆香煙上取煙。盡之後以小青礮收煙藏之。凡眼有風熱多淚者皆可點。此是陽明經有風熱所致。

生熟地黃丸 治血虛眼。

方見眉眶痛類。

龍會丸 見脇痛類。

一人病眼。至春夏使當作鬱治。

黃芩酒浸。

南星姜制。

香附童便浸。

蒼朮童便浸各二兩。

川芎便浸兩半。

山梔炒一兩。

草龍膽酒浸。

陳皮

連翹

蘿蔔子蒸。

青黛各半兩。

柴胡三錢。

右爲末神麪糊丸。

【附方】

瀉熱黃連湯 治眼暴發赤腫疼痛。

黃連酒炒。

黃芩酒炒。

草龍膽

生芩各一兩。

升麻半兩。

柴胡一兩。

右咬咀每服四錢水煎日午前飯後熱服。

上清散 治上熱鼻壅塞頭目不清利。

川芎

薄荷

荊芥穗各半兩。

益硝

石膏

桔梗各一兩。

右爲末每服一字口噙水鼻內搖之神効加龍腦三分尤妙。

東垣熟乾地黄丸

人參二錢。

炙甘草

天門冬去心。

地骨皮

五味子

枳殼炒。

黃連各三錢。

歸身酒洗焙。

黃芩各半兩。

生芩洗酒七錢半。

柴胡八錢。

熟乾地黄一兩。

右爲末煉蜜丸桐子大每服百丸茶清下食後日二服。

口齒七十八

○口瘡服涼藥不愈者。因中焦土虛。且不能食。相火衝上。無制。用理中湯。人參、白朮、甘草、補土之虛。乾姜散火之標。甚則加附子。或噙官桂亦妙。一方。生白礬爲末貼之。極効。或噙良久。以水嗽之。再噙。一方。治口瘡甚者。用要瓜漿水。徐徐飲之。冬月無此。用西瓜皮燒灰傅之。又方。黃連好酒煮之。呷下立愈。又方。遠志醋研。鵝毛掃患處。出涎。

【入方】

細辛

黃柏炒一云黃連等分。

右爲末貼之。或摻舌上吐涎水。再傅。須旋合之。

治滿口白爛

葦撥一兩爲末。

厚柏一兩。

右用柏火炙爲末。米醋煎。數沸後。調上藥。漱涎。再用白湯漱口。卽愈。重者三次。舌上生瘡。用白荷花瓣貼之。

〔附錄〕口舌生瘡。皆上焦熱壅所致。宜如聖湯。或柑桔湯加黃芩一錢。仍用柳花散摻之。

【附方】

黑參丸 治口舌生瘡久不愈。

黑參

天門冬

麥門冬去心各炒一兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每用一丸綿裹噙化嚥津

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索一兩

黃柏

黃連各半兩

密陀僧二錢

青黛二錢

右爲末傅貼口內有津卽吐

增損如聖湯

桔梗二兩

甘草炙一兩半

防風半兩

枳殼湯浸去穢二錢半

右爲末每服三錢水煎食後服

柑桔湯

桔梗二兩

甘草一兩

右水煎食後溫服

理中湯 見中寒類

○牙痛梧桐淚爲末少加麝香擦之牙大痛必用胡椒、萹撥能散其中浮熱間以升麻、寒水石佐以辛涼荆芥、薄荷、細辛之類又方用清涼藥使痛不開必須從治苾撥、川芎、薄荷、荆芥、細辛、樟腦、青鹽

治牙痛甚者

防風

羌活

青鹽入肉

細辛

華撥

川椒

右爲末擦噙。

又方

南星爲末霜梅五箇取其引涎以荆芥薄荷散風熱青鹽入腎入骨擦噙。

又方

蒲公英燒灰

香附末

白芷

青鹽

右爲末擦噙。

治陰虛牙出鮮血氣鬱

用四物湯加牛膝香附生甘草側柏。

蛀牙

蘆薈白膠香寒蛀孔中。

陽明熱而牙痛

大黃香附各燒灰存性爲末入青鹽少許不時擦牙上。

固齒

用羊脛骨燒灰存性二錢。當歸、白芷、豬牙皂角、青鹽各一錢爲末。擦牙上。

刷牙藥

燒白羊骨灰一兩。升麻一兩。黃連半錢。擦用。

破滯氣七十九 附氣刺痛 附諸氣

○破滯氣。須用枳殼。高者用之。夫枳殼者。損胸中至高之氣。二三服而已。又云。滯氣用青皮。勿多用。多則瀉真氣。如實熱在內。相火上冲。有如氣滯。宜知母、黃柏、黃連、黃芩。如陰虛氣滯者。宜四物加玄參、黃柏以補血。

○氣刺痛。用枳殼。看何部分。以引經藥導使之行。則可。若稟受素壯而氣刺痛。宜枳殼、烏藥。若肥白氣虛之人。氣刺痛者。宜參、朮、加木香。若因事氣鬱不舒暢而氣刺痛。當用木香。

〔附錄〕充按丹溪無治氣條。後人增入。姑存以便閱者。

○人以氣爲主。一息不運。則機緘窮。一毫不續。則穹壤判。陰陽之所以升降者。氣也。血脈之所以流行者。亦氣也。榮衛之所以運轉者。此氣也。五臟六腑之所以相養相生者。亦此氣也。盛則盈。衰則虛。順則平。逆則病。氣也者。獨非人身之根本乎。人有七情。病生七氣。七氣者。寒、熱、怒、悲、喜、憂、愁。或以爲喜、怒、憂、思、悲、驚、恐。皆通也。然則均調是氣。將何先焉。曰。氣結則生痰。痰盛則氣愈結。故調氣必先豁痰。如七氣

湯以半夏爲主。而官桂佐之。蓋良法也。況夫冷則生氣。調氣須用豁痰。亦不可無溫中之劑。其間用桂。又所以溫其中也。不然七情相干。痰涎凝結。如絮如膜。甚如梅核。窒碍於咽喉之間。咯不去。嚥不下。或中艱食。或上氣喘急。曰氣隔。曰氣滯。曰氣秘。曰氣中。以至五積六聚。疝癰癥瘕。心腹塊痛。發則欲絕。殆無往而不至矣。怒則氣上。喜則氣緩。驚則氣亂。恐則氣下。勞則氣耗。悲則氣消。思則氣結。此七者皆能致疾。寒氣鬱於中。作痛者。以七氣湯。鹽煎散。東垣升陽順氣湯。逆者抑之。以木香流氣飲。降氣湯。有熱者須加涼劑抑之。所謂從陰引陽也。

【附方】

和劑七氣湯 七氣所傷。痰涎結聚。心腹刺痛。不能飲食。

半夏五兩

人參

桂各一兩

甘草炙牛兩

右每服三錢。水煎。姜五片。棗一枚。

三因七氣湯 治如前。

半夏五兩

茯苓四兩

厚朴三兩

紫蘇二兩

右剉。以水煎。姜七片。棗二箇。

指迷七氣湯 治七情相干。陰陽不得升降。氣道壅滯。攻衝作疼。

青皮

陳皮

桔梗

莪朮

桂

藿香

益智各一兩

香附一兩半

甘草炙七錢半

半夏七錢半

右剉每服三錢水煎姜三片棗一箇

加減七氣湯

莪朮炮

三稜炮

青皮

陳皮

香附

藿香

益智

甘草炙

桔梗

官桂

木香

檳榔

枳殼炒

白果

蘿蔔子炒

紫蘇

右以水煎姜三片

流氣飲子 治男婦五臟不和三焦氣壅心胸悶痞咽塞不通腹脇膨脹脚氣腫痛肩背走注疼痛嘔吐

不食氣喘咳嗽痰盛面目浮腫及四肢大便秘澀小便不通

木香二錢半

檳榔

青皮

半夏

茯苓

枳殼

桔梗

當歸

芍藥

防風

川芎

紫蘇

枳實

黃芪

烏藥

腹皮

甘草炙

陳皮七錢半

右剉每服五錢水煎姜三片棗一枚

和劑流氣飲 調榮衛利三焦行痞滯消腫脹

陳皮

青皮

紫蘇

厚朴姜制

香附炒

甘草炙各四兩

木通二兩

腹皮

丁皮

檳榔

桂

木香

草果

莪朮炮

藿香各一兩半

麥門冬去心

人參

白朮

木瓜

赤茯苓

石菖蒲

白芷

半夏

枳殼炒各一兩

右每服三錢水煎姜四片棗二枚一方有大黃無藿香

大七氣湯 治積聚隨氣上下發作有時心腹疼痛大小便不利

三稜炮

莪朮炮

青皮炒

陳皮

藿香

桔梗

肉桂

益智各一兩半

甘草炙七錢半

香附炒一兩半

右剉以水煎姜五片

分心氣飲 治男婦一切氣不和。心胸痞悶。脇肋脹滿。噎塞不通。噎氣吞酸。嘔噦惡心。頭目昏眩。四肢倦怠。面色痿黃。口苦舌乾。飲食減少。日漸羸瘦。大腸虛秘。並皆服之。

紫蘇 莖葉俱用 四兩 羌活

半夏

肉桂

青皮

陳皮

腹皮

桑白皮炒

木通

芍藥

甘草炙

赤茯苓各一兩

右剉。每服三錢。水煎。生姜三片。棗一枚。燈心十莖。若氣秘。加枳殼。蘿蔔子。皂角子各半錢。咳嗽不利。加入人參一錢。五味子七粒。桔梗一錢。氣滯腰疼。加木瓜二片。枳殼一錢。水氣。面目浮腫。加車前。麥門冬。薤蕪子。澤瀉。猪苓。

分心氣飲 治一切氣留滯於胸膈之間。不能流暢。以致痞悶。噎塞不通。大便虛秘。

木香

丁皮各二錢

人參

麥門冬去心

腹皮

檳榔

桑白皮

草果

桔梗

厚朴

白朮各半兩

香附

藿香

陳皮

紫蘇各一兩半

甘草炙一兩

右剉。每服姜三片。棗一枚。水煎服。

分心氣飲真方 治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯。通利大小便。

紫蘇莖葉三兩

半夏

枳殼各一兩半

青皮

橘紅

腹皮

桑白皮炒

木通

赤茯苓

木香

檳榔

義朮煨

麥門冬去心

桔梗

桂

香附

藿香各一兩

甘草炙一兩三錢

右剉每服三錢水煎入姜三片棗二枚燈心十莖

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛頭目腰痛大便風秘冷熱氣瀉肢體浮腫

紫蘇子

半夏五兩

當歸

甘草炙

前胡

厚朴各二兩

官桂

陳皮三兩

右剉姜三片棗一枚水煎服

三和散 和暢三焦治痞脹浮腫腸胃澀秘

腹皮炒

紫蘇莖葉

沉香

木瓜

羌活各二兩

白朮

川芎

木香

甘草炒

陳皮

檳榔濕紙煨各七錢半

右每服三錢水煎服加茯苓利水

蟠葱散 治男婦脾胃虛冷。氣滯不行。攻刺心腹。痛連胸脇。膀胱小腸腎氣。及婦人血氣刺痛。

玄胡索

肉桂

乾姜炮各一兩

蒼朮

甘草炙各八兩

砂仁

丁皮

檳榔各四兩

蓬朮

三稜

茯苓

青皮各六兩

右每服二錢。水煎。入連莖葱白一莖。空心溫服。

治氣六合湯

當歸

芍藥

川芎

地黃

木香

檳榔

右以水煎服。

分氣紫蘇飲 治脾胃不和。胸膈噎塞。腹脇疼痛。氣促喘急。心下脹悶。

枳殼

茯苓

腹皮

陳皮

甘草

蘇子

草果

白朮

當歸

紫蘇

半夏

桑皮

五味子

右剉。姜三片。水煎。

木香化滯散

木香

白朮

陳皮

桔梗

腹皮

茯苓

人參

砂仁

青皮

藿香

姜黃

檀香

白果

聚香飲子

治七情所傷。遂成七疝。心脇引痛。不可俛仰。

檀香

木香

丁香

乳香

沉香

藿香各一兩

玄胡索

川烏炮

桔梗炒

桂心

甘草炙

片子姜黃各十兩

右姜三片。棗一枚。煎服。

沉香降氣湯

治三焦痞滿。滯氣不宣。心腹痛滿。嘔吐痰沫。五噎五膈。

沉香

木香

丁香

藿香

人參

甘草

白朮各一兩

肉豆蔻

桂花

檳榔

陳皮

砂仁

川姜炮

枳實炒

白檀各二兩

白茯苓

青皮

白豆蔻

右每服三錢。水煎。入鹽少許。

烏藥平氣散 治脚氣上攻。頭目昏眩。脚膝痠疼。行步艱苦。諸氣不和。喘滿迫促。

人參

白朮

茯苓

甘草

天台烏藥

當歸

白芷

川芎

麻黃

木瓜

五味子

右姜三片。水煎服。

復元通氣散 治氣不宣流。或成疔癰。并閃挫腰痛。諸氣滯閉。耳聾耳疼。止痛活血。

茴香

穿山甲 蛤粉炒各二兩

白牽牛炒

玄胡索

甘草炒

陳皮各一兩

木香一兩半

右爲末。每服一錢。熱酒調服。

手拈散 治心脾氣痛。

草果

沒藥

玄胡

五靈脂

右爲末。酒調二錢。

枳殼煮散 治悲哀傷肝氣。痛引兩脇。

桔梗

甘草

葛根

右用水煎服。

鹽煎散 治男子婦人一切冷氣攻衝胸脇刺痛不已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣痛。

羌活

砂仁

甘草炙

茯苓

草果

肉豆蔻煨

川芎

茴香

藜澄茄

麥芽炒

檳榔

良姜油炒

枳殼炒

厚朴

陳皮

蒼朮等分

右用水煎加鹽少許。

東垣升陽順氣湯

升麻

柴胡

陳皮各一錢

半夏

人參各三錢

黃芪四錢

甘草

柏皮各五分

當歸一錢

草豆蔻一錢

神麴炒一錢半

右咬咀每半兩入姜煎。

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促心下脹滿嘔逆不食。

五味子

桑白皮

茯苓

甘草炙

草果

腹皮

陳皮

桔梗各一斤

紫蘇十五兩

右剉。每服四錢。水煎。姜三片。入鹽少許。

雞舌香散 治臟腑虛弱。陰陽不和。中脘氣滯。停積痰飲。胸膈脹悶。心脾引痛。

台烏

香附

良姜

芍藥

甘草

肉桂

右以水煎服。

大玄胡湯

莢朮

三稜

當歸

芍藥

官桂

檳榔

厚朴

木香

玄胡

大黃

桔梗

川練子

川芎

甘草炙

黃芩

右以水煎服。

化氣散 治諸食積。并宿食不消。此劑至為穩當。

三稜

莪朮

青皮

陳皮

厚朴

神麴

麥芽

甘草

台烏

香附

右以水煎服。

東垣木香順氣散 治濁氣在上則生臌脹。

木香三分。

厚朴四分。

青皮

陳皮

益智

茯苓

澤瀉

生姜

吳茱萸

半夏各二分。

當歸五分。

升麻

柴胡一分。

草豆蔻三分。煨。

蒼朮三分。

右作一服。水煎。溫服。

勻氣散 治氣滯不勻。胸膈虛痞。宿食不消。心腹刺痛。脹滿噎塞。嘔吐惡心。調脾胃。進飲食。

生姜

沉香

丁香

檀香

木香各一兩。

藿香四兩。

甘草炙四兩。

砂仁二兩。

白果仁二兩。

右爲末。每服二錢。沸湯調下。或水煎服。

順氣木香散 治氣不升降胸膈痞悶時或引痛及酒食過傷噫氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛

砂仁

官桂

甘草炙

陳皮

厚朴

丁香

茴香

桔梗

蒼朮

木香

乾姜

良姜

右以水煎服。

快氣散 治一切氣心腹脹痛胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解

砂仁

甘草炙

香附

生姜

右為末鹽湯調下。

異香散 治腎氣不和腹脇脹滿飲食難化噫氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛

石蓮肉一兩

莪朮炮

益智

甘草炙

三稜各六兩

青皮

陳皮各三兩

厚朴二兩

右剉每服三錢水煎姜三片棗一枚入鹽一捻同煎服

化氣湯 治一切氣逆胸膈噎塞心脾卒痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣

沉香

胡椒各一兩

砂仁

桂心

木香各二兩

陳皮炒

乾姜炮

莪朮炮

青皮去穢炒

茴香炒

甘草

丁皮各四兩

右爲末。每服二錢。姜蘇鹽湯調下。婦人淡醋湯下。

降氣湯。治中脘不快。心腹脹滿。氣不升降。噎塞喘促。乾噦咳嗽。嗜臥減食。停積不消。專治脚氣上冲。肢體浮腫。有妨飲食。

紫蘇

厚朴

官桂

半夏

當歸

前胡

芫胡

甘草

姜

右以水煎服。

木香化滯湯。治因憂氣。食濕鹽麵結於中脘。腹皮底微痛。心下痞滿不食。

草豆蔻

甘草五錢炙

半夏一兩

當歸稍

枳實炒各二錢

紅花半兩

右每用五錢。水煎。姜三片。棗一箇。熱服。

附脾胃八十 附胃風

【附方】

調中益氣湯

升麻二分

黃芪一錢

甘草五分

蒼朮五分

木香二分

人參五分

柴胡五分

陳皮二分

加黃柏二分

水煎服

四君子湯 治脾胃不調不進飲食

人參

白朮

茯苓

甘草炙

右以水煎服

六君子湯 治脾胃不和。不進飲食。上燥下寒。服熱藥不得者。

人參

白朮

茯苓

甘草

砂仁

陳皮

又方加半夏

右以水煎。姜三片。棗一枚。

胃苓湯

甘草

茯苓

蒼朮

陳皮

白朮

官桂

澤瀉

豬苓

厚朴

右剉。每服五錢。水煎。姜五片。棗二枚。

參苓白朮散 治脾胃虛弱。飲食不進。或致嘔吐泄瀉。及大病後調助脾胃。

白扁豆一斤。炒。

白茯苓

山藥

人參

白朮各二斤。

蓮子

砂仁一斤。

甘草炙二斤。

薏苡

桔梗各一斤。炒。黃色。

右爲末。每服二錢。煎棗湯調下。

治中湯 治脾胃不和。嘔逆。霍亂。中滿。虛痞。或泄瀉。

人參

甘草炙。

乾姜炮。

白朮

青皮

陳皮等分。

右每服五錢。水煎。如嘔。加半夏等分。○加丁香。減半夏。名丁香溫中湯。

丁沉透膈湯 治脾胃不和。痰逆惡心。或時嘔吐。飲食不進。十膈五噎。

白朮二兩。

香附炒。

砂仁

人參各一兩。

丁香

麥芽

木香

肉豆蔻

白豆蔻

青皮各半兩。

沉香

厚朴

藿香

陳皮各七錢半。

甘草炙一兩。

半夏

神麩炒。

草果各二錢半。

右剉。每服四錢。水煎。姜三片。棗一箇。不拘時候。溫服。忌生冷瓜果。
五膈寬中散 治七情四氣。胸膈痞滿。停痰氣逆。遂成五膈。

青皮

陳皮

丁皮

厚朴

甘草炙

白果

香附

砂仁

木香

右以水煎。生姜三片。入鹽少許。

枳縮二陳湯 理脾胃。順氣寬膈。消痰飲。

砂仁

枳實

茯苓

半夏

陳皮

甘草炙

水煎。生姜五片。

八珍湯 和血氣。理脾胃。

當歸

赤芍

川芎

熟苳

人參

白茯苓

甘草

砂仁等分

右以水煎。姜三片。棗二枚。

凝神散 收斂胃氣。清涼肌表。

人參

白朮

茯苓

山藥各一兩

粳米

扁豆炒

知母

生芫

甘草炙牛兩

淡竹葉

地骨

麥門冬各二錢半

右水煎姜三片棗一枚

○胃風 此因初飲食訖乘風涼而致其證脹滿食飲不下形瘦腹大惡風頭多汗隔寒不通胃風湯正治然此亦看挾證加減脈右關弦而緩帶浮

胃風湯 見痢證類

瘦氣八十一 附結核

○瘦氣先須斷厚味

【入方】

海藻一兩

黃連二兩一云黃柏又云黃蘗

右爲末以少許置掌中時時舐之津嚥下如消三分之二止後服
○結核或在項在頸在臂在身如腫毒者多是濕痰流注作核不散

【入方】 治耳後項間各一塊

姜蚕炒

酒大黃

青黛

膽南星

右爲末。蜜丸。噉化。

又方 治項頸下生痰核。

二陳湯加大黃酒炒 連翹

桔梗

柴胡

右以水煎。食後服。

又方 治臂核作痛。

二陳湯加連翹 防風

川芎

皂角刺

酒黃芩 蒼朮

右以水煎服。

跌撲損傷八十二

○跌撲損傷。須用蘇木和血。黃連降火。白朮和中。童便煎炒。○在下者。可先須補接。後下瘀血。在上者。宜飲韭汁。或和粥喫。○切不可飲冷水。血見寒則凝。但一絲血入心。卽死。

【入方】 治癩撲傷損。

跌傷出血者。姜汁。香油。各四兩。酒調服之。

治癩傷骨折及血出者。

用活石。甘草。爲末。人參湯調服。次用生姜自然汁一盞。米醋一盞。獨核肥皂四箇敲破。按於姜汁米

醋中紗片濾過。去粗。入牛皮膠。煎成膏藥。貼之。遍身者皆可。

接骨散

沒藥

乳香各半兩

自然銅一兩煨淬

滑石二兩

龍骨三錢

赤石脂三錢

麝香一字另研

右爲末。好醋浸沒。煮多爲上。乾就炒燥爲度。臨睡服時。又麝香。抄以茶匙。留舌上。溫酒下。分上下食前後服。若骨已接尙痛。去龍骨。赤石脂而服。多儘好。極効。

○世以自然銅爲接骨藥。然此等方儘多。大抵在補氣。補血。補土。俗工惟在速効。以罔利。迎合病人之意。而銅非煨不可服。若新出火者。其火毒金毒相扇挾。香挾藥毒。雖有接傷之功。而燥散之禍。甚於刀劍。戒之。

又方

冬瓜皮

阿膠等分

右炒乾爲末。以酒調。飲醉爲度。

破傷風八十三

○破傷風多死。防風全蝎之類。非全蝎不開。十箇爲末。酒調。日三次。破傷風。血凝心。鴉翅燒灰存性。研細。酒調一錢。

【入方】破傷風發熱。

瓜蒌子九錢

滑石一錢半

南星

蒼朮

赤芍

陳皮一錢

黃連

炒柏

黃芩

白芷五分

甘草些少

右姜一片煎服。

【附方】

天麻丸 治破傷風神效。

天麻

川烏生去皮各三錢

草烏生

雄黃各一錢

右爲末酒糊丸梧子大每服十丸溫酒下無時。

元戎治破傷風欲死者。

川烏

南星

半夏並生

天麻去蘆等分

右爲細末每服一錢豆淋酒調下稍溫服次以酒三盞投之。

諸瘡痛八十四

附天泡瘡

凍瘡

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根稍用及引經藥則可。又云諸瘡以當歸黃連爲君連翹甘草黃芩爲佐。諸痛痒瘡瘍屬火若稟受壯盛宜四物加大承氣湯下之。若性急面黑瘦血

熱之人因瘡而痛宜四物加黃連、黃芩、大力子、甘草。在下焦者加黃柏。若肥胖之人生瘡而痛乃是濕熱。宜防風、羌活、荆芥、白芷、蒼朮、連翹。取其氣能勝濕。

○諸瘡藥 膿窠治熱燥濕爲主。用無名異、乾疥、開鬱爲主。用茱萸、虫瘡如癬狀、退熱殺虫爲主。蕪荑、黑狗脊、白礬、雄黃、硫黃、水銀、殺虫、樟腦、松香、頭上多加黃連、方解石、蛇牀、定痒殺虫、松皮炭、主膿腫多者。加白芷、開鬱、痛多加白芷、方解石、虫多加梨蘆、斑貓、痒多加枯礬、陰囊瘡加茱萸、濕多香油調、乾痒出血多加大黃、黃連、豬脂調、紅色加黃丹、青色加青黛、虫多加錫灰、蕪荑、檳榔。在上多服通聖散。在下多須用下、脚腫出血分濕熱用藥。

【入方】瘡有三種。膿泡瘡治熱爲主。

黃芩

黃連

大黃各三錢

蛇牀

寒水石三兩

黃丹半錢

白礬一錢

輕粉

白芷

無名異少許炒

木香少許痛者用

右爲末油調傅。

沙瘡

蕪荑二錢

剪草二錢

蛇牀三錢

白礬枯

吳茱萸

黃柏各一錢

蒼朮

厚朴

雄黃各五分

寒水石二錢

輕粉十貼

右爲末油調傳

疥瘡藥 春天發瘡疥開鬱爲主 不宜抓破傳

白礬二錢

吳茱萸二錢

樟腦半錢

輕粉十貼

寒水石二錢半

蛇牀三錢

黃柏

大黃

硫黃各一錢

檳榔一箇

又方

蕪荑

白礬枯

軟石膏

大黃

樟腦各半兩另入

管仲

蛇牀各一兩

硫黃

雄黃各二錢半

右爲末香油調須先洗瘡去痂傳之

一上散

雄黃三錢半

寒水石一兩

蛇牀

白膠香

黑狗脊各一兩

黃連五錢

硫黃三錢半

吳茱萸三錢

白礬枯五錢。

斑貓十四箇，去翅足。

右硫黃、雄黃、寒水石，另研如粉。次入斑貓和勻。蛇牀、狗脊等爲極細末同研勻。洗瘡，令湯透去痂。用臘猪油調，手心中擦熱，鼻中臭三二次，却擦上。一上卽愈。如痛甚，腫滿高起，加寒水石一倍。如不苦痒，只加狗脊。如微痒，只加蛇牀子。如瘡中有虫，加雄黃。如喜火炙，湯洗，加硫黃，口臭不止，亦可愈也。

【附方】

四物湯 見婦人類。

大承氣湯 見痢類。

郭氏升麻牛旁子散 治時毒瘡疹，脈浮紅，在表者瘡發於頭面胸膈之際。

升麻

牛旁子

甘草

桔梗

葛根

玄參

麻黃各一錢

連翹一錢

右咬咀，姜三片，水二盞，作一服。

升麻和氣飲 治瘡腫癰疥痒痛。

甘草

陳皮各一兩半

芍藥七錢半

大黃半兩，煨

乾葛

蒼朮

桔梗

升麻各一兩

當歸

半夏

茯苓

白芷各二錢

乾姜

枳殼各半錢

三因有厚朴半兩

右咬咀。每服一兩。水煎。

常歸飲子 治瘡疥。風癬。濕毒。燥痒瘡。

常歸

白芍

川芎

生芩

白蒺藜

防風

荆芥各一兩

何首烏

黃芪

甘草各半兩

右咬咀。每服一兩。水煎。或爲末。每服一二錢。亦得。

○天庖瘡 用防風通聖散末。及蚯蚓泥。略炒。蜜調傅。極妙。從肚皮上起者。是裏熱發於外也。還服通

聖散。見斑疹類。

○凍瘡 用煎熟桐油。調密陀僧末。傅。

○脚上爛瘡久不愈 先以豆腐漿水。洗三兩次。懸鈎柎葉。地暴柎葉搗細。入鹽些少。盪之。

