

增訂本草備要目錄

二卷

牡丹皮 續斷 骨碎補 益母草子 澤蘭蘭草 白薇 艾野艾

延胡索 紅花脂脂 茜草 紫草片 凌霄花 大小薊 三七又三

地榆 蒲黃 卷栢 蘭茹 菴藷子 鬱金 薑黃片子

菝葜 荆三稜 白茅根針 薤根 芋根皮 薔薇根營實

芭蕉根 大黃 黃芩 黃連 胡黃連 生參 知母

龍胆草 青黛 大青 牽牛 防己漢已 葶藶甜 甘遂

大戟 商陸 芫花 芫花 澤漆 常山蜀漆 藜蘆

木通 通草 澤瀉 車前子 薺草 瞿麥 扁蓄

三五青英草 卷二目錄

天仙藤 地膚子 葉 石華 瓦華 海金沙 茵陳 香薷膏 青蒿

附子 烏頭 天雄 烏附尖 側子 草烏頭 射 白附子 破故紙 肉蓯蓉 瑯陽

巴戟天 胡盧巴 仙茅 淫羊藿 蛇牀子 鬼絲子 覆盆子

茨棘子 沙苑 茨藜 刺疾 藜 使君子 益智子 砂仁 白芷 肉苁蓉

草薺 草香 附 木香 響寄 茴香 大小 八角 甘松香 山茱

良薑 組 葛 薤 藜蘆 煙草 金銀花 膏 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝

鶴虱 山慈根 牛蒡子 根 山慈菝 瀉瀉 貫眾 射干

續隨子 馬蘭子 根 葉 苧麻子 白頭翁 王瓜子 王不留行 冬葵子

子 蜀 白魚皮 草解 拔節 上茯苓 赤 白斂 赤斂 預知子 旱蓮草 膏

寄奴草 馬鞭草 殺精草 青箱子 芥門子 藜蘆 馬勃 木驚子

增訂本草備要卷之三

休甯汪 昂初菴著輯

弟汪 桓殿武泰訂

同鄭會慶寶寰同訂

草部

男汪 薑齋

姪汪 惟醜子錫

姪婿仇 漢天同較

牡丹皮 瀉伏火 而補血



辛甘微寒入手足少陰心厥陰肝 瀉血中伏火也

故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景腎

氣丸和血涼血而生血血熱則枯破積血積瘀不去用之涼則生破積血則新血不

生通經脈為吐衄必用之藥血屬陰本靜因相火治中風五勞驚癇

痿筋脈伸縮抽掣為瘰癧或手足抽掣口眼喎邪卒然眩仆吐涎除煩

牡丹皮 續斷 骨碎補

熱療癰瘡血下胎胎退無汗之骨蒸張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地
 少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足
 也按內經云水之精為志故腎臟志火之精為神故心臟神
 紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用良貝母兔絲大黃忌蒜胡荽伏磁時珍
 白者補赤者利人
 所罕悟宜分別之

續斷

補肝腎
理筋骨



苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷中

補不足經疏云味甘故然煖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎

漏懷奸崩帶遺精腸風血痢星齋方平胃散一兩川

米飲下治時腫毒又主金瘡跌以功止痛生肌外科雷為上

劑川產浸狀如雞脚皮黃皺節斷者真去商囊硬筋酒浸用黃

為使

骨碎補

補腎治

折傷

經曰腎

者胃之

閉也前

陰利水

後陰利

穀

益母草

一名羌

蔚

通行瘀

血生新

血



蒸

昔溫補腎故治耳鳴

耳鳴必由腎虛

及腎虛久瀉

研未入猪腎煨熟

心食之腎主二便久瀉多屬腎虛不可專責脾胃也

腎主骨故治折傷

以功命名粥和

傷傷牙痛妙照為末擦入血行傷故治折傷

又入厥陰

肝心包

能破血止血

傷粥和味裏傷處

根似薑而扁長去毛用或密拌



辛微苦寒八手足厥陰肝心包消水行血去瘀生新調

經解毒則經調治血風血運血痛血淋胎痛產難崩

中帶下帶脉橫於腰間病生於此故名為帶亦屬血

養血滋陰而兼調氣

為經產

身藥消疔腫乳癰

亦取其散瘀解毒

通大小便然辛散之藥

曠子散大煮意服

益母子主治畧同調經益精明目

血滯病目者則宜之活血

益母草

續斷

骨碎補

益母草

卷二二

順氣逐風

血行則風散行中有補治心煩頭痛血氣血胎產帶崩令人

有子

有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產

消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良蓋根莖花葉專于行子則行中有補也產寶濟陰返魂丹小暑端年或六月大日採益母萃葉花實為末密丸治胎產百病近効乃搗汁熬膏亦良

忌鐵子微炒用

澤蘭

通行血

消水



苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰脾通

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕

散水腫防已為使治產後血澀腰痛痰行未盡吐血鼻衄目痛

頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻為女科要藥古方

滯蘭九其多

時珍曰蘭草澤蘭一類二種俱生下濕紫莖素枝赤節綠葉

葉對節生有細齒但以莖圓節長葉光有岐者為蘭草莖微方節知葉

有毛者為澤蘭嫩時並可採音那而佩之楚詞所謂紉秋蘭以為佩是也

朱友公離騷辨證云必花葉俱香燥濕不變方可刈佩吳人呼為香草俗佩今之蘭惠花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩

名孩兒菊夏曰采置髮中則髮不脯浸澤蘭草走氣分故能利水道除痰

癰殺蠱辟惡而為消渴良藥經曰敷食肥日傳為消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能

消水腫空癰毒破瘀除癥而為婦人聖藥以為今之山蘭者誤矣臣

為使寇宗莖朱丹溪並以蘭草為山蘭之葉李時珍考眾說以譏之按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經閩產者力勝李

土材云蘭藥稟金水之氣故人肺臟東垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集

諸家之言曰陳述齋閑覽云楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故

陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草節今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得

蘭名揚升菴云世以如蒲骨者為蘭九碗之受誣也久矣又吳草廬有蘭說云蘭為醫經上品有根有莖草之悔者也今所謂蘭無枝無莖因

閩產為勝則是建蘭矣
即名幽蘭正合騷經矣
升菴九種多有

澤蘭
卷之三

朱確故
陳文燭
作正揚
以辨之

本草作要

黃山谷稱之世遂遂指為離騷之蘭寇氏本草溺于流俗反疑舊說為
非夫醫經為實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癖乎其
種盛于閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭
為蘭何以感之甚也昂按朱子辨蘭援離騷初佩以為證竊謂初佩亦
騷人風致之詞口如所云飲木蘭之盛露餐秋菊之落英豈真露可飲
而英可餐乎又云製艾苟以為衣集芙蓉以為裳豈真艾苟可衣芙蓉
可裳乎宋儒釋經執泥恐未可為定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭
明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬木經之澤蘭
無疑也然離騷不常曰春蘭今秋菊乎不又曰結幽蘭而延片乎不又
曰疏石蘭以為芳乎不秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又
不得為山蘭當是何等之蘭乎且山蘭為花中最上之品古今評者列
之梅蘭之前今反屈于孩兒菊之下以為盜襲其名世間至賤之草皆
收入本草獨山蘭清芬佳品攢葉不錄何其不幸若斯之甚也本草殺
蠱之藥良多皆未必有驗至平行水消痰固山蘭之藥力所優為者也
蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤蘭蘭草為一類二種遂并
騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂今蘭草無復有用之者不思昔以為
一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭草反列之上品而澤蘭
止為中品乎况一入氣分一人血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五
除木蘭人所共識其餘看蘭秋蘭幽蘭石蘭若皆以為孩兒菊是不特
二類一種且四種一類矣而以為九畹之受誣豈理也哉蓋本經言澤

卷二

澤蘭明
唯賤品
幽字何
可當也

白微
瀉血熱

蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不用其花也騷經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定農山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以豁多識之士



苦鹹而寒陽明循任之藥利陰氣下水氣王中風身

熱支滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不知人血厥人九多此症宜白微湯白微當歸各一兩參

五錢甘草錢熱淋温瘧傷寒熱酸疝能內營故酸痛 婦人傷中淋

半每服五錢金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

宮血熱干金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

靈丹溪曰此即河間所謂熱甚廷孔鬱結神無所依不能收禁之意也 廷孔女人 產虛煩 嗝 子往往用之益不孕綠于血熱血少而其源起于 弱水也 真陰不足陽勝而內熱故營而自枯也益陰清熱則血 似牛膝而短

小柔軟去鬚酒洗用惡天黃六戟山茱萸爾

五青草 白微 二二四

艾葉

宜理氣
血燥逐
寒濕



苦辛生溫熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰太少厥理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠艾湯良治吐衄崩

帶治帶腹痛冷痢霍亂轉筋皆理氣血逐殺蛇治癩

醋煎外科有用乾艾作湯投口誓二三錢洗瘡然後敷藥
者蓋人血氣冷必假艾力以佐膈而艾性又能殺虫也
以之灸首火

能透諸經而治百病血熱為病者禁用灸火則氣下行入藥則熱上衝

者以熟艾裝袋兜臍腹其妙寒
濕脚氣亦宜以此夾人襪內
陳者良採搗如綿謂之熟艾灸火用

婦人丸散醋煮搗餅再為末用入茯苓散片煎服宜鮮者醋也香附

為使艾附丸調婦人諸病宋時重湯陰文自明成化來則以蕪州艾為膜云灸酒雲一灸便透蒙竿發明並以野艾為質薪艾雖香實非

種

本草


卷一

延胡索

宜活血
利氣

紅花

紅藍花
通行血
潤燥



辛苦而溫入手足天陰肺厥陰心包經能行血中氣

滯氣中血滯通小便除風痺治氣疑血結上下內外

諸痛通則癢崩淋月候不調氣血不和因而產後

血運暴血上衝折傷積血疝氣危急為治血利氣第一藥然辛溫老而

不守獨用力送宜兼補氣血藥通經墜胎血熱氣虛者禁用 根如半夏肉黃小而

堅者良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

辛苦甘溫入肺經而破瘀血活血瘀行則血活有熱結於中藁吐紫黑

血者吐為好吐未盡加桃仁紅凡潤燥消腫止痛凡

花行之大抵鮮血宜止血血宜行非活血熱血瘀則治經閉便難血運口糜胎死腹中行血不

能瘡瘡血熱本草不喉痺不通又能入心經生新血須兼補益藥為佐使 俗用



艾葉 延胡索 二五

染紅併作胭脂胭脂活血解毒疔挑少用養血多則行血過用能使

血行不止而變血生于心色藏于肝属于衝任紅花汁與相類故治血

病有產婦血悶而死名醫陸氏以紅花數十斤煮湯寢婦于上而薰之湯冷再加半日而蘇余賈有紅藍花酒云治婦人六十二種風

黃草 通行血



色亦入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血本經八厥

陰血分心包能行血止血能行故能止消瘕道消痰

通酒煎一兩治風癩黃疽疽有五黃疽殺疽酒疽

血發黃不專于濕熱者也女勞疽必屬腎虛亦不可以濕熱例治當用四物知柏壯其木麥木培其氣隨症而加利濕清熱藥

損痔瘻瘡癩血少者忌用 根可染絳忌鐵

葦

瀉腸 瀉血熱



甘鹹寒入厥陰血分心包氣血活血利九竅通二

便鹹寒治心腹邪氣前熱水腫五疔癩惡瘡血熱

及痘瘡血熱毒盛一便閉瀉血熱則毒閉得紫草涼之則血行而毒出矣便利者忌之活幼心書云紫草性

寒小兒脾胃實者可川脾虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類川發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣瀉者忌用

去頭鬚酒洗

凌霄花

一名紫葳

瀉血熱



甘酸而寒八厥陰血分肝心包能去血中伏火破血去瘀生乳餘疾崩帶癥瘕腸結不大血閉淋悶風痒

血熱生風之症女科多用孕婦忌之木經云養胎經疏云破血之藥非所宜也肺經有用之為君藥者

凌霄花為末和蜜吃僧唾調敷酒齏甚驗藤生花開五辨黃亦有點不可近鼻聞傷腦

大小薊

瀉涼血

大薊 小薊



甘溫大明曰涼皆能破血下氣行而帶補治吐衄腸癰女

子赤白沃安胎涼血之功小薊力微能破瘀生新保精養

血退熱補虛不能如大薊之消癰毒丹溪曰小薊治下焦諸熱血淋

大薊青皮草

茜草 紫草 凌霄花 大小薊

卷三

三七亦各

山漆瀉散痰定痛

地榆瀉止血

本草綱目

本事方一人冷氣入陰囊腫滿疼痛煎大薊汁服立瘥

薊莖低而葉不嫩者用根

兩薊相似花如髻大薊莖高而葉紫小



微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰

腫磨莖即散已為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二錢則血不衝心

後敷之去瘀消腫易愈大抵此藥近時始出軍

中特之從廣西山洞來者密似白艾地黃有節味微甘頗似人參以未

摻猪血中血化為水近出一種葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花莖如金絲盤組可愛而氣不

香根大如牛蒡味甘且易繁衍云是三七治金瘡折傷血病甚効與南中來者不同

苦酸微寒性沉而瀋本草未嘗言瀋然能收汗止血皆酸欬之功也八下焦

除血熱治吐血崩中血虛者為腸風隨臧禁閉腸風而見也血瘀者為藏



卷三

蘇頌著
本草圖

經

蒲黃

生滑行
血炒瀼
止血

卷栢

生用破
血炙用
止血

毒積久而發也糞前為近血也蘇頌曰古方斷不多用之寇宗
出腸胃糞後為遠血出肺肝血痢瘵曰虛寒瀉痢及初起者忌用
柳根外黑裏紅取上截炒黑用稍皮行血得髮良惡麥冬



薑末等分搽之愈時珍曰觀此則蒲黃之涼血活血可知矣
蓋舌為心苗心包相火乃其臣使相乾薑是陰陽相濟也
止血崩帶泄精 香蒲花中流層湯成八藥



生用辛平破血通經治癥瘕淋結炙用辛溫止血治
腸風脫肛 生石上拳攣如雞足俗呼萬年松凡使
鹽水煮半日并水煮半焙用

三七 地榆 蒲黃 卷栢

三七

蘭茹

瀉破血

菴蘭子

瀉行水
散血

鬱金

宜行氣
解鬱滯
泄血破



之...
二

辛寒有小毒蝕肉排膿血殺疥虫除熱痺破癥瘕

內經同烏鰂骨 治婦人血枯 根如莖葉皮黃肉白葉長微潤折之

有汁結實如豆一顆三粒甘草為使

苦辛微寒 別錄 八肝經血分行水散血散中有補治

陽痿經濕腰膝骨節重痛產後血氣作痛閃到折傷

撲打方 多用之 能制蛇 見之 則爛

葉似莖而薄莖似艾而粗或意為使

辛苦氣寒純陽之品其性輕揚上行入心及包絡兼

入肺經涼心熱散肝鬱下氣破血 行滯氣亦不損正 氣破瘀血亦能生

新治吐血尿血婦人經脈逆行 諸症用鬱金未加韭 血

汁薑汁童便服其血自 清痰中帶血者加鈞 瀝 血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失心 尚知畏懼

黃黃
瀉破血
行氣

症屬不足狂多忿怒人莫能制症屬有餘此病多因驚憂瘀血塞于心
竅所致鬱金七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸鬱金入心散惡血明
礬化頑瘰癧入心 鬱金一兩甘草二錢牛煮乾焙研末冰片五分每用
痰故也瘰癧入心 一錢加猪血五七滴新汲水下治班痘如有白泡忽
搐入腹紫 下藥 同升麻服
黑無膿 不吐則下
微香味苦帶甘者真 市人多川 黃黃偽之



後敗血攻心通月經療撲損片子者能入手臂治風
下氣破血除風消腫功力烈于鬱金治氣脹血積產
器大明白熱 色黃入脾兼入肝經理血中之氣

寒濕痺 血虛臂痛者勿用時珍曰入臂
治痛其兼理血中之氣可知
出川廣 陳藏器曰鬱金苦寒
色赤薑黃辛溫色黃

澁味苦色青三物不同所用各別經疏曰薑黃主治介乎三稜鬱金之
間時珍曰薑黃鬱金莖澁形狀功用大畧相近但鬱金入心專治血薑
黃入脾兼治血中之氣述入肝治氣中之血稍為不同今時以扁如乾
薑者為片子薑黃圓如蟬腹者為蟬肚鬱金並可染色澁形雖似鬱金

黃黃
薑黃
鬱金
六二八

我逃音逃
瀉破血
行氣消積

而色不黃也



辛苦氣溫八肝經血分破氣中之血能通肝經聚血消痰通

經閉胃化食解毒止痛消心腹諸痛冷氣吐酸奔豚

疝瘕酒醋磨服疝音賢小腹積疝瘕多見于男子癰

治積聚諸氣良按五積心積曰伏梁起臍上至心下肝積曰肥氣在左

脇肺積曰息賁在右脇脾積曰痞氣在胃腕右測賢積曰奔豚在小腹

上至心下治之不宜專用下藥恐損真氣宜于破血行氣藥中加補脾

胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯也衰其

大半而止過者死東垣五積方用三稜莪朮皆兼人參贊助成功按治

積諸藥神麴麥芽化穀食萊菔化麵食礱砂阿魏山杏化肉食紫蘇化

魚蟹毒葛花枳椇消酒積麩積芫花牽牛大戟行水飲三

稜莪逃鱉甲消癥瘕木香檳榔行氣帶礞石蛤粉攻痰積巴豆攻冷積

大黃芒硝攻熱積雄黃臍粉蠱為泄劑亦能益氣王好古曰故治氣短

攻涎積蝮虫水蛭攻血積不能接續大小七香

丸集香九諸湯散中多用之
根如生薑
根下似剛不齊堅硬難擣灰火煨透

本草綱目

卷二

乘九博之分 八氣 或醋磨酒磨或者煎分 入血

荆三稜

瀉行氣 破血消

積 破血消

積

白茅根

瀉火補 止血

止歲



力峻虛者慎用

病塊如石文理五色削成乃柄因部消腫止痛通乳墮胎功近香附而三稜柄消成水乃知此藥可察癥瘕

色黃體重者鱈魚而小者其醋浸炒或麴裏煨

其寒入手少陰心足太陰陽明脾胃補中益氣除伏熱

消瘀血利小便解酒毒治吐衄諸血上行則吐血肺

火盛則衄血茅根甘和血寒涼血引火下降故治之探損瘀血搗汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋

閉寒熱則寒熱作矣外癰中則崩傷寒噦逆也東垣作乾嘔之甚者



本草

荆三稜 白茅根

卷一九

未行熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水時珍曰良藥也世人以微是月熱喘急內熱煩渴黃疸水腫而忽之惟事苦衷之割傷中和之氣

烏足知
此哉
茅針消癰疔酒煮服二針潰一孔

蘆根

瀉熱止嘔



甘益胃寒降火治嘔噎反胃胃熱火丹則嘔逆食不

消渴客熱傷寒內熱止小便敏肺為水之上源脾氣

通調水道下輸膀胱腎為水臧而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忽火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而小便復其常道矣
能解魚鱗河豚毒
取逆水肥厚者去鬚節用



甘寒而滑補陰破瘀解熱潤燥治天行熱疾大渴大狂胎動下血諸淋血淋搗貼赤遊丹毒癰疽發背金

瘡折傷止血雞魚骨硬搗如龍胆雞骨雞湯下魚骨魚湯下汁能化血為水葶皮與產婦

作枕止血運安腹上止產後腹痛散瘀之功瀉葶汁療消渴

瀉熱故

苦微根
清濕熱

芭蕉根
瀉熱

大黃
大瀉血
分實熱
平有形
積滯



苦澆而冷八胃大腸除風熱濕熱生肌殺虫治泄

痢消渴牙痛口糜煎汁遺尿好眠癰疽瘡癬花有

黃白紅紫數色以黃心白色粉紅者八藥子名營廣酸温主治暑余

曰苦微根角蒿口瘡之神藥角蒿所在多自聞淡紅紫花
角微杏長之寸許辛苦有小毒治惡瘡有虫及日齒瘡



味甘大寒治天行熱狂煩悶消渴產後血脹並搗
汁服塗



大苦大寒八足大陰脾手足明厥陰大腸胃血分

其性浮而不沉其用走而不守若酒浸亦能引至

高之分仲景大腸門調胃承氣湯大黃註曰酒浸陽

承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣在上非酒不至若用
王者則遺至高之邪熱病愈後或目亦喉痺腫膈上熱疾伴也

大黃有要草

蘆根 蒿藜根 芭蕉根 色根大黃

卷二十一

以瀉滌腸胃下燥結而除痰熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥糞故譫語宜下之譫

音音濕熱陰虛下痢赤白腹痛急黃疽水腫癰疽積聚積久成疔謂之積屬陰聚散無

當謂之聚屬陽積多是氣留飲宿食心腹痞滿二便不通昔十鬱吐血

血血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏火行水除痰誣膿消腫能推

陳致新然傷元氣而耗陰血下多若病在氣分胃虛血弱人禁用氣分

而用之是為誤伐無過東垣曰能推陳致新如定禍亂以致太平所以

有將軍之號時珍曰仲環瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連

黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者

以大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之

則痞滿乃寒傷營血邪結上焦用之上腕當心故曰瀉心經曰大陰所至為痞滿又曰濁氣在上則生膜服是已病發于陽而反下之則結胸乃熱邪隨入血分亦在上腕故大咽胸湯九苦用大黃亦傷脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少陰不足亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心木不足

腹音裏

黃芩
瀉火吟
濕

之用血之合也肺肝火退則而歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之李士材曰古人用大黃治虛勞吐血意甚深微益濁陰不降則清陽不生瘀血不去則新血不生也

川產錦紋者長有酒浸酒蒸生熱之不同生用更峻黃芩為使欲取通利者不

得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳夷堅志湯火傷者搗生大黃醋調敷且痛無癢



苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治泄痢腹

痛便血日澀寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰食之不同寒宜溫熱宜清虛宜責實宜下食

宜消導瘀血且行散痰濕宜化痰利濕痛時寒熱生手不可按者為實痛按之痛止者為虛痛

來邪在少陽黃疸五淋血閉實熱在血分氣逆癰瘡湯火諸失血消痰丹溪以黃芩降

痰假其降火也按痰因火動當先降火利水解渴安胎胎孕宜清熱涼血養陰退陽補勞

脫水酒炒則上行瀉肺火利胸中氣肺主氣熱傷氣治焦之風熱

熱丹溪曰黃芩火嗽喉腫五臭肺鼻腫痛過服損胃虛寒者禁

用得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹痛得棗皮瀉肺火得

下利黃芩湯少陽症下後心滿瀉心湯並用之蓋黃連苦寒人心瀉熱

除脾家濕熱使胃火不流入肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者

苦寒傷土損其母也少陽症雖在土表生裏而心膈痞滿實兼心膈上

焦之抑心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之症故用黃芩以治于

足少陽相火黃芩亦少陽藥也楊上瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰

柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治

肺熱身如火燎煩燥引飲而晝盛者宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火黃芩一兩煎服本事力用治明中暴下黃明者良中

虛者結芩即片芩瀉肺火清肌表之熱肉實者條芩即子芩瀉大腸火

瀉火燥 黃連



大苦大寒入心瀉火王梅藏曰瀉心實瀉其子 鎮肝涼血
凡治血防風為上部之使黃連 燥瀉開鬱為單用
為中部之使山 為下部之使

消除煩益肝脾厚腸胃消心痰能去心止盜汗涼治腸瀉瀉痢便血白

連丸濕熱鬱而為痢黃連治痢要藥噤口者熱壅上焦同人參煎湯脾

之但得不因便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼

以解表次用苦寒以攻裏歲要云後重宜下腹痛宜和身重宜除濕脉

眩宜去風風邪內結宜汗身冷自汗宜溫濃血稠整宜重劑以竭之下

痢赤屬血分白屬氣分戴氏曰俗謂赤熱自寒瀉燥濕開鬱仲景治

者非也通作濕熱處治但有新久虛實之分瀉九種心下痞五等

瀉心湯清腹痛清心痛清伏梁清目痛清背傷清人乳浸點或合歸芍等

皆用之清分煎湯熱洗散熱活血癰瘡

疥諸痛癢疥酒毒胎毒小兒初生合目草明目傳信方羊肝一具黃連

治各羊皆屬心火為末密調合嚙之一兩搗丸凡是目疾皆

肝丸定驚鎮止汗解毒除疔同猪肚殺光蛇得苦虛寒為病者甫

入服黃連苦參反熱從火化也昂按次上作苦味苦必燥燥則熱矣且

苦寒沉陰肅殺伐傷生和之氣也韓懋曰黃連與肉桂同行能交心腎

于頃刻時珍曰治痢用香連九瀉連丸用黃連乾薑薑黃散用黃連生

薑左金丸用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛止下血用黃連大蒜一

陰一陽寒因熱用熱因出真州者粗肥出四川者燥小狀類鷹屎

寒用最得製方之妙

出真州者粗肥出四川者燥小狀類鷹屎

珠者長去毛治心火生用虛火醋炒肝胆火猪胆汁炒上焦火瀉炒有

醋糟雜等症亦有吐酸者名醉心中焦火薑汁炒下焦火鹽水或重便

宜黃連吳茱萸降火開鬱醉音醋

炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼

赤人乳浸時珍曰諸法不獨為之引道蓋辛熱黃茶龍骨為使蕪荊花

立參疆蠶白鮮皮長欬牛膝烏猪肉時珍曰方有藏連丸黃連猪肚丸豈忌肉而不忌葷肺乎

烏豈邑豈黃連瀉心火佐以龍胆瀉肝胆火白芍瀉脾火石膏瀉胃

火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝胆火黃連佐之瀉三焦火黃連佐之鄭奠一日熱鬱惡心兀兀欲吐用黃連數分甚効

胡黃連

瀉熱療

驚瀉



苦寒去心熱益肝胆厚腸胃治骨蒸發熱五心煩熱

心高手三消渴而多飲為上消肺熱也心移熱于肺

心足心三消傳為高消是也多食善飢為中消胃熱

也痺成爲消中是也渴而小便不利五疔疔疔疔疔疔

女百書...

蒸
湯火燥
溫神陰



則通肝門而為痔腫
藥朱二允曰解吃烟
亦有之心黑外黃折之顯出如烟者真良醫黃蓮
性味功用同黃連液各出波斯國今秦隴南海

苦燥寒勝熱洗陰主腎補虛精養肝胆安五臟

溫熱去則血氣和
平而五藏日安
利九竅生津止渴明目止淚
肝熱

治濕病血刺
純下清血者風傷也宜散風涼血
下如蓋汁者溫傷脾也宜清熱滲濕腸

風濕亦黃連酒毒熱生風濕生蟲又能祛風逐水殺虫治大腸疥癩然

大苦大寒肝腎虛而主熱者勿服
張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草不可不謂之毒久服必偏勝為患經

日五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久之由

也玉水許曰氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏絕故令人異矣筆
談云久用苦參牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰夫毒治病十去
其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九設

藥醫
病不能

養人食

能養人

不能醫

病

知母

瀉火補

水潤燥

滑腸

東垣治

便秘以

渴不渴

分之

肉菓其食養盡之無使過之傷其正也按人參補脾沙參補肺紫菀水
 參補肝丹參補心玄參補腎苦參不在五參之內然名家者皆補精水
 甘寒之類氣藥用玄參為使龍貝母兜絲子漏蘆反藜蘆
 能吐下
 行時毒



苦寒滑上清肺金而瀉火

瀉胃熱勝膀胱邪

下潤腎

燥而滋陰入二經氣分黃柏入二經血分故

消痰定

嗽止渴安胎真非清火之用

治傷寒煩熱勞骨蒸退有

骨蒸焯虛煩火瘰

利治嗽者清肺火也治渴者清胃熱也退蒸骨者瀉腎火也

利二便消浮腫小

利則腫消東垣口熱在上焦氣分結秘而渴乃肺中伏熱不能生水勝

肌絕其化源宜用溼燥之藥瀉火清金滋水之化源熱在二焦血分便

閉而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大

苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有

熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜丹又有隔二隔三之治始肺不燥但

勞光熱宜寫勞光化三全而可治之也

龍胆草

瀉肝胆

火下焦

濕熱



因脾濕不運而情不上升故脾不能生水則潤胃是脾此隔三之治湯
膀胱黃栢知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二木之類昂按凡病皆
右隔二隔三之然苦寒傷胃而滑腸多服令人瀉李士材曰苦寒肅殺
治不獨便瀉也以其滋陰補之虛損之人則
如水益深矣特夫出以為戒 得酒良上行酒浸不行鹽水拌忌鐵

大英寒沉陰不行益肝胆而瀉火和火寄于肝胆
有瀉無補瀉其

功酒浸能外行上行治骨間寒在腎主
驚疝疝氣

肝經時氣溫熱痢瘡寒濕脚氣足傷寒濕則成脚氣腫而痛者為
濕脚氣宜清熱利濕搜風文有臺

縮枯細瓶而不腫者名咽喉風熱赤睛肉瀉肝胆火能明目元索曰
某胡為主龍胆為使目疾

要藥昂技若目疾初起宜發散忌用寒涼癰疽瘡疥過服損胃甘草水浸一宿曝用小豆

貫衆為使忌地黃

真焦

傷肝散

一火



六青

傷心胃

熱毒



碧蓉水飛淨用

內夾石瓜
故須淘淨

葇蕖根熱毒氣若
內痔婦不能禁酒
研置柿餅中煨食
名聖餅子治野血

小兒驚癇疳積熱傳癰瘡蛇犬毒
即旋花取婦

鹹寒色青瀉肝散五臟火解中下焦蓄熱風熱衍
日一婦患脇腹二陰通生濕熱瘴而痛出黃汁二
便澀用鯢鱧松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜
酒食良魚蝦蟹風之物乃用馬齒莧四兩研爛入青
無一兩和塗熱痛皆去仍服八正散而愈此中下焦

微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發

玉紫黑者蒸極而胃爛也多死活人治赤斑煩痛有
犀角大黃熱痢丹毒喉痺處處有之高三尺
病湯

出副定長真封山... 八月開小江宅戎族賣大如叔色示月也

辟牛

大瀉氣
分濕熱



立製者請屬必

金而能達膏
泄肺自達膏

秘氣秘利大小

症瘕氣塊着濕熱在血分胃弱

謂苦寒安在哉乃瀉氣之藥此諸

血中之濕宜苦寒之味而反用

使氣血俱損也王好古曰以氣藥

一婦腸結年幾六十服養血潤燥

三十餘年其人體肥膏梁而多

無降津液皆化為痰不能下潤腸

能入氣故無效用牽牛為末皂角

便不通脹痛呻吟七晝夜用通利

壅隧路病在二陰之間故前阻小

棟實茴香穿山甲諸藥倍牽牛三

牽牛鹽水炒黑佐沉香社仲肉桂

破故紙諸藥深得補瀉兼施之妙

走入肺經瀉氣之濕熱服生

門走精盛通下焦鬱遏及大腸

逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘

人禁用東垣曰牽牛苦寒誤矣其

藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主

熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣

則人氣以大黃引則入血時珍曰

則在結服硝黃藥則若罔知如此

吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升

非血燥也潤劑留滯硝黃入血不

九轉服便通外甥素多酒色病二

不効十言此乃濕熱之邪在精道

後阻大便病不在大腸膀胱也用

而乎東垣補下焦陽虛天真丹用

有黑白二種黑者方速亦名取

牽牛

墮

通行水
瀉下焦
血分濕

熱

淘去淨者春去皮用得木香乾薑

此藥漢前未入本草故仲景方中無此別錄始載之宋後始多用者

太辛苦寒

別錄
太陽經藥勝能行十二經通痰理

利九竅瀉焦

分濕熱為瘵風水之要藥治肺氣

喘嗽水熱諸

下痰濕瘧氣足傷寒濕為脚氣



則腫熱則痛防已為主藥温加苡仁
活草薺痰加竹瀝南星痛加香附木
花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂
脇加胆草又有足跟痛者屬腎虛不
與脚氣同論

香活木瓜木通熱加苧栝風加老
依威靈仙痛連水腫風腫癰腫惡

濕熱在上焦氣分者苦川

十劑白通
可去滯通草防已之屬是也通草

無以別矣木通甘淡瀉氣介

你之才亦以行水者為通與燥劑

濕熱防已苦寒瀉血分濕熱

出漢
根大而虛通心有花紋色黃名

木焦以
行水為
通劑改
熱藥為
燥劑

漢防已黑點黃澤木強者名木防已
佳陳藏器曰治風用水西先用

惡細辛畏葶藶

葶藶

大瀉氣

秘通行



辛苦大寒屬火性

臍著非此不能

痰止咳定喘水濕

失能下氣行勝脫水肺中水氣

破積聚癥瘕伏留熱氣消腫除

通經利便久服令人

虛十劑曰洩可去閉葶藶大黃之屬

分氣閉氣味俱厚不咸大黃然有

肺而傷胃宜大棗輔之仲景有葶藶

肺氣喘急不得臥昂按輔以大棗補

色黃合糯米微炒去米得酒良榆

為使

子如黍米微糞

所以制水

交墜道水濕直達水氣所結之

水之聖藥

仲景大陷胸湯用之

苦寒有毒能傷腎

處以攻決為用為

水大腹腫滿名水

原脾不能散胃之水精于肺而

則嘉言曰腎為水穀之海五藏

六腑

其遂

大通瀉

經隧水

濕



二二五二草

方已 葶藶

二二七

育者胃
之關也
則陰利
水後陰
利穀

大戟

大通瀉
臧腑水

病于中肺不能通胃之水道于膀胱蓄泄而病于下以致積水浸淫無所肉內筋骨脈有尺寸之殊泮沆之別可用之按水腫有痰裏食積瘀血致生隱道阻塞而成者有燥熱冲擊秘涼魚飲食中氣虛衰而成者有大病水液妄行脾氣能制而成者症屬不足而起丹溪口水病當以健脾為自行宜參苓為君視所挾症加減皆

雷飲便食坎迷頻爛虛者忌用皮

煨熟用或用甘草齊荳汁浸三日其水如黑以清為度再麩裏紙

飲與甘草同用取其相反以立功也遂未傳腫處濃煎甘草湯服之其腫



其有毒能瀉臧

二水腹滿急痛積

病于上腎不能司胃之關時其止上好古火者脾肺腎三經而中四肢下腰脚外皮膚中肌可輕瀉當知病在何經何臟方不升濁不降而成者有濕熱相不通而成者症屬有餘有服寒氣衰德而成者有小便不通分別治之然其源多由中氣此肥實而氣運則水利水藥多致不救瘕瘕積聚

白根作連珠事嘗者其麩裏

黃為便惡遠志反甘草仲景治心下雷

治水腫及腫毒者以甘清二物相反感應如此

寒瀉行血發汗利大小便治十

微腹頰液腫腫風毒脚腫通經

鹽胎誤服真氣時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到人心則迷益

熱往來人經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則癢癢癰腫

陳無澤並以控涎丹主之殊有音効此乃治痰之本痰之本水也濕也

得氣與火則結為痰大戟能泄臧腑水濕甘遂能行經絡水濕曰芥子

能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收可功也又曰錢仲陽謂腎為真乃

有補無瀉復云瘡症交黑歸腎者用日祥膏下之非瀉腎也瀉其腑則

臟自不實腑者膀胱也百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也糯謂非

獨瀉腑乃腎邪實而瀉腑也實則瀉兵子大戟浸水青緣肝胆之色也

痘症毒益火熾則水溢洞風挾外勢則土受虧故津液內竭不能化膿

而成黑陷之症瀉其風火之毒所以救腎扶脾也昂按瀉心乃所以補

心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰復矣機要用大戟一兩棗三枚同

煮焙乾去戟用棗丸

服名棗變百祥丸

得大毒則不損脾畏薑蒲反甘草

苦寒有毒時珍家辛酸沉陰下行與大戟甘遂同功療

水腫脹滿腫屬脾脹屬肝腫則陰氣猶行如葶藶而

不腫者名盡脹為木橫魁士難治腫脹朝



商陸
水大通行

水腫脹滿
不腫者名盡脹為木橫魁士難治腫脹朝

芫花
大通行
水



寬春急為血虛暮寃朝急為氣虛朝暮俱急為氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者古由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治
 瘰癧癰喉痺不通薄切醋炒良濕熱之病瀉醜毒傳惡瘡墮胎孕令
 人見鬼神取花白者良亦者傷人只堪貼臍入屬黑豆湯浸蒸用得蒜

良

苦寒有毒去水飲癰癧瘰癧五水在五臟皮膚脹滿喘

急痛向胸脇咳嗽瘰癧黃汗也水積胸中堅滿如石

名石水汗如相汗名黃汗久不愈必致癰膿時珍曰仲景治傷寒太陽症表未解心下有水而咳乾嘔發

熱或喘或利者小青龍湯王之表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔引痛兩脇或喘或嗽者十棗湯王之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗遂裏邪使水從兩便出內經所謂潔淨府去陳莖法也十棗湯芫花甘草大戟等分棗十枚

藥似

柳二月開花紫碧色葉生花落陳久者良醋煮過水浸暴用根療疥子

壽魚反甘草

關訟者取葉擦皮膚神作赤腫假傷以誣人

辛散結苦泄熱行提藥藥主治暑向花



水大通行

澤漆通行水



常山

宜吐痰散癰通



辛苦微寒消痰熱止嗽殺虫利大小腸治大腹水

腫益丈夫陰氣生平澤葉圓黃綠類貓睛一名

貓兒眼睛草下有白汗粘人時珍曰別錄云是大戟苗非也功相類耳

辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲痰寒痰濕

痰熱痰食痰氣痰也飲有五流于肺為支飲于肝為懸飲于心為伏飲于經絡為溢飲于腸胃為痰飲也

常山力能專治諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎用時珍

曰常山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及捷出陽分之後用之瘧有經瘧藏瘧風寒暑濕痰食瘧魄之別須分陰陽虛實不可繫論常山蜀漆

常山 蜀漆 常山 蜀漆 常山 蜀漆

得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心
 得林米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草菓板柶則入脾益無痰
 不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生用多
 用為然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其
 或吐也世人泥于雷效老入久病忌服之說使良藥見疑沉痾難起柳
 何患也○常山吐癰痰瓜蒂吐熱痰烏附尖吐濕痰萊服子吐氣痰藜
 蘆吐風痰雞骨者良酒浸蒸或炒用枯藁為使息熱苦莖葉名蜀漆功用
 畧同古方有搗漆散取其苗性輕揚發散上焦邪結甘草水并蒸

藜蘆

宜引吐



辛寒苦有毒入口即吐善通真令人噎風癰症多

用之張子和曰一婦病風癰初一二年一作後漸白作甚至一日數作求死而已直歲大飢採百草

食見野草若葱采蒸飽食覺不安吐膠涎數日約一
 二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以所食葱

訪人乃蔥蔥苗即藜蘆是矣李時珍曰和王死年七十中風不省牙關
 緊閉先考太醫吏日月池翁診說藥不得入不獲已打去一齒濃煎藜
 蘆湯灌之少頃噫氣遂吐痰而甦
 甦藥不瞋眩厥疾不瘳誠然
 取根去頭用黃連為使反細辛為藥

木通 名占

通草 輕通行

水瀉小 腸火

諸參惡大黃畏葱白 吐者服葱 易耶上



甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱心火降則化津

液肺為水源肺熱清則津液化水道通下通大小腸膀胱導諸濕熱由

小便出故導赤故用之凡利小便者多不利大便以

大更通利九竅血脉關節治胸中煩熱遍身拘痛楊仁齋云遍身隱熱傷

血血屬于心自木通以大瀉引食火淋瀝不通下焦火心與小腸相

則淋水腫浮大利小便耳聾泄腎火目眩口燥舌乾舌為心苗喉痺咽痛火炎

鼻逆音壅熱壅清道失音清脾熱好眠脾主四肢倦則好眠心為除煩

退熱止痛排膿破血催生行經下乳火不亢牙內氣順血行汗多者禁

用東垣曰肺受熱邪津液氣化之源絕則寒水斷流膀胱受濕熱癰閉

寒水太 陽膀胱

本草 木通 卷二十九

也

通草
古名

通脫木
經通利
水退熱

澤瀉

通利水
瀉勝肌
火

本草

中則心煩嘔歲浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性瀉諸經之火
火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小水而不降矣。君火宜木
通相火宜澤瀉利
水雖同所用各別
筋有細孔兩頭皆通故通



色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經引熱下行
而利小便味淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁

治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音淡通廢寒降
火利肺氣退熱催生



甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功最利濕
行水治消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水痞脚氣痛淋
懋陰汗陰間
有汗尿血洩精所利水而又止洩精何也此
乃濕熱為病不為虛滑者言

也虛渾則當濕熱之病濕熱既除則清氣上行又能養五臟益氣力起
用補瀝之藥
陰氣補虛損止頭旋有聰耳明目之功脾胃有濕熱則頭重耳鳴目昏
滲去其濕則熱亦隨去土乃得

卷二

脾喜燥
腎惡燥
故兼補
為難

車前子
通行水
瀉熱涼

今而清氣上行故本經列之上品云聰且多服昏目小便通利而昏水
明曰而六味丸用之今人多以昏目疑之虛故也腹中有水
屬膀胱過利則水涸而火生仲景八味丸用澤瀉冠宗頭謂其接引桂
附入腎經李時珍曰非接引也乃取其瀉膀胱之邪氣也古人用補藥
必兼瀉邪邪去則補藥得力一闡一闡此乃玄妙後人不知此理謂一
子補必致偏勝之患矣王履曰地黃山茱萸茯苓丹皮皆腎經藥桂附右
腎命門之藥何待接引乎錢仲陽謂腎為真水有補無瀉或云脾虛腎
旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉瀉其伏留之邪耳易老云去脾
中留垢以其微鹹能瀉伏水故也歸按六味丸有熟地之溫丹皮之涼
山藥之瀉茯苓之滲山茱之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必有
瀉相和相濟以成平補之功乃平淡之神奇所以為古今不易之良方
也即有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二
味極三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加
入有補無瀉且客倍于主責成不專而之味之功且退處于虛立夫製
方配合之本旨矣此

鹽水拌或酒浸用忌鐵

甘寒涼血去熱止吐衄消痰明目通淋凡利水之劑多損子

目性此能解汗與小腸之熱濕熱退
而日清矣雷敔曰使葉勿使莖蒞
子甘寒清肺



本草
澤瀉
車前子
卷三十一

肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功強陰益精令人有

子腎有二竅車前子能利水竅而固精緩精盛則有子五子衍宗丸用

前易蓮子時珍曰人服食須佐他藥如治濕瘧五淋暑濕瀉痢歐陽文

六味丸之用澤瀉可也若單用則過瀉治濕瘧五淋暑濕瀉痢志愚暴

下國醫不能愈夫入云市有藥三文一貼甚効公不肯服夫人雜他藥

進之一服而愈問其方乃車前子為末米飲下二錢一云此藥利水而

不動氣水通利則清甘淡而寒降心火心能清肺熱利小腸心與小腸相

瀉分谷莖自止矣則補熱小便亦清通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉

入濕補藥妙研而熱從小便而矣通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉

能斷也瘰癧乳止夜啼擦癩最良縛成把擦摩極痒時虫從



燈草
輕通利
水清熱

瞿麥

通利水
破血



苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥故入

用之五淋大抵皆屬濕熱熱淋宜入正及山梔滑石

之類血淋宜小蘆子藤膏腎虛淋宜補腎不可濁瀉

血利髮癭消腫明目去翳通經墮胎性利善下虛者慎用

熱而小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣

花大如錢紅白斑斕色甚姦媚俗呼洛陽

花用益殼丹皮為使惡燥

產後淋當去血瞿麥蒲黃皆為要藥

扁蓄

扁竹
通淋



苦平殺虫亦利小便治黃疸熱淋蚊咬腹痛魚鱗下

部服葉葉細如竹筴莖莖引促節有粉三月開紅花

天仙籐

通活血
消腫



葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋

苦溫疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫

地膚子
通利水
補陰

石韋
通淋補
勞



本草綱目

甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利小便而通淋
 時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣治小便不通用
 知柏滋腎之意王節齋曰小便不禁或頻數古方多
 類為寒而用溫澁之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火
 邪妄動水不得甯故不能禁而頻數也故老人多頻
 數是膀胱血多陽火偏任也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以
 收澁之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病木屬熱故宜瀉火因水
 不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜
 補血補血瀉火治其本也收之澁之治其標也
 疥瘡作浴湯去皮膚風熱丹腫沈眼除舊膏澁痛 葉如蒿莖赤子類
 良藥作浴湯去皮膚風熱丹腫沈眼除舊膏澁痛 葉如蒿莖赤子類
 蚕砂惡螺蛸

甘苦微寒清肺金以滋化源
 凡行水之藥必通膀胱
 皆能先清肺火通膀胱
 而利水道益精氣補五勞
 利濕清熱之功高陽負對
 黃帝治勞傷用石韋汁
 治淋崩發背調酒 炒未冷
 生石陰柔勒如皮背有莖毛

海金沙
通淋瀉
濕熱

茵陳
通利濕
熱治諸
黃

香薷
宜通利
濕瀉暑

去毛微火用杏仁滑石射于為使得真補良生古死上者名石韋治淋



甘寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱治腫滿五淋莖痛
得梔子牙硝逢砂治傷寒熱狂大熱利小便此釜底抽薪之義也



莖細如線引竹木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火
苦燥濕寒勝熱入足太陽經膀胱發汗利水以泄太陰

加附子乾薑各
隨寒熱治之

又治傷寒時疾狂熱瘧瘧頭痛頭旋女人瘕疝皆濕熱為病



辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺
為清暑之主藥肺氣清則小便行而暑降暑必兼濕

石韋草

地膚子

石韋

海金沙

茵陳

香薷

卷二十一

身寒寒
字當熱
字看傷
寒必病
熱

青蒿
瀉熱補
勞

利濕若無濕但治嘔逆水腫
為乾熱非暑也治嘔逆水腫
筋時珍曰暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏反中人內遂病頭痛發
熱惡寒煩燥口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散邪和脾則愈若
飲食不節勞役作傷之人傷暑大熱大渴汗出如雨煩燥喘促或瀉或
吐者乃內傷之症宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可
也若用香薷是重虛其表而濟之熱矣益香薷乃夏日解表之藥如冬
月之用麻黃氣虛者尤不宜多服今人謂能解暑藥用代茶誤矣李士
材曰香薷為夏月發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若中熱者誤
服之反成大害世所未知按潔古云中暑為陰症為不足中暑為陽症
為有餘經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身
熱得之傷暑故中暑宜溫散中熱宜清涼
味者勝宜冷飲熱
服台人瀉



苦寒得春木少陽之令最早生苗故入少陽厥陰血

分用治骨蒸勞熱童便搗葉
取汁熬膏
勞虛熱凡苦寒之藥
多傷胃氣惟

青蒿分香夫脾獨宜于血虛
有熱之人以其不犯胃氣也
風毒熱黃久瘧久痢瘧

疥癩瘡鬼氣尸疰

時珍曰月令通纂言伏內庚日采蒿懸門庭可辟邪
冬至元且各服一錢亦良明清蒿之治鬼疰蓋亦有

子

燥回

下腎

火逐

寒濕

八八味

加肉亦

地黃

才補陰

用與韭

牛乳

也 補中明目

童便浸葉并根煮之良似子勿使葉使根久使葉



辛甘有毒大熱純陽其性淨而不沉其用走而不守

通行十二經無所不至能引補氣藥以復散失之元

陽引補血藥以滋不足之真陰引發散藥開腠理以

逐在表之風寒

同藟薑桂枝湯 經散寒發汗 引溫煖藥達下焦以祛在裏之寒濕能

火下行亦有津

調貼足心者 治三陰傷寒 吳緩曰附子陰症要藥凡傷寒傳變三陰

腹痛甚則唇青囊縮者急用須用之若待陰極陽結而用之已遲東垣

治陰盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脉七八至但按之則散用薑附

湯加人參投牛劬得汗 中寒中風 卒中口中漸傷曰傷輕為感 氣厥痰

而愈此神聖之妙也 厥虛寒而厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脉 咳逆風嘔噎胃膈噎 伏熱厥似寒者誤投立斃宜承氣白虎等湯 寒嘔噎寒膈噎 多由氣血虛胃治胃稿而成飲可下而食不可下稿在吸門喉間之厥 會也食下胃腕痛須臾吐出稿在賁門胃之上口也此上焦名噎食下

一條參
有論治

良久吐出穢在幽門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐穢在關門大

小腸下口也此下焦名反胃又有煖飲食稍痰血壅塞胃口者如寒痰

胃冷則宜薑附參朮胃痛者宜滋潤宜四物牛羊乳血痰者加韭汁泄命火冷刺寒濕氣逆脾虛

中焦為霍亂等客下焦肝抱掣風痺癥瘕積聚腎脈為病奔強而厥小

兒慢驚瘡瘡灰白癰疽不欬一切沉寒痼冷之症經曰陰盛生內助陽

退陰殺邪瘴鬼本草通經噎胎見陰症用薑附藥宜冷服熱因寒用也

益盛治之以熱則拒格不納用熱藥治飲下隘之後治體既消熱性便

發情且不違而致火益此反治之妙也又有寒藥熱飲治熱症者此寒

因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒

此正治也或以寒治寒以熱治熱此反治也經所謂必先其所主而先

其所因益借寒藥熱藥為反佐以作引導也亦曰從治王好古曰用附

字以補火必防瀉水如陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰愈

耗精血口枯而氣無所附麗遂成不救者多矣

母為管嗣附生者為附子連生者為側子細

長者為天雄兩歧者為烏象五物皆出異名附子以西川彭州赤水產

者為最皮黑體圓底平八角重一兩以上者其更勝然難得生用砂散

熟用峻補趙嗣其曰仲景麻黃附子辛細湯熟附即麻黃發中有補四

味丸用為少陰摠導後世因以為補藥誤矣附子走而不守取其

健悍走下以行也黃之帶耳和烈用為風藥及補藥殺人多矣昂按附

子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不為功故仲景四

逆真武白通諸傷多用之其有功于生民甚大况古人日用常方用之

最多本非禁痢丹溪乃僅以為行經之藥而云用作補藥多致殺人言

亦過矣蓋丹溪法重滋陰故每言陽藥亦其偏也王節齋曰氣虛用四

君子湯血虛用四物湯虛甚者俱宜加熟附蓋四君四物皆平利實獲

之劑須得附子健悍之性行之古能成功附子熟藥木不可輕用但當

今人用
黑豆煮
亦佳

草二錢鹽水薑汁童便各生煮熟用畏人參黃耆甘草防風犀角綠

豆童便反貝母半夏葶藶白及白欬中其毒者黃連犀角甘草煎湯解

之黃土水亦可解烏頭功同附子而稍緩附子性重峻溫腥逐寒烏

頭性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風疾烏頭烏附去吐風痰治癩

痼取其鋒銳直達病所丹溪治許白雲犀角瓜蒂梔子苦參黎盧等劑吐之不透後用附子尖部漿水與之始得大吐

膠痰天雄補下焦益門陽虛寇宗奭張元素皆云補上焦丹溪曰可

數碗下行然補下乃所以益上也若上焦陽虛治風寒濕痺為風家主藥發

則屬心肺之分當用參耆不當用雄附矣汗又能止陰汗側子散則旁生宜于發散四肢充達皮毛治手足風

濕諸痺

烏頭
大燥開
眼痰



辛大熱搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒頗勝

川烏然其毒無所釀制不可輕投 野生狀類川烏

亦名烏蒙其汁炒或豆腐煮用熬膏名射罔傳箭射

狀見且左

白附子

燥祛風
濕治面
候

破故紙

一名補

骨脂

燥補命

火



辛甘有毒大熱純陽助經藥能引藥勢上行治面

上百病陽明之脈營下而白附能去補肝虛祛風痰

治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕癢根如

草烏之小者

寸許皺紋有節炮用陶弘景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

辛苦大溫入心包命門補相火以通君火煖丹田壯

元陽縮小便亦治追尿治五勞七傷五勞之勞七傷之傷腰膝冷痛

腎冷精流腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能蒸蒸則胃脾胃虛寒遲于運化致飲食

滅少腹脹腸鳴嘔涎泄瀉如菡金之下無火物終不熟故補命門相火

即所以補脾被收紙四兩五味三兩肉苁二兩吳茱一兩薑煮棗九名

四神丸治婦人血氣婦人之血脫氣陷亦酒胎猶出南番者色赤嶺南

五更腎瀉酒蒸用亦有童便乳浸鹽水炒香得胡桃胡麻良惡甘草唐鄭



芸臺補
菜也

肉苁蓉

補腎命
湯腸

銷傷

補腸滑

腸

本草綱目

相國方破故紙十兩酒浸蒸為末胡桃肉二十兩云皮爛研密相每日
酒調一匙或水調服白飛霞曰破故紙屬火堅固元陽胡兆屬水潤泉
養血有水火相生之妙忌芸
毫羊血加杜仲名青娥丸



一宿刷去淨甲變被除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵蘇恭曰今人所用多草從

睿功方
和劣

甘酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓
帶遺精峻補精血時珍曰補而下峻故有苁蓉之荒驟用恐妨心湯
大便長大如舊重至斤許有松子鱗用者良酒浸



甘溫補陰益精興陽潤燥養筋強筋故能興陽治痿弱滑大
便使燥者啖之可代從蓉煮粥粥在魚甲筋比狀類男陽酥炙

卷二

巴戟天

補腎祛濕



胡蘆巴

燥補腎命除寒



仙茅

燥補腎命



也蜀產佳

山律根似巴戟但色白人或萌煮以亂之

去心酒浸焙用覆盆子為使惡丹參

濕脚氣

出嶺南番舶者良是番菘服子酒浸暴或蒸或炒

陽氣不能歸元

同附子硫黃

瘰癧冷氣

同面香巴戟川烏用棟吳茱萸

苦溫純陽八有腎命門煖丹田狀元陽治腎臟虛冷

甘辛微溫八腎經血分強陰益精治五勞七傷辛溫散風濕治風氣脚氣水腫根如連珠擊破中紫而

鮮潔者偽也出雖繁微有白粉粉色而理小暗者真

辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺

無乎心腹冷氣不能食

温

腰脚冷痺不能行

了爰筋相

大盛者息服

葉如茅而畧酒根如小指黃白多延

本草綱目

肉苁蓉

錯陽

巴戟天

胡蘆巴

仙茅

卷三十一

淫羊藿
補腎命



竹刀去皮切細米泔浸去赤汁出毒用皂鐵唐婆羅國始進此方當時
乾密丸酒服能養腎能養筋骨滑能養血和精酒服之必効也
若能養氣能養血能養精能養神能養氣能養血能養精能養神

辛甘平溫八肝腎補命門時珍曰手足陽命門精氣堅

助利小便治絕陽不與絕陰不逆冷風氣四肢

不仁手足一名仙靈脾北部有羊一日百合食此

藿所致故名去枝羊脂拌炒山藥為使得酒良

蛇脉子

補腎命
去風濕



辛苦而溫強陽益陰補腎散寒祛風燥濕治陰痿

濕女子陰痛陰癢濕生田同子臧虛寒痛不閉炒

之腎命之病及腰酸體痛帶下脫肛喉痺齒痛濕癬

惡瘡殺虫風濕諸病煎湯治去風癢時珍曰腎俞三焦氣分之藥不獨
土膏補助男子而且有益婦人世人舍

此而求補藥于遠城
豈非貴耳賤目乎一

丹皮貝母巴豆

似小苗而細微炒殺毒則不辣以此黃升圭惡

兔絲子

平補三陰



甘辛犁凝正陽之氣八足三陰脾肝強陰益精温而不燥助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴

脾虛腎燥而生肉熱兔絲益陰清熱祛風明目補衛氣助筋脉益氣力

肥健人

補肝腎之効老耄掩筆記子疾弟少服兔絲子凡數年飲食倍常血氣充盈忽因浴見背腫隨視隨長乃大疽也適值金銀花開飲至數片腫遂消兔絲過服尚能作疽以此加金石藥不可不成

無根雙蓮草上子黃如黍粒得酒

良淘去泥沙酒浸一宿暴乾搗末山藥爲使

覆盆子

平補肝腎



甘酸微温益腎臟而固精補肝虛而明目起陽痿縮

小便寇氏曰服之當淫其溺器故名澤飢膚烏髮梢汁塗髮不自女子多

平補肝腎

淫羊藿

蛇床子

兔絲子

覆盆子

...


孕同密為膏治肺氣虛寒李士材曰強腎無燥熱之偏曰狀如覆盆

故名去蒂潤淨搗餅用時酒拌蒸 葉絞汁滴目中出目弦虫除膚赤

收濕止痕

藜子

平補肝腎



苦溫補腎者瀉肺氣而散肝風益精明目肝以散

能明目治腰痠遺精帶下咳逆肺痿乳閉癥

瘕疝消除積音積腎肝肺三經之病催生墮胎刺藜藜

故能破藏下胎沙苑藜綠色似腎故補炒用亦可刺藜藜三角有刺去刺酒

拌蒸風家宜刺藜藜補餘功瑞竹堂方齒牙打動者藜藜根燒灰傳之

便葶

補脾殺虫消積



甘溫健脾除虛熱殺臟蟲治五疳俱瀉瀉痢瘡癰

為小兒諸病要藥經疏曰五疳便瀉瀉齒腹重皆由脾胃虛弱因而乳停食滯濕熱聚

援地黃
胡麻皆
殺

益寧

燥脾腎
補心腎

砂仁

砂密

宜行氣

寒而成脾胃隨則積滯清濕熱散水迫利而前症盡除矣時珍曰凡能
殺重之藥多是苦辛獨使君子樞子甘而殺重每月上旬重頭向上中
旬頭橫下旬向下消藏云初一至初五重頭向上凡
有虫病者每月上旬空心食數枚重皆死而出也
稜內仁如樞亦可煨食久則油不可用忌飲熱茶犯之作瀉



辛熱水脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門三
焦之不足心為脾母補能潛精固氣本草未載又能開發
鬱結使氣宣通味辛能散溫中進食攝涎唾胃冷則瀉縮小
便腎與膀胱相表裏益智辛溫固腎鹽水炒同治嘔吐泄瀉各寒犯胃
烏藥等分酒煮山藥糊丸鹽湯下名縮泉丸



全氣腹痛崩帶泄精清精固氣因熱而崩濁者禁用出嶺南刑如策用仁
辛溫香寫補肺益腎和胃醒脾快氣調中運行結滯
治腹癰瘰食壅痰塞而痞者有脾虛氣弱而痞者

調中

宜行氣
煖胃
白豆蔻

須分虛實治之不宜尚用利氣藥恐變為鼓脹鼓脹
 肉腸而外有形痞脹惟覺痞悶而已皆太陰為病也噎膈嘔吐上氣咳
 嗽赤白瀉痢濕熱積滯客于火腸霍亂轉筋奔豚崩帶祛痰逐冷消食
 醒酒止痛安胎氣行則痛止散喘喉口齒浮熱化銅鐵骨硬王好古曰
 蔻人肺得入參益智入脾得黃和茯苓入腎得赤石脂入大小腸腎道
 曰辛能潤腎燥引諸藥歸宿川田地黃用之炸蒸亦取其能達下也經
 疏曰腎虛氣不歸元用為出竅南研用
 嚮道殆勝桂附藥藥為害



辛熱流行三焦溫煖脾胃三焦利脾胃運而為肺家

本藥肺主氣散滯氣消酒積除寒燥濕化食寬膨治脾

虛瘧疾感寒腹痛吐逆反胃肺皆火盛及白睛翳膜

自睛屬肺能散肺滯太陽經目背紅筋太陽脉起目背番舶耆良研

絹

肉苳蔻

一名肉

苳

屎脾瀉

腸

草荳蔻

一名草

菓

燥濕祛

寒除痰

截瘡



草荳蔻外有皺紋肉有斑紋糯米粉裏煨熟用忌鐵



辛熱善散煖胃健脾破氣開鬱燥濕祛寒除痰化食

治瘡癩癬瘡佐常山能殺瘧或與知母同用取其一

勝之寒知母治寒一陽治寒熱瘴瘧益草菓治太陰獨

腸用獨勝之火寒客胃痛散滯氣利膈痰因霍亂瀉

痢噎膈反胃瀉吐酸痰飲積聚解口臭氣酒毒魚肉毒故食料過劑

助脾熱耗氣損胃 闊產名草荳蔻如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁

如砂仁而辛香氣和潤廣所產名菓莫如訶子皮黑厚而稜峭粗而

辛臭雖是一物微有不同類異煖孰收仁用忌鐵

香附名一

莎草根

宣調氣

開鬱

素問中

仍有寒

則氣收

熱則氣

泄各丸

故古人

治瘍多

用五香

連翹飲



性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣

通十二經入脈氣分主一切氣入身以氣為主

真順則平逆則病絕則死矣經曰怒則氣結恐則氣
下高則氣援悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣
耗此七情之氣也以香附為引三焦解六鬱痰鬱火
君隨症而加升降補之藥和

血鬱濕 鬱食鬱 止諸痛通則治多怒多憂痰飲痞滿胸腫腹脹飲食積聚霍亂

吐瀉腎氣脚氣癰疽瘡瘍血凝氣滯所致香附一味未服名獨勝丸治

亦宜服之大凡瘡疽喜服香樂行氣通血最忌臭穢不潔觸之康祖左

乳痛癰又臆間生核痛楚平載禱張王夏投以方薑注製香附為未每

服二錢米 飲下逐愈吐血便血崩中帶下月候不調香氣為血配血因氣行經成塊

行後作痛氣血俱虛也色灰亦虛也色紫氣之熱色黑則熱之甚也錯

經者氣之亂肥人痰多而難阻氣不運也香附陰中快氣之藥氣順則

血和暢然須輔以涼血補氣之藥丹溪曰能治虛病能推陳致新故引血藥至氣分而生血此正陽生陰長之義胎產病能推陳致新故諸書皆云益氣行中有補丹溪曰天行健運不怠所以生生無窮即此以參者佐以甘草治虛怯甚速也

去毛用坐則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎

勞微膠膝童便浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥或炒青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且散薑汁炒

則化痰飲炒黑又能止血息鐵時珍曰得參木則補氣得歸地則補血得木香則散帶和中得檀香則理氣醒

脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼木則總解諸鬱得梔子黃連則清降火熱得荜神則交膂心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則

決壅消脹得紫蘇葱白則發汗散邪得三稜莪朮則消積磨塊得艾葉則治血氣煖子宮乃氣病之總司

則鬱解故服之尤効非宜于婦人不宜于男子也李士材曰乃治標之劑惟氣實血虛大虛者宜之不然恐損氣而驚血愈致其疾矣世俗泥

于女科仙藥之一語惜未有發明及此者

木香 宜行氣



辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝

氣和脾氣怒則肝氣上肺氣調則金能制木而肝平水不尅土而肺和治一切氣

痛九腫心痛痛屬胃腕日寒痛熱痛氣痛血氣濕痛痰痛食痛虺痛淫痛益君心不易受邪

真心痛者手足冷過腕節朝發夕死嘔逆反胃霍亂瀉痢後重同檳榔用劉涓子曰痢疾行血則膿血自愈調氣則

從重白粉瘰癧痰癰氣結瘰癧塊腫毒毒衝脈為病氣逆暴急殺鬼物

無瘰癧美服只實大腸消食安胎胎氣逆則胎不安遺服損其氣丹溪曰味辛氣升若陰火衝上

首反助火邪當用黃柏知母少以木香在之王好古曰本草主氣劣氣不足補也通竅導氣破也安胎健脾胃補也除痰癖癥塊破也下同如

此汪機曰與補藥為佐則補與瀉藥為君則瀉珍口諸氣膈鬱皆屬于肺上焦氣帶用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬于肺中焦氣滯用

之者脾胃膏芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則癃閉肝氣鬱則為痛下焦氣滯用之者寒者通之也番舶上水形

如枯骨味苦粘舌者良名青木香今所用者皆廣木香土木香廣汁用東垣用黃連

霍香

宣去惡氣

製亦有蒸甬麩製用者畏用蜜腸止瀉



辛甘微温入手足太陰脾快氣和中開胃止嘔胃弱

而嘔者忌用去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛崩虛

有寒吐焦壅熱能理脾肺之氣古方有霍香正出氣散正氣通暢則邪逆自除

交廣方並有節葉微似茄葉古惟用葉今枝葉亦用之因寒多偽也


茴香古作

藎香

燥補腎

命門寒

痛



大茴辛熱入腎膀胱煖丹田補命門開胃下食調中

吐嘔療小腸冷氣癰疝陰腫疝有七種氣血寒水筋

經以厥陰肝脉絡陰器也多因寒濕所乾濕脚氣多致亦有挾虛者常加參朮干温散藥中

食損目發瘡小茴辛平理氣開胃亦治寒疝食粒宜之 大如麥粒輕

而有細稜者名大茴出寧夏他處小者名小茴自番舶來實八瓣者名

草

木香 茴香 藎香

卷二

八角茴香炒黃用得酒良得鹽則入腎發腎邪故治陰疝受病于肝見症于腎大小

茴各一兩為末猪脾一箇連尿入藥酒煮爛為丸服

甘松香

宜理氣醒脾

山奈

宜溫中辟惡

良薑

宜燥煖胃散寒



甘溫芳香理諸氣開脾鬱治腹中滿痛風疝齒齲脚

膝氣淨煎湯淋洗出京州及醫藥如茶根根用根

辛溫煖中辟惡治心腹冷痛寒濕霍亂風疝牙痛

生廣中根葉皆如生薑入合諸香用

辛熱煖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛凡心口一點痛俗言心氣

痛非也乃胃脘有滯或有虫及因怒因寒而起以良薑酒洗七次香附醋洗七次焙研因寒者薑一錢附

一錢因怒者附子一錢薑一錢寒怒兼者每錢半米飲加薑汁一匙鹽薑少許服初梁錕患心脾痛夢神投此方一味等分服後人各炒分用

亂瀉痢吐惡噎膈瘴癘冷癖肺胃熱者忌之出嶺南高州子名紅薑

藜蘆
一作

燥除胃
令散浮

熱

烟草
宜行氣
癖寒

慈温肺散其醒脾燥濕消食解酒東垣脾胃藥煎取土炒用



辛熱除胃冷温中下氣消食祛痰治水瀉氣痢下乳
虛冷腸鳴亦九大腸經冷痰惡心嘔吐酸水疔瘡陰疔辛

散陽明之浮熱治頭痛偏頭痛者口含温水隨左牙

痛寒痛宜乾薑藜蘆麥辛和熱痛宜石膏牙疔風痛宜皂角蘆蚕蜂房二烏王痛宜石灰雄黃
肺之火損目 出南番嶺南亦有類椹子而長青色去莖用頭醋浸刮

淨皮粟免傷人肺



辛温骨勞治風寒濕痺滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入
口不循常度頃刻而周一身令人通體俱快醒能使
醉醒能醒飢能飽飽能使飢人以代酒代茗終

甘松香 良薑 藜蘆 烟草 山柰 卷二十一

身不厚故一名然火氣虧耗血損年人自不覺耳
閩產者佳烟筒中水

能解
蛇毒

金銀花

瀉熱解



甘寒入肺散熱解毒清熱即消腫凡物甘寒風養血

止渴丹溪曰癰疽安後發渴黃者六一湯吞忍治癰

瘰癧楊梅瘡腸澀血痢五種尸疰 經冬不凋一名忍冬又名左纏勝

花葉同功花香尤佳釀酒代茶熬膏並妙忽冬酒治癰疽發皆一切惡

不及生者力速忍冬五兩甘草二兩水二碗煎至一碗再入酒一碗畧

煎分三服一日一夜吃盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍

冬丸酒則少兩酒煮晒乾同甘草為末以所煮餘酒打糊為

丸陳藏器云熱毒血刺濃煎服之為末糖調常服能稀痘

蒲公英

一名黃

花地丁



甘平花黃屬土八太陰陽明脾化熱毒解毒治腫

秋帶白乳雞乳頭屬厥陰乳房屬陽明同疔毒亦為

為熱解
毒

通淋妙品 諸家不言治 淋試之甚驗 擦牙烏髭髮 瑞竹堂有還少丹方取其通 泉

塗獨 凡螻螂諸虫盛夏孕有游諸物上必遺情汁乾久則有毒人手 獨之成疾名狐尿刺滲痛不眠百療難功取汁厚塗即愈于金

方極言 其功 葉如蒿花如印如菊 花四時有花 花罷飛絮斷之 葉中有

白汁 鄭方升曰一莖兩花高尺許者掘下數尺根大 如拳旁有人形拱抱搗汁酒服治嘔噎如神

紫花地



辛苦而寒治癰疽瘰癧背疔腫癩無名腫毒 葉如

丁

瀉熱解



柳而細其開紫花結角生平地者羣羣生溝壑者起

毒 瀉熱解



蔓 其寒微毒能破血 一婦產後口渴氣喘面赤有痲大

杜牛 一名天



用牛膝濃煎膏飲下 能止血吐痰除熱解毒殺蟲治

一名精



血一桶小便通而愈 小兒牙關緊閉急慢驚風 不省人

一名地



乳蛾喉痺砂淋 林良方云濃煎加 小兒牙關緊閉急慢驚風 不省人

五...

金銀花

蒲公英

紫花地丁 杜牛膝

...

瀉熱吐
痰破血
解毒

烏風

瀉殺虫

山慈根

瀉熱解
毒

本草綱目

汁入好酒灌之即吐
以醋并酒傳頂下

服汁吐瘡痰

驚風服之亦取其吐痰

液汁止牙痛搗之傳蛇

五整毒

樹白如短牛膝地黃為使

煎湯洗痔瘡



肥肉汁調末服

沈存中筆記云是杜牛膝子

別是一種最

粘人皮有狐氣炒熱則香

尚寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱

心火降則不灼肺而

金清肺則大腸相表裏肺金清則大腸亦清

消腫止痛止咳癰咳風腫

齒痛名之喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解藥諸毒

傳禿瘡蛇狗蜘蛛傷瘰人馬急黃

血熱極 苜蓿如

蓋經冬不凋

牛旁子

一名鼠

一名鼠

一名惡

實

瀉熱解

毒

山慈菴

瀉熱解

毒

漏蘆

瀉熱解

毒



辛平潤肺解熱散結除風利咽膈理痰嗽消斑疹利

二便行十二經散諸腫瘍之毒利腰膝凝滯之氣

性冷而滑利痘症虛寒泄消者忌服

實如蒲萄而褐色酒拌蒸待有

霜拌去用根葉藥竹刀刮淨絞汁密和服治中風汗出乃愈搗和猪脂

貼瘡腫及反花瘡肉反出如花狀



甘微辛有小毒功清熱散結治癰瘡疔腫癩結

核醋磨解諸毒蠱毒蛇虫狂犬傷根與慈菴小蒜

相類去毛殼用玉樞丹中用之廣筆記云出處州遂昌縣淇山無毛少真者有毛誤也

鹹軟堅苦下泄寒熱入胃大腸通肺小腸散熱解

毒通經下乳排膿止血生肌殺虫治遺精尿血癰疽



山慈菴根牛旁子山慈菴漏蘆

貫眾

瀉熱解
毒

發背古方以漏盧湯為稱首

油麻枯黑如漆者真甘草伴蒸連翹為使

及預解時行痘疹毒取其寒勝熱又能八鳴明故也

出閩中莖如



味苦微寒有毒而能解邪熱治毒消中帶下產後血氣脹痛破癥瘕發斑痘上海臟快班散用之化骨硬能軟殺三虫根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳

射干

瀉火解
毒散血
消痰



結砂制永解毒軟堅

以此浸水用中曰飲其水能辟時痰

苦寒有毒能瀉實火火降則血散腫消而痰結自解故能消心脾老血行太陰厥陰之積痰肺脾治喉痺咽痛為要藥搗汁醋和嚙之引涎于結核瘰癧便

毒瘡母

鱉甲煎丸治瘡母用之皆取其降厥陰相火也

通經閉利大腸鎮肝明目

扁竹花根

也葉橫鋪如烏羽及扇
故一名烏扇烏翼
泔水浸一日箴竹葉煎半日用

續隨子


一名于

金子

瀉行水

破血解

毒



辛溫有毒行水破血治癥瘕飲冷氣脹滿惡毒
瘰癧大小腸下惡滯物塗疥癬瘡病多効驗疏曰乃
以毒治毒之功去殼取色白者壓去油用時珍曰續隨子大戟澤漆甘遂

莖葉相似主療亦相似長于
利水用之得法皆要藥也

馬蘭子

一名蚤

實

瀉濕熱

解毒

芭麻子

瀉通竅

拔毒出



其平治寒疝喉痺腫瘡婦人血氣煩悶血運崩
帶利大小腸久服令人瀉叢生葉似薤而長厚結
角子如麻大赤色有稜炒用治痢用醋拌根葉同功
辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治偏風
不遂喎邪搗餅右貼右左貼左即止口噤鼻窒耳聾搗爛細裹塞耳塞鼻

本草綱目

實象 射于續隨子 馬蘭子 芭麻子 卷二十三

有形滯

痺舌服

油作飛

利水氣

治水癥

浮腫

研服當下青黃水

能出有形滯

物治針刺入肉

搗敷傷處

刺出好肉

竹木骨硬

兩研勻以

一稔置舌根

能追

鴉麻子一兩疑水石二

鴉麻自胞胎不下

胎下即去之

鴉麻一粒

巴豆一粒

麝香

分貼臍中

能追

心即收

膿拔毒傳癩癧惡瘡外用

屢奏奇功

能拔病氣

出外故諸膏多用之

然

鴉麻油能引藥氣入肉

鴉麻油

能拔病氣出外故諸膏多用之然

有毒熱氣味頗近巴豆

內服不可輕率

一粒至三四粒

治大風疥癩

吞

去皮黃連水浸每晨用浸水吞

一粒至三四粒

治大風疥癩

形如牛蟬黃褐有斑

鹽水煮去皮

研或油

忌鐵

食菟麻一生不得

食炒豆犯之脹死

仲景

堅腎寒涼血

八陽明血分

腸

治熱毒血痢

治熱

仲景

白頭翁
瀉熱涼血



瘡寒熱齒痛骨痛

腎主齒骨

鼻衄

禿瘡癩癧疔瘰

血

腎主齒骨

痔偏墜

搗傳

明目消疣

有風反靜

無風則搖

近根處有白茸

得酒良

搗傳

王瓜 卽瓜根

瀉熱利水行血



治畧似瓜蔓傷寒發斑用王瓜搗汁和伏龍肝未服甚初

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴飲便數帶

下月閉瘀血利大小腸排膿消腫下乳通乳葉多用之單服亦可

墮胎 根如栝藹之小者味如山藥根子通用經疏曰主

王不留

行 通行血



甘苦而平其性行而不住能走血分通血脈乃陽明

衝任之藥陽明多氣多血除風去痺止血定痛通經利便下

乳催生俗云穿山甲王不留治金瘡止血癰瘡散出竹

木刺孕婦忌之

花如鈴鐺實如燈籠子殼五稜取苗子蒸漿水浸用

甘寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脈行津液利二便

冬葵子 滑腸和緩



消水腫用榆皮等分煎服通關格下乳滑胎 秋葵復種經

白頭翁 王不留行 王瓜 冬葵子

冬至春作子者白冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪入藥 蜀葵花
 赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者泊氣燥亦治血淋關格皆
 取其寒潤滑利之功也

白鮮皮

通祛風



氣寒善行味苦性燥

八脾胃除濕熱兼八膀胱

小腸行水道通關節利九竅為諸黃風痺之要藥味

白鮮皮湯治產後風時珍兼治風瘡疥癬女子陰中
日世醫止施之瘡科淺矣
 腫痛濕熱乘虛客胃
 與膀胱所致 根黃白而心實取皮用惡桑

蝶蛸粘梗茯苓



甘苦性平八足陽明厥陰胃祛風去濕以固下焦
陽

主肉屬濕厥補肝虛去風堅筋骨
風濕去則
 益精明目

通祛風
 補下

魚

腎有二
竅淋症
出于溺
竅濁症
出于精
竅一

土茯苓
通祛濕
熱補脾
用

治風寒濕痺腰痛久令關節老血勝脫宿水陰痿失溺莖痛遺濁痔瘻

惡瘡諸病皆陽明濕熱流八下焦草解能除濁分清古方有草解分清

方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾心因大腸心熱不通水液

只就小腸大腸愈加乾渴甚則身熱心躁忌水即重症也此疾本因貪


酒色或過食辛熱畫賦之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便

時作痛也此便數而痛與淋症瀉而病不同宜用草解一兩鹽水炒為

末每服二三錢使水道朝人大腸仍以葱湯
有黃白二種黃長鞭音
頃洗穀道令氣得通則更收及痛自滅也

白虛軟軟者良蕒以為使長大黃柴胡前胡忌茗醋時珍曰草解蕒莖

主治不甚相道豈一類數種平草
甘淡而平陽明主藥胃大健脾胃祛風濕脾胃健則



營衛從風濕除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨拘
纏楊梅瘡毒楊梅瘡古方不載明正德間起于嶺表

白鮮皮 草解 土茯苓

白欵
瀉火散
結

火寄于厥陰肌肉屬于陽明故也醫經輕粉切劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡即乾愈然毒氣竄入經絡筋骨血液枯槁筋失所養變為拘攣癩漏竟致癩痢土茯苓能制輕粉之毒去陽明濕熱用一兩為君苡仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸
歸七分名搜風解毒癩癧瘰癧云濕氣害人皮肉筋脉是也土茯苓淡能添利從補虛膿疥者用湯代茶甚效
大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種

白者良者煮食亦可生啖忌茶



蔓赤枝有五葉根如芎而長三五枚同菓皮烏肉白一種亦欵功用皆

同鄭奠一日能溫瘡而痢腸風痔瘻赤白帶下

此止痛治癩癧瘰癧而上庶瘡金瘡撲損者同丹皮或半夏為末酒服欵瘡方多用之故名每與探凍耳同黃柏及相須未油調

預知子
補勞瀉
熱

旱蓮草

一名鯉

陽又名
金陵草
補腎

劉寄奴

草

瀉破
止血



苦寒補五勞七傷治瘧疾氣塊天行溫疾

殺虫療蠱綴衣領中凡遇蠱毒則利便健生解生

子如皂莢褐色光潤出蜀中云亦難得

甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏鬚于金云當及時多收其效甚速經疏云性

涼不益脾胃故下金方金陵煎九月薑沐和劑苗如旋覆實似蓮房斷之

有汁須臾而黑慈膏良

甘濕破血通經除癥下脹止金瘡血名眼令人吐利

一莖直上葉尖長糙莖花白莖黃如小菊有白

架如苦蕒翠子細長亦似苦蕒子莖葉花子皆可用

劉裕小字寄奴微時曾射一蛇明目見童子林中搗藥問之答曰吾王為劉寄奴所傷合藥敷之裕曰王何不殺之童曰寄奴王者不可殺也

下直青要草

白敏預知子旱蓮草劉寄奴草

卷三十八

此之不見乃收葉回
每遇金瘡傳之立愈

馬鞭草
傷破血
熱脹殺

穀精草
輕明目

青箱子
一名草
大明



情者熟食之
或作丸茶下

味苦微寒破血通經殺毒消脹治氣血癥瘕瘡陰

腫搗壺甚多方葉似益母對生夏秋開細紫

花穗如車前草類蓬蒿而細根白而小用苗葉

辛溫輕淨上行陽明胃兼入厥陰肝明目退翳之功

在菊花之上亦治喉痺齒痛陽翳風熱收穀後荒

田中生葉似嫩秋花如目星小兎省有者竭羊用一具不流竹刀割開八穀


味苦微寒入厥陰肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳

重疥惡瘡疔子散大者急服能動陽火類雞冠而穗尖

肝
長

決明子

瀉肝明目




藜蘆

宜温中



馬勃

輕解熱
外用傳
瘡



甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾故有決名

名又曰蒼精腫子神光屬腎目華口明狀如瀉

蹄俗呼馬蹄決明擣碎煎蘇大麻仁

辛溫温中明目耐風寒下水氣時珍曰古人種藜爲蔬收子八葉今惟酒

麴用其汗耳以香藜青藜紫藜爲良有查麥青藜紫藜赤藜水

藜馬藜

辛平輕瀉肺名九策上普濟消散血止嗽治喉痺

烟痛吹喉中良或加白礬鼻斲失音外用傳諸瘡良

生濕地朽木上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉田取

烏龍草穀精草青麴子決明子藜蘆馬勃木樨二五

粉用

水漿字

瀉熱外
時治瘡



苦溫微甘有小毒利大腸

瀉痢疳積瘰癧瘰癧乳

雜目消腫毒生肌除

疔

疔入外科

核扁

如蘇綠也搽去油者能毒