

自在壺天

卷之二目錄

三消丸方  
肚腹脹四肢腫  
痰氣填胸方  
虛脹腹大  
十種水氣垂死  
遍身水腫  
臌脹方  
飲食傷脾臌脹  
水蠱方  
撞闌引子  
開鹽方  
隔食方  
隔氣方  
開闌方  
噎病吐逆  
隔噎胃腕乾燥

牛皮丸方  
脾氣受寒腹脹  
積年冷氣雷鳴  
食脹不快  
中滿積塊堅硬  
遍身浮腫肚脹  
氣臌放屁如雷  
蠱脹單腹  
臌脹脾虛有濕  
十蠱三消散  
平胃散  
隔噎方  
橫格方  
哽咽隔噎方  
痰隔方  
牛乳膏

四肢腫脹臍凸  
胸脾痺痰結痛  
中滿腹脹  
腫脹痞滿  
水病腹滿喘促  
單腹脹方  
脾虛臌脹  
血蠱方  
黃腫臌症  
十蠱通証散  
水濕腫脹  
噎食方  
隔氣米食下下  
胸膈壅塞  
隔食隔氣  
食已耶吐

老人噎病  
 反胃吐酸  
 酒色反胃  
 胸膈欬噫  
 痰嗽隔噎  
 婦女乾血  
 經水不止  
 婦人頭痛  
 危急血海  
 治崩疾  
 崩中垂死  
 清海蒼蒞丸  
 經水三年  
 帶下方  
 沙麻白帶  
 陰戶番花  
 陰生氣方  
 人參養血丸

翻胃論方  
 反胃吐食  
 隔噎反胃  
 五仙丹  
 十隔五噎  
 婦人乾血  
 經水不調  
 婦人頭眩  
 婦人眼懸  
 經行遲子宮  
 血崩不止  
 血塊作痛  
 香附散  
 益母丸  
 赤白帶下  
 如聖丹  
 陰挺方  
 濟生丹

隔食翻胃  
 反胃方  
 平鄉丸  
 翻胃隔食  
 補中益氣  
 婦人經水  
 婦人血氣  
 婦人血氣  
 室女經閉  
 崩漏方  
 婦人諸淋  
 白淫漏下  
 漏下不絕  
 白帶方  
 陰茹方  
 陰戶生瘻  
 種子金丹  
 八珍益母丸

女種子丹  
 烏鷄丸  
 婦人下寒不育  
 安胎下寒水  
 胎動下寒水  
 胎傷痛方  
 下生胎死胎  
 舉重動胎出血  
 兒在腹中哭  
 斬鬼胎方  
 催生開骨丹  
 逆產方  
 獨行散  
 產後解痛  
 分後暈死  
 產後血不下  
 陰腫堅痛  
 胎衣不下

神聖散  
 煖燼散  
 胎漏方  
 胎死腹中  
 安胎順氣  
 三月孕防墜  
 妊孕經通  
 交孕遺尿  
 妊孕遺尿  
 解毒藥打胎  
 橫生逆產方  
 產後血塊不止  
 產後惡血不盡  
 失笑散  
 產後心疼  
 產後中心風  
 產後心悶  
 產經數日不下

香附丸  
 七製艾附丸  
 胎動欲墜  
 胎痛下血  
 福胎飲  
 下血欲死  
 妊孕腫至腹  
 胎水早行  
 下私胎方  
 難產方  
 橫胎不下  
 產後惡血攻心  
 產後腹痛  
 橫生并血漿乾  
 產後兒枕痛  
 生產子腸先下  
 產後欬逆  
 乳少方

胃氣下陷陰吹  
濟陰返魂丹引

乳初腫方

吹乳方  
雀斑酒疵

治點方  
痘瘡癩靨

消痘丹

痘不出方

痘症十候方

痘毒方  
痘入目方

小兒痘毒乾黑  
口瘡流涎

乳頭裂方  
如咸四物湯

害乳方  
乳痛晝夜啼哭

乳癰方  
面上紫斑黑點

女真五紅膏  
太真五紅膏

痘不起方  
痘多下成漿

出痘時喊叫  
痘至七日瘡出

痘後生翳  
痘發後生翳

痧發不出  
痧發不出

小兒癩疥瘡

下受單方  
縮金蓮法

乳結核不散  
憂鬱乳內有核

雀斑方  
面上黑黧

養容方  
身面斑痕

痘紫色紅絲  
痘症秘法

發痘方  
紅痘疔

目中痘翳  
咽喉痘瘡

小兒癩方  
小兒蠟瘡

小兒痘瘡積

核陸

小兒疳積肚大  
小兒肚痛  
小兒初生去病  
急驚風  
胎驚方  
痰氣滯喉  
小兒水瀉  
小兒痢瀉  
小兒遺尿  
小兒疳積  
小兒哮喘  
小兒夜啼  
寒裁驚癩胎風  
四歲不能行  
初生小兒無皮  
小兒腎縮  
初生不啼  
初生腰氣痛

久疳天柱骨倒  
小兒肚中生螿  
小兒食粽腹疼  
慢驚風方  
慢脾風方  
小兒吐瀉不止  
小兒泄瀉  
小兒脾瀉  
小兒軟癰  
小兒疳積  
小兒天吼  
小兒諸癩  
小兒乳方  
小兒脫肛  
小兒便閉  
小兒血眼  
小兒腰痛  
腰疼方  
腰疼眼

小兒痞積瘡  
小兒後月蝕瘡  
老鴉驚風方  
急慢驚風  
肥兒丸方  
小兒吐瀉  
小兒瀉痢  
小兒面黃肚大  
小兒重舌  
小兒喉中痰壅  
小兒吃黃土  
小兒疳積  
胎癩方  
小兒諸瘡不止  
小兒大癩  
小兒目閉  
小兒解顛丹  
小兒解固腎丸  
腰疼固腎丸  
神仙透骨丹

濕氣腰痛  
黃疸方  
遍身如金色黃  
黑疸方  
寒濕脚氣  
脚氣攻注  
脫肛方  
寒疝方  
偏墜方  
大小子方  
腎囊併子腫  
木腎不痛  
纏風喉閉  
喉痺雙蛾閉  
喉閉如梅核塞  
咽塞下語

過街笑  
黃病方  
治黃胖  
體氣方  
十二風痺脚氣  
乾濕脚氣  
疝氣方  
孤疝方  
男子陰大如斗  
寒疝腰痛  
大小兒卵便方  
小兒閉塞  
乳蛾閉塞  
雙蛾閉塞  
喉痺破瘡口痛  
喉腫無聲  
喉內生癰  
咽緊急水不

腰脚積冷頑麻  
時行發黃  
酒疸方  
脚氣方  
脚氣腰痛  
脚氣冲心  
疝大如斗  
响疝方  
小膈氣方  
痧痞方  
氣胞木腎水泡  
急喉風  
單雙蛾方  
小兒喉蛾方  
小兒喉痺欲死  
鎖喉方  
喉癰  
下拾

卷之二

○三消丸方

甘遂

木香

巴豆

去壳各一錢

右為末寒粟飯為丸每

服二分虛弱者分半先服五苓散加瞿麥車前

木通

活石煎服後服丸藥消上用陳皮湯消下

用葱白湯隔一日進一服三服止若動三五次以冷

粥補消完後用白朮

三兩

陳皮

三兩

甘草

三兩

厚朴

一兩

皂礬

三兩用麩炒盡烟或用醋炒三五次

同藥研為末醋糊丸梧

子大每服五十九米湯下每日進三服忌惱怒煎炒



無鱗魚諸般發物連服四十九日全愈

○牛皮丸治腹中水响如雷上攻耶嘔吐胸膈脹

滿手足作腫方

黑丑頭末

木香

陳皮

各九錢

為末黃蠟化開為丸

每服三十九黃酒下

○秦越人治四肢腫脹臍凸出見諸惡症臨危方

大戟

白丑

木香

等分

為末每服三錢以猪腰子

一對切開入藥在內燒熟空心食之如食左塌左食

右塌右如未全塌於腹上達臍塗甘遂末飲甘草湯

少刻其腫盡消大戟用紅芽者

○牽牛妙酒肚腹脹四肢發腫不問水氣腫濕腫

神效

乾鷄屎一井炒黃好酒三碗淬下煮至一碗細絹去渣飲

之利不盡再服如行不止大田螺肉二個執酒綽效

食之即止溫粥調理峩嶠山老僧治人三服後少頃

氣動作响大利即臍脚先綱其腹即消

○治酒色過度夏食水果取涼太過脾氣受寒腹

脹方

丁香 木香 官桂 煎服健脾和胃肺氣下行耶

愈若用寒涼則重傷

○又方

活鯽魚一個麝香一錢搗成泥頓熱敷臍上布扎手

摩瀉忌鹽百日 又狗腦入麝敷

○胃脾痺痰結痛徹心背痞滿喘效方

瓜蒌子丸服或同薤白煎酒服

痰氣填胸方

銀硃同明礬丸服

○治積年冷氣雷鳴男女氣脹冷熱相攻方

厚朴姜汁炙研末米飲日服厚朴能消痰下氣除脹滿破宿血化水穀

○中滿腹脹且食不能暮食方

猪血晒研酒服取利

治虛脹腹大方

胡椒同全蝎丸服 又全蝎燒灰入麝米飲服

○治食脹滿不快方

用鹽棗子溫水漱嚥二三次即消 敗瓢酒炙三次燒

服治中滿蠱脹 劉寄奴穗為末酒服治血氣鼓滿

綠萼同蒼木丸服名伐肝丸消積滯燥脾濕除脹

滿平肝 鼠粘子 炒末 每服二錢日三次除風利小

便風水身腫欲裂 亭歷子為末寒肉丸服治通身

腫滿 亭歷子同防己末以綠頭鴨血和丸服治陰

水暴腫喘渴尿溫效 茅根同赤小豆煮食治虛病

後飲水多小便不利作腫服此水隨小便下而安

人中白煎令為丸每服一粒治水氣腫滿 續隨子

日服十粒治肺中水氣如下水再連 葱白煮汁服

治水廕病如病已因爛搗坐之取水氣自下 砂仁

同土狗等一個空研和老酒服治遍身腫滿陰腫 榆

皮屑同米作粥食之小便利治身體暴腫

○不換金治腫脹痞滿

木香

胡椒

牙皂

巴豆壳

此味不瀉而寬中有巴豆之功無巴豆之

毒醋糊丸梧子大每服三九或六九湯送下

○又方

名金陵酒丸

真沉香

一兩

牙皂

一兩

廣木香

二兩五錢

換柳

一兩

右為

末南京燒酒蒸丸每服三錢重者四錢五更燒酒下

水從小便出氣放屁再加亭歷煎酒送下

○治十種水氣垂死方

以青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令極

熟作粥食

治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不

安大小便澀滯上氣喘促遍身虛腫方

厚朴

黃芩

益智

草薹

當歸

各五錢

黃連

六錢

半夏

七錢

廣茂

升麻

紅花

炒

吳茱萸

各三錢

甘草

生柴胡

神麴

炒

澤瀉

青皮

陳皮

各三錢

渴加葛

根四錢

每七錢姜三片煎服

○治十種水病腹滿喘促方

蝼蛄

五枚  
焙研

湯服五分重者一錢

或每日灸食十枚

或同大戟芫花甘遂服 或同輕粉嗅鼻皆消水

病 又猪腎包甘遂煨食治下水

治遍身水腫方

壁上喜蛛連窩新瓦灸研細酒調服一服全消

○玉塘散治黃腫遍身浮腫肚腹脹

大壁墓

一個

用甘遂末填滿肚內用線縫之新瓦蓋

黃泥封固大火煨冷定取出為有一兩對甘遂末一



兩研勻每服三錢空心米湯下或酒下即消如肚皮  
皺用皮硝煎水洗

○治鼻腹臃脹方

地膚子 薤子 蘿蔔子 車前子 蘇子 各四兩 獨

蒜 二十枚 裝入猪肚內 洗淨者 連子煮爛搗丸梧子大每

服三錢白湯下日進三次

又方

亭歷 隔紙炒苦 細末二錢無根水下

○又方

沉香 九分  
木香 一錢  
乳香 二錢  
白豆蔻 一錢  
末肉丸

每服五分淡姜湯下

○又方

猪牙皂角 七錢去皮 木香 三錢五分 為末燒酒丸如

菜豆大每服一錢重者二錢

○臃脹方

蟹蟄 一個劈作對半記分左右各 芍藥 陳芫花 各

錢 為末斫蟹蟄入藥搗勻各入藥頓停當礞炒黃黑

為末右半消左空心姜湯下待行三四次方食忌葷

鹽房事百日愈後用鷄肫皮三個為末空心酒下方  
後開鹽此症針灸過者不治

○又方

沉香 木香 亭歷 南星 砂仁 枳壳 小茴

海粉 陳皮 澤瀉 防已 檳榔 莪朮 三稜

大茴 各三錢 大戟 芫花 甘遂 玄胡 各二錢五分 乾蟾

一個去 存性共為細末若血盡加 桃仁 紅花

肉桂 五靈脂 各三錢 葱姜汁打糊為丸如麻仁大

每服三錢五分一日消頭面胸姜葱湯下二日消腹

蘿蔔子湯下三日消下身姜葱酒下忌鹽等物

○又方

良姜 一兩 生姜 七錢 共搗汁露一夕次早加蜜少許

入汁內連碗入鍋內少頓空心服下過三個時辰吐瀉出黃水其症即愈神效

○又方

陳苦葫蘆 一個 開一孔入好酒令滿封固埋土中一  
七針刺葫蘆底漏下酒空心飲一小盞水出消忌鹽

百日

○又方

韭菜

五觔

香附子

一觔

石臼搗極爛炒熟圍腹上漸

消漸下無不愈者真起死回生之妙藥也  
冷天熱用

又方

大蠶墓

一個

新瓦兩箇相合麻繩纏定盛在內  
鹽泥

固濟厚令慢火燒之成灰存性  
溫酒調服三五錢

○又方

蝼蝨

七個

搗爛和麪作餅裱貼臍上  
出水數次愈

○又方

大蟹墓 一個 以蘆管入口內將砂仁灌滿為度用泥封固火煨透令紅烟起取出候冷去泥研末酒下或陳皮湯下 或將松蘿茶一兩配末服

○又方

癩蟹墓 三四個 砂仁 一兩 納入犍猪肚內好酒煮一伏

時去墓將肚酒分服盡大便屁出如雷或者水下其腫自消又有一歲加胡椒一粒更妙 再用活蟹墓一個隔青布安臍上以大碗蓋之一炷香為度其墓

收脹氣而死七日無不愈者專治腫脹滿又蠶腹

入胡黃連五錢如能食者一次服完後用補劑

○又方

獨蒜三觔雄猪肚洗淨入蒜縫之水五六觔煮蓋固

勿洩氣俟乾住火陸續酒下完愈

○氣蠱放屁如雷方

蘿蔔子五兩巴肉四十九粒同炒黃去巴豆不用加巴豆

壳一兩同末每服一錢姜湯送下後用糕糊丸每服

一錢五分

脾虛膨脹手足倦怠短氣溇泄方

以六君子湯主之

○飲食傷脾膨脹大安丸

查肉

二兩炒

白朮

炒

神麴

炒

半夏

製

茯苓

各一兩

陳皮

去白

連翹

蘿蔔子

生用各五錢

丸服

○治蠱脹單腹中滿五子十皮湯

大腹皮

五加皮

茯苓皮

青皮

牡丹皮

甘

草皮

木瓜皮

木通皮

姜皮

地骨皮

山查

子

亭歷子

炒碎

蘿蔔子

炒碎

蘇子

炒碎

車前子

炒碎



錢各一 姜一片 燈心二十根 空心服 又或將五子十

皮為細末 各一錢 五分 用不下水 雄豬肝一個 先以溫水

煮一滾 用竹簽鑽數孔 入藥在內 蒸熟 切片 搗蒜 蘸

食 不過二個 永不發矣 內青皮是 草果皮

○雞屎醴散治血蠱

大黃 酒潤 桃仁 去皮 白雞屎 酒炒 等分 共為末 每服三錢

姜湯下

○治水蠱方

木通 二兩 炒 滑石 四兩 飛 右為末 姜葱車前三汁各一小

鍾打米糊為丸梧子大每服五十九五苓散煎湯送  
下日進二服二三日自從小便出此王道之藥

○臃脹脾虛有濕方

真茅山蒼朮為末清晨米飲調三錢久之復舊

○治大人黃腫臃症小兒疳積肚大方

新鮮地骨皮不拘多少勿犯鐵器以木石搥碎去心  
不用再用好生酒二碗執滾入骨皮三錢復滾水頭  
孰服之症重者三服無不愈也神妙

撞關引子

烏藥 一錢 香附 一分 砂仁 八分 三稜 白豆蔻 甘

草 各五分 丁香 沉香 各二分 水煎或末服用此衝開關

格使氣通而滿自消

○十蠱三消散 與後藥間服

大蝼蝨 一個 大戟 芫花 各三錢 右為末將蝼蝨破作

二塊研爛左消左右消右石銀器內盛藥好酒調服

忌房事油腥鹽醋等百日

十蠱通証散

大戟 甘遂 麻黃 烏梅 葫蘆巴 亭歷 芫

花 黑丑 細辛 防已 蝮蛤 陳皮 桑皮

細末服一錢或二三錢量虛實五更生姜湯晾過溫

調服忌鹽醋

○開鹽方

蒼耳子 二兩 煎湯露一宿次早加砂糖溫服

○又方

澤瀉 赤芍 白朮 茯苓 等分為末 鯽魚腸一個去鹽

麝少 入藥焙乾為丸每服三錢姜蚕煎湯下

○又平胃散

用鹽四兩和勻用箸包火煨結成塊食菜當鹽用

○治水濕腫脹方

白朮 澤瀉各一兩為末丸服三錢白茯苓湯下

○隔食方

紫玉簪花根重五錢五分細酒五觔半煮一炷香一伏時每

日三鍾早中晚三次下飲時以壺嘴吸入不可粘牙

○又方

蘆根汁 蔗汁 姜汁 牛羊乳 蜜少許煉膏服

又方

青皮 陳皮 枇杷葉 去毛炙 每三錢煮酒一鍾煎服後以碎米煎粥將熟入藥再煎一沸服

○又方

蕎麥稽 燒灰 熬汁成膏用水去火毒每服二三匙白滾湯半茶鍾化勻徐服即解索稀湯粥米湯二小鍾不可多食

○又方

千葉白木槿花樹葉一大把煎湯大碗緩送下立時開闔消痰進食冬月用此葉末三四錢米飲下萬

效若有白槿花瓣為末每服二錢白米湯下三五口  
不轉再服別藥

又方

蒼蠅虎

四五個

浸燒酒一觔隨意服下三觔全愈

○又方

犬屎中淘出骨屑瓦上陰陽焙黃為末酒服三錢一  
服便開關

○又方

五穀虫

炒黃

研細末酒送下即開關再用回生丹

急性子 二兩 礪砂 二錢 水一鐘煎乾聽用

○又方

散入厚酒罈中鹽泥封固用黑牛屎作火燒三晝夜  
令火氣不絕取埋土一週時用時將瓶打破研細末  
每四五茶匙白滾湯下十餘服即愈

○又方

開喉劍 即芝蔴根也 其向東行者勿令人知取來切片靜

室中用好淡醋炒七次勿令婦人見餘醋一盞次早  
五更向東燒執醋病者亦向東服之或分服三日完



以其渣去過屋後食肉粥一月

又方

鷄肫皮二十個每服七個烘乾細末蜜水食盡愈

○又方

五靈脂一兩沉香五錢木香五分麝香五分檀香五分

共為一處為末狗胆一個合藥成膏黑鉛四兩打成

盒盛之埋土中七寸深朝日以滾水湯淋七日方取

出用磁罐盛貯火酒送下三服全愈

○隔噎方

噎病在咽嗑主於氣有痰積瘀血及虫

冰糖 三觔 任意食之糖完愈 又壁虎煮酒服之愈

○又方

用水老鴉一隻取喉頭骨并食袋頭下彎骨新瓦焙  
脆為末加青黛 五錢 每三五分數服即愈

○又方

白蜜 半觔 捷猪板油 半觔 共入瓦罐重湯頓化文武  
火煮三炷香取看未化盡再頓濾去渣與皮膜浸晨  
無灰酒化下數錢執如不用酒白滾湯下每日一次  
不可間斷二三日即善飲食神效

○又方

鉄糞打碎如米大洗淨研如麵再加山查一兩蘇子

一兩蘿蔔子一兩菘豆一兩共煎濃汁入前鉄末四兩

共入砂鍋內文武火煮三香如乾加水煮取出炒乾

加白冰糖一兩晚米鍋粬一兩細研磁罐收貯每服

三四錢陳米湯調下此開闕至寶也

噎食方

桔梗 苦參 甘草等分極細末以碗盛密滾水浪

過滴水為丸如龍眼大陰乾每日靜坐去妄想取一

九啣舌下任自化一日含五六丸為度

○又方

雄鷄肫皮不落者取新瓦焙微乾去砂土再炒褐色研細末服三釐日三十次效梅核氣更妙

○又方

蟬退五個五穀虫三錢每用一錢入鷄蛋二個攪煎

熟空心酒下

○又方

黑鉛剪如豆大打成小片又用硫黃四兩將硫一層

鉛一層納於鉄鍋內層：安放武火煨煉硫盡成火  
用鉄鏟炒之其鉛化為黑末取出用上好火酒半鍾  
調藥一錢以執饅首去皮蘸而食之神效

○又方

鳳仙子酒浸晒研酒丸服 又蕎麥稽灰淋取城同  
硼砂服 韭汁入鹽飲 又頭垢以醋漿煎膏用之  
立愈 又蘆根五兩剉細水二鍾煎一鍾溫服

○又方

白蘿蔔子 蘇子 白芥子 各五錢 山查子 香附子

錢各三 共為末合一處作芥末食

又方

蘇子

研細

廣橘紅

二分

麥冬

去心

白芍藥

酒炒

枇杷

葉

去毛刺 刷淨

查肉

三錢

白蔻仁

四分

先嚼下人參

三錢

逆水蘆根汁一大盞河水一鍾半同煎至七分

加姜汁三匙竹瀝一盃饑時服

○又方

烏梅

一個

入蜒蟬

大者一條

外用濕紙包十數層微煨紙

乾為度蓋地上出火氣去紙含嚥忌口

○隔氣方

木香

沉香

各二錢

研末鵝血三匙調勻黃酒服

○又方

老狗一隻含枚細嘴縛定倒掛出涎用大附子一個  
重一兩二三錢者咀片放在涎內煮乾搗爛加硃砂  
一錢麝香二分為丸與病人嗅又放在口內畧噙濕  
取出手瘥又嗅如此嗅二三日即愈

關格似噎而與噎稍異胃中覺有所碍吞吐皆  
妨此為橫格方

宜用二陳湯吐之

○一妙散治男婦隔氣米食不下遠近皆效

糞蛆

能出石灰  
圖外者

可用陰陽瓦焙乾末三分好酒下又

或用蛆末

一兩

加肉豆蔻

三錢

木香

一錢

細茶

五錢

共為末每服三錢火酒下

開關方

沉香

木香

糞螿

油煎枯  
黑色

兵鷄內金

等分

空心火

酒下三分開後用童便好酒各半鐘調勻服下

○哽咽隔噎方



蜚螂 三個水漂三加麝二分 研細末每服一茶匙滾

下送服即愈用粥四十九日不用飯

○治胸膈壅塞開胃化痰軍門方

半夏 洗淨焙乾 為末以生姜自然汁和為餅子用濕紙包

於慢火中煨令香熟水二盂用餅一塊如彈丸大入

鹽半錢煎取一盞慢服能去胸膈壅塞大壓痰毒又

治酒食所傷其功甚效

治噎病吐逆飲食不通方

紫蘇 二兩 白蜜 姜汁 各五 和勻微火煎沸每半匙

空心細服之 又研砂含服

○痰隔方

研砂 一兩 香附 一兩 同研砂炒取白 貝母 五錢 同砂

為細末山查煎湯每服一錢調送下

○隔食隔氣方

黃母雞 一隻 四五 去毛及腸胃砂鍋煮極爛去骨取

年者佳

汁入黑豆一升煮爛取汁復入白蜜煉過滴水成珠

者八兩再熬成膏以罐盛之每晨服三茶匙以白水

調下午服二茶匙晚服一茶匙服完其氣自順臟腑

自榮上下隔塞大便不枯 但飲粥若或多雜菜則吐以涼膈散加桔梗主之

○老婦患隔噎胃腕乾燥方 此屬血虛有熱投以五汁湯

蘆根汁 藕汁 蔗汁 牛羊乳汁 生姜汁 少許

餘各半盞重湯煮溫不拘時徐服之

○牛乳膏潤胃化痰生津養血 何仁元集中方

梨汁 蘿蔔汁 人參煎汁 麥冬汁 橘紅 煎汁 鹽水

每汁各一碗和熬少時加入牛乳二碗如無牛乳人乳亦可再熬將稠入蜜半碗熬成膏取起冷定嚙化

○食已即吐大便結方

大黃同甘草煎服

○治老人噎病心痛膈氣結飲食不下桂心粥方

粳米 四兩 先以米煮半熟次入桂末調和日一服亦

破冷氣殊效

翻胃論方

翻胃大約有四血虛氣虛有熱有痰蕪病必用童便  
韭汁竹瀝牛羊乳姜汁氣虛入四君子湯右手脉無  
力 血虛入四物湯加童便左手脉無力切不可用

香燥之藥若服之必死宜薄滋味 治反胃用黃連  
前方 有痰二陳為主寸關脈沉而大 有氣宜開  
滯導氣之藥寸關脈沉而瀉 有內虛陰火上炎而  
反胃者作陰火治 年少者四物湯清胃脫血燥不  
潤便秘故格致餘論甚詳 年老雖不治亦用參朮  
關防氣虛胃虛氣虛者四君子湯加蘆根童便或參  
苓白朮散或韭汁牛羊乳或入駝驢尿又有積血停  
於內而致當消息逐之 大便溼者難治常令食兔  
肉則便利 年高糞如羊屎不治大腸無血故也

翻胃方

丁香

木香

各一兩

每服四錢煎先以黃泥做成碗瀝

汁於內食前服

○又方

真桑黃

三錢

研末好酒調服

○又方

前胡

半兩洗淨

入臼內搗碎將好白酒

五兩

同放砂鍋內

封固重湯煮三香取出伏火三日每日二次空心服

又方

蜂蜜 不拘多少 隨意日服三杯此治腸胃枯澀者妙

又方

附子 一枚去蓋剉 納丁香 四十九粒 復蓋之縛好砂器中

浸以生姜自然汁及蓋而止慢火煮乾細末錢匕搯

舌上津吞下煩渴食粥糜忌口

○又方

真正白合 其形瓣：瘦長倘瓣上有痕如線勒一條似葫蘆者即非真百合名為倒垂蓮無用

惟真百合其花夜蒜頭一洗淨各入捷猪肚內縫密更

以荷葉包紮煮爛一併食之神效即日吃粥

○又方

五靈脂 為末 狗胆和丸米湯下

又方

不榨糖精 四兩 生姜 二兩 共搗成餅陰乾再搗為末  
每末二兩和甘草末五錢合勻每服三錢粘米湯下  
三服愈

○又方

蟻螂不拘多少洗淨新瓦焙乾為末每服五分大黃  
湯下即效



○又方

乾柿餅同乾飯日食之總不湯水遂愈柿宜連蒂

○又方

近山黃牛糞尖三個燒灰存性砂糖酒調服不宜令病人知之

○隔食翻胃方

粉草

五錢姜汁煮乾

五靈脂

五錢火酒煮乾

等分搗膏酒冲服

○又方

隔食翻胃疾極沉壯蠟枯礬抵萬金砂糖為使服一

次免君愁悶解憂心

螞醋煨滓七次水飛過枯礬少許細末砂糖調服五分重一錢

○又方

蓬朮

大腹皮

木香

蟻螂

等分

共為細末每服

五分好酒送下二三服效

○又方

上好黃丹

八兩以水飛淨

用黑狗胆為丸每丸重

三錢五分

外用

真金箔貼滿一胆可丸四九臨服分作三塊空心滴

燒酒送下過一時方可進食存二塊過三日再服一

次一九可救一人永不發

○又方

薑汁 二兩 姜汁 五錢 竹瀝 半盞 牛乳 一盞 童便 一盞

和勻頓執服 一又單用牛乳不必成塊酒頓亦大補

中風病後及胃弱不能食者

○又方

靈砂 水銀硫 煨成者 白蔻 砂仁 炒 核桃肉 去皮 官礪 八分

古錢 一枚煨紅 薺汁 內七次 共末每服三四釐男左女右置

手心中舌舐之少頃即服山查膏湯汁一鍾每日三

次自然進食不轉

○反胃吐酸方

薄荷 四錢 水煎服

○反胃吐食方

螺螄 一斗 水浸取泥晒乾每服一錢火酒調下

○又方

乾柿 三枚 連蒂搗爛酒服甚效切勿以他藥雜之

○反胃方

白砒 雄黃 硫黃 俱明者 五月五日合為丸先於

午前擇淨麵為條淨鍋清水煮熟取一條投壁上

落為度候到午時將熟麵搗藥丸如圓眼大用竹簽  
線尖頭鑽入丸內陰乾收貯用時薄荷湯漱口淨將  
圓藥含在口中垂線於外待津液滿口即仰面將藥  
丸提出其津液作三口嚥下病輕者一次重者次日  
又如法含之不過三次其藥用薄荷湯洗淨收貯

○酒色反胃方

新溫牛乳細：飲之若仍有酒毒即口乾間以蔗汁  
與之

○隔噎反胃方

沉香 丁香 木香 各一錢  
黑丑頭末 八錢  
大黃 酒製 八錢

枳壳 半夏 姜製 各五錢  
胆星 礞石 硝 五錢  
五錢 研各

以上共研勻每服五分火酒送下三服開關務要留

神不可多飲多食若猛食傷胃則不可復救

○平鯽丸

大鯽魚 一個去腸留鱗以大蒜去皮切片填滿魚腹濕紙包

黃泥固濟慢火煨熟去鱗骨入平胃末杵丸梧子大

每服三十九空心米飲下

治反胃隔噎方

韭菜燒熟鹽吃十頓 又畢澄茄吐出黑汁者米糊

丸服 又鷄腕脰皮燒研酒服

○胸膈欬噫連至四五十釵方

姜汁和蜜煎服三次立效亦擦背浴兒 荔枝七個燒末

煎入少醋服亦妙 治呃逆用蜀椒炒研糊丸酒下

○五仙丹治噎食翻胃諸般氣痛如神

白砒菜豆水 巴豆去油 枯礬 明雄 半夏姜煮 俱

為末姜汁打糊為丸小米大每用半分輕者一服重

者三服大人七粒小人五粒冷茶送下忌諸腥物

○翻胃隔食隔氣方 並治蠱脹

鯽魚 一個重半斤 破開洗淨 用松子肉塞滿縫 飯上蒸熟 食一

二個即愈

三白酒治痰嗽隔噎反胃消食去痰順氣

梨汁 白蘿蔔汁 米糖 同入頭燒酒內常服令

人強健脾胃久之倍常肥暫

○十隔五噎方

用平胃散 內蒼朮用酒浸一 鯽魚 一個去腸胆 將藥入魚

內麪包煨熟共搗如泥丸如梧子大每服三四十九



砂糖湯下

○補中益氣湯加減方

黃耆

勞後病甚可用二錢人參一錢嗽者減去一錢灸草一錢以五分嗽者減去一錢

除脾熱肌歸身一錢酒洗焙乾柴胡半錢引清氣行

陳皮

藥半錢以導滯氣又同諸白朮半錢升麻三分

葛根

半錢如渴用一方有白芍半錢秋紅花三分少

加黃栢

水三分以救腎右作一服水煎午前執服

若頭痛加曼荊

一分錢若頭痛甚加川芎五分

頂痛腦痛加藁朮

五分細辛三分諸頭痛併若頭

痛有痰沉重懶倦者乃太陰厥陰頭痛加半夏或半錢

錢姜三片若耳鳴目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後

臑痛面赤脉洪大者加羌活一錢防風七分甘草三分

藁本五分通其血脉加黃連黃芩各三分消其腫若噤痛頷腫脉

洪大面赤加黃芩三分桔梗七分甘草三分若口

乾咽乾或渴者加葛根五分并胃氣上行以潤之若心下痞脅

悶者加芍藥黃連各一錢如痞脹加枳實三分厚朴

七分木香三分砂仁三分如天寒加乾姜如腹

中痛加炒白芍半錢炙甘草如惡寒覺冷痛加中

桂 半錢 如夏月腹中痛不惡寒不惡熱者加黃芩

五分 芍藥 一錢 甘草 五分 如臍下痛加真熟地黄

半錢 如胸中滯氣加蓮花青皮 一二分壅滯可用氣促少氣者去之

如身龍重痛乃風濕相搏加羌活 半錢 防風 半錢

升麻 一錢 柴胡 半錢 藁本根 半錢 蒼朮 一錢 痛如

大便秘澀加當歸稍 一錢 若久病痰嗽者去人參

冬月加不去節麻黃秋涼亦加春月天溫只加佛耳

草 三分 欬花 加一分勿 若初病之人雖痰嗽不去人

參亦不增添 如食不下者或胸中有寒或氣滯加

青皮木香陳皮寒月加益智仁草豆蔻夏月加黃芩  
黃連秋加檳榔砂仁如心下痛痞加芍藥黃連  
如腹脹加枳實木香砂仁厚朴天寒加生姜肉桂夏  
加乾葛黃芩白芍冬加益智草豆蔻半夏如脇痛  
或縮急加柴胡甘草如臍下痛加熟地不已是寒  
加肉桂如大便秘結加當歸外加黃芩如腳弱  
或痛加黃柏不已加防風如氣浮心亂以硃砂安  
神丸鎮之右此方加減之法乃飲食勞倦喜怒不  
節之症若症屬執中者宜用此方若症屬中寒者則

此方中人參甘草白芍能益其病不宜用此方

又加減法治內傷心下痞如脈緩有痰而痞加半

夏黃連如脈弦四脈滿悶便難而心中痞加柴胡

黃連甘草如大便秘燥加黃連桃仁少加大黃歸

身如心下痞腹脹脅悶者加白芍黃連如心下

痞中寒者加附子黃連如心下痞腹脹加五味子

白芍砂仁天寒少加乾姜或中桂如心下痞嘔逆

者加黃連生姜陳皮如冬月加黃連少入丁香如

伏火者去人參以防痰嗽增益耳長夏濕去客邪

太旺加蒼朮白朮澤瀉上下分清其濕熱之氣如濕痰太盛

主食不消故食減不知穀味則加麩清之加五味子

麥冬取人參瀉火益肺氣助秋損也在三伏中為聖

藥如脇下急或痛加柴胡甘草人參或唾或多

白沫胃口上停寒也加益智仁或胃腕當心痛加

草豆仁三分疲甚之人用人參黃芪白朮有用一兩

二兩者

○女人乾血方

絲瓜穰燒為末服七錢酒下不通再服三錢即通

○治婦人室女乾血癆方

用川大黃

二三四

同蘆柴根切寸許長炒根焦去之又

添新鮮者又炒如此三四次去根存大黃聽用每料

炒過大黃

六錢

生大黃

四錢

遇病者每服二錢空心

黃酒送下渾身如蟻行之狀即通不必服矣

又方

綿灰服二錢亦妙

○掌中金治婦人乾血氣方

穿山甲

炮

草烏頭

牙皂

苦丁香

苦亭歷

川

椒 甘草 白附子 巴豆 一錢  
合用研為細末生  
姜絞汁為丸彈子大每用一九新棉包定陰中一日  
即白二日即赤三日即血神效

○治婦人經水久閉方

益母草 四兩 紅花 三兩  
為末好酒送下三錢

○又方

馬鞭草陰乾為末每服一錢當歸紅花湯下如此三  
次不通加桃仁七個即通

○又方



鼠屎為細末去灰塵焙每一錢廣木香麵四分空心酒服

又方

巴豆去油如菜豆大三九以煤炭末一錢調湯送下

耶通

○又方

真麻油白蜜各一鍾共合磁罐內重湯煮一炷香空心

輒服 又亭歷納陰中耶通月水

○又方

蕎麥麩 金縷大黃等分為末或二錢或三錢用銀  
看病淺深及血氣何如

罌調之童便蜜送下或酒亦可三服為妙大便如猪  
糞小便如蘇木水為度

又方

多取蜒蟥連壳搗爛加陳醋少許敷臍紙掩絹帛紮  
坐少頃肚內作痛用有力女人抱定候藥力週自通  
方可去藥甚妙

○又方

婦人經水不能通鼠屎生來大有功熱酒調服逢扁  
鵲只消一服顯神通

○又方

蚕沙

四兩炒黃色滓入無灰酒一壺

於砂鍋內沸過取起以磁罐盛

之去砂溫飲一鍾

經水不止方

黑豆大炒焦沖酒服

○經水不調方

茜草一兩煎酒服

○治婦人血氣刺痛連於脇膈方

玄胡索

一兩為末炒香清酒一升滓入溫服

○治婦人血氣痛兼血塊經閉心腹痛串氣方

生漆乾渣炒盡烟每酒下二三錢有漆漆罌煮乾亦

可

○婦人心頭痛方

蘇木泥冲執酒服之

○婦人頭眩眼懸方

鷄子七個艾葉七片童便一碗好酒半碗煮半日一

夜次早空心服二個次日又二個次日三個即止

○治婦人血瘕方

輕粉一錢 雄黃七分 獨蒜七個 搗膏先以布護患處

後敷藥扎護其患化黃水而愈

○危急血海敗方

細茶 木耳 槐花 炒黑各一錢 無反酒下即止 隨服鷄

蛋一個不可睡倒臨危可救

○經行遲子宮冷方

當月之時蘄艾煮鷄蛋每日空心酒食二三枚烏鷄

蛋更妙能調經受胎止帶

○桃花散治室女經閉不通五心煩執

紅花 當歸 土牛膝 桃仁炒去皮尖 三錢酒

○治崩疾方

貫衆炒末每服三錢酒送下 又桂燒灰酒調下

○又方

隔年陳香圓

去穰鍋內焙存性

細末二錢好酒空心送下

○血崩不止方

甜杏仁上黃皮燒為末每三錢空心熱酒下

○又方

荆芥炒黑 黃芩炒黑 入好酒二碗秤錘燒紅滓酒

飲名雷火酒

又方

防風炙焦為末每二錢白麴五分酒調下

○又方

棉花子燒存性酒服三錢

○又方

五靈脂半生半炒酒服或為末熬膏入神麴丸服  
燒存性鉄秤錘淬酒服

○崩漏方

拖不出鷄蛋黃泥固濟煨存性酒服

○又方

香附炒極黑為末酒下三錢又二服

○又方

槐花萼燒灰細研食前溫酒服二錢

○崩中垂死方

羊肉煮當歸地黃乾姜服

○琥珀丸治血塊作痛

氣塊下  
可用

乳沒

血竭

各一兩

當歸

一兩五錢

木香

沉香

各三錢

琥珀



二錢 丹皮 一兩 生甘草膏丸 肥皂子 大硃砂 為衣 每

一丸 酒下 立效

○治婦人諸淋方

土牛膝 洗淨一握 水五碗煎一碗去渣入乳香末少許

服下砂石剥之有聲

○清海蒼莎丸 治肥人痰多占住血海地位因而下多者目必漸昏

南星 蒼朮 川芎 香附 作丸服之

○香附子散 治血崩不止面色黃血刺痛不可忍小產血不止一名倍金散許學士治

香附子 不拘多少炒去毛搗碎再炒黃 為細末 每服三五錢好酒調

下能破血積米飲調下能止血冷氣姜湯下  
能止帶艾湯下入醋少許婦人一切諸疾並治之  
粥飲下

○治白淫漏下經水不利子腸堅癖中有乾血方  
白礬燒研同杏仁丸納陰中

○治經水三年不行方

瓦松即屋遊土牛膝歸尾等分瓦上焙焦存性為末

先一日白水調服七分五更再進一服

○益母丸

益母草

連根葉乾末六升

當歸

一兩八錢酒浸炒乾

白芍

一兩酒浸炒乾

人參

一兩八錢飯上蒸三次炒乾

廣木香

七分川芎

三錢

蜜二觔

將藥

搗為細末煉蜜為丸彈子大每服一九

製時勿用銅鐵器

○香附丸

香附

醋煮晒乾十二兩

當歸

酒洗

芍藥

姜製

生地

酒製

熟地

酒製

蘼艾

醋炙晒乾

阿膠

妙成珠明者佳

葛粉

以上各二兩

共為細末

醋糊為丸如梧子大每服六七十丸黃酒下

○治婦人漏下不絕赤白令人黃瘦虛渴方

地榆

三兩切片細

末醋一升煮十沸食前服亦治吐血

○治帶下方

鷄冠花晒末空心酒下三錢 又水和雲母粉服之

○又方

猪腰子一個 竹刀劈開入硫末 三分 濕紙包四五層  
煨熟再用白菓十數個搗汁沖酒下腰子即好食

○治赤白帶方

葵花陰乾空心酒下二錢三服除根

○又方

鮮益母花末每二錢溫酒調下

○又方

石燕一枚磨水服立效

○治白帶方

麦麩

半升篩  
極細者

鷄子清搗丸空心服六十九

○又方

胡椒

硫黃

各半

為末鷄蛋一個入之封頭煮熟空

心酒下

○又方

鷄蛋

三個

酒

三碗

花粉

二兩

煮至一碗去花粉食蛋

酒重者二服見效 又銀杏去皮壳煮湯不時飲之

○又方

青餅燒研末白酒吞三錢三日愈便白米湯下

○又方

蛇床子同枯礬納陰戶中

○治沙淋白帶三十六疾方

貫衆 不拘多少 炒黃色取起配合冬米 五兩杜仲 十兩 再

炒米黃黑色取起冷定為末蜜丸白者酒送下赤者

白湯送下每服三錢如初次太函服藥末三錢

○如聖丹治婦人赤白帶月經不來不能成孕方  
白礬 蛇床子 等分 為末醋糊為丸如彈子大胭脂  
為衣薄綿裹留綿帶二尺許打一大結長留在後只  
以綿裹藥丸深入玉戶中定坐半日執極再換大抵  
月水不通赤白帶下多因子宮不潔服藥難效此方  
易痊亦且效速無傷臟腑能生子嗣

○陰茹方

狗肝燒末狗胆和搽即好 又梧桐瓢煎水薰 又  
小猪腸一尺天麻 四十九粒 研入腸內紙包火煨熟去天

麻空心服之盤脚坐地上即收上

○陰戶番花方

荆芥 蛇床 芒硝 煎水洗效

○陰挺方

艾湯先洗蛇床半升炒熟絹包熨之自入

○陰戶生瘡方

魚胆放入數次

○又生瘡及脹痛方 並臭

黃連 陀僧 雄黃 輕粉 等分 為末青絹袋盛之



或一錢或五分入戶神效

○陰生虱作癢方

銀杏嚼塗 又松香同花椒浸香油燒滴搽

○陰癢方

蘆甘石同蛤粉撲 又龍骨牡蠣烏賊骨鷄肝羊肝

猪肝並室女人陰癢

○種子女金丸

婦人之聖藥也

七製香附

打碎淨

用當歸

二兩

煎水浸香附

香附

二兩用白芍

一兩

玄胡

一兩

煎水浸

香附二兩用

蓬朮 一兩 山稜 一兩 煎水浸 香附 二兩 用川芎 一兩

煎水同醋浸 香附 二兩 用艾 一兩 丹皮 一兩 煎水

浸加童便 香附 二兩 用烏梅肉 一兩 煎水同鹽水

浸 香附 二兩 用柴胡 一兩 煎水同醋浸 春三夏一

秋七冬十浸足取起瓦鍋焙乾研為細末浸藥不用

將藥汁打麵糊為丸如梧子大空心每服六七十丸

淡鹽湯送下戒惱怒凡滯氣之物皆不可食

○人參養血丸 治婦人稟素弱氣血虛損常服補

衝任調月候暖下元生氣血有子

烏梅 二兩 當歸 三兩 人參 赤芍 川芎 蒲黃 三各

兩 熟地 五兩 煉蜜為丸 如梧子大 每服八十九 溫酒

米飲任下

○濟生丹

壯體調經有孕諸病不生

赤芍

當歸

川芎

生地

各四兩

艾葉

去梗一觔

香附

一觔

酒醋鹽水童便各浸四兩

焙共為末 醋三壺拌勻 以砂鍋煮醋乾

為度 取出為末 醋糊為丸 如梧子大 日三服 五十五

丸白湯下

○八珍益母丸

四物四君加四製香附阿膠益母膏加煉蜜為丸此

丸陰陽雙補胎產皆宜氣血俱和而生育必矣

○加味益母丸

益母草 半觔 川芎 赤芍 當歸 木香 各一兩 煉蜜

丸梧子大每服五十九好酒或童便酒下其妙如神

百日即孕 紫竹者佳白花者傷人 又單用益母草一味不犯

鐵罌煉蜜丸彈子大溫酒下一丸服至一月決有效

婦人胎前產後無不效

○女種子方 婦人久不孕者服之無不效應

真阿膠 蛤粉炒成 蘄艾葉 去筋梗四兩好醋煮乾 當

歸酒洗 二兩 川芎 二兩 懷熟地 二兩 白芍 二兩 香附 二兩 酒洗 十二

醋浸一 夜曬乾 共為細末 再用大石榴皮一個連用東流水三

升將前藥煮乾 麵糊為丸 如梧子大 每晨空心服百

丸米飲下 或好醋點湯下

○神聖散 治女子無子 金城范太守進云 若服四十五日 無子 甘斬後果驗

人參 杜仲 秦艽 桂心 防風 茯苓 六錢

白芷 二錢 乾姜 二錢 牛膝 二錢 沙參 二錢 厚朴 二錢

細辛 五錢 黑附子 去皮 右為末 煉蜜為丸 梧子大 每

服三十九 食後無灰酒或米飲送下 女覺有孕 漸則加至十丸

數七九六十三九日行房有孕三日不可服金城公  
主服半月果有孕公主原本宮王一方名蠡斯丸有

白薇有半夏無白芷

○香附子丸

專宜婦人久鬱情不宣暢經多不調故難成孕此方最妙不須更服他藥

香附子

不拘多少去毛粗皮米泔水浸

一宿晒乾用上好米醋砂鍋

內煮之旋添醋以透爛為度取出焙乾為末仍用醋

糊為丸如梧子大每服五七十九久不調者即調久

不孕者即孕

○神效烏鷄丸

下部不實子宮氣衰經水不調赤白帶下不耐房勞一切虛損並效

山萸肉五兩 香附五兩 懷熟地酒煮 川芎酒洗

當歸 白芍 益母草各三兩 蛇床子洗淨 條芩酒炒

覆盆子炒 玄胡炒 丹參洗淨 橘紅各二兩 砂仁 蒼朮

各一兩 白毛烏骨雄雞一隻重二三兩者 養極肥勿

與雌雞交修合絞死不使去血乾後去毛剖開去腸

中屎嗉內食肫內黃皮一應物件外用酒洗仍裝雞

內不可見水置小壇中入酒二觔封固重湯煮極爛

酒淨取出割下淨肉并肝腸搗如泥其骨用酥炙黃

研碎右各為細末同鷄肉地黃加醋糊為丸如梧子

大每服百丸空心清米飲送下 如過期加人參白

朮 各一兩 黃芪 一兩 鹽湯或酒任下 如不及妄行

加黃芩黃連骨皮 各一兩 冬米飲下 如赤白帶下

加蒼朮白朮柴胡升麻 各一兩 餘者任病加減

○煖爐散

潮腦 入碗并打三次 蛇床子 五錢 母丁香 三錢 牡蠣

一錢 良姜 一錢 紫稍花 一錢 以上六味為細末煉蜜

為丸如櫻桃大每次用一九

○七製艾附丸

治女人經水不調帶下淋漓不受胎癰瘕四肢無力五癆七傷皆效



香附 二兩 艾 一兩 歸身 二兩 熟地 二兩 酒浸 香附

二兩 艾 一兩 三稜 二兩 玄胡 二兩 醋浸 香附 二兩

艾 一兩 乾姜 二兩 肉桂 二兩 便浸 香附 二兩 艾 一兩

丹皮 二兩 地骨皮 二兩 烏藥 二兩 韭汁浸 香附 二兩

艾 一兩 陳皮 二兩 紅花 二兩 姜汁浸 香附 二兩 艾

一兩 川芎 二兩 白芍 一兩 柴胡 一兩 葱汁浸 香附

二兩 艾 一兩 蒼朮 二兩 芍藥 一兩 米泔浸 右藥春

三夏五秋冬七日各浸足晒乾為末老米糊為丸每

服五十九空心艾湯或淡醋湯下 前藥內歸身 酒洗

白芍

酒拌炒

蒼朮

米泔浸炒

玄胡

醋浸炒

三稜

醋炒

肉桂

不見火

丹皮

酒洗

紅花

酒拌

川芎

酒拌

○婦人下寒不育方

胡椒

杏仁

核桃仁

搗爛蜂蜜入罐重湯煮一

時每三匙酒調下久自有孕 又覆盆子每日水服

三錢益補強陰補肝明目益男子精女子有孕 又

兔絲子同杜仲丸服治五勞七傷益精補陽 又川

烏

炮

枯礬

等分

細末蜜丸彈子大綿裹納陰中治帶

下絕產

○胎漏方

砂仁五錢炒黃研末酒調服立止百試百驗胎氣痛亦妙

○又方

蔥白一握煎濃汁服

○胎動欲墮痛不可忍方

銀五兩 苧根二兩 清酒一盞水一大盞煎溫服

○安胎將墜欲死方

懷生地二兩酒炒砂仁末一兩水酒各一碗煎分二次服

○胎動者可安死者可下方

川芎 當歸 紫蘇 等分 水煎服

○胎死腹中方

水銀二兩吞之立出 又卑麻肉 一合 搗爛貼足心

如下即去之腸出移貼顛門 又嚼葱白數根即下

○胎痛下血方

歸尾 南星 川芎 各五錢 酒煎入童便服登時即止

○胎動下血心腹疼死生不知方

當歸 四兩 川芎 九兩 酒 三升 水 四升 煮三升分服生

安死下

○胎動下黃水方

荷鼻一個燒研占米湯服

○安胎順氣方

香附子為末紫蘇湯服

名鉄 羶散 惡阻同藿香甘草末入

鹽湯服

○福胎飲

香附子同砂仁甘草末服九月十月服永無驚恐

○又方

龍腦新水服少許立下

○胎傷痛喊方

大黑豆

一合炒黃色

蘄艾

五錢

水酒煎分二服立愈

○胎氣傷動痛不可忍方

縮砂仁

炒研

酒服妊忽倒地觸損不安或胎死亦服

○三月孕防墜方

續斷同杜仲九服月未足腹痛如欲產狀亦服

○下血欲死方

蜜蠟

化一兩

投酒半升立止

○龜壳散下生胎死胎

龜壳 一個 生過男女婦人頭髮 一握燒 川芎 當歸

各一 為末每三錢水煎服良久生胎死胎俱下治產

五七日不下垂死者及矮小石女子交骨不開者

○妊孕經通恐胎漏方

地黄 乾姜 等分 為末酒調服無姜亦可

○妊孕腫至腹小水不利微渴方

猪苓末熱水調服三錢

驚舉重動胎出血方

連末濃煎和蜜服一日服六七次每末 三分 水 三分

○交接後血出不止方

五倍子末敷青布灰同髮灰服

○婦人胎水早行胎澁不下方

猪肝

白蜜

醇酒

各一觔

共煎至二觔分服徐飲

○治兒在腹中哭方

川黃連一味水煎濃呷之

○治妊孕遺尿不覺自出方

白薇

白芍

等分

為末每二錢溫酒下

○又方



明礬 牡蠣 等分為末溫酒下男子遺尿亦妙

○下私胎方

獨根土牛膝摘淨絲根以真麝和水少許醃之入小  
竹內封固勿走氣以一女人代用以中指觀牛膝一  
根探子宮漸觀入其後用長線帶住留尺許在外  
月久再入二根入陰不入宮多不效

○斬鬼丹 鬼胎如  
抱一甕

吳茱萸 川烏 秦艽 柴胡 姜蚕 巴戟 羌  
花 蜜丸 梧子大酒下三七丸取出惡物愈

○又方

芫花根研末一錢桃仁湯下納戶下胎

○白扁豆散

因毒藥打胎以致牙關口噤握拳頭低汗出危急欲絕

白扁豆生為細末新水服即解

○治難產方

川歸 三錢 川芎 二錢 水二鍾煎服即下

○又方

桃仁 一個 劈開 書一片 書可一片 書上字 吞之 即產

○又方

烏桕果子 或五粒或七粒 用滾水搗爛服之 即下 死朽亦下

○又方

硃書本府府尊姓名到此燒紙灰蓋內服下即生

○又方

石燕 一對 左右手各握一枚即下 又瞿麥煎湯服

○催生開骨丹

午時用硃砂 明 乳香砂研如塵 銅鍋將乳香化開入  
砂末乘熱丸如芡大 臨痛至不堪時井水朝東吞下  
一丸立生

○催生不傳遇仙丹

蓖麻仁十四粒 硃砂 雄黃各一錢五分 蛇退一條 右為細

末粥丸彈子大臨時椒湯先洗臍納入蠟紙數層覆

之待產急去之又黃葵子七粒 研酒調服

又方

當歸 八錢 川芎 二錢 長流水煎服

○橫生逆產方

用小針針兒足心三五針急用鹽塗刺處即順下子

母得活

○橫胎不下方

黃豆搗爛炆烟拌黑與產婦嚼俟嘔令穩婆入手拿  
正即產

○又方

蛇皮一條罐子內盛泥固濟燒黑存性每服二錢榆  
白皮湯調服立效名十全博救方 又產書云治產  
不順手足先見者蛇皮燒灰研麴灰面東酒服二錢  
更以藥末敷手足即順生

○又方

橫生倒養苦哀哉急取當歸四錢來為末酒調吞一  
服免散大小動悲哀

○逆產方

槐子

粒十四

井花水吞下即順

○產後血塊不止方

笋壳燒灰冲酒服立止 又槐花炒酒送下

○又方

蒲黃

炒黑

為末每二錢芫歸湯下

○產後惡血攻心臨危可復活方

血竭 沒藥 錢各一 童便和酒調下

又方

白朮 三錢 姜 五片 水煎服

○獨行散

治產後血上攻心腹臍不快不能嗜卧立效死可復生

五靈脂 一兩半 生半 熟為末 每服二錢 溫酒調下 如口噤用

柳條撥開灌之入喉立止此方奧妙

○產後惡血不盡或經月半載方

升麻 三兩 酒五升 煮半溫服 吐下惡物極效

○產後下血虛羸迫死方