

關室秘藏

下



蘭室秘藏卷下

東垣老人 李杲 撰

明 新安 吳勉學 校

大便結燥門

大便結燥論

金匱真言論云北方黑色入通腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難者取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若饑飽失節勞役過度損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥然結燥之病不一有熱

燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結燥者治法云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結者溫之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響然不能大便者以苦藥泄之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黃通之風結燥而大便不行者以麻子仁加大黃利之如氣澀而大便不通者以郁李仁枳實皂角仁潤之大抵治病必究其源不可一槩用巴豆牽牛之類下之損其津液燥結愈甚復

下復結極則以至導引於下而不通遂成不救噫
不慎哉

通幽湯

治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥
秘氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草

紅花

已上各壹分

生地黄

熟地黄

已上各伍分

升麻

桃仁泥

當歸身

已上各壹錢

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗調搯細
末五分稍熟食前服之

潤燥湯

升麻

生地黄

已上各貳錢

熟地黄

當歸梢

生甘草

大黃

煨

桃仁泥

麻仁

已上各壹錢

紅花

伍分

右除桃仁麻仁另研如泥外判如麻豆大都作一服水二盞入桃仁麻仁泥煎至一盞去粗空心稍熱服

潤腸丸

治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥閉塞不通全不思食及風結血秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風

自然通利矣

桃仁湯浸去皮尖

麻仁已上各壹兩

當歸稍

大黃煨

羌活已上各壹錢

右除桃仁麻仁另研如泥外搗為極細末煉蜜為

丸如梧桐子大每服三五丸空心白湯下

如病人不大便為大便不通而澀其邪盛者急加酒

洗大黃以利之

如血燥而大便燥乾者加桃仁酒洗大黃

如風結燥大便不行者加麻仁大黃

如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦朮以利之

如脉澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃
以除氣燥

如寒陰之病爲寒結閉而大便不通者以局方中半
硫丸或加煎附子乾薑湯冰冷與之其病雖陰寒
之證當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中
與一服藥微通其大便不令結閉乃治之大法
若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯躁脉實堅
亦宜於陽藥中少加苦寒之藥以去熱躁躁止勿
加

如陰躁欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細而

遲此易爲辯耳知有客邪之病亦當從權加藥以去之

麻黃白朮湯

治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時躁熱發欲去衣須臾而過振寒項額有時如冰額寒尤甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛當臍有動氣按之堅硬而痛

青皮

去腐

酒黃連

已上各壹分

酒黃蘗

橘紅

甘草 炙半

升麻 已上各貳分

黃芪

人參

桂枝

白朮

厚朴

柴胡

蒼朮

猪苓 已上各叁分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉 已上各肆分

白豆蔻

炒麴 已上各伍分

麻黃 不去節伍錢

杏仁 肆箇

右咬咀分作二服水二大盞半先煎麻黃令沸去

沫再入諸藥同煎至一盞去粗稍熱食遠服

此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽

道為上盛元氣短少上喘為陰火傷其氣四肢痿

藥治之

在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其
肝木又實其母肺金尅火凌木是大勝必有大復
其證善恐欠多嚏鼻中如有物不聞香臭目視眈
眈多悲健忘少腹急痛通身黃腹大脹面目腫尤
甚食不下痰唾涕有血目背癆大便不通並宜此

升陽湯

一名升陽瀉濕湯

治膈咽不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子

已上各
貳分

生地黃

熟地黃

黃蘗

已上各
叁分

當歸身

甘草梢 已上各肆分

蒼朮 伍分

升麻 柒分

黃芪 壹錢

桃仁 拾箇 另研

右咬咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞

煎至一盞去粗稍熱食前服

活血潤燥丸

治大便風秘血秘常常燥結

當歸梢 壹錢

防風 叁錢

大黃 濕紙畏畏

羌活 已上各壹兩

皂角仁 燒存性去皮壹兩伍錢 其性得濕則滑濕滑則

燥結自除

桃仁 貳兩 研如泥

麻仁 貳兩伍錢 研如泥

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸

如梧桐子大每服五十丸白湯下二三兩服後須以蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也以磁器盛之紙封無令見風

潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黄

生甘草

已上各壹錢

大黃

煨

熟地黄

當歸梢

升麻

桃仁

麻仁

已上各壹錢

紅花

叁分

右以水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云病有關有格關則不得小便又云關無出之謂皆邪熱爲病也分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之如渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故渴而小便不利也夫小便者是足太陽膀胱經所主也長生於申申者西方金也肺合生水若肺中有熱不能生水是絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源也故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如露如霜皆從天而降下也乃陽中之陰明秋氣自天而降下也且藥有氣之薄者乃陽中之陰

是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲
泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通
瞿麥扁蓄之類以清肺之氣泄其火資水之上源也
如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而大
燥小便不通也熱閉於下焦者腎也膀胱也乃陰中
之陰陰受熱邪閉塞其流易上老云寒在胸中遏絕
不入熱在下焦填塞不便須用感北方寒水之化氣
味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云無陽則陰
無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽
中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足

也須用感地之水運而生太苦之味感天之寒藥而
生大寒之氣此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣
人稟之生膀胱寒水之運人感之生腎此藥能補腎
與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便
不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必
伏其所主而先其所因其始則氣同其終則氣異也

通關丸

一名滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃蘗

去皮判酒洗焙

知母

剉酒洗焙乾已上各壹兩

肉桂

伍分

右爲細末孰水爲丸如梧桐子大每服一百丸空

心白湯下頓兩足令藥易下行故也如小便利前
陰中如刀刺痛當有惡物下為驗

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心 壹分

通草 貳分

澤瀉

瞿麥

琥珀 已上各伍分

扁蓄

木通 已上各柒分

車前子 炒壹錢

茯苓 去皮貳錢

猪苓 去皮叁錢

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熟食
遠服或局方八正散五苓散亦宜服之

導氣除燥湯

治小便閉塞不通乃血澀至氣不通而竅澀也

茯苓

去皮

滑石

炒黃已上各貳錢

知母

細判酒洗

澤瀉

上各參錢

黃蘗

去皮酒洗肆錢

右以咀每服五錢水三盞煎至一盞去粗稍熱空

心服

如急閉不拘時服

腎疸湯

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澀

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡已上各伍分

升麻伍分

已上治腎疸目黃渾身黃

白茯苓貳分

澤瀉叁分

猪苓肆分

白朮伍分

蒼朮壹錢

已上治小便赤澀

黃蘗貳分

人參叁分

葛根伍分

神麴陸分

甘草叁錢

右剉如大豆大分作二服水三盞煎至一盞去粗

稍熟食前服

痔漏門

痔漏論

內經曰因而飽食筋脉橫解腸澀爲痔夫大腸庚也
主津本性燥清肅殺之氣本位主收其所司行津以
從足陽明旺則生化萬物者也足陽明爲中州之土
若陽衰亦殞殺萬物故曰萬物生於土而歸於土者
是也以手陽明大腸司其化焉旣在西方本位爲之
害蜚司殺之府因飽食行房恐泄前陰之氣歸於大
腸木乘火勢而侮燥金故火就燥也大便秘閉其疾
甚者當以苦寒瀉火以辛溫和血潤燥疎風止痛是
其治也以秦艽當歸梢和血潤燥以桃仁潤血以皂

角仁除風燥以地榆破血以枳實之苦寒補腎以下
泄胃實以澤瀉之淡滲使氣歸於前陰以補清燥受
胃之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣之不足其甘
味以瀉火而益元氣也故曰甘寒泄火乃假枳實之
寒也古人用藥爲下焦如瀆又曰在下者引而竭之
多爲大便秘澀以大黄推去之其津血益不足以當
歸和血及油潤之劑大便自然輒利矣宜作劉湯以
與之是下焦有熱以急治之之法也以地榆酸苦而
壞胃故宿食消盡空心作丸服之

秦艽白朮丸

治痔疾并痔漏瘡膿血大便燥硬而作疼痛不可

忍

秦艽

去芎

桃仁

湯浸去皮尖

皂角仁

燒存性各壹兩

當歸梢

酒浸

澤瀉

枳實

黃麩炒

白朮

已上各伍錢

地榆

參錢

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為丸如

雞頭仁大令藥光滑焙乾每服五七十九白湯下

空心服待少時以美饍厭之忌生冷硬物冷水冷

菜之類并濕麵酒及辣辛熱大料物之類犯之則

藥無驗也

秦艽蒼朮湯

治痔疾若破謂之痔漏大便秘澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣而合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也若大便燥結者主病兼受火邪熱結不通也去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦助病為邪須當破氣藥兼之治法全矣以剉湯與之其効如神

秦艽

去苗

桃仁

湯浸去皮另研

皂角仁

燒存性另研各壹錢

蒼朮 製

防風 已上各 柒分

黃蘗 去皮酒 洗伍分

當歸梢 酒洗

澤瀉 已上各 三分

梭身檳榔 壹分 另研

大黃 少許雖大便過 澀亦不可多用

右除檳榔桃仁皂角仁三味外餘藥咬咀如麻豆

大都作一服水三盞煎至一盞二分去粗入檳榔

等三味末再上火煎至一盞空心熟服待少時以

美饑壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒

濕麵大料物乾薑之類犯之則其藥無効

如有白膿加白葵花頭五朶去萼心青皮半錢不去

白入正藥中同煎木香三分為細末同檳榔等三

味依前煎服餌古人治此疾多以歲月除之此藥
一服則愈

七聖丸

治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生於脾藏傍大
腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦火莫謾多方立紀

綱

羌活

壹兩

郁李仁

湯浸去皮另研
壹兩伍錢

大黃

剉錢
煨

檳榔

無異也而不

桂

去皮

木香

川芎

巴上各
伍錢

右除郁李仁另研入外共為細末煉蜜為丸如梧

桐子大每服三五十丸白湯下食前取大便微利
一服而愈切禁不得多利大便其痛滋甚

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏
也此藥主之

秦艽

防風

當歸身

白朮

已上各壹錢伍分

炙甘草

澤瀉

已上各陸分

黃蘗

伍分

大黃

煨

橘皮

已上各參分

柴胡

升麻

已上各貳分

桃仁

參拾

紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗
稍熱空心服之避風寒忌房事酒濕麵大辛熱物
秦艽羌活湯

治痔漏成塊下垂不任其癢

羌活

壹錢
貳分

秦艽

黃芪

已上各
壹錢

防風

柒分

升麻

炙甘草

麻黃

柴胡

已上各
伍分

藁本

叁分

細辛

少許

紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗
空心服之忌風寒處大小便

當歸郁李仁湯

治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛不能忍

郁李仁

皂角仁

已上各壹錢

枳實

柒分

秦艽

麻仁

當歸梢

生地黄

蒼朮

已上各伍分

大黃

煨

澤瀉

已上各叁分

右剉如麻豆大除皂角仁別為末水三盞煎至一盞去粗入皂角仁末調空心食前服之忌如前

紅花桃仁湯

治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸澀為痔治法

當補北方瀉中央

黃蘗 壹錢五分

生地黄 壹錢

澤瀉 捌分

蒼朮 陸分

當歸梢

漢防已

防風梢

猪苓 已上各伍分

麻黃 貳分

紅花 半分

桃仁 拾箇

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞去粗稍熱食前

服之忌如前

秦艽當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛

大黃 煨肆錢

秦艽

枳實 已上各壹錢

澤瀉

當歸梢

皂角仁

白朮

已上各伍分

紅花

少許

桃仁

貳拾箇

右都作一服水三盞煎至一盞去粗食前熱服忌
如前

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

一富者前陰臊臭又因連日飲酒腹中不和求先師
治之曰夫前陰者足厥陰肝之脉絡循陰器出其挺
末凡臭者心之所主散入五方為五臭入肝為臊此
其一也當於肝經中瀉行間是治其本後於心經中

瀉少衝乃治其標如惡針當用藥除之酒者氣味俱
陽能生稟之濕熱是風濕熱合於下焦為邪故經云
下焦如瀆又云在下者引而竭之酒是濕熱之水亦
宜決前陰以去之

龍膽瀉肝湯

治陰部時復熱痒及臊臭

柴胡梢

澤瀉

已上各壹錢

車前子

木通

已上各伍分

生地黃

當歸梢

草龍膽

已上各叁分

右剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去粗

空心稍熱服便以美膳壓之此藥柴胡入肝為引
 用澤瀉車前子木通淡滲之味利小便亦除臊氣
 是名在下者引而竭之生地黃草龍膽之苦寒瀉
 酒濕熱更兼車前子之類以撤肝中邪氣肝主血
 用當歸以滋肝中血不足也

清震湯

治小便溺黃臊臭淋瀝兩丸如米陰汗浸多

羌活

酒黃蘗

已上各壹錢

升麻

柴胡

蒼木

黃芩

已上各伍分

澤瀉

肆分

麻黃根

猪苓

防風 已上各

炙甘草

當歸身

藁本

已上各

紅花

壹分

石剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

臨卧服大忌酒濕麵

固真湯

一名正元湯

治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有餘滴尻
臀并前陰冷惡寒而喜熱膝下亦冷

升麻

羌活

柴胡

已上各

炙甘草

草龍膽

澤瀉

已上各壹錢伍分

黃蘗

知母

已上各

右判如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞去粗
空心稍熱服以早飯壓之

清鬼湯

一名柴胡勝濕湯

治兩外腎冷兩髀陰汗前陰痿陰囊濕痒臊氣

柴胡

生甘草

酒黃蘗

已上各貳錢

升麻

澤瀉

已上各壹錢伍分

當歸梢

羌活

麻黃根

漢防已

草龍膽

茯苓

已上各壹錢

紅花

少許

五味子

貳拾箇

一判如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞去粗

食前稍熱服忌酒濕麵房事

椒粉散

治前陰兩丸濕痒痛秋冬甚夏月減

肉桂

貳分

小椒

當歸梢

猪苓

已上各三分

蛇床子

黑狗脊

已上各伍分

麻黃根

壹錢

輕粉

少許

紅花

少許

班猫

兩枚

右為末乾糝上避風寒冷濕處坐卧

補肝湯

治前陰冰冷并陰汗兩脚痿弱無力

補定必裁

卷六

二

黃芪

柒分

炙甘草

伍分

升麻

猪苓

已上各四分

白茯苓

葛根

人參

已上各三分

柴胡

羌活

陳皮

連翹

當歸身

黃蘗

炒

澤瀉

蒼朮

麴末

知母

防風

已上各貳分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去

粗空心稍熱服忌酒濕麵

溫腎湯

治面色痿黃身黃脚痿弱無力陰汗

柴胡

麻黃根

已上各陸分

白茯苓

白朮

酒黃蘗

猪苓

升麻

已上各一錢

蒼朮

防風

已上各壹錢伍分

澤瀉

二錢

右分作二服每服水二大盞煎至一盞去粗食前

稍熱服一時辰許方食

延胡丁香丸

一名丁香痙氣丸

治臍下撮急疼痛并周身皆急痛小便頻數及五

脉急獨腎脉按之不急皆虛無力名曰腎痙

羌活

參錢

當歸

茴香

已上各二錢

延胡索

麻黃根節

肉桂

已上各一錢

丁香

木香

甘草

川烏頭

已上各伍分

防已

叁分

蠟

拾叁箇

右為細末酒煮麵糊為丸如雞頭大每服五十丸
空心鹽白湯服

瀉痢門

訶子皮散

癸卯冬白樞判家一老漢面塵脫色神氣特弱病
脫肛日久服藥未驗復下赤白膿痢作裏急後重
白多赤少不任其苦以求其治曰此非肉食膏粱

必多蔬食或飲食不節天氣雖寒衣蓋猶薄不禁而腸頭脫下者寒也真氣不禁形質不收乃血滯脫也此乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當以澀去其脫而除其滑微酸之味固氣上收以大熱之劑而除寒補陽以補氣之藥升陽益氣

御米殼

去蕈蔓蜜炒

橘皮

已上各伍分

乾薑

炮陸分

訶子

煨去核柒分

右爲細末都作一服水二盞煎至一盞和杵空心

熱服

升麻補胃湯

治宿有陽明血證因五月間大熱喫杏腸澀下血
啣遠散漫如篩腰沉沉然腹中不痛血色紫黑病
名濕毒腸澀屬陽明少陽經血證也

白芍藥

壹錢伍分

升麻

羌活

黃芪

壹錢

生地黄

熟地黄

獨活

牡丹皮

炙甘草

柴胡

防風

伍分

當歸身

葛根

已上各參分

肉桂

少許

右判如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞
去粗食前稍熱服

升陽去熱和血湯

治腸澼下血另作一派其血唧出有力而遠射四散如篩腸中血下行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當升陽去濕熱和血脉是其治也

橘皮 貳分

熟地黄

當歸身

蒼朮

秦艽

肉桂 已上各三分

生地黄

牡丹皮

生甘草 已上各伍分

升麻 七分

熟甘草

黃芪 已上各壹錢

白芍藥 壹錢伍分

右咬咀都作一服水四盞煎至一盞去粗空心稍

熱服立効

益智和中湯

治腸澼下血或血色紫黑腹中痛腹皮惡寒右手
關脉弦按之無力而喜熱物熨之內寒明矣

附主 壹分

桂枝 肆分

牡蛎 壹分

柴胡

葛根

益智仁

半夏 已上各伍分

當歸身

炙甘草

黃芪

升麻 已上各壹錢

白芍藥 壹錢伍分

乾薑 少許

右為麤末都作一服水三盞煎至一盞去粗食後

溫服

芍藥藥皮丸

治濕熱惡痢血痢頻併窘痛無問膿血並皆治之

芍藥

黃蘗

已上各壹兩

當歸

黃連

已上各伍錢

右為末飯為丸如雞頭大每服五七十九丸食前米飲湯下忌油膩酒濕麵等物

和中益胃湯

治太陰陽明腹痛大便常泄若不泄即秘而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛脇下急縮

脉緩而共弦中之下得之按之空虛

蘇木 壹分

藁本

益智仁 已上各二分

熟地黄

炙甘草 已上各叁分

當歸身 四分

柴胡

升麻 已上各伍分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服

槐花散

治腸澼下血濕毒下血

川芎 四分

槐花

青皮

荆芥穗

熟地黄

白朮 已上各陸分

當歸身

升麻 已上各壹錢

右為細末每服三錢米飲湯調下食前忌酒濕麵

生冷硬物

茯苓湯

治因傷冷飯水泄一夜走十行變作白痢次日其痢赤白腹中疴痛減食熱躁四肢沉困無力

生黃芩 三分 當歸身 肆分

肉桂

炙甘草 已上各伍分 猪苓 茯苓 已上各陸分

澤瀉 壹錢 芍藥 壹錢伍分 蒼朮

生薑 升麻 柴胡 已上各貳錢

右以咀如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去粗稍熟食前服之

黃芪補胃湯

治一日大便三四次澹而不多有時作泄腹中鳴

小便黃

黃芪

柴胡

當歸身

益智

橘皮

已上各參分

升麻

陸分

炙甘草

貳錢

紅花

少許

右以咀都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熟食前服之

升陽除濕湯

自下而上者引而去之

蒼木 壹錢

柴胡

羌活

防風

升麻

神翅

澤瀉

猪苓 已上各伍分

炙甘草

陳皮

麥蘗麩 已上各三分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗空心服之

如胃寒腸鳴加益智仁半夏 各伍分 生薑三片棗一

枚同煎至非腸鳴不得用

人參益胃湯

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠墮躁熱短氣口不知味腹鳴大便微澹身體昏悶覺渴不喜

冷物

黃芪

甘草

當歸梢

益智

已上各貳分

人參

黃芩

柴胡

半夏

白朮

已上各叁分

陳皮

升麻

已上各伍分

蒼朮

壹錢伍分

紅花

少許

右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食前服

之

升麻補胃湯

治因內傷服牽牛大黃食藥泄瀉過多腹中大痛

甘草 柴分

升麻

柴胡

草豆蔻

黃芪

已上各伍分

半夏

叁分

當歸身

乾薑

已上各貳分

紅花

少許

右都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熟食遠服之

瘡瘍門

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或肩上

或於脇下皆手足少陽經中及癩癧遍於頰或至
頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二證瘡已
破流膿水並皆治之

黃芩

捌錢酒洗炒
一半生用一半

草龍膽

酒洗各
炒四遍

瓜蒌根

剉碎
酒洗

黃蘗

酒製

酒知母

桔梗

昆布

已上各
伍錢

柴胡

肆錢

炙甘草

京三稜

酒洗

廣茂

酒洗
炒

連翹

已上各
叁錢

葛根

白芍藥

當歸梢

黃連

已上各
貳錢

升麻

陸分

右咬咀每服六錢水二盞零八分先浸多半日煎

至一盞去粗食後熱服於卧處伸足在高處頭低
垂每含一口作十次嚥服畢依常安卧取藥在膈
上停蓄故也另攢半料作細末煉蜜爲丸如菉豆
大每服百餘丸用此藥湯畱一口送下或加海藻
五錢炒亦妙

升陽調經湯

治癰瘰遶頸或至頰車此皆出足陽明胃經中來
若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾
傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等
並皆治之或作丸亦可

升麻 捌錢

葛根

草龍膽 酒製

黃芩 酒製

廣茂 酒洗

京三稜 酒洗

炙甘草

黃連 酒洗

連翹

桔梗 已上各伍錢

生黃芩 肆錢

當歸梢

芍藥 已上各叁錢

黃蘗 酒洗 貳錢

知母 酒洗炒 壹兩

右另秤一半作末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘

丸一半作吹咀每服五錢若能食大便硬可旋加

至七八錢水二盞先浸半日煎至一盞去粗臨卧

熱服足高去枕仰卧噲一口作十次嚥之留一口

在後送下丸藥服畢其卧如常

連翹散堅湯

治耳下或至缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無
根名曰馬刀從手足少陽經中來也或生兩脇或
已流膿作瘡末破並皆治之

柴胡

壹兩
貳錢

草龍膽

酒洗
四次

土瓜根

酒製已
上壹兩

黃芩

酒炒二
次柴錢

當歸梢

生黃芩

廣茂

京三稜

同廣茂
酒炒

連翹

芍藥

已上各
伍錢

炙甘草

叁錢

黃連

酒炒
二次

蒼朮

已上各
二錢

右另秤一半為細末煉蜜為丸如棗豆大每服百

餘丸一半吹咀每服五錢水二盞先浸多半日煎至一盞去粗臨卧熱服去枕仰卧每口作十次嚥之雷一口送下丸藥服畢卧如常更以後藥塗之

龍泉散

龍泉粉炒

瓦粉

廣茂

京三稜酒洗炒

昆布已上各伍錢

右同為細末煎熟水調塗之用此藥去疾尤速

救苦化堅湯

治癰瘰馬刀挾癭從耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中乃手足少陽之經分其癰瘰在頰下或

至頰車乃足陽明之經分受心脾之邪而作也
將二證合而治之

黃芪 壹錢

護皮毛間腠理虛及活血脈生血亦瘡家聖藥也又能補表實元氣之弱也

人參 叁分

補肺氣之藥也如氣短不調及喘者加之

炙甘草 伍分

能調中和諸藥瀉火益胃氣亦能去瘡邪

真漏蘆

升麻 已上各壹錢

葛根 伍分

此三味俱足陽明本經也

連翹 壹錢

此一味十二經滄中之藥不可無也能散諸

血結氣聚此滄家之神藥也

牡丹皮 叁分

去腸胃中畱滯宿血

當歸身

生地黄

熟地黄 已上各叁分

此三味諸經中和血生血涼血藥也

白芍藥 叁分

如夏月倍之其味酸其氣寒能補中益肺

虛弱治腹中痛必用之冬寒則不可用

肉桂 貳分

大辛熱能散結積陰證瘡瘍須當少用之此
寒因熱用之意又為寒陰覆蓋其瘡用大辛
熱以消浮凍之氣如有煩躁者去之

柴胡 捌分

功同連翹如瘡不在少陽經則去之

黍粘子 叁分

無腫不用

羌活 壹錢

獨活

防風 已上各伍分

此三味必關手足太陽證脊痛項強不可迴
 視腰似折項似拔者是也其防風一味辛溫
 若瘡在膈已上雖無手足太陽經證亦當用
 之為能散結去上部風邪病人身拘急者風
 也

昆布 貳分

其味大鹹若瘡堅硬結硬者宜用鹹能軟堅

京三稜 煨貳分

廣茂 煨叁分

此二味若瘡堅硬甚者用之如不堅硬勿用

益智仁 貳分

如唾多者胃不和也或病人吐沫吐食胃上寒者加之無則去之

大麥蘖麵 壹錢

治腹中縮急兼能消食補胃

神麴末 炒黃色 貳分

為食不消化故也

黃連 去鬚 參分

以治煩悶

黃蘗 炒參分

如有熱或腿脚無力加如有躁煩欲去衣者

如氣不順加橘皮甚者加木香少許量病人虛實臨
時斟酌與之無令藥多妨其飲食此治之大法也
如止在陽明分爲瘰癧者去柴胡黍粘子二味餘皆
用之

如在少陽分爲馬刀挾瘦者去獨活漏蘆升麻葛根

更加瞿麥穗三分

如本人素氣弱其病勢來時氣盛而不短促者不可

考其平素宜作氣盛而從病變之權也宜加黃芩

黃連黃蘗知母防已之類視邪氣在上中下三處

假令在上焦加黃芩一半酒洗在中焦加黃連一半酒洗

一半在下焦則加酒製黃蘗知母防已之類選而

用之

如本人大便不通而滋其邪盛者加酒製大黃以利

如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製大黃二味

如風結燥不行者加麻仁大黃

如風澀而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之
如脉澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃
以除氣燥也

如陰寒之病爲寒結閉而大便不通以局方中半硫
丸或加煎附子乾薑米泔與之大抵用藥之法不
惟瘡瘍一說諸疾病量人素氣弱者當去苦寒之
藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元氣
餘皆倣此

柴胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡

中桂 三分

當歸梢 一錢五分

黍粘子 二錢

炙甘草

酒黃蘗

生地黄 已上各三錢

柴胡

黃芩 炒

酒知母

連翹 已上各伍錢

瞿麥穗 陸錢

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去

粗稍熱食後服之

黍粘子湯

治耳痛生瘡

昆布

蘇木

生甘草

蒲黃

草龍膽 已上各一分

黍粘子

廣生利病 六一

連翹

生地黄

當歸梢

黄芩

炙甘草

黄連

柴胡

黄芩

桔梗

桃仁

紅花

右劉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

稍熟食後服忌寒藥利大便

淨液湯

一名連翹防風湯

治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

桂枝

連翹

生地黄

桔梗

升麻

甘草

已上各五分

當歸梢 柒分

麻黃

草豆蔻仁

羌活

防風

柴胡

蒼朮 已上各一錢

酒黃芩 一錢

紅花 少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

食後熱服

消腫湯

治馬刀瘡

黍粘子 炒

黃連 已上各伍分

當歸梢

甘草 已上各一錢

瓜蒌根

黃芪 已上各一錢伍分

生黃芩

柴胡 已上各一錢

連翹 三錢

紅花 少許

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱食

後服忌酒濕麵

內托羌活湯

治足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力尻臀生

癰堅硬腫痛大作

肉桂 二分

連翹 於每西至於炙甘草

蒼朮

橘皮 已上各五分 當歸梢

防風

藁本 已上各一錢 黃芪 一錢五分

黃蘗 酒製

羌活 已上各二錢

右咬咀都作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗
稍熱空心服以夾衣蓋癰上使藥力行罷去蓋之
衣

升麻托裏湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其
脉弦洪按之細小

黃蘗 二分

肉桂 三分

黍粘子 伍分

黃芪

炙甘草

當歸身 已上各一錢

連翹

升麻

葛根 已上各一錢五分

右咬咀都作一服水一大盞酒半盞同煎至一盞

去粗稍熱食後服

內托黃芪湯

賈德茂小男於左大腿近膝股內出附骨癰不辯
肉色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大其左腳乃肝之髀
上也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之
分其脉左二部細而弦按之洪緩微有力此藥主
之

生地黄 一分

黃蘗 二分

肉桂 三分

羌活 伍分

當歸梢 柒分

土瓜根 酒製

柴胡梢 已上名 一錢

連翹 一錢 二分

黃芪 二錢

右咬咀都作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗
空心熱服

柴胡通經湯

治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡

連翹

當歸梢

生甘草

黃芩

黍粘子

京三稜

桔梗

已上各二分

黃連

伍分

紅花

少許

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去
粗稍熱食後服忌苦藥泄大便

白芷升麻湯

尹老家素貧寒形志皆苦於手陽明大腸經分出
癱幼小有癩疔其臂外皆腫痛在陽明左右寸脉
皆短中得之俱弦按之洪緩有力此癱得自八風
之變以脉斷之邪氣在表其證大小便如故飲食
如常腹中和口知味知不在裏也不惡風寒止熱
燥脉不浮知不在表也表裏既和邪氣在經脉之
中內經云凝於經絡爲瘡癰其癰出身半已上故
風從上受之故知是八風之變爲瘡者也設治其
寒邪調其經脉中血氣使無凝滯而已

炙甘草 壹分

升麻

桔梗 已上各伍分

白芷 柒分

當歸梢

生地黄 已上各壹錢

生黃芩 壹錢伍分

酒黃芩

連翹

黃芪 已上各貳錢

中桂 少許

紅花 少許

右呶咀分作二服酒水各一大盞半同煎至一盞去粗稍熱臨卧服一服而愈

保生救苦散

治火燒或熱油烙及脫肌肉者

生寒水石

大黃 火煨

黃蘗 油炒已上各等分

右為細末用油調塗之或乾用此藥塗之其痛立

止日近完復永無破傷風之患

一上散

治諸般疥癬必効

雄黃

通明手
破者

黑狗脊

蛇床子

炒

熟硫黃

已上各
伍錢

寒水石

陸錢

在苗拾叁尖翅
王芩足毛研碎

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入班猫和蛇牀

子黑狗脊為細末同研勻先洗疥癬令湯透去痂

油調手中擦熱以鼻中臭三兩次擦上可

愈

如痛甚及腫滿高起者加寒水石一倍

如不苦癢只加黑狗脊

如微癢只加蛇牀子

如瘡中有蟲加雄黃

如喜火灸湯浴者加硫黃

聖愈湯

治諸惡瘡血出多而心煩不安不得睡眠亡血故也以此藥主之

生地黃

熟地黃

川芎

人參

已上各五分

當歸身

黃芪

已上各五分

右咬咀如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞

去粗稍熱無時服

獨聖散

治湯泡破火燒破瘡疔疼痛

生白礬

右為細末芝麻油調掃瘡破處不拘時候

黃芪肉桂柴胡酒煎湯

治附骨癰堅硬漫腫不辨肉色行步作痛按之大

痛

黃芪

當歸梢

以上各二錢

柴胡

壹錢伍分

黍粘子

炒

連翹

肉桂

以上各壹錢

升麻 柒分

炙甘草

黃蘗 已下各伍分

右咬咀好糯酒一大盞半水一大盞半同煎至一大盞去粗空心溫服少時便以早飯壓之不致大熱上攻中上二焦也

雜病門

安神丸

治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊懷之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不安宜用權衡法以鎮陰火之浮越以養上焦之元氣經云熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心

煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣
滋生陰血為臣以當歸補血不足以硃砂納浮雷
之火而安神明也

黃連

壹錢伍分酒洗

硃砂

壹錢水飛

酒生地黃

酒當歸身

炙甘草

已上各伍分

右件除硃砂水飛外搗四味為細末同和勻湯浸
餅為丸如黍米大每服十五丸津唾嚥下食後

硃砂安神丸

治心煩懊懷心亂怔忡上熱胸中氣亂心下痞悶
食入反出

硃砂 肆錢

黃連 伍錢

生甘草 伍分

右為末湯浸餛餅為丸如黍米大每服十九食後

津唾嚥下

補氣湯

治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

白芍藥

橘皮 不去白各壹兩伍錢 炙甘草

黃芪 上各壹兩

澤瀉 伍錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去粗溫服

當歸補血湯

治婦人肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息

補氣必錄

卷下

二不啻

三六

其脉洪大而虛重按全無內經曰脉虛血虛脉實
血實又云血虛發熱證象白虎惟脉不長實為辯
也若悞服白虎湯必死此病得之於肌困勞役

黃芪

壹兩

當歸身

貳錢
酒製

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱空

心服

柴胡升麻湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋骨熱表熱如火燎
以手捫之烙人手夫四肢者屬脾土也熱伏地中
此病多因血虛而得之又有胃虛過食冷物鬱遏

陽氣於脾土之中此藥主之

升麻

葛根

獨活

羌活

白芍藥

人參

已上各伍錢

炙甘草

柴胡

已上各三錢

防風

二錢伍分

生甘草 二錢

右以咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗熱服

忌寒冷之物

火鬱湯

治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發

之

升麻

葛根

柴胡

白芍藥

已上各壹兩

防風

甘草

已上各伍錢

右咬咀每服五錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎至一盞去粗稍熱不拘時候服

小黃丸

化痰涎和胃氣除濕治胸中不利

黃芩

一兩

半夏

湯薑製

白朮

已上各伍錢

陳皮

青皮

去白

黃芪

已上各一錢

澤瀉

一錢

乾薑

一錢五分

右為末湯浸餛餅為丸如菘豆大每服五十九食

遠溫水下

黃芩利膈丸

除胸中熱利膈上痰

生黃芩

炒黃芩

已上各一兩

半夏

黃連

澤瀉

已上各伍錢

南星

枳殼

陳皮

已上各三錢

白朮

二錢

白礬

伍分

右為末湯浸餛餅為丸如梧桐子大每服三五十

丸食遠溫水下忌酒濕麵

補益腎肝丸

治目中流火視物昏花耳聾耳鳴困倦之力寢汗
惡風行步不正兩足軟側卧而多驚脚膝無力腰
以下消瘦

柴胡

羌活

生地黄

苦參炒

防已

炒已上
各伍分

附子

肉桂

已上各
一錢

當歸身

三錢

右為細末熟水為丸如雞頭仁大每服五十丸食
前溫水下

大陽經噫藥

防風 二分

羌活 三分

紅豆 一箇

右爲細末鼻內噙之

麻黄茱萸湯

治胸中痛頭痛食減少咽嗑不利右寸脉弦急

麻黄

羌活

已上各五分

吳茱萸

黄芩

升麻

已上各三分

黄芩

當歸

黄蘗

藁本

已上各二分

川芎

蔓荆子

柴胡

蒼朮

黄連

半夏

已上各一分

細辛

少許

紅花

少許

蘭室必藏

卷下

〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

稍熟服食後

黃芪湯

治表虛惡風寒

黃芪 伍錢

甘草 三錢

香白芷 二錢

藁本

升麻 已上各二錢

草豆蔻

橘皮 已上各一錢五分

麻黃

當歸身 已上各一錢

蓮花青皮 七分

柴胡 六分

黃蘗 少許

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗不拘時

服

除濕補氣湯

一名清神補氣湯

治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重
如山語聲不出若寸脉洪大

升麻

六錢

蒼朮

四錢

酒黃蘗

柴胡

黃芪

已上各三錢

酒知母

藁本

生甘草

當歸

已上各二錢

五味子

陳皮

已上各一錢五分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗
空心服之待少時以早飯下之

參歸湯

補氣必效

參

歸

補氣血俱不足

黃芪 七分

甘草

生地黄 已上各伍分

柴胡

草豆蔻仁

升麻 已上各四分

當歸身 三分

熟地黄

人參 已上各二分

益智仁 少許

紅花 少許

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

食遠服

升陽湯

治陽躄癰疾足太陽經寒恐則氣下行宜升陽氣

炙甘草 伍錢

麻黃 節 不去

防風 已上各八錢

羌活

壹兩
伍錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熟空

心服之

自汗門

自汗論

或問濕之與汗為陰乎為陽乎曰西南坤土也在人則為脾胃也人之汗猶天地之雨也陰滋其濕則為霧露為雨也陰濕下行地之氣也汗多則亡陽陽去則陰勝也甚為寒中濕勝則音聲如從瓮中出濕若中水也相法家有說土音如居深瓮裏言其壅也遠

也不出也以明其濕審矣又知此二者亦為陰寒也
 內經云氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒
 知始為熱中表虛亡陽不任外寒終傳寒中多成痺
 塞矣色以候天脉以候地形者乃候地之陰陽也故
 以脉氣候之皆有形無形之可見者也

調衛湯

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒

黃芪

麻黃根

已上各壹錢

羌活

各一分

生甘草

當歸梢

生黃芩

半夏

薑製已上各伍分

麥門冬

生地黄

已上各叁分

猪苓 煎分

蘇木

紅花 已上各壹分

五味子 朱簡

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去粗

稍熱服

中風證必自汗不得重發其汗

清燥湯

治六月七月間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合必刑庚大腸寒冷以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動行步不正兩足欹側此

藥主之

黃芪

壹錢伍分

橘皮

白朮

澤瀉

伍分

人參

白茯苓

升麻

參分

炙甘草

麥門冬

當歸身

生地黃

神麴末

猪苓

貳分

柴胡

酒黃蘗

黃連

蒼朮

壹分

五味子

玖箇

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去粗

空心熱服

當歸六黃湯

治盜汗之聖藥也

當歸

生地黄

熟地黄

黃蘗

黃芩

黃連

已上各等分

黃芪

加一倍

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞食前服小

兒減半服之

紅豆散

治頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根

炒伍錢

苦丁香

伍分

羌活

炒

連翹

炒已上各叁分

紅豆

拾箇

其諸三、導、急、大、便秘、澀、面、赤、熱、出、風、寒、難、治、方、左

身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搐急而攣
痺乃風淫末疾而寒在外也內經曰寒則筋攣正
謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之間故
大便秘澀而面赤熱內則手足陽明受邪外則足
太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪

而緩其急搐又以黃蘗之苦寒以瀉實而潤燥
急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之
經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明之經為引
用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之
邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣為之
輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥此藥主之

芍藥

伍分

升麻

葛根

人參

當歸身

炙甘草

已上各壹錢

酒黃蘗

桂枝

已上各貳錢

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞熱

服不拘時令暖房中近火摩搓其手

瀉榮湯

治瀉風滿面連頭極癢不任眉毛脫落先砭其處
令惡氣消盡後服此藥

連翹

升麻

已上各陸分

桔梗

伍分

生黃芩

生地黄

已上各四分

黃芪

蘇木

黃連

地龍

全蠍

當歸

已上各三分

白豆蔻

人參

已上各貳分

甘草

一分半

梧桐淚

一分

麝香

少許

桃仁

三箇

蚕蟲

去翅足炒三箇

水蛭

寒簡炒
令烟盡

右剉如麻豆大除連翹梧桐淚白豆蔻另為細末
麝香虫蟲水蛭三味同為細末都作一服水二盞
酒一盞入連翹煎至一盞去粗再入白豆蔻二味
并麝香等再煎至七分稍熱早飯後午前服之忌
酒濕麵生冷硬物

人參益氣湯

治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃熱傷元氣
也

黃芪 捌錢

生甘草

人參 已上各
伍錢

白芍藥 參錢

柴胡 貳錢 伍分

炙甘草

升麻 已上各 貳錢

五味子 壹百肆 拾箇

右咬咀分作四服每服水二盞煎至一盞去粗稍

熱食遠服

導氣湯

治兩腿麻木沉重

黃芪 捌錢

甘草 陸錢

青皮 肆錢

升麻

柴胡

當歸梢

澤瀉 已上各 貳錢

橘皮 壹錢

紅花

五味子 壹百貳 拾箇

右咬咀分作四服每服水二大盞煎至一盞去粗
食前熱服

補中湯

治面黃汗多目赤四肢沉重減食腹中時時痛嗽
嗽兩手寸脉短右手脉弦細兼澀關脉虛

升麻

柴胡

當歸

已上各
貳分

神麴

參分
炒

澤瀉

肆分

大麥蘖麴

捌分

蒼朮

已上各
伍分

黃芪

貳錢
伍分

炙甘草

捌分

紅花

少許

五味子

貳拾
箇

右咬咀分作二服水二盞煎至一盞去粗食遠服

麻黃蒼朮湯

治秋冬每夜五更嗽連聲不絕乃至天曉日高方
緩口苦兩脇下痛心下痞悶卧而多驚筋攣肢節
疼痛痰唾涎沫日晚神昏呵欠不進飲食

麻黃 捌錢

蒼朮 伍錢

黃芪 壹錢

草豆蔻 陸分

柴胡

羌活 已上各伍分

生甘草

當歸梢

防風 已上各肆分

炙甘草

黃芩 已上各叁分

五味子 玖箇

右咬咀分作二服水二盞煎至一盞稍熱臨卧服

上清湯

清利頭目寬快胸膈

人參

蔓荊子

已上各五分

防風

壹錢

葛根

壹錢伍分

黃芪

叁錢

甘草

肆錢

右咬咀分作二服水二盞煎至一盞去粗臨卧熱服以夾衣蓋覆不語須臾汗出為効

木桂湯

一名麻黃蒼木湯

治寒濕所客身體沉重胃脘痛面色痿黃

蒼木

貳錢

麻黃

炒神麴

橘皮

白茯苓

澤瀉

已上各壹錢

桂枝

半夏

草豆蔻仁

猪苓 已上各伍分

黄芪 叁分

炙甘草 貳分

杏仁 拾箇

右都作一服水二盞生薑五片煎至一盞去粗食

前熱服

正氣湯

治盜汗

炒黄蘗

炒知母

已上各錢伍分

炙甘草

伍分

右為麤末作一服水二盞煎至一盞食前溫服

越痛丸

治打撲閃損腰痛不可忍

乳香

沒藥 各錢

白蒿芎子 壹兩 炒黃 烏梅 壹箇

白粟米 炒

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫

酒空心下

退熱湯

治表中虛熱或遇夜則甚

黃芪 壹錢

柴胡 柒分

生甘草

黃連 酒製

黃芩

芍藥

地骨皮

生地黃 去血 熱

蒼朮 已上各 伍分

當歸身

升麻 已上各 叁分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

如身體力困者加麥門冬五味子已上各伍分人參甘草

已上各壹錢

解表升麻湯

治遍身壯熱骨節疼痛

升麻

羌活

蒼朮

已上各壹錢

防風

捌分

柴胡

甘草

已上各柒分

當歸

藁本

已上各伍分

橘皮

叁分

冬加麻黃

不去節

春加麻黃

去節

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗濫服後以

葱醋湯發之得微汗為効

天麻黃芪湯

治表有風證因連日酣飲其證復來右口角并眼頗有側視及左手左脚腿麻木疼痛

天麻

芍藥

神麴炒

羌活

肢節不痛去之

茯苓

已上各參分

人參

黃連

已上各肆分

當歸

伍分

黃芪

甘草

升麻

葛根

黃蘗

蒼朮

已上各陸分

澤瀉

柒分

柴胡

玖分

右吹咀作一服水三盞煎至一盞去粗食遠溫服

或加猪苓

陸分

健步丸

治膝中無力伸而不得屈屈而不能伸腰背腿膝

沉重行步艱難

防己

酒洗壹兩

羌活

柴胡

滑石

炒

炙甘草

瓜蒌根

酒洗已上伍錢

澤瀉

防風

已上各叁錢

苦參

酒洗

川烏

已上各壹錢

肉桂

伍分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九煎

愈風湯下空心服

白朮除濕湯

治午後發熱背惡風四肢沉重小便或多或少黃色此藥又治汗後發熱

白朮

壹兩

生地黄

炒

地骨皮

澤瀉

知母

已上各柒錢

赤茯苓

人參

炙甘草

柴胡

已上各伍錢

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠

溫服

如小便秘利減茯苓澤瀉一半

如有刺痛一料藥中加當歸身

酒洗柒錢

加味四君子湯

治久瘧熱多寒少不上

白朮

白茯苓

人參

甘草

柴胡

薄荷葉

黃芩

已上各等分

右咬咀每服五錢水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞去粗不拘時候服

瀉血湯

治發熱晝少而夜多太陽經中尤甚晝病則在氣夜病則在血是足太陽膀胱血中浮熱微有氣也

既病人大小便如常知邪氣不在臟腑是無裏證也外無惡寒知邪氣不在表也有時而發有時而止知邪氣不在表不在裏知在經絡也夜發多而晝發少是邪氣下陷之深也此雜證當從熱入血室而論之

生地黄

酒洗炒

熟地黄

蒲黃

丹參

酒炒

當歸

酒洗去土

漢防已

酒洗炒

柴胡

去芦

甘草梢

炙

羌活

已土各壹兩

桃仁

去皮參錢湯浸

右為麤末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗空

心溫服

洗面藥

治面有黥點或生瘡或生痲癩及粉刺之類并去皮膚燥癢去垢膩潤澤肌膚

皂角

叁斤去皮
茲子另搗

好升麻

捌兩

楮實子

伍兩

白芨

壹兩
細剉

甘松

柒錢

縮砂

連皮

白丁香

臘月
收

三柰子

已上各
伍分

菘豆

搗合揀淨
另搗

糯米

壹升
貳合

右為細末用之如常

瑩肌如玉散

白丁香

白芨

白牽牛

白欵

已上各壹兩

白芷

柒錢

當歸梢

白蒺藜

升麻

已上各五錢

白茯苓

楮實子

已上各叁錢

麻黃

去節貳錢

白附子

連翹

已上各壹錢伍分

小椒

壹錢

右為細末用之如常

面油摩風膏

麻黃

升麻

去黑皮

防風

已上各貳錢

羌活

去皮

當歸身

白芨

白檀

已上各壹錢

蘭室必錄

卷下

五十四

右用小油半斤以銀器中熬綿包定前藥於油中
熬之得所澄淨去粗入黃蠟一兩再熬之爲度

小兒門

治驚論

外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水
石安神丸大忌防風丸治風辛溫之藥必殺人何也
辛散浮溫熱者火也能令母實助風之氣盛皆殺人
也因驚而泄青色先鎮肝以硃砂之類勿用寒涼之
氣大禁涼驚丸風木旺必克脾胃當先實其土後瀉
其木閻孝忠編集錢氏方以益黃補土悞矣其藥有

丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香
辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子令脾胃虛反更瀉
子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關
脈洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來
乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢青白益黃散聖藥也今
立一方先瀉火補金大補其土是為神治之法

黃芪湯

黃芪

貳錢

人參

壹錢

炙甘草

伍分

右咬咀作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠服
加白芍藥尤妙

此三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫
于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火
酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位大旺
火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪

夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃寒濕大
盛神品之藥也若得脾胃中伏熱火勞役不足之
證及服熱藥巴豆之類胃虛而成慢驚之證用之
必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也
錢氏以羌活膏療慢驚風悟矣脾虛者由火邪乘
其土位故曰從後來者爲虛邪火旺能實其木木

旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於
脾土中瀉火以甘寒更於脾土中補金以酸涼致
脾土中金旺火衰風木自虛矣損食多進藥愈前
藥是也

益黃散

治胃中風熱

黃芪 貳錢

陳皮 去白

人參 已上各壹錢

芍藥 柒分

生甘草

熟甘草 已上各伍分

黃連 少許

右爲細末每服二錢水一盞煎至五分食前服

升陽益血湯

二月間有一小兒未滿一百日病腹脹二日大便
一度瘦弱身黃色宜升陽氣滋血益血補血利大
便

蠟梢貳分

神麴末

升麻已上各

當歸

厚朴已上壹錢

桃仁拾箇

右都作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠熱服

厚腸丸

治小兒失乳以食飼之未有食腸不能消化或生
腹脹四肢瘦弱或痢色無常

厚朴

青皮

已上各貳分

橘紅

半夏

蒼朮

人參

已上各叁分

枳實

麥蘖麵

神麴

已上各伍分

右為極細末水煮麵糊為丸如麻子大每服二十丸溫水送下食前忌飽食

補陽湯

時初冬一小兒二歲大寒證明堂青脉額土青黑腦後青絡高起舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳尖冷目中常常淚下仍多眵胸中不利卧而多驚無搖則寒

黃蘗

橘皮

葛根

連翹

蠍梢

炙甘草

已上各壹分

升麻

黃芪

柴胡

已上各貳分

當歸身

麻黃

已上各叁分

吳茱萸

生地黃

地龍

已上各伍分

右咬咀都作一服水一大盞半煎至六分去粗乳食後熱服服藥之後添喜笑精神出氣和順乳食旺

大蕪荑湯

一名梔子茯苓湯

治黃疳土色為熱為濕當小便不利今反利知

色為燥胃經中大熱髮黃脫落知膀胱與腎俱受
 土邪乃大濕熱之證鼻下斷作瘡者上逆行榮氣
 伏火也能乳者胃中有熱也寒則食不入喜食土
 者胃不足也面黑色者為寒為痺大便青寒褐色
 血黑色熱畜血中間黃色腸中有熱治法當滋榮
 潤燥除寒熱致津液

防風

黃連

已上各壹分

黃蘗

炙甘草

麻黃

不去根節

羌活

已上各貳分

山梔子仁

柴胡

茯苓

已上各叁分

當歸

肆分

大蕪荑

白朮

已上各伍分

右劉如麻豆大都作一服用水一大盞半煎至六

分去粗食前稍熱服

塌氣退黃湯 一名茯苓滲濕湯

治小兒面色痿黃腹膜脹食不能下

白朮

柴胡 已上各半分

升麻 壹分

桂枝

麻黃

吳茱萸

厚朴

羌活

草豆蔻

神麴末

蒼朮

澤瀉

白茯苓

猪苓

黃蘗

橘紅 已上各貳分

青皮

黃連 已上各伍分

杏仁 貳箇

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗食前溫服

中消分消丸

枳實

黃連 去鬚

厚朴 已上各伍分

生薑

薑黃

猪苓 已上各壹錢

橘皮

甘草

白朮 已上各壹錢伍分

砂仁

澤瀉

茯苓 已上各叁錢

半夏 肆錢

黃芩 壹兩貳錢

右爲細末湯浸餽餅爲丸如黍米大每服三五十

丸溫水下

消痞丸

黃連 伍錢

黃芩 貳錢

厚朴 柒分

薑黃 伍分

乾生薑

人參 肆分

甘草 叁分

枳實 貳分

橘皮 壹分

右為細末湯浸餅為丸如黍米大每服三十九
隨乳下

癩疹論

夫癩疹始出之證必先見面燥腮赤目胞亦赤呵欠
煩悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴足稍冷多睡驚並瘡疹之
證或生膿胞或生小紅癩或生癩疹此三等不同何

故俱顯上證而後乃出蓋以上諸證皆太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳導逆於面上故顯是證蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸癡證皆從寒水逆流而作也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門主男子藏精施化婦人繫胞有孕俱爲生化之源非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則爲男子三日四日五日血脈已旺精不勝血則爲女子二物相搏長生

精道釋二門言之本來面目是

二間隨母呼吸呼吸者陽氣也

食母血渴則飲母血兒

足十月降生口中尚

一六二行長命片胞口

僻於一隅伏而不發直至因內傷乳食濕熱之氣下
流合於腎中二火交攻致營氣不從逆於肉理惡血
乃發諸癩疹皆出於膀胱壬水其瘍後聚肉理歸於
陽明故三番癩始顯之證皆足太陽壬膀胱尅而小
腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱僂爲膿者

也二火熾甚反勝寒水遍身俱出此皆出從足太陽
傳變中來也當外發寒邪使令消散內瀉二火不令
交攻其中令濕氣上歸復其本位可一二服立已仍
令小兒以後再無二番癩出之患此內經之法覽者
詳之

消毒救苦散

治癩 悉具消化便令不出如已出希者再不生

癩

防風

羌活

麻黃根

升麻

生地黄

連翹

初出者減
出天者加

酒黃蘗已上各伍分

當歸身

黃連已上各叁分

川芎

蒙本

柴胡

葛根

酒黃芩

生黃芩

艾已上各貳分

細辛

生甘草

白朮

陳皮

蘇木

紅花已上各壹分

吳茱萸半分

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去

粗稍熟空心服

夫癩疹出者皆因肉傷必出癩營氣逆故也大禁牽

牛巴豆食藥宜以半夏枳木大黃益智仁之類去

其泄瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚噫嘔

知必出癍也諸大膿泡小水癍疹癩三色皆營氣

逆而寒復其表宜以四味升麻湯中加當歸身連

翹此定法也

如肺成膿癍先嗽喘或氣高而喘促加人參少加黃

芩以瀉伏火而補元氣

如心火小紅癍必先見嗑乾驚悸身熱肌肉腫脉弦

洪少加黃連

如命門出癍疹必先骨疼身熱其疼痛不敢動搖少

加生地黃又加黃蘗諸癍疹皆為陰證瘡須皆因

內傷飲食脾胃不足營氣逆行雖大熱內熾陰覆
其外治法如前

辯小兒癡證

月欠

噫噴

睡中發驚

或耳尖冷

耳澀

或辯復食

或口熱不食得如或口醋氣貝破妳辦不消

或腹中痛紅或腹中打那裡打得開一連打

如癡證少具其癡未發乃與升麻湯三五錢帶熱服
之待身表溫和癡疹已顯服藥乃止

如其身涼其癩未出辯得是癩證無問服數直候身
表溫和及癩瘡已顯然後乃止只時時與桔梗湯
寬胸膈利咽喉

桔梗湯

如癩已出只時時與之快咽喉寬利胸膈

桔梗 貳錢

甘草 壹錢

右爲末每服三錢水一大盞煎至六分去粗大

溫時時服之不可計服數

如見傷食證又見癩證先與不犯大黃巴豆藥剋化
過再與升麻湯

如食重傷前藥不能過再與犯大黃巴豆藥過

如大便行當即便與升麻湯服之恐癰子內陷已後

臨時作罪過

如癰子出稠密身表熱急與下項

黍粘子湯

如癰子已出稠密身表熱急與此藥服之防後青

乾黑脂

黍粘子

炒香

當歸身

酒洗

炙甘草

已上各壹錢

柴胡

連翹

黃芪

黃芩

已上各壹錢伍分

地骨皮

已上各貳錢

良王兒

右同為麤末每服三錢水一大盞煎至六分去粗
溫服腹空服藥畢日休與乳食

麻黃柴胡升麻湯

治小兒寒鬱而喘喉鳴腹中鳴腹滿鼻流清涕脉
沉急而數

麻黃

草豆蔻仁

益智仁已上各
錢伍分

厚朴

厚朴已上各
貳分

當歸稍

甘草

柴胡

生黃芩已上各
壹分

升麻

神麴

蘇木已上各
半分

全蠍貳箇

紅花少許

