

得効方



六七

世醫得效方卷第六

大方脉雜醫科

風證神术散

治胃經傷風自汗小便難下痢方見

類咳嗽

露宿湯治風痢純下清血

暑露杏仁

七箇去尖

苦木瘡

一掌

烏梅

一箇

米煎草果

一箇

酸石榴皮

半箇

青皮

二箇

不熱甘草

半錢

右剉散作一劑水二盃生薑三片煎七分露星

一宿次早空腹服

胃風湯治法藥件

泄方並見類



寒證一人參敗毒散治寒邪壯熱下痢及所下似痢非痢似血非血色如濁酒者加陳米百粒煎方見傷寒類

不換金正氣散治臟腑受寒下痢赤白加烏梅陳米煎方見時疫類

暑證六和湯治冒暑伏熱致成痢疾煩渴小便赤澀方見傷暑類

五苓散治同上能分陰陽利水道方見傷暑類

藥皮湯治暑痢方見泄瀉類

酒蒸黃連治伏熱瀉痢不止用香薷散燈心二

十莖車前草二根煎吞服立效方見後面及傷暑類

濕證加味除濕湯治一身盡痛重著浮黃下痢如

豆羹

半夏麴

厚朴去麴皮薑汁炒

蒼朮炒各一兩

藿香葉

陳皮炒

茯苓各五錢

粉草五錢

官桂

木香各三錢

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二

枚煎服空心仍以五苓散兼服利其小水

艾薑治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉四兩炒魚存性

川白薑一兩炮

右為末醋煮麴糊口如梧子大每服三十口溫

熱米飲下

苦散治脾受濕氣泄痢不止米穀不化

黃連去鬚剉如豆

吳茱萸

白芍藥劉到同炒如豆各二兩

右劉散每服二錢水一瓊煎至七分去滓溫服
熱證小承氣湯治下痢赤黃但煩飲冷小便不利
得熱則極心煩燥喜渴先服一二服蕩之須審是
實熱方可次用

五苓散加車前子以利小便黃連阿膠依治之
即效方見傷暑及咳類

小柴胡湯治下痢赤白心中煩燥潮熱加赤芍藥
地榆麥門冬淡竹葉煎效方見傷寒陽証類

敗毒散治同上加陳米煎方見傷寒陽証類
烏梅口治下痢純血臍腹絞痛脉急大數由腸胃

久虛或先經下血痢未止服熱藥溫毒伏熱滲成

血痢

烏梅二兩焙

當歸

黃連三兩

酸石榴皮各兩

萊菔口

右為末醋糊口如梧桐子大每服三十口米飲

湯下更以意加減服

地榆散治熱留腸胃下痢鮮血亦名發火散見傷暑類

藥皮湯治熱證發熱下痢方見泄瀉類

芍藥藥皮口治一切濕熱惡痢頻併窘痛無問膿

血並宜服

芍藥

黃藥各一兩

當歸

黃連各半兩

右為末水口小豆大溫水下三四口無時候
及夜五六服忌油膩脂肥發熱等物熱痢大效

三黃熟艾湯治傷寒四五日大下熱痢諸藥不止
宜服此除熱止痢亦作口子熱水吞下四十日治
時行毒痢良驗

黃芩 黃連

黃蘗各二分

熟艾半箇雞子大

右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服
不拘時

酒蒸黃連口治身熱下痢鮮血煩燥多渴或傷熱
物過度

黃連

去鬚

好酒

二分

右用酒浸瓦器盛置甑上蒸至爛取出曬乾研
為末用麩糊為口如梧子大每服三十口熱水
吞下又療傷酒過多臟毒下血大便泄瀉用溫

米飲下食前一日兩服

白頭翁湯治熱痢下血連月不瘥

白頭翁二兩

黃連

黃蘗皮

秦皮

各三兩

右剉散每服四錢水一盞半煎至八分不拘時
溫服

冷證當歸口治冷痢淒清腸鳴所下純白腹痛不
止手足冷者宜服之

當歸

白芍藥

附子炮

白朮

乾薑炮

厚朴製

阿膠

炒各一兩

烏梅

二兩

右為末醋糊口如梧子大每服五十口米飲吞
下空心服腹痛甚加桂半兩小便不利加白朮
苓一兩

大凡痢疾雖體寒手足逆冷冷汗自出六脉沉伏
不宜輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自
出四肢逆冷六脉虛弱但背寒面垢或面如塗
油齒乾煩冤燥渴引飲此伏暑證也小柴胡湯
五苓散酒蒸黃連必能奏效學者宜審思耳
傷寒陽証傷暑類及見前

水煮木香治純下白痢及淡紅黑痢

罌粟殼二兩去蒂萼穢

訶子肉六錢 乾薑四兩

木香

青皮

陳皮

甘草各三錢

當歸

白芍藥各半兩

右為末煉蜜如彈子大每服一口熟水空心服

豆蔻散治脾虛腸鳴久痢不止

大肉豆蔻

一枚在內以麩裹煨麩熟為度去麩

右為末每服一錢米飲調下

附子理中湯正理中湯加炮附子每料一兩木附湯

薑附湯治同上

方見霍亂中濕中暑類

玉華白丹治臟腑久虛下痢空心米飲下渴者入

參湯下亦治腸風下血

震靈丹橘皮煎治同上

方並見痢冷及虛損類

鍾乳建脾治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾

胃冷弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛

積冷下痢清穀或下純白腹中疝痛及久痢赤白

腸滑不禁少氣羸弱不思飲食並宜服之

肉桂皮去麋

人參去芦

乾薑

龍骨各一兩

蜀椒去目及汗三兩者微

當歸去芦

大麥蘖炒

石斛去根各一兩

附子炮去皮

茯苓去皮

細辛去苗

神麴炒碎

赤石脂各一兩

鍾乳粉一兩

右為末入鍾乳粉和勻煉蜜為口如梧桐子大

每服三十口食前温米飲下日三服建湯吞金

粟黄芽丹數粒方見痢冷類

木香散治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不

化臍下疔痛腹中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁

藿香葉洗焙

丁香

赤石脂

附子去皮脐醋煮

當歸去芦

肉豆蔻仁

木香

甘草炙各二兩

訶子半一兩

右剉散每服三錢生薑三片棗子二枚煎空心

温服

五積散治內傷生冷下痢加縮砂木香製粟殼炒

阿膠大效方見傷寒陰証類

椒艾口治虛寒下痢不止方見泄瀉類

四柱散治下痢又復洩瀉耳鳴手冷腹痛加木香

生薑棗子粟米煎就調後藥方見泄瀉類

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中

雷鳴及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛遍數頻多

脇肋虛滿胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

赤石脂

甘草炙各一兩

縮砂仁

五兩

肉豆蔻 麩裏煨令熟十兩

右為末二錢粟米飲調

冷熱不調下痢 **真人養臟湯**

香連 治同上 二方並見 洩瀉類

駐車 治同上 方見後已上三 方用皆立效

氣痢 牛乳湯治氣痢洩如蟹渤

葦撥 二錢 牛乳 半升

右同煎減半空腹服效

木香流氣飲 治同上 方見諸 氣類

五膈寬中散 治同上 方見五 膈類

異香散 治憂鬱氣滯不散腹中膨滿刺痛下痢不止

蓬莪茂 煨 益智仁 甘草 炙

京三稜 煨各六兩 青皮 去白 陳皮 去白各三兩

石蓮肉 一兩 厚朴 薑汁浸炒二兩

右剉散每服二錢水一椀薑三片棗一枚鹽一

捻煎七分通口服不計時或鹽湯鹽酒亦可

木香勻氣散 治氣痢腹痛經驗方見諸 痢類

積痢 治食積下痢腹內緊痛不進飲食鹽梅湯或

米飲多服盧氏感應 或用蘇合香和口仍用

平胃散五苓散 二末藥鹽湯空心服調理立安

諸積中氣脾胃傷暑類

蠟贗 又名靈砂治痢止水瀉

硃砂 研一分 辰砂 研一分 巴豆 去殼七粒

黃蠟 半兩

右以二砂為末外將巴豆黃蠟銀石器內重重
煮一伏時候巴豆紫色為度去十四粒將七粒
與二砂末同研極勻再鎔蠟置藥每旋口如棗
豆大每服三粒至五粒水浮生薑湯吞下白痢
艾湯赤痢烏梅湯五更空心時服服畢一時不
須喫食臨卧服尤佳

禁口痢敗毒散治心煩手足熱頭痛此乃毒氣上
衝心肺所以嘔而不食每服四錢水一盞半陳倉

米百粒薑三片棗一枚煎溫服

方見傷寒陽証類

真料參苓白朮散治禁口痢食飲不下棗湯調效

方見脾胃類

又方用石蓮肉留心為末陳米飲下

又方治心腹虛膨手足厥冷或飲過苦澁涼劑晨
朝未食先嘔或聞食即吐不思飲食此乃脾胃虛
弱山藥一味剉如小豆大一半銀石器內炒熟一
半生用為末米飲調下自獲其功

煨鯽魚方治禁口

鯽魚撚去膽與腸肚入白礬一大豆許同煨
熟入鹽醋喫不過兩枚與痢俱效

休息痢加味養臟湯加炮附子青皮烏藥茯苓各
五錢治傷酒肉炙燂後發為痢疾休作無時名曰
休息生薑三片紅棗二枚煎

方見泄瀉類

神效散治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸

烏梅肉

黃連

右等分為末研大蒜成膏為口如梧子大每服
二三十口厚朴湯下一方加阿膠

炒五積散治同上生薑三片紅棗二枚鹽梅一箇
木香半錢煎方見傷寒陰証類

駐車口治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛不
可忍者及治休息痢疾大效痢方之魁

黃連去鬚六兩 阿膠蛤粉炒三兩 當歸去蘆洗焙三兩

乾薑炮二兩

右為末醋煮米糊口如梧子大每服五十口加
至七十口空心米飲下

秘方養臟湯治同上方見後

大已寒口虛冷者效方見泄瀉類

薑茶口止休息痢大效

乾薑炮 建茶各一兩

右以烏梅取肉口如梧子大每服三十口食前
米飲下

毒痢苗根口治毒痢及蠱注下血如豚肝心煩腹
痛又脉或大或小浮熖而起下血如豚肝五内切
痛此因服五石湯口逼損陰氣甚則其血自百脉
經絡而來注下成蠱毒此為難治

苗根 升麻去蘆 犀角 地榆

黃連 當歸去蘆 枳殼去穰 白芍藥

右等分為末醋糊口如梧子大每五十口米飲
空心下

魚鮮湯治痢下五色膿血或如爛魚腸並無大便腸中攪痛不可忍呻吟叫呼聲聞于外

粉霜研

輕粉

朱砂研

硃砂研去石

白丁香各一錢

乳香半錢

巴豆二七箇去殼不去油

右為末蒸棗肉為口嬰孩三口如粟米大二三歲四五歲如麻粒大每用三四口並旋口煎鮮湯吞下仍間服調胃藥此證緣久積而成故小兒多有之

蠱症痢羚羊角口治下血黑如雞肝色相似時發渴者

羚羊角半一兩

宣黃連二兩

白茯苓一兩

黃栢去黑皮一兩半

右為末煉蜜口如梧子大每服五六十口蠟茶送下病危者復生若血鮮滑洩不固欲作厥狀此藥不可服當灸臍下氣海關元二穴更服玉

華白丹方見痢冷類

參附湯

人參

綿附炮去皮

肉豆蔻微火裂

右剉散每服二錢水盞半生薑七片棗二枚煎食前服

腹痛不止薑茶方治痢下腹痛肚皮熱手不可近

又方煮茶 白痢用蜜赤痢用薑末效用真人養

臟湯再加揚芍藥當歸立止方見泄瀉類

香連口治冷熱下痢腹痛甚肛門所泄皆熱方見泄濁類

木香勻氣散治宿冷不消氣滯腹痛用紫蘇湯調

下未效用乳香沒藥湯調服方見諸痢類

瘧痢六和湯治夏月冒暑瘧痢俱作瘧則間日而

寒戰掉煩燥難禁當發瘧之時痢或暫止痢則腹

痛晝夜頻數又胸滿乾嘔食藥莫下以此藥治之

用生薑三片烏梅一箇紅棗二枚麥門冬二十粒

去心煎仍間服香連口米飲下未效用五苓散

消暑口仍多服加減清脾湯更用勝金口斷之方見

痢風傷暑泄瀉中加味敗毒散治痢手足拘攣疼痛加檳榔木

瓜虛人五積散合和生薑紅棗煎方見傷寒陰証類

大防風湯祛風順氣活血脉壯筋骨逐寒濕逐冷

氣又治患痢後脚痛痿弱不能行履名曰痢風或

兩膝腫大痛髀脛枯腊但存皮骨拘攣跣卧不能

屈伸名曰鶴膝風服之氣血流暢肌肉漸生自然

行履如故

熟乾地黄洗白朮各二兩羌活去芦

人參去芦各一兩川芎洗附子炮去皮脐各一兩半

防風去芦二兩牛膝去芦酒浸切

川當歸洗去芦二兩黃耆去芦微炒

杜仲去麋皮炒白芍藥各二兩甘草炙一兩

右剉散每服五錢水一椀半生薑七片大棗一

救煎八分空腹温服

〔郁李仁〕治痢後風手足不能屈伸或麻豆證傳變手足筋脉急亦能治之

郁李仁

枳殼

川獨活

鰲甲醋炙

右等分為末木瓜湯調下酒亦可

〔又方〕治脚手皆腫不能行步

川烏

赤芍藥

蒼朮酒浸

土朱

右為末糊口如梧子大引子同土

通治〔木香散〕住腹痛痢

南木香五錢

地榆一兩

黃連七錢

青皮去穢

赤芍藥

枳殼煨去

乳香

甘草各五錢

右為末每服二錢熱湯調服

〔黑豆散〕

小黑豆炒

川練子

烏梅

甘草

乾薑

罌粟殼二箇去蒂穢

右剉散煎至七分將紗濾過捩自然汁空腹服

〔當歸散〕住瀉痢

地榆

陳皮

罌粟殼去蒂穢

當歸去尾

赤芍藥

甘草

肉豆蔻煨

加黃連

右等分為末每服一錢冷水調服

獨神口治痢神效

罌粟殼

十分生用去穰皮蒂萼一分醋炒一分蜜炙

右為末用蜜口如小指頭大紅痢生地黄春茶

煎湯嚼下白痢烏梅甘草節但為末二錢陳米

鹽梅湯亦效

神應散治痢緊嚴絕妙

金罌草

梗

肉豆蔻

訶子

罌粟殼

去蒂萼

地榆

甘草

當歸

去尾

茯苓

白朮

枳殼

去穰

烏梅

各一兩

丁皮

木香

住痛各五錢

陳皮

若一兩取紅生血勿用

右為口或末五花痢用春茶陳皮煎湯下如是

末用蜜一匙春茶烏梅煎湯調服

又方

金罌華葉及子

罌粟殼

去穰及蒂萼醋炒

右為末用蜜口如手指大湯引同上

秘方養臟湯治五色痢經驗

陳皮

去白

枳殼

去穰

黃連

去鬚

南木香

烏梅

去核各五錢重

罌粟殼

去蒂膜蜜炒一兩重

厚朴

去麁皮薑汁炒

杏仁

去尖皮

甘草

各五錢重

右到散五色黑豆棗子煎紅痢生地黄春茶甘

草節煎服五色久不效加龍骨赤石脂人參揚

芍藥各一兩為末蜜口烏梅甘草湯下粟米飲

亦可立效

〔大阿膠〕治發熱下痢腹痛至甚肛門痛欲絕者

當歸

阿膠炒

豆蔻煨

龍骨

赤石脂

大艾

黃連各半

木香

乳香別研五錢

白礬枯一

右為末鹽梅肉口每服三十口如梧子大陳米

飲下

〔四物湯〕治血痢方見婦人科通治類

〔駐車〕治同上方見前

〔九聖〕治下痢赤白日夜無度裏急外重緊痛服之特效

罌粟殼去蒂膜米醋炒一兩重

川烏炮去皮臍

黃連去鬚

南木香

北赤石脂

粘礬

肉豆蔻火煨

乾薑

白茯苓去皮各五錢重

右為末醋煮陳米粉糊為口梧桐子大每服五十口空心米飲下腹痛不止當歸乳香湯下又

名〔緊皮〕

〔立效散〕治同上

罌粟殼六兩去蒂萐穢蜜炒赤

當歸一兩

芍藥

榴皮

地榆各二兩

甘草一兩

右劉散每服三錢水一瓊同煎溫服

〔天斷下〕治久痢不止方見泄瀉類

〔沒石子〕治臟氣虛弱大腸滑洩次數頻併日漸

羸瘠不進飲食或久患赤白痢脾浮等疾並皆治之

白朮

白茯苓

各三錢

白薑

切作片略炒

訶子

紙裹炮取皮

赤石脂

別研

丁香

不見火各二錢

肉豆蔻

麩裹炮

沒石

麩裹炮各二箇

右和勻用湯泡蒸餅為口小梧桐子大每服三四十口米飲吞下粥食前一日三四服棗肉口亦可

荆芥湯治白痢血痢或婦人血崩

荆芥

楮樹皮

右等分剉散治血崩每服二錢水一盞煎至七分去滓放溫服如血痢則為末冷醋調徐徐呷

服白痢熱醋調下神效不可具述

香茸口治下痢危困

麝香

半錢別研臨時入

鹿茸

一兩火燎去毛酥炙

右鹿茸為末方入麝香以燈心煑棗肉口如梧子大每服五十口空心服每料加滴乳香半兩尤效有人苦痢疾凡平時所用罌粟殼之類不可向口往往不救而死唯服此等藥或沒石子口作效

平胃散治血痢

方見前

右秤一兩入川續斷麋末二錢半拌勻每服二錢水一盞煎七分服

方見脾胃類

樗白皮散治下痢諸藥不效

白樗白皮一握粳米五十粒葱白一握甘草一
錢二寸豉二合水一升取半升頓服小兒量大
小加減

百中散治一切痢不問赤白或一日之間一二百
行只一服便疎再二三服即愈

罌粟殼

二兩半去上下蒂及穢到
成片子蜜炒令赤色淨秤

厚朴

二兩半去麩皮淨秤用薑汁
淹一宿炙令薑汁盡為度

右為末每服二三錢米飲調下忌生冷油膩魚

鮮毒物

酸石榴皮散治同上

石榴皮

陳皮

甘草

川當歸

罌粟殼

去蒂萼
各半兩

右到散用水十盞煎取三盞次用下藥

茯苓

七錢

粉草

七錢

北五味子

七箇

右為末將前藥汁入此三味再煎五七沸去滓
空心溫服甚者不過兩劑輕者一劑立效

乳香散治痢疾甚者數服止

人參

白朮

當歸

地榆

阿膠

蚌粉

炒黃

甘草

各一錢

乳香

少許

肉豆蔻

二箇麩
裏煨

右到散每服三錢水一椀煎至七分去滓溫服

仍無服來復丹

方見痢
冷類

加減木香煑散治一切痢神妙

木香

甘草

當歸

肉豆蔻

人參

官桂

揚芍藥

訶子

烏梅核去

阿膠

蚌粉炒

白茯苓

各五錢

罌粟殼

一兩半去蒂
萼穰切蜜炒

右剉散每服四錢水一椀半生薑三片紅棗二

枚同煎去滓空腹服

〔加味四君子湯〕治久患痢疾服藥已多而疾不愈

但治痢多是攻擊臟腑之藥轉覺難安宜用輕清

和氣之藥即愈

人參

白朮

白茯苓

川芎

黃耆

甘草

罌粟殼

製同上

右各等分剉散每服三錢水一椀半生薑三片

棗子二枚烏梅一箇煎溫服

〔蒲黃散〕治婦人胎前產後赤白痢

生薑自然汁

年少者十兩
老者二十兩

鴨子

一箇打碎入
薑汁內攪勻

右二味煎至八分入蒲黃三錢煎五七沸空心

溫服效

〔單方〕治痢無問赤白

玄胡索不以多少新瓦上炒過為末每服二錢

米飲調下只一服取效

〔又方〕治暑毒濕氣下痢

雄黃一味乾蒸研為末甘草湯調服即效

〔灸法〕泄利食不消不作肌膚灸脾腧隨年壯其穴

在第十一椎下兩傍各去一寸半

泄利不禁小腹絞痛灸丹田百壯其次在臍下一寸又灸臍中一二十壯灸關元穴百壯泄痢不嗜食雖食不消灸三報穴在俠臍相去五寸一名循際

秘澁

小便不通熱證八正散治心經邪熱小便赤澁不通加燈心枳殼車前草地膚子煎

方見積熱類所加並半錢

五苓散治小便不通壅上心滿燈心十莖車前草

二根煎湯調

方見傷暑類

通心飲治心經有熱唇焦面赤發熱小便不通每服四錢水一盞半燈心十莖滑石末一匕麥門冬二十粒桑白皮七寸煎去滓再入生車前草汁一

合攪勻服

方見小方科諸熱類

瓜蒌散治腹脹小便不通

瓜蒌仁不以多少為末每服三錢溫酒調

不飲

用米湯頻服通為度

虛證八味口治腎虛小便秘澁不通或過服涼藥者每服五十口溫鹽湯下立效

方見虛損類

附子散治小便不通兩尺脉俱沉微乃陰虛故也

用淋閉通滑之劑不效者

綿附子

一兩重炮去皮時鹽水內浸炙久

澤瀉

不蛀者一兩重

右劉散每服四錢水一盞半燈心七莖煎隨通

而愈

琥珀散治老人虛人心氣閉塞小便不通

利氣散 治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃耆去蘆 陳皮去白 甘草各等分

右剉散每服三錢水一盞煎服自然流通

參耆湯 治心虛客熱乘之小便澀數數而瀝

赤茯苓七錢 生乾地黄 綿黃耆去蘆

桑螵蛸炙微 地骨皮去骨各半兩 人參去蘆

北五味子去梗 兔絲子酒浸 甘草各二錢半

右剉散每服新水一盞煎臨熟入燈心二十一

莖溫服

轉胞滑石散 治胞為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內洩應

出不得出小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石二兩 白滑石一兩 葵子一合

亂髮灰 車前子 木通去皮節各一兩

右剉散水一斗煮取五升時時服一升即利

八味口 治虛人下元冷胞轉不得小便膨急切痛

經四五日困篤欲死每服五十口鹽湯下方見虛損類

葱白湯 治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶

絕欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱

閉而不流氣衝胞系不正

陳皮三兩 葵子一兩 葱白一莖

右剉散水五升煮取二升分三服

洗方 治胞轉小便不能通先用

良薑

葱頭

紫蘇莖葉

各一握

右煎湯密室內熏洗小腹外腎肛門留湯再添
蘸綿洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐垂脚
自舒其氣次用

蜀葵子

二錢半

赤茯苓

赤芍藥

白芍藥

各半兩

右判散每服三錢煎取清汁再暖乘熱調蘇合
香口三口并研細青鹽半錢食前温服

〔又法〕炒鹽半斤囊盛熨小腹

〔葱熨法〕治小便難小腸脹不急治殺人用葱白三
斤細剉炒令熟以帕子裹分作兩處更替熨臍下
即通

〔大便不通〕風秘脾約〔麻仁口〕治風秘脾約證小便
數大便秘

大黃

赤芍藥

枳殼

炒各一兩

厚朴

半兩薑汁炒

麻仁

一兩別研

杏仁

去皮尖一兩別研

右為末煉蜜口如梧子大每服三十五口温水
吞服〔枳殼散〕温水調送下尤妙

方見婦人科護胎類

〔皂角口〕專治有風人臟腑秘澁大效

猪牙皂角

厚枳殼

去穢

羌活

桑白皮

檳榔

杏仁

製同別研

麻仁

防風

川白芷

陳皮

去白

右等分為末蜜口如梧子大每服三十五口温

水吞下蜜湯亦可

〔又方〕皂角口治大腸有風大便秘結尊年之人宜服

皂角子炙去

枳殼去穢

右等分為末煉蜜口如梧子大每服七十口空

心食前米飲送下

〔疎風散〕治風毒秘結

枳殼製半

防風 羌活

獨活

檳榔

白芷 葳靈仙

蒺藜去刺

麻仁妙別

杏仁湯洗去皮

甘草炙各

右剉散每服二錢半生薑五片蜜一匕水一盞

大半煎服

〔枳殼口〕治腸胃氣壅風盛大便秘實

皂角去皮弦

枳殼妙

大黃

羌活

木香

橘紅

桑白皮

香白芷各等

右為末煉蜜口如梧桐子大每服七十口空心

米飲下

〔又方〕只用枳實皂角等分為末飯飲為口亦妙治法

湯引

〔順氣口〕治三十六種風七十二般氣上熱下冷腰

脚疼痛四肢無力惡瘡下疰疎風順氣專治大腸

秘澁真良方也

大黃五兩半生用 山藥剉去 山茱萸肉

麻子仁

二微炒退殼

郁李仁

皮炮去研

兔絲子

酒浸炒

川牛膝

各酒浸一宿

防風

枳殼

炒

川獨活

各一兩

檳榔

車前子

二兩半

右為末煉蜜為口

如梧桐子大每服二三十口

用茶酒米飲任下

百無所忌平旦臨卧各一服

又服自然精神強健百病不生

搜風散治大便秘結

青皮

去白

威靈仙

去頭洗各二兩

大黃

生一兩

大戟

一兩

牛蒡子

四兩新瓦上炒

右為末每服一錢

人壯實每服三錢蜜酒調服

畢嗽口

二仁口

專治虛人老人風秘不可服大黃藥者

杏仁

去皮尖炒黃

麻仁

各別研

枳殼

去穢炒赤

訶子

慢火炒去核

右等分末煉蜜口

如梧子大每服三十口溫水下

下

氣秘

三和散方見諸氣類

四磨湯

治氣滯腹急大便秘澀

大檳榔

沉香

木香

烏藥

右四味於搗盆內各磨半錢

和勻溫服有熱者

加大黃枳殼名六磨湯

蘇子降氣湯

治氣不下降大便不通加枳殼杏仁

方見諸氣類

橘杏口

治氣秘老人虛弱人皆可服

欬橘紅取末

杏仁湯浸去皮尖別研

右各等分煉蜜口如梧子大每服七十口空心蘇米飲下

蘇麻粥此藥順氣滑大便

紫蘇子

麻子仁

右二味不拘多少研爛水瀉取汁煮粥食之小通氣散治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳送致令秘澁服燥藥過大便秘亦可用

陳皮

去白

蘇嫩莖葉

枳殼

去穰

木通

去皮節

右等分剉散每服四錢水一盞煎溫服立通積滯秘結脾積口治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞

酸大便秘結

蓬莖朮

京三稜

良薑

半兩已上用米醋一升於磁瓶內煮乾乘熱切碎焙

青皮

去白

南木香

半兩

不蛀皂角

三大錠燒存性

百草霜

村莊家鍋底者佳

右末用川巴豆半兩只去殼研如泥漸入藥末研和麩糊口麻子大每服五十口加至六十口橘皮煎湯送下

木香逐氣口治食積氣滯通利大便兼治脚氣小腸氣諸氣攻刺腹痛

橘紅

青皮

去白

檳榔

雞心者各半兩

南木香

二錢半

川巴豆肉

一錢半

漸入藥夾研

如泥

右為末生薑自然汁調神麩末為糊口如麻子
大每服十口薑湯下如氣攻腹痛枳殼木瓜煎
湯下

〔感應〕治飲食所傷三焦氣滯大便秘澀

百草霜用村莊家鍋底上新揀丁香 一兩

杏仁去雙仁揀肥者一百四十箇去尖

南木香去芦頭 肉豆蔻去麁皮用滑

川乾薑炮製 巴豆研細出盡油如粉

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味搗為

末與三味同拌研令細用好蠟燭和先將蠟六

兩溶化作汁以重綿濾去滓更以好酒一升於

銀石器內煮蠟溶袞數沸傾出候酒冷其蠟自

浮於上取蠟秤用凡春夏修合用清油六兩於

銚內熬令香熟次下酒煮蠟四兩化作汁

就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油

一兩半同煎煮熱作汁和蠟置藥末成劑分作

小錠子以油單紙裹之旋口服餅

虛秘半硫 治年高冷秘及痲痺冷氣

生硫黃 半夏等分

右為末生薑自然汁煮麩糊為口如梧子大每

服三十口空心飯飲下酒亦可

〔金液丹〕治大便挾冷結滯用麻仁杏仁煎湯下傷

寒陰結亦用方見類 〔歲靈仙〕治年高氣衰津液枯燥大便秘結

黃耆蜜炙 枳實 葳靈仙

右等分為末用蜜口如梧子大每服五七十口

金薑湯熟水下一方用防風無黃耆忌茶

五仁口治津液枯竭大腸秘澁傳導艱難

桃仁炒去皮 杏仁炒去皮 拍子仁半兩

松子仁一分 郁李仁一錢 陳皮四兩

右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜為丸

如梧子大每服五十口空心米飲下

潤腸口治發汗利小便亡津液大腑秘老人虛人

皆可服

沉香別研 肉蓯蓉酒浸焙

右為末用麻子仁汁打糊為口如梧子大每服

七十九九空心米飲送下

又方治大便秘澁連日不通

麻子仁一盞半細研用水

脂麻半盞微炒研用 桃仁湯洗去皮焚

荆芥穗搗末各

右用前藥入鹽小許同煎可以當茶飲之以利為度

葱白湯治老人大便不通

葱白二莖 阿膠一片

右以水煎葱候熟不用却入阿膠溶開溫服

胃氣口治老人胃寒氣怯大便反秘每服五十九

米飲空腹下未效生薑自然汁著熱水小許吞下

方見霍亂類

黃耆湯治年高老人大便秘澀

綿黃耆

陳皮

去白各半兩

右為末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿水一盞濾去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘澀之患此藥不冷不燥其效如神

熱秘神功口治氣壅風盛大便秘澀後重疼痛煩悶此藥當量虛實加減

大黃

四兩煨蒸皆可

人參

二兩

訶子皮

四兩

麻仁

二兩別研

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九溫湯酒

米飲任意下食後臨卧服

攪榔口治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便秘

結

攪榔

大黃

蒸

麻子仁

炒去殼別研

枳實

炒

羌活

去

牽牛

炒

杏仁

去尖炒皮

白芷

黃芩

各一兩

人參

半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九空心熱

水下

四順清涼飲治同上每服三錢水一盞半燈心十

莖枳殼十片去穰煎立效

方見積熱類

小三黃口治熱証大便秘結每服三十口溫水下

方見積熱類

小柴胡湯治傷寒陽結能食而大便不下方見傷寒類

濕秘檳榔散治腸胃有濕大便秘澀

檳榔不拘多少

右為末每服二錢用蜜湯點服不以時候

香蘇散多加枳殼檳榔亦效方見傷寒類

通治甘遂散治大小便不通

右以甘遂二兩赤皮者為末煉蜜二合和勻每

一兩重分作四服日進一服蜜水下未知日二

服漸加之

又方葵子末三合青竹葉一把水一升煮五沸頓

服

又方葵子末三合水一升煮去滓分作二服猪脂

二兩空心

又方治大小便關格不通經三五日者用不蛀皂

角燒灰米湯調下即通

又方猪脂二兩水一升煮三沸飲汁立通

八正散治同上方見積熱類

推車散治大小便秘經月欲死者

推車客七箇

土狗七箇

如男子病推車客用頭土狗用身如女子病土狗用頭推車客用身

右新瓦上焙乾為末用虎目樹皮向南者濃煎

汁調只一服經驗如神

又掩臍法治大小便不通用連根葱一莖帶土不洗以生薑一塊淡豉二十一粒鹽二匙同研爛換餅烘熱掩臍中以帛扎定良久氣透自通不然再換一劑

通治大便不通大潤腸口大便秘澁通用

杏仁去皮尖 枳殼浸去穢 麻仁

陳皮各半 阿膠 防風各二錢半

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九老者蘇子煎湯下壯者京芥泡湯下

獨棗湯治大便積日不通

大好棗一枚擘開入

右以棗相合麻線扎縛慢火煮熟嚼細以棗汁

送下

敷葉治閉結至亟昏不知人生大螺一二枚以鹽

一匕和殼生擣碎置病者臍下一寸三分用寬帛

緊繫之即大通未效烏柏木根三寸研井水服亦

效就多研爛敷臍下亦可

蜜兌法蜜三合入猪膽汁兩枚在內煎如飴以井

水出冷候凝然如指大長三寸許納下部立通活

人書單用蜜一法入皂角末在人斟酌用一法入

薄荷末代皂角用尤好又或偶無蜜只嚼薄荷以

津液調作挺用之亦妙

煨蒜方獨頭蒜煨熟去皮以綿裹納後部即通

熏方不蛀皂角用碗燒置於桶內熏其後部自通

老人臟腑秘不可用大黃老人津液少所以臟腑秘澁更服大黃以溼之津液皆去定須再秘甚於前只可服寬潤大腸之藥更用槐花煎湯淋洗亦效更有老人發熱而大腑秘澁或因多服丹藥脾胃虛弱煮化不行遂為臟腑積熱須用神保口得通溼一行熱亦即退

脹滿

風寒暑濕脹大正氣散治脾胃怯風寒濕氣傷動冲和心腹脹滿有妨飲食

厚朴

薑製

藿香葉

半夏

湯泡七次

橘紅

白朮

各一兩

甘草

炙

檳榔

桂枝

不見火

枳殼

去穢炒

乾薑

炮各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片棗子二

枚煎至七分去滓不以時溫服

平肝飲子治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿連兩脇妨悶頭暈嘔逆脉來浮弦

防風

去芦

桂枝

不見火

枳殼

去穢炒

赤芍藥

桔梗

去芦炒各一兩

木香

不見火

人參

檳榔

當歸

去芦酒浸

川芎

橘紅

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞薑五片煎七分不拘

時溫服

五膈寬中散治七氣流滯飲食不下氣滿膨脹

木香流氣飲調榮衛利三焦行痞滯消脹滿方見諸氣類

附子粳米湯治憂怒相乘神志不守思慮無并擾

亂臟氣不主傳導使諸陽不舒反順為逆中寒氣

脹腸鳴切痛胃脇逆滿嘔吐不食

附子一箇生去皮

半夏湯洗七次

粳米各三錢

甘草錢半

乾薑一分

右剉每服二錢水二盞棗三箇煎至七分去滓

食前服

溫胃湯治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與

胃氣不平脹滿衝欬食不得下脉虛而緊瀆

附子炮去

當歸

厚朴去麩皮

人參

橘皮

白芍藥

甘草炙各

乾薑一分

川椒炒出汗去合

右剉散每服四大錢水二盞煎七分去滓食前

服

沉香降氣湯治中脘脹滿時復脇肚痛楚每噫則

覺氣快不噫則悶漸覺面浮磨擯榔入紫蘇同煎

下神保口五七口諸氣類

穀脹大異香散治失飢傷飽痞悶停酸早食暮不

能食名穀脹

京三稜

蓬朮

青皮

陳皮

半夏麴

藿香

北梗

益智仁

枳殼製

香附子

甘草

積殼製

右到散每服三錢水盞半薑五片棗二枚煎服

葶澄茄口治痞滿脹痛穀脹氣脹通用

葶澄茄

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

蘿蔔子

木香

肉豆蔻

茴香

藜蘆

丁香

陳皮

藜蘆

右為末麴煮稀糊丸梧桐子大每服三十九陳

皮湯下

水脹大半夏湯治脾土受濕不能制水水漬於腸

胃溢於皮膚澆澆有聲怔忡喘息名水脹

半夏

陳皮

茯苓

桔梗

檳榔

甘草

右到散每服三錢水一盞半生薑三片煎溫服

青木香口治同上

方見諸

血脹人參芎歸湯治煩燥嗽水迷忘驚狂痛悶喘

惡虛汗厥逆小便多大便黑名血脹

當歸

半夏

川芎

蓬朮

木香

縮砂仁

烏藥

甘草

人參

藜蘆

五靈脂

右到散每服三錢薑五片棗二枚紫蘇四葉煎

食前服

熱脹一七物厚朴湯治腹滿發熱以陽并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱脉必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如故致脹滿者為熱脹

厚朴 薑汁炒

甘草 炙

大黃 蒸各三錢三字

枳實 麸炒去穢半兩

桂心 一分

右判散每服四錢水盞半生薑七片棗三枚煎

至七分食前服嘔加半夏利者去大黃寒多則

加生薑十片

一推氣口治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿大便秘

澀小便赤少並宜服之

大黃

陳皮

檳榔

枳殼 小者去穢

黃芩

黑牽牛

生用各等分

右為末蜜丸如梧桐子大每服五七十九臨臥以溫熱水下更量虛實加減

寒脹朴附湯治老人虛人中寒下虛心腹膨脹不

喜飲食脉來浮遲而弱此名寒脹

附子 炮去皮

厚朴 薑製炒

右等分剉散每服四錢水二盞生薑七片紅棗

二枚煎至八分去滓溫服不拘時候加少木香

尤佳

順氣木香散治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞悶脇

肋脹滿及酒食所傷噎氣吞酸心脾刺痛大便不

調面色痿黃肌肉消瘦可思飲食無婦人血氣刺痛及一切冷氣並治之

丁皮火不見

縮砂仁

良薑去蘆

肉桂去皮

乾薑炮

甘草炙

陳皮去白

厚朴去蘆皮

蒼朮浸炒

桔梗去蘆

茴香炒各三兩

右剉每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至八分稍熱不拘時或入鹽小許沸湯點服寬中順氣和胃進食

食脹強中湯治脾胃不和食啖生冷過飲寒漿多致腹脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾薑炮去土

白朮各一兩

青皮去白

橘紅

人參

附子炮去皮

厚朴薑製

甘草炙各半兩

草果仁

丁香各三兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片大棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時嘔者加半夏半

兩或食麪致脹滿加蘿蔔子半兩

溫中散治虛人老人喜啖生冷多致腹脹心下痞滿有妨飲食或刺痛洩利氣痞滯悶

厚朴去皮

甘草細剉

生薑洗切

青州棗切各等分

右以厚朴甘草搗令得所方入生薑再杵令勻取出同棗焙令溫溫微燥却入鍋內慢火炒至紫色再焙乾為末每服一大錢擦生薑少許沸

湯點空腹以和為度氣味甚美兼能愈疾又易修合

桂香口治大人小兒過食雜果腹脹氣急

肉桂 不見火 一兩

麝香 別研 一錢

右為末飯丸如菉豆大大人五口小兒七口不拘時候熟水送下未痊再服

獨聖散治脾胃不足過食瓜菓心腹堅脹痛悶不安

鹽 五合

右用水一升煎消頓服自吐下即定或因食麥令人腹脹暖酒和薑汁飲一兩盃即消

感應口治積食停滯脾胃作脹 方見秘澁類

北亭口治稟受怯弱脾胃易傷因此積聚中脘脹滿心腹堅硬疴痛攻衝牽引小腹如蠱之狀 見虛損類
溫白口治心腹積聚九癥癖塊腹脹心下堅結大如杯椀傍攻兩脇心痛積年食不消化

吳茱萸 湯洗七次焙炒

桔梗 去芦

柴胡 去芦

菖蒲

紫苑 去苗葉土 黃連 去鬚

乾薑 炮

肉桂 去皮 茯苓 去皮

蜀椒 去目及汗

人參 去芦 厚朴 去麁皮

巴豆 去皮心上各半兩

川烏 炮去皮

皂莢 去皮子

右為末入巴豆令勻煉蜜口如梧子大每服三十丸紫蘇湯下取下積滯如魚腦爛綿而安

鼓脹嘉禾散四柱散治脾胃虛憊腹脹如絀鼓氣

宇喘促食後愈甚方見脾胃類四柱散方見泄瀉類

厚朴橘皮煎治傷冷澹下腹肚膜脹其狀如覆栲

栲喘息奔急鼻張口吐氣上下不得分泄

厚朴製去麁皮薑枳殼麩炒

良薑切各一兩二錢青皮去白

肉桂去皮麁全蝎去尾足毒

右為末醋糊口如梧子大每服三十九生薑橘皮湯吞下或紫蘇湯下

三稜煎口青木香口治心腹堅脹喘滿短氣膨緊

促噫氣不通飲食不消或嘔逆吐痰或腸中水聲

大便或秘或泄二藥合和每服三十口食後米飲

下方見諸氣類

四炒枳殼口主腹脹鼓疾

枳殼去穢四兩切作片子四分處炒

右分作四分每分一兩一分用剉碎蒼朮一兩

同炒一分用蘿蔔子一合同炒一分用乾漆一

兩同炒一分用茴香一兩同炒各以枳殼黃為

度只取枳殼一味為末却將蒼朮等四味用水

二椀煮至一椀半去滓取汁煮麩糊為丸如梧

桐子大每服五十九食後米飲下

氣針口專治氣膨

全蝎并去毒足木香 丁香不見火胡椒

肉豆蔻一塊各兩片子薑黃 青皮去白各

右為末用蘿蔔子炒淨退殼取仁四兩爛研和藥令勻紅酒生薑汁各少許煮糊丸如梧子大每服四五十口紫蘇陳皮湯下不以時候

〔丁沉透膈湯〕治氣滿不食腹中膨脹刺痛胃方見脾〔導氣口〕治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便結秘等証又腎氣小腸氣等功效尤速

青皮水蛭等分同

莪朮去虫等分同

胡椒去苗香炒

三稜去乾漆炒

檳榔去斑貓炒

茱萸去牽牛炒

赤芍去川椒炒

石菖蒲去桃仁炒

乾薑去礪砂炒

附子去青鹽炒

右各剉碎與所註藥炒熟去水蛭等不用紙以

青皮等十味為末酒糊丸如梧子大每服五十丸加至七十口空心紫蘇湯吞下

〔熨法〕治腹脹緊如鼓澁如木皮樣

杜烏藥 荊芥 蒼朮 茵草

山茵陳 夏蠶沙 松毛 樟根葉

肚蒜 螃蚬葉 橘葉 椒目

烏豆 赤豆 藟各等分

右剉細分作二次炒熟以布袋盛熨腫處冷又炒熨三四十度或後用煎水熏洗或服〔神保口〕微溏泄去其氣

〔敷藥〕治腹緊硬如石或陰囊腫大先用熱水嚼甘草後用

大戟 芫花 甘遂 海藻各等分

右為末醋調塗或用白麪和藥調一片覆肚上
通治沉香飲治腹脹氣喘坐卧不得

沉香 木香 枳殼各半兩 蘿蔔子一兩炒
右到散每服三錢水一盞半生薑三片煎七分
温服

小檳榔口治脾虛腹脹不進飲食快氣寬中

蘿蔔子炒 檳榔煨 黑牽牛炒 木香各半兩

右末水煮麪糊口梧桐子大每服三十口薑湯
食前下

灸法脹滿水腫灸脾腧隨年壯穴在第十一椎下
兩傍各去一寸半

胸滿心腹積聚痞痛灸肝腧百壯穴在第九椎
下兩傍各去一寸半

腹脹滿繞臍結痛堅不能食灸中守穴百壯在
臍上一寸一名水分

脹滿癥聚滯下冷疼灸氣海十壯穴在臍下一
寸五分

腸中膨脹不消灸大腸腧四十九壯穴在第十
六椎下兩傍各一寸半

腸中雷鳴相逐痢下灸承滿五十壯穴在俠巨
關相去五寸巨關在心下一寸灸之者俠巨關
兩邊各二寸半

五臟六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來

小便不利羸瘦少氣灸三焦腧隨年壯穴在十
三椎下兩傍各一寸半

世醫得效方卷第六終

世醫得效方卷第七

大方脉雜醫科

瘡渴

肺瘡澄源丹治氣實血虛熱在上焦心煩燥渴引
飲無度小便數晝夜一二十行有麩片甜者此疾
多得之飲啖炙煨日就羸瘦咽喉唇口焦燥吸吸
小氣不能多語兩脚痠食倍於常不為氣力

牡蠣粉

苦參

蜜陀僧

知母

水銀

以白蠟半錢結

括樓根

一兩

黃丹

銀一兩與水同研

右為末男子用雌猪肚一箇女人用雄猪肚一
箇入藥在內以線縫定用繩縛在新磚上別用

生括樓半斤切碎同煮早晨至午時取藥出不
用括樓根只爛研猪肚和藥為口如梧桐子大
每服二十粒食前米湯下日三服十日可去病
根

真珠口治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲
過多皆致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或
不利

知母 一兩

川連 一兩

苦參

牡蠣 煨 一兩

天花粉 各半

白扁豆 煮去皮 一兩

少許口如梧子大

醫學綱目二十二腹扁門神聖復氣湯 干姜三分 人參五分 半夏七分
柴胡 黃芩 各八分 防風五分 羌活 甘草 各八分 升麻 白芍 各五分
當歸 黑附子 各三分 杏仁 五分 郁李仁 五分 右作一服水三盞煎至三盞
入黃芪 芫荽 陳皮 各五分 右件入在內再煎至一盞再入下項藥
黃柏 五分 葶連 酒炒 三分 枳殼 三分 生草 三分 以上四味 預一日別用新汲
水浸 又次入知母 三分 川芎 三分 蔓荊子 三分 預一日用水半大盞分作二
處浸此三藥并黃柏等藥 前項藥作一大盞不去查入此浸藥再上火
煎至一大盞查相熱服空心

用金銀箔為衣每服二十口至三十口先用括
樓根汁下一服次用麥門冬熟水下病退日二
服忌炙烤酒色次投菝葐口補

菝葐口

菝葐

酒浸

磁石

煨碎

熟地黄

洗

山茱萸

去核

黃耆

湯浸 鹽

澤瀉

鹿茸

去毛切

遠志

汁炒 薑

石斛

覆盆子

五味子

去梗

草薺

破故紙

炒

巴戟

酒浸

兔絲子

酒浸

龍骨

杜仲

去皮剉薑汁拌

附子

炮去皮臍 一錢

右為末煉蜜口梧桐子大每服五十口空腹米

生括樓半斤切碎同煮早晨至午時取藥出不
用括樓根只爛研猪肚和藥為口如梧桐子大
每服二十粒食前米湯下日三服十日可去病
根

真珠口治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲
過多皆致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或
不利

知母 一分兩
玄參 各一兩
朱砂 二別兩研
金箔 二百片
銀箔 二百片
白扁豆 煮去皮
右為末煉蜜入生括樓根汁少許口如梧子大

用金銀箔為衣每服二十口至三十口先用括
樓根汁下一服次用麥門冬熟水下病退日二
服忌炙燻酒色次投菴蓉口補

菴蓉口

菴蓉 酒浸
磁石 煨碎
熟地黄 洗

山茱萸 去核
黃耆 湯浸
澤瀉

鹿茸 去毛切
遠志 汁去心薑
石斛

覆盆子
五味子 去梗
草薺

破故紙 炒
巴戟 酒浸
兔絲子 酒浸

龍骨
杜仲 去皮剉薑汁拌

附子 炮去皮臍一錢

右為末煉蜜口梧桐子大每服五十口空腹米

飲下

〔生地黄膏〕治渴證通用

生地黄束一如常椀 冬蜜一椀

人參半兩

白茯苓去皮一兩

右將地黄洗切研細以新水一椀調開同蜜煎至半次入參苓末拌和磁器密收匙挑服

脾瘕之證飲食入腹如湯澆雪隨小便而出落於溷僻溝渠中皆旋結如白脂肌膚日益消瘦用熱藥則熱愈甚用涼藥則愈見虛羸不能起止精神恍惚口舌焦乾或陽強興盛不交而泄其斃不久無治法姑錄一二方聊為備用

〔薑粉散〕治消中多因外傷瘴熱內積憂思喜啖鹹食及麪致脾胃乾燥飲食倍常不為肌膚大便反堅小便無度

生薑研汁

輕粉

右搜勻每服二錢匕長流水調下齒浮是效次

投附子猪肚口補

〔附子猪肚口〕

附子炮去皮臍

檳榔剉焙各一兩

鱉甲醋煮七錢半

當歸

知母

木香

川練子去核剉

秦艽去苗土

大黃酒蒸

龍膽草

白芍藥

破故紙酒浸炒

枳殼炒去穰各半兩

右為末分作三分將二分入猪肚內縫定用蜜

酒三升童子小便五升同入砂鉢內熬乾爛研細入一分末同搜擣為口梧桐子大每服五十口温酒米湯任下

白朮散治消中消穀善飢

人參去芦

白朮去芦

白茯苓

甘草炙

藿香葉去土各

白乾葛二

木香兩半

加北五味去梗

柴胡去毛

枳殼去穢各

右剉散每服三錢新水煎去滓不拘時候

茯神口治消中煩熱消穀小便數

人參去芦

茯神去木

生乾地黄去土

黃連淨

麥門冬去心

枳殼去穢

牡礪粉各一

蓮肉去心

黃耆去芦

知母去毛各

瓜根半七錢

右為末煉蜜和搗三百杵口如梧桐子大每服五十口清粥飲下

腎痛加減八味口治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能既濟煎熬而生心煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌膚漸漸如削或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其煩渴頓止

熟地黄大者洗焙乾切酒酒

山茱萸去核取肉焙

真山藥微炒

澤浮水

肉桂去麋皮不見

白茯苓去皮為末飛取

牡丹皮去骨

白茯苓沉者各八錢

真北五味略炒別為

右為末煉蜜口梧桐子大五更初未言語時温

酒鹽湯下三五十口午前及晚間空腹再服此

方用真北五味子最為得力服此不惟止渴亦

免生癰疽久服永除渴疾氣血加壯

天王補心丹寧心保神益血固精壯力強志令人

不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸瘵咽乾口燥

育養心氣

熟地黄洗

人參去芦

白茯苓去皮

遠志心去

石菖蒲去毛

黑參去心

柏子仁

桔梗去芦

天門冬心去

丹參洗

酸棗仁炒去皮

甘草炙

麥門冬去心

百部洗

杜仲薑汁炒

茯神去木

當歸去尾

五味子各等分

右為末煉蜜口每一兩作十口金箔為衣每服

一口燈心棗湯化下食後臨卧服作梧子大口

吞服亦可

鹿茸口治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸去毛切酒浸

麥門冬去心

熟地黄洗蒸

黃耆去芦

鷄臍脰炙炒

菴蓉酒浸

山茱萸去核取肉

破故紙炒

川牛膝去芦酒浸

五味子各三分

白茯苓去皮

地骨皮去骨各半兩

人參去芦三分

右為末蜜口如梧子大每服三十口至五十口

米湯下

雙補口治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠

二兩

沉香

半兩不見火

澤瀉

截塊再蒸半兩

覆盆子

白茯苓

去皮

人參

去芦

宣木瓜

薏苡仁

炒

黃耆

炙

熟地黄

洗再蒸

茯苓

酒浸焙

兔絲子

酒浸焙

五味子

石斛

炒

當歸

去尾酒浸焙各一兩

生麝

別一錢研

右為末煉蜜口梧桐子大朱砂為衣每服五十

口空心棗湯送下

丹石毒瓜萋散治盛壯之時不自謹惜恣情縱慾

年長腎氣虛弱惟不能房多服丹石真氣既盡石

氣孤立唇口乾焦精液自洩小便赤黃大便乾實

小便晝夜百十行須當除熱補虛

白茯苓

去皮

天花粉

宣連

白扁豆

人參

去芦

石膏

甘草節

寒水石

白朮

去芦

猪苓

各等分

右為末每服貳錢熱湯調服立效

一石子薺芫湯治強中多因耽嗜色慾及快意飲食

或服丹石真氣既脫葉氣陰發致煩渴引水飲食

倍常陰氣常興不交精出故中焦虛熱注於下焦

三消之中最為難活

薺芫

石膏

各三兩

人參

去芦

茯神去木

括樓根

磁石煅

知母去毛

乾葛

黄芩去心

甘草各二兩

右到散每服用水三盞腰子一箇去脂膜黑豆一合煮至一盞半去腰子黑豆入藥四錢煎至七分去滓食後服下焦熱則夜間服渴止勿服次投補藥

黃連猪肚口治強中消渴服瓜蒌散薺芎湯後便可服此亦能補養

猪肚一枚治如食法

黃連去芦

小麥炒各五兩

天花粉

茯神去木各四兩

麥門冬去心二兩

右五味為末內猪肚中縫塞安甑中蒸之極爛

木白小梓可口如梧桐子大每服七十口米飲送下隨意服之如不能口入少煉蜜

瞿粟湯治腎渴解五石毒六兩二十口空公鹽

瞿粟子 右煮稀粥入蜜飲之

加減三黃口治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用

春 黄芩兩四 大黄兩二 黄連兩四

夏 黄芩兩六 大黄兩一 黄連兩七

秋 黄芩兩六 大黄兩二 黄連兩三

冬 黄芩兩三 大黄兩四 黄連兩二

右為末煉蜜口梧桐子大每服十口服一月病

愈

酣飲烏梅木瓜湯治飲酒多發積為酷熱熏蒸五臟津液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿

木瓜乾

烏梅打破不

麥蘖炒

甘草

草果去皮各

右剉散每服四錢水盞半生薑五片煎七分不拘時服

枳椇子治同上

枳椇二兩

麝香一錢

右為末麪糊梧桐子大每服三十口空心鹽湯吞下

三神湯治同上

烏梅肉

遠志

去心甘草水煮過却以薑汁拌炒各一兩

枳實去核一兩

夏加黃連五錢春秋冬不用

右剉散每服四錢水兩盞糯米根一握煎七分去滓不拘時溫服若無糯米根白茅根亦可如無白茅根禾稈繩代之亦可

龍鳳治同上

鹿茸

火燎去毛一兩酒浸炙

山藥

兔絲子

酒浸炒各二兩

右為末煉蜜梧桐子大每服三十口食前米飲下濃煎人參湯亦可

薑連治消渴小便滑如油頻數者

黃連去須

瓜蒌

連核各等分

右為末生地黄自然汁口如梧子大每服五十
口食後牛乳汁下酪湯下一日二服忌冷水猪
肉或研麥門冬自然汁為口熟水吞下

渴 朱砂黃連口治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消

朱砂別一兩 宣連三兩 生地黄二兩

右為末煉蜜口如梧子大每服五十口燈心棗
湯吞下

酒蒸黃連口治膈熱解酒毒止渴厚腸胃方見下
通治玄兔丹治三消渴利神藥常服禁精止白濁

延年

兔絲子酒浸通軟乘濕研

白茯苓去皮

乾蓮肉各三兩

五味子去梗酒浸

右為末別研山藥末六兩將所浸酒餘者添酒
煮糊為口如梧子大每服五十口天花粉北五
味子煎湯下温酒鹽湯亦可脚膝無力木瓜湯
下

清心蓮子飲治心中蓄熱時常煩燥因而思慮勞
力憂愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄
遺瀝澀痛便赤如血或因酒色過度上盛下虛心
火炎上肺金受尅口舌乾燥漸成消渴睡卧不安
四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白及病後氣不
收斂陽浮於外五心煩熱藥性温平不冷不熱常
服清心養神秘精補虛滋潤腸胃調順血氣

黃芩半去心

黃耆去蘆

石蓮肉去心

白茯苓皮去

人參去蘆

麥門冬去心

甘草

地骨皮去骨

車前子去沙土

右剉散每服三錢麥門冬十粒去心水一盞半煎取八分去滓水中沉冷空腹服發熱加柴胡薄荷煎

六神湯治三消渴疾

蓮房

乾葛

枇杷葉去毛

甘草炙

括樓根

綿黃耆去蘆

右剉散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服小便不利加赤茯苓

童子童柔白皮湯治三消渴病或飲多利少或不飲

自利肌膚瘦削四肢倦怠常服補虛止渴利

童根柔白皮

即未多時栽者去蘆皮曬乾不焙

白茯苓皮去

人參去蘆

麥門冬去心

乾葛

乾山藥

桂心去蘆皮

甘草半兩生用

右剉散水一盞半煎至七分去滓溫服

梅花湯治三消渴利神效

糯米旋炒作爆

桑根白皮厚者切細等分

右每用秤一兩許水一大碗煮取半碗渴則飲不拘時

文蛤散治渴欲飲水不止

文蛤即五倍子最能回津

右為末以水飲任調方寸匕不拘時服
〔羊乳〕治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中夏寒熱脚
弱虛滿而渴者

宣連 去鬚不拘
多少為末

生栝樓根汁

生地黄取汁

羊乳 無羊乳亦得
人乳亦得

右以三汁搜和為口如梧子大每服三五十口
米飲下一法濃煮小麥飲下

〔益元散〕白虎湯去桂五苓散合和大治消渴 方見
中暑

傷寒傷
暑類

〔生地黃飲子〕治消渴咽乾面赤煩燥

人參 去
芦

生乾地黄 洗

熟乾地黄 洗

黃耆 蜜
炙

天門冬 去
心

麥門冬 去
心

枳殼 去
穰
炒

石斛 去
根
炒

枇杷葉 去
毛
炒

澤浮

甘草 炙
各
等分

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後

臨卧温服此方乃全用二黃口甘露飲料生精

補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疎導二腑使心

火下行則小腑清利肺經潤澤則大腑流暢宿

熱既消其渴自止造化精深妙無踰此

〔栝樓粉〕治大渴

右深掘大栝樓根削去麤皮寸切以水浸一日

夜一易浸五日取出爛研細絹絞汁如作粉法

乾之水服方寸匕日三四服入牛乳一合服尤

好

消 降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日

人參 去芦

遠志

去骨以甘草薑汁拌炒乾

當歸 去芦

熟地黄

洗去土蒸

白茯苓

去皮

黃耆

去芦

北五味子

去梗

甘草

微炙各半兩

天花粉

一兩

右剉散每服三錢水一盞半棗一枚煎食前服

蠟苓 補虛治濁止渴潤腸婦人血海冷白帶白

淫白濁

黃蠟

雪白茯苓

去皮各四兩

右茯苓為末溶蠟和口彈子大每服一口不飢

飽細嚼下棗湯亦可

辰砂妙香散 治渴證小便澁數而瀝兼有油濁用

燈心 茯苓煎湯下

方見心類

神效散 治渴疾飲水不止

白浮石

蛤粉

蟬殼

右為末用鯽魚膽七箇調七錢服不拘時候神

效

三疇 治消渴骨蒸

宣連去鬚為末不以多少剉冬瓜肉研搥自然

汁和成餅子陰乾再為末再用汁浸和如是七

次即用冬瓜汁為口如梧桐子大每服三四十

口以冬瓜汁煎大麥仁湯送下尋常渴止一服

浮萍 治消渴虛熱者大佳

乾浮萍

栝樓根

等分

右為末以人乳汁和口每服二十口空腹米飲下日三服三年病者三日可又白芷末水調服止

〔又方〕

鈆丹 兩二

附子 兩一

乾葛

栝樓根 兩各三

右為末煉蜜口每服十口米飲下日三服渴則服之治日飲水至一石者春夏去附子

〔白朮散〕治胃虛發渴

白朮 兩一

人參 去芦

白茯苓

甘草 兩各半

右為末每服七錢水一盞半煎至七分服凡渴之後多有腫疾仍預服〔復元丹〕數服

〔參耆湯〕治消渴

人參 去芦

栝樓 去芦

天花粉

甘草 兩各一

綿黃耆 浸湯

白芍藥 兩各二

白茯苓 去皮

北五味 兩各一

右剉散每服四大錢水盞半煎八分日進四服

合滓煎

〔雞蘇口〕治病後虛羸發渴

右雞蘇口以北五味煎湯吞下仍服〔安腎口〕

失血虛損類

〔麩餅口〕治消渴

密陀僧

二兩別研極細

川黃連

一兩為細末

右用蒸餅口如梧子大每服五口煎蠶空茄根湯下臨卧服次日加至五十口以後每日五口至三十口止服藥後以見水惡心為度即住服不過五六服必效若覺惡心但每日食乾物壓之旬日後自定奇甚奇甚蠶空是出蠶娥了空蠶殼

忍冬口治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草

不以多少根莖花朵皆可用一名老翁鬚一名蜜啜花一名金銀花以洗

淨用之

右以米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許為末即以所浸酒為糊內如梧

子大每服五十口至百口酒飲任下不拘時候

此藥不特治癰亦能止渴并五痔諸漏

牡礪散治不渴而小便大利以牡蠣末取患人小

便煎服

單方治渴

糯稻稈灰取中一尺燒淋汁飲或不燒便煎服亦妙

生牛乳細呷或生蘿蔔搗取汁時飲少許

蠶絲湯治渴神效

煮蠶繅絲湯任意飲之頓效如非時以絲或綿煎湯服

煞蟲方治消渴有蟲

熬苦練根取新白皮一握切焙入麝少許水二碗煎至一碗空心飲之雖困頓不妨自後下虫三四條狀如蛻虫其色真紅而渴頓止乃知消渴一證有虫耗其津液

凡消渴大忌飲酒房事食油麪煎炙糟藏鹹物及一切熱物百日以上不可鍼灸則瘡中生膿水或成癰疽膿水不止則死

漩濁

心濁瑞蓮口治思慮傷心便下赤濁

白茯苓去皮

石蓮肉炒去心

龍骨生用

天門冬洗去心

遠志洗去心甘草煮

柏子仁炒別研

紫石英火煨七次研令極細

當歸去蘆酒浸

酸棗仁炒去殼

龍齒已上一兩

乳香半兩別研

右為末煉蜜口梧桐子大朱砂為衣每服七十

口空心溫酒棗湯任下

加味清心飲治心中客熱煩燥赤濁肥脂

石蓮肉

白茯苓各一兩

益智仁

麥門冬

遠志水浸取肉薑製炒

人參各半兩

石菖蒲

車前子

白朮

澤瀉

甘草微炙二分

右到散每服三錢燈心二十莖煎服有熱加薄

荷少許

寧志膏治心臟虧虛神志不守恐怖赤濁常多恍惚易於健忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆

治之

人參去芦

辰砂研細水

右為末煉蜜口如彈子大每服一口温酒化下

棗湯亦可空心臨臥服

十四友口補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不

寧精神昏倦睡卧不安赤白濁甚

柏子仁別研

紫石英明亮

白茯苓去皮

黃耆蜜炙

龍齒半一兩

酸棗仁微炒去皮

乳香一分以乳鉢

遠志去心

熟乾地黄洗

茯苓去皮

阿膠炒碎

辰砂別研

肉桂不見火已

人參去芦

川當歸洗淨去

酸棗仁去殼

當歸去尾

人參去芦

肉桂不見火已

人參去芦

肉桂不見火已

人參去芦

肉桂不見火已

人參去芦

肉桂不見火已

人參去芦

肉桂不見火已

香苓散治男子婦人小便赤濁諸藥不效者

五苓散

辰砂妙香散

右和勻用天門冬麥門冬去心煎湯空心調服

一大錢一日三服當頓愈

桑螵蛸散治小便日數十次如稠米泔色心神恍

惚憔悴食減以女勞得之服此不終劑而愈乃主

安神魂定心志

菖蒲鹽炒

茯神去木

龍骨

當歸去尾

人參去芦

當歸去尾

右等分為末每服二錢夜臥人參湯調服

蠟苓口治同上方見消渴類

遠志口治小便赤濁如神

遠志去心用甘草煎半斤 茯神去木 益智仁各二兩

右為末酒糊口每服五十口臨卧棗湯下

心腎口治水不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤

夢遺

牛膝去苗酒浸 熟地黄洗蒸 菴蓉酒浸各二兩

鹿茸火去毛酒潤炙 附子炮去皮臍 五味子去枝

人參去芦 黃耆去芦炙

遠志去心甘草汁炒 白茯神去木 山藥炒

當歸去芦尾酒浸 龍骨煨各一兩

兔絲子酒浸餅三兩研成

右為末浸棗酒煮糊口如梧子大每服七十口

棗湯下

腎濁秘精口治元氣不固遺精夢泄

大附子炮去皮臍 龍骨煨通赤 肉菴蓉酒浸一夕

牛膝酒浸一宿焙 巴戟去心各一兩

右末煉蜜口如梧子大每服三十口鹽酒鹽湯

空心下

震靈丹治腎經虛憊漏濁不止用二陳湯加白茯

苓煎湯送下方見泄瀉類

鎖精口治小便白濁

破故紙炒 青鹽各四兩 白茯苓

五倍子各二兩

右為末酒糊口空心三十口鹽湯酒任意下

〔芡實〕治勞傷心腎水火不交漩面如油光彩不定漩腳澄下凝如膏糊頻數無度又治遺泄不禁之疾方見虛損類

〔固精〕治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂腰重少力

牡蠣煨

兔絲子

酒蒸焙乾

韭子

炒

龍骨

五味子

白茯苓去皮

桑螵蛸

酒浸炙

白石脂

各等分

右為末酒糊口如梧子大每服七十口空心鹽

湯送下

〔地黄〕治心腎水火不濟或因酒色遂至以其甚謂

之土淫盖脾有虛熱而腎不足故土邪干水先賢常言夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚此方中和補泻兼之水火既濟而土自堅其流清矣

熟地黄

九蒸十兩

兔絲子

洗酒浸蒸

鹿角霜

各五兩

茯苓

柏子仁

各三兩

附子

一兩

右為末鹿角膠煮糊口如梧子大每服百十口

鹽酒下

〔四精〕治濁渴

鹿茸

肉蓯蓉

山藥

茯苓

各等分

右為末米糊口如梧子大每服三十口棗湯下

或加沉香木香

蒜口治濁

杜仲

人參

川烏

巴戟各等分

破故紙

右為末蒜膏口如梧子大每服三十口鹽湯温

酒任下

入藥靈砂口治諸虛白濁耳鳴大效

當歸酒洗

鹿茸去毛鹽酒炙

黃耆鹽水

沉香鎊

北五味炒

遠志肉

酸棗仁炒

吳茱萸去枝

茴香炒

破故紙炒

牡蠣煨

熟地黄蒸

人參去芦

龍骨煨

附子炮

巴戟各一兩淨

靈砂二兩研

右各煨製如法為末酒糊口每服五十粒至七

十粒空心温酒鹽湯任下

小兒絲子口治腎氣虛損五勞七傷小腹拘急四

肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣

夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無

味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室

不舉股內濕痒水道澁痛小便出血時有遺瀝並

宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟去萬病明視

聽益顏色輕身延年聰耳明目

石蓮肉二兩

兔絲子

酒浸焙研為末五兩

白茯苓

焙不

山藥

二兩七錢打糊

右為末山藥糊搜和為口如梧子大每服五十口空心温酒或盐湯下如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

四五湯治小兒白濁

生料四君子湯

生料五積散

右和勻每服二錢燈心一握水一盞煎服方見脾胃

傷暑類

安腎口白口子山藥口治虚勞羸瘦浮臃白濁三

葉夾和每服七十口食前煎雙和湯下方見虚損類

脾濁蒼朮難名丹治元陽氣衰脾精不禁漏濁淋

瀝腰痛力疲

蒼朮

科去麋皮半斤米泔浸一日夜焙乾用

舶上茴香

炒

川練子

蒸去皮一兩半焙

川烏

炮去皮

破故紙

炒

白茯苓

龍骨

別研各一兩

右為末酒麵糊口梧桐子大朱砂為衣每服五

十口空心縮砂煎湯下粳米湯亦可

七情四七湯治小便渾濁生薑煎吞青州白口子

芡實口治思慮傷心小便赤澁遺精白濁方見虚損類

通治還少丹治心腎俱虚漏精白濁

山藥

炮

牛膝

酒浸焙

白茯苓

山茱萸

水洗去核

舶上茴香

炒各兩半

兔絲子

酒浸研焙

續斷

去芦各一兩

三十口鹽

右為末煉蜜口如梧子大每服三十口鹽湯下
分清飲通心氣稍漏精治小便餘瀝并赤白濁
益智 川草薺 石菖蒲鹽炒

天台烏藥

右等分剉散入鹽少許煎空心服

蠟苓口一治赤白濁方見消渴類

玉鎖固真丹一治心氣不足思慮太過腎經虛損真
陽不固漩有遺瀝小便經歲白濁或淡赤或如膏
夢寐精泄甚則身軀拘倦骨節酸疼飲食不進面
色黧黑容枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗舉動力乏
多服取效

白龍骨半斤

磁石醋淬七次

朱砂各一兩

牡蠣煨一兩

紫梢花半兩

家莊子

兔絲子各二兩半

鹿茸酒浸

白茯苓

川巴戟

官桂

肉蓯蓉酒浸

桑螵蛸酒浸切炙

遠志甘草水煎取皮薑汁炒

當歸去尾

蒼朮切酒炒

茴香炒

吳茱萸炒

川練子炒

桑寄生真者

沉香不見火

木香不見火

黃耆去蘆

綿附子熟炮已上各一兩

右為末煉蜜口如梧子大每服五十口溫酒鹽

湯任下

小溫金散一治心虛泛熱或觸冒暑熱漩下或赤或
白或淋澁不行時發煩鬱自汗

人參去芦 石蓮肉去心 川巴戟去心

益智仁去殼 黃耆去芦 草薺浸酒炒

麥門冬去心 赤茯苓去皮 甘草各等分

右為散每服三錢水一盞半燈心二十莖紅棗

二枚煎食前溫服以後藥相無

子午口治心腎俱虛夢寐驚悸體常自汗煩悶短

氣悲憂不樂消渴引飲漩下赤白停凝濁甚四體

無力眼昏形容瘦悴耳鳴頭暈惡風怯冷

榧子去殼 蓮肉去心 枸杞子

白龍骨 川巴戟去心 破故紙炒

真琥珀別研 芡實去殼 苦櫛實去殼

白礬枯 赤茯苓去皮 白茯苓去皮

文蛤 蓮花鬚鹽蒸 白牡蠣煨各

右為末酒蒸肉苁蓉一斤二兩爛研為口梧桐子

大朱砂一兩半重細研為衣濃煎草薺湯空心吞

下忌勞力房事專心服餌渴止濁清自有奇效

漩多

川方五子口治小便夜多脚弱老人虛人多有此

證令人卒死大能耗人精液頭昏

兔絲子酒蒸 家韭子略炒 益智子去皮

茴香炒 蛇床子去殼炒

右等分為末酒糊口如梧子大每服五七十口

糯米飲益湯任下

又方治夜多小便

右取純糯米糍一片臨卧炙令軟熟啖之仍以温酒下不飲酒湯下多啖愈佳行坐良久待心間空便睡一夜十餘行者當夜便止

又方

右用茴香不以多少淘淨入少鹽炒為末如前炙糯米糍蘸喫或用獾猪胞盛以糯米煮爛或入椒鹽少許同煮去糯米只用胞切片蘸藥或更飲好酒半杯臨晚臨卧各一服尤妙

兔絲子口治小便利數每服三十口温酒鹽湯下

兔絲子

酒蒸二兩

桑螵蛸

酒炙半兩

牡蠣

煨取粉一兩

肉蓯蓉

酒潤二兩

附子

炮去皮一兩

五味子

各一兩

雞臍脰

半兩微炙

鹿茸

酒炙一兩

右為末酒糊口如梧子大每服七十口食前鹽酒任下一方加巴戟去心破故紙微炒赤石脂

煨草薺各一兩

橘皮煎口治小便利數每服三十口温酒鹽湯下

草薺口治小便頻數日夜無時

方見虛損類

右用川草薺洗不拘多少為末酒糊口如梧子

大每服七十口空心食前鹽酒鹽湯任下

縮泉口治脬氣不足小便頻數

天台烏藥

益智仁

各等分

右為末酒煮山藥末糊口如梧子大每服七十

口臨臥鹽湯吞下

遺溺

家韭子治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進美飲食

家韭子

六兩炒

鹿茸

四兩酥炙

菴蓉

酒浸

牛膝

酒浸

熟地黄

當歸

各二兩

兔絲子

酒浸

巴戟

去心各一兩半

杜仲

炒

石斛

去苗

桂心

乾薑

各一兩

右為末酒糊口梧桐子大每服五十口加至百

口空心食前鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因

胞寒亦稟受陽氣不足故也別作一樣小口服

雞內金散治溺床失禁

右以雞臍腔一具并腸淨洗燒為灰男用雌女

用雄者研細每服方寸匕酒飲調服

又方用猪胞洗淨鍍釘上炙香熟嚼細溫酒下

秘元丹治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨

三兩

訶子

十五箇去核

縮砂

一兩去皮

右為末糯米粥口梧桐子大每服五十口空心

鹽酒下

桑螵蛸散治小便日數十次如稠米泔色心神恍惚瘦悴食減以女勞得之

桑螵蛸

鹽水炙

遠志

去心

菖蒲

鹽炒

龍骨

人參

茯神

當歸

鱉甲

醋煮

右各等分為末每服二錢夜卧人參湯調下

〔補膠飲〕治婦人產後傷動胞破終日不能小便但漏濕不乾

黃絲絹生者一尺剪碎 白牡丹根皮末千葉者他無効 白及末一錢

右用水一碗煎至絹爛如錫空心頓服服時不得作聲作聲不效

〔遺精〕

〔桑螵蛸〕治下焦虛冷精滑不固遺瀝不斷

附子去皮 五味子 龍骨各半

桑螵蛸七箇切炒

右為末純糯米糊口每服三十口空心鹽酒吞下

〔仙方固真丹〕專治精洩不禁

禹餘糧 石中黃 赤石脂

紫石英 石燕子五件各一兩炭火煨通紅米醋三升淬乾為度

右以白茯苓四兩人參二兩青鹽一兩同為末入無灰酒約量多少打糊拌和衆藥為口以朱砂為衣如小指頭大每服二口至三口溫酒或鹽湯下空心臨卧服

〔鎖陽丹〕治脫精泄不禁

桑螵蛸三兩瓦上焙燥 龍骨別研 白茯苓各一兩

右末糊口如梧子大每服七十口煎茯苓鹽湯食前服

〔辰砂妙香散〕治夢中遺精每服十七虛者溫酒調

熱者麥門冬去心濃煎湯調方見心

三仙口治夢泄

益智仁二兩用鹽二兩炒去鹽 烏藥一兩半炒

右為末用山藥一兩為糊口如梧子大每服五十口空心臨卧鹽湯下以朱砂為衣凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒或熱用補澁之藥不效其脉浮軟而散蓋非虛也亦非房室過度此無他因有所覩心有所慕意有所樂慾想方興不遂所欲而致斯疾既以藥補且固不效將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心腎交媾精神內守其病自愈其法用

人參三錢當歸一錢洗焙為末作三服糯米飲調下服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎三錢人參一錢焙為末作三服沸湯調服頭眩遂差精不禁者用白芍藥半兩丁香三錢木香三錢剉散每服用生薑五片棗二枚煎空心服即

心安神定精固神悅

清心口治經絡熱而夢泄心怔忡恍惚

大柏皮一兩去粗皮

右為末入腦子一錢同研煉蜜口如梧子大每服十五口至十九口濃煎去心麥門冬湯下
猪苓口治年壯氣盛情慾動中所願不得意淫於外致夢遺白濁

半夏一兩

猪苓二兩

右用半夏剉如豆大用猪苓為末先將一半炒半夏黃色不令焦地上出火毒半日取半夏為末糊口如梧子大候乾更用猪苓末炒微裂入不油沙瓶中養之每服四十口空心温酒鹽湯送下如常服於申未間冷酒下

理脾口治遺泄尋常只治心腎緣脾虛亦有此疾

厚朴

去粗皮切生薑自然汁拌炒

羊脛炭

又名灰炭火煨通紅別研去粉一兩

右為末水麪糊為口如梧子大每服百十口米湯下

失血

風證桂枝栝樓根湯治傷風汗下不解鬱于經絡隨氣湧泄衄出清血或清道閉流入胃管出清血遇寒泣之色必瘀黑者

桂心

白芍藥

甘草

川芎

栝樓根

右等分剉散每服四大錢水一盞半薑三片棗一枚煎服頭痛加石膏

胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不

化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日

夜無度

方見泄瀉類

寒證麻黃升麻湯治傷寒發熱解利不行血隨氣壅世謂紅汗者

麻黃去節

升麻一分

黃芩

芍藥

甘草

石膏煨

茯苓各一兩

右剉散每服四大錢水一盞生薑三片煎熱服

微汗解

犀角地黄湯治傷寒及溫病應發汗而不汗內蓄為瘀血及鼻衄吐血不盡餘血停留致面黃大便黑

犀角一兩

生地黄八兩

芍藥三兩

牡丹皮二兩

右剉散水煎狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脈大來遲腹不滿自言滿為無熱不須加也

小柴胡湯治同上方見傷寒

暑證五苓散治伏暑飲熱暑氣流入經絡壅溢發衄或胃氣虛血滲入胃停留不散吐出一二升許治衄則以茅花煎湯調下屢用得效

枇杷葉散治同上方並見傷暑類

濕證除濕湯治冒雨著濕鬱于經絡血溢作衄或脾不知濕著經絡流入胃吐血

茯苓

乾薑各二兩

甘草炙

白朮各一兩

右剉散每服四大錢水煎服頭疼加川芎二錢最止浴室發衄

七情木香勻氣散治氣逆嘔血衄血用側柏葉白

茅花煎湯下方見諸

蘇合香口治因氣作衄或吐嘔血濃煎白茅花湯

化氣類

止血散治氣鬱發衄無比神方

黃耆六錢

赤茯苓

白芍藥各三錢

當歸

生乾地黄

阿膠各三錢

右為末煎黃耆湯調下為剉散煎亦可

歸脾湯治思慮傷脾心多健忘為脾不能統攝心

心以致妄行或吐血下心

白朮

茯神

黃耆

酸棗仁炒去殼

龍眼肉各一兩

人參

木香各半兩

甘草二錢

合右剉散每服水一盞薑五片棗一枚煎不拘時

煎候溫服

天門冬湯治思慮傷心吐血不止

遠志去心甘草水煎

白芍藥

天門冬去心

藕節

麥門冬去心

黃耆去蘆

阿膠炒蚌粉

沒藥

當歸去蘆

生地黄各一兩

人參

甘草各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘

時服

虛證加味理中湯治飲食過度傷胃不化致嘔吐

其色鮮紅或心腹絞痛自汗名曰傷胃嘔血

人參

乾薑炮

白朮各一兩

乾葛

甘草 各半

右到散每服三錢水一大盞煎不拘時候溫服
去乾葛加川芎治鼻衄理中腕分利陰陽安定
血脉

又方治暴吐血桂末貳錢水湯各半盞調猛喫甚
者只兩服效

桂附湯治吐血自汗大效 方見痢

加味四物湯治咯血用毛頭白紙燒灰入麝香煎

調二錢服之如神 方見婦人崩漏類四君子湯二

效調服

熱證大薊散治飲啖辛熱熱邪傷肺嘔吐出血一
合或半升許名曰肺疽

大薊根 洗

犀角 鎊

升麻

桑白皮 炙

蒲黃 炒

杏仁 去皮

桔梗 去芦炒

甘草 半

右到散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘
時溫服

犀角地黄湯治同上 方見前

茜根散治鼻衄終日不止心神煩悶

茜根

黃芩

阿膠 蟬粉

側柏葉

生地黄 各一兩

甘草 半兩

右到散每服四錢水一盞半生薑三片煎不拘
時溫服

萬金散治咯血

右用槐花不以多少為末每服二錢食後熱酒調服

龍腦雞蘇口治肺熱咳嗽鼻衄吐血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止渴除驚涼上膈解酒毒口臭喉腥口甜口苦

柴胡二兩到同木通以沸湯入半

麥門冬去心黃耆一兩阿膠二兩

生乾地黄末六兩後蒲黃二兩雞蘇淨葉

甘草一兩人參二兩木通到二兩

右除別研藥後入外為末用好蜜二斤先煉一二沸然後入生乾地黄末不住手攪時時入柴胡木通汁慢慢熬成膏勿令焦同餘藥和為口

如蠶豆大每服二十口以去心麥門冬煎湯食後臨卧服血崩下血諸淋疾並空心食前服

三黃口治肛門腫痛或下鮮血

黃連去須黃芩去須大黃各十兩

右為末煉蜜口如梧子大每服四十口熟水吞下

白朮散治積熱吐血咳血若因飲食過度負重傷胃而吐血者最宜服之忌食熱麪煎燂一切發風之物

白朮二兩人參七兩白茯苓二兩

黃耆二兩山藥二兩百合三兩

甘草半兩前胡去蘆柴胡去蘆

右到散每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎
温服

勞傷雞蘇散治勞傷肺經唾内有血咽喉不利

雞蘇葉

黃耆

去芦

生地黄

洗

阿膠

蛤粉炒

白茅根

各一兩

桔梗

去芦

麥門冬

去心

蒲黃

炒

貝母

去心

甘草

各半兩

桑白皮

半兩

右到散每服四錢生薑三片水一盞半棗一枚

煎温服

蓮心散治勞心吐血

右以蓮子心五十箇糯米五十粒為末酒調服
效

大阿膠治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有

鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血並宜服之

麥門冬

去心半兩

乾山藥

熟乾地黄

五味子

各一兩

遠志

去心一分

丹參

貝母

炒

防風

去芦各半兩

阿膠

炒一兩

茯神

去木

柏子仁

百部根

杜仲

炒各半兩

茯苓

一兩

人參

一分

右為末煉蜜口如彈子大水一盞煎六分和滓服

傷損奪命散治金瘡打損及從高墜下木石所壓
內損瘀血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死

紅蛭

用石煨令焦黃色半兩

大黃

黑牽牛

各二兩

右為末每服三錢熱酒調下如人行四五里再用熱酒調牽牛末二錢催之須臾臟腑轉下惡血塊或片血盡愈

〔花藥石散〕治一切金瘡打撲傷損猫犬咬傷並於傷處摻傅或內損血入臟腑壅溢作衄及婦人產後敗血不散

花藥石 研細 一介

上色硫黃 研細 四兩

右和勻入藏瓶中以紙筋搗黃泥固濟候乾焙令熱透以磚盛用白炭一秤頂上發火燒炭盡候冷取出再研極細諸臟傷及婦人產後瘀血不行並用童子小便溫酒一二錢匕取瘀血效

〔雞鳴散〕治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死并久積瘀血煩燥疼痛叫呼不得並以此藥利去瘀血即愈推陳致新折傷神效

大黃 一兩 酒蒸

杏仁 三七粒 去皮尖

右研細用酒一椀煎至六分掬去滓雞鳴時服次日取下瘀血即愈若便覺氣絕取藥不及急擘開口以熱小便灌之

〔加味芎藭湯〕治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血或如豆羹汁

川芎

當歸

白芍藥

百合

水浸 半日

荊芥穗 各等分

右剉散每服四錢水一盃酒半盃同煎不拘時

服

茯苓補心湯治心氣虛耗不能藏血以致面色黃
瘁五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦
宜服之

白茯苓皮去 人參去 前胡去 半夏

川芎各三 陳皮 枳殼去 紫蘇

桔梗去 甘草 乾葛各半

當歸一兩 白芍藥二 熟地黃酒炒一

右到散每服四錢生薑五片棗一枚煎食前服

通治立效散治吐血

側柏葉焙乾如倉卒難乾新瓦焙為末每服三

錢米飲調食後服一方柏葉加赤土拌勻煉蜜

為餅子服

單方治鼻衄不止或吐血

蘿蔔榴汁入鹽服一盃立效或蘿蔔汁藕汁滴

入鼻中

麝香散治鼻衄不止

白礬粘 白龍骨粘 麝香粘

右和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然

後吹藥於鼻中或以濕紙蘸藥於鼻內尤妙

黑神散治大吐血及傷酒食飽低頭搨損吐血至

多并血妄行口鼻中俱出但聲未失無有不效

百草霜村中燒草

不拘多少羅細為末每服一錢糯米飲調下鼻

衄搯一字皮破血出灸瘡出血摻上止并治舌

忽然腫破乾摻

川芎三黃散一治實熱衄血

大黃濕紙裹蒸

川芎

黃連淨

黃芩等分

右為末每服二錢食後井水調服

敗毒散一加桑白皮麥門冬煎吞鷄蘇口一治肺熱胸

中鬱熱衄血兼治血淋吐血口臭方見傷寒陽証親及見前

蘇子降氣湯一治虛壅鼻血方見諸氣類

衄血方

川鬱金末井水調下亦治吐血 又茆花煎湯

通口服 又方血餘散用頭髮燒存性研米湯

調下仍吹少許入鼻中 曾服燒煉藥致鼻血

者山梔子煎湯解之仍燒山梔子存性為末入

鼻 又方烏賊魚骨槐花等末入鼻 又方槐

花半生半炒為末入鼻 又方成片人中白燒

去穢為末入麝香少許入鼻或加油髮灰 又

方大蒜煨香取三瓣研傅脚底鼻中有蒜氣即

去之

天門冬口一治吐血咯血大能潤肺止咳

天門冬兩一

甘草

杏仁炒

貝母

茯苓

阿膠各半兩

右為末煉蜜丸彈子大每一丸嚥津噲化日夜

可十九

龍骨散一治鼻衄過多

右以龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中

凡九竅出血皆可用一方用梔子如前法

〔白及散〕治鼻衄嘔血咯血肺損或食飽負重得者服之愈

白及不拘多少

右為末米飲調或用井水調一匕用紙花貼鼻竅中一方用阿膠末調貼

〔黃耆建中湯〕治汗出污衣甚如坯染皆由大喜傷心喜則氣散血隨氣行兼服〔妙香散〕金銀器麥子

麥門冬煎湯下病名紅汗方見虛損心恙類

〔葶草汁〕治產婦大喜汗出污衣赤色及膏淋尿血

葶草不拘多少

右搗取汁二升醋二合和空腹飲一盃或煮濃

汁飲亦治淋瀝尿血

〔側拍散〕治內損吐血下血或因酒大過勞傷於內血氣妄行其出如湧泉口鼻皆流須臾不救則死服此即安

拍業二兩半蒸乾

人參

荆芥穗燒灰各一兩

右為末每服三錢入飛羅麩二錢拌和新汲水調如稀糊相似吸服立效又方用百草霜川白芷研為末每服三錢濃米飲併服

〔特效方〕治鼻衄不止

右以蒲黃血竭為末吹入鼻中

〔灸法〕虛勞吐血灸胃脘三百壯

吐血唾血上氣欬逆灸肺膈隨年壯

吐血嘔逆灸大陵穴在掌後兩骨間是

又口鼻出血不止名腦衄灸上星穴五十壯入髮際一寸衄不止灸足大指節橫理三毛中十壯

劇者百壯并治陰卵腫

大便下血熱證酒蒸黃連口治酒毒積熱便下鮮

紅或肛門作熱方見消渴類

槐角口治五種腸風瀉血糞前有虫名外痔糞後

有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面弩肉如

妳名舉痔頭上有孔名瘻並皆治之

槐角去枝梗炒一兩

黃芩半斤

右為末酒糊口如梧子大每服五十口不拘時

地榆兩八

防風兩八

當歸去八兩

枳殼去穢半斤

黑米飲下

人參敗毒散治同上每服三錢生薑三片薄荷葉

七皮桑白皮七寸烏梅一箇煎方見傷寒陽證類

防風散治因食熱物過度風氣蓄盛銷鑠大腸膏

脂以致榮衛之血滲流而下此方獨效

羌活

枳殼

荆芥

防風

僵蠶絲炒去

薄荷各等分

右剉散白水煎空心溫服忌再喫熱物

黃連阿膠口治同上米飲下方見咳嗽類

加減四物湯治腸風下血不止

側柏葉

川芎各一兩

生地黃

枳殼炒去白

當歸酒浸

荆芥穗

槐花炒

甘草各半

右到散每服三錢生薑三片烏梅一箇煎空心服一方加防風烏梅各半兩效

虛證腸風黑散大便鮮血臍腹疼痛裏急後重脫肛酒痢

荆芥燒二兩

亂髮燒

槐花燒

槐角燒各一兩

枳殼二兩燒一兩炒

甘草炙

蝟皮燒各一兩半

右將合燒藥同入甕瓶內黃泥固濟燒存三分性出火氣同甘草枳殼一兩搗為末每服一錢白水煎空心服溫酒調亦可

黑玉丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻著床頭痛不

可忍者服此不過三四次見效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬核此是痔如破為瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有虫若不去根本其病不除此藥的效

刺蝟皮四兩到研

猪懸蹄二十箇

牛角腮三兩到碎

雷丸一兩

槐角一兩半

敗棕二兩到

亂髮皂角水洗淨焙二兩

脂麻一兩

苦棟根皮一兩二錢半

右到碎入甕罐內燒存性碾為末入麝香二錢乳香五錢研令和勻用酒打麪糊為丸如梧子大每服八粒先細嚼胡桃一枚空心晚食前溫

酒吞日二服病甚日三服切忌別藥不過三兩日可除根本

〔加味雙和湯〕加側柏葉每服三皮炒過生薑三片棗二枚烏梅一箇煎空心服方見虛損類治同上

〔卷柏散〕治臟毒下血神效

卷柏生土石傍上高四寸根黃如絲莖細上有黃點子止以五寸根曝乾用

右等分為末每服二錢米飲調下

〔聖金口〕治腸風下血溺血

百藥煎三兩一兩燒存性一兩炒焦一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九空心米飲下

〔神丹〕治腸風痔漏

刺蝟皮一箇鐵器中炒焦黑為度

皂角刺燒存性

硫黃研 猪牙皂角去黑皮蜜塗灸

白礬

枳殼炒 黃耆蜜灸

附子去皮各半兩

白雞冠花子一兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七丸至十九

空心食前溫酒下不飲米飲下久年漏痔服至

三四十日肉滿平安諸痔服之即自消外痔用

藥十九丸同朱砂細研蜜調塗常服永除根本若

服藥覺熱加白雞冠花子一兩半或二兩更加

三五丸服之臟腑自調

〔小烏沉湯〕

香附子

杆去皮毛 焙二兩

天台烏藥

去心 一兩

甘草

分炒一

右為末每服一錢空心鹽湯點服治同上

〔震靈丹〕玉華白丹一治臟腑虛損大腸不收久作腸

風下血二藥夾用每服五十九煎不換金正氣散

加川芎空心嚥下

方並見 痢冷類

〔理中湯〕治同上加木香妙

方見霍 亂類

〔香梅口〕治腸風臟毒下血

烏梅

同核燒 灰存性

香白芷

不見 火

百藥煎

燒存性 各等分

右末米糊丸梧桐子大每服七十九空心米飲

下

〔斷紅口〕治臟府虛寒下血不止面色痿黃日漸羸瘦

側柏葉

炒黃

川續斷

浸酒

鹿茸

火去毛 醋煮

附子

炮去 皮睛

黃耆

阿膠

蛤粉 炒

當歸

酒浸各 一兩

白礬

半兩 枯

右為末醋煮米糊丸梧子大每服七十九空心

米飲下

冷熱不調〔黃連香薷散〕

香薷

扁豆

黃連

去鬚

厚朴

薑製

右剉散用水煎服

〔香連口〕治冷熱不調下血

方見泄 浮類

〔芎歸湯〕熱加茯苓槐花冷加白茯苓丁香方見婦 產類即 佛手散

真人養臟湯治大人小兒冷熱不調便下膿血魚
腦裏急後重方見泄
瀉類

消風散米飲調熱者吞酒蒸黃連丸冷者吞烏荆
丸方見風科熱證
通治及下痢類

通治單方治腸風下血百藥不效

山裏棗俗名鼻涕團取乾者為末米飲調立效
又方柏子十四枚搥破紗囊貯以好酒三盃煎
至八分服之初服反覺加多再服立止非飲酒
而致斯疾以艾葉煎湯服之神效勝於他藥
又方生豬臟一條切控乾以槐花炒乾為末填
入臟內兩頭線縛了以好米醋於磁石器內慢
火煮爛切片沙鉢內研爛為丸梧桐子大每服

二十九煎當歸酒下

又方荆芥穗縮砂仁各等分為末糯米飲下

灸法第二十推隨年壯

又法平立一杖子比臍平却向後脊骨當中灸
七壯或年深於脊骨兩傍各一寸灸七壯余謂
寸半則是腎腧自佳

小便出血酒蒸黃連口白茆根濃煎湯放溫吞下

方見下
痢類

五苓散加辰砂一字燈心一握煎湯調下方見傷
暑類

茯苓調血湯治酒麪過度房勞後小便出血

半赤茯苓兩一

赤芍藥

川芎

半夏麴各半
兩

前胡

柴胡

青皮

桑白皮

枳殼

白茅根

北梗

燈心

甘草 各二錢半

右剉散每服三錢半薑五片蜜二匙新水煎服

生薑 七片

蜜 半盃

白茅根 握一

右用水同煎服神效

鹿角膠口治房室勞傷小便尿血

鹿角膠 半兩

沒藥 研別

油頭髮灰 各三錢

右為末用白茅根汁打糊丸如梧桐子大每服五十九鹽湯送下

髮灰散

右用自己頭髮一握洗淨燒灰溫酒調下一服

立效

鏡面散治小便出血

鏡面草取清汁入蜜少許同水調服效

單方療小遺出血條

淡豆豉一撮煎湯服效

又方治小便出血

竹茹一大塊水煎服妙

又方川牛膝一兩去蘆水一椀煎至半椀頓服

又方生地黄取自然汁半升生薑自然汁半合相

和服未止再服

又方當歸川白芷為末每服二錢溫米飲下

脫肛

〔文蛤散〕治大腸寒肛門脫出不收用力過多及小兒叫呼久痢後皆使脫肛

五倍子

右為末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤佳洗後用赤石脂為末以少許摻在芭蕉上頻用托入或長尺餘者以兩床相接中空一尺以甕瓶盛藥水滿架起與床平令病者仰卧以其所脫浸在瓶中換藥逐日如此浸縮盡為度

〔木賊散〕

右用木賊一味為末摻肛上

〔槐花散〕治脫肛

槐花

槐角

右等分炒香黃為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下或以猪膏去皮蘸藥炙服

〔釣腸口〕治同上

方見諸痔類

〔蝟皮散〕治肛門或因洞泄或因用力太過脫出不收

蝟皮

一箇燒存性

磁石

煨碎

桂心

各半兩

右為末每服二錢米飲空心調下治女人陰脫加鰲頭一枚燒灰研入

〔香荆散〕治肛門脫出大人小兒悉皆治之

香附子

一兩半炒去毛

荆芥穗

一兩

右為末每服三匙水一大碗煎熟淋洗

〔灸法〕病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯
脫肛歷年不愈灸橫骨百壯又灸脊窮骨上七
香壯

諸痔

冷證釣腸口一治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時
有膿血

括樓

二箇燒
存性

蝟皮

兩箇到碎
內燒存性

白礬煨

綠礬

括

胡桃仁

十五箇不油者
罐內燒存性

白附子

生用

半夏

天南星

雞冠花

五兩
剉炒

枳殼

炒

附子

去皮
晒

訶子

去核
二兩

右為末醋麪糊丸如梧子大每服二十九空心

臨卧温酒下遠年不差者服十日見效久服除

根

〔黑玉丹〕治同上

方見失
血類

〔橘皮湯〕治氣痔

橘皮

枳殼

炒

川芎

槐花

炒各
半兩

檳榔

木香

桃仁

浸去
皮炒

紫蘇莖葉

香附子

甘草

各二
錢半

右剉散每服三錢水一盃半生薑三片紅棗二
枚煎服

〔立效口〕

百藥煎研為末每服三錢煮稀白粥攪勻服

之立愈糊丸米飲下亦可

黑日子專治久年痔漏下血用之累驗

乾薑

百草霜各一兩

木饅頭

二兩

烏梅

敗棕

柏葉

亂髮各五分

右各燒灰存性再入桂心三錢白芷五錢同為

末醋糊丸梧桐子大空心三十九米飲下

熱證逐瘀湯通利大小便取下黑物

川芎

白芷

生乾地黄

赤芍藥

五靈脂

枳殼製

阿膠炒

蓬莪朮煨

茯苓

茯神

大木通

生甘草

各一分

實大黃

桃仁湯去皮焙各一分半

右剉散每服三錢井水一碗生薑三片蜜三匙

煎服以利為度瘀血作痛通用

白玉丹治久年腸痔下血服藥不效者

寒水石不以多少

右煨紅研細水飛再入銀窩中煨紅用糯米糊

丸梧桐子大每服五六十口陳米飲下只一服

黃連阿膠解熱調血枳殼散送下方見泄瀉及婦人護胎類

槐角治腸風痔瘡内生虫裏急下膿血止痒痛

消腫聚祛濕毒服之除根方見前

乾葛湯專治酒痢

白乾葛

枳殼

炒

半夏

茯苓

生乾地黄

杏仁 各半

黃芩

甘草 各一分

右劉散每服三錢黑豆百粒薑五片白梅一箇煎服

〔寬腸口〕五灰膏塗痔瘡之後或臟腑秘結不通者用此藥

〔寬腸五灰膏〕方見後

黃連

枳殼 各等分

右為末麩糊丸如梧子大每服五十九空心米飲下

通治秘方治諸痔捷效

右用白礬信石各少許於新瓦上煨過為末再

入朱砂末少許以新汲井水調成膏用舊傘紙上藥隨瘡大小貼之先用鬱金國丹末以鵝翎刷於瘡四畔圍護恐傷好肉凡上藥貴宦人肉理嬌脆薄少用之愚俗人肉理麤厚稍多少許用之大抵上藥後多疼不可太過為妙仍用大青根晚蠶沙煎水洗後再上藥無服槐角口皂角丸臟腑結熱秘甚八正散加燈心枳殼薄荷葉煎再用大黃茶莽草荆芥穗防風煎水洗效

八正散方見積熱類

〔又方〕用川白芷煮白苧作線快手緊緊繫痔上微疼不妨其痔自然乾痿而落七日後安

〔五灰膏〕治臟腑一切蘊毒發為痔瘡不問遠年近

日形似鷄冠蓮花挑核牛乳或內或外並皆治之
蕎麥_{瓶七} 荆柴 薊柴

山白竹

老杉枝

右以四件柴竹截作一尺許長以斧劈破成片
各取一束曬乾於火上燒過置壘內為炭防為
風所化俟燒盡却以水於鍋內煮出炭汁又用
酒漏以布帛實其竅而置蕎麥灰於酒漏內以
所煮炭汁淋之然後取汁於窩內慢火熬汁約
取一小碗候冷入石灰國丹調和成膏以瓦瓶
貯之上用石灰傅面不令走氣臨用却去石灰
以冷水調開令病者以水洗淨痔瘡仰卧搭起
一足先以濕紙於瘡四圍貼護却用收效必矣

熏方

蝟皮

指方大三

雄黃

熟艾

子如雞大

為末用瓶一箇以灰實一半如燒香法安高桶
內坐其上莫令烟透烟從口中香出方好三度
熏求差勿犯風冷

又方

黃連

黃芩

京芥

蛇床子

各一兩

側柏葉

四兩

槐條

鏡面草

蚶蜆草

各一握

右用新汲水熟煎傾盆內熏候通手却洗

蓮子散

蓮子

十四箇

草芽茶

十四箇

乳香

隨上二藥

右三味同搗以帛裹煨透先以黃蓮湯洗患處然後以藥生貼之

〔木鱉散〕

木鱉子

百藥煎

右等分為麤末每服一掬布裹煎湯以桶盛之蓋上穴一竅先以氣熏蒸後通手洗白鱉膏敷法熊膽膏傳痔極效

熊膽

細研

腦子

細研

右各少許用井花水調以雞羽拂痔上

〔枯礬散〕治五痔痛痒

枯礬

半錢

腦子

一字

右並研為末先用魚腥草濃煎汁放溫洗次用少許傳痔上效

〔消石散〕

右用寒水石朴硝為末以津潤手指點藥敷瘡上立效

〔葱青散〕

右用葱青刮去涎對停入蜜調勻先以木鱉子煎湯熏洗然後傳藥其冷如冰

〔又方〕耳環草一名碧蟬兒花手搦軟納患處即愈

〔又方〕穿山甲白尾根盡處數除三鱗不用取第四

第五第六鱗橫三行燒存性為末用麝香少許

臘茶一匙同調空心服以澄下濃者傳瘡上其

冷如冰永不痛無不效

〔蝸牛散〕治痔瘡腫脹作熱如火

右用蝸牛螺一箇以冰片腦子麝香各少許同入瓦器內盛頓逼半日自化成水以少許點瘡上立愈

〔灸法〕平立量脊骨與臍平處推上灸七壯或年深更於推骨兩傍各一寸灸如上數無不除根又法治痔疾大如胡瓜貫於腸頭熱如塘灰火發則僵仆以柳枝濃煎湯洗後以艾炷灸其上三五壯若覺一道熱氣入腸中大瀉鮮紅血穢惡一時至甚痛楚瀉後其疾如失久冷五痔便血灸脊中百壯五痔便血失尿灸回氣百壯穴

在脊窮骨上

世醫得效方卷第七

世醫心法卷之六

脾胃論

五

脾胃

冬

可氣自壯危

失谷五痔更

傷新血蒸

心經

熱

壯

氣

胃

脾

肝

肺

腎

ク

