



丹溪心法附餘卷之二十一

休寧東山古庵方廣約之類集

婦人門

下

產前

九十五

丹溪心法

○產前當清熱養血

產婦因火動胎逆上休帶急者急

用條芩香附之類為末水調服條芩水中取沉者為佳

墮胎乃氣虛血虛血熱黃芩安胎乃上中二焦藥能

降火下行 益母草即此藥治產前產後諸病能行
血養血難產可煎作膏地黃膏牛膝膏皆可用 懷妊
愛物乃一臟之虛假如肝臟虛其肝氣止能生胎無餘
用也又云不能榮其肝肝虛故愛酸物 產前安胎白
朮黃芩為妙藥也係安胎聖藥也俗人不知以為寒
而不敢用反為溫熱之藥可養胎殊不知產前宜清熱
令血循經而不妄行故能養胎 胎熱將臨月以三補
丸加炒香附炒白芍藥蒸餅丸服 抑熱以三補丸用
地黃膏丸 有孕八九箇月必用順氣須用枳殼紫蘇
梗 凡妊婦脉細勻易產大浮緩火氣散難產 生產

如抱船過渠一般

入方 固胎

地黃錢半

歸身

人參

白芍錢一

白朮錢一

川芎錢五

陳皮錢一

黃芩錢半

甘草分三

黃連分三

黃柏分三

桑上牛兒藤圓七葉

一本無芩

右咬咀每二錢入糯米二十粒煎服 血虛不安者用

阿膠 痛者用砂仁止痛安胎行氣故也

東胎散 第八箇月可服

炒黃芩

夏一兩春秋七錢半冬五錢

白朮

二兩不陳皮兩

三十一
三十一
三十一
三十一

茯苓七錢半
不見火

右為末粥丸如梧桐子大每服五六十丸食遠溫水下
還生散 又名東胎散

大腹皮三錢

人參

陳皮各半錢

白朮

芍藥各一錢

紫蘇半錢

甘草二錢

歸身尾一錢

右作一服入青葱五葉黃楊樹腦七箇此即黃楊樹葉精
兒也或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九箇月服十
數貼甚得力夏月加黃芩冬不必加春加川芎 或有
別証以意消息于后

氣虛加參朮

氣實倍香附陳皮

血虛倍當歸加地

黃 形實倍紫蘇 性急加黃連 有熱加黃芩 濕

痰加滑石半夏 食積加山查 食後易飢倍黃楊樹
有痰加半夏 腹痛加木香桂

又方 第九箇月服

黃芩一兩

酒炒不宜涼

白朮一兩

枳殼七錢半

滑石七錢半

臨月十日

右為末粥丸梧子大每服五十九丸空心熱湯下多則恐
損元氣氣實人宜服

又方 安胎

白朮上

黃芩上

神曲炒

右為末粥丸服 一本云用條芩一二兩為末每一錢
或半錢濃煎白朮湯調下每次用白朮五七錢煎湯
○惡阻從痰治 多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者
有痰瘦者有熱須用二陳湯

入方

白朮不少

右為末水丸隨所好或湯或水下

○子腫

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

入方

山梔子炒

右為末米飲吞下或丸服

三因鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩

茯苓四兩

當歸

芍藥各二兩

右細剉以鯉魚一箇脩事如食法煮取汁去魚不用每
服四錢入魚汁一鍾半姜七片陳皮少許煎至七分去
粗空心服

○胎漏 氣虛 血虛 血熱 可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

產前

卷之三

九

胎前

麥木飲 治妊娠轉胞

四物湯四錢加

人參

白朮

半夏五分

陳皮

甘草

右吹咀入生姜煎空心服

治胎動不安已有所見

艾葉

阿膠

當歸

川芎

甘草兩

右每服五錢水煎次下膠令洋溫服

○難產氣血虛故也此蓋九月十月之四心不謹守者有之

亦有氣血凝滯而不能轉運者臨月吐可服野天麻熬膏

白湯調下油蜜小便和極勻治難產

方

砂仁中

香附醋煮

枳殼中

甘草下

右為末湯調下以香油蜜小便和勻各半鍾調益母草

末

催生

白芷灰中

百草霜中

滑石上

右為末用芎歸煎湯調下或姜汁服亦可

天麻丸 易產

天麻即益母草六月
間連根採陰乾

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時溫酒或白湯化一丸能除產後百病

附諸賢論

王節齋曰婦人半產多在二箇月五箇及七箇月除跌撲損傷不拘外若前次三箇月而墮則下次必如期復然蓋先於此時受傷故後至期必應乘其虛也遇有半產者產後須多服養氣血固胎元之藥以補其虛損下次有胎先於兩箇半月後即服固胎藥十數服以防三月之墮至四箇半月後再服八九服防過五月又至六箇半月後再服五七服以防七月及至九箇月內服丹溪

達生散十數服可保無虞若有連墮數次胎元損甚者服藥須多久則可以留方用四物湯加入參白朮陳皮茯苓甘草阿膠艾葉條芩多氣加香附縮砂有痰加姜製半夏調理妊娠在於清熱養血條芩黃芩為安胎聖藥清熱故也暑月宜加用之養胎全在脾胃猶鍾懸於梁梁軟則鍾下墜折則墮矣故白朮補脾為安胎君藥若因氣惱致胎不安者宜用川芎陳皮茯苓甘草多加縮砂少佐木香以行氣

附脉理

脉訣舉要曰男女之別以左右取左疾為男右疾為女沉

實在左浮大在右右女左男可以預剖離經六至沉細而滑陣痛連腰胎即時脫血厥弦急而大者生虛小弱者即是死形半產漏下革脉主之弱即血耗立見傾危附諸方

驗胎方 經脉不行已經三月者

用川芎為細末空心濃煎艾葉湯調下一錢覺腹內微動則有胎也否則為經滯

○胎動不安

安胎散 濟生方治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血縮砂不拘多少於熨斗內炒令熱却去皮

研為細末每服二錢熟酒調服艾葉湯亦可

川芎散 簡易方治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能腹臍疼痛

南川芎為末每服二錢温酒調下

佛手散 大全良方治妊婦胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸 酒浸 芎藭 略一

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸温服

膠艾湯 損動胎下血腹痛

艾葉 錢二 阿膠 錢三

右二味水煎服

膠艾湯濟生方治妊娠或因倒仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黄洗 艾葉炒 白芍藥 川芎

黃芪去蘆 阿膠蛤粉炒 當歸酒浸 甘草炙

右以咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚同煎去滓空心溫服

杜仲丸濟生方治妊娠三兩月胎動不安防其欲墮預宜服之

杜仲去皮剉姜汁炒去絲 川續斷酒浸各二兩

右為末棗肉煮爛杵和為丸如梧桐子大每服三十丸米飲下

安胎當歸湯不全良方療妊娠五月舉動驚悸胎動不安

下墜小腹引腰脇小便疼痛下血

當歸 阿膠 川芎 人參酒

棗子二枚 艾一虎

右細切酒水各三升合煮至三升內膠令烊分二服腹中當安小便當煖也 一方有甘草無艾棗

旋覆花湯不全良方療妊娠六七月間胎不安常處亦名

阻病

旋覆花兩 厚朴 白朮 枳殼

黃芩 茯苓各三兩 半夏炒 芍藥

生姜略二

右咬咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去渣溫服食則忌
羊肉餲醋桃李雀肉

芍藥湯 六全良方 治妊娠八月中風寒有所犯觸身體

盡疼乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒
時時小便白如米泔或青黃寒慄腰背苦冷痛面
視茫茫

芍藥兩

人參

當歸

甘草略二

白朮兩

厚朴兩

薤白切一

生姜兩切四

右用水五升酒四升煮取三升分三服日再夜一忌海

藻菘菜桃李雀肉等物

二香散 聖惠方 療妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔

吐酸水起坐覺重宜服

香附子兩

藿香葉

甘草略二

右為細末每服二錢鹽沸湯調下

當歸湯 六全良方 治妊娠胎動湯盪心煩躁悶絕口乾橫生

倒產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保安

飲

當歸

人參各一兩半

阿膠炒一兩

甘草二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半連根葱白一莖煎至八分

去滓温服 一方無甘草有川芎厚朴產保方有川芎
阿膠散 大全良方 治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓

白朮

川芎各七

阿膠炒七

當歸炒

陳皮各一

甘草二錢

右次咀每服八錢水一鍾半生薑二片棗二枚煎至八

分食前温服

龍骨散 大全良方 因藥損胎下惡血不止

龍骨

當歸

地黃各八

艾葉炒四

地榆

阿膠

芍藥

乾姜各六

蒲黃五

牛角鯁炙焦三分

右為末食前米飲調二錢服

當歸散 大全良方 療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連

腰痛下血

當歸

川芎各八

阿膠炒

人參各六

艾葉四

大棗二

茯苓錢

右次咀每服八錢生薑二片水一鍾半煎至八分去滓

食前温服

一方 治胎動出血產門痛

用黃連為末酒調一錢日三服

立聖散 胎動不安下血不止

用雞肝二具好酒一斤煮熟去渣飲之大効

金匱當歸散 妊娠宜常服之

當歸

川芎

白芍

黃芩 各一兩

白朮 兩

右五味為末酒飲調服方寸七日二次 或用水糊為丸如梧桐子大每服五十九茶湯任下空心食前服日三次

此方養血清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素曾半產者皆宜服之以清其源而後無患也

○廣按婦人有妊娠則得脾運化遲而生濕濕而生熱

古人用白朮黃芩為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥濕

黃芩清熱故也况妊娠賴血培養此方又加當歸川

芎白芍以補血尤為備也服此劑之後尤為易產所

生男女無無胎毒則痘疹稀少無病易育而聰明智

慧不假言矣此端本澄源之事也累試累驗

安胎飲 永類鈔方 治懷胎三四月至九月惡阻病者心中

潰悶頭重目昏眩四肢沉重懈墮不欲動作惡聞食氣

欲吃鹹酸睡多少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動

腹腸疼痛或時下血及妊娠一切病疾並皆治之

甘草 炙

茯苓 去

當歸 去

川芎

熟葉

酒蒸

白木

黃耆去苗

白芍藥

半夏湯泡

阿膠蛤粉

地榆各等

右咬咀每服八錢水一鍾

半夏四片煎至八分去滓溫服不拘時候

方無白木黃耆

半夏地榆有艾是膠艾湯加白茯苓

安胎和氣飲濟生

方治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子去核

白木各一

陳皮去白

高良姜炒

木香不見

陳米炒

甘草各半

右咬咀每服四錢水一鍾

姜五片煎服忌食生冷之物

大聖散

濟生方治妊娠忪悸睡不安驚腹脇膨脹坐臥不寧

白茯苓去皮

川芎

巫山門冬心

當歸去蘆酒

黃芪去蘆

木香不見

人參

甘草各半

右咬咀每服四錢水一鍾

姜五片煎七分去滓溫服

芎藭補中湯

濟生方治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而墮

乾姜炮

阿膠蛤粉

芎藭

五味子各一

黃芪去蘆

當歸去蘆

白木

赤芍藥各半

木香不見

人參

杜仲去皮

甘草各半

產前

產前

產前

產前

產前

產前

產前

產前

產前

產前

產前

產前

產前

右咬咀每服四錢水一鍾煎至七分不拘時服

益母丸 醫方大全 專治難產橫逆併安胎順氣

用益母草其葉類大麻葉莖方花紫色白者不是五月五日採其葉莖陰乾不見日忌鐵器以石磨為末煉蜜丸如彈子大每服一九臨產時以童子小便溫酒化下若氣不順木香人參湯或艾醋湯化下

枳實枳櫛丸 宣明方 安養胎氣和調經候破癥瘕癖塊有

似姪孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實生 枳櫛 黃連 黃蘗

黃芩 當歸 阿膠 煨炒 木香 略半

右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十九日進三服

黃芩湯 宣明方 治婦人孕胎不安

白朮 黃芩 各等分

右為末每服二三錢水二鍾入當歸一根同煎至一鍾

溫服

黃耆散 大全良方 療姪娠胎不長宜服安胎和氣思食利

四肢

川芎 甘草 略五 黃耆 白朮

陳皮 麥門冬 白茯苓 前胡

人參 略二

右吹咀每服八錢生薑三片棗二枚水一鍾半煎至八分食前服

知母丸聖惠方治月日未足而似欲產腹痛者

用知母為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸溫酒對下日

一服一方如梧桐子大每服二十九丸粥飲送下

槐子丸大全良方治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃各等分

右為末用煉蜜丸如梧桐子大溫酒下三十九丸以痛止為

度

○胎漏

如聖湯濟生方治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮

當歸酒浸

熟地黃酒蒸

白芍藥

川芎

阿膠蛤粉炒

川續斷酒浸

甘草各等分

右吹咀每服四錢水一鍾芎根少許薑五片同煎溫服

桑寄生散濟生方治胎漏經血妄行淋瀝不已

當歸酒浸

桑寄生

川續斷酒浸

川芎

白朮

香附子炒去毛

阿膠蛤粉炒

人參

茯神去木各

甘草錢五

右吹咀每服四錢水一鍾薑五片煎七分去粗不拘時

溫服

黃散 按萃方 治婦人胎漏下血

生地黄 熟地黄 各等分

右為細末煎白朮枳殼湯調下二錢食前服

枳殼湯 按萃方 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼 去穢 麩炒 黃芩 各半 白朮 一兩

右為末水煎食前溫服二錢

秘傳當歸寄生湯 治妊娘胎漏非時下血

當歸 川芎 艾葉 白朮 各一錢

人參 桑寄生 川續斷 熟地黄 各一錢

用水三鍾煎至一鍾云滓空心溫服

厚朴散 無故卒下血

阿膠 二兩 蛤粉炒 生地黄 半斤 搗取汁

右以清酒三升將二味攪勻溫熱分三服飲之

一方 無故尿血

龍骨 一兩 蒲黃 半兩

右為末酒調每服二錢日三服

一方胎動不安或腰疼胞轉撞心下血不止

用石菖蒲根搗汁三升飲之

方用檳榔一兩為末葱白湯調下一錢

榆白皮散 簡易方 治妊孕漏胎去血恐其難產常宜服之

榆白皮

葵根

火麻仁去殼

瞿麥各二兩

木通兩

牛膝七錢 浸半 焙去

右咬咀每服四錢水一鍾煎八分温服

地黃當歸湯 治胎痛

當歸兩

熟地黃兩二

右為末每半兩水煎大全良方等分為末蜜丸名內補丸許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋此等藥甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散苦寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽

不至強陰不至助陽湯調停有丸胎嗣此前人未嘗論

定心散詳論陽調停不若不服為愈

○忌

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐

吐

旋覆花

陳皮去白

桔梗

白芍藥

人參去蘆

甘草炙

川芎各半

半夏泡 七次

赤茯苓

熟芩各七錢半

右咬咀每服四錢水一鍾姜四片煎七分空心熱服

養參丸 和膏方治妊娠惡阻停飲憂聞食氣當與茯苓湯

美服

赤茯苓皮去

人參去蘆

肉桂去

乾姜炮

半夏洗焙

陳皮各一

白朮

葛根

甘草多

枳實去白 炒

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

竹茹湯和劑方治妊娠嘔吐頭疼眩暈

橘紅去白

人參各

甘草半錢

麥門冬去心

厚朴姜製

白茯苓各半

白朮一

右吹咀每服五錢水一鍾姜五片入竹茹一塊如彈子

大同煎至八分不拘時溫服

小地黃丸和劑方治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食

人參去蘆

乾姜炮各

右為末用生地黃汁丸如梧桐子大每服五十丸白朮

湯下食前服

參橘散和劑方治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓

橘皮去白各

麥門冬去心

白朮

厚朴製

甘草各

右吹咀每服四錢水一鍾姜七片竹茹少許煎七分去

滓溫服

白朮散簡易方治妊娠胎氣不和不進飲食

三

三

一

三

白朮炒

紫蘇各一兩

白芷炒

人參各一兩

訶子

青皮去白

川芎各七錢

甘草二錢

右咬咀每服四錢水一鍾姜三片煎七分不拘時服

旋覆半夏湯濟生方治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

卧少起

旋覆花

川芎

細辛洗去土

人參

甘草各半兩

半夏湯洗七次

赤茯苓去皮

當歸酒浸去蘆

乾生姜

陳皮各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分去粗溫服

人參半夏丸濟生方治妊娠惡阻醋心眩腹冷痛吐逆不

食

半夏

湯泡七次

人參

乾生姜各一兩

右為末以生地黃汁浸蒸餅丸如梧桐子大每服四十

丸米飲下

白朮散大全良方治惡阻吐清水十餘日粥漿不入者

白朮

兩

人參五錢

丁香二錢

甘草錢

右咬咀每服一兩生姜五片水二鍾煎至一鍾去滓溫

服食前

人參橘皮湯聖惠方治惡阻病嘔吐痰水

人參去蘆

橘皮

白朮

麥門冬

甘草各三錢

厚朴製

白茯苓各半兩

右咬咀每服一兩水二鍾姜三片竹茹彈大一塊煎至

一鍾去滓食前溫服集驗方無茯苓麥門冬有甘草

人參丁香散大全良方治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食

反心腹刺痛

人參錢五

丁香

藿香各一錢半

右咬咀每服五錢水一鍾煎至八分去滓溫服無時

保生湯大全良方治婦人經候不調或不行身無病似病

脉滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞

食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿

作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎服

人參

甘草各二錢半

白朮

香附子

烏藥

橘紅各五錢

右咬咀每服一兩水一鍾半生薑三片煎七分去滓溫

服不拘時或為末調服亦可

○子煩

竹葉湯簡易方治妊娠心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓四兩

防風

麥門冬去心

黃芩各三兩

右咬咀每服四錢水一鍾竹葉五片煎服不拘時

知母散 簡易方 治妊娠心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

赤茯苓 黃芩 黃耆各二 知母

麥門冬 甘草各二

右咬咀每服四錢水一鍾入桑白皮煎熟再入竹瀝同

服

竹茹湯 大全良方 療妊娠煩躁或胎不動

淡青竹茹兩

右用水一大升煮四合徐徐服盡為度

麥門冬散 濟生方 治妊娠心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬法 防風 白茯苓各一 人參半

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片淡竹葉十片煎七分

溫服

歸涼接命散 濟生方 治妊娠面赤口苦心煩腹脹

川芎 芎根 白芍藥 麥門冬法

當歸法 酒浸 白木各一 糯米半 甘草多五

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至一鍾去粗溫服

麥門冬散 聖惠方 療妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣

頭眩四肢沉重百節疼痛多卧少起

麥門冬 子芩 赤茯苓 柴胡

赤芍藥 陳皮 人參 桑寄生

桔梗

甘草

旋覆花

各半

生地黄

右吹咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓
食前溫服

柴胡散

聖惠方治妊娠心煩頭目昏重不思飲食或嘔吐

柴胡

赤茯苓

麥門冬

各一兩

枇杷葉

人參

橘皮

甘草

各三錢

右吹咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓
溫服無時

人參散

聖惠方治妊娠熱氣乘於心下津液枯少煩躁

執口舌乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

家葛根

黃芩

犀角屑

各半甘草

右吹咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓溫服

○子癇

羚羊角散

永類金方治妊娠中風頭項強直筋脉挛急言

語蹇澁痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角

川獨活

酸棗仁

炒

五加皮

各半

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

木香

甘草

各二分

右吹咀每服四錢水一鍾姜五片煎七分不拘時服

防風湯 大全良方治妊娠中風卒倒心神悶亂口禁不能言四肢強直

防風

桑寄生

葛根略一

菊花

防已

細辛

秦艽

當歸

官桂

茯神

甘草

羚羊角略半

右吹咀每服八錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓加竹瀝半合溫服不拘時候

葛根湯 聖惠方

療妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識人吐

逆眩倒少醒復發名曰寸癩

葛根

貝母

牡丹皮法

防風

防已

當歸

川芎

白茯苓

官桂

澤瀉

甘草各二兩

石膏

獨活

人參各三兩

右吹咀每服八錢水二鍾煎至八分去滓溫服無時

防風葛根湯

妊娠中風腰背強直時復反張

防風

葛根

川芎

生地黄略一

杏仁法皮

麻黃去節各兩半桂心少許

獨活

甘草

防已各一兩

每服八錢水一鍾半煎八分不拘時溫服

麻

妊娠中風角弓反張口噤語澁調之風瘧亦名

癰

麻黃各半

防風

獨活各一

桂心許

羚羊角

升麻

甘草

酸棗仁

秦艽各半

川芎

當歸

杏仁製各

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分加竹瀝一合

溫服

○子腫

全生白朮散簡易方 治妊娠面目虛浮肢體腫如水氣名

曰子腫

白朮一兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

白茯苓皮各半

右為末每服二錢米飲調下不拘時服

五皮散大全良方 治胎水尋常脾虛腫滿

大腹皮

桑白皮

茯苓皮

生姜皮

陳皮分

右吹咀每服八錢水一鍾濃磨木香水一鍾同煎至八

分去滓不拘時溫服一方空心服

防已湯 脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已七錢

木香二錢

赤茯苓

桑白皮

紫蘇葉各一兩

右每服八錢水一鍾半姜四片煎至八分食前溫服
如大便不通加枳殼枳柳

○子氣

李氏天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸
腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美狀似水氣
至於脚指間有黃水出者名曰子氣

天仙藤洗畧香附子炒陳皮

甘草

烏藥各等分

右為末每服三錢水一鍾半姜三片紫蘇三葉木瓜三
片同煎空心食前服日三次腫消止藥

腎著湯大全良方治妊娠腰脚腫

茯苓

白朮

各四錢

杏仁

甘草

各三錢

○子淋
右吹咀每服八錢水二鍾煎至一鍾去滓通口食前服

安榮散濟生方治妊娠小便澀少逐成淋瀝名曰子淋

麥門冬去心

通草

滑石各三錢

當歸酒洗

灯心

甘草

各半兩

人參

細辛

各一兩

右為細末煎麥門冬湯調下不拘時服

大腹皮散濟生方治妊娠大小便赤澀

枳殼去白

大腹皮

甘草

各錢

赤茯苓

去皮

三錢

右為末每服一錢濃煎葱白湯調下不拘時

冬葵子散濟生方治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈

欲倒

冬葵子錢三 赤茯苓去皮

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是

轉胞加髮灰少許極妙

○轉胞

八味丸 治妊娠小便不通名曰轉胞亦治子淋補損

全生茯苓散簡易方治妊娠小便不通

赤茯苓 葵子各等分

右次咀每服五錢水二鍾煎至一鍾空心溫服濟生方

加髮灰少許同服極妙

○子懸

紫蘇飲濟生方治胎氣不和湊上心眩脹滿疼痛謂之子

懸

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮去

紫蘇葉 當歸去蘆酒 人參 甘草各半

右次咀每服四錢水一鍾生薑五片葱白七寸煎至七

分空心溫服

香米散大全良方治妊娠五箇月已後每常胃腹間氣刺

滿痛或腸鳴以致嘔逆減食此由忿怒憂思過度飲食失節所致蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂成此病醫官王師復處此方三服而愈

裁木

兩

一

丁香

五錢

甘草

半錢

右為細末每服一錢空心鹽湯調服覺胃中如物推下之狀

○廣按此方所言婦人忿怒憂思過度以致胃腹之間氣刺滿痛此言良是蓋婦人上有舅姑丈夫事觴物忤不能自決而憂思忿怒沉鬱于中丹溪云氣鬱便成火火載胎上榮衛不通則心腹之間脹滿痛俱作也宜矣

○兒在腹中哭

經驗方

用多年空屋下鼠穴中土一塊令孕婦噙之即止

又方

經驗方

用川黃連濃煎令母哈之

○鬼胎

斬鬼丹 鬼胎如抱一瓮

吳茱萸

川烏炮

秦艽

柴胡

白殭蚕

等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸蜜酒送下取出

惡物愈

○風寒熱病

表虛六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒中風表虛自汗頭痛項

強身熱惡風脉浮而弱太陽經病宜服

四物湯 兩四 桂枝 地骨皮 各七

表實六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊

惡寒太陽經病宜服

四物湯 兩四 麻黃 細辛 各半

風濕六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒中風濕之氣肢節煩疼

脉浮而瀦頭痛太陽標病也宜服

四物湯 兩四 防風 蒼朮 各七

升麻六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒下後過經不愈温毒發

班如錦文宜服

四物湯 兩四 升麻 連翹 各七

柴胡六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒胸脇滿痛而脉弦少陽

頭昏項強宜服

四物湯 兩四 柴胡 黃芩 各七

大黃六合湯 聖惠方 若妊婦傷寒大便硬小便赤氣滿而

脉沉數陽明太陽本病也急下之宜服

四物湯 兩四 大黃 錢五 桃仁 去皮

產前 八法附錄卷之三十一 二十六 二三百八

人參六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物湯 兩四 人參 五味子 各五錢

厚朴六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽

明本虛宜服亦治咳嗽喘滿

四物湯 兩四 厚朴 枳實 各五錢

梔子六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜服

四物湯 兩四 梔子 黃芩 各五錢

石膏六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒身熱大渴蒸熱而煩脉

長而大者宜服

四物湯 兩四 石膏 知母 各五錢

茯苓六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒小便不利太陽本病也

宜服

四物湯 兩四 茯苓 澤瀉 各五錢

琥珀六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血

狀者宜服

四物湯 兩四 琥珀 茯苓 各五錢

膠艾六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣

損者宜服

四物湯 兩四 阿膠 艾葉 各半兩

一方有甘草同上 一方加乾姜甘草黃耆

附子六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗

中痛脉沉而遲少陰病也宜服

四物湯 附子炮去桂各半

四物大黃湯 聖惠方 若妊娠傷寒畜血証不宜隨胎藥下

宜服

四物湯 生地黃 大黃酒浸各

芍藥散 濟生方 治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心

胃煩悶

紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮

麥門冬去心 陳皮去 乾薑各一 甘草炙半

右咬咀每服四錢水一盞薑五片葱白二寸煎服

白朮散 拔萃方 治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐

逆不下食

白朮 橘紅 人參 前胡

川芎 麥門冬 赤茯苓 甘草

半夏湯泡七次 姜各半兩

右咬咀每服四錢姜四片竹茹二錢水煎去滓溫服

無時

升麻散 拔萃方 治妊娠傷寒頭痛身體熱

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃去蘊各

黃芩

大青各半兩

石膏兩

右為粗末每服四錢生薑四片竹葉五七片水同煎

芍藥湯按萃方治婦人妊娠傷寒自利腹中痛飲食不下

脈沉者太陰也宜服此藥

芍藥

白朮各一兩

甘草

茯苓各五錢

黃耆兩

右剉細每服一兩水煎服

麻黃散聖惠方治妊娠五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩疼

麻黃

桂心

柴胡

赤芍藥各一兩

甘草兩

右吹咀每服八錢生薑三片水一盞半煎至八分去滓

通口服

前胡湯大全良方治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節疼痛

石膏一錢二分

前胡六分

甜竹葉三分

黃芩

大青各五分

知母

梔子各四分

右吹咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓

溫服不拘時外臺無甜竹葉

黃龍湯聖惠方治婦人妊娠寒熱頭痛嘔噦不欲食脇下

痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水

適來適斷病後勞復餘熱不解宜服

柴胡去蘆一兩

黃芩

人參

甘草各二錢七分半

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時

枳實散聖惠方治妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹

上氣渴不止飲食不多腰疼體重

枳實炒一兩

陳皮七錢半

麥門冬去心半兩

右咬咀每服一兩水一盞半生薑半錢葱白七寸煎至

八分溫服

麥門冬湯聖惠方治妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食

胎動不安

人參

石膏各一兩

前胡

黃芩各七錢半

家葛根

麥門冬各五錢

右咬咀每服一兩水二盞生薑二片棗二枚竹茹一錢

半煎至一盞去滓溫服不拘時

秦艽散 傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語嘔逆

秦艽

柴胡

石膏

前胡

赤茯苓

甘草節

葛根

犀角屑

升麻各等分

右每服八錢水二盞姜三片竹茹三錢煎至八分溫服

○廣按此方云傷寒五六日不得汗口乾多飲水狂語

吐逆此即溫熱病之證候也古方溫熱病皆謂之傷寒多不分也用者審之

葛者解肌湯聖惠方治妊婦傷風自汗

人參

黃芪

當歸

川芎

甘草各半兩

芍藥錢六

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服不拘時

加蒼朮生地黄亦可

柴胡散聖惠方治妊婦熱病骨節煩痛頭痛壯熱若熱不

治則損胎

柴胡

葛根

知母

梔子

甘草錢五

石膏兩三

大青

茯苓

升麻錢七

右咬咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去滓

通口服不拘時候一方有黃芩無茯苓

梔子仁飲子大全良方治妊婦熱病斑出黑色小便如血

氣急絕胎欲落

梔子仁

升麻

石膏

地黃各二兩

黃芩

大青各一兩

豆豉四九粒

救急方有杏仁無地黃石膏

右咬咀每服半兩水一盞葱白七寸煎至五分去滓溫

服無時 一方加青黛無本青 又方以陳艾如雞子
大酒煮服救妊婦危困

六黃飲子 聖惠方治妊婦熱病六七日熱入腹中大小便
秘澀煩熱

六黃飲

石膏 兩一

知母

前胡

赤茯苓

各二錢

梔子仁

甘草

黃芩

各五錢

石咬咀每服八錢水一盞生地黃二錢半煎至七分去
滓食前溫服

柴胡石膏湯 聖惠方治妊婦傷暑頭痛惡寒身熱煩燥悶
亂四肢疼痛項背拘急口乾舌燥宜服

柴胡

甘草

石膏

右咬咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓
溫服無時若氣虛體冷加人參四兩

傷寒熱病護胎法

一方用白藥子不拘多少為末以雞彈清調攤於紙上
如碗大貼臍下胎存處乾以溫水潤之

一方以竈心土水調塗臍下乾又塗之就調服一錢
一方壯熱甚并底沉敷心下令胎不傷

○雜病

消風散 濟生方治妊婦肝臟熱毒上攻太陽穴頭眩目暈

腮項腫核胃膈延纏

石膏煨

甘菊花去枝 防風去蘆

荊芥穗

川羌活去蘆

川芎

羚羊角鎊

大豆黃卷炒

當歸去蘆

白芷斫

甘草炙

右咬咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分去滓

食後溫服

天門冬飲子 濟生方治妊娠肝經風熱上攻眼目世雷吊失

明

天門冬去心

知母

羌蔚子 各一兩

防風去蘆

五味子

茯苓去皮

川羌活去蘆

人參各七錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至八分去滓食後

溫服

百合散 濟生方治妊娠風壅咳嗽痰喘滿悶

百合蒸

紫苑茸 洗

貝母去心

白芍藥

前胡去蘆

赤茯苓去皮

桔梗去蘆 各一兩

甘草炙 五錢

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分去滓不拘

時溫服

百合散 聖惠方治妊娠咳嗽心胃不利煩滿不食

川百合

紫苑

麥門冬

桔梗

桑白皮各一兩

甘草炙

竹茹一兩

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓入蜜半匙
再煎一二沸食後溫服

紫苑湯 永類鈴方治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草

杏仁

桑白皮錢半紫苑兩

桔梗兩

天門冬去心各一兩

右咬咀每服八錢水一盞半竹茹一團煎至八分去滓

入蜜半匙再煎一二沸溫服

馬兜鈴散

大全良方治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

貝母錢各五

陳皮

大腹皮

紫蘇

桑白皮兩五味子錢

右咬咀每服八錢生薑三片水一盞半煎至八分去滓

食後溫服

平安散

濟生方治妊娠上氣喘急嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴

生薑錢各一

乾姜炮

陳皮去白各一錢

川芎錢半

木香錢半

乾地黄洗一錢半甘草錢四

右咬咀每服四錢水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時

驅邪散 濟生方治妊娠停食感冷發為瘡疾

高良姜炒

白朮

草果仁

橘紅

藿香葉

縮砂仁

白茯苓去皮各一兩甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

柴胡散 治妊娠瘧疾

黃芩半一錢 甘草錢 柴胡錢 生大黃錢二

右作一服水煎臨發日五更溫服取利為度如胎上逼

心可服枳殼散忌油麵辛酸之物

一方 治瘧疾發熱口乾渴飲無度

生地黃半兩 黃芩兩 麥門冬錢 人參

知母 乾葛各一兩 石膏兩二 甘草兩半

右每服一兩水一鍾半烏梅半箇煎至一鍾溫服

一方 治瘧疾

常山 石膏各一兩 甘草錢 黃芩各半兩

烏梅七箇

右作二服每服酒水各一碗浸一宿平旦煎服

蒙姜黃連丸 濟生方 治妊娠下痢赤白穀道腫痛冷熱皆

可服之

乾姜炮 黃連去 縮砂仁炒 川芎

阿膠蛤粉 白朮各一兩 乳香三錢 枳殼去白

右烏末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵老如梧桐子

大每服四十九丸白痢乾姜湯赤痢甘草湯下 赤白痢

乾姜甘草湯下

當歸芍藥湯 濟生方 治妊娠腹中疝痛下痢

白芍藥

白茯苓去皮

當歸酒浸

澤瀉

川芎各一兩

白朮一兩

右為末每服三錢空心溫酒米飲任下

白朮湯 治女子婦下痢膿血

白朮

黃芩

當歸各四錢

用水二盞煎至一盞去粗食前溫服

大龍散 按萃方 治妊娠氣痛

艾葉末鹽炒一兩半

茴香

川練子各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分食後服

白朮湯 千金方 治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白朮

三兩去黑心

赤芍藥兩

黃芩一兩去黑心

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服忌桃李雀肉

服忌桃李雀肉

當歸散 大全良方 治妊娠中惡心腹疝痛

當歸

丁香

川芎各三兩

青皮兩

吳茱萸湯泡三次

右為末溫酒調一錢服無時

芎歸湯 按萃方 治妊娠先忽患中心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

官桂

吳茱萸 當歸各三 厚朴製 白芍藥各二

一右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

候 一方有桔梗無官桂

○廣按丹溪云凡心腹諸痛不可用參朮補氣其痛愈

甚則此方與前白朮湯中皆犯藥禁未知果乎否乎

食公下氣湯 大全良方 治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下

飲食四肢無力

羌活 上小芍藥 甘草 檳榔

青皮 八腹皮 陳皮 赤茯苓

半夏 白皮 官桂 紫蘇

右吹咀每服八錢生姜五片棗一枚水一盞半煎至八

分去滓食前溫服

勝金散 濟生方 治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸 酒浸 陳皮 白 生姜 乾姜炮

川芎 厚朴 皮去 縮砂仁 炒 甘草 各等分

右為末每服二錢鹽湯調服不拘時

通氣散 大全良方 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上炒令香熟

右為末嚼胡桃肉半箇空心溫酒調下二錢

消熱飲子 聖惠方 治妊婦時氣六七日熱甚大小便不利

最宜服之

川芒硝一兩研細
葵子三兩

右為末每服五錢溫水調下無時一方水二大盞煎至一盞三分去滓不拘時溫服

一方 治孕婦大便秘澀 大全良方

枳殼炒 防風去蘆 甘草炙

右為末每服二錢白湯調下空心食前日三服

桑螵蛸散 濟生方 治妊娠小便不禁

桑螵蛸二十箇炙為細末每服二錢空心米飲調下

白薇散 濟生方 治妊娠遺尿不禁

白薇 白芍藥各等分

右為末每服三錢食前溫酒調服

○瘦胎

瘦胎枳殼散 簡易方 治妊娠七八月常宜服滑胎易產

粉甘草一兩 商州枳殼五兩 去白半炙 炒赤

右為末每服一錢空心白湯點服 一方加香附子尤

佳

○廣按前人云枳殼散性苦寒若單服之恐有胎寒胎

痛之疾以地黃當歸湯蜜丸佐之可也 謹見前

地黃當歸湯 補血養胎與枳殼散間服蓋枳殼散破氣

產前 產後 治法 卷之二十一 三十八 五

有餘而地黃當歸湯補血不足也方見前

救生散濟生方治胎氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益

氣易產

人參

訶子煨去核

白木

神麩

陳皮各等分

右為末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

○催生

催生如聖散

黃葵花不以多少焙乾

右為末熟湯調下二錢神効一或有漏血胎藏動生

產痛劇者併進三服良久腹中氣寬胎溫即時產下

如無花只以蜀葵子研爛小半合以酒調尤妙亦治

打撲傷損如胎死不下煎紅花溫酒調下經驗方用

子四十九粒或三十粒歌曰黃金丙子三十粒細研酒

調能備急命若懸係在須臾即令眷屬不悲泣

催生如聖散濟生方

用黃蜀葵子為細末每服二錢熱酒調下熱湯亦可

催生神妙佛手散太全良方治婦人妊娠五七月因事案

磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此

藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下

當歸錢六

川芎錢四

用水一盞半煎令泣欲乾頭酒一大盞止煎一沸去滓
溫服口噤灌之如人行五里再服不過二三服便生
催生如意散聖惠方臨產腰疼方可服

人參為末錢一

乳香錢一

辰砂五分

右將一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥末再用
姜汁調開冷服如橫生倒產即時順子母平安
催生神效七寶散大全良方臨產腰痛方可服

玄胡索

沒藥

白礬

香白芷焙

姜黃焙

當歸

桂心各等分

右為細末每服三錢燒梨頭令紅淬酒調下臨陣每
服一二服立產

催生如神散聖惠方治逆產橫生瘦胎兼產前產後虛損
月脉不調崩漏等証一名催生黑散子一名烏金散一
名二神散

百草霜

白芷蘇枳

右等分研勻服二錢於臨產之時以童子小便并少米
醋打為膏沸湯調下集驗方用童子便酒各半盞煎沸
即調停熱服甚者不過再服

催生丹簡易方治產婦生理不順臨產艱難

十二月免腦髓法去膜研

乳香研如粉麝香一細研

母丁香末錢一

右研勻用兔髓和丸如雞頭大陰乾油紙封貯每一丸
研破後溫水服即時產下隨男左女右手握藥出是驗
催生鉛丹濟生方治橫逆難產

用黑鉛一錢將小銚子火上鎔投水銀一錢急攪結成
砂子傾出以熟絹衣角紐作丸子如棗豆大臨產時麝
香水吞下二丸立下

催生散 懷孕不曾行動舒伸忍痛曲身或臥故子在腹
中不能動轉致有橫逆難產甚則子死腹中

蛇退條

蟬退條二十

人退即男婦頭髮一團如雞彈大

方 右俱燒為末酒調下分作三服

用蛇退一條全者燒灰入麝香一字酒調二錢面東服
如橫生逆產以餘相塗所出手足即順也

方 用草鞋鼻繩路上者洗淨燒灰末童便和酒調服一名
千里馬

滑胎散聖惠方催生神効

益元散一兩方見暑門

蛇退一條燒灰存性

男子亂髮香油一

蟬退全者五箇燒灰

穿山甲一片燒灰存性

右為細末用蓋水一碗和藥煎二沸入油頭髮拌勻冷定服之立下

○產難

無憂散濟生方治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨產難產

當歸

川芎

白芍藥各一兩 枳殼炒半兩

乳香錢三

木香

甘草各一錢半 血餘灰錢三

右為末每服二錢水一盞煎至八分不拘時溫服

金液丸濟生方治胎氣太肥橫逆難產

飛生毛火燒如脂

血餘灰無病女

公母羊糞燒灰各半錢

竈心土錢一 硃石研

黑鉛二錢用錫子火土鎔投木銀半錢急攪結成砂子傾出研令極細

右為末用粽子角為丸如菽豆大遇難產以倒流水吞

五丸

東甦散濟生方治臨產用力太過氣脉衰微精神困倦頭

眩目暈口噤面青髮直不省人事

木香

神麩炒

陳皮

麥蘖

黃芪去蘆

生薑炒

阿膠

白芍錢一

苧根錢三

甘草錢三

糯米合

三行

小正寸餘

四三

五三

右用水三盞煎至一盞半幹開口灌之連進為妙

二退散 治產難

蛇退金條 蚕退紙方圓

右各燒存性為細末酒調服

雲母散 橫生逆產

用雲母石研成粉每服一錢酒調下不拘時服

救生散 橫生逆產

用桂心為末童便酒調一錢服之神效

一方 治產難

用臘月兔頭一枚燒灰為末葱白湯調二錢立生 又

或吞雞子黃三箇并少古酒服之立生 又或用赤小

豆二升水九升煮取一升汁入炙了明黃膠一兩同煎

少時一服五合 又用槐子十四枚即下 又方當歸

為末酒調方寸匕服之

一方 治難產三日不下

用伏龍肝細研每服一錢酒調服之

一方 治胞衣不下

取阜屋黑塵研為細末酒調方寸匕服之

黑龍丹 濟生方 治妊娠臨產難生或胎衣不下產後血暈

不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中刺痛血滯浮

腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛
或類瘧疾胎前產後一切危急狼狽垂死以此藥灌三
四丸無不救活者

五靈脂

當歸酒

生地黄

川芎

良姜各二兩

右剉入砂鍋內紙筋益泥固濟炭火煨通紅候火減冷
取出研細入後藥

百草霜錢三

乳香

生硫黃

琥珀

花葉石鎔錢二

右五味計一兩一錢細末同前藥和勻米醋煮麵糊為

丸如彈子大每要服用炭火煨藥通紅投入生姜自然
汁浸碎之以無灰酒以合童便頓服神效不可盡述
內灸散和劑方治婦人產前產後一切血疾血崩虛僂腹
脇疼痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或不
五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐清水頻產血
衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈
血癢時發疼痛頭自眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不
乾體虛多汗手足逆冷並宜服之

○死胎

香桂散 大全良方 下死胎

麝香

五分

官桂

錢二

右共和勻用溫酒一盞調服須更如手推下

一方 治胎死腹中或半產不下產實方

官桂

五錢

牡丹皮

川芎

葵子

各一分

右為細末每服三錢煎葱白湯下

一字神散

大全良方

治子死腹中胎不下胞破不生此方

累有效驗

鬼白

不拘多少黃
色者去毛

右研為末以手指擦之如粉極細為度此藥不用羅每

服三錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神

一方 死胎不出產婦面青指甲青舌青口臭

用朴硝為末每服三錢順流水調下甚者溫童子小便

調服胎下母活亦治胎衣不下

靈犀奪命丹

濟生方

治臨產驚然氣喘目翻口噤面黑唇

青沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活修合時勿

令婦妾雞犬見之

蛇退

一條入瓦
罐內煨

金銀箔

各七

丁香

五別

髮灰

錢一

馬鳴

即蠶退

黑鉛

錢一

水銀

七分半依
前法作州

千里馬

略上左脚舊草鞋
取鞋鼻洗淨燒灰

右為末以獐猪心血丸如梧桐子大倒流水灌下二丸

如灌不下研開亦得

如聖膏 大令良方 治難產兼治胞衣不下亦治死胎

用草薺子七粒去殼細研成膏塗臍心胞衣即下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸即縮入如聖之妙一方用四十九粒

○唐按產前諸証皆因胎氣所致天胎動胎漏皆下血

而胎動有腹痛胎漏無腹痛為異爾故胎動宜行氣

胎漏宜清熱也惡阻者惡心而阻隔飲食也子煩者

煩躁而悶亂心神也子癰者痰涎潮搐目吊口禁也

子腫者面目虛浮肢體腫滿也子氣者兩足浮腫也

子淋者小便澀少也轉胞者小便不通也子懸者心

胃脹痛也蓋脾主運化水穀婦人有胎則脾運化水

穀不利而生濕濕則生痰痰生熱熱生風也子腫子

氣者濕也惡阻者痰也子煩子淋者熱也子癰者風

也子懸者氣也轉胞者虛也濕則滲之痰則消之熱

則清之風則平之氣則散之虛則補之何為而不愈

哉外有風寒熱病雜病之條者用藥要去邪保胎之

逆行有催生難產死胎之目者治法有緩急輕重之

少異業醫者其可忽乎

產後

九十六

○產後無得令虛當大補氣血為先雖有雜証以未治之
一切病多是血虛皆不可發表 產後不可用芍藥以
其酸寒伐生發之氣故也 產後血暈因虛火載血上
行漸漸暈來方用鹿角燒灰出火毒研極細末好酒同
童便灌下一呷即醒行血極快 又方以韭菜細切盛
於有嘴瓶中以熱醋沃之急封其口速以嘴塞產婦鼻
孔中可愈 產後中風切不可作風治必大補氣血為
主然後治痰當以左右手之脉分其血氣多少而治

產後中風口眼喎斜切不可服小續命湯 產後水腫

必用大補氣血為主 佐蒼朮茯苓使水自利 產後

大發熱必用乾姜輕以有用茯苓淡滲其熱一應寒苦并

發表之藥皆不可用 產後發熱惡寒皆屬血虛 左

手脉不足補血藥多於補氣藥 惡寒發熱腹痛者當

云惡血腹滿者不是 產後發熱乳汁不通及膨者無

子當消用麥蘖二兩炒研細末清湯調下作四服 有

子者用木通通草猪蹄煎服 此產後有病先固血氣

前條云產後大熱必用乾姜或曰用姜者何也曰此

熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故以補陰藥大劑服

之且乾姜能入肺和肺氣入肝分引血藥生血然不可
獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙非天下之至
神孰能與於此乎 產後脉洪數產前脉細小澁弱多
死懷孕者脉主洪數已產而洪數不改者多主死

入方 產後補虛

人參 白朮錢一 茯苓 歸身尾

陳皮 川芎各半 甘草炙三 有熱加黃芩錢

右作一服生姜三片水一鍾半煎服不拘時

產後消血塊方

滑石錢三 沒藥錢二 血竭二錢 如無以杜丹皮代

白朮陳皮湯下 五靈脂為末神效

又方

血竭錢 五靈脂錢

右為末消產後血塊極妙

又方 治產後泄瀉

黃芩下 白朮上 川芎中 茯苓上

乾姜炮 滑石上 陳皮中 炒芍藥中

甘草炙

右以咀水煎食後溫服

又方 治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂中 香附上 一方加蛤粉下

右為末醋糊丸甚者入桃仁不去尖溫水服三十九

獨行丸 治婦人產後血衝心痛及治男子血氣心腹痛

有孕者忌服

五靈脂上 不拘多少 生

右為末水丸彈子大每一丸或酒或姜湯化下

參朮膏 治產後胞損成淋瀝証

人參二錢 白朮二錢 桃仁去皮 陳皮各二錢

黃芪一錢 茯苓一錢 甘草一錢

右以咀先用水煮猪羊胞熟湯二鍾入藥煎一鍾溫服

附諸賢論

王節齋曰凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾姜之苦溫從治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過服飲食傷滯而發熱者誤作血虛則不効矣但遇產後發熱者須審問用何飲食有無傷積胃膈飽悶噯氣惡食泄瀉等証只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法

附諸方

產後

心法附錄卷之三十一

五十一

五十一

花藥石散

治產後胎衣不下極有神效方見前類

奪命丹

濟生方治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或

去血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証宜急

取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子

炮去皮臍半兩牡丹皮

去心乾漆各一兩

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸如

梧桐子大每服五十九溫酒送下

一方產後惡血衝心胞衣不下腹中血塊

用錦紋大黃一兩為末以好醋半升熬成膏丸如梧桐

子大以醋大半鍾化五丸服之須臾即下

一方治產後生腸不收

用枳殼二兩去穰煎湯溫浸良久即入

一方治婦人子宮不收

荆芥穗中

藿香葉中

臭椿皮上

右等分吹咀煎湯薰洗子宮即入

一方治婦人子宮太痛不可忍

五倍子

白礬各等分

右為末溫湯泡洗乾糝亦可

一方治下胎或產後血上沖心已死

用鬱金燒灰存性為末每服二錢米醋一呷調灌之立

活

芎歸湯和劑方治產後去血過多暈煩不省一切去血并宜服之

芎藭

當歸去蘆酒洗 焙各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓不拘時熱服

腹中刺痛加白芍藥 口乾煩渴加烏梅麥門冬 發

寒熱加乾姜白芍藥 水停心下微有嘔逆加茯苓生

姜 虛煩不得眠加人參竹葉 大便秘澀加生地黃

橘紅杏仁 小便不利加車前子 腹脇膨脹加厚朴

四崩不止加香附子 咳嗽痰多加紫苑半夏生薑

腰疼膝痛加牛膝 心下疼痛加玄胡索 惡血不下

腰腹重痛加牡丹皮

返魂丹 治生產一十六証 一名益母丸

野天麻一名益母 用早方梗四五月份間 開紫花時採花葉子陰乾半斤

赤芍藥錢六 當歸錢六 木香錢五

右同為細末煉蜜丸如彈子大每服一九隨飲子下

○子死腹中冷痛小便流出腹脹四肢冷瓜甲青黑置

便酒和勻煎沸化下

○產後惡血不盡臍腹刺痛童便和酒化下

○產時面垢顏赤胎衣不下敗血自下如帶或橫生不

產後

心法附錄卷之二十一

五十一

三十一

頭暈目眩... 薄荷自然汁... 酒下

○產後三日... 不得眼昏... 酒下

鬼狂言不省人事... 酒下

○產後煩渴呵欠不... 息飲食手足... 酒下

○產後浮腫氣喘小... 便澀咳嗽惡心... 口... 酒下

力酒下

○產後寒熱如瘧... 臍腹作痛米湯... 下桂枝湯亦可

○產後中風牙關緊... 急半身不遂失... 音不語童便和酒... 下

○產後大便秘心煩... 口渴童便酒化... 下薄荷自然汁亦... 可

下

○產後痢疾月未滿... 食冷物與血相... 擊或有積聚湯... 化

下

○產後身體百節痛... 溫米飲下

○產後崩中漏下... 蓋是傷酸物狀... 如雞肝脊背悶... 倦糯

米秦朮湯下桂枝... 湯下亦可

○產後食熱麪壅結... 成塊四肢無力... 睡後汗出不止... 月

水不調久成骨蒸... 勞童便和酒下

○產後嘔逆虛脹酒... 下

產後

產後

產後

產後

○產後鼻衄口乾舌黑童便酒下

○產後赤白帶下秦芫同糯米煎湯下

○廣按返魂丹功效不可具述其於產前清熱養血產後推陳致新無不可也

有事之家理宜預備

黑神散和劑方治婦人產後惡露不盡胞衣不下血氣攻心眩暈等証

黑豆炒半斤

熟地黄

當歸去蘆酒浸

肉桂去皮

乾姜炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

濟生方去蒲黃加附子

右為末每服二錢熱酒調下入童子小便尤佳

○廣按敗血見熱則行見寒則凝理也此方姜桂俱用

己是熱矣而濟生又加以附子不無熱之太過乎世

俗好溫惡寒之弊於此見之也

黑龍丹 治妊娠臨產臨生或胎衣不下產後血暈不省

人事及惡露不盡腹中刺痛血入心經語言恍惚並宜

服之方見產前

四味湯聖惠方 療產後一切諸疾纒方分婉宜服

當歸

玄胡索

血竭

沒藥各五分

右共二錢為細末用童子小便半盞煎熟調通口服

如心膈煩加當歸五分 如氣悶喘急加玄胡索五分

如惡露不快加血竭五分

如心腹撮痛加沒藥五

神仙索金散醫方大成治婦人產後血暈血虛積血不散

寒熱往來胃膈不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血風

瘡此藥逐惡血生新血止肚痛

當歸

川芎

赤芍藥

熟地黄

金藤

川牛膝

麻黃

玄胡索炒

官桂

神麴

荆芥

粉甘草

雄黑豆略

右為末每服二錢溫酒調下或當歸湯童子小便任下

不拘時候

一方治產後血暈心悶氣絕

用紅花一兩坏子者為末作一服酒二盞煎取一盞併

服如口噤幹開口灌之

血竭破權散秘方治婦人產後血閉血暈血勞嗽血

男子傷力勞嗽吐血

乳香

血竭

箭頭砂略

右為末巴豆仁研泥共為膏磁器盛之如用丸如雞頭

大婦人狗膽調冷酒下男子止用冷酒下

清魂散濟生方治產後血暈昏不知人更宜先取乾漆或

產後

法附錄卷之二

五十二

三十五

漆器燒烟鼻中薰之類置醋炭房內次進此藥

澤蘭葉

人參去蘆

荆芥穗兩

甘草兩

川芎兩

右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下

奪命散

大全良方

治產後血暈血入心經語言顛倒健忘

失志及產後百病

沒藥

血竭

右等分為末燒產下便用童便與細酒各半盞煎一二

沸調下二錢良久再服其惡血自此下行更不衝上免

生百病專治婦人方只用白湯調下

七珍散

大全良方

論曰產後不語者何答曰人心有七孔

三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明

了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如

此即服此藥

川芎

人參

石菖蒲各一兩

細辛一兩

防風

辰砂另研各一兩

生乾地黄一兩

一方加甘草半兩名八珍散

右為末每服一錢薄荷湯調下不拘時候

胡氏孤鳳散

大全良方

治產後閉口不語

用白礬研細熟水調下一錢

產後

心法附錄卷之三十一

五十一

張治

○廣按產後不語有熱血迷塞心竅者有熱痰迷塞心
竅者前方七珍散治熱血此方孤鳳散治熱痰也肥
人多是熱痰瘦人多是熱血

卷荷散按粹方治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡

露不快並皆治之

初出卷荷 紅花

當歸

蒲黃

牡丹皮各一兩

右為細末每服三錢空心益酒送下二臘月用童子小

便調下

大嚴蜜湯濟生方治產後血氣衝心時發疼痛甚者宜進

玄胡索湯方見經病類

熟地黃酒蒸 當歸去蘆

川獨活去蘆

白芍藥

細辛洗

吳茱萸炒

桂心不見火

小草

乾姜略

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一鍾不拘時煎服

當歸血竭丸 聖惠方治婦人產後惡物不下結聚成塊心

胃痞悶及臍下堅痛

當歸炒

血竭

蓬朮

芍藥略二

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五六十丸温酒送下

或粥清下空心食前服

荷葉散 聖惠方 療產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉二兩

桃仁半兩去皮

劉寄奴

蒲黃各一兩

右吹咀每服四錢半童子小便一大盞生姜三片生地

黃一分煎至六分去粗熱服不拘時

失笑散

治產後心腹絞痛欲死者

方見經病類

紫金丸

大全良方

治產後惡露不快腰痛小腹如刺時

寒熱頭痛亦治久有瘀血月水不調羸瘦不思飲食亦

療心痛與失笑散同

五靈脂水淘去石

真蒲黃

右以好米醋調五靈脂不慢火熬成膏子次以蒲黃末

搜和丸如櫻桃大每服一丸水與童子小便各半盞煎

七分令藥化溫服少頃再一服惡露即下久有瘀血成

塊月信不利者並用酒磨下

一方 治產後血塊腹痛

荆芥炒

川當歸炒

乾地黄洗

芍藥各一兩

蒲黃二錢半銚內

右同為細末每服三錢空心溫酒調服

地黃散 按粹方 治產後惡物不盡腹中疝痛

生乾地黄

當歸各二兩

生姜

半兩

細切如蠅頭大

右為細末姜酒調下二錢服不拘時

四神散和劑方治產後瘀血不消積聚不散作塊心腹切痛

當歸 乾姜炮 川芎 赤芍藥各等

右為細末每服二錢溫酒調下

當歸養血丸和劑方治產後惡血不盡發熱身痛經閉者

並皆治之

肉桂兩 當歸去蘆 牡丹皮 玄胡索

赤芍藥各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒

米飲下

天仙藤散 聖惠方 治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

天仙藤炒焦

右為末每服二錢產後腹痛用炒姜小便和酒調下當

患氣血用溫酒調下

玉燭散 治產後惡露不盡臍腹疼痛時寒熱

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃

大黃 甘草 朴硝各半

右作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

○廣按諸方治敗血作痛皆是溫劑熱劑流通之理惟

此一方却是涼劑蓋為敗血凝滯發熱大便燥結者
設也非大便燥結者慎不可用

一方 治產後敗血不止

生乾地黃兩

用石器內搗為細末每服二錢食前熱酒調服連進三
服

瑞蓮散 聖惠方治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮一百枚燒
灰存性

棕櫚燒灰
存性

當歸各一兩

官桂二枚

檳榔二枚

鯉魚鱗炒

川芎銼

右為細末每服三錢煨生姜酒調如未止更進一服或

時血崩此藥可治進此二服即止

紅花散 產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣

乾荷葉

牡丹皮

當歸

紅花

蒲黃炒各
等分

右為細末每服一錢酒調溫服 若胞衣不下以榆白

皮煎湯調服半兩立效

琥珀散 聖惠方治產後經脈不調四肢煩疼飲食減少日

漸羸瘦

琥珀

牛膝

生地黃

當歸各一兩

桃仁

赤芍藥各五錢

右咬咀每服八錢水二盞生姜三片煎至八分去滓無
特溫服 一方加桂心半兩

調經散 濟生方治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮
腫不可作水氣治之但調其經而腫自消又有去血過
多心虛易驚加生龍腦一捏煎服

沒藥

肉桂

不見火

赤芍藥

細辛

洗半

琥珀

射香

當歸

酒浸

同芍藥甘草

右為末每服二錢生姜汁溫酒任意調下

趁痛救濟生方治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼

痛

當歸

官桂

白朮

黃芪

獨活

生姜

川牛膝

去蘆酒浸

甘草

薤白

右以咀每服四錢水二盞煎服加桑寄生半兩尤佳

愈風散

聖惠方

療產後中風不省人事口噤牙緊手足瘳

痰如角弓狀口吐涎沫亦治魯暈四肢強直或築心眼

倒吐瀉欲死

荊芥穗

當歸身

各等分

右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効

如神口噤者斡開灌之或吹鼻中皆效 一方用蜜丸
或麵糊丸如梧桐子大每服五十丸空心米湯下

血風湯 產後諸風變急或痿弱無力

川芎 上

芍藥 中

當歸 上

熟地黃 上

秦艽 中

羌活 中

防風 下

白芷 中

白朮 上

茯苓 上

右為細末一半煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九

溫酒下一半末溫酒調下

交如散 濟生方治產後中風脇不得轉動

生地黄 五兩 研

生薑 五兩 研

右交互以汁浸渣一夕次日漬取盡汁各炒黃焙為末

酒調服不拘時

○已上諸方行血去邪之劑

四順理中丸 和劑方治新產血氣俱傷脾胃不調百日内

宜常服

甘草 二兩

人參 去蘆

乾姜 炮

白朮 略

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

千金散 治產後虛勞不能食

白朮

茯苓

黃芪 略

人參

川芎

芍藥

熟地黄

當歸 略

肉桂半兩 甘草兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片棗三枚同煎至一盞空心溫服

人參當歸散和劑方治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

生內熱其証心胃煩滿吸吸短氣頭痛悶亂轉甚

與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄 入參去蘆 當歸去蘆 肉桂去粗皮

麥門冬去心各一兩 白芍藥二兩

右咬咀每服四錢水二盞先以梗米一合淡竹葉十片

煎至一盞去米葉入藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加

生地黄

當歸黃耆湯和劑方治產後失血過多腰脚疼痛壯熱自汗

當歸去蘆三兩 黃耆三兩 白芍藥兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分不拘時溫服

增損四物湯濟生方治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡

露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸去蘆 白芍藥 川芎 乾姜

人參兩 甘草兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎服不拘時

當歸羊肉湯濟生方治產後發熱自汗肢體疼痛名曰厚勞

當歸酒浸蘆

人參錢七

黃芪去蘆

生薑兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去滓作六服早晚頻進

猪腰子粥濟生方治產後虛勞發熱

用猪腰子一箇去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熟粥蓋之如作蠶生粥狀空心服之

熟地黃湯漁寮方治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食

無味

熟地黃

一兩淨洗酒浸蒸焙

人參去蘆

麥門冬去心各兩

甘草兩

炙半

桔槳根兩

右咬咀每服四錢水一盞半糯米一撮姜三片棗二枚煎八分不拘時服

人參湯永類鈐方治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身

人參去蘆

右等分為末猪腰子一箇去膜切作片子以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘時服

產後

卷之三十一

八

三

大調經散 聖惠方 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯
榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣不
平之所為也

大豆 炒一兩半 去皮 茯神 一兩 琥珀 錢一

右為末每服三錢濃煎烏豆紫蘇湯調下

白茯苓散 聖惠方 治產後蓐毒方蓋因生產日淺久坐多語

運動用力遂致頭目四肢疲痛寒熱如瘡狀

白茯苓 兩 當歸 兩 川芎 兩 桂心 兩

白芍藥 兩 黃耆 兩 人參 兩 熟地黃 各半

右吹咀先用水二盃入猪胆有雙去脂膜細研生薑三

片棗子二箇同煎至一盃去咀口棗棗入沒藥五分者取

七分去滓食前分二服温服

佛手散 全良方 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽

有痰

當歸 兩 川芎 兩 黃耆 各一兩 柴胡 兩

前胡 錢半

右吹咀每服五錢水一大盃挑柳枝各三寸棗子烏梅

各一枚生薑三片煎至六分去滓温服如有痰去烏梅

黃龍湯 全良方 治婦人寒熱頭痛嘿嘿不欲食脇下痛

嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞室寒熱如瘡并經水適

未適斷病後勞復餘熱不解

柴胡四分

黃芩

人參

甘草各一錢

右作一服用水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

增損柴胡湯聖惠方治產後經水適斷感于異證手足搐

掉咬牙昏冒係屬上焦

柴胡八錢

黃芩四錢

人參三錢

甘草

石膏各四錢

知母二錢

黃芪五錢

半夏三錢

右取咀每服八錢生姜三片棗一枚水一盞半煎至八

分去滓溫服無時

增損柴胡湯濟生方治產後血羸發寒熱飲食少進腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥

右等分取咀每服八錢水一盞半生姜五片棗二枚煎

至八分去滓不拘時通口服

三之一湯濟生方治產後虛勞雖日久而脉浮盛疾

柴胡八錢

黃芩

人參

半夏洗

甘草炙

川芎

芍藥

熟地黃

當歸各二錢

右取咀每服八錢水二盞生姜三片棗一枚煎至八分

去滓溫服

三聖散 濟生方 治產後日久虛勞針灸服藥俱不効者

川芎

當歸

熟地黄

白芍藥

白朮

白茯苓

黃芪各一兩

柴胡

人參

各一兩 六錢

黃芩

半夏

甘草各六錢

右吹咀每服八錢水一盞半生薑二片棗一枚煎至八

分去滓通口食前服一方無姜棗

○廣按已上五方小柴胡湯加減法也學者對證而用

則中肯綮矣

○已上諸方補虛退熱之劑

芎藭理中丸 產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉不止又治

男子脾胃虛弱久泄不止

人參兩

白朮兩

乾姜二

甘草各五錢

肉苳蔻七錢 麩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四五十九空心米

湯下酒煮麵糊為丸亦可

調中湯 濟生方 治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛積

泄不止

良姜炒

當歸去蘆 酒浸

肉桂不見

白芍藥

附子炮去 皮

川芎各一 兩

甘草炙

人參各半 兩

右吹咀每服三錢水一盞煎服

白朮散 聖惠方 治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

白朮 橘皮 麥門冬 人參

乾姜 炮 甘草 炙半

右吹咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓

服無時

枳實芍藥湯 聖惠方 治產後腹痛煩滿不得卧

枳實 炮 芍藥

右吹咀等分每服八錢水一盞半煎至八分去滓温服

無時一方為末服方寸匕日三服

抵聖湯 濟生方 治產後血氣傷于脾胃腹痛悶嘔逆惡

心

赤芍藥 半夏 湯 澤蘭葉 陳皮 白

人參 各二 甘草 炙一

右吹咀每服四錢生姜七片煎服不拘時

現皖丸 濟生方 治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心

下痞痛

高良姜 炮 姜黃 洗 華澄茄 陳皮 白

蓬朮 炮 人參 京三稜 炮 各

右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汁煮麵糊丸

如梧桐子大每服五十九就用蘿蔔湯送下

產後

卷之三十一

六十一

三十四

○廣按已上六方皆為產後脾胃虛弱飲食過傷遂成諸疾而作也

旋覆湯和劑方產後感冒風寒咳嗽而滿痰涎壅盛鼻塞
聲重

麻黃節法

柴胡

杏仁去皮尖

五味子法

旋覆花

甘草炙

茯苓

赤芍藥

荆芥法

半夏各等

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七分溫服

芎烏散 治產後頭痛

天台烏藥 川芎蘄

右為末各等分每服三錢以燒秤鍾淬酒服

一母散 聖惠方 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽如傷風

痰嗽用尋常傷風藥不效宜服

知母

貝母

白茯苓

人參各五錢

桃仁去皮尖

杏仁各去皮尖

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

參蘇飲

聖惠方

治婦人產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參一兩為末

蘇木二兩槌碎

右用水二碗煎蘇木一碗去滓調人參末隨時加減服

丁香散 聖惠方 治產後心煩咳噫不止脾胃虛寒衛氣厥

逆

白芷 寇

丁香 各五錢

伏龍肝 兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再

服

石蓮散 聖惠方 治氣欬噫又治吐逆心怔目暈可思飲食

石蓮子 半兩

白茯苓 兩

丁香 半兩

右為細末每二錢米飲調下不拘時服

漢防已散 大全良方 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已

猪苓

枳殼

桑白皮 各二兩

商陸

甘草 各半

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓

溫服無時一方空心服

調道散 聖惠方 治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼 各四錢

甘草 二錢

右咬咀每服一兩用姜三片棗子一枚水二盞煎至一

盞去滓溫服不拘時忌動風物

麻仁丸 濟生方 治產後去血過多津液枯竭不能轉送大

便閉澀

產後

治法附錄卷之三十一

二十一

二百六十六本

麻子仁另研枳殼去白人參中

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸溫酒米飲任下

橘杏丸 治產後體弱大便虛秘方見燥結類

一方 產後小便數及遺尿

龍骨兩 桑螵蛸半兩

右為細末米飲調下二錢空心服

漏蘆散濟生方治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

漏蘆二兩 蛇蛻十條 瓜蒞煨存性 熨火

右為細末每服二錢酒調下不拘時候仍吃熟羹助

一方 治產後陰腫痛

用挑仁去皮尖細研四五次抹之

一方 治產後用力太過陰門突出

用四物湯煎熟入龍骨末以許空心連進二服用麻油

和湯薰洗

一方 治婦人陰冷

用吳茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎

帛裹納陰中良久如火熱

○已上諸方調理雜證之劑

○廣按產後諸證其源有三曰血虛火動曰敗血妄行

產後
心法附錄卷之二十一
白飲食過傷何以明之氣屬陽也血屬陰也經曰陽
虛生外寒陰虛生內熱蓋產後去血過多血虛火動
而為煩躁發熱之類一也血猶水也水之就下性也
孟子云今夫水搏而躍之可使過額激而行之可使
出山非水之性也勢使之然也蓋產後虛火上載敗
血妄行而為頭暈腹痛之類二也經云少火生氣壯
火食氣東垣云火為元氣之賊火與元氣不兩立一
勝則一負蓋產後火傷元氣脾胃虛弱若飲食過傷
則為痞滿吐瀉之類三也治之之法血虛火動則補

之

猪蹄湯 治婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄雙 通草兩

右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮
得四五升取汁飲之

玉露散 治產後乳脉不行身體壯熱痰痛頭目

昏痛大便澀滯悉能治之涼膈壓熱下乳

人參 白茯苓 甘草各半 桔梗

川芎 白芷各一 當歸半錢 芍藥半錢

右吹咀每服四錢水一鍾半煎至七分去滓溫服食後

如頭熱甚大便秘加大黃二錢半

湧泉散 因氣乳汁少

瞿麥穗 麥門冬法 王不留行 緊龍骨

川山甲 炮黃各等分

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服藥以

木梳左右乳上梳三十餘下日三服

皂角散 治乳汁不通及乳結硬疼痛

歌曰

婦人吹乳意如何

熱酒一盃調八字

皂角燒灰蛤粉和

須臾揉散笑呵呵

下難易又不可驟論也

子嗣

九十七 附諸虛

斷子法

丹溪心法

○若是肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食之人經水不調不

能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰用星夏

蒼朮台芎防風羌活滑石或導痰湯之類 若是怯瘦

性急之人經水不調不能成胎謂之子宮乾澀無血不

能攝受精氣宜涼血降火或四物加香附黃芩柴胡養

血養陰等藥可宜 東垣有六不地黃丸以補婦人之

陰血不足無子服之者能使胎孕出試效方

附脉理

脉訣舉要曰陰搏於下陽別於上血氣和調有子之象乎之少陰其脉動甚尺按不絕此而有孕少陰屬心心主血脉腎為胞門脉應於尺或寸脉微閉滑尺數往來流利如雀之豕或診三部浮沉不一或平而虛當問月水婦人有病而無邪脉此孕非病所以不月

附諸方

六味地黄丸見補損

女金丹韓飛霞方

白芍藥

川芎不見火

黨本

赤芍脂白亦

人參

白薇

桂心

牡丹皮

白芷

白朮

玄胡

白茯苓

沒藥酪一

當歸兩

甘草五

十五味除石脂沒藥另研外其餘皆以醇酒浸三日烘

乾為細末足穀一十五兩

香附子

十五兩以水醋浸三日畧炒為細末足十五兩

右十六味和合重羅數過煉蜜丸如彈子大磁銀器封收每取七丸空心雞未鳴時服一丸先以薄荷湯或茶灌漱咽喉後細嚼以温酒或白湯送下鹹物乾果壓之

子同

法附余卷之三

二十四

香

服至四十九為一劑以癸水調平受胎為度胎中三日
一丸產後二日一丸百日止盡人事而不育焉天夫人
為鹵莽諉曰天命予每于世之乏嗣者惜焉

說說九 和劑方 治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

澤蘭葉 一兩 肉桂 去皮五錢 當歸 焙 川芎

石斛 酒浸 白芍藥 牡丹皮 熟地黃 洗

延胡索 各一兩 白朮 一兩 乾姜 炮半兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒下

烏雞丸 治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨

蒸等疾不能成胎

用白毛烏骨公雞一隻重二斤半許閉死去毛腸

用艾四兩青蒿四兩剉碎約一半在雞腸用酒燻一

隻納雞并餘艾蒿在內用童便和水灌令沒雞二寸

許煮絕乾取出去骨餘俱搗爛如薄餅狀焙乾研為

細末

南香附去毛淨一斤分作四分米泔水浸一分童便

浸一分醋浸一分酒浸一分春秋二夏一冬四日取

出晒乾

熟地黃 四兩 當歸 酒浸 白芍藥 遼入參

鱉甲 醋浸炙 生地黃 懷慶者勿北 白朮

黃芪

川牛膝去蘆

柴胡

牡丹皮去心

知母

貝母各二兩

秦艽一兩

地骨皮

乾姜

玄胡索

黃連各一兩

川芎三兩

白茯苓去白二兩半

右并香附共為細末并雞末酒醋糊為丸如梧桐子大

每服五六十丸漸加至七八十丸温酒下或米飲下亦

得忌煎炒辛辣之物及葷菜

○補血新地

附諸方

當歸建中湯和劑方治婦人一切血氣不足虛損羸瘦

當歸四兩

肉桂去皮

甘草各二兩

白芍藥六兩

右咬咀每服三錢水一盞姜五片棗一枚同煎空心熱

服

人參養血丸和劑方治女人稟受素弱血氣虛損常服補

衝任調月候暖下元生血氣令人有子

烏梅肉三兩

熟乾地黄五兩當歸去蘆二兩

人參去蘆

赤芍藥

川芎

蒲黃炒各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十九温酒米飲

任下

六神湯御藥院方治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進

子同

卷之三

二六

三

飲食

當歸

地黃

芍藥

川芎

地骨皮

黃芪各一兩

右改咀每服四錢水二盞煎七分空心溫服

補中丸聖惠方治婦人虛損諸疾宜常服

川芎

白芍藥

黃芪

當歸

人參

陳皮各五錢

白朮

地黃各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九溫水下

八珍散瑞竹堂方調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美飲

食

四物湯

四君子湯

右等分姜三片棗子一枚水二

盞煎至二盞去滓食前

溫服

滋血湯御藥院方治婦人皮聚心落心肺俱損血脉虛弱

月水過期益氣養血調進飲食

人參中

白茯苓去皮川芎中

當歸上

白芍藥

山藥上

共煮膏上

熟地黃上

右改咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服不

拘時

滋血湯大全良方滋養榮血補婦人諸虛治血海火冷

同

卷之三

三

三

當歸

川芎

芍藥

人參

麥門冬

牡丹皮

阿膠各二兩

琥珀七錢半

酸棗仁炒

官桂

甘草各一兩

半夏各一兩

右以咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至八分去滓通

口服食前日三服

烏雞煎丸秘方治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等証

當歸

黃芪各六兩

生地黃

香附子各四兩

茯苓三兩

人參

官桂

地骨皮各二兩

右用烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和炒麵丸雞頭子大喂雞服生膠吊死腸肚洗淨搗毛搥

碎骨入前藥雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙枯

研共為細末用汁打糊丸如梧桐子大每服五十九鹽

湯下

○斷子法用白麵麩一升無灰酒五升作糊煮至二升半

瀘去滓可分作三服候經至前一日晚次早五更及天

明各喫一服經即不一無不字行則終身無子矣

○廣按婦人無子之因或經不勻或血不足或有疾病

或交不時四者而已調其經而補其血去其病而節

其慾夫如是則經調血足無病而交有時豈有不妊

娠者乎雖然人之後嗣係乎天命亦或人事未之盡

者可不究其心歟

諸病

九十八 新增

附諸方

加減四物湯 治婦人諸病

熟地黃

川芎

芍藥

當歸各等

右以咀每服六錢用水一鍾半煎八分不拘時服

○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃芩

○妊娠胎動不安下血不止加艾葉阿膠黃芪

○血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉

○血崩如生地黃黃芩黃連一方加阿膠艾葉黃芩

○血虛腹疼微汗惡風加殺木官桂

○風虛眩暈加秦艽羌活

○氣虛無力加厚朴陳皮

○發熱心煩不得卧加黃連連子

○虛寒脉微自汗氣短自利加乾姜附子

○中濕身重無力身微汗加白朮茯苓

○筋骨肢節疼及頭疼增寒加羌活防風藁本細辛

○臍中虛冷腹疼腰脊間痛加玄胡索川練子

○經水過多加黃芩白朮

○經水澁少加葵花紅花

○虛勞氣弱咳嗽喘滿加厚朴姜製枳實麩炒

○經水暴下加黃芩

○血積塊痛加莪朮二錢稜實桂乾漆炒

○赤白帶下加香附官桂

○血痢加阿膠艾葉黃連

○產後血痢腹痛加槐花黃連罌粟殼

○血熱相搏舌乾口渴加括蕁根麥門冬

○大渴引飲加知母石膏

○臟腑秘澁加大黃桃仁

○嘔吐加白朮人參藿香生姜

○虛寒滑泄加官桂附子炮

○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁

○目暴赤作翳疼加防風羌活防己酒浸龍膽草

加減四物湯大全良方治如娠產前腹痛及治月事或多

或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多

或惡露不下宜服

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服

○妊娠下血即入艾葉六七片阿膠末一錢同煎病勢

甚大散藥不及以四味各半兩用水四盞煎至二盞
半去滓分四服食前熱服一日中令盡以止為度

○產乳服至三臘止

○如虛弱血藏不調至一月止

○因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水者加天花粉
一兩麥門冬七錢半

○腹中刺痛惡露不下加當歸芍藥各二錢半

○血崩加生地黃蒲黃各一兩

○因熱生風加川芎二錢半柴胡五錢

○身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩

○大便秘結加大黃半兩桃仁二錢半炒

○如大便滑泄加桂心熟附子各二錢半

○發寒熱加乾姜牡丹皮芍藥各二錢半

○嘔者加白朮人參各半兩

○腹脹加厚朴枳實各二錢半

○虛煩不得眠加竹葉人參各二錢半

○煩躁大渴加知母石膏各五錢

○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各二錢半

○虛寒狀類傷寒加人參柴胡防風各七錢半

經驗加減四物湯醫方大成治婦人諸虛不足

當歸酒浸宿用身熟地黃

白芍藥

川芎各一

右咬咀剉為散看病證加減後藥煎服

○血氣不調加吳茱萸一兩甘草半兩

○胎動下血加熟艾一塊阿膠末一錢

○補下元加乾姜半兩甘草七錢

○血崩淋瀝不斷加炮附子一箇赤石脂一兩

○便血及帶下加荆芥地椒

○血氣滯腹內刺痛加桂

○產後傷風頭痛加石膏一兩甘草半兩

○血風勞加荆芥柴胡

○潮熱加前胡乾葛人參黃芩

○虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩

○嘔吐不止加藿香白朮半兩人參一錢

○產後虛憊血熱煩悶加生地黄

○產後腹脹加枳殼肉桂各三錢

○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

○產後寒熱往來加柴胡麥門冬各半兩

○經脉淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥

○血滯不通加紅花桃仁各二錢半

○產後悶亂加茯苓遠志各半兩

○虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩

○妊娠心腹煩加竹茹一塊

○如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黃以生者易之

○大便閉加大黃桃仁各二錢半

八物湯聖惠方若經事欲行腹臍絞痛者血澁也宜服

四物湯四錢玄胡索苦練碎炒黑檳榔木香各一兩

○若經水過多別無証宜服黃芩六合湯

四物湯四兩黃芩白朮各一兩

○若經水澁少宜四物湯加葵花煎又加紅花血見愁

○若虛勞氣弱咳嗽喘滿服厚朴六合湯

四物湯四兩厚朴製一兩枳實炒五錢

○若經水暴下加黃芩一兩若腹痛者加黃連如夏月不去黃芩

○若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

○若經水少面色和者四物湯加熟地黃當歸各一兩

○若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之

○若婦人血積者四物湯內加京三棱桂廣茂乾漆各二兩

八物湯 聖惠方 若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜

服四物湯四兩黃耆甘草茯苓白朮各一兩

○若赤白帶下宜服香桂六合湯

四物湯四兩桂香附子各五錢

○若虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯主之

○若四肢腫痛不能舉動四物蒼朮各半湯主之

○若治燥結四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散

○若流濕潤燥宜四物湯理中湯各半

○若大渴者加知母石膏

○若保胎氣令人有子四物湯加磁砂四君子湯各半

名八珍湯

○若熱與血相搏口舌乾渴飲水加括蕒麥門冬

○若腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥

○若血崩者加生地黃蒲黃黃芩

○若臟秘結澁者加大黃桃仁

○若頭昏項强者加柴胡黃芩

○若滑瀉者加官桂附子

○若因熱生風者加川芎柴胡防風

○若嘔者加白朮人參生姜

○若發寒熱者加乾生姜牡丹皮芍藥柴胡

○若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

○若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風

○若產婦諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服之

其效如神

○若婦人或因傷酒或因生產去血或虛勞五心煩熱

者宜服四物二連湯

四物湯內用生地黄黃連胡黃連真者溫飲清服

○若虛煩不得睡加竹葉人參

○若婦人血虛心腹痞痛不可忍者去地黄加乾姜名

四神湯

○若諸痛有濕者四物與白朮小相半加天麻茯苓川山

甲酒煎

○廣按婦人外感內傷一切症八病與丈夫同治惟月候

孕產崩漏帶下數證與丈夫異治也夫婦人以血為

海婦人伏於人者凡事不徇以專行每多憂思忿怒也

醫書云氣行則血行氣止則血止蓋婦人憂思過度

則氣結氣結而血亦結矣又云氣順則血順氣逆則

血逆蓋婦人忿怒過度則氣逆氣逆而血亦逆矣氣

血結逆於臟腑經絡之間所以婦人多腹脇諸痛內

外煩熱也然疼痛煩熱二者不可不分疼痛者血滯

者有

也煩熱者氣滯也血滯以辛
 涼之劑治之氣血俱滯而疼
 痛煩熱者又當以
 辛平之劑治之太抵婦人血
 用事氣行則無病而古
 入治婦人之病多用香附縮
 砂木香檳榔青皮枳殼
 者行氣故也抑嘗論之凡治
 婦人之病先問月候緊
 要以月候如期為安先期而
 不者血熱也過期而來
 者血虛也或疼痛或發熱者
 血鬱結也凡婦人之
 病多是血氣鬱結故治婦人
 之病以開鬱行氣為主
 鬱開氣行而諸病自瘥矣

煩熱者內煩也
 是二意煩者內煩也

丹溪心法附餘卷之二十一終

