

新刊西學集成

醫學集成卷之六

後學 義烏 傅滋 續註

○ 癆瘵三十七

脈法

平人牀大為勞極虛為勞浮大為裡虛脈虛弱沉弦

無寒熱短氣裡急小便不利面色白時目瞋喜衄諸

乾動微緊男子失精女子夢交脈小遲名脫氣如咳

行則喘手足寒腹滿甚則溇泄食不消脈弦而大

則為乾弦則為減女子漏下男子失精脈微弱而澀

為無子脈舉之而滑按之而微者在何部以知其病

脉輕手則滑重按則平者在何經而辨其府寸弱而
微者上虛尺弱滑而澁下虛尺滑而澁疾為血虛脉
數骨肉相失聲散嘔血陽事不禁晝涼夜熱者死

丹溪云陰虛之極痰與血病有有虫者其傳尸一證不
可云無其病俗名傳尸雖多種不同其病與前人相
似大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而
聳或腹中有塊或腦後兩邊有小核數箇或聚或散
沈々默々咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或獲
下利蟲瘦困乏不自勝持證雖不同其根多有虫嚙
心肺一也

王節濟云人若色慾過勞傷精血必生陰虛火
之病睡中盜汗午後發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲食
少進甚則交延帶血咯吐血或咳痰吐血用藥
熱煉况發肌肉消瘦此各勞察最難調治輕者用藥
數十帖重者期以歲年然必須病人變命聖心定志
能穿室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖
服良藥無効也此病治之於早則易差
若到肌肉燒煉沈困著味則難為矣

大法

四物湯加人尿竹瀝姜汁或加參朮

一方

青蒿一斗五升童便三斗文武大熬約童便減二斗

去蒿再熬至一升入猪膽汁七箇

又長砂故即末

熬數沸

以甘草末收之用湯調服

氣血虛甚發熱成勞者補天丸加骨蒸藥佐之

身瘦屬火因火燒爍故也。白蠟塵治瘰癧

不治證

不受補者肉脫甚者

附方

癆瘵方

雜著

當歸

芍藥 各一錢 三分

川芎

熟地黄 各一錢

黃柏 酒炒 七分 知母 酒炒 一錢

生地

酒洗 五分 甘草 炙 五分

天門冬 去心 一錢

白朮 三分

陳皮

七分 乾姜 炒 三分

生薑 三片

水煎服咳嗽加桑白

皮塊冬瓜萋仁各七分五味七粒痰加姜製半夏貝

母瓜萋仁各一錢盜汗加牡礪酸棗仁各七分浮麥

一撮朝熱加桑白皮沙參地骨皮各七分麥道精

加牡蠣龍骨

另末綿裹入

山茱萸各七分赤白濁加白茯苓

苓一錢炒連三分衄血咳血出於肺也加桑白皮一

錢黃芩山梔炒各五分嗽血痰血出於脾也加桑白

皮貝母黃連瓜蒌仁各七分嘔吐血出於胃也加山

施黃連乾葛蒲黃炒各一錢韭汁半酒蜜姜汁少許

咯嘔血出於腎也加桔梗玄參側柏葉炒各一錢若

先見血證或吐衄甚者宜先治血輕者涼血止血盛

者先消瘀血次止血涼血蓋血未多必有瘀停於胸

膈者不先消化之即止之涼之不應也葛可久方可

次第檢用唯獨參湯止可用於大吐血後昏倦脉微
細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬若陰虛火
動潮熱盜汗咳嗽脉數者不可用也且此病大忌服
人參若服過多者亦難治此病屬火大喘多燥然須
節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀澀則前項
寒涼之藥難用矣急宜調理脾胃用二陳加白朮麥
芽等藥俟胃氣復然後用本病藥收功保後宜常服
補陰丸

二方

治傳尸癆瘵寒熱交攻久嗽咯血先以三拗湯

次以蓮心散

不可久方

黃石甘草

生炙

為細末入水片少許吹之

如嘔止咯嗽血者先以十灰散過住甚者以花藥石
散止之止後其人必倦用獨參湯補之後服他藥保
和湯止嗽清肺保真湯補虛除熱太平丸潤肺除痰
消化丸下痰消氣加減法具各方之下服藥之法每
日仍濃煎消苛湯灌漱喉中用太平丸先嚼一丸徐
徐嚥下次嚼一丸緩上溶化至上床時亦如此用之
夜則肺竅開藥必流入竅中如痰壅却先用錫糖拌
消化丸一百丸吞之次又依前嚼太平丸令其作

卧服前七藥後若有嗽可煮潤肺丸食之服前藥有
暇煮此七藥服之亦續煮白鳳膏食之固其根本
後服十珠丸以收功也

十灰散

治癆證嘔血咯血嗽血先以此過之

大蓊

小蓊

側柏葉

荷葉

茅根

牡丹皮

大黃

梔子

棕灰

等分

百草霜

右各燒灰存性研細出火毒以藕汁或蘿蔔汁磨京
墨半椀調下五錢立止癆重出血升斗者亦效

花藥石散

花藥石

燒存性研細

右用童便一盞煎醋調末三錢甚者五錢食後男子

和酒一半婦人和醋一半調下立止其瘀血化為

水後以

獨參湯

人參一兩水二盞棗五枚煎細服之

保和湯

治勞嗽潤肺

知母 貝母

天門冬

麥門冬

款花 三錢

天花粉 薏苡仁

杏仁

錢

五味

粉草 炙

兜令 紫苑

百合

桔梗 一錢

阿膠 川歸

生地

紫蘇

薄荷 五分

姜水煎加錫一匙服

保真湯

治勞證骨蒸

當歸 生地黃

熟地黃 人參

白朮

黃芪 赤茯苓

白茯苓 各半兩

天門冬

麥門冬

赤芍

白芍

知母

炒栝

五味

訖胡

地骨

二錢 甘草

陳皮

二錢

蓮心

五分

右姜棗水

煎服

如驚悸加茯神遠志栝子仁酸棗仁淋濁加草薢烏

藥猪苓澤瀉便澁加水通石韋扁魚遺精加龍骨牡

蠣蓮須蓮子燥熱加石膏滑石青蒿煎甲盜汗加浮

麥杜礪麻黃根黃芪

太平丸

治勞證咳嗽肺痿肺癰

天門冬

麥門冬

知母

貝母

欵花

杏仁

二錢

當歸

生地

黃連

阿膠

兩半

蒲黃

京墨

荆芥

薄荷

各一兩

蜜

四兩

射香

少許

右為末煉蜜九彈子大以薄荷湯漱喉嚨一丸

津下上床時再服一丸如痰盛先服用飴糖拌消化丸

一百丸送下後禽化仰卧使流入肺竅

消化丸

白茯苓

青礞石

煨法見痰門

橘紅

半夏

姜汁炒各兩半

枳殼

枳實

各一兩

薄荷

南星

姜炒各八錢

神曲糊丸桐子大飴糖拌吞下

百九次醫太平丸二藥

潤肺丸

治久嗽肺燥肺痿

羯羊肺

具杏仁

研

柿霜

真酥

白蜜 二兩

右先將羊肺淨洗次

將五藥水解薄攪稠粘灌入肺中水煮熟食與前七

藥同服

白鳳膏

治一切虛怯咳嗽吐痰咯血發喘此火乘金

也

鴨

黑紫白者一隻

大京棗 斤 參苓平胃散 升 陳酒 一大

瓶將鴨縛定脚掛起次量患人隨量傾酒器中盪盪

却刺鴨血入酒中攪勻飲之具血直入肺中補肺止

嗽其鴨上乾搗去毛脇下開二孔取出腸雜用紙拭

乾次將棗去核入參苓平胃散以皮札定填鴨肚砂

毫一箇放鴨在內四圍用炭火慢煨煮酒一瓶作三

次添入以酒乾為度取出食之餘乾隨意食用又以

十珍丸收功

十珍丸

治一切勞證久勞虛憊體乾精涸血枯氣

竭服前藥愈後以此收功

猪脊脊一條 羊脊脊一條

團魚 一个 烏骨雞 一个 右四味去骨取肉煮酒一大瓦

於鬘內煮熟搗細再以大山藥五味蓮肉半斤京菓

一百个霜柿十个右四味以水一大瓶於沙鬘內煮

熟搗細令均前藥并肉再用慢火熬却下明膠四兩

黃蠟三兩右二味旋下前入味和勻一處研成膏和

平胃散末四君子湯末并知母黃柏末各一两共十

兩搜和成劑如硬再入白蜜同熬取起放青石上用
提匕打如法免如桐子大每一百丸棄湯下服半月
精神完氣血和一月飲食加倍起居輕快二月消除
諸虛百損一切虛憊不可盡述已上皆實可久方也

三物湯

治傳尸癆寒熱久嗽客血羸瘦先服此後蓮

心散萬不失一方見嗽門

蓮心散

當歸 黃芪 甘草炙 鱉甲

訖胡

前胡 羌活 獨滑 防己

防風

茯苓 半夏 黃苓 陳皮

阿膠

官桂 赤芍 麻黃 杏仁

商星

川芎

芫花

枳殼

枳殼

右除芫花每服二錢姜三片棗一枚入芫花一抄水
二小盞半煎至八分服頃吐有異物漸減芫花蓋甘
草所以殺虫炒之所以斷熱去寒必在此處

調鼎方

治傳尸癆神効

混沌皮

一具醋浸一宿焙下

鱉甲

炙

桔梗

胡黃連

芍藥

大黃

炒

草龍膽

貝母

黃藥子

知母

敗鼓皮心

醋炙各

犀角

一銖

蓬朮

一十

芒硝

半一

朱砂

二一

右為末煉蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服二十九

空心溫酒下

取勞虫石

三因

桑枝

柳枝

桃枝

梅枝各七寸

青蒿一握

石槽皮

右用童便一升半芎白七並去頭葉煎及一半去渣

別入安息香阿魏各一分再煎一炷意者渣調辰砂末

半錢攪即求一分麝香一字分作二服調下五更初

一服三點時一服至巳時必取下虫色紅者可救青

者不治

神效散

三因

治傳尸癘氣殺虫去毒

川椒

二斤澤去子并合

口者炒汗出即乾為細末米湯下一錢必麻痺

暈悶少傾如不能禁以酒糊丸梧桐子大空心服五

十九

鍼灸法

與上門可參看

五蒸病三十八

丹溪云蒸病須斷厚味絕妄想使心靜口淡內外之火

不起乃有可治宜大蒸病丸五蒸湯

古今錄驗五蒸湯 治五蒸病

甘草

炙一入參

黃芩

知母

各二茯苓

熟地黄

乾葛

各三

竹葉

二把

石膏

五月

粳米

右剉以水九升煮取三升分三服或以小麥煮水煎

隨各經虛實加減于後忌海藻松菜蕪荑芩米醋

實熱 黃芩 黃連 黃柏 大黃。虛熱分氣 氣烏梅 秦

芫花 胡血 青蒿 鱉甲 蛤蚧 小麥 牡丹皮。肺鼻乾

烏梅 天麥 門冬 秦皮一作紫死。皮舌白唾血 石膏

桑白皮。膚昏昧嗜卧 牡丹皮。大腸不鼻乾痛 大

黃芩 硝。氣更身氣熱常促鼻乾 人參 黃芩 梔子。

脈啞白浪語脉絡溢脉緩急不調 生地 當歸。心古

乾 黃連 生地 黃。血髮焦 地黃 當歸 桂 心 童便。小

腸下吞焦 赤茯苓 生地 木通。脾昏焦 芍藥 木瓜 苦參

○肉食無味而嘔煩躁不安 芍藥。胃古下痛 石膏

粳米 大黃 芒硝 葛根。肝眼黑 川芎 當歸 前胡。筋

甲焦 芎藭 當歸。膽非白夫色 芫胡 括萎。三焦

熱不寒 石膏 竹葉。腎兩耳焦 生地 石膏 知母 寒水

石。胸 頭眩 悶而熱 地黃 防風 羌活。髓

天門 當歸 地黃。骨齒黑腰痛足逆 變癘 食載 鯨甲

地骨皮 牡丹皮 川歸 生地。肉肢細膚腫脊湯 煖熟

石膏 黃柏。胞小便赤色 澤瀉 茯苓 生地 沉香 滑石

。膀胱 左耳 焦 澤瀉 茯苓 滑石

一云先諸家蒸病皆熱油脈酒末或房勞而成蒸久不除變成癘宜謹之謹之也

○ 蟲三十九

丹溪云 蠶蝕陰左肢虛小者生 緊急者死 又脈沉滑者

寸白虫

濕熱之生臟腑虛則侵蝕

或曰暖陰風木生虫三焦

能制木蒸脾胃濕熱是以生虫如寸白長虫血蠶之類皆是也

腹內熱腸胃虛虫行求食上唇有瘡曰惑虫食其臟

下唇有瘡曰狐虫食其肛 外有口瘡宜辨之

上半月虫頭向上易治下半月虫頭向下難治先以肉

汁或糖蜜吃引虫頭向上然後用藥

打虫方

練樹根檳榔鷓鴣風 夏取 濃煎飲之

萬病丸最好。一方雞子炒白礬塵酒糊丸治寸白

虫。一方川楝為末酒糊丸。一方黑鉛炒成灰

即末飲下

瀉心湯

治惑。苦參湯洗治狐

蛇虫

苦練根為君佐以二陳湯煎服

附方

化虫丸

鶴虱去土 檳榔

練根

胡粉炒各一兩

白枯丸 二錢半 糊丸麻子大一歲兒服五丸温漿水

入生油一二點令勻飲下亦可大者自下小者皆化

為水

又方

硫黃一兩 木香半兩 密陀僧三錢 附子炮一

右醋一升同附末熬膏入藥和丸錄豆大湯清下二

十九

取虫丸

治小兒肚大青筋有虫

牽牛

三錢

檳榔

錫灰

各半兩

大黃

六錢

滴水丸 桐子大練根史君子湯十五丸以下虫為度

安虫丸

治虫動心痛

胡粉

炒黃

檳榔

川練

去核

鶴虱

各二兩

白礬

各一分

為末每一字大者五

分飲下

集効丸

木香

鶴虱

檳榔

訶子

煨

蕪荑

炒

附子

乾姜

各半錢

大黃

烏梅

醋湯送下

擯榔 五兩 大黃 八兩 黑丑 四兩 皂角

練根皮斤一先以皂角苦練用水干搥熬成膏和末為丸如梧桐子大後用雷丸沉香各一两為衣先沉香衣次雷丸木香衣四更時沙糖水下三九

惡寒四十

舟惡寒非寒明是熱證亦有久服熱藥而得者河

間謂火極似水熱甚而反覺自冷實非寒也有用熱

藥而少愈者辛能發散鬱遏暫開耳王太僕云病人身寒厥冷其脉

要數按之鼓擊於指下者非寒也此名陽盛拒陰也

雖盛夏必襲重裘擁火坐密室中他醫投以烏附轉劇曰此熱極似寒非寒也以大黃芒硝服之而愈又

抱一第治一人泄瀉惡寒見風輒仆日卧寒以極
治要進冊附益甚翁診之曰此脾伏火邪濕熱下流
非寒也法當升陽散火以逐其濕熱以升麻黃胡
寫老滑等劑繼以神芎九絨曰苦久世今復利之恐
非治也翁曰公之六脉浮瀉而弱丑歲熱者濕也
數者脾伏火也病由溫熱而又加以熱則若非苦寒
逐之不可法曰通因通用正謂此也項之利如小
者三四世而體去次日而火去
遂安若此之例果可以為寒劫

陽虛惡寒參芪之類甚者少加附子

發熱惡寒宜解表此胡蒼木。惡寒久病亦用解鬱

寒不得熱是無火也按經曰熱之而寒者取之陽由乎
真火之不足也王註云取之陽所

以益心火之不足而使其制大腎水之
有餘也益曰益火之源以消陰翳是也

治一壯年惡寒多服附子病甚以江茶入姜汁香油此

少吐痰一升減綿衣大半通與通聖散去麻黃大黃
芒硝加地黃川歸百貼而安知其燥熱已多血傷亦
深且淡食以養胃內觀以養神則水可升火可降必
多服補血涼藥乃可否則附毒必發彼以為迂果發
背而死。一老婦肥尊夏患惡寒戰慄發熱御綿大
汗已得附子三十餘渾身痒甚脉沉瀉重取稍大知
其熱甚而血虛也以四物去芍倍地黃加白朮黃芪
炒栢生甘草人參每貼二兩腹大泄目無視口無言
知其熱深而藥無反佐之過也以前藥熟炒與之一
貼利止四貼精神四十貼全愈。一女子患惡寒用

苦參一錢赤小豆一錢蘼汁探吐後以川芎蒼朮南
星黃芩酒糊丸服。一人形瘦色黑素多酒不困午
半百有別館一日大惡寒發戰言渴不飲脉大而弱
右閃稍實畧數重則瀉此酒熱內鬱不得外泄由表
熱而虛也以黃芪二兩芎根一两飲之大汗而愈

濟世

治一人七月病發熱或令服小茈胡湯升發太

過多汗亡陽惡寒甚肉暈筋惕視其脉微欲絕以真
武湯七八服稍愈服附子八枚而痊

○惡熱四十一

丹溪

惡熱非熱明是虛證經曰陰虛則外熱陽在外

為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節

氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡熱也

當作陰虛治之

熱不得寒是無水也

經曰寒之而熱者取之陰由乎真水之不足也王註云取之陰所以

滋腎水之不足而使其制夫心火之有餘也經曰壯水之主以鎮陽光是也

治一人足常熱冬不用綿自誇質壯予知其足三陰之

虛教其早斷慾事以補養陰血不斂患痿而死

東垣治一人目赤煩渴引飲脉七八至按之則散者此

無根之脉用姜附加人參服之愈 又一條見汗門

玉田隱者治一人得熱病雖祈寒亦以水精浸水輪取

握手中衆以為熱曰此寒極似熱非熱也治以附子

而愈按此治則皆陰陽幽顯之奧水火激化之微事者深求內經之旨則造化之理可得而明矣

王太僕云身熱脉數不攻擊者此名陰盛格陽非熱也

○眩運四十二

丹溪云脉數為熱瀉為死血實為痰大是久病浮為風

緊為寒暑則虛溫則細

痰在上火在下火炎上而動其痰也

諸風掉眩皆屬肝木此特一端耳

屬痰者多蓋無痰不能作運雖因風者亦必有痰內經

云狗象招搖目眩耳聾下虛上實迥在足少陽厥陰甚則入肝許淳士云上虛者肝虛也故肝虛則頭暈

欲發者如以汗厥則頭暈也原病式曰諸風掉眩皆屬肝
 風主動也所謂風氣甚而頭目眩運者由風木旺
 必是金衰不能平木而木復生火風皆屬陽上乎
 動二動相持則為之旋轉故火本動也如得風則自
 然旋轉也或曰眩暈之証皆屬於肝風上攻所致
 體虛之人外感六氣內傷七情皆能眩運宜少時
 別之風則脈浮有汗項強不仁寒則脈緊無汗
 而筋昏則脈虛煩悶溫則脈細沉重吐逆及其上
 所感逆使裁氣不平鬱而生涎結而為痰為眩隨
 上逆令人眩運或肩脊痛眼不可開寸脈多沉為
 是耳若疫癘後去血過多皆令人眩運也
 人崩傷產後去血過多皆令人眩運也
 後之卒者必求其本而療之无不効也

火動其痰二陳加黃芩蒼朮羌滑挾氣虛者亦治痰
 為主兼補氣降火藥如東垣白木半夏天麻湯之類

一云眩運脈弱食少地內傷者半夏白木天麻湯因去血多者芎歸湯。吐

實氣實人眩運不可當者以大黃酒炒三次為末茶湯下。參苓湯治氣虛頭痛及運補氣降火為主。參朮苓連。滾痰丸治痰火眩運。瓜蒂散治痰厥眩運。治一老婦患赤白帶一年半只是頭運坐立不夕睡之則安專治帶愈其眩自止。又見虛損門。

附方

天麻半夏湯

並東垣

治頭運目黑胸膈不利欲吐

天麻

半夏

各一錢

羌胡

黃芩

橘紅

茯苓

各七分

甘草

五分

右剉姜水煎

羌滑湯

治風熱上攻頭目昏眩疼痛及胸膈

甘草

芫胡各七分 澤瀉 三錢 瓜蒌根 茯苓

酒栢各半兩

防風 苓連 羌滑各一兩 水煎服

紅豆散

治頭重如山此濕氣在頭也 麻黃半兩

苦丁香五分 羌滑

連喬各三分 紅豆十五粒 為末鼻內

啗之

頭運方

利痰清熱降火

二陳加桔梗黃芩南星枳殼姜水煎服

白附子丸

治風痰上厥眩運頭疼 全蝎半兩

白附子包

半夏 旋復花 甘菊 天麻

川芎

橘紅 姜蚕 乾生姜一本有幾分

白朮茯苓各一兩又南星右為末姜汁糊丸梧桐子大荆芥湯下五十丸

早起眩運須臾自定日以為常者正元飲下黑錫丹

香橘飲

治氣虛眩運

木香

白朮

半夏曲

陳皮

茯苓

砂仁

各半兩

丁香

炙甘草

各二錢半

姜水煎血虛加芎歸桂

人參前胡湯

治風痰眩運

導痰湯加水香紫蘇人參前胡

一本有半夏曲

六合湯

治風虛眩運

四物湯秦芫羌滑

川灸法

上星

在前髮際上一寸半灸三壯

神庭

在前髮際上五分灸三壯

發頂

百會後一寸半灸三壯

足三里風池百會胸戶

並見前

○頭痛四十三

附胸痛

脈法

寸口緊急或短或浮或弦皆頭痛浮滑為風痰易治

短濡難治浮緊為太陽弦細少陽浮緩長陽明沉緩

太陰沉細少陰浮緩厥陰也

丹溪云

東垣頭痛論極好

按東垣論經云東風生於肝俞在頸項故春氣

病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目內睛上額交巔上入絡督還出別下頤病冲頭痛

又足少陽膽之脈起於目眇睛上抵頭角額痛夫風從上受之風寒傷於上邪從外入客於經絡令大振

寒頭痛身重惡寒治在風池風府認其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九

竅不利者腸胃之所生氣虛頭痛也心煩頭痛者病
在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如云上不
下頭疾頭疾者下虛上實也過在足少陽巨陽甚則
入介此寒濕頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽
明此偏頭痛也其真頭痛者甚則皆甚痛手足寒至
節死不洽有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓上者
以膏為主膏逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥
洽之者總其大体而言之也高巔之上惟風可到故
味之薄者為陰中之陽乃自地升天者也然亦有三
陰三陽之異故太陽頭痛惡風脈浮紫川芎羌活獨
活麻黃之類為主少陽頭痛惡寒脈弦細桂枝湯柴
胡為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升
麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰體重或腹
痛為痰癖其脈沉緩蒼木半夏商星為主少陰頭痛
三陰二陽經不流行而足寒氣逆而寒致其脈沉細
麻黃附子細辛為主厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其
脈浮緩吳茱萸湯土之血虛頭痛川芎當歸為主氣
虛頭痛人參芩芪為主氣血俱虛調中益氣火加川
芎蔓荊子細辛之類白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛
藥也清空膏乃風熱頭痛藥也羌活附子湯厥陰藥

也如淫氣在上者少苦吐之不可藥方而治者
病頭發將兩頰青黃眩暈日不食閉目身重
兀上飲之更久太陰此發陰太陰合病名曰風痰必玉
壺丸治之更久太陰此發陰太陰合病名曰風痰必玉
者必究其本多主於痰痛甚者火多有風者滯或風
而察之可也
毒上
有血虛者上營有諸經氣滯者而不行有氣虛

有四氣外傷有勞役所傷有可吐者有可下者

頭痛或半邊偏疼皆因風冷所傷遇風冷即發眩浮
食積痛者因胃中有陰冷宿食不化上攻而疼古寸

繁盛氣虛者因下部氣虛上攻溫上而痛異子邪毒
所致脈虛浮傷寒在太陽經其疼如破人迎緊數者

是陽明經胃熱上攻右關洪大葛上有風使冷或
嘔吐寸口弦強者是陰毒傷寒身不熱脈沉細者

是宜辨而治之

偏頭痛連睛痛

石膏黍粘子炒為末茶酒下

癆役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽作痛此相火

自下冲上宜補中益氣多加芎歸甚者加知母蔓荊

子

治頭痛

片苓酒拌晒乾一兩

川芎三兩細辛八錢

甘草三錢右為細末食後茶清下

清空膏

治諸般頭痛惟血虛頭痛不治方見

東垣云

頭痛須用川芎如不愈各加引經藥大陽川芎陽明白芷

火陽並胡太陰蒼朮火陰細辛厥陰吳茱萸

一云肥人多是濕痰宜半夏蒼朮瘦人是熱酒苓防風

。感冒防風羌活藥本白芷。氣虛黃芪生地南星

或安神丸。風執上攻天麻蔓刺子台芎藭參苦
痛加細辛。形瘦蒼黑之人是血虛芎歸酒芩。頂
巔痛藥本並胡防風

少陽頭痛大便多秘或可下之。濕熱痛則心煩。痰
厥痛者吐之火者清之散之虛者補之。壯實熱痛
大便結燥者大承氣。頭面壅腫有熱脈弦數者涼
膈散去硝黃加桔梗枳殼荆芥消奇。面上紅腫因
氣實怒一作而痛者胃風湯。面腫生瘡調胃承氣加
消奇荆芥

經云真頭痛其胸甚痛手足寒至節者死手三陽之脈

受風寒伏留而不去名厥頭痛或曰厥者通也

顛陷至死九宮者各真頭痛非藥之能愈也

雜著云久病頭痛畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包

裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識悉用辛溫解

表之藥暫時得効誤認為寒殊不知因其亦有鬱熱

毛竅常疎故風寒易入外寒束其內熱閉逆而為痛

辛熱之藥雖能閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病

本益深惡寒愈甚矣惟當瀉火涼血為主而佐以辛

溫散表之劑以從法治之則病可愈而根可除也

胸痛 脈緩大者難治因風熱乘虛而入於腦以辛涼

之藥行之

治一婦人心與頭更痛

許見心

痛門又虛齒門

附方

清空膏 並東垣 治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱

上壅損目及胸痛

川芎 半兩 茈胡 七

黃連 一半浸酒

防風 羌滑 各一兩 甘草 兩半

條芩 三兩半生半炒

右為細末每服二錢熱酒內入

茶少許調如膏臨卧抹在口內少湯下如苦頭痛加

細辛二分太陰脉緩有痰減羌滑防風川芎甘草加

半夏一兩半偏頭痛羌活防風川芎一半加茈胡一

倍發熱惡執而渴只以白虎加白芷

半夏白朮天麻湯

治痰厥頭痛

麥芽

黃柏

乾姜

澤瀉

茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

炒曲

白朮

半夏

陳皮

各半右每服半兩

姜三片水煎

一桂金

樺撥

各懸待陰乾一兩半

入腹內

玄胡索

青黛

白芷

川芎

各一

為末無根水丸每用

一丸無根水化開搽鼻以銅子二三文咬定出涎

川芎茶調散

治頭痛有痰

藜奇

川芎

荆芥

各四防風

羌活

甘草

細辛

白芷配二為末茶清下二錢

玉堂丸

治風濕頭痛亦治痰

白麩

天麻

南星

半夏

雄黃

羌汁糊丸

羌滑附子湯

治大寒犯胸上痛及齒痛名曰胸風

麻黃

黑附子

升麻

防風

僵蚕

黃栢各三

羌滑

蒼朮各五

甘草

白芷各二

黃芪各一

右作一服水煎

霍香散

治胸風頭風

霍香

川芎

天麻

蔓荊子

白芷

槐花

為末酒下

吹搐方

治症同上

銅綠谷精草各二錢硝石一錢為末吹鼻中或細辛
瓜蒂良姜各三錢硝平兩口含水搗之或荆芥木通
姜蚕箔芎竭枳朮茶清下二錢

安神湯

治頭痛頭旋目黑

甘草

生四

防風

二升

芫胡

升麻

生地

知母

各半

酒拍

羌滑

各一兩

黃芪

一兩

水煎加蔓荊子川芎再煎服之

順氣和中湯

治氣虛頭痛

補中益氣湯加芎藭川芎細辛蔓荊子

不目散

治頭痛

皂角玄胡青黛為末吹鼻中取涎

灸法

百會後頂合谷

頭痛灸

○頭風四十四

附 頭風痺

風痺

舟溪云 為痰者多在右屬痰與熱用蒼朮半夏或二陳湯熱用片苓在左屬風與血虛風用消苛荆芥血虛用芎歸為藥酒栢諸家不言所屬故多不効

一方

片苓一兩 蒼朮

羌滑

防風各五

蒼耳 三錢

細辛 二錢

為末姜一片和藥三錢雷勾茶

下

吐頭風

常山 二錢 甘草

細辛 各一錢 烏梅 一個

右剉水煎空心服吐

醫方集要

卷二

一方 大南星一箇全蝎一介右將南星開一竅置

蝎於中紙包鹽泥固濟燒紅去泥為末每服先噙水

一口將鷺管抄藥些少吹入鼻內吐水愈

一方 酒苓 蒼朮 羌滑 防風 各半

蒼耳子 三 為末姜一片和末三錢搗勻茶湯下

聖散子 治偏正頭風 川芎 甘草 各半

防風 半夏 天麻 各二 川烏 六 生南星

乾姜 各七 錢半 為末姜汁糊丸芡實大先陰一二時於日

中晒乾荆芥膜茶湯嚼五七丸

度人指藥 軟石膏 朴硝 各半 胸子

荆芥

檀香

茵奇各一錢

白芷

細辛各一錢

右為末搗鼻中

小清空膏

治少陽偏正頭風太陽亦治

片苓

酒浸透晒干

為細末茶酒任下

附方

天香散

治遠年頭風甚者一二服除根

白芷

南星

川芎

一作川烏

半夏

右水煎加

姜汁服

又方

酒苓

川芎

細辛各三錢

白朮

甘草

各一錢

右末姜一片搗勻茶清下

又方

甘菊 三斤 槐花 一斤 一作槐角 枸杞子 一斤

粟米粉 一斤 荆芥 半斤 杏仁 半斤 芝麻 二斤 没藥 一斤

右為末每早用一匙溫水入鹽少許下月三服忌食

鯉魚

頭風痒風屑髮黃 大黃酒浸炒為末茶調下

香芎丸

治一切頭風

香附 炒二兩 川芎

甘草 炙二兩 石羔 半兩 為末每一錢細茶荆芥湯點

又方

細辛 防風 川烏 草烏

白芷

荆芥 羌活 水煎

又方

葶藶良姜白芷細辛 等分 為末搗鼻中

川芎散

治頭目不清利

川芎 三分

防風 七分

羌活

藁本

甘草 生

升麻

各一錢

生地

各二錢

酒連

黃芩

各半

為末每服四錢茶清下忌酒麪

灸法

神庭上星後頂印堂百會風池中腕

見眩暈等篇

○ 肩胛痛四十五

丹溪云 屬風熱與痰作風痰治類頭風

或曰肩胛痛有肝二眼屬肝有肝

至而痛才見光明則肩胛痛甚宜生熟地黃丸又有眉髮滑而目不可開晝靜夜劇宜道爽湯二芽茶或

二陳湯吞青州白丸子

一方

黃芩 酒浸

白芷

為末茶下二錢

眉骨痛

川烏草烏為君童便浸炒去毒細辛羌活

黃芩甘草佐之為末茶清下

又方

防風

羌滑

甘草

黃芩

白朮

半夏

南星

細辛

水煎

選奇方

治眉骨痛甚

羌滑

防風

甘草

各二錢

酒芩一錢

右剉每服三錢水煎

○脾胃四十六

夫脾胃轉運之職胃為納受之器運納無功故能消化精微以分清濁益長血氣營養身足為平人若飲食失宜脾胃乃傷脾傷不能運化胃傷則不能容受而諸病生之

脾生者宜

保養焉

丹溪云諸病先觀胃氣源也又曰飲食入胃游溢精氣

上輸於脾脾氣散精上居於肺通調水道下輸於腎

水精四布五經是五藏六府四體皆無不榮也

脾胃脾胃既虛則無所稟受而俱病矣故謂病必先

觀胃氣之有無也雖經云春鍊微弦夏微洪秋微毛

冬微沉若有胃氣也蓋微沉者是又喉內之中沉脈

也中為胃氣故四微者皆有中之胃氣故為平脈如

弦多氣胃氣少者是二分浮一分中也若脈但弦者

只見其浮而無中之胃氣為真裁之現必死餘藏皆

此也

脾胃虛 東 臣 本經四君子湯

肝乘之 脇痛口苦往來寒熱而嘔四肢滿悶泄便

澤瀉黃柏 細辛法石

心乘之 心火亢乘於脾胃之位亦至而不為不及

本藥為使

肺受病

咳嗽短氣頰語皆則

水侵侮

作涎清涕有甲皆脊痛冷池宜乾姜木附烏桂蒼木茯苓

脾食不進飲食

蒼木川椒川練子破故紙各一

兩右四味同炒焦黃止用蒼木為末醋糊丸梧桐子

大每服二十九湯下不過三五服食大進

補脾丸

白朮一兩 陳皮

芍藥各四兩

冬去芍藥

加肉豆蔻如肚瀉炒丸服如不止加凡半夏各二錢

五分

又補脾丸

脾虛惡藥者以此服之

白朮半斤

藥水

陳皮

茯苓

粥光湯下

雜著云

凡治諸病時常審察有無飲食傷積但見胸膈

滿悶或噫氣蒸酸腹痛腸泄惡食少食便問曾何飲

食審知傷積即先調理脾胃消導飲食然後用本病

之藥內加消導飲食藥若不審此則藥雖對症而不

效蓋人以脾胃為本胃氣自傷則不能運化藥味以

成功也亦有食後即藥後即睡或傷藥太過須要

識此。近世論治脾胃者不分陰陽氣血而悉皆理

胃皆用辛溫燥熱助火消陰之劑遂致胃火益旺脾

陰胃傷清純中和之氣變為燥熱胃脘乾枯大腸燥

結脾裁漸絕而死期迫矣殊不知脾胃屬土屬溫位
居長夏故溫熱之病十居七八况土旺四季寒熱溫
涼各隨其時豈可徧用辛熱之劑哉

附方

加戒枳木丸

雜著本方見第六

元氣弱食少加陳皮

一元氣素弱飲食難化多則腹

內不和疼痛泄瀉此虛寒也加人參酒芍藥炒神曲

麥芽

各一兩宿砂木香

各半兩素有痰火胸膈鬱寒酸

暖氣及素有吞酸吐酸之證或酒積瀉結痛此皆溫

熱也加姜炒黃連酒芍藥陳皮各一兩石膏生甘草

宿砂木香

各一

川芎

傷食過多痞塞不消加神

曲麥芽山查肉

各一

食積痞塊

非加黃連厚朴

半積堅者加蓬木

醋炙

昆布

各三

傷冷食不消腹痛

溼泄加半夏

一兩

宿砂

乾姜

神曲

麥芽

各半

性多燥

夾氣傷食氣滯不通加川芎香附

各一

木香黃連

各一

胸膈不利過服辛香燥熱之藥以致上焦受傷胃

腕乾燥嘔吐噎膈反胃

加黃連梔子

各半

白芍藥川

歸

各一

桔梗

生甘草

石膏

各半

胸膈頑痰膠結及大

便燥秘再加芒

石

各半

素有痰

加半夏

橘紅

白茯苓

各一

兩姜炒苓連

各半

能食好食

但食後反飽

難化

此胃

火旺脾陰虛也加酒芍藥半一兩人參七錢石羔煨生

甘草半兩炒連香附木香各四錢年老脾虛血燥易飢易

飽大便燥難加白芍藥當歸各一兩人參七錢升麻炙甘草

草各四錢山查麥芽桃仁各半兩此老人常服藥也

調中益氣湯東垣

補中益氣湯戒白木川歸加蒼朮木香黃柏

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐泄瀉

及大病後調助脾胃 扁豆一斤炙甘草

人參 白朮各一斤白茯苓 山藥二斤蓮子

宿秋 桔梗 薏苡仁一斤右為煎湯下

君子湯大君子湯見三五平胃散第八枳湯八物咸白

加味枳木丸 白朮三兩 去茯苓 陳皮

半夏 澤瀉各一兩半 黑枳實 川芎 神曲炒

猪苓 白芍 羅蔔子 麥芽各一兩 厚朴

砂仁 萊菔各半兩 蒼朮二兩 草豆蔻客

寒犯胃心加一兩 木香 檳榔氣加 荷葉煨飯

為丸

灸法 脾脘背十一椎下各開 中脘足三里並見前

○怠惰嗜卧四十七

丹溪云 脾胃受温沉困無力怠惰嗜卧者半夏白朮肥

白夫脉當取
 太過不及陽微
 在弦即胸痺而
 州所以然者有
 大極虛也今陽
 盛和在正焦所
 以胸痺心痛者
 以其陰弦故也

人是氣虛宜人參二朮半夏甘草
又云是溫
 人是熱黃芩白朮飲食太過轉運不調枳實白朮
水茯苓活石
 黑瘦

心痛四十八

脉法

右手實者痰積大是久病緊實不大便者下
 之痛者脉必伏陽微陰弦短而數者心痛若沉細
 而遲者可治堅大而實浮大而長滑而利數而緊皆

難治

丹溪云

心痛即胃脘痛。有熱厥寒厥大實死血食積

痰蟲

按機要云熱厥心痛身熱足寒甚則煩躁而吐
 額自汗出脉洪可汗刺太溪昆侖寒厥心痛手

足逆逆身冷汗便弱清利
 氣厥厥弱可溫木附

胎痺之病喘
息欬吐胸膈
痛短氣寸口
脈沉而遲
工小緊數

按之則痛不能飲食可下
黃連丸
痛者痛則在積
發作腫脹彼未上下行痛有什作腹熱善渴涎出
色乍青乍白乍赤乍黑吐清水積者積上然得辛
湯則胃止戴氏又曰死血痛者痛有常要不動移者
是若痛甚欲大便去後痛減者食積也
李者積積
痰於疑似之間辨寒熱於隱微
之際使一卒而萬全豈不美哉

治法雖分新久君明知身受寒氣口傷寒物於初得
之時宜溫散或溫利之藥
如草豆蔻
丸之類
稍久則成鬱熱

原病式中備言之矣若欲行溫散寧無助火為病乎
由是古方多以山梔為主加熱藥為白導則邪易伏
病易退正氣伏而愈美用山梔十五枚大者九枚去
皮炒濃煎佐以姜汁令辣服之或加川芎一錢或以

二陳加川芎蒼朮倍梔子煎服甚者加乾姜輕者以

麻黃桂枝之類散之或以桔梗韭汁開提之重者加

石醮一本有川芎蒼朮香附炒梔子作丸服之因平日喜食熱物以致死

血留於胃口而痛者宜桃仁承氣下之或玄胡索一

兩半桂滑石紅花曲各半兩桃仁三十枚炊餅丸或

時作時止或熱湯水而痛者是死血有勞後大甚飲食失節中氣不足

或寒邪乘虛而客或久不散鬱而生熱或素有熱虛

熱相搏結於胃口而痛或食積痰飲或乘氣而食相

鬱不散停結胃口而痛。一方梔子蒼朮香附各少

椒目滑石并茶各三姜汁浸炊餅丸服。雖日久不

食亦不死若治而痛方止即食必復痛勿歸咎於藥

也。痛甚用溫藥附子之類不可用參朮諸痛不可

補氣補其氣旺不通而愈甚九用純寒純熱之藥必以甘草緩

其寒熱之勢。氣實者用牡蠣粉一二錢酒下亦治

心痛。以物拄按而止者挾虛二陳加乾姜和之。

食積急痛者備急丸。濕飲而痛者小胃丹下之。

山梔并劫藥止之又發前藥必不効以玄明粉一服

立止。一方黃荊子炒為末米飲下甚効又方藍葉

杵細取汁以姜汁和服又方青黛姜汁又方海粉佐

以香附末用川芎山梔煎湯姜汁調服又方鹽置刀

頭燒紅焮入水中就服

蟲痛者面上白斑唇紅有痛後便能食時作時止者

是也上半月魚頭向上易治下半月向下難治先用

肉汁及蜜吃下引虫頭向上然後用打虫藥苦練根

錫灰之類一本自按即鶴風草治之或曰痛而坐針不安自按

發日無睛光者止痛也又云腫痛肚大青筋者取去木或安虫散方見虫門

心膈大痛攻走胸背發厥諸藥不納者就吐中以葱

翎探吐之出痰積枕許而痛立止。客寒犯胃者白

木附子湯服寒心藥過傷而痛者益胃湯秋病傷冷物者草豆蔻丸

積痰痛方

果師授 橋上 年久片錄

滑石

蒼朮

山柰

香附

南星

兩

枳殼

青皮

木香

半夏

砂仁

各半兩

春加芎夏加連秋冬加茱萸各半兩姜汁浸炊餅丸棗

豆大姜湯下

垢積痛方

班猶烏梅肉丸如豆大泔下一丸

又方

皂樹上葷泡湯肥珠起飲之微泄劫末已再服

婢飲丸

治飲水吞酸作痛 墻上規殼末服

萬靈丸

治蟲痛

檳榔頭末三錢於十六日待虫頭向上米湯下三錢

心胃腸脇散 痛二陳加蒼朮諸香藥治之。熱飲痛黃

連甘遂作丸服之。冬寒停飲桂黃散。心極痛以
生地黃汁調麩煑。打下虫積効。實痛者手不可
近六。沉細甚有汗大承氣加桂強壯痛甚者加桃
仁附子小腹痛虛寒作痛小建中湯。寒熱嘔吐而痛
疎沉弦大柴胡湯。脾虛積黃而痛胃苓湯。胃虛
感冷而痛理中湯。內傷發熱不食胃口作痛補中
益氣加草豆蔻熱痛加梔子。肥人心脾中脘當心
痛或痞氣不食用草豆蔻炒三棧白朮各一兩白豆
仁桂枝小草遠志茯苓丁香丁皮木香藿香炒餅丸
梧桐子大姜湯下三十五丸。胃脘痛者溫中

及中下二焦連日用瓜蒂梨子苦參等藥俱吐不效
而穢躁愈甚乃用附子尖三枚和漿水以蜜飲之方
大吐膠痰一大桶以林消滑石黃黍石膏連翹等一
斤濃煎置井中極冷飲之四日服四升後腹微痛二
便秘眩暈至於邪胃時予謂尔再為予足陽明之應
此乃胃與大腸有積滯未盡當速瀉之諸醫惑阻乃
紫雲三日服至五兩腹穢稍安後又小便閉痛飲
以羅蔔子汁得吐立通又小腹和痛以大黃牽牛等
分水丸服至三百丸下如爛魚腸者二升許眩不歇
又大便秘痛小腹滿悶又與前丸藥百粒腹大絞痛

腰疼重眼火出不言語瀉下穢物如桐油條一尺許
肛門如火以水沃之自病半月不食不語至此方啜
稀粥始有生意數日平安自嘔吐至安日疎嘗平常
弦火次年行倒念法全愈。一童子父癩方愈心脾
痛六脉伏痛成時氣口緊盛余部弦實而意其宿食
詢之果傷冷油麵食以小胃丹津嚥下十餘立禁餘
食三日與蒸十二次痛止後又與穀太早忽大痛連
脇乃禁食亦不與藥蓋宿食已消今因新穀與餘積
相逆而痛若再藥必傷胃氣二夜心曹索食先以
白朮黃連陳皮丸服以止其止此非飢也乃餘飲

○脾胃不和而痛大交丸。○因氣者加陳木香枳實
丸。○咳逆上氣痰飲心痛海蛤粉煨瓜蒌仁帶核等
分研細和勻米糊丸

治一人以酒飲牛乳患心痛年久無汗醫多以下附蕪
弱食減每痛以物拄之脉連弦而瀉又苦吞酸以二
陳加芩連白朮桃仁郁李仁澤瀉每旦服之涌出酸
苦黑水并如爛木耳者服至二百餘貼脉瀉退至添
純弦而漸充滿時令暖意其欲汗而血氣未充以參
朮歸芍陳皮半夏甘草痛緩與麻黃蒼朮芎歸絳下
咽忽運厥須臾而甦大汗痛止

許文懿公因飲食作痰成心脾疼後觸風雪腿骨痛盤
以黃芽歲丹烏附治十餘年又灸萬計又胃寒而痛
加膠雞開合脾疼時膠精輕膠痛則脾疼止予謂初
因中脘有食積痰飲積胃寒溫鬱道經絡氣血不行
津液不通痰飲注入骨節性來如潮湧上則為脾疼
降下則為膠痛須涌泄之以甘遂末一錢入猪腰子
內煨食之連泄七行足便能安後嘔吐大作不食煩
躁氣弱不語予記金匱云無寒熱而短氣不足以息
者實也其病多年鬱結一旦泄之徒引動其猖強之
勢無他製師之藥故也仍以吐劑建其上焦次第治

未了因氣而動耳若與食復痛詢其飢作膳間消悶
又與前丸子一晝夜不飢而昏睡後少與粥漸安
一婦因久積憂患後心痛食減羸瘦渴不能飲心與
頭更換而痛不寐大便燥結以四物加陳皮甘草百
餘貼未効予曰此肺火為火所鬱氣不得行血亦高
塞遂成汗濁氣壅則頭痛血不流則心痛通一病也
治肺當自愈遂効東垣清空膏例以黃芩細切酒浸
透炒赤色為細末湯下頭稍汗十餘貼汗漸通身而
愈因其眩下無汗瘦弱脉澁小便數大便澁當補血
以防後患以四物湯加陳皮甘草桃仁酒蒸服之愈

一婦春末心脾疼自言腹脹滿手足寒時脈須綿
最火烘胸畏熱喜微露風涼脈沉細濡稍重則絕輕
似弦而短渴喜熱飲不食以草豆蔻仁三倍加黃連
滑石神曲為丸以白朮為君茯苓為佐陳皮為使作
湯下百丸至二斤而安。一婦形瘦色嫩味厚幼時
味以火烘濕鞋濕氣上襲致吐清水吞酸服丁香熟
藥時作時止至是心疼有痞塊累吐食脈皆微弦重
似濇輕稍和與左金丸三十四粒姜湯下三十餘次
食不進予曰結已開矣且止藥或思飲與水間與青
桑丸疎弦漸添與人參酒芍藥引金湯木漸思食盡

大便秘以生芍藥陳皮桃仁人參為丸與之又以蜜
道便通食進

一老人心腹大痛昏厥脉洪大不食不勝一味攻擊
之藥用四君子加川芎沉香麻黃服愈

東垣治一婦人重娠六箇月冬至因慟哭口吸風寒忽
病心痛不可忍渾身冷氣欲絕曰此乃客寒犯胃故
胃腕當心而痛急與草豆蔻半夏乾生姜炙甘草益
智仁之類或曰半夏有小毒重娠服之可乎曰乃有
故而用也岐伯曰有故無殞故無殞也服之愈

滑伯仁治一婦人盛暑洞泄厥逆惡寒胃腕當心而痛

自腹引脇轉為滯下嘔噦不食人皆以中暑霍亂治之益甚脉三部俱微短沉弱不應呼吸此陰寒極矣不亟溫之則無生意遂以姜附三四進間以丹藥脈稍有力厥逆漸退更服姜附七日而安

附方

草豆蔻丸

東垣

治客寒犯胃而痛熱亦可服止可二服

草豆蔻

去皮而果煨熟一分四分

橘紅

吳茱萸

人參

乾姜

黃芪

益志

各八分

生甘草

熟甘草

當歸

青皮

各六分

澤瀉

半夏

桃仁

七粒

麥牙

一分

神由

姜黃

各四分

柴胡

加脇痛

右為末炊餅充梧桐子大姜湯下二十九

和中丸

治寒涼藥傷胃脘腕痛

人參

乾生姜

橘紅各一

乾木瓜二炙甘草三

右為末炊餅充

益胃湯

治證同上

人參

甘草

厚朴

白豆蔻

姜黃

乾姜

砂仁

澤瀉各三

益智

陳皮各六

右劉姜水煎服

姜橘丸

治中酒惡心上脾痛嘔逆

生姜

一斤青鹽一

青皮

砂仁

木香各三

薤水

一兩

甘草炙

陳皮

一兩

右為末蜜拌研干下

元如櫻挑大盐酒下一丸

金鈴子散

治熱厥心痛或作或止

金鈴子

天胡索

等分

右為末酒下三錢熱加芍药

氣加荔枝

薤白丸

治大實心痛痞癖如神

薤白

一斤

巴豆

半斤

白面

二兩

右水丸如梧桐子大

每服時先煎沸湯下藥二十四粒薤白三十沸撈入冷

水沉水冷一時下二丸一日夜二十四丸也加至微

利為度用浸藥水下

木附湯

或寒厥心痛脉微氣弱

附子 炮去毒一兩 白朮 四兩 炙甘草 一兩 右剉姜煎

水煎服

木香散 木香 蓬朮 甘漆 炒烟尽 右為末

醋湯下一錢

烏梅丸 治胃冷攻痛嘔吐四肢冷 烏梅 三百

細辛 肉桂 附子 炮 人參 各六兩 蜀椒 炒

川歸 乾姜 十兩 黃連 十六兩 烏梅肉 蜜丸

驗方 銅青末些少淡醋湯下或荔枝核燒存性醋

湯下一錢或五灵脂蒲黃等分為末先以醋

調二錢熬成膏入水一盞食前服

灸法

上腕

針入一寸半

中腕

針入四寸

脾疼四十九

丹溪云

用海石香附川芎山梔為丸姜湯

腹痛五十

脈法

脈多細小緊急若弦為食滑為痰陰弦或緊或尺緊而實或伏者可下若細小遲者生堅大而疾浮大而長痛而喘滑而利數而緊者皆難治暗下或大痛人中黑色者不治

丹溪云有寒積熱死血食積強痰虫

按經云寒積入經七積逐之而不行

客格脉則血少客於胸中則氣不通故卒然而痛
或卒然而止或痛甚不可按或按之痛止或不
痛動應手或物動與小腹相引而痛或腹痛引陰
者或痛死生問復生或區或瀉或小便不通者皆寒
也或或又曰綿綿痛而無增減者寒也時作時止者
熱也痛有常處不走移者死血也痛甚故大便利後
痛或食積也人低痛而小便不利或得寺錄熱湯
則暫止者痰也痛定即能食時作時止或吐大青筋
腫聚往來無有休止延出嘔
吐清水者重也宜詳辨之

凡心腹痛必用溫散以其鬱結不行阻氣不運故也

○初得元氣未虛必推蕩之壯實與初病宜下虛與

久病宜升宜消。大法之方台芎蒼朮香附白芷為

末姜汁入湯調下。氣用氣藥木香攢枳殼香附

之類血用血藥弓歸桃仁紅花之類。腹中鳴乃火

擊動其水也。蓋水欲下火欲上相觸而然。用二陳加
梔子芩連。白芍藥止治血虛腹痛。惡寒加桂。惡熱
加黃柏。宜分三陰部分而治中脘。太陰臍腹少陰
小腹厥陰也。肥白人是氣虛與溫痰。宜半夏人參
二朮。蒼瘦人是實熱。以硝黃下之。久病有實熱
大便燥秘者潤肺丸。在下者多屬食。宜溫散之。乾
姜蒼朮川芎白芷香附姜汁。飲食過傷而痛者本
香攢柳丸下之。氣虛傷飲食而痛。調補胃氣并消
導藥。參朮枳實麥芽木香神曲。小腹實痛用青皮。
小兒多是飲食所傷。白朮陳皮山查神曲青皮麥芽。

砂仁 甘草 寒加 霍香 萊菔 更熱加 芩 跌踣損傷

是瘀血 桃仁 承氣 加 當歸 蘇木 紅花 下之。諸痛不

可用 參朮 補氣 旺不通而愈甚。食宜溫散 蓋食

得寒則凝 得熱則化 更用行氣 或利藥 助之。痰因

氣滯而聚 阻隘道路 氣不通而痛 宜導痰解鬱。寒

客之則阻不行。熱內生鬱而不散。死血食積 溫

痰結滯妨碍 升降故痛 宜導痰解鬱 氣溫散之。重

痛者 苦練根 檳榔 鶴虱 之類。中氣虛者 理中湯。

寒者 理中 建中 一云小建中加干姜桂芍。熱痛

二陳加 芩連 梔子 甚者 加 乾姜 一云調胃承氣。腹

腹瀉 宜用 芍藥 甘草 芩連 梔子 甚者 加 乾姜 木香 枳實

大痛脉沉細實附子理中湯合大承氣湯

治一人不禁用川芎蒼朮香附白芷乾姜茯苓滑石愈
。又一人六月按淵取魚至秋雨涼半夜忽小腹痛
甚大汗脉沉弦細實重取如循刀責上然與大承氣
加桂二服微利痛止仍連日於酉時復痛每與前藥
得微利痛暫止又以前藥加挑仁下紫黑血數升依
時復痛脉雖減而責上然猶在又於前藥加附子下
紫黑血如破絮者二升而愈又傷食酉時復痛在臍
腹間脉和與小建中湯一服愈。一少年自少面微
黃夏間腹大痛或與小建中湯加丁香不効加厚朴

清汁又與丁沉透脯湯一匙不食因臥着無休止不
可按又與阿膠丸百粒夜熱不寐左脉沉弦而致關
尤甚右沉滑救實與大柴胡加甘草四貼下之痛止
雖戒食未進以小茈胡去參苓加芍藥陳皮黃連生
甘草二十貼安。一婦人腹隱痛常燒磚瓦熨之面
胸畏火氣六脉和皆微弦苦夜不寐悲憂一年衆作
心病治速覺氣自下冲上形不瘦予謂肝受病與防
風通聖散吐之時寒加桂入姜汁調之日三四次夏
稍熱與當歸炮膽丸間枳朮丸服一月愈。一人中
腕作疼食已口吐血紫霜色二關脉痞乃血病也因

跌仆而致治以生新去陳之劑吐出片也

附方

厚朴温中湯

東垣 治胃虛寒脹滿疼痛

厚朴

陳皮各一兩 茯苓

草豆蔻 甘草

木香

各半兩

乾姜 二錢

右剉姜水煎

四物苦練湯

治臍下虛冷痛

四物湯

四兩

加玄胡苦練

各一兩 水煎

酒積腹痛

檳榔

厚朴

三稜

莢朮

香附

桂心

蒼朮

陳皮

甘草

茯苓

木香

為末曲糊丸

七氣湯

治七清氣鬱而痛

人參

甘草

肉桂

半夏

姜水煎

大承氣湯

治脈實腹滿大便秘或繞臍痛

方見第二

錢灸法

大稜

掌后謁文二筋間灸二七壯

外關

大稜上二寸灸二七壯

腕見前

○腰痛五十一

針法

大者腎虛瀆為瘀血緩為溫或滑或伏為痰

天沉為腰背痛又脈沉而弦沉為滯弦為虛沉弦而

緊為寒沉弦而浮為風沉弦而瀯細為溫沉弦而實

閃朮

丹溪云有腎虛來血溫熱挫閃痰外感

被戴氏曰痰以不為諸清便也

日輕夜重者血也過天陰或久坐而痛者濕也
肢體足寒逆腰冷如冰冷汗精滑痛者是濕熱也
此因於房室過傷而腎虛者為多蓋腎虛則火旺
既則陰愈消而不絀榮養故作痛也久而不洽則成
骨痠夫腰為腎之府乃一身之太關節故經曰轉
不能腎府遺矣又或六氣乘虛而外入七情所感而
而內傷如志傷腎鬱怒傷肝或負重損傷
瘀血蓄而不行皆使氣停血滯着而成病矣

腎虛者杜仲龜板黃柏知母枸杞子五味猪脊髓丸服

瘀血者行血順氣補陰丸加桃仁宜刺委中出血 見霍

亂門

痰 南星半夏佐以快氣使痰隨氣運

濕 燥濕行氣黃柏杜仲蒼朮川芎溫熱亦因腎虛

諸腰痛不宜補氣藥亦禁寒涼。腰曲不能伸宜針灸

中

失志者 匡羸不足面黑遠行久立力不能任

驚恐者 腹急胸脹目視眈眈所祈不得意溫於外

憂思者 肌肉濡清痺而不仁飲食不化腸胃脹滿

房勞者 精血不足無所榮養經曰轉搖不能腎將遺矣

濕熱者 四肢緩足冷逆腹冷如冰冷汗精滑痛

外感曰虛表之如太陽腰痛引項尻重陽明腰痛不可

以頌善悲少陽如刺其尖不可俯仰太陰煩熱如有

橫水居其中遺溺少陰引脊內厥陰如張弓弦大抵

太陽少陰多中寒陽明太陰多燥濕少陽厥陰多風

熱

氣鬱痰積腰痛

沙參根半二錢 栝葉一兩 黃栝半兩

到氣卅

治刺閃

全向兩北茴香兩 為末酒下

腰膝痛

龜板一兩

牡栝

青皮兩各半 茸草一

姜研服或加蒼朮蒼耳威靈仙栝葉為末酒糊丸或

黑豆煎湯煎四物湯加陳皮甘草生姜吞

濕熱腰腿痛兩脇搖急露濕地不能轉側用蒼朮切

黃栝防風附子杜仲川芎肉桂等分煎服

風濕身痛吐法

生芎茶搗入香油數滴水

數沸入芎柳金未吐之

補腎丸

治腎虛腰痛

杜仲

龜板

黃柏

知母

川歸

五味

枸杞子等分
猪脊髓丸

加或法同
羌活湯

摩腰膏

治寒濕腰痛

附子尖

烏頭尖

南星

各二

朱砂

乾姜各一

雄黃

樟腦

丁香

各半

射香

五粒

右為末窰

丸如負眼大姜汁化如粥厚烘熟置掌中摩腰上令
粘肉烘綿衣縛定腰熱如火間三日用一丸或加茱

萸桂

腎氣丸

治房室勞傷而痛

即六味地黃丸
方見三十五

封髓丹

治膏粱之人

天門冬

熟地黃

人參

各半

黃柏

酒炒

砂仁

半

甘草

炙

為末

水丸

梧桐子

大用

茯苓

酒

一盞

浸一宿

煎三四沸

下五

十九

十九

牙垣

治一人露宿寒濕之地腰痛不能轉側兩脇搐急

作痛月餘腰痛論云皆足太陽足少陰血絡有凝血

作痛間有一二證屬少陽膽經外絡脉病皆去血絡

之凝乃愈經云冬三月禁針只宜服藥通其經絡破

血絡中敗血以漢防已防風各三分炒曲獨滑各五

分川芎柴胡肉桂當歸炙甘草蒼朮各一錢羌活一

半桃仁五粒作一服酒煎服遂愈

老滑湯

東垣

壽滑

當歸

獨滑

柴胡

防風

肉桂

如卧

寒

地足

太陽

少陰血絡中有凝血加歸尾蒼朮桃仁已溫熱痛

加黃栢杜仲蒼朮川芎厘加杜仲五味知母龜

板瘀血加桃仁蘇木射香水蛭水煎服

煨腎散

治腎虛腰痛

杜仲末

三錢猪腰一
枚批開五七

片生以鹽淹去包以荷葉外包紙數重煨熟酒下
腥水將末在內包以荷葉外包紙數重煨熟酒下

青娥丸

治同上

破故紙

杜仲

生薑二兩

為末用胡桃肉三十個研膏入藥膏丸梧子大酒下

百丸

浴腰痛

壯精氣補筋骨

草薢四兩 一兩重便

酒一兩 鹽湯浸一兩 各浸二日夜

補骨脂酒

杜仲四兩

胡桃肉八兩 去皮水浸 去油膩另研

共和杵干下春加糯米粥丸

秋冬蜜丸桐子大酒下五十丸

煨腎散

甘遂末三各 揗猪腰子細批以鹽椒淹透切

揗粟在內以荷葉包煨熟酒下

按此瀉溫藥也 又名益腎散

湯滑湯

治勞役腰痛如折

卷滑

獨活

防風

桂心

澤瀉

大黃

各三錢 甘草

川歸

連翹

各半

桃仁

立三十

黃柏

酒水煎

蒼朮湯

治濕熱腰痛

防風

芫胡

黃柏 一錢

蒼朮 三錢

水煎

如神湯

甚者不過三服

川歸

桂心

玄胡索

為末酒下三錢

越痛丸

治燈撲閃損腰痛

白蒿莖子

炒黃

白粟子

炒

乳香

沒藥

各一錢

烏梅 一枚

炊餅丸彈

子大酒嚼一丸

牛膝丸

治肝腎損傷而痛

方見三十五

針灸法

人中針

委中出血

命門

對臍是穴灸七

腎踰

命門二旁各開一寸半灸七壯

昆崙

在外踝下一寸大筋後骨死上中灸二十七壯名下昆崙

○腰軟五十二

丹溪云腎肝伏熱用黃柏防已

○腎着五十三

腎着為病体空腰冷如水飲食如故小便自利腰已下

冷痛如帶五千錢治宜流濕蒸溫散

腎着湯

即四君子成參加干姜是也

溲濕湯

見寧九

○脊背痛五十四

附背脾痛

麻法

洪而大

洪為熱

麻促上擊者有背痛沉而滑者

痛

因風熱乘肺手太陰經肺氣鬱甚不行病則頰頰腫頸
有顯肘臂外後臙痛汗出小便數而欠者皆風熱乘
肺也小便遺失者皆肺金虛也

治法

通經益元氣散風瀉火

通氣散

治風熱乘肺肩背疼

防風

藁本

獨滑

羌活

已上通經血

黃芩

黃連

二味降火

虛加人參

通氣防風湯

治肩背痛汗出小便數而少風熱乘肺

肺氣鬱甚宜瀉風熱

方見第九

羌滑勝濕湯

治有背痛不可回顧此太陽經氣鬱

而不行以風藥散之脊背項強腰似折項似拔此足

太陽經不通如身重沉上然此寒濕也加漢防已五

分輕者附子五分 粘痛湯亦治

蒼木復煎散

治寒濕相合腦右痛惡寒項筋脊骨強

有背脾眼痛膝膕痛無力

紅花 黃栢

芫胡

藁本

澤瀉

白朮

升麻各五分

蒼朮

羌滑一錢

右先煎蒼朮湯二大盞復入前

項藥煎至

一盞熱服取微汗忌酒麪

肩胛痛

因小腸經氣不行小腸心及有

外有肺風肺寒骨虛而致

○身體痛五十五

丹溪云一傷寒太陽經表證六脉俱緊。陰毒傷寒身
如被杖脉沉緊。傷寒發汗後身體痛氣血未和脉
弦遲。傷濕流關節一身尽痛風濕相搏肢体重痛
不可轉側脉緩。虛勞人氣血虛損脉弦小

有濕鬱而周身走痛或關節間痛遇寒即發者以濕鬱
治。周身骨節疼痛宜南星白术香附羌滑或陳香
附煎服

風濕身痛

蒼术

一两

黄柏

半两

羌滑

威靈仙

各

各

各

各

錢姜播服又吐沫見

○腰痛五十六

丹溪云

尺脉粗常熱為熱中痛

因傷寒濕流注經絡結滯骨節氣血不和而痛有痰積滯經絡流搏於血內亦然

附方

除濕丹

檳榔

甘遂

芍藥

威靈仙

澤瀉

亭瀝

乳香

沒藥

大戟

陳皮

牽牛

為末麪糊丸

禹女散

黑丑

茴香

為末姜汁下一二錢

一方 阮氏 治膝痛脚骨熱痛或赤腫

蒼朮

泔浸一日夜晒
干照水炒四兩

黃柏 酒浸一日
炙焦四兩 右剉水煎

脇痛五十七

朱云

雙弦

兩手俱
弦也

沉澹是鬱細緊或弦者怒氣

有汗木氣實火盛

或因怒氣大逆肝氣鬱甚謀慮下
或風中於肝皆使木氣實生火盛

火盛則有死血

其病則自汗而痛若按之益甚矣
痰積流注發除之經亦使脅下痛病則咳

有痰

又云痰積流注發除之經亦使脅下痛病則咳
急引脇痛又有鬱而熱痰者如脈沉澹當以

六鬱木氣實用川芎蒼朮青皮

○肝火盛以辛散之

當歸龍會丸瀉火要藥或瀉青丸。死血宜破血行

氣用留尖桃仁紅花川芎香附或加青皮蒼朮

又云
宜血

血為主調血為佐復元活。痰流注二陳加南星蒼

木川芎一本有青皮香附青。痰積宜去痰行氣二

陳加南星半夏香附青黛一本有青皮。肝急辛以散之

撫芎蒼朮或小茈胡經一云脇下痛發寒熱者湯以訖胡

為。兩脇走痛或可用控涎丹有痰積者可用

達故。咳嗽痛二陳加南星香附青皮青黛姜汁。

氣弱人脇下痛脉細緊或弦多以勞役怒氣得者八

物湯加木香青皮或加官桂一云氣弱人脇下痛上

宜片姜黃枳實挂也甘草。肥人因氣虛發寒熱脇下痛者補虛

用參芪退熱用訖胡黃芩調氣用木香青皮。瘦人

脇下痛發寒熱多怒者必有瘀血宜桃仁紅花當歸
 柴胡青皮六黃桅子草龍膽。去滯氣須用青皮膏
 皮乃肝膽兩經之藥多怒脇下有鬱積者固宜以解
 二經之實若二經氣不足者必先補血少加青皮可
 也。發寒熱脇下痛似覺有積塊必是飲食過傷勞
 力所致宜龍會丸。脇下有食積一條紅起用吳茱
 炒黃連。痛不得舒伸者龍會丸蜜丸服

外有肝中風左脅肝中寒右脅肝實肝虛筋實懸飲息

積內虛右脅因下積左膽實熱右下飲水下鳴

辨非 血枯證脇胸支滿經氣妨於食病至先

聞腥臊臭出清液肝病肺四肢清目眩前後血肝血

此年少脫血或醉身肝傷氣竭皆致脇病須詳之

當歸龍會丸

當歸 辛豆膽 梔子

黃連 黃芩各一兩 大黃 盧會 青黛各三錢

木香二錢 射香五分 神曲糊丸姜湯下一本有柴胡半兩青皮兩

如脇下作痛脈實而大便祕者木香攢柳丸

治一入年三十六虛損瘦甚石脇下疼四肢軟弱二陳

湯加白芥子枳實姜炒黃連竹瀝八十貼安

抱一翁治一入脇痛按以為癰投諸香姜桂葉並其翁

於之曰此腎邪也法當先溫利而後竭之以神保丸

下黑澁痛止即令更服神芎丸或疑太過翁曰向用
 神保丸以腎邪透膜非全竭不能引導巴豆性熱非
 芒硝大黃滯之遇熱必舉乃大帶數出病已其陽明
 脉弦陰脉微消弦者痛也瀉者腎邪有餘也腎邪上
 搏於脇不能下上腎惡燥熱發之非得利不愈

附方

心脇痛

黃連

炒

蘇葉

各二錢

黃芩

炒半兩

甘草

三錢

茯苓

白芷

各五分

南星

陳皮

一錢

滑石

一錢半

右用水煎服

推氣散

治右脇疼痛脹滿

片姜黃

枳殼 麩炒 桂心 各半 炙甘草 兩 為末 姜棗湯下 二錢

一方 治左右脇痛

白姜 蚕 必 桂枝 各半 炙甘草 三錢 為末 米湯下

枳實散 治左脇痛

枳實 川芎 各半 炙甘草 一錢 煎法同前

左金丸 治肝火 見火門

導痰湯 治痰積 流注 見痰門

江氣天香湯 治諸痛皆生於氣

破血散 治積傷血滯 脇下痛

防風 羌活 中桂 各一錢 蘇木 半錢 連翹

歸梢

訖胡

各二錢 水蛭 三錢 炒煙

射香

二

另研 余作二貼 酒二盞 水一盞 煎至一盞 去渣 調二

味末空心服

貼痛

芥菜子水研付 或琥珀膏貼 或茱萸醋研付

熨痛

灰醋炒熱熨之 或芎艾 或韭菜皆可炒熨

○脚氣五十八

脉法

浮弦為風 濡細為濕 洪數為熱 遲濇為寒 微滑為虛 牢堅為實 浮為表 沉為裏 沉弦為風 沉緊為寒 沉細為濕 沉數為熱 結因氣散 因憂緊 因怒細 因悲左寸

乍大乍小乍無與左尺絕者皆不洽

丹溪云有濕熱有食積流注有風濕寒濕

按三因云自汗走注為風

勝無汗掣急掣痛為寒勝腫滿重着為濕勝煩渴熱

預為暑濕四氣兼中者但推其多者為勝又須分表

裏以施治也蓋古無勝氣之說內証明發二漢間各

緩因宋齊之發謂之脚氣各雖不同其實一也初得

不覺因他病乃作始發或奄然大悶雖三二日方覺

先從脚起或發弱痺或行起忽倒或兩脛腫脹或

足膝枯細或心中忪悸或小腹不仁或舉體轉筋或

見食吐逆惡聞食氣或胃滿氣急或遍體痠疼此其

候之不同也初覺即灸所覺

費二三十壯隨愈亦良法也

脚氣從濕從下須提起其濕在下之藥隨氣血用

南方之人自外而感北方之疾自內而致蓋南方之人

當風取涼醉房久坐濕地或獲風濕毒氣血氣盛過

邪氣所行胃腸邪氣盛正氣少故血氣澁則痺
則弱病發熱四肢痠疼煩劇者因暑月冷濕得之四
肢結轉筋者寒月冷濕得之北方之疾因酒醪酒
之濕熱下注積久而成腫滿疼痛也治宜下藥泄
其邪

病脰腫小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時寒熱便澀不
通甚者攻心而勢迫治之不可後也此壅之疾壅未
成當宣通之調以黃蘗蒼朮濕類是也壅既成當破
瘀血而後以藥治之。脚氣攻心乃血虛而有濕熱
也四物加黃蘗。轉筋而痛者血受濕熱也四物加

挑仁本連有痰積流注加竹瀝姜汁南星又云轉筋
屬血熱四物加酒本紅花。筋動於足大指上至大
腿近腰結了此奉養厚因風寒而作又加蒼朮南星
如常腫者專主乎濕

治法

東垣云濕淫所勝治以苦溫以苦辛散之透關節勝濕
為佐以苦寒泄之流濕清熱為臣宜當歸粘痛湯

不治證

入心則恍惚謬妄嘔吐食不入眠不安脈左乍大乍
小乍無者不治左寸為心入腎則腰脚俱腫小便不

通治冷日 額黑冲胸而喘左尺絕者不治 左尺屬腎
音絕故也

治濕與氣方
紫蘇 黃栢 芍藥

木瓜 澤瀉 木通 防已 攢榔

蒼朮 枳殼 甘草 香附 羌活

痛加木香腫加大腹皮發熱加黃連大黃水煎

防已飲 炒栢 蒼朮 鹽炒 白朮

防已 生地 攢榔 川芎 犀角

甘草梢 木通 黃連 熟加苓時令熱加石

膏蔘力竹瀝姜汁南星便秘加桃仁小便澀加牛膝

健步丸

尋常服之

生地

陳皮

芍藥

各一兩半

歸尾

蒼朮

各一兩

大腹子

三斤

牛膝

茱萸

條芩

各半兩

桂枝

一斤

炊餅丸白朮通草湯下

脚氣冲心

四物加炒栝又以附子末津調貼湧泉

穴外用艾炙以引其熱

食積流注

蒼朮

防已

黃栝

商星

川芎

白芷

犀角

續斷

血虛加牛膝龜板酒糊丸服

一人足腫

方用

生地

黃栝

蒼朮

南星

紅花

牛膝

川芎

龍膽草

項彥章治一人足病發則兩足如柱潰黃水踰月乃已
輒復發六脉沉緩沉為裏有濕緩為厥為風此風濕
毒俗名濕脚氣也以神芎丸與神佑丸下濁水數十
出而愈

附方

三因論乃風寒著濕毒氣襲之也風則脉浮寒則脉
緊濕則脉細表則脉浮裏則脉沉風則痛濕則重暑
則煩風則行隨所中經絡而治之

太陽經則頭項腰脊皆痛六淫中之論同前宜以

麻黃左經湯

桂

麻黃

乾葛

細辛

白朮

茯苓

防己

防風

甘草

陽明則寒熱伸欠鼻乾腹脹膝解臍中循

外皆痛宜

大黃左經湯

大黃

細辛

茯苓

防己

羌活

黃芩

前胡

枳殼

厚朴

杏仁

少陽口苦脇痛面垢體無膏澤頭眩痛宜

半夏左經湯

半夏

乾葛

細辛

白朮

茯苓

桂

防風

訶胡

麥門冬 黃芩

三陽合病寒熱關節重痛手足拘挛冷痺緩急氣上
嘔吐下利脉必浮弦緊數合前三方治之

太陰腹滿咽連舌急胸膈痞滿骨節煩疼四肢拘急
浮腫宜大物附子湯

桂 附子 防己 各四兩 甘草 茯苓 各二兩

白朮 三兩

少陰上氣喘急小腹不仁腰脊足踡脰背痛八味丸
三十五枚

厥陰脇腰痛陰器小腹夾臍諸處脹痛中風宜用

神應養真丹

川歸 川芎 天麻

木瓜 羌活 熟地 芍藥

三陰經無併藏腑不同故也

心滑導滯湯

羌活 獨活 防已

川歸 枳實 大黃

應通丸

治痛甚 赤芍 草烏 張去皮尖半分

右為末酒為丸湯下每服十九

除濕丹

治諸濕 赤芍藥 檳榔 甘遂

威靈仙 澤瀉 亭歷 乳香 沒藥

黑丑 三錢 大戟 陳皮 右糊丸如梧桐子大

水下八十九

除濕湯

治風寒暑濕足常履之所致

木瓜

攢柳

白芷

各半兩

半夏曲

厚朴

蒼木

各二兩

霍香

陳皮

白朮

茯苓

各兩

甘草

七錢

右剉加姜棗水煎

獨滑寄生湯

治疎風養血

獨滑

川歸

芍藥

熟地

各三兩

桑寄生

如無以續斷代之

牛膝

細辛

秦朮

茯苓

桂心

防風

川芎

人參

各二兩

甘草

半兩

右剉姜水煎服

脚氣痿壯人涼膈散老人八味丸

虛人脚氣腫者用枳實大黃羌活滑川歸

脚氣煩疼面背沉重胸膈不利及偏疼下注於足脛腫

痛用當歸拈痛湯

見泥門

八珍丸

治一切脚氣痛風頭疼

方見痺門

脚氣腫痛

白芥子白芷等分為末姜汁調貼或用仙

木羌活獨活白芷細辛為末作襪用

煉洗

威靈仙

防風

州芥

地骨皮

川芎

升麻

胡蘆

煎湯漂洗

藥方

杉樹爭荔白攝葉攢柳煎水浸洗煎服尤妙

針灸法

足三里絕骨三陰交昆命委中

並其前

陽輔 及外踝骨上一灸七壯

遠行脚腫

防風

細辛

草烏

右為末按鞋底下