

醫

學

辯

正

醫學辨正卷三目錄

頭

面

眼

鼻

耳

口舌

咽喉

牙齒

心

脾

肝

肺

腎

胸

乳

脇

腰

腹

手

足

疝氣

淋濁

遺精

陽痿

小便

大便泄瀉

秘結

痔瘡

痢疾

雜五卷二目錄

頭

面

頰

鼻

耳

口舌

咽喉

天竅

心

肺

肝

脾

醫學辨正卷三

內寒水熱香和書山陰張學醇筱溥編集男克元校訂

頭膏

頭爲天谷以藏神腦爲髓海有餘則輕勁多力不足則腦轉耳鳴脛疫眩冒目無所見其病也雖有正頭痛偏頭痛風寒頭痛濕熱頭痛厥逆頭痛痰厥頭痛氣厥頭痛濕熱厥頭痛熱厥頭痛真頭痛醉後頭痛之分治法仍不外乎寒熱兩門分之清則立見其效也

內外惡寒者追風湯

川芎 三錢

附子 一二錢

羌活 三錢

當歸 三錢

防風 三錢

白芷 二錢

內外發熱者清心瀉火湯

柴胡 五錢

黃芩 三錢

黃連 一錢

石膏 一兩

甘草 二錢

澤瀉 三錢

內寒外熱者麻葛湯

麻黃 二錢

苦杏仁 三錢

當歸 三錢

葛根 二錢 滑石 八錢

甘草 一錢

內熱外寒者芎翹湯

川芎 一錢

羌活 一錢

防風 二錢

連翹 二錢

梔子 二錢

黃連 一錢

如藥力一時不能上達令病人仰臥以藥滴入鼻內上吸

宗氣入腦立時便愈左痛滴左右痛滴右兩邊俱痛則兩孔

空竅俱滴或以藥末吸入亦效

面

經云、人之十二經脈、三百六十五絡、其血氣皆上於面而走
空竅、其精陽氣上走於目而爲睛、其別氣走於耳而爲聽、其
宗氣上出於鼻而爲臭、其濁氣出於胃走唇舌而爲味、其氣
之津液皆上薰於面、而皮又厚、其肉堅、故能耐寒暑而不衣、
五藏六府之有病、皆上現於面、而分寒熱、面黃目青、面黃目
赤、面黃目黃、面黃目白、面黃目黑者、皆不死、面青目赤、面赤
目白、面青目黑、面黑目白、面赤目青、皆死也、此相五色之奇
脈也、面上之病、或腫或生瘡癩、疥癩、均按其部位、分寒

熱而治之

寒氣凝結硬而不腫者麻黃細辛湯

麻黃 二錢

細辛 一錢

防風 二錢

白芷 二錢

當歸 二錢

川芎 一錢

熱氣紅腫者犀角地黄湯

犀角 二錢

地黄 八錢

葛根 二錢

羚羊角 二錢

黃連 一錢

甘草 一錢

外紅腫心中惡寒者表裏雙解湯

滑石 五錢

生地 八錢

甘草 一錢

麻黃 二錢

苦杏仁 三錢

烏梅 三錢

外惡寒而內煩燥發熱者補肺清心湯

防風 三錢

白芷 一錢

細辛 一錢

黃連 一錢

連翹 三錢

梔子 一錢

眼

大惑論曰五藏六府之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之

精爲白眼、肌肉之精爲約速、裏擷筋骨、血氣之精、而與脉并爲系、上屬於腦、後出於項中、故邪中於項、因逢其身之虛、其入深、則隨眼系以入於腦、則腦轉、腦轉則引目系急、目系急則目眩以轉矣、邪中其精、其精所中、不相比也、則精散、精散則視岐、視岐見兩物、目者五藏六府之精也、營衛魂魄之所常瑩、神氣之所常生也、故神勞則魂魄散、志意亂、是故瞳子黑、眼法於陰、白眼赤脉法於陽也、故陰陽合傳而精明也、目者心之使也、心者神之舍也、故神精亂而不轉、卒然見非常

之處精神魂魄散不相得故曰惑也

五藏六府之精氣皆上注於目其病也或因於寒或傷於熱乃一定之理楊士瀛李挺所說眼科無寒症皆一偏之見張景岳云眼科一證古人有五輪八廓七十二證之辨皆非切當之論徒資惑亂不足為憑但當辯其虛實二字足以盡之此語似屬切當然須分十二經之虛實方能合拍否則終不能著手成春眼科無寒症何足為憑耶

內外俱熱者滋陰降火湯

地黃 八錢

白頭翁 二錢

丹皮 二錢

前胡 三錢

石決明 五錢

黃連 一錢

山查 二錢

桑葉 三錢

內外俱寒者麻黃細辛湯

麻黃 二錢

桂枝 三錢

苦杏仁 二錢

細辛 二錢

半夏 三錢

防風 三錢

外熱內寒者清肺補心湯

生地 八錢

桑白皮 三錢

桑葉 五錢

遠志 二錢
麻黃 二錢
益母草 二錢

外寒內熱補肺清心湯

白芷 三錢
防風 三錢
桂枝 二錢

菊花 三錢
石決明 三錢
黃連 一錢

內外惡寒發熱者表裏雙解湯

細辛 二錢
遠志 三錢
菊花 三錢
桑葉 二錢

白芷 三錢
麻黃 一錢
石決明 三錢
前胡 三錢

鼻

肺開竅於鼻、肺和則鼻知香臭、肺有病則鼻爲之不利、重則有鼻淵鼻痔之病、有餘者清肺降火湯

石膏

八錢

黨參

五錢

甘草

二錢

丹皮

三錢

知母

二錢

貝母

二錢

脾胃有寒者加白朮

肝腎有寒者加當歸

不足者補肺益氣湯

細辛

二錢

白芷

三錢

防風

三錢

乾薑 一錢

半夏 二錢

白朮 三錢

脾胃有熱者加生地

心肝有熱者加黃芩

鼻淵者、鼻涕津津不已、又名爲腦漏、鼻痔者、鼻中生肉、滯塞鼻竅、又爲鼻艱、除服藥清理外、再用外治、以除其根、熱用冰片、輕粉、寒用細辛、麝香末、以綿裹塞鼻中、其肉自落。

耳

耳爲腎之竅、腎經之有餘不足、皆能令其病、輕則耳鳴生瘡、重則聾閉不通、陰虛者、當補其水、陽虛者、當補其火、則病自

愈若為大炮振聾及年老氣血衰弱之聾則當調其虛實而治之非可計日而效也

陰虛者秋石補血湯

秋石 二錢

滋石 一錢

連翹 三錢

地黃 一兩

黃柏 二錢

甘草 二錢

陽虛者菴蓉補氣湯

肉菴蓉 三錢

破故紙 三錢

當歸 三錢

石菖蒲 三錢

遠志 三錢

五味子 一錢

千金方治耳聾久不效用大蒜一瓣中剗一孔以巴豆一粒去皮膜火炮極熟入蒜內用新棉包定塞耳中三次而愈此治陽虛則可陰虛則非徒無益而有害焉方書多半不分陰陽以致有效有不效千金尙如此何論其他余反其意日以冰片磁石塞耳內可治陰虛之耳聾

口舌

金匱真言論曰中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌本舌和則知五味

口舌生瘡，宜分寒熱。卽明係火症，他經有寒者，則當加以
溫藥，不可悉用涼藥。舌腫熱，用冰片敷之，寒則刺出其
血卽愈。如舌卷囊縮，乃不治之症也。舌爲心之苗，關係
甚重。若以之識五藏六府之症，則不確。查內經並無看
舌苔之明文。後人以舌苔白者爲寒，紅者爲熱。每見大
熱症，而苔亦有白者。現在時醫專看舌苔，能無錯誤。舌
爲心之苗，以之認心經之寒熱，則可以之認別經之寒
熱，則不可也。

內外俱熱者加味白虎湯

石膏 八錢

生地 八錢

甘草 二錢

知母 三錢

連翹 三錢

梔子 二錢

內外俱寒者大青龍湯

麻黃 二錢

細辛 一錢

桂枝 三錢

石膏 五錢

半夏 三錢

乾薑 一錢

外熱內寒者補心清胃湯

天花粉 五錢

丹皮 三錢

甘草 二錢

遠志 三錢

乳香 二錢

沒藥 二錢

外寒內熱者補肺益心湯

荊芥 三錢

半夏 三錢

白芷 三錢

黃芩 三錢

梔子 二錢

連翹 三錢

內外惡寒發熱者表裏雙解湯

苦參 三錢

乳香 二錢

丹皮 三錢

黃耆 五錢

黃連 一錢

沒藥 二錢

天花粉 三錢

赤石脂 三錢

咽喉

咽喉者、水穀之道、氣之所以上下者也、其病也、頃刻可以傷命、古人以喉痺有十八證之辨、均指爲相火、後人亦有識其有寒症者、或遲疑而不敢用、或用之、而病家惑於相火之說、而不敢服、誤人性命者多矣、患此症者、或失音不能言、或腫痛閉塞、而不能進飲食、皆屬危症、用輕緩之藥、雖對症亦不濟事、須用性味俱重之藥、方可轉危爲安、藥力之猛、以大黃、巴豆、冰片、麻黃爲最、善用之、可以定亂於頃刻、醫者將此四藥、各研細末、帶在身邊、遇有喉症、肺胃寒者、用巴豆、肝心寒

者用麻黃、肺胃熱者用冰片、肝心熱者用火黃、心肝寒肺胃
熱者用麻黃、冰片、心肝熱肺胃寒者用巴豆、大黃、以藥吹入
喉內、吐出痰涎、立時卽解、然後再用湯藥、以善其後、昔孫兆
治潘元從急喉、以藥半錢、吹入喉中、少頃吐出膿血而愈、潘
謝以百金、求其方、以濟世、孫云、猪牙皂角、白礬、黃連、等分、瓦
上焙乾爲末、耳、旣授以方、不受所贈、此藥性味、與大黃、巴豆
同、故能立效、若外熱內寒之症、下咽則立斃矣、用藥可不慎
哉、耳鼻之症、認清寒熱、以此藥吹入亦愈也、

內外俱熱者清涼散

黃連 一錢

梔子 二錢

連翹 三錢

生地 八錢

丹皮 三錢

甘草 二錢

內外俱寒者去風湯

防風 三錢

薄荷 三錢

當歸 二錢

細辛 一錢

川芎 二錢

蘇葉 二錢

外熱內寒者清肺補心湯

丹皮 三錢

滑石 五錢

甘草 二錢

當歸 三錢

遠志 二錢

橘皮 二錢

外寒內熱者清心補肺湯

川芎 二錢

防風 三錢

半夏 三錢

牛旁子 三錢

馬勃 二錢

連翹 二錢

內外惡寒發熱者表裏雙解湯

黃連 一錢

丹皮 三錢

半夏 三錢

何首烏 三錢

梔子 二錢

生地 五錢

桂枝 三錢

厚樸 二錢

牙齒

齒者骨之餘、上古天真論曰、女子七歲腎氣盛、齒更髮長、三七盛氣平均、故真牙生而長極、丈夫八歲腎氣實、髮長齒更、三八腎氣平均、筋骨勁強、故真牙生而長極、五入腎氣衰、髮墮齒槁、八入則齒髮去矣、是牙齒之堅固不堅固、關乎腎氣之盛衰、而手陽明之脉、從缺盆上貫頸頰、入下齒中、動則病齒痛頸腫、足陽明之脉、下循鼻外、上入齒中、齒雖腎之餘、然關乎胃與大腸、胃與大腸之寒熱、皆能令齒病、又加小兒喜食甘甜味、土壯則尅水、故能令齒病、又甘甜濕熱、化生牙

蟲以蝕牙根、而牙亦痛、治此者、以殺蟲為主、殺蟲之方甚多、而效者甚少、以不分寒熱故耳、南方有挑牙蟲者、有挑之而永遠不發者、有挑之而仍發者、大約不戒甘甜、則仍發耳、

內外俱熱者、清心涼膈湯

石膏 一兩

生地 一兩

黃柏 三錢

知母 三錢

秋石 五分

甘草 一錢

內外俱寒者、附子理中湯

附子 三錢

桂枝 三錢

當歸 一錢

細辛 一錢

烏梅 一錢

肉蓯蓉 一錢

外熱內寒者清胃補肝湯

滑石 八錢

生地 八錢

丹皮 三錢

苦杏仁 三錢

五味子 五分

旋覆花 一錢

外寒內熱者補胃瀉肝湯

葶撥 一錢

細辛 一錢

防風 三錢

連翹 二錢

苦參 三錢

牡蠣 八錢

內外惡寒發熱者內外兩解湯

桂枝 二錢

黃耆 五錢

續斷 二錢

破故紙 三錢

枳榔 三錢

澤瀉 三錢

地骨皮 二錢

羚羊角 三錢

齒病塗擦方

寒重者香椒散

香附子 二錢

川椒 一錢

破故紙 五錢

萆撥 一錢

乳香 一錢

沒藥 一錢

細辛 一錢

麻黃 一錢

鹽 一錢

共研為末每日擦之病除而止

熱重者清胃散

生石膏 一兩
鹽 一錢

研末擦之

外熱內寒者清胃補腎散

生石膏 一兩

天花粉 五錢

破故紙 五錢

陽起石 五錢

共研細末擦之

外寒內熱者溫胃清腎散

赤石脂 五錢

白芷 三錢

胡椒 一錢

牡蠣 五錢

桑螵蛸 五錢

白礬 一錢

共研細末擦之以上擦牙各藥病好即止

心

經云心有大小高下堅脆端正偏傾之別。赤色小理者心小，麤理者心大，無鬲髡者心高，鬲髡小短舉者心下，鬲髡長者心堅，鬲髡弱小而薄者心脆，鬲髡直下不舉者心端正，鬲髡倚一方者心偏傾也，心小則易傷以憂，心大則憂不能傷，心高則滿於肺中，悅而善忘，難開以言，心下則易傷於寒，易恐以言，心堅則藏安守固，心脆則善病消痺熱中，心端正則和利難傷，心偏傾則操持不一，無守司也，心實則胸中痛，脇支

滿、脇下痛、膺背肩脾間痛、兩臂內痛、心虛則胸腹大脇下、與腰背相引而痛、心應脉、皮厚者脉厚、脉厚者小腸厚、皮薄者脉薄、脉薄者小腸薄、皮緩者脉緩、脉緩者小腸大而長、皮薄而脉冲小者、小腸小而短、諸陽經脉、皆多行屈者、小腸結、心脉急甚者爲瘕瘕、微急爲心痛、引背食不下、緩甚爲狂笑、微緩爲伏梁在心下、上下行、時唾血、大甚爲喉呿、微大爲心痺、引背善淚出、小甚爲善噦、微小爲消痺、滑甚爲善渴、微滑爲心疝、引臍、小腸鳴、濇甚爲瘖、微濇爲血溢、維厥、耳鳴、癩疾。

有餘者三黃湯

黃連 二錢

黃芩 三錢

黃柏 三錢

不足者補氣湯

遠志 三錢

當歸 三錢

厚樸 三錢

脾

脾有大小高下堅脆端正偏傾之別，黃色小理者脾小，粗理者脾大，揭唇者脾高，唇下縱者脾下，唇堅者脾堅，唇大而不可

藏安難傷於邪也、脾大則苦溲眇而痛、不能疾行、脾高則眇引季脇而痛、脾下則下加於大腸、下加於大腸則藏苦受邪、脾堅則藏安難傷、脾脆則善病消痺易傷、脾端正則和利難傷、脾偏傾則善滿善脹也、脾氣虛則四肢不用、五藏不安實則腹脹、涇洩不利、脾應肉、肉腠堅大者胃厚、肉腠磨者胃薄、肉腠小而磨者胃不堅、肉腠不稱身者胃下、胃下者下脘約不利、肉腠不堅者胃緩、肉腠無小裏累者胃急、肉腠多少裏累者胃結、胃結者上脘約不利也、脾脉急甚爲瘕癥、微急爲

膈中食飲入而還出後沃沫、緩甚為痿厥、微緩為風痿、四肢不用、心慧然若無病、大甚為擊仆、微大為疝氣、腹裏大、膿血在腸胃之外、小甚為寒熱、微小為消痺、滑甚為癰、微滑為蟲、毒蝟蝎腹熱、瀦甚為腸癰、微瀦為內癰、多下膿血、有餘者清胃湯

滑石 一兩

甘草 二錢

不足者補脾飲

黃耆 五錢

白朮 五錢

肝

肝

白

肝有小大高下堅脆端正偏傾之別、青色、小理者肝小、粗理者肝大、廣胸反骹者肝高、合脇兔骹者肝下、胸脇好者肝堅、脇骨弱者肝脆、膺腹好相得者肝端正、脇骨偏舉者肝偏傾也、肝小則藏安、無脇下之痛、肝大則逼胃、迫咽迫咽、則苦膈中、且脇下痛、肝高則上支賁切、脇悅爲息賁、肝下則逼胃脇下空、脇下空則易受邪、肝堅則藏安難傷、肝脆則善病消痺、易傷、肝端正則和利難傷、肝偏傾則脇下痛也、肝實則兩脇

下痛引小腹、善怒、虛則目眊眊無所見、耳無所聞、善恐、如人將捕之、肝應爪、爪厚色黃者膽厚、爪薄色紅者膽薄、爪堅色青者膽急、爪濡色赤者膽緩、爪直色白無約者膽直、爪惡色黑多紋者膽結也、肝脉急甚者爲惡言、微急爲肥氣在脇下、若覆杯、緩甚爲善嘔、微緩爲水痕痺也、大甚爲內癰、善嘔、微大爲肝痺、陰縮、欬引小腹、小甚爲多飲、微小爲消痺、滑甚爲癩疔、微滑爲遺溺、濇甚爲溢飲、微濇爲瘕、攣筋痺、有餘者清肝飲

山查 五錢

黃連 一錢

秋石 五分

不足者温膽湯

五味子 一錢

附片 三錢

當歸 三錢

乾薑 二錢

肺

肺有小大高下堅脆端正偏傾之別、白色小理者肺小、粗理者肺大、巨肩反膺陷喉者肺高、合腋張脇者肺下、好肩背厚者肺堅、肩背薄者肺脆、背膺厚者肺端正、脇偏疎者肺偏傾

也肺小則少飲不病喘喝肺大則多飲善病胸痺喉痺逆氣
肺高則上氣息肩欬肺下則居賁迫肺善脇下痛肺堅則不
病欬上氣肺脆則苦病消癰易傷肺端正則和利難傷肺偏
傾則胸偏痛也肺氣虛則鼻息不利少氣實則喘喝悲胸仰
息肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大
腸大而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離
者大腸結肺脉急甚爲巔疾微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引
腰背胸苦鼻息肉不通緩甚爲多汗微緩爲鼠瘦偏風頭以

下汗出不可止，大甚為脛腫，微大為肺痺，引胸背，起惡日光，小甚為泄，微小為消瘴，滑甚為息賁，上氣微滑為上下出血，澇甚為嘔血，微澇為鼠瘦，在頸支腋之間，下不勝其上，其應善瘦矣。

有餘者清肺湯

石膏 一二兩

生地 一兩

甘草 四錢

不足者益氣飲

乾薑 一錢

白芷 三錢

白朮 三錢

腎

腎有小大高下堅脆端正偏傾之別，黑色小理者腎小，粗理者腎大，高耳者腎高，耳後陷者腎下，耳堅者腎堅，耳薄不堅者腎脆，耳好前居牙車者腎端正，耳偏高者腎偏傾也，腎小則藏安難傷，腎大則善病腰痛，不可以俛仰，易傷以邪，腎高則苦背脊痛，不可俛仰，腎下則腰尻痛，不可俛仰，爲狐疝，腎堅則不病腰背痛，腎脆則苦病消痺易傷，腎端正則和利難傷，腎偏傾則苦腰尻痛也，腎實則腹大脛腫，喘咳身重寢汗

出憎風、虛則胸中病、大腹小腹痛、清厥意不樂、腎應骨密理厚皮者、三焦膀胱厚、粗理薄皮者、三焦膀胱薄、疎腠理者、三焦膀胱緩、皮急而無毫毛者、三焦膀胱急、毫毛美而粗者、三焦膀胱直、稀毫毛者、三焦膀胱結也、腎脉急甚爲骨癩疾、微急爲沉厥、奔豚足不收、不得前後、緩甚爲折脊、微緩爲洞、洞者食不化、下嗝還出、大甚爲陰痿、微大爲石水、起臍以下至小腹、臞臞然、上至胃脘、死不治、小甚爲洞泄、微小爲消痺、滑甚爲癰瘡、微滑爲骨痿、坐不能起、起則目無所見、濇甚爲大

癰、微瀦爲不月、沉痔、

有餘者滋腎湯

地黃 八錢

羚羊角 一二錢

秋石 五分

淫羊藿 三錢

丹皮 三錢

知母 三錢

不足者補腎湯

肉蓯蓉 三錢

附子 一二錢

陽起石 三錢

遠志 三錢

鹿角霜 三錢

五味子 五分

經云、五藏皆小者、苦焦心、多愁憂、五藏皆大者、緩於事、難使

以憂、五藏皆高者、好高舉措、五藏皆下者、好出人下、五藏皆
堅者、無病、五藏皆脆者、不離於病、五藏皆端正者、和利得人
心、五藏皆偏傾者、邪心而善盜、不可以爲人也、

胸

胸腹者、藏府之郭也、人之呼吸所經、飲食所過、一有失節、則
生疾病、滿而不痛者爲痞、滿而痛者爲結胸、仲景曰、傷寒病
發於陽而反下之、熱入因作結胸、病發於陰而反下之、因作
痞、所以成結胸者、以下之太早故也、愚謂結胸一症、亦須分

十二經之寒熱方可無誤，豈因本有內熱而下之太早，遂成結胸耶？此乃不當下而下之耳。

內外俱熱者陷胸湯

大黃 三錢

芒硝 一錢

葶藶子 三錢

杏仁 三錢

甘遂 五分

白密 一錢

內外俱寒者薑附湯

乾薑 一錢

附子 三錢

桂枝 三錢

厚樸 一錢

陳皮 三錢

巴豆霜 三分

心肝熱肺胃寒者半夏瀉心湯

半夏 三錢

乾薑 一錢

甘草 一錢

大黃 二錢

黃連 一錢

黃芩 三錢

肺胃熱胸中寒者麻杏石甘湯

麻黃 三錢

苦杏仁 五錢

石膏 一兩

甘草 一錢

內外惡寒發熱者陰陽雙解湯所謂內外有寒熱乃身熱如炭而又見風怕冷心中則忽寒忽熱此乃府寒藏熱表裏皆

病之症，故宜雙解。

大黃 二錢

石膏 八錢

澤瀉 三錢

芒硝 二錢

厚樸 三錢

桂枝 二錢

白朮 三錢

附子 二錢

乳

燒

五錢

金

驗

正

乳

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

三錢

乳為腎之根本，婦人所尤重也。前人治乳，多半以清涼為主。一遇結核奶巖之症，無不束手。林屋山人云：紅者為癰，白者為疽。乳岩初起之時，不痛不痒。二三年後，愈長愈大，漸漸腫痛，臭爛孔深，亦有初起色白，堅硬一塊作痛。此係陰疽，最為

險惡此由哀哭憂愁患難驚恐所致治宜陽和湯此論實為
 治癰疽之要訣惟不知十二經之寒熱用藥尙未能絲絲入
 扣耳

紅腫者清涼散

連翹 五錢

金銀花 五錢

梔子 三錢

澤瀉 三錢

滑石 六錢

白甘草 二錢

色白堅硬者陽和湯

麻黃 二錢

地黃 五錢

甘草 一錢

肉桂 一錢

鹿角膠 三錢
白芥子 一錢
炮薑炭 五分

外寒內熱者補脾清肝飲

半夏 二錢
黃耆 五錢
荆芥 三錢

連翹 三錢
梔子 三錢
龍膽草 二錢

外熱內寒者護心清肺湯

乳香 二錢
沒藥 二錢
當歸 三錢

丹皮 三錢
天花粉 三錢
綠豆粉 八錢

內外惡寒發熱者雙解飲

乳香 一錢
沒藥 一錢
荆芥 三錢
烏梅 二錢

黃連 一錢
黃柏 三錢
丹皮 三錢
白礬 五分

脇

肝膽之脉布脇肋、經云、肝病者、兩脇下痛引少腹、令人善怒、
肝有邪其氣流於兩脇、肝雍兩胠滿、臥則驚、不得小便、傷寒
三日少陽受之、少陽主膽、其脉循脇絡於耳、故胸脇痛而耳
聾、肝熱病者、熱爭則狂言及驚、脇滿痛、手足躁、不得安臥、寒
氣客於厥陰之脉、則血泣脉急、故脇肋與少腹相引痛矣、風

寒客於人，弗治則病入舍肺，弗治卽傳而行之肝，名曰肝痺。脇痛出食，少陽之厥，暴聾頰腫而熱，脇痛膈不可以運，有病胸脇支滿者妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四肢清目眩，時時前後血，病名曰血枯。此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。治以烏賊魚骨丸。歲厥陰在泉，風淫所勝，民病心痛支滿，兩脇裏急，飲食不下。歲陽明在泉，燥淫所勝，民病心脇痛，不能反側，厥陰司天，民病胃脘當心而痛，上肢兩脇，膈咽不通，飲食不下，少

陰司天、熱淫所勝、民病胸中煩熱、右肱滿、陽明司天、民病左
 肱脇痛、心脇暴痛、不可反側、厥陰之勝、胃脘當心而痛、上支
 兩脇、太陰之勝、病在肱脇、陽明之勝、清發於中、左肱脇痛、陽
 明之復、清氣大來、病生肱脇、氣歸於左、
 熱盛者左金丸

黃連 八錢
 吳茱萸 一錢

山查 三錢
 秋石 二錢

共研細末密和為丸每服一錢

寒盛者烏梅丸

烏梅 一兩

當歸 五錢

烏賊魚骨 一兩
天南星 三錢

共研爲末和丸每服一錢

脇痛一症、肝膽二經爲最多、故立二方、以治本經、如脉象連及他經、則隨經加藥以治、若房勞過度、肝腎俱病、則當求其虛實而治之、大匠能與人規矩、不能使人巧、神而明之存乎其人也、

腰

腰者腎之府、轉搖不能、腎將憊矣、腎脉搏堅而長、其色黃而赤者、當病折腰、

足太陽腰痛、令人引項脊尻背如重狀、痛引肩、目眈眈然時遺漉、痛如引帶、常如折腰狀、善恐甚則悲、

熱甚者清火湯

牡蠣 一兩

黃柏 一錢

牛膝 三錢

石斛 三錢

知母 一錢

甘草 一錢

寒甚者補氣湯

破故紙 三錢

肉蓯蓉 二錢

續斷 二錢

核桃仁 四錢

乾薑 一錢

黃耆 三錢

少陽腰痛，令人如以鍼刺其皮中，循循然，如不可以俛仰，不可以顧，不可以咳，咳則筋縮急。

熱甚者龍膽瀉肝湯

龍膽草 三錢

山查 三錢

澤瀉 二錢

秋石 五分

秦芃 三錢

甘草 一錢

寒甚者溫膽湯

烏梅 三錢
杜仲 三錢
五加皮 三錢

破故紙 三錢
核桃肉 五錢
乾薑 一錢

陽明腰痛，令人不可以顧，顧如有見者，善悲，令人腰痛而熱，而生煩，腰下如有橫木居其中，甚則遺洩。

熱甚者加味白虎湯

石膏 一兩
甘草 二錢
黃柏 三錢

知母 三錢
生地 八錢
麥冬 二錢

寒甚者溫胃湯

黃耆 二錢

砂仁 一錢

荳蔻 一錢

陳皮 二錢

當歸 二錢

川芎 二錢

少陰腰痛、令人痛引脊內廉、目眈眈然、甚則反折舌卷不能

言、

熱甚者玉女煎

石膏 一兩

麥冬 三錢

牡蠣 二兩

生地 一兩

知母 五錢

黨參 二錢

寒盛者補腎湯

肉蓯蓉 五錢
五加皮 三錢
乾薑 一錢

附子 三錢
杜仲 五錢
白朮 二錢

厥陰腰痛、令人腰中如張弓弩弦、其病令人善言、嘿然不
慧、不可以俛仰、

熱甚者瀉肝湯

山查 三錢
黃連 一錢
澤瀉 三錢

黃芩 二錢
秋石 五分
青蘘 一個

寒甚者溫膽湯

木瓜 三錢

五味子 五分

遠志 三錢

附子 三錢

黃耆 三錢

乾薑 一錢

太陰腰痛、令人痛引少腹控眇、不可以仰息、

熱甚者清肺湯

丹皮 三錢

滑石 八錢

甘草 二錢

生地 八錢

石斛 三錢

桑白皮 三錢

寒甚者補脾飲

桂枝 三錢

黃耆 五錢

破故紙 三錢

乾薑 一錢

白朮 三錢

核桃肉 五錢

此就六經腰痛、分寒熱以立方、若有兼症、當憑脉以分其陰陽、不可以呆方治病也。

腹

舉痛論、帝曰、願聞人之五藏卒痛、何氣使然、岐伯曰、經脉流
行不止、環周不休、寒氣入經而稽遲、泣而不行、客於脉外則
血少、客於脉中則氣不通、故卒然而痛、帝曰、其痛或卒然而
止者、或痛甚不休者、或痛甚不可按者、或按之而痛止者、或

按之無益者、或喘動應手者、或心與背相引而痛者、或脇肋
與少腹相引而痛者、或腹痛引陰股者、或痛宿昔而成積者、
或卒然痛死不知人、少間復生者、或痛而嘔者、或腹痛而後
泄者、或痛而閉不通者、凡此諸痛、各不同形、別之柰何、岐伯
曰、寒氣客於脉外、則脉寒、脉寒則縮、縮則脉絀、急、絀急
則外引小絡、故卒然而痛、得炁則立止、因重中於寒、則痛久
矣、寒氣客於經脉之中、與炁相薄、則脉滿、滿則痛而不可
按也、寒氣稽留、炁氣從上、則脉充大、而血氣亂、故痛甚不可

按也、寒氣客於腸胃之間、膜原之下、血不得散、小絡急引、故痛、按之則血氣散、故按之痛止、寒氣客於挾脊之脉、則深、按之不能及、故按之無益也、寒氣客於衝脉、衝脉起於關元、隨腹直上、寒氣客則脉不通、脉不通則氣因之、故喘動應手矣、寒氣客於背俞之脉、則脉泣、脉泣則血虛、血虛則痛、其俞注於心、故相引而痛、按之熱氣至、熱氣至則痛止矣、寒氣客於厥陰之脉、厥陰之脉者、絡陰氣繫於肝、寒氣客於脉中、則血泣、脉急、故脇肋與少腹相引痛矣、厥氣客於陰股、寒氣上及

少腹、血泣在下相引、故腹痛引陰股、寒氣客於小腸膜原之
間、絡血之中、血泣不得注於大經、血氣稽留不得行、故宿昔
而成積矣、寒氣客於五藏、厥逆上泄、陰氣竭、陽氣未入、故卒
然痛死不知人、氣復反則生矣、寒氣客於腸胃、厥逆上出、故
痛而嘔也、寒氣客於小腸、小腸不得成聚、故後腹痛矣、熱氣
留於小腸、腸中痛、暉熱焦渴、則堅乾不得出、故痛而閉不通
矣、

寒痛者温中薑附湯

乾薑 二錢

附子 三錢

白朮 三錢

桂枝 三錢

厚樸 二錢

五味子 一錢

熱痛者清火芩芍湯

黃芩 三錢

枳實 一錢

澤瀉 三錢

芍藥 三錢

枳榔 二錢

猪苓 三錢

手足

四肢為諸陽之本、陽盛則熱、陽虛則寒、經云、掌中熱者腹中

熱、掌中寒者腹中寒、太過不及、均令人病、中風之症、必先從

手指麻木起、初覺之時、卽按其虛實而調理之、便不致大病、所謂治未病也、若俟其病發而治之、十無一愈、卽有愈者、亦屬帶疾延年、余曾治一手指麻木之症、用玉女煎、旁一友人、亦明醫者、詔曰、指麻乃中風之漸、而桂枝防風等去風之藥、一味不用、不解何意、余曰、此係風熱、非風寒也、若用溫藥、是速其病也、病者曰、余服桂枝、則麻更甚、向來體氣喜冷惡熱、遂服玉女煎而愈、中風一症、古來醫家、悉以爲風、初起之時、未常不可治、而所用之藥、無非溫熱、不治尙可、治則更甚、手

指雖非心腹之疾，所關甚大，其可忽哉。

熱盛者清心涼膈散

黃連 二錢

黃芩 二錢

甘草 二錢

石膏 八錢

生地 八錢

桑枝 二兩

寒盛者桂附補氣湯

桂枝 五錢

附子 三錢

白朮 三錢

夜交藤 五錢

五加皮 三錢

木瓜 三錢

有兼症者另行加減

足

足爲一身之主、足有病則不能行、經云、久走傷筋、久立傷骨、
足之病不外乎肝腎兩經、以筋屬肝、骨屬腎也、經云、濕熱不
攘、大筋繆短、小筋弛長、繆短爲拘、弛長爲痿、所謂繆短者、大
筋受熱、則縮而短、故拘攣而不伸、所謂弛長者、小筋受濕而
引長、故痿弱而無力、是筋之寒熱、偏盛皆爲足之病、後人名
之曰、腳氣是也、

受熱者、枳實清火湯

受熱枳實 三錢

大黃 二錢

牡蠣 二兩

山查 三錢

羚羊角 二錢

澤瀉 三錢

受寒者木瓜去濕湯

木瓜 八錢

當歸 二錢

何首烏 三錢

川椒 一錢

附子 二錢

乾薑 一錢

筋熱骨寒者補腎涼肝湯

破故紙 五錢

核桃肉 五錢

附子 一錢

黃柏 三錢

山查 三錢

牛膝 三錢

筋寒骨熱者温肝清腎湯

木瓜 五錢
五味子 一錢

牡蠣 二兩
秋石 五分

疝

觀草 三錢 薑 三錢 車前子 三錢

經云、小腹痛、不得大小便、病名曰疝、得之寒、疝者寒氣結聚之所為也、疝者睪丸連小腹急痛也、又云肝脉滑甚為癢疝、心脉微滑為心疝、腎肝滑甚為癢癢、滑為陽氣盛、微有熱、已指明疝有寒熱、當分陰陽而治、

寒疝宜用烏頭桂枝湯

烏頭 五錢

乾薑 二錢

吳茱萸 二錢

桂枝 三錢

胡椒 二錢

巴豆霜 三分

熱疝宜用龍膽瀉肝湯

龍膽草 三錢

澤瀉 三錢

車前子 三錢

柴胡 三錢

地黃 八錢

甘草 二錢

外熱內寒者歸芍湯

當歸 三錢

厚樸 三錢

木瓜 三錢

芍藥 三錢

滑石 八錢

甘草 二錢

外寒內熱者瀉心湯

半夏 三錢

乾薑 二錢

白朮 三錢

連翹 三錢

知母 三錢

黃柏 三錢

內外惡寒發熱者宜陰陽雙解湯

麻黃 二錢

丁香 二錢

木通 三錢

猪苓 三錢

陳皮 三錢

茴香 二錢

車前子 三錢

澤瀉 三錢

淋濁

淋之爲病、小便痛澁滴瀝、欲去不去、欲止不止者、是也、濁則
下凝如膏糊、或如米泔、或如粉糊、或如赤膿者、是也、經云思
想無窮、所願不得、意淫於外、入房太甚、宗筋弛縱、發爲筋痿、
及爲白淫、白淫卽淋濁也、

陽虛者薑附湯

乾薑 二錢

附子 三錢

白朮 三錢

當歸 三錢

麻黃 二錢

木瓜 三錢

陰虛者導赤散

生地 八錢
澤瀉 三錢
車前子 三錢

梔子 三錢
黃芩 三錢
甘草 二錢

肝熱胃寒者附子瀉心湯

附子 二錢
乾薑 二錢
防風 三錢

火熾大黃 二錢
黃芩 三錢
黃柏 三錢

心寒肺熱者麻黃薏苡湯

麻黃 二錢
薏苡 一兩

苦杏仁 五錢
甘草 二錢

遺精

遺精一症、有有夢而遺者、有無夢而遺者、有夢而遺者、乃少年多慾之人、或心有妄思、或外有妄遇、以致君火搖於上、相火熾於下、則水不能藏、而精隨以泄、是火旺也、無夢而遺者、乃陽虛不固、思慮勞倦、精滿而溢、是水旺也、人之體氣、陰陽和平者、無病、一有偏盛、卽病、旦旦而伐之、固患水虧、火旺之症、久節房事、而服滋陰補血之藥、則水盛、火衰、而患陽虧之矣、此乃陰陽之大道、知之則強、不知則弱也、

有夢而遺者清心降火湯

地黃 一兩

知母 三錢

黃柏 二錢

天冬 二錢

麥冬 三錢

秋石 五分

無夢而遺者扶陽補氣湯

破故紙 五錢

核桃肉 五錢

龍骨 三錢

附子 三錢

肉蓯蓉 三錢

五味子 一錢

外熱內寒而遺者清肺補心湯

黨參 五錢

石斛 三錢

丹皮 三錢

遠志 三錢

陳皮 三錢

荔枝肉 三錢

外寒內熱而遺者補肺益心湯

黃耆 三錢

白朮 三錢

白芷 三錢

牡蠣 二兩

知母 三錢

黃柏 三錢

府寒藏熱表裏皆虧者十全大補湯

附子 一錢

黨參 五錢

高麗參 三錢

肉苁蓉 一錢

肉桂 一錢

朮 三錢

丹參 三錢

鹿角膠 二錢

知母 三錢

貝母 一錢

龜膠 二錢

鱉膠 一錢

陽痿

四兩 丹史 二兩 桑白史 二兩

經云、足厥陰之筋病、陰器不用、傷於內則不起、傷於寒則陰縮入、傷於熱則縱挺不收、是陽痿亦宜分寒熱而治、不可以陽痿為命門火衰而專用溫補也、

陽虛者溫腎補氣丸

肉蓯蓉

二兩

巴戟天

四兩

龍骨

三兩

破故紙

二兩

五味子

二兩

陽起石

二兩

附子

二兩

乾薑

二兩

遠志

四兩

其和為丸每服三錢淡鹽湯下

陰虛者還少丹

地黃 四兩 枸杞 二兩 淫羊藿 四兩

山藥 二兩 牛膝 二兩 澤瀉 二兩

黃柏 三兩 知母 二兩 秋石 一兩

其和為丸

腎虛肺熱者補腎潤肺丸

黨參 四兩 丹皮 四兩 桑白皮 二兩

淫羊霍

四兩

遠志

三兩

肉苁蓉

三兩

陽起石

二兩

鹿角膠

二兩

烏賊魚骨

二兩

共和為丸

肺寒腎熱者補肺滋腎丸

巴戟天

四兩

蛇床子

二兩

五加皮

二兩

川芎

二兩

羚羊角

二兩

地骨皮

二兩

龜板膠

二兩

鱉甲膠

二兩

共和為丸

內外忽寒忽熱藏府皆病者十全大補丸

黃耆 四兩 破故紙 二兩 桑螵蛸 二兩 續斷 二兩

黨參 四兩 山藥 四兩 海螵蛸 三兩 丹參 三兩

烏梅 二兩 山查 二兩 何首烏 三兩 元參 三兩

共和為丸

小便

熱結膀胱不通者清心飲

猪苓 三錢 茯苓 三錢 澤瀉 三錢

滑石 五錢

甘草 二錢

黃芩 三錢

寒氣凝結癰閉者補氣湯

陳皮 五錢

遠志 三錢

五味子 一錢

附子 三錢

桂枝 三錢

白朮 三錢

小便遺尿者尿出不自知也

陽虛者補氣湯

肉苳蓉 三錢

當歸 二錢

兔絲子 二錢

蛇床子 二錢

巴戟天 三錢

烏藥 一錢

陰虛者知柏地黄湯

地黄 八錢

澤瀉 三錢

丹皮 三錢

知母 二錢

黃柏 二錢

山茱萸 二錢

外熱內寒者潤肺補腎湯

桑白皮 三錢

滑石 五錢

甘草 二錢

桃仁 三錢

當歸 二錢

陽起石 五錢

外寒內熱者補肺滋腎湯

丁香 二錢

吳茱萸 三錢

五加皮 三錢

苦參 三錢

木通 二錢

蚯蚓 一錢

內外惡寒發熱者表裏雙解湯

桂枝 三錢

防風 三錢

遠志 三錢

破故紙 三錢

葶藶 三錢

滑石 五錢

知母 三錢

桑螵蛸 三錢

腎囊濕痒陰腫等症除按脉之寒熱服藥外另用洗藥

陽虛者乾薑蛇床子煎湯洗

陰虛者白礬甘草煎湯洗

泄瀉

經云、虛邪之中人也、留而不去、傳舍於腸胃、多寒則腸鳴、殞泄、食不化、多熱則溏出糜、是言寒熱也、胃中熱、腸中寒、是言上實下虛也、胃中寒、腸中熱、是言上虛下實也、經訓何等明白、而後人名之曰、濕泄、濡泄、風泄、暑泄、火泄、熱泄、虛泄、殞泄、酒泄、痰泄、食積泄、脾泄、腎泄、脾腎泄、膿泄、洞泄、久泄、頭緒愈多、治法愈難、其實不過寒熱而已、

熱泄者黃連清心飲

黃連 二錢

地黃 八錢

梔子 三錢

芍藥 三錢

滑石 五錢

甘草 一錢

寒泄者桂附補氣湯

桂枝 三錢

附子 三錢

乾薑 一錢

黃耆 五錢

陳皮 三錢

厚樸 二錢

外熱內寒者當歸澤苓湯

滑石 八錢

澤瀉 三錢

猪苓 三錢

當歸 三錢

苦杏仁 三錢

金櫻子 三錢

外寒內熱者薑連飲

乾薑

一錢

白朮

三錢

木香

一錢

連翹

三錢

知母

三錢

黃芩

三錢

秘結

大便秘結古方書有虛秘風秘氣秘熱秘寒秘濕秘熱燥風

燥陽結陰結之說立名太多徒資疑惑所最要者不過陰陽

兩結及外寒內熱內寒外熱而已

陽結者承氣湯

大黃

二錢

黃連

一錢

芒硝

二錢

厚樸 二錢

枳實 二錢

石膏 五錢

陰結者烏附散

烏藥 二錢

乾薑 二錢

桃仁 三錢

附子 三錢

巴豆霜 三分

肉桂 一錢

外寒內熱者乾薑大黃湯

乾薑 二錢

防風 三錢

丁香 一錢

大黃 三錢

枳實 三錢

芒硝 一錢

外熱內寒者桃仁花粉湯

桃仁 三錢
遠志 三錢
厚樸 一錢

天花粉 三錢
丹皮 三錢
澤瀉 二錢

痔瘡

痔瘡一症無不起於飢飽勞傷起居不節酒色過度諺云十人九痔重者脫肛形狀不同病名亦異然皆不外乎陰陽之盛衰好酒者戒酒好色者戒色然後再分陰陽以施治自可見效若不肯禁忌則為終身之累無脫體之時矣

陰虛者涼血地黃湯

地黃 八錢

槐花 四錢

芍藥 三錢

黃柏 三錢

知母 三錢

甘草 二錢

陽虛者補中益氣湯

黃耆 五錢

桂枝 三錢

遠志 二錢

破故紙 三錢

核桃肉 五錢

乾薑 一錢

外熱內寒者補心潤肺湯

丹皮 三錢

生地 八錢

甘草 一錢

何首烏 三錢

紫苑 三錢

五味子 一錢

外寒內熱者補肺益心湯

白芷 三錢

赤石脂 三錢

黃耆 三錢

槐實 三錢

黃柏 三錢

牡蠣 二兩

痢疾

痢疾、即內經之所謂腸澼也。經云、食飲不節、起居不時者、陰受之、陰受之則入五藏、入五藏則臍滿閉塞、下為殮泄、久為腸澼、脾脉外鼓沉、為腸澼、久自已、肝脉小緩、為腸澼、易治、腎脉小搏沉、為腸澼、下血、血温身熱者死、心肝澼亦下血、二藏

同病者可治其脉小沉濇爲腸澼其身熱者死熱見七日死大便赤瓣飧泄脉小手足寒者難已飧泄脉小手足溫者易已陰陽虛腸澼死腎移熱於脾傳爲虛腸澼死泄而脉大脫血而脉實皆難治腸澼便血身熱死寒則生腸澼下白沫脉沉則生脉浮則死腸澼下膿血脉懸絕則死滑大則生腸澼之屬身不熱脉不懸絕者滑大則生懸濇者死

內經重言痢疾之生死則此病之難治可知後世以赤痢爲熱白痢爲寒有赤白痢膿血痢噤口痢休息痢風痢

寒痢、濕痢、虛痢、熱痢、氣痢、積痢、久痢、疫痢、蠱疰痢、五色
內痢、裏急後重等名目，治法得失各半，未能盡善，皆由於

未通脉理故耳。

陽虛者附子理中湯

附子 三錢

乾薑 一錢

當歸 三錢

桃仁 二錢

陳皮 三錢

白朮 三錢

陰虛者清心涼膈散

連翹 三錢

黃柏 三錢

梔子 一錢

石膏一兩
甘草二錢
芍藥三錢

外寒內熱者木香黃連湯

木香三錢
乾薑二錢
赤石脂三錢

黃連二錢
黃芩三錢
嬰粟殼三錢

外熱內寒者烏梅滑石湯

烏梅三錢
苦杏仁三錢
陳皮三錢

滑石八錢
甘草二錢
葶藶二錢

內外惡寒發熱者表裏雙解散

草果 三錢
丹皮 三錢
龍骨 三錢
滑石 五錢

砂仁 二錢
芍藥 三錢
赤石脂 三錢
黨參 三錢

何首烏 五錢
黃連 二錢
白頭翁 二錢
金櫻子 三錢

海螵蛸 三錢
桑螵蛸 三錢

方劑分兩乃示人以規矩，如外寒重者，辛溫之藥宜加，內熱重者，苦寒之藥宜加，外熱重者，辛涼之藥宜加，內寒重者，苦溫之藥宜加，亦有病輕寒熱不現者，須憑脈以分其陰陽，不可以呆方治病也。