

卷六



傅氏眼科審視瑤函卷之六

數集目錄

迎風冷淚症

河間當歸湯

阿膠散

枸杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散

白殭蠶散

真珠散

無時冷淚症

菊睛丸

麝香散

無時熱淚症

當歸飲子

椒芋丸

醫見... 卷之六目錄

些帷爛症

風通聖散

東垣碧天丸

紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散

疏風散濕湯

治爛弦眼生蟲方

敷爛弦眼方

因風症

正容湯

半夏茯苓天麻湯

夜光柳紅散

加減地黃丸

豆淋酒法

蟬花無比散

槐子丸

川芎石膏散

摩風膏

因毒症

內疎黃連湯

滋陰解毒湯

因他症

前胡犀角飲

蒼蔚子丸

明目大補湯

東垣清神益氣湯

順經湯

磁石丸

羊肝丸

物損真睛症

加味四物湯

局方黑神散

經効散

一線散

懸骨飛揚症

翠瓶西法

飛經
目症

經効三法

時復症

洗肝散

洗心湯

瀉肺湯

六味地黄湯

通明散

東垣羌活除翳湯

明目流氣飲

神仙退雲丸

天王補心丹

加味六味地黄丸

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯

七宣丸

神功丸

小柴胡湯

二陳湯

溫白丸

川芎茶調散

四物湯

涼膈散

三黃丸

四季三黃瀉心丸

青州白丸子

瓜蒂散

茶調散

導痰湯

保命集當歸湯

保命集羚羊用散

濟陰地黃丸

秘製點眼丹藥諸方

靈飛散

五膽膏

宋真宗皇帝勅封瓊液膏

紫金錠子

丹陽藥品法製

陰丹藥品法製

配合陰陽法式

用丹頭大要

不換金撥雲丹

秘授製蘆甘石法

煮薑甘石三黃湯藥

取永粉法

製礪砂法

眼科取靈砒法

爛翳方

點翳膜老障翳方

收淚散

敷眼諸藥方

玉龍丹

散血膏

清涼膏

搜風散

洗眼諸藥方

神仙碧霞丹

洗爛弦風赤眼

洗眼紅棗兒

治眼吹藥諸方

立應散

碧玉散

青火金鍼

赤火金鍼

通頂散

止痛藥方

乳香丸

神仙拈痛散

傅氏眼科審視瑤函卷之六目錄終



傅氏眼科審視瑤函卷之六

株陵傅仁宇九科纂輯

廣陵林長生聲震較補

婿張文凱廷獻泰閣

男傅維藩國棟編集

甥張秀微訂正

公猷

掄

全次

大梁周靖公亮節較梓

體仁

顓

運氣原證

按內經運氣淚出皆從風熱經云厥陰司天之政三之氣天政

布風乃時舉民病泣出是也

目淚

靈樞黃帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰心者

五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也目
鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六
腑皆搖瑤則宗脈感宗脈感則液道開液道開故涕泣
出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣
滋不止則液竭液竭則精不灌精不灌則日無所見矣
故命曰奪精補天柱經俠頸俠頭中分也又曰五臟
六腑心為之主耳為之聽目為之視肺為之相肝為之

榮脾爲之衛腎爲之主故五臟六腑之津液上滲於目
心悲氣并則心氣急則肺舉而泣出矣素
夫心氣與肺不能常舉乍上乍下故欬而泣出矣素
問解精微論曰厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上
陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰氣并於下則足
寒足寒則脹夫一水不勝五火故目昏是以氣衝風
泣下而不正夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燭
目故風見則泣下有喻比之夫火疾風生乃能由此之
類也○東垣云水附木熱上爲眼溼爲眵爲
冷淚此皆由肺金之虛而用木寡於畏也

迎風冷淚症

迎風冷淚水木但虛血液不足寒藥勿施失治則重宜早補之
此症謂見風則冷淚流若赤爛有障翳者非也水木二經血
液不足陰邪之患久而失治則有內障視眇等症生焉與無
時冷淚不同此爲竅虛因邪引邪之患若無時冷淚則內虛
膽腎自傷之患也此宜服

河間當歸湯

治風邪所傷寒中目
淚自出肌瘦汗不止

白米炒

白茯苓

乾薑炮

細辛

川芎

白芍藥

甘草

炙各五分

官桂

陳皮各一錢

當歸身酒製

人參

各二錢

右爲劑水二鐘薑一片燂棗三枚煎八分去滓熱服不計時

併三服

阿膠散

治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也

阿膠

馬兜鈴各兩半

紫菀

款冬花

糯米各一兩

白蒺藜炒二錢半

甘草

五分

右爲細末每服二錢水一鐘煎不拘時服

枸杞酒

治目視不明迎風冷淚

枸杞子

揀肥者一觔杵爛右用絹袋盛貯須浸酒訖蜜封勿令泄炙候三七日取飲

陳無灰酒十觔

仍用猪肝煮熟切片蘸花椒鹽同食每飲酒一二盃勿官過
飲不但不効反佐濕熱爲害不淺矣

按肝氣通於目肝和則能辨五色矣今肝爲勞傷致目視不
明多出冷淚經曰味爲陰味厚爲陰中之陰枸杞子味厚故
足以養厥陰之陰煮以純酒取其液治氣血而已

迎風熱淚症

迎風熱淚出肝虛爽火來水中起隱伏久則或因災但此症不
論何時何風見之則流熱淚若有刑症及風氣者非也乃肝
膽腎水之津液不足故因虛竅不密而風邪引出其淚也中
有隱伏之火發故淚流而熱久而不治及有觸花則有變矣
宜服

羚羊角散

治肝臟受熱眼目
昏花時多熱淚

羚羊角細 羌活 玄參 車前子 山梔仁

黃芩 瓜瓞各五錢 胡黃連 家菊花各三錢 細辛一錢

右為細末每服二錢食後竹葉煎湯調下

白殭蠶散治衝風淚出

白殭蠶炒 粉草 旋覆花 細辛

木賊草各五錢 嫩芥二錢半 嫩桑葉一兩

右為細末每服二錢白水煎食後溫服

珍珠散治肝虛目風淚出

珍珠另研 丹砂研各二分 乾薑研二分 貝齒火煨水卒乾研一兩

右共研極細令勻以熟絹帛籠三遍每仰臥以少許點眼中

閑少時為妙

無時冷淚症

香見...

無時冷淚水不俱傷此幽陰之深患其爲病也非常然斯疾各出不意非毒疴則內障爲殃

此症爲目無赤病也只是時常流出冷淚久則視瞻昏渺非比迎風冷淚因虛引邪之輕者此蓋精液耗傷肝氣漸弱精膏澀枯腎水不足幽陰已甚久而失治則有內障青膏之患精血衰敗之人及悲傷哭泣久鬱婦人產後悲泣太過者每多此症且爲禍又緩人不爲慮往往罹其害而禍成也悔已遲矣宜服

菊睛丸

治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠常見黑花多有冷淚久服補不足強肝腎

甘菊花

去梗葉
四兩炒

巴戟

去心
一兩

肉菴蓉

酒洗去皮炒
切焙乾一兩

枸杞子

搗焙
三兩

右爲細末煉蜜爲丸如同子大每服三錢溫酒或青鹽湯空

心食前送下

麝香散

治眼冷淚
不此啗鼻

香附子

川椒目

各等分

蒼木

麝香

各少許

右爲細末令病者噙水一口將藥吹於鼻內

無時熱淚症

無時熱淚其禍幽微此損耗中之伏隱乃不足中之有餘服寒涼則傷汁損血服熱藥則血壅難舒當以意中求趣補益當而消除

此症謂曰無別病止是熱淚無時而常流也若有別病而熱淚出者乃火激動其水非此病之比蓋肝膽腎水耗而陰精虧澀及勞心竭力過慮深思動其火而傷其汁也故膏液不足又哭泣太傷者每每患此久而失泊觸犯者變爲內障因

其為患微緩羅其禍也多矣宜服

當歸飲子

當歸身

人參

柴胡

黃芩

甘草

白芍藥

大黃

各一錢

滑石

五分

右剉劑水二鐘生姜三片煎至八分去滓溫服

椒芋丸

治目昏多淚

熟地黃

切焙乾

川椒

去目及閉口者微炒

生地黄

切焙乾

右三味各等分為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十九粒

米飲空心送下

江陵傅氏家貧鬻紙為業好接待遊士一日有客方中布袍邀傅飲傅日昏多淚客叫以此方服不一日目能夜視

物三年八九十聰明不衰

感沿

月谿云風沿眼系此膈有積熱自飲食中挾怒氣而成頰痰痞寒濁氣不下降清氣不上升由是火益熾而水

臨降積而火也。眼沿四臙漬而腫於中生細小虫。遂
年火不愈而多癢者是也。用紫金膏以銀釵助搯去油
膩點之。試問若果癢者又當去虫。以絕根本。蓋紫金膏
只去濕而去風涼血而已。昔前所謂飲食挾怒成痰。又
須更與防風通聖散去硝黃為綱。末以酒拌勻曬
乾。依法服之。禁諸厚味及大料物。方盡諸法之要。

皆睢赤爛症

皆睢赤爛人皆有之。火土燥濕病有重輕。重則皆睢裂而血出
輕則弦赤爛而難舒。以清潤而為治。何病患之不除。

此症專言皆之赤爛。目無別病也。若目有別病而赤爛者及
因別火致傷其皆。又非此比。赤勝爛者多於勞心憂鬱。分悖
無形之火所傷。爛勝赤者多於恣燥者。酒哭泣過多。冒火冲
烟風熱蒸薰。有形之火所傷。病屬心絡甚則火盛而生瘡於
皆邊也。要分大小二皆。相火君火虛實之症。宜服點洗。

防風通聖散

并治中風一切風熱大便秘結小便赤澀眼目赤
痛或熱急生風舌強口噤或鼻生紫赤風刺慮疹

而為肺風或成風厲而世呼天麻風或腸風為痔瘡或腸癰而為諸熱謔妄驚狂並苦治之

防風 川芎 大黃 赤芍藥 連翹

麻黃 去節 芒硝 蘇薄荷 當歸 滑石 投過

甘草 梔仁 炒 荆芥穗 白朮 桔梗

石膏 煨 黃芩 各分

右為麤末每服四錢薑三片水二鍾煎食連溫服

按防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之出汗而泄荆

芥薄荷清上藥也風熱之在顛頂者得之由鼻而泄大黃芒

硝通利藥也風熱之在腸胃者得之由後而泄滑石梔子水

道藥也風熱之在決瀆者得之由溺而泄風淫於膈肺胃受

邪石膏桔根清肺胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火

風之為患肝木主之川芎當歸和肝血也而甘草白朮又所

以和胃氣而健脾劉守真氏長於治火此方之旨詳具悉哉

如目兩臉潰爛或生風粟白睛紅赤黑睛生翳障家菊花黃

連羌活白蒺藜名曰菊花通聖散人弱大便不結燥者減去硝黃

東垣碧天丸治目疾屢服寒涼不愈兩日黑熱有如次薰赤而

上下臉赤爛或不伏風土而內外脫背皆破以此

瓦粉炒一兩 桐綠七分 枯白礬二分

右研銅綠口礬令細旋旋入瓦粉研目熱水和之共為丸如

黃豆大每用一丸熱湯半盞浸一二時長洗至覺微瀼為度

少閉眼半個時辰許臨臥更洗之瞑目就睡尤為神妙一丸

可洗二三日可在湯內炖熱此藥治其標為裏熱已去矣裏

實者不宜用此當瀉其實熱

紫金膏用水飛過號丹壘多水少文武火熬以器盛之照

醫見留... 卷之六

迎風赤爛症

迎風赤爛邪在肝因虛被克木相傳久不愈兮成赤爛赤爛風
弦治又難

此症謂目不論何風見之則赤爛無風則好者與風弦赤爛
入脾絡之深者不同天風屬木水強土弱弱則易侵則邪引
邪因外夾攻土受木尅是以有風其病無風則愈赤爛者上
木之病也赤者木中火症爛者土之濕症苦痰若濕甚者爛
勝赤若火若燥甚者赤勝爛心承肺承者珠亦痛而赤焉此
章專言赤爛之患與前章迎風冷熱淚入內之深者又不同
宜服洗

柴胡散

治眼眶澀爛因風
而作用氣藥燥之

柴胡

防風

赤芍藥

荆芥

羌活

桔梗

生地黄

甘草

百各等分爲細末每服三錢白水煎溫服

疏風散濕湯

赤芍藥

黃連

防風

銅綠

川花椒

當歸尾

輕分

羌活

伍倍子

荆芥

膽礬

明礬

右爲一處水三鐘煎至一半去滓外加銅綠泡化後入輕粉

攪勻湯膠甲綿紙濾過澄清可用手蘸洗目爛濕處

方治爛弦
血風眼

覆盆子

不拘多寡去根日晒乾研令極細薄綿裹之以

點目中即仰臥不遇三四日

視物如少年忌酒麪油膩物
宋宗室趙太尉乳母苦爛弦風眼近二十年有賣藥老婦
過門云此眼有虫其細如絲色赤而長久則滋生乃入山

審視

取此藥咀嚼之而留汁滓存於竹筒內以皂紗蒙乳母眼
取筆畫雙目於紗上然後滴藥汁清取下弦轉勝聞由從
紗中出共數十條後眼弦肉常如常太醫上官彥謙之
有隋婦亦患此症試之無不立瘥考之本草陳藏器云此
藥治眼暗不明冷淚淫不止
及青盲等恙蓋治眼妙品也

治爛弦眼生蟲方

覆盆子葉為末一錢

乾薑燒灰

生礬各半

枯礬一分

共研一處蜜調用絹片做膏藥貼眼上一夜次午揭起其蟲

自出粘在絹上次晚再將肥猪肉切片貼眼上一宿即愈

敷爛弦眼方

蘆甘石煨飛過一兩

飛丹五錢

枯礬二錢五分

明珠砂研細一錢

銅綠二錢

共為一處研極細為度先用荆芥陳茶葉煎水洗患處乘濕

將藥敷上一二三立愈

諸因內外諸因種種不一有鬱七情六淫傷感過度而致者
其症隨愈適復晨靴細治有外受風邪燥火剋制致未

衛失調而滄滄濕濕膠膠昧不清宜貴宜和服補劑之類
因他症侵乘及物傷等症累目眩內外輕重各分其類
總之火鬱者宜疏之氣滯者宜導之燥甚風邪
宜審虛實調之庶不至客邪延久成固疾已

因風症

風兮風兮禍何多未傷人身先損目有因脾反爛弦紅有致偏
喎竝振搖有成內障目昏盲有生外障多齧肉內外輕重皆不
同比之常症猶難逐驅風活血養陰精勝似求仙去問卜

此症調患風病人而目病也蓋風屬木木爲肝肝之竅在日
木乎一氣火風則熱盛何也木能生火也火盛則血因風火
久而不熄遂致耗損矣况火病必生鬱鬱則又生火火注土
炎火熱極而又生風展轉相生內外障翳皆起于此故患風
太之病各因其故而發之有日淺而鬱未深爲偏喎益斜者
有入脾而脾反濕赤勝爛者有血虛筋弱而振搖者有恣燥

嗜熱火邪乖亂清和融純之氣因鬱而爲內障者有風勝血
滯結爲內障如努肉等症者再加以服餌香燥之藥就酒縱
辛不善保養以致陰愈虧而火愈燥火愈燥而風愈勝病變
爲凝滯之重者治當各因其證而伐其本且外內常却不同
大抵若因風病目者當去風爲先清火次之不然源旣不清
流何能止目病今雖暫退後必復來治之雖至再至三風不
除而火不熄目終無不發之理矣宜服

正容湯

治目眼瞶邪儀容不正服此卽能正之故云

羌活

白附子

防風

秦艽

膽星

白僵蠶

半夏製

木瓜

甘草

黃松節

卽茯神心木各等分

右判劑白水二鐘生姜三片煎至八分去滓加酒一盃服之

右方祛風以羌防化痰須星夏生草清熱秦芫榮筋面部需

白附殭蠶舒筋急資木瓜松節薑散風邪酒行藥勢此方服

十劑平服如故敢陳一得願獻知音

半夏茯苓天麻湯治痰厥頭痛頭眩眼黑頭悶惡心氣短促言

如裂身重如
山四肢厥冷

天麻 黃芪蜜製 人參 蒼朮泔水製 橘皮

澤瀉 白茯苓 炒麩各五分 白朮錢炒 黃檗酒製二分

乾薑泡二錢方二分 半夏姜炙

右剉劑白水二鐘煎至八分去滓食後服

此頭痛為定水頭目厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛

內作非天麻不能除天麻苗謂之定風草乃治內風之神氣

內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人

參甘溫調中補氣瀉火二朮甘溫除濕補中益氣澤瀉茯苓
利小便導濕橘皮苦溫益氣調中而升陽炒麩消食蕩胃中
之滯氣麥芽寬中而助胃氣乾姜辛熱以調中寒黃蘗苦寒
用酒洗以療之冬日少火在泉而發燥也

夜光柳紅散

治風邪傷胞險致風牽
臉翻不收由淚汪汪者

人參

荆芥穗

川烏

川白芷

南星製

軟石膏

川芎

各一兩

何首烏

草烏

去皮

石決明

炮

藁木

川細辛

當歸身

雄黃

蘇薄荷

蒲黃

防風

茅蒼朮

浸炒

甘松

霍香葉

全蠍

各一兩半

川羌活

三兩

右爲細末每服二錢或三錢茶清調下

加減地黃丸

治男婦肝臟積熱肝虛目眩膜入水輪漏睛翳淚
眼見黑花視物不明濕睛冷淚緊膜遮障及昏翳

虛憊肝受虛熱及遠年日進暴熱赤眼風毒氣眼虛則者
兼治乾濕脚氣消中消渴及諸風氣等波由腎氣虛則者

但眼此能補肝益

腎驅風明目神効

生黃

乾者一斤熟地

乾者一斤

石斛

去苗

汚風

去苗

枳殼

麩炒

牛膝

酒洗

杏仁

泡去皮尖麩炒黃入
瓦器研去油各四兩

右為細末除杏霜另入勿犯鐵器煉蜜為丸如梧桐子大每

服五十丸空心以豆淋酒送下或飯飲及清鹽湯亦可忌一

切動風毒等物

豆淋酒法

黑豆半升揀簸炒令烟出以炒不斤浸之不用黑豆用此

酒煮獨活即是柴湯也

唐公氣李恭全在居從蜀中目患眼成羅或生翳膜或疼

痛或見黑花如豆火雲氣絨絨不斷或見如飛蟲翳羽百

方治之不効有指智深云相公此病由受風毒夫五臟實

則瀉其之並則補其母母能令子實子能令母虛腎是子

然脚氣消中消渴諸風等症皆由腎虛地黃丸主之

蠅花無此散 治大小男婦遠年迎日一切風眼氣眼攻注眼目

明及久患而正頭風牽搐頭眼漸細小速眩赤爛小

鬼瘡珍入下自膜遮睛赤浸瘧痛常服驅風退翳明目

白茯苓 防風 甘草 蛇脫 蟬脫 川芎

赤芍藥 蒼朮 羌活 當歸 白蒺藜 石決明 除石決

茶清亦可忌食發風毒等物

梔子丸 治疔虛風邪

槐子仁 酸棗仁 蔓荊子 覆盆子

柏子仁 白蒺藜 車前子 牛旁子

梔子丸 治疔虛風邪

槐子仁 酸棗仁 蔓荊子 覆盆子 柏子仁 白蒺藜 車前子 牛旁子

羌蔚子

各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十丸空心白滾

湯送下

川芎石膏散

治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘救鼻塞口瘡煩渴林閉眼生翳膜此藥清神到頭目

石膏

煨

防風

蘇薄荷

連翹

各一兩 桔梗

甘草

滑石

飛過

寒水石

各二兩半

川芎

人參

當歸

黃芩

荆芥穗

大黃

炮

梔仁

炒

白朮

製

菊花

赤芍藥

各五錢

縮砂仁

炒一錢五分

除寒水石膏滑石各研細另人餘共為細末攪均每服二三

錢食遠滾白湯調服忌薑蒜辛熱等物

摩風膏

治風牽眼偏邪

白芷

黑附子

廣木香

防風

細辛

骨碎補

當歸身

藁本

各一兩

烏頭

赤芍

厚肉桂

各一兩半

牛酥

即骨隨

鷺脂

各四兩

猪板油

半斤

除酥脂板油外以上諸藥各爲細末用真麻油半斤浸一晝夜再入酥脂板油共熬以文武火熬如膏爲度塗之於患處

因毒症

人爲瘡瘍腫毒六陽壅塞勿寧血瘀氣滯不和平皆是有餘火盛水少不能制伏故教炎熾飛騰只緣肝膽未純清邪濁擾侵致病

此症指人生瘡瘍腫毒異及目痛也夫六陽火燥有餘水不能制以致妄亂無拘氣滯血壅而始發瘡瘍腫毒火性上炎目竅高火之所從泄濁能害清理之自然肝膽清淨融和之腑瘡瘍毒癰痘疹濁邪熾盛侵擾清和因其素所斲喪肝腎

有虧陰虛血少膽之清汁不克因化源弱目絡無滋故邪得以乘虛故入目爲害若病目在於病毒之時治毒愈而目亦愈若毒愈而目不愈者乃邪入至高之深處難以速退當滯其流而澄其源若急追治之因而觸激甚者必有瘀滯之變矣宜服

內疎黃連湯

治諸瘡毒皮色腫硬發熱作脞大便閉而脉洪實者攻及兩眼或一目赤痛紅腫并並

黃連

炒梔仁

黃芩

當歸

桔梗

廣木香

檳榔

赤芍藥

甘草

蘇薄荷

各入分

連翹

製大黃

各錢二分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠服

還陰解毒湯

治梅毒餘毒未清移害於肝腎以致蒸灼神水窄下兼赤絲黑白混濁不清看物昏暗不明

川芎

當歸

酒洗

生地黄

金銀花

去葉

連翹

黃芩

酒炒

土茯苓

細甘草

減半

黃連

酒炒

苦參

麥門冬

去心

白芍藥

酒洗

玄參

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

因他症

因他之症爲別病內外輕重總不定內外傷情外緣縱性不斷不喪順夫和能守能常頗清淨五味四氣慎其宜不獨目明亦長命戒慎恐懼如響如應

此症專言因害別病而累及目也所致不同有陰病而陰自傷有陽病而陽自損有寒病熱藥太過傷其神氣熱病寒藥太過耗其精血補者瀉之瀉則損其元瀉者補之補則助其邪砭針之泄散真氣炮炙之激動火邪實實虛虛損不足益有餘之爲害亦各因人觸犯或受臟腑經絡衰旺隨其所因

而入爲病內外輕重不等當驗其標而治其本譬如傷寒陽
症熱鬱蒸損瞳神內症也熱甚血滯赤瘀內澀者外症也陰
症脫陽而目昏內症也服薑附溫劑多而火燥亦澀者外症
也癩疾之熱損瞳神內症也火滯於血而赤濕外症也精瀉
液耗而膏汁不得滋潤內症也山嵐墮氣而昏者邪氣蒙蔽
乎正內症也蠱脹中滿亦痛者陰虛難制陽邪外症也氣症
拂鬱熱多昏花皆內症也痰症之臍滯火症之赤澀皆外症
也餘倣此嗚呼身之精血有眼人之斲喪無窮故虛者多實
者少明者少而渺者多若能知受養之方而不犯禁忌之戒
外不從性以傷於五味四氣內不放心於六慾七情順時氣
養天和頰立清淨之志而存恆久之心則三真不喪而六賊
潛消血克精固神定氣清陰陽和而水火濟精華盛而目力

全復何病之有哉若火火不輟綿綿若存不獨目無病而瞻
視明命亦良矣若治之須看因和症為害於目則以本症治
之難執方括亦不可拘定眼科藥法治之於傷寒陽症熱由
蒸損瞳神則看是何經之熱分表裏攻發使其熱退則目自

愈若必用眼科之藥其症壞矣餘症倣此無遺

前胡犀角飲 治傷寒兩目昏
暗少生浮翳

黃芪 一錢 蔓荊子 三分 犀角 銼末 青柏子 炒 前胡

稻仁炒 麥門冬 去心 防風 生地黄 羌活

細辛 車前子 菊花 草決明 炒各 甘草 四分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後溫服

菟蔚子丸 治時氣後目
暗又在翳膜

黃連 炒三 枸杞子

枳殼 去穰 青箱子

生地各

芫薊子

澤瀉各一兩石決明

細辛

麥門冬

去心

車前

各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢食後藥水送下

明目大補湯

治血氣俱損眼目昏花神光不足延久患眼疾服涼藥過多氣血衰澆昏瞶服此以鍾陽光壯賢水

乾熟地

酒蒸

白朮

土炒

白茯苓

焙

人參

白芍藥

當歸身

酒洗

甘草

炙

白豆蔻

取肉

川芎

黃芪

蜜炒

大附子

沉香

厚肉桂

各等分

右剉劑白水二鐘生姜一片輝棗二枚煎至八分不拘時温

服

東垣清神益氣湯

治因脾胃虛弱之人慢服洗肝散或服寒涼過多而目愈病者宜此

白茯苓

人參

白朮

製各一錢

蒼朮

泔水製

升麻

白芍藥

防風

黃蘗

鹽炒

廣陳皮

青皮

炙甘草 麥冬 去心 五味子 肥者打破 各五分

右剉劑白水二鐘煎至八分去滓温服

順經湯 治室女月水停欠倒行逆上冲眼 紅亦生翳先服調氣則血通矣

當歸身 川芎 柴胡 桃仁 泡去 烏藥

香附子 製 青皮 紅花 蘇木 赤芍

廣陳皮 玄參

右剉劑白水二鐘煎至八分去滓加酒一盃食遠温服熱甚

加酒炒黃連煎服

磁石丸 治眼因患後起早元氣虛弱目 無翳膜視物昏暗欲成內障

肉苳蓉 刮去皺皮酒浸 磁石 醋煨 淨七次 杵碎 一宿焙乾一兩 細研水飛過二兩

兔絲子 酒浸五日晒乾 巴戟 去心 遠智肉 另研爲末三兩

熟地黃 焙乾 石斛 各一兩 桂心 一兩 遼五味

廣水香

甘草 炙赤色 各五錢

除磁石兔絲子研另入餘共為細末和勻煉蜜為團仍搗二三百杵九如梧桐子大每服三四十九食前温酒送下或青

鹽湯亦可

羊肝丸

治肥人酒色太過紅筋侵目 氣毒傷肝白膜傷睛者并治

白蒺藜 炒去刺

菊花 去根

石決明 煨

生地 各一兩

槐角 炒一兩

楮實子

黃連

五味子

歸尾 各五錢

防風

荆芥穗 各二錢半

甘草 一錢

真川芎 三錢

蕤仁 去殼油 淨七錢

右共為細末用雄羊肝一具滾水沸過共前藥搗為丸每服

五六十九空心薄荷湯送下

忌椒薑辛辣燒酒等物

物損真睛症

物損真睛症傷之在目輪白黃兩般病黃暴白遲行若然傷得重損壞人瞳神總然醫得速終必欠光明

此症謂目破物觸打迫在風輪之急者故曰物損真睛有黃白二色黃者害速白者害遲若尖細之物觸傷者淺小可治若麤礪之物傷大而深及內損神膏者雖愈亦有痕跡若觸之破珠爲害已甚總然急治瞳神雖在亦難免欹側之患物雖尖小而傷治膏破者亦有細細黑顆如蟹睛而出愈後有疤每見耘苗之人竹木匠輩往往悞觸竹絲木屑苗葉在風輪而病者若飛流之物撞入而致破風輪者必致清黃牒出狀若稠痰白脂凝在風輪欲流不流此是傷破神珠外邊氣分之精膏也不可悞認爲障若神昏者瞳神有大小欹側之患久而失治目必粘凸大凡此症不論大小黃白但有流淚

赤障等病者急而有變珠痛頭疼者尤急也宜服

加味四物湯

治打損
眼目

白芍藥

川芎

當歸身

荆芥

熟地黄

防風

各等分

右咬咀為劑白水二鐘煎熟去滓再入生地黄搗汁少許溫服

外又再以生地黄一兩杏仁二十粒泡去皮尖研為細末用水調稠綿紙攤藥敷在眼上令乾
特方黑神散

熟地黄

蒲黃

歸尾

乾薑

炮

肉桂

赤芍藥

甘草

稍各等分

右為細末量病之輕重大小以童便生地黄汁相和多寡調

服

經效散

治眼因撞刺生翳疼痛無時經久不安復被物之擊兼為風熱所攻轉加痛楚不能睜開見物等症

柴胡

一兩

犀角

銚末二錢

赤芍藥

當歸尾

大黃

各五錢

連翹

甘草

稍五分 各二錢

右為末每服二三錢白水二鍾煎食遠服

綠散

治打撲傷損眼胞赤腫疼痛

芙蓉葉

生地黄

各等分

右二味共搗爛敷眼胞土或為末以雞蛋清調勻敷亦可

瞇目飛揚症

瞇目多因出路行風吹砂土入人睛頻擦頻拭風輪竅氣滯神

珠膏血凝昏昏目不爽漸漸病生成

此症因風吹砂土入目頻多揩擦以致血氣凝滯而為病也

初起磊澀赤脈次後淚出急澀漸至結翳障翳然有輕重赤
白亦因人之戒觸所致富驗形症別經絡因其形症而治其

本末也

經郊四法

孫真人治瞤目鹽與鼓置於

水中浸之視水其物立出

千金治稻麥芒入眼以新布覆眼內

將蟻蟻從布上摩之其芒自着布上

由居物落眼中用

新筆蘸水激出

又方用上好金墨

研濃點之立出

飛絲入目症

遇破遊絲入目皆緣沒意隄防模糊眸子淚如湯澀急壅瘀腫
脹那更羞明怕熱頭疼珠痛難當金蚕老鸛定珠陽惡毒無這

樣

此症謂風颺遊絲偶然撞入目中而病痛也卽今人呼爲天
絲打眼若野蚕蜘蛛等虫之絲其患尙遲若金蚕老鶴絲其
目不出三日而珠裂破碎令人但患客風暴熱天行赤熱痛
如鍼刺一應火實之症便呼天絲入目殊不知飛絲入目乃
人自知者但迴避不及不意中被其入也入目之時亦自知
之倏然而痛淚湧難開又非木偶入豈有不知今之愚人不
度理之有無妄以已意謬呼人疾失之甚矣

經効三法

丹谿治飛絲人眼紅腫如眦痛澀不開兩鼻流清涕用金
墨濃磨以新筆塗之入目中閉目少時以手張開其絲自
成一塊看眼皮上用新筆輕輕
拭出則愈如未盡再塗此法神効
治飛絲入眼用柘樹槩點之用綿
裹筋頭蘸水於目內敷拭毒
又方飛絲入目以火麻子一合搗碎井花水
調一碗浸攪却將舌浸水中燵抹自出立効



時復症

若言時復症歲歲至期來莫言無後患終久變成災

此症謂目病不治捱熬忍待自愈或治不得當慾戒有犯觸其脈絡遂致深入又不治之致邪正擊搏不得發散之故或年之月月之日如花如潮至期而發過期而又愈久而不治及因激發者遂成其害未發問其所發之時別其病本在何經絡既發者當驗其形色經絡以別何部分此症如治之或

發於春宜服

洗肝散

治風毒上攻暴作目腫痛澀難開眩淚不絕

當歸尾

酒洗

川芎

蘇薄荷

甘草

錢半

生地

炒梔仁

羌活

龍膽草

大黃

煨

防風

各等分

右為細末每服三錢白滾湯調下

發於夏宜服

洗心湯

治心經煩熱皆赤澀

黃連

生地黄

各一錢半

木通

梔仁

各一錢

甘草

二分

菊花

當歸尾

各一錢一分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

發於秋宜服

瀉肺湯

治暴赤客熱外障白睛腫脹

川羌活

玄參

黃芩

各一錢半

桔梗

大黃

地骨皮

芒硝

各一錢

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠服

發於冬宜服

六味地黃湯

治腎虛不能制火者

熟地黄

山茱萸

去核

山藥

澤瀉

白茯苓

牡丹皮

各等分

右剉劑水二鐘煎至八分去滓溫服

以上四時雖定四方不必拘執仍須視其時定診何臟腑相

尅然後加減更變施治可也

通明散

治氣眼片人之目必患後眼其經絡喜怒哀樂之情多有傷於心肝發作不時此乃氣輪受病之故也

升麻

炒梔仁

各一兩半

細辛

川芎

白芷

防風

草決明

白芫

白欽

夏枯草

羌活

各一兩

蟬退

去頭足

楊梅皮

五倍子

各五錢

甘草 二錢

右爲細末每服三錢白水一鐘半淡竹葉七片同煎食後溫

服

腫痛赤脈從上而下太陽病者服

東垣羌活除翳湯 治太陽寒水翳膜

麻黃根 五分 薄荷 四分 生地黄 七分 川芎 當歸 身冬

黃蘗 酒製 荆芥穗 煎成 藁本 各一 川羌活 一錢

防風 一錢 北細辛 二分 知母 酒製 川花椒 五分

右剉劑白水二鐘煎至八分加荆芥穗再煎去滓食遠稍熱

服忌酒辛熱濕麪等物

腫痛赤脈從下而上陽明病者服

明目流氣飲 宿月經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明

開或生障墜倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼

蒼朮 米泔水浸 炒二錢 細辛 牛蒡子 炒 大黃 煨

川芎 防風 梔仁 炒 白蒺藜 炒去 黃芩

菊花 蔓荊子 甘草 炙 木賊 玄參 各一

草決明錢炒

右剉劑白水二鐘加酒一小盃煎至八分去滓臨睡温服

腫痛赤脈從外走內少陽病者服

神仙退雲丸治一切翳膜內外等障昏無光者

荆芥穗 蛇脫 密蒙花各二錢此三味同什草焙乾揀去甘草不用

川芎 當歸身各兩半 蘇薄荷不見水 枳實 犀角銼末酒蒸

川練子 蟬退去頭足洗 家菊花各五錢 生地酒洗 羌活

白蒺藜炒去刺 地骨皮炒各三錢 萸仁生用六錢 木賊草去節二兩蜜覆浸一宿焙乾

右爲細末煉蜜爲丸每一兩重分作十九丸米泔湯調服日進

二三丸俱食後服婦人用當歸湯化下有氣者廣木香湯化

下使之在人消息活變

天王補心丹治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡不眠致目疾久而不愈等症能清

三焦化痰延去煩熱除
驚悸療咽乾養育心神

當歸身 酒洗

天冬 去心

栝子仁 炒

麥冬 去心

酸棗仁 炒各三兩

丹參 微炒

揀人參 去苦

玄參 微炒

白茯苓

遠志 去水炒

遼五味 烘乾

楮梗 各五錢

生地黄 酒洗四兩

長砂 五錢研細為衣

石為細末煉蜜為丸栝梧桐子大空心每服三錢白滾湯送下或龍眼湯俱佳

忌胡荽大蒜蘿蔔魚腥燒酒

心者神明之官也憂愁思慮則傷心神明受傷則主不明而十二官危故健忘怔忡心主血益燥則津枯故大便不利口為心之外候心火炎上故口舌生瘡是在以生地為君者取其下入足少陰以滋水主水盛可以伏火况地黄為血分要

藥又能入手少陰也棗仁遠志柏仁養心神者也當歸丹參
玄參生心血者也二冬助其津液五味收其耗散參苓補其
氣虛以桔梗為使者欲載諸藥入心不使之速下也目病
日久不瘥以致虛甚可間服後加味地黄丸並進

加味六味地黄丸

滋陰固精明目不寒不
熱平和之劑久服延年

懷生地

酒製
八兩

茯苓

乳拌
乾

山萸肉

酒洗
焙乾

山藥

各四
兩

牡丹皮

酒洗
炒

澤瀉

各三
兩

枸杞子

焙乾

菊花

各六
兩

遼五味

焙一
兩半

蒺藜

炒去刺
五兩

除地黄膏另入餘為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢錢

空心淡鹽湯送下虛甚者地黄丸內在加紫河車一具酒洗

極淨磁罐內酒水煮爛搗如泥或焙乾為末入丸臨晚睡服

天王補心丹

正頭風及腦痛

三方朝夕並服久久自効今之治目多補腎不知補心然心者君火也

眼科針灸要穴圖像



此症針後或一二月再發如前痛甚但頭爲諸陽會首宜先補後瀉又宜瀉多補少或錯補瀉再發愈重當再針百會合

目 眼 症 斜

合谷上星三穴瀉之無不効也舉發另刺上星太陽
 正頭痛旦發夕死夕發旦死醫用心刺遠如不然難治也端
 的正頭風十死之症又明腎厥頭痛



此症皆因醉後睡臥當風串入經絡痰飲灌注或因怒氣傷

肝房事不節宜先刺頰車合谷地倉人中如不愈再刺地倉
合谷承漿童子窮

頭頂痛



此症乃陰陽不分風邪串入腦戶故刺不効先取其痰後去
其風自然効也宜先刺百會後頂台谷不効再刺風池合谷

三里

一星二六氣之無不效也舉醫民陳士星大則

頭風目眩

草

風池

人昆口

三里

曲登隆

解溪

此症為因醉飽行房未避風寒而臥賊風入於經絡宜刺解
谿合多豐隆再發後刺風池上星三里

審見論
卷之十一

十一



外障眼

此乃頭風灌注瞳人血氣湧溢上盛下虛故得此疾宜刺太陽睛明合谷小骨空不効再刺臨泣攢竹三里



迎風冷淚

攢竹



此症一乃醉後當風或暴赤眼痛不思房事恣食熱物婦人多
 因產後當風坐視賊風串入眼中或行經與男子交感穢氣

暴赤腫眼痛

冲於頭目故成此疾宜刺攢竹合谷大骨空小骨空如未愈全再刺小骨空



此症乃時氣所作血氣壅滯當風睡臥饑飽勞役宜先刺谷三單太陽睛明不效後再刺攢竹太陽絲竹空

丙 障 眼

臨泣

睛明

太陽

風池



此症乃怒氣傷肝血不就舍腎水枯竭血氣耗散初病不謹
 恣貪房事用心過多故得難治先刺臨泣睛明倉谷瞳神子

窳如發後刺光明風池

偏正坎風

絲竹空
風池



合谷

毛帶
三重

此症乃痰飲停滯胸膈賊風串入腦戶偏正頭風發來連年
或脾肉疼痛或手足沉冷久而不治變為癱患亦分陰陽針

紅腫疼痛眼

之或針力未到故不効也此症宜先針風池合谷絲竹空後
可針三里瀉之以去其風針後穴前穴絲竹空鞋帶



此症因傷寒未解却有房事上盛下虛氣血壅上或頭風不

早治則血灌瞳人或暴赤腫痛或怒氣傷肝房事觸毒心肝
二經飲食不節饑飽醉勞皆有此症心火炎上故不散及婦
人產後怒氣傷肝產期未滿非一時可療漸而為之無不効
也宜先刺睛明臨泣合谷不愈再刺風池太陽行間

百會

一名三陽五會一名巔上一名天滿在前頂後一寸五分
分頂中央旋手心客豆許直兩耳尖上對是穴○督脈
足太陽之會手足少陽足厥陰俱會於此○刺二分灸
五壯甲乙經曰刺三分灸三壯一日灸頭頂不得過七

七壯
主治頭
風頭痛

合谷

一谷虎口在手大指次指岐骨間陷中○手
陽明所過為原○刺三分留六呼吸二壯
主治偏正頭痛而腫目翳神農經云治鼻衄目痛不明
席弘賦云睛明治眼若未効合谷九明不可銖千金上

一穴云曲池兼合谷可散頭痛馬丹陽天星十二
穴云療頭疼并面腫體熱身汗出目暗視茫然

上星

一穴云神堂在鼻耳入髮際一寸陷者中可容豆○刺三
分六呼吸灸五壯雲宜三稜鍼出血以寫諸陽熱氣

眼 生 翳 膜

宜共...谷二...不效再...
此...血...
...
...

睛明

太陽



合谷

光明

此症受病既深未可一時便能針愈先刺睛明合谷不効須
是二次針之方可如發再刺太陽光明

紅腫澁爛沿眼

睛明



此症乃醉飽行房氣血凝滯用手揩摸賊風串入故有此症
宜先刺合谷二間不効再刺睛明三里

羞明怕日眼

睛明

攢竹

小骨空

睛間

行間



此症乃暴痛在路迎風串入眼中血不就舍肝不藏血觀燈則淚出見日則酸涩痛疼難開宜刺攢竹合谷小骨空二間不愈再刺睛明行間

一、世再陳謝開行間

眼處出良日頃類密燕我讓開宜讓林竹合谷心骨空三

美即前日類

對以

閣

閣

閣



合一... 功... 明... 三...

神庭

主治頭風頭痛鼻塞目眩睛痛不能遠視三稜鍼刺之即先世諸陽熱氣無令上衝頭目直鼻上入髮際五分髮高者分○督脉足太陽陽明之會

狂口失明一日灸

七壯至三七壯止

主治發狂登高妄走風癩癩疾角弓反張目上視不識人頭風鼻淵流涕不止頭痛目淚頃滿喘渴驚悸不得

安寢

瞳子

一名太陽一名前關在目外出背五分○手太陽手足少陽三脉之會○刺三分○灸三壯

主治頭痛目癢外骨赤痛翳膜青盲遠視流淚出多眵

頰車

一名機闕一名曲牙在耳下曲頰端近前陷中側臥問口取之○刺三分灸三壯一日灸七壯至七七壯炷如

小麥

主治中風牙關不開失音不語口眼歪斜頰腫牙痛不可嚼物頸強不得回頰凡口眼歪斜者嚼則左瀉右補

斜則左補右瀉王龍賦云兼地倉療口斜

賦云兼地倉療口斜

地倉

一名會維夾口物旁四分外如迎下微有動脉若外用風其脉亦有不動者○手足陽明任脉陽蹻之會○刺

三分間五呼灸七壯或二七壯重者七七壯病左治右病右治左艾炷宜小如粗釵脚若是水口友囑脚灸承漿則愈

愈 主治偏風口眼喎斜牙關不開齒痛頰腫口不得閉失音不語飲食不收水漿漏落眼澗動遠視眈七日夜無見

後頂

一名交衝在百會後一寸五分枕骨上○刺二分灸五壯

主治頭項強急額顛上痛 遍頭痛惡風目眩不明

臨泣

在目上直入髮際五分陷中正睛取之○足太陽少陽陽經三脉之會○刺三分留七呼主治鼻塞目眩生

多眵眼冷淚眼目諸疾驚癇反視

足三里

即下陵出本輪篇在膝下三寸胕骨外廉太筋內宛矣○足陽明所入為合○刺五分留六呼灸三壯十金

云灸二百壯至五百壯○秋月不宜出血恐上虛主治寫

方可灸不爾反生疾○秋月不宜出血恐上虛主治寫

胃中皖熱與氣衝巨虛上下兼同秦承祖曰膝膑疫痛

目不明外臺明堂云人年三十已外若不灸三

風池

在耳後顛之後腦空下髮際陷中按之引耳一云耳後

照中後髮際大筋外兼○足少陽七維之會○刺四分

灸三壯七壯

炷不用人

主治中風偏正頭痛頸項如拔痛不得因目眩赤痛淚出通玄賦云頭暈目眩覓風池

絲竹空

一各目膠在眉後陷中○甲乙經曰足少陽脈氣所發○刺三分留三呼禁灸七不幸令人目小及育

主治頭痛目赤目眩視物眩暈拳毛倒睫風癩戴眼發狂吐涎汗偏正頭風通玄賦云治偏頭難忍一傳主眼赤痛鍼一

分出血

人中

一各水澁在鼻下人中陷中○督脈手足陽刺三分留六呼得氣即寫灸一壯至七壯炷

灸不

及鍼
主治中風口噤牙

承漿

一各天池一名懸漿在頤前下唇七下陷中○足陽明任脈之會○刺三分留五呼灸三壯目可七次至七七

壯止即血脈宣通其風應時立愈
艾炷下必大但合當脈即能愈疾

主治偏風半身不遂口眼歪斜口
禁不開一云療偏風口喎面腫

迎香

一各衝陽在禾膠上二寸鼻孔旁五
力○手足陽明之會○刺三分禁灸

客主人

主治鼻塞不聞香臭喘息不利偏風口眼喎斜浮腫
風動滿面作癢狀如蟲行玉龍賦云能消眼熱之淚
一各上関在耳前起骨上廉問口有空側臥張口取
之○手足少陽足陽明三脉之會○木輪篇曰刺之
則哄不能欠者即此穴○刺一分留七呼灸

三壯甲乙經曰刺上関不得深下関不得久
主治口眼過斜耳聾耳
鳴聾耳目眩齒痛癢癱

角孫

在耳廓中間上髮際下開口有空○手太陽手足少陽
三脉之會○甲乙經手陽作手陽明寒熱病篇曰足太
陽有人項偏齒者各目角孫則足太
陽脉亦會於此○刺三分灸三壯

主治目生翳齒齲腫不
能嚼唇吻皴頰項強

光明

在外踝上五寸○足少陽絡別
厥陰○刺六分留七呼灸五壯
主治熱病席弦賦云睛明治眼未効時合谷
光明不可標幽賦云兼地五會治眼癢痛

地五會

在足小指次指本節後陷中
去狹豁一寸○刺一分禁灸
主治標幽賦云兼
去翳治眼癢痛

主治標幽賦云兼

主治標幽賦云兼

毫

鍼

重書重書

尖如蚊虻喙取法干毫毛長一寸六分士

式

寒痛痺在絡

瘡

解谿

一各鞋帶在衝陽後一寸五分足腕上繫鞋帶處陷中
一日在足大指大指直上踞上陷者腕中刺瘡論註
日在衝陽後三寸半氣血論註曰二寸半甲乙經曰

寸半○足陽明所行為經○刺五分留五呼灸三

主治風氣面浮頭痛目眩生翳神農經
云治腹脹胸七痛目眩頭痛可灸七壯

豐隆

在列缺上八寸下廉筋骨外廉陷中○
陽明絡別走太陰○刺三分灸三壯

主治頭痛面腫風逆癲狂見鬼好
笑百證賦云兼強問治頭痛難禁

攢竹

穴宛七里一刺一分留五呼不宜灸甲乙經云明堂
細三稜鍼刺之宣泄熱氣

眼目大明宜刺三分出血
主目視眩七淚出目眩瞳子癢眼中赤痛及腮臉腫

動不臥王龍賦云兼頭維治目疼頭痛百證賦云兼三

問可治目中漢七通玄
賦云腦昏目赤寫此

即堂

在兩眉中間。神農鍼經云：治小兒急慢驚風。可灸三壯，艾炷如小麥。玉龍賦云：善治驚搐。

睛明

論註曰：手足太陽足陽明陰陽踴五脈之會。刺一分，半留六呼，甲乙經。日刺六分，一曰禁笑。

主治：目痛、視不明、見風淚出、努肉攀睛、白翳、皆瘳、疔、眼、頭痛、目眩、凡治雀目者，可久留鍼，然後速出之。席弘賦云：治眼若木，効并合谷、光明不可。

缺百證賦云：兼行問可治雀目。陽踴足陽明之會。○山

巨膠：此入土齒中，後出循地倉。○刺三分，灸七性。主治：癩癧、唇外、腫痛、口喎、目瘳、青盲、無見、遠視、瞳七、而風、鼻頰、腫胸、氣膝、脛、腫痛。

大骨空：在手大指前二節前尖上，屬指當骨節中，灸二七壯，禁針。主治：內瘳、久痛及吐瀉。

小骨空：在手小指第二節前尖上，屬指當骨節中，灸二七壯，禁鍼。主治：迎風、治淚、風、眼、昏、眩、等症、已。

七夫小骨空二穴宜口吹火，威。

在手小指末節後外側，橫紋尖上，陷中，仰手循拳，喎之。

在手手腕前外側，拳尖起，骨下陷中。○手太陽所起。

在手小指末節後外側，橫紋尖上，陷中，仰手循拳，喎之。

在手手腕前外側，拳尖起，骨下陷中。○手太陽所起。

爲膺○刺一分留二

呼灸一壯一云三壯

主治目翳鼻明耳聾通玄賦云治頭頂立安捷法云肺

與三焦熱病腎虛頭痛肝厥頭暈及頭目昏沉偏正頭

風痰痛兩額顛眉角疼痛太陽痛頭項拘急痛引眉皆

醉後頭風嘔吐不止惡聞人言眼未痛衝風淚下不已

在足大指間動脈應手陷中一云在足大指次指破骨

問上一有筋前後有小骨尖其穴正居陷中有動脈應

于○足厥陰所濡爲禁

刺三分留上呼灸三壯

主治中風白濁四逆監乾煩渴膜不欲視目

中淚出百證賦云兼睛明可治雀目汗

一各間答在食指本節前內則陷中○手

二間

陽明所溜爲榮○刺三分留六呼灸五壯

或問曰睛明迎香承泣絲竹空等穴皆禁灸何也曰血近目目

畏火故禁灸也以是推之則知睛明不可灸矣凡灸頭面之

艾炷宜小麥大不宜多灸蓋頭面爲諸陽之首故也若四肢

炷清大皆服則又犬不妨多灸四肢多灸則枯細瘦人春夏

之月刺宜淺肥人秋冬之月宜刺深此行針灸之大法也

古人灸艾桂火便用洗法以赤皮葱薄荷葉煎湯溫洗瘡週回約一時火令驅逐風散於瘡口出更令經脈往來不澀自然疾愈若灸火退痂後用東南桃枝青嫩皮黃湯溫洗能護瘡中諸風若瘡內黑爛加胡安煎洗若疼不可忍加黃連煎洗神効

古人貼灸瘡不用膏藥要用農水出多而疾除資生云春用柳絮夏用竹膜秋用新綿冬用兔腹下白細毛或猶腹細毛今人多以膏藥貼之目兩三易欲其速愈此非治疾之本意也但今貼膏藥意在避風亦取其便惟久久貼之可也

鍼灸避人神論

千金云欲行鍼灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相犯

即可故男忌除女忌破男忌成女忌已有日神忌有每月忌
有十二時忌有四季人神有十二部年人神九部傍通人神
有雜忌傍通人神有血支血忌之類凡腎者不能知此避忌
若逢病人危會男女氣怯下手至困通人達士豈拘豈哉若
遇卒暴急患皆不拘禁忌許希云卒暴之疾須速灸療一日
之間止忌一時是也于金云癰疽疔腫喉痺客忤尤爲急切
凡作湯藥宜速不可避凶又曰泥卒暴急症并中風卒仆痰
癱等症卽用鍼灸治療若論忌神少緩則不可救此所以不
可拘泥也若平居從容治病於未形選吉日避人神可也

取十二建人神之忌時

建日在足禁晡時

除日在眼禁日入

滿日在復禁黃昏

平日在背禁人定

定日在心禁半夜

破日在面禁平旦

成日在唇禁食時

開日在耳禁午時

執日在手禁雞鳴

危日在鼻禁日出

收日在頭禁寅時

閉日在目禁日昃

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯

治諸虛百損榮胃不和形骸羸瘦面色痿黃脚膠酸疼腰脊倦痛頭眩耳重口苦舌乾骨熱內煩心

松多汗飲食進退寒熱往來喘嗽吐衄遺精失血婦人崩漏經候不調凡病後不爽及憂慮傷動血氣此藥平補有效

白茯苓

白朮

土炒

肉桂皮

川芎

當歸身

熟地黃

人參

黃芪

蜜製

白芍

甘草

各等分

右剉劑水二鐘生姜三片輝棗一枚煎至八分去滓溫服下

拘時候

按經曰氣生响之血主濡之故用人參白朮黃芪茯苓甘草

甘溫之品以補氣氣盛則能充實於肌肉矣用當歸川芎芍

藥地黃因桂味厚之品以補血血生則能潤澤其枯矣

七宣丸

治風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛止腹小及積年腰

脚痠心痛冷如水石脚氣衝心煩憤悶亂頭旋腦倒有皆

頭痛心腹脹悶胸膈閉塞風毒腫氣連及頭而大便或秘

小便時澀脾胃氣痞不能飲食脚氣轉筋掣痛攣急心神

恍惚病用不安等疾

錦紋大黃麵裏煨十五兩甘草炙四柴胡洗去苗訶梨勒皮一

枳實焙木香名五兩桃仁炮去皮尖

石為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二三十丸食遠臨臥

米飲送下漸增至四五十丸取宜利為度覺病勢退愈則止

服不問男女老少並宜服之量虛實增減

神功丸

治三共氣壅心腹痞悶六腑風熱大便不通腰腿疼痛

治脚氣并素有風入大便結燥

火麻仁

另搗

人參

去蘆各二兩

錦紋大黃

麩裏

訶梨勒

取乾皮

右為細末另入麻仁膏搽勻加煉蜜為丸如梧桐子大每服

二三十丸滾白湯或溫酒米飲皆可送下食遠臨臥時服知

大便不通可倍丸數以通利為度

小柴胡湯

治傷寒濕熱病身熱惡風頸項強急胸滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘澀或過

輕未解或潮熱下除及瘧後勞復發熱就痛婦人傷風并皆痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後傷風并皆

服之

柴胡

去蘆

人參

去蘆

甘草

炙

黃芩

各二兩

半夏

湯泡七次焙乾二兩

錢五

右剉劑或為麤末每服三五錢水二鐘生薑二片棗二枚土

核同煎七分去滓溫服不拘時候小兒分作二服量其大小

多煎

按邪在表則惡寒邪在裏則發熱邪在半表半裏則惡寒且熱故令寒熱往來少陽之脈行於兩脇故令脇痛其經屬於膽膽汁上溢故口苦膽者肝之腑在五行爲木有垂枝之象故脈弦柴胡性辛溫辛者金之味故用之以平木過者奪之氣故用之以太少陽黃芩質枯而味苦枯則能浮苦則降君以柴胡則入少陽矣然邪之傷人常乘其虛用人參甘草者欲中氣不虛邪不得復傳入裏耳是以中氣不虛之人雖有柴胡證而人參在可去也邪初入表裏氣逆而煩嘔故用半夏之辛以除嘔逆邪半在表則榮衛爭故用苦重之辛甘以和榮衛

陳湯

治痰飲爲患或嘔吐惡心或頭眩心煩或中脘不快或發熱發寒或因食生冷脾胃不和

半夏

湯泡洗去
次姜汁炒

廣陳皮

湯泡去白
各一錢半

甘草炙七分

白茯苓

錢

右判劑水二鐘生薑三片烏梅一箇同煎至六分去滓不拘時溫服

按水穀入胃無非濕也脾土旺則能運化水穀土歸於肺下達膀胱無濕氣之可留也惟夫脾弱不能制濕則積而爲痰飲半夏之辛能燥濕茯苓之淡能滲濕甘草之甘能健脾陳皮之辛能利氣脾健則足以制濕氣利則積飲能行東南之人多有濕飲之痰

故丹溪恒至之其曰加升提之劑者亦清氣升而濁氣自除之謂

按此湯乃治一身之痰都管之要藥也欲下行加引下藥黃栢木通防已之類欲上行加引上藥升麻柴胡防風之類又

曰二陳加升入藥能使大便潤而小使長

溫白丸

治心復積聚久癥癖塊大如枳椇黃膽宿食朝起嘔吐
種水病人種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋痰九種心
痛積年食不消化或瘧疾連年不瘥及療一切諸風身戰
頑痺不知痛癢或半身不遂或冒髮墮落及療七十二種
風三十六種通口疰并反癲癩或婦人諸疾斷縮不生帶
下淋瀝五邪煩心愁憂思慮意思不樂飲食無味月水不
調及腹中一切諸氣有似懷孕連年屢月羸瘦困弊或歌
或哭如鬼所使俱服此藥無不除愈

川烏頭

泡去皮臍二兩五錢

紫苑

去苗土葉

柴胡

去虛頭

厚朴

去皮姜製

右菖蒲

桔梗

皂角

去皮子炒

乾薑

炮

黃連

吳茱萸

用湯洗炒

人參

肉桂

去粗皮

巴豆

去心皮

煨出

白茯苓

洗炒

蜀花椒

去目及閉口者

炒去汗各五錢

右為細末另入巴豆拌勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二丸

薑湯送下食後臨卧服漸加至五九七丸通利則止再縮減

回服

川芎茶調散

治男婦小兒諸風上攻頭目昏重偏正頭風大痛

盛婦人血風攻症太陽穴疼但是感風氣悉皆治之

蘇薄荷

去根取葉不見火八兩

防風 三兩

白芷

川羌活

炙甘草

各二兩

細辛

去蘆八錢

川芎

荆芥穗

各兩

右為細末每服二錢食後茶清調下或薑蔥煎服亦可方加

菊花殭蚕蟬退名曰菊花茶調散常服清頭目

四物湯

治調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不調臍腹疼痛崩中漏下血瘦塊硬發歇疾痛如婦宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏患露不下結生痲聚少腹堅痛時作寒熱

當歸身

去鬚酒浸微炒

白芍藥

酒洗

川芎

酒洗

乾熟地

酒蒸各等分

右剉劑白水二鐘煎至八分去滓溫服

按是方治血分之聖藥也用當歸引血歸肝經川芎引血歸

肺經芍藥引血歸脾經地黃引血歸腎經惟心生血肝納血
脾統血肺行血腎藏血男子化而爲精女子化而爲月水血
有形之物屬平陰故名曰四物湯

經云氣血人身之二儀也天地之道陽常有餘陰常不足人
與天地相似故陰血難盛而易虧是方也當歸芍藥地黃味
厚者也味厚爲陰中之陰故能生血川芎味薄而氣清爲陰
中之陽故能行血中之氣然草木無情何以便能生血所以
謂其生血者以當歸芍藥地黃能養五臟之陰川芎能調營
衛申之氣五臟和而血自生耳若曰四物便能生血則未也
師云血不足者以此方調之則可若上下失血大多氣息機
微之際則四物禁勿與之所以然者四物皆陰陰者天地閉
塞之令非所生萬物者也故曰禁勿與之

涼膈散

治男婦小兒臟腑積熱煩燥多渴面熱頭昏唇焦咽燥
舌腫喉閉目赤疼痛鼻湧頭煩口舌生瘡痲實不

利涕唾稠粘睡臥不寧謔狂妄腸胃燥
澀便溺秘結凡一切風壅等症并宜服之

黃芩

酒炒

梔仁

炒黑

蘇薄荷

各三

連翹

四兩

大黃

酒炒

甘草

炙

玄明粉

各一

右為麤末每服四錢白水二鐘煎至八分去滓食遠熱服

按是方黃芩梔子味苦而氣涼故瀉火於中連翹薄荷味薄

而氣薄故清熱於上大黃芒硝鹹寒而味厚故諸實皆瀉以

甘草者取其性緩而戀膈也不作湯液而作散者取其泥膈

而成功於上也

三黃丸

治三焦積熱上攻眼目赤腫小便赤澀大便
結燥五臟俱熱腸風痔漏等症并皆治之

川黃連

黃芩

黃蘗

俱甘酒潤
炒各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢空心白滾湯送

下忌煎炒椒姜辛辣等熱物

按少火之火無物不生壯火之火無物不耗經曰壯火食氣是也故少火宜升壯火宜降今以三物降其三焦之壯火則氣得其生血得其養而三焦皆受益矣責苓苦而枯故清熱於上黃連苦而實故瀉火於中黃蘗苦而潤故瀉火於下雖然火有虛實是尤但可以治實火若虛者用之則火反盛謂降多亡陰也丹溪曰虛火宜補則虛實之辨若天淵矣明者當求之證焉

一各三補丸

三補云何謂黃連黃芩黃蘗三黃能瀉三焦之火火瀉則陰生故曰三補

按是方乃瀉中之補非補中之補也若真以爲補是何痴人說夢也程巖泉曰人皆知補之爲補而不知瀉之爲補知瀉之爲瀉而不知補之爲瀉真之言哉

四季三黃瀉心丸

治男婦三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤頭項疼痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥

不美飲食下焦有熱小便赤澀大便秘結五臟俱熱即生瘡癩瘡癩及治五般痔疾蠱門腫或下鮮血小兒積熱亦宜

服

大黃

酒浸九蒸晒春秋三夏一冬五兩

黃連

酒炒春四夏五秋三冬一兩

黃芩

酒炒春四夏秋六冬二兩

右為細末煉蜜為丸或用水疊為丸亦可如梧桐子大每服

一二錢滾白湯送下

按味之苦者皆能降火黃芩味苦而質枯黃連味苦而氣燥

大黃苦寒而味厚質枯則上浮政能瀉火於膈氣燥則就火

故能瀉火於心味厚則喜降故能蕩邪攻實此天地親上親

下之道水流濕火就燥之義也

高州白朮子

治男婦半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞皮切風也樂所不能勝者小兒驚風大人頭風

洗頭風婦人血

風病宜服之

大南星

製三兩

白附子

二兩

半夏

以水浸洗過白
大者用七兩

川烏頭

去皮臍五錢各生用

右為細末以生絹袋盛用井華水攪末出者更以手探今出
如有滓更研再入絹袋攪盡為度放磁盆中日晒夜露至曉
棄水別用井華水攪又晒至來日早再換新水攪如此春五
日夏三日秋七日冬十日去水晒乾後如玉片碎研以糯米
粉煎粥清為丸如棗豆大初服五丸服至十五丸生薑湯送
下不計時候如癱瘓風以溫酒下二十九日進三服至二日
後當有汗便能舒展服經三五日阿右共為細末每服一錢
用薑汁調服吐之為度

大承氣湯

治陽明胃經積熱攻目其脈沉實睛珠痛眩運紅腫生翳累發累治久服寒涼之劑大過以致寒裏火

邪結熱未除實于腹內秘結不通
治宜瀉滯通大便下實熱可也

錦紋大黃酒洗

芒硝各二錢

厚朴去皮

枳實各二錢

右為劑水四鐘先煮厚朴枳實至二鐘入大黃煎一二沸入

硝煎溫服取利為度如未利再投一服

按經云燥淫所勝以苦下之大黃之苦寒以瀉實熱枳實之

苦辛溫收腸胃壅滯潤燥除熱又曰燥於內治以苦溫厚朴

之苦辛溫破腹中結燥又曰一淫所勝治以鹹寒芒硝之鹹

以及蘊熱之堅痞

白通湯

治少陰腎水客寒白利宜通陽氣溫中散寒
故用葱白通氣助乾姜附子溫中散寒可也

葱白四莖

乾薑二錢

附子製過

水二鐘煎服本方加人尿猪膽汁苦寒使熱藥不為寒氣所

格乃內經所謂甚者從治之法是也

十棗湯

治傷寒邪熱內蓄伏飲以致頭疼心下痞滿引脇下痛乾嘔氣治宜下熱遂飲為當經云辛以散之故用芫花

之辛以散飲苦以泄之故用甘遂大戟之苦以泄及大棗之甘以益脾土

芫花 錢半

大戟 一錢

甘遂 四分

大棗 六枚

共為一劑白水二鍾先煎大棗至八分入前三味右共為細

末每服二錢用漿汁調服吐之為度

導痰湯 治風痰湧盛者

半夏 錢二

廣陳皮 去白

枳實 去穰

赤茯苓

甘草 炙

膽南星 各一錢

右剉劑白水二鍾生姜三片煎至八分去滓溫服

按風痰者濕土生痰痰生熱熱生風也半夏陳皮茯苓甘草

煎之二陳湯耳加南星以治風痰入枳實去痰如倒壁

保命集當歸湯 治翳補益瞳人

當歸身

黃芩

赤芍藥各一錢半

柴胡

川黃連

各一錢

甘草

六分

熟地黃二錢

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓溫服

保命集羚羊角散

治水翳久不去者

羚羊角

銼細末

升麻

芫花

甘草

各等分

右為細末一半煉蜜為丸每服五六十丸用一半為散以酒

水煎滾吞丸子食後送下

散眼二錢空

心滾湯送下

濟陰地黃丸

治三陰虧損虛火上炎致目睛散夫視物不真或昏花

或卒見非常之處此症其功

亦與六味還少丹相似

遼五味

當歸

山茱萸

菊花

山藥

肉苁蓉

枸杞

巴戟肉

熟地

麥冬

去心各等分

為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九空心白滾湯送下

下

點眼藥法

凡治目點眼藥必按時候每日漬過已至午始點蓋人之陰陽與天地同子後一陽生午後一陰生正是陽生之際火亦午焉若點藥犯之則火勢難道午後屬陰方宜點藥或膏或散或錠用犀簪骨簪如錠膏必蘸水乳磨化如散者乾桃俱先宜少點些微若目受藥再畧多些不妨不可令患目者疼而怕點卽係仙丹患者畏懼要在醫者輕手徐徐對病投藥命患者閉目仰面久坐不睜切戒妄想多言輕則可點二三次重則點三四次每次必用簪撥淨藥滓不可過點過多點則未必爽快恐激動其火反復增其患矣

秘製點眼丹藥諸方

靈飛散

治目疾清腫止淚明日去翳退赤定痛收濕除爛一切等症

蘆甘石

水煨通紅用童便淬如此七次水飛淨晒乾聽用每用一兩

明硃砂

琥珀

珍珠

牛黃

真熊膽

以上俱各另研膩粉各一錢

靈藥

二錢

右和極勻每次用牙簪挑少許點眼閉目片時再點又閉片時待藥力過然後用簪撥去藥滓溫水洗淨每日點二三次久閉為妙

附靈藥方

水銀

黑鉛

各五錢

火硝

八錢

官礬

二錢

先將鉛化開人水銀作一家再加硝礬研勻入陽城罐內鹽泥封固打火三炷香先文後武待冷取出聽用

按此靈飛散所宜製也是散也甘石收濕除爛靈藥磨搗

雲石砂珀珠末牛黃熊膽者解毒清熱止淚退赤明目之品

也凡目有外症者俱可

五膽膏

治一切火熱赤眼流淚爛弦怕熱羞明或痛或癢等症

熊膽

精膽

鯉膽

猪膽

羊膽

川蜜

等分

夏二秋四冬七日瀘去滓復添水熬三次取盡藥升以蜜絹
綿緝重瀘過證去砂上漫火煎熬槐柳枝各四十九條五瀘
一順攪不住手攪得此藥加飴糖相類入蜜和勻磁器盛放
湯瓶日上重湯蒸炖成膏復瀘淨滴入水中沉不成珠可丸
為度待數日出火毒再溶化入末和勻杵搗為丸錠陰乾金
銀箔為衣每以少許新汲水浸化開鴨毛蘸點眼大眇內又
可以熱水泡化作洗眼藥亦可如水冷再煖用日洗五六次

日點二三次大効

陽丹藥品法製

蘆甘石眼科之要藥也選輕田者佳四兩用

蘇薄荷

羌活

防風

麻黃

荆芥穗

川芎

白芷

細辛

發散之藥各二錢用清河水或雪水更妙四大碗煎至一
碗去滓將甘石搗碎入藥水中於瓶內煮乾為度此陰製
用陽藥煎水法也又用

龍膽草

黃芩

赤芍藥

大黃

生地

木賊草

黃連

割荷奴

連翹

黃蘗

夏枯草

當歸

千里光

菊花

枝仁

皆寒之藥各二錢用井水五碗春夏浸二日秋冬浸四日

常以下攪之浸畢去滓藥水分作清濁二碗將所煮甘
石入陽城水內大火煨乾甘出少時先以濁水淬入再烟
再淬以水盡爲度此陽製用陰藥浸水法也又將前陰製
煎水藥滓及陽製浸水藥滓共合一處浸水二碗去滓瀝
淨再澄清將煉過甘石內研攪浸露一宿飛過分輕重
兩處晒乾上者爲輕下者爲重各研極細收藏輕者治輕
服重者治重眼此陽丹合製用藥之法也蓋甘石經火煉
本陽藥也又用發散藥製度是辛甘發散爲陽之象故以
陽丹名又用陰藥爲陰製者是陽中亦有微陰之象及治
火毒法也

陰丹藥品法製

銅綠黃連水煮飛過青鹽塊洗白水乳香各二錢五分

礶砂洗六分

蜜陀僧飛過二分

沒藥三分五厘

又將前製陽丹蘆甘石一兩共七味俱研極細勿合犯火所以為陰藥也中用陽丹甘石者為陰中有陽之象也但只用蘇州薄荷淨葉川黃連龍膽草三味各等分浸水二盞露一宿去滓濾淨水一盞入前藥在內調均明月下露一宿而得月之陰氣次日曬乾又得月之陽氣也俟夜露

日晒透乾再研極細入後藥此製陽丹之法也

川黃連去皮毛洗淨乾六分三厘草烏新白者細辛五分上葉

胡黃連條實者洗淨乾四分薄荷要蘇州淨葉洗淨曬乾三分

以上五味乃疎風退熱之藥取象於五輪之義也各研極

細拌勻用人乳和丸如小豆大用絹袋盛之懸於東崖角

頭風乾再研極細篩過和前藥內共研勻又入後藥

生薑粉用大鮮姜四五塊竹刀齊中切片瀝出姜汁晒乾一

分硃砂明者飛過六分黃丹黃連水飛過晒白丁香真者

粉霜各一蝶蛸去相研輕粉各一

製牙硝四兩血竭艾薰研雄黃飛過

珍珠五分以上陰丹藥味共和一處研極細用磁罐收貯是為陰丹

藥雖頗峻但合時有輕重緩急之分而有病輕則輕病重

則重之法也如用者須當斟酌

配合陰陽法式

配合陰陽法式

前所製陰陽二丹無獨用之以所謂孤陽不生孤陰不長之

義然配合之法其各有五取陰陽生五行之義也開列於後

右藥研有先後二丹為先後所配如加粉砂礬味為次而片

麝則又候諸藥研至極細時方可加入同研凡合眼藥皆依此法而粗細須以舌嚙之夫抵女人眼藥宜從右轉男子宜從左轉否則治目有反攻之患須識此意

一 丸金丹

陽丹 九分 陰丹 一分 礪砂 二厘 玄明粉 風化 一厘 明礬 一厘

麝香 二厘 冰片 三厘

一 八木丹

陽丹 八厘 陰丹 二厘 粉霜 二厘 玄明粉 風化 二厘

礪砂 二分 明礬 一厘 麝香 二厘 梅花片 三厘

三 七水丹

陽丹 七分 陰丹 三分 粉霜 四厘 礪砂 一分

麝香 一厘 冰片 三厘 此丹不用礬

四六火丹

陽丹 六分

陰丹 四分
粉霜 六厘

硼砂 二分

明礬 二厘

麝香 厘半
冰片 三厘

陰陽合配土丹

陽丹 五分

陰丹 五分
粉霜 八厘

硼砂 二分

明礬 二厘

麝香 一厘
冰片 三厘

俱研如前法

用丹頭大要

前所配合諸丹按陰陽生五行之義也其輕重之分則金丹為輕而木丹水丹則漸加重暴發赤眼近年翳膜可以酌點者也至若火上二丹則為峻重遠年老翳膜努肉礬睛方可施治可暫點數次不可常點所謂邪輕則輕邪重則重又須量入眼內容受何如以意推裁不必拘執故曰神而助之存

乎其人然點眼宜飽治重服患乎吹若翳膜在眼珠上必吹
可到吹較點多有神効眼輕則不宜吹吹點後則以桑白皮
側柏葉煎水稍熱洗之一可以退散赤賊三可以洗去藥毒
切勿用冷水洗點寒涼點至將愈時則不可過點蓋留有餘
不盡之意恐過點以致復發須此意

不換金撥雲丹

治一切遠年近日翳障皆能復明

大石蟹

一箇為則焙後製法

大黃

楛梗

黃蘗

川黃連

黃芩

防風

芥穗

羌活

蘇薄荷

烏藥

陳皮

枳殼

乾薑

桑白皮

前胡

薑黃

細辛

當歸

木賊草

菊花

樂胡各等分

右將二十又味細剉用水五大碗放銅器內浸三日將布濾

去滓却將石蟹微火煨冷紫色入藥汁內蘸冷取起細研爲末就將藥水淘飛浮清者以淨器盛浮水安靜室勿動以物覆器上毋使塵垢入內候其澄清傾去藥水以蟹粉曝乾取用配合後之諸藥

蟹粉

坯子

各五錢

熊膽

明礪砂

膽礬

各一錢

銀硃

輕粉

麝仁霜

硃砂

各錢

川椒

黃連

牛黃

夜明砂

珍珠

鷹條

各五錢

白豆霜

血竭

金墨

各二分

右各依製法合礪一日極細無薄礪確貯之聽用名曰丹頭隨病輕重加減點眼其故如神

輕號

丹頭

五分

水片

一分

麝香

三厘

坯子

一錢

右共礪極細再治一切風熱暴赤爛碎迎風冷淚怕熱羞明
或兼半年一發或一年一發歇作無時悉以輕劑點之不可
輕用重藥病輕藥重反受其害內服合病之劑爲助

次輕號

丹頭 六分

冰片 一分

麝香 三厘

坯子 一錢

右共礪極細專治久患不瘥珠上必生薄翳或有紅筋赤發
悉以此次輕藥點之每日三四次若見退減日點一二次愈
則勿點

號

丹頭 七分

冰片 一分

麝香 三厘

坯子 一錢

右共礪極細治眼患頗重或翳障飛廉或赤帶痛澀用此吹
點每日三四次目漸愈卽上吹藥點數亦減內服稍輕藥爲

愈

至重號

丹頭 九分

冰片 一分

麝香 三厘

坯子 一錢

右共礪極細專治重服厚膜遮睛釘白翳昏言無見方點此藥每日點二三次漸愈漸滅

秘授製蘆甘石法

用好田泥做成大窩毬二箇外以礪砂硝石不拘多少共爲夫卽將所做窩二箇口中曝乾極透用上好羊腦甘石一斤裝在窩內將毬相合又用前礪硝鹽水調塗固濟又用泥包過以乾爲度以大炭週圍架之居中煨至三炷香盡色如松花樣爲度取出淬入童便內畧輕礪一遍浮上者逼在一處重濁不淬者裝入煨前復煨又淬在螞又逼所沉者石脚不

用細末須炙烘得極乾再用三黃湯開列於後煮過取乾收貯聽用

煮蘆甘石三黃湯藥味

川黃連 黃蘗 川羌活 黃芩 防風

山枝仁 木賊 家菊花 蝉退 白芷

蘇薄荷 細辛 當歸身 川芎 大黃

荆芥穗 赤芍 連翹各等分

右剉一劑白承四碗煎至二碗去滓澄清入煨過甘石煮之

取汞粉法此粉如遇痰火症配痰火藥驚風症配驚風藥每劑中加四厘無有不効

汞一兩鉛二錢五分鐵鈎鎔化另放冷定再將白礬牙硝

炭硝皂礬各五錢青鹽二錢炒乾再入鉛汞共研極細入

罐升打鐵蓋扎好礪砂鹽泥固濟三釘駕於火上先用文

一炷後武二炷爲度武火時以新羊毛筆蘸水盞內畫圈
香盡止冷開取用

雙砂法

用好砂五錢以初生男兒乳汁溫透放古鏡背面碗巷
蜜布包定埋土內四十九日取出走線的是活砂聽用

眼科取靈砒法

白砒五錢爲末用牙硝白膜子一箇切如豆大將砒拌勻
用烏公雞一隻餓二日將胰喂之食盡半頓飯時殺雞取
出淘淨入罐內封固打火三炷香取升盞靈砒再用多年
老鵝油拌砒封固放淨處四十九日去油加麩仁去聲皮
五錢黃連三錢生砒五分俱爲末再入罐內打火取出聽

用

爛翳方

用虎掌草根燒灰點之努肉并點亦妙

點翳膜老障驗方

凡難退翳障須用是藥點除如畏痛勿用治之

明礬二兩要上好者

人言七分

番礪砂一錢

共研細入陽城礪內打火先文後武礪口留一孔出烟以烟盡為度埋土中一宿去其火毒次早開出研極細末加銀等一分二厘再研勻似桃紅色收貯礪內聽用

收淚散

治風淚不止

綠蘆甘石

製煨飛細一錢

海螵蛸五分

梅花片少許

共研極細點出淚竅處

凡蟹睛不收捉大花白花蜘蛛數箇用陰陽瓦乾研細末或滾於丸藥上或溫酒調服即收神効

敷眼諸藥方

玉龍丹

治一切火眼赤腫

明礬

六分

沒藥

二錢

乳香

五分

蘆後石

錢 珍珠

黃丹

飛淨一兩

麝香

七分

梅花片

三分

共研為極細煉蜜為丸銀硃五分為衣收貯聽用如用將并

花涼水磨塗眼皮外立効

散血膏

治赤腫不能開睛痛熱淚如雨

紫金皮

白芷

大柏皮

大黃

赤小豆

南星

寒水石

薑黃

右各等分為細末生地黄汁調成膏敷眼四圍

清涼膏

南星

生用

蘇薄荷

各五錢

荆芥

百藥煎

各三錢

右為細末并水調成膏貼眼角上自然清涼

搜風散 治風熱眼及腫痛

川黃連

大黃

硃砂

黃丹

右等分為末以苦參同煎湯外加煨過白蜜同調敷眼四弦

甚妙

洗眼諸藥方

神仙碧霞丹 治一切內外俱障

當歸

沒藥 各三錢

血竭

白丁香

硼砂

片腦

麝香

馬牙硝

乳香 各五分

黃連 三錢

銅綠 一兩五分錢為衣

右為細末熬黃連膏和丸如雞頭實大每用新汲水半盞於

磁盒內浸常用每一丸可洗四五日大病不過一月小病半

月冷淚三日見効

洗爛弦風赤眼方

其効如神此藥人家不可少無日病則以施入價廉工省濟人甚

苦參

四錢

五倍子

荆芥穗

防風

黃連

各三錢

銅絲

五分

右爲細末外以蘇薄荷煎湯丸如彈子大臨時用以熟水化

開洗眼每日三次立愈神効

洗眼紅棗兒

治不論年久爛弦風眼俱可洗

皮硝一斤滾水泡化澄清去滓取上好紅棗兒一斤去核

入硝汁內浸一日取晒乾又浸如此數次以汁盡爲度將

棗兒一箇裝黃白末三分小者二分將棗仍舊合之勿令

洩氣用時取棗二箇投白滾湯泡之不時洗眼極妙

治眼吹藥諸方

立應散 治內外障翳昏澁多淚及暴赤眼一切目疾並皆治之三次噴鼻

躑躅花 減半 香白芷 當歸

雄黃 另研

川附子 炮 鵝不食草 洗淨各等分

右為細末入麝香少許和勻舍水噴鼻內去盡濁涕眼淚屬

度

碧玉散 治眼睛腫服紅赤昏暗羞明怕日病澀難開疼痛風癢頭重鼻塞腦鼻疼癢翳膜努肉眼淚稠粘等毛倒睫一

症切服

羌活 躑躅花 薄荷 川芎 防風

細辛 蔓荊子 荊芥 白芷 各一錢 石膏 煨

青黛 風化硝 黃連 各錢 鵝不食草 三兩

古為細末吹鼻中一日吹三次

青火金 鐵 治火眼赤腫及頭痛牙疼者

酸硝 一兩

青黛

蘇薄荷 淨葉

川芎 各五錢

右為細末令患人口含水以管吹入鼻內濁涕熱淚去淨為愈

赤火金鐵 治赤眼頭風冷淚鼻塞耳鳴牙疼者

酸硝 一兩

川芎

雄黃

乳香

沒藥

石膏 各二錢

右為細末每用一二分如前搐鼻三次

通頂散 治風每致眼并夾腦風

香白芷

細辛

藿香葉

川芎 各七錢 躑躅花 三錢

右為細末每令病人先隕新汲冷水一口然後盧筒少挑啗於鼻內以手擦兩太陽穴

止痛藥

乳香丸

治眼疼頭痛或而致作而急遍身疼痛

五靈芝 二錢

乳香

沒藥

草烏

夏蠶沙 各五錢

木鱉子 五枚

右爲細末酒煮麩糊爲丸如梧桐子大每服七丸薄荷湯或茶清任意送下如頭疼痛甚三服即止

按乳香沒藥總爲定痛之要藥也必審其痛之源而佐之以乳沒則草効速也如有風而痛者用散風藥中加乳香沒藥則痛可止如血滯而痛者當用行血藥中加乳香沒藥而痛即止如熱實而痛者當用清熱藥中加乳香沒藥而痛即止今人不至於此而惟恃乳香沒藥定痛服之而痛不止者不知治痛之所由也乳香沒藥豈能奈之何哉而徒嗟其藥之不効弗思甚耳

神仙指痛散

治一切暴發火眼
疼痛晝夜不止

生明礬

揀上白明透者佳
研極細如粉樣

台用雞蛋清共礬粉調勻將鵝翎毛搽腫眼胞疼痛之處如
乾再搽再搽數次其痛即止

傅氏眼科審視瑤函卷之六終

卷之六