

千金方

廿

備急千金要方卷第二十八

平脉

朝奉郎守常少卿充秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋員外林億等校正

平脉大法第一

診五藏脉輕重第二

指下形狀第三

五藏脉所屬第四

分別病形狀第五

三關主對法第六

五藏積聚第七

陰陽表裏虛實第八

何時得病第九

扁鵲華佗察聲色要訣第十

五藏六腑氣絕證候第十一

四時相反脉第十二

診脉動止投數疎數死期年月第十三

扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四

診百病死生訣第十五

三部虛實訣死生第十六

平脉大法第一

論曰夫脉者醫之大業也既不深究其道何以爲醫者哉是以古之哲醫寤寐俯仰不與常人同域造次必於醫顛沛必於醫故能感於鬼神通於天地可以濟衆可以依憑若與常人混其波瀾則庶事墮壞使夫物類將何仰焉由是言之學者必當屏棄俗情凝心於此則和鵲之功因茲可得而致也經曰診脉之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脉調均氣血未亂故乃可診有過之脉脉經云過此非也

切脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑疆弱形之盛衰可以此參伍訣生死之分也

又曰平脉者皆於平旦勿食勿語消息體氣設有所作亦如食頃師亦如之既定先診寸口初重指切骨定畢便漸舉指令指不厚不薄與皮毛相得如三菽之重於輕重之間隨人疆弱肥瘦以意消息進退舉按之宜稱其浮沉諸類應於四時五行與人五藏相應不爾者以其輕重相薄尋狀論寒暑得失

凡人稟形氣有中適有躁靜各不同氣脉潮動亦各隨其性韻故一呼而脉再至一吸而脉再至呼吸定息之間復一至合爲五至此爲平和中適者也春秋日夜正等無餘分時也其餘日則其呼而脉至多吸而脉至少或吸而脉至多呼而脉至少此則不同如冬夏日夜長短之異也凡氣脉呼吸

法晝夜變通倣四時然於呼吸定息應五至之限無有虧僻
猶晷刻與四時有長短而歲功日數無遺也若人有羸有壯
其呼吸雖相壓遏而晝夜息度隨其漏刻是謂呼吸象晝夜
變通倣四時

夫診脉當以意先自消息壓取病人呼吸以自同而後察其
脉數計於定息之限五至者爲平人若有盈縮尋狀論病源
之所宜也

問曰何謂三部脉答曰寸關尺也凡人脩短不同其形各異
有尺寸分三關之法從肘腕中橫文至掌魚際後文却而十
分之而入取九分是爲尺從魚際後文却還度取十分之一
則是寸寸十分之而入取九分之中則寸口也此處其骨自
高故云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入却行六分
爲關分從關分又入行六分爲尺分

又曰從魚際至高骨却行一寸其中名曰寸口從寸口至尺
名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界
如天地人爲三界寸主射上焦頭及皮毛竟手上部開主射
中焦腹及腰中部尺主射下焦小腹至足下部此爲三部法
象三才天地人頭腹足爲三元也夫十二經皆有動脈獨取
寸口以訣五藏六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脉
之大會手太陰之動脈也人一呼脉行三寸一吸脉行三寸
呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一万三千五百息脉行
五十度周於其身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦
二十五度爲一周脉時也故五十度而復會於手太陰太陰者
寸口也即五藏六腑之所終始故法取於寸口人有三百六
十脉法三百六十日也

診五藏脉輕重法第二

初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部庚辛之氣

如六菽之重與血脉相得者心部丙丁之氣

如九菽之重與肌肉相得者脾部戊己之氣

如十二菽之重與筋平者肝部甲乙之氣

按之至骨舉之來疾者腎部水火之氣

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也豫散浮而短濶者

肺也

法金
愬濶

腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也

如卉生
敵吐穎

按之突舉指來實者腎也

濡弱如冰
舉重勝船

脾者中州故其脉在中是陰陽之脉也

而長者脾也
翼云遲緩

指下形狀第三

浮脉舉之有餘按之不足

浮於
指下

沈脉舉之不足按之有餘確得

按之

濡脉細而遲往來難且散或一止復來

一日浮而短一日
短而止或如散一日

滑脉往來前却流利展轉替替然與數相似

一日浮浮中如有力一日瀧瀧如欲脫

洪脈極大在指下

一日浮而大

細脉小大於微常有但細耳

微脉極細而軟或欲絕若有若無

一日小也一日手
日薄一日按之如欲盡也

弦脉舉之無有按之如張弓弦狀

一日如張弓弦按之不

緊脉數如切繩狀

索之如轉無常

遲脉呼吸三至去來極遲

一日舉之不足按之盡牢

數脉去來促急

一日數者進之名

緩脉去來亦遲小駛於遲

一日浮大而軟陰與陽同等

弱脉極軟而沈細按之欲絕指下

一日按之乃得舉之即無

動脉見於關上無頭尾大如豆欣欣動搖

伏脉極重指著骨乃得

一日關上沈不出名曰伏一日手

足按之不足舉之無有

芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實一日指下無兩傍有

軟脉極軟而浮細一曰按之無有舉之有餘一日細小如翼千金翼軟作濡

虛脉遲大而軟按之不足隱指幅幅然空

實脉大而長微彊按之隱指幅幅然浮一日沈浮皆得

促脉來去數時一止

結脉往來緩時一止復來脉結者生

代脉來數中止不能自還因而復動脉代者死

散脉大而散散者氣實益虛有表無裏

革脉有似沈伏實大而長微弦一千金翼以革爲牢

弦與緊相類 浮與芤相類一曰浮與洪相類

耎與弱相類 微與濇相類

沈與伏相類 緩與遲相類又曰軟與遲相類

革與實相類翼作牢與實相類 滑與數相類

五藏脉所屬第四

心部在左手關前寸口

亦名迎

肝部在左手關上

腎部在左手關後尺中

肺部在右手關前寸口

亦名氣口

脾部在右手關上

腎部在右手關後尺中

脈法讚云

肝心出左

脾肺出右

腎與命門

俱出尺部

魂魄穀神

皆見寸口

左主司官

右主司府

左大順男

右大順女

關前一分

人命之主

左爲人迎

右爲氣口

神門波斷

兩在關後

人無二脉

病死不愈

諸經損減

各隨其部

三陰三陽

按察陰陽

誰先誰後

陰病治官

官藏內也

陽病治府

府外也

奇邪所舍

如何捕取

審而知者

針入病愈

脉有三部

陰陽相乘

榮衛氣血

而行人躬

呼吸出入

上下於中

因息遊布

津液流通

隨時動作

斂象形容

春弦秋浮

冬沈夏洪

察色觀脉

大小不同

一時之間

變無經常

尺寸參差

或短或長

上下乖錯

或存或亡

病輒改易

進退低昂

心迷意惑

動失紀綱

願爲縷陳

令得分明

師曰子之所問

道之根源

脉有三部

尺寸及關

榮衛流行

不失衡銓

腎沈心洪

肺浮肝弦

此自常經

不失銖分

出入升降

漏刻周旋

水下二刻

脉一周身

旋復寸口

虛實見焉

變化相乘

陰陽相干

風則浮虛

寒則緊弦

沈潛水畜

支飲急弦

動弦爲痛

數洪熱煩

設有不應

知變所緣

三部不同

病各異端

太過可怪

不及亦然

邪不空見

終必有姦

審察表裏

三焦別分

知邪所舍

消息診看

料度腑藏

獨見若神

分別病形狀第五

脉數則在腑遲則在藏

脉長而弦病在肝

脈經作
出於肝

脉小血少病在心

扁鵲云脉大
而洪出於心

脉下堅上虛病在脾胃

脉滑一作澁而微浮病在肺

脉大而堅病在腎

扁鵲云
小而緊

脉滑者多血少氣

脉澀者少血多氣

脉大者血氣俱多又云脉來大而堅者血氣俱實

脉小者血氣俱少又云脉來細而微者血氣俱虛沈細滑疾者熱

遲緊爲寒

脉經云洪數滑疾爲熱濇遲沈細爲寒

脉盛滑緊者病在外熱

脉小實而緊者病在內冷

脉小弱而濇謂之久病

脉滑浮而疾者謂之新病

脉浮滑其人外熱風走刺有飲難治

脉沈而緊上焦有熱下寒得冷即便下

脉沈而細下焦有寒小便數時苦絞痛下利重

脉浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便

脉洪大緊急病速進在外苦頭發熱癰腫

脉細小緊急病速進在中寒爲疝瘕積聚腹中刺痛

脉沈重而中散者因寒食成癥

脉沈重而中散者因寒食成癥

脈直前而中散絕者病消渴

一云浸淫癰

脉沈重前不至寸口徘徊絕者病在肌肉遁尸

脉左轉而沈重者氣微陽在胃中

脉右轉出不至寸口者內有肉瘤

脉累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去

脉累累如止不至寸口輒者結熱在小腸膜中伏留不去

脉直前左右彈者病在血脉中肝血也

脉後而左右彈者病在筋骨中也

脉前大後小即頭痛目眩

脉前小後大即脣滿短氣

上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死

上部無脉下部有脉雖困無所苦

夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進

上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細微滑素則氣少濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊弊綽綽其去如絃絕者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而弦急者病在內浮而洪大者病在外脉實者病在內脉虛者病在外在上爲表在下爲裏浮爲在表沈爲在裏滑爲實爲下又爲陽數爲虛爲熱浮爲風爲虛動爲痛爲驚沈爲水爲實微弱爲虛爲悸遲則爲寒濇則少血緩則爲虛洪則爲氣熱一作緊則爲寒弦數爲瘡瘍脉自弦弦數多熱弦遲多寒微則爲虛代散則死弦爲痛痺一作浮偏弦爲飲雙弦則脇下拘急而痛其人濇濇惡寒脉大寒熱在中伏者霍亂安卧脉盛謂之脫血凡亡汗肺中寒飲冷水欬嗽下利胃中虛冷此等其脉並緊浮而大者風

浮大者中風頭重鼻塞

浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉

滑而浮散者攤緩風 滑爲鬼疰

澀而緊痺病

浮洪大長者風眩癲疾

大堅疾者癲病

弦而鈎脅下如刀刺狀如蠱尸至困不死

緊而急者遁尸

洪大者傷寒熱病

浮洪大者傷寒秋吉春成病

浮而滑者宿食

浮滑而疾者食不消脾不磨

短疾而滑酒病

浮而細滑傷飲

遲而濇中寒有癥結

駁而緊積聚有擊痛

弦急疝瘕小腹痛又爲癖病

一作
渾病

遲而滑者脹

盛而緊曰脹

弦小者寒澼

沈而弦者懸飲內痛

弦數有寒飲冬夏難治

緊而滑者吐逆

小弱而濇胃反

遲而緩者有寒

微而緊者有寒

沈而遲腹藏有冷病

微弱者有寒少氣

實緊曾中有寒苦不能食時時利者難治

一作時時
嘔稽難治

滑數心下結熱盛

滑疾胃中有熱

緩而滑曰熱中

沈而急病傷暑暴發虛熱

浮而絕者氣

辟大而滑中有短氣

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也

沈而數中水冬不治自愈

短而數心痛心煩

弦而緊曾痛藏傷有瘀血

一作有
寒血

沈而滑爲下重亦爲背膂痛

脉來細而滑按之能虛因急持直者僵仆從高墮下病在內
微浮秋吉冬成病

微數雖甚不成病不可勞

浮滑疾緊者以合百病久易愈

陽邪來見浮洪

陰邪來見沈細

水穀來見堅實

脉來乍大乍小乍長乍短者爲祟

脉來洪大嫋嫋者祟

脉來沈沈澤澤四肢不仁而重土祟

脉與肌肉相得久持之至者可下之

弦小緊者可下之

緊而數寒熱俱發必下乃愈

弦遲者宜溫藥

緊數者可發其汗

三關主對法第六

諸浮諸弦諸沈諸緊諸澀諸滑若在寸口膈以上病頭部若在關上胃以下病腹部若在尺中腎以下病腰脚

平寸口脉主對法

寸口脉滑而遲不沈不浮不長不短爲無病左右同法

寸口太過與不及寸口之脉中手短者曰頭痛中手長者曰足脛痛中手促上擊者曰肩背痛

寸口脉沈而堅者曰病在中

寸口脉浮而盛者曰病在外

寸口脉沈而弱者曰寒熱及疝瘕少腹痛熱一作氣

寸口脉沈而弱緩必墮落

寸口脉沈而緊苦心下有寒時時痛有積邪

寸口脉沈而滑者胷中有水氣面目腫有微熱爲風水

寸口脉沈大而滑沈即爲血實滑即爲氣實血氣相搏入藏
即死入腑即愈

寸口脉沈胷中短氣

寸口脉沈而喘者寒熱

寸口脉浮而滑頭中痛

寸口脉浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有滯氣宿食

寸口脉弦而緊弦即衛氣不行衛氣不行即惡寒水流走腸間

寸口脉緊或浮膈上有寒肺下有水氣

脈緊上寸口者中風風頭痛亦如之翼云亦爲

脉弦上寸口者宿食降者頭痛

寸口脉弦大婦人半生漏下男子亡血失精

寸口脉微而弱微即惡寒弱則發熱當發不發骨節疼煩當煩不煩與極汗出

寸口脉微而弱氣血俱虛男子吐血婦人下血嘔汁出

寸口脉動而弱動即爲驚馬弱即爲悸

寸口脉緩而遲緩即爲虛遲即爲寒虛寒相搏則欲溫食食冷即咽痛

寸口脉遲而緩遲則爲寒緩即爲氣寒氣相搏則絞而痛

寸口脉遲而澀遲即爲寒澀爲少血

脉來過寸入魚際者遺尿脉出魚際逆氣喘息

寸口脉但實者心勞

寸口脉濶濶如羹上肥陽氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰

兩手前部陽絕者苦心下寒毒喙中熱

寸口脉偏絕則臂偏不遂其人兩手俱絕者不可治

寸口脉來暫大暫小者陰絡也苦陰風痺應時自發身洗洗也
寸口脉來暫小暫大者陽絡也苦皮膚病汗出惡寒下部不仁
寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風池風府
向火炙身摩治風膏覆令汗出

寸口脉緊苦頭痛是傷寒宜服麻黃湯發汗針眉衝顚顙摩
傷寒膏

寸口脉微苦寒爲劔宜服五味子湯麻黃茱萸膏令汗出
寸口脉數即爲吐以有熱在胃管熏鼻中宜服藥吐之及針
胃管服除熱湯若傷寒七八日至十日熱在中煩滿渴者宜
服知母湯

寸口脉洪大脣脢滿宜服生薑湯白薇丸亦可紫菀湯下之
針上管期門章門

寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄熨之

佳灸諸治風穴

寸口脉滑陽實胷中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨闕寫之
寸口脉弦心下幅幅微頭痛心下有水氣宜服甘遂丸針期門寫之

寸口脉弱陽氣虛弱自汗出宜服茯苓湯內補散將適飲食
消息勿極勞針胃管補之

寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針胃
管一作三里補之

寸口脉芤吐血微芤者衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黃
土湯灸膻中

寸口脉伏胷中逆氣噎塞不通是諸氣上衝胷中宜服前胡
湯大三建丸針巨闕寫之

寸口脉沈胷中引脇痛胷中有水氣宜服澤漆湯針巨闕寫之

寸口脉軟弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯署預丸內補散牡蠣散并粉針太衝補之

寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯茱萸丸調和飲食以暖之

寸口脉實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛則生寒在脾胃食不消化熱即宜服竹葉湯葛根湯寒即茱萸丸生薑湯

寸口脉細發熱嘔吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗湯炙中府

平開脉主對法

開上脉浮而大風在胃中張口肩息心下澹澹食欲嘔

開上脉微浮積熱在胃中嘔吐蛻蟲心健忘

開上脉滑而大小不均必吐逆是爲病方欲來不出一二日復欲發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止者死

開上脉緊而滑者就動

開上脉弦而長翼作有痛如刀刺之狀在臍左右上下

脉經云

積在臍左
右上下

開上脉溢而堅大而實按之不減有力爲中焦實有伏結在
脾肺氣塞實熱在胃中

開上脉澹澹大而尺寸細者其人必心腹冷積瘤瘕結聚欲
熱飲食

開上脉時來時去乍大乍小乍踈乍數者胃中寒熱羸劣不
欲飲食如瘧狀

開上脉浮腹滿不欲食浮為虛滿宜服平胃丸茯苓湯生薑
前胡湯針胃管先寫後補之

開上脉緊心下苦滿痛脉緊為實宜服茱萸當歸湯又加大
黃二兩佳脉經云又大治之佳黃針巨闕下管寫之

關上脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子丸針
巨關補之

關上脉數胃中有客熱宜服知母湯一作丸除熱湯針巨關上
管寫之

關上脉緩不欲食此脾胃氣不足宜服平胃丸補脾湯又針
章門補之

關上脉滑胃中有熱滑爲熱實氣滿故不欲食即吐逆宜
服朴消麻黃湯平胃丸人參大平胃丸
一作宜服紫菀湯針胃管寫之

關上脉弦胃中有冷心下厥逆脉弦胃氣虛宜服茱萸湯溫
調飲食針胃管補之

關上脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱爲虛熱作病且說云有
熱不可大攻之熱去即寒起正宜服竹葉湯針胃管補之
關上脉細虛腹滿宜服生薑湯茱萸蜀椒湯白薇丸針灸三管

關上脉澀血氣逆令脉澀爲血虛宜服乾地黃湯四補散針足大衝上補之

關上脉芤大便去血宜服生地黃并生竹皮湯灸膈輸若重下去血針關元甚者服龍骨丸關元一巨闕

關上脉伏有水氣溏泄宜服水銀丸針關元利小便止溏泄便止

關上脉洪胃中熱必煩滿宜服平胃丸針胃管先寫後補之
關上脉沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇丸茯苓丸附子湯針胃管補之

關上脉軟苦虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎丸針關元補之

關上脉遲胃中寒宜服桂枝丸茱萸湯針胃管補之

關上脉實胃中痛宜服梔子湯茱萸烏頭丸針胃管補之

關上脉牢脾胃氣塞盛熱即腹滿嚮嚮宜服紫菀丸寫脾丸
針灸胃管寫之

平尺脉主對法

尺脉浮者客陽在下焦

尺脉弱下焦冷無陽氣上熱衝頭面

尺脉弱寸彊胃絡脈傷

尺脉偏滑疾面赤如醉外熱則病

尺脉細微溏泄下冷利

素問云尺寒脉謂之後泄

尺脉虛小者足胫寒痺痺脚疼

尺脉澀下血不利多汗

素問云尺澀脉謂之多汗

尺脉沈而滑者寸白虫

尺脉細而急者筋攣痺不能行

尺脉大者熱在脬中小便赤痛

尺脉龜常熱者謂之熱中腰跨疼小便赤熱
尺脉按之不絕婦人血閉與關相應和滑者男子氣血實婦
人即爲妊娠

尺脉來而斷絕者男子小腹有滯氣婦人月水不利
尺寸俱軟弱內溫熱手足逆冷汗出

尺寸俱沈關上無有者苦心下喘

尺寸俱沉關上若有苦寒心下痛陰中冷脚痺

尺寸俱微少心力不欲言血氣不足其人脚弱短氣

尺寸俱數手足頭面有熱俱遲有寒手足頭面有冷風

尺脉浮熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散針橫骨關元寫之

尺脉緊脣下痛宜服當歸湯炙天樞針關元補之

尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯針氣海

尺脉數惡寒脣下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚散針橫

骨寫之

尺脉緩脚弱下腫

一無四字

小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥

散針橫骨寫之

尺脉滑血氣實經脉不利宜服朴消煎大黃湯下去

經血針

關元寫之

尺脉弦小腹疼小腹及脚中拘急宜服建中湯當歸湯針氣

海寫之

尺脉弱氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃茯苓湯針關元

補之

尺脉澀足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足太衝

補之

尺脉芤下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯炙丹田關元

尺脉伏小腹痛癥瘕水穀不化宜服大平胃丸桔梗丸針關

元補之

尺脉沈腰背痛宜服腎氣丸針京門補之

尺脉軟脚不收風痺一無此小便難宜服瞿麥湯白魚散針

關元寫之

尺脉牢腹滿陰中急宜服葶苈子茱萸丸針丹田關元中極
尺脉遲下焦有寒宜服桂枝丸針氣海關元寫之

尺脉實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩利大便
針關元補之

五藏積聚第七

人病有積有聚有穀氣谷一作繫夫積者藏病終不移也聚者腑
病發作有時展轉痛移為可治也穀氣者脇下牽痛按之則
愈愈復發為穀氣夫病以愈不得復發今病復發即為穀氣
也諸積大法脉來而細軟附骨者為積也寸口結積在胷中
微出寸口積在喉中關上結積在臍傍微下關者積在少腹

也各以其經所在言病之逆順也

脉有陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沈之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是謂陰陽虛實之意也凡脉浮大數動長滑陽也沈濇弱弦短微陰也陽病見陰脉者逆也主死陰病見陽脉者順也主生開前爲陽開後爲陰陽數即吐陰微即下陽弦則頭痛陰弦即腹痛以依陰陽察病也又尺脉爲陰陰脉常沈而遲寸開爲陽陽脉但浮而速有表無裏邪之所止得鬼病何謂表裏寸尺爲表閑爲裏兩頭有脉開中絕不至也尺脉上不至閑爲陰絶寸脉下不至閑爲陽絶陰絶而陽微死不治呼爲表屬腑吸爲裏屬藏陽微不能呼陰微不能吸呼吸不足月中短氣弱反在閑濡反在巔微在其上濇反在下微即陽氣不足沾熱汗出濇即無血厥而且寒

諸腑脉爲陽主熱

諸藏脉爲陰主寒

陽微則汗

陰浮自下

脈經作陰微

陽數口生瘡

陰數加微必惡寒而煩擾不得眠

陽芤吐血

脈經作陽數則吐血

陰芤下血

脈經作陰濁即下血

無陽即厥

無陰即嘔

寸口脉浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹

中熱

寸口脉沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少

氣時汗出陰氣不通

不通作併

臂不能舉

巢源作臂偏

不舉

尺脉沈細者名曰陰中之陰病苦兩脰酸疼不能久立陰氣

衰小便餘瀝陰下濕癢

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然

尺脉牢而長閑上無有些爲陰干陽其人苦兩脰重少腹引

尺中結積在氣衝上關上積在心下脉出在左積在左脉出
在右積在右脉兩出積在中央各以其部處之寸口沈而橫
者脇下及腹中有橫積痛其脉弦腹中急痛腰背痛相引腹
中有寒疝瘕

脉弦緊而細微者癟也夫寒痺癟瘕積聚之脉狀皆弦緊若
在心下即寸弦緊在胃管即關弦緊在臍下即尺弦緊一曰
閏脉長弦有積在臍左右上下

又脉瘤法左手脉橫瘤在左右手脉橫瘤在右脉頭大在上
頭小在下

又一法橫脉見左積在右見右積在左偏得洪實而滑亦爲
積弦緊亦爲積爲寒痺爲疝痛內有積不見脉難治見一脉
相應爲易治諸不相應爲不合治也左手脉大右手脉小上
病在左脅下病在左足右手脉大左手脉小上病在右脅下

病在右足脉弦而伏者腹中有癥不可轉也必死不治脉來細而沈時直者身有癰腫若腹中有伏梁脉來沈而虛者泄注也脉來小沈實者胃中有積聚不可下食即吐

陰陽表裏虛實第八

弦爲少陽緩爲陽明洪爲太陽三陽也微爲少陰遲爲厥陰沈爲太陰三陰也

脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此言之寸口有六脉俱動耶然經言如此者非有六脉俱動也謂浮沈長短滑濇也凡脉浮滑長者陽也沈濇短者陰也所以言一陰一陽者謂脉來沈而滑也二陰二陽者謂脉來沈滑而長也一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脉來浮而濇也一陽二陰者謂脉來長而沈濇也一陽三陰者謂脉來沈濇而短時一浮

腰痛

寸口壯大尺中无有此爲陽干陰其人苦腰背痛陰中傷足
脛寒

人有三虛三實者何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診
之虛實脉之虛實者脉來濡者爲虛牢者爲實也病之虛實
者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者爲實緩者爲虛急
者爲實也診之虛實者癢者爲虛痛者爲實外痛內快爲外
實內虛內痛外快爲內實外虛故曰虛實也

問曰何謂虛實呑邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所
謂重實者大熱病氣熱脉滿是謂重實也

脉盛皮熱腹脹前後不通惡督爲五實
脉細皮寒氣少洩痢注前後飲食不入爲五虛

何時得病第九

何以知人露卧得病陽中有陰也何以知人夏月得病諸陽入陰也何以知人春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋得病無腎脉冬得病無脾脉四季之月得病

扁鵲華佗察聲色要訣第十

病人五藏已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫謠言者不可治

病人陰陽俱絕掣手衣掇空妄言者死

病人妄語錯亂及不能語者不治熱病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者不死青如草滋死

病人面黃目赤者不死赤如衃血死

病人面黃目白者不死白如枯骨死

病人面黃目黑者不死黑如焰死

病人面目俱等者不死

病人面黑目青者不死

病人面青目白者死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經
膽氣妄泄目則爲青雖有天救不可復生

病人面赤目白者十日死憂恚思慮心氣內索面色反好急

求棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索

病人面黑目白者八日死腎氣內傷病因留積

病人面青目黃者五日死病人著牀心痛短氣脾竭內傷百
日復愈能起彷徨因坐於地其立倚牀能治此者可謂神良

病人面無精光若土色不受飲食者四日死

病人目無精光及牙齒黑色者不治

病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死

病人耳目及顴頰赤者死在五日中

病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩顴上者亦死在五日中

病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在三日中

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死

病人面黑目直視惡風者死

病人面黑脣青者死

病人面青脣黑者死

病人面黑兩脣下滿不能自轉反者死

病人目回回直視肩息者一日死

病人陰結陽絕目精脫恍惚者死

病人陰陽絕竭目眶陷者死

病人眉系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不返者死

病人口張者三日死

病人脣青人中反者三日死

病人脣反人中滿者死

病人脣口忽乾者不治

病人脣腫齒焦者死

病人齒忽變黑者十三日死

病人舌卷彌縮者必死

病人汗出不流舌卷黑者死

病人髮直者十五日死

病人髮如乾麻蓋怒者死

病人髮与眉衝起者死

病人爪甲青者死

病人爪甲白者不治

病人手足爪甲下肉黑者八日死

病人榮衛竭絕面浮腫者死

病人卒腫其面蒼黑者死

病人手掌腫無文者死

病人臍腫反出者死

病人陰囊茎俱腫者死

病人脉絕口張足腫者五日死

病人足趺腫嘔吐頭重者死

病人足趺上腫兩膝大如斗者十日死

病人卧遺屎不覺者死

病人尸臭者不可治

肝病皮白肺之日庚辛死

心病目黑腎之日壬癸死

脾病腎青肝之日甲乙死

肺病頰赤目腫心之日丙丁死

腎病面腫腎黃脾之日戊己死

青欲如蒼璧之澤不欲如藍

赤欲如帛裹朱不欲如赭

白欲如鵝羽不欲如鹽

黑欲如重漆不欲如炭

黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土

診五藏六腑氣絕證候第十一

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人

汗一作泣出如水不止一日死

病人膽絕七日死何以知之眉爲之傾

病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青呼罵不休一曰八日死

病人心絕一日死何以知之肩息回視立死一曰目亭二日死

病人腸一云小腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白

汗不止

病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臍脹泄利不覺出無時度一曰五日死

病人胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆

平日肺腸九日死

病人肉絕六日死何以知之耳乾舌皆腫溺血大便赤泄一曰足腫九日死

一曰死

病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還虛

一曰鼻口張短氣

病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

病人腎絕四日死何以知之齒爲暴枯面爲正黑目中黃色
腰中欲折白汗出如流水一日人中平七日死

病人骨絕齒黃落十日死

諸浮脉無根者皆死已上五藏六腑爲根也

診四時相反脉第十二

春三月木王肝脉治當先至心脉次之肺脉次之腎脉次之此爲王相順脉也到六月土王脾脉當先至而反不至反得腎脉此爲腎反脾也七十日死何謂腎反脾夏火王心脉當先至肺脉次之而反得腎脉是謂腎反脾期五月六月忌丙丁脾反肝三十日死何謂脾反肝春肝脉當先至而反不至脾脉先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙腎反肝三歲死何謂腎反肝春肝脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反肝期七月八月忌庚辛腎反心二歲死何謂腎反心夏心脉

當先至而反不至腎脉先至是謂腎反心期六月忌戊己此中不論肺金之氣踈略未諭指南又推五行亦頗顛倒待求別錄上

凡療病察其形與神氣色澤脉之盛衰病之新故乃可治之形氣相得色澤以浮脉從四時此爲易治形氣相失色天不澤脉實堅甚脉逆四時此爲難治

逆四時者春得肺脉夏得腎脉秋得心脉冬得脾脉其至皆懸絕澀者曰逆春夏沈澀秋冬浮大病熱脉靜泄利脉大脫血脉實病在中脉堅實病在外脉不實名逆四時皆難療也凡四時脉皆以胃氣爲本雖有四時王相之脉無胃氣者難差也何謂胃脉來弱以滑者是也命曰易治

診脉動止投數踈數死期年月第十三

脉一動一止二日死一經云一日死

脉二動一止三日死

脉三動一止四日死或五日死

脉四動一止六日死

脉五動一止七日死或五日死

脉六動一止八日死

脉七動一止九日死

脉八動一止十日死

脉九動一止九日死又去十一日死一經云十三日死若立

春死

脉十動一止立春死一經云立夏死

脉十一動一止立夏死一經云夏至死又立秋死

脉十二動十三動一止立秋死一經云立冬死

脉十四動十五動一止立冬死一經云立夏死

脉二十動一止一歲死若立秋死

脉二十一動一止二歲死

脉二十五動一止二歲死一經去一歲死又去立冬死

脉三十動一止三歲死若三歲死

脉三十五動一止三歲死

脉四十動一止四歲死

脉五十動一止五歲死不滿五十動一止五歲死

五行氣畢陰陽數竇榮衛出入經脉通流晝夜百刻五德相生

生脉來五十投而不止者五藏皆受氣即無病也

脉來四十投而一止者一藏無氣却後四歲春草生而死

脉來三十投而一止者二藏無氣却後三歲麥熟而死

脉來二十投而一止者三藏無氣却後二歲桑椹赤而死

脉來十投而一止者四藏無氣歲中死得節不動出清明死

遠不出穀雨死矣

脉來五動而一止者五藏無氣却後五日而死

脉一來而久住者宿病在心主中治

脉二來而久住者病在肝枝中治

脉三來而久住者病在脾下中治

脉四來而久住者病在腎間中治

脉五來而久住者病在肺枝中治

五脉病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四

扁鵲曰夫相死脉之氣如羣鳥之聚一馬之馭糸水交馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之裏不在榮衛伺候交射不可知也

脉病人不病脉來如屋漏雀啄者死屋漏者其來既絕而止也而疾雀啄者脈來甚數又經言得病七八日脉如屋漏雀啄者死如彈人手
如黍米也脉來如彈石去如解索者死彈石者辟辟急也解索者動數而隨散亂無復次緒也

脉困病人脉如蝦之游如魚之翔者死蝦游者茀茀而起尋退沒不知所在久乃復起起輒遲而沒去速者是也魚翔者似魚不行而但掉尾動頭身搖而久住者是也脉如懸薄卷索者死脉如轉豆者死脉如偃刀者死脉涌涌不去者死

脉忽去忽來暫止復來者死脉中侈者死脉分絕者死上分散也脉有表無裏者死經名曰結去即死何謂結

脉在指下如麻子動搖屬腎名曰結去死近也

脉五來不復增減者死經名曰代何謂代脉五來一止也脉七來是人一息半時不復增減亦名曰代正死不疑

經言病或有死或有不治自愈或有連年月而不已其死生存亡可切脉而知之耶然可具知也設病者若閉目不欲見人者脉當得肝脉弦急而長而反得肺脉浮短而濶者死病若開目而渴心下牢者脉當得緊實而數反得沈滑而微者死

病若吐血復軌衄者脉當得沈細而反得浮大牢者死病若譖言妄語身當有熱脉當洪大而反得手足四逆脉反沈細微者死

病若大腹而洩脉當微細而涩反得緊大而滑者死此之謂也經言形脉與病相反者死奈何然病若頭痛目痛脉反短濶者死

病若腹痛脉反浮大而長者死

病若腹滿而喘脉反滑利而沈者死

病若四肢厥逆脉反浮大而短者死

病若耳聾脉反浮大而濇者死

千金翼云脉大者
生澁遲細者難治

病若目瞑脉反大而緩者死

左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此為逆逆者死不可治

脉來沈之絕濡浮之不止推手者半月死半日

脉來微細而絕者人病當死

人病脉不病者生脉病人不病者死

人病尸厥呼之不應脉絕者死脉當大反小者死

肥人脉細小如絲欲絕者死

羸人得躁脉者死

人身澀而脉來往滑者死

人身滑而脉來往澀者死

人身小而脉來往大者死

人身大而脉來往小者死

人身短而脉來往長者死

人身長而脉來往短者死

尺脉上應寸口太遲者半日死

脈經云尺脉不應時如馳半日死

診五藏六腑十二經脉皆有相反有一反逆即爲死候也

診百病死生要訣第十五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短皆如其人形性者吉反之者凶

診傷寒熱盛脉浮大者生沈小者死傷寒已得汗脉沈小者生浮大者死

溫病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治
溫病時行大熱其脈細小者死

脉經時行作攘攘

溫病下利腹中痛甚者死不治

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅彊急者生虛緩者死

熱病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾者八日死四五日頭痛腹痛而吐脉來細彊十二日死八九日頭不疼身不痛目不赤色不变而反利脉來牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死

熱病七八日脉不轉喘一作不散數作者當瘡瘍後三日溫汗不出者死

熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌焦乾黑者死

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難差

熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治

熱病脉躁盛而不得汗者此陽之極也十死不治

熱病已得汗脉常躁盛陰氣之極也亦死

太素作陽極

熱病已得汗常大熱不去者亦死

大作專

熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治也

熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下利

診人被風不仁痠蹙其脉虛者生

巢源云數者生

虛堅急疾者死

診癲病虛則可治實則死

癲疾脉實堅者生脉沈細小者死

癲疾脉搏大滑者久久自已其脉沈小急實不可治小堅急亦不可療

診頭痛目痛久視無所見者死

作卒視一

診人心腹積聚其脉堅彊急者生虛弱者死又實彊者生沈者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長者死腹脹滿便

血脉大時絕極下血脉小疾者死

心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死

腸澼便血身熱則死寒則生

腸澼下白沫脉沈則生浮則死

腸澼下膿血脉懸絕則死滑大則生

腸澼之屬身熱脉不懸絕滑大者生懸濇者死以藏期之

腸澼下膿血脉沈小流連者生數疾且大有熱者死

腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死

洞洩食不化下膿血脉微小者生浮大數者死

洩注脉緩時小結者生浮大數者死

瘞蝕陰疽其脉虛小者生緊急者死

欬嗽脉沈緊者死浮直者生浮軟者生小沈伏匿者死

欬嗽羸瘦脉形堅大者死

欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下脫形熱不去者死
欬而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絕者死

吐血衄血脉滑小弱者生實大者死

汗出若衄其脉小滑者生大躁者死

唾血脉緊彊者死滑者生

吐血而欬上氣其脉數有熱不得卧者死

傷寒家欬而上氣其脉數散者死謂其人形損故也

上氣脉數者死謂其形損故也

上氣喘息低昂其脉滑手足溫者生脈澀四肢寒者死

上氣面浮腫肩息其脉大不可治加利必死

一作甚

上氣注液其脉虛寧寧伏匿者生堅強者死

寒氣上攻脈實而順滑者生實而逆澀則死

太素云太寒氣暴上脉滿實

何如曰實而滑則生實而逆則死其形盡滿何如曰舉形
盡滿者脉急大堅尺滿而不應如是者順則生逆則死何

謂順則生逆則死曰所謂逆者手足寒也

消渴其脉數大者生細小浮短者死

消渴其脉實大病久可治脉懸小堅急病久不可治

消渴脉沉小者生實堅大者死

水病脉洪大者可治微細者不可治

水病脹閉其脉浮大軟者生沉細虛小者死

水病腹大如鼓脉實者生虛者死

卒中惡吐血數升脉沉數細者死浮大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊而浮者死緊細而微者亦生

病瘡腰脊彊急瘻癰者皆不可治

寒熱瘻癰其脉代絕者死

金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死

金瘡出血脉沈小者生浮大者死

研瘡出血一二石脉來大三十日死

研刺俱有病多少血出不自止斷者脉止脉來大者七日死從高頓什內有血腹脹滿其脉堅彊者生小弱者死人爲百藥所中傷脉微細者死洪大而速者生脈遲速

人病甚而脉不調者難差

人病甚而脉洪易差

人陰陽俱結者見其上齒如熟小豆其脉躁者死結一作竭

人內外俱虛身躄冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆躄不得安靜者死

脉實滿手足寒頭熱春秋生冬夏死

老人脉微陽羸陰彊者生脉焱大加息者死
陰弱陽彊脉至而代奇月而死

尺脉濶而堅爲血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上行此爲婦人胞中絕傷有惡血久成結瘕得病以冬時黍穄赤而死尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者是穀氣不充病得節輒動棗葉生而死此病秋時得之

左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至關關至尺三部之位處處動搖各異不同其人病仲夏得之此脉桃花落而死作花一葉

右手寸口脉偏沈伏乍小乍大朝來浮大暮夜沈伏浮大即太過上出魚際沈伏即下不至關中往來無常時時復來者渝葉枯落而死憊英

右手尺部脉三十動一止有頃更還二十動一止乍動乍踈不與息數相應其人雖食穀猶不愈藜草生而死左手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循直木如循

張弓弦絇絇然如兩人共引一索至立春而死

脉經作至立冬死

診三部脉虛實訣死生第十六

凡三部脉大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒四五歲者脉呼吸八至細數吉

千金翼云人大而脉實人苦而脉細人虛性急

而脉緩性緩而脉躁人壯而脉細人羸而脉急

則無治反此爲順順則易治凡婦人脉常欲濡弱於丈夫小兒

駢疾呼吸八至也

三部脉或至或不至冷氣在胃中故令脉不通

三部脉虛其人長病得之死虛而濇長病亦死虛而滑亦死虛而緩亦死虛而弦急癲病亦死

三部脉實而大長病得之死實而滑長病得之生卒病得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲病可治之

三部脉彊非稱其人病便死

三部脉羸非其人得之死

三部脉龜長病得之死卒病得之生

三部脉細而軟長病得之生細而數亦生微而緊亦生

三部脉微而伏長病得之死

三部脉軟長病得之不治自愈治之死卒病得之生

三部脉浮而結長病得之死浮而滑長病亦死

三部脉浮而數長病風得之生卒病得之死

三部脉芤長病得之生

三部脉弦而數長病得之生卒病得之死

三部脉革長病得之死卒病得之生

三部脉堅而數如銀釵股蠱毒病必死數而軟蠱毒無病得之生

三部脉濶濶如羹上肥長病得之死卒病得之生

三部脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生

三部脉如霹靂長病得之死

三部脉如角弓長病得之死

三部脉累累如貫珠長病得之死

三部脉如水淹然流長病不治自愈治之反死

三部脉如屋漏長病十四日死

脈經云
十日死

三部脉如雀啄長病七日死

三部脉如金中湯沸朝得暮死夜半得日中死日中得夜半死

三部脉急切腹間病又婉轉腹痛針上下差

備急千金要方卷第二十八

金澤文庫