



11+1

内閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (30)
函號	300 211



Blank page with faint grid lines and ghosting of text from the reverse side.

Blank page with a large, faint watermark or ghosting of text from the reverse side.



重校聖濟總錄卷二十

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

諸痺門

筋痺

骨痺

腸痺

周痺

風冷痺

風濕痺

風濕痺身體手足不隨

痺氣

熱痺

筋痺

論曰經曰風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以春
遇此者為筋痺其狀拘急屈而不伸是也筋痺不
已復感於邪內舍於肝是為肝痺其狀夜卧則驚
飲多數小便上為引如懷蓋淫氣乏竭痺聚在肝
治法以筋痺為先筋痺既平則邪弗入於肝矣
大麻丸方 治筋風四肢攣痺

天麻 細辛 菖蒲 赤箭 地榆 人參
各二兩 附子 芎藭 木香 桂 苦參
各一兩 牛膝 去苗 陳橘皮 湯浸去白 當歸 切
三兩 二兩 焙乾一兩

赤芍藥 酸棗仁 威靈仙 藁本 防
風 獨活 各二兩

右為細末鍊蜜和杵為丸如梧桐子大每服溫
酒下二十九丸日二服加至三十九

牛膝湯方 治筋痺以筋虛為風所傷故筋攣縮
腰背不伸強直時痛

牛膝 酒浸 防風 丹參 前胡 石斛 二兩
半 杜仲 塗酥 秦艽 去苗 續斷 各一兩
一兩 大麻仁 合



右除大麻仁外擣篩每服五錢煎熟別下麻仁末一錢再煎空心服日二

獨活散方 治筋痺肢體拘急不得伸展

獨活三兩 附子炮裂去臍 薏苡仁 蒼耳子

防風 蔓荆實 芎藭 細辛 秦艽 葛

蒲各兩

右為散每服一錢水煎空腹以溫酒調下日二

茯神散方 治肝痺多驚悸神思不安

茯神 酸棗仁 黃耆 人參各一兩 熟乾地

黃 遠志 五味子各半兩 白茯苓一兩 丹砂

別研半兩

右除丹砂外擣羅為散入丹砂末再研勻每服一錢以溫酒調下

補肝湯方 治肝痺內兩脇下滿筋急不得太息

疝痕四逆搶心腹痛目不明夜卧則驚飲多小便數

白茯苓一兩 烏頭一枚 枳仁 研 栝子仁 研

防風 細辛各二兩 山茱萸 桂各三分 甘草

兩半

右九味剉如麻豆入研藥拌勻每服五錢棗二枚同煎數沸溫服

細辛湯方 治肝虛氣痹兩脇脹滿筋脈拘急不得喘息四肢少力

細辛 防風 白茯苓 栝子仁研 桃仁

湯浸去皮 各半兩 山茱萸 草各三分 蔓荆實 枳

殼去瓢麩炒 各半兩

右每服三錢棗三枚水煎溫服如足脛痿弱加

薏苡仁 木瓜 草薺 五加皮

防風湯方 治肝痹頭目昏塞四肢不利胸腹虛煩

防風一兩 芎藭 黃耆 五味子 人參

茯苓 獨活 羚羊角鎊 前胡各三分 細辛

酸棗仁 甘草各半兩

右每服三錢大棗三枚水煎溫服

五加皮酒方 治筋痹多悲思顏色白四肢不營諸筋拘攣伸動縮急腹中轉痛

五加皮

枳刺

炒

豬椒根皮

各八兩

丹參

八兩

桂

三兩

當歸

三兩

甘草

炙

天雄

秦椒

去閉口及目炒

白鮮皮

木通

各半兩

芎藭

乾薑

各五兩

兩

薏苡仁

半斤

大麻仁

三斤

右剉如麻豆大以夾絹袋盛貯清酒三斗浸之
春夏三日秋冬六七日初服二三合稍加以知

為度

骨痹

論曰經謂人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然

不凍慄是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎
脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨
腎不榮則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍
慄肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二
火故不能凍慄病名曰骨痹是人當攣節也夫骨
者腎之餘髓者精之所充也腎水流行則髓滿而
骨強迨夫天癸虧凝澀則腎脂不長腎脂不長則
髓涸而氣不行骨乃痹而其證內寒也雖寒不為
凍慄則以肝心二氣為陽火一水不能勝之特為

骨寒而已外證當攣節則以髓少而筋燥故攣縮而急也

肉菀蓉丸方 治寒濕補骨髓

肉菀蓉 酒浸切 獺肝 一具塗酥炙切 柴胡 去苗 秦艽

各三分 巴戟天 去心 黃耆 剉各一兩 人參 半兩 白茯苓

三分 熟地黄 半兩 澤瀉 附子 炮製去皮

遠志 一兩 山芋 蒺藜子 各半兩 石斛 去根三分 厚

朴薑汁 五味子 桂 去麤皮 桃仁 湯浸去皮炒研 丁香

檳榔 陳橘皮 湯浸去白 赤石脂 白朮 乾

薑 郁李仁 去皮研 甘草 炙 牡丹皮 蜀椒

去目閉口者 山茱萸 芎藭 牡蠣 炒半兩

右擣研為末再和勻鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服酒下三十丸不拘時日三服

石斛丸方 治腎虛骨痺肌體羸瘦腰脚痠疼飲食無味小便滑數

石斛 去根 牛膝 酒浸切焙 續斷 各三分 兔絲子 酒浸別研

石龍芮 炒 桂 各一兩 肉菀蓉 酒浸三分 鹿茸 去毛酥炙

一兩 杜仲 白茯苓 熟乾地黄 各三分 附子 一兩

巴戟天兩半

防風三分

桑螵蛸炙

芎藭

各半

山茱萸三分

覆盆子半兩

兩

補骨脂

藟

澄茄各三分

五味子半兩

兩

澤瀉一兩

沉香

藁

香子各三分

分炒

薏苡仁

炒一兩

右為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服

空心以溫酒下三十九日二服

熟乾地黄丸方 治腎虛骨痺面色萎黑足冷耳

鳴四肢羸瘦脚膝緩弱小便滑數補腎

熟乾地黄

肉蓯蓉

酒浸

菴石

煨醋淬二兩

山茱

萸三分

分

桂皮

附子

各半兩

山芋

三分

牛膝

酒浸

切焙

石南

白茯苓

澤瀉

黃耆

各三分

鹿

茸去毛酥

炙二兩

五味子

三分

石斛

一兩

覆盆子

遠志三分

分

補骨脂

炒一兩

草薺

巴戟天

各三分

杜仲

一兩

兔絲子

二兩酒浸別研

白龍骨

兩

右為末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服

附子獨活湯方 治腎臟中風寒濕骨痺腰脊疼

痛不得俛仰兩脚冷瘡緩弱不遂頭昏耳聾語

音渾濁四肢沉重

附子 獨活各一兩 防風 芎藭 丹參 草

藜 菖蒲各半兩 天麻 桂各一兩 黃耆半兩 當

歸 細辛 山茱萸 白朮 甘菊花 牛

膝酒浸 枳殼 甘草各半兩

右每服三錢生薑三片水煎溫服

鹿茸天麻丸方 治腎臟氣虛骨痺緩弱腰脊痠

疼臍腹虛冷顏色不澤志意昏憤

鹿茸酥炙一兩 天麻一兩半 附子 巴戟天 菖蒲

各一兩 石斛一兩半 乾蝎 草藜 桂 牛膝酒浸

天雄 獨活 丹參 當歸 杜仲各一兩

肉蓯蓉酒浸切焙一兩半

右為末鍊蜜和勻杵三五百下丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸晚食前以溫酒下

腎瀝湯方 治腎臟久虛骨疼腰痛足冷少食無力

慈石煨醋淬二兩 肉蓯蓉酒浸 黃耆 人參 白

茯苓 芎藭 桂去皮 菖蒲 當歸 熟乾

地黃 石斛 覆盆子 乾薑 附子 五

味子 各一兩

右每服三錢用羊腎一隻去脂膜先用水二盞
煮羊腎取汁一盞去腎入藥末煎七分去滓溫
服空心日午夜卧共三服

腸痹

論曰內經曰腸痹者數飲而出不得中氣喘爭時
發飧泄夫大腸者傳導之官其所以傳導者皆冲
和之氣今風寒濕三氣乘虛客於腸間則邪留而

和氣閉矣故其證數飲而出不得中氣喘爭時發
飧泄大小腸氣痹水道不通故雖多飲食而不得
洩便并氣於大腸使糟粕不化故中氣喘爭時發
飧泄也

吳茱萸散方 治腸痹寒濕內搏腹滿氣急大便

飧泄

吳茱萸 湯浸焙乾 炒半兩 肉豆蔻仁 乾薑 甘草

各半兩 陳橘皮 湯浸 去白 厚朴 生薑 汁炙 高良薑 各二兩 縮

砂仁 陳麴 炒 白朮 各一兩

右為散每服一錢粥飲調下食前服

草豆蔻散方 治腸虛寒濕內攻腹痛飧泄

草豆蔻 陳橘皮 湯浸去白 桂 木香 白

術 當歸 切焙 白豆蔻仁 丁香 肉豆蔻

仁 良薑 各半

右為散每服一錢生薑棗湯調下食前服

赤茯苓丸方 治腸痺腹滿喘爭小便不利大便

飧泄

赤茯苓 白朮 桂 各二兩 木香 訶藜勒 煨去

核 陳橘皮 湯浸去白 厚朴 生薑汁炙 甘草 炙

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九米

飲下空心食前服

訶藜勒湯方 治腸痺飧泄腹脹氣飲食不化

訶藜勒 煨用一兩半 附子 一兩 當歸 三分 桔梗 半兩

肉豆蔻 三兩 木香 半兩 吳茱萸 湯浸七分炒一分

陳橘皮 浸去白 甘草 一分

右每服五錢生薑半分棗二枚水煎熱服

木香丸方 治腸痺腹脹疼痛時復飧泄食不消

化

木香

一兩

訶藜勒

煨用皮一兩半

白朮

一兩

桂

一兩

附子

二兩

蕪荑

炒一兩

高良薑

一兩

肉豆蔻

半兩

厚朴

薑汁炙過二兩

乾薑

炮三分

甘草

半兩

右爲末以麴末煮作糊和擣三二百杵丸如梧

桐子大食前生薑棗湯下二十九

訶藜勒丸方

治腸痹飧泄腹脇脹滿

訶藜勒

煨用皮一兩

乾薑

三分

當歸

炒一兩

黃連

去鬚

白朮

一兩

木香

三分

厚朴

生薑汁炙一兩

右爲末鍊蜜和杵二三百丸如梧桐子大每服

三十丸粥飲下不拘時候

木香散方

治腸痹腹脹飧泄小便不利

木香

三兩

訶藜勒

用皮半兩

附子

半兩

乾薑

一兩

厚朴

生薑汁炙二兩

枳實

一兩

甘草

赤茯苓

半兩

當歸

一兩

右爲細末每服二錢粥飲調下食前服

周痹

論曰黃帝鍼經謂周痹者在於血脈之中隨脈以

上隨脈以下不能左右各當其所夫風寒濕之爲痺本痺而不通今乃能周身上下者以其邪中於血脈之間與脈流通隨氣上下升降無礙也

巴戟天散方 治周痺肢體痿弱不能行履

巴戟天兩半 芎藭分一 附子分三 白斂分一

黃耆 桂 細辛各半兩 桔梗兩一 人參兩半

芍藥分一 牡荊實 天雄各半兩 肉苳蓉酒浸一分

草薺兩半 赤茯苓 牛膝酒浸各一兩 山芋 菊

花未開者炒 秦艽各半兩 烏啄去皮臍 遠志各一兩 山茱

萸 黃芩 白朮 石斛去根剉 白礬研如粉各半兩

五味子分三 龍腦 蜀椒去目并合口者各一分炒出汗 厚

朴生薑汁炙半兩 菖蒲九節者去鬚節先用米泔浸後切焙用一兩

右三十一味除白礬別研外將三十味搗羅爲末次入白礬末拌勻重羅每服半錢加至一錢

溫酒調下日二夜一未覺身脣口痺熱卽漸加至一錢半如覺大痺心煩以少許豉湯解之

遠志散方 治周痺不仁

遠志 黃耆各半兩 芍藥兩一 五味子 黃芩

各一分 赤茯苓去皮 牡荊實三分 秦艽一兩 烏

頭去皮 天雄去皮 細辛 山茱萸 菊花開者

炒各半兩 防風三分 狗脊 桂 芎藭 蕪蘘微炒

半兩 菖蒲米泔浸去節皮焙 菱麩去土及鬚焙各三分 白斂生用

山芋 附子 龍膽去苗 厚朴生薑汁炙 蜀

椒去目并開口者炒出汗 巴戟天去心各一分

右為散每服一錢空心溫酒調下加至二錢日二夜一

黃耆湯方 治周痺身體不仁

黃芩 甘草 防風各半兩 秦艽 葛根 杏

仁麩炒各一分 桂 當歸 赤茯苓各半兩

右為散每服六錢水酒各半棗二枚生薑一片同煎溫服日二夜一

白朮散方 治積年周痺頭髮禿落癰癧生瘡氣脈不通搔之不覺痛癢

白朮三兩 附子二兩 石斛半兩 蜀椒去目并閉口者

焙乾薑 天雄 細辛三分 烏頭一兩 羊躑

躑半兩 石南用葉灑醋微炒三分 桂一兩 防風二兩半

右為散每服半錢至一錢加至一錢半溫豆淋酒三合調下空心臨卧各一服每服藥後宜以少白羊脯嚼汁下藥續更用三合溫豆淋酒衝滌令接藥力常令有酒氣其藥以韋皮袋貯勿泄其氣初服身與髀膝有汗宜慎外風

金牙散方 治周痺脚脛細瘦痿弱不行立

金牙 別研細 防風 側子 去皮 當歸 石膏

別研 桂 各二兩 芎藭 一兩 白朮 三兩 澤瀉 細

辛 去葉 黃芩 去黑 赤茯苓 各一兩 石南葉 灑酒炒

人參 二兩

右除金牙石膏別研外將十二味擣羅為散方入金牙石膏末拌勻重羅每服一錢加至二錢空心溫酒調下日二夜一未覺更增至二錢半

附子散方 治周痺肢體脚膝無力

附子 炮製去皮 狗脊 去毛各一兩 山芋 熟乾地黃

王孫 去土 桂 去麤皮 天雄 炮製去皮 山茱萸

秦芫 去土 乾漆 酒浸炒 防風 去 甘草 各半兩

白斂 一兩

右為末每服一錢空心溫酒調下日二夜一加至一錢半服之一月愈

六生散方 治周痺身體拘痛腰膝痺痛

生菖蒲 九節者去節切焙 生地黃 生枸杞根 生

商陸根 淨浸切焙 生烏頭 四兩 生薑 去皮切

右六味先焙了各秤及本方分兩復以醇酒一斗五升淹浸一宿漉出暴乾復內酒中令酒盡再暴乾擣羅為散每服半錢以清酒一盞調下加至一錢空心臨卧各一服

續命湯方 治八風十二痺

羌活 三兩 茯苓 薏苡仁 炒各一兩

右每服六錢別入竹瀝一匙更煎數沸溫服口二夜一

白石英浸酒方 治風濕周痺肢節中痛不可持

物行動無力耳聾及腎臟虛損益精髓保神守

中

白石英 碎如大麻粒 慈石 火煨令赤醋淬如

右以生絹袋盛貯用酒一升浸經五六日每服

重刊聖濟總錄 卷二十一 五 痺痿
不計隨時性溫服將盡更添新酒浸之

醍醐方 治寒濕周痺

醍醐一兩

右每日空心以溫酒五合和一匙服之

大豆藥方 治周痺除五臟留滯胸中結聚益氣

止毒潤皮毛補腎

大豆藥一升炒令香熟

右為末每空心溫酒調下一匙再加至一匙

野驪脂方 治周痺

野驪脂鍊了濾過一斤

右別入好酥四兩同鍊攪勻每服半匙以熱酒半盞和化服之加至一匙空心食前各一

風冷痺

論曰痺雖異狀然皆本於三氣寒氣多者謂之冷痺其證令人脚膝痠痛行履艱難四肢瘡麻身體俱痛甚則有一身不隨者

巴戟天湯方 治冷痺脚膝疼痛行履艱難

巴戟天三兩 五加皮二兩 草薺 牛膝酒浸

石斛 甘草各一兩半 防風 白茯苓各一兩三分 附子二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢生薑三片水煎空心溫服

牛膝散方 治冷痺脚膝疼痛無力

牛膝酒浸一兩 桂半兩 山茱萸一兩

右為散每服空心溫酒調二錢再服

虎骨散方 治中諸風毒冷痺偏枯不隨骨節疼痛手足攣拳

虎骨酥炙黃 敗龜酥炙黃一兩 何首烏酒蘚去黑皮 羌活

各半 當歸細切焙乾 芎藭 牛膝酒浸去苗 秦艽各三分

附子半兩去皮臍 威靈仙洗焙 原蠶沙炒各三分 延胡

索與糯米炒赤為度半兩 皂莢去黑皮及子炙黃一兩 檳榔煨三分

生乾地黄一兩

右為散每服溫酒調下三錢不拘時

菖蒲散方 治風冷痺身體俱痛

菖蒲 生地黄 枸杞根各四兩去心 烏頭二兩

生商陸根四兩 生薑八兩

右以清酒三升浸一宿暴乾復入酒中以酒盡
乾為度暴乾研為細散每服空心溫酒調一錢
匕日再服

車蘚丸方 治風冷痺遊走無定處亦名血痺

車蘚 山芋 牛膝酒浸 澤瀉各一兩 熟乾地

黃二兩 地膚子 乾漆炒烟出 狗脊各三兩 白朮

半兩 茵芋一分

右研為細末鍊蜜和丸如梧桐子每服空心溫
酒下二十丸

防風湯方 治風冷痺身體不隨四肢癢麻不覺

痛癢不能言語

防風 麻黃各三兩 石膏 黃芩 芎藭 當

歸各一兩 杏仁四十枚 桂二兩 熟乾地黃 甘草

各一兩

右每服五錢水煎空心溫服

白斂散方 治風冷痺腫筋急轉轉移易不常

白斂二兩 附子一兩

右擣羅為散每服空心溫酒調下二錢

羌活飲方 治風冷痺膝冷疼頗覺無力

羌活一兩 防風二兩 五加皮一兩 赤芍藥二兩

薏苡仁一兩 羚羊角三分 檳榔一枚雞心者煨 慈

石火煨醋淬五兩

右每服五錢生薑五片水煎溫服

枳實丸方 治風冷痺下焦虛寒腰膝不隨

枳實炒三分 桂二分 枳殼三分 牛膝去苗酒浸 檳榔

乾薑一兩半

右為末鍊蜜丸如梧桐子大空心晚食前溫酒

下三十九

風濕痺

論曰風濕痺者以風濕之氣傷人經絡而為痺也其狀皮膚癢厚肌肉痠痛蓋由真氣虛弱為風濕所襲久不差入於經絡搏於陽經致關機縱緩不能維持故令身體手足不隨也

防己湯方 治風濕痺肌膚不仁體常汗出惡風

防己二兩 白朮一兩半 桂 茵芋 丹參 五

加皮各一兩 牛膝酒浸 細辛 甘草各半兩

右每服五錢生薑五片水煎溫服日二

海桐皮湯方 治風濕痺不仁肢體疼痛

海桐皮 丹參 桂 防己 各一兩 甘草 麻

黃節 去根 天門冬 各二兩 側子 半兩

右每服四錢生薑五片水煎溫服

白花蛇丸方 治風濕痺四肢緩弱皮膚不仁精

神昏憤

白花蛇 酒浸去皮 骨二兩 薏苡仁 附子 草薺

仙靈脾 各一兩 羌活 天南星 天麻 桂

芎藭 各三兩 莽草 微炙 乾蝎 烏頭 防風

楓香脂 各半兩

右為細末糯米粥和擣三百杵丸如小豆大每服十丸荆芥湯或溫酒下

草薺丸方 治風濕痺肢體疼痛不能行動

草薺 四兩 牛膝 三兩 丹參 附子 白朮

枳殼 各二兩

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下

防己湯方 治風濕痺脈浮身重汗出惡風

防己 二兩 甘草 黃耆 麻黃 去根節煎去沫焙各一兩

白朮 一兩半

右每服五錢棗二枚生薑三片水煎空心溫服
夜卧并二服服訖用椒葱湯浴繼以生薑酒粥
投之汗出慎外風皮膚中當如蟲行

蒼耳飲方 治風寒濕痺四肢拘攣

蒼耳 微炒三兩

右為末每服二錢水煎溫服

大黃丸方 治男女惡風濕痺周身不仁小腹拘

急繞臍疼痛頭目昏眩時吐涎沫咳嗽背強難
以俛仰心下懊懺面目脫色喉咽不利耳聾惡
寒飲食失味膀胱忽滿大小便不利兩脛痠痛
手足厥逆吸吸短氣時復失精白汁自出夢寐
不安心神恍惚肌膚癢癢

五味子 炒 廔蟲 熬 芎藭 肉蓯蓉 酒浸

白薇 黃連 去鬚 牡丹皮 各三分 阿膠 燥 麥

門冬 續斷 石斛 甘草 吳茱萸 湯浸焙炒

商陸根 芒硝 細辛去苗葉 厚朴生薑汁炙 黃芩

各半 桂去麤皮 蜀椒去目并閉口者炒出汁 乾薑 當歸

各一兩 烏頭去皮 生乾地黄各一兩一分 大黃二兩半

附子一分

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸日二服溫水下漸加至十丸以知為度

乳香丸方 治風寒濕氣留於血脈癢痺不仁

乳香研 沒藥研 五靈脂研各一分 烏頭 草

烏頭炮 白殭蠶炒 附子去皮 自然銅醋炒

各半 黑牽牛瓦土炒 天麻酒浸切焙各一兩

右為末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸薄荷酒下

楮實丸方 治風冷濕痺腰脚不利

楮實六兩 桂 乾薑炮 枳殼去白麩炒各兩半 牛

膝酒浸三兩 檳榔二兩半

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前酒下

菖蒲散方 治風濕冷痺身體俱痛

菖蒲 生地黃 枸杞根 商陸根 生者各四兩

烏頭 二兩 生薑 半斤

右以清酒一升浸一宿暴乾復內酒中如此以

酒盡為度暴乾擣羅為散每空心煖酒調一錢

日二服

芍藥飲方 治風濕痺身體痛惡風微腫

赤芍藥 麻黃 去根節 天門冬 各三兩 杏仁 去皮

尖雙仁炒黃五十枚

右每服五錢生薑一片棗二枚水煎溫服

防己飲方 治寒風濕痺四肢攣急或身體浮腫

防己 桑根白皮 桂 麻黃 去根節 白茯苓 各三兩

苓 四兩

右每服五錢水煎溫服不拘時候

芍藥飲方 治風濕痺皮膚癢厚肌肉痠痛不可

屈伸

赤芍藥 芍藥 各四兩 附子 二兩 甘草 三兩

右每服五錢水煎溫服

側子浸酒方 治風濕痺不仁脚弱不能行

側子

去皮

牛膝

酒浸

丹參

山茱萸

并子杜

仲

去麤皮炙

石斛

去根

蒟蒻根

各二兩

防風

蜀椒

去目并閉口者炒出汗

細辛

去苗葉

獨活

桂

秦芫

芎藭

當歸

白朮

茵芋

各一兩半

五加皮

二兩

半

薏苡仁

炒半斤

右以生絹袋貯用酒三斗浸春夏三日秋冬六

七宿初服三合日再稍加之以知為度

巨勝浸酒方

治風濕痺脚膝無力筋攣急痛

巨勝

炒一升半

薏苡仁

炒半升

生乾地黄

二兩

右剉令勻細生絹袋貯以酒三斗浸春夏三五

日秋冬六日每服五合空心臨卧溫服

牛膝大豆浸酒方

治久患風濕痺筋攣膝痛兼

理胃氣結聚止毒熱去黑痣面黥潤皮毛

牛膝

酒浸

大豆

緊小者炒熟一斤

生地黄

洗切一斤

右三味拌勻同蒸一饷傾出絹袋貯以酒三斗

浸一宿每服三合五合空心日午臨卧溫服

治風濕痺脚膝痺厥腰脚不隨兼治一切風脚膝

之疾方

麥麩末斤一 鹽斤三

右二味蒸令氣餹，置袋盛之，以足踏踐袋上，冷則易之。

陳元膏方 治風濕痺

當歸 附子 天雄 烏頭俱生用各一兩半 生地

黃一斤擣取汁 細辛 乾薑生 芎藭各一兩 桂

白芷生用一兩 丹砂別研各半兩 雄黃別研一分 醋一斤

半松脂四兩 豬肪不中水者去筋膜成鍊五斤

右十五味除二味研者，并地黃汁、豬肪、松脂、醋

等相次入外餘，剉切如豆粒，先將地黃汁與醋拌勻，浸一宿，取豬肪、松脂同於淨器中煎，常令小沸，候白芷色黃，停溫用厚綿濾去滓，瓷盒盛入，雄黃、丹砂末熟攪至凝止，每用塗摩病處，凡修合無令婦人、小兒及雞犬見。

塗摩膏方 治風濕痺，肌肉痛痺，四肢攣急，疼痛日久不差，令機關縱緩，不能維持身體，手足不

隨

牛膝 芍藥 芎藭 當歸 白朮 白芷

蜀椒去目并閉口者 厚朴 雷丸 半夏湯浸七遍 桔

梗炒 細辛 吳茱萸 桂 附子 木香

大腹 檳榔各一兩 酥二兩 駝脂三兩 臘月

豬脂三斤

右二十一味除後三味外並細切量藥多少以酒浸一宿先鍊豬脂成膏去滓後令入眾藥以慢火從旦煎至晚其膏成以綿裹濾去滓再入鎊中投酥并駝脂候消攪勻以瓷器盛每不拘多少藥摩之摩經七日即歇三兩日再摩之

風濕痺身體手足不隨

論曰風寒濕氣搏於氣血不得宣通則真邪相擊肌肉盡痛或皮膚痛痺甚則邪氣深入於諸陽之經陽氣行遲不能榮養於筋故機關弛縱筋脈不能收攝而令身體手足不隨也

仙靈脾丸方 治風濕痺肢節疼痛身體手足不隨

仙靈脾三分 防風半兩 羌活 白附子 犀

角屑 羚羊角屑 乳香研 虎脛骨酥炙黃

附子 當歸 牛膝 鹿茸酥炙去毛 石斛 海

桐皮各三分 乾蝎半兩 烏蛇酒浸去皮骨炙二兩 麝香細研

一兩桂半兩 檳榔半兩 木香半兩 天麻一兩 南

星半兩 白殭蠶炒半兩

右二十三味除研二味餘二十一味擣羅為末

與研者拌和令勻鍊蜜和杵五七百杵丸如梧

桐子大每服三十丸食前溫酒下

防風湯方 治風寒濕痺筋脈攣急身體手足不

隨

防風 薏苡仁各二兩 麻黃去根節煮去沫四兩 白朮

芎藭 細辛 羌活 茵芋去莖 牛膝酒浸切焙

狗脊 草薺 側子去皮 杏仁去皮炒黃 赤箭

桂去麤皮各一兩

右每服四錢生薑三片水煎溫服

天麻散方 治諸痺身體癢麻或多癢癢筋脈拘

急言語蹇澀手足不隨

天麻 白附子 羌活 防風 芎藭 獨

活 當歸 桂各半兩 白殭蠶炒 牛膝 草

薺各三分 乾蝎去土炒 麻黃各一兩

右為散每服二錢煖竹瀝半盞調下不計時候

羌活湯方 治風濕痺身體手足不隨冷疼癢痺

羌活二分 防風一兩 五加皮半兩 赤芍藥一兩

薏苡仁半兩炒 羚羊角兩 檳榔二枚煨 磁石二兩

醋淬兩半

右每服六錢生薑五片水煎空心食前服

防風飲方 治風寒濕痺半身不隨不能語言四肢麻木不知痛癢

防風一兩 麻黃去根節煮一兩 石膏 黃芩 芎

藟 當歸各半兩 杏仁去皮尖炒二十枚 桂一兩 熟乾

地黃焙 甘草半兩

右每服五錢水煎溫服日二夜一

巴戟湯方 治風寒濕痺脚膝疼痛行履不得

巴戟天去苗酒浸切焙一兩 五加皮一兩 草薺炒 牛

膝酒浸 石斛各三分 防風 白茯苓各九錢 附子

一兩 甘草三分

右每服五錢水煎空心食前溫服

菖蒲散方 治風濕痺身體手足不隨

菖蒲

九節者米泔水浸細切

生乾地黄

枸杞根

各一兩半

烏頭

商陸

一兩半

生薑

四兩切焙

右咬咀如麻豆大清酒二升浸一宿暴乾復內

酒中以酒盡為度暴乾擣羅為散空心溫酒調

下一錢七日再服

牛膝散方

治風寒濕痺肢體腰膝冷疼癢痺動

不相隨

牛膝

酒浸半兩桂一分去麤皮

山茱萸

半兩

右為散每服二錢空心食前溫酒下日再

痺氣

論曰內經謂人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何是人多痺氣也陽氣少陰氣多故寒如從水中出夫陽虛生外寒陰盛生內寒人身陰陽偏勝則自然生寒熱不必外傷於邪氣也痺氣內寒者以氣痺而血不能運陽虛而陰自勝也血凝泣而脈不通故其證身寒如從水中出也
溫補鹿茸丸方 治陽氣虛陰氣盛痺氣內寒如

從水中出

鹿茸酥炙四兩 人參 天雄 五加皮 五味子

牛膝酒浸 防風 遠志 石斛 山芋

狗脊各一兩 肉蓯蓉酒浸切焙 熟乾地黄各三兩 草薺

石南 蛇牀子 白朮各三分 巴戟天 天

門冬 杜仲各一兩半 乾薑 吳茱萸炒 桂 附

子去皮 細辛 蜀椒去日并合口者各三分 白茯苓

兔絲子酒浸別搗各一兩一分 覆盆子 石龍芮各二兩

右除兔絲子別搗外搗羅為末再拌勻鍊蜜丸
如梧桐子大每服溫酒下二十九加至三十九

空心食前日三

巴戟天丸方 治陽衰陰盛痺氣身寒

巴戟天酒浸 肉蓯蓉去皺皮酒浸 白龍骨 五味

子 鹿茸酥炙 白茯苓 天雄 續斷 山

芋 白石英各二兩半 覆盆子 兔絲子酒浸別研各三

兩 熟乾地黄二兩 蛇床子一兩炒 遠志去

乾薑各一兩半

右十六味除兔絲子別研外同搗羅為末入兔

絲子拌勻再羅鍊蜜為丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十九至三十九日再

補益黃耆丸方 治陰盛陽虛痺氣身寒如從水中出

中出

黃耆 鹿茸炙酥 白茯苓 烏頭去皮臍 乾薑

各三分 桂 芎藭 當歸 熟乾地黄各一兩 白

朮 兔絲子酒浸一宿別擣 五味子 百子仁 枸

杞根各一兩半 大棗去核二十枚

右十五味除兔絲子別擣外同擣羅再拌勻鍊

蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下五十九日

三

肉蓯蓉丸方 治陽虛陰盛痺氣身寒如從水中

出

肉蓯蓉酒浸 天雄去皮臍 石斛 當歸 桂各一兩

蜀椒去目并合口者 牛膝酒浸 陳橘皮湯浸去白 乾薑

各一兩半

右為末擣勻鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸

空心食前溫酒下

天雄丸方 治陽虛陰盛痺氣身寒如從水中出

天雄炮製去皮臍 烏頭去皮臍 石龍芮 王孫 王

不留行 蜀椒去目并合口者炒出汗 肉蓯蓉酒浸 當

歸 天麻各二兩 蛇牀子半兩

右擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服空心溫

酒下二十九日再

附子丸方 治痺氣中寒陽虛寒陰盛身寒如從

水中出

附子去皮臍 烏頭 桂去麤皮 蜀椒去目并合口者炒出汗

菖蒲去鬚 甘草各一兩 天麻 補骨脂 白朮

各二兩

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下

二十九日再

熱痺

論曰內經於痺論有云其熱者陽氣多陰氣少陽
遭陰故為熱痺蓋腑臟壅熱復遇風寒濕之雜至
客搏經絡留而不行陽遭其陰故痛痺熯熱而悶
也



石南散方 治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反壞皮膚色變兼治諸風

石南葉 山芋 天雄各一兩 黃耆三分 山茱

萸一兩 桃花生用 石膏別研 菊花未開者炒

珍珠別研三分 升麻各一兩 甘草三分 菱麩一兩 丹砂

一分別研與珍珠膏末一處同研極細

右除別研外將十味擣羅為散次入所研者藥拌勻每服一錢空心溫酒調下日二夜一漸加至二錢不拘時

升麻湯方 治熱痺

升麻 射干 甘草 芎藭 人參各二兩 赤

小豆炒三各 麥門冬 生薑 菱麩各三兩

右每服四錢生地黃汁半合青竹葉十五片水同煎溫服不拘時候

防風丸方 治熱痺

防風 羌活 茯神 牛膝酒浸 桂去麤人

參 枳殼去瓢炒 五加皮 芍藥 丹參 薏

苡仁 元參 麥門冬 生乾地黃各一兩 慈

重刊聖濟新金 卷二十一 三

石煨醋淬 檳榔二兩 松子仁 大黃 木香

各半

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服溫酒下三十丸加至四十丸

升麻湯方 治熱痺

升麻二兩 茯苓 人參 防風 犀角鎊

羚羊角 羌活去蘆頭 桂半

右每服四錢生薑一塊竹瀝少許水同煎溫服

生地黄湯方 治熱痺

生地黄研取汁 竹瀝 荆瀝各一斤 羌活 防風

各三兩 附子一枚重者去皮臍入破之

右除前三味外餘三味剉如麻豆大每服三錢

生地黄汁荆瀝竹瀝各少許水同煎服

重刊聖濟新金 卷二十一 諸痺門 三

重校聖濟總錄卷二十一

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 助懋哉校訂

傷寒門

傷寒可汗

傷寒可下

傷寒可吐

傷寒可溫

傷寒過經不解

傷寒統論

論曰風寒暑濕飲食勞倦皆能為病是謂五邪冬傷於寒者春必病溫春傷於風者夏必殮泄夏傷

重校聖濟總錄 卷二十一
於暑者秋必痲瘡秋傷於濕者冬必咳嗽是乃四
時之氣也然五邪所中雖不同本皆外邪大率同
類唯冬時嚴寒其毒厲尤甚人或中之病在冬時
則正名傷寒若邪毒藏於肌膚至春之時乘溫而
發者類溫病若留連日久至夏之時乘盛暑而發
者爲暑病所謂先夏至一日爲病溫後夏至日爲
病暑是也其病之傳次先客於太陽其病令人頭
項痛腰脊強其脈尺寸皆浮太陽不已傳於陽明
其病體熱目疼鼻乾不得臥其脈尺寸皆大陽明

不已傳於少陽其病胸脇痛而耳聾其脈尺寸皆
弦少陽不已太陰受之其病腹滿體重其脈尺寸
俱微太陰不已少陰受之其病口燥舌乾而渴或
背微惡寒其脈尺寸俱沉少陰不已厥陰受之其
病煩滿舌卷囊縮其脈寸尺俱緩病之所傳不過
三陰三陽而已其未滿三日者邪在陽經未入於
裏其病在表宜汗之而愈若經四日者邪入陰經
其病在裏宜下之而愈特其大畧爾蓋有一日而
傳之數經者亦有數日而尙在太陽者陽病雖宜

直格聖濟總錄 卷二十一 二 燕遠堂
發汗陽明之病反宜下之陰病雖宜下之少陰之
病或宜溫之由人之稟受虛盛其傳有遲速又有
不傳經者當審其脈證凡此六經受病五邪脈證
各不同傷風必惡風脈浮緩傷寒者必惡寒其脈
浮緊以至傷暑脈虛傷濕脈濡人迎緊盛爲傷寒
氣口緊盛爲傷食診得五邪知其本也診得六經
知其標也有病雖在表而不可汗者或裏而不可
下也或若汗之太多則津液燥竭遂致亡陽下之
太早則邪氣動膈乃成結胸清濁相干則變爲霍
亂熱毒內瘀則變爲瘀血又或爲發黃者濕熱相
蒸也或爲發斑者陽毒太盛也陽盛之人得之於
熱乃爲陽毒陰盛之人得之於寒乃爲陰毒蟲動
則爲狐惑壞病之甚則爲百合若勞復陰陽易之
類雖差後猶宜節慎變態多端不可備舉當以類
求之皆以適當爲良唯二感之病表裏皆受邪爲
難治其他或陰證似陽陽證似陰或陰盛隔陽陽
盛隔陰者在診病者以意詳之

傷寒可汗

論曰傷寒病汗之而愈者以初得病一日至三日陽經受邪未傳諸陰其邪在表故當發汗此大約也然病數日脈浮太陽證不罷者亦可汗之當以脈證為準凡頭痛發熱惡風振寒是為可汗之證其脈浮者是為可汗之脈陽虛則惡寒脈浮為在表或浮而弱或浮而緊或浮大而數皆宜汗之麻黃湯方 治傷寒太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風發熱無汗而喘者

麻黃 去根節 三兩 桂 去麤皮 三兩 甘草 炙 一兩 杏仁 去皮雙

仁七
十枚

右咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服覆取微汗不須啜粥餘如桂枝法將息

大青龍湯方 治傷寒太陽中風脈緊發熱惡寒身痛不汗出而煩躁

麻黃 去根節 六兩 桂 去麤皮 一兩 甘草 各二兩 杏仁 去皮尖 雙仁四

右咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服脈微汗出惡風者不可服

桂枝麻黃各半湯方 治傷寒太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒


桂去麤皮 芍藥 生薑 甘草 麻黃去根節各
一兩半 四兩 二十四枚湯浸
兩 大棗四枚 杏仁二十四枚湯浸
右咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服

桂枝湯方 治傷寒太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解

桂 芍藥 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十枚
右咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服須臾啜熱稀粥助藥力取微汗

麻黃附子甘草湯方 治傷寒少陰病得之二三日宜微發汗以二三日無裏證故微發汗

麻黃去根節 甘草各二兩 附子一枚炮製去皮臍
右咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服



葱豉湯方 治傷寒初覺一二日頭項腰脊痛惡寒

葱白十四 豉炒半 乾薑一分 麻黃去根節 桂去

皮芍藥各半

右呔咀如麻豆大每服五錢水煎溫服良久投葱豉熟粥蓋覆出汗

葱粥湯方 治傷寒服葱豉湯後未得汗再服

葱白十莖并頭切 豉三合 生薑半兩

右水五盞煎至二盞半去滓入白米依常法煮

粥入少鹽攪勻任意食之衣覆出汗未汗再服

麻黃葛根湯方 治傷寒初得一二日出汗

麻黃去根節 葛根 柴胡去苗各 芍藥三

右每服五錢水一盞豉一百粒開口椒七粒連

鬚葱白三寸薄荷二十葉同煎熟服服後葱豉

湯一盞投之衣覆取汗未快再服

解毒湯方 治傷寒初覺煩熱頭疼脚痛

芩胡半 黃芩 荆芥穗各一分

右每服五錢生薑一棗大拍碎入生地黃汁一

合白蜜半匙同煎執服

葛根湯方 治傷寒初覺頭痛惡寒壯熱腹內熱

脈洪大一二日宜服

葛根 黃芩 芫胡 去苗各半兩 葱白 五莖 豉 一合

右以咀每服五錢生薑一棗大拍碎同煎溫服
良久再服得汗即止

麻黃解肌湯方 治傷寒初患一二日體熱頭痛

麻黃 去根節一兩 石膏 碎 葛根 各一兩半 甘草 一分

芍藥 杏仁 去皮尖雙仁炒各一兩 桂 去麤皮三分

右每服五錢生薑五片水煎溫服

葛根湯方 治傷寒一二日頭痛壯熱遍身疼痛

其脈洪數

葛根 白朮 芍藥 乾薑 各半兩 麻黃 去根節

桂 去麤皮各三分 甘草 炙一分半

右每服五錢水煎熱服如脈微即加附子半兩

神丹丸方 治傷寒三日發汗

人參 白茯苓 半夏 湯浸七片炒各一兩 附子 去皮臍

烏頭

右共為末入丹砂一分研勻鍊蜜和杵三五百杵為丸如大豆大每服三丸薄荷茶下令體中潤潤然又以熱粥投之汗出即止

石膏人參解肌湯方 治傷寒初得一二日頭疼

壯熱惡寒脈浮緊

石膏碎 麻黃各一兩 芫胡去苗 人參各半兩 桂

去麤皮 甘草各一分 葛根二兩

右每服三錢入葱豉生薑同煎熱服

芫胡湯方 治傷寒三日已前表証不除

芫胡 麻黃去根節 石膏各一兩 甘草半兩

右每服三錢入鹽豉三十粒葱白二寸水煎併三服汗出為度

芫薊湯方 治傷寒初病三日內脈浮有表證

芫薊四兩 蒼朮一斤半 麩炒熟木相內杵去黑皮取淨者一斤 藁本

一兩 甘草二兩

右每服三錢生薑五片水煎并三服

荊芥湯方 治傷寒初得一二日至三日頭疼痰

逆肢體煩躁惡風身熱憎寒

荊芥根四兩 白朮 半夏湯浸七遍 甘草二兩 前

胡 旋復花各三兩 麻黃去根不節 芍藥各一兩

時候

五味桂枝湯方 治傷寒二三日頭痛體疼發表

桂去麤皮 葛根各一兩 麻黃去根節 山梔子仁半兩

石膏一分

右每服三錢葱白一莖切豉三十粒同煎熱服良久再服以葱白稀粥投之微汗即差

五解湯方 治傷寒二日內表證不解者

麻黃去根節二兩 白朮一兩半 葛根 甘草 山梔

子仁 桔梗 石膏碎 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒各

一兩

右每服三錢入葱白鹽豉同煎連併熱服不拘時候汗出為度

白朮湯方 治傷寒三日頭痛壯熱骨節痠疼

白朮 五味子 甘草 石膏各四兩 乾薑三兩

右每服三錢鹽一捻同煎連併熱服不問有汗

無汗自解如傷寒挾冷腹痛加生薑三片棗二枚同煎

六味桂枝湯方 治傷寒頭痛發熱惡寒解表

桂去麤皮 麻黃去根節 石膏 乾薑 白朮生用

蒼朮米泔浸麩炒各一兩

右每服三錢生薑三片葱白二寸豉七粒同煎服不拘時候

人參湯方 治傷寒一日至三日頭痛壯熱煩悶其脈洪數

人參一兩 白朮 甘草炙各半兩 麻黃去根節 桂去麤皮

右每服三錢生薑三片同煎連併溫服不拘時候衣覆出汗

十味人參湯方 治傷寒頭痛體疼寒熱不解

人參 厚朴生薑汁炙 桂 甘草 杏仁去皮尖雙仁炒

白朮 乾薑 白茯苓 陳橘皮湯浸去白各一兩

麻黃去根節湯煮去沫二兩

右每服三錢生薑二片棗一枚同煎熱服纔覺

傷風併三兩服汗出立差

羌活湯方 治傷寒表不解頭痛體痠發汗

羌活 獨活 柴胡 人參 白茯苓 桔

梗 前胡 芎藭 甘草 炙各一兩 枳殼 去瓢麩炒二兩

右每服三錢生薑二片薄荷少許同煎溫服不

拘時

香木湯方 治傷寒二三日頭痛肌熱煩燥不解

四肢倦痛可汗

蒼朮 米泔浸一宿切焙二兩 陳橘皮 湯浸去白 當歸 桂 去

皮甘草 各炙一兩 白茯苓 去黑皮 吳茱萸 人參

厚朴 生薑汁炙 羌活 各半兩 防風 麻黃 去根節焙乾各一兩

右除桂外剉碎慢火炒黃入桂同擣篩每服三

錢葱白一寸生薑二片同煎溫服不拘時候

葱豉湯方 治傷寒一日至三日以前身熱脈大

肢體疼痛汗不出

蒼朮 米泔浸去皮麩炒黃 麻黃 去根節湯煮去沫各二兩 甘草 炙

桂心 各一兩

右每服三錢葱白三寸鹽豉二十粒同煎熱服

不拘時候

前胡湯方 治傷寒表不解取汗

前胡去蘆頭 芫藟 人參 枳

殼去瓢麩炒 甘草炙 芍藥各半兩 麻黃去根節湯浸煮去沫

一兩

右每服三錢入葱白三寸煎至七分熱服如要發汗更入薄荷三五葉同煎服服訖以厚被覆如人行五里再服徐令汗透徧身即旋去衣被避風若傷寒後餘毒未解潮熱往來數服即解

茯苓湯方 治傷寒表未解氣脈閉塞津液不通

水飲氣亭在胸府結而成痰膈腕否悶倚息短

氣體重多唾頭目旋運嗜臥好眠額角徧痛腠

理開疎體常汗出消飲

茯苓去黑皮 前胡 芫藟 羌活 桔梗炒

人參 獨活 甘草炙 芫胡去苗各半斤 陳橘

皮去白四兩

右為散每服三錢沸湯點服不計時候或判如麻豆用前件藥半兩水三盞煎溫二服

前胡湯方 治傷寒頭痛惡寒發熱肢體疼倦

前胡 羌活 去蘆頭 各六兩 防風 桔梗 三兩 薺苳

二兩 蛇脫皮 一兩剪碎 炒令黃 陳橘皮 湯浸去白 焙半兩 蟬

殼 去土 一兩 甘草 一兩 人參 二兩

右每服三錢生薑三片薄荷七葉同煎溫服

桂心湯方 治四時傷寒初覺

桂 去蘆 皮 芍藥 甘草 炙 葛根 各等分

右每服四錢生薑二片棗一枚同煎服


傷寒可下

論曰凡傷寒邪入於陰其病在裏法當下之諸腹滿不大便或口燥舌乾而渴或潮熱譫語皆為可下之證諸診得脈沈而實即為可下之脈但脈證已具不必拘以日數急宜攻裏若病雖過經而裏證未備者未可下也故經曰陽盛陰虛下之則愈其法謂此

調胃承氣湯方 治陽明不吐不下心煩者可與

調胃承氣湯太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱

者可與調胃承氣湯傷寒吐後腹脹滿者可與



調胃承氣湯

甘草炙二兩 大黃以清酒洗四兩

右㕮咀每服五錢入芒硝一錢更煎一二沸服

大承氣湯方 治陽明病脈遲雖汗出不惡寒者

其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解

可攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞅也與

大承氣湯若汗多微發熱惡寒者外未解也其

熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與

小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下

大黃酒洗四兩 厚朴炙半斤 枳實麩炒五枚

右㕮咀每服五錢入芒硝一錢同煎溫服

小承氣湯方 治陽明病其人多汗以津液外出

胃中燥大便必鞅鞅則譏語小承氣湯主之若

一服譏語止者勿再服

大黃四兩 厚朴二兩 枳實麩炒大者

右㕮咀每服五錢水煎溫服初服湯當更衣不

爾者盡飲之若更衣者勿服

芫胡湯方 治傷寒四日以後煩熱不解大小腸

澀

柴胡去苗 黃芩一兩 犀角鎊 芍藥各三兩 山

梔子仁半兩 大黃炒一兩半 木通三分 朴硝一兩一分

右每服五錢入竹葉三片同煎空腹服大小腸

通為度如未效再服

大芫胡湯方 治傷寒十餘日熱結在裏往來寒

熱者

此胡去苗半斤 枳實炒四兩 黃芩 芍藥各三兩 半夏

二兩半湯洗七遍 大黃二兩

右以咀每服五錢入生薑十片棗三枚同煎服

四味承氣湯方 治傷寒四日已後腹脹滿痛喘

麤壯熱

大黃醋炒二兩 枳殼去瓢炒一兩半 朴硝二兩 甘草二分

每服五錢水煎空腹服

黃芩湯方 治傷寒五日口乾頭痛大便澀

黃芩去黑心 山梔子仁 大黃醋炒各一兩 陳橘皮

湯浸去白一兩 朴硝一兩

右每服五錢水煎溫服

調胃承氣加橘皮湯方 治傷寒發汗不解蒸蒸

發熱

陳橘皮 浸去白半兩 大黃 醋炒一兩 甘草 炙半兩

右每服四錢入芒硝一錢同煎溫服

芫胡大黃湯方 治傷寒日數過多心中氣悶或

發疼痛狂言不定煩燥不得眠大小便不通

芫胡 大黃 濕帶裹煨 朴硝 枳實 炙各一兩 甘草 兩

右每服五錢水煎溫服不可過多若大小腸通則汗自出

宣毒散方 治傷寒脈大潮燥伏熱

大黃 剉炒 甘草 炙各半兩 朴硝 研一分 牽牛子 一兩半生

炙半

右為散每服二錢龍腦膩粉蜜水調下一方鍊

蜜為丸如梧桐子大每服十五丸用龍腦膩粉

水下

小黃芩湯方 治傷寒八九日大便不通心神悶

亂 黃芩 一兩 大黃 二兩 枳殼 炒 大腹 醋炒各一兩

右每服三錢水煎溫服如人行五里未通再服以利為度

火青散方 治陽盛發狂有班大小便閉澀

大青 知母 黃芩 大黃煨 山梔子仁

升麻 黃連各一兩 甘草炙半兩

右為散每服三錢入朴硝一錢蜜水調下

承氣丸方 治傷寒時氣溫熱病大便不通

大黃炒三分 郁李仁湯浸去皮研 枳實炒麩 朴硝各研

右研為末和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下未利再服不計時候

傷寒可吐

論曰諸病吐之而愈者邪在胸中也傷寒大法謂四日以上若入陰經其傳未深邪氣高而裏實客於胸膈下之則動胃汗之則亡陽惟宜吐而出之然亦不必拘此凡寒邪熱毒痰實在胸中及有宿食在胃脘者皆當吐之但診其脈寸口或浮或滑或數或緊與諸部不同者其證心胸痞滿鬱鬱而

痛不能息多涎唾飲食入則吐欲吐復不能出或手足厥冷及心下滿而煩飢不能食吐下後心中懊懣者是也內經所謂其高者因而越之即其法也

瓜蒂散方 治胸有寒病如桂枝證頭不痛項不

強寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝喉咽不得息當

吐之

瓜蒂熬

赤小豆

各一分

右搗篩再和勻每服一錢豉一合湯七合先漬

之須臾煮作稀糜取汁調散放溫頓服不吐少

加之快吐為度亡血虛家不可與

擦膈湯方 治傷寒三四日胸中痰壅憎寒壯熱

頭痛

桃枝

一握東引者取梢

柳枝

一握取梢

甘草

一分生用

烏梅

去核

三山梔子仁一分

右各細剉同用漿水一大盞半煎至一盞空心

分為二服相次再服取吐為度

三物湯方 治服前擦膈湯吐後頭痛壯熱未退

即服此

薄荷一握 人參半兩 生薑一分

右水煎空心温服晚再服

吐痰散方 治傷寒四日毒氣入胃喉中閉悶

瓜蒂炒 丁香各一分 赤小豆

右爲散每服一錢空心温水調下當吐下後便

可煮葱豉粥補之

取吐方 治温病胸中滿悶

豬膽三枚 苦酒二合

右二味同攪勻綿濾過頓服未吐再服

苦參散吐方 治傷寒四日已上嘔逆

苦參

右爲細散每服三錢温酒五合調服之即吐

常山湯吐方 治傷寒四日後太陰初受

常山 鼈甲去裙襴 醋炙 石膏研 茈胡去苗 知

母焙 甘草生各半兩

右每服三錢竹葉七片同煎温服當吐涎沫後

却服和氣湯藥

人參湯吐方 治傷寒出汗後心胸妨悶煩熱未退

人參 半兩

燈心 一小束

枳殼 一分

麩炒

大腹皮 一枚

茶末 二錢

生甘草 半兩

右除茶末外各細剉用淡漿水二大盞煎至一盞下茶末攪勻分溫二服以紙撚子於咽喉中取吐為度

傷寒可溫

論曰傷寒病雖有三陰三陽然在陽則太陽病多在陰則少陰病多以二經為表裏故也至於陽明太陰病頗稀少而少陽厥陰病亦少也然窺觀古人治陽明則多下於少陰則多溫蓋陽明者胃也胃受病則不惡寒反惡熱濇濇汗出大便秘澀語潮熱須下之乃愈若乃氣弱本虛人初中病腠理寒邪氣更不經三陽而便見少陰証蓋少陰者腎也腎受病則身冷惡寒四肢厥逆脈微細心煩但欲寐或自利而渴須溫之乃愈雖然三陰病大約可溫而古人特於少陰詳言之者則少陰病尤宜

温故也

附子湯方 治傷寒少陰病得之一二日口中和

其背惡寒者當灸之

附子

去皮臍
二兩

人參

一兩

白朮

四兩

芍藥

白

茯苓

三兩

右每服五錢水煎温服日二

四逆湯方 治傷寒少陰病脈沉者急温之

甘草

二兩

乾薑

半兩

附子

一枚
生用

右剉如麻豆每服五錢水煎温服强壯之人可

倍加薑附

四逆湯方 治傷寒少陰病下利清穀裏寒外熱

手足厥冷脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤

或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈

加減四逆湯

甘草

各二兩

附子

大者一枚

乾薑

二兩

右各剉如麻豆大每服五錢水煎温服其脈即

出者愈面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加

芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍藥加

桔梗一兩利止脈不出者去桔梗加人參二兩
病皆與方相應者乃服之

吳茱萸生薑湯方 治傷寒手足厥冷脈細欲絕
其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑

當歸 芍藥 桂去麤皮 細辛各三兩 吳茱萸湯洗

炒甘草炙 木通各二兩

右剉如麻豆每服五錢入生薑半分棗三枚水
酒同煎溫服

附子飲方 治傷寒頭疼壯熱恐成陰毒

附子 白朮各半兩 桔梗 細辛各一兩

右剉如麻豆每服五錢水煎空心溫服衣蓋取
汗或得吐即差如未吐汗再服

通關飲方 治厥陰傷寒脈絃長者生沉細不足
者死

附子一兩 乾薑 羌活 桔梗 甘草炙

五加皮各半兩 桂心三分 黃耆一分 防風一分

右剉如麻豆每服五錢水煎食前溫服日二

桂心湯方 治傷寒陰盛身寒脈候沉細頭痛體

痛

桂去麤皮 麻黃 甘草炙 人參各半兩 白朮

杏仁去皮尖雙仁炒黃 附子各三分

咬咀如麻豆每服五錢生薑半分同煎溫服

迴陽湯方 治傷寒陰盛手足厥冷體寒脈微

延胡索炒 半夏切生薑汁炒黃 甘遂麩炒各一兩 陳橘

皮湯浸去白 附子去皮臍 桂去麤皮 麻黃去根節湯煮去沫各半兩

檳榔一枚 天南星一枚

右剉如麻豆每服二錢酒煎溫服服後一炊頃

患人頭面渾身覺熱時便與衣服蓋覆令出汗

溫白丸方 治傷寒面青心下堅鞭開口出氣身

體不熱面多汗四肢厥冷

半夏湯浸去滑 白附子炮 硫黃研各一兩

右研為末用粳米飯搗和為丸如梧桐子大每

服二十九丸溫酒下吐逆炒薑鹽酒下或艾醋湯

下陰毒併喫二三服不計時候

白朮飲方 治傷寒伏陰胸膈妨悶吐逆不定手

足厥冷

白朮 附子去皮 高良薑炮 桂去皮 人參

乾薑炮各一兩 霍香去梗一分

右剉如麻豆大每服三錢溫服

益智湯方 治傷寒四肢厥冷其脈沉細

益智去皮 烏頭去皮臍各一兩 麻黃去根 青橘皮湯

去白三分 乾薑各半兩

右剉如麻豆大每服三錢生薑三片鹽半錢同煎溫服

煎溫服

正元湯方 治傷寒陰證脈候沉細

麻黃去根 陳橘皮去白 大黃牛 甘草炙


乾薑 桂 芍藥 附子去皮 吳茱萸湯浸十遍

焙半夏 湯浸七遍 焙各半兩

石剉如麻豆大每服二錢生薑三片棗二枚同煎熱服以衣被蓋覆取汗未汗如人行五里再服或連吃三服汗出立差

重 退陰湯方 治傷寒手足厥冷脈息沉細頭痛腰

重 烏頭去皮 乾薑各半兩



炒令轉色放冷再擣篩每服一盞鹽一捻水一盞同煎溫服

吳茱萸散方 治傷寒渾身手足厥冷面青唇口無色心中寒慄

吳茱萸 湯洗焙炒 硫黃 研 桂 去蘆皮 附子 去皮臍 芎藭 各一分

右擣羅為散煎艾葉湯調下三錢陰盛者兼灸氣海數十壯

黑龍湯方 治傷寒陰盛隔陽身冷煩躁脈細沉

緊

附子 一枚及半兩者燒存性用冷灰焙去火毒

右擣研細入臘茶一錢和勻分作二服每服以水一盞蜜半匙同放冷服須臾躁止得睡汗出

為效

返陰丸方 治傷寒陰盛手足多冷脈沉細助陽消陰

硫黃 消石 陽起石 太陰元精石 白礬 石膏 各半兩

右為末同入鍋子內熬成汁為度放冷細研用水浸炊餅為丸如梧桐子大煎艾湯下十五丸
青白散方 治陰盛傷寒身體疼痛

石膏半斤乾薑炮烏頭椎碎草烏頭椎碎

兩以上四味先用鐵器盛石膏燒通赤次入三味用碗合定不透氣候冷同衆藥擣研

麻黃去根藿香去梗各一兩皂莢灰 自然銅燒通

赤醋淬七 徧各半兩

右擣研為細散每服一錢空心食前溫服酒調下如痧氣傷寒艾葉煎湯下

返陰散方 治復寒四肢厥冷脈微自汗心胸痞滿

陽起石 石膏 寒水石三味同燒令赤出火毒細研入諸藥

附子 乾薑 甘草炙剉各一兩硫黃研半兩

右研為散每服二錢生薑汁溫水調下陰毒併服之

附子湯方 治傷寒憎寒壯熱頭痛隔悶

附子 白茯苓 人參 細辛 芫胡

陳橘皮一兩 甘草 莎草根 赤芍藥 厚

朴 黃耆 各半

右剉如麻豆大每服二錢生薑五片棗二枚同煎溫服不拘時候

均氣湯方 治傷寒表裏未解榮衛氣逆手足厥冷上喘陰證或霍亂吐瀉非時腹脹及年高榮衛虛弱臟腑不和膀胱緊急腰臆痺痛及婦人產後勞冷等疾

白朮 米泔水浸乾微炒 天台烏藥 炒各二兩 人參 青橘皮 去白炒 甘草 炙 白芷 各一兩 白茯苓 去黑皮半兩

右每服三錢生薑三片棗二枚同煎溫服如吐逆入藿香少許

四味桂枝湯方 治傷寒陰證

桂 去麤皮 麻黃 去根節各三分 附子 乾薑 一分

右咬咀每服五錢入生薑半分棗三枚同煎溫服不拘時候

桂心湯方 治傷寒服冷藥過多心腹脹滿脚膝厥冷昏悶不知人

桂心 厚朴 生薑汁炙各三分 芍藥 一兩 乾薑 檳

椰各半
兩

右每用五錢入童子小便一合攪勻空心溫服

蒸熨方 治傷寒四肢厥冷

吳茱萸 湯洗焙乾三升

右以溫酒浸令通濕用生絹袋二箇盛蒸令極

熟取吳萸袋子更手熨四肢前後心及手足心

候氣通微即止

又用藥熨氣通暢後宜服此方

人參 一兩 生薑 煨切二兩

右細剉用水一盞半煎分溫二服如食頃再服

傷寒過經不解

論曰傷寒為病六經受邪始傳於三陽病在表者可汗其滿三日傳於三陰病入裏者可下其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少微九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹滿減如故十一日少陰病衰渴止舌乾已而噦十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也故傷寒

愈者皆在十二日若過此經病猶不解者為邪熱結於裏其或譫言妄語或鬱鬱微煩或腹滿吐下皆緣治之失宜邪氣稽留故病過經不能解也當隨其證以治若更感異氣變為他疾者當依壞病法療之

調胃承氣湯方 治傷寒十三日過經譫語者有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為內實也

大黃 四兩 酒浸 甘草 炙二兩

右剉如麻豆大每服五錢入芒硝一錢同煎服

犀角湯方 治傷寒過經不解熱結在裏往來寒

熱煩渴燥悶

犀角 屑一兩 芩胡 去苗 吳藍 各三分 大青 升麻

各一兩 烏梅 去核 黃芩 各三分 甘草 半兩

右每服五錢入竹葉三十片同煎食後溫服

鼈甲湯方 治傷寒過經半月不解

鼈甲 去裙爛 醋炙 芩胡 升麻 各一兩 烏梅 去核 半兩 枳

實炒 犀角屑 黃芩各一兩 甘草半兩

右每服五錢入地黃汁二合攪勻食後溫服

木通湯方 治傷寒十三日過經不解臍腹脹滿

小便淋澀煩悶燥渴

木通 葛根 青橘皮湯浸去白鹽炒 檳榔 滑石

瞿麥穗各一兩

右每服五錢入葱白二寸同煎溫服不計時候

萬應散方 治傷寒過經心胸痞滿煩燥狂言積

熱毒氣及婦人血風血氣經候不調寒熱有積

甘遂連珠者 威靈僊去土 五靈脂各一兩

右擣羅為散每服一錢如傷寒日數多有積熱

者同鷄子清蜜水調下如婦人前件病証者綿

灰酒調下尋常熱氣蜜水調下冷即用葱湯調

下陽毒積熱入臙粉白丁香各半錢生薑汁蜜

水調下

芫胡湯方 治傷寒發汗下之後過經不解胸脇

滿結渴而不嘔但頭汗出往來寒熱小便不通

宜服此湯

芫胡二兩 桂 黃芩各一兩 牡蠣生用 甘草各半

兩 括樓根一兩半 木通一兩

右每服五錢用生薑半分葱白五寸同煎食後

温服

保安散方 治傷寒過經不解三焦滯悶身重疼

痛

黃耆 木通 青橘皮湯浸去白 桑根白皮 白

木香三分 陳橘皮湯浸去白 黑牽牛一兩

炒 擣取未半兩

右每服二錢濃煎棗湯調下

皇朝聖訓總金

卷二十一

三

恭
正
堂

