



醫國統正脈八

傳中一統

內閣文庫
漢書
架冊號類
三〇九
二九七

漢書門
架冊號類
二九七
二〇二
三一七
二〇二

內閣文庫
番號 漢 12974
冊數 32 (18)
函號 301 58

五十八



經書卷之四

儒門事親卷之四

風

圖書

戴人張子和著

新安吳勉學校

夫風者厥陰風木之主也諸風掉眩風痰風厥涎潮不利半身不遂失音不語留飲殮泄痰實嘔逆旋運口喎搐搦僵仆目眩小兒驚悸狂妄胃脘當心而痛上支兩脇咽膈不通偏正頭痛首風沐風手足攣急肝木為病人氣在頭

防風通聖散

防風天麻湯

防風湯

祛風丸

排風湯

小續命湯

道風散

暑二

夫暑者為少陰君火之主也諸痛痒瘡瘍癰疽腫毒及胃煩熱嗑乾欬喘唾血泄血肘腫肩脾背內痛心痛肺脹腹脹鬱悶風溫病多發風傷于榮溫傷於衛血為榮氣為衛其脉兩手多沉自汗出身重多睡必汗三日以裏且宜辛涼解之或辛溫解之如不已裏症未罷不可下如下則胃中虛空四日之外表熱入裏則譫語口乾發疹潮熱直視失溲者十死八九

肺金為病人氣在胸及小兒瘡疹丹燦但發人氣在

腹

白虎湯

桂苓甘露散

化痰玉壺丸

益元散

玉露散

石膏散

濕三

夫濕者為太陰濕土之主也諸濕腫滿霍亂泄注肘腫骨痛及腰膝頭項痛風痺痿厥唾有血心懸如肌熱痛始作三陽受之一日太陽二日陽明三日少陽可汗而已如四日太陰五日少陰六日厥陰可下而已或七日不愈再傳至十三日大邪皆去六經悉和則愈矣腎水為病

五苓散

葶藶木香散

白木木香湯

益元散

大橘皮湯

神助散

桂苓白朮丸

火四

夫火者少陽相火之主也諸暴卒發熱惡寒痛病大作傳為水腫面黃身痿泄注膿血赤白為利癰腫疽毒丹熛瘍疹小兒疳瀉腹脹暴下如水心胸中熱甚則熱衄胸脇皆痛耳聾口苦舌乾與臟毒下血米穀不化腸鳴切痛消渴上喘時金為病

涼膈散

黃連解毒湯

瀉心散

神芎丸

八正散

調胃散

調胃承氣湯

燥五

夫燥者是陽明燥金之主也諸氣憤鬱腸胃乾涸皮膚皴揭脇痛寒瘧喘咳腹中鳴注泄驚澹脇肋暴痛不可反側嗑乾面塵肉脫色惡及丈夫癩疔婦人少腹痛帶下赤白瘡瘍瘞癰喘咳潮熱大便澁燥及馬刀挾瘦之瘡肝木為病

神功丸

脾約丸

麻仁丸

潤體丸

四生丸

寒六

夫寒者是大陽寒水之主也諸寒冷濕痺肘臂攣急
秋濕既多寒咳為嗽痰厥心痛心中澹澹大動胸脇
胃脘痛不可食食已不饑吐利腥穢屈伸不便上下
所出不禁目盲堅痞色焮渴而飲冷積水足浮腫囊
縮四肢冷爪甲青心火為病

薑附湯

四逆湯

二薑湯

木附湯

大已寒丸

理中湯

解利傷寒七

人冒風時氣濕病傷寒二日以裏頭痛身熱惡寒可

用通聖散益元散各五七錢水一大椀入生薑十餘
片葱白連鬚者十餘莖豆豉一撮同煎三五沸去滓
稍熱先以多半投之良久用釵子於咽喉中探引吐
了不宜嗽口次用少半亦稍熱投之更用葱醋酸辣
湯投之衣被蓋覆汗出則愈矣如遇世亂內經曰歲
火太過炎暑流行火氣太盛肺金受邪上應熒惑大
而明現若用辛涼之劑解之則萬舉萬全也若遇治
世人安可用升麻湯葛根湯敗毒散辛溫之劑解之
亦加葱根白豆豉上涌而表汗內經曰因其輕而揚
之揚者發揚也吐汗發揚寒熱之邪既吐汗之後必

大將息旬日之後其邪不復作也

又一法或於無藥之處可用酸薤汁一大椀煎三五沸去菜葉猛服訖少間用釵子咽喉中探引吐了如此三次後煎葱酸辣湯投之以衣被蓋覆汗出則解內經曰酸苦涌泄為陰涌者吐也傷寒三日頭痛身熱是病在上也在上者固宜涌之然後以淡漿粥養之一二日則愈矣

又一法可用不卧散解之於兩鼻內啗之連嚏噴三二十次以衣被蓋覆用此藥時當於暖室中嚏罷以酸辣漿粥投之汗出如洗嚏噴者同吐法也此法可

與雙解散為表裏也

又有導引一法可於一間處用之先教病人盤脚而坐次用兩手交十指攀腦後風池風府二穴乃是風門也向前叩首幾至于地如此連點一百二十數急以葱醋粥辛辣湯投之汗出立解

傷寒溫疫時氣冒風中暑俱四時不正之氣也人若初感之皆頭痛惡寒身熱及寒熱往來腰脊強是太陽經受之也內經曰可先治內而後治外先用生薑葱白豆豉煎雙解散上涌及汗出則解如不解者至五六日或不大便喘滿譫語實熱兩手脈沉可用調

胃大小承氣湯下之慎不可用銀粉巴豆霜杏仁芫
花熱藥下之則必死此先治外而後治內也如大汗
之後慎不可食葷羹藿菜羊猪雞犬魚兔等肉惟不
先明必致重困後必難治也傷寒七八日發黃有斑
潮熱腹滿者或痰實作止雖諸承氣湯下過者仲景
曰寸口脉浮滑者可用瓜蒂散吐之然傷寒寸口脉
浮滑者可用雜病寸口脉沉者可吐叔和云寸脉沉
兮胸有痰啓玄子曰上盛不已吐而奪之是也

風八

夫中風失音悶亂喎斜口眼內經曰風之爲病善行

而數變故百病皆生於風也可用三聖散吐之如不
省人事牙關緊閉粥菜不能下者煎三聖散鼻內灌
之吐出涎口自開也次服通聖散涼膈散大人參半
夏丸桂苓甘露散等大忌雞猪魚兔酒醋葷麵動風
引痰之物吐痰之法在方論中

頭風眩運手足時復痲痺胃脘發痛心腹滿悶按之
如水聲可用獨聖散吐之吐訖可服辛涼清上之藥
仲景曰此寒痰結於胸中之致然也

痺九

夫大人小兒風寒濕三氣合而爲痺及手足痲木不

仁者可用鬱金散吐之吐訖以導水丸通經散泄之
泄訖以辛溫之劑發散汗出則可服當歸芍藥乳沒
行經和血等藥如不愈則便不宜服此等藥

痿十

夫男女年少面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧更加涎
嗽不止或喘滿面浮此名曰肺痿可用獨聖散吐之
吐訖次用人參柴胡飲子小柴胡飲子加當歸桂苓
甘露散之類內經曰男女之病皆同也男子精不足
是味不化也女子血不流是氣不用也又曰形不足
者溫之以氣精不足者補之以味是也

厥十一

夫厥之爲病手足及膝下或寒或熱也舉世傳爲脚
氣寒濕之病豈知內經中本無脚氣陽氣衰于下則
爲寒厥陰氣衰于上則爲熱厥熱厥爲手足熱寒厥
爲手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之
下陽氣勝則足下熱陰氣勝則足下寒熱厥者寒在
上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺金熱
在上者以涼劑清心火則愈矣若尸厥痿厥風厥氣
厥酒厥可以涌而醒次服降火益水和血通氣之藥
使粥食調養無不瘥者若其餘諸厥做此行之慎勿

當疑似之間便作風氣相去邈矣

癰十二

夫癰病不至於目瞪如愚者用三聖散投之更用大盆一箇於暖室中令汗下吐三法俱行次服通聖散百餘日則愈矣至於目瞪愚者不可治內經曰神不得守謂神亂也

瘡十三

夫富貴膏粱之人病瘡或間日或頻日或作熱或作寒或多寒少熱或多熱少寒宜以大柴胡湯下之下過三五行次服白虎湯玉露散桂苓甘露散之類如

不愈者是積熱大甚宜以神芎藏用丸三花神祐丸調胃承氣湯等藥大作劑料下之下訖以長流水煎五苓散服之或服小柴胡湯數服亦可如不愈復以常山散吐之後服涼膈散白虎湯之類必愈矣大忌熱麵及羊肉雞豬魚兔等物如食之瘡疾復作以至不救

貧賤藟蕘之人病瘡以飲食踈糲衣服寒薄勞力動作不可與膏粱之人同法而治臨發日可用野夫多効方溫脾散治之如不愈用辰砂丹治之則愈矣如服藥訖宜以長流水煎白虎湯五苓散服之不宜食

熱物及燥熱之藥以瘧疾是傷暑伏熱之故也內經曰夏傷於暑秋必痲瘧可不信哉忌物同前

泄痢十四

夫大人小兒暴注瀉水不已內經曰注下也注下者水利也火運太過之病火主暴逆之故也急宜用水調桂苓甘露散五苓散益元散或以長流水煎過放冷服則愈慎不可驟用罌粟殼乾薑荳蔻聖散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以分陰陽利水道而已

痢利十五

夫病痢利米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀出可用導水丸禹功散瀉訖一二日可服胃風湯不愈則又可與桂枝麻黃湯發汗則愈矣內經曰久風入中爲腸澼飧泄啓玄子云風在腸中上薰於胃所食不化而出又云飧泄者是暮食不化也又經云春傷於風夏必飧泄故可汗而愈內經曰風隨汗出痛隨利減若服豆蔻罌粟殼之類久而不輟則變爲水腫以成不救也

臟毒下血十六

夫臟毒下血可用調胃承氣湯加當歸瀉訖次用芍

備用事類
藥蘖皮丸黃連解毒湯五苓益元各停調下五七錢
服之內經曰腸癖便血何如答曰癖者腸間積水也
身熱則死寒則生熱為血氣敗故死寒為榮氣在則
生七日而死者死於火之成數也

下利膿血十七

夫下利膿血腹痛不止可用調胃承氣湯加生薑棗
煎更下藏用七八十九丸量虛實加減瀉訖次用長流
水調五苓散五七錢或加燈心煎調下亦得調益元
散五七錢亦可大忌油膩一切熱物則愈矣

水泄不止十八

夫男子婦人病水濕瀉注不止因服豆蔻烏梅薑附
峻熱之劑遂令三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體
否腫面黃腹大小便赤澁兩足按之陷而復起內經
曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月寒
涼宜於暖室不透風處用火一盆以藉火力出汗次
以導水禹功散量虛實瀉十餘行濕去腫減則愈矣
是汗下吐三法齊行既汗下吐訖腑臟空虛宜以淡
漿粥養腸胃二三日次服五苓散益元同煎燈心湯
調下如勢未盡更宜服神助散舊名葶藶散可以流
濕潤燥分陰陽利小便不利小便非其法也既平之

後宜大將息忌魚鹽酒肉菓木房室等事如此三年則可矣如或不然決死而不救也

痔漏腫痛十九

夫痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脉橫解腸澀爲痔痔而不愈變而爲漏同治濕法而治之可先用導水丸禹功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更加以葵羹菠菜猪羊血等通利腸胃大忌房室雞魚酒醋等物勿食之

霍亂吐瀉二十

夫霍亂吐瀉不止者可用五苓散益元散各停水水

調下五七錢如無水水可用新汲水調下桂苓甘露散玉露散清涼飲子調下五七錢或香薷湯調下五七錢亦可如無已上諸藥可服地漿三五盞亦可地漿者可於淨地掘一井子用新汲水一桶並於井子攪令渾候澄清連飲三五盞立愈大忌白朮湯薑桂烏附種種燥熱之藥若服之則必死矣巢氏云霍者揮霍而成疾亂者陰陽亂也皆由陰陽清濁二氣相干故也

大便澁滯二十一

夫老人久病大便澁滯不通者可服神功丸麻仁丸

備門 卷之四
四生丸則愈矣時復服葵菜菠菜猪羊血自然通利也內經云以滑養竅是也此病不愈令人失明也

五種淋瀝二十二

夫大人小兒病沙石淋及五種淋瀝閉癢并臍腹痛益元散主之以長流水調下八正散石葦散依方服用此三藥皆可加減服之

酒食不消散二十三

夫一切冷食不消宿酒不散亦同傷寒身熱惡寒戰慄頭項痛腰脊強及兩手脉沉不可用雙解止可用導飲丸五六十丸量虛實加減利五七行所傷冷食

宿酒若推盡則頭痛等病自愈也次以五苓散生薑棗長流水煎服五六服不可服酒癥進食丸此藥皆犯巴豆有熱毒之故也

酒食所傷二十四

夫膏粱之人起居間逸奉養過度酒食所傷以致中脘留飲脹悶痞膈醋心可服木香導飲丸以治之夫藟莢之人飲食粗糲衣服寒薄勞役動作一切酒食所傷以致心腹滿悶時嘔酸水可用進食丸治之

沉積水氣二十五

夫一切沉積水氣兩脇刺痛中滿不能食頭目眩者

傷風 諸積不化二十六
可用茶調散輕涌訖冷涎一二升次服七宣丸則愈
矣木香檳榔丸導飲丸亦妙不可用巴豆銀粉等藥

諸積不化二十六
夫諸積不化可服無憂散每月瀉三五次可用桂苓
白朮丸散妙功丸大忌生硬粘滑動風發熱等物

骨蒸熱勞二十七

夫男子婦人骨蒸熱勞皮膚枯乾痰唾稠粘四肢疼
痛面赤唇乾煩燥睡卧不寧或時喘嗽飲食少味困
弱無力虛汗黃瘦等疾內經曰男子因精不足而成
女子因血不流而得也可先以茶調散輕涌訖次以

導水禹功散輕瀉三兩行後服柴胡飲子桂苓甘露
散搜風丸白朮調中湯木香檳榔丸人參犀角散之
類量虛實選而用之如咯血吐血便血此乃亡血也
並不宜吐吐之則神昏內經曰血者人之神也故亡
血則不宜吐慎不可服峻熱薑附之藥若服之則飲
食難進肌肉消削轉成危篤也五勞之病乃今人不
明發表攻裏之過也大忌暑月於手腕足外踝上着
灸手腕者陽池穴也此穴皆肌肉淺薄之處灸瘡最
難痊可及胸次中脘臍下背俞三里等穴或有灸數
十者及以燔針終無一効病人反受苦可不思之勞

疾多饒所思之物但可食者宜食療本草而與之菠
菜葵羹水水涼物慎不可禁以盪水穀入胃脉道乃
行也若過忌慎則胃口閉胃口閉則形必瘦形瘦脉
空乃死之候也諸勞皆可倣此

虛損二十八

夫病人多日虛損無力補之以無比山藥丸則愈矣

上喘中滿二十九

夫上喘中滿醋心腹脹時時作聲吞氣上下不能宣
暢叔和云氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐之
吐訖次用導水禹功輕瀉三五行不愈更以利膈丸

瀉之使上下宣通不能壅滯後服平胃散五苓散益
元散桂苓甘露散三和散分陰陽利水道之藥則愈
一切涎嗽三十

夫富貴之人一切涎嗽是飲食厚味熱痰之致然也
先用獨聖散吐之吐訖可服人參散通聖散加半夏
以此止嗽更服大人參半夏丸以之化痰也大忌酸
鹹油膩生硬熱物也

咳嗽三十一

夫貧難之人咳嗽內外感風冷寒濕之致然也內經
曰秋傷於濕冬生咳嗽可服寧神散寧肺散加白朮

之類則愈矣忌法同前

欬逆三十二

夫男子婦人欬逆俗呼曰忤忤乃陰陽不和也乃傷寒亦有欬逆者並可用既濟散治之忌寒熱物宜食溫淡物以養胃氣耳

風痰三十三

夫風痰酒痰或熱在膈上頭目不清涕唾稠粘或欬嗽上喘時發潮熱可用獨聖散吐之吐訖可服搜風丸涼膈散之類內經曰流濕潤燥是也

咯血衄血嗽血三十四

夫男子婦人咯血衄血嗽血欬膿血可服三黃丸黃連解毒湯涼膈散加桔梗當歸大煎劑料時時呷之內經曰治心肺之病最近藥劑不厭頻而少時時呷之者是也

消渴三十五

夫三消渴內經曰三消渴者肺消膈消風消也右以繅絲煮蠶湯澄清頓服之則愈或取生藕汁頓服之亦愈矣

雷頭三十六

夫雷頭懶于乃俗之謬名也此疾是胸中有寒痰多

沐之致然也可以茶調散吐之吐訖冷痰三二升次
用神芎丸下三五行然後服愈風餅子則愈矣雷頭
者是頭上赤腫核或如生薑片酸棗之狀可用銚針
刺而出血未除根本也

頭痛不止三十七

夫頭痛不止乃三陽之受病也三陽者各分部分頭
與項痛者是足太陽膀胱之經也攢竹痛俗呼爲眉
稜痛者是也額角上痛俗呼爲偏頭痛者是少陽經
也如痛久不已則令人喪目以三陽受病皆胸膈有
宿痰之致然也先以茶調散吐之後以香薷散白虎

湯投之則愈然頭痛不止可將葱白鬚豆豉湯吐之
吐訖可服川芎薄荷辛涼清上搜風丸香芎散之類
仲景曰葱根豆豉亦吐傷寒頭痛叔和云寸脉急而
頭痛是也

兩目暴赤三十八

夫兩目暴赤發痛不止可以長流水煎鹽湯吐之次
服神芎丸四物湯之類內經曰暴病皆屬火也又曰
治病有緩急急則治其標緩則治其本標者赤腫也
本者火熱也以草莖鼻中出血最妙

目腫三十九

夫目暴赤腫痛不能開者以青金散鼻內搐之鼻內出血更捷

病目經年四十

夫病赤目經年不愈者是頭風所加之令人頭痛可用獨聖散八正散之類赤目腫作是足厥陰肝經有熱利小便能去肝經風熱也

風衝泣下四十一

夫風衝泣下者俗呼風冷淚者是也內經曰太陽經不禁固也又曰熱則五液皆出肝熱故淚出風衝於外火發於內風火相搏由此而泣下也治之以貝母

一枚白膩者胡椒七粒不犯銅鐵研細臨卧點之愈

風蛙牙疼四十二

夫風蛙牙疼久不愈者用針插巴豆一枚於燈焰上燎煙未及及存性於牙窩根盤上薰之則愈

口瘡四十三

夫大人小兒瘡唇緊用酸漿水洗去白痴臨困點綠袍散如或不愈貼赴筵散又不愈貼鉛白霜散則愈

喉閉四十四

夫男子婦人喉閉腫痛不能言未刺兩手大拇指去爪甲如莖葉是少商穴少商是肺金之井穴也以銚

針刺血出立愈如不愈以溫白湯口中含嗽是以熱導熱也

瘦四十五

夫瘦囊腫悶稽叔夜養生論云頸如險而瘦水土之使然也可用人參化瘦丹服之則消也又以海帶海藻昆布三味皆海中之物但得二味投之於水瓮中常食亦可消矣

背疽四十六

夫背瘡初發便可用藏用丸玉燭散大作劑料下臑臑一二十行以銚針於腫焮處亂刺血出如此者二

後以陽起石散傳之不可便服內托散內犯官桂更用酒煎男子以背為陽更以熱投熱無乃太熱乎如瘡少愈或口瘡未合瘡痂未斂風痒時作可服內托散以辟風邪耳

瘰癧四十七

夫人頭目有瘡腫瘰癧及胸臆臑脇之間或有瘡痂腫核不消及有膿水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大椀煎放溫作三五次頓服訖候不多時於咽喉中探引吐涎三二升後服和血通經之藥如玉燭散四物湯之類是也內經曰鹹味涌泄為陰涌

者吐也瀉者泄也銅人曰少陽起于目銳眥行耳後
下脇助過期門癰癧結核馬刀挾癭是少陽膽經多
氣少血之病也

便癰四十八

夫便癰者乃男子之疝也俗呼爲便癰言於不便處
害一癰故名便癰也使癰者謬名也難素所不載也
然足厥陰肝之經絡是氣血行流之道路也衝任督
脉亦屬肝經之傍絡也難經曰男子有七疝是也使
癰者血疝也治之以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯
投之同瘀血不散而治大作劑料峻瀉 二十行次

以玉燭散和氣血通經絡之類則是也世之多用大
黃牡蠣而已問有不愈者是不知和血通經之道也

惡瘡四十九

夫一劫惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之則愈

下疳五十

夫下疳久不愈者俗呼曰臊疳是也先以導水禹功
先瀉肝經外以木香散傅之日上三兩度然後服淡
粥一二日則止

張一三日四五

夫戴州盜於以木香醋膏之日土三兩與煎於粥飲
夫不可久不愈者於平日煎膏是也夫以藥水與紅

不與五十

夫一此惡毒又不愈者以木香煎醋醋謂之預愈

惡毒四十水

黃其融而日出不愈者是不味味血脈通之宜出
以王徽煎時麻油煎煎之煎煎是也其煎之宜用大

儒門事親卷之五

戴人張子和著

新安吳勉學校

瘡癩癰腫五十一

夫大人瘡癩小兒赤癰腫發之時疼痛不止內經曰
夫諸痛痒瘡瘍皆生於心火可用一呪法禁之法者
是心法呪曰

龍鬼流兮諸毒腫 癰瘡膿血甚被痛

忘心稱念大悲呪 三唾毒腫随手消

右一氣念呪三遍望日月燈火取氣一口吹在瘡腫

丹瘤之上右手在瘡上虛收虛撮三次左手不動每一氣念三遍虛收虛撮三次百無禁忌如用之時心正爲是此法得於祖母韓氏相傳一百餘年用之救人百發百中若不食葷酒之人其法更靈病瘡腫者大忌雞猪魚兔發熱動風之物此法不得輕侮無藥處可用之

瘡腫丹毒五十二

夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止又有一法面北端想北海雪浪滔天冰山無際大寒嚴冷之氣取此氣一口吹在瘡腫處立止用法之人大忌五辛之

菜五厭之肉所病之人切忌雞猪魚兔酒醋濕麵等物無藥之處可用此法救之

凍瘡五十三

夫凍瘡者因寒月行於冰雪中而得之有經年不愈用陂野中淨土曝乾以大蒜搗如泥和土捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小而貼之泥餅子上以火艾灸之不計艾壯多少以泥乾爲度去乾餅以換濕餅貼定灸之不問灸數多少有灸一二日者直至瘡痂內覺痒微痛是凍瘡活也然後不含漿水澄清用雞翎一二十莖縛作刷子於瘡口上洗淨以此而洗

之後肌膚損痛也用軟帛拭乾次用木香檳榔散傳之夏月醫之大妙

金瘡五十四

夫一切刀箭所傷有刀箭藥用風化石灰一斤龍骨四兩二味爲細末先於端四日採下刺薊菜於端午日五更合杵曰內搗和得所團作餅子若酒麴中心穿眼懸於背陰處乾陰搗羅爲細末於瘡口上摻貼亦治裏外腫并諸瘡腫大効

又有呪法 呪曰

今日不祥 正被物傷 一禁不疼

二禁不痛 三禁不膿不作血

急急如律令奉勅攝

又每念一遍以右手收一遍收在左手中如此七遍則放手吹去却望太陽取氣一口吹在所傷處如陰晦夜間望北斗取氣亦得所傷之人大忌雞猪魚兔酒醋熱麵動風之物如食之則瘡必發
又一法 默想東方日出始取氣一口日出一半取氣一口日大圓滿取氣一口吹在所傷之處如此三次則止用法之人並無所忌所傷之人禁忌同前可於無藥之處用之

誤吞銅鐵五十五

夫誤吞銅鐵以至羸瘦者宜用肥猪豚與葵菜羹同
飧數頓則銅鐵自然下也神驗如不食葷腥者宜以
調胃承氣湯大作其劑下之亦可也

魚刺麥芒五十六

夫魚刺麥芒一切竹木籤刺咽喉及鬚髮惹伴在咽
嗑中不能下者內經曰不因氣動而病生於外可用
道藏經一呪法治之

呪曰

吾請老君東流順

老君奉勅攝攝

攝法毒水吾託大帝尊不到稱吾者各各現帝身急

急如律令奉勅攝一氣念遍又以左手屈中指無名
指作三山印印上坐淨水一盞右手掐卯文作金鎗
印左手在下右手在上左手象地右手象天虛挽虛
卓九次為定左足橫右足豎作丁字立如作法時望
日月燈火取氣一口吹在盞內此法百無禁忌用法
之時以正神氣是也如所傷物下不可便與米湯米
飯喫恐米粒誤入瘡口中潰作膿也姑以拌麵羹養
之數日可也

蛇虫所傷五十七

夫犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類謂毒氣

不出也內經曰先治內而後治外可也當先用導水
丸禹功散或通經瀉十餘行卽時痛減腫消然後用
膏藥生肌散傳貼愈此是先治內而後治外之法也

杖瘡五十八

夫一切虫獸所傷及背瘡腫毒杖瘡焮發或透入裏
者可服木香檳榔丸七八十九丸至百丸或百五十九
至二百丸生薑湯下過五七行量虛實加減則可矣

禁蝎五十九

夫禁蝎有一呪法 呪曰

玉女傳仙攝

勅斬蟬蜥

右如有蝎螫之人來求治者於蝎螫處望而取氣一
口默念七遍怒着作法吹在蝎螫處內經曰蜂蠆之
毒皆屬於火用可新水一盆浸之如浸不得處速以
手帛蘸水搭之則痛止也用法之人大忌五厥肉

落馬墜井六十

夫一切男子婦人落馬墜井因而打撲便生心恙是
痰涎發於上也內經曰不因氣動而病生於外可用
三聖散空心吐訖如本人虛弱疲痺可用獨聖散吐
之吐訖可服安魂寧魄之藥定志丸酸棗仁伏神之
類是也

婦人月事沉滯六十一

夫婦人月事沉滯數月不行肌肉不減內經曰此名為癥為沉也沉者月事沉滯不行也急宜服桃仁承氣湯加當歸大作劑料服不過三服立愈後用四物湯補之更可用宣明方檳榔丸

血崩六十二

夫婦人年及四十以上或悲哀太甚內經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺布葉舉而上焦不通熱氣在中故經血崩下心系者血山也如久不愈則面黃肌瘦慎不可與燥熱之藥治之豈不聞血得熱而流散先以黃連解毒湯次以涼膈散四物湯等藥治之而愈四物者是涼血也乃婦人之仙藥也量虛實加減以意消息用之

腰膝疼痛六十三

夫婦人腰膝疼痛兩脚麻木惡寒喜暖者內經曰乃是風寒濕痺先可服除濕丹七八十九丸量虛實以意加減次以禹功散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫為驗後以長流水同生薑棗煎五苓散服之風濕散而血氣和也

頭風眩暈六十四

夫婦人頭風眩暈登車乘船亦眩暈眼澁手麻髮退
健忘喜怒皆胸中有宿痰之使然也可用瓜蒂散吐
之吐訖可用長流水煎五苓散大人參半夏丸兼常
服愈風餅子則愈矣

經血暴下六十五

夫婦人年及五十以上經血暴下者婦人經血終于
七七之數數外暴下內經曰火主暴速亦因暴喜暴
怒憂結驚恐之致然也慎不可作冷病治之如下峻
熱之藥則死止可用黃連解毒湯以清於上更用蓮
殼灰櫻毛以滲於下然後用四物湯加玄胡散涼血

和經之藥是也

赤白帶下六十六

夫婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功
散或單用無憂散量虛實加減瀉訖次用桂苓丸五
苓散葶藶木香散同治濕治瀉法治之或用獨聖散
上涌亦可也室女亦可

月事不來六十七

夫婦人月事不來室女亦可內經曰月事不來者是
胞脉閉也胞脉者屬火而絡於脬中令氣上迫肺心
氣不得下通故月事不來也可用茶調散吐之吐訖

備用事類 卷之五
可用玉燭散當歸散或三和湯桂苓白朮散柴胡飲
子量虛實選而用之降心火益腎水開胃進食分陰
陽利水道之藥是也慎勿服峻熱之藥若服之則變
成肺痿骨蒸潮熱咳嗽咯膿嘔血而喘小便澀滯寢
汗不已漸至形瘦脉大雖遇良醫亦成不救嗚呼人
之死者豈爲命耶

婦人無子六十八

夫婦人年及二三十者雖無病而無子經血如常或
經血不調乃陰不升陽不降之故也可獨聖散上吐
訖冷痰三二升後用導水丸禹功散瀉訖三五行及

十餘行或用無憂散瀉十餘行次後喫葱醋白粥三
五日胃氣旣通腸中得實可服玉燭散更助以桂苓
白朮丸散二藥是降心火益腎水旣濟之道不數月
而必有孕也

若婦人有滯閉遺溺嗑乾之諸證雖服藥針灸亦不
能孕也蓋衝任督三脉之病故不治也表證見內證
及熱論中

小產六十九

夫婦人半產俗呼曰小產也或三月或四五月皆
爲半產已成男女故也或因憂恐暴怒悲哀太甚或

因勞力打撲傷損及觸風寒或着暴熱不可用黑神散烏金散之類內犯乾薑之故止可用玉燭散和經散湯之類是也

大產七十

夫婦人大產十月滿足降誕者是也或臍腰痛乃敗血惡物之致然也舉世便作虛寒以燥熱治之誤人多矣難經曰諸痛爲實實者熱也可用導水丸禹功散瀉五七行慎不可便服黑神散烏金散燥之同一產治之則可矣

產後心風七十一

夫婦人產後心風者則用調胃承氣湯一二兩加當歸半兩細剉用水三四盞同煎去滓分作二服大下三五行則愈如不愈三聖散吐之

乳汁不下七十二

夫婦人有本生無乳者不治或因啼哭悲怒鬱結氣溢閉塞以致乳脉不行用精猪肉清湯調和美食於食後調益元散五七錢連服三五服更用水梳梳乳用回百餘遍則乳汁自下也

又一法用猪蹄湯調和美味服之乳汁亦下合用熟猪蹄四枚食之亦効

又一法針肩井二穴亦効

產後潮熱七十三

夫婦人產後一二日潮熱口乾可用新汲水調玉露散或冰水調服之亦可或服小柴胡湯加當歸及柴胡飲子亦可慎不可作虛寒治之

乳癰七十四

夫乳癰發痛者亦生於心也俗呼曰吹乳是也吹者風也風熱結薄於乳房之間血脉凝注久而不散潰腐爲膿也可用一法禁之

呪曰 謹請東方護司族吹妳是灰妳子

右用之時當先問病人曰甚病病人答曰吹妳取此氣一口但吹在兩手坎字文上用大姆指緊捏定面北立一氣念七遍吹在北方如此者三遍若作法時以左右二婦人面病人立於病乳上痛操一二百數如此亦三次則愈

雙身大小便不利七十五

夫婦人雙身大小便不利者可用八正散大作劑料除滑石加葵菜子煎服內經曰膀胱不利爲癃癃者是小便閉而不通也如八正散加木香取効更捷經曰膀胱氣化則能出然後服五苓散三五服則愈矣

雙身病瘡七十六

夫雙身婦人病瘡可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等藥如大便結硬可用大柴胡散微瀉過不可大吐瀉恐傷其孕也內經曰夏傷於暑秋必病瘡

雙身傷寒七十七

夫雙身婦人傷寒時氣溫疫頭痛身熱可用升麻散一兩水半椀大煎劑料去滓分作二服先一服吐了後一服不吐次以長流水加生薑棗煎五苓散熱啜之汗出盡頭痛立止

身重瘖瘖七十八

夫婦人身重九月而瘖瘖不言者是將生絡脈不相接也則不能言經曰無治也雖有此論可煎玉燭散二兩水一椀同煎至七分去滓放冷入蜜少許時時呷之則心火下降而肺金自清故能作聲也

懷身入難七十九

夫婦人懷身入難月可用長流水調益元散日三服欲其易產也產後自無一切虛熱血氣不和之疾如未八月則不宜服也以滑石滑胎故也

眉煉八十

夫小兒眉煉在面曰眉煉在耳曰輒耳在足曰靴痒

此三者皆謬名也內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火乃心火熱盛之致然也可用銚針刺之而出血一刺不愈當再刺之二刺則必愈矣內經云血實者宜決之決者破其血也眉煉者不可用藥傳之其瘡多痒則必爬若藥入眼則眼必損矣

牙疳八十一

夫小兒牙疳牙疳者齒齲也齲者是牙斷腐爛也上下牙者是手足陽明二經也或積熱於內或服銀粉巴豆大毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而上至於齒齲齒斷牙縫為嫩薄之分反為害也

可以射香玉線子治之乳母臨卧當服黃連解毒湯一服疳病則愈

夜啼八十二

夫小兒夜啼不止者當用燈花一枚研細隨乳汁下併三服則每服用燈花一枚服罷此藥於淨室中卧一兩日則止也

丹癩八十三

夫小兒丹癩浮赤走引或遍身者乃邪熱之毒在於皮膚以磁片撤出血則愈如不愈則以拔毒散掃三二十度必愈矣內經曰丹癩赤癩火之色也相火之

病是也

疳眼八十四

夫小兒疳澁眼數日不開者乃肝木風熱之致然也可調服涼膈散數服眼開而愈

身瘦肌熱八十五

夫小兒身瘦肌熱面黃腹大或吐瀉腹有青筋兩脇結硬如椀之狀名乳癰癖俗呼曰妳脾是也乳癰得之綿帛大厚乳食傷多大熱則病生肌大飽則必傷於腸胃生於肌表者赤眼丹瘡疥癬癰瘡眉煉赤口瘡牙疳宣爛及寒熱往來此乳母抱不下懷積熱

薰蒸之故兩手脉浮而數也傷於腸胃者吐瀉驚疳哽氣腹脹肌瘦面黃肚大筋直喜食泥土揉鼻竅頭髮作稔乳瓣不化此皆大飽之致然也久而不愈則成乳癰兩手脉沉而緊也此其辨也已上諸症皆乳母懷抱奉養過度之罪癖之疾可以丁香化痺散取過數服牛黃通膈丸甘露散益黃散等藥磨之如不愈者有揉脾一法

呪曰 日精月華 助吾手法 勅斬滅消

驅毒勅攝

右用法之人每念一遍望日取氣一口吹在手心自

採之如小兒病在左壁上用法之人亦左手揉之在
右壁以右手揉之亦吹在乳脾上令母揉之男孩兒
用單日女孩兒用雙日大忌風兩陰晦產婦孝子見
之用法之時宜於日中前晴明好日色則可矣

大小便不利八十六

夫小兒大小便不利通者內經曰三焦約也約者不
行也可用長流水煎八正散時時灌之候大小便利
卽止也

久瀉不止八十七

夫小兒久瀉不止者至八九月間變爲秋深冷痢瀉

泄清白時復撮痛乳辦不化可用養脾丸丸如黍米
大每服二三十丸米飲下日三服則愈若治葛莖之
兒萬舉萬全富家且宜消息

通身浮腫八十八

夫小兒通身浮腫是水氣腫也小便不利者通小便
則愈內經曰三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體否
腫是風乘濕之症也可用長流水加燈心煎五苓散
時時灌之更於不透風暖處頻治汗出則腫消腫消
則自愈內外兼治故也

發驚潮搐八十九

夫小兒三五歲時或七八歲至十餘歲發驚潮搐涎
如拽鋸不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此皆
得於母胎中所授悸惕怕怖驚駭恐懼之氣故令小
兒輕者為驚弔重者為癇病風搐為腹中積熱為臍
風已上證候可用吐涎及吐之藥如吐訖宜用朱犀
腦射清涼墜涎之藥若食乳之子母亦宜服安魂定
魄之劑定志丸之類如婦人懷孕之日大忌驚憂悲
泣縱得子必有諸疾

拗哭不止九十一

夫小兒拗哭不止或一二日或二四日乃邪祟之氣

漆子心七哭不止也有藏經一法以綿絹帶縛手足
許用三姓婦人淨驢槽對小兒於其中不令他人知
調製之候移時則拗哭自止也

身熱吐下九十二

夫小兒身熱吐下腹滿不進乳者可急用牛黃通腸
丸下過四五行則愈

風熱涎嗽九十三

夫小兒風熱涎嗽可用通聖加半夏多煎少少服之
不遇三五日愈

水瀉不止九十三

夫小兒水瀉不止可服五苓與益元各停用新水調
下一二錢不拘時服

瘡疥風癬九十四

夫小兒瘡疥風癬可用雄黃散加芒硝少許油調傳
之如面上有瘡癬不宜擦藥恐因而入眼則損目矣

甜瘡九十五

夫小兒甜瘡久不愈者俗呼曰香瘡是也多於面部
兩耳前有一法令母口中嚼白米成膏子臨卧塗之
不過三五上則愈矣小兒并乳母皆忌雞豬魚兔酒
醋動風發熱之物如治甜瘡亦可

白禿瘡九十六

夫小兒白禿瘡者俗呼爲雞糞禿者是也可用甜瓜
蔓龍頭不以多少河水浸之一宿以沙鍋熬取極苦
汁瀝去芫蔓以文武慢火熬成如稀湯狀盛於磁器
中可先剃頭去盡瘡痂死血出盡着河水洗淨却用
熬下芫蔓膏子一水盞加半夏末二錢生薑自然汁
一兩匙狗膽一枚同調不過三兩上立可大忌雞豬
魚兔動風發熱之物

瘡疾不愈九十七

夫瘡疾連歲不愈者可用呪菓法治之果者謂桃杏

備門事類 卷之五 六
棗梨栗是也

呪曰

吾從東南來 路逢一池水 水裏一條龍

九頭十八尾 問伊食甚的 只喫瘧病鬼

右念一遍吹在菓子上念七遍吹七遍在上令病人於五更雞犬不聞時面東而立食訖於淨室中安困忌食瓜菓葷肉熱物此法十治八九無藥處可救人腰痛氣刺九十八

夫一切男子婦人或因欬嗽一聲或因悲哭啼泣擡昇重物以致腰痛氣刺不能轉側及不能出氣者可用不計散嚏之汗出痛止如不食可用通經散導水

丸瀉十餘行瀉訖服烏金丹和血丹痛減則止矣

赤癩丹腫九十九

夫小兒有赤癩丹腫先用牛黃通膈丸瀉之後用陽起石掃傳則丹毒自散如未散則可用銚針砭刺出血而愈矣

瘡疱癩疹一百

夫小兒瘡疱癩疹跌瘡丹燦等疾如遇火運勝時不可便用升麻湯解之升麻湯者是辛溫之劑止可用辛溫之劑解之太平之時可用辛溫之劑發散後便可用涼膈加當歸白虎湯化班湯王露散煎服之甚

者解毒湯調胃承氣湯投之古人云瘡瘍者首尾俱不可下此言誤人久矣豈不聞揚湯止沸釜底抽薪內經曰五實五申歲多發此病此病少陽相火之歲也少陽客氣勝丹燥瘡疱癰疹之疾生矣又內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬於心火由是言之皆明心生不可用辛溫之劑發散以至熱勢轉增漸成臟毒下血咬牙搖擲爲大熱之症明矣如白虎湯加人參涼膈加桔梗當歸不論秋冬但有瘡疱之症便可用之亦且瘡疱癰疹丹燥跌瘡者是天之一氣以傷人也且如瘡疱癰疹以少爲吉以稠爲凶希少者不服藥而自

愈稠密者以寒涼藥捨死而治之十痊其一二弊家親眷相知信服此藥獲効多矣

此病此病少陽相火之歲
 也癰疹之疾生矣又內經曰
 心火直是言之皆明心生不可
 以至於動時增成臟毒下血吐
 之證明矣如
 湯加入參涼膈加
 之症便可用之亦
 一氣以傷人也且如
 春以寒涼藥針而宗之十全其一正粹家

儒門事親卷之六

戴人張子和著

新安吳勉學校

風形

因驚風搖一

新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣成
 風搖已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則
 令人代哺口目張睽唇舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡
 每發市人皆聚觀夜卧發熱衣被盡去遍身燥痒
 中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破

其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊
戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌
奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺膺穴必愈先
以通聖散汗之繼服洎劑則痰一二升至晚又下五
七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃
成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽嗑
腫傷昏憤如醉約一二時許稍稍省又下數行立覺
是輕顫減熱亦不作是亦能步手能巾櫛自持匙筋
未至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食
補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風

導氣之藥切不可熱劑溫之恐反成他病也

風搖反張二

呂君王之妻年三十餘病風搖目眩角弓反張數日
不食諸醫皆作驚風暗風風癰治之以天南星雄黃
天麻烏附用之殊無少効戴人曰諸風掉眩皆屬肝
木曲直動搖風之用也陽主動陰主靜由火盛制金
金衰不能平木肝木茂而自病先涌風痰二三升次
以寒劑下十餘行又以鉞針刺百會穴出血二盃愈

殮世三

趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月至六月不愈諸

醫以爲脾受大寒故併與聖散子豆蔻丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不思口戴人至而笑曰春傷於風夏必飧泄飧泄者米穀不化而直過下出也又曰米穀不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能尅戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脉皆浮數爲病在表也可汗之直斷曰風隨汗出以火二盆暗置牀之下不令病人見火恐增其熱給之入室使服涌劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時訖開戶滅火一半須臾汗止泄亦止

因風鼻塞四

常仲明常於炎暑時風快處披露肌膚以求爽爲風所賊三日鼻塞雖坐於暖處少通終不大解戴人使服通聖散入生薑葱根豆豉同煎三兩服大發汗鼻立通矣

風痰五

常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一兩次發必頭痛則擊數百拳出黃綠涎一兩盞乃已比年發益頻目見黑花發作昏不知人三四

日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一効偶
遇戴人于隱水之南鄉戴人以雙解散發汗次以苦
劑吐痰病去八九續以分劑平調自春至秋如此數
次方獲全瘥

癩六

朱葛解家病癩疾求治于戴人戴人辭之待五六月
間可治之時也今春初尚寒未可服藥我已具行裝
到宛丘待五六月製藥朱解家以爲託辭後戴人果
以六月間到朱葛乃具大蒜浮萍等藥使人召解家
曰藥已成矣可來就治解爲他藥所惑竟不至戴人

曰向日我非託也以春寒未可發汗暑月易發汗肉
經論治癩疾自眉毛再生針同發汗也但無藥者
用針一汗可抵千針故高俱奉採萍歌曰不居山兮
不在岸採我之時七月半選甚癩風與癩風些小微
風都不算豆淋酒內下三九鐵幘頭上也出汗噫文
士相輕醫氏相疾文士不過自損醫氏至於害人其
解家之謂與陽夏張主簿病癩十餘年眉鬚皆落皮
膚皴澁如樹皮戴人斷之曰是有汗者可治之當大
發汗其汗出當臭其涎當腥乃置煖室中徧塞風隙
以三聖散吐之汗出周身如卧水中其汗果粘臭不

儒門事親
可聞痰皆腥如魚涎兩足心微有汗次以舟車丸瀉
川散大下五七行如此數次乃瘳

手足風裂七

陽夏胡家婦手足風裂其兩目昏漫戴人曰厥陰所
至爲壘又曰鳴柝啓坼皆風之用風屬木木鬱者達
之達謂吐也先令瀉之繼以調胃承氣湯加當歸瀉
之立効

胃脘痛八

一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛也乃胃脘
當心痛也內經曰歲不大過風氣流行民病胃脘當

心而痛乃與神祐丸二百餘粒病不減或問曰此胃
脘有寒宜溫補將軍素知戴人明了復求藥於戴人
戴人復與神祐丸二百餘粒作一服大下六七行立
愈矣

搐搦丸

黃如村一叟兩手搐搦狀如拽鋸冬月不能覆被適
戴人之舞陽道經黃如不及用藥針其兩手大指後
中注穴上戴人曰自肘已上皆無病惟兩手搐搦左
氏所謂風淫末疾者此也或刺後豁手太陽穴也屈
小指握紋盡處是穴也

面腫風十

南鄉陳君俞將赴秋試頭項徧腫連一目狀若半壺其脉洪大戴人出視內經面腫者風此風乘陽明經也陽明氣血俱多風腫宜汗乃與通聖散入生薑葱根豆豉同煎一大盞服之微汗次日以草莖鼻中大出血立消

驚風十一

戴人常曰小兒風熱驚搐乃常病也常搦時切戒把捉手足握持太急必半身不遂也氣血徧勝必痺其一臂漸成細瘦至老難治當其搐時置一竹篋鋪之涼地使小兒寢其上待其搐風刀行徧經絡茂極自止不至傷人

風溫十二

陽夏賀義夫病傷寒當三日以裏醫者下之而成結胸求戴人治之戴人曰本風溫證也不可下又下之太早故發黃結胸此已有瘀血在胸中欲再下之恐已虛惟一涌可愈但出血勿驚以茶調瓜蒂散吐之血數升而衄且噎逆乃以巾捲小鍼而使枕其刃不數日平復

風水十三

張小一初病疥爬搔變而成腫喘不能食戴人斷爲風水水得風而暴腫故遍身皆腫先令浴之乘腠理開發就燠室中用酸苦之劑加全蝎一枚吐之節次用藥末至三錢許出痰約數升汗隨涌出腫去八九分隔一日臨卧向一更來又下神祐丸七十餘粒三次燕之至夜半動一行又續下水煮桃紅丸六十九以麝香湯下又利三四行後二三日再以舟車丸通經散及白朮散以調之愈

右

曹典更妻產後憂志抱氣渾身腫統陰器皆腫大小

便如常其脉浮而大此風水腫也先以壘水擦其痰以火助之發汗次以舟車丸瀲川散瀉數行後四五日方用苦劑涌訖用舟車丸通經散過十餘行又六日舟車瀲川復下之末後用水煮桃紅丸四十餘丸不一月如故前後涌者二瀉凡四通約百餘行當時議者以爲倒布袋法耳病再來則必死世俗只見塵中貨藥者用銀粉巴豆塌腫者暫去復來必死以爲驚俗豈知此法乃內經治鬱之玄兼此藥皆小毒其毒之藥豈有反害者哉但愈後忌慎房室等事况風水不同從水無復來之理

小兒風水十四
鄆之營兵秋家小兒病風水諸醫用銀粉粉霜之藥
小洩反澁飲食不進頭腫如腹四肢皆滿狀若水晶
家人以爲勉強求治于戴人戴人曰此證不與壯年
同壯年病水者或因雷飲及房室此小兒纔七歲乃
風水證也宜出汗乃置燠室以屏帳遍遮之不令見
火若內火見外火必昏憤也使大服胃風湯而浴之
浴訖以布單重覆之凡三五重其汗如水腫乃減五
分隔一二日乃依前治之汗出腫減七分乃二汗而
全減尚未能食以檳榔丸調之兒已喜笑如常日矣

腎風十五

桑惠民病風面黑色畏風不敢出爬搔不已眉毛脫
落作癩醫三年一日戴人到棠谿來求治于戴人戴
人曰非癩也乃出素問風論曰腎風之狀多汗惡風
脊痛不能正立其色焔面瘃然浮腫今公之病腎風
也宜先刺其面大出血其血當如墨色三刺血變色
矣於是下針自額上下鉋針直至顙頂皆出血果如
墨色偏腫處皆針之惟不針目銳眦外兩旁蓋少陽
經此少血多氣也隔日又針之血色乃紫二日外又
刺其血色變赤初鍼時痒再刺則額覺痛三刺其痛

不可任蓋邪退而然也待二十餘日又輕刺一遍方已每刺必以水水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除根下熱之藥病再作戴人在東方無能治者

勞風十六

戴人見一男子目下腫如卧蚕狀戴人曰目之下陰也水亦陰也腎以爲水之主其腫至于目下故也此由房室交接之時勞汗遇風風入皮腠得寒則閉風不能出與水俱行故病如是不禁房則死

中風十七

高評事中風稍緩張令涌之後服鉄彈丸在普濟加減方中或問張曰君常笑人中風服鉄彈丸今以用之何也張曰此收後之藥也令人用之於大勢方來之時正猶蚍蜉撼大樹不識次第故也

暑形

中暑十八

小鄭年十五田中中暑頭痛困卧不起戴人以雙解散汗之又以米醋湯投之未解薄晚又以三花神祐丸大下之遂愈

又

張叟年七十一暑月田中因饑困傷暑食飲不進時
時嘔吐口中常流痰水腹脇作痛醫者槩用平胃散
理中丸導氣丸不効又加鍼灸皆云胃冷乃問戴人
戴人曰痰屬胃胃熱不收故流痰水以公年高不敢
上涌乃使一筋探之不藥而吐之痰涎一升次用黃
連清心散導飲丸玉露散以調之飲食加進惟大便
秘以生薑大棗煎調胃承氣湯一兩奪之遂愈

瘖瘧十九

故息城一男子病瘖求治于戴人診兩手脈皆沉伏
而有力內有積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣

腸中作痛積亦痛形如覆杯間發止今已三年祈禳
避匿無所不至終不能療戴人曰此瘖瘧也以三花
神祐丸五七十九以冷水送過五六行次以冷水止
之冷主收斂故也濕水既盡一二日煎白虎湯作頓
啜之瘖猶不愈候五六日吐之以常山散去冷痰涎
水六七次若飜漿次以柴胡湯和之間用妙功丸磨
之瘖悉除

火形

馬刀二十

襄陵馬國卿病左乳下二脇間期門穴中發癰堅而

不潰痛不可忍醫瘍者皆曰乳癰或曰紅系漏或曰
覷心瘡使服內托散百日又服五香連翹湯數月皆
無驗國卿偃僕而來求治于戴人遇諸市戴人見之
曰此馬刀癰也足少陽膽經之病出靈樞十二經以
示之其狀如馬刀故曰馬刀堅而不潰乃邀之於食
肆中使食水浸湯餅國卿曰稍覺緩次日先以滄鹽
上涌又以涼劑滌去熱勢約數十行腫已散矣
又朱葛黃家妾左脇病馬刀癰增寒發痛已四五日
矣戴人適避暑於寺中來乞藥戴人曰此足少陽膽
經病也少血多氣堅而不潰不可急攻當以苦劑涌

之以五香連翹湯托之既而痛止然癰根未散有一
盜醫過見之曰我有妙藥可潰而爲膿不如此何時
而愈既經毒藥痛不可忍外寒內熱嘔吐不止大便
黑色食飲不下號呼悶亂幾至于死諸姑惶懼夜投
戴人戴人曰當尋元醫者余不能治其主母亦來告
至于再三戴人曰脇間皮薄肉淺豈可輕用毒藥復
令洗出以涼劑下之痛立止腫亦消也

項瘡二十一

戴人在西華寄於夏官人宅忽項上病一瘡狀如白
頭瘡腫根紅硬以其微小不慮也忽遇一故人見邀

以羊羔酒飲雞魚醢蒜皆在焉戴人以其故舊不能
辭又忘其禁忌是夜瘡疼痛不可忍項腫及頭口發
狂言因見鬼神夏君甚懼欲報其家戴人笑曰請無
慮來日當平乃以酒調通經散六七錢下舟車丸百
餘粒次以熱麵羹投之上涌下泄一時齊作合去半
盆明日日中瘡腫已平一二日腫消而愈夏君見大
奇之

伐指痛二十二

麻先生妻病伐指痛不可忍酒調通經散一錢半夜
先吐吐畢而痛減余因歎曰向見陳五曾病此醫以

爲小蟲傷或以草上有毒物手因觸之遷延數月膿
盡方已以今日觀之可以大笑

瘰癧二十三

一婦人病瘰癧延及胸臆皆成大瘡相連無好皮肉
求戴人療之戴人曰火淫所勝治以鹹寒命以滄鹽
吐之一吐而着痂次用涼膈散解毒湯等剗皮肉乃
復如初

咽喉腫塞二十四

一婦人病咽喉腫塞漿粥不下數日腫不退藥既難
下鍼亦無功戴人以當歸荊芥甘草煎使熱嗽之以

冷水拔其兩手不及五六日痛減腫消飲食如故咽
喉之病甚急不可妄用鍼藥

舌腫二十五

南隣朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起
和舌尖亦腫腫至滿口比元舌大二倍一外科以燔
鍼刺其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛巖戴人
曰血實者宜決之以銚鍼磨令鋒極尖輕砭之日砭
八九次血出約一二盞如此者三次漸而血少痛減
腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又曰
諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔鍼艾火是何義也

腰胯痛二十六

戴人女僮冬間自途來面赤如火至灑陽病腰胯大
痛稟急後重痛則見鬼神戴人曰此少陽經也在身
側爲相火使服舟車丸通經散瀉至數盆病猶未瘥
人皆怪之以爲有祟戴人大怒曰驢鬼也復令調胃
承氣湯二兩加牽牛頭末一兩同煎服之太過數十
行約一二缶方捨其杖策但發渴戴人恣其飲水西
瓜梨柿等戴人曰凡治火莫如冰水天地之至陰也
約飲水一二桶猶覺微痛戴人乃刺其陽陵穴以伸
其滯足少陽膽經之穴也自是方寧女僮自言此病

每一歲須瀉五七次今年不曾瀉故如是也常仲明
悟其言以身有濕病故一歲亦瀉十餘行病始已此
可與智者言難與愚者論也

狂二十七

一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如虫行
兩手爬搔數年不已戴人診其兩手脉皆洪大如繩
繩斷之曰口為飛門胃為賁門曰口者胃之上源也
鼻者足陽明經起於鼻交頰之中旁納太陽下循鼻
柱交人中環唇下交承漿故其病如是夫徭役煩擾
便屬火化火乘陽明經故發狂故經言陽明之病登

高而歌棄衣而走罵言不避親疎又况肝主謀膽主
決徭役迫遽則財不能支則肝屢謀而膽屢不能決
屈無所伸怒無所泄心火礚礚遂乘陽明全然胃本
屬土而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發
狂乃命置燠室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱
則達之火鬱則發之良謂此也又以調胃承氣湯半
斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與
瘀血相雜而下數升取之乃康以通聖散調其後矣

痰厥二十八

一夫病痰厥不知人牙關緊急諸藥不能下候死而

已戴人見之問侍病者口中曾有涎否曰有戴人先以防風藜蘆煎湯調芫蒂末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去刃以紙裹其尖灌於右鼻竅中咽然下咽有聲後灌其左竅亦然戴人曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投之鼻中忽偃然仰面似覺有痛斯須吐噦吐膠涎數升頗腥砒石尋常勿用以其病大非如此莫能動然無芫蒂亦不可便用宜消息之大凡中風涎塞往往止斷爲風專求風藥靈寶至寶誤人多矣劉河間治風捨風不論先論二火故令將此法實於火形中

滑泄乾嘔二十九

麻先生妻當七月間病臟腑滑泄以去濕降火之藥治之少愈後腹脹及乳痛狀如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒熱往來噤乾嘔逆胸脇痛不能轉側耳鳴食不可下又復瀉余欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以溫劑止利又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請戴人比及戴人至因檢劉河間方惟益元散正對此證能降火解表止渴利小溲定利安神以青黛薄荷末調二升置之枕右使作數次服之夜半衾身出冷汗如洗元覺足冷如水至此是大暖頭頓輕

肌涼痛減嘔定痢止及戴人至余告之已解戴人曰
益元固宜此是少陽證也能使人寒熱徧劇他經縱
有寒熱亦不至甚既熱而有痢不欲再下何不以黃
連解毒湯服之乃令診脈戴人曰娘子病來心常欲
痛哭爲快否婦曰欲如此余亦不知所謂戴人曰少
陽相火凌爍肺金受屈制無所投告肺主悲但欲
痛哭而爲快也麻先生曰余家諸親無不敬服脈初
洪數有力自服益元散後已半又聞戴人之言使以
當歸芍藥以解毒湯中味數服之大瘥矣

笑不止三十

戴人路經古臺逢一婦病喜笑不止已半年矣衆醫
治者皆無藥術矣求治于戴人戴人曰此易治也以
滄鹽成塊者二兩余用火燒令通赤放冷研細以河
水一大椀同煎至三五沸放溫分三次啜之以釵探
於咽中吐出熱痰五升次服大劑夫黃連解毒湯是
也不數日而笑定矣內經曰神有餘者笑不休此所
謂神者心火是也火得風而成焰故笑之象也五行
之中惟火有笑矣

膈食中滿三十一

遂平李官人妻病咽中如物寒食不下中滿他醫治

之不効戴人診其脉曰此痰膈也內經曰三陽結爲
膈王啓玄又曰格陽云陽盛之極故食格拒而不入
先以通經散越其一半後以舟車丸下之凡三次食
已下又以芫蒂散再越之律啖如昔日矣

目盲三十二

戴人女僮至西華自忽暴盲不見物戴人曰此相火
也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竺穴與頂前
五穴大出血目立明

小兒悲哭不止三十三

夫小兒悲哭彌日不休兩手脉弦而緊戴人曰心火

甚而乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心燥
則痛甚故爍甚悲亦甚今浴以温湯漬形以爲汗也
肺主皮毛汗出則肺熱散矣浴止而啼亦止仍命服
涼膈散加當歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉膈
中之邪熱

小兒手足搐搦三十四

李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝
也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致
乃令掃淨地以水洒之乾令復洒之令極濕俛卧兒
于地上良久渾身轉側泥浣皆滿仍以水洗之少頃

而瘥矣

目赤三十五

李氏範日常赤至戊子年火運君火司天其年病目者往往暴盲運火炎烈故也民範是年目大發遂遇戴人以苾芾散涌之赤立消不數日又大發其病之來也先以左目內眥赤發牽睛狀如鋪麻左之右次銳眥發亦左之右赤貫瞳子再涌之又退凡五次交亦五次皆涌又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中外皆奪方能戰退然不敢觀書及見日張云當候秋涼再攻則愈火方旺而在皮膚雖攻其裏無

益也秋涼則熱漸入裏方可擒也惟宜暗處閉目以養其神水暗與靜屬水明與動屬火所以不宜見日也蓋民範因初愈後曾冒暑出門故痛連發不愈如此涌泄之後不可常攻使服黍粘子以退翳方在別集中矣

熱形

沙石淋三十六

酒監房善良之子年十三病沙石淋已九年矣初因瘡疹餘毒不出作便血或告之令服太白散稍止後又因積熱未退變成淋闕每發則見鬼神號則驚隣

適戴人客鄧壻寺以此病請戴人曰諸醫作腎與小腸病者非也靈樞言足厥陰肝之經病遺溺閉癆閉謂小溲不行癆爲淋瀝也此乙木之病非小腸與腎也木爲所抑火來乘之故熱在脬中下焦爲之約結成沙石如湯瓶煎煉日久熬成湯鹼今夫羊豕之脬吹氣令滿常不能透豈真有沙石而能漏者邪以此知前人所說服五石丸散而致者恐未盡然內經曰木鬱則達之先以瓜蒂散越之次以八正散加湯鹼等分頓啜之其沙石自化而下

又屈村張氏小兒年十四歲病約一年半矣得之麥

秋發則小腸大痛至握其峻跳躍旋轉號呼不已小溲數日不能下下則成沙石大便秘澁肛門脫出一二寸諸醫莫能治聞戴人在朱葛寺避暑乃負其子而哀請戴人戴人曰今日治今日効時日在辰巳間矣以調胃承氣僅一兩加牽牛頭末三錢汲河水煎之令作三五度嚥之又服苦末丸如芥子許六十粒日加瞞上涌下泄一時齊出有膿有血涌瀉旣覺定令飲新汲水一大盞小溲已利一二次矣是夜凡飲新水二三十遍病去九分止哭一次明日困卧如醉自晨至暮猛然起走索食與母歌笑自得頓釋所苦

繼與太白散八正散等調一日大瘥恐暑天失所養
留五日而歸戴人曰此下焦約也不吐不下則下焦
何以開不令飲水則小溲何以利大抵源清則流清
者是也

又栢亭劉十三之子年六歲病沙石淋戴人以苦劑
三涌之以益腎散三下之立愈

膏淋三十七

鹿邑一閑闕家有子二十三歲病膏淋三年矣鄉中
醫不能治往京師徧訪多作虛損補以溫燥灼以鍼
艾無少減聞戴人僑居滬東見戴人曰惑蠱之疾也

凡曰白淫實由少腹冤熱非虛也可以涌以泄其人
以時暑憚其法峻不決者三日浮屠一僧曰予以有
暑病近覺頭痛戴人曰亦可涌願與君同之母畏也
於是涌痰三升色如黑礬汁內有死血并黃綠水又
瀉積穢數行尋覺病去方其來時面無人色及治畢
次日面如醉戴人慮其暑月路遠又處數方使歸以
自備云

二陽病三十八

常仲明病寒熱往來時欬一二聲面黃無力懶思飲
食夜多寢汗日漸變削諸醫作虛損治之用二十四

味燒肝散鹿茸牛膝補養二年口中痰出下部轉虛
戴人斷之曰上實也先以涌劑吐痰二三升次以柴
胡飲子降火益水不月餘復舊此症名何乃內經中
曰二陽病也二陽之病發心脾不得隱曲心受之則
血不流故女子不月脾受之則味不化故男子少精
此二證名異而實同仲明之病味不化也

小兒面上赤腫三十九

黃氏小兒面赤腫兩目不開戴人以銚鍼刺輕砭之
除兩目尖外亂刺數十鍼出血三次及愈此法人多
不肯從必欲治病不可謹護

頭熱痛四十

丹霞僧病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布
圍其頭上置水於其中日易數次熱不能已諸醫莫
識其證求見戴人戴人曰此三陽畜熱故也乃置炭
火於暖室中出汗涌吐三法併行七日方愈僧顧從
者曰此神 hands 也

勞嗽四十一

馳口鎮一男子年二十餘歲病勞嗽數年其聲欲出
不出戴人曰問曾服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴
人曰年壯不妄服藥者易治先以苦劑涌之次以舟

車濬川大下之更服重劑果瘥

一田夫病勞嗽一涌一泄已減大半次服人參補肺湯臨卧更服檳榔丸以進食

又東門高三郎病嗽一年半耳鳴三月矣嗽膿血面多黑點身表俱熱喉中不能發聲戴人曰嗽之源心火之勝也秋傷於濕冬生欬嗽冬水既旺水濕相接隔絕於心火火不下降反而炎上肺金被燠發而爲嗽金燬既久聲反不發醫者補肺腎皆非也戴人令先備西芫冰雪等物其次用涌泄之法又服去濕之藥病日已矣

勞嗽咯血四十二

灑陽劉氏一男子年二十餘歲病勞嗽咯血吐唾粘臭不可聞秋冬少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作狀如瘡瘡寢汗如水累服麻黃根敗蒲扇止汗汗自若也又服寧神散寧肺散止嗽嗽自若也戴人先以獨聖散涌其痰狀如雞黃汗隨涌出昏憤三日不省時時飲以凉水精神稍開飲食加進又與人參半夏丸桂苓甘露散服之不經數日乃愈

吐血四十三

岳八郎常日嗜酒偶大飲醉吐血近一年身黃如橘

昏憤發作數日不省漿粥不下強直如厥兩手脉皆
沉細戴人視之曰脉沉細者病在裏也中有積聚用
舟車丸百餘粒瀆川散五六錢大下十餘行狀如葵
菜汁中燥糞氣穢異常忽開兩目伸挽問左右曰我
緣何至此左右曰你吐血後數日不省得戴人治之
乃醒自是五六日必以瀉凡四五次其血方止但時
欬一二聲潮熱未退以涼膈散加桔梗當歸各秤二
兩水一大盃加老竹葉入蜜少許同煎去滓時時呷
之間與人參白虎湯不一月復故

嘔血四十四

崇谿李民範初病嗽血戴人以調胃湯一兩加當歸
使服之不動再以舟車丸五六十粒過三四行又嘔
血一椀若庸工則必疑不再宿又與舟車丸百餘粒
通經散三四錢大下之過十餘行已愈過半仍以黃
連解毒湯加當歸煎服之次以草薺鼻中出血半升
臨晚又用益腎散利數行乃愈

因藥燥熱四十五

高爍巡檢之子八歲病熱醫者皆為傷冷治之以熱
藥攻矣欲飲水水禁而不與內水涸竭煩燥轉生前
後皆閉口鼻俱乾寒熱往來嗽欬時作遍身無汗又

信州事類 卷之六
欲灸之適遇戴人戴人責其母曰重裊厚被煖炕紅
爐兒已不勝其熱矣尚可灸乎其母謝以不明戴人
令先服人參柴胡飲子連進數服下爛魚腸之類臭
氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪凉水連進數杯節
次又下三四十行大熱方去又與牛黃通膈丸復下
十餘行兕方大痊前後約五十餘行略無所困冰雪
水飲至一斛向灸之當何如哉

肺癰四十六

武陽仇天祥之子病發寒熱諸醫作骨蒸勞治之半
年病愈甚以禮來聘戴人戴人往視之診其兩手脉

尺寸皆潮於關關脉獨大戴人曰癰象也問其乳媪
曾有痛處否乳媪曰無戴人令兒去衣舉其兩手觀
其兩脇下右脇稍高戴人以手側按之兒移身乃避
之按其左脇則不避戴人曰此肺部有癰也非肺癰
也若肺癰已吐膿矣此不可動止可以藥托其裏以
待自破家人皆疑之不以為然服藥三日右脇有三
點赤色戴人連辭云此兒之病若早治者談笑可已
今已失之遲然破之後方驗其死生矣若膿黃赤白
者生也膿青黑者死也遂辭而去私告天祥之友李
簡之曰數月之後即此兒必有一症也其症乃死矣

肺死于已至期而頭眩不舉不數日而死也其父曰
群醫治之斷爲骨蒸證戴人獨言其肺有癰也心終
疑之及其死家人輩以火焚其棺旣燃天祥以杖破
其脇下果出青黑膿一椀天祥仰天哭曰諸醫誤殺
吾兒矣

痿四十七

宛丘營軍校三人皆病痿積年不瘥腰已下腫痛不
舉遍身瘡赤兩目昏暗唇乾舌燥求療于戴人戴人
欲投瀉劑二人不從爲他醫溫補之藥所惑皆死其
同病有宋子王者俄省曰彼已熱死我其改之敬邀

戴人戴人曰公之疾服熱藥久矣先去其藥邪然後
及病邪可下三百行子玉曰敬從教先以舟車丸瀟
川散大下一盆許明日減三分兩足舊不仁是日覺
痛痒累至三百行始安戴人曰諸痿獨取陽明陽明
者胃與大腸也此言不止謂鍼也鍼與藥同也

口瘡四十八

一男子病口瘡數年上至口中至咽嗑下至胃腕皆
痛不敢食熱物一涌一泄一汗一去其九次服黃連
解毒湯不十餘日皆釋

虛勞四十九

西華東茂之病虛勞寢汗面有青黃色自膝以下冷
痛無汗腹中燥熱醫以薑附補之五晦朔不令飲水
又禁梳頭作寒治之請于戴人戴人曰子之病不難
愈難於將護恐愈後陰道轉茂子必不慎東生曰不
敢戴人先以舟車丸瀝川散下五七行心火下降覺
渴與冰水飲之又令澡浴數日間面紅而澤後以河
水煮粥溫養脾胃河水能利小溲又以活血當歸丸
人參柴胡散五苓散木香白朮散調之病大瘥寢汗
皆止兩足日煖食進戴人常曰此本肺痺當以涼劑
蓋水之一物在目爲涼在皮爲汗在下爲小溲穀多

少爲常無水可乎若禁飲水必內竭內竭則燥熱
生焉人若不渴與水亦不肯飲之矣東生旣愈果忘
其戒病復作戴人已去乃殂

心痛五十

酒官楊仲臣病心氣痛此人常好飲酒初飲三二杯
必奔走跛懶兩足三五十次其酒稍散方能復蓆飲
至前量一醉必五七次至明嘔青黃水數日後變魚
腥臭六七日始安戴人曰宜涌乃吐虫一條赤黃色
長六七寸口目鼻皆全兩目膜瞞狀如蛇類以鹽淹
乾示人

傷寒極熱五十一

戴人之僕常與隣人同病傷寒俱至六七日下之不通隣人已死僕發熱極投於井中撈出以汲水貯之檻使坐其中適戴人遊他方家人偶記戴人治法曰傷寒三下不通不可再攻便當涌之試服瓜蒂散良久吐膠涎三椀許與宿食相雜在地狀如一帚頓快乃知世醫殺人多矣戴人之女僮亦嘗吐一吏傷寒吐訖使服太白散甘露散以調之

失笑五十二

戴人之次子自出妻之後日瘦語如瓮中此病在中

也常撚第三指失笑此心火也約半載日飲冰雪更服涼劑戴人曰惡雪則愈矣其母懼其大寒戴人罵曰汝親也吾用藥如鼓之應桴何惡涼藥宜乎世俗之謗我也至七月厭冰不飲病已解矣

赤目五十三

安喜趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思戴人語曰凡病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君玉歎曰法之妙其迅如此乃知法不遠人自遠法也

目眾五十四

清州王之一子年十餘歲目赤多淚衆工無効戴人見之曰此兒病目衆當得之母腹中被驚其父曰姪娘時在臨清被圍戴人令服瓜蒂散加鬱金上涌而下泄各去涎沫數升人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至明日其目耀然爽明李仲安見而驚曰竒哉此法救人其日又與頭上出血及眉上鼻中皆出血吐時次用通經散二錢舟車丸七十粒自吐却少半又以通經散一錢投之明日又以舟車丸三十粒投之下十八行病更不作矣

痘後嘔吐五十五

河門劉光濟之子纔二歲病痘後嘔吐發昏用丁香豆蔻之類不効適麻先生寄其家乃謂光濟曰余有小方無毒人皆知之公肯從乎光濟曰先生之言必中於理何敢不從麻先生曰劉河間常言涼膈散可治瘡疱張戴人用之如神况因經言少陽所至爲嘔涌少陽者相火也非寒也光濟欣而從之此日利二行適王德秀自外入聞其利之也乃曰瘡疱首尾不可下麻自悔其多言業也已然姑待之此至食時下黃涎一合日午問之兒已索遊于街矣

熱厥頭痛五十六

彭吳張叟年六十餘歲病熱厥頭痛以其用涌藥時
已一月間矣加之以火其人先利臟腑年高身困出
門見日而仆不知人家人驚惶欲揉撲之戴人戴人
曰大不可擾續與西瓜凉水蜜雪少頃而蘇蓋病人
年老涌泄目脉易亂身體內有炎火外有太陽是以
跌自若是擾之便不救矣惟安定神思以凉水投之
待之以淨淨便屬水自然無事若他醫必惑足以知
戴人之諳練

產前喘五十七

武安胡產祥之妻臨難月病喘以涼膈散二兩四物

湯二兩朴硝一兩分作二服煎令冷服之一服病減
大半次又服之病痊効矣產之後第六日血迷又用
涼膈散二兩四物湯三兩朴硝一兩都作一服大下
紫黑水其人至今肥健戴人常曰孕婦有病當十月
九月內朴硝無碍八月者當忌之七月却無妨謂陽
月也十月者已成形矣

血崩五十八

孟官人母年五十餘歲血崩一匙數用澤蘭丸黑神
散保安丸白薇散補之不効戴人見之曰天癸已盡
本不當下血蓋血得熱而流散并寒也夫女子血崩

多因大悲哭悲甚則肺葉布心系爲之恐血不禁而
下崩內經曰陰虛陽搏之爲崩陰脉不足陽脉有餘
數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非
者可服大劑大劑者黃連解毒湯是也次以棟香附
子二兩炒白芍二兩焙當歸一兩焙三味同爲細末
水調下又服檳榔丸不拘口口而交

婦人二陽病五十九

一婦月事不行寒熱往來口乾頰赤喜飲豆羹湯飲
一二聲諸醫皆云經血不行宜蠶虫水蛭乾漆礪砂
元清紅娘子沒藥血竭之類性戴人不然曰古方中

雖有此法柰病人服之必心膈腹發痛飲食不進乃命
止藥飲食稍進內經曰二陽之病發心脾心受之則
血不流故女子不月既心受積熱宜抑火升水流濕
潤燥開胃進食乃涌出痰一二升下泄水五六行濕
水上下皆去血氣自行沸流月事不爲水濕所膈自
依期而至矣亦不用蠶虫水蛭之類有毒之藥如用
之則月經縱來小洩反閉他證生矣凡精血不足當
補之以食大忌有毒之藥偏心而成天閔

月閉寒熱六十

一婦年三十四歲經水不行寒熱往來面色痿黃唇

備門事類 卷之六
焦頰赤時欬三兩聲向者所服之藥黑神散烏金丸
四物湯燒肝散鱉甲散建中湯平肺散鍼艾百千病
轉劇家人意倦不欲求治戴人聞之先涌痰五六升
午前涌畢午後食進餘證悉除後三日復輕涌之又
去痰一二升食進益不數日又下通經散瀉訖一二
升後數日去死皮數重小者如麩片大者如葦膜不
一月經水行神氣大康矣

惡寒實熱六十一

一婦身冷脉微食沸熱粥飯六月重衣以狐帽蒙其
首猶覺寒泄注不止常服薑附硫黃燥熱之劑僅得

平和稍用寒涼其病轉增三年不愈戴人診其兩手
脉皆如絙繩有力一息六七至脉訣曰六數七極熱
生多以涼布搭心次以新汲水淋其病處婦乃叫殺
人不由病者令人持之復以冷水淋其三四十桶大
戰汗出昏困一二日而向之所惡皆除此法華元化
已曾用拂無知者

遇寒手熱六十二

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛戴人曰四肢者諸
陽之本也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛
以三花神祐丸大下之熱遂去

嘔逆不食六十三

柏亭王論夫本因喪子憂抑不思飲食醫者不察以爲胃冷血燥之劑盡用之病變嘔逆而瘦求治于戴人一視涌泄而愈愈後忘其禁忌病復作大小便俱秘臍腹撮痛嘔吐不食一日大小便不通十有三日復問戴人戴人曰令先食葵羹菠菱菜猪羊血以潤燥開結次與導飲丸二百餘粒大下結糞又令恣意飲冰水數升繼搜風丸桂苓白朮散以調之食後服導飲丸三十餘粒不數日前後皆通藥止嘔定食進此人臨別又留潤腸丸以防復結又留滌腸散大閱

則用之凡服大黃牽牛四十餘日方瘳論夫自歎白向使又服向日熱藥已非今日人矣一僧問戴人云腸者暢也不暢何以此一句儘多

痊癰六十四

一省掾背項常有痊癰愈而復生戴人曰太陽血有餘也先令涌泄之次於委中以鉗鍼出紫血病更不復作也

牙痛六十五

澤州李繼之忽病牙痛皺眉不語藥景先見之曰何不藥也曰牙痛藥曰曾記張戴人云陽明經熱有餘

也宜大下之乃付舟車丸七十粒服畢遇數知交留
飲強飲熱酒數杯藥爲熱酒所發盡吐之吐畢而痛
止李大笑曰戴人神仙也不三五日又痛再服前藥
百餘粒大下數行乃愈

淋六十六

戴人過息城一男子病淋戴人令頓食鹹魚少頃大
渴戴人令恣意飲水然後以藥治淋立通淋者無水
故澁也

口臭六十七

趙平尚家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如發

廁雖親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金爲火
所煉火主焦臭故如是也又則成腐腐者腎也此極
熱則反蕪水化也病在上宜涌之先以茶調散涌而
去其七分夜用舟車丸瀦川散下五七行比旦而臭
斷嗚呼人有病口臭而終其老者世訛以爲肺系偏
而與胃相通故臭妄論也

濕形

疝六十八

汝南司候李審言因勞役王事飲水坐濕地乃濕氣
下行流入臍囊大腫痛不可忍以金鈴川練子等藥

不効求治于戴人曰可服泄水丸審言惑之又數日痛不可堪竟從戴人先以舟車丸瀝川散下青綠沫十餘行痛止次服茴香丸五苓以調之三日而腫退至老更不作夫疝者乃肝經也下胃沫者肝之色也

水疝六十九

律科王敏之病水疝其法在於寒形中

留飲七十

郭敬之病留飲四日浮腫不能食脚腫連腎囊痛先以苦劑涌之後以舟車丸瀝川散瀉之病去如拾遺又棠谿張鳳村一田叟姓楊其病嘔酸水十餘年本

留飲諸醫皆以燥劑燥之中脘臍脘以火艾燔鍼刺之瘡未嘗合戴人以苦劑越之其涎如膠乃出二三升談笑而愈

黃疸七十一

蔡寨成家一重子年十五歲病疸一年而黃如金遍身浮腫乏力惟食鹽與焦物戴人以茶調散吐之涌涎一盃臨晚又以舟車丸七八十粒通經散三錢下四五行待六七日又以舟車丸瀝川散下四五行鹽與焦物見而惡之面色變紅後再以茶調散涌之出痰二升方能愈矣

又一男子作贅偶病痘善食而瘦四肢不舉面黃無力其婦翁欲棄之其女子不肯曰我已生二子矣更適他乎婦翁本農者召婿意欲作榮見其病甚每日辱詬人教之餌膽礬丸三稜丸了不關涉鍼灸祈禳百無一濟戴人見之不診而療使服涌劑去積痰宿水一斗又以泄水丸通經散下四五十行不止戴人命以米水一盂飲之立止次服平胃散等間服檳榔丸五七日黃退力生蓋脾疸之證濕熱與宿穀相搏故也俗謂之金勞黃

又朱葛周黃劉三家各有僕病黃疸戴人曰僕役之職飲食寒熱風暑濕寒尋常觸冒也恐難調攝虛費治功其二家留僕於戴人所從其飲餌其一僕不離主人執役三人同服苦散以涌之又服三花神祐丸下之五日之間果二僕愈而一僕不愈如其言

黃病七十二

某寨一女病黃遍身浮腫面如金色困乏無力不思飲餌惟喜食生物坭煤之屬先以苦劑蒸餅為丸涌痰一椀又舟車丸通經散下五七行如墨汁更以導飲丸磨食散氣不數日肌肉如初

病發黃七十二

備門事類 卷之六
安喜趙君王爲掾省日病發遍身黃往問醫者醫云
君乃陽明證公等與麻知幾皆受訓於張戴人是疇
議喫大黃者難與論病君王不悅歸自揣無別病乃
取三花神祐丸八十粒服之不動君王乃誤曰予之
濕熱盛矣此藥尚不動以舟車丸瀆川散作劑大下
一斗糞多結者一夕黃退君王由此益信戴人之言

水腫七十四

南鄉張子明之母極肥偶得水腫四肢不舉戴人令
上涌汗而下泄之去水三四斗初下藥時以草貯布
囊高支兩足而卧其藥之行自腰以上水覺下行自

足以上水覺上行水行之狀如蛇走隧如線牽四肢
森然涼寒會於臍下而出不旬日間病大減餘邪未
盡戴人更欲用藥竟不能從其言

涌水七十五

李七老病涌水證面黃而喘兩足皆腫按之陷而腹
起行則濯濯有聲常欲飲水不能睡卧戴人令上涌
去痰而汗之次以舟車丸瀆川散下之以益腎散復
下之以分陰陽利水道之劑復下之水盡皆瘥

停飲腫滿七十六

涿郡周敬之自京師歸鹿邑道中渴飲水過多漸成

備用藥錄 卷之六 三六
腫滿或用三花神祐丸憚其太峻或用五苓散分利水道又太緩淹延數多終無一効蓋粗工之技止於此耳後手足與腎皆腫大小便皆秘澁常仲明求治于戴人戴人令仲明付藥比及至已歿矣戴人曰病水之人其勢如長川泛溢欲以杯勺取之難矣必以神禹決水之法斯愈矣

濕痺七十七

常仲明病濕痺五七年矣戴人令上涌之後可瀉五七次其藥則舟車瀆川通經神祐益腎自春及秋必十餘次方能愈公之病不畢鍼灸與令嗣皆宜涌但

膈月非其時也欲候春時恐予東遷公姑屏病之大勢至春和時人氣在上可再涌之以去其根卒如所論矣

又一衲子因陰雨卧湿地一半手足皆不隨若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類又及大便澁風燥生經歲不已戴人以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄之數日手足皆舉戴人口夫風濕寒之氣合而成痺水痺得寒而浮畜於皮膚之間久而不去肉舍六腑曰用去水之藥可也水濕者人身中之

寒物也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣
 又息帥病腰股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒
 濕治之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥
 無不用之至六十餘日目赤上熱大小便澀腰股之
 病如故戴人診其兩手脉皆沉遲沉者為在裏也在
 裏者泄之以舟車丸瀆川散各一服去積水二十餘
 行至早晨服藜白粥一二頓與之馬已能矍鑠矣
 又崇谿李十八郎病腰脚大不伸偃僂蹇蹇而行已
 數年矣服藥無効止藥却愈因以暮涉水病復作醫
 氏使服四斤丸其父李仲安乃乞藥于戴人戴人曰

近日服何藥仲安曰四斤丸公曰昏赤未其父驚曰
 目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明既來則策杖
 而行目腫無所見戴人先令涌之藥忽下走去二十
 行兩目頓明策已棄矣比再涌泄能讀官歷日記至
 一月令服當歸丸健步而歸家矣
 又息城邊校白公以隆暑時飲酒覺極熱於涼水池
 中漬足便其冷也為濕所中股膝沉痛又因醉卧濕
 地其痛轉加意欲以酒解痛遂以連朝而飲反成赤
 痛發間止且六十年往往斷其寒濕脚氣以辛熱治
 之不効或使服神芎丸數服痛微減他日復飲疾作

如前畢囊痒湿且腫硬臍下似有物難於行以此免
軍役令人代之來訪戴人戴人曰余亦斷爲寒湿但
寒則陽火不行故爲痛湿則經隧有滯故腫先以苦
劑涌之次以舟車丸百餘粒瀆川散四五錢微一兩
行戴人曰如激劑尚不能攻何況于熱藥補之乎異
日又用神祐丸百二十九通經散三四錢是用僅得
四行又來日以神祐八十九丸投之續日一二行又次
日服益腎散四錢舟車丸百餘粒約下七八行白公
已覺膝寒者暖硬者軟重者輕也隔者亦退飲食
加進又以涌之其病全瘳臨別又贈之以疎風丸併

以其方與之此公以其不肯妄服辛熱藥故可治也

屈膝有聲七十八

嶺北李文卿病兩膝臏屈伸有聲剝剝然或以爲骨
鳴戴人曰非也骨不憂焉能鳴此筋湿也湿則筋急
有獨緩者緩者不鳴急者鳴也若用予之藥一涌一
泄上下去其水水去則自無聲矣李文卿乃從其言
既而果然矣

白帶七十九

息城李左衙之妻病白帶如水窈滿中綿綿不絕穢
臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷

起石硫黃薑附之藥重重燥補污水轉多常以礶日
易數次或一藥以木炭十斤置藥在鉗鍋中鹽泥封
固三日三夜炭火不絕燒令通赤名曰火龍丹服至
數升污水彌甚炳艾燒鍼三年之間不可勝數戴人
斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不可勝如
此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰水二
三升次日下沃水十餘行三遍汗出周身至明日病
人云汚已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一子
內經曰少腹冤熱洩出白液帶之爲病溶溶然若坐
水中故治帶下同治濕法瀉痢皆宜逐水利小溲勿

以赤爲熱白爲寒今代劉河間書中言之詳矣

濕嗽八十

趙君王妻病嗽時已十月矣戴人處方六味陳皮當
歸甘草白朮枳殼桔梗君王疑其不類嗽藥戴人笑
曰君怪無烏梅罌粟囊平夫冬嗽乃秋之濕也濕土
逆而爲嗽此方皆散氣除濕解急和經三服帖然効
矣

瀉兒八十一

一婦年三十四歲夜夢與鬼神交驚怕異常及見神
堂陰府舟楫橋梁如此一十五年竟無娠孕巫祈覲

禱無所不至鑽肌灸肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中
滿足腫委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火盛於
上陰火盛于下鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫
橋梁水之用兩手寸脉皆沉而伏知胸中有痰實也
凡三涌三泄三汗不旬日而無夢一月而有孕戴人
曰余活婦人使有娠此法不誣

濕癬八十二

一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝發痒
時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流痛不可忍灸熇
薰樛硫黃藺茹白僵蚕羊蹄根之藥皆不効其人姿

性研巧以此病不能出嫁其父母求療于戴人戴人
曰能從余言則瘥父母諾之戴人以銚鍼磨令尖快
當以痒時於癬上各刺百餘鍼其血出盡煎鹽湯洗
之如此四次大病方除此方不書以告後人恐爲癬
藥所誤濕淫于血不可不砭者矣

又蔡寨成家童子一歲病滿腹胸濕癬每爬搔則黃
水出已年矣戴人先以苦末作丸上涌涌訖次以舟
車丸瀆川散下三五行次服涼膈加朴硝煎成時時
呷之不數日而愈

濕慝瘡八十三

穎臯韓吉卿自髀至足生濕匿瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類虫行袴鞞愈而復生盤痕成凹一餘年不瘥戴人晒之曰此濕匿瘡也由水濕而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃渠素不信戴人之醫至此大服

泄瀉八十四

古鄆一講僧病泄瀉數年丁香豆蔻乾薑附子官桂烏梅等燥藥燔針燒臍熯腕無有關者一日發昏不省檀那贈紙者盈門戴人診兩手脉沉而有力脉訣云下利微小生者脉洪浮大者無瘥以瓜蒂散涌之

出寒痰數升又以無憂散泄其虛中之積及燥糞僅盈斗次以白朮調中湯五苓散益元散調理數日僧已起矣非術精識明誰敢負荷如此

洞泄八十五

一講僧顯德明初聞家遭兵革心氣不足又爲寇賊所驚得臟腑不調後入京不伏水土又得心氣以至危篤前後三年八仙丸鹿茸丸燒肝散皆服之不効乃求藥于戴人戴人曰此洞泄也以謀慮久不決而成肝主謀慮甚則乘脾久思則脾濕下流乃上涌痰半盆末後有血數點肝藏血故也又以舟車丸濬川

散下數行仍使澡浴出汗自尔日勝一日常以胃風湯白朮散調養之一月而強食復故矣

又李德卿妻因產後病泄一年餘四肢瘦乏諸醫皆斷爲死證當時戴人在朱葛寺以舟載而乞治焉戴人曰兩手脉皆微小乃痢病之生脉况洞泄屬肝經肝木尅土而成此疾亦是腸澼澼者腸中有積水也先以舟車丸四五十粒又以無憂散三四錢下四五行寺中人皆駭之病羸如此尚可過耶衆人雖疑然亦未敢詰且更看之復導飲丸又過之渴則調以五苓散回晚使人伺之已起而緝牀前後約三四十

以胃風湯調之半月而能行一月而安健由此闔寺服德卿之昆仲咸大異之

又劉德源病洞泄逾年食不化肌瘦力乏行步欹傾面色黧黑舉世治病之藥皆用之無効適戴人治瀝陽往問之戴人乃出示內經洞泄之說雖不已疑然畏其攻劑夜焚香禱神曰某以病久不瘥欲求治于戴人戴人以謂宜下之欲不從戴人名醫也欲從之形羸如此恐不任藥母已老矣無人侍養來日不得已須服藥神其相之戴人先以舟車丸無憂散下十餘行殊不困已頗喜食後以檳榔丸磨化其滯待數

日病已大減戴人以爲去之未盡當以再服前藥德源亦欣然請下之又下五行次後數日更以苦劑越之往問其家彼云已下村中收索去也忽一日入城面色極佳語言壯健但怪其跛足而立問何故如此德源曰足上患一癰戴人曰此裏邪去而於外病痊之後凡病皆如是也

大便少而頻八十六

太康劉倉使病大便少而頻日七八十次常於兩股間懸半枚瓠蘆如此十餘年戴人見之而笑曰病旣頻而少欲通而不得通也何不大大下之此通因通用

也此一服藥之力乃與藥大下三十餘行頓止

暑泄八十七

殷輔之父年六十餘暑月病泄瀉日五六十行自建碓鎮來請戴人于陳州其父喜飲二家人輩爭止之戴人曰夫暑月年老津液衰少豈可禁水但勸之少飲比及用藥先令速歸以菘豆雞卵十餘枚同煮卵熟取出令豆軟下陳糲米作稀粥攪令寒食雞卵以下之一二頓病減大半蓋糲米雞卵皆能斷痢然後製抑火流濕之藥調順而方愈

腹滿面腫八十八

蕭令腹滿面足皆腫痰黃而喘急食減三年之間醫者皆盡而不驗戴人以瓜蒂散涌之出寒痰三五升以舟車丸瀝川散下之青蘘末送平年以桂苓白朮散五苓散調之半日獲愈矣

又... 瀝川散... 舟車丸... 瓜蒂散... 青蘘末... 桂苓白朮散... 五苓散... 調之... 半日獲愈矣

此為一... 藥之... 凡與藥大下三下... 瀝川散... 舟車丸... 瓜蒂散... 青蘘末... 桂苓白朮散... 五苓散... 調之... 半日獲愈矣

... 瀝川散... 舟車丸... 瓜蒂散... 青蘘末... 桂苓白朮散... 五苓散... 調之... 半日獲愈矣

