



本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經 商陸 本經 狼毒 本經

防葵 本經 狼牙 本經 藺茹 本經

大戟 本經 澤漆 本經 甘遂 本經

續隨子 開寶 芫蓉 本經 雲實 本經

蓖麻 唐本 常山蜀漆 本經 木藜蘆 拾遺

藜蘆 本經 參朮 本經

附子 本經 天雄 本經 側子 別錄

漏籃子

綱目

烏頭

本經

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

由跋

本經

蒟蒻

開寶 菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經 不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躑躅

本經

山躑躅 羊不吃草附

芫花

本經

莨花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蕒

本經

石龍芮

本經 胡椒附

毛茛

拾遺 每薑附

牛扁

本經 莢草附

葶麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目 透山根附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目 卷十七 草部 第十七卷上

本草綱目草部第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經 下品

**釋名** 黃良 將軍 火參 普 膚如 吳普弘景曰大

之號當取其駿快也 臬曰推陳致新如 戡定禍亂以致太平所以有將軍之號

**集解** 采根火乾 晉曰生蜀郡北郡或隴西二月八月

生黃赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五月實黑八月采根根有黃汁切片陰乾弘景曰今

采益州北部汝山及西山者雖非河西隴西好者 猶作紫地錦色味甚苦澇色至濃黑西川陰乾者

勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如西耐蛙堪 久此藥至勁利粗者便不中服恭曰葉子莖並倍

羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根紅者亦俗宿羊蹄大者乃如盤長二尺其性溫潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熟橫寸截著石上燂之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者皆佳幽并以北者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣藏器曰凡用當分別之若取和厚深洗能攻病者可用蜀中侶牛舌片緊硬者若取溷洩駿快推陳去熱者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃正月內生青葉侶莖麻大者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二八月采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盤藥市以大者為枕紫地錦文也今人以莊浪出者

為最莊浪即古涇原隴西地與別錄相合

**正誤** 頌曰興州出一種羊蹄大黃治疥癩甚効初生苗葉累年長大即葉侶商陸而狹尖四月

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色呼為金蕎麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為上大黃時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其侶大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀侶羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

**根修治** 雷曰凡使細切以文如水旋斑緊重者剉片蒸之從巳至未晒乾又洒臘水蒸之從

未至亥如此凡七次晒乾却洒淡蜜水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃晒乾用藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以火石燂乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸 莫

氣味苦寒無毒別錄曰大寒普曰神農雷公苦有

日味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸

煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒流入陽明經

餘經不用酒果曰大黃苦峻下走用之于下必生

用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之

分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生

者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或痰痺或

頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃

寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元

氣耗陰血故也之才曰黃芩為之

使無所畏權曰忌冷水惡乾漆

主治下瘀血血

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟本平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結別錄通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿甄權通宜一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘧大瀉諸實

熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿元下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃

疸諸火瘡時珍

發明之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚

怒心下悸氣得消石紫石英菝仁療女子血

用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐  
其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用  
之無不効惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒  
善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經  
之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉  
去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之  
陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故  
黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血  
之台也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不  
明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後  
人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰  
五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在  
氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足  
而手足厥陰心包絡  
足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖  
曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下  
痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉

脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則傷  
痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘  
在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所致為  
痞滿又云濁氣在上則生膜脹是矣病發於陽而  
反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分  
野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之  
邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸  
湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無已註釋  
傷寒論亦不知分別此義成無已曰熱淫所勝以  
苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強  
頌曰本草稱大黃惟陳致新其効最神故古方下  
積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒  
藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用  
也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是  
快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元  
帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧  
坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從  
之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

**附方** 舊十四新 吐血衄血 治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之大黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一吐血刺痛 川大

升熱服取利 張仲景金匱玉函 傷寒痞滿 兩為散每服一錢以生地黃汁一合水 傷寒痞滿

半盞煎三五沸無時服 簡要 傷寒痞滿 病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為

痞也大黃黃連瀉心湯主之大黃二兩黃連一兩 以麻沸湯二升漬之須臾絞汁

分作二次溫服 仲景傷寒論 熱病譫狂 川大黃 炒微赤為散用臘雪水五升煎如

膏每服半匙冷水下 聖惠方 傷寒發黃 上方同 氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎汁一

升入苾瀉一兩緩服須臾當利下 傷寒類要 腰 腳風氣 作痛大黃二兩切如碁子

令焦搗篩每用二錢空心以水二大合入 方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷一切壅滯 驗 膿惡物即痛止 崔元亮海上方

子大每服十九白湯下並不損人如要微利加一 大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧

二十丸衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸名墜痰丸 又名全真丸金宣宗服

之有驗賜名保安丸 痰為百病 滾痰丸治痰為 前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰消二兩同入 砂鑊固濟煨紅研末二兩右各取末以水和丸梧

子大常服一二十九小病五六十丸緩病七八十 丸急病一百二十九溫水吞下即卧勿動候藥逐

上焦痰滯次日先下糟柏次下痰涎未下再服王 隱君歲合四十餘斤愈 男女諸病 無極丸治婦人

疾數萬也 養生主論 帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹 痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其効甚速



宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分用童尿一盞食鹽二錢浸一日切晒一分用醇酒一盞浸一日切晒再分用紅花四兩泡水一盞浸一日切晒一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去歸切晒為末煉蜜丸梧子大每服五十九空溫暫下取下惡物為驗未下再服此

**心腹諸疾** 三物武當高士孫碧雲方也醫林集要

充治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三丸凡中客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死者以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹中鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即瘥此乃仲景方司空裴秀改為散用不及丸也

**圖經** **腹中痞塊** 大黃十兩為散醋三升蜜兩匙和本草煎丸梧子大每服三十九生薑湯下吐利為度

**腹脇積塊** 風化石灰末半斤瓦器炒外臺祕要

極熱稍冷入大黃末一兩

炒熟入桂心末半兩畧炒下米醋攪成膏攤布吐之○又方大黃二兩朴消一兩為末以大蒜同填骨和貼之或加阿魏一兩尤妙

丹溪心法 **久患積聚** 二便不利上搶大黃白芍各二兩為末水丸梧子大每湯下四十九日三以知為度

千金方 **脾癖疳積** 不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞沙鍋內文武火熬成膏傾瓦上日晒夜露三日再研用船上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之後再服若不思口不如勿服

聖濟總錄 **小兒無辜** 閃癖癩癧或頭乾黃聾或乍痢乍瘡諸狀多者大黃煎主之大黃九兩錦紋新實者若微朽即不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和置瓦盃中於大鑊內浮湯上炭火慢煮候至成膏可丸乃貯器中三歲兒一服七丸梧子大日再服以下出青赤膿為度若不下或下少稍稍加瓦若

下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可  
用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳  
母亦禁之一加木香

一兩半 崔知悌方 小兒諸熱 大黃煨熟黃本各  
一兩為末煉蜜丸

麻子大每服五丸至十丸蜜湯下 骨蒸積熱 漸漸  
黃瘦

加黃連名三黃丸 錢氏小兒方 骨蒸積熱 黃瘦  
大黃四分以童子小便五六合煎取四合去滓 赤  
空腹分為二服如人行五里再服 廣利方

白濁淋 好大黃為末每服六分以雞子一個破頂  
入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈

簡便 相火秘結 大黃末一兩牽牛頭末半兩每服  
三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩蜜湯服 劉 諸痢初起 大黃煨熟當歸各二三  
河間保命集 錢莊人各一兩水煎服

取利或加檳榔 集簡方 熱痢裏急 煎服取利 集簡方 忽喘  
不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕

悶絕 而復蘇名傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩

危氏得效方 食已即吐 胸中有火也大黃  
一兩甘草二錢半

景金賈玉函方 婦人血癖 作痛大黃一兩酒  
二升煮十沸頓服

金翼 產後血塊 大黃末一兩頭醋半升熬膏丸  
梧子大每服五丸溫醋化下良

八當下 乾血氣痛 錦綾大黃酒浸晒乾四兩為末  
好醋一升熬成膏丸茨子大卧

千金方 乾血氣痛 好醋一升熬成膏丸茨子大卧  
時酒化一丸服大便利一二行紅漏自下 婦人嫁

乃調經仙藥也或加香附 董氏集驗方 婦人嫁  
痛 小戶腫痛也大黃一兩酒一 男子偏墜 作痛大  
升煮一沸頓服 千金方 黃末和

醋塗之乾則 濕熱眩暈 不可當者酒炒大黃為末  
茶清服二錢急則治其標

易 梅師方 濕熱眩暈 茶清服二錢急則治其標  
也 丹 小兒腦熱 常欲閉目大黃一分水三合浸

溪纂要 小兒腦熱 常欲閉目大黃一分水三合浸  
上乾即再上 暴赤目痛 四物湯加大黃酒煎 胃

姚和衆至寶方 暴赤目痛 四物湯加大黃酒煎 胃  
服之 傳信適用方

下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可  
用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳  
母亦禁之一加木香

一兩半 崔知悌方 小兒諸熱 大黃煨熟黃芩各  
一兩為末煉蜜丸

麻子大每服五丸至十丸蜜湯下 骨蒸積熱 漸漸  
加黃連名三黃丸 錢氏小兒方

大黃四分以童子小便五六合煎取四合去滓 赤  
空腹分為二服如人行五里再服 廣利方

白濁淋 好大黃為末每服六分以雞子一個破頂  
入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈

簡便 相火秘結 大黃末一兩牽牛頭末半兩每服  
三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩蜜湯服 劉 諸痢初起 大黃煨熟當歸各二三  
河間保命集 錢莊人各一兩水煎服

取利或加檳 熱痢裏急 大黃一兩浸酒半日 忽喘  
椰 集簡方 煎服取利 集簡方

悶絕 不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕  
而復蘇名傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩

水二盞煎一盞熱服 食已即吐 胸中有火也大黃  
可安 危氏得效方 一兩甘草二錢半

水一升煮半升溫服 婦人血癖 作痛大黃一兩酒  
仲景金匱玉函方 二升煮十沸頓服

取利 產後血塊 大黃末一兩頭醋半升熬膏丸  
千金翼 梧子大每服五丸溫醋化下良

久當下 乾血氣痛 錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末  
千金方 好醋一升熬成膏丸芡子大卧

時酒化一丸服大便利一二行紅漏自下 婦人嫁  
乃調經仙藥也或加香附 董氏集驗方

痛 小戶腫痛也大黃一兩酒一 男子偏墜 作痛大  
升煮一沸頓服 千金方 黃末和

醋塗之乾則 濕熱眩暈 不可當者酒炒大黃為末  
易 梅師方 茶清服二錢急則治其標

也 丹 小兒腦熱 常欲閉目大黃一分水三合浸  
溪纂要 一夜一歲兒服半合餘者塗頂

上乾即再上 暴赤目痛 四物湯加大黃酒煎 胃  
姚和衆至寶方 服之 傳信適用方

火牙痛

口含冰水一口以紙燃蘸大黃末風熱牙

痛

紫金散治風熱積壅一切牙痛去口氣大有奇效好大黃煎肉燒存性為末早晚楷牙漱去都

下一家專貨此藥兩宮常以數千

風蟲牙痛

漸至崩落口鼻極効大黃米泔浸軟生地黃各旋

引入風

口瘡糜爛

大黃枯礬等分為末鼻中生

瘡

生大黃杏仁搗勻猪脂和塗○又方生大黃黃連各一錢麝香少許為末生油調搽聖惠方

仙茅毒發

見仙茅下

傷損瘀血

三因方雞鳴散

石壓傷及一切傷損瘀積痛不可忍並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研

酒一盃煎六分雞鳴時服至曉取下瘀血即愈○和濟方治跌壓瘀血在內脹滿大黃當歸等分炒

研每服四錢溫酒

打撲傷痕

瘀血滾注或作潮熱

服取下惡物愈

杖瘡腫痛

大黃末薑汁調塗

白也

瀕湖集簡方

杖瘡腫痛

大黃末醋調塗

摘玄

金瘡煩痛

大便不利大黃黃芩等分為末

千金

凍瘡破爛

湯火傷灼

蜜調塗之不惟止痛又且滅癥此乃

灸瘡飛蝶

因

灸訖火痂便退瘡肉鮮肉片飛如蝶形而去痛不可忍是火毒也大黃朴消各半兩為末水服取利

即愈

蠅虻咬瘡

火丹赤腫

遍身者

水頻刷之

腫毒初起

大黃五倍子黃蘗等分為末

伊方癰腫焮熱

作痛大黃末醋調塗之燥即易不過

乳癰腫毒 全黃散用川大黃粉草各一兩為末好

先以溫酒服一大匙明日大風癩瘡 大黃煨一兩

取下惡物 婦人經驗方 如亂髮之蟲取盡乃服雄

為末每服方寸七空心溫酒下取出惡毒物如魚

腦狀未下再服即取下如亂髮之蟲取盡乃服雄

造散 十便良方 天再

葉氣味酸寒無毒 主治置薦下辟風蟲 相感

商陸 本經 下品

呼 本經時珍曰 此物能逐蕩水氣故曰遂葛訛為

道葉葉相當故曰當陸或

云多當陸路而生也

集解 別錄曰 商陸生咸陽川谷如人形者有神恭

甚有毒保昇曰 所在有之葉大如牛舌而厚脆赤

花者根赤白花者根白二月八月采根日乾頌曰

俗名章柳根多生於人家園圃中春生苗高三四

尺青葉如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫

花作朶根如蘿蔔而長八九月采之爾雅謂之遂

葛廣雅謂之馬尾易經謂之莧陸 教曰 一種赤昌

苗葉絕相類不可服之有傷筋骨消腎之毒惟花

自年多者仙人采之作脯可下酒也 時珍曰 商陸

昔人亦種之為蔬取白根及紫色者擘破作畦栽

之亦可種子根苗莖並可洗蒸食或用灰汁煮過

亦良服丹砂乳石人食之元利其赤與黃色者有

毒不可食按 周憲王救荒本草云章柳幹粗似

雞冠花幹微有線楞

色微紫赤極易生植

根修治 教曰 取花白者根銅刀刮去皮薄切以東

流水浸兩宿漉出菜餹蒸以黑豆葉一重

本草綱目章部 卷十七上

商陸一重如此蒸之從午至亥取出  
去豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

**氣味**辛平有毒

別錄曰酸權曰甘有大毒忌犬肉  
大明曰白者苦冷得大蒜良赤者

有毒能伏礪砂砒石雌黃  
撥錫恭曰赤者但可貼  
腫服之傷人痢血不已殺  
人令人見鬼神張仲景  
目商陸以水服殺人果曰  
商陸有毒陽中之  
陰其味酸辛其形類人其  
用療水其效如神**主治**

水腫疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物本經療胸中邪氣

水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散水氣別錄瀉十種水

病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良甄權通大小腸瀉

蠱毒墮胎熒腫毒傳惡瘡

大明

**發明**弘景曰方家不甚用惟療水腫切生根雜鯉  
魚煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能

去尸蠱見鬼神其實子亦入神藥  
花名蓼花尤良  
頌曰古方術家多用之亦可單服  
五月五日采根

竹筴盛掛屋東北角陰乾  
百日搗篩并華水調服  
云神仙所祕法也時珍曰商陸苦寒  
沉也降也陰

也其性下行專於行水與大戟甘遂  
蓋異性而同  
功胃氣虛弱者不可用方家治腫滿  
小便不利者

以赤根搗爛入射香三分干臍心以  
帛束之得  
小便利即腫消又治濕水以指畫肉  
上隨散不成

文者用白商陸香附子炒乾出火毒  
以酒浸一夜  
日乾為末每服三錢米飲下或以大  
蒜同商陸煮

汁服亦可其莖葉作蔬食亦治腫疾  
嘉謨曰古讚  
云其味酸辛其形類人療水即腫其  
效如神斯言

盡之矣

**附方**

舊九  
新六**濕氣脚軟**樟柳根切小豆大煮熟更以  
綠豆同煮為飯每日食之以

瘡為度最効  
斗門方**水氣腫滿**外臺祕要用白商陸根去  
皮切如豆大一大盞以水

二升煮一升更以粒米一大盞同煮成粥每日空心服之取微利不得雜食○千金髓用白商陸六

兩取汁半合和酒半升看人與服當利下水取効○梅師方用白商陸一升羊肉六兩水一斗煮取

六升去滓和葱腹中暴癥有物如石痛刺啼呼不鼓作臛食之治百日死多取商陸根

搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆瘰癧如石在脇即易晝夜勿息孫真人千金方

下堅硬生商陸根汁一升杏仁一兩浸去皮搗如泥以商陸汁絞杏泥火煎如錫膏服棗許空腹熱

酒服以利下惡物產後腹大散用樟柳根三兩大為度聖惠方

戟一兩半甘遂炒一兩為末每服二三錢熱湯調下大便宜利為度此乃主水聖藥也潔古保命集

五尸注痛腹痛脹急不得喘息上攻心胸旁攻兩脇痛或礫塊涌起用商陸根熬以囊盛

更互熨之取小兒痘毒小兒將痘發熱失表忽作効肘后方

由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根和葱白搗傅臍上斑止痘出方免無虞摘玄方

耳卒熱腫生商陸削尖納入喉卒攻痛商陸切根日再易聖濟錄

熨之冷即易立瘰癧喉痺攻痛生商陸根搗作餅愈圖經本草

三四壯良○一切毒腫再易之孫真人千金方外臺秘要

石癰如石堅硬不作膿者生商陸根搗擦之燥即易取軟為度亦治濕漏諸癰張文仲

方瘡傷水毒章陸根搗炙布裏熨之千金方冷即易之

葛花主治人心昏塞多忘喜卧取花陰乾百日搗

末日暮水服方寸七乃卧思念所欲事即於眠中

醒悟也蘇頌

狼毒

本經下品

釋名

時珍曰觀其名知其毒矣

集解

別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采根陰乾陳而沉水者良弘景曰宕昌亦出之乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故為難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根但置水中沉者是狼毒浮者是防葵俗用亦稀為療腹內要藥耳恭曰今出秦州成州秦亭原在二州之界秦隴地寒元無蝮蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢中亦不聞有陶說謬矣志曰狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為力劣秦亭在隴西奉高是太山下縣陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實得水皆沉狼毒春夏采者輕虛得水皆浮且二物全別不可比類此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸為六陳也保昇曰根

似玄參惟虛浮者為劣也頌曰今陝西州郡及遼石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼毒出秦晉地今人往往以草蘭茹為之誤矣見蘭茹下也

根氣味

辛平有大毒

大明曰苦辛有毒之才曰大豆為之使宜醋炒惡麥句薑

畏占斯蜜 陀僧也

主治欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣

惡瘡鼠瘦疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸

本經

除胸下

積僻

別錄

治痰飲癥瘕亦殺鼠

大明

合野葛納耳中治

聾

抱朴子

附方

舊四新六

心腹連痛

作脹用狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸梧子大一服

九二日二九三日三九止又從一丸起至二九止以瘥為度肘后方

九種心痛

蟲



二蛙三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證

九痛丸用狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩附子泡去皮三兩為末煉

蜜丸梧子大每空服溫酒下一丸和劑局方腹中冷痛水穀陰結心下

按之鳴轉逆害飲食用狼毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗末蜜丸梧子大每服三九食前白湯下

日三服○陰疝欲死丸縮入腹急痛欲死狼毒四肘后方

蜜丸梧子大每服三九日兩脇氣結方同腹中一夜三度白湯下肘后方

切蟲病川狼毒杵末每服一錢用錫一皂子大沙糖少許以水化開卧時空腹服之次早即

下蟲也○乾濕蟲疥狼毒不拘多少搗爛以猪油集効方

蒙頭恐藥氣傷面此維揚潘積年疥癩狼毒一兩氏所傳方蘭氏經驗方

一牛炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化為末同以清油浸藥高一寸三

日行藥沉油清遇夜不見燈火蘸油塗瘡上仍以口鼻於藥盞上吸氣取効永類方積年

乾癬生疥搔之黃水出每逢陰雨即惡疾風瘡狼秦茺等分為末每服方寸七聖惠方

溫酒下日一二服千金方

防葵

釋名房苑別錄梨蓋本利茹吳普又名爵離方蓋農

根香味似防風故名防葵

集解別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室

二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月采根恭曰此物亦稀有襄陽望楚

山東及興州西方有之興州者乃勝南者為隣蜀地也頌曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如蔥花景天輩而色白六月開花即結實根似防風香味亦如之依時采者乃沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣時珍曰唐時隴西成州貢之蘇頌所說詳明可據

**正誤**

弘景曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒陳久者亦不能沉矣敬曰凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異効又不能切須審之恐誤人疾其防葵在葵州沙土中生采得二十日便生艸用之惟輕為妙恭曰狼毒與防葵都不同類生處亦別藏器曰二物一是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉為別後人因而用之將以防葵破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別殊為謬誤

**根脩治**

敬曰凡使須揀去艸末用甘草湯浸一宿澆出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土

器中炒至汁盡用

**氣味**辛寒無毒

別錄曰甘苦普曰神農辛寒桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝辛苦無

毒權曰有小毒

**主治**疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆濕

瘖癩癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身

本經療五

臟虛氣小腹支膈臚脹口乾除腎邪強志中火者

不可服令人恍惚見鬼

別錄久服主邪氣驚狂蘇恭主

疰癩氣塊膀胱宿水血氣瘤大如盃者悉能消散

治鬼瘧百邪鬼魅精怪通氣

甄權

發明

時珍曰防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火

者服之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多服令人迷惑恍惚如狂按難經云重陽者狂脫陽者見是是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狠毒功用非防葵也狠毒之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方治蛇瘕鼈瘕大方中多用防葵皆是狠毒也

附方

舊一腫滿洪大防葵研末溫酒服一乃圭至新二傷寒動氣傷寒汗下後臍左

○肘

癩狂邪疾上方同傷寒動氣有動氣防葵散用

防葵一兩木香黃芩柴胡各半兩每服半兩水一盞半煎八分溫服雲岐子保命集

狼牙

本經下品

釋名牙子

本經狠齒別錄狠子別犬牙吳抱牙吳支蘭

李當之弘景曰其牙似獸之齒牙故有諸名

集解

別錄曰狼牙生淮南川谷及宛句八月采根暴乾中濕腐爛生衣者殺人普曰葉青根黃

赤六七月華八月實黑正月八月采根保昇曰所在有之苗似蛇莠而厚大深綠色根黑若獸之牙三月八月采根日乾頌曰今江東汴東州郡多有之時珍曰范子計然云出建康及三輔色白者善根氣味苦寒有毒別錄曰酸普曰神農黃帝苦有莠之才日蕪蕪為之使惡地榆棗肌主治邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔

去白蟲

本經治浮風瘙痒煎汁洗惡瘡殺腹臟一切蟲止赤白痢煎服大

切蟲止赤白痢煎服

大

**附方** 舊六 **金瘡出血** 狼牙草莖葉熟搗 貼之 肘后方 **小便溺血**

金粟狼牙草焙乾入蚌粉炒 槐花百藥煎等分爲 末每服三錢米泔空心調服亦治酒病 衛生易

簡 **寸白諸蟲** 狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不 方 食明旦以漿水下一合服盡卽瘥

外臺 **蟲瘡瘙癢** 六月以前采狼牙葉以後用根生 祕要 吹咀以木葉裹之焙火炮熟於瘡

上熨之冷卽止 **小兒陰瘡** 狼牙草濃煮汁 婦人陰 楊炎南行方 洗之 千金方

**瘙** 狼牙二兩蛇牀子三兩 婦人陰蝕 瘡爛者狼牙 煎水熱洗 外臺祕要 湯用狼牙三

兩水四升煮取半升以筋纏綿浸湯 **聾耳出汁** 狼 瀝洗日四五遍 張仲景金匱玉函

研末綿裹日塞 **毒蛇傷螫** 獨莖狼子根或葉搗爛 之 聖惠方 臘猪脂和塗立瘥 崔

氏 **射工中人** 有瘡狼牙冬取根夏取葉搗汁 千金方 飲四五合并傳之

**藺茹** 本經 下品

**釋名** 離婁 別錄 **掘掘** 音結 **白者名草藺茹** 時珍曰藺 茹本作藺

藺其根牽引之貌掘掘當作拮据 詩云予手拮据手口共作之狀也

**集解** 別錄曰藺茹生代郡川谷五月采根陰乾黑 頭者良 普曰草高四五尺葉圓黃四四相當

四月華五月實黑根黃有汁亦黃色三月采葉四 月五月采根弘景曰今第一出高麗色黃初斷時

汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草藺茹色 白皆燒鐵鑿頭令黑以當漆非真也 頌曰今河陽

淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根 如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月

開淺紅花亦淡黃色不着子陶隱居謂出高麗者 此近之又有一種草藺茹色白古方兩用之故姚

僧坦治癰疽生惡肉有白藺茹散傳之看肉盡便 停止但傳諸膏藥若不生肉又傳黃芪散惡肉仍

不盡者可以漆頭赤皮蔞茹為散半錢和白蔞茹  
散三錢和傅之觀此則赤白皆可用也時珍曰范  
子計然云蘆茹出武都黃色者善草蔞茹出建康  
白色今亦處處有之生山原中春初生苗高二三  
尺根長大如蘿蔔蔓菁壯或有岐出者皮黃赤肉  
白色破之有黃漿汁莖葉如大戟而葉長微闊不  
甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對團而出尖葉  
中出莖莖中分二三小枝二三月開細紫花結實  
如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續  
隨子之狀今人往往皆呼其根為狼毒誤矣狼毒  
葉似商陸大黃  
葷根無漿汁

**根氣味**辛寒有小毒別錄曰酸普曰神農辛岐伯

日甘草為之**主治**蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿

使惡門冬經本去熱痺破癥瘕除

**息肉**別錄

**發明**宗奭曰治馬疥尤善服食方用至少時珍曰

素問治婦人血枯痛用烏鰂骨蘆茹二物丸  
服方見烏鰂魚下王冰言蘆茹取其散惡血又齊  
書云郡王子隆年二十身體過充徐嗣伯合蘆茹  
丸服之自消則蘆茹亦可服食但要斟酌爾孟詵  
必効方治甲疽生于脚趾邊腫爛用蔞茹三兩黃  
芪二兩苦酒浸一宿以猪脂五合合煎取膏三合  
日三塗之即消又聖惠方治頭風旋眩鴟頭丸中  
亦用之

**附方**舊二緩疽腫痛蔞茹一兩為散溫水傷寒咽

痛毒攻作腫真蔞茹瓜甲大納口嚼汁中焦熱痞

善忘不禁蔞茹二分甘草炙二兩消石為末每  
服一錢雞鳴時溫酒下以知為度聖惠方疥

瘡瘙癢 藺茹末入輕粉香油 調傳之 多能鄙事

大戟 本經 下品

釋名 卽鉅 爾雅 下馬仙 綱目 時珍曰 其根辛苦戟人 咽喉故名今俚人呼為下馬

仙言利人甚速也 郭璞注 爾雅云 蒿卽鉅卽大戟也

集解 別錄曰 大戟生常山十二月采根陰乾保昇 日苗似甘遂而高大葉有白汁花黃根似細

苦參皮黃肉黃白五月采苗二月八月采根用頌 日近道多有之春生紅芽漸長叢高一尺以來葉

似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏 花又似蕪荑根似細苦參秋冬采根陰乾淮甸出

者莖圓高三四尺葉黃莖至心亦如百合苗江南 生者葉似芍藥時珍曰 大戟生平澤甚多直莖高

二三尺中空折之有白漿葉長狹如柳葉而不團 其稍葉密攢而上杭州紫大戟為上江南土大戟

次之北方綿大戟色白其根皮柔韌如綿甚 峻利能傷人弱者服之或至吐血不可不知

根修治 敦日 凡使勿用附生者誤服令人洩氣不 禁卽煎薺芫湯解之采得後于槐砧上細

剉與海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉曬乾用時珍 日凡采得以漿水煮軟去骨曬乾用海芋葉麻而

有毒恐不 可用也

氣味 苦寒有小毒 別錄曰 甘大寒 權曰 苦辛有大 毒 元素曰 苦甘辛陰中微陽瀉

肺損真氣 時珍曰 得棗卽不損脾之才日 反甘草 用苜蓿解之 恭日 畏苜蓿蘆葦鼠屎 大明日 赤小

豆為之使 惡薯蕷 主治 蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風

皮膚疼痛吐逆 本經 頸腋癰腫頭痛發汗利大小便

別錄 瀉毒藥泄天行黃病温瘧破癥結 大明 下惡血癖

塊腹內雷鳴通月水墮胎孕甄權治隱癰風及風毒

脚腫並煮水日日熱淋取愈蘇頌

**發明**也成無已曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主

者苦燥除之也時珍曰痰涎之為物隨氣升降無

處不到入于心則迷竅而成癩癰妄言妄見入于

肺則塞竅而成茲唾稠粘喘急背冷入于肝則留

伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻

痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱

痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此

乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝滯

而為痰為飲為涎為涕為癰大戟能泄臟腑之水

濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外

之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎為

真水有補無瀉而復云痘瘡變黑歸腎一證用百

祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其腑則臟自不實

愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其

腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑

正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦

瀉浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治嗽而

蘇頌

甄權

治隱癰風及風毒

蘇頌

成無已曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主

時珍曰痰涎之為物隨氣升降無

處不到入于心則迷竅而成癩癰妄言妄見入于

肺則塞竅而成茲唾稠粘喘急背冷入于肝則留

伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻

痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱

痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此

乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝滯

而為痰為飲為涎為涕為癰大戟能泄臟腑之水

濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外

之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎為

真水有補無瀉而復云痘瘡變黑歸腎一證用百

祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其腑則臟自不實

愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其

腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑

正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦

瀉浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治嗽而

脚腫並煮水日日熱淋取愈

也

成無已曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主

者苦燥除之也時珍曰痰涎之為物隨氣升降無

處不到入于心則迷竅而成癩癰妄言妄見入于

肺則塞竅而成茲唾稠粘喘急背冷入于肝則留

伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻

痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱

痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此

乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝滯

而為痰為飲為涎為涕為癰大戟能泄臟腑之水

濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外

之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎為

真水有補無瀉而復云痘瘡變黑歸腎一證用百

祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其腑則臟自不實

愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其

腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑

正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦

蘇頌

甄權

成無已曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主

時珍曰痰涎之為物隨氣升降無

處不到入于心則迷竅而成癩癰妄言妄見入于

肺則塞竅而成茲唾稠粘喘急背冷入于肝則留

伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻

痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱

痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此

乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝滯

而為痰為飲為涎為涕為癰大戟能泄臟腑之水

濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外

之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎為

真水有補無瀉而復云痘瘡變黑歸腎一證用百

祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其腑則臟自不實

愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其

腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑

正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦

附方

新

一

百祥膏

治嗽而吐青綠水又治痘瘡歸腎紫黑乾隔不發寒者宜下之

毒邪

不黑者慎勿下紅芽大戟不拘多少陰乾漿水煮極軟去骨日乾復納原汁盡焙為末水丸粟米大每服一二九研赤脂麻湯下○繫古活法機要棗變百祥丸治痘瘡變黑大便閉結用大戟一兩棗三枚水一盞同煮暴乾去大戟以控涎丹治痰棗肉焙丸服從少至多以利為度在胸膈上下變為諸病或頸項胸背腰脇手足勝似乎癰瘰不可忍筋骨牽引釣痛走易及皮膚麻痺頭痛不可舉或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心竅並宜此藥數服痰涎自失諸疾尋愈紫大戟白甘遂白芥子微炒各一兩為末薑汁打麩糊丸梧子大每服七九或二十九以津液嚥水腫喘急下若取利則服五六十九二因方水腫喘急便瀉及水蠱大戟炒二兩乾薑剋半兩為散每服三錢薑湯下大小便利為度聖濟總錄水病腫滿水不同年月淺深大戟當歸橘皮各一兩切以水一升煮取七合頓服利下水二三升勿怪

至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作此方出張尚客李絳兵部手集水氣腫

脹大戟一兩廣木香半兩為末五更酒服一錢半取下碧水後以粥補之忌鹹物○簡便方用大

戟燒存性研末每水腫腹大如鼓或遍身浮腫用戟空心酒服一錢七棗一斗入鍋內以水

浸過用大戟根苗蓋之瓦盆合定煮熟取棗無時食之棗盡決愈○又大戟散用大戟白牽牛木香

等分為末每服一錢以猪腰子一對批開慘末在內濕紙煨熟空心食之左則塌左右則塌右張

繫古活牙齒搖痛大戟咬於痛處中風發熱大戟法機要良生生編苦參

四兩白醉漿一斗煮熟洗之寒乃止千金方

澤漆本經下品

釋名漆莖本經貓兒眼睛草綱目綠葉綠花草綱目五鳳



草弘景曰是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦醫人○餘見下

**集解**別錄曰澤漆大戟苗也生太山川澤三月三

花也川澤中有莖梗小花黃色葉似嫩菜五月采之頌曰今冀州郟州明州及近道皆有之時珍曰

別錄陶氏皆言澤漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食然大戟苗洩人不可為菜今攷土

宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多

有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉如苜蓿葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名貓兒眼莖

頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉

綠花草福菴有白汁粘人其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結

草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟苗也今方家用治水蠱脚氣有效尤與神農本文相合自

漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

莖葉氣味苦微寒無毒別錄曰辛大明曰冷有小毒之才曰小豆為之使惡

黃 **主治**皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰

氣不足本經利大小腸明目輕身別錄主蠱毒蘇恭止瘡

疾消痰退熱大明

**發明**時珍曰澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁遂誤以為大戟然大戟根苗皆有毒洩

人而澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食而利丈夫陰氣盛不相侔也

**附方**舊二肺欬上氣脈沉者澤漆湯主之澤漆二斤以東流水五斗煮取一斗

五升去滓入半夏半升紫參白前生薑各五兩廿草黃芩人參桂心各三兩煎取五升每服五合日

三服 張仲景 心下伏瘕 大如盃不得食者澤漆

金匱要畧方 搗篩蜜丸梧子大每服二十腫水氣 澤漆十斤夏

九月三服 葛洪肘後方 入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀餈

入瓶內收每日空心溫酒調下一匙以愈為度 聖惠 水氣蠱病 生鮮貓眼睛草晒乾為末棗肉丸

方 服覺腹中暖小便利 腳氣赤腫 行步脚痛貓兒眼

為度 乾坤秘韞 牙齒疼痛 貓兒眼晴

等分每服一兩水五碗煎三 爛湯泡取汁含漱吐 男婦瘰癧 貓兒眼晴草一搗研

涎 衛生易簡方 五日午時鍋內熬至一桶去滓澄清再熬至一碗

旌收每以椒葱槐枝煎湯洗瘡淨乃搽此膏數次 愈 便民 癩瘡有蟲 貓兒眼晴草晒乾為末香油

### 甘遂

木經 下品

釋名 甘藁 別錄 陵藁 吳 陵澤 別錄 甘澤 吳 重澤 別錄 苦澤

吳 白澤 吳 主田 別錄 鬼 醜 吳 普 時珍 曰 諸

集解 別錄 曰 八月采 弘景 曰 中山在代郡第一本出太

山江東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮

者都下亦有名草甘遂殊惡蓋贗偽者也 恭 曰 甘

遂苗似澤漆其根皮赤肉白作連珠寶重者良草

甘遂乃是蚤休療體全別苗亦不同俗名重臺葉

似鬼臼菟麻根皮白色大明 曰 西京者上津滄吳

者次之形似和皮甘草節 頌 曰 今陝西江東亦有

之苗似澤漆莖短小而葉有汁 根皮赤肉白作連珠大如指頭

根修治 數 曰 凡采得去莖於槐砧上細剉用生甘

草湯薺芫自然汁二味攪浸三日其水如

黑汁乃漉出用東流水淘六七次令水清為度漉出于土器中熬脆用之時珍曰今人多以麩煨熟用以去其毒

**氣味苦寒有毒**

別錄曰甘大寒普曰神農桐君苦有毒岐伯雷公甘有毒元素曰純

陽也之才曰瓜蒂為之使惡遠志反甘草

**主治大腹疝瘕腹滿面目浮**

腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道

本經下五水散

膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿

別錄能瀉十二種水疾

去痰水

甄權瀉腎經及隧道水濕脚氣陰囊腫墜痰

迷癩癩疔膈痞塞

時珍

**發明**

宗奭曰此藥專于行水攻決為用元素曰味苦氣寒苦性泄寒勝熱並達水氣所結之處

乃泄水之聖藥水結胸中非此不能除故仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用時珍曰腎主水凝則為痰飲溢則為腫脹甘遂能泄腎經濕氣治痰之本也不可過服但中病則止可也張仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也劉河間係命集云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹達臍令滿內服甘草水其腫便去又王璆百一選方云脚氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末水調傳腫處即濃煎甘草汁服其腫即散二物相反而感應如此清流韓詠病脚疾用此一服病去七八再服而愈也

**附方**

舊三新**水腫腹滿**甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半為末水煎時時呷

濟方

**膜外水氣**甘遂末大麥麩各半兩水和作餅燒熟食之取利聖濟總錄

**身面洪腫**

甘遂二錢生研為末以獾猪腎一枚分為七瓣入末在內濕紙包煨令熟食之

日一服至四五服當覺腹鳴腎水流注腿膝攣急

小便便利是其効也肘后方腎水流注四肢腫痛

即上方加木香四錢每用二錢煨熟溫酒正水脹

嚙下當利黃木為驗御藥院方傳小兒疳水

急大小不利欲死甘草五錢半生半炒胭脂坏子

水煮令浮淡食之大小便便利後用平胃散加熟附子每以二錢煎服普濟方

珠子甘遂炒青橘皮等分為末三歲用一錢以麥芽湯下以利為度忌酸鹹三五日名木寶散

總徵水蠱喘脹甘遂大戟各一兩慢火炙研每服

論水腫喘急一字水半盞煎三五沸服不過十

服聖水腫喘急大小便不通十棗丸用甘遂大

濟錄梧子大每服四十九侵晨熱湯下利去妊娠腫滿

黃水為度否則次午再服三因方心下留飲滿

氣急少腹滿大小便不利已服猪苓散不瘥者用太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服

五十九丸得微下仍服猪苓散小品方心下留飲滿

服之猪苓散見猪苓下張仲景金匱玉函脚氣

脈伏其人欲自利反快甘遂半夏湯用甘遂大者三枚半夏十二個以水一升煮半升去滓入芍藥

五枚甘草一節水二升煮半升去滓以蜜半升同煎八合頓服取利脚氣

腫痛腎臟風氣攻注下部瘡痒甘遂半兩木鼈子

四錢摻在內濕紙包煨熟空心食之米飲下服後便伸兩足大便行後吃白粥二三日為妙本事

方二便不通甘遂末以生麴調傳臍中及丹田

太山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻小便轉脬甘遂

分作四服日一服取利聖惠方小便轉脬甘遂

錢猪苓湯調下立疝氣偏腫甘遂苗香等分為末

通筆峰雜興方疝氣偏腫酒服二錢儒門事

親婦人血結婦人少腹滿如敦狀小便微難而不

渴此為水與血俱結在血室大黃二

三四

兩甘遂阿膠各一兩水一升半煮  
半升頓服其血當下  
張仲景方  
膈氣哽噎

五錢南木香一錢為末壯者一錢  
弱者五分水酒調下  
怪病奇方  
痞證發熱

疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩  
以細糠火炒黃  
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水  
卧時服忌油膩

魚肉  
普濟方  
消渴引飲  
蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二

丸忌甘草  
楊氏家藏方  
癩癩心風  
及婦人心風血邪用甘遂

二錢為末以猪心取三管血和藥  
入猪心內縛定  
紙裹煨熟取末入辰砂末一錢  
分作四丸每服一

丸將心煎湯調下大便下惡  
馬脾風病  
小兒風熱

物為効不下再服  
濟生方  
不安謂之馬脾風  
甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

二錢半輕粉一角為末每服一字  
漿水少許滴油  
一小點抄藥在上沉下去漿  
麻木疼痛

灌之名無價散  
全幼心鑑  
耳卒聾閉  
寸綿裹

蓖麻子仁四兩樟腦一兩搗作  
餅貼之內飲甘草湯  
摘玄方  
耳卒聾閉

耳卒自然通也  
永類方  
續隨子  
宋開

釋名  
千金子  
開千兩金  
華菩薩豆  
華拒冬  
寶聯步

頌曰  
葉中出葉數數相續而生  
故名冬月始長故又名拒冬

集解  
志曰  
續隨子生蜀部處處亦有之  
苗如大戟

一莖莖端生葉葉中復出葉花亦類  
大戟初生  
抽幹而生實青有殼人家園亭中  
多種以為飾秋

種冬長春秀秋實  
時珍曰  
莖中亦有白汁可結水銀

修治  
時珍曰  
凡用去殼取色白  
者以紙包壓去油取霜用

氣味辛溫有毒主治婦人血結月閉瘀血癥瘕

癖除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡

滯物開寶積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎

酒服不過三顆當下惡物蜀本宜一切宿滯治肺氣

水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥喫即止

又塗疥癬瘡明大

發明頌日續隨下水最速然有毒損人不可過多

療亦相似其功皆長于利水惟在用之得法亦皆要藥也

附方舊二小便不通新四臍腹脹痛不可忍諸藥不効者不過再服用續隨子去皮

一兩鈔丹半兩同少蜜搗作團辨盛埋陰處臘月

至春末取出研蜜丸梧子大每服二三十九丸木通

湯下化破尤妙病急水氣腫脹歷去油重研分作

亦可旋合聖濟錄水氣腫脹歷去油重研分作

七服每治一人用一服丈夫生餅子酒下婦人荆

芥湯五更服之當下利至曉自止後以厚朴湯補

之頻弊益善忌鹽醋一百日乃不陽水腫脹續隨

復作聯步即續隨子也斗門方陽水腫脹續隨

去油二兩黃一兩為末酒水丸綠豆大凝積癥

塊續隨子三十枚膩粉二錢青黛炒一錢研勻糯

熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後蛇咬腫悶欲死

取積聚惡物為効聖濟錄蛇咬腫悶用重

臺六分續隨子仁七粒搗篩為散酒服方寸七黑

兼唾和少許塗咬處立効崔元亮海上方

子疣贅續隨子熟時塗之

自落普濟方

本草綱目卷十七

葉及莖中白汁主治剝人面皮去黥黥寶開傳白癩

癰瘍大搗葉傳蠍螫立止時珍

莨菪音浪蕩本經下品

釋名天仙子圖橫唐本行唐時珍曰莨菪一作藺

狼放宕故名

集解別錄曰莨菪子生海濱川谷及雍州五月采子弘景曰今處處有之子形頗似五味核而

極小保昇曰所在皆有之葉似菘藍莖葉皆有細毛花白色子殼作罌狀結實扁細若粟米大青黃

色六月七月采子日乾頌曰處處有之苗莖高三三尺葉似地黃王不留行紅藍等而潤如三指闊

月開花紫色莖莢有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白色如粟米粒敷曰

凡使勿用蒼莨子其形相似只是微赤服之無効時人多以雜之時珍曰張仲景金匱要畧言菜中

有水莨菪葉圓而光有毒誤食令人狂亂狀如中風或吐血以甘草汁解之

子修治敷曰修事莨菪子十兩以頭醋一鎰煮乾黑卽是真者度却用黃牛乳汁浸一宿至明日乳汁

曬乾搗篩用

氣味苦寒無毒別錄曰甘權曰苦辛微熱有大毒藏器曰性溫不寒大明曰溫有毒

服之熱發以綠豆汁甘草升麻犀角並解之敷曰有大毒誤服之衝人心大煩悶眼生暹火頌曰本

經言性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云溺川于美人懷子不乳飲以浪藥一撮以酒飲旋乳

且不乳豈熱藥所治又古方主卒主治齒痛出蟲顛狂亦多單用莨菪豈果性寒耶

肉痺拘急久服輕身使人健行走及奔馬強志益

力通神見鬼多食令人狂走本經療癩狂風癩顛倒

拘攣別錄安心定志聰明耳目除邪逐風變白主疰

癰取子洗晒隔日空腹水下一指捻亦可小便浸

令泣盡暴乾如上服勿令子破破則令人發狂藏器

炒焦研末治下部脫肛止冷痢主蛙牙痛咬之蟲

出甄權燒熏蟲牙及洗陰汗大明

發明弘景日入療顛狂方用然不可過劑久服自

日以石灰清煮一伏時掬出去芽暴乾以附子乾

薑陳橘皮桂心厚朴為丸服去一切冷氣積年氣

口莨菪之功未見如所說而其毒有甚焉時珍

日而芽方生其為物可知矣莨菪雲實防葵赤商

陸皆能令人狂惑見鬼者昔人未有發其義者蓋

此類皆有毒能使痰迷心竅蔽其神明以亂其視

聽故耳唐安祿山誘奚契丹飲以莨菪酒醉而坑

之又嘉靖四十三年二月陝西遊僧武如香挾妖

術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全

家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其

奸汚復將魔法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆

是妖鬼盡行殺死凡一十六人並無血迹官司執

柱囚之十餘日柱吐痰二梳許問其故乃知所殺

者皆其父母兄嫂妻子姊姪也柱與如香皆論死

世宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是莨菪之流

爾方其痰迷之時視人皆

鬼矣解之之法可不知乎

附方舊二十新卒發顛狂莨菪三升為末以酒一升

如小豆三九日三服當見面急頭中如有蟲行額

及手足有赤豆處如此並是瘥候也未知再服取



盡神良 陳風痺厥痛 天仙子三錢炒大草烏頭  
延之小品方 未糊丸梧子大以螺青為衣每服十九丸男  
子昔蒲酒下女子芫花湯下 聖濟錄 久嗽不

止 有濃血 莨菪子五錢淘去浮者煮令芽出炒研  
真酥一雞子大大棗七枚同煎令酥盡取棗日  
食三枚○又方莨菪子三撮吞之日五六 年久呷

度光祿李丞服之神驗 孟詵必効方 脂塗青紙上撒末于上卷作筒燒烟熏吸之  
嗽 至三十年者莨菪子木香熏黃等分為末以羊

崔行功 水腫蠱脹 方見獸部 積冷疝瘕 不思飲食  
纂要方 麝羊下 藜子三分水淘去浮者大麥四十九個水三升煮

乾只取棗去皮核每空心食一個米飲下覺熱即  
止 聖濟錄 水瀉日久 填滿札定燒存性每粟米飲服

一錢 聖惠方 冷疝痢下 莨菪子為末臘猪脂和丸綿裹  
聖惠方 棗許導下部因痢出更納新者

不過三度瘥 ○ 赤白下痢 腹痛腸滑後重 大黃煨  
孟詵必効方 為末每服一錢米 久痢不止 變種種痢兼脫肛 莨

飲下 普濟方 淘去浮者煮令芽出晒乾炒黃黑色青州棗一升  
去皮核醞醋二升同煮搗膏丸梧子大每服二十

丸食前米飲 聖惠方 腸風下血 乾搗篩生薑半斤取汁銀  
下 鍋中更以無灰酒二升搜之上火煎如稠餈即旋

投酒度用酒可及五升即止慢火煎令可丸大如  
梧子每旦酒飲通下三九增至五七九止若丸時

粘手則以兔絲粉襯隔之火候忌緊藥焦則失力  
也初服微熱勿怪疾甚者服過三日當 脫肛不收

下利疾去利亦止絕有効 篋中方 脫肛不收  
莨菪子炒研傅 風牙蟲牙 撮入小口瓶內燒烟竹

筒引烟入蟲孔內熏之即死永不發○普濟方用  
莨菪子入瓶內以熱湯淋下口含瓶口令氣熏之

本草綱目卷之七

卷之七

三

三

三

三

冷更作盡三合乃止有涎津可去甚効○備牙齒

宣落風痛 荇子數納孔中以蠟封之亦効

腫水服荇子末 兩錢 乳癰堅硬新荇子 半匙

不得嚼破外臺秘要 石癰堅硬不作濃者 荇子為末醋

金惡瘡似癩十年不愈者 荇子打撲折傷羊脂

若子末傳之 惡犬咬傷荇子七枚 吞之

根氣味苦辛有毒主治 邪瘧疥癬殺蟲時珍

附方新 瘧疾不止荇子根 燒灰水服一合 惡癬有

蟲荇子根 搗爛蜜和 趾間肉刺荇子根 搗汁塗之

云脚生肉刺視繫 荇根和鹽 搗傳

根謂繫于視帶上也 狂犬咬人荇子根 和鹽搗傳

要惡刺傷人荇子根 水煮汁浸之冷 箭頭不出萬

神應丹端午前一日 不語尋見荇子科 根本枝葉

花實全好者道云 先生你却在這裏道罷 用柴灰

自東南起圍了 以木柙子掘取 根下周迴土 次日

日未出時依前 不語用鏤頭 取出洗淨勿令 雞犬

婦人見于淨室中以石 日搗如泥丸 彈子大 黃丹

為衣以紙袋封懸高處陰乾 遇有箭頭不出者先

以象牙末貼瘡 口後用緋帛 袋盛此藥放臍 中

雲實本經 上品

釋名員實別錄 雲英別錄 天豆吳普 馬豆圖經 羊石子圖經 苗

名草雲母唐 臭草圖經 粘刺綱目 時珍日 負亦音 雲

本草綱目卷之二十一 二二

羊石當作羊矢  
其子肖之故也

**集解** 別錄曰雲實生河間川谷十月采暴乾普曰

月花八月九月實十月采弘景曰處處有之子細

如葶藶子而小黑其實亦類葶藶燒之致鬼未見

其法術恭曰雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆

故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如苜

蓿枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葶藶者非

也保昇曰所在平澤有之葉似細槐花黃白色其

莢如豆其實青黃色大若麻子五月六月采實頌

曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石

子草實名馬豆三月四月采苗十月采實過時即

枯落也時珍曰此草山原甚多俗名枯刺赤莖中

亦有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纍然滿

枝莢長三寸許狀如肥皂莢內有子五六粒正如

鵲豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚

殼白仁咬之極堅重有腥氣

**實修治** 教曰凡采得粗搗相對渾

**氣味**辛溫無毒別錄曰苦普曰神農辛

腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱本消渴

別錄治瘧多用頌主下巖膿血時珍

**附方** 新一 蠶下不止 雲實女萎各一兩桂半兩川烏

五九水下日三 服 肘后方

**花** 主治見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明

本殺精物下水燒之致鬼別錄

**發明** 時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂

豈有久服輕身之理此古書之訛也

本草綱目卷之十一  
根**主治**骨哽及咽喉痛研汁嚥之時珍

蓖麻 唐本草

**釋名** 頌曰葉似大麻子形宛如牛蟬故名時珍曰蓖亦作蠅蠅牛虱也其子有麻點故名蓖麻

**集解** 恭曰此人間所種者葉似大麻葉而甚大結子如牛蟬今胡中來者莖赤高丈餘子大如

皂莢核用之亦良保昇曰今在處有之夏生苗葉似葎草而大厚莖赤有節如甘蔗高丈餘秋生細

花隨便結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采莖葉秋采實冬采根日乾用時珍曰其莖有赤有

白中空其葉大如瓠葉每葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗纒纒黃色每枝結實數十顆上有刺攢

族如蠅毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀如已豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蠅再

去斑殼中有仁嬌白如續隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

**子修治** 教曰凡使勿用黑天赤利子緣在地蔞上斑凡使以鹽湯煮半日去皮取子研用時珍曰取

蓖麻油法用蓖麻仁五升搗爛以水一斗煮之有沫撇起待沫盡乃止去水以沫煎至點燈不泮滴水不散為度

**氣味**甘辛平有小毒時珍曰凡服蓖麻者一主不得食炒豆犯之必脹死其油

能伏丹砂粉霜**主治**水癥以水研二十枚服之吐惡沫加

至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體

瘡痒浮腫尸疰惡氣榨取油塗之唐本研傅瘡癩疥

癩塗手足心催生大明治癩癧取子炒熟去皮每卧

時嚼服二三枚漸加至十數枚有效宗奭主偏風不

本直綱目卷之十一  
三二

遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺齧喘  
脚氣毒腫丹瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下

子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔

毒時珍

發明

震亨曰蓖麻屬陰其性善收能追膿取毒亦  
外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞衣  
剝骨膠血者用之時珍曰蓖麻仁甘辛有毒熱氣  
味類近巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開  
通諸竅經絡故能治偏風失音口噤口日喎斜頭  
風七竅諸病不止于出有形之物而已蓋鵝鵝油  
能引藥氣入內蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多  
用之一人病偏風手足不舉時珍用此油同羊脂  
麝香鯨鱉甲等藥煎作摩膏日摩數次一月餘漸  
復兼服搜風化痰養血之劑三月而愈一人病手

臂一塊腫痛亦用蓖麻搗膏貼之一夜而愈一人  
病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗搗太極穴一  
夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜  
而上此藥外用累奏奇勳但內服不可輕率爾或  
言搗膏以筋點于鵞馬六畜舌根下卽不  
能食或點肝內卽下血死其毒可知矣

附方

舊九新半身不遂失音不語取蓖麻子油一  
升酒一斗銅鍋盛油著酒

中一日煮之令熟細口目喎斜蓖麻子仁搗膏左  
細服之外臺秘要貼右右貼左卽正

○婦人良方用蓖麻子仁七七粒研作餅右喎安  
在左手心左喎安在右手心却以銅盂盛熱水坐

藥上冷卽換五六次卽正也○一方用蓖麻子  
仁七七粒巴豆十九粒麝香五分作餅如上用風

氣頭痛

不可忍若乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右  
貼太陽穴解髮出氣甚驗○德生堂方用

蓖麻油紙剪花貼太陽亦効○又方蓖麻仁半兩  
棗肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕卽

止八種頭風

芫麻子剛子各四十九粒去殼雀腦

掛風處陰乾用時先將好末茶調成膏子塗蓋勺

後將灰火燒前藥烟起以蓋覆之待烟盡以百沸

葱湯點盞內茶葉服之後以綿袖珍方鼻塞不通

被暴頭臥汗出避風仁三百

精大棗去皮一枚搗勻綿裹塞之一天柱骨倒

日一易三十日聞香臭也聖濟錄

瘡疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋散

貼之木鼈子六筒去殼芫麻子六十粒去殼研勻

先包頭擦頂上令熱以津

調藥貼之鄭氏小兒方

仁二兩黃連一兩石膏水一盞文武火煮之乾即

添水三日兩夜取出黃連只用芫麻子風乾勿令見

日以竹刀每個切作四段每服二十段食後荆芥

湯下日二服終身忌食豆犯之必腹脹死衛生

寶鑑

舌上出血

芫麻子油紙燃燒烟熏

舌脹塞口

仁四十粒去殼研油塗紙上作燃燒烟熏之末

再熏以愈為度有人舌腫出口外一付人用此法

而愈

急喉痺塞

牙關緊急不通用此即破以

烟熏吸即通或只取油

咽中瘡腫

杜在方用芫麻

一錢同研新汲水服之連進二三服效○三因方

用芫麻仁荆芥穗等分為末蜜九綿包噙燕之

干水氣脹滿

芫麻子仁研水解得三合清旦一頓

止可服五粒

外臺秘要

脚氣作痛

芫麻子七粒去殼研爛同

也

小便不通

芫麻仁三粒研細入紙燃內

咳嗽

芫麻子去殼炒熟揀甜者食之須多服

生下胞

崔元亮海上集驗方取芫麻子七粒去殼

則子腸出卽以此膏塗頂則腸自入也。肘后方云產難取蓖麻子十四枚每手各把七枚須臾立下**子宮脫下**。蓖麻子仁枯礬等分爲末安紙上托也。入仍以蓖麻子仁十四枚研膏塗頂。

心卽入**盤腸生產**。塗頂方。同上。催生下胎。不拘生胎死胎。蓖麻二個。巴豆二個麝香一分研貼臍中并足心。一切毒又下生胎一月一粒溫酒吞下。集簡方。

**腫痛**卽止也。肘后方。**癘風鼻塌**。手指攣曲節漸至斷落用蓖麻子一兩去皮黃連一兩到豆大以小瓶十入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取蓖麻子一枚劈破而東以浸藥水吞之漸加至四五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜

猪肉試之如不發是效也。若發動再服直候不發乃止。小兒丹疔。蓖麻子炒去皮研入麪一匙水調塗之甚効。修真秘旨。

二二三枚取効一生不可。瘰癧惡瘡。及軟癩用白膠。化去滓以蓖麻子六十四個去殼研膏溶膠投之。攪勻入油半匙頭至點水中試軟硬添減膠油得所以緋帛量瘡大小攤貼一膏。

可治三五癩也。儒門事親。肺風面瘡。起白屑。赤瘡用蓖麻子仁四十九粒白果膠棗各三粒瓦。松三錢肥皂一個搗爲丸洗而用之良。吳旻扶。

壽**面上雀斑**。用羊髓和勻夜夜傳之。摘玄方。髮黃不黑。蓖麻子仁香油煎焦去滓。耳卒聾閉。蓖

子一百個去殼與大棗十五枚搗爛入乳小兒乳汗和丸作錠每以綿裹一枚塞之覺耳中熱爲度。一日一易二十湯火灼傷。蓖麻子仁蛤粉等分研

水調塗之。○**鍼刺入肉**。蓖麻子去殼一個先以帛。古今錄驗。○**視傷處**。傅之頻看若見刺。

出即拔去恐藥緊弩出好肉或加竹木骨硬莖麻子仁

白梅肉同研尤好衛生易簡方

然不見○又方莖麻油紅麴等分研細沙糖丸皂

子大綿裹合雞魚骨哽莖麻子仁研爛入百藥煎

半九惡犬咬傷莖麻子五十粒去殼以井花研膏

印下神珍方先以鹽水洗吹痛處乃貼此膏

葉氣味有毒主治脚氣風腫不仁蒸搗裹之日二

三易即消又油塗灸熱熨顙上止鼻衄大驗蘇治

痰喘欬嗽時珍附方新駒喘痰嗽儒門事親方用九尖莖麻葉三錢入飛過白礬二錢以猪肉四

兩薄批抄藥在內荷葉裹之文武火煨熟細嚼以

白湯送下名九仙散○普濟方治欬嗽涎喘不問

年深日近用經霜莖麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒

各一兩為末蜜丸彈子大每服一丸白湯化下日

一服名無憂丸

附錄博落迴拾遺藏器曰有大毒主惡瘡櫻根癩

和百丈青雞桑灰等分為末傅之蠱毒精魁溪毒瘡瘦

有法生江南山谷莖葉如莖麻莖中空吹之作聲

如博落迴折之有黃汁藥人立死不可輕用入口

常山本經蜀漆同釋名恒山吳普互草本經雞屎草日華鴨屎草日華時珍

也恒山乃北岳名在今定州常山乃郡名亦今真定豈此藥始產于此得名歟蜀漆乃常山苗功用



相同今併為一

**集解** 別錄曰常山生益州川谷及漢中二月八月

中常山苗也五月采葉陰乾弘景曰常山出宜都

建平細實黃者呼為雞骨常山用之最勝蜀漆是

常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名

故是同處爾彼人采得縈結作丸得時燥者佳恭

曰常山生山谷間莖圓有節高者不過三四尺葉

似茗而狹長兩兩相當二月生白花青萼五月結

實青圓三子為房其草暴燥色青白堪用若陰乾

便黑爛鬱壞矣保昇曰今出金州房州梁州中江

縣樹高三四尺根似荆根黃色而破五六月采葉

名蜀漆也李含光曰蜀漆是常山莖八月九月采

之頌曰今汴西淮浙湖南州郡亦有之並如上說

而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色

似山棟子而小今天台山出一種草名土常山苗

葉極甘人用為飲甘味如蜜又名蜜香草性涼益

人非此常山也

**修治** 斆曰采時連根苗收如用莖葉臨時去根以

漆細剉又拌甘草水勻再蒸日乾川其常山凡用

以酒浸一宿漉出日乾蒸搗用時珍曰近時有酒

浸蒸熟或瓦炒熟者亦不甚吐人又有醋制者吐人

**常山氣味苦寒有毒** 別錄曰辛微寒普曰神農岐

寒權曰苦有小毒炳曰得甘草吐瘧之才**主治傷**

日畏玉札大明曰忘葱菜及菘菜伏砒石

**寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆** 木療鬼蠱

**往來水脹洒洒惡寒鼠瘦** 別治諸瘧吐痰涎治項

**下瘤癭** 權

蜀漆氣味辛平有毒別錄曰微溫權曰苦有小毒

之使之才日枯樓主治瘧及欬逆寒熱腹中癥堅為之使惡貫衆

瘕積聚邪氣蠱毒鬼疰木經療胸中邪結氣吐去之

別錄治鬼瘧多時溫瘧寒熱下肥氣甄權破血洗去腥

與苦酸同用導膽邪元素

發明噉口蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病

可多進令人吐逆震亨曰常山性暴悍善驅逐能

傷真氣病人稍近虛怯不可用也外臺乃用三兩

作一服殊昧雷公老人久病切忌之戒時珍曰常

山蜀漆有劫痰截瘧之功須在發散表邪及提出

陽分之後用之得宜神効立見用失其法真氣必

傷夫瘧有六經瘧五臟瘧痰濕食積瘧疫鬼邪諸

瘧須分陰陽虛實不可一槩論也常山蜀漆生用

則上行必吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用亦不致

吐也得甘草則吐得大黃則利得烏梅鯪鯉甲則

入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得

龍骨附子則入腎得草果檳榔則入脾蓋無痰不

作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已楊士瀛直指

方云常山治瘧人皆薄之瘧家多蓄痰涎黃水或

別錄曰微溫權曰苦有小毒

為之使惡貫衆

木經

甄權

元素

噉口

震亨曰

時珍曰

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

楊士瀛

欲發前頓服取吐○肘后方用常山一兩秫米一百粒水六升煮三升分三服先夜未發臨發時服盡○養生主論王隱者驅瘧湯云予用此四十年奇効不能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮晒乾知母貝母草果各一錢半水一鍾半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服

截瘧諸酒 肘后方用常山一兩酒一升漬二三日分作三服平日一服少頃再服臨發又服或加甘草煮服之

○宋俠經心錄醇醕湯治間日瘧支太醫云乃桂廣州方也甚驗恒山一錢二分大黃二錢半炙甘草一錢二分水一盞半煎減半醇發日五更溫服再以水一盞煎減半日醕未發時溫服○虞搏醫學正傳治久瘧不止常山一錢半檳榔一錢丁香五分烏梅一個酒一盞浸一宿五更飲之一服便

止永不 截瘧諸丸 千金方恒山丸治數年不瘥發如神 者兩劑瘥一月以來者一劑

瘥恒山三兩研末雞子白和九梧子大瓦器煮熟殺腥氣則取晒乾收之每服二十丸竹葉湯下五

更一服天明一服發前一服或吐或否即止○肘後丹砂丸恒山搗末三兩真丹一兩研白蜜和杵

百下丸梧子大先發時三九少頃再服三九臨時服三九酒下無不斷者○曾世榮活幼心書黃丹丸治大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦

焙一兩為末糯米粉糊丸梧子大每服三五丸涼酒下隔一夜一服平日一服午後方食○葛洪

肘後方用恒山三兩知母一兩甘草半兩搗末蜜丸梧子大先發時服十九次服七丸後服五六丸以瘥為度○和劑局方瞻仰丸治一切瘧常山四

兩炒存性草果二兩炒存性為末薄糊丸梧子大每卧時冷酒服五十丸五更再服忌鷺羊熱物○

又勝金丸治一切瘧胸膈停痰發不愈者常山入兩酒浸蒸焙檳榔二兩生研末糊丸梧子大如上

法服○集簡方二聖丸治諸瘧不拘遠近大小雞骨恒山雞心檳榔各一兩生研鯪鯉甲煨焦一兩

半為末糯米粉糊丸菜豆大黃丹厥陰肝瘧寒多熱

為衣每服三五丸如上法服

厥陰肝瘧 寒多熱

少喘息

如死狀或少腹滿小便如膿不問久近不吐不泄  
如神恒山一兩醋浸一夜瓦器煮乾每用二錢水  
一盞煎半盞五更冷  
服 趙真人濟急方 **太陰肺瘧** 痰聚胸中病至令  
熱間善驚如有所見恒山三錢甘草半錢秫米三  
十五粒水二鍾煎一鍾發日早分三次服 千金

**少陰腎瘧** 凄凄然寒手足寒腰脊痛大便難目  
眴眴然恒山二錢半豉半兩烏梅一  
錢竹葉一錢半葱白三根水一升 **牝瘧獨寒** 不熱  
半煎一升發前分三服 千金方 **牝瘧獨寒** 者蜀  
漆散用蜀漆雲母煨三日夜龍骨各二錢為末每  
服半錢臨發日且一服發前一服酢漿水調下温  
瘧又加蜀漆一錢 ○ **牡瘧獨熱** 不冷者蜀漆一錢  
張仲景金匱要畧 半甘草一錢麻黃

二錢牡蠣粉二錢水二鍾先煎麻黃蜀漆去沫入  
藥再煎至一鍾未發前温服得吐則止 王燾外  
臺祕 **温瘧熱多** 恒山一錢小麥三錢淡竹葉二  
要 錢水煎五更服甚良 藥性論 三

**十年瘧** 用后方治三一年老瘧及積年久瘧常山  
黃連各一兩酒三升漬一宿以瓦釜煮取  
一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷當利  
無不瘥者 ○ 張文仲備急方用恒山一兩半龍骨  
五錢附子炮二錢半大黃一兩為末雞子黃和丸  
梧子大末發時五九將發時五九白湯下支太醫  
云此方神驗 **瘧瘧寒熱** 劉長春經驗方常山一寸  
無不斷者 草果一枚熱酒一盞浸一  
夜五更望東服之蓋卧酒醒即愈 ○ 談楚翁試驗  
方用常山檳榔甘草各二錢黑豆一百粒水煎服  
之乃彭司寇所傳 ○ 葛稚川用后方用常山黃連  
香豉各一兩附子炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹  
飲服四九欲發時 **妊娠瘧疾** 酒蒸常山石膏煨各  
三九至午後乃食 一錢烏梅炒五分甘  
草四分水一盞酒一盞浸一夜 **百日兒瘧** 水鑑仙  
平日温服 姚僧坦集驗方 人歌曰

瘧是邪風寒熱攻直須術治免成空常山刻作人  
形狀釘在孩兒生氣宮如金生人金生在巳即釘

已上木生人釘亥上火生人小兒驚忤暴驚卒死

釘寅上水土生人釘申上也中惡用蜀

煎炒二錢左顧牡蠣一錢二分漿木胸中痰飲山恒

甘草各一兩水五升煮取一升去滓入蜜阮氏

二合溫服七合取吐不吐更服千金方

**附錄杜莖山** 圖經頌曰葉味苦寒主溫瘴寒熱作

絞汁服吐惡涎甚效生宜用莖高四五尺葉土

作苦蕒菜秋有花冬作實如枸杞子大而白紅山

紅山頌曰葉非微寒無毒主骨節疼痛勞熱瘴瘧

而小無毛秋生白花如粟粒不實福州生者作細

藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭土人取根

米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃為末每服一

錢水一盞生薑一片同煎服亦治勞瘴甚效時珍

曰杜莖山即上恒山土紅山杜莖山之類故並附之

**藜蘆** 本經

**釋名山葱** 別錄葱苒 同葱蒨 音葱葵 音豐蘆 音葱葱

綱目鹿葱 時珍曰黑色曰藜其蘆有黑皮裹之故名

謂之鹿葱 根際似葱俗名葱管藜蘆是矣此大謂之

**集解** 別錄曰藜蘆生太山山谷三月采根陰乾普

下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之保昇曰

所在山谷皆有葉似鬱金花葉荷等根若龍膽

莖下多毛夏生冬凋八月采根頌曰今陝西山南

東西州郡皆有之遼州均州解州者尤佳三月生

苗葉似初出櫻心又似車前莖似葱白青紫色高

溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名葱白  
藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均  
州土俗亦呼為鹿葱范子  
計然云出河東黃白者善

**根修治**

雷曰凡采得去頭用糯米泔  
汁煮之從已至未晒乾用

**氣味辛寒有毒**

別錄曰苦微寒普曰神農雷公辛  
有毒岐伯鹹有毒李當之大寒大

毒扁鵲苦有毒之才曰黃連為之使反細辛芍藥  
人參沙參紫參丹參苦參惡大黃時珍曰畏葱白  
服之吐不止  
飲葱湯即止

**主治**蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥癩惡瘡殺諸蟲

**毒去死肌**

本經

療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛

**瘡不入湯用**

別錄

主上氣去積年膿血泄痢

權

吐上

**膈風涎暗風癩病小兒鰕鮒痰疾**

頌

末治馬疥癬

**宗**

**發明**

頌曰藜蘆服錢七一字則惡吐人又用通頂  
令人噦而別本云治噦逆甚効未詳時珍曰

噦逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不

一常山吐瘧痰瓜丁吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔  
子吐氣痰藜蘆則吐風痰者也按張子和儒門事

親云一婦病風癩自六七年得驚風後每一二年  
一作至五七年五七作三十歲至四十歲則日作

或甚至一日十餘作遂昏痴健忘求死而已值歲  
大饑采百草食于野中見草若葱狀采歸蒸熟飽

食至五更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止約  
一二斗汗出如洗甚昏困三日後遂輕健病去食

進百脈皆和以所食葱訪人乃慙葱苗也即本草  
藜蘆是矣圖經言能吐風病此亦偶得吐法耳我

朝荆和王妃劉氏年七十病中風不省人事牙

關緊閉群醫束手先考太醫吏日月池翁診視藥  
不能入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯  
灌之少頃噫氣一聲遂吐痰而甦調  
理而安藥弗賧眩厥疾弗瘳誠然

**附方** 舊六新 諸風痰飲 藜蘆十分鬱金一分為末  
每以一字溫漿水一盞和

服撰吐 ○ **中風不省** 牙關緊急者藜蘆一兩去苗  
經驗方 頭濃煎防風湯浴過焙乾切

炒微褐色為末每服半錢小兒減半溫水調 **中風**  
灌以吐風涎為効未吐再服 簡要濟眾

**不語** 喉中如曳鋸口中涎沫取藜蘆一分天南星  
一個去浮皮于臍上剉一坑納入陳醋二椀

斗四而火通黃色研為末生麩丸小 **諸風頭痛** 州  
豆大每服三九溫酒下 經驗方

藜蘆一莖日乾研末入麝香少許吹鼻 ○ 又 **久瘧**  
方通頂散藜蘆半兩黃連三分嚼鼻 聖惠

**痰多** 不食欲吐不吐藜蘆末半錢 **痰瘧積瘧** 藜蘆  
溫蘆水調下撰吐 保命集 皂莢

炙各一兩巴豆二十五枚熬黃研末蜜丸小豆大  
每空心服一九未發時一九臨發時又服一九勿

用飲食 **黃疽腫疾** 藜蘆灰中炮為末水服半  
肘後 錢匕小吐不過數服効 **胸中**

**結聚** 如駭駭不去者巴豆半兩去皮心炒擣如泥  
藜蘆炙研一兩蜜和擣丸麻子大每吞一二

丸 ○ **身面黑痣** 藜蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器  
肘後 重湯煮成黑膏以針微刺破點之

**木過三次** **鼻中息肉** 藜蘆三分雄黃一分為末蜜  
効 聖惠 和點之每日三上自消勿點

**兩畔** ○ **牙齒蟲痛** 藜蘆末內入孔中勿 **白禿蟲瘡**  
聖濟方 牙齒蟲痛 藜蘆末內入孔中勿

藜蘆末猪脂調 **頭生蟻虱** 藜蘆末搽 **頭風白屑** 痒  
塗之 肘後方 藜蘆末搽 直指

黎蘆末沐頭搽之緊包二 **反花惡瘡** 惡肉反出如  
日夜避風効 本事方 黎蘆末生

脂和傳日三五 **疥癬蟲瘡** 油和塗 **羊疽瘡痒** 藜  
上 聖濟錄 油

二分附子八分爲末傳之  
陶隱居方  
誤吞水蛭  
黎蘆炒爲末  
水服一錢必

虫自出也  
吐出  
德  
生堂方

**附錄山慈石**  
別錄有名未用日苦平無毒主女子  
帶下生山之陽正月生葉如黎蘆莖

有衣一  
名爰此  
**參果根**  
又日苦有毒主鼠瘦生百餘根根  
有衣裏莖三月三日采根一名百

連一名烏蓼一名  
**馬腸根**  
宋圖經頌日苦辛寒有  
鼠莖一名鹿蒲  
毒主蠱除風葉療瘡疥

生秦州葉似桑三月  
采葉五月六月采根

**木黎蘆**  
遺於

**釋名黃黎蘆**  
綱  
**鹿驪**

**集解**  
藏器曰陶弘景注漏蘆云一名鹿驪山南人  
用苗北人用根按鹿驪乃木黎蘆非漏蘆也

乃樹生如茱萸樹高二尺有毒時珍曰鹿驪呼人  
呼爲黃黎蘆小樹也葉如櫻桃葉狹而長多皺文  
四月開細黃花五月  
結小長子如小豆大

**氣味苦辛温有毒**  
主治疥癬殺蟲  
藏器

**附子**  
本經  
下品

**釋名其母名曰烏頭**  
時珍曰初種爲烏頭象烏之  
頭也附烏頭而生者爲附子

如子附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一物也  
別有草烏頭白附子故俗呼此爲黑附子川烏頭  
以別之諸家不分烏頭有川草  
兩種皆混雜註解今悉正之

**集解**  
別錄日附子生犍爲山谷及廣漢冬月采爲  
附子春月采爲烏頭弘景日烏頭與附子同

根附子八月采八角者良烏頭四月采春時莖初  
生有腦頭如烏鳥之頭故謂之烏頭有兩岐其蒂



狀如牛角者名烏喙取汁煎為射蔞天雄似附子細而長乃至三四寸側子即附子邊角之大者並是同根而本經附子出犍為天雄出少室烏頭出朗陵分生三處當各有所宜也今則無別矣恭曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳俱以八月采造餘處雖有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用大明曰天雄大而長少角刺而實附子大而短有角平穩而實烏喙似天雄烏頭次于附子側子小于烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一喬子母之類氣力乃有殊等即宿根與嫩者爾敦曰烏頭少有莖苗身長而烏黑少有旁尖烏喙皮上蒼色有尖頭大者孕八九個周圍底陷黑如烏鐵天雄身全矮無尖周匝四面有附子孕十一個皮蒼色側子只是附子旁有小顆如棗核者木鼈子是喙附烏雄側中毗患者不入藥用保昇曰正者為烏頭兩岐者為烏喙細長三四寸者為天雄根旁如芋散生者為附子旁連生者為側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾

宗奭曰五者皆一物但依大小長短以象而名之爾頌曰五者今並出蜀土都是一種所產其種出于龍州冬至前將陸田耕五七遍以猪糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺莖作四稜葉如艾其花紫碧色作穗其實細小如桑椹狀黑色本只種附子一物至成熟後乃有四物以長二三寸者為天雄割削附子旁尖角為側子附子之絕小者亦名側子元種者為烏頭其餘大小者皆為附子以八角者為上綿州彰明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收采時月與本草不同謹按本草冬采為附子春采為烏頭博物志言附子烏頭天雄一物也春秋冬夏采之各異而廣志云奚毒附子也一歲為側子二年為烏喙三年為附子四年為烏頭五年為天雄今一年種之便有此五物豈今人種蒔之法用力倍至故爾繁盛乎時珍曰烏頭有兩種出彰明者即附子之母今人謂之川烏頭是也春未生子故曰春采為烏頭冬則生子已成故曰冬采為附子其天雄

烏喙側子皆是生子多者因象命名若生子少及獨頭者即無此數物也其產江左山南等處者乃本經所列烏頭今人謂之草烏頭者是也故曰其汁煎為射兩陶弘景不知烏頭有二以附子之烏頭註射兩之烏頭遂致諸家疑貳而雷斅之說尤不近理宋人楊天惠著附子記甚悉今撮其要讀之可不辯而明矣其說云綿州乃故廣漢地領縣八惟彰明出附子彰明領鄉二十惟赤水廉水昌明會昌四鄉產附子而赤水為多每歲以上田熟耕作壟取種於龍安龍州齊歸木門青埕小坪諸處十一月播種春月生苗其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花紫瓣黃蕤長苞而圓七月采者謂之早水拳縮而小蓋未長成也九月采者乃佳其品凡七本同而未異其初種之小者為烏頭附烏頭而旁生者為附子又左右附而偶生者為鬲子附而長者為天雄附而尖者為天錐附而上出者為側子附而散生者為漏藍子皆脈絡連貫如子附母而附子以貴故專附名也凡種一而子六

七以上則皆小種一而子二三則稍大種一而子特生則特大附子之形以蹲坐正節角少者為上有節多鼠乳者次之形不正而傷缺風皺者為下本草言附子八角者為良其角為側子之說甚謬矣附子之色以花白者為上鐵色者次之青綠者為下天雄烏頭天錐皆以豐實盈握者為勝漏藍側子則園人以乞役夫不足數也謹按此記所載漏藍即雷斅所謂木鼈子大明所謂虎掌者也其鬲子即烏喙也天錐即天雄之類醫方亦無此名功用當相同爾

**修治**

保昇曰附子烏頭天雄側子烏喙采得以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裹之數易

使乾又法以米粥及糟麴等淹之並不及前法頗日五物收時一處造釀其法先於六月內造大小麴麴未采前半月用大麥煮成粥以麴造醋候熟去糟其醋不用太酸酸則以水解之將附子去根鬚於新甕內淹七日日攪一遍撈出以踈篩攤之令生白衣乃向慢風日中晒之百十日以透乾為

度若猛日則皺而皮不附肉時珍曰按附子記云此物最多不能常熟或種美而苗不茂或苗秀而根不充或已釀而腐或已曝而孽若有神物陰爲之者故園人常禱於神目爲藥妖其釀法用醋醅安密室中淹覆彌月乃發出眼乾方出釀時其大有如拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得土人云但得半兩以上者皆良蜀人餌者少惟秦陝閩浙人宜之然秦人纔市其下者閩浙纔得其中者其上品則皆貴人得之矣弘景曰凡用附子烏頭天雄皆熱灰微炮令析勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者正制其毒故也教曰凡使烏頭宜文武火中炮令皺折孽破用若用附子須底平有九角如鐵色一個重一兩者卽是氣全勿用雜木火只以柳木灰火中炮令皺拆以刀刮去上孕子并去底火孽破於屋下午地上掘一土坑安之一宿取出焙乾用若陰制者生去皮尖底薄切以東流水并黑豆浸五日夜漉出日中曝用震亨曰凡烏附天雄須用童

子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之力入搗少許尤好或以小便浸二七日揀去壞者以竹刀每個切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日晒乾用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熟切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一箇用甘草二錢鹽水薑汁童尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也

**氣味辛溫有大毒**別錄曰其大熱善日神農辛岐

有大毒元素曰大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至爲諸經引用之藥好古曰入手少陰三焦命門之劑其性走而不守非若乾薑止而不行趙嗣真曰熟附配麻黃發中有補

仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也生附配乾薑補中有發仲景乾薑附子湯通脈四逆湯是也戴原禮曰附子無乾薑不熱得甘草則性緩得桂則補命門李燾曰附子得生薑則能發散

以熱攻熱又導虛熱下行以除冷病之才曰地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃耆時珍曰畏綠豆烏韭童溲犀角忌或汁得蜀椒食鹽下達命門主治風寒欬逆邪氣

寒濕踈躄拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血瘕

金瘡本經腰脊風寒脚氣冷冷弱心腹冷痛霍亂轉

筋下痢赤白溫中強陰堅肌骨又墮胎為百藥長

別錄別錄溫暖脾胃除脾濕腎寒補下焦之陽虛元素除臟

腑沉寒三陽厥逆濕淫腹痛胃寒虻動治經閉補

虛散壅李呆督脉為病脊強而厥好古治三陰傷寒陰

毒寒疝中寒中風痰厥氣厥柔痊癩癘小兒慢驚

風濕麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭痛暴瀉脫陽久

痢脾泄寒瘧瘴氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不斂

久漏冷瘡合葱涕塞耳治聾時珍

烏頭即附子母主治諸風風痺血痺半身不遂除寒冷

溫養臟腑去心下堅痞感寒腹痛元素除寒濕行經

散風邪破諸積冷毒李呆補命門不足肝風虛好古助

陽退陰功同附子而稍緩時珍

發明宗奭曰補虛寒須用附子風家即多用天雄

之時珍曰按王氏究原方云附子性重滯溫脾逐寒川烏頭性輕疎溫脾去風若是寒疾即用附子

風疾卽用川烏頭一云凡人中風不可先用風藥  
 及烏附若先用氣藥後用烏附乃宜也又凡用烏  
 附藥並宜冷服者熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽  
 上浮治之以寒則陰氣益甚而病增治之以熱則  
 拒格而不納熱藥冷飲下咽之後冷體既消熱性  
 便發而病氣隨愈不違其情而致大益此反治之  
 妙也昔張仲景治寒痼內結用蜜煎烏頭近效方  
 治喉痺用蜜炙附子含之嚙汁朱丹溪治疝氣用  
 烏頭厄子並熱因寒用也李東垣治馮翰林姪陰  
 盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脉來七八至但  
 按之則散用薑附湯加人參投半斤服之得汗而  
 愈此則神聖之妙也吳綬曰附子乃陰證要藥凡  
 傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脉沉者  
 必用之或厥冷腹痛脉沉細甚則唇青囊縮者急  
 須用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰  
 證傷寒往往疑似不敢用附子直待陰極陽竭而  
 用之已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰陽氣頓衰必  
 須急用人參健脉以益其原佐以附子溫經散寒

此不用將何以救之劉完素曰俗方治麻痺多  
 用烏附其氣暴能衝開道路故氣愈麻及藥氣盡  
 而正氣行則麻病愈矣張元素曰附子以白朮為  
 佐乃除寒濕之聖藥濕藥宜少加之引經又益火  
 之原以消陰翳則便溺有節烏附是也虞搏曰附  
 子稟雄壯之質有斬關奪將之氣能引補氣藥行  
 十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以  
 滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表  
 之風寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕震  
 亨曰氣虛熱甚者宜少用附子以行參耆肥人多  
 濕亦宜少加烏附行經仲景八味丸用為少陰嚮  
 導後世因以附子為補藥誤矣附子走而不守取  
 其健悍走下之性以行地黃之滯可致遠爾烏頭  
 天雄皆氣壯形偉可為下部藥之佐無人表其害  
 人之禍相習用為治風之藥及補藥殺人多矣王  
 履曰仲景八味丸兼陰火不足者設錢仲陽六味  
 地黃丸為陰虛者設附子乃補陽之藥非為行滯  
 也好古曰烏附非身涼而四肢厥者不可借用服

附子以補火必妨涸水○時珍曰烏附毒藥非危  
病不用而補藥中少加引導其功甚捷有人纔服  
錢七即發燥不堪而昔人補劑用為常藥豈古今  
運氣不同耶荆府都昌王體瘦而冷無他病目  
以附子煎湯飲兼嚼硫黃如此數歲漸州衛張百  
戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常宋張  
杲醫說載趙知府耽酒色每日煎乾薑熟附湯吞  
硫黃金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不支壽至  
九十他人服一粒即為害若此數人皆其臟腑稟  
賦之偏服之有益無害不可以常理槩論也又瓊  
碎錄言滑臺風土極寒民啖附  
子如啖芋栗此則地氣使然爾

**附方** 舊二十六 **少陰傷寒** 初得二三日脉微細但  
欲寐小便色白者麻黃

附子甘草湯微發其汗麻黃去節二兩甘草炙二  
兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻黃去沫納二  
味煮取三升分作三服取 **少陰發熱** 少陰病始得  
微汗張仲景傷寒論

**者** 附子細辛湯發其汗麻黃去節二兩附子

炮去皮一枚細辛二兩水一斗先煮麻黃去沫方

納二味同煮三升 **少陰下利** 少陰病下利清穀裏

分三服 同上 **微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔**

或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯用大附子

一個去皮生破八片甘草炙二兩乾薑三兩水三

升煮一升分溫再服其脉即出者愈百赤加葱九

莖腹痛加芍藥二兩嘔加生薑二兩咽痛加 **陰病**

桔梗一兩利止脉不出加人參二兩 同上 **惡寒**

傷寒已發汗不解反惡寒者虛也芍藥甘草  
湯附子湯補之芍藥三兩甘草炙三兩附子炮  
去皮一枚水五升煮取 **傷寒發躁** 傷寒下後又發

一升五分服 同上 **不得眠夜不安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無**  
大熱者乾薑附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚  
去皮破作八片水三升煮 **陰盛格陽** 傷寒陰盛格  
取一升頓服 傷寒論

熱而不飲水脉沉手足厥逆者是此證也霹靂散用大附子一枚燒存性為末蜜水調服逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈孫兆口訣熱病吐下及下利身冷脉微

一升煎半升溫服立効孫兆口訣熱病吐下及下利身冷脉微陰毒傷寒

孫兆口訣云房後受寒少腹疼痛頭疼腰重手足厥逆脉息沉細或作呃逆並宜退陰散用川烏頭

乾薑等分切炒放冷為散每服一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服得汗解本事方玉女散治陰

毒心腹痛厥逆惡候川烏頭去皮臍冷水浸七日切晒紙裹收之遇有患者取為末一錢入鹽入分

水一盞煎八分服壓下陰毒傷寒如猪血相似再進一服濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹

痛身冷一切冷氣大附子三枚炮裂去皮臍為末每服三錢薑汁半盞冷酒半盞調服良久臍下如

火煖為度續傳信方治陰毒傷寒煩燥迷悶急者用半兩重附子一箇生破作四片生薑一大塊

作三片糯米一撮以水一升煎六合溫服煖臥或汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得

與冷水如渴更煎中風痰厥昏不知人口眼喎斜

滓服屢用多効中風痰厥并體虛之人患瘧疾寒多者五生飲用生川烏頭生附子並去皮臍各

半兩生南星一兩生木香二錢五分每服五錢生薑十片水二盞煎一盞溫服和劑局方中風氣厥痰壅昏不知人六脉沉

去皮生木香半兩每服四錢薑九片中風偏廢羸活

水二盞煎七分溫服之濟生方中風偏廢羸活

湯用生附子一箇去皮臍羸活烏藥各一兩每服四錢生薑三片水一盞煎七分服王氏簡易方

半身不遂遂令瘳症用附子一兩以無灰酒一升浸一七日隔日飲一合延年秘錄

風病癱緩手足躄曳口眼喎斜語音蹇澀步履不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮臍

五靈脂各五兩為末入龍腦麝香五分滴水為丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化暖酒調服

一日二服至五七九便覺手擡移  
得步十九可以梳頭也  
梅師方  
風寒濕痺  
麻木

或手足不遂生川烏頭末每以香  
白米煮粥一盃  
入未四錢慢熬得所下薑汁一匙  
蜜三大匙空腹

也脾主四肢風淫客肝則侵脾而  
四肢病也此湯  
極有力予每授人良

驗 許學士本事方  
體虛有風  
外受寒濕身如在  
南星各二錢生薑十片水一盞半  
慢火煎服予

曾病此醫傳張子發授此方二服愈  
本事方  
口

眼喎斜 生烏頭青礬各等分為末  
每用一字啗入  
鼻內取涕吐涎立効無比名通關散

中秘 口卒噤瘖 卒忤停尸並用  
附子末  
產後中風

身如角弓反張口噤不語川烏頭  
五兩剉塊黑大  
豆半升同炒半黑以酒三升傾鍋  
內急攪以絹濾

取酒微溫服一小盞取汗若口不  
開拘開灌之未  
効加烏雞糞一合炒納酒中服以  
瘥為度 小品

諸風血風 烏荆 治諸風縱緩言  
語蹇澹徧身麻  
痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩腸

風臟毒下血不止者服之尤効有  
痛風攣搖顛頷  
不收者服六七服即瘥也川烏頭  
炮去皮臍一兩

荆芥穗二兩為末醋麩糊丸梧子  
大 婦人血風  
虛

溫酒或熟水每服二十九 和劑方  
婦人血風  
冷

月候不勻或手脚心煩熱或頭面  
浮腫頭麻用川  
烏頭一斤清油四兩鹽四兩鐱內  
同熬令裂如桑

椹色為度去皮臍五靈脂四兩為  
末搗勻蒸餅丸  
如梧子大空心溫酒鹽湯下二十九  
亦治丈夫風

諸風癩疾 生川烏頭去皮二錢  
半五靈脂  
師方 楊 半兩為末猪心血丸梧  
子大每

薑湯化 小兒慢驚 搖擲涎壅厥  
逆川烏頭生去皮  
服一丸 臍一兩全蠍十箇去尾分  
作三

服水一盞薑七片煎 小兒項軟  
乃肝腎虛風邪襲  
服 湯氏嬰孩寶鑑 入用附子去  
皮臍

天南星各二錢為末薑汁調攤貼  
小兒顛陷 綿烏  
天柱骨內服瀉青丸 全幼心鑑  
頭附



子並生去皮臍二錢雄黃八分為末麻痺疼痛桃

葱根搗和作餅貼陷處全幼心鑑

丸治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打撲傷

損閃胸痛不可忍生川烏不去皮五靈脂各四兩

威靈仙五兩洗焙為末酒糊丸梧子大每服七丸

至十九益湯下忌茶此藥常服其効如神普濟

方風痺肢痛營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同

焙為末醋熬稠丸綠豆大每腰脚冷痺疼痛有

温酒下七九日一服聖惠方

頭三箇生去皮臍為散醋調塗大風諸痺痰澀脹

帛上貼之須臾痛止聖惠方

子半兩者二枚炮折酒漬之春冬五日夏脚氣腿

秋三日每服一合以瘡為度聖惠方

腫久不瘳者黑附子一箇生去皮臍為散生薑汁

調如膏塗之藥乾再塗腫消為度簡要濟眾

十脂疼痛麻木不仁生附子去皮臍木香各等分

生薑五片水煎温服王氏簡易方

搜風順氣

烏附丸用川烏頭二箇香附子半斤薑汁淹一宿炒焙為末酒糊丸梧子大

每温酒下十丸肌體肥壯有頭風頭痛外臺秘要

風疾者宜常服之澹寮方

頭一升炒令黃末之以絹袋盛浸三斗酒中逐日

温服○孫兆口訣用附子炮石膏煨等分為末入

腦麝少許每服半錢茶酒任下○修真秘旨用附

子一枚生去皮臍綠豆一合同入銚子內煮豉熟

為度去附子食綠豆立瘳每風毒頭痛聖惠方治

箇可煮五次後為末服之風毒攻注

頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑

一兩大黑豆一合炒熟同酒一盞煎七分調附末

一錢温服○又方治二三十年頭風不愈者用大

川烏頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二

錢細茶三錢薄荷七葉塩梅一箇水一盞煎七分

臨臥温服○朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭

一錢白芷四錢為末茶服一字

風寒頭痛十便良

仍以末嚙鼻有人用之得効

方治風

五三

寒客于頭中清涕項筋急硬胸中寒痰嘔吐清水  
 用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎藟生  
 薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每用五  
 錢水煎服隔三四日一服或加防風一兩○三因  
 方必効散治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有  
 神効用大附子一箇生切四片以薑汁一盞浸炙  
 再浸再炙汁盡乃止高良薑等分為末  
 每服一錢臘茶清調下忌熱物少時  
 沐頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用大附  
 子一箇炮食鹽等分為末以方寸七摩顙上令藥  
 力行或以油調稀亦可  
 一日三上 張仲景方 年久頭痛 川烏頭天南星  
 調塗太陽 頭風斧劈 難忍川烏頭末燒烟熏碗  
 穴 經驗 經 內溫茶炮服之 集簡方 痰  
 厥頭痛 如破厥氣上衝痰塞胸膈炮附子三分釜  
 墨四錢冷水調服方寸七當吐即愈忌猪  
 肉冷 腎厥頭痛 指南方用大附子一箇炮熟去皮  
 水 生薑半兩水一升半煎分三服○

經驗良方 葶根丸 治元陽虛頭痛如破眼睛如錐  
 刺大川烏頭去皮微炮全蠟以糯米炒過去米等  
 分為末 葶根汁丸 綠豆大每 氣虛頭痛 氣虛上壅  
 薄荷茶下十五丸 一日一服 偏正頭痛  
 不可忍者 大附子一枚 去皮臍研末 葱汁麩糊丸  
 綠豆大每服十丸 茶清下○ 僧繼洪 澹寮方 蠟附  
 丸云 氣虛頭痛 惟此方最合造化之妙 附子助陽  
 扶虛 鍾乳補陽 鎮墜全蠟 取其鑽透 葱涎取其通  
 氣 湯使用椒以達下 鹽以引川 使虛氣下歸 對證  
 用之無不作効 大附子一枚 剉心入全蠟 去毒三  
 枚在內 以餘附末 同鍾乳粉二錢 半白麩少許 水  
 和作劑 包附煨熟 去皮研末 葱涎和丸 梧子大每  
 椒鹽湯下 腎氣上攻 頭項不能轉移 椒附丸 用大  
 五十丸 熟附子一枚 為末 每用二錢  
 以椒二十粒 用白麩 填滿椒口 水一盞 半薑七片  
 煎七分 去椒入鹽 空心點服 椒氣下達 以引逆氣  
 歸經也 鼻淵腦泄 生附子末 葱涎和如 耳鳴不止  
 本事方 泥會涌泉穴 普濟

無晝夜者烏頭燒作灰菖蒲等分爲末耳卒聾閉

綿裹塞之日再用取効楊氏產乳

附子醋浸削尖插之或更於

上灸二七壯本草拾遺

灌耳中喉痺腫塞附子去皮炮令拆以蜜塗上灸

肘後喉痺腫塞之令蜜入含之勿嚙汁已成者

再換之風蟲牙痛普濟方用附子一兩燒灰枯礬

川附子生研麩糊丸小豆大每綿包一丸

咬之○刪繁方用炮附子末納孔中乃止

腫砂大着背中以定爲度張文仲備急方

切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精益

子盛以童子小便浸七日逐日添冷溢出揀去壞

者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘七次乃浸

之日日換水日足取焙爲末酒煮麩糊充綠豆大

每服十九空心鹽湯下少齋飯壓之經驗方

升降諸氣暖則宣流熱附子一大箇分作二服水

方中寒昏困薑附湯治体虛中寒昏不知人及臍

附子一兩去皮臍乾煎丸一兩每服三

錢水二鍾煎一鍾溫服和劑局方

耳卒聾閉

生附子爲末葱涕和

末葱涕和

生附子爲末醋麩調

貼足心男左女右日

久患口瘡

普濟方用附子一兩燒灰枯礬

一分爲末搗之○又方川烏頭

張文仲備急方

元氣強力固精益

添冷溢出揀去壞

水淘七次乃浸

綠豆大

經驗方

和劑局

分作二服水

及臍

中寒昏不知人

及臍

耳卒聾閉

生附子爲末葱涕和

末葱涕和

生附子爲末醋麩調

貼足心男左女右日

久患口瘡

普濟方用附子一兩燒灰枯礬

一分爲末搗之○又方川烏頭

張文仲備急方

元氣強力固精益

添冷溢出揀去壞

水淘七次乃浸

綠豆大

經驗方

和劑局

分作二服水

及臍

中寒昏不知人

及臍

耳卒聾閉

生附子爲末葱涕和

末葱涕和

生附子爲末醋麩調

貼足心男左女右日

久患口瘡

普濟方用附子一兩燒灰枯礬

一分爲末搗之○又方川烏頭

張文仲備急方

元氣強力固精益

添冷溢出揀去壞

水淘七次乃浸

綠豆大

經驗方

和劑局

分作二服水

及臍

中寒昏不知人

及臍

疝腹痛

選臍手足厥冷白汗出脉弦而緊用大烏頭煎主之大烏頭五枚去臍水三升煮取一升去滓納蜜二升煎令水氣盡強人服七合弱人服五合不瘥明日更服 張仲景金匱玉函方

寒疝身痛

腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭桂枝湯主之烏頭一味以蜜二斤煎減半入桂枝湯五合解之得一升初服二合不知再服又不知加至五合其知者如醉狀得吐為中病也

寒疝引脇

肋心腹皆痛諸藥不効者大金匱玉函一斤煎令透取焙為末別以熟蜜和九梧子大每服二十九丸冷鹽湯下永除 崔氏方

滑泄

腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑七片煎七分溫 倉卒散治寒疝腹痛小

急難忍汗

出厥逆大附子炒去皮臍一枚山巵子炒焦四兩每周二錢水一盞酒半盞煎七分入

虛寒腰痛

鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩薑花三分為末棗肉和九梧子大每服三十丸空心溫酒下○夷堅志云特康

元臟傷冷

附子炮去此方本治腰而効乃如此 經驗方用

梅師方

虎九補元臟進飲食壯筋骨用烏頭附子合四兩醱醋浸三宿切作片子搗一小坑炭

火燒赤以醋

三升同藥傾入坑內用盆合之一宿取出去砂土入青塩四兩同炒赤黃色為末醋打

胃冷有痰

脾弱嘔吐生酒下十五丸婦人亦宜 附子半夏各

二錢薑十片水二盞煎七分空心溫服久冷反胃

一方並炮熟加木香五分奇効良方

經驗方用大附子一箇生薑一兩剉細同煮研如

麩糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十丸○斗

門方用長大附子一箇坐于磚上四面着火漸逼

以生薑自然汗涿之依前再逼再涿約薑汁盡半

碗乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘥或

以猪腰子切片炙熟蘸食○方便集用大附子一

箇切下頭子剉一竅安丁香四十九箇在內仍合

定線紮入砂銚內以薑汁浸過丈火熬乾為末

每挑少許置掌心舐喫日十數次忌毒物生冷脾

**寒瘧疾** 濟生方云五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧

附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服

水一碗生薑七片棗七枚煎七分露一宿發日空

心溫服未久再進一服三瘳不一選方云寒痰宜

附子風痰宜烏頭若用烏頭則寒多者火炮七次

熱多者湯炮七次去皮焙乾如上法用烏頭性熱

炮多則熱散也○又氣附湯用熟附子去皮草果

仁各二錢半水一盞薑七片棗一枚煎七分發日

**寒熱瘧疾**

附子一枚重五錢者麩煨人參丹砂各一錢為末煉蜜丸梧子大每服二十九

未發前連進三服中病則吐或身體麻

**瘧瘧寒熱**

木末中病來日再服 龍安常傷寒論

冷瘧寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汗多引飲或自

利煩躁宜薑附湯主之大附子一枚四破每以一

片水一盞生薑十片煎七分溫服李侍制云此方

極妙章傑云嶺南以啞瘧為危急不過一二日而

死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得

**嶺南小便虛閉**

兩尺脈沉微用利小便藥不効

衛生方 臍鹽水浸良久澤瀉一兩每服四錢水

一盞半燈心七莖煎服即愈 普濟方 腫疾喘滿

大人小兒男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降為寒痞隔故水疑而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附子一箇去皮臍切片生薑十片入沉香一錢磨木同煎食前冷飲附子雖三五枚亦無害小兒每服三錢水煎

**脾虛濕腫** 大附子五枚去皮四服 朱氏集驗方 破以赤小豆半升藏

附子于中慢火煮熟去豆焙研末以薏苡仁粉打糊丸梧子大每服十九蘿蔔湯下 朱氏集驗方

**陰水腫滿** 烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去滓銅器盛之重湯煎至可丸九卜豆

大每服三五丸取小便利為佳忌油膩酒麩魚肉

○又方大附子童便浸三日夜逐日換尿以布擦去皮搗如泥酒糊和丸小豆大每服

**大腸冷秘** 附子三十九煎流氣飲送下 普濟方

一枚炮去皮取中心如棗大為末 老人虛泄 不禁

二錢蜜水空心服之 聖濟總錄

子一兩赤石脂一兩為末醋糊丸梧子大每服五十九 楊氏家藏方 **冷氣洞泄** 川

烏頭一兩木香半兩為末醋糊丸梧子大每服二十九 本事方 **臟寒脾泄** 及

人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩煨熟大附子去皮臍一兩五錢為末粥丸梧子大每服八十九

蓮肉煎湯下○十便良方治脾胃虛冷大腸滑泄米穀不化乏力用大附子十兩連皮同大棗二斤

於石器內以水煮一日常令水過兩指取出每箇切作三片再同煮半日削去皮切焙為末別以棗

肉和丸梧子大每空 **小兒吐泄** 注下小便少白龍心米飲服三四十九 丸用熟附子五錢

白石脂煨龍骨煨各二錢半為末醋麩糊丸 **霍亂** 黍米大每米飲量見大小服 全幼心鑑

**吐泄** 不止附子重七錢者炮去皮臍為末每服四錢水二盞益半錢煎一盞溫服立止 孫兆

秘寶 **水泄久痢** 川烏頭二枚一生用一以黑豆半方 合同煮熟研丸綠豆大每服五丸

黃連湯下 **久痢赤白** 獨聖丸用川烏頭一箇灰火

研末酒化臘丸如大麻子大每服三九赤痢黃連

甘草黑豆煎湯放冷吞下白痢甘草黑豆煎湯冷

吞如瀉及肚痛以水吞下並空 **久痢休息** 熟附子

心服之忌熱物 經驗良方 聖濟總錄 **下痢欬**

末雞子白二枚搗和丸梧子大傾入沸湯 煮數沸瀉出

作兩服米飲下 脉沉陰寒者退陰散主之陳自明云一人病下

**逆** 此不止服此兩服而愈方見前陰毒傷寒下

**血虛寒** 日久腸冷者熟附子去皮焙白礬一兩為

末每服三錢米飲下○又方熟附子一枚 去皮生薑三錢

半水煎服或 **陽虛吐血** 生地黃一 如黑豆一百粒

並聖惠方 酒少許以熟附子一兩半去皮臍切片入汁內石

器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏和 鳴丸梧子大每空心米飲下三十九昔葛察判妻

苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢効 余居士 選奇 **溲數白濁** 熟附子為末每服二錢薑三片

方 水一盞煎六分溫服 普濟方 **虛** **火背熱** 虛火上行背內熱如火炙者附

子末津調塗涌泉穴 摘玄方 **經水不調** 血臟冷痛北方平易捷徑熟附子去皮

當歸等分每服三錢水煎服 普濟方 **斷產下胎** 生附子為末淳酒和塗右

**折腕損傷** 卓氏膏用大 足心胎下去之 小品方 附子四枚主 切以豬脂一斤三年苦醋同漬三宿取

脂煎三上三下日摩傅之 深師方 **癰疽腫毒** 川烏頭炒黃藥炒各一兩為末唾調 塗之留頭乾則以米泔潤之 同上 **癰疽久漏** 瘡 冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大 片厚三分安瘡口上以艾炙之隔數日一灸灸至 五七次仍服內托藥自然肌肉長滿 **癰疽弩肉** 如 研末作餅子亦可 薛已外科心法 粘貼上用艾火灸之附子焦復唾濕再灸令熱氣

徹內即瘥 癰疽肉突 鳥頭五枚濃醋三升漬三日

驗 千金方 醋和附子末塗之 洗之日夜三四度 古今錄

驗 丁瘡腫痛 醋和附子末塗之 千金翼 久生疥癬 川鳥頭

水煎洗甚 手足凍裂 附子去皮為末以水麩調 談堃翁試驗方 足

釘怪疾 兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘 脛骨生 碎孔髓流出身發寒顫 惟思飲酒此是肝

腎冷熱相吞用炮川鳥頭末傅之 內服韭子湯効 夏氏奇疾方

烏頭附子尖主治為末茶服半錢吐風痰癩癩 時珍

發明 時珍曰烏附用尖亦取其銳氣直達病所爾 無他義也保幼大全云小兒慢脾驚風四肢

厥逆用附子尖一箇硫黃棗大一箇蠟稍七箇為 末薑汁麩糊丸黃米大每服十丸米飲下亦治久

瀉冠羸凡用烏附不可執為性熱審其手足冷者 輕則用湯甚則用丸重者用膏候手足暖陽氣回

即為佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非 真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎碧霞之戒

附方 舊一 風厥癩癩 凡中風痰厥癩癩驚風痰涎 上壅牙關緊急上視搐搦並

宜碧霞丹主之烏頭尖附子尖蠟稍各七十箇石 綠研九度飛過十兩為末麩糊丸茨子大每用一

丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰 涎為妙小兒驚癩加白僵蠶等分 和劑局方

臍風撮口 生川鳥尖三箇全足蜈蚣半條酒浸炙 麝香少許為末以少許吹鼻得嚏乃以

薄荷湯灌 木舌腫脹 川鳥尖巴豆研細醋 字 禾類方 調塗刷 集簡方 牙痛

難忍 附子尖天雄尖全蠟各七箇 奔豚疝氣 作痛 生研為末點之 禾類方 或陰

囊腫痛去鈴丸用生川鳥尖七箇巴豆七枚去皮 油為末糕糊丸梧子大朱砂麝香為衣每服二九

空心冷酒或冷鹽湯下三兩 割甲成瘡 連年不愈 日一服不可多 澹寮方 川鳥頭尖



黃藥等分爲末洗了貼之  
以愈爲度  
古今錄驗  
老幼口瘡  
鳥頭尖一箇  
研末薑汁和塗足心男左  
女右不過二三次卽愈  
天南星一箇

本草綱目草部第十七卷終

本草綱目草部第十七卷下

草之六

天雄  
本經  
下品

釋名白幕

而尖者謂之  
天雄象形也  
本經時珍曰天雄乃種附子而生出或  
變出其形長而不生子故曰天雄其長

集解

別錄曰天雄生少室山谷二月采根陰乾弘  
景曰今採用八月中旬天雄似附子細而長  
乃至三四寸許此與烏頭附子三種本出建平故  
謂之三建今宜都佷山者最好謂爲西建錢塘間

者謂爲東建氣力小弱不相似故曰西水猶勝東  
白也其用灰殺之時有水強者不佳恭曰天雄附  
子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有力  
弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭苗名董音靳爾雅云芫董草是也今訛董為建遂以建平譯之矣承曰天雄諸說悉備但始種而不生附子側子經年獨長大者是也蜀人種之尤忌生此以為不利如養蠶而成白殭之意時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或種附子而盡變成長者即如種芋形狀不一之類一種是他處草烏頭之類自生成者故別錄註鳥喙云長三寸已上者為天雄是也入藥須用蜀產曾經釀制者或云須重一兩半有象眼者乃佳餘見附子下

**修治**

數曰宜炮皴去皮尖底用或陰制如附子法亦得大明曰凡丸散炮去皮用飲藥即和皮生使甚佳時珍曰熟用一法每十兩以酒浸七日掘土坑用炭半秤煨赤去火以醋二升沃之候乾乘熱入天雄在內小盆合二夜取出去臍用之

**氣味**辛溫有大毒

別錄曰甘大溫權曰大熱宜乾薑制之之才曰遠志為之使

惡腐婢忌豉汁

**主治**大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣

金瘡強筋骨輕身健行

本經

療頭面風去來疼痛心

腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志

令人武勇力作不倦

別錄禹錫曰按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取天雄

一枚納雄雞腸中

治風痰冷痺軟脚毒風能止氣

喘促急殺禽蟲毒

甄權

治一切風一切氣助陽道暖

水臍補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四

肢不遂下胸膈水破疔瘰癧結排膿止痛續骨消

瘀血背脊僵痺霍亂轉筋發汗止陰汗炮含治喉

痺大

發明

宗奭曰補虛寒須用附子風家多用天雄亦取其數散也元素曰非天雄不能補上焦之陽虛震亨曰天雄烏頭氣壯形偉可為下部之佐時珍曰烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥補下所以益上也若是上焦陽虛即屬心脾之分當用參芪不當用天雄也且烏附天雄之尖皆是向下生者其氣下行其臍乃向上生苗之處寇宗奭言其不肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是誤認尖為上爾惟朱震亨以為下部之佐者得之而未發出此義雷敷炮炙論序云咳逆數數酒服熟雄謂以天雄炮研酒服一錢也

附方

新三建湯 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脉沉微

際固冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄炮裂去皮臍等分咬咀每服四錢水二盞薑十五

片煎八分温男子失精 天雄三兩炮白朮八兩桂枝六兩龍骨三兩為散每

酒服半錢 張大風惡癩 三月四月采天雄烏頭仲景金匱要畧 苗及根去土勿洗搗汁

漬細粒黑豆摩去皮不落者一夜取出晒乾又浸

如此七次初吞三枚漸加至六七枚禁房室猪魚

雞蒜犯之即死

側子 別錄下品

釋名

萌子 時珍曰生于附子之側故名許慎說文作萌子

集解

弘景曰此附子邊角之大者削取之昔時不

用比來醫家以療脚氣多驗恭曰側子附子皆是烏頭下旁出者以小者為側子大者為附子今以附子角為側子理必不然若當陽以下江左

山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州以上劍南所出者附子之角但如黍粟豈可充用比來都下皆用細附子有効未嘗取角也保昇曰今附子邊果有角如大棗核及檳榔以來者形狀自是一顆且不小乃烏頭旁出附子旁出側子甚明時珍曰側子乃附子旁粘連小者爾故吳普陶弘景皆指為附子角之大者其又小干側子者即漏藍子矣故楊氏附子記言側子漏藍園人皆不重之以乞役夫

**修治** 同附子

**氣味** 辛大熱有大毒 普曰神農岐伯有大毒 **主治** 八月采畏惡與附子同

癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎 別錄

脚氣冷風濕痺大風筋骨攣急 甄權 冷酒調服治遍

**身風癩神妙** 雷敷

**發明** 機曰烏頭乃原生之腦得母之氣守而不移居乎中者也側子散生旁側體無定在其氣

輕揚宜其發散四肢克達皮毛為治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木鼈子則餘氣所結其形催殘宜其不入湯服令人喪目也  
時珍曰唐元希聲侍郎治癰瘰風有側子湯見外臺秘要藥多不錄

**漏藍子** 綱目

**釋名** 木鼈子 炮炙 **虎掌** 日華時珍曰此乃附子之瑣細未成者小而漏藍故

名南星之最小者名虎掌此物類之故亦同名夫明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對烏頭五十對漏藍二十斤不知何用

氣味苦辛有毒教曰服之主治惡痢冷漏瘡惡瘡

癘風時珍

發明時珍曰按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽當用漏蓋子輩加減用之如不當

用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而為害尤甚也又按類編云一人兩足生瘡臭潰難近夜宿

五夫人祠下夢神授方用漏蓋子一枚生研為末入膩粉少許井水調塗依法治之果愈蓋此物不

堪服餌止宜入瘡科也

附方新一切惡痢維下及休息痢百歲丸用漏蓋子一箇大者阿膠木香黃連罌

粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子大一歲一丸米飲下羅天益衛生寶鑑

烏頭木經下品校正併入拾遺

釋名烏喙木經即草烏頭綱土附子日奚毒木經

子吳普毒公吳普又金鴉綱苗茗菴音菴音董音獨

白草拾遺鴛鴦菊綱汁煎名射罔普曰烏頭形如鳥

合如鳥之喙者名曰烏喙喙即鳥之口也恭曰烏喙即鳥頭異名也此有三岐者然兩岐者少若烏

頭兩岐名烏喙則天雄附子之兩岐者復何以名之時珍曰此即烏頭之野生于他處者俗為之草

烏頭亦曰竹節烏頭出江北者曰淮烏頭日華子所謂土附子者是也烏喙即偶生兩岐者今俗呼

為兩頭尖因形而名其實乃一物也附子天雄之偶生兩岐者亦謂之烏喙功亦同于天雄非此烏

頭也蘓恭不知此義故反疑之草烏頭取汁捫為毒藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遼東塞外

秋收烏頭為毒藥射禽獸陳藏器所引續漢五行志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

此烏頭非川烏頭也菊譜云鴛鴦菊即烏喙苗也

**集解** 別錄曰烏頭烏喙生朗陵山谷正月二月采陰乾長三寸以上者為天雄普曰正月始生

葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似弘景曰今采用四月亦以八月采搗芥莖汁日煎為射罔獵人以傳箭射禽獸十步即倒中人亦死宜速解之則陵屬汝南郡大明曰上附子生去皮搗濾汁澄清旋添晒乾取膏名為射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥為異爾然毒則甚焉段成式酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭置乾地及濕濕地及乾飛鳥觸之隨走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建寧郡烏勾山有牧靡草鳥鵲誤食烏喙中毒必急食此草以解之牧靡不知何藥也

**修治** 時珍曰草烏頭或生用或炮用或以烏大豆同煮熟去其毒用

**烏頭氣味辛温有大毒** 別錄曰其大熱大毒普曰

毒權曰苦辛大熱有大毒大明曰味發辛熱有毒之木曰莽草遠志為之使反半夏栝樓貝母白欬白芨惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌 鼓汁畏飴糖黑豆冷水能解其毒 **主治** 中風惡

風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱其

汁煎之名射罔殺禽獸 本經 消胸上痰冷食不下心

腹冷痰臍間痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

胎 別錄 主惡風憎寒冷痰包心腸腹疔痛痲氣塊

齒痛益陽事強志 權 治頭風喉痺癰腫疔毒 時珍

烏喙一名兩頭尖氣味辛微温有大毒 普曰神農雷公桐君

黃帝有毒權曰苦辛王治風濕丈夫腎濕陰寒癢

寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎

別錄男子腎氣衰弱陰汗癩癧歲月不消甄王大風

頑痺時珍

射罔氣味苦有大毒之才曰温大明曰人中射罔

冷水薺苳皆王治尸疰癥堅及頭中風痺別錄瘰瘡

瘡根結核癭癧毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸

近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水塗之若無

膿水有生血及新傷破卽不可塗立殺人藏

發明時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏

自非風頑急疾不可輕投甄權藥性論言其益陽

事治男子腎氣衰弱者未可遽然也此類止能搜

風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏

頭附子補右腎命門之功哉吾斷郝知府自負知

醫因病風癰服草烏頭木鱉子藥過多甫入腹而

麻痺遂至不救可不慎乎機曰烏豕形如鳥嘴其

氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病

所冀為射罔能殺禽獸非氣之鋒銳捷利能如是

乎楊清叟曰凡風寒濕痺骨內冷痛及損傷入骨

年久發痛或一切陰疽腫毒並疔毒烏頭南星等

分少加肉桂為末薑汁熱酒調塗未破者能內消

久潰者能去黑爛二藥性味辛烈能破惡塊逐寒

熱遇冷卽消遇熱卽潰

附方舊四新陰毒傷寒生草烏頭為末以葱頭蘸

藥納穀道中名提益散

七

王游蕪陰 二便不通 卽上方名 中風癱瘓 手足顫

證畧例 麩濟左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去

皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以斑

蝮三三筒去頭翅同煮豆熟去蝮取豆焙乾為末

和勻以醋麪糊丸梧子大每服三十九溫酒下

簡易 癱瘓頑風 骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下

方 天各三錢硫黃麝香丁香各一錢木蠶子五箇為

末以熟斷艾屎款合成一處用鈔紙包裹燒熏病

處名雷丸 孫 諸風不遂 宋氏集驗方用主草烏

天仁集効方 生地龍鴉和入少醋糊丸梧子大每服四五丸白

湯下其妙勿多服悉麻人名鄂洛小金丹〇經驗

濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一兩同

以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木日搗三百杵

作餅焙乾為末酒糊丸梧子大 一切頑風 神應丹

每空心鹽湯下十九丸名至寶丹 一 切頑風 用生草

烏頭生天麻各洗等分搗絞汁傾盆中砌一小

坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次夜

則露之晒至成膏作成小錠子每一錠分作三

服用葱薑自然汁和好酒熱服 乾坤秘韞 一

切風證 不問頭風痛風黃鴨吊脚風痺生淮烏頭

葱一斤薑一斤搗如泥和作餅子以草鋪盤內加

楮葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃

一日夜乃晒之春為末以生薑取汁煮麪糊和丸

梧子大初服三十九日二服服後身痺汗出卽愈

避風 乾 破傷風病 壽域方用草烏頭為末每以

坤秘韞 門事親方用草烏尖白芷并生研末每服半錢冷

酒一盞入葱白一根同煎服少頃以葱白熱粥投

之汗出 年久麻痺 或歷節走氣疼痛不仁不拘男

卽愈 為末以袋一箇盛豆腐半袋入烏末在內再將豆

腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥卽堅如石取出



晒乾為末每服五分冷風濕氣以生薑湯風濕痺

下麻木不仁以葱白湯下之活人心統

木黑神丸草烏頭連皮生研五靈脂等分為末六月

甚一丸作二丸薄荷湯化風濕走痛黑弩前丸用

下覺微麻為度本事方烏頭三箇去皮臍研末醋

脂各一兩乳香沒藥當歸三錢為末醋糊丸梧子

大每服十丸至三十九臨臥溫酒下忌油膩濕麪

孕婦勿服腰脚冷痛調貼須臾痛止十便良

方膝風作痛草烏細辛防風等分為末摻靴襪中

方遠行脚腫如草鞋以水微濕摻之用之可行于

里甚妙脚氣掣痛或勝間有核生草烏頭大黃木

又法草烏一味為末以薑汁煎茶調貼之

或酒糟同搗貼之永類方濕滯足腫早輕晚重

一兩以生薑一兩同研交感一宿蒼朮一兩以葱

白一兩同研交感一宿各焙乾為末酒糊丸梧子

大每服五十九丸酒下除風去濕治痺胃虛弱久積

艾元英如宜方草烏頭一斤蒼朮二斤以去白陳皮半斤生甘草

西兩黑豆三升水一石同煮乾只揀烏木晒焙為

末酒糊丸梧子大焙乾收之每空心溫酒下二偏

三十九覺麻即漸減之名烏木丸集簡方

正頭風草烏頭四兩川芎麝四兩蒼朮半斤生薑

理上中春五夏三秋五冬七日取出晒乾揀去葱

薑為末醋麪糊和丸梧子大每服九九臨臥溫酒

下立効戴久患頭風草烏頭尖生用一分赤小

古渝經驗方末每服半錢薄荷湯冷服風痰頭痛

更隨左右指鼻指南方聚痰飲上厥

頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩川烏頭生

去皮尖一兩藿香乳香三皂子大為末每服二錢

去皮尖一兩藿香乳香三皂子大為末每服二錢

薄荷薑湯下食後  
**女人頭痛** 血風證草烏頭厄子  
陳言三因湯  
隨左右調塗太陽及額上  
等分爲末自然葱汁

勿過眼避風  
**腦洩臭穢** 草烏去皮半  
川芎二兩並生研末麩糊丸綠豆大每  
兩蒼木一兩

服十九茶下忌一切熱物  
**耳鳴耳癢** 聖濟總錄  
如流水及風聲不治成聾用生烏頭掘得乘濕削  
千金方

如棗核大塞之日易二次不三口愈  
喉痺口噤 不開欲死草烏頭皂莢等分爲末入麝  
香少許擦牙并噴鼻內牙關自開也○

濟生方用草烏尖石膽等分爲末每用一錢醋煮  
皂莢汁調稀掃入腫上流涎數次其毒即破也

**虛壅口瘡** 滿口連舌者草烏一箇南星一箇生薑  
或以草烏頭吳茱萸等分爲  
末蜜調塗足心  
本事方

**疔蝕口鼻** 穿透者草  
末蜜調塗足心  
爲末貼之

**風蟲牙痛** 草烏炒黑一兩細辛一錢  
爲末指之吐出涎○一方

草烏食鹽同炒黑  
**寒氣心痛** 三十年者射罔食末  
摻之 海上方

子大每酒下二九日三服劉國  
**寒瘧積瘧** 巴豆一  
英所秘之方 范汪東陽方 枚去心

皮封罔去皮如巴豆大大棗去皮一枚搗成丸梧  
子大清旦先發時每服一九白湯下 肘後方

**脾寒厥瘧** 先寒後熱名寒瘧但寒不熱面色黑者  
者並宜服此賈耘老用之二二十年累試有効不蛀  
草烏頭削去皮沸湯泡二七度以蓋蓋良久切焙

研稀糊丸梧子大每服三十九藍十片棗三枚葱  
三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一  
服絕勿飲湯便不發

也 蘇東坡良方  
**腹中癥結** 害妨飲食羸瘦射  
搗末雞子白和丸麻子大每服一  
丸漸至三丸以愈爲度 肘後方

兩以一半生研一半燒灰醋糊和丸綠豆大每  
服七丸井華水下忌生冷魚肉 十便良方

水泄寒痢 烏一

水泄寒痢 烏一

水泄寒痢 烏一

**痢注下** 三神丸治清濁不分泄瀉注下或赤或白腹臍刺痛裏急後重用草烏頭三箇去皮

尖以一箇火炮一箇醋煮一箇燒灰為末醋糊丸綠豆大每服二十九水瀉流水下赤痢甘草湯下

白痢薑湯下忌魚腥 **結陰下血** 腹痛草烏頭蛤粉生冷和劑局方炒去皮臍切一兩

煎香炒三兩每用三錢水一盞入鹽少許 **老人遺尿** 不知出者草烏頭一兩童便浸七日去皮同鹽

普濟 **內痔不出** 草烏為末津調點肛門內痔即反出

**疥毒初起** 羅麩一兩為末無根水調搽留日以紙蓋之乾則以水潤

之 **疥毒惡腫** 生烏頭切片醋熬成膏攤貼次日根出

又方兩頭尖一兩巴豆四箇 **疥瘡發背** 草烏頭去皮搗貼疥自拔山普濟方

葱白連鬚和搗丸豌豆大以雄黃為衣每服一九先將葱一根細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四

口用冷水一口止之即臥以被厚蓋 **惡毒諸瘡** 及汗出為度亦治頭風 乾坤秘韞

背疥瘡便毒等證二鳥膏用草烏頭川烏頭于瓦上以井華水磨汁塗之如有口即塗四邊乾再上

亦可單用草烏頭 **大風癬瘡** 遍身黑色肌體麻木

斤刮洗去皮極淨攤乾以清油四兩鹽四兩同人

煎內炒令深黃色頭出刺油只留鹽并藥再炒令

黑烟出為度取一枚擊破心內如米一點白者始

好白多再炒乘熱杵羅為末醋麩糊丸梧子大每服三十丸空心溫酒下草烏性毒難制五七

日間以黑豆煮粥食解其毒 **生瘡** 陰囊兩脚尤甚者草烏一兩鹽一兩化水浸

切搗醋糊丸綠豆大每服三一切諸瘡 未破者草

十九丸空心鹽湯下 **瘡察方** 烏頭為末

人輕粉少許臘猪油和搽普濟方療癰初作未破作寒熱草烏頭

木醋磨細人搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻醫林正宗馬汗入

瘡腫痛急療之遲則毒深以生烏頭末傳靈苑方蛇蝎螫

人射司傳之類易血射司傳之中沙虱毒射司傳之千金

白附子別錄

釋名見後發

集解別錄曰白附子生蜀郡三月采弘景曰此物

西蜀郡不復育生砂磧下濕地獨莖似鼠尾草細

葉周匝生於穗間根形似天雄珣曰徐表南州異

珍根正如草烏頭之小者長寸許乾者皺文有節

氣味辛甘大溫有小毒保昇曰甘辛溫大明目無

藥勢上行曰純陽引主治心痛血痺面上百病行藥勢別中

風失音一切冷風氣面疔癩疔大諸風冷氣足弱

無力疥癬風瘡陰下濕癢頭面痕入面脂用李補

肝風虛好風痰震亨

發明時珍曰白附子乃陽明經藥因與附子相似

附方新十中風口喎半身不遂牽正散用白附子

末每服二錢熱酒調小兒暑風暑毒入心痰塞心

危急之證非此丸生料膜眩之劑不能伐之三生

丸用白附子天南星半夏並去皮等分生研猪膽

汁和丸黍米大量兒大小以薄荷湯下風痰眩運

令兒側臥嘔出痰水即甦全幼心鑑

頭痛氣鬱胸膈不利白附子炮去皮臍半斤石膏

煨紅半斤硃砂二兩二錢半龍腦一錢為末粟米

飯丸小豆大每服三十丸食偏正頭風

後茶酒任下御藥院方白附子白

角去皮等分為末食後茶痛痰厥頭痛

服仰臥少頃普濟本事方痰厥頭痛

等分生研為末生薑自然汁浸蒸餅丸綠赤白汗

豆大每服四十九食後薑湯下濟生方

斑白附子硫黃等分為末薑汁調面上野豔

藥臥時漿水洗面以白蜜和塗紙耳出膿水

正貼之久久自落衛生易簡方

羌活一兩為末猪羊腎各一箇每箇人未半

羹濕紙包煨熟五更食温酒下聖濟錄

喉痺

腫痛白附子末枯礬等分研末塗

齒為末津調填臍上以艾灸三小兒吐逆

壯或五壯即愈楊起簡便方

白附子藿香等分為末房米慢痺驚風

飲下半錢保幼大全方

虎掌

本經

天南星

宋開寶

釋名虎膏

綱目

鬼蒟蒻

日華恭曰其根四畔有圓牙

南星即本草虎掌也小者名曰按古方多用虎掌

不言天南星南星近出唐人中風痰毒方中用之

乃後人採用別以此名爾時珍曰虎掌因葉形似

之非根也南星因根圓白形如老人星狀故名南

星即虎掌也蘇恭說甚明白宋開寶不當重出南星條今併入

**集解**

別錄曰虎掌生漢中山谷及宛句二月八月

四邊有子如虎掌今用多破作三四片方藥不甚

用也恭曰此是由跋宿根其苗一莖莖頭一葉枝

丫扶莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔

有圓牙看如虎掌由跋是新根大如半夏二三倍

四畔無子牙陶說似半夏乃由跋也保昇曰莖頭

有八九葉花生莖間藏器曰天南星生安東山谷

葉如荷獨莖用根頌曰虎掌今河北州郡有之初

生根如豆大漸長大似半夏而扁年久者根圓及

寸大者如雞卵周匝生圓牙三四枚或五六枚三

四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分布

尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠

尾中生一葉如匙裏莖作房旁開一口上下尖中

有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布

地一子生窠九月苗殘取根今冀州人菜園中

種之呼為天南星又曰天南星處處平澤有之二

月生苗似荷梗其莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝

相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石

榴子紅色二月八月采根似芋而圓扁與蒟蒻相

類人多誤采了不可辨但蒟蒻莖斑花紫南星根

小柔膩肌細炮之易裂為可辨爾南星即本經虎

掌也大者四邊皆有牙子采時削去之江州一種

草葉大如掌面青背紫四畔有牙如虎掌生二四

葉為一本冬青不結花實治心疼痛寒熱積氣亦與

虎掌同名故附見之時珍曰大者為虎掌南星小

者為由跋乃一種也今俗又言大

者為鬼臼小者為南星殊為謬誤

**修治**頌曰九月采虎掌根去皮臍入器中湯浸五

裂用時珍曰凡天南星須用一兩以上者佳治風

痰有生用者須以溫湯洗淨仍以白礬湯或入皂

角汁浸三日夜日日換水暴乾用若熟用者須於

黃土地掘一小坑深五六寸以炭火燒赤以好酒

沃之安南星於內瓦盆覆定灰泥固濟一夜取出  
用急用卽以濕紙包於塘灰火中炮裂也一法治  
風熱痰以酒浸一宿桑柴火蒸之常洒酒入甑內  
令氣猛一伏時取出竹刀切開味不麻舌爲熟未  
熟再蒸至不麻乃止脾虛多痰則以生薑渣和黃  
泥包南星煨熟去泥焙用造南星麴法以薑汁罨  
湯和南星木作小餅子安藍內楮葉包蓋待上黃  
衣乃取晒收之造胆星法以南星生研末臘月取  
黃牯牛胆汁和劑納入胆中  
繫惡風處乾之年久者爛佳

氣味苦溫有大毒

別錄曰：微寒。晉曰：虎掌神農雷公苦有毒。岐伯桐君辛有毒。大

明目辛烈平杲曰：苦辛有毒。陰中之陽可升可降  
乃肺經之本藥震亨曰：欲其下行以黃蘗引之。之  
才曰蜀漆爲之使惡莠草。大明曰：畏附子乾薑生  
薑時珍曰：得防風則不麻得牛胆則不燥得火炮  
則不毒生能伏雄黃丹砂煇消主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷

筋痿拘緩利水道

除陰下濕風眩別錄主疝瘕腸

痛傷寒時疾強陰

天南星主中風麻痺除痰下

氣利胃膈攻堅積消癰腫散血墮胎

開寶金瘡折傷

痰血痔傳之

藏器蛇蟲咬疥癬惡瘡大去上焦痰及

眩運

元素主破傷風口噤身強李補肝風虛治痰功

同半夏

好治破癰口眼喎斜喉痺口舌瘡糜結核

解顛

時珍

發明

時珍曰：虎掌天南星乃手足太陰脾肺之藥

味辛而麻故能治風散血氣溫而燥故能勝  
濕除涎性緊而毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜  
楊士瀛直指方云諸風口噤宜用南星夏以人參

石菖蒲

佐之

**附方** 舊十新 **中風口噤**

目瞋無門下藥者開關散

等分五月五日午時合之每用中指點末指齒三

驗 **諸風口噤** 天南星炮制大人三錢小兒三字生

膽汁少許溫服 **小兒口噤** 牙關不開天南星一枚

孔透藥了口中牙關自開也 **小兒驚風** 墜涎

方用生南星同薑汁擦之自開 **小兒驚風** 散用

天南星一兩重一箇換酒浸七伏時取出安新瓦

上煨過炭火炙裂合濕地出火毒為末入硃砂一

分分服半錢煎不湯調下每服 **吐瀉慢驚** 天王散

空 **心** 服午時一服 **吐瀉慢驚** 治小兒

吐瀉或誤服冷藥脾虛生風痰慢驚天南星一箇

重八九錢者去臍黃土坑深三寸炭火五斤煨赤

入好酒半盞安南星在內仍架炭三條在上候發

裂取到再炒熟為末用五錢天麻煨熟研末一錢

麝香一字和勻三歲小兒用半錢以生薑防 **風癩**

風煎湯調下亦治久嗽惡心 錢乙小兒方 **風癩**

**痰迷** 墜痰丸用天南星九蒸九晒為末薑汁麵糊

門冬湯亦可 **小兒癩瘡** 濕紙包煨為末雄猪膽汁

衛生寶鑑 **治癩利痰** 天南星煨香一兩味砂一

調服二字 **治癩利痰** 錢為末猪心血九梧子大

全幼心鑑 **治癩利痰** 天南星生研末自然薑

每防風湯化下 **口眼喎斜** 天南星生研末自然薑

一丸 普濟方 **口眼喎斜** 汁調之左貼右貼左

存方 **角弓反張** 南星半夏等分為末薑汁竹瀝

**傷中風** 胡氏奪命散又名玉真散治打撲金刃傷

及破傷風傷濕發病強直如癩狀者天南

星防風等分為末水調敷瘡出水為妙仍以溫酒

調服一錢已死心尚溫者熱童便調灌二錢闔

關



內傷墜壓者酒和童便連權三破傷風瘡生南星末水調

全瘡四圍水出婦人頭風攻目作痛天南星一箇

以醋一盞沃之蓋定勿令透氣候令研末風痰頭

每服一字以酒調下重者半錢千金方

痛不可忍天南星一兩荆芥葉一兩為末薑汁糊

用天南星茴香等分生研末鹽醋煮麵風痰頭運

糊丸如上述法服並出經効濟世方

言眩吐逆煩懣飲食不下玉壺丸用生南星生半

每服三十九以水先煎沸入藥煮五七沸腦風流

漉出放溫以姜湯吞之魚民和劑方

涕邪風入腦鼻內結硬遂流髓涕大白南星切片

同煎服三四服其硬物自出腦氣流轉髓涕自收

以大蒜草芡末作餅隔紗貼額前熨斗熨之或以

香附薑末頻吹小兒風炒熱毒壅滯涼心壓驚

鼻中直指方一兩入金錢薄荷十片丹砂一錢半龍腦麝香各

一字研末煉蜜丸芡子大每服一九竹葉湯化下

全幼壯人風痰及中風中氣初起星香飲用南

心鑑十四片煎六分溫痰迷心竅壽星丸治心膽被驚

服王碩易簡方竅恍惚健忘妄言妄見天南星一斤先掘土坑一

尺以炭火三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星

在內盆覆定以灰塞之勿令走氣次日取出為末

琥珀一兩珠砂二兩為末生薑汁打麵糊丸梧子

大每服三十九至五十九煎人參石風痰注痛方

首蒲湯下一日三服和劑方

羊躑躅下痰濕臂痛右邊者南星制蒼木等分生

欬嗽大天南星一枚炮製研末每服一錢水一盞

薑三片煎五分溫服每日早午晚各一服

石菖蒲 佐之

**附方** 舊十新 中風口噤 目瞋無門下藥者開關散 用天南星為末入白龍腦

等分五月五日午時合之每用中指點末搯齒三

驗 諸風口噤 天南星炮制大人三錢小兒三字生 薑五片蘇葉一錢水煎減半入雄猪

膽汁少許溫服 小兒口噤 牙關不開天南星一杪 仁齋直指方

孔透藥了口中牙關自開也 小兒驚風 墜涎 方用生南星同薑汁擦之自開

天南星一兩重一箇換酒浸七伏時取出安新瓦 上煨過炭火炙裂合濕地出火毒為末入硃砂一

分分服半錢煎不湯調下每服 吐瀉慢驚 天王散 空 心 服午時一服 經驗方

吐瀉或誤服冷藥脾虛生風痰慢驚天南星一箇 重八九錢者去臍黃土坑深三寸炭火五斤煨赤

入好酒半盞安南星在內仍架炭三條在上候發 裂取到再炒熟為末用五錢天麻煨熟研末一錢

麝香一字和勻三歲小兒用半錢以生薑防 風煎湯調下亦治久嗽惡心 錢乙小兒方 風癩

痰迷 墜痰丸用天南星九蒸九晒為末薑汁麵糊 丸梧子大每服二十九人參湯下石菖蒲麥

門冬湯亦可 小兒癩瘡 濕紙包煨為末雄猪膽汁 衛生寶鑑

調服二字 治癩利痰 天南星煨香一兩硃砂一 全幼心鑑 錢為末猪心血丸梧子大

每防風湯化下 口眼喎斜 天南星生研末自然薑 一丸 普濟方 汁調之左貼右貼左

存方 角弓反張 南星半夏等分為末薑汁竹瀝 破 南星下一錢仍灸印堂 摘玄方

傷中風 胡氏奪命散又名玉真散治打撲金刃傷 及破傷風傷濕發病強直如癱狀者天南

星防風等分為末水調敷瘡出水為妙仍以溫酒 調服一錢已死心尚溫者熱童便調灌二錢闔毆

天南星 一錢 闔毆

內傷墜壓者酒和童便連灌三  
破傷風瘡 生南星末水調

服即避亦可煎服 三因方  
攻目作痛天南星一箇

塗瘡四圍水出 婦人頭風 掘地坑燒赤交藥於中

有劫 普濟方 益定勿令透氣候令研末 風痰頭

以醋一盞沃之 每服一字以酒調下重者半錢 千金方

痛 不可忍天南星一兩荆芥葉一兩為末薑汁糊

用天南星茴香等分生研末鹽醋煮麵 風痰頭運

糊丸如上述法服 並出經効濟世方

夏各一兩天麻半兩白麵二兩為末水丸梧子大

每服三十九以水先煎沸入藥煮五七沸 腦風流

漉出放溫以姜湯吞之 蕙民和劑局方

涕 邪風入腦鼻內結硬遂流髓涕大白南星切片

同煎服三四服其硬物自出腦氣流轉髓涕自收

以大蒜葦荻末作餅隔紗貼額前熨斗熨之或以

香附薑萎末頻吹 小兒風 炒 熱毒壅滯涼心壓驚

鼻中 直指方 一兩入金錢薄荷十片丹 炒 一錢半龍腦麝香各

一字研末煉蜜丸 芡子大每服一九竹葉湯化下

心鑑 全幼 壯人風痰 及中風中氣初起星香飲用南

十四片煎六分溫 痰迷心竅 壽星丸治心膽被驚

十金氣痰欬嗽 玉粉丸南星麴半夏麴陳橘皮各一兩為末自然薑汁打糊丸如梧

子大每服四十九薑湯下寒痰去清氣化痰 三仙橘皮加官桂 東垣蘭室秘藏

中腕氣滯痰涎煩悶頭目不清生南星去皮半夏各五錢並湯泡七次為末自然薑汁和作餅鋪竹

篩內以楮葉包覆待生黃成麴晒乾每用二兩入香附末一兩糊丸梧子大每服四十九食後薑湯

下 王璆 溫中散滯 消導飲食天南星炮高良薑百一選方 炮各一兩砂仁二錢半為末

薑汁糊丸梧子大每薑酒積酒毒 服此即解天南湯下五十九 和劑方 星丸用正端天

南星一片土坑燒赤沃酒一斗入坑放南星盆覆泥固濟一夜取出酒和水洗淨切片焙乾為末入

硃砂末一兩薑汁麴糊丸梧子大每服五十九薑湯下蔡丞相呂丞相常用有驗 楊氏家藏丸

吐泄不止 四肢厥逆虛風不省人事服此則湯回各回陽散天南星為末每服三錢京棗

三枚水二鍾煎入分溫服未省脈服 腸風瀉血又方醋調南星末貼足心 普濟方

諸藥不効天南星石灰炒焦黃色為末酒糊丸梧子大每酒下二十九 普濟方 吐血不止

止 天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿洗焙研末每服一錢以自然銅磨酒調下 勝金方

初生貼額 頭熱鼻塞者天南星炮為末水調小兒貼額上灸手熨之 危氏得効方

解顛 顛開不合鼻塞不通天南星炮去皮為末淡醋調排帛上貼額門灸手熨之立効 錢

乙小兒 解顛脫臼 不能收上用南星末薑汁調直訣 醫說 小兒

兒口瘡 白屑如鵝口不須服藥以生天南星去皮集効 走馬疔蝕 透骨穿熱生南星一箇當心剉空

方 以盞子合定出火毒去麵為末入麝香少許拂瘡數日甚効 經驗方 風濕骨痛

香少許拂瘡數日甚効 經驗方 風濕骨痛

風濕骨痛 星

未塞孔以霜梅會  
喉風喉痺  
天南星一箇  
心入

熟研末薑汁調服一錢甚者准  
痰癥結核  
南星膏

之吐涎愈名如聖散  
博濟方  
治人皮

肌頭面上生瘤及結核大者如拳小者如栗或軟  
或硬不疼不癢宜用此藥不可輒用針灸生天南

星大者一枚研爛滴好醋五七點如無生者以乾  
者為末醋調先用針刺令氣透乃貼之覺癢則頻

由跋  
木經  
下品

釋名

集解

恭曰由跋是虎掌新根大于半夏一二倍四  
生林下前高一尺似薔  
根如雞卵保昇曰春  
一莖莖端有八九葉根  
扁而肉白時珍曰此即

天南星之小者其氣未足不堪服食故醫方罕用  
惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之

側子不如附  
子之義也

正誤

弘景曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏  
翼而布地花紫色根似附子苦酒磨塗腫亦  
効恭曰陶氏所說乃鳶尾根即鳶頭也又言虎掌  
似半夏是以為尾為由跋以由跋為半夏非惟不  
識半夏亦不識鳶尾與由跋也今南人猶以由跋  
為半夏時珍曰陳延之小品方亦以東海鳶頭為  
由跋則其  
訛誤久矣

氣味辛苦溫有毒主治毒腫結熱  
本經

蒟蒻  
宋開  
寶

釋名蒟蒻頭  
開寶  
鬼芋  
圖  
鬼頭

集解

志曰：蕝頭出吳蜀，葉似由跋半夏，根大如碗。生陰地，雨滴葉下生子。又有斑杖苗，相似至

秋有花，直出生赤子，根如蕝頭，毒猛不堪食。虎杖亦名斑杖，與此不同。頌曰：江南吳中出白蕝，蕝亦

曰：鬼芋生平澤，極多人采以爲天南星，了不可辨。巾中所收，往往是此。但南星肌細膩，而蕝蕝莖斑

花紫，南星莖無斑，花黃爲異。爾時珍曰：蕝蕝出蜀中，施州亦有之，呼爲鬼頭。閩中人亦種之，宜樹陰

下，掘坑積糞，春時生苗，至五月移之，長一二尺，與南星苗相似，但多斑點，宿根亦自生苗。其滴露之

說蓋不然。經二年者，根大如碗，及芋魁，其外理白，味亦麻。人秋後采，根須淨潔，或搗或片，段以醃灰

汁，煮十餘沸，以水淘洗，換水更煮五六遍，卽成凍了。切片以苦酒五味淹食，不以灰汁，則不成也。切

作細絲，沸湯灼過，五味調食，狀如水母。絲馬志言其苗似半夏，楊慎丹鉛錄言：蕝蕝卽此者，皆誤也。

王禎農書云：救荒之法，山有粉蕝、蕝蕝、橡栗之類，則此物亦有益于民者也。其斑杖卽天南星之類。

有斑者

根氣味辛寒有毒

李廷飛曰：性冷甚，不益人冷氣，人少食之，生則戟人，喉出血。

主治：癰腫、風毒、摩傳腫，上搗碎以灰汁煮成餅，五

味調食，主消渴

寶開

發明

機曰：按三元延壽書云：有人患瘵，百物不思，見隣家修葺，蕝求食之美，遂多食而瘵愈。又

有病腮癰者，數人多食之，亦皆愈。

附錄：菩薩草

宋綱經頌曰：生江浙州郡，凌冬不凋，秋冬有花，苗出赤子，如蕝頭。冬月采

根，用味苦無毒，主中諸毒，食毒酒，研服之。又諸虫傷，搗汁飲，并傳之。婦人妊娠，欬嗽，搗篩蜜丸服，効

半夏

本經下品

釋名守田本經水玉本經地文別錄和姑本經時珍曰禮記月令五月半

夏生蓋當夏之半也故名守田會意水玉因形

集解別錄曰半夏生槐里川谷五月八日采根暴乾普曰生微丘或生野中二月始生葉三三

相偶白花圓上弘景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久恭曰所在

皆有生半澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用功狀殊異其

苗似是由跋誤以為半夏也頌曰在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似

竹葉而生江南者似芍藥葉根下相重上大下小皮黃肉白五月八月采根以灰裏二日湯洗暴乾

蜀圖經云五月采則虛小八月采乃實大其平澤生者甚小名羊眼半夏由跋絕類半夏而苗不同

敷曰白傍幾子真似半夏只是咬着微酸不入藥用

修治弘景曰凡用以湯洗十許過今滑盡不爾有毒載人咽喉方中有半夏必須用生薑者以

制其毒故也敷曰修事半夏四兩用白芥子末二兩攪醋二兩攪濁將半夏投中洗三適用之若洗

涎不盡令人氣逆肝氣怒滿時珍曰全治半夏惟洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯脹乾切片薑

汁拌焙入藥或研為末以薑汁入湯浸澄三日瀝去涎水晒乾用謂之半夏粉或研末以薑汁和作

餅子日乾用謂之半夏餅或研末以薑汁白礬湯和作餅楮葉包置籃中待生黃衣日乾用謂之半

夏麴白飛霞醫通云痰分之病半夏為主造而為越尤佳治濕痰以薑汁白礬湯和之治風痰以薑

汁及皂莢煮汁和之治火痰以薑汁竹瀝或荆瀝和之治寒痰以薑汁礬湯入白芥子末和之此皆

造麴妙法也

根氣味辛平有毒別錄曰生微寒熟溫生令人吐熟令人下湯洗盡滑用元素曰

味辛苦性溫氣味俱薄沉而降陰中陽也（好古曰）辛厚苦輕陽中陰也入手陽明大陰少陰三經之  
才曰射于為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮  
龜甲反烏頭權曰柴胡為之使忌羊血海藻佐糖  
元素曰熱痰佐以黃芩風痰佐以南星寒痰佐以  
乾薑痰痞佐以陳皮白朮多用則瀉脾胃諸血證  
及口渴者禁用為其燥津液也（主）治傷寒寒熱心下  
也孕婦忌之用生薑則無害

堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗（本）消

心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時

氣嘔逆消癰腫療痰黃悅澤面目墮胎（別）消痰下

肺氣開胃建脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩癰腫

除瘤瘰氣（甄）治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧

大治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬消胸中痞膈上

痰除胸寒和胃氣燥脾濕治痰厥頭痛消腫散結

元素治脊稜骨痛（震）補肝風虛（好）除腹脹目不得瞑

白濁夢遺帶下（珍）

發明（權曰）半夏使也虛而有痰氣宜加用之（頌曰）

潤也半夏之辛以散逆氣結氣除煩嘔發音聲行

水氣而潤腎燥好古曰經云腎主五液化為五濕

自入為唾入肝為泣入心為汗入脾為痰入肺為

涕有痰曰嗽無痰曰欬痰者因欬而動脾之濕也  
半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也  
效無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流濕  
潤燥也俗以半夏為肺藥非也止嘔吐為足陽明  
除痰為足太陰柴胡為之使故今柴胡湯中用之



雖為止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱是又為足  
 少陽陽明也宗奭曰今人惟知半夏去痰不言益  
 脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡困困則不能治  
 水經云水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑  
 一兩半夏大棗各三十枚水一升菟籠中慢火燒  
 為熟水時呷之便已也趙繼宗曰丹溪言二陳湯  
 治一身之痰世醫執之凡有痰者皆用夫二陳內  
 有半夏其性燥烈若風痰寒痰濕痰食痰則相宜  
 至于勞痰失血諸痰用之反能燥血液而加病不  
 可不知機曰俗以半夏性燥有毒多以貝母代之  
 貝母乃太陰脾經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃  
 經之藥何可代也夫欬嗽吐痰虛勞吐血或痰中  
 見血諸鬱咽痛喉痺肺癰肺痿瘰疬疝婦人乳難此  
 皆貝母為向導半夏乃禁用之藥若涎者脾之液  
 美味膏梁炙煇皆能生脾胃濕熱故涎化為痰久  
 則痰火上攻令人昏瞶口禁偏廢僵仆蹇澹不語  
 生死且夕自非半夏南星豈可治乎若以貝母代  
 之則翹首待斃矣特珍曰脾無留濕不生痰故脾

為生痰之源肺為貯痰之器半夏能主痰飲及腹  
 脹者為其醴滑而味辛性溫也涎滑能潤辛溫能  
 散亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂  
 辛走氣能化液辛以潤之是矣絮古張氏云半夏  
 南星治其痰而欬嗽自愈丹溪朱氏云二陳湯能  
 使大便潤而小便長聊攝成氏云半夏辛而散行  
 水氣而潤腎燥又和劑局方用半硫丸治老人虛  
 秘皆取其滑潤也世俗皆以南星半夏為性燥誤  
 矣濕去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方  
 治咽痛痰痺吐血下血多用二物非禁劑也二物  
 亦能散血故破傷打撲皆主之惟陰虛勞損則非  
 濕熱之邪而用利竅行濕之藥是乃重竭其精液  
 醫之罪也昔藥之咎黃甲乙經用治夜不眠是果  
 性燥者乎岐伯云衛氣行于陽陽氣滿不得入于  
 陰陰氣虛故目不得瞑治法飲以半夏湯一劑陰  
 陽既通其臥立至方用流水千里者八升揚之萬  
 遍取清五升煮之炊以葦薪大沸入秫米一升半  
 夏五合煮一升半飲升一盃日三以知為度病新

發者覆盃則臥汗出則已久者三飲而已

**附方** 舊十五新 法制半夏

清痰化飲壯脾順氣用大半夏湯洗七次焙乾

再洗如此七轉以濃米泔浸一日夜每一兩用白礬一兩半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫水化又浸七日以漿水慢火內煮沸焙乾收

之每嚼一二粒薑湯送化下 御藥院方 紅半

**夏法** 消風熱清痰涎降氣利咽大半夏湯浸焙制如上述法每一兩入龍腦五分硃砂為衣染之

先鋪燈草一重約一指厚排半夏上再以燈草蓋一指厚以炒豆焙之候乾取出每爵一兩粒溫

水送下。御藥院方 **化痰鎮心** 祛風利膈辰砂半夏丸用半

以水浸三日生絹濾去滓澄清去水晒乾一兩入辰砂一錢薑汁打糊丸每薑湯下七十九

此周府方 **化痰利氣** 三仙丸方 消痰開胃 去胸膈

也 袖珍 見虎掌下

門方用半夏湯泡焙乾為末自然薑汁和作餅濕紙裏煨香以熟水二盞同餅二錢入塩五分煎一

盞服之大壓痰毒及酒食傷極驗。經驗用半夏天南星各二兩為末水五升入壘內浸一宿去清

水焙乾重研每服二錢 **中焦痰涎** 利咽清頭目進水二盞薑三片煎服 飲食半夏泡七

次四兩枯礬一兩為末薑汁打糊或煮棗肉和丸梧子大每薑湯下十五丸寒痰加丁香五錢熱痰

如寒水石煨四兩名 **老人風痰** 大腑熱不識人及玉液丸 和劑局方 肺熱痰實不利半

夏炮七次焙消石半兩為末入白麵搗勻 **膈壅風** 水和丸綠豆大每薑湯下五十九 普濟

**痰** 半夏半斤酸漿浸一宿溫湯洗五十遍去惡氣日乾為末漿水搜作餅日乾再研為末每五兩

入生龍腦一錢以漿水濃脚和丸雞頭子大紗袋盛避風處陰乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下 御藥院方 **搜風化痰** 定志安神利頭目辰砂化痰丸用

枯礬各半兩為末薑汁打糊丸梧子大每痰厥中

版三十左食後薑湯送下和劑局方

風省風湯用半夏湯泡入兩甘草炙二兩防風四

風痰頭運用生半夏生天南星寒水石煨各一

兩天麻半兩雄黃二錢小麥麵三兩為末木和成

餅水煮熟浮起漉出搗丸梧子大每服五十九薑湯

下極効亦治風痰咳嗽二便不通風痰濕痰青壺

風痰頭痛紫古活法機要方

夏一斤天南星半兩各湯炮晒乾為末薑汁和作

餅焙乾入神翅半兩白木末二兩枳實末二兩薑

丹麵糊丸梧子大每服五風痰喘逆兀兀欲吐眩

十丸薑湯下葉氏方

一兩雄黃三錢為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每

服三十九薑湯下已吐者加檳榔活法機要風

痰喘急千縉湯用半夏湯洗七箇甘草炙皂莢炒

劑局上焦熱痰欬嗽制過半夏一兩片黃芩末二

方元淡薑湯食後服此周憲肺熱痰嗽制半夏栝樓

王親制方也袖珍方

末薑汁打糊丸梧子大每服二三十九熱痰欬嗽

和劑局方

奇効方

金花

各一

成

湯

九

半

壺

青

痰

濕

痰

風

痰

頭

運

生

天

下

入

兩

甘

草

炙

二

兩

防

風

四

方

煎

服

二

兩

石

煨

各

一

兩

天

南

星

寒

水

石

煨

各

一

兩

木

和

成

湯

五

十

九

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

二

錢

小

麥

麵

三

兩

為

末

薑

汁

浸

蒸

餅

丸

一

兩

雄

黃

**結胸痛** 正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯  
主之半夏半升黃連一兩栝樓實大者一

箇水六升先煮栝樓至三升去滓內二  
味煮取二升分三服 仲景傷寒論 濕痰心痛

喘急者半夏油炒為末 粥糊丸綠豆  
大每服二十九薑湯下 丹溪心法 急傷寒病

四錢生薑七片酒一盞煎  
服 胡洽居士百病方 結痰不出 語音不清年

粉丸半夏兩桂心一字草烏頭半字為末薑汁  
浸蒸餅丸茨子大每服一丸夜臥含燕 活法機

要 **停痰冷飲** 嘔逆橘皮半夏湯用半夏水煮熟陳  
橘皮各一兩每服四錢生薑七片水

二盞煎一盞溫 **停痰留飲** 胸膈滿悶氣短惡心飲  
服 和劑局方 食不下或吐痰水茯苓

半夏湯用半夏泡五兩茯苓三兩每服四錢薑  
七片水一鍾半煎七分甚捷徑 和劑局方 支

**飲作嘔** 嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘  
不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤憤並宜

小半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水  
七升煮一升五分服 張仲景金匱要畧 噦逆

**欲死** 半夏生薑湯主 痘瘡噦氣 方同 嘔噦眩悸 穀  
之即上方也 得下半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三

兩切以水七升煎一升半分溫服之 金匱要畧  
目不得眠 見發 心下悸忪 半夏麻黃丸半夏麻黃

每服三十丸日 **傷寒乾哕** 半夏熟洗研末生薑湯  
三 金匱要畧 服一錢七 梅師方

**嘔逆厥逆** 內有寒痰半夏一升洗滑焙研小麥麩  
一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚

日三服稍增至十五枚旋煮旋吞覺病減再作  
忌羊肉錫糖此乃許仁則方也 外臺秘要 嘔

**吐反胃** 大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升  
水一斗二升和揚之一百二十遍煮取三

升半溫服一升日再服亦 **胃寒噦逆** 停痰留飲藿  
治膈間支飲 金匱要畧 香半夏湯用

本草綱目 卷一 下 三十五

半夏湯泡炒黃二兩藿香葉一兩丁香半兩小兒

吐瀉 脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢

小兒痰吐 或風壅所致或痰嗽發熱飲食即吐半

和包丁香用麴重包煨熟去麴為末生薑自然汁

議 妊娠嘔吐 半夏二兩人參乾薑各一兩為末薑

服 仲景 霍亂腹脹 半夏桂等分為末小兒腹

脹 半夏末少許酒和丸粟米大每服二丸薑湯下

子母 黃疸喘滿 小便自利不可除熱半夏生薑各

秘錄 有人氣結而死心下暖以此伏暑引飲 脾胃不利

半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤為末薑汁

老人虛秘 冷秘及疰癘冷氣半硫丸半夏炮炒生

子大每空心溫酒下 失血喘急 吐血下血崩中帶

宿痰用半夏槌扁以薑汁和麴包煨黃研末米

濁夢遺 半夏一兩洗十次切破以木猪苓二兩同

山藥糊丸梧子大每服三十九茯苓湯送下腎氣

閉而一身精氣無所管攝妄行而遺者安用此方

蓋半夏有利性猪苓導水使腎氣通也 八般頭風

三次見効半夏末入百草霜少許作紙燃燒烟就

少陰咽痛 生瘡不能言語齶不出者苦酒湯主之

黃納苦酒令小滿入半夏在內以鑲子坐于炭火上煎三沸去滓置盃中時時嚙之極驗未瘥更作

○伴景 喉痺腫塞 生半夏末嚙鼻內 骨哽在咽 傷寒論 喉痺腫塞 涎出効 集簡方 骨哽在咽 白芷等分為末水服方寸七 重舌木舌 脹大塞口 當嘔出忌羊肉 外臺秘要 水煮過再炮片時 乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱冷吐之 小

兒顛陷 乃冷也水調半 面上黑氣 半夏焙研米醋 不計流數從早至晚如此三日皂 癩風看落 夏羊 角湯洗下面榮如玉也 摘玄方 產後運絕 和九大豆大

屎燒焦等分為末自然 盤腸生產 產時子腸先出 薑汁日調塗 聖濟錄 產後不收者名 盤腸產以半夏末頻嚙鼻 產後運絕 和九大豆大

中則上也 婦人良方 產後運絕 和九大豆大 納鼻中即愈此篇 小兒驚風 生半夏一錢皂角半 鵝法也 肘後方 小兒驚風 錢為末吹少許入鼻

名噎驚散 卽 卒死不寐 半夏末吹鼻中卽活南 甦 直指方 夫人紫靈魏元君方也

五絕急病 一曰白縊二曰墻壁三曰溺水四曰麤 人鼻中心溫者一日 癰疽發背 及乳瘡半夏末雞 可活也 子母秘錄 癰疽發背 子自調塗之 肘

後次奶腫痛 半夏一箇煨研酒服立愈一方以末 打撲瘀痕 水調半夏末塗之 宿 遠行足跡 方同 簡金刃不出 人骨脈中者半夏白歛等分為末酒

李筌大 飛蟲入耳 生半夏末 淋油調塗 蠍蠱螫人 自經 耳門外 本事方 蠍蠱螫人 半夏末水調塗之立 蝎癭五孔 相通者半夏末水

出 錢相公篋中方 蝎癭五孔 調塗之日二 聖 惠 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

方 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

方 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

方 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

方 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

方 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

方 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

方 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

方 咽喉骨哽 半夏白芷等分為末水服方寸 外臺秘要

本草綱目卷十七  
莖涎主治煉取塗髮眉墮落者即生

蚤休 本經下品

釋名 蚤休 別錄 紫河車 日華 重臺 唐本 重樓金線

唐本 三層草 綱目 七葉一枝花 蒙 草甘遂 唐本 白甘遂 時珍

曰 重蛇之毒得此治之即休故有蚤休螿休諸名

重臺三層因其葉狀也金線重樓因其花狀也甘遂因其根狀也紫

河車因其功用也 **集解** 別錄曰蚤休生山陽川谷及宛句 **恭曰**今謂

一莖六七葉似王孫鬼曰菀麻葦葉有二三層根

如肥大苜蓿細肌脆白保昇曰葉似鬼曰牡蒙年久者二重根如紫參皮黃肉白五月采根日乾

天明曰根如尺二蝶蚣大如肥紫苜蓿 **頌曰**即紫

河車也今河中河陽華原文州及江淮間亦有之

葉似王孫鬼曰等作二三層六月開黃紫花蕊赤

黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥萇皮赤肉

白四月五月采之 **宗奭曰**蚤休無旁枝止一莖挺

生高尺餘顛有四五葉葉有岐似苦杖中心又起

莖亦如是生葉惟根入藥用 **時珍曰**重樓金線處

處有之生于深山陰濕之地一莖獨上莖當葉心

葉綠色似芍藥凡二三層每一層七葉莖頭夏月

開花一花七瓣有金絲蕊長三四寸王屋山產者

至五七層根如鬼曰蒼朮狀外紫中白有粘糯二

種外丹家采制三黃砂永入藥洗切焙用俗諺云

七葉一枝花深山是我家瘡疽如遇者一似手拈

根氣味苦微寒有毒

大明曰冷無毒伏雄黃丹砂蓬砂及鹽

主治驚

癩搖頭弄舌熱氣在腹中

本經 癩疾癰瘡除蝕下三

蟲去蛇毒別錄生食一升利水唐本治胎風手足搖能

吐泄療癰大明去瘧疾寒熱時珍

發明恭曰摩醋傅瘰腫蛇毒甚有效時珍曰紫河車足厥陰經藥也凡本經驚癇瘧疾瘰癧瘰癧腫者宜之而道家有服食法不知果有益否也

附方新五服食法紫河車根以竹刀刮去皮切作骰子大塊麪裹入瓷甌中懸風處待乾每服三九五

漉出凝冷入新布袋中懸風處待乾每服三九五更初面東念呪井水下連進三服即能休糧若

飲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸煮稀粥漸漸食之呪曰天朗氣清金雞鳴吾今服藥欲長生吾

今不飢復不渴賴得神仙草有靈小兒胎風手足搖搦用蚤休即

錢冷水下○慢驚發搐帶有腸證者白甘遂末即驚生易簡方

同于慢火上炒焦黃研勻每服一字中鼠莽毒金

煎麝香薄荷湯調下錢乙小兒方重樓根磨水服咽喉穀賊腫痛用重臺赤色者川

即愈集簡方消半兩半夏泡一分為末蜜丸艾子大含之聖惠方

鬼曰本經校正併入圖經

釋名九曰本經天曰別錄鬼藥綱目解毒別錄爵犀本經馬目

毒公本經害母草綱目羞天花綱目木律草綱目瑞田草綱目

獨腳蓮本草獨荷草土宿山荷葉綱目旱荷綱目八角盤

綱目唐婆鏡弘景曰鬼日根如射干白而味甘九日

而日如馬眼故名馬目毒公殺蠱解毒故有犀名其葉如鏡如盤如荷而新苗生則舊苗死故有鏡



盤荷蓮害母諸名蘇東坡詩集云瑞田草俗號唐  
 婆鏡卽本草鬼日也歲生一日如黃精根而堅瘦  
 可以辟穀宋祁劔南方物貨云羞天花蜀地處處  
 有之依莖綴花蔽葉自隱俗名羞天子改爲羞寒  
 花卽本草鬼日也贊云胃寒而茂莖修葉廣附莖  
 作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○別有羞天  
 草與此不同  
 卽海芋也

集解

別錄曰鬼日生九真山谷及宛句二月八月

射干木草又似鉤吻有兩種出錢塘近道者味甘  
 上有叢毛最勝出會稽吳興者大而味苦無叢毛  
 方劣今馬日壽公狀如黃精根其日處似馬眼而  
 柔潤今方家多用鬼日而少用壽公不知此邪復  
 乖越如此(恭曰)鬼日生深山巖石之陰葉如蓖麻  
 重樓輩生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖  
 莖枯則爲一曰假令生來二十年則有二十日豈  
 惟是日耶根肉皮鬚並似射干今俗用多是射干

而江南別送一物非真者今荊州當陽縣硤州遠  
 安縣襄州荆山縣山中並貢之亦極難得(頌曰)今  
 江寧府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之並如  
 蘇恭所說花生莖間赤色三月開後結實又一說  
 鬼日生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一  
 葉如繖且時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花  
 紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未常見日一  
 年生一莖既枯則生一日及八九年則八九日矣  
 然一年一日生而一日腐蓋陳新相易也故俗名  
 害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前  
 年之曰腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀  
 雖相似然日形淺薄與鬼日大異鬼日如八九箇  
 南星側比相疊而色理正如射干用者當使人求  
 苗采之市中不復有也(時珍曰)鬼日根如天南星  
 相疊之狀故市人道謂小者爲南星大者爲鬼日  
 殊爲謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底開花俗名  
 羞天花卽鬼日也歲生一日滿十二歲則可爲藥  
 今方家乃以鬼燈檠爲鬼日誤矣又鄭樵通志云

鬼曰葉如以荷形如鳥掌年長一莖莖枯則根為一曰亦唯與角盤以其葉似之也據此二說則似是今人謂獨脚蓮者也又名山荷葉獨荷草旱龍門山王屋山有之一莖獨上莖生葉心而中空一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫探其葉作瓜李香開花在葉下亦有無花者其根全似蒼朮紫河車丹爐家采根制三黃砂藥或云其葉八角者更靈或云其根與紫河車樣但以白色者為河車赤色者為鬼曰恐亦不然而唐辛玉册謂蚤休陽草旱荷陰草亦有分別陶弘景以馬目毒公與鬼曰為二物殊不知正是一物而有二種也又唐獨孤活丹房鏡源云木律草有二種根皆似南星赤莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作數層葉似蓖麻而青背紫而有細毛葉下附莖開一花狀如鈴鐸倒垂青白色黃蕊中空結黃子風吹不動無風自搖可制砂汞按此即鬼曰之二種也其說形狀甚明

根氣味辛溫有毒

別錄曰微溫弘景曰甘溫有毒權曰苦之才曰長垣衣

主治殺蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

本經殺大毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去月

中膚翳不入湯別錄主尸疰殭瘕勞疾傳尸瘦疾甄權

下死胎治邪瘧癰疽蛇毒射工毒時珍

發明頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之天日今福州人三月采瑤田草根葉焙乾搗末

蜜丸服治風疾

附方新子死腹中胞破不生此方累效救人歲萬數也鬼曰不拘多少黃色者去

手為細末不用篩羅只燃之如粉為度每服一錢無灰酒一盞同煎八分通口服立生如神名一字



瓣上有細文秋結實作房中子黑色一說射干多  
生山崖之間其莖雖細小亦類木故荀子云西方  
有木名曰射干莖長四寸生於高山之上是也陶  
弘景所說花白者自是射干之類震亨曰根為射  
干葉為烏髮紫花者是紅花者非杻曰按諸注則  
射干非一種有花白者花黃者花紫者花紅者丹  
溪獨取紫花者必曾試有驗也時珍曰射干即今  
扁竹也今人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶其花  
三四月開六出大如萱花結房大如柳指頗似泡  
桐子一房四隔一隔十餘子子大如胡椒而色紫  
極硬咬之不破七月始枯陶弘景謂射干為尾是  
一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是為尾紅花者是  
射干韓保昇謂黃花者是射干蘇頌謂花紅黃者  
是射干白花者亦其類朱震亨謂紫花者是射干  
紅花者非各執一說何以憑依謹按張揖廣雅云  
鸛尾射干也易通卦驗云冬至射干生土宿真君  
本草云射干即扁竹葉扁生如側于掌形莖亦如  
之青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江

南湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制  
丹砂能拒火據此則鸛尾射干本是一類但花色  
不同如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同  
屬也大抵入藥功不相遠藏器曰射干之名有三  
佛經射干貂襜此是惡獸似青黃狗食人能緣木  
阮公云射干臨層城者是樹殊有高大者本草射  
干是草即今人所種者也

**根修治** 教曰凡采根先以米泔水浸一宿漉出  
然後以筆竹葉煮之從午至亥日乾用

**氣味苦平有毒** 別錄曰微寒權曰有小毒元素曰苦陽中

陰也時珍曰主治欬逆上氣喉痺咽痛不得消息  
寒多服瀉人

散結氣腹中邪逆食飲大熱本經療老血在心脾間

欬唾言語氣臭散胸中熱氣別錄苦酒摩塗毒腫景

治疰氣消瘀血通女人月閉甄權消痰破癥結胸膈

滿腹脹氣喘眩癖開胃下食鎮肝明目大明治肺氣

喉痺為佳宗奭去胃中癰瘡元素利積痰疝毒消結核

震亨降實火利大腸治瘧母時珍

**發明**震亨曰射干屬金有木與火行太陰厥陰之

積痰使結核自消甚捷又治便毒此足厥陰

濕氣因疲勞而發取射干三寸與生薑同煎食前

服利三兩行甚效時珍曰射干能降火故古方治

喉痺咽痛為要藥孫真人千金方治喉痺有烏嬰

膏張仲景金匱玉函方治欬而上氣喉中作水雞

聲有射干麻黃湯又治瘧母鼈甲煎丸亦用烏扇

燒過皆取其降厥陽相火也火降則血散腫消而

痰結自解癥瘕自除矣

**附方**舊二新八咽喉腫痛射干花根山豆根陰乾為傷

寒咽閉腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令焦喉

痺不通漿水不入外臺祕要用射干一片含嚙汁

良○醫方大成用扁竹新根搗汁嚙之六

腑動即解或醋研汁嚙引涎出亦妙○便民方用

紫蝴蝶根一錢黃芩生甘草桔梗各五分為末水

調頓服立愈二便不通諸藥不効紫花扁竹根生

名奪命散水蠱腹大動搖水聲皮膚黑用鬼扇根搗陰

通○普濟疝腫刺發時腫痛如刺用生射干搗汁乳癰初腫

扁竹根如僵蠶者同葶藶根為中射工毒生瘡者

末蜜調傅之神効永類方烏嬰丹

麻各二兩水三升煎二升溫服

以滓傅瘡上姚僧坦集驗方

三三五

鳥尾 本經 下品

釋名鳥園 本經 根名鳶頭 時珍曰並以形命

鳥園 錄曰鳥鳶生九疑山谷五月采弘景曰方

用者頭當是其根療體相似而本草不題恭曰此

草在有人之家亦種葉似射干而潤短不抽長

花紫碧色根似高良薑皮黃肉白嚼之戟人咽

與射干全別射干花紅抽莖長根黃有白保昇

曰草名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根葉似射干布

池生黑根似高良薑而節大數筒相連九月十月

采根日乾時珍曰此即射干之苗非別一種也肥

地者莖長根粗瘠地者莖短根瘦其花日有數色

諸家皆是分陳廷之小品方言東海

鳶頭即山巖者亦訛也東海山之故耳

氣味苦平有毒 恭曰有小毒 主治蠱毒邪氣鬼疰諸毒

破癥瘕積聚去水下三蟲 殺鬼魅療頭眩

附方 舊一 飛尸遊蠱 着喉中氣欲絕者鳶尾根削

為佳 陳藏 鬼魅邪氣 四物鳶頭散東海鳶頭黃

器本草拾遺 未酒服方寸七飲令病人見鬼增防葵一分飲

知鬼又增一分立驗不可多服 陳延之小品

玉簪 綱目 釋名白鶴仙 時珍曰並以

集解 時珍曰玉簪處處人家栽為花草二月生苗

有尖葉上紋如車前葉青白色頗嬌瑩六七月抽

莖莖上有細葉中出花朵十數枚長一三十本小

未大未開時正如玉搔頭簪形又如羊肚蕈茹

之狀開時微綻四出中吐黃蕊頗香不結子其根

本草綱目卷之十一  
連生如鬼白射干生薑輩有鬚毛舊莖死則根有  
一白新根生則舊根腐亦有些紫花者葉微狹皆鬼  
白射干之屬

根氣味甘辛寒有毒主治搗汁服解一切毒下骨

硬塗癰腫

附方 新乳癰初起 內消花即下着花取根搗  
酒服以濟傳之 海上方 婦人

斷產 白鶴仙根白鳳仙子各一錢半紫葳二錢半  
辰砂二錢搗末蜜和丸梧子大產內三十一日

以酒半盞服之不可着牙 解斑蝥毒 玉簪根搗水

齒能損牙齒也 趙真人下魚骨哽 然片以竹筒灌人刺中其骨自  
下平可着牙齒 ○ 玉簪根乾者一錢白

雁仙乾坤生意 刮骨取牙 砒三分白礬七分蓬

砂二分威靈仙三分草烏頭一分半為末以  
少許點疼處即自落也 余居士選奇方

葉氣味 同 主治 蛇虺螫傷搗汁和酒服以渣傳之

中心留孔洩氣 時珍

鳳仙 綱目

釋名 急性子 救 旱珍珠 綱目 金鳳花 綱目 小桃紅 救 夾

竹桃 救 海蔘 納音 染指甲草 救 菊婢 時珍曰其花頭

然如鳳狀故以名之女人采其花及葉包染指甲  
其實狀如小桃老則迸裂故有指甲急性小桃諸

名宋光宗李后諱鳳宮中呼為好女兒  
花張宛丘呼為菊婢韋居呼為羽客

集解 時珍曰鳳仙人家多種之極易生二月下子  
五月可再種苗高二三尺莖有紅白二色其

大如指中空而脆葉長如尖似桃柳葉而有鋸齒  
極間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自  
變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍  
然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之  
即自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色  
人采其肥莖肉配以充蒿笋嫩華酒浸一宿亦可  
食但此草不生虫蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也

**子氣味**微苦溫有**小毒****主治**產難積塊噎膈下骨

**哽透骨通竅**時珍

**發明**時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨軟堅庖  
人烹魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也

緣其透骨最能損齒與玉簪根同凡  
服者不可着齒也多用以莨麻子隨年數搗塗足心

**附方**新**產難催生**鳳仙子二錢研末水服勿近牙  
外以莨麻子隨年數搗塗足心

**噎食不下**鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒  
丸綠豆大每服八粒溫酒下不可

**咽中骨哽**欲死者白鳳仙子研水  
一大呷以竹筒灌入咽

**牙齒欲取**金鳳花子研末  
入砒少許點疼

**小兒痞積**急性子水菘花子大黃各一  
兩俱生研末每味取五錢外

用皮消一兩拌勻將白鷄鴿一箇或白鴨亦可去  
毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用絲紮  
定沙鍋內入水三碗重重紙封以小火煑乾將鴿  
鴨翻調焙黃色冷定早晨食之日酉時疾軟三日  
大便下血病去矣忌冷物  
百日孫天仁集効方

**花氣味**甘滑溫無毒**主治**蛇傷糯酒服即解又治

腰脇引痛不可忍者研餅晒乾為末空心每酒服



三錢活血消積

時珍

**附方** 新 風濕臥床

不起用金鳳花栢子仁朴消木瓜煎湯洗浴每日二三次內服

獨活寄生湯

吳曼扶壽精方

根葉氣味苦甘辛有小毒**主治**雞魚骨哽誤吞銅

鐵杖樸腫痛散血通經軟堅透骨

時珍

**附方** 新 咽喉物硬

金鳳花根嚼爛噙骨自下雞骨尤効卽以溫水漱口免損齒

也亦治誤吞銅鐵

打杖腫痛鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一

夜血散卽愈冬月收取乾者研末

馬患諸病白鳳

水和塗之葉廷器通變要法

連根葉熬膏遇馬有病抹其眼四衛生易簡方

坐拏草

宋圖經

**集解**

頌曰生江西及滁州六月開紫花結實采其苗入藥甚易得後因人用有効今頗貴重

珍曰按一統志云

出吉安永豐縣

氣味辛熱有毒**主治**風痺壯筋骨兼治打撲傷損

蘇頌

**發明**

頌曰神醫普救方治風藥中已有用者**時珍**

治膈上虛熱咽喉噎塞小便赤瀉神困多睡有坐

拏丸用坐拏草大黃赤芍藥木香升麻麥門冬黃

芪木通酸棗仁薏苡仁枳殼等分為末

蜜丸梧子大每服二十九麥門冬湯下

**附錄** 狎不蘆

時珍曰按周密癸辛雜志云漠北回地方有草名狎不蘆土人以少許

磨酒飲即通身麻痺而死加以刀斧亦不知至三日則以少藥投之自活御藥院中亦儲之貪官汚吏罪甚者則服百日丹皆用此也昔華陀能剗腸條胃豈不有此等藥耶

### 曼陀羅花

釋名風茄兒

山茄子

時珍曰法華經言佛說法

北斗有陀羅星使者手執此花故後人因以名花曼陀羅梵言雜色也茄乃因葉形爾姚伯聲花品呼為惡客

### 集解

時珍曰曼陀羅生北土人家亦栽之春生夏

葉如茄葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛花而大積花中折駢葉外包而朝開夜合結實圓而有丁拐中有小子八月采實

花子氣味辛溫有毒生治諸風及寒濕脚氣煎湯

洗之又主驚癇及脫肛并入麻藥

時珍

### 發明

時珍曰相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令人舞予嘗試之飲須半酣更令一人或笑或舞引之乃驗也八月采此花七月采火

麻子花陰乾等分為末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦也

### 附方

新面上生瘡

曼陀羅花晒乾研末少許貼之

小兒慢

### 驚

曼陀羅花七葉重一字天麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半為末每服半

錢薄荷湯調下

大腸脫肛

曼陀羅子連殼一對橡斗十六箇同剉水煎三

五沸入朴消少許洗之

儒門事親

羊躑躅

本經下品

**釋名**黃躑躅

綱目黃杜鵑

蒙羊不食草

拾遺鬧羊花

綱目

驚羊花

綱目老虎花

綱目玉枝

別錄弘景曰羊食其葉躑躅而死故名鬧當作

惱惱

**集解**

別錄曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山三月采花陰乾弘景曰近道諸山皆有之花黃

似鹿葱不可近眼恭曰花亦不似鹿葱正似旋花色黃者也保昇曰小樹高二尺葉似桃葉花黃似

瓜花三月四月采花日乾頌曰所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄花

山石榴華正黃色羊食之則死今嶺南蜀道山谷

遶生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥時珍

曰韓保昇所說似桃葉者最的其花五出蕊瓣皆

黃氣味皆惡蘇頌所謂深紅色者即山石榴名紅

躑躅者無毒與此別類張揖廣雅謂躑躅一名决

光者誤矣决光决明也按唐李紳文集言駱谷多

山枇杷毒能殺人其花明艷與杜鵑花相似樵

者識之其說似羊躑躅未知是否要亦其類耳

**花氣味**辛温有大毒

權曰惡諸石及麵不入湯使

**主治**賊風在皮膚中淫淫痛温瘡惡毒諸痺

本經邪

氣鬼疰蠱毒

別錄

**發明**

頌曰古之大方多用躑躅如胡洽治疔行赤

散及治百病風濕等毒王酒中亦用躑躅花

今醫方將脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑

躑花散云甚勝時珍曰此物有大毒曾有人以其

根入酒飲遂至於斃也和劑局方治中風癱瘓伏

虎丹中亦用之不多服耳

本草綱目卷之十一  
附方 新風痰注痛 躑躅花天南星並生時同搗作餅

之臨時取焙為末蒸餅丸梧子大每服三九濕酒下腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大豆續傳

信痛風走注 黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞酒各一盞徐徐服大吐大泄一服便能動也

醫學集成 風濕痺痛 手足身體收攝不遂肢節疼痛言語蹇澀躑躅花酒

特蒸一炊久晒乾為末每以牛乳 風蟲牙痛 躑躅花酒一合酒二合調服五分 聖惠方

草烏頭二錢半為末化臘丸豆大 綿包一丸咬之追涎 海上仙方

附錄 山躑躅 時珍曰處處山谷有之高者四五尺而花繁一枝數萼二月始開花如羊躑躅而蒂如石榴花有紅者紫者五出者千葉者小兒食其花味酸無毒一名紅躑躅一名山石榴一名映山紅一名杜鵑花其黃色者即有毒羊躑躅也

不契草 拾遺藏器曰生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不契者是也味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之亦浸酒服時珍曰此草似羊躑躅而云無毒蓋別有此也

芫花 本經 校正 自木部 移入此

釋名 杜芫 赤芫 去水 毒魚 頭痛花 兒

草 吳 敗華 根名黃大戟 蜀桑 別錄時珍曰芫

詳去水言其功毒魚言其性大戟言其似也俗人因其氣惡呼為頭痛花山海經云首山其草多芫是也

集解 別錄曰芫花生淮源川谷三月三日采花陰乾普曰芫根生邯鄲二月生葉青色加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生三月采花五月采葉八月九月采根陰乾保昇曰近道處處

大草綱目卷之十一

集解

別錄曰

芫花生淮源川谷三月三日采花陰乾普曰芫根生邯鄲二月生葉青色加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生三月采花五月采葉八月九月采根陰乾保昇曰近道處處

大草綱目卷之十一

集解

有之苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月花發紫碧色葉未生時收采日乾葉生花落即不堪用也頌曰在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細今絳州出者花黃謂之黃芩花時珍曰顧野王玉篇云芩木出豫章煎汁藏果及卵不壞洪邁容齋隨筆云今饒州處處有之莖幹不純是木小人爭鬪者取葉按捺皮膚蚰作赤腫如被傷以誣人至和盪擦卵則又染其外若赭色也

### 修治

弘景曰用當微熬不可近眼時珍曰芩花留數年陳久者良用時以好醋煮十數沸去醋以水浸一宿晒乾用則毒戒也或以醋炒者次之

### 氣味

根辛溫有小毒別錄曰苦微溫普曰神農黃帝雷公苦有毒扁鵲岐伯皆

李當之有大毒多服令人洩之才曰決明為之使及甘草主治欬逆上氣喉鳴

喘咽腫短氣蟲毒鬼瘡疔痕癰腫殺蟲魚本經消胸

中痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒

毒肉毒根療疥瘡可用毒魚別錄治心腹脹滿去水

氣寒痰涕唾如膠通利血脉治惡瘡風痺濕一切

毒風四肢攣急不能行步甄權療欬嗽瘴瘧大治水

飲痰澀脇下痛時珍

### 發明

時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋小

青龍治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐裏邪使水氣自大

誤投之則害深矣荒花與甘草相反而胡洽居士方治痰癖飲癖以甘遂大戟荒花大黃甘草同用

**正誤**慎微曰三國志云魏初平中有青牛先生常服荒花年百餘歲常如五六十人時珍曰荒

**附方**舊五新九卒得欬嗽荒花一升水三升煮汁一

愈食五枚必卒嗽有痰去渣白糖入半斤每服棗許

勿食酸鹹物喘嗽失音暴傷寒冷喘嗽失音取

張文仲備急方喘嗽失音荒花連根一虎口切暴

乾冷病人以薦自裹春令灰飛揚入其七孔中當

錄乾嘔脇痛傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇

和也十棗湯主之芫花熬甘遂大戟各等分爲散  
以大棗十枚水一升半煮取八合去渣納藥強人  
服一錢羸人半錢平旦服之當下利病  
除如不除明旦更服 仲景傷寒論 水腫支飲  
及癰飲用十棗湯加大黃甘草五物各一兩大棗  
十枚同煮如法服一方加芒消一兩 胡洽百病

方天行煩亂 凝雪湯治天行毒病七八日熱積胸  
取一升半漬故布薄胸上不過再三薄  
熱則除當溫四肢護厥逆也 千金方 久瘧結癖  
在腹脇堅痛者芫花炒二兩硃砂五錢爲  
末蜜丸梧子大每服十九棗湯下 直指 水蠱脹

滿 芫花枳殼等分以醋煮芫花至爛乃下枳殼煮  
爛搗丸梧子大每服三十丸白湯下 普濟方  
酒疸尿黃 發黃心懊痛足脛滿芫花椒目等  
分燒末小服半錢日二服 肘後 背腿

間痛 一點痛不可忍者芫花根末米醋調傳之如  
不住以帛束之婦人產後有此尤安 袖珍

諸般氣痛 芫花醋煮半兩玄胡索炒一兩半爲末  
每服一錢男子元臟痛葱酒下瘡疾烏  
梅湯下婦人血氣痛當歸酒下諸氣痛  
香附湯下小腸氣痛茴香湯下 仁存 鬼胎癥瘕

經候不通芫花根三兩剉炒黃爲末每服一  
錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈 聖惠方 催生  
去胎 芫花根剉皮以綿裹點麝香套入  
陰穴三寸卽下 攝生妙用方 產後惡物

不下芫花當歸等分炒爲 心痛有蟲 芫花一兩醋  
末調一錢服 保命集 炒雄黃一錢  
爲末每服一字溫醋 牙痛難忍 諸藥不効芫花末  
湯下 乾坤生意 擦之令熱痛定以

溫水漱之 白禿頭瘡 芫花末猪脂和  
末和膠塗 癰癤已潰 芫花根皮搓作糝插入則不  
之 千金 癰癤已潰 生合令膿易竭也 集簡方

痔瘡乳核 芫根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞  
汁於石器中慢火煎成膏將絲線於膏

內度過以線繫痔當微痛候痔乾落以紙撚蘸膏  
納竅內去根當永除根也一方只搗汁浸線一夜  
用不得使  
水 經驗 療癰初起 氣壯人用芫根搗水一盞服  
傳 瀕湖 便毒初起 芫根搗水服以渣傳之得下  
集簡方

集簡方 贅瘤焦法 甘草煎膏筆粧瘤之四圍上三次  
調別以筆粧其中勿近甘草次日縮小又以甘草  
膏粧小暈三次如前仍上此藥自然焦縮 危氏  
得効 一切菌毒 因蛇虫毒氣熏蒸所致用芫花生  
方 氏得 研新汲水服一錢以利為度 危

芫花 音饒 〇本  
經下品

釋名 時珍曰芫者饒也其花繁饒也

集解 別錄曰芫花生咸陽川谷及河南中牟六月  
芫花而極細白色恭曰苗似胡荽莖無刺花細黃  
色四月五月收與芫花全不相似也保昇曰所在  
有之以雍州者為好生岡原上苗高二尺許宗奭  
曰今京洛間甚多時珍曰按蘇頌圖經言絳州所  
出芫花黃色謂之黃芫花其圖小株花成簇生恐  
卽此芫花也生時色黃乾則如白故陶氏言細白  
也或言無芫花以桃  
花代之取其利耳

氣味 苦寒有毒 別錄曰辛 微寒有毒  
主治 傷寒溫瘧下十二

水破積聚大堅癥瘕蕩滌滌胸中留癖飲食寒熱邪

氣利水道 本經 療痰飲欬嗽 別錄 治欬逆上氣喉中腫

滿疰氣蠱毒疰瘕癖氣塊 甄權



**發明** 宗奭曰張仲景傷寒論以蕘花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不可過使與不及也須有是證乃用之 好古曰仲景小青龍湯云若微利去麻黃加蕘花如雞子大葵令赤色用之蓋利水也 時珍曰蕘花蓋亦芫花之類氣味主治大畧相近

醉魚草 綱目

**釋名** 鬧魚花 綱目

魚尾草 綱目

槐木

**集解**

時珍曰醉魚草南方處處有之多在塹岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃

荆有微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如芫花一樣結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍圍而死呼為醉魚兒草池沼邊不可種之此花色狀氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時為異爾按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤華名曰

華薺可與毒魚其此草之類與

**花葉氣味** 辛苦溫有小毒 **主治** 痰飲成齁遇寒便

發取花研末和米粉作糲炙熟食之即効又治誤

食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和

冷水少許嚥之吐即止骨即化也久瘡成癬者以

花填鯽魚腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花和

海粉搗貼便消 時珍

莽草

本草

**校正**

自木部移入此

**釋名** 茵草

音

芒草

山海經

鼠莽

弘景曰莽本作茵字俗訛呼爾時珍曰此

物有毒食之令人迷罔故  
名山人以毒鼠謂之鼠莽

**正誤** 別錄曰一名莽一名春草禹錫曰按爾雅云

注云一名苦草所見異也時珍曰薺音尾白薇也

又以為薺草蓋因孫

**集解** 別錄曰莽草生上谷山谷及宛旬五月采葉

人取食之無妨頌曰今南中州郡及蜀川皆有之

木若石南而葉稀無花實五月七月采葉陰乾一

皆木葉如石南葉枝梗乾則縹揉之其臭如椒敦

目牙用葉勿用尖及孿生者時珍曰

**葉修治** 敦曰凡使取葉細剉以生薑水蓼二味

用 熬乾

**氣味辛溫有毒** 普曰神農辛雷公桐君苦有毒時

珍曰莽草制雌黃雄黃而有毒誤

癰腫乳癰疔瘰除結氣疥癩殺蟲魚本療喉痺不

通乳難頭風癢可用沐勿令入眼別錄治風疽疔氣

腫墜凝血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿

殺蟲與白歛赤小豆為末雞子白調如糊熒毒腫

乾更易上甄治皮膚麻痺煎濃湯淋風蟲牙痛大

**發明**

頌曰古方治風毒痺厥諸酒皆用茵草今醫家取葉煎湯熱含少頃吐之治牙齒風虫及喉痺甚効宗奭曰濃煎湯淋灑皮膚麻痺周禮煎氏掌除蠹物以茵草熏之則死時珍曰古方治小兒傷寒有莽草湯又瑣碎錄云思村王氏之子生七日而兩腎縮入二醫云此受寒氣而然也以硫黄茱萸大蒜研塗其腹以茵草蛇床子燒烟熏其下部而愈也

**附方**

舊四 賊風腫痺 風入五臟恍惚宜莽草膏主之莽草一斤烏頭附子躑躅各二兩切以水和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三上三下絞去滓向火以手摩病上三百度應手即瘥若耳鼻疾可以綿裹塞之肘後小兒風癘掣挺戴眼疥癬雜瘡並安摩之十發又治大人賊風莽草雷丸各一雞子黃大化猪脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近目及陰日凡三四次外臺秘要 頭風久痛 莽草煎湯沐之勿風蟲牙痛 聖惠方

用後方用莽草煎湯熱漱冷吐○一加山椒皮○一加獨活○一加郁李仁○一加芫花○一加川椒細三各等分煎湯熱漱冷吐○聖惠用莽草半兩皂角三挺去皮子漢椒七粒為末棗肉丸芥子大每以一九塞孔中吐涎取効 癰瘡未潰 方同上得 乳腫不消 莽草小取効止○ 狗咬昏悶 浸椒水調莽草末 為末苦酒和傳 衛生易簡 茵芋 本經 下品

**釋名**

莞草 別錄 甲共

別錄時珍曰茵芋本作因預未詳其義莞草與蒲莞名同

**集解**

別錄曰茵蕒生太山川谷三月三日采葉陰乾弘景曰好者出彭城今近道亦有莖葉狀似莽草而細軟連細莖采之方用甚稀惟合療風酒大明曰出自海塩形似石南樹生葉厚五六七

本草綱目卷之十一  
月采頌曰今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三四月四月七月采莖葉日乾

莖葉氣味苦溫有毒別錄曰微溫有毒權曰苦辛有小毒 主治五臟邪

氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀發作有時諸關節風濕

痺痛本經療久風濕走四肢脚弱別錄治男子女人軟

脚毒風拘急攣痛甄權一切冷風筋骨怯弱羸顛入

藥灸用大

發明特珍曰千金外臺諸古方治風癩有茵蕒丸治風痺有茵蕒酒治婦人產後中風有茵蕒膏風濕諸方多用之茵蕒石南荊草皆古人治風妙品而近世罕知亦醫家疎缺也

附方舊一茵蕒酒治賊風手足枯痺拘攣用茵蕒附子天雄烏頭秦艽女萎防風

防已石南葉躑躅花細辛桂心各一兩十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日藥成每服一合日二服以微痺為度方茵芋丸治風氣積

出劫治居士百病方圖經本草茵芋丸治風氣積

滯成脚氣發則痛者茵芋葉炒薏苡仁各半兩郁李仁一兩牽牛子三兩生研末半兩右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九五更薑棗產後中風茵

湯下取利未利再服取快本事方

五兩木防已半斤苦酒九升漬一宿猪脂四斤煎三上三下膏成每服熱摩千遍千金方

石龍芮本經校正併入菜部水莖

釋名地樾本經天豆別錄石能別錄魯果能別錄水莖吳普

又音苦董爾雅董葵郭璞胡椒菜救荒彭根別錄弘景曰

芹又音苦董爾雅董葵郭璞胡椒菜救荒彭根別錄弘景曰

本草綱目卷之十一  
五十一

葉芮芮短小故名恭曰實如桑椹故名地椹禹錫曰爾雅云齧苦董也郭璞云卽苦董也本草言味甘而此云苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也時珍曰芮芮細兒其椹之子細芮故名地椹以下皆子名也水董以下皆苗名也苗作蔬食味辛而滑故有椒葵之名唐本草菜部水董係重出今依吳普本草合併爲一

集解

別錄曰石龍芮生大山川澤石邊五月五日采子二月八月采皮陰乾弘景曰今出近道子形粗似蛇狀子而扁非真好者人言是菑菜子也東山石上所生者其葉芮芮短小其子狀如葶蘆黃色而味小辛此乃是真也恭曰今用者俗名水董苗似附子實如桑椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶蘆氣力劣於山南者陶以細者爲真未爲通論又曰董菜野生非人所種葉似叢花紫色藏器曰爾雅云葶董草注云烏頭苗也蘇恭注天雄亦云石

龍芮葉似葶草故名水董據此則董草是烏頭苗水董定是石龍芮更非別草也頌曰今惟出兖州一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉短小多刻缺子如葶蘆而色黃蘇恭所說乃水董非石龍芮也兖州所上者正與本草及陶氏說合爲得其真宗奭曰石龍芮有兩種水中生者葉光而子圓陸地生者葉毛而子銳入藥須水生者陸生者又謂之天灸而補不足莖冷失精時珍曰蘇恭言水董卽石龍芮蘇頌非之非矣按漢吳普本草石龍芮一名水董其說甚明唐本草菜部所出水董言其苗也本經石龍芮言其子也寇宗奭所言陸生者乃是毛華有大毒不可食水董卽俗稱胡椒菜者處處有之多生近水下濕地高者尺許其根如薺二月生苗叢生圓莖分枝一枝三葉葉青而光滑有三尖多細缺江淮人三四月采苗淪過晒蒸黑色爲蔬四五月開細黃花結小實大如豆狀如初生桑椹青綠色槎散則子甚細如葶蘆子卽石龍芮也宜半老時采之范子計然云石龍芮出三輔色

善黃者

子根皮氣味苦平無毒普曰神農苦平岐伯酸扁鵲大寒雷公賦無毒之才

日大戟為之使畏菜莢蛇蛻皮主治風寒濕痺心腹邪氣利關節

止煩滿久服輕身明目不老本經平腎胃氣補陰氣

不足失精莖冷令人皮膚光澤有子別錄逐諸風除

心熱燥大明

發明時珍曰石龍芮乃平補之藥占方多用之其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉

水莖氣味甘寒無毒時珍曰微辛苦瀉主治搗汁洗馬毒

瘡并服之又塗蛇蝎毒及癰腫唐本久食除心下煩

熱主寒熱鼠瘦癩癧生瘡結核聚氣下瘀血止霍

亂又生搗汁半升服能殺鬼毒即吐出孟詵

發明詵曰莖葉止霍亂與香莢同功香莢即香薷也

附方舊二新一結核氣莖菜日乾為末油煎成膏摩之日三五度便瘥孟詵食療

蛇咬傷瘡生莖杵汁塗之萬畢術血疝初起胡椒菜葉按按揉之集簡方

毛茛音艮拾遺校正併入毛茛

釋名毛建草拾遺水茛綱目毛莖音芹天灸衍義自灸綱目猴

蒜時珍曰良乃草烏頭之前此草形狀及毒皆似之故名肘後方謂之水茛又名毛建亦莖字音

訛也俗名毛莖似水莖而有毛也山人截瘡采葉接貼寸口一夜作泡如火燎故呼為天灸自灸

本草綱目卷之十一

集解 藏器曰陶注鈎吻云或是毛茛蘇恭云毛茛

一方云菜中有水茛葉圓而光生水旁有毒蟹多食之人誤食之狂亂如中風狀或吐血以甘草汁

解之又曰毛建草生江東地田野澤畔葉如芥而大上有毛花黃色子如蒺藜時珍曰毛建毛茛即

今毛茛也下濕處即多春生苗高者尺餘一枝三葉葉有三尖及細缺與石龍芮莖葉一樣但有細

毛為別四五月開小黃花五出甚光艷結實狀如欲綻青桑椹如有尖峭與石龍芮子不同人以為

驚不食草者大誤也方士取汁煮砂伏硫沈存中筆談所謂石龍芮有兩種水生者葉光而未圓陸

生者葉毛而未銳此即葉毛者宜辨之

附錄海薑陰命 藏器曰陶注鈎吻云海薑生海中命生海中赤色着木懸其子有大毒今無的識者

葉及子氣味辛温有毒主治惡瘡癰腫疼痛未潰

搗葉傅之不得入瘡令肉爛又患瘡人以一握微

碎縛於臂上男左女右勿令近肉即便成瘡和薑

搗塗腹破冷氣 藏器

牛扁 本經 下品

釋名扁特 唐本 扁毒 唐本

集解 別錄曰牛扁生桂陽川谷弘景曰今人不復識此恭曰此藥似董草石龍芮葷根如秦芫

而細生平澤下地田野人名為牛扁療牛虱甚効太常名扁特或名扁毒保昇曰今出寧州葉似石

龍芮附子等二月八月采根日乾頌曰今潞州一種便特六月有花八月結實采其根苗搗末油調

殺蟻虱主療大都相似疑解  
扁特也但聲近而字訛耳

**氣味**苦微寒無毒**主治**身皮瘡熱氣可作浴湯殺

牛虱小蟲又療牛病本經

**附錄**虱建草拾遺藏器曰苦無毒主蟻虱按汁沐頭虱盡死人有誤吞虱成病者搗汁

服亦主諸虫瘡生山足湿地發葉似山丹  
赤高一二尺又有水竹葉生水中葉如竹葉而  
短小可生食亦去蟻虱

**葶苈**葶音熇○宋圖經

**釋名**毛蕨時珍曰葶字本作蕨杜子美有除蕨草詩是也

**集解**頌曰葶苈生江寧府山野中時珍曰川黔諸處甚多其莖有刺高二三尺葉似花桑或青

或紫背紫者入藥上有毛芒可畏觸人如鋒蠶螫  
蠶以人溺濯之即解有花無實冒冬不凋按投水

中能毒魚

**氣味**辛苦寒有大毒吐利人不止**主治**蛇毒搗塗

之蘇頌風癩初起以此點之一夜皆失時珍

**格注**草唐本

**集解**恭曰出齊魯山澤間葉似蕨根紫色者藥草根一株有二十許二月八月采根五月六月

采苗日乾用

**氣味**辛苦温有大毒**主治**蠱疰諸毒疼痛等唐本

**海芋**綱目



釋名 觀音蓮

綱目

羞天草

玉冊

天荷

綱目

隔河仙

見下

集解

時珍曰海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有幹夏秋間抽莖

開花如一瓣蓮花碧色花中有蕊長作穗如觀音像在圓光之狀故俗呼為觀音蓮方士號為隔河仙云可變金其根似芋魁大者如升盤長六七寸蓋野芋之類也庚辛玉冊云羞天草陰草也生江廣深谷澗邊其葉極大可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可煨粉霜殊砂小者名野芋宋祁海芋贊云木幹芋葉擁腫盤戾農經弗載可以治瀉

氣味辛有大毒主治瘧毒腫風癩伏疔砂

時珍

附錄 透山根

時珍曰按响嘯神書云透山根生蜀中山谷草類靡蕪可以點鐵成金昔

有人采藥誤研此草刀忽黃軟成金也又庚辛玉冊云透山根出武都取汁點鐵立成黃金有大毒

人誤食之化為紫水又有金英草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅摸鐵成金亦有大毒人口殺人須臾為紫水也又何遠春渚紀聞云劉均父吏部罷官歸成都自水銀一篋過峽篋漏急取渡旁叢草塞之又而開視盡成黃金矣宋初有軍士在澤州澤中割馬草蹄鏹皆成金以草燃釜亦成黃金又臨安僧法堅言有客過於潛山中見一蛇腹脹嚙一草以腹磨之而消念此草必能消脹取置篋中夜宿旅館聞隣房有人病腹脹呻吟以釜煎藥一盃與服頃之不復聞聲念已安矣至旦視之其人血肉俱化為水罵駭骨在牀爾視其釜則通體成金矣觀何氏所載即是透山根乃金英草之類如此毒草不可不知故備載之耳

鉤吻

木經 下品

釋名 野葛

本經

毒根

吳普

胡蔓草

圖經

斷腸草

綱目

黃藤

綱目

# 火把花

弘景曰言其入口則鉤人喉吻也或言吻當作挽字牽挽人腸而絕之也時珍曰此

草雖名野葛非葛根之野者也或作冶葛王充論衡云治地名也在東南其說甚通廣人謂之胡蔓草亦曰斷腸草滇人謂之火把花因其花紅而性熱如火也岳州謂之黃藤

## 集解

時珍曰鉤吻生傅高山谷及會稽東野折之青烟出者名固活二月八月采晉曰秦鉤吻一名除辛生南越山及寒石山或益州葉如葛赤莖大如箭而方根黃色正月采之茶曰野葛生桂州以南村墟闕巷間皆有彼人通名鉤吻亦謂苗為鉤吻根名野葛蔓生其葉如柿其根新采者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防已皮節斷者良正與白花藤相類不深別者頗亦惑之新者折之無塵氣經年以後則有塵起從骨之細孔中出今折向犯根亦然本草言折之青烟起者名固活為

良亦不達之言也人誤食其葉者致死而羊食其苗大肥物有相伏如此博物志云鉤吻蔓生葉似鳧葵是也時珍曰樁含南方草木狀云野葛蔓生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草人以雜生蔬中毒人半日輒死段成式酉陽雜俎云胡蔓草生邕州容州之間叢生花扁如卮子而稍大不成朵色黃白其葉稍黑又按嶺南衛生方云胡蔓草葉如茶其花黃而小一葉入口百竅潰血人無復生也時珍又訪之南人云鉤吻即胡蔓草今人謂之斷腸草是也蔓生葉圓而光春夏嫩苗毒甚秋冬枯老稍緩五六月開花似檉柳花數十朵作穗生嶺南者花黃生滇南者花紅呼為火把花此數說皆與吳普蘇恭說相合陶弘景等別生分辨並正下

## 正誤

弘景曰五符經亦言鉤吻是野葛叢事而言似是兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集今人用合膏服之無嫌鉤吻別是一物葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生極類

黃精故人采多惑之遂致死生之反或云鉤吻是  
毛茛參錯不同未詳云何教曰凡使黃精勿用鉤  
吻真似黃精只是葉有毛鉤于二個黃精葉似竹  
葉又曰凡使鉤吻勿用地精莖苗相同鉤吻治人  
身上惡毒瘡其地精殺人恭曰鉤吻蔓生葉如  
補陶言飛鳥不集者妄也黃精直生葉似柳及龍  
膽草殊非比類毛茛乃有毛石龍肉與鉤吻何干  
頌曰江南人說黃精莖苗稍類鉤吻但鉤吻葉頭  
極大而根細與蘇恭所說不同恐南北之產異也  
再錫曰陶說鉤吻似黃精者當是蘇說似柿葉者  
別是一物也又言苗名鉤吻根名野葛者亦非通  
論時珍曰神農本草鉤吻一名野葛一句已明草  
木狀又名胡蔓草顯是藤生吳普蘇恭所說正合  
本文陶氏以藤生為野葛又指小草為鉤吻復疑  
是毛茛乃祖雷斅之說諸家遂無定見不辨其蔓  
生小草相去遠也然陶雷所說亦是一種有毒小  
草但不得指為鉤吻爾昔天姥對黃帝言黃精益  
壽鉤吻殺人乃是以二草善惡比對而言陶氏不

審疑是相似遂有此  
說也餘見黃精下

**氣味辛溫大有毒**

普曰神農辛雷公有毒殺人時  
珍曰其性大熱本草毒藥止云  
有大毒此獨變文曰大有毒可見其毒  
之異常也之才曰半夏為之使惡黃芩

**主治金瘡**

**乳瘻中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒**  
本經 **破癥**

**積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸搗汁**

**入膏中不入湯飲**  
別錄 **主喉痺咽塞聲音變**  
吳普

**發明**

藏器曰鉤吻食葉飲冷水即死冷水發其毒  
也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生菌于

收之名菌藥烈於野葛也薤菜搗汁解野葛毒取  
汁滴野葛苗即萎死南人先食薤菜後食野葛二  
物相伏自然無苦魏武帝噉野葛至尺先食此菜  
也時珍曰按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣

人負債急每食此草而死以誣人以急水吞卽死  
急慢水吞死稍緩或取毒蛇殺之覆以此草澆水  
生菌爲毒藥害人葛洪肘後方云凡中野葛毒口  
不可開者取大竹筒洞節以頭柱其兩脇及臍中  
灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之  
惟多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鵝斷頭瀝血入  
口中或羊血灌之嶺南衛生方云卽時取雞卵抱  
木成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲  
卽死也

本草綱目草部第十七下終

