


劉涓子鬼遺方  
秘製大黃清寧丸



叢書集成

初編

主王

編雲

着五

行發館書印務商

6.9.9  
11-1432

方遺鬼子涓圖



3 0405 1556 5



A 022287

劉涓子鬼遺方

本館據讀畫齋叢  
書本排印初編各  
叢書僅有此本

# 劉涓子鬼遺方卷第一 幷序

南北朝 龔慶宣撰

昔劉涓子晉末於丹陽郊外照射忽見一物高二丈許射而中之如雷電聲若風雨其夜不敢前追詰且率門徒子弟數人尋蹤至山下見一小兒提罐問何往爲我主被劉涓子所射取水洗瘡而問小兒曰主人是誰人云黃父鬼仍將小兒相隨還來至門聞搗藥之聲比及遙見三人一人開書一人搗藥一人臥爾乃齊唱呴突三人並走遺一卷瘡疽方并藥一臼時從宋武北征有被瘡者以藥塗之卽愈論者云聖人所作天必助之以此天授武王也於是用方爲治千無一失姪適余從叔祖涓子寄婦書具敍此事并方一卷方是丹陽白薄紙本寫今手跡尚存從家世能爲治方秘而不傳其孫道慶與余鄰居情款異常臨終見語家有神方兒子幼稚苟非其人道不虛行尋卷診候兼辨藥性欲以相傳屬余旣好方術受而不辭自得此方於今五載所治皆愈可謂天下神驗劉氏昔寄龜方故草寫多無次第今輒定其前後族類相從爲此一部流布鄉曲有識之士幸以自防齊永元元年太歲己卯五月五日撰道慶曰王祖母劉氏有此鬼方一部道慶祖考相承謹按處治萬無一失舅祖涓子兄弟自寫寫稱云無紙而用丹陽錄永和十九年資財不薄豈復無紙是以此別之耳案永和祇十二年且去宋武甚遠疑元嘉之訛

黃父曰夫言癰疽何以別之岐伯答曰榮衛稽留於經脈之中久則血澀不行血澀不行則衛氣從之不

通壅遇不得行火不止熱勝熱勝則肉腐爲膿然不能陷膿於骨髓不爲燒枯五藏不爲傷故曰癰黃父曰何爲疽岐伯曰熱氣浮盛當其筋骨良肉無餘故曰疽疽上皮肉以堅上如牛領之皮癰者薄以澤背其候也黃父曰及如所說未知癰疽之性名發起處所診候形狀治與不治死活之期願一一聞之岐伯曰癰疽圖曰

赤疽發額不寫十餘日死其五日可灼也其膿亦多血死未有膿可治人年二十五三十一六十

九十五者在額不可見血見血者死

禽疽發如轉者數十數其四日腫合牽核痛其狀若擎十日可灼其肉發身核寒齒如噤欲逕如是者十五日死

杼疽發頂若兩耳下不寫十六日死六日可灼其色黑見膿而癰者死不可治人年十九二十三三十五三十九五十一五十五六十一八十七九十九百神在耳下不可見血見血者死

丁疽發兩肩比起有所逐惡結血流內外榮衛不通發爲丁疽三日身腫痛甚口噤如瘡狀十一日可灼不治二十日死

蜂疽發髀背起心輪若連肩骨二十日不治死八日可灼其色赤黑膿見青者死不可治人年一十八

二十四。三十五。六十七。七十二。九十八者。百神在肩不可見血見血者死。

陰疽發脾若陰股始發腰強內不能自止數飲不能多五日堅痛不治三歲而死。

刺疽發起肺腑不寫二十日死其八日可刺發而赤其上肉如椒子者死不可治人年十九二十五二十九三十九五十七六十七十三八十一九十七百神在背不可見血見血者死。

脈疽發頸項如痛身隨而熱不欲動悄悄或不能食此有所大畏恐駭而不精上氣噦其發引耳不可以腫二十日可刺不刺八十日死。

龍疽發背起胃俞若腎俞二十日不寫死九日可刺不刺其上赤下黑若青膿黑死發血膿者不死首疽發熱八十日一方云八九日大熱汗頭引血盡如噉身熱同同如沸者皮頤腫淺刺之不刺二十日死。

榮疽發脅起若兩肘頭二十五日不寫死九日可刺膿多赤白而可治也人年一歲十六二十六

三十二四十八五十八六十四八十九十六百神在脅不可見血見血卽死。

行疽發如腫或後合相從往來不可要其所在刺之卽愈。

勇疽發股起太陰若伏鼠二十五日不寫死其十日可刺勇疽發膿青黑者死白者尙可治不可治人年

十一十五二十三十一三十三四十六五十九六十三七十五九十一百  
神皆在尻尾不可見血見血者死

標叔疽發背熱同同耳聾後六十日腫如聚水其狀若如此者可刺之但出水後及有血出卽除愈也不可治人年五十七六十五七十三八十一九十七者百神在背不可見血見血者死癰疽發足趺若足下三十日不寫死其十二日可刺癰疽者白膿不太多其瘡上痒赤黑者死不可治人年十三二十九三十五六十一七十三九十三百神在足不可見血見血者死

衝疽發小腸痛而振寒熱四日五日悄悄六日而變刺之五十日死

敦疽發兩指頭若五指頭七八日不寫死其四日可刺其發而黑擁者不堪未過指節可治一方不呼爲敦疽恐是刺寫明

堂引爲

敗疽

疥疽發腋下若兩臂兩掌中振寒熱而噏乾者飲多卽嘔心煩悄悄六十日而漸合者如此可有汗如無汗者死一方云床疽明堂亦引爲床疽

筋疽皆發脊兩邊大筋其色蒼八日可刺若有膿在肌腹中十日死

陳乾疽發兩臂三四日痛不可動五十日身熱而赤六十日可刺如刺無血三四日病愈

搔疽發手足五指頭起節其色不變十日之內可刺過時不刺後爲蝕有癰在脈腋三歲死。

叔疽發身腫牽核而身熱不可以行不可以屈伸成膿刺之以除。

白疽發脾若肘後痒自痛傷乃身熱多汗五六處有者死心主癰疽在股脛六日死發膿血六十日死。

黑疽發腫居背大骨上八日可刺過時不刺爲骨疽。

骨疽膿出不可止壯熱碎骨六十日死脇少陽有癰疽在頸八日死發膿血者十日死。

倉疽發身痒後痛此故傷寒氣入藏篤發爲倉疽九日可刺之不刺九十日死矣。

腰太陽脈有腫交脈屬於陽明在頸十日死發腫七十日死。

尻太陽脈有膿腫癰在足心少陽八日死發膿血六十日死或八十日死。

頭陽明脈有腫癰在尻六日死發膿血六十日死。

股太陰有腫癰在足太陽十七日死發膿血百日死。

肩太陽脈有腫癰在頸八日死發膿血百日死。

足少陽脈有腫癰在脰八日死發膿血六百日死。

手陽明脈有腫癰在腋淵一歲死發膿三歲死。

黑疽發腋淵死。

黑疽發耳中如米大此疽不治死。

黑疽發肩死。黑疽發缺盆中名曰伏疽不治死。

赤疽發於脾半夜可治出歲死。

黑疽發肘上下不死可治。

髀解除指本黑頭赤死。

黑疽發掌中不死可治。

赤疽發陰股軟可治堅死。

赤疽發肥腸死。

黑疽發脹臍軟可治堅不可治。

赤疽發掌中不可治。

黑疽發趺上堅死。

足下久腫癰色赤死。

癰高而光者不大熱用薄雍其肉平平無異而紫色者不須治但以黃耆并淡竹葉湯申其氣耳癰平而痛用八物黃耆薄大癰七日小癰五日其自有堅強色診寧生破發背及發乳若熱手近不得者令人之

熱熟先服王不留行散。外摩發背大黃膏。若背生破無善在乳者。熟之候手按之。若隨手起便是熟。針法要膿看以意消息之。督背不可過一寸針。良久不得膿。即以食肉膏散差。瓮頭肉。癰口中人體熱氣。歇服木瓜散。五日後癰欲差者。排膿內寒散。

凡破癰之後。病人便連綿欲死。內寒熱腫。自有似癰而非者。當以手按腫上。無所連。是風毒耳。勿針。可服昇麻湯。外摩膏。破癰口當合流下三分。近一分針。唯令極熱。便不痛。破癰後敗壞不差者。作豬蹄湯洗之。日再下湯。二日故可用。塗六七日。湯半劑。亦可用。胸中斷氣斷氣者。當入閨中。以手按左眼視右眼。見光者。胸中結癰。若不見光者。燒疽內發。針傷脈血不出。住實不寫。留成癰。腎脈來者。大漸小陰結。若肌肉渾癰。癰爲發寸口。如此來大。如未漸小矣。

有黑色者。是石留黃毒。有赤色者。是丹砂毒。有青色者。是硇砂毒。有似鹽顆者。是鍾乳毒。有黃水者。是杏桃人毒。有白水者。是附子乾薑毒。有膿者。熱肉麪等毒。硇砂發。白雄鴨頂上血一合。已來取黑鉛湯一茶椀調服之解。鍾乳發。雄雞肘上血一合。將鐵粉湯一茶椀調服之解。附子發。取附子皮三半。豉半升相和。以水一升煎。約一茶椀服之解。丹砂發。取黑鉛黃耆防風伏龍肝各半兩。水一升。煎半茶椀去滓服之解。



# 劉涓子鬼遺方卷第二

治金瘡止血散方

治金瘡血肉癟蝠蠅散方

治金瘡肉瘦蒲黃散方

治金瘡箭肉中不出白蘋散方

治金瘡中腸出小麥散方

治金瘡腸出欲入礞石散方

治金瘡煩悶止煩白芷散方

治金瘡先有散石消石散方

治金瘡痛不可忍當歸散方

治金瘡弓弩所中悶絕琥珀散方

治金瘡弓弩所中筋急弩筋散方

治金瘡內傷蛇銜散方

治金瘡中筋骨續斷散方

治金瘡煩疼麻黃散方

治金瘡煩滿白薇散方

治金瘡去血多虛蓆容散方

治金瘡內塞澤蘭散方

治金瘡內塞黃耆散方

治金瘡中茴藥藍子散方

治金瘡大渴麥芽散方

治被打腹中瘀血蒲黃散方

治癰疽金瘡止痛生肉膏方

治癰疽金瘡生肉甘菊膏方

治癰疽金瘡生肉膏方

治金瘡腹內瘀血烏雞湯方

治金瘡內有瘀血未及得下烏雞湯方

治金瘡有瘀血桃核湯方

治金瘡驚悸。純心湯方

治金瘡癰疽生肉膏方

治被打有瘀血白馬蹄散方

治金瘡止血散方

烏草根 三兩 白芷 兩 鹿茸 二分  
燒灰。

當歸 一兩

芎菊 一兩

乾地黃 一兩  
蒸焙 切

續斷 一兩

右七味搗篩令調著血出處卽止。

治金瘡血肉瘻蝙蝠消血散方

蝙蝠三枚燒令煙盡沫下絹篩之。

右以水服方寸匕一日服令盡當下如水血消也。

治金瘡肉瘻蒲黃散方

七月七日麻勃 一兩 蒲黃 二兩

鬼道方 卷二

右二物搗篩爲散。溫酒調服一錢。七日五服。夜再兩服。

治金瘡箭肉中不出。出箭白斂散方

白斂 二  
兩  
半夏 三  
生  
三國漫洗七遍。熟過。

右二味爲末。調水服方寸匕。日三服。若輕淺瘡。十日出。深二十日出。終不停住肉中。

治金瘡中腹。腸出不能內之。小麥飲噴瘡方

取小麥五升。水九升。煮取四升。去滓。復以綿度濾之。使極冷。傍舍噴之。瘡自上漸漸入。以冷水噴其背。不中多人見。亦不欲令傍人語。又不可病人知。或晚未入。取病人席四角。令病人舉搖。須臾腸便自入。十日之內不可飽食。頻食而宜少。勿使病人驚。驚則煞人。

治金瘡腸出欲入。礫石散方

礫石 三  
兩  
滑石 三  
兩

右二物下篩理令調。飲日方寸匕。日五服。夜再服。

治金瘡煩悶。止煩白芷散方

白芷 二  
兩  
芎藭 二  
兩  
甘草 二  
兩  
炙

右三味熬令變色搗爲散水調服方寸匕日五服夜再服。

治金瘡先有散石煩悶欲死大小便不通止煩消血解散消石散方

消石

澤瀉

白斂

芍藥

寒水石

苦蘿

已上各一兩

右六味搗篩爲散水服方寸匕日夜各一服或未通稍增之。

治金瘡不可忍煩疼不得住止痛當歸散方

當歸

甘草 炙

藁本

桂心

木占斯

已上各一兩

右五味合搗篩令調水服半方寸匕日三服夜一服。

治金瘡弓弩所中筋急屈伸不得敗弩散方

琥珀隨多少搗篩以童子小便服之乃熱不過三服便差。

治金瘡弓弩所中筋急屈伸不得敗弩散方

乾地黃

十分

乾棗

三枚

杜仲

二分

當歸

四分

附子

四分

故敗弩筋

燒灰取

五分

右七味合搗篩理令勻溫酒服方寸匕日三服夜一增一至三。

治金瘡內傷蛇銜散方

蛇銜	
甘草	炙
芎藭	
白芷	
當歸	各
兩	

黃芩 澤蘭 乾薑 桂心 分各三 烏頭 炮五分

右一味合搗篩令勻酒服方寸匕日三服夜一服

芎藭半	一兩
地黃兩	二
地銜兩	二
當歸半	一兩
蕤容半	一兩

附子	炮三分
漢椒	汗三分去目此
桂心	分三分
人參	兩一
甘草	炙一兩

右十四味搗篩理令匀調溫酒服之方寸匕日三服夜一服

麻黃	六分
玄参	三分
甘草	五分
炙	
乾薑	三分
附子	三分
炮	
當歸	三分

續斷 分三  
黃芩 分三  
芍藥 分三  
桂心 分三  
芎藭 分三

右十一味搗篩理令勻調溫酒服方寸匕日三服夜一服

乾壺炮。三分。  
續斷雨。三

細辛 分二

白芷  
分三

治金瘡煩滿。疼痛不得眠睡。白薇散方

白薇

苦葵

枳實炒

辛夷去毛

甘草炙

石膏已上各一兩

厚朴二分

酸棗二分炙

右八味爲末。調溫酒服方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡去血多虛竭。內補當歸散方

當歸三分

芍藥五分

乾薑三分

辛夷二分去毛

甘草三分炙

右五味搗篩。理令勻。調溫酒服方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡去血多虛竭。內補蓴蓉散方

蓴蓉

當歸

甘草炙

芍藥

黃芩

桂心

人參

芍藥

乾薑

吳茱萸

白及

厚朴

黃耆

蜀椒

三分出汗

右十四味。篩理令勻。調溫酒服方寸匕。日三服。夜一服。

治金瘡內塞。澤蘭散方

澤蘭 防風 蜀椒 去目汗 未 附子 炮 乾薑

細辛 辛夷 去毛各 二兩 苓藶 分 當歸 炒 三分 甘草 四分

右十一味。搗篩理令勻。調溫酒服方寸匕日三夜一服。多倍甘草渴加苦蔴二分。煩加黃芩二分。腹滿氣短加厚朴二分。瘡中血瘀加辛夷一倍。

治金瘡內塞黃耆散方

黃耆 三兩 茄菊 白芷 當歸 麻黃節 去去 鹿茸 黃芩  
細辛 乾薑 芍藥 繢斷 桑蟲屎 已上各 附子 半兩 山茱萸 一兩

右十四味。搗篩理勻。調溫酒服方寸匕日三服。夜一服。漸可至二匕。

治金瘡中腐藥解毒藍子散方

藍子 五合 升麻 八兩 甘草 炙 四兩 王不留行 四兩

右四味。搗篩理令勻。調冷水服二方寸匕日三夜二。及以方寸匕水和勻塗瘡上。毒即解去矣。

治金瘡大渴內補。豐麥散方

蕎麥

芍藥

當歸

甘草  
炙

乾薑

桂心

續斷

厚朴  
炙

白斂

蜀椒  
去目閉  
口汗

辛夷  
毛去

牡蠣  
末

芍藥

桔梗

乾地黃

防風  
各三分

細辛  
二分

苦蔴  
一分

人參  
三分

右十九味搗篩理令勻。調溫酒服方寸匕日三夜一。或筋骨斷。更加續斷三分。  
治被打腹中瘀血。蒲黃散方。

蒲黃  
一升

當歸  
二兩

桂心  
二兩

右三味搗篩理勻。調酒服之方寸匕日三夜一。不飲酒熟水下。

治癰疽金瘡續斷生肌膏方

續斷

乾地黃

細辛

當歸

芍藥

黃耆

通草

芍藥

白芷

牛膝

附子  
炮

人參

甘草  
炙各二兩

臘月猪脂四升

右十四味咬咀。諸藥內膏中。漬半日。微火煎三上。候白芷色黃。膏即成。傅瘡上。日四五膏中是猪脂煎。  
治金瘡癰疽。止痛生肌。甘菊膏方。

茵草  
甘草 炙

防風 黃芩

大戟 已上各  
一兩 生地黃 四兩

芍藥 一兩半  
細辛

大黃 蜀椒 去目閉  
口汗 杜仲

黃耆 各半  
兩 白芷 一兩

右十四味咬咀以臘月猪脂四升微火煎五上下白芷候黃成膏一方添甘菊二兩以傅瘡上日易兩次。

治癰疽金瘡生肌膏方

大黃 菖蒲

芍藥 黃耆 獨活

當歸

白芷

已上各  
一兩

薤白 方一兩別

生地黃 一兩別  
方二兩

右九味合薤咬咀以猪脂三升煎三上下白芷黃膏成絞去滓用磨之多少隨其意。

治金瘡腹內有瘀血烏雞湯方

烏雞雞隻

大黃 三兩

細辛 三兩

人參 一兩

甘草 一兩  
炙

地黃 三兩

杏仁 一兩去  
皮雙入

盲蟲 一兩

當歸 二兩

芍藥 一兩

黃芩 一兩

桃人 二兩去  
皮碎

大棗 故

右十三味理烏雞如食法以水二斗煮雞取一斗咬咀諸藥內雞汁中更煮取三升絞去滓通寒溫傷

出困甚者初服五合以一日二夕盡湯便應下食之粥慎食他物。

治金瘡內有瘀血未及得出而反成膿烏雞湯方

烏雞一隻白芷麥門冬去心甘草炙

芍藥當歸各一兩桂心二兩瓜練二兩

右八味先理雞如食法以水二斗煮取七升咬咀諸藥內汁中更煮取三升去滓服七合日三夜勿食。治金瘡有瘀血桃核湯方

蘆蟲三十枚熟蜜蟲各三十枚熟桂心二分大黃五兩桃核五十枚去皮切

右六味酒水各五升咬咀合煮取三升去滓服一升日三服

治金瘡驚悸心中滿滿如車所驚怛純心湯方

純心具人參桂心甘草炙乾地黃

桔梗石膏末芎藭各一當歸二兩

右九味細切剉諸藥咬咀先以水二斗煮心取汁八升內諸藥煮取一升一服八合一日令盡

治金瘡癰疽生肉膏方

黃耆 細辛 生地黃 蜀椒

去目汗  
閉口 當歸

芍藥 薤白 蒼朮 獨活

蕤蓉

白芷 丹參 黃芩 甘草

已上各一兩 臘月豬脂半斤

右十五味咬咀以苦酒一升合漬諸藥夏一夜冬二夜浸以微火煎三上候苦酒氣成膏用之。  
治被打腹中瘀血白馬蹄散方

白馬蹄燒令煙盡搗篩溫酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血疾消爲水。

# 劉涓子鬼遺方卷第三

治強壯熱癰疽。大黃湯方

治發癰疽兼結實。淡竹葉湯方

治發背發乳癰疽。生地黃湯方

治乳癰已服前湯又淡竹葉湯方

治癰疽虛熱。生地黃湯方

治癰疽內虛熱大渴。黃耆湯方

治背。生地黃湯方

治癰疽內虛黃耆湯方

治癰疽五味竹葉湯方

治癰疽發背乳遠志湯方

治發背乳下復生。白石脂湯方

治發癰疽取痢。竹葉湯方

治發癰疽痢小便竹葉湯方

治發癰疽痢後小竹葉湯方

治發背癰兼味竹葉湯方

治發背已潰白石脂湯方

治發背大去膿汁黃耆湯方

治癰疽內虛生地黃湯方

治發背黃耆湯方

治炎疽枳實湯方

治腸癰大黃湯方

治背上欲有疹大黃湯方

治婦人妬乳辛夷湯方

治婦人乳結腫黃耆湯方

治癰腫熱盛黃耆湯方

治發癰疽去膿血多內補黃耆湯方

治癰疽去膿多虛滿竹葉湯方

治癰疽增損竹葉湯方

治癰疽後黃耆湯方

治年四十已還強壯常大患熱癰無定處大小便不通大黃湯方

大黃三兩梔子五十個升麻二兩黃芩三兩芒消一兩別

右五味切以水五升煮取二升四合去滓下消綃調分溫三服快利爲度  
治發癰疽兼結實大小便不通寒熱已服五痢湯吐出不得下大渴煩悶淡竹葉湯方

淡竹葉去尖切四升苦蘿蔔通草前胡升麻茯苓

黃芩知母甘草炙石膏未旦上各二兩生地黃十兩芍藥一兩

大黃三兩黃耆三兩當歸半兩人參一兩

右十六味先以水一斗六升煮竹葉去葉取九升內諸藥後煮取三升二合分四服日三夜一快利便止不必盡湯湯盡不利便合取利

治發背發乳四體有癰疽虛熱大渴生地黃湯方

生地黃十  
兩

竹葉四  
升

黃芩

黃耆

甘草  
炙。

茯苓

麥門冬去心已上  
各三兩 升麻

前胡

知母

芍藥各二  
兩

苦棗四  
兩

大棗二十枚  
去核

當歸一兩半  
兩

人參一  
兩

右十五味先以水一斗五升煮竹葉取一斗去葉內諸藥煮取三升六合分爲四服日三夜一  
治發背乳癰已服生地黃湯取利後服此淡竹葉湯方

淡竹葉四  
升

麥門冬去  
心

黃耆 芍藥

乾地黃

生薑已上各  
三兩

前胡

黃芩 升麻

遠志心去

苦棗各二  
兩

大棗十四  
枚

當歸一  
兩

右十三味先以水一斗八升煮竹葉及小麥一斗去滓內諸藥再煮取三升分溫三分

右語煮竹葉小麥  
恐是麥門冬也是  
非也

治癰疽虛熱生地黃湯方

右十二味先以水二斗煮了水取一斗五升去滓復煮諸藥再煮取四升八合一服八合日三夜再能頓服爲佳。

治癰疽內虛熱渴甚黃耆湯方

生地黃五兩

人參

甘草炙

黃耆

芍藥

茯苓各三兩

當歸

芎藭

黃芩

通草各二兩

大棗二十枚

淡竹葉

切成三升

生地黃八兩

黃耆

黃芩

前胡

竹葉三升切

小麥二升

芍藥

升麻

茯苓

芎藭各三兩

苦蔴四兩

通草

芍藥

當歸各一兩

甘草各二兩

知母各二兩

人參

當歸

右十六味先以水二斗煮竹葉及小麥取一斗二升去滓復煮諸藥取四升分四服日三夜一小便利除通草茯苓加麥門冬腹滿加石膏三兩熱盛去人參當歸治背生地黃湯方

生地黃八兩

人參

甘草炙

芍藥各二兩

通草

茯苓

黃耆 黃芩 各三  
兩 淡竹葉 切二 升 大棗 二十 枚

當歸 茜草 各一  
兩

右十二味先以水三斗煮竹葉取一斗去滓內諸藥再煮四升一服八合日三夜再若能每服一升佳治癰疽內虛黃耆湯方

黃耆 人參 甘草 炙 芍藥 當歸 生薑 各三  
升 各二 升 各二 升 各一 升 各三  
兩

大棗 二十 枚 乾地黃 茵芩 各二  
升 各二 升 各二 升 各一  
兩

白朮 一  
升

遠志 一  
半

右十一味以水一斗三升煮取四升去滓分溫四服治癰疽五味竹葉湯方

竹葉 切二 五味子 前胡 當歸 乾地黃

人參 各二 小麥 二 黃耆 黃芩 麥門冬 去心

生薑 各三 甘草 半錢 升麻 一 大棗 十四  
兩 升 升 枚 升 各一 升 各一  
兩

右十五味先以水二斗煮竹葉小麥取一斗去滓內諸藥煮取三升分溫四服日三夜一

治癰疽發背乳大去膿後虛憊少氣欲死服此遠志湯方

遠志  
心

當歸

甘草  
炙

桂心

芎藭  
兩  
各一

黃耆

人參

麥門冬  
去心  
三兩  
各

茯苓  
兩  
二

乾地黃  
兩  
二

生薑  
兩  
五

大棗  
枝  
十四

右件十三味以東流水一斗煮取三升二合分溫四服日三夜一治發背乳下復住服此白石脂湯方

白石脂  
四  
兩

龍骨  
三  
兩

當歸

桔梗

女萎

黃連  
毛

甘草  
已上各  
二兩

白頭翁

乾薑  
兩  
三

右九味以水九升煮取三升二合分四服下住便止不必盡服當下未即來日止治發癰疽取利熱小便退不用食物竹葉湯方

淡竹葉  
切三  
升

小麥  
二  
升

乾地黃

人參

黃芩

前胡

升麻  
兩  
各二

麥門冬  
心  
去

生薑

黃耆

芍藥  
兩  
各三

大棗  
枚  
十四

桂心半兩  
遠志半兩去心  
當歸一兩  
甘草炙

右十六味切先以水一斗八升煮竹葉小麥取一斗去滓內諸藥又煮取三升分二服羸者分四服日三夜一

治癰疽取下後熱少退小便不利竹葉湯方

淡竹葉切一升  
小麥三升  
乾地黃兩  
黃耆

人參  
甘草炙

芍藥

石膏末

通草

升麻

黃芩

前胡兩各二

大棗十四枚

麥門冬

三兩去心

右十四味先以水一斗六升煮竹葉小麥取九升去滓內諸藥煮取三升二合強卽分三服羸卽四服日三夜一

治癰疽取利後熱小便不利竹葉湯方

竹葉升切三  
小麥二升  
人參  
黃芩  
前胡

芍藥

甘草炙

乾地黃兩

當歸

桂心各二

黃耆三兩

麥門冬三兩去心

龍骨碎三兩

牡蠣末一兩

赤蜻蟲三十枚炒

大棗十四枚去核

右十六味以水二斗煮竹葉小麥取一斗去滓內諸藥煮取四升分四服日三夜一。

治發背癰及發乳兼味竹葉湯方

淡竹葉

升

小麥

升

黃耆

黃芩

五味子

人參

前胡

乾地黃

當歸

大棗

枝

麥門冬

二兩

去心升麻

兩

桂心

半兩

甘草

一兩

生薑

三兩

治發背已潰而下不住白石脂湯方

白石脂

四兩

龍骨

三兩

當歸

二兩

桔梗

二兩

女萎

兩

白頭翁

各四兩

黃連

兩

乾薑

三兩

兩

右八味以水九升煮取三升三合去滓服八合日三夜一。  
治發背已潰大膿汁虛憊少氣力內補黃耆湯方

黃耆

三兩

乾地黃

人參

茯苓

各二兩

當歸

二兩

芍藥

二兩

芎藭

桂心 遠志 去心各一兩 甘草半兩 麥門冬 去心三兩 生薑五兩。右十三味以水一斗煮取三升二合去滓分溫四服日三夜一治癰疽內虛熱生地黃湯方

生地黃五兩 人參

甘草炙

芍藥

茯苓

芍藥

通草

黃芩

當歸各二兩

大棗二十枚

竹葉切三升

右十二味以水三斗煮竹葉取半去滓內諸藥煮取四升分五服日三夜二能服一升可佳。

治發背黃耆湯方

黃耆

黃芩

遠志

麥門冬去心各二兩

乾地黃

人參

芍藥

甘草炙

芍藥

大棗二十枚

生薑五兩

雞肫肝二具勿去皮

桑螵蛸十四枚炙

右十四味咬咀以水一斗先煮取四升五合一服九合日三服夜一服

治炎疽枳實湯方苦林所秘不得

枳實 炙

夜干

升麻

乾地黃

黃芩

前胡 各三  
兩

犀角 半  
兩

大黃 半  
兩

麝香 半  
兩

一方用甘草  
二兩

右九味咬咀以水九升煮取分溫三服須差也。

治腸癰。大黃湯。癰之爲病。診小腹腫痞堅。按之則痛。或在膀胱左右。其色或赤或白色。堅大如掌熱。小便欲調時。色赤。汗出時復惡寒。其脈遲堅者。未成膿也可下之。當有血脉數。膿成不可服此方。

大黃 四  
兩

牡丹 三  
兩

芥子 半  
升

消石 三  
合

桃人 五十枚去  
皮炒切之

右五味咬咀以水六升五合分爲兩服。膿下無者下血大良。

治背上初欲作疹。便服此大黃湯方。

大黃 三  
兩

梔子 一百枚  
去皮

升麻

黃芩 甘草  
炙各  
三兩

右五味以水九升煮取三升半分爲三服。得快下數行便止。不下更服。

治婦人妬乳。辛夷湯方。

辛夷 一升  
去毛

大棗 材 三十  
枚

桂長一尺

防風 二  
分

白朮 甘草一尺。生薑二分。澤蘭一升。切。

右八味切以水一斗煮取三升分溫三服。

治婦人客熱乳結腫或潰或作癰內補黃耆湯方

黃耆 茯苓 各三分。芍藥二兩。麥門冬三兩。去心甘草二兩。

厚朴 人參 生薑 乾地黃 各三兩。去心甘草二兩。

右九味切以水一斗二升煮取三升分五服日三夜一。

治癰腫患熱盛黃耆湯方

黃耆 麥門冬 去心黃芩 六分。桔子十四枚。芍藥二兩。

苦蔴 乾地黃 升麻 各二兩。去心甘草二兩。

右八味剉以水一斗煮取三升分溫三服。

治發癰疽腫潰去膿多裏有虛熱內補黃耆湯方

黃耆 二兩。茯苓 桂心 人參 各二兩。麥門冬 去心甘草 六分。

生薑一兩

遠志二兩去心

當歸兩

五味子四兩

大棗二十枚

右十一味切以水一斗煮取四升分六服日四夜二治癰去膿多虛滿上氣竹葉湯方

竹葉切一升

半夏二兩湯洗

甘草二兩炙

厚朴三兩炙

小麥升四兩

生薑兩

當歸一兩

麥門冬二兩炙

人參

桂心各一兩

黃芩三兩

右十一味切以水一斗半先煮竹葉小麥取九升去滓又煮諸藥取二升分溫三服治癰疽腫煩熱增損竹葉湯方

竹葉切一握

當歸

茯苓

人參

前胡

黃芩

桂心

芍藥各二兩

甘草三兩炙

大棗二十枚

小麥一升

麥門冬一升去心

右十二味切以水一斗六升煮竹葉小麥取一斗一升去滓內諸藥煮取三升分服日三夜重加黃耆二兩。胃中惡加生薑六兩下者減芍藥黃芩各六分如體強羸者以意消息之。治癰疽後補塞去客熱黃耆湯方

鬼道方 卷三

三四

黃耆 生薑 石膏 甘草

炙。未。

芍藥

升麻

人參

已上各

二兩

乾地黃

一兩

右十三味切以水一斗二升煮取四升分溫四服日三夜一  
知母 茯苓 各一  
桂心 六分  
麥門冬 二兩  
去心  
大棗 十四枚

# 劉涓子鬼遺方卷第四

九江黃父癰疽論

釋癰疽色診

相癰疽知是非灸法

相癰疽知有膿可破法

治癰疽腫松脂枯腫方

治癰疽腫松脂枯腫方

治癰疽升麻薄荷冷方

治癰疽白斂薄方

治癰疽始一二痛猪膽薄方

治癰疽腫熱盛除熱黃耆湯方

治客熱鬱積在內或生癰黃耆湯方

治癰未潰黃耆湯方

治癰內補竹葉湯方

治補度冷下赤石脂湯方

治取冷過寒下溫中湯方

治斷下補胃附子湯方

治癰及惡瘡猪蹄湯洗方

治癰腫壞多汗猪蹄湯方

治肘疽方

治癰最膿增損散方

治癰消膜木占斯散方

治發背婦人發房木占斯散方

治諸癰腫未潰蠶麥散方

治瘡食惡肉散方

治癰疽兒膏方

治食禁青龍膏方

治癰疽金瘡生肌膏方

治癰疽發壞出膿血黃耆膏方

治癰疽侵溼瘡膏方

缺

治癰疽或如桃核雞子燉熱搗湯方

缺

治癰疽十指燉熱豬蹄湯方

治癰疽多汁浸大粉散方

缺

治丹癰疽始發焮熱搗湯方

黃父癰疽論

九江黃父問於歧伯曰。余聞腸胃受穀。上焦出氣以溫分肉。而養骨節。通腠理。中焦出氣如露。注谿谷。而燥經脈。津液和調。變化而赤爲血。血和則乘脈先滿。乃注經絡。經絡皆盈。乃注於經絡。苟有脫誤。陰陽已張。因息乃行。行有經紀。周有道。與天合同。不得休止。切而調之。從虛去實。寫則不足。疾則氣留。去虛補實。則有餘。血氣已調。形神乃持。余已知血氣平與不平。未知癰疽之所從生。成敗之時。死生之期。期有遠近。何

以度之可知聞乎。

歧伯曰。經脈流行不止。與天同度。與地同紀。故天宿失度。日月薄蝕也。經始紀冰道流溢。草薹不成。五穀不植。經路不通。民不往來。菴聚邑居。別離異處。血氣猶然。則言其故。

夫血脈榮衛。周流不休。上應星宿。下應經數。寒客於經絡之中。則血泣。泣則不通。不通則歸之不得復及。故癰腫與寒氣化爲熱。熱勝則肉腐。肉腐則爲膿。膿不寫。則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則水髓消。不當骨肉。不寫。筋枯空虛。筋骨肌肉不得相親。經脈敗漏。蠹於五藏。五藏傷。故死矣。

黃父曰。願聞於癰疽之形。與其期日。

歧伯曰。略說癰疽極者。一十八種。癰發於嗌。名曰猛疽。猛疽不治。則化爲膿。膿塞其咽。半日死。其爲者寫。則已。含豕膏無冷寫。三日而已。一方無冷食。發於頸者。名曰天疽。其狀癰大而赤黑。不急則熱氣下入淵脈。腋前傷任脈。內薰肝脈。十餘日死。陽氣大發消腦。名曰腦裸。其色不樂。項痛如刺。以藏頭乘心者不治。本作留學。發於肩及臑者。名曰鵝癰。其狀亦黑。急治之。此令人汗出至足。不害五藏。

發於腋下。赤堅者。名曰米疽。治之犯石。欲細長疏。或云塗豕六膏。日以勿裹。其疽堅而不潰者。馬刀夾纓。乃治之。

發於脅者。名曰井疽。其狀如大豆。三四日起。不早治。下入腹。不治。十日死。

發於脣者。名曰甘疽。其狀如穀實萎黃。常寒熱。急治之去其寒。十歲似死。死後膿自出。

發於脅者。名曰改營。改營者女子之病也。久之其疾大癰。膿治之。其中乃有生肉。大如赤小豆。剉陵翹草。陵根各一升。水六升。煮之竭爲三升。卽強飲。厚衣坐釜上。令汗出至足已。

發於股陽明。名曰股瘡疽。其狀不甚變。而癰膿附骨。不急治四十日死。

發於股陰。名曰赤施疽。不急治六日死。在兩股之內。不治六日死。一方云。十  
六日死。發於尻。名曰兌疽。其狀亦堅大。

急急治之不速治三十日死。

發於膝。名曰雌疽。其狀癰色不寒熱而堅。勿破。破之死。須以手緩柔之。乃破。

諸疽發於節。而相應之者不可治之也。

發於陽者百日死。

發於陰者四十日死。

發於腦。名曰蒐齧。其狀疾赤至胃。急治之不治煞人。

發於踝。名曰走渙。其狀癰也。急不變灸而止其寒熱。不死。

發於足上。名曰四淫。其狀如癰。不急治之百日死。

發於足。名曰厲疽。其狀初小指發急治之去其黑者不輒愈。不治百日死。

發於足指。名曰脫疽。其狀赤黑不死。治之不衰。急漸去之。治不去必死矣。  
夫癰疽者。初發始微。多不爲急。此實奇患。惟宜速治。急治不苦。速成病難救。以此致禍。能不痛哉。具述所懷以悟後賢。謹按黃父癰疽論。所著緩急之處。生死之期。如有別癰之形色。難易之治。如左僧納私撰。是用非是先賢。恐後高雅。故記之名字。令惑之耳。

發皮穴淺。腫高之赤即消。不治亦愈。

發筋穴深。腫下之堅。其色或青或黃白黑。或復微熱而赤。宜急治之。成消中半。發附骨者。或未覺肉突。肉突已殃者。癰疽之甚也。  
肉突肉突似誤。接突即肉字也。

凡發背外皮薄爲癰皮。堅爲疽。如此者多現先兆。宜急治之。皮堅甚大者。多致禍矣。

夫癰壞後有惡寒。當者以猪蹄湯洗其穢。次傳食宀膏散。惡寒盡。乃傳生肌膏散。乃摩四邊。令善宀速生。當須絕房室。慎風冷。勿自勞動。須筋脈復常。乃可自勞耳。不爾。新宀易傷。則重發。便益潰爛。慎之慎之。

相癰疽知是非可灸法

癰疽之甚。未發之兆。肥渴爲始。發之始。或發日疽。薨似若小癥。或復大痛。皆是微候。宜善察之。欲知是

非重按其處。是便隱復按四邊。比方得失審定之後。卽灸第一。便灸其上二三百壯。又灸四邊一二百壯。小者灸四邊。中者灸六處。大者灸八處。壯數處所。不患多也。亦應卽枯卽薄。令得所。卽消。內服補暖湯散。不已。服冷藥外卽冷薄。不已。用熱枯。枯之法。開其口泄熱氣。

相癰知有膿可以破未

癰大堅者。未有膿。半堅薄半有膿。當上薄者。都有膿。便可破之。所破之法。應在下逆上破之。令膿得易出。用排針。膿深難見。上穴厚而生穴。火針若外不別有膿。可當其上。數按之。內便隱痛者。穴殃堅者。未有膿也。按更痛於前者。內膿已熟也。膿泄去熱氣。不爾長速速。卽不良。

治癰疽腫松脂枯方。

- |                                 |       |      |      |      |
|---------------------------------|-------|------|------|------|
| 黃耆                              | 芎藭    | 白芷   | 白斂   | 黃耆   |
| 黃芩                              | 防風    | 芍藥   | 茵草   | 白蠟   |
| 當歸                              | 大黃各一兩 | 細辛二分 | 臍脂三兩 | 松脂二斤 |
|                                 |       |      |      |      |
| 右十六味。切曝乾極燥微火煎三上。下手不得離。布綿綻去滓。枯之。 |       |      |      |      |

治癰疽腫松脂枯方。

- |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 當歸 | 黃耆 | 黃連 | 芍藥 | 黃芩 |
|----|----|----|----|----|

大黃  
臘蜜  
青荳各一  
兩  
松脂一斤  
半陳  
臘脂半合  
右十味細切合煎。微火三上三下。膏成。綿布絞去滓。向火塗紙上貼之。  
治癰疽松脂貼腫方

防風	松脂	一
分半	斤	
白芷	大黃	
	分	三
白斂	臘脂	
	兩	一
菖蒲	細辛	
	分	半
當歸	黃芩	
	半	一分

芍藥	葛根
茵草	黃連
	白蟻
	黃檗
分各	

右二十五味細切曝令極燥先煎脂蠟下松脂洋薑內諸藥一上下候色足綃以綿布水中以新竹片上火炙之施紙上貼之此藥大祕實有奇效不妄傳之

升麻	兩	一
白及	一分	
乾者		
牡蠣粉	二分	
白斂	分	六
龍骨	一	
黃耆	兩	一
甘草	二分	
灸		
黃芩	分	六
芎藭	兩	一
芎藭	兩	一

右十味節和以豬膽調塗布傅之癰上燥易之。

治癰白斂薄方

白斂 大黃 黃芩 分各等

右三味搗篩和雞子白塗布上薄癰上二燥輒易之亦可治又以三指撮置三升水中煮三沸綿注汁拭腫上數十過以寒水石沫塗腫上紙覆之燥復易一易輒以煮汁拭之晝夜二十易之

治癰疽始一二日痛微內薄令消猪膽薄方

黃耆 龍骨 青木香 桔子人 羚羊角 乾地黃

升麻 白斂 大黃 黃蘖 黃芩

赤小豆 麻黃去節 黃連 犀角兩

右十六味各等分搗篩以豬膽調令如泥以故布開口如小豆大以泄熱氣

治癰腫熱盛口燥患渴除熱止渴黃耆湯方

黃耆 苦棗 乾地黃 升麻各二兩

麥門冬 三兩。  
去心。梔子 枚。三十  
芍藥 兩。兩。  
黃芩 半。一兩。

右八味以水一斗。煮取三升。分溫三服。

治客熱鬱積在內。或生癰。黃耆湯方

黃耆 二兩。  
人參 一兩。  
芍藥 二兩。  
當歸

遠志 心。去  
乾地黃 兩。各二  
大棗 枚。二十  
生薑 五兩。

右十味切。以水一斗二升。煮取三升。分溫三服。

治癰未潰。黃耆湯方

黃耆 四兩。  
甘草 二兩。  
桂心 三兩。  
芍藥

右七味。以水七升。煮取三升。飴化。分三服。

治癰內補。竹葉黃耆湯方

竹葉 切。一升。  
黃耆 四兩。  
甘草 二兩。  
芍藥 兩。四

桂心 一兩。如冷。  
用半兩。  
大棗 枚。十二  
乾地黃 兩。二  
升麻 兩。三  
茯苓 兩。一

甘草 炙。各一兩。  
麥門冬 去心。五兩。  
半夏  
生薑 各八兩。  
人參 二兩。  
生薑 各一兩。  
飴 斤。一

右十二味以水二斗煮竹葉澄清取九升內諸藥更煮取三升分溫三服。

治補度冷下赤石脂湯方

赤石脂 人參 甘草 炙。各一  
乾薑 各二兩 龍骨 研一兩 附子 大者一枚炮。

右六味切以水八升煮取二升半去滓分溫三服如人行十里進一服。

治取冷過寒下飴見出溫中湯方

甘草 炙。六分 乾薑 六分 炮去皮。  
附子 破六分 蜀椒 二百四十粒去口者出汗。

右四味切以水六升煮取二升分溫三服。

治斷下補胃附子湯方

附子 炮。二分 當歸 人參 黃連 甘草 炙。各一  
乾薑 桂心 茯苓 各二兩 蜀椒 去汗自閉口半分。

右九味以水五升煮取一升五合去滓分溫二服。

治癰瘡及惡瘡有惡穴猪蹄湯洗方

猪蹄 一具治  
如食法 白斂 兩  
白芷 兩 黃連 兩  
黃芩 兩 獨活  
大黃 兩 狼牙 兩

芍藥 兩  
黃芩 兩  
大黃 兩  
獨活  
大黃 兩

右九味以水三斗煮猪蹄一斗五升去蹄內諸藥又煮取五升洗瘡日四次甚良。

治癰疽腫壞多汁猪蹄湯方

猪蹄 一具治  
如食法 芎薦 甘草 炙  
大黃 黃芩 各二  
芍藥 兩 當歸 兩

右七味先以水一斗五升煮蹄取八升去蹄內諸藥更煮取三升更去滓及溫洗瘡上日三亦可以布內湯中薄瘡腫上燥復之。

治肘疽方

黃連 皂莢 各等分炙  
去皮子

右二味搗下和以淳苦酒調令如泥塗滿肘以綿厚薄之日三易良。

治癰疽最膿增損散方

黃耆 五分驟  
多倍之 小豆 一分熟口  
乾倍之 芎薦 二分肉未  
生倍之 白斂 三分有驟  
不含倍之 苦蓼 三分若小  
便利倍之

右六味搗篩令細酒調溫服方寸匕日三

治癰消膿木占斯散方

木占斯 桂心 人參 細辛 敗醬

乾薑

厚朴

甘草  
炙

防風

桔梗

已上各一兩

右十味搗篩酒服方寸匕入咽覺流入瘡中若癰及疽亦之不能發壞者可服之瘡未壞去敗醬已發  
膿內入敗醬此藥時有化癰疽成水者方正桂爲異故兩存焉案正桂句似誤

治發背及婦人發房并腸癰木占斯散方

木占斯 厚朴  
炙 甘草  
炙 細辛 菖蒲

防風

乾薑

人參

桔梗

敗醬

已上各一兩

右十味搗篩清酒服方寸匕日七夜四以多爲善敗醬草名也病在上者當吐在下者當下膿血此謂  
腸癰之屬也諸病在裏惟服此藥卽覺有力及癰疽便卽復痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便卽早愈  
凡俗流醫不知用此藥發背有不善而渴便勤服之若藥力行覺渴心便消散若雖服壞終無苦但晝  
夜服勿懈也發此藥消散不覺腫去時卽愈或長服卽去敗醬偏治婦人乳腫諸產疵速愈良又云惟

服有異始覺背有不善之也。

治諸癰疽已潰未潰瘡中疼痛膿血不絕。豐麥散方

豐麥

白芷

黃耆

當歸

細辛

芍藥

薏苡仁

芎藭

赤小豆

未各一兩

右九味先以清酒小豆出於銅器中熬令乾復漬漬後復熬五過止然後治末合搗篩溫酒服方寸匕晝夜各五三日後痛痒者肌肉也又方用苦酒漬小豆多痛倍豐麥瘡口未開倍白芷多膿倍黃耆薏苡人芍藥等。

治癰食惡穴散方

藥蘆

一分半

真珠

一分半

石硫黃

雄黃

麝香

各三分

馬齒

礬石

漆頭

蘆茹

各三分

右九味篩搗粉瘡上亦可爲膏和傅瘡上。

治癰疽食惡穴散方

雄黃一兩。礬石一分。蘆茹一兩。

右三味搗篩稍著之隨用多少不限一兩。

治癰疽免膏方

當歸 莱菔子 白芷 松脂各二兩。烏頭一兩。猪脂二升。巴豆十分去心皮。

右七味咬咀內膏中微火合煎三沸已內松脂攬合相得以綿布絞之去滓以膏著綿絮免頭丈作免之瘡雖深淺免之曠就免盡卽善肉瘡淺者不足免著瘡中日三惡肉盡則止。

治食宍青龍膏方

白礬二兩。火煉末之。熟梅二升。去核。鹽三合。大錢二十枚。

右四味於銅器中猛火投之摩滅成末乃和猪脂搗一千杵以塗瘡上甚痛勿怪此膏食惡宍盡復著可傅蛇銜膏塗之令善矣復生。

治癰疽金瘡生肉膏方

大黃 芍藥 黃耆 獨活 白芷

芎藾各一  
當歸一  
薑白二  
生地黃三

右九味咬咀以盛煎猪膏三升煎三上下以綿布絞去滓用發摩多少隨意常用之。  
治丹癰疽始發煥熱浸溼長成瘡湯方

升麻  
黃芩各三  
黃連  
大黃各二  
當歸一

甘草一兩  
芎藾二  
芒消三  
羚羊角屑各一

右九味咬咀以水一斗三升煮取五升絞去滓鑄中內芒消上火攪令成沸盡滓稍分適冷熱貼帛搘腫上數過其熱隨手消散王練甘林所祕不傳此方

# 劉涓子鬼遺方卷第五

治癰疽敗壞生地黃膏方

治癰疽瘡生肌黃耆膏方

治發背乳急痛丹參膏方

治癰疽腫堅強不消黃芩膏方

治癰疽止痛鷗脂膏方

治癰疽續斷膏方

治癰疽金瘡止痛膏方

治癰疽金瘡止痛甜竹葉膏方

治癰疽敗壞生肉茵草膏方

治癰疽敗壞膿爛蛇銜膏方

治癰疽食肉大黃膏方

治癰疽食惡肉蘆茹膏方

鬼遺方  
卷五

治癰疽始作便敗壞膏方

治久病疥癬膏方

治癰疽惡疥癬五黃膏方

治癰疽疥癬散熱水銀膏方

治面瘡炮麝香膏方

治面瘡炮木蘭皮膏方

治瘡炮鵝鵝屎膏方

治瘡炮鵝鵝屎膏方

治髮禿生髮膏方

治婦人乳腫丹參膏方

治頭白禿經年五味子膏方

治疽漏瘻疥惡瘡膏方

治久癰疽諸瘡野葛膏方

治丹砂膏三首

赤膏治百病方

治癰疽丹砂膏方

治癰疽麝香膏方

治釘腫芎薑膏方

治癰疽始發丹砂膏方

治風溫病疽諸惡瘡膏方

治癰疥諸惡瘡丹砂膏方

治小兒頭瘡紫草膏方

治小兒熱瘡水銀膏方

治火瘡相皮膏方

治癰疽浸淫廣大羊髓膏方

治熱毒瘡升麻膏方

治熱瘡生地黃膏方

治諸瘡爛雄黃膏方

治癰疥疽漏水銀膏方

治癰瘍瘻瘡白芷膏方

治皮膏中熱癰瘍白斂膏方

治熱瘡生地黃膏方

治溫熱諸瘡黃連膏方

治熱瘡蛇床子膏方

治熱瘡木蘭膏方

治熱瘡黃連膏方

治炙瘡甘草膏方

治諸瘻破大去膿黃耆膏方

治癰疽已潰白芷膏方

治諸疽瘡膏方

治鼻中塞白芷膏方

治竹本所刺手腳羊屎膏方

治湯瘍人肉爛壞朮膏方

治火燒爛壞柏皮膏方

治久病癰疽惡瘡蘆茹膏方

治婦人妬乳生瘡雄黃膏方

治惡瘡麝香膏方

治頭瘡骨疽牛屎薰方

治諸傷六物滅瘧膏方

治癰疽敗壞生肉地黃膏方

生地黃一斤

辛夷

獨活

當歸

大黃

芎藭

黃耆

薤白

白芷

芍藥

黃芩

續斷各一兩

右十二味切以臘月豬脂四升微火煎白芷色黃膏成絞去滓傅日四

治癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆

細辛

生地黃

蜀椒去目閉口汗

當歸

芎藭

薤白

白芷

丹參

甘草

炙

蕤英

獨活

黃芩

已上各一兩

臘月豬脂半斤

鬼道方

卷五

右十四味細切以苦酒一升二合夏卽漬一日冬二夜微火煎三上下酒氣盡成膏傅之極良治發背乳口已合皮止急痛生穴膏方

丹參

防風

白芷

細辛

芎藭

黃芩

芍藥

甘草炙

黃耆

牛膝

槐子

獨活

當歸

蘭草

右十三味切以臘月脂五升微火煎三上下白芷黃耆成病上摩向火日三四治癰腫堅強不消不可用傅貼處黃芩膏方

黃耆

黃芩

芎藭

白斂

防風

蘭草

白芷

芍藥

大黃

細辛

當歸已上各一兩

右十一味咬咀以豬脂四升微火上煎一沸一下白芷黃卽成膏傅之堅硬者日可十易

治癰疽止痛生肌鴟脂膏方

松脂七兩

芍藥

當歸

黃芩各一兩

鴟脂七兩

白蠟五兩

右七味咬咀以臘月豬脂二升二合微火煎一沸一下三十過成以摩於瘡上治癰疽金瘡續斷生穴膏方

續斷

乾地黃 細辛

當歸

芎菊

黃耆

通草

芍藥

白芷 牛膝

附子炮  
人參

甘草

炙已上各兩

臘月猪脂升

右十四味咬咀著銅器中下晉諸藥漬之半日微火煎三上下白芷候黃耆成傅之瘡上日四五過良治癰疽瘻止痛生肉甜竹葉膏方

甜竹葉

兩五

生地黃四兩

大戟二兩

臘月脂升四兩

當歸

續斷

白芷

蘭草 薑菊

防風各二兩

甘草一兩

芍藥一兩

蜀椒

半兩去目汗閉口

細辛 大黃

杜仲各半兩

黃耆半兩

右十七味咬咀以豬脂微火煎五上下候白芷黃耆成傅瘡上甚良。治癰疽敗壞生肉蘭草膏方

蘭草

當歸 薺白

黃芩 甘草

炙各二兩

生地黃五兩

白芷三兩

大黃四兩

續斷一兩

丸

遠方 卷五

五七

右九味咬咀以猪脂三升微火煎三沸三上下白芷黃膏成傅瘡良。

治癰疽膿爛并小兒頭瘡牛領馬鞍革及腸中諸惡耳聾痛風腫腳疼金木水火毒蠱所中衆瘡百癥無所不治蛇銜膏方

蛇銜 大戟 大黃 茯苓 附子 炮當歸 獨活  
茵草 黃芩 細辛 莱菔 蜀椒 去目閉口汗 蕤白 已上各一兩

右十三味咬咀以苦酒漬之淹一夜以猪脂二升半微火煎三上下膏成綿布絞去滓病在內酒下彈元大。

治癰疽食宍膏方

松脂 五兩 雄黃 別研 雄黃 野葛皮 各二兩 猪脂 一斤 漆頭蘆茹 三兩 巴豆 一百枚去皮膜心

右七味先煎松脂水氣盡下諸藥微火煎三上下膏成絞去滓內雄雌二黃攪調以膏著免頭內瘡內口方六七勿字兼新故初用病更腫赤但用如節度惡宍盡止勿使過也。治癰疽大黃食宍膏方

大黃 附子 茵草 蒜頭 雄黃 真珠末 各一兩

白斂 磬石 黃芩 漆頭蘆茹 各一  
雌黃 一兩

右十一味。㕮咀六物。以猪脂一升四合。微火煎三上下。末蘆茹下。煎成膏中。以塗免頭。傅瘡中。須惡肉盡。勿使過也。

治癰疽食惡肉蘆茹散方

漆頭蘆茹 磬石 硫黃 雄黃 已上各  
二分

右四味。搗篩。攬令著免頭內瘡口中。惡肉盡止。勿使過也。

治癰疽始作便敗壞發瘡膏方

羊髓 一兩 甘草 二兩 胡粉 五分 大黃 一兩 猪脂 二升

右五味切合。脂髓煎。二物令洋。內甘草大黃三上去滓。內胡粉攬令極調。傅瘡上。日四五。

治久病疥癬惡瘡膏方

丹砂 雄黃 雌黃 亂髮 洗 松脂

白蜜 已上各 一兩 蘆茹 漆頭者 三兩 巴豆 十四個 去皮心 臘月猪脂 三升

右九味先煎亂髮消盡內松脂煎三上下成膏絞去滓末茹內膏中煎攪極調傅瘡上日三易之。  
治久病疥癬諸惡瘡毒五黃膏方

雌黃

雄黃

黃連

黃夔

黃芩

青木香

白芷各二兩

亂髮一匱雞子大

雞舌香一兩

狼跋子四十枚

右十味咬咀以苦酒半升瀆諸藥一夜以臘月脂三升先煎髮一沸內諸藥三五沸止絞去滓成膏傅瘡上日五易之。

治病疥癬惡瘡散熱水銀膏方

水銀

礬石

蛇床子

黃連已上各一兩

右四物兩度篩以臘月猪脂七合和并水銀攪令調打數萬過不見銀膏成傅瘡若膏少益取并小兒瘡良。龔慶宣加蘆茹一兩

治面黓疮麝香膏方

麝香二兩

當歸

青黛

白芷

芍藥

已上各一兩

細辛

杜衡

二分

右八味咬咀以臘月豬脂一升二合煎諸藥三上下綃去滓別末研麝香安膏中攪令調傅炮上日三易之。

治面查炮木蘭膏方

木蘭

防風

白芷

青木香

牛膝

獨活

藁本

當歸

芍藥

杜衡

辛夷

芎藭

細辛各一兩

麝香

附子一分炮

右十五味咬咀諸藥以臘月豬脂一升微火煎三沸三上下去滓末下攪令調膏成傅炮上日三治查炮鵝鵠屎膏方

右取鵝鵠屎一升搗篩臘月豬脂調和傅之。

治頭頸生髮白芷膏方

白芷

蔓荆子

附子

防風

芎藭

蘭草

細辛

黃芩

當歸

蜀椒各一兩去汗閉口

大黃一兩半

馬鬚膏五合

此所用多無

右十二味切以臘月猪脂三升合諸藥微火煎三上下白芷色黃膏成洗頭澤髮勿近面治婦人乳腫痛丹參膏方

丹參  
芍藥各二兩  
白芷一兩

右三味以苦酒漬一夜猪脂六合微火煎三上下膏成傳之

治頭白頹瘡髮落生白痴經年不差五味子膏方

五味子分二  
菟絲子分五  
蒼朮分二  
雄黃分一  
松脂分二  
白蜜分一  
雞屎半分  
遠志去心各三分  
雌黃  
蛇床子

右十味以猪膏一升二合煎先內雌黃次內雞屎次內蜜次內松脂次內諸藥並先各自末之膏成先以桑灰洗頭後傳之

治疽瘻瘍疥諸惡瘡連年不差并小兒頭瘡悉治之膏方

藜蘆  
附子  
蘆茹  
桂心  
天雄  
蛇床子  
野葛皮  
雄黃  
亂髮  
洗  
白芷  
半夏  
湯  
礬石  
細辛  
杏仁

芎菊

芍藥

白朮

烏頭各二兩

黃連

當歸

藁本已上各二兩

班貓

蘭草

巴豆去皮心

黃藥

吳茱萸

蜀椒自閉口汗

右二十七味。㕮咀以苦酒漬一夜。以臘月猪脂四斤。微火煎令酒氣盡。膏成日四五傅用多妙。  
治久癰疽諸瘡。治葛膏方。

治葛皮

黃連

細辛

杏人

蘭草

芍藥

黎蘆

附子

亂髮

蘆茹

芎菊

白芷

蛇床子

桂心

藁本

烏頭

白朮

吳茱萸

雌黃

礬石

天雄

當歸已上各二兩

班貓

巴豆去皮心

蜀椒

去目汗閉口

黃藥

各一兩

右二十六味。咬咀各搗篩。以豬脂五升。於銅器內微火煎諸藥七沸。上下綃去滓。更煎攪勻成膏。以傅  
瘡上。日四五次。

丹砂膏方三首

丹砂五兩

芎菊三兩

大黃二兩

蜀椒二兩去目出汗

白芷二兩

麝香三兩

升麻二兩

鬼遺方 卷五

六三

治葛皮二兩 麻黃五兩 去節 丹參五兩 巴豆二升去皮心 桂心二兩 附子十二枚 皂莢二兩去皮子

右十四味以豬脂六升春夏共用調合在後方消停。

又方

丹砂三兩 蒼窮三兩 大黃二兩 蜀椒二兩去目汗 白芷二兩

附子一枚 乾薑五分 治葛二兩 丹參六兩 細辛二兩

麝香六兩 虎二兩

巴豆三升去皮心

右十三味秋冬共用亦在年中有所宜以意消息藥各搗羅之巴豆細切以苦酒漬一夜量足不須覆之明日以豬脂成六升鑄中微火煎三上下膏成勿使傍人及雞犬貓兒其膏同治共敍此方須是細意事持。

又方

丹砂二兩 未去口汗 蜀椒去目閉 大黃 白芷 甘草炙已上

巴豆三升去皮心 麝香 各二兩 蒼窮各二兩 附子一枚 升麻二兩

治葛皮 尸角 當歸 烏頭各二兩 丹參一斤

右十五味切以苦酒漬之一夜以猪脂六升微火煎三上下膏成絞去滓用之此膏是四時常用日三此方無比

丹砂膏敍治百病傷寒溫毒熱疾服如棗核大一枚鼻塞取半核大內鼻中縮氣令人聰裏若耳聾取如兩棗核大洋之如水內其耳中三五年聾可差或寒癲腹滿堅脹及飛尸惡毒楚痛溫酒服霍亂當成未成已吐未痢白湯服棗核大若已痢一兩行而腹煩痛更服之眼中風膜膜或痛常下泪取如粟大注眼中自當下止或半目痛便愈

又胸背喉頸痛摩足口中亦稍稍令常聞有膏氣人體自有不同者易爲藥當服取利爲度老小增減服膏之法得利若不利如人行十五里可與熱飲發當預作白薄粥令冷若過利要止者多進冷粥便住若能忍待藥勢盡自止更佳

赤膏治百病方

治病同丹砂膏用之

治葛皮一兩白芷兩蜀椒二升去目閉口汗大黃各二兩青黛各二兩

巴豆三升去皮心附子十二枚丹參一斤猪脂六升

右九味咬咀以苦酒漬一宿合微火煎三上下白芷黃即膏成絞去滓用傷寒覶鼻溫酒服如棗核大

一枚。

賊風癰疽腫。身體惡氣久。溫痺骨節疼痛。向火摩之。竊疥諸惡瘡。以帛薄之。鼠瘻疽痔下血。身體隱軫。痒搔成瘡。汁出馬鞍牛領。以膏傅之卽愈。腰背手足流腫拘急。屈伸不快。以膏傅之。日三婦人產乳中風。及難產服如棗核大。并以膏摩腹立生。如食魚哽。日五服愈。如耳聾。以膏如小豆大。著耳中。患息肉。以膏內鼻中愈。眼齒痛。以膏如粢注眥中。白蘆醫當童子視。以膏如粟注眥中愈。

治癰疽丹砂膏方

丹砂 末

夜干

大黃

芎藭

麝香 末

黃芩

各二兩

生地黃 切

升麻

前胡

沈香

各三兩

青木香

一兩

右十二味。㕮咀。以苦酒漬淹一宿。以豬脂五升。微火煎三上下。絞去滓。內丹參麝香末。攪調。稍稍服之。

麝香 末

凝水石 黃芩

丹砂 末

芎藭

雞舌香

青木香 各二兩

蘭草 三兩

升麻 三升

羚羊角

夜干

大黃

羊脂 各三兩

一升

右十四味。切。以苦酒漬一夜。用豬脂六升。微火上煎三上下。絞去滓。內麝香丹砂末。攪令調膏成。以摩

病上甚良。

治丁腫生芎窮膏方

生芎窮汁一升丹砂二兩  
麝香末三兩甘草三兩  
當歸二兩升麻二兩  
大黃兩八兩

右十二味咬咀以苦酒漬一夜猪脂五升微火煎三上下膏成摩於腫上。

治癰疽始發未曾治宜速服丹砂膏方

丹砂末犀角二兩夜干三兩  
生地黃十兩大黃三兩  
升麻三兩  
芎窮三兩麝香二兩前胡三兩沈香二兩  
黃芩三兩青木香兩

右十二味咬咀以猪脂五升微火煎三上下止絞去滓入麝香丹砂末攪令調溫酒下如棗核大日三服。

治風溫癰疽諸惡瘡經年不差其著胸臍背日大不可視之恐見肺肺髓者皆主之博當火須以意用之丹砂膏方

丹砂末 雄黃末 附子 天雄 乾地黃 大黃

當歸 秦膠各二兩 烏頭 桂心 黃連 松脂

茴辛各四兩 蜀椒一升去目汗 乾薑二兩 巴豆一百枚去皮心 蠕蚣四枚去足赤者 石南草二兩

右十八味咬咀十六味以苦酒一斗漬一夜以豬脂六升微火煎三上下藥色膏成絞去滓內二石末攪令調傅瘡有口亦可免瘡口此脂多治合卽隨多少苦酒不必盡一斗以意量用之

治癰疥癬諸惡瘡丹砂膏方

蜀椒三升去目汗 丹砂 細辛 桂心各二兩 附子三十枚 前胡

白芷各切一升 蒜薑切 白朮 吳茱萸各一升 當歸一兩

右十一味咬咀諸藥唯椒茱萸不搗以苦酒漬一夜令淹以豬脂不中水者十斤細切合諸藥於銅器內煎三上下白芷黃成膏以綿布絞去滓如患風溫腫不消服如彈丸大一枚

若鼻塞不通以膏著鼻中若青盲風目爛皆痒痛茫茫不見細物以綿裹筋頭注膏中以傅兩眞至臥時再傅之齒痛亦如耳聾亦准之諸惡痛皆治之金瘡牛領馬鞍瘡亦可傅之治下赤腹中有癰

并癰疾在外卽摩之在內卽服之如彈丸大一枚日三服此膏無所不治

治小兒頭瘡并惡紫草膏方

紫草三兩黃連二兩女青一錢白芷各一兩  
礬石三兩燒令汗出苦酒合五升生地榆根一兩

右七味內三味礬石紫草黃連爲末入諸藥煎白芷黃膏成傅瘡上

治小兒熱瘡水銀膏方

水銀兩胡粉兩松脂兩猪脂四升

右四味煎松脂水銀氣出下三物攪令不見銀放冷以傅瘡上

治火瘡相皮膏方

右皮去黑皮用白肉以豬脂少多煎去滓候凝隨意使之

治標疽浸淫廣大赤黑爛壞成瘡羊髓膏方

羊髓兩大黃二兩甘草一兩胡粉二分

右四味咬咀以豬脂二升半并胡粉微火煎三上下絞去滓候冷傅瘡上日四五

治熱毒并結及腫成瘡升麻膏方

升麻 三兩 白朮 一兩 牡蠣 分兩 白芨 二兩

白芨 二兩

茵草 二分 夜干 二兩 大黃 二兩 黃連 二兩

黃連 二兩

右九味咬咀以豬脂三升微火煎膏成絞去滓以傅瘡上日四五。

治熱瘡生地黃膏方

生地黃 白斂 白芷 黃連 升麻 黃芩

大黃 已上各  
十兩

右七味咬咀以豬脂一升半微火煎成膏絞去滓傅瘡日四五。

治惡瘡皆爛雄黃膏方

雄黃 磬石 未 黎蘆 當歸 黃連

附子 各二兩 茵草 蒜頭 白芨 各一兩 巴豆 六十枚  
去皮心

右十味咬咀以豬脂二升微火煎膏成絞去滓內石末攪調傅瘡日四五。

治癰疽瘻水銀膏方

水銀 半兩 胡粉 二兩 松脂 二升 猪脂 四升

右四味先煎松脂水氣盡下胡粉攪令水銀盡不見可傅瘡日三亦治小兒疳熱瘡頭瘡治辨濕瘡白斂膏方

白斂	三兩	白芷	三兩	芎藭	大黃	黃連	各二兩
當歸	三兩	黃耆	二兩	豉炒	八合		
				羊脂	三兩		
				猪脂	二升		
右十味咬咀以二脂合煎內諸藥微火煎膏成去滓候凝傅之							
治皮膚中熱辨濕癰白斂膏方							

白斂  
黃連  
兩各二  
生胡粉  
兩一

黃連  
兩.各二  
生胡粉  
兩.一

右三味搗篩溶脂調和傅之

治熱瘡生地黃膏方

生地黃兩。四  
黃連兩。四  
大黃兩。三  
黃櫟  
甘草炙

兩.四  
黃連  
兩.四

右七味咬咀以猪脂二升半微火合煎膏成绞去滓候凝可傅之

微火合煎膏

成絞去滓候

疑可傳之

治熱瘡生地黃膏方

鬼遣方 卷五

生地黃兩四 黃連兩五 白芷各一 茵藥兩 白芨兩各一 苦參

升麻兩各三

右七味咬咀以猪脂二升半內諸藥同熬膏成去滓候凝傅之

治溫熱諸瘡黃連膏方

黃連一 白斂一 白芷各二 生胡粉一

右四味細篩用猪脂調塗之

治熱瘡蛇床子膏方

蛇床子兩二 乾地黃兩二 苦參兩一 大黃兩二

通草二 白芷一 黃連各一 狼牙二 分

右八味搗篩爲細末用猪脂以意調和塗之

治熱瘡木蘭膏方

木蘭兩一 白芷一 黃連各三

梔子二十 黃芩二 狼牙二 夜干一 蛇床子兩一

黃藥兩二 茵藥兩一

右十味咬咀以猪脂二升合諸藥微火煎膏成去滓塗傅之。

治熱瘡黃連膏方

黃連  
生胡粉各三兩  
白斂二兩  
大黃二兩  
黃藥二兩

右五味爲末用猪脂以意調和塗之。

治灸瘡甘草膏方

甘草一兩  
當歸兩  
胡粉半兩  
羊脂半兩  
豬脂三兩

右五味咬咀以猪羊脂并諸藥微火煎成膏絞去滓候凝傅之。治諸瘡破後大膿血極虛黃耆膏方

黃耆  
附子  
白芷  
甘草  
防風  
大黃

當歸  
續斷  
芍藥各一兩  
蕤蓉一分  
生地黃五分  
細辛三分

右十二味切以猪脂三升內諸藥微火慢煎候白芷黃色膏成絞去滓候凝塗瘡摩四邊口中日四過。治癰疽已潰白芷膏方

白芷三分 甘草三分 烏頭三分 薤白一枚 青竹皮大一塊  
右五味以猪脂一升合煎候白芷黃膏成綬去滓塗四邊。

治諸疽瘡膏方

蠟一兩 亂髮 磬石蒸者一兩 松脂一兩 猪脂四兩

右五味先下脂煎令消下髮髮消下磬石磬石消下松脂松脂消下蠟蠟消膏成濾過候凝塗傅之。  
治鼻中塞利鼻白芷膏方

白芷 通草 蕤核各一分 薫草二錢 羊髓八錢 當歸一分

右六味以清酒煉羊髓二過咬咀諸藥煎膏成綬去滓用小豆大內鼻中日三

治竹木所刺入手足壯不出膿疼痛羊屎膏方

右取乾羊屎搗篩用猪脂和以塗之瘡口立出。

治湯淚入穴爛壞亦膏方

荳兩 附子一枚大者炮 甘草二兩 羊脂五兩不入水者 松脂雞子大一塊 猪脂五兩

右六味微火上煎猪脂後內羊脂并諸藥又煎膏成絞去滓候凝塗瘡上日三。

又方

柏樹皮四兩去黑處 甘草三兩細切 淡竹葉二兩切

右三味以不中水猪脂一升二合入藥煎膏成絞去滓塗瘡上日三。

又方

麻子一合取人 柏皮一兩取白芷一兩去白 生柳皮一兩去白

右四味咬咀以脂一升同藥煎膏成濾去滓候凝傅瘡日三。

治癰疽疥癬及惡瘡蘆茹膏方

蘆茹三兩漆頭者 雄黃末各一兩 丹砂研半兩 亂髮洗半兩

右五味搗篩令調煎以先用猪脂二升半煎髮取盡內諸藥微火更煎候膏成不令他人雞貓犬見傅瘡上日三。

治婦人妬乳生瘡雌黃膏方

鬼遣方 卷五

雌黃 白斂 雄黃 漆頭蘆茹 各一兩  
亂髮 一團如雞子大

右五味各研搗篩以不中水猪脂二升先煎亂髮令盡下諸藥再微火煎候膏成放凝塗瘡上日三四治諸惡瘡麝香膏方

麝香 冷石 雄黃 丹砂 各五分

右四味各細研如粉以臘月豬脂量其多少調和如塗博瘡時先用大黃湯放溫洗了淹乾然後塗膏治頭瘡惡瘡骨疽等牛屎薰方

取苦瓠截除底斷其鼻取牛屎著地上燒以無底瓠籠屎上引煙從瓠空中出以瘡著煙上薰之自然止過三度即除

六物減瘢膏方

衣中白魚 雞屎白 麝糞白 芍藥 白斂 白蜂 等分

右藥研如粉以乳汁和塗瘡上日三良

小品減瘢方

雞矢白 一兩 辛夷人 四分 白附子 二分 細辛 二分

右四味酒浸一宿。以羊脂六合限火煎三上三下。去滓。傷痏。以甘草湯洗訖。塗之。

一方有桂  
二分

又方

鷄屎白一兩研。白蜜和塗痏上。日三。



方丸寧清黃大製秘

撰 遷思孫

祕製大黃清寧丸方

本館據平津館叢  
書本排印初編各  
叢書僅有此本

## 製大黃丸方序

內府傳有十五製大黃丸方。家大人每歲如法製成，以施病者。不論何疾，一服輒愈。適刊素女方，因附于後，以廣其傳。昔家真人思邈少嬰羸疾，博究醫術，撰千金方、千金翼方，集醫學之大成。星衍亦病，俗醫不學，喜搜羅醫方古書，訂證神農本經三百六十種，刊宋本華氏中藏經。然試之治疾，惟製大黃最神効。大黃于本草爲下品，而無毒無所畏。本經稱其主下瘀血，血閉寒熱，破癥瘕積聚，留飲宿食，蕩滌腸胃，推陳致新，通利水穀，調中化食。安和五藏云云。張仲景治傷寒多用之。宋人法帖載唐張旭草書云：忽肚痛不可堪，不知是冷熱所致。永一作若服大黃湯，冷熱皆有益。據此則知大黃不獨治熱病。今俗以寒疾不宜服大黃者非也。古人以單方治疾，或以數十種藥合作丸散，兼治各種疾。如華陀書所載萬應圓，或用湯液，則出於伊尹及張仲景必有一藥爲之君，配以臣佐及使分量。按五行之數，俾行五藏。今人既不解診脈，不知疾在何所，因試之以藥十餘種，輕重任意，不得主宰，不按古方，疾旣委頓，乃復以藥治藥，故漢人有不服藥爲中醫之論，豈不然乎？病有汗吐下三法，而汗吐輒耗元氣，致損食啖，惟下之速愈。而大黃奏効尤神。陶隱居謂其有將軍之號，且經十五製，其性已化，多從小便下達，不致瀉利，是以塞外求大黃，比中原之求人蔘，而此製大黃方亦自都下通行海內。但俗醫惡其速効，遏抑之，率稱不可服。因爲考古，敍

大黃丸方序

其證驗云。五松居士書。時辛未歲二月九日。

# 祕製大黃清寧丸方

係內府所傳。遇諸般病症。每用不過三錢。神效無比。但藥材要好。炮製須照原方各隨症加引。方見奇功。仁入君子能修合廣施。實陰德之一助。

錦文大黃數十斤。或十斤。用布拭去毛。以米泔水浸半日。切片晒乾。每斤入無灰好黃酒半斤。浸三日。取出。晒大半乾。用好陳酒浸更佳。

第一次用側柏葉鋪墊飯底。並蓋藥上。將大黃蒸至一炷香久。取出。晒乾。每次蒸俱另用側柏葉蓋墊。蒸過不用。

第二次用薑荳熬濃汁。將大黃拌透。蒸一炷香久。取出。晒乾。自後每次拌汁蒸晒俱照前法。

第三次用大麥熬濃汁。凡薑荳大麥黑等荳。每大黃一斤。約用二三合。拌透蒸晒。

第四次用馬料荳熬濃汁。

第五次用槐葉熬濃汁。

第六次用桑葉熬濃汁。

第七次用桃葉熬濃汁。

第八次用鮮車前葉熬濃汁。

以上四薑大黃一斤。每重約用二三兩熬汁。拌透蒸晒。

第九次用厚朴熬濃汁。

第十次用陳皮熬濃汁。

第十一次用半夏煎汁。

第十二次用白朮煎汁。

第十三次用香附煎汁。

第十四次用黃芩煎汁。

以上諸藥每大黃一斤各用

一兩煎汁拌透如前蒸罷。

第十五次每大黃一斤用無灰好陳酒一斤拌透晒乾再蒸三炷香時取出晒乾磨爲細末每藥末一斤。

用黃牛乳如無以練過熟真童便姜汁各二兩拌勻用木杵搗千餘下如天時乾燥須將練過好白蜜蓋二兩代之丸如桐子大晒乾盛貯磁器中蓋好勿使泄氣每服大人三錢小兒一錢俱照後症用引煎湯送下累試累効至神至奇。

一頭痛牽連兩眉稜骨者。

火

姜皮燈心湯下。左邊痛者柴胡湯下。右邊痛者桑白皮湯下。兩太陽痛者。

白芷石膏棗本各三錢煎湯下。頭頂作痛者棗本三錢升麻一錢煎湯下。

一頭腦雖痛身不發熱口中發渴。

亦係

淡火用薄荷湯下。

一時時頭暈。

亦係

淡火燈心湯下。

一眼痛初起疼腫異常先用羌活白芷甘菊花

各一錢二分

川芎大黃

各一錢

紅花

三錢

枳殼陳皮

各八分

甘草赤芍

各四分

葱頭

三個

水碗

二煎熟服

次日方服此丸用菊花煎湯下無不効。

一眼害久不愈歸身

一錢

菊花

二錢

煎湯下。

一遇勞碌兩眼卽痛內見黑花龍眼肉

七枚

煎湯下。

一鼻上生紅瘡紅點

心火上炎薰灼肺經所致

用桑白皮燈心煎湯下非服二三十次不能奏效。

一鼻孔生瘡枇杷葉

三錢

煎湯下。

一耳暴聾燈心湯下。

一耳內作癢燈心湯下。

清寧丸方

四

一耳鳴。心腎不足。淡鹽湯下。

一耳鳴。火生之故。是胃火上升。

竹葉燈心湯下。

冬月用  
竹葉

一口舌生瘡。茯苓燈心湯下。

一口唇腫硬。生甘草三錢。煎湯下。

咽喉腫痛。津液難嚥。桔梗甘草湯下。

一牙齒痛。石膏升麻各三錢。煎湯下。

一老年人牙齒常疼。虛火。燈心湯下。

一單雙乳鶯牛膝煎湯下。

一嗽血。麥冬湯下。

一吐血。紅花一錢。煎湯入童便半杯下。

一吐紫血成塊。名爲蓄血。用紅花歸尾甘草稍各三錢。同煎入童便半杯。無灰好陳酒半杯服。

一鼻血不止。燈心湯下。

一、左癱右瘓。秦艽三錢。生姜一片。煎湯下。

一、從高墜下。跌傷身體。蓄血在內。不思飲食。蘇木五錢。煎湯入。重便好陳酒。各半杯。每服五錢。

一、溺血管中。疼痛者。麥冬湯下。

一、溺血。或身體壯實。平日喜食熏炙者。燈心湯下。

一、溺血。或年老體弱者。膀胱蓄熱。水不行之故。宜早服六味丸。晚服此丸。淡鹽湯下。

一、溺血于盆中。少頃如魚如蝦。如絮如石。因自奉不謹。心腎不足所致。牛膝二兩。水煎至一碗。服此丸三錢。

一、大便糞前下血者。歸身二錢。生地白芍川芎各一錢。煎湯下。

一、大便糞後下血者。槐花地榆各一錢。煎湯下。

一、大便或純鮮血者。紅花湯下。

一、大便純鮮血者。當歸湯下。

一、遺精者。淡鹽湯下。

一、白濁。燈心湯下。

一、淋症。燈心湯下。

清寧丸方

六

一 淋症兼痛者 海金沙三錢 煎湯濾清下。

一 胸膈有痰火 燈心湯同姜汁下。

一 胸中時痛時止 口吐酸水 橘餅半個 煎湯下。

一 胸膈飽脹及作酸 姜湯下。

一 胃脘作痛 飲食減少 姜湯下。

一 傷寒發熱 解散出汗後 尚有餘熱未盡 白芨湯下

一 傷寒後 胸膈不寬 百藥無效者 用多年陳香櫟一個 捏碎 取長流水一碗 煎至一碗 去渣露一宿服。

一 嘔吐 煙姜煎湯下。

一 乾嘔 姜湯下。

一 傷風久嗽者 姜湯下。

一 久嗽無痰 乾咳者 麦冬湯下。

一 傷風咳嗽發汗後 餘熱已退 仍咳嗽不止者 姜湯下。

一 咳嗽吐黃痰者 姜湯下。

一·咳嗽吐白痰者。紫蘇湯下。

一·久嗽有痰。諸藥不效者。陳酒或姜皮一錢。三五分酌用。姜湯下。

一·久嗽聲啞者。柯子麥冬湯下。

一·發熱久不退。柴胡湯下。

一·煩渴思飲不休。燈心湯下。

一·痢疾初起。或純白者。姜湯下。

一·痢疾初起。或純紅者。核榔紅花湯下。

一·紅白相間者。姜皮燈心湯下。

一·久痢不止者。炙甘草湯下。

一·噤口痢不止。飲食不進。陳米湯下。

一·胸中作酸。姜湯下。

一·胸中作嘈。姜皮湯下。

一·濕痰流注。初起者。姜湯下。孕婦忌服。

清寧丸方

一、胸膈飽滿。姜汁沖湯下。

一、背心常作痛。又作冷。雖伏天亦怕冷者。此乃五臟各處多有停痰。煨姜煎湯下。

一、肥人素善飲無病。忽然昏沉如醉如癡。或蹲地不起。眼生黑花者。痰也。姜湯下。

一、傷酒。甘菊花煎湯下。

一、眼眶下忽如煤色者。淡也。姜汁沖湯下。

一、水腫。麥冬赤芍煎湯下。久病發腫者不宜。

一、噎膈。姜湯下。若有至五十日不治者。此丸能救之。用四物湯服。川芎。生地。白芍。當歸。

一、中暑者。姜皮燈心湯下。

一、暑瀉。香薷湯下。

一、寒伏暑霍亂者。姜湯下。

一、暑伏寒霍亂者。姜皮湯下。

一、陰陽不和霍亂者。姜湯下。

一·哮喘·大腹皮湯沖服。

一·肥人多痰·姜汁下。

一·盜汗浮小麥煎湯下。

一·自汗浮小麥煎湯下·久用圓眼湯。

一·驚悸怔忡症·石菖蒲汁沖湯下。

一·夜不能寐·炒酸棗仁煎湯下。

一·大便結燥·當歸湯下。

一·小便不通·燈心湯下。

一·癲狂病·燈心湯下。

一·老年痰火·夜不能寐·氣血不和·真廣皮三錢·煎湯·磨木香五分·沖服。

一·身體時時作癢·羣塊如紅雲·則成麻風·菊花湯下。

一·眼目歪邪·出言無緒·罵詈不堪·頃刻又好·心胸經絡有痰·遇火蒸蒸·痰入心竅·故昏惑狂言·少頃心火下降·仍復清明·用茯苓三錢·湯下·非數服·不能愈。

一、嘔吐痰。醒臭如濃血。胸中作痛者。肺癰也。 茄仁一錢。煎湯下。

一、大腸癰。肛門墜痛。或登廁並無糞出。但有紅白水。如痢疾者。槐米湯下。

一、小腸癰。腹中疼痛。臍內出膿水。小便短少者。燈心湯下。

一、四肢無力。遍身筋骨疼痛異常。反側艱難者。木通兩錢。水二碗。煎至一碗。下四錢。三服立愈。

一年老大便結燥。當歸四錢。煎湯下。

一、黃疸。皮膚兩眼如黃金色者。茵陳三錢。煎湯下。

一、蠱脹。大腹皮湯下。

一、跌打損傷。蓄血不行。不思飲食。蘇木湯。加重便服。

女科諸症

一、骨蒸發熱。地骨皮湯下。

一、潮熱盜汗。浮小麥湯下。

一、胸有痰涎。姜湯下。

一、胸膈不寬。香附三錢。煎湯下。

一胃脘時時作痛。良姜湯下。

一常常噯氣。不思飲食。閟悶不樂。

有憂鬱之疾。川芎。當歸。白芍。生地。各一錢。同煎下。餘益與之。香附五錢。姜三片。同煎下。男子同。

### 行經

一經水不調。

用四物湯。川芎。當歸。白芍。生地。各一錢。煎服。

一凡行經時。血氣紫。腹中作痛。

蘇木三錢。同煎。入姜汁三匙。下。

一行經時身痛。益母草湯下。

### 胎前

一孕婦小便不通。燈心湯下。

### 產後

一孕婦遍身發腫。大腹皮湯下。

一產後惡露不盡。腹中作痛。益母草五錢。煎湯。入童便半杯服。或加蘇木三錢。與益母草同煎亦可。

一產後小便不利。木通湯下。

一產後頭暈目暗。四物湯下。

川芎。白芍。

當歸。生地。

一產後大便不通。肛門壅腫。歸身三錢。紅花一錢。同煎服。

一產後發熱。四物湯加益母草三錢。同煎服。

一產後嘔吐不止。藿香湯下。

一乳汁不通。王不留行煎湯下。

小兒諸症

一小兒初生啼聲未出。急將口中污血拭淨。用甘草五錢。煎湯。研丸爲末。七七。調稠灌下。能去一切胎毒。

一小兒吐乳。姜湯下。

一小兒夏日中暑。藿香湯下。

一胎黃。茵陳湯下。

一小便不通。燈心湯下。

一大便結燥。蜜匙。沖湯下。

一暑瀉。燈心湯下。寒瀉忌服。

一慢驚風。人參三分。勾藤一錢。煎湯下。

一急驚風。勾藤薄荷各一分。煎湯下。

一天吼。薄荷勾藤湯下。

一喘症。瘤症。燈心湯下。

一黃疸。燈心湯下。

一重舌。燈心湯下。

一霍亂。藿香湯下。

一瘧疾。檳榔蘇葉煎湯下。

一嘔吐。姜湯下。

一鼻血不止。白茅根搗爛絞汁。沖湯下。

一傷風熱退夜嘔。薄荷湯下。

一癌後咳嗽不止。枇杷葉湯下。

一痧後發熱不退。用銀柴胡三錢。煎湯下。

一中風腫痛。蒼朮三錢。煎湯下。

一小兒幼時不知人事。久雨乍晴。蹲在地上頑耍。致濕氣浸入。睡臥不安。夢中啼哭。勾藤薄荷各三錢。煎湯服。

一小兒身上如紅雲外以朴硝大黃等研末雞蛋白調敷再用燈心服此丸。

一小兒肝疳面青體瘦目黃性急發熱不止小便黃赤喜食酸物銀柴胡湯下。

一脾弱面黃體瘦大便泄瀉唇口生瘡喜食甜物多食無厭或好吃泥土喜睡炙甘草一錢桑白皮湯下。

一腎疳面黑體瘦頭髮直豎小便多熱不食喜食鹹物桑白皮湯下。

一肺疳面白體瘦小便如米湯色鼻流清涕周身毫毛直豎馬料豆煎湯下。

一心疳面紅舌赤發熱體瘦小便短少喜喫辛物茯苓一錢燈心五錢煎湯下。

一小兒痢疾諸症俱照大人所用引服月內小兒每服分作三次服。

中華民國二十六年六月初版

三九八一  
鎮

發行人 王雲五

上海河南路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館

上海及各埠

(本書校對者朱鼎賓銘文)



432