

御纂醫宗金鑑卷三十一

刪補名醫方論卷七

大承氣湯

治陽明病潮熱手足濇然汗出讞語汗出多胃
燥獨語如見鬼狀喘冒不能臥腹滿痛脈滑實
又目中不了了睛不和又少陰病初得之口燥
咽乾者自利清水色純青心下痛口燥舌乾者
六七日腹脹不大便者

大黃 四兩
酒洗

厚朴 半斤

御纂醫宗金鑑卷三十二

刪補名醫方論卷七目錄

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

更衣丸

麻仁丸

桃仁承氣湯

抵當湯丸

從身身身身身金
卷三二二
梔子豉湯

梔子豉加甘草湯

梔子豉加生薑湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

瓜蒂散

小陷胸湯

大陷胸湯丸

三物白散

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

旋覆代赭石湯

麻黃連軀赤小豆湯

梔子蘘皮湯

茵陳蒿湯

御纂醫宗金鑑卷三十一

刪補名醫方論卷七

大承氣湯

治陽明病潮熱手足濇然汗出讞語汗出多胃
燥獨語如見鬼狀喘冒不能臥腹滿痛脈滑實
又目中不了了睛不和又少陰病初得之口燥
咽乾者自利清水色純青心下痛口燥舌乾者
六七日腹脹不大便者

大黃

四兩
酒洗

厚朴
半觔

枳實 五枚

芒消 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃
煮取二升去滓內芒消再上火微煮一二沸
分溫再服得下即停後服

小承氣湯

大黃 四兩

厚朴 二兩
炙 去皮

枳實 三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫
三服初服湯當大便不爾再服以利為度得

便即止服

集註

柯琴曰諸病皆因於氣穢物之不去由於氣之不順也故攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯方分大小者有二義焉厚朴倍大黃是氣藥爲君名大承氣大黃倍厚朴是氣藥爲臣名小承氣味多性猛制大其服欲令大泄下也因名曰大味寡性緩制小其服欲微和胃氣也因名曰小且煎法更有妙義大承氣用水一斗煮枳朴取五升去滓內大黃

再煮取二升內芒消何哉蓋生者氣銳而先行熟者氣純而和緩仲景欲使芒消先化燥屎大黃繼通地道而後枳朴除其痞滿若小承氣以三味同煎不分次第同一大黃而煎法不同此可見仲景微和之意也

喻昌曰金匱治瘧爲病胸滿口噤臥不着席脚攣急必齧齒可與大承氣湯乃死中求生之法也靈樞謂熱而瘧者死腰折瘰癧齒齧也茲所云臥不着席卽腰折之變文脚攣急

卽瘕癥之變文且斷齒加以

口禁上中

下三焦熱邪充斥死不旋踵矣在傷寒證腹
滿可下胸滿則不可下然投是湯者須知所
謂胸滿謂其邪尙在表故不可下此證入裏
之熱極深極重匪可比倫况陽熱深極陰血
立至消亡卽小小下之尙不足以勝其陽救
其陰故取此湯以承領其一綫之陰氣陰氣
不盡爲陽熱所劫因而得生者多矣可與二
字甚活臨證酌而用之初非定法也既有下

之重傷其陰之大戒復有下之急救其陰之
活法學者欲爲深造端在此矣

調胃承氣湯

治表解有汗裏熱不除胃因不和而不作解者

大黃

四兩酒洗

甘草

二兩炙

芒消

半觔

右三味以水三升先煮二味取一升去滓內

芒消微煮令沸少少溫服之

註

三承氣湯之立名而曰大者制大其服欲急

下其邪也小者制小其服欲緩下其邪也曰

調胃者則有調和承順胃氣之義非若大小

專攻下也經曰熱淫於內治以鹹寒火淫於內治以苦寒君大黃之苦寒臣芒消之鹹寒二味並舉攻熱瀉火之力備矣更佐甘草之緩調停於大黃芒消之間又少少溫服之使其力不峻則不能速下而和也

更衣丸

治津液不足腸胃乾燥大便不通

硃砂

五錢研如飛麴

蘆薈

七錢研細生用

滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒下

集註

柯琴曰胃為後天之本不及固病太過亦病

然太過復有陽盛陰虛之別焉兩陽合明而

胃家實仲景製三承氣湯以下之三陽燥結

而津液亡前賢又製更衣丸以潤之古人入

廁必更衣故以此命名也硃砂以汞為體性

寒重墜下達蘆薈以液爲質味苦膏潤下滋
兼以大寒大苦之性味能潤燥結從上導下
而胃關開矣合以爲丸兩者相須得效最宏
奏功甚捷誠匪夷所思矣

麻仁丸 又名脾約丸

治腸胃燥熱大便秘結小便數多

麻子 二升

芍藥 半觔

枳實 半觔

大黃 一觔 去皮

厚朴 一觔 去皮

杏仁 一升 去皮 煎熬碾脂

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十九日

三服漸加以利為度

集註 成無已曰約者約結之約又約束也經曰飲

入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸

於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并
行今胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱
小便數而大便鞭故曰脾約麻仁甘平而
潤杏仁甘溫而潤經曰脾欲緩急食甘以緩
之本草曰潤可去燥是以麻仁爲君杏仁爲
臣枳實破結厚朴瀉滿故以爲佐芍藥調中
大黃通下故以爲使

宋震亨曰旣云脾約血枯火燔津竭理宜滋
陰降火津液自生何秘之有此方雖熱甚而

稟實者可用熱微而虛者愈致燥涸之苦矣

桃仁承氣湯

治血結胸中手不可通或中焦畜血寒熱胸滿
漱水不欲嚥善忘昏迷如狂者此方治敗血留

經通月事

桃仁

五十個
去皮尖

桂枝

三兩

大黃

四兩

芒消

二兩

甘草

二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消
更上火微沸下火先食溫服五合日三服當

微利

抵當湯並丸

治傷寒畜血併治癥瘕追蟲攻毒甚佳

水蛭 三十個 熬

蟪蟲 三十個 熬 去頭足

大黃 三兩

桃仁 三十個 去皮尖

右四味為散以水五升煮三升去滓溫服一

升不下再服利為度

水蛭 二十個 熬

蟪蟲 二十五個 熬去翅

桃仁 二十個 去皮尖

大黃 三兩

右四味杵分爲四丸以水一升煮一丸取七
合服晬時當下血若不下更服

集註

柯琴曰膀胱爲水府血本無所容畜者也少

腹者膀胱之室也熱結鞭滿當小便利而

反利者是病不在膀胱內而在少腹內也可

知其隨經之營血因瘀熱而結於少腹之裏

而非膀胱之裏也故小便雖利而鞭滿急結

畜血仍瘀於少腹也熱淫於內神魂不安故

發狂血瘀不行則營不運故脈微而沉營不

運則氣不宣故沉而結也營氣不周於身則
身黃消穀善饑者胃火熾盛也大便秘反易者
血之濡也色黑者畜血滲入也善忘者血不
榮智不明也此皆瘀血之徵兆非至峻之劑
不足以抵其巢穴而當此重任故立抵當湯
蛭蟲之善飲血者而利於水蠱蟲之善吮血
者而猛於陸並取水陸之善取血者以攻之
同氣相求更佐桃仁之苦甘推陳致新大黃
之苦寒蕩滌邪熱故名抵當也若熱雖盛而

未狂少腹滿而未鞭宜小其制爲丸以緩治之若外證已解少腹急結其人如狂是轉屬陽明用調胃承氣加桃仁桂枝之行血者於其中以微利之胃和則愈矣此桃仁承氣爲治之緩也

梔子豉湯

附加減諸湯

治陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重煩躁心中憤憤怵惕懊憹目疼鼻乾不得臥

梔子

十四枚擘

香豉

四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服

若少氣者加甘草二兩

御製醫方全錄卷三十二
若嘔者加生薑三兩

若下後心煩腹滿起臥不安者去香豉加厚
朴四兩枳實四枚

若醫以丸藥下之身熱不去心中結痛去香
豉加乾薑二兩

若身熱發黃者去香豉加甘草一兩黃蘗二
兩

集註

柯琴曰太陽以心腹爲裏陽明以心腹爲表
蓋陽明之裏是胃實不特發熱惡熱目痛鼻

乾汗出身重謂之表一切虛煩虛熱咽燥口
苦舌胎腹滿煩躁不得臥消渴而小便不利
凡在胃之外者悉是陽明之表也仲景製汗
劑是開太陽表邪之出路製吐劑是引陽明
表邪之出路所以太陽之表宜汗不宜吐陽
明之表當吐不當汗太陽當汗而反吐之便
見自汗出不惡寒饑不能食朝食暮吐欲食
冷食不欲近衣等證此太陽轉屬陽明之表
法當梔子豉湯吐之陽明當吐而不吐反行

汗下溫鍼等法以致心中憤憤怵惕懊懣煩
躁舌胎等證然仍在陽明之表仍當梔子豉
湯主之梔子苦能涌泄寒能勝熱其形象心
又赤色通心故主治心中上下一切證豆形
象腎又黑色入腎製而爲豉輕浮上行能使
心腹之濁邪上出於口一吐而心腹得舒表
裏之煩熱悉解矣所以然者急除胃外之熱
不致胃家之實卽此梔豉湯爲陽明解表之
聖劑矣熱傷氣者少氣加甘草以益氣虛熱

相搏者多嘔加生薑以散邪若下後而心腹
滿起臥不安是熱已入胃便不當吐故去香
豉屎未燥鞭不宜復下故祇用梔子以除煩
佐枳朴以泄滿此兩解心腹之妙又小承氣
之輕劑也若以丸藥下之身熱不去知表未
解也心中結痛知寒留於中也表熱裏寒故
任梔子之苦以除熱倍乾薑之辛以逐寒而
表熱自解裏寒自除然非吐不能達表故用
此以探吐之此又寒熱並用爲和中解表之

劑矣內外熱熾肌肉發黃必須苦甘之劑以
調之藥皮甘草色黃而潤助梔子以除內煩
而解外熱形色之病仍假形色以通之此皆
用梔豉加減以禦陽明表證之變幻也夫梔
子之性能屈曲下行不是上涌之劑惟豉之
藹氣上蒸心肺能令人吐耳觀瓜蒂散必用
豉汁和服是吐在豉而不在梔也梔子乾薑
湯去豉用薑是取其橫開梔子厚朴湯以枳
朴易豉是取其下泄似皆不欲上越之義雖

苦亦能作涌然非探吐不能吐也病人舊微
澹者不可與則梔子之性自明矣

瓜蒂散

治胸中痞鞭痰飲一切實邪及氣衝咽不得息者用此吐之

瓜蒂

一分
熬黃

赤小豆

一分

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢七以香豉一合熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加服得快吐乃止

註

胸中者清陽之府諸邪入胸皆阻陽氣不得

宣達以致胸滿痞鞭熱氣上衝燥渴心煩噎
噎欲吐脈數促者熱鬱結也胸滿痞鞭氣上
衝咽喉不得息手足寒冷欲吐不能吐脈遲
緊者寒鬱結也凡胸中寒熱與氣與飲鬱結
爲病諒非汗下之法所能治必得酸苦湧瀉
之品因而越之上焦得通陽氣得復痞鞭可
消胸中可和也瓜蒂極苦赤豆味酸相須相
益能除胸胃中實邪爲吐劑中第一品也而
佐香豉粥汁合服者藉穀氣以保胃氣也服

之不吐少少加服得快吐而卽止者恐傷胃
中元氣也此方奏功之捷勝於汗下所以三
法鼎立今人不知岐伯仲景之精義置之不
用可勝惜哉

小陷胸湯

治心下痞按之則痛脈浮滑者

黃連 一兩

半夏 半升

栝蒌實

一個大者

右三味以水六升先煮栝蒌實取三升去滓

內諸藥煮取二升分溫三服

集註

程知曰此熱結未深者在心下不似大結胸

之高在心上按之痛比手不可近為輕脈之浮滑又緩於沉緊但痰飲素盛挾熱邪而內

結所以脈見浮滑也以半夏之辛散之黃連
之苦瀉之栝蒌之苦潤滌之皆所以除熱散
結於胸中也先煮栝蒌分溫三服皆以緩治
上之法

程應旂曰黃連滌熱半夏導飲栝蒌潤燥合
之以開結氣亦名曰陷胸者攻雖不峻而一
皆直瀉其胸裏之實邪亦從此奪矣

大陷胸湯丸

主治傷寒發熱不發汗而反下之表熱乘虛入於胸中與不得為汗之水氣結而不散令心下至少腹鞭滿而痛不可近其人身無大熱但頭汗出或潮熱燥渴脈沉緊者如水腫腸澼初起形氣俱實者亦可用

大黃 六兩

芒消

苦葶藶子

杏仁 各半升 去皮

甘遂 一錢 為末

右五味以水先煮大黃杏薤去滓內芒消煮
一二沸內甘遂末溫服得快利止後服如未
劇者加白蜜二合作丸如彈子大水煮一丸
服過宿乃下如不下更服

集註

柯琴曰胸中者宗氣之所出故名氣海氣爲
陽故屬太陽之部氣爲水母氣清則水精四
布氣熱則水濁而壅結矣水結於胸則津液
不下無以潤腸胃故大便必燥不下輸膀胱
故水道不通大黃芒消善滌腸胃之熱實此

病在胸中而亦用以爲君者熱淫於內當治以苦寒且以潤陽明之燥是實則瀉子之法補膀胱之寒亦制之以其所畏也任甘遂之苦辛所以直攻其水結然水結因於氣結必佐杏仁之苦溫以開其水中之氣氣行而水自和矣水結又因於氣熱必佐葶藶之大寒以清其氣分之熱源清而流自潔矣若胸中水結而未及中焦者當小其制而復以白蜜之甘以緩之使留戀於胸中過宿乃下但解

胸心之結滯而保腸胃之無傷是又以攻劑
爲和劑也是方爲利水攻積之劑故治水腫
痢疾之初起者甚捷然必視其人壯實可以
一戰成功如平昔素虛弱與病久而不任攻
伐者當念虛虛之戒矣

三物白散方

治傷寒寒實結胸無熱證者及膈膈寒實痰水
內結等證

桔梗 三分

貝母 三分

巴豆

一分去皮熬
黑研如泥

右杵二味為末內巴豆於臼中杵之以白飲
合服強人一錢羸者減之病在膈上必吐在
膈下必利不利進熱粥一盃利過不止進冷

粥一盃

註

是方治寒實痰水結胸極峻之藥也君以巴豆極辛極烈攻寒逐水斬關奪門所到之處無不破也佐以貝母開胸之結使以桔梗爲之舟楫載巴豆搜逐胸邪膈上者必吐膈下者必利使其邪悉盡無餘矣然惟知任毒以攻邪不量強羸鮮能善其後也故羸者減之不利進熱粥利過進冷粥蓋巴豆性熱得熱則行得冷則止不用水而用粥者藉穀氣以保胃也

大黃黃連瀉心湯

治傷寒表解心下痞按之不軟其脈關上浮者

大黃 二兩

黃連 一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分

溫再服

註

痞鞭虛邪而用大黃黃連能不起後人之疑

耶仲景使人疑處正是妙處蓋因後人未嘗

細玩不得其法皆煎而服之大悖其旨矣觀

乎用氣薄之麻沸湯漬大黃黃連須臾去滓

行身圖說全金卷三十二
三
僅得其無形之氣不重其有形之味是取其
氣味俱薄不大瀉下雖曰攻痞而攻之之妙
義無窮也

附子瀉心湯

治傷寒表解心下痞惡寒汗出者

大黃 二兩

黃連 一兩

黃芩 一兩

附子 一枚炮去皮別煮汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

註

心下鞭痛結胸也鞭而不痛心下痞也惡寒而復汗出非表不解乃表陽虛也故以大黃黃連黃芩瀉痞之熱附子溫表之陽合內外

行身要略卷之三
而治之其妙在以麻沸湯漬三黃須臾絞去
滓內別煮附子汁義在瀉痞之意輕扶陽之
意重也

甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀
不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得
安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此
非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也

甘草 四兩

黃芩 三兩

黃連 一兩

乾薑 三兩

半夏 半升

大棗 十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

註

毋論傷寒中風表未解總不可下醫反下之
因而成痞其人下利日數十行水穀不化腹
中雷鳴者誤下胃中空虛也心下痞鞭而滿
乾嘔心煩不得安者乘虛客邪上逆也醫見
心下痞鞭謂下之不盡又復下之其痞益甚
但此非結熱之痞亦非寒結之痞乃乘胃空
虛客氣上逆陽陷陰凝之痞也方以甘草命
名者取和緩之意用甘草大棗之甘溫補中

緩急治痞之益甚半夏之辛破客逆之上從
芩連瀉陽陷之痞熱乾薑散陰凝之痞寒緩
急破逆瀉痞寒熱備乎其治矣

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解後胃中不和心下痞鞭乾噫食

臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

甘草

二兩
炙

人參

三兩

乾薑

一兩

半夏

半升
洗

黃芩

三兩

黃連

一兩

生薑

四兩
切

大棗

十二枚
擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

註

傷寒汗出之後餘邪轉屬陽明心下痞滿鞭
痛不大便者此其人胃素燥熱因而成實攻
之可也今其人平素胃虛兼脇下有水氣即
不誤下餘熱乘虛入裏結成痞鞭不痛胃虛
不能消化水穀則乾噫食臭也胃中寒熱不
和則腹中雷鳴下利也名生薑瀉心湯者其
義重在散水氣之痞也生薑半夏散脇下之
水氣人參大棗補中州之土虛乾薑甘草以
溫裏寒黃芩黃連以瀉痞熱備乎虛水寒熱

之治胃中不和下利之痞未有不愈者也

半夏瀉心湯

治傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之但滿不痛心下痞者

半夏 半升 洗

黃芩 三兩

乾薑 三兩

人參 三兩

黃連 一兩

甘草 三兩 炙

大棗 十二枚 擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

集註

王又原曰傷寒五六日柴胡證具而以他藥
下之成痞卽用小柴胡湯以乾薑易生薑以
黃連易柴胡彼以和表裏此以徹上下而必
推半夏爲君者痞從嘔得來半夏之辛以破
結而止嘔也

代赭石湯

治汗吐下解之後心下痞鞭噫氣不除

旋覆花 三兩

人參 二兩

代赭石 一兩

半夏 半升

生薑 五兩

甘草 三兩

大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

集註 羅謙輔曰汗吐下解後邪雖去而胃氣已虧

矣胃氣既虧三焦因之失職清無所歸而不
升濁無所納而不降是以邪氣留滯狀飲爲
逆故心下痞鞭噫氣不除方中以人參桂草
養正補虛薑棗邪脾養胃所以安定中州者
至矣更以代赭石之重使之斂浮鎮逆旋覆
花之辛用以宣氣滌飲佐人參以歸氣於下
佐半夏以蠲飲於上濁降痞鞭可消清升噫
氣自除觀仲景治少陰水氣上凌用真武湯
鎮之治下焦滑脫不守用赤石脂禹餘糧固

之治胃中

積下積之

愈者也

從金

金
卷之三十三

麻黃連軹赤小豆湯

治傷寒表不解痰熱在裏發黃者

麻黃 二兩
赤小豆 一升

杏仁 四十枚
去皮尖
生薑 一兩
切

大棗 十二枚
擘
甘草 一兩
炙

生梓白皮 一升
連軹 二兩

以上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日則盡

註 濕熱發黃無表裏證熱盛者清之小便不利

者利之裏實者下之表實者汗之皆無非爲
病求去路也用麻黃湯以開其表使黃從外
而散去桂枝者避其濕熱也佐薑棗者和其
營衛也加連軹梓皮以瀉其熱赤小豆以利
其濕同成表實發黃之效也連軹卽連翹根
無梓皮以茵陳代之成無已日煎以潦水者
取其味薄不助濕熱也

梔子蘖皮湯

治傷寒身黃發熱無表裏證者

梔子

十五枚

甘草

一兩

黃蘖

一兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

註

傷寒身黃發熱者若有無汗之表以麻黃連
軹赤小豆湯汗之若有成實之裏以茵陳蒿
湯下之今外無可汗表證內無可下裏證惟

有黃熱宜以梔子蘗皮湯清之可也此方之
甘草當是茵陳傳寫之誤也

茵陳蒿湯

陽明病發熱但頭汗出身無汗小便不利渴飲
水漿此爲瘀熱在裏身必發黃腹微滿者本方
主之

茵陳蒿 六兩

梔子 十四枚

擘

大黃 二兩

右三味以水二斗先煮茵陳減六升內二味
煮取三升去滓分溫三服小便當利如皂角
汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

集註 柯琴曰 太陽陽明俱有發黃證 但頭汗出而

身無汗則熱不外越 小便不利則熱不下泄

故瘧熱在裏 然裏有不同 肌肉是太陽之裏

當汗而發之 故用麻黃連翹赤小豆湯為涼

散法 心胸是太陽陽明之裏 當寒以勝之用

梔子蘖皮湯 乃清火法 腸胃是陽明之裏 當

瀉之於內 故立本方是逐穢法 茵陳瀉脾湯 北方

之氣 經冬不凋 傲霜凌雪 偏受大寒之氣 故

能除熱邪 留結率 梔子以通水源 大黃以調

胃實令一身內外癢熱悉從小便而出腹滿
自減腸胃無傷乃合引而竭之之法此陽明
利水之聖劑也又曰仲景治陽明渴飲有四
法本太陽轉屬者五苓散微發汗以散水氣
大煩燥渴小便自利者白虎加參清火而生
津脈浮發熱小便不利者豬苓湯滋陰而利
水小便不利腹滿者茵陳蒿湯以泄滿令黃
從小便出病情治法胸有成竹矣每思仲景
利小便必用氣化之品通大便必用承氣之

品故小便不利者必加茯苓甚者兼用豬苓
因二苓爲氣化之品而小便由於氣化也茲
小便不利不用二苓者何本論云陽明病汗
出多而渴者不可與豬苓湯以汗多胃中燥
豬苓湯復利小便故也斯知陽明病汗出多
而渴者不可用則汗不出而渴者津液先虛
更不可用明矣此以推陳致新之茵陳佐以
屈曲下行之梔子不用枳朴以承氣與芒消
之峻利則大黃但可以潤胃燥而大便秘之

遽行可知故必一宿而腹始減黃從小便法
而不由大腸去仲景立法神奇匪夷所思耳

而不由大觀六年秋九月
直而然欲其謂從心野

御纂醫宗金鑑卷三十三

刪補名醫方論卷八目錄

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡桂枝湯

黃芩湯

黃連湯

黃連阿膠湯

理中湯丸

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

附子湯

四逆湯

通脈四逆湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

烏梅丸

赤石脂禹餘糧湯

白頭翁湯

白鹿...

...

...

...

...

御纂醫宗金鑑卷三十三

刪補名醫方論卷八

小柴胡湯

治傷寒五六日寒熱往來胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔口苦耳聾脈弦數者此是少陽經半表半裏之證宜此湯以和解之

柴胡 半觔

黃芩 三兩

人參 三兩

半夏 半升

甘草 三兩

生薑 三兩

大棗

十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎

取三升溫服一升日三服

若胸中煩而不嘔去半夏人參加栝蒌實

若渴者去半夏加人參栝蒌根

若腹中痛去黃芩加芍藥

若脇下痞鞭去大棗加牡蠣

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓

若不渴外有微熱者去人參加桂枝溫覆取

微似汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子乾薑

集註

程應旄曰方以小柴胡名者取配乎少陽之

義也至於制方之旨及加減法則所云上焦

得通津液得下胃氣因和盡之矣何則少陽

脈循脇肋在腹陽背陰兩歧間在表之邪欲

入裏爲裏氣所拒故寒往而熱來表裏相拒

而留於岐分故胸脇苦滿神識以拒而昏困

故嘿嘿木受邪則妨土故不欲食膽爲陽木

而居清道爲邪所鬱火無從泄通炎心分故
心煩清氣鬱而濁則成痰滯故喜嘔嘔則木
火兩舒故喜之也此則少陽定有之證其餘
或之云者以少陽在人身爲遊部凡表裏經
絡之罅皆能隨其虛而見之不定之邪也據
證俱是太陽經中所有者特以五六日上見
故屬之少陽半表半裏兼而有之方是小柴
胡證方中以柴胡疏木使半表之邪得從外
宣黃芩清火使半裏之邪得從內徹半夏豁

痰飲降裏氣之逆人參補久虛助生發之氣
甘草佐柴芩調和內外薑棗佐參夏通達營
衛相須相濟使邪無內向而外解也至若煩
而不嘔者火成燥實而逼胸故去人參半夏
加栝蒌實也渴者燥已耗液而逼肺故去半
夏加栝蒌根也腹中痛木氣散入土中胃陽
受困故去黃芩以安土加白芍以戢木也脇
下痞鞭者邪既留則木氣實故去大棗之甘
而泥加牡蠣之鹹而奠也心下悸小便不利

者水邪侵乎心矣故去黃芩之苦而伐加茯苓之淡而滲也不渴身有微熱者半表之寒尚滯於肌故去人參加桂枝以解之也欬者半表之寒瘳入於肺故去參棗加五味子易生薑爲乾薑以溫之雖肺寒不減黃芩恐乾薑助熱也總之邪在少陽是表寒裏熱兩鬱不得升之故小柴胡之治所謂升降浮沉則順之也

大柴胡湯

治熱結在內心下急嘔不止鬱鬱微煩柴胡證
仍在者與大柴胡湯下之

柴胡 半劔

黃芩 三兩

半夏 半升

芍藥 三兩

枳實 四枚

大黃 二兩

生薑 五兩

大棗 十二枚擘

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎
溫服一升日三服

三冊補名醫方論八

註

柴胡證在又復有裏故立少陽兩解法也以
小柴胡湯加枳實芍藥者仍解其外以和其
內也去參草者以裏不虛少加大黃以瀉結
熱倍生薑者因嘔不止也斯方也柴胡得生
薑之倍解半表之功捷枳芍得大黃之少攻
半裏之效徐雖云下之亦下中之和劑也

柴胡桂枝湯

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結此太陽少陽併病也柴胡桂枝湯主之

柴胡 四兩

桂枝 一兩半

人參 一兩半

甘草 一兩

半夏 二合半洗

黃芩 一兩半

芍藥 一兩半

大棗 六枚擘

生薑 一兩半

右九味以水七升煮取三升去滓分溫服

集註

柯琴曰仲景書中最重柴桂二方以桂枝解
太陽肌表又可以調諸經之肌表小柴胡解
少陽半表亦可以和三陽之半表故於六經
病外獨有桂枝證柴胡證之稱見二方之任
重不拘於經也如陽浮陰弱條是仲景自爲
桂枝證之註釋血弱氣虛條亦仲景自爲柴
胡證之註釋桂枝有壞病柴胡亦有壞病桂
枝有疑似證柴胡亦有疑似證病如桂枝證
而實非若脚攣急與胸中痞鞭者是已病如

柴胡證而實非本渴而飲水嘔食穀嘔與但
欲嘔胸中痛微溼者是已此條爲傷寒六七
日正寒熱當退之時反見發熱惡寒諸表證
更見心下支結諸裏證表裏不解法當表裏
雙解之然惡寒微發熱亦微可知肢節煩疼
則一身骨節不疼可知微嘔心下亦微結故
謂之支結表證雖不去而已輕裏證雖已見
而未甚故取桂枝之半以散太陽未盡之邪
取柴胡之半以解少陽微結之證口不渴身

有微熱者法當去人參以六七日來邪雖未
解而正已虛故仍用之外證雖在而病機已
見於裏故方以柴胡冠桂枝之上爲雙解兩
陽之輕劑也

黃芩湯

治太陽少陽合病自下利者若嘔者加半夏生

薑

黃芩

甘草

芍藥

各三兩

大棗

十二枚擘

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

日再服夜一服

嘔者加半夏升生薑三兩

集註程應旆曰此之合病者頭痛胸滿口苦咽乾

目眩或往來寒熱或脈大而弦半表之邪不待太陽傳遞而即合少陽裏氣失守所以下利陽熱漸盛所以上嘔故用黃芩湯清熱益陰半裏清而半表自解矣

柯琴曰太陽少陽合病是熱邪已入少陽之裏膽火下攻於脾故自下利上逆於胃故兼嘔也與黃芩湯酸苦相濟調中以存陰也熱不在半表故不用柴胡今熱已入半裏故黃芩主之雖非胃實亦非胃虛故不須人參以

補中兼嘔者故仍加半夏生薑以降逆也

黃連湯

治傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者

黃連 三兩

乾薑 三兩

甘草 三兩

人參 二兩

桂枝 三兩

半夏 半升

大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升

日三服夜二服

集註

程應旄曰熱在胸中有煩躁鬱悶之證可知

胃中反有邪氣以寒邪被格在下故也此證

寒熱俱有較之大青龍之寒熱已向近裏一

層故其證不見之表裏際而祇見之上下際

腹中痛者陰邪在胃而寒乃獨治於下也欲

嘔吐者陽邪在胸而熱乃獨治於上也此為

上下相格治法亦寒熱並施而辛寒易以苦

寒辛熱加以苦熱更以人參半夏以補宣中

氣升降陰陽自此條而互及瀉心諸湯皆其

法也

成無已曰濕家下後舌上如胎者以丹田有
熱胸中有寒是邪氣入裏而爲下熱上寒也
此傷寒傳裏而爲下寒上熱也
喻昌曰陰陽悖逆皆當和解法

[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]

黃連阿膠湯

治少陰病得之二三日以上心中煩不得臥

黃連 四兩

黃芩 一兩

芍藥 二兩

雞子黃 二枚

阿膠 二兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內

膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合

日三服

集註 柯琴曰此少陰病之瀉心湯也凡瀉心必藉

連芩而導引有陰陽之別病在三陽胃中不和而心下痞鞭者虛則加參甘補之實則加太黃下之病在少陰而心中煩不得臥者既不得用參甘以助陽亦不得用大黃以傷胃矣用芩連以直折心火用阿膠以補腎陰雞子黃佐芩連於瀉心中補心血芍藥佐阿膠於補陰中斂陰氣斯則心腎交合水升火降是以扶陰瀉陽之方變而爲滋陰和陽之劑也是則少陰之火各歸其部心中之煩不得

臥可除矣經曰陰平陽秘精神乃治斯方之
謂歟

理中湯丸

治中氣不運腹中不實口失滋味病久不食藏
府不調與傷寒直中太陰自利不渴寒多而嘔

等證

人參

三兩

白朮

三兩

甘草

三兩

乾薑

三兩

右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯
數合和一丸研碎溫服之日三四枚夜二枚
腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四

物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服

一升日三服

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

多吐者去朮加生薑三兩

下多者還用朮

悸者加茯苓二兩

渴欲得水者加朮足前成四兩半

腹中痛者加人參足前成四兩半

寒者加乾薑足前成四兩半

腹滿者去术加附子一枚服湯後如食頃飲
熱粥一升許微自溫勿發衣被

集註

程應旆曰陽之動始於溫溫氣得而穀精運
穀氣升而中氣贍故名曰理中實以燮理之
功予中焦之陽也若胃陽虛則中氣失宰膈
中無發宣之用六府無灑陳之功猶如釜薪
失焰故下致清穀上失滋味五藏凌奪諸證
所由來也參术炙草所以守中州乾薑辛以
溫中必假之以焰釜薪而騰陽氣是以穀入

於陰長氣於陽上輸華蓋下攝州都五藏六
府皆以受氣此理中之旨也若水寒互勝卽
當脾腎雙溫加以附子則命門益土母溫矣
白朮補脾得人參則壅氣故臍下動氣吐多
腹滿者去朮也加桂以伐腎邪加生薑以止
嘔也加附子以消陰也下多者濕勝也還用
朮燥濕也渴欲飲水飲渴也加朮使飲化津
生也心下悸停水也加茯苓導水也腹中痛
倍人參虛痛也寒者加乾薑寒甚也

乾薑附子湯

下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔
不渴無表證脈沉微身無大熱者乾薑附子湯
主之

乾薑 一兩

附子

一枚去皮生
川破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

茯苓四逆湯

傷寒厥而心下悸發汗若下之病仍不解煩躁
者茯苓四逆湯主之

茯苓 六兩

人參 一兩

甘草 一兩

乾薑 一兩

附子 一枚生用

破八片

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合

日三服

註

凡太陽病治不如法汗後復下或下後復汗

誤而又誤變成壞病若其人陽盛而從熱化

則轉屬三陽陽衰而從寒化則繫在三陰此

二湯所治之煩躁皆壞病也煩躁雖六經俱

有而多見於太陽少陰者太陽爲真陽之本也未經汗下而煩躁多屬少陰爲真陽之本也未經汗下而煩躁多屬陽其脈實大其證渴熱是煩爲陽盛躁爲陰虛已經汗下而煩躁多屬陰其脈沉微其證汗厥是煩爲陽虛躁爲陰極也夫先下後汗於法爲逆外無大熱內不渴嘔似乎陰陽自和而實妄汗亡陽所以虛陽擾亂於陽分故晝日煩躁不得眠盛陰偏安於陰分故夜而安靜脈沉微是真陽將脫而煩躁也用乾薑

附子壯陽以配陰薑附者陽中陽也生用則力更銳不加甘草則勢更猛是方比四逆爲峻救其相離故當急也先汗後下於法雖順若病不解厥悸仍然驟增晝夜煩躁似乎陰盛格陽而實腎上凌心皆因水不安其位挾陰邪而上乘是陽虛有水氣之煩躁也用茯苓君四逆抑陰以伐水人參佐四逆生氣而益陽參苓君子也兼調以甘草比四逆爲緩陰陽不急故當緩也一去甘草一加參苓而

緩急自別仲景用方之妙如此

附子湯

治少陰病身痛手足寒骨節痛口中和背惡寒

脈沉者

附子

二枚生用去皮破八片

茯苓

三兩

人參

二兩

白朮

四兩

芍藥

三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升

日三服

註

少陰為寒水之藏故傷寒之重者多入少陰

所以少陰一經最多死證方中君附子二枚者取其力之銳且以重其任也生用者一以壯少火之陽一以散中外之寒則惡寒自止身痛自除手足自溫矣所以固生氣之原令五藏六府有本十二經脈有根脈自不沉骨節可和矣更佐白朮以培土芍藥以平木茯苓以伐水水伐火自旺旺則陰翳消木平土益安安則水有制制則生化此萬全之術其畏而不敢用束手待斃者曷可勝計耶

四逆湯

治脈沉厥逆等證

甘草

炙 二兩

乾薑

半 一兩

附子

一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫

再服

強人可大附子一枚乾薑三兩

註

方名四逆者主治少陰中外皆寒四肢厥逆也君以炙草之甘溫溫養陽氣臣以薑附之

辛溫助陽勝寒甘草得薑附鼓腎陽溫中寒
有水中煖土之功薑附得甘草通關節走四
肢有逐陰回陽之力腎陽鼓寒陰消則陽氣
外達而脈升手足溫矣

通脈四逆湯

治少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲
絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或
咽痛或利止脈不出者厥陰下利清穀裏寒外
熱汗出而厥者主之

乾薑

三兩強人可四兩

甘草

二兩炙

附子

大者一枚生用去皮

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫

再服其脈即出者愈

面色赤者加葱九莖

腹中痛者去蔥加芍藥二兩

嘔者加生薑二兩

咽痛去芍藥加桔梗一兩

利止脈不出者加人參二兩

註

論中扶陽抑陰之劑中寒陽微不能外達主以四逆中外俱寒陽氣虛甚主以附子陰盛於下格陽於上主以白通陰盛於內格陽於外主以通脈是則可知四逆運行陽氣者也

附子溫補陽氣者也白通宣通上下之陽氣者也通脈通達內外之陽氣者也今脈微欲絕裏寒外熱是腎中陰盛格陽於外故主之也倍乾薑加甘草佐附子易名通脈四逆湯者以其能大壯元陽主持中外共招外熱反之於內蓋此時生氣已離亡在俄頃若以柔緩之甘草爲君豈能疾呼外陽耶故易以乾薑然必加甘草與乾薑等分者恐渙漫之餘薑附之猛不能安養元氣所謂有制之師也

若面赤者加葱以通格上之陽腹痛者加芍藥以和在裏之陰嘔逆者加生薑以止嘔咽痛者加桔梗以利咽利止脈不出氣少者俱倍人參以生元氣而復脈也

白通湯

治少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脈暴出者死脈微續者生

葱白 四莖

乾薑 一兩

附子

一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通加豬膽汁湯

葱白 四莖

乾薑 一兩

附子

一枚生用去皮破八片

人尿

五合

豬膽汁

一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內豬膽

汁人尿和令相得分溫再服若無膽汁亦可

註

是方也即四逆湯減甘草加葱白也而名之

曰白通者以葱白能通陽氣也減甘草者因

其緩也加尿膽者從其類也下咽之後冷體

既消熱性便發情且不違而致大益則二氣

之拒格可調上下之陰陽可通矣

真武湯

治少陰水氣為患腹痛下利四肢沉重疼痛小便不利其人或咳或嘔或小便利而下利者用

此加減

白朮 二兩

茯苓 二兩

白芍 二兩

大附子 一枚

生薑 三兩切

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合

日三服

若咳者加五味子半升細辛乾薑各一兩

若小便利者去茯苓

若下利去芍藥加乾薑二兩

若嘔去附子加生薑足成半筋

註

小青龍湯治表不解有水氣中外皆寒實之

病也真武湯治表已解有水氣中外皆寒虛

之病也真武者北方司水之神也以之名湯

者藉以鎮水之義也夫人一身制水者脾也

主水者腎也腎爲胃關聚水而從其類倘腎

中無陽則脾之樞機雖運而腎之關門不開
水卽欲行以無主制故泛溢妄行而有是證
也用附子之辛熱壯腎之元陽則水有所主
矣白朮之苦燥建立中土則水有所制矣生
薑之辛散佐附子以補陽於主水中寓散水
之意茯苓之淡滲佐白朮以健土於制水中
寓利水之道焉而尤妙在芍藥之酸收伸景
之旨微矣蓋人之身陽根於陰若徒以辛熱
補陽不少佐以酸收之品恐真陽飛越矣用

芍藥者是亟收陽氣歸根於陰也於此推之則可知誤服青龍致發汗亡陽者所以於補陽藥中之必需芍藥也然下利減芍藥者以其陽不外散也加乾薑者以其溫中勝寒也水寒傷肺則咳加細辛乾薑者散水寒也加五味子者收肺氣也小便利者去茯苓以其雖寒而水不能停也嘔者去附子倍生薑以其病非下焦水停於胃也所以不須溫腎以行水祇當溫胃以散水且生薑功能止嘔也

當歸四逆湯

手足厥冷脈細欲絕者主之若其人內有久寒

加吳茱萸生薑

當歸 三兩

桂枝 三兩

芍藥 三兩

細辛 二兩

通草 二兩

甘草 二兩

大棗 二十五枚

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升

日三服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

於前湯內加吳茱萸半觔生薑三兩

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓分溫五服

註

凡厥陰病則脈微而厥以厥陰爲三陰之盡陰盡陽生若受其邪則陰陽之氣不相順接故脈微而厥也然厥陰之藏相火遊行其間經雖受寒而藏不卽寒故先厥者後必發熱所以傷寒初起見其手足厥冷脈細欲絕者

不得遽認爲虛寒而用薑附也此方取桂枝
湯君以當歸者厥陰主肝爲血室也佐細辛
味極辛能達三陰外溫經而內溫藏通草其
性極通善開關節內通竅而外通營倍加大
棗卽建中加飴用甘之法減去生薑恐辛過
甚而迅散也肝之志苦急肝之神欲散甘辛
並舉則志遂而神悅未有厥陰神志遂悅而
脈微不出手足不溫者也不須參苓之補不
用薑附之峻此厥陰厥逆與太少不同治也

分卷之四 金 卷之三 三
若其人內有久寒非辛溫之品所能兼治則
加吳茱萸生薑之辛熱更用酒煎佐細辛直
通厥陰之藏迅散內外之寒是又救厥陰內
外兩傷於寒之法也

吳茱萸湯

治厥陰病乾嘔吐涎沫頭痛者少陰證吐利手足厥冷煩躁欲死者陽明食穀欲嘔者

吳茱萸一升 人參三兩

生薑六兩 大棗十二枚

右四味以水七升煮取二升溫服七合日三

服

集註 羅謙輔曰仲景救陽諸法於少陰四逆湯必

用薑附通脈四逆湯倍加乾薑其附子生用

附子湯又加生附至二枚所以然者或壯微陽使之外達或招飛陽使之內返此皆少陰真陽失所故以回陽爲亟也至其治厥陰則易以吳茱萸而併去前湯諸藥獨用人參薑棗者蓋人身厥陰肝木雖爲兩陰交盡而一陽之真氣實起其中此之生氣一虛則三陰濁氣直逼中上不惟本經諸證悉具將陽明之健運失職以至少陰之真陽浮露而吐利厥逆煩躁欲死食穀欲嘔種種叢生矣吳茱

莫得東方震氣辛苦大熱能達木鬱直入厥
陰降其盛陰之濁氣使陰翳全消用以爲君
人參秉冲和之氣甘溫大補能接天真挽回
性命升其垂絕之生氣令陽光普照用以爲
臣佐薑棗和胃而行四末斯則震坤合德木
土不害一陽之妙用成而三焦之間無非生
生之氣矣諸證有不退者乎蓋仲景之法於
少陰則重固元陽於厥陰則重護生氣學者
當深思而得之矣

...

...

...

...

...

...

...

...

...

烏梅丸

治厥陰病消渴氣上撞心中疼熱饑而不欲

食食即吐或又主久痢

烏梅

三百箇

細辛

六兩

乾薑

十兩

黃連

一觔

當歸

四兩

附子

六兩

蜀椒

四兩
去汗

桂枝

六兩

人參

六兩

黃蘗

六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒浸烏梅一宿

去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相
得內臼中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先
食飲服十九日三稍加至二十九禁生冷滑
物臭食等

集註

柯琴曰六陰惟厥陰爲難治其本陰其標熱
其體木其用火必伏其所主而先其所因或
收或散或逆或從隨所利而行之調其中氣
使之和平是治厥陰法也厥陰當兩陰交盡
又名陰之絕陽宜無熱矣第其具合晦朔之

理陰之初盡卽湯之初生所以厥陰病熱是
少陽使然也火王則水虧故消渴氣上撞心
心中疼熱氣有餘便是火也木勝則尅土故
饑不欲食蟲爲風化饑則胃中空虛虵聞食
臭出故吐虵也仲景立方皆以甘辛苦味爲
君不用酸收之品而此用之者以厥陰主肝
木耳洪範曰木曰曲直作酸內經曰木生酸
酸入肝君烏梅之大酸是伏其所主也配黃
連瀉心而除疼佐黃蘗滋腎以除渴先其所

因也連藥治厥陰陽邪則有餘不足以治陰
邪也椒附辛薑大辛之品並舉不但治厥陰
陰邪且肝欲散以辛散之也又加桂枝當歸
是肝藏血求其所屬也寒熱雜用則氣味不
和佐以人參調其中氣以苦酒浸烏梅同氣
相求蒸之米下資其穀氣加蜜爲丸少與而
漸加之緩則治其本也虻昆蟲也生冷之物
與濕熱之氣相成故藥亦寒熱互用且胸中
煩而吐虻則連藥是寒因熱用也虻得酸則

靜得辛則伏得苦則下信爲治蟲佳劑久痢
則虛調其寒熱酸以收之下痢自止

其寒熱以察之

其脈以察之

赤石脂禹餘糧湯

治久利不止大腸虛脫服理中丸而利益甚者

赤石脂

一劬搗碎

禹餘糧

一劬搗碎

右二味以水六升煮取二升去滓分溫三服

集註

柯琴曰甘薑參朮可以補中宮元氣之虛而

不足以固下焦脂膏之脫此利在下焦故不

得以理中之劑收功矣然大腸之不固仍責

在胃關門之不閉仍責在脾二石皆土之精

氣所結實胃而瀉腸急以治下焦之標者實

以培中宮之本也。要知此證土虛而火不虛，故不宜於薑附若濕甚而虛不甚，復利不止者，故又當利小便也。

白頭翁湯

治厥陰熱利下重脈沉弦渴欲飲水者

白頭翁 三兩

黃連 三兩

黃蘗 三兩

秦皮 三兩

右四味以水七升煮取三升去滓溫服一升
不愈更服一升

註

三陰俱有下利證自利不渴者屬太陰也自
利而渴者屬少陰也惟厥陰下利屬於寒者
厥而不渴下利清穀屬於熱者消渴下重下

利膿血此熱利下重乃火鬱濕蒸穢氣奔迫
廣腸魄門重滯而難出內經云暴注下迫者
是矣君以白頭翁寒而苦辛臣以秦皮寒而
苦瀉寒能勝熱苦能燥濕辛以散火之鬱瀉
以收下重之利也佐黃連清上焦之火則渴
可止使黃蘗瀉下焦之熱則利自除也治厥
陰熱利有二初利用此方以苦燥之以辛散
之以瀉固之是謂以寒治熱之法久利則用
烏梅丸之酸以收火佐以苦寒雜以溫補是

謂逆之從之隨所利而行之調其氣使之平也

也

此