


欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷

七六



詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方

婦人方

問答

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

比年至七十與少不殊

鍾乳澤蘭丸也

補丹... 婦人五勞七傷... 冷瘦削而無顏色飲食

備急千金要方

減少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補

益方

栢子仁

黃耆

乾薑

紫石英 各二兩

蜀椒

一兩半

杜仲

當歸

甘草

芎藭

各四十銖

厚朴

桂心

桔梗

赤石脂

茯苓

五味子

白朮

細辛

獨活

人參

石斛

白芷

芍藥 各一兩

澤蘭 二兩六銖

藁本

蕪荑

各十八銖

乾地黄

烏頭

一方作牛膝

防風

各三十銖

鍾乳

白石英

各二兩

右三十味為末蜜和酒服二十九如梧子不知加至

三十丸

千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦朮各半兩為三十三味并治產後半身枯悴

大五石澤蘭圓治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩急風頭

痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹痛堅逆飲食手

足冷多夢身體痺痛榮衛不和虛弱不能動及產後虛

損並宜服方

鍾乳

禹餘糧

紫石英

甘草

黃耆

各二兩半

石膏

白石英

蜀椒

乾薑

各二兩

澤蘭

二兩六銖

當歸

桂心

芎藭

厚朴

栝子仁

乾地黄

細辛

茯苓

五味子

龍骨

各一兩半

石斛

遠志

人參

續斷

白朮

防風

烏頭

各三銖

山茱萸

紫苑

各一兩

白芷

藁本

蕪荑

各十銖

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九丸加

至三十九丸

千金翼有陽起石二兩

小五石澤蘭圓治婦人勞冷虛損飲食減少面無光色腹中冷痛經候不調吸吸少氣無力補益温中方

鍾乳

紫石英

礬石

各一兩半

白石英

赤石脂

當歸

甘草

各四十兩

石膏

陽起石

乾薑

各二兩

澤蘭

二兩六銖

茯苓

龍骨

桂心

各二兩半

白朮

芍藥

厚朴

人參

蜀椒

山茱萸

各三
十銖

栝子仁

藁本

各一
兩

蕪荑

十八
銖

右二十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九加

至三十九日三

增損澤蘭圓治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭

甘草

當歸

芍藥

各四十
二銖

附子

乾薑

白朮

白芷

桂心

細辛

各一
兩

防風

人參

牛膝 各三十銖

栝子仁

乾地黄

石斛 各三十銖

厚朴

藁本

蕪荑 各半兩

麥門冬 二兩

右二十味為末蜜和丸如梧子空腹酒下十五丸至二十九

大補益當歸圓治產後虛羸不足胸中少氣腹中拘急疼痛或引腰背痛或所下過多血不止虛竭乏氣晝夜不得眠及崩中面目脫色唇乾口燥亦治男子傷絕或從高墮下內有所傷藏虛吐血及金瘡傷犯皮肉方

當歸

芍藥

續斷

乾薑

阿膠

甘草

各四兩

白朮

吳茱萸

附子

白芷

各三兩

桂心

芍藥

乾地黄

十兩

右十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日三

夜一不知加至五十丸若有真蒲黃加一升絕妙

白芷圓治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目

脫色腹中痛方

白芷

五兩

乾地黄

四兩

續斷

乾薑

當歸

阿膠

各三兩

附子

一兩

右七味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日四五

服無當歸芎藭代入蒲黃一兩妙無續斷大薊根代

紫石英栝子仁圓治女子遇冬天時行溫風至春夏病

熱頭痛熱毒風虛百脉沉重下赤白不思飲食而頭眩

心悸酸慚恍惚不能起居方

紫石英

栝子仁

各三兩

烏頭

桂心

當歸

山茱萸

澤瀉

芍藥

石斛

遠志

寄生

菴蓉

乾薑

甘草

蜀椒

杜衡

杜一作仲

辛夷

各一兩

細辛

一兩半

右十八味為末蜜和丸如梧子酒服二十九丸漸加至

三十九日三服一方用牡蠣一兩

鍾乳澤蘭圓治婦人久虛羸瘦四肢百體煩疼臍下結

冷不能食面目瘀黑憂恚不樂百病方

鍾乳 二兩

澤蘭 三兩六銖

防風 四銖二銖

人參

栢子仁

麥門冬

乾地黄

石膏

石斛 各一兩半

芍藥

甘草

白芷

牛膝

山茱萸

薯蕷

當歸

藁本 各三十銖

細辛

桂心 各一兩

蕪荑 半兩

艾葉 十八銖

右二十一味為末蜜和丸如梧子酒服二十九加至

四十丸日二服

大... 卷...

備急千金要方

六

大澤蘭圓治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或
頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上游風去來目
淚出多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不止及泄
痢淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或
漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮膚中澀如麻
豆苦癢痰癖結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目
眩無所見或上氣惡寒洒淅如瘧或喉痺鼻繩風癩癩
疾或月水不通魂魄不定飲食無味并產後內衄無所

不治服之令人有子方

澤蘭 二兩
六銖

藁木

當歸

甘草 各一兩
十八銖

紫石英 三兩

芎藭

乾地黄

栝子仁

五味子 各一兩
半

桂心

石斛

白朮 一兩
六銖

白芷

菝葜

厚朴

防風

薯蕷

茯苓

乾薑

禹餘糧

細辛

卷栢 各一兩

蜀椒

人參

杜仲

牛膝

蛇牀子

續斷

艾葉

燕羨

各十
八銖

赤石脂

石膏

各二
兩

一有枳實

十八
銖

麥門冬

一兩
半

右三十二味為末蜜和為丸如梧子大酒服二十九

至四十九久赤白痢去乾地黃石膏麥門冬栝子仁

加大麥蘖陳麴龍骨阿膠黃連

各一兩半有鍾
乳加三兩良

小澤蘭圓治產後虛羸勞冷身體尪瘦方

澤蘭

二兩
六銖

當歸

甘草

各一兩
十八銖

芎藭

栝子仁

防風

茯苓

各一
兩

白芷

蜀椒

藁本

細辛

白朮

桂心

蕪荑

人參

食茱萸

厚朴

各十八銖

石膏

二兩

右十八味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日三

服稍加至四十丸無疾者依此方春秋二時常服一

劑甚良有病虛羸黃瘦者服如前一方無茯苓石膏

有芍藥乾薑

胡洽十五味無栢子仁人參食茱萸除細辛桂心生用外盡熬令變色為末蜜

丸如彈子大內暖酒中服之千金翼無茯苓食茱萸有乾薑一兩

紫石英天門冬圓主風冷在子宮有子常墮落或始為婦便患心痛仍成心疾月水都未曾來服之肥充令人有子方

紫石英

天門冬

禹餘糧

各三兩

燕羨

烏頭

菴蓉

桂心

甘草

五味子

栝子仁

石斛

人參

澤瀉

一作澤蘭

遠志

杜仲

各二兩

蜀椒

卷栝

寄生

石南

雲母

當歸

一作辛夷

烏賊骨

各一兩

右二十二味為末蜜和為丸梧子大酒服二十九日
二服加至四十九

三石澤蘭圓治風虛不足通血脉補寒冷方亦名石斛

澤蘭丸

鍾乳

白石英

各四兩

紫石英

防風

藁朮

茯神

各一兩六銖

澤蘭

二兩六銖

黃耆

石斛

石膏

各二兩

甘草

當歸

芎藭 各一兩十八銖 白朮

桂心 人參

乾薑 獨活

乾地黄 各一兩半 白芷

桔梗 細辛

栝子仁 五味子

蜀椒 黃芩

菴蓉 芍藥

秦朮 防葵 各一兩

厚朴 蕪荑 各十八銖

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九加

至三十九日二三服

大平胃澤蘭圓治男子女人五勞七傷諸不足定志意

除煩滿手足虛冷羸瘦及月水往來不調不能動等方

澤蘭

細辛

黃耆

鍾乳

各三兩

栝子仁

乾地黄

各二兩半

大黃

前胡

遠志

紫石英

各二兩

芍藥

白朮

蜀椒

各一兩半

白芷

丹參

梔子

一本用枳實

芍藥

桔梗

秦朮

沙參

桂心

厚朴

石斛

苦參

人參

麥門冬

乾薑

各一兩

附子

六兩

吳茱萸

麥蘖 各五合

陳麴 升一

棗 五十枚作膏

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九加

至三十丸令人肥健 一本無乾薑有當歸三兩

澤蘭散治產後風虛方

澤蘭 九分

禹餘糧

防風 各十分

石膏

白芷

乾地黄

赤石脂

肉蓯蓉

鹿茸

芎藭 各八分

藁朮

蜀椒

白朮

栝子仁 各五分

桂心

甘草

當歸

乾薑

各七分

蕪荑

細辛

厚朴

各四分

人參

三分

右二十二味治下節酒服方寸七日三

月水不通第十九

方

桃仁湯治婦人月水不通方

桃仁

朴硝

牡丹皮

射干

土瓜根

黃芩

各三兩

芍藥

大黃

柴胡

各四兩

牛膝

桂心

各二兩

水蛭

蝨蟲

各七
十枚

右十三味咬咀以水九升煮取二升半去滓分三服
乾薑圓治婦人寒熱羸瘦酸消怠惰胸中支滿肩背脊
重痛腹裏堅滿積聚或痛不可忍引腰小腹痛四肢煩
疼手足厥逆寒至肘膝或煩滿手足虛熱意欲投水中
百節盡痛心下常苦懸痛時寒時熱惡心涎唾喜出每
愛鹹酸甜苦之物身體或如雞皮月經不通大小便苦
難食不生肌方

乾薑

芎藭

茯苓

消石

杏仁

水蛭

蝨蟲

桃仁

蟻螯

廣蟲 各一兩

柴胡

芍藥

人參

大黃

蜀椒

當歸 各二兩

右十六味為末蜜和丸如梧子空心飲下三丸不知

加至十丸

千金翼以療婦人
瘕結脅肋下疾

乾漆湯治月水不通小腹堅痛不得近方

乾漆

萎蕤

芍藥

細辛

甘草

附子各一兩

當歸

桂心

芒硝

黃芩各二兩

大黃三兩

吳茱萸一升

右十二味㕮咀以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓

內消烱盡分為三服相去如一炊頃

芒硝湯治月經不通方

芒硝

丹砂末

當歸

芍藥

土瓜根

水蛭各二兩

大黃三兩

桃仁一升

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓內丹砂芒硝

分為三服

治月經不通心腹痛絞欲死通血止痛方

當歸

大黃

芍藥各三兩

吳茱萸

乾地黄

乾薑

芎藭

蝨蟲

水蛭各二兩

細辛

甘草

桂心各一兩

梔子十四枚

桃仁升一

右十四味以水一斗五升煮取五升分為五服

一本有牛膝麻子仁各三兩

桃仁湯治月經不通方

桃仁升一

當歸

土瓜根

大黃

水蛭

蝨蟲

芒硝各二兩

牛膝

麻子仁

桂心各三兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升半去滓內消令烊

分為三服

肘後無當歸麻子仁用牡丹射干黃芩芍藥柴胡各三兩為十三味千金翼無蝨蟲

前胡牡丹湯治婦人盛實有熱在腹月經瘀閉不通及

勞熱熱病後或因月經來得熱不通方

前胡

牡丹

玄參

桃仁

黃芩

射干

旋復花

栝蒌根

甘草

各二兩

芍藥

茯苓

大黃

枳實

各三兩

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服

乾地黃當歸圓治月水不通或一月再來或隔月不至或多或少或淋瀝不斷或來而腰腹刺痛不可忍四體噓吸不欲食心腹堅痛有青黃黑色水下或如清水不

欲行動舉體沉重惟思眠卧欲食酸物虛乏黃瘦方

乾地黄三兩

當歸

甘草各一兩半

牛膝

芍藥

乾薑

澤蘭

人參

牡丹各一兩六銖

丹參

蜀椒

白芷

黃芩

桑耳

桂心各一兩

廣蟲四十枚

芎藭一兩十銖八銖

桃仁二兩

水蛭

蝨蟲各七枚

蒲黃二合

右二十一味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下

十五丸漸加至三十丸以知為度一本無

牡丹圓治婦人女子諸病後月經閉絕不通及從小來不通并新產後瘀血不消服諸湯利血後餘疾未平宜服之取平復方

牡丹三兩

芍藥

玄參

桃仁

當歸

桂心各二兩

蝨蟲

水蛭各五枚

蟻螯二枚

瞿麥

芎藭

海藻各一兩

右十二味為末蜜和丸如梧子大酒下十五丸加至

二十九丸血盛者作散服方寸七腹中當轉如沸血自

化成水去如小便赤少除桂心用地膚子一兩

黃芩牡丹湯治女人從小至大月經未嘗來顏色萎黃

氣力衰少飲食無味方

黃芩

牡丹

桃仁

瞿麥

芍藥各二兩

芍藥

枳實

射干

海藻

大黃各三兩

蝨蟲七十枚

水蛭五十枚

蟻螯十枚

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升分三服服兩劑
後灸乳下一寸黑員際各五十壯

治月經不通方

取葶藶一升為末蜜丸如彈子大綿裹內陰中入三
寸每丸一宿易之有汁出止

乾漆圓治月經不通百病不瘥方

乾漆

土瓜根

射干

芍藥

各一兩半

牡丹

牛膝

黃芩

桂心

吳茱萸

大黃

柴胡

各一兩
六銖

桃仁

鼈甲

各二兩

麩蟲

蟻螯

各四
十枚

水蛭

七蟲

各七
十枚

大麻仁

合四

亂髮

雞子大
二枚

菴藺子

合二

右二十味為末以蜜和為丸每日酒下十五丸梧子大漸加至三十丸日三仍用後浸酒服前丸藥

浸酒方

大麻子

升三

菴藺子

升二

桃仁

升一

竈屋焙煤

兩四

土瓜根

射干

各六
兩

牛膝

兩八

桂心

兩四

右八味以咀咀以清酒三斗絹袋盛藥浸五宿以一盞
下前丸藥甚良或單服之亦好

當歸圓治女人臍下癥結刺痛如蟲所嚙及如錐刀所
刺或赤白帶下十二疾腰背疼痛月水或在月前或在
月後方

當歸

葶藶

附子

吳茱萸

大黃 各二兩

黃芩

桂心

乾薑

牡丹

芍藥 各一兩半

細辛

秦椒

柴胡

厚朴

各一兩
六銖

牡蒙

一方
無

甘草

各一
兩

蝨蟲

水蛭

各五
十枝

右十八味為末蜜和丸如梧子大空心酒下十五丸

日再有胎勿服之

鼈甲圓治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周
流痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火炎玉門
冷如風吹經水不通或在月前或在月後服之三十日
便瘥有孕此是河內太守魏夫人方

鼈甲

桂心 各一兩半

蜂房 兩半

玄參

蜀椒

細辛

人參

苦參

丹參

沙參

吳茱萸 各十銖

廣蟲

水蛭

乾薑

牡丹

附子

皂莢

當歸

芍藥

甘草

防葵 各一兩

蟻螯 二十枚

蝨蟲

大黃 各一兩六銖

右二十四味為末蜜和丸如梧子大酒下七丸日三稍加之以知為度

又方治婦人因產後虛冷堅結積在腹內月經往來不
時苦腹脹滿繞臍下痛引腰背手足煩或冷熱心悶不
欲食方

鼈甲 一兩半

乾薑

赤石脂

丹參

禹餘糧

當歸

白芷 一方用木

乾地黄 各一兩六銖

代赭

甘草

鹿茸

烏賊骨

殭蠶 各十銖

桂心

細辛

蜀椒

附子 各一兩

右十七味蜜和丸如梧子大空心酒下五丸加至十丸

禹餘糧圓治婦人產後積冷堅癖方

禹餘糧

烏賊骨

吳茱萸

桂心

蜀椒

各二兩半

當歸

白朮

細辛

乾地黄

人參

芍藥

芎藭

前胡

各一兩六銖

乾薑

三兩

礬石

六銖

白薇

紫苑

黃芩

各十八銖

麩蟲

一兩

右十九味為末蜜和丸如梧子空心酒若飲下二十丸日二不知則加之

牡蒙圓治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷風寒氣或產後未滿百日胞絡惡血未盡便利於懸圓上及久坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛為之積聚小如雞子大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙或如針刺氣時搶心兩脇支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃管痛連玉門背膊嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中創欬

引陰痛小便自出子門不正令人無子腰膝疼痛四肢
沉重淫躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或
月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不

祥方

亦名紫蓋丸

牡蒙

厚朴

消石

前胡

乾薑

麝蟲

牡丹

蜀椒

黃芩

桔梗

茯苓

細辛

葶藶

人參

芍藥

吳茱萸

桂心 各十
八銖

大黃 二兩
半

附子 一兩
六銖

當歸 半兩

右二十味為末蜜和更搗萬杵丸如梧子大空心酒

服三丸日三不知則加之至五六丸下青白黃赤物

如魚子者病根出矣

治月經不通結成癥瘕如石腹大骨立宜此破血下癥

方

大黃

消石 各六
兩

巴豆

蜀椒 各一
兩

代赭

柴胡 熬
色

水蛭

丹參 紫
色

土瓜根 各三兩 乾漆 芎藭 乾薑

蝨蟲 茯苓 各二兩

右十四味為末巴豆別研蜜和丸如梧子空心酒服

二丸未知加五丸日再服 千金翼無柴胡水 蛭丹參土瓜根

大蝨蟲圓治月經不通五七年或腫滿氣逆腹脹癢痛

宜服此數有神驗方

蝨蟲 四百枚 蟻螬 一升 乾地黄 牡丹

乾漆 芍藥 牛膝 土瓜根

桂心 各四兩

吳茱萸

桃仁

黃芩

牡蒙 各三兩

茯苓

海藻 各五兩

水蛭 三百枚

芒硝 一兩

人參 一兩半

葶藶 五合

右十九味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下七

丸不知加之日三服 千金翼無芒硝人參

桂心酒治月經不通結成癥瘕方

桂心

牡丹

芍藥

牛膝

乾漆

土瓜根

牡蒙 各口兩

吳茱萸 升一

大黃 三兩

黃芩

乾薑 各二兩

蝨蟲 二百枚

廣蟲

齊蠟

水蛭 各七枚

亂髮灰

細辛 各一兩

殭蠶 五十枚

大麻仁

竈突墨 三升

乾地黃 六兩

虎杖根

鼈甲 各五兩

菴藷子 二升

右二十四味 㕮咀以酒四斗分兩甕浸之七日併一

甕盛攪令調還分作兩甕初服二合日二加至三四

合

虎杖煎治腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重月經不通亦

治丈夫病方

取高地虎杖根細剉二斛以水二石五斗煮取一大斗半去滓澄濾令淨取好醇酒五升和煎令如錫每服一合消息為度不知則加之

又方治月經閉不通結癥腹大如甕短氣欲死方

虎杖根 百斤去頭去土曝乾切

土瓜根

牛膝 各取汁二斗

右三味以水一斛浸虎杖根一宿明旦煎取二斗內土瓜牛膝汁攪令調勻煎令如錫每以酒服一

合日再夜一宿血當下若病去但服

桃仁煎治帶下經閉不通方

桃仁

蝨蟲

各一升

朴硝

五兩

大黃

六兩

右四味為末別治桃仁以醇苦酒四升內銅鐺中炭火煎取二升下大黃桃仁蝨蟲等攪勿住手當欲可丸下朴硝更攪勿住手良久出之可丸乃止取一丸如雞子黃投酒中預一宿勿食服之至晡時下如大豆汁或如雞肝凝血蝦蟇子或如膏此是病下也

治月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦

此為氣瘕一作血瘕若生肉瘕不可為也療之方

生地黃 三十斤
取汁

乾漆 一斤
為末

右二味以漆末內地黃汁中微火煎令可丸每服酒

下如梧子大三丸不知加之常以食後服

治月經不通甚極閉塞方

牛膝 斤一 麻子 三升
蒸 土瓜根 兩三 桃仁 升二

右四味以好酒一斗五升浸五宿一服五合漸

加至一升日三能多益佳

治產後風冷留血不去停結月水閉塞方

桃仁

麻子仁

各二升

菴藎子

一升

右三味以好酒三斗浸五宿每服五合日三稍加至一升

五京圓治婦人腹中積聚九痛七害及腰中冷引小腹
害食得冷便下方

乾薑

蜀椒

各三兩

附子

一兩

吳茱萸

一升

當歸

狼毒

黃芩

牡蠣各二兩

右八味為末蜜和丸如梧子初服三九日二加至十

丸此出京氏五君故名五京久患冷困當服之

雞鳴紫圓治婦人癥瘕積聚方

皂莢分一

藜蘆

甘草

礬石

烏喙

杏仁

乾薑

桂心

巴豆各二分

前胡

人參各四分

代赭五分

阿膠分六

大黃分八

右十四味為末蜜丸如梧子雞鳴時服一丸日益一
凡至五丸止仍從一起下白者風也赤者癥瘕也青
微黃者心腹病

遼東都尉所上圓治臍下堅癖無所不治方

恒山

大黃

巴豆

各一分

天雄

二枚

苦參

白薇

乾薑

人參

細辛

狼牙

龍膽

沙參

玄參

丹參

各三分

芍藥

附子

牛膝

茯苓 各五分

牡蒙 四分

藿蘆

六分一方云
二兩三分

右二十味為末蜜丸宿勿食服五丸日三大羸瘦月

水不調當二十五日服之下長蟲或下種種病出二

十五日服中所苦悉愈肌膚盛五十日萬病除斷緒

有子

牡蠣圓治經閉不通不欲飲食方

牡蠣 四兩

大黃 一斤

柴胡 五兩

乾薑 三兩

芎藭

茯苓

名二兩半

蜀椒

十兩

葶藶子

芒硝

杏仁

各五合

水蛭

蝮蟲

各半兩

桃仁

七十枚

右十三味為末蜜丸如梧子大飲服七丸日三

當歸圓治腰腹痛月水不通利方

當歸

芎藭

各四兩

蝮蟲

烏頭

丹參

乾漆

各兩

人參

牡蠣

土瓜根

水蛭

各二兩

桃仁

五十枚

右十一味為末以白蜜丸如梧子大酒下三丸日三服

消石湯治血癥月水留瘀血大不通下病散堅血方

消石

附子

蝨蟲各三兩

大黃

細辛

乾薑

黃芩各一兩

芍藥

土瓜根

丹參

代赭

蟾蜍各二兩

大棗

十枚

桃仁

二升

牛膝

一斤

朴硝

四兩

右十六味以酒五升水九升漬藥一宿明日煎

取四升去滓下朴硝消石烱盡分四服相去如炊頃
去病後食黃鴨羹勿見風

備急千金要方卷六

欽定四庫全書

備急千金要方卷七

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

赤白帶下崩中漏下第二十

論方
灸法

論曰諸方說三十六疾者十二癥九痛七害五傷三瘕不通是也何謂十二癥是所下之初一日狀如膏二日如黑血三日如紫汁四日如赤肉五日如膿六日如

豆汁七日如葵羹八日如凝血九日如清血血似水十日如米泔十一日如月浣乍前乍却十二日經度不應期也何謂九痛一曰陰中痛傷二曰陰中淋瀝痛三曰小便即痛四曰寒冷痛五曰經來即腹中痛六曰氣滿痛七曰汁出陰中如有蟲嚙痛八曰脇下分痛九曰腰痛十曰膀胱痛何謂七害一曰窮孔痛不利二曰中寒熱痛三曰小腹急堅痛四曰藏不仁五曰子門不端引背痛六曰月浣乍多乍少七曰害吐何謂五傷一曰兩脇支滿痛

二曰心痛引脇三曰氣結不通四曰邪思洩利五曰前後痼寒何謂三痼一曰羸瘦不生肌膚二曰絕產乳三曰經水閉塞病有異同具治之方

白堊圓治女人三十六疾方

又方見後

白堊

龍骨

芍藥

各十八銖

黃連

當歸

茯苓

黃芩

瞿麥

白欬

石膏

甘草

牡蠣

細辛

附子

禹餘糧

白石脂

人參

烏賊骨

藁本

甘皮

大黃 已上各半兩

右二十一味為末蜜和丸如梧子大空腹飲服十丸
 日再不知加之二十日知一月百病除若十二癥倍
 牡蠣禹餘糧烏賊骨白石脂龍骨若九痛倍黃連白
 斂甘草當歸若七害倍細辛藁本甘皮加椒茱萸各
 一兩若五傷倍大黃石韋瞿麥若三痼倍人參加赤
 石脂礬石巴戟天各半兩合藥時隨病增減之

治女人腹中十二疾一曰經水不時二曰經來如清水
三曰經水不通四曰不周時五曰生不乳六曰絕無子
七曰陰陽減少八曰腹苦痛如刺九曰陰中寒十曰子
門相引痛十一曰經來凍如葵汁狀十二曰腰急痛凡
此十二病得之時因與夫卧起月經不去或卧濕冷地
及以冷水洗浴當時取快而後生百病或瘡痍未瘥便
合陰陽及起早作勞衣單席薄寒從下入方

赤石脂

半夏

各一兩
六銖

蜀椒

乾薑

吳茱萸

當歸

桂心

丹參

白斂

防風

各一兩

薤蘆

半兩

右十一味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒服十

丸日三不知稍加以知為度

白石脂圓治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白方

白石脂

烏賊骨

禹餘糧

牡蠣

各十八銖

赤石脂

乾地黄

乾薑

龍骨

桂心

石韋

白斂

細辛

芍藥

黃連

附子

當歸

黃芩

蜀椒

鍾乳

白芷

芍藥

甘草

各半
兩

右二十二味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下
十五丸日再一方有黃蘗半兩

小牛角腮散治帶下五賁一曰熱病下血二曰寒熱下
血三曰經脉未斷為房事則血漏四曰經來舉重傷任
脉下血五曰產後臟開經利五賁之病外實內虛方

牛角腮

一枚燒令赤

鹿茸

禹餘糧

當歸

乾薑

續斷 各二兩

阿膠 三兩

烏賊骨

龍骨 各一兩

赤小豆 二升

右十味治下篩空腹以酒服方寸七日三

千金翼無鹿茸烏賊

骨

龍骨散治淳下十二病絕產一曰白帶二曰赤帶三曰

經水不利四曰陰胎五曰子藏堅六曰藏癖七曰陰陽

患痛八曰內強九曰腹寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛

十二日夢與鬼交宜服之

淳下一本
作腹下

龍骨

三兩

黃蘗

半夏

竈中黃土

桂心

乾薑

各二兩

石韋

滑石

各一兩

烏賊骨

代赭

各四兩

白殭蠶

五枝

右十一味治下節酒服方寸七日三白多者加烏賊

骨殭蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃蘗

二兩子藏堅加乾薑桂心各二兩已上各隨病增之

服藥三月有子即住藥藥太過多生兩子當審方取

好藥寡婦童女不可妄服

治女人帶下諸病方

大黃蒸三斗
米下附子

茯苓 牡蒙

牡丹 桔梗

葶藶各三
兩 厚朴

芎藭 人參

當歸 蝨蟲

蜀椒 吳茱萸

柴胡 乾薑

桂心各半
兩 細辛二兩
半

右十八味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒服二

丸不知加之以腹中温温為度一本有麻子三兩澤蘭半兩而無蜀椒葶

治帶下百病無子服藥十四日下血二十日下長蟲及青黃汁出三十日病除五十日肥白方

大黃

破如豆粒熬令黑色

柴胡

朴硝

各一斤

芎藭

五兩

乾薑

蜀椒

各一斤

茯苓

如雞子大一枚

右七味為末蜜丸如梧子大先食米飲服七丸不知加至十丸以知為度

治帶下方

枸杞根斤一

生地黄斤五

右二味以酒一斗煮取五升分為三服水煮亦

得

治婦人及女子赤白帶下方

禹餘糧

當歸

芍藥各一兩半

赤石脂

白石脂

阿膠

龍骨

石韋一兩六銖

烏賊骨

黃蘗

白斂

黃芩一兩用黃連

續斷

桑耳

牡蠣各一兩

右十五味為末蜜丸如梧子大空心飲下十五丸日
再加至三十九丸為度

白馬蹄圓治女人下焦寒冷成帶下赤白浣方

白馬蹄

鼈甲

鯉魚甲

龜甲

蜀椒各一兩

磁石

甘草

杜仲

草薢

當歸

續斷

芎藭

禹餘糧

桑耳

附子各二兩

右十五味為末蜜丸梧子大以酒服十丸加至三十

丸日三服一本無
龜甲

白馬駝散治帶下方下白者取白馬駝下赤者取赤馬駝隨色取之

白馬駝二兩 龜甲四兩 鼈甲十八銖 牡蠣一兩十八銖

右四味治下篩空心酒下方寸匕日三服加至一七

半

治五色帶下方

服大豆紫湯日三服方見別卷

又方燒馬左蹄為末以酒服方寸七日三服

又方燒狗頭和毛皮骨為末以酒服方寸七

又方煮甌帶汁服一杯良

又方燒馬蹄底護乾為末以酒服之方寸七日三

雲母芎藭散衛公治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛
面生瘡腰痛不可俯仰陰中腫如有瘡狀毛中癢時痛
與子藏相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱
氣逆衝急心煩不得卧腹中急痛食不下吞醋噫苦上

下腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒方

雲母

芎藭

代赭

東門邊木

燒各一兩

白殭蠶

烏賊骨

白堊

蝟皮 各六銖

鼈甲 一作龜甲

桂心

伏龍肝

生鯉魚頭 各十八銖

右十二味治下篩酒服方寸七日三夜一一方有龍骨乾葛

慎火草散治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面

黑無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或

苦絞痛上至心兩脇腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息

乏少腰背痛連脇不能久立每嗜卧困懶又方見後

慎火草 白石脂 禹餘糧 鼈甲

乾薑 細辛 當歸 芍藥

石斛 芍藥 牡礪各二兩 黃連

薔薇根皮

乾地黄

各四兩

熟艾

桂心

各一兩

右十六味治下篩空腹酒服方寸七日三稍加至二

匕若寒多者加附子椒熱多者加知母黃芩各一兩

白多者加乾薑白石脂赤多者加桂心代赭各二兩

禹餘糧圓治崩中赤白不絕困篤方

禹餘糧

五兩

白馬蹄

十兩

龍骨

三兩

鹿茸

二兩

烏賊魚骨

一兩

右五味為末蜜丸梧子大以酒服二十九日再以知

為度

增損禹餘糧圓治女人勞損因成崩中狀如月經來去
多不可禁止積日不斷五臟空虛失色黃瘦崩竭暫止
少日復發不耐動搖小勞輒劇治法且宜與湯未宜與
此丸也發時服湯減退即與此丸若是疾久可以長與
此方

禹餘糧

龍骨

人參

桂心

紫石英

烏頭

寄生

杜仲

五味子

遠志 各二兩

澤瀉

當歸

石斛

茯苓

乾薑 各三兩

蜀椒

牡蠣

甘草 各一兩

右十八味為末蜜丸梧子大空心酒下十丸漸加至

二十九日三服

治女人白崩及痔病方

槐耳

白斂

艾葉

蒲黃

白芷 各二兩

黃耆

人參

續斷

當歸

禹餘糧

橘皮

茯苓

乾地黄

蝟皮 各三兩

牛角腮 四兩

豬後懸蹄

二十箇

白馬蹄

四兩酒浸一宿熬

右十七味為末蜜丸每日空心酒下二十九日二加

之

治婦人忽暴崩中去血不斷或如鷺鴨肝者方

小薊根

六兩

當歸

阿膠

續斷

青竹茹

芎藭

各三兩

生地黄

八兩

釜月下土

絹裹

地榆 各四兩

馬通 一升赤帶用赤馬白帶用白馬

右十味㕮咀以水八升和馬通汁煮取三升分三服

不止頻服三四劑未全止續服後丸方

續斷

甘草

地榆

鹿茸

小薊根

丹參 各三十銖

乾地黄 二兩半

芎藭

赤石脂

阿膠

當歸 各一兩半

龜甲

秦牛角腮

各三兩剉熬令黑

栝子仁

一兩集驗作栝葉

右十四味為末蜜丸梧子大空心以酒服十丸日再

後稍加至三十丸

治女人崩中去赤白方

白馬蹄

五兩

蒲黃

鹿茸

禹餘糧

白馬鬣毛

小薊根

白芷

續斷 各四兩

人參

乾地黄

栢子仁

烏賊骨

黃耆

茯苓

當歸 各三兩

艾葉

菴蓉

伏龍肝

各二兩

右十八味為末蜜丸如梧子大空心飲服二十九日

再加之至四十九

當歸湯治崩中去血虛羸方

當歸

芎藭

黃芩

芍藥

甘草

各二兩

生竹茹

二升

右六味㕮咀以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸藥

煎取三升半分二服忌勞動嗔怒禁百日房事

治崩中晝夜十數行衆醫所不能瘥者方

芎藭八兩㕮咀以酒五升煮取三升分三服不飲酒

者水煮亦得

治崩中下血出血一斛服之即斷或月經來過多及過期不來者服之亦佳方

吳茱萸

當歸

各三兩

芍藥

人參

芍藥

牡丹

桂心

阿膠

生薑

甘草

各二兩

半夏

八兩

麥門冬

一升

右十二味以水一斗煮取三升分為三服治暴崩中去血不止方

牡蠣

兔骨 各二兩
半炙

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治女人白崩方

芎藭

桂心

阿膠

赤石脂

小蘗根 各二兩

乾地黄 四兩

伏龍肝 如雞子
大七枚

右七味呶咀以酒六升水四升合煮取三升去滓內

膠令烱盡分三服日三 千金翼止六
味無伏龍肝

伏龍肝湯治崩中去赤白或如豆汁方

伏龍肝 如彈丸
七枚

生薑 五兩

生地黃 四升一
方五兩

甘草
艾葉

赤石脂 桂心
各二兩

右七味哎咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

大牛角中仁散治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沉

重虛極方

牛角仁 一枚
燒 續斷

乾地黃
桑耳

白朮
赤石脂
礬石
乾薑

附子

龍骨

當歸 各三兩

人參 一兩

蒲黃

防風

禹餘糧 各二兩

右十五味治下篩以溫酒未食服方寸七日三不知

稍加

治崩中去血積時不止起死方

肥羊肉 斤三

乾薑

當歸 各三兩

生地黃 升二

右四味以咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃

汁及諸藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之

生地黄湯治崩中漏下日去數升方

生地黄斤一 細辛兩三

右二味以水一斗煮取六升服七合久服佳

治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲

牡蠣各三兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方燒亂髮酒和服方寸匕日三

又方桑耳二兩半

鹿茸十八銖

右二味以醋五升漬炙燥漬盡為度治下篩服方寸匕日三

又方燒鹿角為末酒服方寸匕日三

又方燒桃核為末酒服方寸匕日三

又方地榆
知母

右二味各指大長一尺者咬咀以醋三升東向竈中
治極濃去滓服之

又方桑木中蜴屎燒灰酒服方寸匕

治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方

澤蘭

蜀椒

二兩
六銖

藁本

栢子仁

山茱萸

厚朴

各十
八銖

乾地黄

牡蠣

各一
兩半

代赭

桂心

防風

細辛

乾薑

各一
兩

甘草

當歸

芍藥

各一兩
十八銖

蕪荑

半
兩

右十七味治下節空心温酒服方寸匕日三神良一方加白芷龍骨各十八銖人參一兩十八銖為二十

味

治崩中方

白茅根斤三

小薊根斤五

右二味咬咀以水五斗煎取四斗稍稍服之

外臺用酒煎

丹參酒治崩中去血及產餘疾方

丹參

艾葉

地黃

忍冬

地榆

各五斤

右五味剉先洗白熟舂以水漬三宿出滓煮取汁以

之
黍米一斛炊飯釀酒酒熟窄之初服四合後稍稍添

牡丹皮湯治崩中血盛併服三劑即瘥方

牡丹皮

乾地黄

斛脉各三兩

禹餘糧

艾葉

龍骨

栝葉

厚朴

白芷

伏龍肝

青竹茹

芍藥

地榆各二兩

阿膠一兩

芍藥四兩

右十五味以水一斗五升煮取五升分五服相

去如人行十里久再服

治崩中單方

燒牛角末以酒服方寸七日三服亦治帶下

又方桑耳燒令黑為末酒服方寸七日二服亦治帶下

又方生薊根一斤半擣取汁溫服亦可酒煮服之

又方羊脰一具以酢煮去血服之即止忌猪魚鮓滑物

犯之便死亦治帶下

治白崩方

灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸內踝上三寸左
右各百壯

論曰治漏血不止或新傷胎及產後餘血不消作堅使
胞門不閉淋瀝去血經踰日月不止者未可以諸斷血
湯宜且與牡丹丸散等待血堅消便停也堅血消者所
去淋瀝便自止亦漸變消少也此後有餘傷毀不復處
此乃可作諸主治耳婦人產乳去血多傷胎去血多崩
中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多未止心中懸虛

心悶眩冒頭重目暗耳聾滿舉頭便悶欲倒宜且煮當歸芩窮各三兩以水四升煮取二升去滓分二服即定展轉續次合諸湯治之

白堊圓治女人三十六疾胞中病漏下不絕方

又方見前

邯鄲白堊

禹餘糧

白芷

白石脂

乾薑

龍骨

桂心

瞿麥

大黃

石韋

白斂

細辛

芍藥

甘草

黃連

附子

當歸

茯苓

鍾乳

蜀椒

黃芩

各半兩

牡蠣

烏賊骨

各十銖

右二十三味為末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再

服不知加至十丸

治女人漏下或瘥或劇常漏不止身體羸瘦飲食減少
或赤或白或黃使人無子者方

牡蠣

伏龍肝

赤石脂

白龍骨

桂心

烏賊骨

禹餘糧

各等分

右七味治下篩空心酒服方寸匕日二白多者加牡

蠣龍骨烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多者加

伏龍肝桂心隨病加之

張文仲同亦療崩中肘後無白龍骨以粥飲服

治婦人漏下不止散方

鹿茸

阿膠 各三兩

烏賊骨

當歸 各二兩

蒲黃 一兩

右五味治下篩空心酒服方寸匕日三夜再服

治女人產後漏下及痔病下血方

礬石一兩

附子一枚

右二味為末蜜丸如梧子大空心酒下二九日三稍加至五丸數日瘥能百日服之永斷

芎藭湯治帶下漏血不止方

芎藭

乾地黄

黃耆

芍藥

吳茱萸

甘草各二兩

當歸

乾薑各三兩

右八味以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黄吳茱萸加杜仲人參各二

兩

治漏下去血不止方

取水蛭治下篩酒服一錢許日二惡血消即愈

治漏下神方

取槐子燒末酒服方寸匕日三五瘥

治漏下去黑方

乾漆

麻黃

細辛

桂心

兩各一

甘草

兩半

右五味治下篩以指撮著米飲中服之

治漏下去赤方

白朮

二兩

白薇

半兩

黃蘗

二兩半

右三味治下篩空心酒服方寸七日三

治漏下去黃方

黃連

大黃

桂心

各半兩

黃芩

麋蟲

乾地黄

各六銖

右六味治下篩空心酒服方寸七日三

治漏下去青方

大黃

黃芩

白薇 各半兩

桂心

牡蠣 各六銖

右五味治下篩空心酒服方寸七日三

治漏下去白方

鹿茸 一兩

白鯁 十八銖

狗脊 半兩

右三味治下篩空心米飲服方寸七日三

治女子漏下積年不斷困篤方

取鵲重巢柴燒灰作末服方寸七日三服三十日愈甚良重巢者去年在巢中產今年又在上作重巢產者是也

馬通湯治漏下血積月不止方

赤馬通汁

一升取新馬尿絞取汁乾者水浸絞取汁

生艾葉

阿膠

各三兩

當歸

乾薑

各二兩

好墨

半圓

右六味㕮咀以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通汁及膠微火煎取二升分再服相去如人行十里

久

馬蹄屑湯治白漏不絕方

白馬蹄

赤石脂

各五兩

禹餘糧

烏賊骨

龍骨

牡蠣

各四兩

附子

乾地黄

當歸

各三兩

甘草

二兩

白殭蘇

一兩

右十一味哎咀以水二斗煮取九升分六服日三

馬蹄圓治白漏不絕方

白馬蹄

禹餘糧

各四兩

龍骨

三兩

烏賊骨

白殭蠶

赤石脂

各二兩

右六味為末蜜丸梧子大酒服十九不知加至三十丸

慎火草散治漏下方

又方見前

慎火草

十兩熬黃

當歸

鹿茸

阿膠

各四兩

龍骨

半兩

右五味治下篩先食酒服方寸匕日三

蒲黃散治漏下不止方

蒲黃升半

鹿茸

當歸各二兩

右三味治下節酒服五分七日三不知稍加至方寸

七

灸法

女人胞漏下血不可禁止灸關元兩傍相去三寸

女人陰中痛引心下及小腹絞痛腹中五寒灸關儀百

壯穴在膝外邊上一寸宛宛中是

女人漏下赤白及血灸足太陰五十壯穴在內踝上三

寸足太陰經內踝上三寸名三陰交

女人漏下赤白月經不調灸交儀三十壯穴在內踝上
五寸

女人漏下赤白灸營池四穴三十壯穴在內踝前後兩
邊池中脉上一名陰陽是

女人漏下赤白四肢酸削灸漏陰三十壯穴在內踝下
五分微動脚脉上

女人漏下赤白泄注灸陰陽隨年壯三報穴在足拇趾

下屈裏表頭白肉際是

月經不調第二十一

方
灸法

白堊圓治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少

淋瀝不斷或來而腰腹痛嘔吸不能食心腹痛或青黃

黑色或如水舉體沉重方

白堊

白石脂

牡蠣

禹餘糧

龍骨

細辛

烏賊骨

各一兩半

當歸

芍藥

黃連

茯苓

乾薑

桂心

人參

瞿麥

石韋

白芷

白斂

附子

甘草

各一兩

蜀椒

半兩

右二十一味為末蜜丸如梧子大空心酒下二十九日三至月候來時日四五服為佳

桃仁湯治產後及墮身月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四體噓吸不能食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉體沉重惟欲眠卧多思酸

物方

桃仁 五十枚

澤蘭

甘草

芎藭

人參 各二兩

牛膝

桂心

牡丹皮

當歸 各三兩

芍藥

生薑

半夏 各四兩

地黃 八兩

蒲黃 七合

右十四味以水二斗煮取六升半分六服

杏仁湯治月經不調或一月再來或兩月三月一來或

月前或月後閉塞不通方

杏仁 二兩

桃仁 一兩

大黃 三兩

水蛭

蝨蟲 各三枚

右五味 咀咀以水六升 煮取二升 分三服 一服當有

物隨大小 便有所下 下多者止之 少者勿止 盡三服

大黃 朴硝 湯治經年 月水不利 胞中有風 冷所致 宜下

之方

大黃

牛膝 各五兩

朴硝

牡丹

甘草

紫苑 各三兩
作紫葢 代赭 一兩

桃仁

蝨蟲

水蛭

乾薑

細辛

芒硝

各二兩

麻仁

五合

右十四味以水一斗五升煮取五升去滓內消

令烱分五服五更為首相去一炊頃自下後將息忌

見風

茱萸蝨蟲湯治久寒月經不利或多或少或火方

吳茱萸

三升

蝨蟲

水蛭

廔蟲

牡丹

各一兩

生薑

一斤

小麥

半夏

各一升

大棗 二十枚 桃仁 五十枚 人參 牛膝 各三兩

桂心 六兩 甘草 一兩半 芍藥 二兩

右十五味以酒一斗水二升煮取一斗去滓適寒溫一服一升日三不能飲酒人以水代之湯欲成乃內諸蟲不耐藥者飲七合

抵虎湯治月經不利腹中滿時自減并男子膀胱滿急方

虎掌 千金翼作虎杖 大黃 各二兩 桃仁 三十枚 水蛭 二十枚

右四味以水三升煮取一升盡服之當下惡血為度
七熬圓治月經不利手足煩熱腹滿默默不欲寤心煩

方

大黃 一兩半

前胡 一作柴胡

芒硝 熬各五兩

葶藶

蜀椒 並熬各六銖

生薑

芎藭 各十銖

茯苓 十五銖

杏仁 九銖熬

桃仁 二十枚熬

水蛭 半合熬

蝱蟲 熬

右十二味為末蜜丸梧子大空腹飲服七丸日三不

知加一倍 千金翼無芎藭又一方有麋蟲牡丹各二兩為十四味

桃仁散治月經來繞臍痛上衝心胸往來寒熱如瘧症
狀方

桃仁五十枚 麩蟲二十枚 桂心五寸 茯苓一兩

薏苡仁 牛膝 代赭各二兩 大黃八兩

右八味治下篩宿勿食温酒服一錢七日三

治月經往來腹腫腰腹痛方

麩蟲四枚 蜀椒 乾薑各六銖 大黃

女青 桂心 芎藭各半兩

右七味治下節取一刀圭先食酒服之日三十日微下善養之

治月經不調或月頭或月後或如豆汁腰痛如折兩脚疼胞中風寒下之之方

大黃

朴硝各四兩

牡丹三兩

桃仁一升

人參

陽起石

茯苓

甘草

水蛭

蝱蟲各二兩

右十味以水九升煮取三升去滓內朴硝令烊

盡分三服相去如一飯頃

陽起石湯治月水不調或前或後或多或少乍赤乍白
方

陽起石

甘草

續斷

乾薑

人參

桂心各二兩

附子一兩

赤石脂三兩

伏龍肝五兩

生地黄一升

右十味以水一斗煮取三升二合分四服日三夜一

治婦人憂恚心下支滿膈中伏熱月經不利血氣上搶

心欲嘔不可多食懈怠不能動方

大黃

芍藥

蝨蟲

各二兩

土瓜根

蜀椒

黃芩

白朮

乾薑

地骨皮

一作炭皮

芎藭

各一兩

桂心

乾漆

各一兩半

右十二味為末蜜丸如梧子每服十九日三不知加之

牛膝圓治產後月水往來乍多乍少仍復不通時時疼痛小腹裏急下引腰身重方

牛膝

芍藥

人參

大黃各三兩

牡丹皮

甘草

當歸

芍藥各二兩

桂心兩一

廣蟲

蟻螬

蜚蠊各十枚

蠹蟲

水蛭各七枚

右十四味為末蜜丸如梧子酒服五丸日三不知稍

增

又方鹿角末服之良

又方生地黄汁三升煮取二升服之

金匱要略卷七
又方飲人乳汁三合善

又方燒月經衣并花水服之

又方燒白狗糞焦作末酒服方寸七日三

又方取白馬尿服一升良

治月經不斷方

船茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服

又方服地黃酒良

又方服大豆酒佳

又方燒箕舌灰酒服之

又方灸內踝下白肉際青脉上隨年壯



備急千金要方卷七

總校官中書臣朱鈺

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣張元功