


重訂解體新書 卷之八

洋学文庫
文庫8
A 28
7





訂解體新書卷之八

大槻文庫

遠西西 郁航空 覃鳩 盧摸斯 撰

若狹 玄白杉田翼 翻譯

日本 東奧 僊臺 玄澤 大槻 茂質 重訂

○靜血脉篇第七

○^{壹大較}靜血脉者起其幹處頗為廣濶幹支共性靜而無鼓動資其始於動血脉所窮止之支

末細絡。受其血。逆行而終。會上。下兩幹。納心右室。今倒置其終始。却管幹。而說之者。要

○^戴幹 接心之處。分而為上下。屬之者。則

^平冠心脉

^子上幹 屬之者。則

^牛奇脉 起於幹之後側。而當肋間。

^米肺管脉 受肺管動脉之血。而逆行。

^丙鎖骨下脉 會于此者。則

大馬文卷一

^甲內行頸脉 自腦而下。次入

^乙外行頸脉 自頭外被而下。

^丙項脉

^丁上肋間脉

^戊乳脉 自乳而行。位臆中骨下。

^己頸項筋脉

^庚肩胛脉 由內與外。而行胛。

^辛腋脉 從此分者。則

^壬頭脉 分於腋脉外支。

庚 肝脉

分於腋脉內支

辛 中脉

在肘中曲灣合頭肝二脉

壬 脾脉

在赤背近指處

下幹會于此者則

癸 橫鼻脉

受血於門脉

甲 脂脉

受血於門脉

乙 噲收脉

一名黑膽液室脉

丙 噲收脉

二條腎脉左右各一條又有或

精脉右或左二條者入下幹左入左噲收

丁 精脉

左右二條右入下幹左入左噲收

戊 腰脉

出於腰部入下幹

己 薦骨脉

起于內行腸骨脉間

庚 腸骨脉

由此分兩支

辛 內行腸骨脉

下腹脉取骨脉及內行

壬 外行腸骨脉

上腹脉及股骨脉入于

癸 癰脉共資原于此也

此

外行腸骨脉

上腹脉及股骨脉入于

股骨脉 其支分之著者則

筋脉 膝脉 膑脉 母脉

○^{參主用}靜血脉者主受既所發營養之血於其細
絡以還心右室矣其還也右五等機以助之
一者本脉必因傍在動血脉以假其鼓動擊

搏機也二者因動血脉末梢血尚有鼓動擊
搏之餘勢也三者因管中有障膜以節其血
行也障脉見于第十符四者因為其管質直筋
衣膜者固有運動機也其機名曰五者因血
液有自然動機也

靜血脉 譯名義解
和蘭何處空羅甸謂之蠟花網按
歟網者空勝盧也哈花者何處也故和

蘭翻云爾。今此重譯則濶脉也。然本脉
通古今。單稱某。空牒盧而不稱某。何鹿
空牒盧。故此篇單譯某脉。譬如冠脉呼
曰。革籠空牒盧而不稱革籠。何鹿空牒
盧。則不譯冠濶脉。而譯冠脉之類也。其
辨既見于第三篇。
又按空牒盧者。筒也。管也。即通血脉管
之統名也。以其幹口之接心處廣濶。後
冠何鹿以別搏動脉者乎。

本篇諸脉頗有闕略。如動血脉篇。今又
參考註證及他書。譯以補于左云。

冠心脉出於幹之所起。纏繞心豐底。恰

若帽冠然。非剖開心囊則不得視之也。

上幹起於心右室。大白當脊第八椎。其

管所起巨大。為空濶。其內具半月樣障

膜。堤名。以此障遮。自上下幹所奔會之

血。使無濫入于心右耳也。蓋上下兩幹

位胸中央兩肺之間。附着豎中隔。不如

動血脉附脊推上也。故下幹則倚右側。心尖尾則倚左側。以使不障格心運動。實自然之妙巧也。是以心鼓動常在胸左旁。應手即可知心之倚位左方也。又上幹者。附貼豎中隔。直上行肺葉間。經氣管及食道之胸水羅。抵頸。一曰於此處生奇脉。奇脉出於上幹後面右側。當背第四推。第五推間。經肺管右支。上行向頸灣曲。又屈曲而下行。抵背第八第九推。依動。

血脉右側。循脊骨下行。穿橫隔中央。膈質之部。入于腹中。蔓延其部分。於噎收脉之處。盡布散。又此脉受血於第十肋間。逆行其兩側。其中。左此脉所起。左右遍傍。第八肋間。筋入其所在小支者。名下肋間脉。支。又曰。此多岐。各遍布其近傍。諸器。其最下支。則入腰部。或曰。入脊業八。盧牒空。牒盧。即無對脉。按原名。竊業八。盧牒空。牒盧。即無對脉之義也。凡諸脉。左右必對向。此脉獨奇。行而無對。故名云爾。但此脉獸類則偶。

也。或有不起其定所而由鎖骨下起。下行者。

肺管脉

鎖骨下脉

上幹上行臆中骨下。經氣管直。至頸起其前面者。名肺管脉。屢見無此脉。如然者。奇脉或上肋間脉。必代而為其用也。又在幹之上部起。豎中隔脉及橫隔上脉。由肺間經心。行橫膈也。又於上幹分為二支。左右各至兩手。其次起鎖骨下後。

名曰鎖骨下脉。補豎中隔脉。起於幹前面。出之。左右各起於上幹。其端兩鎖骨下。而下行。橫膈者。名豎中隔脉。循行豎中隔。

內行頸脉

左右各於鎖骨接臆中骨處。合鎖骨下脉。其際一二支。循氣管與食道漸行喉。分內外二支。其外者。至下顎骨角。支令而循喉及耳後。與顛額繫顏面。其內者。穿鉞鉞樣骨。尚傍一孔。入腦蓋中。合厚腦膜之兩側會脉。以臨額。○脉。如右各一。

此脉如右各一

起於鎖骨上頭之上面外行頸脈與內側鎖骨接
膈中並上行分許多倍支而氣行脈內側行鎖骨
喉部筋上骨行舌齒齦其內者餘大近傍諸氣管食道
動脈兩支內併行二支其骨內者兩旁而與內部又至
樣骨兩支併行中楔骨兩旁膜傍孔自鉞行針
外者小而入腦蓋中骨厚腦處又筋分爲二支其
其行喉循一下顎骨後行顙額筋遂蔓延
顏面

外行頸脈

從鎖骨下斜上行頸側女前於

皮下行蔓延頸頭及面頰一曰鎖骨下右各一
斜上行頸左右各於兩側皮交不與外行頸脈上起
併行左支右支與合按此脈刺絡八處之一也
動脈支連合按此脈刺絡八處之一也

一說曰凡咽喉喉腫刺此絡其指常得効多其
方法頸之以下部又開左方使刺其指壓方定其
反定之○又它症刺此絡宜施縛其方定其
先於頸最下部刺於部卷縛前當疝定其醫者
入兩手指示其指於頸與縛帶間而結疝定其醫
帶訖而拔其指如縛帶則無患疝定其醫者
吸之患也其後醫浮起乃可用其指疝定其醫者
上也壓定頸脈其後醫浮起乃可用其指疝定其醫
也

項脈

此脈甚細小也貫項椎側起之孔自

其後斜至頭頂於其下方分一兩細支循
其近傍頸項諸筋

上肋間脉 起於頸脉下鎖骨下脉於鎖骨

動脉之處分二三支屈曲而行于上肋合

乳脉此脉循第四肋間筋奇脉之所不級

乳脉 左右一支分鎖骨下脉下面前側或

有左右各二條者多起於其幹即如示于

圖此脉下臆中骨兩側行于腹其支行肋

軟骨間其支末合肋間筋端又數支向前

而循乳行其所在諸筋又行下方循腹直

筋合其諸支者解剖諸家別名下腹脉

頸項筋脉 上下二條其上者在外行頸脉

側分數支多循頸後側之皮與諸筋其下

者或右止外行頸脉者然大自至鎖骨下

筋上胸及下頸筋

肩胛脉 內外二條其外者循肩胛隆起部

其內者行肩胛下及其側循其近傍諸筋

一曰內胛脉左右各一起于鎖骨下脉上

面行內胛部及其諸筋外胛隆起部及其

腋脉 即鎖骨下脉出於胸經腋下下于臂

者其在腋下部更名腋脉。

頭脉

有屬腋脉而著者二支其上者曰頭脉其下者曰肝脉頭脉自肩外側被總諸筋間經膊及肘臂手腕而至五指又於膊臂上有分一支者共行三頭筋入皮裏布散其數支循皮及其近傍諸筋者視下臂側而可知也又此脉於肘分爲二支按絡於未分二支上此部刺之則其內者斜行能治頭病故得此名云其內者斜行皮下於尺中曲灣傍會肝脉大支而生中

脉其外者斜行臂外側沿尺骨而下支分其皮筋至腕後此細支當撓骨再合肝脉之細支名之曰脾脉自其外側經腕後至指殊循環指與耳指間或有其行經不然然取頭脉一支或中脉支末以充脾脉之用也

肝脉

比頭脉頗大且其所位深於頭脉昔時解剖家其在右手名之肝脉在左手名之脾脉於其始分爲二支又支分許多細

以下之脈
指上書不儿補
堂三未岐作

絲循臂水羅及諸筋上而至胸筋循肋間支分而合肋間脉其大者名曰下胸脉。二支其一深循諸筋者頗大名曰深肝脉其一淺在皮下者名曰皮下脉。深肝脉並腋動脉及神經沿上臂而下至肘之關節傍令內外支相連下行蔓延所在之諸筋支別交屈指筋之臑經腕後輪帶循手掌及指腹其外者傍橈骨下而為二小支行拇指與示指又別令一支行中指其

內者在尺骨側令許多細支循餘指內外又深肝脉一支合為深脉起三支其一或有一條者沿尺骨圍繞動脉行其近傍諸筋又分細支循指內部其二支在橈骨側下而入拇指屈筋循拇指內部示指及其近傍諸筋其三支在屈指諸筋之下間帶之傍令而圍繞其所在動脉又淺脉之末支令一支貫間帶令而入尺橈二骨內外之諸筋皮下肝脉在臂之皮下由

中脉 以位頭肝二脉之中間得此名云。又
二脉統會以生中脉。故一名統脉。臂中部
斜下行而循尺骨分數支。又起二支著者。
其外者循腕後內側至拇指合其近傍之
諸脉其餘支行。與示指之間。中三脉
尺中刺絡八。其中一而支亦名
脾脉。頭一刺也。其中一而支亦名
環指者。名曰脾脉。按脾脉刺絡八處。一循
故名。云一。名曰脾脉。按脾脉刺絡八處。一循
名乎。又肝脉在左手者亦名脾脉。同病而

異位。此因其部位異。而其主治同歟。

下幹 起於心直下。大或至胸中央。近橫隔

處於兩側各起一支。名曰

橫隔脉。支分循橫隔。豎中隔及心囊。

肝脉 下幹貫橫隔。差為濶大如灣處。於脊

右側固着肝上部。於其如灣處起三大支。

及數小支。無算支分。而蔓延肝全象。支

末悉與門脉之支末接合。

脂脉 此脉多則起於噲收脉支別。多彌

肝脉之支末接合

蔓橫膈。合橫膈脈支別。一說曰。此脈循其近傍脂肪。故有此名。腎衣膜。側腎及

噏收脈

起於下幹當腰初推處之兩側

面。此脈左右正對者至稀。此因有妨礙

血之注入也。其於近腎之處起二三四

支。或五支。其許多支別入于腎。蔓延其

全質。又此脈或左右共二條者。一說此

短。大。色。右。脈。比。左。脈。則。稍。高。或。云。左。脈。而。差。高。又。左。或。右。右。二。條。者。

右方精脈

注入其血於下幹。左方精脈

入于左方噏收脈。何則左脈知右脈接

其幹。則以起動脈幹上。其細管為

動脈幹鼓動之激勢。所壓迫。右支障遏

止其流血之患也。是以左脈不接其幹。

而接噏收脈者。為俾之避動脈搏動。以

無其官能之妨礙也。此脈左右共斜下

行。男子則經恥骨。過臍囊。未岐。行陰囊入

睪丸。女子則不經臍囊。未岐。抵卵巢。至子

宮底。

腰脉 位腰推後。穿其窈孔間。傍其神經。

循脊椎於其兩側。合內行頸脉二支之

下行者。筋者說。左右各一。起腎脉下。入腰

工腰脉 下幹合肝脉下。三四指橫徑。沿

動脉下幹。下行。至腰推處。左右各起一

支行腰筋。

脂脉 此脉多。則起於喻收脉。支別多彌

蔓橫隔。合橫隔脉支別。衣膜。側腎及其

近傍脂肪。故有此名云。

靜血脉 下幹 至腰第四推處。與大動脉

下幹。前後轉其位置。此因以腰推末起

骨為隆起。大動脉幹若位置此。則為之

妨障其自然之搏動也。故自離推骨。以

出靜脉幹前也。按西醫格致身體諸器。

表而。至如左方。精脉不接其幹。而接喻

叔脉。靜血脉。幹。至腰第四推。與大動脉

所以前後易位。亦何奇也。實可謂造化之

秘矣。

又靜脉幹於此部。岐為二大支。以行足

部。其為岐處名曰勝骨脉。由其岐間起者。則

薦骨脉 起於勝骨脉所為始之內側。或

有左右各起一支者。穿薦骨前孔而入
脊椎。

內行勝骨脉 生下腹脉。隱處脉。內行彌

脉。

下腹脉 悉彌蔓少腹所在諸器。又其

精中。行直勝諸筋。生外行彌脉。為恥骨脉。

行勝脉。男子。則循陽莖。按刺絡一也。八女

子。則其許多細支。循子宮者極夥。此

當月月有餘之時。則合隱處脉。通泄

其血。月經即此也。且此脉。女子。則循

脛。及肉翅。與陰門脣。即隱處脉也。又

男子。則行于陰囊。與陽莖。

外行勝骨脉 生上腹脉。筋脉。即

上腹脉 上行而循腹之諸筋。及腹膜。

腹皮等。而其一支著者。貫腹膜。升而

經腹直筋上行而抵臍。○名哲法魯必烏斯。及其它解剖家皆言此脉合乳脉。然歛韌力烏斯。及老楞低烏斯。二子以前說為可疑。爾後亦未聞有精究之者也。

補筋脉起於上腹脉下。循行腸骨筋。及其近傍諸筋。

股骨脉此外行腸骨脉下至股骨之部也。自此分五支。第一支曰膞脉。分

大小二支。其小支則循膞外側諸筋。及其大支則先行腓之諸筋。分爲二支。其一貫膜間帶。循膞骨前部諸筋。過輪樣帶。行足背。終循每趾兩側。其二循膞骨後部諸筋。而至跗及蹠。與趾下面。第二支名筋脉。分爲二。循股骨及髌骨諸筋。○第三支名膝脉。資其始於股骨脉一支。行膝皮下。引蔓而至跟上。又令腓皮下。下行彌蔓內

右所說動靜二脉之支分行經。每人各體多不同。是因其所分散彌蔓各體有不同也。決不能執一定之說也。

靜脉管中數處有障膜。或單或複。以支障

血之逆退。今之便循行。見于第三篇圖

符。一則說欲知其血為逆。行血假令在

之則其血向上下部。然二脉又共至其

然亦或有不。然者。如手足則二脉併行。共

股骨筋諸筋。大胫脉。

肅

終始循環之狀。左右各有不同者。然如大支則大抵併行。至其細小支則不必然也。按所循環身體血道二途。其一前所說之搏動血脉。而漢所謂動脉也。其一本篇所說之靜血脉。而漢所謂青脉。青筋。浮絡。也。然稱其青脉等者。古來未見有辨其行經之本末起止。外內出入。與其本性主用者。故雖以經與絡。分脉行之表裏。內外。呼伏行為裏者。曰經。浮越見表者。

細之德。灌於脉經。搏是脉即云云。脉經分
繞周身之支體。但貼於血絡之下。血絡
按是脉即與脉經各有本絡各有相別之
血也。○問血絡即靜之血運行周身者。
可見脉經之血運行周身於血絡之下
不者。可見何也。脉經之本性。本用較之血
絡。脉經尤高。其覆掩之也。有皮肉與血
絡三重。且脉經之純血與生活至細之
德均為甚熱。必脉經貼於血絡之下。則

血絡之血。受脉經血之熱。乃不凝。同可
運行於周身。不然。血體重凝。滯不行矣。
今血出膚末。有不凍者。是知血絡之血。
必藉脉經之甚熱。以行周身也。云云。
右畧聞西方精說所著而未免詒
疎漏謬誤之譏也。且其本編所說。多加
舊說。與臆見可故擇而從者。董董乎此類
耳。然漢自有醫道。以降三千年。醫人之
多。醫書之夥。無一不涉陰陽五行者。而

其說頗係于實測者。僅此書與明方氏所著耳。唯所恨猶且因循舊習。未能全脫其樊籬。而發揮實理。又憾未有後進之有容疑舊醫說者。能承其堂構。就其端緒。而撰其本。溯其源者。要之陰陽五行。漢土古今一大結構。耳目所慣。人人安其中。雖有豪傑。恬不省者。古來國俗風習。令然也。吾黨之創西洋醫學。後二氏貳百餘年。然以直從事翻譯。東西萬

里。而得且莫與西哲交臂。而討論於一堂上。厭飫之久。所得亦非如二氏傳聞之比也。躬試親驗。又深信彼所說實測一規。而不虛設。而空論。而益知舊說之可疑。而不可信據也。豈不愉快乎。是雖籍天之寵靈。實外平餘澤之所波及也。△又按二脉之幹也。枝也。雖有分流支派。萬絲千別。總是一經。出於心。還心。乃彼所謂血行。則晝夜往來循環。其常態恰

如渾圓匝也。但因其所經過位置，舉其著者以命之名耳。今二血脉之得名者，算計之，則各不過四五十。各條擡頭其名者，則當內外醫方諸譯說有言及其名者，欲俾便參照之也。是其所以不厭煩而為此補譯也。讀者宜注意矣。但諸血脉路大小引蔓，至說或出或分，或上下或內外或左右或前後之多岐數派者，則讀此譯此之際，目睵心茫，亦自不

能無惑。恐有誤解其位置次第者，後之譯者幸訂焉。

○門脉篇第十八

意大較
○門脉者一種之脉，而在于腹內膈隔之膜間也。其體質全同靜血脉，但其脉中異無障膜耳。資其原於腹內諸臟之動血脉細絡，此猶其無算細脈，彼此漸合以作數支數枝。此猶

脉靜血

會為一幹。幹入肝。復分許多纖小細絡。組織造為肝之全象。其狀殆如樹根之漫延。故以此脉全形恰為似一樹木之倒懸者也。

○其連屬門脉諸脉區分之則。纖枝。此謂幹入肝漫衍其中。如樹之纖根在胎兒時。臍脉者入于此。其處

名曰

門脉灣

見于第二十七篇十符

幹入于灣與肝門。肝門見于第四篇入幹者。

則

二條膽脉起于膽

胃右脉起於胃之右側

十二指腸脉起於十二指腸之側

又有二大支起於左方者則

脾枝屬之者則

內行孀脉起於直腸大抵位脾脉

為岐之間

胃左脉

腸細左脉

胃及腸網左脉

驛林脉

短脉 在于脾與胃之間

右支 屬之者則

圖中脫了符

腸網右脉

胃及腸網右脉

腸隔脉

數多起於腸中彼此交互

相合相圍恰為大小泐嶼相連狀

卽示符號者是也

^{注用}○門脉者其主用有二。受資養既竣之餘血。於腹內諸器而為逆施也。其用全如靜血脉。然其血不歸納心而還輸導諸肝以分泌膽汁。猶動血脉之作用。但此脉無擊搏如靜血脉。雖則如靜血脉管中無障膜常能俾其血上輸也。若其血之運行急疾則為險重病患之因也。女子諸病因于此者殊多云。蓋使疾速此脉之血行者。因橫隔之動機經常不息。與肝臟自然顫動也。故此脉支之入肝者以

技力梭泥名衣膜。拒止之。以俾其得常度也。第廿四版

包纏之。能保障

譯名義解

門脉

羅甸

蘇納梭

和蘭

波盧

郎共門

脉之義也。此脉如靜血脉。亦如動血脉。而異其用。如說于本篇。蓋以其形狀與官能論之。則兼動靜二血脉之用者也。其名門脉者。以受所繫腹內諸器之脉。

血而輸送諸肝門之故也。故對譯云爾。就諸說審之。門脉者。受所循腹內諸臟動脉之血。漸湊會為一短幹。以入于肝門。入則復分為數小支。為肝之全象也。故上下兩端。許多支分。而其中間為一短幹。是以其所起止。謂之上下支。其作用。則猶他部所循動血脉之梢末。必靜血脉支相接。而支授者也。其所受血之諸器。則膽。胃。脾。腸。及腸網。腸隔等也。其

血則入肝。為釀製膽汁之用也。蓋循諸
器而既竣。資用之餘血。其質已濃厚。故
運行亦徐緩也。且其血汁屬渣滓。加以
二條膽脈所輸者。故其味已帶淡苦。此
所以為製造肝之純苦膽液之料也。其
中自腸隔起者尤多。殊因脾所出之血。
專助其主用也。○諸支之湊會于幹。而
入肝為漫衍者。名曰甲。支上支分乙為二
大支。中間生丙。小支。二大支又分各為

二支。共五支。從此漸分裂千朶萬極。彌
蔓肝之全體。其末梢悉連肝水羅。分泌
製造膽液也。已終其用。則輸之肝血脈
之支末。會幹而歸納于心。資其原內藏
諸器者。名曰甲。下支。其用如靜血脈。而無
障膜耳。○門脈之入肝。支分者。皆向上
蔓延。肝靜脈之入肝。支分者。皆斜向下
蔓延。兩脈錯綜。殆為十字狀。悉相連接。
以得傳注門脈之血於靜脈。○欲審辨

二脉之細支別則先剝去肝包膜少抓
 傷就其靜脉大支與門脉幹更吹之則
 悉泡脹乃可得二脉分明觀之矣
 滿所之支別
 織枝 羅旬修留和蘭更時一名斯
 更打者枝朶也其勢留者織枝也但此非
 門脉所為樹枝狀之謂其爾為根狀之
 猶纖根細鬚者之言也此門脉之入肝
 彌蔓而造其全象者也上說所謂有一
 種纏膜固包織枝之錯綜者名曰技力

補 校泥烏斯統膜見于第二十四版圖一
 膽脉二條共連幹右側臍脉此脉兒在
 胎孕中時在門脉連幹入肝之處一者連
 胃右脉自上胃上部連幹左側名之曰胃
 十二指腸脉又起于幹右側連十指腸
 門脉於大小二支左者指腸之高奇之分
 為左幹右大而起行此者
 脾絡二指腸脉而起行此者
 內行孺脉和蘭謂之斯逆空牒盧按斯

也。竊思西哲嘗究門脈之所起止者。先
欲測肝之為形質者。而解其肝。就其細
絡支漸次逐其所來。終得其所起而
知之者乎。彼致知其究理之學。亦能可謂
得其法矣。

右動靜門三脈。義解分註補說者。
鶴齋先生家藏西方名哲悒盧恒之
解剖書所載。而因社字氏所嘗譯也。
其說頗詳密。其圖殊覺明備。足與本
篇詳畧互相發揮也。故神寫其二脈
圖於本圖之後。附符號其諸名。與流

流注起止。則載錄于左。宜與之參
照辨焉。但門脈者。義解本條中。為
右為其神譯之側。併記符號。亦宜與
鶴齋圖符。照視焉。哲悒盧恒之解剖書
所載。而因社字氏所譯也。其說頗詳密。
而其圖殊覺明備。足與本篇詳畧互相
發揮也。故譯附其圖。且附符號。以供參
照。

e. へ へ へ へ へ へ へ へ
 子 子 子 子 子 子 子 子
 子 子 子 子 子 子 子 子
 子 子 子 子 子 子 子 子

内行頸動脈
 脊椎動脈行頭中處
 脊椎動脈合頸動脈者
 脊髓動脈
 頸椎動脈支
 頸筋動脈
 乳動脈
 上肋間動脈
 外胛動脈

A 甲
 a.a. 子
 B. B. C. 子
 b.b. 子
 c.c. 子
 d.d. 子

○動血脈符號

起於心左室者

冠心脈
 動血脈下幹
 左鎖骨下動脈
 頸動脈
 脊椎動脈
 頸動脈外支
 及後頭動脈
 及後頭動脈之支
 及後頭動脈之支
 及後頭動脈之支

d.d. d.d. ㄗ ㄨ ㄨ ㄨ ㄗ ㄗ ㄗ
 二二 二二 ㄨ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ
 ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ
 ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ

脂動脈
 腎動脈
 腰動脈
 精動脈
 腸隔下動脈
 腸骨動脈
 薦骨動脈
 內行腸骨動脈
 外行腸骨動脈

ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ
 ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ
 ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ ㄗ

腸網動脈
 胃腸網動脈
 脾動脈
 右方膽動脈
 肝動脈
 腸隔上動脈
 其所切斷動脈
 循腸為弦狀支絡
 其為弦狀者蔓延腸之動脈

D r g p e n
丁 水 九 少 如 如
二

行跗動脈
 循跗外面動脈
 行踵動脈
 爲彎曲而支別蔓延者
 彎曲支別行足指者
 以動脈成跗形者

淨血水

〇 淨血水
 此水能治一切血病
 凡血熱者服之立見功效
 凡血虛者服之立見功效
 凡血凝者服之立見功效
 凡血燥者服之立見功效
 凡血毒者服之立見功效
 凡血毒者服之立見功效

○靜血脉符號

A 甲 寸 斷心室見靜血脉幹孔口

B 乙 八 靜血脉下幹

C 丙 二 靜血脉上幹

D 丁 木 奇脉

E 戊 人 鎖骨下脉

a 一 帽脉

a 一 肺管脉

b.b 四 下肋間脉

2 豎中隔脉

c.c 三 横隔上脉

d 二 外行頸脉

e 一 內行頸脉

f 一 脊椎脉

g 一 內行頸脉循黏水羅及厚腦膜一支

h 一 內行頸脉合厚腦膜左右兩會脉處

i 一 外行頸脉前支

j 一 外行頸脉二支合為額脉者

ル、又、ぬ
フ、ハ、る
マ、フ、セ
ニ、ワ、ウ
カ、カ、カ
カ、ヨ、ヨ、ク
ク、タ、タ
カ、ル、ル
ル、ル、ル
ル、ル、ル

外行頸脉後支

上肋間脉

乳脉

皮下脉 即頸筋下脉

頸筋上脉

胛筋脉

上下胸脉

循上臂數小支別

行下臂數支別

ル、ツ、ツ、ツ

靜血脉數支為連合者

ル、ナ、ナ

脾脉

ル、ナ、ナ、ナ

支分而行手數多支別

ル、ナ、ナ

肝脉

ル、ナ、ナ

頭脉

ル、ナ、ナ

頭脉外支

ル、ナ、ナ

頭脉内支

ル、ナ、ナ

皮下脉

ル、ナ、ナ

肝脉内支

乃 乙 亥
 K 癸 又
 L 壬 子
 M 丑 天
 N 寅 又
 卯 巳 又

小 膝 脉
 内 筋 脉
 膝 脉
 腓 脉
 大 膝 脉
 母 脉 支

F 己 亥
 G 庚 子
 H 辛 丑
 I 壬 寅
 癸 卯
 甲 辰
 乙 巳
 丙 午
 丁 未
 戊 申
 己 酉
 庚 戌
 辛 亥

内 行 膝 骨 脉
 外 行 膝 骨 脉
 母 脉 即 内 行 股 脉
 髀 脉 即 外 行 股 脉
 下 腹 脉
 外 行 彌 脉
 内 行 膝 骨 脉 支 循 臀 筋 者
 外 皮 脉 即 上 腹 脉
 隱 處 脉

○腹篇第十九

壹大較○夫腹者。位于軀幹之下部。在前而軟者也。謂上從肋下。下至兩股之際也。

審屬其部分者則

甲臍 在腹之正中。此脫去臍帶之痕也。

屬其內者

甲臍脉 在胎兒則其內為空也。已生

而漸長則壓遍而為繫帶。詩于篇

乙白條 在于被總之下。界肚腹之中行。

以等分其左右。此腹肚諸筋為隤者。裹會而所成也。

○外圍諸物 此謂腹之外圍空殼之部內

則包裹諸臟

被總 詳于第六篇

腹面統繫五對筋 詳于第二十八篇

臟囊 膜曾極薄。然襲而有滑澤以之。

統包腹內諸部。能保收諸臟。位置各

使得其所也。又殊繫下之部分者。

詳分之則名曰

臟囊末岐。臟囊下部為岐之處也。

男子則從其兩股側分。而及陰囊。

包裹罩丸。與精脉自為莢。名曰罩

丸莢膜。女子則繫于子宮圓帶之

所着。其後端自入股骨部分之諸

筋中。腰椎及無名骨從後與下。

相擁屬于此。詳于第五篇。

○內護諸物 謂包收腹之空殼中者。其物

則

腸網

多脂之囊膜也。其狀殆與一種

網囊無異。其上部則前附著于胃底

十二指腸及脾。後則附著于結腸與

臍牀下部。則延長至臍廓之部分。緩

覆諸腸之上。無所附著。此主溫諸

臟。將諸腸之動機。且其脂肪滲透膽

液。以爲資養一身之料。

諸腸

滿腹中。而最長大者也。詳于篇

腸隔

位腹之中部。固著諸腸。詳于篇

胃

位橫膈下。而倚左方。詳于篇

肝

其內屬膽。倚右側。詳于篇

脾

位左側胃之後。詳于篇

臍牀

一名臑。位胃下。詳于篇

兩腎

位肝與脾之下兩側。詳于篇

膀胱

位腹之下部。孟內。詳于篇

膀胱

近傍生殖諸器。詳于篇

並其所在動靜門三血脈及乳糜管

肆
主用

等。詳于篇第十六。十七。十八。及第二十

○腹主擁護內充諸物。以防禦外。囊傷客。獎
發諸腸。乳糜之旋化。佐呼吸。而排泄不淨
渣滓。且助胎兒產出機。

譯名義解

白條

和蘭

微斯斯

即白條之義。

故對譯云爾。按諸說。白條一名腹中線。此斜腹之外被。則所現其中行之一大

筋也。

漢所謂任

上起劍尖軟骨。下至恥

骨。其幅一指橫徑。自臍廓以下。至恥骨

際。稍狹細。此即腹面諸筋之織鬚細線。

斜橫交錯。聚會組修。而所成之膜也。

臟囊

和蘭

逆斯

按逆斯者

腹也。

臟也。

鞞古

者。囊也。乃對譯云爾。註

證曰。此物囊膜成質。其間容包兩腎。輸尿管。膀胱。靜血脈幹。及其諸支別。乳糜槽等。故解剖家統稱之曰。囊囊。但至其

下端則甚薄。而如脂囊。宜於膀胱與恥骨間。辨晰焉。○此物資其始於腹內諸臟外膜。與舉提肝帶。女子則自子宮潤帶。亦起之也。

腸網

和蘭海爐模郎腸網之義。故對譯

云爾。編諸單注證曰。此物脂肪極多。有

一箇脂管。輸脂於其脂囊云。又此物

開一小孔。在于肝大葉之下。肝帶十二

指腸接膽之際。結腸與臍牀相連之處。

東言云云。其說係冗長。故畧焉。

按本篇腹中外所具有之諸物。各詳本篇。故舉其名目耳。但此三物。舉其體用。而別無本篇。因畧抄諸說。以附焉。俱是漢所未說者也。

重訂解體新書卷之八畢

