


醫宗必讀

十之下



庫文閣內			
言	三	漢	
函	四	書	
七	九		
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	12439	
冊數	18	(18)	
函號	301	48	





健忘

經曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心氣虛虛

則管衛留於下久之不以時上故善忘也

家之清氣也下氣者腸胃之濁氣也管衛留於下則腎中之精氣不能時時上交于心故健忘

○腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言

怒木肝之志而亦傷腎者肝腎為子母氣相通也腎藏志志傷則意失而善忘其前言也

併於下氣併于上亂而喜忘

血併于下則無以養其心氣併于上則無以充其腎水下火上坎離不交亂其揆度故喜忘也

愚按內經之原健忘俱責之心腎不交心不下

腎氣必虛

交于腎濁火亂其神明腎不上交于心精氣伏而不用火居上則因而為痰水居下則因而生躁擾擾紜紜昏而不寧故補腎而使之時上養心而使之善下則神氣清明志意常治而何健忘之有

治法 思慮過度 歸脾 精神衰倦 人參養榮 痰迷

心竅 導痰湯 送 心腎不交 朱雀

歸脾湯 治思慮傷心脾健忘怔忡

人參 茯神 龍眼肉

黃耆 酸棗仁 炒研 白朮 各二錢半

當歸 遠志 各一錢 木香

甘州 各三分

水二鍾薑五片紅棗一枚煎一鍾服

人參養榮湯 見虛 導痰湯 見痰 飲

寧志膏

人參 酸棗仁 各一兩 辰砂 五錢

乳香 二錢半

為末蜜丸彈子大每服一丸薄荷湯送下

壽星丸

南星 一斤掘坑深二尺炭五斤坑內燒紅掃淨酒洗南星下坑急蓋密一宿焙

琥珀 四兩 另研 硃砂 一兩水飛 一兩半為衣

猪心血三個生薑汁打麩糊丸如梧子大每

服三錢人參湯空心送下日三服

朱雀丸

沉香 一兩 茯神 四兩

為末蜜丸小豆大每服三十丸人參湯下

不得卧

經曰衛氣不得入于陰常留于陽留於陽則陽

氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入于陰則陰氣虛

故目不瞑矣 行陽則寤行陰則寐此其常也失其常則不得靜而藏魂所以目不

得瞑 胃者六府之海其氣下行陽明逆不得從

其道故不卧下經曰胃不和則卧不安此之謂

也 寤從陽而主上寐從陰而主下胃氣上逆則壅于肺而息有音不得從其陰降之道故卧

不安 又曰卧則喘者水氣之客也夫水者循津

液而流腎者水藏主津液主卧與喘也 卧則喘者亦不

得卧也水病者其本在腎其末在肺故為不得卧卧則喘者標本俱病也

愚按內經及前哲諸論詳考之而知不寐之故大約有五一日氣虛六君子湯加酸棗仁黃耆一日陰虛血少

心煩酸棗仁一兩生地黃一兩一日痰滯温膽湯加南星酸棗

五錢米二合煮粥食之仁雄一日水停輕者六君子湯加菖蒲黃耆末遠志蒼朮重者控涎丹一日胃

不和橘紅甘艸石斛茯苓半夏神麴山查之類大端雖五虛實寒熱

互有不齊神而明之存乎其人耳

六君子湯見虛癆温膽湯俱見驚控涎丹

酸棗湯治虛癆虛煩不得眠

酸棗仁 一兩 甘艸 一錢 知母

茯苓 各二錢

水二鍾煎八分服

鼈甲丸 治四肢無力膽虛不眠

鼈甲 酸棗仁 羌活

牛膝 黃耆 人參

五味子 各等分

為末蜜丸梧子大每服三錢温酒送下

羌活勝濕湯 治卧而多驚邪在少陽厥陰

羌活 獨活 藁本

防風 各一錢 蔓荊子 三錢 川芎 二分

甘艸 炙五分

水二鍾煎一鍾食後服

不能食

東垣云胃中元氣盛則能食而不傷過時而不

饑脾胃俱旺能食而肥脾胃俱虛不能食而瘦

繇是言之則不能食皆作虛論若傷食惡食心下痞滿自有治法不在此例 羅謙甫

云脾胃弱而食少不可尅伐補之自然能食許

學士云不能食者不可全作脾治腎氣虛弱不

能消化飲食譬之釜中水穀下無火力其何能

熟嚴用和云房勞過度真陽衰弱不能上蒸

脾土中州不運以致飲食不進或脹滿痞塞或

醫宗必讀

卷之十

三

不能食

滯痛不消須知補腎腎氣若壯丹田火盛土蒸脾土脾土溫和中焦自治膈開能食矣愚按脾胃者具坤順之德而有乾健之運故坤德或慙補土以培其卑監乾健稍弛益火以助其轉運故東垣謙甫以補土立言學士用和以壯火垂訓蓋有見乎土強則出納自如火強則轉輸不怠火者土之母也虛則補其母治病之常經每見世俗一遇不能食者便投香砂枳朴麩蔔查芽甚而用黃連山梔以為開胃良方而


天柱者多矣不知此皆實則瀉子之法因脾胃間有積滯有實火元氣未衰邪氣方張者設也虛而伐之則愈虛虛而寒之遏真火生化之元有不敗其氣而絕其穀乎且誤以參木為滯悶之品畏之如砒酖獨不聞經云虛者補之又云塞因塞用乎又不聞東垣云脾胃之氣實則枳實黃連瀉之虛則白朮陳皮補之乎故不能食皆屬脾虛四君子湯補中益氣湯補之不效當補其母地黃丸二神丸挾痰宜化子湯挾鬱宜開湯佐米宜

安異功散加子金宜顧肺金虛則盜竊土母之
木香沉香桔參苓夫脾為五藏之母土為萬物之根安穀
之屬則昌絕穀則亡關乎人者至為切亟慎毋少忽
醫案

文學倪念嵐纍勞積鬱胸膈飽悶不能飲食服
消食之劑不效改而理氣又改而行痰又改而
開鬱又改而清火半載之間藥餘百劑而病勢
日增惶懼不知所出始來求治于余余先簡其
方案次診其六脉喟然嘆曰脉大而軟兩尺如

絲明是火衰不能生土反以伐氣寒涼投之何
異于人既入井而又下石乎遂以六君子湯加
益智乾薑肉桂各一錢十劑而少甦然食甚少
也余勸以加附子一錢兼用八味丸調補凡百
餘日而復其居處之常

新安程幼安食少腹悶食粥者久之偶食蒸餅
遂發熱作渴頭痛嘔逆或以傷寒治之或以化
食破氣之藥投之俱不效勢甚危迫及余診之
謂其兄季涵曰脉無停滯之象按之軟且濡是



脾土大虛之診也法當以參朮理之衆皆不然予曰病勢已亟豈容再誤遂以四君子湯加沉香炮薑與之數劑而減一月而安

和中丸 開胃進食 人參 白朮 各三兩 乾薑

甘州 陳皮 木瓜 去穰各一兩

爲末水丸白湯送三錢

七珍散 開胃養氣補脾進食

人參 白朮 酒炒各一兩半 黃耆 蜜炙

白茯苓 陳黃米 炒焦 砂仁 炒各一兩

甘州 薑汁炒 五錢

爲末每服三錢薑棗湯送

二神丸 破故紙補腎爲癸水肉豆蔻補脾爲戊土戊癸化火進食炒方

破故紙 炒四兩 肉豆蔻 生二兩

爲末肥棗四十九枚生薑四兩切片同煮爛

去薑取棗剝皮核研膏爲丸桐子大每服三

錢鹽湯下

育氣湯

木香 丁香 藿香

人參 白朮 茯苓

砂仁 白豆蔻 葶澄茄

炙甘草 各半 山藥 一兩 橘紅

青皮 去白各 二錢半 白檀香 半兩

爲末每服二錢木瓜湯調下

資生丸

白朮 泔浸土蒸九次晒九 人參 去蘆飯上蒸熟三兩

茯苓 去皮飛去筋乳拌飯 橘紅 上蒸晒乾一兩五錢

山查肉 蒸 神麩 炒各一兩 川黃連 薑汗炒枯

白豆蔻 澤瀉 去毛炒 桔梗 炒

藿香 洗 甘艸 蜜炙各五錢 白扁豆 炒去殼

蓮肉 去心各一兩 薏苡仁 淘炒三兩 山藥 炒

麥芽 炒 芡實 炒各一兩五錢

爲末蜜丸每丸二錢每服一丸淡薑湯磨服

心之液也而腎主五液故汗證未有不錄心腎
 虛而得者心陽虛不能衛外而為固則外傷而
 自汗腎陰衰不能內營而退藏則內傷而盜汗
 然二者之汗各有冷熱之分因寒氣乘陽虛而
 發者所出之汗必冷因熱氣乘陰虛而發者所
 出之汗必熱雖然熱火過極亢則害承乃制反
 兼勝已之化而為冷者有之此又不可不察也
 至夫肺虛者固其皮毛黃耆六一湯脾虛者壯
 其中氣補中益氣湯心虛者益其血脈當歸六
四君子湯

肝虛者禁其疎泄白芍藥腎虛者助其封藏五
山茱萸龍骨地骨皮牡蠣遠志五倍子何首烏五藏之內更有宜溫宜
 清宜潤宜燥豈容膠一定之法以應無窮之變

脈候 肺脈奘而散者當病灌汗 肺脈緩甚

為多汗 尺濇脈滑謂之多汗尺膚濇而尺脈
若汗出如膠之粘如珠之凝或
淋漓如雨指拭不逮者難治
 黃耆建中湯 治血氣虛而自汗

黃耆 桂 各一錢 白芍藥 三錢

甘草 一錢

水二鍾煨薑五片棗二枚煎一鍾入稠飴一大匙再煎一沸服舊有微澹或嘔者不用飴

者附湯 治氣虛陽弱自汗體倦

黃耆 去蘆 蜜炙 附子 炮去皮 臍等分

每服四錢水一鍾生薑十片煎八分服

參附湯

人參 三錢 附子 炮去皮 臍一錢

水一鍾薑三片煎六分服

黃耆六平湯

黃耆 六兩去蘆蜜炙 甘州 一兩炙

每服五錢水一鍾棗一枚煎七分服

玉屏風散

黃耆 各一兩 白朮 二兩

每服三錢水一鍾薑三片煎六分服

白朮散 治虛風多汗少氣不治將成消渴

牡蠣 煨三錢 白朮 一兩二錢半 防風 二兩半

為末每服一錢溫水調下

安胃湯 治汗出日久虛風痿痺

黃連去鬚 五味子 烏梅肉

白木生 甘州各五分 熟甘草三分 升麻稍二分

水二杯煎一盃服

正元散 治下元虛冷自汗厥逆嘔吐痛瀉

紅豆炒 乾薑炮 陳皮去白各三錢

人參 白木炙 甘州炙

茯苓去皮各二兩 肉桂去麩 川烏炮去皮各半兩

附子炮去皮 山藥薑汁浸 川芎

烏藥去木 乾葛各一兩 黃耆炙一兩半

為細末每服三錢水一鍾薑三片棗一枚鹽

少許煎七分食前服

牡蠣散 治自汗盜汗

黃耆 麻黃根 牡蠣煨研各等分

每服三錢水一杯小麥一百粒煎六分服

大補黃耆湯

黃耆蜜炙 防風 山茱萸

川芎 當歸 白朮炒

肉桂 炙甘草 五味子

人參 各一兩 白茯苓 一兩半 熟地黄 二兩

大餅 肉蓯蓉 酒浸 三兩

每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分服

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥

當歸 生地黄 熟地黄

黃芩 黃連 各一錢

黃耆 二錢

水二鍾煎一鍾臨卧服

盜汗良方

麻黃根 牡蠣 煨為粉 各三兩 黃耆

人參 各二兩 龍骨 打碎 地骨皮 各四兩

大棗 七枚

水六鍾煎二鍾半分六服一日飲盡

茯苓湯 治虛汗盜汗

白茯苓 去皮及膜 研細末

每服二錢煎烏梅陳艾湯調服

栝子仁丸

栢子仁 半夏麴各二兩 牡蠣煨醋淬七次焙

人參 麻黃根微炙去汙 白朮

五味子各一兩 淨麴炒半兩

為末棗肉九梧子大空心米飲下三錢

止汗法

川鬱金研細末臨臥以津調塗乳上

止汗紅粉

麻黃根 牡蠣煨各二兩 赤石脂

龍骨各五錢 為細末以絹包撲于身上

黃疸

經曰溺黃赤安臥者黃疸論疾診尺篇曰身痛色微黃齒垢黃爪甲

黃黃疸也溺黃赤安臥脈小而寒 已食如饑者

胃疸消穀善饑胃有熱也論疾尺診篇曰脈小而澹不嗜食寒也治疸者須知寒熱之別

目黃者曰黃疸目者宗脈所聚諸經有熱上薰於目故黃疸者目黃

愚按黃者中央戊巳之色故黃疸多屬太陰脾

經脾不能勝濕復挾火熱則鬱而生黃譬之盪

麴相似以濕物而當暑月又加覆蓋濕熱相搏

其黃乃成然濕與熱又自有別濕家之黃色暗

不明熱家之黃色光而潤亦有脾腎虛寒脉沉而細身冷自汗瀉利溺白此名陰黃茵陳蒿湯附九味汗出染衣色如藥汁此名黃汗黃者湯者芍桂苦酒挾表者脉浮汗之而愈桂枝加黃耆湯挾裏者腹脹下之而安大黃硝石湯食傷有穀疸之名茯苓茵陳酒傷有酒疸之治葛花解酲湯若夫御女勞傷則膀胱悉而小便自利微汗出而額上色黑手足心熱發以薄暮加味四君子湯統言疸證清熱導濕為之主方茯苓滲濕湯假令病久脾衰胃薄

必以補中參朮健脾胃湯

脉候 脉洪泄利而渴者死 脉小溺利不渴

者生 寸口近掌處無脉口鼻冷者死 疽毒

入腹喘滿者死 年壯氣實脉大易愈 老人

氣虛脉微難瘥

茯苓滲濕湯 清濕熱利小便

茵陳 七分 白茯苓 六分 木猪苓

澤瀉 白朮 陳皮

蒼朮 滑浸一宿炒透 黃連 各五分 山梔 炒

秦艽

防已

葛根

各四分

水二杯煎七分食前服

者芍桂苦酒湯

黃耆

五兩

白芍藥

桂枝

各三兩

苦酒一升水七升煮三升温服一升當心煩

人至六七日解若心煩不止苦酒阻故也

桂枝加黃耆湯 脉浮而腹中和者汗之

桂枝

白芍藥

生薑

各三兩

黃耆

甘草 各二兩

大棗

十一枚

水八升煮取三升服一升須臾飲熱稀粥一升以助藥力取微汗若不汗更服

黃耆湯 治黃汗身腫發熱不渴

黃耆

去蘆 蜜炙

赤芍藥

茵陳蒿

各二兩

石膏

四兩

麥門冬

去心

淡豆豉

各一兩

甘草

炙半兩

每服四錢水一杯生薑五片煎七分服

大黃硝石湯

一方加梔子十五枚

大黃

黃礬

硝石

各四兩 作滑石

吳

薑

醫心方卷之十

水六升煮取二升內硝煮取一升頓服
加減五苓散

茵陳 猪苓 白朮

赤茯苓 去皮 澤瀉 各二錢


水二鍾煎一鍾服

茯苓茵陳梔子湯

茵陳葉 一錢 茯苓 去皮 五分 梔子仁

蒼朮 去皮炒 白朮 各三錢 黃芩 生六分

黃連 去鬚 枳殼 麩炒 猪苓 去皮



澤瀉 陳皮 漢防已 各

青皮 去白 一分

水二杯煎一杯服

葛花解酲湯 見泄 八味丸 理中湯 並見

加味四君子湯 治色疸及久疸不愈

人參 白朮 白茯苓

白芍藥 黃耆 炙 白扁豆 炒 各二錢

甘州 錢 炙 一

水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾服

腎疸湯 治女勞成疸

升麻根 半兩 蒼朮 一錢

獨活根 白朮 柴胡根

羌活根 葛根 茯苓

猪苓 澤瀉 甘艸根 各三分

黃蘗 二分 人參 神麴 各六分

水二杯煎一服食前服

參朮健脾湯 治久黃脾虛食少

人參 白朮 各一錢 白茯苓

陳皮 白芍藥 煨當歸 酒洗各一錢

炙甘艸 七分

水二鍾棗二枚煎八分服 色疸黃

茵陳薑附湯 治陰黃脉沉微小便利或瀉

附子 炮去皮三錢 乾薑 炮二錢 茵陳 一錢

半夏 製 枳實 麩炒

橘紅 各三分 澤瀉 各五分 白茯苓

水二鍾生薑五片煎八分待冷服

蔓菁散 治陰黃汗染衣涕唾黃

蔓菁子 爲細末平旦以井華水服一匙
日再加至兩匙以知爲度每夜小便中浸少
許帛子各書記日色漸白則瘥不過服五升
而愈

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

霍亂

經曰太陰所至爲中滿霍亂吐下又曰土鬱之

發民病嘔吐霍亂注下 此二條言受濕霍亂也
宜五苓散理中丸之類

歲土不及風乃大行民病霍亂餐泄 此言風木
勝土而爲

霍亂宜桂 此言火熱霍
亂宜香薷散

苓白木散熱至則身熱霍亂吐下 此言火熱霍
亂宜香薷散

足太陰之别名曰公孫去本節後一寸別走陽

明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸

中切痛虛則蠱脹取之所別 ○清氣在陰濁氣

在陽營氣順脉衛氣逆行清濁相于亂于腸胃

則為霍亂 此言厥氣上逆清濁不分

愚按霍亂者揮霍變亂起于倉卒心腹大痛嘔

吐瀉利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先

腹痛則先瀉心腹俱痛吐瀉並作甚者轉筋入

腹則斃 轉筋者以陽明養宗筋屬胃與大腸吐

囊縮舌卷 陰陽反戾清濁相干陰陽否隔上下

奔迫須遵內經分濕熱風暑虛實而為施治乾

霍亂者心腹脹滿攪痛欲吐不吐欲瀉不瀉躁

亂昏憤俗名攪腸沙此錄脾土鬱極不得發越

以致火熱內擾不可過于攻過攻則脾愈虛不

可過于熱過熱則火愈熾不可過于寒過寒則

火必捍格須反佐以治然後鬱可開火可散古

方用鹽熬調以童便不獨降火兼能行血極為

穩妥霍亂多起于夏秋之間皆外受暑熱內傷

飲食所致 縱冬月患之亦 轉筋者兼風木 建中

瓜柴 厥冷唇青兼寒氣 建中加附 身熱煩渴氣

麤兼暑熱 桂苓白朮散 體重骨節煩疼兼濕化

除濕 風暑合病 石膏理 暑濕相搏 香 多食寒

湯 中湯 散

冷六和湯倍霍香情志鬱結七氣轉筋逆冷吳
煎熟調蘇合丸黃湯或通邪在上者宜吐雖已自吐利仍當吐
脈四逆湯之以提其氣用極鹹鹽湯三碗熱飲一碗指探
碗三吐乃止吐利不止元氣耗散病勢危篤或
此法極良口渴喜冷或惡寒逆冷或發熱煩躁欲去衣被
此陰盛格陽不可以其喜冷欲去衣被為熱中
湯甚者附子理中湯不效霍亂已透餘吐餘瀉
四逆湯並宜冰冷與服未止腹有餘痛宜一味報秋豆葉保命集云有
從標而得者有從本而得者有從標本而得者

六經之變治各不同細察色脈知犯何經隨經
標本活法施治此大法也

脈候 霍亂遍身轉筋肢冷腹痛欲絕脈洪易

治脈微舌卷囊縮者死 霍亂後陽氣已脫或

遺尿不知或氣少不語或膏汗如珠或大躁欲

入水或四肢不收皆不可治

理中湯

人參 乾薑 白朮 各三錢

甘州 炙一錢

醫宗心訣 卷之十 五

水二杯煎一杯服加附子名附子理中湯

二香散治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香 白朮 厚朴

橘紅 茯苓 半夏

紫蘇 桔梗 白芷

香薷 黃連 扁豆 各一錢

大腹皮 甘草 各五分

水二杯薑五片葱白三根煎一杯服

香薷散 霍亂諸證皆宜服之

厚朴 去皮薑汁炒 黃連 薑汁炒 香薷 四兩

甘草 五錢

為末每服四錢水煎不犯鐵器井中沉冷服

桂苓白朮散 暑食兩傷濕熱霍亂轉筋

桂枝 人參 白朮

白茯苓 各半兩 澤瀉 甘艸

石膏 寒水石 各一兩 滑石 二兩

為細末每服三錢薑湯下一方有木香藿香葛根各半兩

除濕湯 見類中風 五苓散 見泄瀉 蘇合香丸 見中風

七氣湯 治七情鬱結霍亂吐瀉

半夏湯洗 厚朴 白芍藥

茯苓各二錢 桂心 紫蘇

橘紅 人參各一錢

水二鍾生薑七片紅棗一枚煎一鍾服

吳茱萸湯 治胃暑或傷冷物或忍飢或大怒或乘舟車傷動胃氣轉筋逆冷

吳茱萸 木瓜 食鹽各半兩

同炒焦水三升煮令百沸入藥煎至一升服

如無藥用鹽一撮醋一鍾煎八分服

通脉四逆湯

附子大者一枚生用 乾薑二兩強者四兩 甘草炙二兩

水三升煮取一升一分温再服

建中加木瓜柴胡湯

桂枝二兩半 芍藥 二兩 甘草 一兩

膠飴半升 生薑一兩半 大棗 六枚

木瓜 柴胡各五錢

每服一兩水三杯煎杯半去渣下飴兩匙服

六和湯

霍亂

香薷 二錢 砂仁 半夏 湯洗七

杏仁 去皮 尖炒 人參 去蘆 甘艸 炙各五分

赤茯苓 去皮 藿香 去土 白扁豆 薑汁 畧炒

厚朴 薑汁 炒 木瓜 各一錢

水二杯薑五片紅棗一枚煎一杯服

藿香正氣散 見中風

厚朴湯 治乾霍亂

厚朴 薑汁 炒 枳殼 去瓢 炒 高良薑

檳榔 朴硝 各七錢半 大黃 炒二

為末每服三錢水一杯半煎一杯服

冬葵子湯 治乾霍亂二便不通煩熱悶亂

冬葵子 滑石 研 香薷 各二兩

木瓜 一枚去皮瓢

為末每服五錢水二杯煎一杯服 五次

地漿法 於墻陰掘地約二尺許入新汲水攪

之澄清服一杯既取土氣又取墻陰及新汲

水蓋陰中之陰能治陽中之陽也

水蓋得中... 六經... 此... 故寒氣與新穀氣

嘔吐

有聲無物為嘔

有物無聲為吐

經曰諸逆衝上皆屬於火諸嘔吐酸皆屬於熱

火性炎上故逆上皆屬於火然諸藏諸經各有

逆氣則陰陽虛實各自不同實火可瀉芩連之

屬虛火可補參耆之屬不可不察也胃熱則

嘔而酸者肝之味也火盛金傷不能制木則肝

木自甚在素問則以為熱東垣又以吐酸為寒

何也經言始受熱中東垣言未傳寒中摠之壯

盛人多熱虛弱人多寒若不○寒氣客于腸胃

以虛實形證為辨非醫矣

厥逆上出故痛而嘔亦主于寒客食則嘔者物

盛滿而上溢脾不能運化精微則足太陰病舌

本強食則嘔脾脈連于舌本故寒氣與新穀氣

俱還入于胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復
出於胃故為噦東垣以有聲無物為噦蓋指乾嘔也而內經所為噦者蓋呃逆也即其論鍼刺者有云病深者其聲噦又曰噦者以州刺鼻嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之法亦可已此皆治呃逆之法每試而必效者也

愚按古人以嘔屬陽明多氣多血故有聲有物
氣血俱病也吐屬太陽多血少氣故有物無聲
血病也噦屬少陽多氣少血故有聲無物氣病
也獨東垣以嘔吐噦俱屬脾胃虛弱或寒氣所
客或飲食所傷致上逆而食不得下也察古老

人從三焦分氣積寒三因上焦在胃口上通天
氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地
氣主熟腐水穀下焦在臍下下通地氣主出而
不納故上焦吐者皆從于氣氣者天之陽也其
脉浮而洪其證食已即吐渴欲飲水治當降氣
和中中焦吐者皆從于積有陰有陽氣食相悞
其脉浮而弦其證或先痛後吐或先吐後痛法
當去積和氣下焦吐者皆從于寒地道也其脉
大而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大

醫宗必讀 卷之十一 五

便不通法當通其閉塞溫其寒氣後世更爲分別食剝則吐謂之嘔剝者頃刻也食纔入口食入則吐謂之暴吐食纔下咽即便吐小半夏湯謂之嘔吐食畢然後吐食久則吐謂之反胃食則既入于胃矣胃中不能別清濁食再則吐謂之翻胃初食一次不吐也第二次食下則吐直且食暮吐暮食朝吐積一日之食至六時之久然後吐此下焦病半夏生薑大黃湯以上諸證吐愈速則愈在上吐愈久則愈在下陰陽虛實之間未易黑白判也古方通以

半夏生薑爲正劑獨東垣云生薑止嘔但治表實氣壅若胃虛穀氣不行惟當補胃推揚穀氣而已故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈挾寒者喜熱惡寒肢冷脉小或二陳湯加丁香枳實並須水冷與服冷則不吐諸藥不效者紅豆蔻神效挾熱者喜冷惡熱躁渴脉洪二陳湯加黃連梔子竹茹氣滯者脹滿不通二陳湯加枳實沉香木香痰飲者遇冷即發俗名冷以薑蘆湯下靈砂食積者消導乃安枳實厚朴麥芽山查砂仁吐而諸藥不效必假鎮重以墜之靈砂丹養

正丹吐而中氣久虛必借穀食以和之焦黑米炒

皮茯苓半夏甘艸陳倉米先吐後瀉身熱腹悶

名曰漏氣此因上焦傷風邪二便不通氣逆不

續名曰走嘔此下焦實熱乾嘔氣逆橘皮生薑等分惡

心胃傷虛者人參橘紅茯苓甘艸半夏夏生薑嘔

苦邪在膽經黃連甘艸生薑橘皮柴胡吐酸責之肝藏挾熱

金丸加白蔻生薑竹茹梔子挾寒嘔清水者多

者左金丸加丁香香乾薑白木沉香嘔清水者多

氣虛六君子湯吐蚘蟲者皆胃冷理中湯加川椒五粒檳榔

五分吞詳別其因對證用藥不膠于一定之跡

烏梅丸

方可應無窮之變耳

脉候

陽緊陰數為吐陽浮而數亦為吐寸

緊尺濇胸滿而吐寸口脉數者吐緊而濇

者難治緊而滑者吐逆脉弱而嘔小便復

利身有微熱見厥者死嘔吐大痛色如青菜

藥者死

兵尊高玄圃久患嘔吐閱醫頗眾病竟不減余

診之曰氣口大而軟此穀氣少而藥氣多也且

多犯辛劑可以治表實不可以治中虛可以理

氣壅不可以理氣，投以熟艾，夏五錢，人參三錢，陳倉米一兩，白蜜五匙，甘瀾水煎服。二劑減十劑安。文國八思，出問醫，治寒疾，及不食，余屯院孫瀟湘夏月食瓜果過多，得食輒嘔，十日弗止，舉家驚惶，千里迎余，比至署中，已二十日矣。因頓床褥，手足如冰，余曰：兩尺按之，有神，胃氣縷縷不絕，祇因中氣本弱，復為寒冷所傷耳。遂用紅豆丸連進三服，至明日便能食粥，兼與理中湯，加丁香、沉香，旬日之間飲食如常矣。

小半夏湯 止嘔定吐，開胃消食。

半夏 洗 生薑 留皮各三錢

水一鍾煎六分服，加橘皮名橘皮半夏湯。

大半夏湯 治胃虛嘔吐。

半夏 五錢 湯洗 人參 三錢 白蜜 二錢

水二碗和蜜揚之二百四十遍，煮八分，溫服。

薑橘湯

橘皮 去白 生薑 留皮各三錢

水一鍾煎六分服。

水煑金花丸俱見理中湯見傷寒

紫沉香 治中焦吐食積寒氣作痛痛

砂仁 半夏麴各三錢烏梅去核

丁香 檳榔各二錢沉香

杏仁去皮尖炒白朮各錢木香各錢

陳皮五錢白豆蔻 巴豆霜各五分 另研

為細末醋糊丸黍米大每服五十丸食後薑湯下反胃用橘皮去白裏生薑麴裏紙封燒令熟去麴煎湯下紫沉香一百粒一日二服

半夏生薑大黃湯 半夏各二兩生薑一兩

水五升煑取三升分溫再服

紅豆丸 治嘔逆膈氣反胃吐食

丁香 胡椒 砂仁

紅豆各二十粒

為細末薑汁糊丸皂角子大每服一丸以大棗一枚去核填藥麴裏煨熟去麴細嚼白湯下日三服

靈砂丹 治上盛下虛痰盛吐逆此丹最能鎮

水銀一觔 硫黃四兩

右三味用新銚內炒成砂子入水火鼎煨煉為末糯米糊丸麻子大每服三九空心棗湯米飲并花水人參湯任下忌猪羊血菘豆粉冷滑之物

養正丹 見中風 六君子湯 見虛癆 烏梅丸 見傷寒

麥門冬湯 治漏氣上焦傷風膝理開經氣失道邪氣內着身背熱肘臂痛悶而吐瀉

麥門冬 去心 生蘆根 竹茹

白朮 各五兩 甘艸 炙 茯苓 各二兩

人參 陳皮 葳蕤 各三兩

每服四錢水鍾半薑五片陳米一撮煎七分服

走哺人參湯 治大小便不通下焦實熱

人參 黃芩 知母

葳蕤 各一錢 蘆根 竹茹

白朮 梔子仁 陳皮 各半兩

石膏 煨一兩

每服四錢水鍾半煎七分服

左金丸 治肝火吐酸水各左金者使

黃連 各一兩同

爲細末粥丸煎白木陳皮湯下二錢

貞享四年歲在丁卯孟夏吉辰

江府書肆 富野次右衛門勝武

洛陽書肆 茨木多左衛門方淑 繡梓

新刻醫宗必讀後題

醫之爲道邈焉渺兮歷

云諾嘆昏矧而心裁藉

極博然惟多方法而論

理未確實近者雲間李

老士材學造閩奧術殫

精微其行著之書三十
有餘部而今所行
日域者內經知要歟生微
論藥性解數部身醫宗
必讀其平日所用方
書也予往歲懇于友人

幸讀之喜大
益然商船所傳酷
有回之者韞
者希乎深恨焉一日
侍我
相公談及斯事

相一云 莊書甚富 竊比石渠
 百陽因命 披四庫以賜
 一本遂聽 壽梓與命借
 於乎
 相一云 及物之仁 廣被天下
 後云 豈翅我徒之幸哉

寔斯民之度也 蓋非李
 君則無著此書 非
 相一云 至擴步澤於是為
 一云 至之學者以
 相一云 仁為心 以李君之
 學為法 則誠魔愧司命


皇清御製

年

負享歲處丁卯夏五穀旦

水戶醫官法橋板垣宗懔

採毫于聊爾齋



皇清御製

