

聖濟總錄

吳錫璜著

巳4

8649

大德重校聖濟總錄卷第三十

傷寒門

傷寒吐血

論曰傷寒吐血者熱在陽經邪盛於表應汗不汗熱毒入深結於五藏遂成痰熱熏于上焦血隨氣行併入胃中胃得血則滿悶氣逆故吐血也

治傷寒頭疼手足煩熱吐血不止麥門冬湯方

麥門冬

去心焙一兩半

薺菜

吳藍

甘草

炙黃芩

去心

茅根

生乾地黄

焙各一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒疫病吐血不止面黃乾嘔心神煩躁蒲黃湯方

蒲黃

桑寄生

犀角

鈔

甘草

炙葛根

各一兩

右五味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒熱病當發汗而不發內有瘀熱鼻衄吐血不止地黃湯方

生乾地黄

焙芍藥

犀角

鈔

各一兩

牡丹皮

參分

右四味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒吐血不止喜忘如狂熱毒不散內有蓄瘀犀角湯方

犀角鑄一兩 大黃剉炒芍藥 黃芩去黑心 牡丹皮參生乾地黃

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食後温服

治傷寒吐血心神煩悶黃芩湯方

黃芩去黑心 山梔子人兩半 遠志去心一分 桂去麤皮 黃連須法 竹筴各參

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓食後温服

治傷寒吐血不定此由心肺積熱血得熱即妄行黃連湯方

黃連去須一兩半 荷葉微炙一兩 艾葉微炒一兩 柏葉參

右四味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓下生地黃汁一合攪

令勻食後温服

治傷寒後心氣不足吐血及衄血三黃湯方

大黃剉炒 黃連須去 黃芩去黑心

右三味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食後温服

治傷寒吐血煩躁紫河車散方

紫河車參分 朴消 甘草各半 蛤粉分

右四味搗羅為散每服二錢七沙糖新汲水調下不計時候日三服

治傷寒吐血不止金花散方

鬱金 甘草剉炙 青黛各半

右三味搗羅為散每服二錢匕用雞子白調下

治傷寒吐血不止地黃散方

大黃剉炒搗龍腦錢一

右二味合研勻每服二錢匕用生地黃汁調下

治傷寒吐血下血及血汗人參湯方

人參 芍藥 桔梗剉 芎藭 當歸切 桂皮去麤 甘草炙剉各 竹茹分

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後餘毒不解心藏熱極吐血不止方

生藕汁合二 生地黃汁合參 惡實根汁合二 刺薊根汁合二 蜜合

右五味相和攪勻每服一二合不計時候頻頻服

傷寒瘀血

論曰傷寒病在表當汗不汗邪無所出熱結在裏皆成瘀血然太陽病不解熱結膀胱其人如狂者少腹鞕滿小便自利下血乃愈又陽明病其人喜忘者本

有瘀血大便雖鞭反易其色必黑凡病人腹不滿其人自言滿者亦為瘀血在裏皆宜下之使瘀血得下即愈診其脉沉結者瘀血之病也

治傷寒陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有瘀血故令喜忘大便雖鞭反易其色必黑者宜抵當湯方

水蛭參十枚去 桃人二十枚去 大黃一兩酒洗

右四味剉如麻豆大以水五盞煮取三盞去滓温服一盞不下更服

治傷寒太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外已解但少腹急結者乃可攻之宜桃人承氣湯方

桃仁湯去皮共雙 大黃剉一兩 桂去麤皮半兩 甘草炙半兩 芒消半兩

右五味先剉四味如麻豆大以水三盞煎取一盞半去滓下芒消再煎數沸

分温三服以微利為度未利移時再服

治傷寒八九日至十二日病不解發熱如狂少腹滿悶其脉沉結内有瘀血桃人丸方

人丸方

桃人湯浸去皮共雙 水蛭梗米同炒 蟲蟲各一分去 大黃生剉

右四味除桃人搗羅為細末再入桃人同研勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服

二十九煎桃人湯下如人行五七里瘀血下為效未下再服

治傷寒太陽病隨經入裏瘀熱內積蓄血喜忘如狂大黃為藥湯方

大黃剉炒芍藥 牡丹皮 犀角鎊屑各一兩 生乾地黄半

右五味剉如麻豆大每服五錢匕用水二盞煎取一盞去滓溫服

治傷寒數日不得汗內有蓄血為藥湯方

芍藥 牡丹皮各一兩 生乾地黄半 犀角鎊屑一兩

右四味麤擣篩每服三錢匕用水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒及溫病應發汗而不發內有蓄血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血面黃大

便黑為藥地黃湯方

芍藥參分 牡丹皮二兩 犀角鎊屑一兩

右三味挫如麻豆大每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓下生地黄汁三

合攪令勻食後溫服如狂者加黃芩一兩去黑心用

治傷寒內有瘀血大便不利小腹急痛大黃湯方

大黃剉炒 桃人湯浸去皮共雙人 水蛭米炒一分 木通半兩

右四味除桃人外麤擣篩入桃人同研令勻每服二錢匕以水一盞煎至七

分去滓温服不計時候

傷寒口舌生瘡

論曰傷寒口舌瘡脾受熱熏于口舌又或因冬時發汗吐利後重亡津液表裏俱虛熱勢不已毒氣攻于上焦致口中糜爛生瘡也

治傷寒口舌瘡赤爛升麻湯方

升麻

一兩

去心焙

牡丹皮

甘草

炙剉各半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片棗二枚擘破煎至八分

去滓食後温服

治傷寒少陰病咽中生瘡語聲不出苦酒湯方

半夏

湯洗七遍切十四枚

雞子

一枚

去黃留白苦酒在內

右二味內半夏於苦酒內以雞子殼置剪刀環中安火上煮二沸去滓少少

含嚥

治傷寒後下冷上熱口舌生瘡大青煎方

大青

升麻

射干

去毛

苦竹葉

山梔子

各一人兩

黃蘗

去麤皮蜜炙半兩

玄參

聖者參分

薔薇根

二兩

生地黃汁

白蜜

各半升

右一十味將八味挫如麻豆大都用水五升煎至一升去滓下蜜地黃汁攪
勻再煎如稠餈以淨器盛每服半匙含化嚙津不拘時

治傷寒後心藏熱舌裂口生瘡黃蘗湯方

黃蘗去麤皮蜜炙 大青 龍胆 玄參聖者 生乾地黃各半兩 升麻一兩 射干去毛

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片煎至八分去滓入蜜一
合攪勻食後含化嚙津

治傷寒熱病後餘熱上衝口舌生瘡羚羊角湯方

羚羊角銹射干去毛 麥門冬焙去心 芦根各一兩 升麻 芍藥各參分 木通剉一兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒熱病後乍寒乍熱百骨節痛口舌生瘡此胡湯方

此胡去苗一兩 升麻 芍藥 麥門冬焙去心 甘草 黃芩去黑心各參分 知母焙 黃連

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜一棗大拍碎豉一百粒葱白五
寸切煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒後口舌生瘡黃連湯方

黃連去須炒一兩 大黃剉炒 大青 升麻 黃芩去黑心 甘草剉各參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後心熱口瘡久不差芍藥湯方

芍藥 黃芩去黑心 羚羊角鎊 甘草炙到各一兩 大青三分 升麻二兩 黃蘗去粗皮蜜炙半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片煎至八分去滓入蜜半

合更煎一兩沸食後溫服

治傷寒後口内生瘡小便赤色手足煩熱秦苧湯方

秦苧去苗土 苳胡去苗 大青各一兩 升麻 黃芩去黑心 甘草炙到各參分 虎杖半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半葱白五寸切豉一百粒煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒後心藏虛熱滿口生瘡犀角湯方

犀角鎊 玄參各一兩 胡黃連 甘草炙到各半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片煎至半盞去滓食後溫

服

治傷寒後脾壅唇口常有瘡疾藜散方

蒺藜子炒去角 白藟豆炒各一兩

右二味搗羅為散每服一錢匕如茶點不拘時

治傷寒後心熱口瘡久不差黃蘗湯煎方

黃蘗一兩

右一味搗羅為末入蜜三兩和勻慢火煎如稀餈每取少許含化良久吐涎日三五度不拘時嚙津亦得覺胸中似有瘡者即用蜜酒調下二錢匕

治傷寒心熱口舌生瘡地黃煎方

生地黃汁參五分

右二味攪勻慢火煎如稠餈每服半匙含化徐徐嚙津不拘時

傷寒舌腫脹

論曰傷寒舌腫脹者病在三陰也太陰之脉連舌本散舌下少陰之脉循喉嚨俠舌本厥陰之脉循喉嚨之後又手少陰心之經其氣通於舌凡此經絡為風熱所乘隨脉至舌熱氣留於血血氣壅滯故令舌腫脹診其脉數急者是其候也治傷寒熱病咽喉壅塞連舌根腫痛及乾嘔頭痛不下食升麻湯方

升麻一兩木通剉黃蘗去麩皮剉玄參參分麥門冬去心焙青竹茹半兩

前胡去芦頭石膏碎朴消二兩

右九味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓食後溫服日再

治傷寒心脾虛熱喉中有瘡連舌根腫涕唾不下食乾地黄湯方

生乾地黄焙二兩 青竹筴 雞蘇 赤茯苓去黑皮各一兩 麥門冬去心焙一兩 玄參一分

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日再

治傷寒脾肺虛熱毒氣壅塞喉咽連舌根腫滿疼痛犀角湯方

犀角銹屑 當歸切 白芷各一兩 升麻 甘草炙 射干 杏仁湯浸去皮去雙

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服日再服

治傷寒喉咽閉塞連舌腫疼小便赤澀馬蘭根湯方

馬蘭根 升麻各一兩 瞿麥 射干各一分 犀角屑 木通剉各半兩 玄參一兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服日再

治傷寒熱病喉咽閉塞連舌根腫痛熱毒氣聚於心胸木通湯方

木通剉 絡石碎各一兩 升麻半兩 射干半兩 犀角屑半兩 玄參 桔梗炒各一分

山梔子半兩 芍藥一分 青竹筴半兩 朴消一兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服

治傷寒心脾風熱舌腫口瘡喉咽中痛口吐涎沫羚羊角散方

羚羊角屑 黃蘗去麤皮塗蜜炙 大黃剉 甘草炙各半兩 玄參參分

右五味搗羅為散每服一錢匕食後煎竹葉熟水調下

治傷寒上焦虛熱毒氣壅塞喉咽連舌腫痛方

玄參 射干 當歸切焙一兩

右三味搗羅為散每服三錢匕水一大盞煎至半盞不去滓食後溫服日再

服

治傷寒舌腫口内生瘡此是心脾積熱上衝所致湯方

大青 升麻各半兩 黃連去須一分 大黃剉炒半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至半盞去滓食後溫服

治傷寒心脾有熱舌本腫痛方

生地黄汁升半蜜八兩

右二味同攪和勻慢火煎如稠錫每服半匙含化嚙津不拘時候日二三服

治傷寒咽喉中痛舌根腫滿不能轉此謂上焦心脾虛熱宜先用鍼舌下兩邊

出血即消後服升麻湯方

升麻 車前子 大黃剉 甘草炙各半兩 生乾地黄焙參兩

朴消分參

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日再

傷寒咽喉痛

論曰傷寒咽喉痛者少陰受邪邪毒壅遏於上焦微則咽喉發痛甚則痛而生瘡又傷寒過經邪熱內盛熏於上焦亦令人咽喉腫痛各隨其證以法治之

治少陰病二三日咽喉痛者可與甘草湯方

甘草炙剉一兩

右一味以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服

治少陰病二三日咽喉痛服甘草湯不差者可與桔梗湯方

桔梗半兩甘草炙一兩

右二味各剉細以水三盞煎取一盞去滓分溫二服

治少陰病咽中痛生瘡不能語言聲不出者苦酒湯方

半夏十四枚湯洗七遍切焙生雞子一枚

右二味將雞子破殼去黃入半夏在內并苦酒滿雞子殼置剪刀鑲中安火

上令三四沸去滓少少含嚥之不差更作服

治少陰病咽中痛半夏湯方

半夏湯洗七遍切焙桂去麤皮甘草炙

右三味等分麤搗篩每服先以水一盞煎七沸內藥兩方寸匕更煮三沸下

火放冷少少噉之

治傷寒咽閉塞痛效嗽多腥氣射干湯方

射干 木通剉升麻各一兩桔梗 玄參 黃芩去心甘草炙

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒咽喉痛塞不通小便赤澀羚羊角湯方

羚羊角銹升麻 木通剉射干 甘草炙芍藥各一兩芍藥半兩生苧根剉

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒咽喉壅塞小便不通氣脹口舌乾燥麥門冬湯方

麥門冬去心焙大黃剉防己 玄參 葛根 木通剉青竹茹

滑石碎各半兩甘草炙木香一分

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎葱白五寸切同

煎至八分去滓食後溫服

治傷寒熱毒未解咽喉壅塞口内生瘡連翹散方

連翹半兩 白芍子分參 山梔子人 苕胡去苗各半兩 甘草炙到一分

惡實 黃蘗去麤皮蜜炙半兩

右八味搗羅為細散每服食後用蜜水調下二錢匕日二

治傷寒時氣肺熱欬咽喉痛如有瘡地黃煎方

生地黃汁升半 升麻 玄參 芍藥 苕胡去苗各一兩 貝母去心參分

麥門冬去心焙一兩 竹葉一兩 白蜜五兩

右九味除地黃蜜外細剉用水五大盞煎至二盞去滓下蜜及地黃汁慢火

煎成膏每服半匙不計時候嚥津

治傷寒咽喉痛壅塞不通口苦玄參湯方

玄參堅者一兩 羚羊角銹 升麻 射干各參分 芍藥 木通剉各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半八生姜半分拍碎同煎至八分去滓

食後溫服

治傷寒毒氣上衝喉中痛悶塞不通茯苓湯方

赤茯苓去黑皮半兩 木通剉參分 升麻 羚羊角銹 前胡去芦頭各半兩 桑根白皮剉參分

大黃剉炒馬蔞根 朴消各一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒咽喉痛心中煩躁舌上生瘡牛黃散方

牛黃研朴消研甘草炙剉各一兩升麻 山梔子去皮芍藥各半兩

右六味搗研為細散再同研令勻每服一錢匕食後煎姜蜜湯放冷調下

治傷寒咽喉痛口中乾燥不止犀角散方

犀角屑半兩黃連須去鉛霜研各一分栝蔞根半兩鬱金 甘草炙剉各一分

右六味搗研為細散再同研勻每服食後用去心麥門冬熟水調下二錢匕

治傷寒藏府虛熱毒氣攻衝咽喉腫塞急痛升麻丸方

甘草生用升麻三兩射干各二兩

右三味搗羅為末用牛蒡汁和杵數百下丸如彈子大每服綿裹一丸含化

嚙津不拘時候如和不成入鍊蜜少許

治傷寒頭痛身熱咽喉壅塞語聲不出麻黃地骨湯方

麻黃去節地骨皮 玄參各半兩五味子參甘草炙乾姜炮各一分

附子炮裂去皮桔梗炒杏仁湯浸去皮知母各半兩

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

傷寒毒攻手足

論曰傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣客於府藏邪結在裏循經而出注於四肢故令人手足煩熱赤腫疼痛也

治傷寒後毒氣攻手足腫滿疼痛心神煩悶連翹湯方

連翹兩一 大黃兩半 當歸兩一 木香兩半 麥門冬兩一 防風兩一 羌活兩一

黃芩兩一 犀角屑兩一 麝香錢一 枳殼錢一 惡實兩半

右一十二味搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後毒氣攻四肢虛腫及喘息促急防己丸方

防己兩半 桑根白皮兩半 葶藶子兩半 郁李人兩半 木通兩半

赤茯苓兩半 百合兩半 澤漆兩半

右八味搗羅為末鍊蜜和更搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十九空心

煎桑根白皮湯下

治傷寒毒氣攻四肢及胸背虛腫五香湯方

沉香 木香 薰陸香 雞舌香 麝香 白薇

枳實炒 麻黃去根 防風去 萎蕤 秦艽去苗 獨活去頭 甘草半兩

右一十三味除五香別搗研外麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓下五香末一錢匕再煎令沸溫服食前臨卧日三服

治傷寒毒氣攻手足虛腫疼痛甚者虎杖湯方

虎杖細剉

右一味以水一斗煎至五升去滓看冷熱以漬手足即差於避風處用

治傷寒熱病後毒氣攻手足腫滿疼痛欲脫者蒼耳漬手足方

蒼耳五握

右一味搗絞取汁以漬手足良

治傷寒後毒氣攻手足虛腫鉛丹膏方

鉛丹半兩 松脂 乳香各一兩 麝香研一

右五味除松脂蠟外各別研為末用瓷器內先鍊松脂次下蠟及鉛丹乳香

等慢火煎少時候冷攤於絹上以貼腫處一切腫毒並宜貼此膏

大德重校聖濟總錄卷第三十

聖濟總錄

卷第三十

傷寒門

七

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、
 十一、
 十二、
 十三、
 十四、
 十五、
 十六、
 十七、
 十八、
 十九、
 二十、

附錄
 卷之三
 三
 三
 三

大德重校聖濟總錄卷第三十一

傷寒門

傷寒後夾勞

論曰傷寒差後復夾勞者由病人先有夙疹因汗下之後榮衛虛弱氣不復常形體羸劣時有盜汗寒熱不常喘咳痰唾鼻中臭氣飲食不消肢體痠痛面黃頰赤不即治之則致危殆

治傷寒後夾勞氣四肢無力脾虛胃弱飲食無味向晚潮熱手足心煩漸覺黃瘦木香丸方

瘦木香丸方

木香

龍甲

去裙襴醋浸

羌活

去芦頭

苳胡

去苗

半夏

湯洗七遍

去滑

半兩

桔梗

炒

知母

焙

陳橘皮

湯浸去白

五味子

秦艽

去苗

天靈蓋

酥炙各

半兩

桃人

湯浸去皮共雙人炒研如膏四兩

右一十二味搗羅十一味為末與桃人同研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服

空心米飲下二十九晚再服

治傷寒後夾勞肢體煩疼早晚虛熱口苦噤乾夜卧多汗脚手麻痺及風勞等

疾羸活散方

羌活去頭

白朮

黃耆剉

青橘皮湯浸去白

桔梗炒

甘草炙

附子炮裂去皮臍

五茄皮用茱萸半兩水一椀煎水

桂皮去麤皮

乾薑炮各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕温酒調下用水一盞生姜三片棗一枚擘煎至七分温服亦得不拘時

治傷寒後夾勞骨節疼痛渾身壯熱氣力虛乏人參湯方

人參 桔梗炒 白朮 芍藥 白茯苓去黑皮 紫苑去土 懷香子炒各一兩

秦艽去苗土

甘草炙一兩半

芎藭去苗

陳橘皮湯浸去白焙

蒼朮洗切炒

羌活去頭

右一十三味麤搗篩每服三錢匕水一盞生姜三片棗一枚擘同煎七分去滓温服不拘時

治傷寒後勞氣四肢煩痛日漸虛羸脣紅頰赤知母湯方

知母焙半兩 犀角屑 地骨皮 前胡去頭 白鮮皮 芎藭去苗

赤茯苓去皮 人參 黃耆剉各一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生姜三片煎至七分去滓食後温服

治傷寒後骨蒸熱日漸黃瘦大便澁小便赤鼈甲湯方

鼈甲去裙襴

知母切焙

大黃剉

桑根

白皮

浸炙一兩醋

鼈甲去裙襴 知母切焙 大黃剉 桑根 白皮

甘草炙劉各一分木香炒半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞童子小便三分葱白三寸煎至七分去滓早晚食後溫服

治傷寒溫病差後夾勞形體羸瘠或寒或熱如瘧狀四肢煩疼黃耆鼈甲湯方

黃耆劉鼈甲去裙襴醋浸知母焙桑根白皮各半兩

甘草劉陳橘皮湯浸去白炒白朮各參分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半葱白三寸生姜三片煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無力不能飲食此胡湯方

此胡去苗黃耆劉赤茯苓去黑皮地骨皮去苗黃芩去黑心

葛根劉枳殼去麤殼炒人參炙各鼈甲去裙襴醋浸

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞生姜三片煎至七分去滓不拘時

溫服

治傷寒後夾勞寒熱乍進乍退虎骨湯方

虎頭骨塗酥知母焙各半兩甘草炙鼈甲去裙襴醋浸人參炙黃耆劉各

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞童子小便三分生姜三片葱白三寸煎至七分去滓不拘時溫服

湯方
治傷寒後夾勞寒熱往來進退不時頭痛體痛口苦咽乾不思飲食人參鼈甲

人參 鼈甲去裙襖 附子炮裂去皮臍 苳胡去苗各一兩 桃人去皮共炒 芍藥

知母焙 桂皮去麤皮 烏梅炒去核 陳橘皮湯浸去白炒 當歸切焙 秦花去苗

菟活頭去芦 五味子各半

右一十四味判如麻豆每服三錢匕水一盞生姜三片煎至七分去滓早晚

食前溫服

治傷寒差後夾勞氣四肢無力骨節煩疼不思飲食人參丸方

人參 前胡去芦頭各一兩 乾薑炮半兩 鼈甲去裙襖 桔梗剉炒 甘草炙各一分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸生姜棗湯下不拘時服

治傷寒後百節疼痛變為勞氣發熱盜汗前胡湯方

前胡去芦頭 桔梗各一兩 龍膽 甘草炙各半兩 苳胡去苗 烏梅去核炒

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生姜二片同煎至七分去滓溫服不拘

時

治傷寒後夾勞羸瘦盜汗寒熱不常喘欬痰唾飲食減少當歸湯方

當歸焙切代赭研黃連去須各桑根白皮剉桂去麤皮附子炮裂去

陳橘皮湯浸去黃芩去黑心白朮厚朴去麤皮生木通微炙

地榆各一桃人湯浸去皮炙右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

傷寒後勞復

論曰內經謂熱病少愈食肉則復多食則遺此其禁也蓋傷寒病新差之後脾胃尚虛氣血猶弱穀氣未復津液未通若將養失宜輒嗜肉食則脾虛不能消釋或因勞形於事皆令邪熱乘虛還入經絡復成大病故名勞復當隨其證候或表或裏依法治之

治傷寒差後因食勞復如初壯熱頭疼此胡知母湯方

此胡去苗知母焙參分龍甲去裙爛醋石膏搗碎

雄鼠糞炒秦光去苗土

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒同煎至八分去滓食後

傷寒門

三

傷寒門

傷寒門

傷寒門

温服

治傷寒差後因飲食動作致勞復如初麻黄梔子湯方

麻黄

去節

山梔子人

半兩

龍甲

去裙襖

雄鼠糞

炒七粒

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸豉一百粒同煎至八分去滓食後温服良久喫葱豉粥衣被蓋覆取汗

治傷寒温病差後或食肉或沐浴或嗔怒動作勞復三物湯方

山梔子人

參七枚

龍甲

去裙襖

生乾地黄

焙各一兩

右三味吹咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入豉一百粒同煎至八分去滓

滓温服食後日二

治傷寒差後勞復壯熱頭痛六神湯方

龍甲

去裙襖

芫胡

去苗

人參

知母

黄連

去須炒

烏梅肉

炒半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎同煎至八分去滓

食後温服

治傷寒新差後勞動用力或飲食過傷致勞復知母湯方

知母

焙

龍甲

去裙襖

芫胡

去苗

麻黄

去節

葛根

剉焙各

雄鼠糞

炒令焦

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸豉一百粒同煎至八分去滓食後溫服服後喫少葱粥取汗

治傷寒溫病差後起早及飲食多致勞復紫蘇飲方

紫蘇莖葉剉一兩 生姜切半兩 豉二合

右三味用水二盞半煎至一大盞去滓食前分溫二服

治傷寒後食肉勞發如初壯熱頭痛心煩欲吐小便赤石膏黃芩散方

石膏碎一兩 黃芩去黑心 山梔子人 葛根剉 知母焙 人參 黃連去須炒各半兩

右七味搗羅為細散每服二錢匕濃煎葱白竹葉湯調下空心食前日二服以差為度

以差為度

治傷寒天行病差後食勞加熱異功湯方

雄鼠糞炒令煙出二七粒 山梔子人 枳殼去瓢炒一分

右三味細剉用水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後傷食食勞困絕者麴藥湯方

陳麴搗碎炒一兩 大麥藥炒半兩 寒食乾飴半合 雄鼠糞參七粒炒令煙盡為末

右四味除鼠糞外略搗過拌令勻分作二服每服用水一盞半入葱白五寸

薤白五寸豉一百粒同煎至八分去滓入鼠糞末一半攪勻空心温服

治勞復小腹鞭卵縮疔痛欲死知母湯方

知母

焙 苽胡 去心 苗 麥門冬 去心

甘草 炙 各 半分 葱白 參 莖

右五味咬咀如麻豆大都以水一盞浸一宿次日煎令水欲盡下童子小便二盞豉心半合煎五六沸下地黄汁二合更煎微沸去滓空腹頓服微利即差

傷寒後骨節煩疼

論曰傷寒後骨節煩疼者由津液不足血脉皆虛餘毒客於經絡榮衛澀滯於骨節之間故令骨節煩疼也診三部脉細而遲澀者乃其候也

治傷寒後毒氣未解四肢少力骨節煩疼心腹脹滿葛根湯方

葛根

剉 生 乾地黃 焙 羗活 去 頭 去 芦 桂 皮 去 粗 芍藥 芎藭

麻黃

去根節湯 煮掠去沫 陳橘皮 湯浸 去 白 焙 木香 各 半 兩 甘草 炙 剉 一分

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓空心温服晚食前再服

治傷寒後百節疼痛壯熱頭疼苽胡湯方

此胡去苗芍藥 知母焙 桃人湯浸去皮 木香 山梔子人 升麻

大青 白芷 黃芩去黑心 細辛去苗 甘草炙到各一分 石膏兩

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎同煎至七分

去滓食後溫服日三

治傷寒後骨節疼痛效嗽不能食口舌乾燥乍寒乍熱唇口生瘡此胡飲方

此胡去苗升麻 茯神去木 芍藥 犀角鎊 百合 地骨皮 麥門冬去心

黃芩去心 人參各半 龍甲去裙襴 石膏各一兩 甘草炙到一分

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎竹葉三七片

同煎至七分去滓食後溫服日再

治傷寒後壯熱骨肉疼痛頭重嘔噦芍藥湯方

芍藥 此胡去苗 赤茯苓去黑皮 人參 麥門冬去心 藿香葉

白芷各半兩 生蘆根一兩 甘草炙一分

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎同煎至七分

去滓空心溫服晚食前再

治傷寒後四肢煩熱骨節疼痛百合湯方

百合 知母 焙 鼈甲 去裙襖 醋炙 苡胡 去苗 葛根 剉 桑根白皮 剉各一兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入生地黄汁一合攪

勻食後溫服日再

治傷寒後骨節煩疼乍起眼暗氣衝胸背上氣滿急茯苓湯方

白茯苓 去黑皮 苡胡 去苗 桔梗 炒 細辛 去苗葉 芍藥 大腹皮 各半兩

枳殼 去麩炒 陳橘皮 湯浸去白焙各一兩 杏仁 湯浸去皮共雙人炒參分 甘草 炙一分

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎同煎至八分去

滓食後溫服日再

治傷寒後骨節煩疼不欲食食即氣脹汗出補氣黃耆湯方

黃耆 剉 芍藥 桂皮 去麩 麥門冬 焙去心 五味子 前胡 去頭 白茯苓 去黑皮

當歸 切人參各半兩 甘草 炙一分

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎棗三枚擘破同

煎至七分去滓溫服日三

治傷寒後徧身骨節疼痛脚膝無力防風湯方

防風 去 白朮 附子 炮裂去皮臍 白鮮皮 黃耆 桂皮 去粗 薏苡仁 各一兩

右七味挫如麻豆每服三錢匕水一盞入生姜半分拍碎同煎至半盞去滓
温服日三

治傷寒後下焦風虛骨髓痠痛腰脚頑痺不能久立日漸消瘦羗活湯方

羗活去頭防風去叉五茄皮剉牛膝去苗酒浸切焙酸棗人炒丹參微炒麻黃去根節

去沫芍藥焙當歸切焙獨活去頭檳榔剉玄參堅者木通剉桂皮去羸黃耆剉

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓空心温服日晚

再服

治傷寒熱毒氣攻腎腰背疼痛脊脊強急頭不痛左手尺脉浮微數續斷湯方

續斷杜仲去麤皮麻黃去根節湯煮羗活去頭芍藥剉芎藭各一兩牽牛一分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎一二沸去滓空心服

傷寒後餘熱

論曰傷寒病後餘熱不解者蓋陰陽未和邪氣未盡傳留經絡蘊而生熱潮作
如瘧鼻衄煩躁面赤目黃腹滿小便不利大便乾澀或即譫言渴欲得水脉沉
數者當以裏證求之若脉但浮者當消息治其外

治傷寒後餘熱脉浮者麻黃湯方

麻黃去根節煎芍藥 甘草炙令微赤桂皮去麤皮細辛去苗葉

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服日三

治傷寒發汗熱已解半日許復發熱煩脉浮數者可更發汗桂枝湯方

桂皮去麤皮芍藥各一分甘草炙二兩

右三味以咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大切棗二枚擘煎取一盞去滓溫服取汗為度

煎取一盞去滓溫服取汗為度

治傷寒餘熱汗出如瘧狀日晡發熱脉實者可下宜大茈胡湯方

茈胡去人兩黃芩去黑心半夏生薑汁製枳實去麤殼大黃二兩

右五味以咀每服五錢匕水一盞半入生姜半分切煎至八分去滓溫服以利熱退為度

利熱退為度

治傷寒差後更發熱小茈胡湯主之脉浮者以汗解脉沉實或緊者以下解小

茈胡湯方

茈胡去苗黃芩去黑心人參 甘草炙各一兩半半夏生薑汁製枳實去麤殼大黃二兩

右五味以咀如麻豆大每服五錢匕水二盞入生姜半分切棗二枚擘煎取

八分去滓不拘時溫服

治傷寒及天行後頭痛餘熱不解葛根湯方

葛根剉 芩胡去苗各一兩 麻黃去根節煎掠 芍藥 黃芩去心

甘草剉 桂去麤皮

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘煎至六分去滓不計時候

温服

治傷寒後餘熱不除及寒熱頭重體痛表證尚未罷葛根湯方

葛根 芍藥 白茯苓去黑皮 黃芩去心 烏頭炮裂去皮臍 芎藭各一兩 梔子人兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入豉三七粒煎至七分去滓

温服

治傷寒汗後餘熱不退心神煩躁茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 人參一分 甘草炙剉

右三味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓不拘時候温服

治傷寒汗後餘熱不除及四肢拘急痛胸膈不利嘔逆不思飲食茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 芩胡去苗 枳殼去麤皮 桑根白皮剉 麥門冬去心焙

葛根剉 參一分 甘草炙剉 桂去麤皮 人參各一分

右九味麤搗篩每服三錢匕用水一盞生姜三片大棗二枚擘煎至七分去滓溫服

治傷寒發汗及吐下後餘熱不退頭痛滿悶口乾葛根人參湯方

葛根剉一兩 人參一兩 麥門冬去心焙半兩 黃芩去黑心半兩

黃耆剉一兩 地骨皮 石膏碎各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓溫服

治傷寒數日餘熱不解時發寒熱姜蕤湯方

姜蕤 芫胡去苗 羚羊角銹各一兩 石膏碎半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不計時候溫服

治傷寒後餘熱不退人參湯方

人參一兩 知母一分 甘草炙 石膏碎 黃芩去黑心各半兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞入竹葉粳米各少許同煎至七分去滓

不計時候溫服

治傷寒後餘毒不解頰赤口乾四肢煩熱芫胡湯方

芫胡去苗 茵陳蒿 甘草炙 人參各一兩 大黃剉炒半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞小麥五十粒同煎至七分去滓溫服不計時候

傷寒後虛羸

論曰傷寒之病多因發汗吐下乃解病雖差然府藏俱傷榮衛皆耗穀氣未復津液不足無以充養故形體虛羸內經所謂必養必和待其來復者此也若其人本自虛弱又因大病之後羸劣不復者則易生勞傷諸疾當先以氣味養和後以藥石療治故曰氣味合而服之以補精益氣

治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆人參湯方

人參

白茯苓

去黑皮各二分

麥門冬

焙去心

黃耆

剉各一兩

半夏

湯洗七遍炒乾

白朮

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

甘草

炙一分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後虛羸少力補益元藏附子湯方

附子

炮裂去皮臍

草薢

熟乾地黄

焙

人參

各一兩

芍藥

半夏

湯洗七遍炒各半兩

白茯苓

去黑皮

桂皮

去麤皮

當歸

切焙

芍藥

五味子

黃耆

剉各參分

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎棗三枚
擘破同煎至八分去滓空心溫服

治傷寒後體虛成勞徧身盜汗四肢無力口苦憎寒又多欬嗽此胡知母湯方

此胡

知母

桔梗

厚朴

去麤皮生

熟乾地黄

白茯苓

去黑皮

山芋

黃耆

紫苑

地骨皮

黃芩

去黑心半兩

甘草

桂皮

半夏

湯洗七遍炒各參分

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎棗三枚擘
破同煎至八分去滓空心溫服日再

治傷寒後虛勞羸瘦乏力桂心湯方

桂皮

人參

黃耆

牛膝

酒浸切焙各一分

甘草

炙剉二分

白茯苓

去黑皮參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜三片棗二枚擘破同煎至六分
去滓空心溫服

治傷寒後氣血不復虛羸黃耆芍藥湯方

黃耆

剉

人參

各一兩

芍藥

桂

去麤皮

五味子

各一分

白朮

半兩

甘草

一分剉

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜三片棗三枚去核同煎至六分

去滓溫服空心食前

治傷寒後虛勞短氣小腸急痛羸劣黃耆甘草湯方

黃耆

二兩剉

甘草

炙

白茯苓

去黑皮

芍藥

白朮

各半兩

桑螵蛸

炙

桂

去麤皮各一分

右七味咬咀如麻豆每服四錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎棗三枚擘

破同煎至八分去滓空心溫服

治傷寒後五藏俱虛羸劣不足黃耆薤白湯方

黃耆

人參

各半兩

白茯苓

去黑皮

五味子

白朮

各一分

薤白

七莖

葱白

參莖

粳米

各半合

芍藥

生姜

各半分

羊腎

一脂膜

右一十一味細剉分作三服每服用水二盞煎至一盞去滓食前溫服一日

服盡

治傷寒後藏氣不足虛乏黃耆薑桂湯方

黃耆判一兩 桂皮去麤 乾薑炮 人參 芍藥各半兩

甘草判一分 半夏參分湯洗七編炒

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜三片棗三枚擘破同煎至六分去滓空心温服

治傷寒後血氣不足脚膝無力四肢羸劣乾地黄湯方

熟乾地黄焙 地骨皮 五味子各一兩 桂皮去麤皮 黃耆判一兩半

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半先將羊腎一隻去筋膜切煮至一盞次下藥更煎至七分去滓空心温服

治傷寒後胃氣虛乏不思飲食日漸羸瘦白朮黃耆湯方

白朮 黃耆判各一兩 山茱萸 五味子 人參 茯苓去木各參分

半夏湯洗七編炒 前胡去芦頭 山芋 桔梗炒各半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎同煎至八分

去滓空心温服

治傷寒後煩熱憎寒口苦不思飲食日漸羸瘦羚羊角湯方

羚羊角鑄 芩胡去苗 鼈甲去裙襴醋炙 人參各參分 知母 黃耆

淡竹筴 赤茯苓去黑皮

甘草炙各半兩

天門冬去心焙一兩

右一十味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日

二

傷寒後虛煩

論曰傷寒病後煩躁者有虛煩有穀煩陽氣偏多謂之虛煩病差後食穀太早新虛不勝穀氣胃內蒸熱謂之穀煩若陰陽和調則虛煩自己損其穀食則穀煩者差治虛煩狀似傷寒但身不疼痛不惡寒內外皆不可攻者宜竹葉湯方

竹葉半兩

石膏碎四兩

半夏湯洗去滑切焙參分

人參半兩

甘草炙半兩

麥門冬去心二兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入粳米百餘粒生姜半分拍

碎同煎取八分去滓溫服

治傷寒發汗後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊懣宜服梔子豉湯又傷寒發汗若下之煩熱胸中窒痛亦宜服梔子豉湯又傷寒下利後更煩按之心下濡者虛煩也亦宜服梔子豉湯方

梔子十四枚去皮

豉四合

右二味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎六分去滓溫服

治中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆五苓散方

散方

豬苓去黑皮

赤茯苓去黑皮

白朮各參分

桂去麤皮半兩

澤瀉一分

右五味搗羅為散每服二錢匕白湯調服

治少陰病下利六七日欬而渴嘔而煩不得眠豬苓湯方

豬苓去黑皮

赤茯苓去黑皮

阿膠炙燥

澤瀉

滑石各一兩

右五味剉碎如麻豆大每服三錢匕水一盞煎六分去滓溫服

治傷寒大病差後體虛煩滿烏梅湯方

烏梅取肉

山梔子人

甘草炙

葛根各半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞入豉二七粒同煎至半盞去滓早晚食後溫服

後溫服

治傷寒汗後虛煩心神不寧麥門冬飲方

麥門冬去心培

苈胡去苗

防風去義

半夏湯洗去滑姜汁製

赤茯苓去黑皮

犀角鑄各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜五片煎至八分去滓溫服

治傷寒後虛煩心胸滿悶腹脹微喘人參湯方

人參 白茯苓去黑皮 杏仁去皮去雙人細研各半兩

右三味除杏人外剉如麻豆每服三錢匕水一盞半入粳米百餘粒同煎米

熟去滓空心溫服

治傷寒後不解或寒或熱四肢瘦弱飲食不能胸中煩滿虛躁麥門冬湯方

麥門冬焙去心 赤茯苓去黑皮 人參 白朮各一兩 桂去麤皮半兩

陳橘皮去白炒一兩 甘草炙半兩 地骨皮洗焙 黃耆剉各一兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日再

治傷寒發汗後氣虛心煩腹滿痰逆不思飲食厚朴飲方

厚朴二兩去麤皮姜汁炙 甘草炙 半夏姜汁製 人參 陳橘皮去白焙各一兩

右五味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半生姜五片同煎至七分去滓空心

服

治傷寒汗後煩滿多睡小便赤澀意欲人湯方

薏苡人 酸棗人 防風去 人參 甘菊花

地骨皮剉 紫蘇子 甘草 白茯苓去黑皮 各一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入荊芥薄荷生姜各少許同煎至七分

去滓溫服睡多冷服不睡熱服

治傷寒汗後氣虛煩滿心神不寧人參飲方

人參 赤茯苓去黑皮 陳橘皮去白 白朮剉炒各一兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞生姜三片煎至七分去滓溫服日三

治傷寒後煩滿心神恍惚不得眠卧麥門冬茯苓飲方

麥門冬去心 焙 赤茯苓去黑皮 知母焙 芎藭 酸棗人微炒

陳橘皮去白 炒 檳榔剉 甘草炙各一兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜五片煎至一盞去滓溫服日

三

治傷寒後虛勞煩熱驚悸不得眠睡芩胡湯方

芩胡去苗 半兩 酸棗人微炒 二兩 遠志去心 一分 當歸焙切 防風去

甘草炙 剉 茯苓去木 豬苓去黑皮 桂去麤皮 黃耆剉

人參 生乾地黄 芎藭 麥門冬去心 焙 各半兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞生姜三片煎至七分去滓空心
温服日再

治傷寒後虛勞不得眠煩悶四肢乏力人參湯方

人參一兩 酸棗人參微炒 當歸切 芎藭剉 桂皮去麤 甘草炙

此胡苗去 白茯苓皮去黑 石膏碎各

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片煎至一盞去滓食前温服

治傷寒虛煩不安六神湯方

人參 白茯苓皮去黑 防風去 百合 黄耆剉 乾山芋各一

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服不拘時候

治傷寒後虛煩不得眠睡頭目昏眩酸棗人湯方

酸棗人炒 麥門冬去心焙 地骨皮剉一

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞生姜三片同煎至七分去滓温服不計

時候

治傷寒後虛煩心腹不快茯苓散方

茯苓去木 此胡苗去 陳橘皮去白 甘草炙各

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓溫服不拘時候
傷寒後盜汗

論曰汗者心之液傷寒差後眠寢有汗者由心氣偏虛榮衛不足腠疎表弱因
寢寐之間汗出故名盜汗久不已日漸羸瘦肢體痿弱也

治傷寒後體虛夜卧汗出不止頭旋惡心不思飲食人參湯方

人參 半夏湯洗去滑生薑汁製 黃耆剉 麻黃根各一兩 牡蠣燒二兩 防風去分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後虛汗不止麻黃根湯方

麻黃根剉 黃耆剉各一兩 五味子炒半兩 牡蠣燒二兩 甘草炙分

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後汗出不止漸覺虛劣茯苓湯方

白茯苓去皮黑皮剉 人參 白朮 麻黃根剉 肉蓯蓉切

五味子炒 甘草炙 牡蠣燒各一兩 芍藥參分

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後虛羸夜多盜汗杜仲湯方

杜仲去麤皮炙 牡蠣燒 麻黃根各一兩半 黃耆剉 白朮剉

肉苁蓉焙切 白茯苓去黑皮剉 芍藥各一兩 甘草炙剉 人參參

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後盜汗不止心多煩躁驚悸人參湯方

人參一兩 遠志去心一分 甘草炙 白茯苓去黑皮剉 麥門冬去心

竹茹 黃耆剉 芫胡去苗 桔梗剉 龍骨燒各半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片棗一枚擘破煎至八分

去滓不拘時溫服

治傷寒後羸劣虛汗不止牡蠣散方

牡蠣燒一兩 白茯苓去黑皮剉 人參 白朮 芍藥

龍骨燒 熟乾地黄燒各半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時服

治傷寒後虛劣不思飲食汗出不止黃耆散方

黃耆剉 白茯苓去黑皮 人參 白朮各一兩 牡蠣燒一兩半

麥門冬去心 陳橘皮去白切炒

右七味搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時服

治傷寒後虛汗不止黃耆散方

黃耆剉 麻黃根剉各一兩半 牡蠣燒二兩 知母焙半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕濃煎小麥湯調下不計時候

治傷寒後體虛盜汗不止黃連散方

黃連去須一兩 牡蠣燒二兩 白茯苓去黑皮參分 甘草炙半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎竹葉熟水調下不拘時候

治盜汗腠理開疎粉汗方

牡蠣半斤燒研如粉 麻黃根一兩搗羅為末

右二味同拌勻寢寐中有汗處使人傅之

治傷寒後盜汗不止方

白朮二兩

右一味搗羅為細散每服二錢匕不計時候菖蒲湯調下

傷寒後驚悸

論曰傷寒病後心氣不足風邪乘之則令精神不寧恍惚驚悸此由憂愁思慮致心氣虛邪氣內乘故神氣不得泰定而生驚悸也

治傷寒病後壅熱心忪驚悸人參湯方

人參分參 犀角屑 甘草炙 黃芩心去黑 玄參堅者

秦艽去苗土 地骨皮各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓下竹瀝一合攪勻食後

溫服

治傷寒後心熱煩悶睡多驚悸茯神湯方

茯神去木分 犀角屑 龍齒兩 升麻半兩 麥門冬去心焙

玄參堅者半兩 竹筴一兩 芍藥分 馬牙消一兩半

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓下地黃汁一合攪勻食

後溫服

治傷寒後心忪驚悸煩熱口乾麥門冬飲方

麥門冬去心焙 龍齒分 山梔子人 玄參堅者各半兩 芍藥分

木通剉一兩 人參 茅根各分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓
下生藕生地黄汁各一合攪勻食後分溫二服

治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡犀角湯方

犀角屑兩半 茵陳蒿分參 茯神去木 芍藥一兩 山梔子人兩半

麥門冬去心焙 生乾地黄焙二

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎竹葉三七片同煎
至七分去滓食後溫服

治傷寒後驚悸不定前胡湯方

前胡去頭 茯神去木 人參各一兩 遠志去心一兩半 甘草炙一分

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞同煎至七分去滓溫服不計時候

治傷寒後心虛忡悸麥門冬湯方

麥門冬焙 茯神去木 菊花 人參各一兩 甘草炙半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓溫服

治傷寒後心虛驚悸恍惚不寗人參茯神湯方

人參 茯神去木各一兩 陳橘皮湯浸去白 杏人湯浸去皮六

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜半分拍碎同煎至半盞去滓温服

治傷寒後驚悸煩悶虛羸少力紫石英湯方

紫石英

研 桂皮去麤

紫苑

去苗 白茯苓皮去黑

麥門冬

人參

黃耆

剉各一兩 甘草兩炙半

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至七分去滓温服不計時候

治傷寒後心氣虛悸恍惚多忘或夢寐驚魘龍骨湯方

龍骨

研 人參

茯神

紫石英

赤石脂

當歸

切 乾姜地

桂

甘草

白朮

芍藥

紫苑

防風

遠志

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至七分去

滓食前温服

治傷寒後或用心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸短氣補虛茯神丸方

茯神

去木 麥門冬

焙去心

熟乾地黄

焙各一兩

牡丹皮

人參

黃耆劉各參分

桂去皮

甘草炙

牛膝去苗

澤瀉各半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大食前温酒下二十丸

大德重校聖濟總錄卷第三十一

大德重校聖濟總錄卷第三十二

傷寒門

傷寒後身體虛腫

論曰血氣滋榮外濡於腠理則形體充實傷寒汗下之後血氣不足府藏虛寒榮衛滯津液不通肌肉無以充榮故令身體虛腫若脾與腎藏俱虛不能約制於水水氣流溢於皮膚則變水氣腫滿

治傷寒後身體腫滿心胸壅悶喘促氣滿黃耆湯方

黃耆兩一

枳殼去瓢麩炒

防己兩半

桂去麤皮

細辛去苗葉

白朮兩分

赤茯苓去黑皮

赤芍藥兩分

當歸半兩

當歸半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜半分切煎至六分去滓不計時

候溫服

治傷寒後身體浮腫喘息促小便利坐卧不安防己湯方

防己兩分

豬苓去黑皮

海蛤兩一

陳橘皮湯浸去白

木香兩半

白朮兩半

桑根白皮剉參

赤茯苓去黑皮

檳榔剉一

木香兩半

紫蘇莖葉兩一

木通剉半

右一十一味麤搗篩每服三錢七水一盞入生姜半分切煎至六分去滓不計時候温服

治病後脾腎不足水道不利腰脚浮腫木通湯方

木通剉一兩 桑根白皮炙黃 澤瀉 防己 赤茯苓去黑皮

石韋去毛各參分 大腹微煨剉四枚

右七味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食前温服日二

治病後氣虚津液不通皮膚虚滿防己湯方

防己 黃耆剉 桂去麤皮各一兩半 赤茯苓去黑皮參兩 甘草炙令赤剉一兩

右五味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎取七分去滓温服日再服

治傷寒病後脾腎氣虚欲成水病四肢面目浮腫小便澀喘急檳榔湯方

檳榔并皮剉五枚 桑根白皮炙令黃色剉一兩 陳橘皮湯浸去白焙乾參分 防己一兩

吳茱萸水浸一宿炒乾一分 木通剉碎一兩 郁李人湯浸去皮微炒一兩

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞半煎取七分去滓温服日二

治傷寒後身體浮腫心胸滿悶不欲飲食前胡丸方

前胡去芦頭一兩 人參參分 檳榔剉一兩 旋復花半兩 木香半兩

陳橘皮湯浸去白 訶梨勒皮一兩 赤茯苓去黑皮 桂去麤皮

桑根白皮到參 郁李人湯浸去皮 微炒一兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服煎生薑棗湯下三十九日三服

治傷寒後通體洪滿腹堅脹喘急不能飲食郁李人湯方

郁李人湯浸去皮 大黃到碎 微炒 苈胡去苗 桑根白皮到

澤瀉 赤芍藥 豬苓去黑皮 桔梗炒 麻黃去根節

杏人湯浸去皮 雙雙 鼈甲去裙襴 赤茯苓去黑皮

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒病後徧身洪腫木香丸方

木香 肉豆蔻去殼 青橘皮湯浸去白 檳榔微炒

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服空心溫酒下二十九丸漸加至三

十九丸

傷寒後不思食

論曰傷寒後不思食者脾胃虛弱故也由汗下之後邪氣已除穀氣未復脾胃虛弱故不思飲食

治傷寒後脾胃虛弱不思飲食人參丸方

人參

白朮

厚朴去麤皮薑汁炙各半兩

五味子

細辛去苗葉各一分

陳橘皮湯浸去白焙一兩

右六味搗羅為末煮棗肉和丸梧桐子大每服生姜湯下十五丸食前服

治傷寒後脾胃氣虛不嗜食及新虛不勝穀氣消食丸方

小麥蘗

麴各一升

乾姜炮

烏梅肉各四兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸溫湯下日再稍加至四

十九

治傷寒後脾胃氣虛四肢乏力骨節煩疼口苦舌乾不思飲食茯苓煮散方

茯苓去黑皮

苈胡去苗

陳橘皮湯浸去白焙

訶梨勒去核炮

桔梗炒

人參各一兩

甘草炙

半夏湯洗去滑七編焙各半兩

枳葉去毛薑汁炙二兩

枳殼去麤殼炒參分

右一十味搗羅為散每服五錢匕水一盞半入生姜一分拍碎同煎至七分

去滓食前溫服

治傷寒後脾胃虛冷不入飲食理中丸方

人參 白朮 乾姜炮 甘草炙

右四味等分搗羅為末鍊蜜丸如彈丸大每服一丸沸湯化破食前服

治傷寒後胃氣冷不思飲食人參煮散方

人參 厚朴去麤皮 白茯苓去黑皮 芫胡去苗 半夏湯浸去滑

枇杷葉薑汁炙 草豆蔻去皮各

右七味搗羅為散每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至七分去

滓食前溫服

治傷寒差後胃虛不入食白朮湯方

白朮 陳橘皮湯浸去白 甘草炙一分 白豆蔻去皮 高良薑各半

茯神去木

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎

至七分去滓食前溫服

治傷寒後胃氣未和嘔吐不下食藿香湯方

藿香 竹茹 陳橘皮湯浸去 麥門冬焙去心 枇杷葉去毛 人參參

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎同煎至七分去滓
溫服

治傷寒後脾胃氣虛全不思食腹藏不調參朴湯方

人參 厚朴去麤皮姜汁炙各一兩 陳橘皮湯浸去白焙 訶梨勒炮去核

桂去麤皮 木香 枳殼去麤皮炒 黃耆剉各半兩 甘草炙一分 白朮參分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍破棗二枚擘破同煎
至半盞去滓食前溫服日再

治傷寒後虛羸不思飲食六神湯方

人參 白朮 黃耆剉各一兩 枳實去麤皮炒 白茯苓去黑皮各半兩 甘草炙一分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎棗三枚擘破粳米
少許同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脾肺未和痰壅欲吐不思飲食參橘湯方

人參 陳橘皮湯浸去白焙各一兩 前胡去頭 白朮 杏仁湯浸去皮

枇杷葉去毛薑汁炙各半兩 甘草炙一分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後胃虛不思飲食白朮飲方

白朮 人參 生姜切各半兩 甘草炙一分

右四味挫如麻豆以水三盞煎至一盞半去滓食前分温二服

治傷寒後脾胃有餘熱氣滿不能食百合飲方

百合一分 人參一分 豉熬 粳米淘各半合 陳橘皮湯浸去白焙半兩

薤白切五兩 生姜切半兩

右七味判如麻豆以水五盞煎至二盞半去滓食後分温三服

治傷寒後脾胃虛冷嘔逆不下食薤白飲方

薤白切五兩 生姜切一分 附子炮裂去臍皮剉一分

右三味以水一盞半煎至七分去滓再煎沸入雞子白一枚攪勻空心温服

傷寒後宿食不消

論曰胃受穀脾播而消之傷寒發汗吐下之後府藏俱虛氣血未復脾胃弱不能化飲食故令宿食不消也其狀煩熱如瘧心胸滿脹噫氣酸臭者是也
治傷寒後胃氣虛冷宿食不消參藥人參丸方

大麥蘖炒黃 人參 枳殼去麩炒 白朮各一分 甘草炙半兩 木香 乾姜炮裂各分

右七味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前温酒下十五丸加至二十九日再

治傷寒後飲食不消腹脇虛滿堅筋倍力大麥蘖丸方

大麥蘖炒黃一兩

白朮

人參各一兩半

枳殼去麩炒

檳榔剉

半夏湯洗七遍焙

陳橘皮湯浸去白焙

薏苡人炒

乾姜炮

大黃細剉醋炒

厚朴去麩皮生薑炙各一兩

甘草炙參分

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心米飲下十五丸加至二十九日再

治傷寒後腸胃虛冷食不能化陳麴丸方

陳麴搗炒黃一兩

乾姜炮

白朮

人參各一兩半

甘草炙

枳殼去麩炒

大麥蘖炒黃

厚朴去麩皮生薑汁炙

杏仁湯浸去皮尖各一兩

桂去麩皮參分

右一十味除杏人外搗羅為末入杏人同研勻鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心温酒下二十九日再

治傷寒後新虛穀食不化消食丸方

小麥蘖炒

陳麴各一

乾姜炮

烏梅肉各四兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸溫水下日再稍加至四十九

治傷寒後胃氣不和不能食縱食不消平胃丸方

白豆蔻皮去 枳殼去麤 白朮 人參 大麥蘖炒黃各

乾姜炮參 甘草炙半

右七味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心煎生姜棗湯下二十九日再

治傷寒後宿食不消心腹氣脹參朮丸方

人參 白朮各一兩半 木香 陳橘皮湯浸去 乾姜炮

桂皮去麤 赤茯苓去黑皮 檳榔剉半 枳殼去麤

右九味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心溫酒下五丸日再

治傷寒後脾胃虛冷胸膈氣滯和五藏消宿食木香丸方

木香 人參 白茯苓去黑皮 檳榔剉 白朮

乾姜炮 陳橘皮湯浸去 訶梨勒炮去核 桂皮去麤

郁李人微炒去皮

甘草炙參

吳茱萸湯洗參編炒乾半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心米飲

下二十九

治傷寒後宿食不消調中丸方

白朮

高良姜各一兩半

桂皮去麤

甘草炙

人參

京三稜炮各一兩

紅豆蔻

乾姜炮各半兩

枳殼去麤參分炒

右九味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心温酒下二

十九加至三十九日再

治傷寒後宿食不化助胃丸方

縮沙人

白朮

茯苓去黑皮各一兩

紅豆蔻

甘草炙

人參

枳殼去瓢麤炒各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心米飲下五

丸日再

治傷寒後宿食不消心腹妨悶大腸不利疎氣丸方

京三稜炮剉二兩

牽牛子微炒四兩

乾姜炮半兩

陳橘皮湯浸去白焙一兩

右四味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心生姜湯下
二十九丸微利為度未利稍加至三十九丸

治傷寒後宿食不消大腸氣滯大黃丸方

大黃二兩細切

葶藶微炒

杏仁湯浸去皮

朴消各一兩

右四味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前米飲下十丸以利為度

傷寒後不得眠

論曰榮衛之氣晝行於陽則寤夜行於陰則寐傷寒差後藏府皆虛榮衛出入不能循常緣熱邪未散與陽氣并衛氣獨行於陽不得入於陰則陽實陰虛故不得眠
治傷寒發汗後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯方

梔子十四枚

香豉四合

右二味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服一二服得吐止後服

治傷寒後虛煩不得眠心中懊懣梔子烏梅湯方

梔子人

甘草炙

黃芩去黑心

烏梅去核炒

芫胡去苗

右五味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半生姜三片豉五十粒竹葉二
七片同煎至七分去滓溫服

治傷寒吐下後心煩氣乏晝夜不得眠酸棗人湯方

酸棗人炒一兩 麥門冬去心焙二合 甘草炙一兩 知母切焙半兩 芎藭

白茯苓去黑皮 乾姜炮各三分

右七味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

治傷寒後勞損煩躁不得眠酸棗人甘草湯方

酸棗人微炒四兩 甘草炙剉 當歸焙切 桂去麤皮 人參

白茯苓去黑皮 石膏碎 芎藭各半兩 遠志去心一分

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治傷寒汗後虛煩不得眠睡酸棗人湯方

酸棗人微炒二兩 人參一兩 石膏碎半兩 赤茯苓去黑皮參分

桂去麤皮半兩 知母焙切 甘草炙各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

治傷寒後餘熱未散不得眠睡酸棗人黃苓湯方

酸棗人二微炒

黃芩去黑

麥門冬去心焙

遠志去心

人參切一

桂去麤皮

茯神去木

甘草炙半

草薢分

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜五片煎至一盞去滓食前溫服

日再

治傷寒後虛煩不得眠睡嘔逆梔子人湯方

梔子人一分 芎藭半兩

酸棗人炒一兩

陳橘皮去白

人參

白茯苓去黑皮

豉炒一分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一大盞生姜三片煎至七分去滓食前溫服

日再

治傷寒後虛勞不得眠煩悶四肢乏力人參湯方

人參一兩 酸棗人微炒

當歸焙切 芎藭剉

桂去麤皮

甘草炙 此胡去苗

赤茯苓去黑皮

石膏碎各一兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片煎至一盞去滓食前溫服

治傷寒後虛勞煩熱驚悸不得眠睡此胡湯方

此胡去苗

酸棗人微炒

遠志去心

當歸焙切

防風去

甘草炙

茯神去木

豬苓去黑皮

桂去麋皮

黃耆剉

人參

生乾地黄

芎藭

麥門冬去心焙各半兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞生姜三片煎至七分去滓空心温服日再

治傷寒後煩滿心神恍惚不得眠卧麥門冬茯苓飲方

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮

知母焙

芎藭

酸棗人微炒

陳橘皮去白炒

檳榔剉

甘草炙各一兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜五片煎至一盞去滓温服日

三

治傷寒後虛煩客熱累夜不得眠睡頭痛眼疼迷悶地骨皮飲方

地骨皮洗

麥門冬去心各二兩

酸棗人炒參兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜五片煎至七分去滓温服食

後服

治傷寒後膽冷不得睡梅實丸方

梅實肉

大棗肉

酸棗人炒等分

右三味同搗成膏丸如彈丸大每服一丸臨卧含化服

治大病後及虛勞不得眠酸棗人湯方

酸棗人炒

榆皮切各參兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服

傷寒後失音不語

論曰傷寒後失音不語者由風寒客於會厭會厭為音聲之戶邪氣傷之故卒然無音又肺主聲而通於氣人之五藏有五聲皆稟氣而通之若邪客於肺則氣道不調亦令人語無音聲治法當隨其輕重以方制之

治傷寒後外邪客於肺卒失音五味子湯方

五味子

桂去麤皮各一兩半

杏人湯浸去皮六雙人炒一兩

甘草炙剉半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片煎至一盞去滓不計時候

温服

治傷寒後忽暴嗽失音語不出杏人煎方

杏人湯浸去六皮雙人研二兩

木通剉

貝母去心

紫苑去苗土

五味子

桑根白皮切

百合各一兩

生姜汁半兩

沙糖四兩

蜜四兩

右一十味除杏人姜汁糖蜜外細剉用水五盞煎至三盞去滓下杏人膏姜汁糖蜜等相和微火再煎如稀餈以淨器盛每服半匙水一盞煎開溫服不計時侯

治傷寒失音不語豆竹湯方

黑豆淘洗半升

青竹如算子四十九莖各長四寸

右二味用水五大盞同煮以豆熟為度去滓分溫三服

治傷寒卒失音牙關緊急麻人飲方

大麻人半升

羚羊角屑二兩

右二味麤搗篩每服五錢匕酒水各一盞共煎至一盞去滓溫服日再服

治傷寒失音不知人口眼不正舌強羚羊角散方

羚羊角屑一兩

麻黃去根節

石膏各半兩

防風去叉

麥門冬去心焙

黃芩去黑心

乾葛剉

升麻各參分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服日三

治傷寒失音不能語口噤防已湯方

防已剉

桂皮去麤皮

麻黃去根節

葛根剉各一兩

甘草炙

防風去

芍藥各半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片同煎至一盞去滓空心温

服日再服

治傷寒失音不語神志昏冒升麻飲方

升麻一兩

桂去麤皮

木通劉二

防風去

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下竹瀝半合攪令勻

空心温服

治傷寒失音不語二瀝湯方

竹瀝

梨汁

荆瀝各二

陳醬汁半

右四味攪令勻以綿濾過分温四服空心日晚各一服

治傷寒邪氣傷肺失音不語桂心湯方

桂去麤皮

菖蒲一兩

右二味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓不計時候温服夜覆

取汗未退再服

治傷寒後肺中風冷失音不語芥子酒熨方

白芥子

五合研碎

右一味用酒煮令半熟帶熱包裹熨項頸周遭冷則易之

傷寒後餘毒攻眼

論曰五藏六府精氣皆上注於目諸脉之所屬也傷寒差後餘毒未盡內乘於肝邪熱上衝血脉壅滯故令眼目赤痛甚者成瘡或生腎膜遮障瞳人治宜涼肝經以消熱毒

治傷寒後熱毒風壅攻衝眼目昏暗疼痛羚羊角湯方

羚羊角

屑

決明子

芎藭

羌活

去芦頭

石膏

碎各兩

芫胡

去苗

黃芩

去心黑

人參

各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞竹葉三七片煎至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒後毒氣上攻眼生浮翳赤痛黃連湯方

黃連

去須

黃芩

去心黑

升麻

各一兩

甘草

炙三分

朴消

研半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉三七片煎至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒後毒氣攻眼目赤痛及生障翳連翹湯方

連翹 漏蘆去芦頭 黃連去須 升麻 麻黃去節根

白斂 大黃炒 甘草炙 朴消研各一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉三七片煎至六分去滓溫服早

晚食後各一

治傷寒熱病後眼目諸疾地膚子丸方

地膚子 決明子 沙參 羚羊角屑各一兩 秦皮

菊花 枳殼去瓢炒 大黃剉炒各一兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後溫水下二十丸

治傷寒後眼目昏暗赤痛生瘡決明丸方

石決明 黃連去須 車前子 細辛去苗葉 枳殼去瓢炒

梔子人 大黃炒 黃芩去黑心 羚羊角屑各半兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後煎竹葉湯下二十丸

治傷寒熱病後眼暗有翳及赤澀疼痛麥門冬丸方

麥門冬焙 澤瀉 芫蔚子 枸杞子各一兩 細辛去苗葉

生乾地黄

焙

枳殼

去蘇炒

石決明

刮淨

黃連

去須各兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後米飲下二十九

治傷寒後肝氣實熱目中疼痛或生翳暈犀角湯方

犀角

屑參分

瞿麥穗

黃芩

去黑心

黃連

去須

木通

剉

梔子人

大黃

剉炒

車前子

各半兩

人參

一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉三七片煎至六分去滓溫服早晚食後各一

晚食後各一

治傷寒後熱氣上衝目生瘡醫洗眼秦皮湯方

秦皮

分

竹葉

一握

防風

去叉

菊花

姜蕤

各半兩

蕤人

去殼研一分

甘草

生用參分

右七味麤搗篩都用水二升煎取一升綿濾去滓放溫洗眼不拘時

治傷寒後肝虛目暗視物不明或見黑花防風湯方

防風

去叉

芎藭

甘草

剉炙

人參

茯神

去木

獨活

去頭

前胡

去頭各一兩

細辛

去苗葉

菊花

各半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服早晚食後各一

傷寒後咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏經絡上攻咽喉也足太陰之脉上膈俠咽而喉則肺氣之所通故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後餘毒未盡上攻咽喉故亦令閉塞不通也

治傷寒後咽喉閉塞疼痛六七日其人下後脉沉遲手足厥逆下部脉不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止當歸湯方

當歸焙切

升麻

知母

姜蕤

黃芩去黑心

麥門冬去心焙各半兩

桂皮去麤皮

芍藥

乾姜炮

石膏

白茯苓去黑皮

甘草剉

白朮各一分

麻黃去根節一兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後温服日三治熱病喉中閉塞疼痛木通湯方

木通剉

羚羊角銹

芍藥

絡石各一兩

升麻二兩

射干一兩半

杏人湯浸去皮尖

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至六分去滓食後温服

日三

治傷寒後咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上攻黃芩湯方

黃芩去黑心

大青

山梔子人

甘草炙剉各半兩

升麻

麥門冬去心焙參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至六分去滓食後溫服日三五服

治傷寒後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上攻升麻湯方

升麻

木通剉各一兩

射干

羚羊角銹

芍藥各半兩

蘆根捶

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服日三

治傷寒後舌根腫塞喉痺此為脾虛心熱先鍼舌下兩邊出血次服地黃湯方

生地黄切二兩

甘草剉

大黃各半兩

升麻參分

車前子一兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓下朴消末一錢匕攪

勻食後溫服日三

治傷寒後咽喉疼痛葛根湯方

葛根剉

青竹茹各一兩

倉粳米合一

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜一棗大拍碎煎至六分去滓食

後溫服日三

治傷寒後喉內生瘡及喉腫塞毒熱上衝升麻丸方

升麻

苦藥子

鉛丹

炒

大黃

生用各半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹嚙津化盡再服之

治傷寒時行咽喉閉塞及賊風毒氣上攻丹參煎方

丹參

二兩

蒴藿根

剉

羊躑躅

炒

甘菊花

莽草

各半兩

秦艸

去苗土一兩半

牛膝

去苗酒浸

羌活

去芦頭

烏頭

鹽炒去皮臍

蜀椒

去目并合口炒出汗

右一十二味哎咀如麻豆大以苦酒半升拌勻漬半日先取油二斤鍊香熟

旋旋下藥煎候白朮赤色即下鍊了豬脂一斤更煎藥赤黑色停溫綿瀘過

瓷合盛每服取如半棗大含化稍嚙之熱毒單服齒痛綿裏嚼之嚙汁

治傷寒後咽喉不能嚙食口中生瘡積熱上攻涎出不止地黃煎方

生地黃汁

二合

鉛丹

炒一兩

豬牙皂莢

一挺去皮

白蜜

二兩

右四味和勻以瓶子盛密封頭飯上蒸一時久去滓收之每取一匙頭含化

嚙津

治傷寒後咽喉痛舌強餘熱上攻貼喉膏方

蜜

斤半

甘草

剉二兩

豬脂

四兩

右三味先以豬脂與蜜鍊消後入甘草煎候甘草赤黑色以綿濾過瓷合收
盛每取如半棗大含化嚙津

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒熱上攻射干煎方

射干

半斤為末

豬脂

一斤

右二味先煎豬脂沸次下射干候射干黑色以綿濾過瓷合盛綿裹如彈子

大含化嚙津

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上衝方

蘭茹

右取少許如瓜甲共內口中微嚼嚙汁

治傷寒熱病後咽喉腫痛閉塞不通毒氣上衝方

商陸根

切

右炒令熱以布裹熨腫上冷復易之

治傷寒熱病後咽喉痛閉塞不通毒氣上衝方

黃明膠

右取手掌大一片以水煮軟貼頸外差

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上衝方

白礬

如杏
人大

右以綿裹含之細細嚥汁以通為度

大德重校聖濟總錄卷第三十二

聖濟總錄

卷第三十二

傷寒門

十三

大德重校聖濟總錄卷第三十三

傷寒門

傷寒後變成瘧

論曰傷寒變成瘧者因病差後外邪未散真藏尚虛因為勞事致二氣交爭陰勝則振寒陽勝則發熱陰陽更勝即往來寒熱休作有時也一日再發者得汗必解若傷寒八九日得之熱多寒少其人不嘔清便自調者欲自愈也或陽明證煩熱汗出日晡所發熱者脉浮宜解表脉實宜攻裏又有婦人熱入血室發熱而更作寒者當詳辨之

治傷寒後變成瘧病寒熱躁渴知母升麻湯方

知母

石膏

升麻

各一兩

蜀漆

常山

甘草

各一分

烏梅

去核半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後變成瘧口乾煩渴二黃湯方

麻黃

去根節

大黃

剉炒

枯薑根

各一兩

甘草

炙剉半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後變成瘧寒熱躁渴升麻前胡湯方

升麻

前胡

去芦頭各一兩半

知母

焙

芍藥

各參分

朴消

山梔子人

木通

剉

烏梅

去核各半兩

甘草

炙剉一分

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎同煎至七分去滓入生地黄汁二合更煎一沸食後溫服

治傷寒後變成瘡痲毒壅脾面色萎黃寒熱時作人參常山湯方

人參

常山

各半兩

甘草

生

陳橘皮

湯浸去白焙各一分

燈心

一拾莖

右五味細剉拌勻用水二盞酒一盞同煎至兩盞去滓入好茶末二錢七分

作兩服溫服取吐即差

治傷寒後變成勞瘡久不差黃芩鼈甲湯方

黃芩

去黑心

芫胡

去苗

山梔子人

烏梅

去核各半兩

鼈甲

去裙襴醋炙一兩

甘草

炙一分

右六味麤搗篩每服五錢匕用童子小便一盞半入桃柳共各七箇生姜一棗大拍碎豉半合同浸一宿平旦煎至七分去滓入生地黄汁一合攪勻更

煎一沸溫服不拘時

治傷寒後肝瘡由邪熱客於足厥陰經所成顏色蒼蒼戰掉或似熱勞蜀漆鼈

甲丸方

鼈甲去裙襖 炙

蜀漆

知母焙

烏梅核去

苦參

常山姜蕤各一兩

豉一合 熬

石膏二兩

細辛去苗 葉

甘草炙 各分

右一十一味搗羅為末鍊蜜和搗數百下丸如梧桐子大每服十五丸空心

溫酒下晚再服

治傷寒後心瘧令人煩熱不止飲水多常渴常山石膏湯方

常山

鼈甲去裙襖 炙

犀角屑

蜀漆各一兩

甘草炙

烏梅去核 各一分

山梔子人兩

石膏一兩 半

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉三七粒淡竹葉二七片生姜一

棗大拍碎同煎至八分去滓食後溫服日二

治傷寒後脾瘧脾藏受熱或渴或不渴熱氣內傷不得大便腹中熱痛身寒汗

出常山丸方

常山二兩

知母焙

鼈甲去裙襖 炙 各一兩 醋

甘草炙 半

右四味搗羅為末鍊蜜和搗數百下丸如梧桐子大每服十五丸未發前溫

酒下發時再服

治傷寒後肺瘧痰熱聚於胸膈令人心寒甚則發熱熱則驚如有所見者三味湯方

常山一兩 秫米半匙 甘草一分

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎同煎至八分去

滓臨發時溫服

治傷寒後腎瘥令人悽悽腰脊痛而宛轉大便難手足寒常山 芫胡湯方

常山 芫胡去苗 麥門冬去心焙 烏梅去核 半夏湯洗七

檳榔剉 枳殼去瓤麩炒

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜一棗大拍碎淡竹葉二七片豉

二七粒同煎至七分去滓臨發時溫服

治傷寒後變成瘧疾或取轉早陰氣結伏心下成塊或膨滿嘔逆喘促面黑唇

青四肢逆冷飲食不下并氣結食毒並宜服此太一護命丸方

陽起石 硫黃 附子炮裂去皮 金星石 銀星石

白石英 紫石英 礞石 滑石 消石

凝水石燒赤 磁石煨 太陰玄精石 甘錫子累經銷

不灰木各半 丹砂分 巴豆四十九粒去 杏仁四十九粒湯

右一十八味搗研為末再同研極細用阿魏一分與糯米粥同納勺丸如櫻

桃大每服一丸麩炭火內燒赤取出用兩隻蓋子合在內候冷細研以生姜米飲下未知再服

治傷寒後寒熱不退成瘡時作茯苓飲方

赤茯苓去黑皮

鼈甲去裙襴醋炙

地骨皮各二兩

芫胡去苗

知母焙各一兩半

枳殼去瓢炒一兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎取七分去滓入生地黄汁一合食後良久溫服如人行五六里再服

傷寒後腳氣

論曰傷寒後腳氣者緣其人腎經本虛風濕毒氣乘虛客搏腎主腰腳故邪氣沉滯則腳弱而滿雖傷寒已差邪熱未盡風濕毒氣與熱相搏上衝於心肺其狀令人心胸煩滿上氣息急甚者致死診其脉左手尺脉洪而數者脚氣也服藥後脉沉而緩者愈

治傷寒後脚氣上衝心膈煩悶羚羊角湯方

羚羊角鎊一兩

旋復花參分

茯苓去黑皮一兩

黃芩去心

半夏湯洗七遍焙各參分

檳榔剉半兩

陳橘皮湯浸去白焙參分

吳茱萸半兩湯洗參兩焙乾炒

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一分拍碎同煎至七分去滓
食前溫服

治傷寒後脚氣衝心心神煩亂嘔逆減食脚膝痠疼紫蘇木香湯方

紫蘇莖葉

一兩

木香

赤茯苓 去黑皮 各半兩

沉香

芍藥

木通

剉各一兩

吳茱萸

湯洗參編 焙乾炒

檳榔

剉

陳橘皮

湯浸去白 焙各一分

右九味麤搗篩每服三錢匕用水一盞入生姜半分拍碎同煎至七分去滓

食前溫服

治傷寒後脚氣攻心悶絕檳榔散方

檳榔

剉

木香

各一兩

郁李人

微炒 去皮

桂

去麤皮 各參分

吳茱萸

湯洗參編 乾炒半兩 焙

牛漆

去苗酒浸 焙各參分

赤茯苓

去黑皮

右七味搗羅為細散每服一錢半匕食前煎桑根白皮木通湯調下日二

治傷寒後脚氣胸中滿悶喘息促急陳橘皮散方

陳橘皮

湯浸去白 焙參分

檳榔

剉一兩

桂

去麤皮 參分

牽牛子

微炒 一兩

右四味搗羅為細散每服一錢半匕食前溫酒調下日二

治傷寒後脚氣攻心悶亂腹滿如石小便赤澀茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

鼈甲醋炙去

木通剉

郁李人微炒去皮

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脚氣心煩滿悶不下飲食嘔逆多痰半夏湯方

半夏湯洗七

枳殼去麩炒

茯苓去黑

前胡去芦

木通剉各

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生姜一分拍碎同煎至半盞去滓食

前溫服

治傷寒後脚膝腫滿氣急大便秘澀赤小豆湯方

赤小豆合半

桑根白皮兩半

紫蘇莖葉兩

檳榔兩半

右四味剉三味如麻豆大同小豆用水五盞入生姜一分拍碎煎至二盞半

去滓分兩服食前溫服

治傷寒後脚氣兩脛腫滿心中煩悶犀角散方

犀角鎔一

檳榔剉半

陳橘皮湯浸去白

吳茱萸湯洗參編焙

細辛去苗葉

右五味搗羅為細散每服一錢半匕食前生姜熟酒調下日二

治傷寒後脚氣心腹妨悶脹痛坐卧不安吳茱萸散方

吳茱萸湯洗參編焙 檳榔剉 當歸切 木香 郁李人微炒去皮

右五味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓食前温服

治傷寒後脚氣攻心腹脹鞭小便赤澀大戟丸方

大戟炒 芫花醋炒 苦苧蘆炒各半兩 續隨子炒去皮

巴豆去皮心壓去油

右五味搗羅四味為細末入巴豆和研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三丸

至五丸温米飲下不計時候

傷寒後腰脚疼痛

論曰腰者腎之府腎者主水受五藏六府之精而藏之傷寒病後精血不足腎氣既弱風邪襲虛客搏於足少陰之經留注腰脚凝滯不散故機關不利為腰脚疼痛亦有宿患腎經風濕腰痛因病後下經氣虛而發者各從其證以方治之

治傷寒後風虛邪氣流注腰膝冷疼腰膝無力獨活湯方

獨活去芦頭 牛膝去苗酒浸 防風去叉 芍藥一兩 乾姜炮裂

五味子炒參 杜仲去麤皮炙 五茄皮二分 桂去麤皮 附子炮裂去皮

右一十味剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至七分去滓食前温服

治傷寒後腰痛或皮肉痛痺腿膝疼痛行履艱難不可俛仰防風湯方

防風去一兩

麻黃去根節

牛膝去苗酒浸

細辛去苗葉

桂去麤皮

五茄皮半兩

杜仲剉去麤皮炙

羌活去芦頭

當歸切焙

芍藥一兩

附子炮裂去皮

續斷一兩

丹參半兩

芎藭分參

右一十四味剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半入生姜半分拍碎同煎至

七分去滓食前温服

治傷寒後腎藏氣虛腰疼乳香丸方

乳香半兩

地龍微炒

當歸切焙

桂去麤皮

乾蠍微炒去足半兩

烏頭去皮臍生

附子炮裂去皮

右七味搗羅為末用安息香一兩剉酒浸一宿細研淘濾去滓慢火煎成膏

同藥末研令勻鍊蜜和丸如棗豆大每服空心温酒下五丸至十丸

治傷寒後風傷腰膝冷疼兼補益元藏杜仲丸方

杜仲剉去麤皮炙

乾漆炒令烟出

牛膝去苗酒浸

五茄皮剉一兩

巴戟天去心一兩半

桂去麤皮一兩

狗脊去毛一兩

防風去叉半兩

山芋一兩

附子炮裂去皮臍一兩

山茱萸一兩

獨活去芦頭一兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心温酒下二十九

治傷寒後腰痛行履不得敗龜散方

敗龜醋浸炙

虎骨塗酥炙

補骨脂微炒

當歸切焙

芍藥各一兩

薰陸香

桂去麤皮

白芷各半兩

右八味搗羅為細散每服食前熱酒調下二錢匕日二服

治傷寒後腰痛或腰內有冷膿及膀胱氣痛檳榔散方

檳榔剉

陳橘皮湯去白炒乾

桂去麤皮

芍藥

附子炮裂去皮臍各半兩

乾姜炮裂一分

牽牛子五兩入糯米百粒同炒米色黃即住搗羅取末參兩其滓不用

右七味搗羅六味為散入牽牛子末和令勻每服空心温酒調下三錢匕服

藥了喫少姜粥投良久利下腰間積滯物如不利即加至四錢匕以利為度

治傷寒後腰間冷痛當歸散方

當歸切焙

桂去麤皮各一兩

牡丹皮

附子炮裂去皮臍各半兩

右四味搗羅為細散每服空心温酒調下二錢匕晚再服

治傷寒後腰痛不可忍沒葯散方

沒葯一兩

地龍微炒一兩

桂去麤皮半兩

右三味搗研為細散每服空心温酒調下二錢已

治傷寒後風虛氣滯攻腰膝疼痛坐卧艱難芫花散方

芫花二兩

吳茱萸半兩

芸薹子一兩

右三味搗羅為散每用散半匙以黃米糟一兩入酒煮如糊攤於蠟紙上貼

痛處

治傷寒後或中風濕毒氣流注腰脊日夜疼痛牛膝煎方

牛膝去苗

天麻

附子炮裂去皮臍生用

菎活去芦頭各二兩

當歸切焙一兩

右五味搗羅為末用黑豆二升桑枝三斤細剉生姜四兩切用水二斗煎至

二升半去滓入葯末煎成膏每服空心温酒調下半匙七日晚再服

治傷寒汗出不徹濕毒留客肢體攣急腰脚不得屈伸牛膝散方

牛膝

麻黃節去根

地龍

天南星各二兩

惡實根條

右五味先將惡實根去皮細剉并諸葯入在沙盆內細研後用法酒一升再

研勻爛用新布絞取汁後用炭半秤燒一地坑子令通赤後去火掃淨投葯

汁於坑子內再以火燒令黑色取出於乳鉢內研細每服半錢匕溫酒調下
日三服並無所忌

治傷寒發汗吐下後體虛元藏積冷氣刺腰痛轉動艱難方

原蠶沙

斤半

糯米

升半

右二味同炒令米色焦然後搗羅為末每用半兩以米醋調如稀糊入銚子
內煎攪令稠及熱攤於蠟紙上貼痛處以帛纏縛冷即易之

治傷寒後體虛元藏挾風冷腰膝疼痛行履不得杜仲酒方

杜仲

去麤皮炙
剉二兩

獨活

去芦頭
半兩

附子

炮裂去皮
臍一兩

仙靈皮

三牛膝
去苗一兩

右五味細剉用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七日後開每日取二三合
溫服日可三服未差再浸服

傷寒後下痢膿血

論曰傷寒後變成膿血痢者本病差之後熱未散乘虛客於腸胃與津液相
搏故下痢膿血毒氣甚則壯熱而腹痛濕毒加之則所下如魚腦或如爛肉又
傷寒未解少陰病下痢便膿血者亦濕熱相搏故也

治傷寒熱毒入胃下利膿血黃連阿膠湯方

黃連去須炒

梔子人兩半

阿膠炙令燥

黃蘗去蘂皮炙

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞煎七分去滓不拘時溫服

治傷寒毒熱不解日晚壯熱腹痛便利膿血地榆湯方

地榆剉

黃連去須炒

犀角鎊

茜根

黃芩去黑心

梔子人兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞薤白三寸同煎六分去滓不拘時溫服

治少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利膿血不止桃花湯方

赤石脂兩四

乾姜一分

粳米二合

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎米熟去滓溫服三服得愈勿服

治傷寒後下痢膿血疼痛香連散方

木香兩半

黃連去須炒

青橘皮去白焙

梔子人一分

右四味搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時

治傷寒後濕熱不除下痢膿血晝夜無度烏梅丸方

烏梅肉焙

黃連去須炒

當歸切

訶梨勒各去核

阿膠炙令燥

乾姜一分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十丸食前米飲下加至三十丸

治傷寒熱病差後下痢膿血不止黃連湯方

黃連去須炒

黃芩去黑心

梔子一分

阿膠炙令燥

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食前溫服

治傷寒後下痢赤多白少所往澀痛宜服黃耆湯方

黃耆一兩

枳殼去穢炒

大腹皮各半

甘草炙參

白茯苓去黑皮

芍藥各一兩

黃連去須參分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

治傷寒後下痢膿血方

龍骨二兩

黃連去須炒

右二味搗羅為散每服二錢匕食前米飲調下日三夜一

治傷寒後腹痛下痢膿血日夜三五十行赤石脂散方

赤石脂半兩

乾姜炮一分

厚朴去麤皮姜汁炙透

訶梨勒炮去核各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕食前米飲調下日三服

治傷寒熱病後熱毒下痢膿血黃連丸方

黃連

去須炒

烏梅肉

炒二兩

右二味搗羅為末鍊蜜入少蠟和搗五百杵丸如梧桐子大每服二十九空心米飲下加至三十丸

治傷寒下痢膿血腹痛不止赤石脂湯方

赤石脂兩一

乾姜炮

附子炮裂去皮臍

當歸切焙各半兩

芍藥兩一

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎一盞去滓食前溫服

治傷寒後下痢膿血時復憎寒木瓜湯方

乾木瓜焙

白朮

白芷各一兩

黃連去須二兩半

附子炮裂去皮臍

石膏研碎

赤石脂

桑根白皮各二兩

桂去麤皮

芎藭

當歸各一兩半

白豆蔻去皮一分

芍藥參分

黃芩去黑心半兩

龍骨參兩

右一十五味呔咀每服五錢匕以水一盞半入生姜一分拍碎同煎至八分

去滓溫服

治傷寒後下痢膿血食物不得氣脹腹滿白芷黃連湯方

白芷半一兩

黃連去須一兩

天雄炮裂去皮臍一兩半

桂去麤皮一兩

當歸剉焙一兩半

黃耆細剉一兩

白朮一兩

訶梨勒皮煨一兩半

赤石脂一兩

龍骨一兩

芎藭半一兩

乾姜炮半

吳茱萸洗焙炒半兩

黃芩去黑心半兩

地榆一兩

厚朴去麤皮生姜汁炙一兩半

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓空腹溫服日三

傷寒後蠱瘡

論曰傷寒後蠱瘡者因腹中有熱其人食少胃中空虛三蟲須食或食五藏或食下部隱僻有瘡故名蠱瘡其候齒無色舌上盡白四肢沉重忽忽喜眠甚則脣裡有瘡其瘡在上脣裡如米粟心內懊懣痛者此蟲食五藏之證也若下脣裡有瘡其人喜眠者此蟲食下部之證也若肛爛見五藏者死

治傷寒後蠱瘡桃人湯方

桃人湯浸去皮六雙人炒

槐子微炒

艾葉炒各一兩

大棗十五枚去核焙

右四味麤搗篩以水三盞煎至一盞半去滓分溫三服

治傷寒及諸病後瘡出下部黃連犀角湯方

黃連去須微炒半兩

犀角鎊一兩

木香錢一

烏梅七枚去核焙

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

治傷寒後濕蠱蟲食下部心中煩懊槐子丸方

槐子微炒

苦參各一兩

熊膽研半兩

木香

檳榔一兩

乾漆參分炒
令煙盡

桃人湯去皮共雙
人炒研二兩

右七味搗羅為末鍊蜜和搗數百下丸如梧桐子大每服二十九丸空心荆芥湯下加至三十九丸

治傷寒後心中煩躁唇口生瘡蟲食下部羚羊角散方

羚羊角鎊參分

龍膽兩半

黃耆剉分

升麻兩半

玄參

此胡去苗各分

右六味搗羅為散每服二錢匕煎槐子湯調下空心食前日三服

治傷寒後蠱瘡麝香散方

麝香研

雄黃研醋煮

丹砂研一分

青箱子

升麻

犀角鎊

羚羊角鎊

黃連去須微炒

貝齒煨研各半兩

桃人湯浸去皮共雙人炒研參分

右一十味搗研為散再同研勻每服二錢匕食後煎麥人粥飲調服又以綿

裹藥半棗核大內下部中良久去之

治傷寒後蠱瘡雄黃散方

雄黃一分醋煮研

青箱子

黃連去須

苦參各一兩半

桃人湯浸去皮共雙人炒研參分

右五味搗研為散再同研勻每服一錢匕空心米飲調下若蠱在下部更以

綿裹藥一錢內下部中良久去之

治傷寒後蠱瘡苦參湯方

苦參一兩

槐白皮剉二兩

熊膽研半兩

右三味除熊膽外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入熊膽末半錢匕攪勻空心溫服下部有瘡者更灌下部

治傷寒後蠱虫食下部桃皮湯方

桃皮剉

槐子

榧實各一兩

石榴根剉半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後脣口生瘡心中懊懣蟲食下部時或下痢犀角湯方

犀角鎊

龍骨各一兩

木香一分

阿膠炙令燥一兩

升麻半兩 桃人湯浸去皮六雙人一兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服晚再服

治傷寒天行下部蠱瘡方

烏梅去核搗爛半兩

獨頭蒜搗爛

屋塵口

右三味一處入苦酒一升和勻於銅器中煎候可丸丸如棗核大內下部中辟瘟疫令不相傳染

論曰凡時行瘟疫皆四時不正之氣感而病者長少率相似此病苟不辟除多致傳染宜有方術預為之防

辟時氣瘟疫令不相染敗龜湯方

敗龜 酥炙 半兩

梔子人

大青

羊角 銹

芍藥

馬牙消

前胡 去苗

紫苑 去土 一分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食前

辟時氣疫癘絕瘴散方

麻黃 去節

桂皮 去麤

升麻

細辛 去苗

乾姜 炮

附子 炮裂去皮臍

防已

防風 去叉

桔梗 炒

白朮

蜀椒 去目并閉口炒出汗 芎藭 各半兩

右一十二味搗羅為細散每服二錢匕空心溫酒調下

辟傷寒瘟疫瘴癘令不相染赤小豆丸方

赤小豆 二兩

鬼臼

鬼箭羽

丹砂 研

雄黃 醋煮研 各一兩

右五味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如麻子大每服五丸米飲下不計時

辟時疫癘辟瘴湯方

甘草 大黃各二錢 皂莢一錢並生用

右三味細剉用水二盞煎至一盞去滓空心熱服至晚下惡物為効

治瘟癘病轉相傳染雄黃丸方

雄黃醋煮 鬼臼 鬼箭羽 赤小豆 丹參各一兩

右五味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如小豆大每服五丸溫水下

辟瘟疫病真珠散方

真珠研 桂去麤皮 貝母半兩 雞子二枚去殼炒 杏人湯浸去皮共

右五味搗研為末再同研勻歲旦溫酒調下一錢匕若歲中人多病者可旦

望服之如遇時行病即不拘時

治時疫更相傳染宜預服羗活湯方

羗活去頭 桂去麤皮 芎藭 牡丹皮 苾胡去苗

桔梗炒 升麻 荊芥穗 玄參 甘草剉

麻黃去根節 木香各一分 吳茱萸湯洗焙 牽牛炒半

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

辟瘴癘瘟疫時氣預服蒼耳散方

蒼耳 重午日採 暴乾參兩

右一味搗羅為散每服二錢匕空心并華火調下

辟時行瘟疫瘴癘方

蕪青 不限多少 搗取汁

右一味立春後遇庚子日闔家大小各溫服一二盞

辟瘟疫時氣流金散方

雄黃 參兩 研

雌黃 二兩 研

鬼箭羽 半兩

白礬 半兩 燒灰

羚羊角 一兩

右五味搗研為散縫小絹袋盛一兩帶於胸前別以一袋掛於門戶上每月

初以一兩許當庭燒之能辟溫氣

辟瘟疫去百惡雌黃丸方

雌黃 研

雄黃 研各 兩

虎骨

殺羊角 鎊各 二兩

龍骨

蝟皮 各一 兩

空青 研半兩

龜甲 一兩

樗雞 七枚

芎藭 二兩

真珠 研參兩

鮫鯉甲 一兩

右一十二味搗研為末再同研勻鎔蠟和丸如彈子大正旦戶前燒一丸男

左女右繫一丸於臂上遇時行亦依此用

辟瘟疫時氣塗傳方

雄黃二兩 研

丹砂研

菖蒲切

鬼臼各一兩

右四味搗研為末再同研勻以水調塗五心及額上鼻中耳門辟温甚驗

治傷寒疫癘傳染及頭目昏重項脊拘急胸膈不通辟瘟丸方

玄參炒五兩

蒼朮炒參兩

芎藭炒

白芷炒

羌活去芦頭 生用

甘草炙 剉

烏頭炮裂去皮 臍各一兩

安息香分

龍腦

麝香各半 錢研

右一十味除腦麝外餘搗羅為細末入腦麝拌勻粟米粥為丸如彈子大陰

乾紗袋盛安近火處每服一丸時疾生姜蜜水磨下陰毒面青熟水磨下

辟四時疫癘非節之氣調中丸方

大黃五兩 剉炒

麻人一兩 別研

枳殼去麩 炒

白茯苓去黑皮

前胡去芦 頭

芍藥

黃芩去黑心 各一兩

右七味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸食後飲下微利為度日

晚夜卧服之佳

大德重校聖濟總錄卷第三十三