



LIBRARY OF  
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

PURCHASED 1923 FROM  
BOTANICAL GARDEN

Septemb 1899

R. W. Gibson - Inv.







QK 315  
• H328  
atlas  
v. 3



*Leucanthemum coronopifolium* (Vill.) — Krähenfussblättrige  
Wucherblume.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500–2200 Meter, besonders auf Kalk. Juli–August.







*Doronicum cordatum* (Wulf. 1805) Kern. = *cordifolium* Sternb.  
1818. — Herzblättrige Gemswurz.

Tirol bis Oesterreich, Wälder, 1000–1600 M., bes. auf Kalk, Juli, August.





*Doronicum Austriacum* Jacq. — Oesterreichische Gemswurz.  
Tirol bis Oesterreich und Krain, feuchte Stellen, 1300–1900 M., bes. auf Kalk, Juli, August.





*Aronicum scorpioides* (L.) Reichenb. — Scorpionartige Krebswurz  
Schweiz bis Kärnten, auf Gerolle, 1600—1700 M. Juli—August





*Aronicum glaciale* (Wulf.) Reichb. — Gletscher-Schwindelkraut.  
 Alpenkette, Gletscher, 1900–2600 M., auf Urgestein. Juli–August.







*Arnica montana* L. — Berg-Wohlverleih, Arnika.

Alpenkette, auf Triften, 1000–2000 M. Mai J. 0.





*Senecio abrotanifolius* L. — Staubwurzblättriges Kreuzkraut.


Alpenkette, bes. auf Kalk, 1200—1600 M. Juni—August.





*Senecio incanus* L. — Weissgraues Kreuzkraut.

Schweiz bis Steiermark, 1900—2500 M. Juli—August.





*Senecio carniolicus* Willd. -- Krainisches Kreuzkraut

Ostalpen, bes. auf Urgestein, 1200—2000 M. Juli, August







*Senecio cordifolius* Gouan (1773) = *cordatus* Koch. — Herzblättriges Kreuzkraut.

Alpenkette, trockene Stellen. Sennhütten, 1300–1600 M. Juli. August.





*Senecio Doronicum* L. — Gemswurz-Kreuzkraut.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2300 M., bes. auf Kalk, Juli, August.





*Cirsium spinosissimum* (L.) Scop. — Vielstachelige Kratzdistel.  
 Alpenkette, Wiesen, 1300–2000 M., Juli, August.





*Carduus defloratus* L. — Abgeblühte Distel.

Alpenkette, auf Kalkboden, bis 1700 M. Juh — August.







*Saussurea pygmaea* (L.) Spreng — Zwergige Saussuree  
Alpenscharte

Ostalpen, auf Kalkboden. 2000—2700 M. Juli, August





*Saussurea discolor* (Willd.) De Cand. — Zweifarbige Saussuree,  
Alpenscharte.

Schweiz bis Krain u. Niederösterr., trockene Stellen, 2000—2700 M., auf Kü'k, Juli. August.





*Saussurea alpina* (L.) De Cand. — Alpen-Saussuree.  
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 2000—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.





*Saussurea macrophylla* Saut. — Grossblättrige Saussuree.  
Tirol und Salzburg, Juli, August.








*Serratula heleniifolium* Gren. & Godr. — Allantblättrige Scharte.  
Schweiz bis Krain. auf Triften, 1600—2200 M. Juli, August.





***Centaurea montana* L. — Berg-Flockenblume.**

Alpenkette, unter Gebüsch, bis 1600 M. Juli—August.





*Centaurea plumosa* Lam. (1793) = *Phrygia* Reichb. nec Koch  
 nec L. = *nervosa* Willd. 1809. — Federige Flockenblume.  
 Schweiz bis Krain, Wiesen, 1600–2200 M., Juli, August.





*Centaurea Phrygia* L. — Phrygische Flockenblume.

Alpenkette, auf Wiesen, bis 1600 M Juli—September.







*Aposeris foetida* (L.) Less. — Stinkender Hainlattich.  
Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M. Juli–August.






*Leontodon saxatilis* All. = *Taraxaci* All. 1785 sub *Picris*; Lois,  
Koch nec. L. — Felsen-Löwenzahn.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1900–2600 M., besonders auf Kalk, August-September.





*Leontodon Pyrenaicus* Gouan. — Pyrenäischer Löwenzahn.  
Alpenkette, Wiesen, 1200—1900 M., Juli, August.





*Scorzonera rosea* Waldst. & Kit. — Rosenrothe Schwarzwurz.  
Kärnten und Krain, Wiesen, bei 1600 M., Mai, Juni.







*Hypochoeris uniflora* L. — Einköpfiges Ferkelkraut.


Schweiz bis Steiermark, auf Triften. 1300–1900 M. Juli–August.





*Willemetia stipitata* (Jacq. 1775) = *hieracioides* Monn. (1825).  
 = *apargioides* (Willd 1796) — Gestielte Willemetie.  
 Alpenkette, auf Triften, bis 2000 M. Juni—August.





*Taraxacum nigricans* Kitaib. = *officinale* Wigg. var.  $\gamma$  *alpinum* Koch. — Schwärzliche Kuhblume.  
Alpenkette, Wiesen, 1500–2200 M., Juni–September.





*Taraxacum Pacheri* Schultz. Bip. — Pacher's Kuhblume.

Kärnten: Salmshöhe, Juni, Juli.









*Mulgedium alpinum* (L.) Less. — Alpen-Milchlattich.

Alpenkette, Gebüsch bis 1600 M. Juh--August





*Crepis aurea* (L.) Cass. — Goldener Pippau.,  
Alpenkette, auf Wiesen, bes. Kalkboden, 1600—2500 M. Juni—August.





*Crepis pygmaea* L. — Kleiner Pippau.  
Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1600–2500 M., Juli, August.





*Crepis jubata* Koch = *chrysantha* Koch nec Fröl. — Bémähnter  
Pippau.

Schweiz und Tirol, auf Gerölle, 1800—2700 M. Juli—August.







*Crepis Terglouensis* (Hacq. 1782) Kern. = *Soyeria hyoseridifolia* Vill. 1807 sub *Hierac.* Koch. — Terglou'scher Pippau.  
Kalk-Alpenkette, trockene Stellen, 2200–2600 M. Juli–August.





*Crepis pontana* (L.) = *Soyeria montana* Jacq. 1774 sub *Hierac.*;  
Moun. — Linne's Pippau.

Alpenkette, Wiesen, 1600—1900 M., Jull, August.





*Crepis alpestris* (Jacq.) Tausch. — Voralpen Pippau.  
Alpenkette, trockene Stellen, bis 1600 M., auf Kalk. Mai-August.





*Crepis chondrilloides* (L.) nec Jacq. = *Jacquini* Tausch. —  
Knorpelsalatartiger Pippau.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500—2000 M. auf Kalk, Juli, August,








*Hieracium staticifolium* Vill. — Widerstossblättriges Habichtskraut.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 1800 M., bes. auf Kalk. Juli, August.





*Hieracium aurantiacum* L. — Orangerotes Fiebichskreut.  
Alpenkette, auf Wiesboden, zw. 1300—1600 M. häufig. Juni—





*Hieracium intybaceum* Wulf. = *albidum* Vill. = Wegwarteartiges  
Habichtskraut.

Centralalpen, im Gerölle, 1400—2000 M. Juli August





*Hieracium alpinum* L. = *pilosum* Schleich. Griseb. — Alpen-  
Habichtskraut.

Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 1500—2200 M., Juli, August.







*Hieracium villosum* L. — Zottiges Habichtskraut


Alpenkette, trockene Stellen, 1200—2000 M. auf Kalk. Juni—August.





*Phyteuma comosum* L. — Schopfige Rapunzel

Kalkfelsen in Südtirol und Krain, 600–1500 M. Juni–August





*Phyteuma Scheuchzeri* Ali. — Scheuchzers Rapunzel.


Tirol bis Krain, trockene Stellen, 1300–2200 M., Juli, August.





*Phyteuma Sieberi* Spreng. — Sieber's Rapunzel.

Ostalpen (Tirol bis Krain), 1500—2200 M. Juli, August








*Phyteuma pauciflorum* L. — Armlüthige Rapunzel.

Schweiz bis Steiermark, 1850–2800 M. Juli–August.





*Phyteuma humile* Schleich. — Niedrige Rapunzel.  
Schweiz bis Salzburg und Kärnten, trockene Stellen, 2000–2700 M., auf Urgestein,  
Juli, August.





*Phyteuma hemisphaericum* L. — Halbkugelige Rapunzel.  
Schweiz bis Steiermark, Wiesen, 1500–2200 M., auf Urgestein, Juli, August.





*Phyteuma latifolium* (Heuff. v. 1858) = *confusum* Kern. 1870.  
— Breitblättrige Rapunzel.

Kärnten u. Steiermark, Wiesen 1500–2200 M. auf Urgestein, Juli, August.








*Phyteuma betonicaefolium* Vill. = *Michelii* Bert. var  $\alpha$  Koch.

— Betonienblättrige Rapunzel.


Alpenkette, Wiesen, bis 2000 M., Mai—Juli.





*Campanula barbata* L. — Bartige Glockenblume.

Alpenkette, auf Triften, 800—1800 M. Juni—August.





*Campanula alpina* L. — Alpen-Glockenblume.


Tirol bis Oesterreich u. Steiermark, trockene Stellen, 1000-2100 M., auf Kalk. Juli, August.





*Campanula thyrsoides* L. — Straussblüthige Glockenblume.

Alpenkette, 1600—2100 M. Juli, August







*Campanula Cenisia* L. — Cenis'sche Glockenblume.

Rhaeticon-Gebiet, Gerölle über 1800 M. Juli—August.





*Campanula Morettiana* Reichenb. — Moretti's Glockenblume

Fassa- und Fleinsertal, Südtirol, um 1100 M. Juli August





*Campanula Zoyssii* Wulf. — Zoyss' Glockenblume.


Ost-Alpen, Kärnten, Steiermark und Krain, trockene Stellen, 2000–2700 M., auf Kalk,  
Juli, August.





*Campanula pulla* L. — Dunkelblaue Glockenblume.

Salzburg bis Krain, trockene Stellen, 1300–1900 M. Juli, August.







*Campanula linifolia* Scop. (1772) = *Carnica* Schiede 1812. —  
Linienblättrige Glockenblume.  
Krain, trockene Stellen, über 1600 M., Juni, Juli.





*Campanula Scheuchzeri* Vill. — Scheuchzer's Glockenblume.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 2000 M. Juli—September






*Edrajanthus Croaticus* Kern. = *Kitaibelii* Koch et aut. nec de  
Cand. — Kroatische Kruglocke.

Krain, Wiesen, um 1300 M., Juli.





*Vaccinium uliginosum* L. — Moosbeere.  
 Alpenkette, Gebüsch, 1300—2000 M., Mai—Juli.







*Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng. — Alpen-Bärentraube.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1500—2000 M., bes. auf Kalk, Mai—Juli.





*Arctostaphylos Uva ursi* (L.) Spreng. = *officinalis* Wimm. & Grab. — Gemeine Bärentraube.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500–2000 M., bes. auf Kalk, Mai–Juli.





*Calluna vulgaris* (L.) Salisb. — Gemeine Besenheide.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 2000 M., bes. auf Schieferböden, August—October.





*Erica carnea* L. — Fleischrothe Heide.

Alpenkette, auf Mergelhoden, 370—2200 M. März—Mai.







*Azalca procumbens* L. — Niederliegende Alpenheide.

Alpenette, trockene Steilen 1500—2000 M., bes. auf Schieferboden, Mai—August.





*Rhododendron chamaecistus* L. — Zwerg-Alpenrose.  
Tirol bis Krain, trockene Stellen, 1200–1900 M., auf Kalk. Mai–Juli.





Rhododendron hirsutum. L. — Rauhhaarige Alpenrose.

Alpengebiet, bes. auf Kalkboden, 1400—2300 M. Mai—Juli.





ca



*Rhododendron ferrugineum* L. — Rostrothe Alpenrose.

Alpenkette, bes. auf Urgestein, 1300—2000 M. Juni—August.







*Pirola uniflora* L. — Einblüthiges Birnkraut.

Alpenkette, auf Humusboden, 550—1600 M. Juni—August.





*Pirola secunda* L. — Einseitwendiges Birnkraut.

Alpenkette, unter Gebusch, bis 1700 M. Juni—Juli.





*Ilex Aquifolium* L. — Immergrüne Stechpalme.  
 Schweiz bis Oesterreich, Wälder, Gebüsch, bis 1500 M., Mai-Juli






*Sweertia perennis* L. — Ausdauernde Swertie Tarant.  
Alpenkette, feuchte Stellen, 1500—2300 M. Juli—August.





*sta**pi**pt**fr**se**se**fr*

*Lomatogonium Carinthiacum* (Wulf.) A. Br. — Kärntnerische  
Saumnarbe.

Schweiz, Tirol, Salzburg und Kärnten, trockene Stellen, 1500—2300 M. bes. auf Kalk. August,  
September.





*Gentiana lutea* L. — Gelber Enzian

Alpenkette, auf Triften, 1100—1600 M. Juli August.





*Gentiana purpurea* L. — Purpurrother Enzian.  
Schweiz, Vorarlberg und Tirol, Wiesen um 1600 M., Juli, August.





*Gentiana punctata* L. — Punktirter Enzian.

Ostalpen, auf Alpwiesen 1.000—1.500 M. Juli—August.







*Gentiana Pannonica* Scop. — Pannonischer Enzian.  
Schweiz bis Oesterreich, Wiesen, 1300—2000 M., auf Kalk. Juli, August.





*Gentiana tenella* Rottb. — Zarter Enzian.  
Schweiz bis Kärnten, Gletscher, 1900–2600 M. August–September.





*Gentiana nana* Wulf. — Zwerg-Enzian.  
Salzburg und Kärnten, Gletscher, 2200–2900 M. Juli–September.





*Gentiana asclepiadea* L. — Schwalbenwurzartiger Enzian.

Alpen- Gebirge, bis 1700 M., bes. auf Kalk; auch auf Urgestein. August, September.







*Gentiana Clusii* Song. u. Perr. = *acaulis* aut.; Linn. var.  $\beta$ . — Clusius' Enzian.

Alpenkette, auf Kalkboden, 500—2400 M. Juni—August.





*Gentiana acaulis* (L. v.) nec aut. = *excisa* Presl. 1828; *Kochiana* Perr & Song. 1855. — Stengelloser Enzian.  
Alpenkette, Wiesen, 1400–2000 M. bes. auf Urgestein, Juni, Juli.





*Gentiana Frölichii* Jan. — Fröhlich's Enzian. .  
Kärnten und Krain, trockene Stellen, über 1800 M., August, September






*Gentiana frigida* Hänke. — Kälteliebender Enzian.  
Steiermark, trockene Stellen, über 1800 M., auf Granit. Juli-September.








*Gentiana Bavarica* L. — Baierischer Enzian.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2500 M. auf Kalk, Juli, August.





*Gentiana imbricata* Frol — Dachblättriger Enzian

Ostalpen von Tirol bis Krain, 2100—3000 M. Juli, August.






*Gentiana pumila* Jacq. — Niedriger Enzian.

Tirol bis Oesterreich und Krain, Wiesen, 1600—2000 M. Juli, August.





*Gentiana brachyphylla* Vill. — Kurzblättriger Enzian.  
Schweiz bis Steiermark, Wiesen, 1900–2800 M., auf Urgestein, Juli, August.







*Gentiana angulosa* M. Bieb. = *aestiva* R. u. Sch. -- Geflügelter Enzian.

Alpenkette, auf Triften, bis 2000 M. Juni, Juli





*Gentiana utriculosa* L. — Blasiger Enzian.  
Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1700 M., Juni—August.





*Gentiana nivalis* L. — Schnee-Enzian.

Alpenkette, auf Triften, 1500–2000 M. Juli–August.





*Gentiana prostrata* Hänke — Niedergestreckter Enzian.  
Tirol bis Oesterreich und Krain, Wiesen, 2000—2800 M., Juli, August








*Polemonium coeruleum* L. — Blaues Sperrkraut.


Schweiz bis Krain, Gebüsch, bis 1500 M., Mai, Juni.





*Cerinthe alpina* Kit. — Alpen-Wachsblume.

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, bis 1680 M., Juni—August.






*Myosotis alpestris* Schmidt = *silvatica* Hoffm. var  $\beta$  Koch et aut  
 — Alpen-Vergissmeinnicht


Alpenkette, auf Wiesen und Gerölle, 1200—2000 M. Juni, Juli





*Eritrichium Terglouense* (Hacq.) Kern = *nanum* (All) Schrad. —  
Terglou'scher Himmelsherold.

Schweiz bis Krain, auf Urgebirge, 1800—2300 M. Juli, August.








*Linaria alpina* L. — Alpen-Leinkraut.

Alpenkette, bes. auf Kalk. 1600 — 2000 M. Juni — September.





*Erinus alpinus* L. — Alpen-Leberbalsam.

Schweiz und Tirol, trockene Stellen, Wiesen, 1300—2400 M., Mai—Juli.






*Veronica fruticulosa* L. — Kleinstrauchiger Ehrenpreis.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M. auf Urgestein, Juli, August.





Veronica saxatilis Scop. — Feisen-Ehrenpreis

Alpenkette, auf Gerölle, 1500—2400 M Juni Juli







*Veronica alpina* L. — Alpen-Ehrenpreis.

Alpenkette, auf Tiffen, 1200—2500 M. Juni—August.





*Veronica bellidioides* L. — Massliebchenartiger Ehrenpreis.

Alpenkette, auf Gerölle, 1500—1850 M. Juli—August.





*Veronica latifolia* L. (1753) = *urticaefolia* Jacq. 1773 — Breitblättriger Ehrenpreis.

Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M., Juni, Juli.





*Veronica aphylla* L. — Blattloser Ehrenpreis.  
Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1200 — 2300 M. Juni—August.







*Paederota Bonarota* L. — Blaue Paederote, Mänderle.  
Südtirol bis Krain, trockene Stellen, über 1500 M., Juni—August.





*Paederota agerita* L. — Gelbe Päderote, Mänderle.

Süd-Tirol bis Krain, trockene Stellen, über 1500 M., Juni -- August.





*Wulfenia Carinthiaca* Jacq. — Kärntnerische Wulfenie, Kuhtritt.  
 Oberkärnten: Kühweger- und Watschigeralpe im Gailthal, über 1500 M., Juli, August.





*Tozzia alpina* L. — Alpen-Tozzie.

Alpenkette, bes. auf Kalk, 1300—2300 M. Juni, Juli.







*Melampyrum laricetorum* Kern i. sched. (1870). — Lärchen-  
Wachtelweizen.

Tirol, Central-Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., auf Schiefer, Juli, August.





*Pedicularis acaulis* Scop. — Stängelloses Läusekraut.


Südtirol bis Krain, auf Triften, 1300 — 2000 M. April—Mai.





*Pedicularis verticillata* L. — Quirlblättriges Läusekraut

Alpenkette, bes. auf Kalk, Triften, 1200—2100 M. Juni—August.





*Pedicularis incarnata* Jacq. — Fleischrothes Läusekraut.

Alpenkette, Wiesen, 1200—2000 M., Juli, August.








*Pedicularis asplenifolia* Flörke. — Farrenblättriges Läusekraut.  
Schweiz bis Salzburg und Steiermark, feuchte Stellen, 2000–2500 M., bes. auf Urgestein.  
Juli, August





*Pedicularis rostrata* L. = Jacquin Koch et aut. -- Geschnabeltes  
Läusekraut.

Schweiz bis Oesterreich, Triften auf Kalk, 1200—2200 M. Juli—August





*Pedicularis Kernerii* D. T. non Huter. = *rostrata* Koch et aut.  
nec L. = *Rhaetica* Kern. — Kerner's Läusekraut.

Schweiz bis Salzburg und Krain, feuchte Stellen, 1500—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.





*Pedicularis geminata* Portenschl. (1821) = Portenschlagii Saut.  
— Gezweites Läusekraut.

Tirol bis Salzburg und Steiermark, Wiesen, 2000–2600 M., auf Granit und Urgestein.  
Juli–August.







*Pedicularis rosea* Wulf. — Rosenrothes Läusekraut.


Tirol bis Krain, Wiesen, 1600–2200 M., bes. auf Kalk, Juli, August.





*Pedicularis recutita* L. — Beschnittenes Läusekraut.

Schweiz bis Ob.-Oesterreich und Steiermark, feuchte Stellen, 1200—2200 M., Juni—August.





*Pedicularis tuberosa* L. — Knolliges Läusekraut.  
Schweiz bis Salzburg und Krain, feuchte Stellen, 1300–2200 M., Juli, August.





*Pedicularis versicolor* Wahlenb. = *Oederi* aut. nec Vahl. —  
Buntes Läusekraut.

Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen, 1600—2200 M., Juni—August.








*Pedicularis foliosa* L. - Blattrreiches Läusekraut.

Alpenkette Triften auf Kalkfelsen 1000-2000 M Juni-August





*Rhinanthus aristatus* Čelak. = *alpinus* Koch & aut. p. p. nec  
Baumg. — Begrannter Klappertopf.


Alpenkette, Wiesen, 1300—2200 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.






*Bartsia alpina* L. — Alpen-Bartsie.

Alpenkette, 1300—1700 M. Juni—August






*Euphrasia salisburgensis* Funke. — Salzburgischer Augentrost.  
Alpenkette, Wiesen, bis 1900 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.







*Euphrasia minima* Jacq. = *officinalis* var.  $\beta$  Lam.; *pratensis* var.  $\alpha$  Reichb.; *nemorosa* var.  $\zeta$  Soy. — Kleinster Augentrost.  
 Alpenkette, Wiesen, 1800–2400 M.; besonders auf Schiefer, Juli–August.














New York Botanical Garden Library  
OK 315 .H328 v.3 gen  
Hartinger, Anton/Atlas der Alpenflora



3 5185 00108 4050

