



證治準繩


女科

卷之一上

共八十冊



內閣文庫	
番號	漢 12548
冊數	80 ( 34 )
函號	301 61



女醫治準繩自序

婦人有專治方舊矣史稱扁鵲過邯鄲聞貴婦人卽  
爲帶下醫語兼長也然帶下直婦人一病耳調經雜  
證懷子免身患苦百出療治萬方一帶下寧渠盡之  
乎世所傳張長沙雜病方論三卷婦人居一焉其方  
用之奇驗奈弗廣何孫真人著千金方特以婦人爲  
首蓋易基乾坤詩首關雎之義其說曰特須教子女  
學習此三卷婦人方令其精曉卽於倉卒之秋何憂  
畏也而精於醫者未之深許也唐大中初白敏中守  
成都其家有因免乳死者訪問名醫得咎殷備集驗

方三百七十八首以獻是爲產寶宋時濮陽李師聖  
得產論二十一篇有說無方醫學教授郭稽中以方  
附焉而陳言無擇於三因方評其得失確矣婺醫杜  
菽又附益之是爲產育寶慶集臨川陳自明良甫以  
爲諸書綱領散漫而無統節目諄略而未備醫者局  
於簡易不能深求徧覽有纔進一方不効輒束手者  
有無方可據揣摩臆度者乃采摭諸家之善附以家  
傳驗方編葺成篇凡八門門數十餘體總二百六十  
餘論論後列方綱領節目燦然可觀是爲大全良方  
良方出而閨闈之調將大備矣然其論多採巢氏病  
源什九歸諸風冷藥偏獷熱未有條分縷析其宜不  
者近代薛已新甫始取良方增注其立論酌寒熱之  
中大抵依於養脾胃補氣血不以去病爲事可謂救  
時之良醫也已第陳氏所葺多上古專科禁方具有  
源流本末不可昧也而薛氏一切以已意芟除變亂  
使古方自此湮沒余重惜之故於是編務存陳氏之  
舊而刪其偏駁者然亦存什之六七而已至薛氏之  
之說則盡收之取其以養正爲主且簡而易守雖子  
女學習無難也若易水瀝水師弟則後長沙而精於  
醫者一方一論具掇是中迺它書所無有挾是而過

邯鄲庶無道少之患哉其積德求子與夫安產藏衣  
吉凶方位皆非醫家事故削不載云稿成而兵憲蔡  
虛臺公明府涂振任公助之貲刻行之以爲此亦二  
公仁政萬分之一遂不復辭

萬曆丁未早秋念西居士王肯堂宇泰甫書於無住  
菴

女科證治準繩目錄

卷之一

治法通論

通治婦人諸疾

四物湯加減治雜病例

芩歸湯

異香四神散 玉仙散

烏犀丸

蒲黃黑神散 莪朮散

濟陰丹

南岳魏夫人濟陰丹

皴血丸

加味五積散 卷栢丸

烏雞煎丸

小白薇丸 白聖丹

琥珀澤蘭煎

內灸散

勝金丸

沉香煎丸

龍骨散

妙應丹

萬應紫苑丸

溫白丸

調經門

經候總論

四物加黃芩黃連湯

當歸飲

七沸湯

四物加黃芩白朮湯

四物加葵花湯

四物加熟地黃當歸湯

先期後期先期湯

金匱土瓜根散

過期飲

滋血湯

調經簡易當歸散

人參養血丸

逍遙散

增損四物湯

澹寮煮附丸

沉香降氣散

嚴氏抑氣散

紺珠正氣天香湯

東垣益胃升陽湯

調經大溫經湯

小溫經湯

溫經湯

滋血湯

加味吳茱萸湯

桃仁散

薑黃散

紫石英丸

煖宮丸

內補當歸丸

熟乾地黃丸

禹餘糧丸

鹿茸丸

升陽舉經湯

調經破血之劑紅花當歸散

大玄胡索散

鼈甲丸

身越痛散

腹痛海藏八物湯

琥珀散

交加散

交加地黃丸

大金交加散

桂枝桃仁湯

玄胡索湯

三神丸

柴胡丁香湯

沒藥除痛散

加味烏沉湯

熱入血室加味小柴胡湯

乾薑柴胡湯

海蛤散

月水不膠艾湯

續斷丸

禹餘糧丸

牡蠣丸

伏龍肝散

固經丸

月水不利牛膝散

牡丹皮散

產寶方

養榮湯

過芩心丸

茸附湯

補中芩薈湯

經閉

五補丸

衛生湯

大金萬病丸

上牛膝散

當歸散

琥珀散

產寶方

千金桃仁煎

三稜丸

紅花當歸散

通經丸

滋血湯

掌中金丸

礬石丸

柏子仁丸

澤蘭湯

沉香鼈甲散

劫勞散

麥煎散

牡丹散

六神湯

桃仁散

血崩

固經丸

旋覆花湯

半夏丸

備金散

縮砂散

五靈脂散

當歸芍藥湯

栝子仁湯

益胃升陽湯

調經升陽除濕湯

柴胡調經湯

獨聖散

加減四物湯

黃芪當歸人參湯

地黃丸

涼血地黃湯

小蓟湯

芎藭酒

奇効四物湯

金華散

丁香膠艾湯

芎藭湯

斷下湯

熟附丸

鹿茸丸

赤龍丹

紫金散

白芷煖宮丸

和劑震靈丹

牡蠣散

栝黃散

伏龍肝散

地榆散

鹿茸散

栝葉散

補宮丸

鎮宮丸

十灰丸

十灰散

一笑散

香礬散

琥珀散

神應散

楊氏黑金散

如聖散

烏金散

梅飲子

赤白帶下

樗皮丸

固腸丸

乳香散

伏龍肝散

馬蹄丸

白芷散

補經固真湯

補真潤腸湯

白斂丸

當歸煎

牡蠣散

茯苓散

卷栝丸

艾煎丸

沉香牡丹丸

紫桂丸

固真丸

茅花散

苦棟丸

地榆膏

麒麟竭湯

豆花散

調經補真湯

地黄丸

桂附湯

二豆散

鶴頂丸

濟生白聖丸

養氣活血丹

茱萸浴湯

坐藥龍鹽膏

勝陰丹

回陽丹

酒煮當歸丸

當歸附子湯

白礬丸

溫經湯

益母散

玳瑁丸

神仙聚寶丹

白濁白淫

薑黃散

內

丸

烏金散

加味四七湯

鎖精

固精丸

卷之二

雜證門上

虛勞

增損四物湯

六神湯

加減大建中湯

清氣湯

黃芪散

四白散

桔梗飲子

如聖散

劫勞散

筒骨煎

補中丸

溫中丸

人參丸

秘方十補丸

五聖丸



七補丸

羊乳丸

人參鼈甲丸

艾煎丸

芪味丸

大聖散

渾身碎痛飲子

當歸木香湯

木香丸

煮肝散

礪砂煎丸

黃芪散

逍遙散

子芩散

知母散

半夏散

秦朮散

鼈甲地黃湯

胡黃連散

犀角散

紅藍花散

鼈甲散

豬肚丸

胡黃連丸

益母草煎丸

青蒿丸

鼈甲丸

雞蘇丸

待效方河車丸

黃芪丸

地黃煎丸

人參散

赤茯苓散

天門冬丸

麥煎散

牡丹湯

鼈甲丸

柴胡散

黃連散

青蒿散

豬肚丸

石膏散

青蒿鼈甲煎丸

天靈蓋散

益母草丸

獺肝丸

殺鬼方

溫金散

補肺湯

瓜蒌湯

人參荆芥散

地骨皮散

地黃煎

乞力伽散

大効油煎散

馬鞭草散

琥珀散

茯神散

逍遙散

熟乾地黃散

琥珀丸

鼈甲丸

牡丹丸

柴胡丸

客熱

麥門冬散

犀角散

黃耆飲

丹砂散

玉霜散

生乾地黄丸

寒熱

地骨皮散

生地黄散

異功散

七寶湯

柴胡散

桃仁丸

青蒿散

生地黄丸

惡寒

中風

防風散

葶藶散

附子散

羌活散

南星散

木香煮散

白僵蠶散

麝羊角散

紫湯

烏蛇丸

口天南星散

走馬散

烏蛇散

白朮酒

不語神仙解語丹

防風湯

竹瀝湯

手足不隨三痺湯

獨活湯

烏蛇散

東垣羌活湯

甘艸附子湯

獨活湯

續命煮散

補遺防風白朮牡蠣散

賊風偏枯大八風湯

增損茵芋酒

續斷湯

補遺全生虎骨散

虎脛骨酒

偏風口噤防風湯

深師續命湯

防風散

飛尸血厥

白薇湯

倉公散

補遺內鼻散

硫黃散

瘰癧

顛振

交加散

增損柴胡湯

本事青鹽丸

本事星附散

三因獨活散

世傳茯苓丸

驚悸

茯苓神散

龍齒丸

朱寶琥珀散

茯苓補心湯

茯苓神湯

酸棗仁丸

定志丸

養心湯

硃砂安神丸

治要茯苓散

失血心神不安寧志膏

茯苓補心湯

妙香散

半夏湯

獨參湯

顛狂

防風散

血風煩悶

酸棗仁散

紫石英散

當歸散

赤芍藥散

血風攻脾不能食

草豆蔻散  
訶梨勒散

神麴丸

進食散

身體骨節疼痛

芎藭散  
海桐皮散

虎骨散

何首烏散

通靈丸

當歸沒藥丸

四生丸

羚羊角散

羌活勝濕湯

走疰痛

沒藥散

琥珀散

虎骨散

雄黃散

漏蘆散

麝香丸

芍藥知母湯

附子八物湯

頭目眩暈

養正丹

釣藤散

獨活散

川芎散

四神散

頭痛

旋復花湯

七生丸

白附子散

川芎茶調散

玉真丸

硫黃丸

心痛

烏藥散

阿魏丸

雞舌香散

目録 女科 九

應痛散

陳氏二神丸

陳日華抽刀散

心腹痛

三神丸

沒藥散

延胡索散

琥珀散

金散

牡丹散

八仙散

二方

索湯

大効琥珀散

蠲痛散

沒藥散

菖蒲丸

手拈散

木香枳朮丸

木香化滯湯

小腹痛

威靈散

當歸散

追氣丸

石灰散

吳茱萸湯

椒紅丸

大腹皮飲

項筋強痛

追風散

急風散

蝎附散

木瓜煎

兩脇脹痛

靈寶散

草豆蔻散

菴藺子散

人參紫金丸

氣針丸

木通散

三腕散

左金丸

當歸龍薈丸

補肝散

腰痛

如神湯

獨活寄生湯

舒筋散

腰脚疼痛

虎骨丸

仙靈脾散

藁本散

敗龜散

骨碎補散

附子散

養腎散

臂痛

栢子仁丸

舒筋湯

茯苓丸

控涎丹

白芥子散

流氣飲

秦艽地黃湯

脚氣

大腹皮散

紫蘇飲

四白散

蒼朮丸

癩疹搔痒

何首烏散

蒺藜飲

卷之三

雜證門下

痰飲

旋復花湯

天南星丸

大半夏湯

導痰湯

咳嗽

目錄  
黃芪散

蛤蚧丸

含化丸

貝母湯

定喘湯

補肺湯

金不換散

古今錄驗橘皮湯

深階四滿丸

團魚丸

參朮調中湯

噙化丸

喘滿

杏子散

橘皮半夏湯

棗膏丸

神授湯

天門冬丸

嘔吐

益智子散

丁香散

竹茹湯

良方槐花散

許仁則半夏丸

人參七味丸

青金丹

人參安胃散

霍亂

加減理中丸

四順湯

四逆加豬膽汁湯

香薷散

訶子散

胡椒湯

翻胃吐食

白堊散

白芷散

太倉丸

東垣補真丸

血膈

牡丹煎

鼻衄

刺薊散

伏龍肝散

吐血

鷄蘇散

柔脾湯

四生丸

犀角地黄湯

青餅子

乾薑甘草湯

花蕊石散

濟生雞蘇散

生地黃散

三因茯苓補心湯

麥門冬飲子

積聚癥瘕

通治諸積順氣丸

勝紅丸

香稜丸

大消石丸

阿魏膏

黃度皂莢散

血桃仁煎

三稜煎

癥瘕穿山甲散

蓬莪茂丸

丁香丸

桃仁煎

食礪砂丸

礪石丸

小二稜煎丸

血大黃丸

腹中調榮湯

川當歸散

大黃湯

琥珀散

地榆散

痲麝香丸

蔥白散

四等丸

木香礪砂丸

當歸散

痲乾漆散

當歸散

礪砂丸

巴豆丸

黑神丸

蟠蔥散

寶鑑疾藜湯

丹溪定痛散

心腹脹滿

目錄

卷一

七



白朮散

檳榔散

木香散

嘈雜

旋覆花湯

小便淋瀝

石韋散

木通散

桃膠散

金沙散

雞蘇散

火府丹

滋腎丸

黃芩清肺飲

五淋散

脬轉不得小便

滑石散

蕩葉散

石韋湯

蔥白湯

滋腎生肝飲

小便數

鹿茸散

桑螵蛸散

補遺縮泉丸

遺尿失禁

鹿茸丸

補遺秘元丸

小便出血

大全鹿茸散

髮灰散

生乾地黄散

當歸散

大便下血

加減四物湯

腸風黑神散

地榆湯

防風如神散

大便不通

通神散

大麻仁丸

皂角丸

潤腸丸

搜風順氣丸

子和脾約丸

大便或秘或利

疾藜湯

大五柔丸

二仁丸

蜜兌法

補遺通氣散

泄瀉

香朴丸

桂香丸

豆蔻分氣飲

豆蔻丸

人參豆蔻散

木香散

香連丸

防風芍藥湯

滲濕湯

如金丸

茯苓湯

白朮芍藥湯

胃苓散

五香散

二神丸

五味子散

固腸丸

協熱下利

玉粉丸

四味阿膠丸

滯下

白頭翁湯

神木散

六神丸

三黃熟艾湯

四順附子湯

三建丹

加味參附湯

香茸丸

調中湯

胃風湯

水煮木香丸

戊巳丸

升陽除濕防風湯 三黃丸 芍藥湯

痢後嘔噦

橘皮乾薑湯 半夏生薑湯 丁香柿蒂湯

橘皮竹茹湯 生薑橘皮湯 退陰散

豬苓湯 補遺倉廩湯

痔瘻

鼈甲散

脫肛

升陽除濕湯

誦陰諸疾

陰腫 菖蒲散 麻黃湯 白礬散

陰痒 大黃散 陰痛 太和湯 海螵蛸散

陰瘡 補心湯 藿香養胃湯 黃芩湯 洗方

雄黃散 當歸湯 陰下 三茱丸

一捻金丸 黃芩散 陰冷 五加皮酒

傷丈夫頭痛 桑白皮湯

與鬼交通

茯神散 桃仁丸 辟瘟丹

殺鬼雄黃散 別離散 朱砂散

卷之四

胎前門

求子

六味地黄丸

螽斯丸

抑氣散

大五補丸

增損三才丸

紫石門冬丸

白薇丸

趙氏菘蓉兔絲子丸

加味香附丸

調經丸

正元丹

盪胞湯

坐導藥

葆真丸

千金種子丹

聚精丸

五子衍宗丸

十子丸

趙氏加味孕子丸

候胎

驗胎散

探胎散

胎產大法

保生丸

交感地黄煎丸

琥珀丸

龍鬚湯

佛手散

返魂丹

內灸散

逐月養胎法

烏雌鷄湯

補胎湯

艾葉湯

黃連湯

雄雞湯

茯神湯

菊花湯

調中湯

阿膠湯

安中湯

安胎當歸湯

麥門冬湯

柴胡湯

旋復花湯

蔥白湯

杏人湯

芍藥湯

葵子湯

丹溪縮胎丸

半夏湯

豬腎湯

丹溪縮胎丸

滑胎枳殼散

內補丸

易產滑胎散

神寢丸

榆白皮散

保氣飲

無憂散

縮胎飲即達生散

黑神丸

惡阻

乾薑人參半夏丸

半夏茯苓湯

茯苓丸

旋復半夏湯

旋復花湯

白朮散

人參丁香散方二

醒脾飲

人參橘皮湯

歸原散

安胎飲

小地黃丸

保生湯

白朮散

二香散

胎動不安

永固孕湯

當歸散

白朮散

阿膠散方二

立効散

寄生湯

黃芪湯

順氣飲子

安胎寄生湯

秦艽湯

小品止痛湯

黃芩湯

釣藤湯

蔥豉安胎湯

安胎織罩散

銀苧酒

鯉魚臙

胎上逼心

本事紫蘇飲

當歸湯

妊娠經來

漏胎下血

濟生如聖湯

桑寄生散

鄭氏人參散

羅氏立聖散

二黃散

地黃湯

保命枳殼湯

子芩丸

防風丸

防風黃芩丸

桂枝茯苓丸

榆白皮散

胎漏黃汁下或如豆汁

跌撲傷胎毒藥傷胎

催生神妙佛手散

竹茹汁

補遺安胎散

奪命丸

心痛

火龍散

白朮湯

心腹痛

當歸芍藥散

阿膠散

芍歸湯

草豆蔻散

香茂散

腹痛

地黃當歸湯

小腹痛

腰腹及背痛

通氣散

五加皮散

五加皮丸

大地黄丸

紫酒

小品苧根湯

心腹脹滿

倉公下氣湯

訶梨勒散

安胎和氣飲

枳殼湯

附子湯

胎水腫滿

天仙藤散

苧蔕子散方二

澤瀉散

防已湯

千金鯉魚湯

腎着湯

指迷五皮散

全生白朮散

腹內鐘鳴

積聚

孕癰

傷食

木香丸

白朮散

鄭氏勝金散

中惡

當歸散

中風

防風散

生犀角散

防已散

獨活散

白僵蠶散

赤箭丸

白朮散

風痙

羚羊角散

葛根湯

羌活酒

瘰癧

眩暈

消風散

犀角散

驚悸

大聖散

瘡

煩 口乾附

竹葉湯

竹瀝湯

竹茹湯

知母飲

麥門冬湯

麥門冬散 方

柴胡散

人參散

一母丸

煩躁升麻散

知母散

葛根散

人參黃芪散

吐血衄血咳唾血

局方必勝散

咳嗽

款冬花散

苦梗散

馬兜鈴散

麻黃散

百合散

紫苑湯



喘

平安散

瘧

驅邪散

七寶散

柴胡散方二

霍亂

人參白朮散

人參散

白朮散

木瓜煎

縮脾飲

泄瀉

加味理中湯

滯下

大寧散

黃連湯

厚朴散

草果飲

大小便不通

甘遂散

豬苓散

葵子湯方二

當歸散

大腹皮湯

小便不通

葵子茯苓散

苦參丸

獨聖散

淋

地膚大黃湯

安榮散

大腹皮散

遺尿

桑螵蛸散

尿血

續斷湯

補遺薑蜜湯

眼目

天門冬飲子

臟躁悲傷

甘麥大棗湯

淡竹茹湯

妊病可下胎斷胎

胎自墮

濟生芩薊補中湯

阿膠湯

杜仲丸

四製艾附丸

生地黃湯

人參湯

人參黃芪湯

龍骨散

當歸酒

烏金散

紅藍花散

白蜜湯

豬膏飲

當歸湯

地黃湯

澤蘭湯

蒲黃酒

當歸川芎湯

芩薊湯

當歸散

聖愈湯

當歸補血湯

四物二連湯

全生活血湯

胎不長

安胎白朮散

黃芪散

人參丸

目録  
女科  
三  
枳實檳榔丸

日月未足欲產過期不產

集驗知母丸 槐子丸

鬼胎

雄黃丸

臨產坐草法

蛇蛻散

催生法

滑劑催生如聖散

香劑乳朱丹二方 開骨膏

如意散

行血易產天麻丸

直血催生如聖散

勝金散

立聖丹

交骨不開加味芎歸湯

下死胎法

熱劑烏金散

卷之五

產後門

毒劑一字神散

勝金散

如聖散

破血半夏湯

外取如聖膏

如神散

行氣催生湯

無憂散

七聖散

萬金不傳遇仙丹

勝金丹

若劑柞木飲子

催生丹名鬼腦丸

產後通用方

加味四君子湯

四順理中丸

地黄丸

四味湯

玉露散

地黄煎

地黄酒

桃仁煎

產後醋墨

黑神散

琥珀散

千金增損澤蘭丸

黑龍丹

胞衣不下

奪命丹

花藥石散

芎藭散

必効牛膝湯

牛膝散

千金備急丹

下胎丸

逆

清魂散

保命荆芥散

來甦散

芎歸湯

獨行散

奪命散

紅花散

牡丹散

血不下

荷葉散

沒藥丸

血不止

芎歸加芍藥湯

獨聖湯

牡蠣散

豆淋酒

心痛

目錄 女科 五

七氣手拈散 大岩蜜湯 失笑散

經心蜀椒湯

腹痛

見延胡索散 黑神散 黑白散 惡露不盡地黃散

當歸血竭丸 溫憶居澤蘭湯 卷荷散

產乳芸薹散 枳實芍藥散 下瘀血湯

千金桃仁芍藥湯 延胡索散

香桂散 紫金丸 當歸養血丸

當歸生薑羊肉湯 內補當歸建中湯

濟生增損四物湯

腸脹痛

當歸散 抵聖湯

腰痛

千金大豆酒 生地黄湯 桃仁湯

五香連翹湯 當歸黃芪湯

頭痛

川芎散 一奇散 芎附散

加減四物湯

脚氣

獨活寄生湯

目錄 女科 五

遍身疼痛

趁痛散

中風

防風湯

川芎散

經効茯苓湯

鹿肉湯

保命血氣湯

華陀愈風散

虛極生風濟危上丹

禁口葛根湯

乾葛湯

天麻散

當歸散

伏龍肝散

交加散

角弓反張羚羊角散

一物獨活湯

一物白鮮湯

千金雞矢醴

汗多變壅大豆紫湯

大豆湯

麋羊角飲子

防風當歸散

瘕瘕

防風湯

增損柴胡湯

秦艽湯

拘攣

芎藭散

防已膏

不語

七珍散

胡氏孤鳳散

逐血補心湯

狂言謔語

烏金散

四物補心湯

顛狂

大聖澤蘭散

乍見鬼神

調經散

茯神散

栝子仁散

驚悸

白茯苓散

熟乾地黄散

產乳七寶散

大効牡丹散

遠志丸

白茯苓丸

人參散

琥珀地黄散

茯苓散

抱膽丸

恍惚

琥珀散

遠志散

天麻丸

辰砂遠志丸

虛煩

金黃散

沒藥丸

竹葉湯

甘竹茹湯

人參當歸湯

薤白湯

芍藥梔豉湯

仲景二物黃芩湯

竹皮大丸

渴

熟地黄湯

黃芩散

括萋根湯

千金竹葉湯

七味白朮散

竹葉歸芪湯

玄胡索散

桃花散

自汗

全生活血湯

麻黃根散

止汗散

人參湯

當歸六黃湯

參附湯

芪附湯

黃疸

發熱

羅氏犀角飲子 三之一湯

三分散

加味道遙散

往來寒熱

柴胡四物湯

小柴胡加生地黄湯

增損柴胡湯

雲岐熟地黄散

黃芪丸

大調經散

加減烏金散

知母湯

痲

草果飲子

生熟飲子

辱勞

石子湯

豬腰子粥

人參鼈甲散

白茯苓散

胡氏牡丹散

黃芪煮散

黃芪建中湯

虛羸

三合散

當歸羊肉湯

十全大補湯

痞悶

見睨丸



腹脹

水腫

小調經散

白朮湯

奪魂散

漢防已散

加減吳茱萸湯

加減八物湯

積聚

芍藥湯

四神散

桂心丸

霍亂

白朮散

溫中散

附子散

高良薑散

嘔吐

開胃散

石蓮散

吃逆

丁香散

羌活散

咳嗽

知母飲

喘

血竭散

雲岐參蘇飲

旋復花湯

五味子湯

大補湯

鼻衄

血崩

固經丸

芎藭湯加芍藥方

熟乾地黄散

白芍藥散

阿膠丸

菖蒲酒

瑞蓮散

月水不調

琥珀散

薑黃丸

月水不通

瀉利

調中湯

赤白痢

救急散

黃連丸

白頭翁加甘艸阿膠湯

大便祕澀

麻仁丸

大小便不通

桃花散

遺尿

淋悶

茅根湯

滑石散

小便數

桑螵蛸散

括婁湯

小便不禁

固脬散

補遺補脬飲

雞內金散

小便出血

大便下血

陰脫玉門不閉

硫黃散

桃仁膏

硫黃湯

熨法

當歸散

陰蝕

洗搨湯

甘濕散

狼牙湯

乳少

漏蘆散

湧泉散

成煉鍾乳散

玉露散

羅氏湧泉散

吹栝蒴散

皂角散

金匱如連翹湯

赤龍皮湯

天麻湯

飛鳥膏散

黃連胡粉膏散

婦人室物天癸未行之間皆屬少陰天癸既行... 陰者是神氣生化之原也厥陰海少陽相表裏故治... 法無犯胃氣及上焦為二禁不可汗不可下不可... 利小便若發汗者同傷寒下早之證利大便則麻...

大便下血

赤白帶下

流黃散

熨法

桃仁膏

當歸散

硫黃湯

天麻散

張烏膏

黃蠟代膏

豆魚醋

破鼓陳散

赤龍丸

王蠶醋

蘇力散

神效散

女科證治準繩卷之一

金壇王肯堂輯

門人南昌張緯校

治法通論

保婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆屬厥陰天癸既絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰者是祖氣生化之原也厥陰與少陽相表裏故治法無犯胃氣及上三焦為三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動於脾利小便則內亾津液胃中枯燥制藥之法能不犯此三禁則榮衛自和而寒熱止矣外則和

通治  
於榮衛內則調於清便先將此法爲初治次後詳而論之見證消息同壞證傷寒爲之緩治或小便不利大便秘結或積熱於腸胃之間或已成痿或散血氣而爲浮腫蓋產理多門故曰同傷寒壞證如發渴而用白虎氣弱而用黃耆血刺痛而用當歸腹痛而加芍藥已上例證不犯三禁謂產後之久病也若產後暴病又不可拘也如產後熱入血室者用桃仁承氣抵當湯等藥胃堅燥者大承氣不可以泄藥言之產後世人多用烏金四物湯是不分四時之寒熱不分血氣之虛實盲然一槩用藥如此而愈加增劇是誤

也大抵產病天行則增損柴胡雜證則加減四物又春夏從柴胡秋冬從四物藥性寒熱病證虛實不可不察也四物湯常宜服餌今立四時增損法於後

**養血四物湯** 益榮衛滋氣血治月水不調臍腹疔痛婦人經病或前或後或多或少疼痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露過多或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後血塊不散或吐血過多惡露不止四物湯加茱萸煎服若人陽臟少使茱萸陰臟多使茱萸一方加香附

熟地黃

補血如臍痛非此不能除乃通臍經之藥也

川芎

治風泄肝木如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥也

芍藥

和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也

當歸

和血如血刺痛刺如刀割非此不能除乃通腎經之藥也

右為籠末水煎服

春倍川芎

一曰春二曰脉三曰頭痛

夏倍芍藥

一曰夏二曰脉三曰泄

秋倍地黃

一曰秋二曰脉三曰血虛

冬倍當歸

一曰冬二曰脉沉三曰寒而不食

若春則防風四物加防風倍川芎

若夏則黃芩

四物加黃芩倍芍藥

若秋則門冬四物加天門

冬倍地黃

若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸

若血虛而腹痛微汗而惡風四物加芩桂謂之腹

痛六合 若風眩運加秦艽羌活謂之風六合

若氣虛弱起則無力冠然而倒加厚朴陳皮謂之

氣六合

氣不足而用泄氣之藥可乎當以參芪易之

若發熱而煩不

能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合 若虛寒脉

微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒

六合 若中濕身沈重無力身涼微汗加白朮茯

苓謂之濕六合 若婦人筋骨肢節疼及頭痛脉

弦憎寒如瘧宜治風六合或傷損氣血乘虛而暈

者四物湯兩四羌活防風各壹兩若血氣上衝心腹

脇下滿悶宜治氣六合四物湯兩四木香檳榔各壹兩

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合

小腹痛四物湯兩四玄胡苦棟各壹兩若氣衝經

脉故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合四物湯兩四

芍藥倍黃芪壹兩若經事欲行臍腹絞痛臨經痛

者血澀也宜八物湯四物湯兩四玄胡檳榔苦棟碎

焦木香各壹兩若婦人血虚心腹疔痛不可忍者

去地黃加乾薑名四神湯 補下元加乾薑半兩

甘草七分 氣築小腹痛加玄胡索煎服 若腹

中刺痛惡物不下倍加當歸芍藥 若腹痛作聲

經脉不快加熟地黃一倍添桂心半倍煎 經行

腹痛腰痛加芸薹牛膝紅花吳茱萸菴閣甘草

銀器燈心熱服 若經水澀少宜四物湯內加葵

花煎又加紅花血見愁 若經水少而色和者四

物湯加熟地黃當歸各壹兩若經水暴下四物湯

內加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩 若

經水如黑豆汁者加黃芩黃連各壹兩若經水過

多別無餘證宜黃芩六合湯四物湯兩四黃芩白朮

各壹兩經血淋漓不斷加乾瑞蓮房炒入藥 陰

陽交合經脉行加赤石脂黃芪肉桂百草霜藕節  
 敗櫻灰肉豆寇當歸木香龍骨白朮茯苓地榆  
 若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小柴胡  
 湯以去其寒熱後以四物湯和之如寒熱不退勿  
 服四物是謂變證表邪猶在不能效也依前論中  
 變證隨證用藥調治 若血崩者加生地黄蒲黃  
 補血任崩加百草霜櫻灰首綿灰蒲黃炒過龍  
 骨白薑 血成片加地黄藕節 黑血片人參白  
 朮 若血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾 月  
 水不調血崩或多少或前後嘔逆心膨陳艾黃芪

若赤白帶下宜香桂六合四物湯四兩桂枝香附

各五錢四物湯為細末煉蜜丸梧子大空心米飲

下三四十九治年高婦人白帶良驗 白淫濁龍

骨地黃當歸 五色研麝香好酒 鮮紅溫酒鹽

湯 帶下加肉桂蒲黃百草霜甘草黑豆白朮玄

胡索白薑龍骨空心鹽酒下 白帶加白龍骨酒

下 若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆炒煙

壹兩若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等

兩分用之王石膚云熟地黃滯血安能止痛不若以

五靈脂代之 血滯不通加桃仁紅花各貳錢半



經閉加枳殼大黃荆芥黃芩青皮滑石木通瞿  
麥海金沙山梔子車前子 血寒加甘草烏梅柴  
胡桃柳枝 月經久閉加肉桂甘草黃芪薑錢棗  
子木通紅花 月水不通加野苧根牛膝紅花蘇  
木舊酒水同煎 血氣不調加吳茱萸壹兩甘草  
半兩 四物湯加甘草半兩為細末煉蜜丸每兩  
作八九酒醋共半盞煎湯同化調下名當歸煎去  
敗血生好血如人行五里再進一服無時 若虛  
熱病四物湯與參蘇飲相合名補心湯主之 溼  
柴胡名五神湯大能補虛退虛熱 潮熱加黃芩

地骨皮柴胡一方加柴胡乾葛黃芩人參 虛熱

口乾加麥門冬黃芩壹兩 虛渴加人參乾葛烏

梅枯萋根 虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩

虛寒潮熱加柴胡地骨皮白朮茯苓甘草秦芎知

母黃芩麥芽貝母人參烏梅棗子 若四肢腫痛

不能舉動宜與蒼朮各半湯主之 若大便燥結

四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散主之 若

流濕潤燥宜四物理中各半湯 若氣血俱虛四

物與四君子湯各半名八珍湯主之加縮砂仁保

胎氣令人有子有熱加黃芩 若因熱生風者加

川芎柴胡防風無一方

血氣勞加荆芥柴胡 血

風兩脇築痛或盤腸成塊加大黃葶撥乳香 血

弱生風四肢痺疼行步艱難加人參乳香沒藥麝

香甘草五靈脂羌獨活防風荆芥地龍南星白附

子澤蘭為末蜜丸木瓜鹽湯下 血風膨脹加甘

草木香枳殼馬兜鈴葶藶紫蘇藿香地黃空心服

臟腑祕加大黃桃仁 滑泄加官桂附子 虛

瀉加人參川芎白芷蒲黃炒阿膠白朮茺莢續斷

乾薑附子肉桂黃芪赤石脂甘草蜜丸鹽梅湯下

嘔加白朮人參一方有生薑 嘔吐不止加藿香白

朮半兩人參貳錢半 嘔逆飲食不入加白朮下

香甘草人參縮砂益智仁胡椒 若欬嗽加桑白

皮半夏人參生薑北五味子甘草 感風勞嗽加

欵花知母阿膠半夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏仁

柴胡薑錢訶子烏梅 若發寒熱加乾生薑牡丹

皮柴胡一方加芍藥 如寒熱往來加炮乾薑牡牙皮

各壹分 若平常些少虛眩肢體瘦倦月信不通只用

生薑薄荷此是婦人常服之藥蓋味寡而性緩效

遲而功深 若大渴加知母石膏 若水停心下

微吐逆者加豬苓茯苓防已 若心腹脹滿加枳

穀青皮 虛汗加麻黃根 汗多加浮麥 大便  
下血四肢寒膨脹腸胃有風槐花枳殼漏蘆荊芥  
木香白鷄冠花木通紅內消紫草石榴皮陳皮青  
皮黃芩甘草白茅根槐角 腸風下血加槐角槐  
花枳殼荊芥黃芩大腹皮紅內消地榆石楠葉白  
鷄冠花爲散煎一半爲末空心鹽湯舊酒調下  
鼻衄吐血加竹青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花  
紅棗飛羅麩白茅根蚌粉 若頭昏項強加人參  
黃芩 若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風 若  
虛煩不得睡加竹葉人參 若諸痛有濕者四物

與白朮相半加天麻茯苓穿山甲用酒煎服 治  
老人風祕加青皮等分煎服 治瘡疾荊芥酒煎  
常服 妳癰加連翹茨菰子紅內消白芷菰片荊  
芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏蘆生地黃 赤眼頭  
風疾加薄荷清茶 赤眼生風加防風黃芩 風  
瘡赤腫加荊芥牛蒡子何首烏甘草防風羌活地  
黃鹽酒 腳腫加大腹皮赤小豆茯苓皮生薑皮  
若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜八物  
湯四物湯四兩黃芪白朮茯苓甘草各壹兩 若妊娠  
傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而

弱太陽經病宜表虛六合湯四物湯兩桂枝地骨

皮各七若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太

陽經病宜表實六合四物湯兩麻黃細辛各半

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而熱頭

痛此太陽標病也宜風濕六合湯四物湯兩防風

蒼朮各七若妊娠傷寒下後過經不瘳溫毒發

斑如錦紋宜宜升麻六合四物湯兩升麻連翹各

錢若妊娠傷寒胸脇滿痛脉弦少陽頭昏項強

宜柴胡六合四物湯兩柴胡黃芩各七若妊娠

傷寒大便鞭小便赤氣滿而脉沉數陽明泄

病也急下之宜大黃六合四物湯兩大黃半桃仁

十箇去皮若妊娠傷寒汗下後欬嗽不止宜人

參六合湯四物湯兩人參五味子各半若妊娠

傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六

合湯亦治欬嗽喘滿四物湯兩厚朴枳實各

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯兩梔子黃芩各半若妊娠傷寒身熱大

渴蒸蒸而煩脉長而大者宜石膏六合四物湯兩

石膏知母各半若妊娠傷寒小便不利太陽本

病宜茯苓六合湯四物湯兩茯苓澤瀉各半若

妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六

合湯四物湯四兩琥珀茯苓各半兩 若妊娠傷寒汗

下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯四物湯

四兩阿膠艾各半兩一方加乾薑甘草黃芪同 若妊娠傷

寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉而遲少陰病

也宜附子六合湯四物湯四兩附子炮去皮臍桂各半兩

若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大

黃湯四物湯四兩生地黃大黃酒浸各半兩 四物與麻

黃桂枝白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆

可作各半湯不能殫述此易老用藥大畧也 安

胎及漏胎下血加阿膠大艾甘草蒲黃炒過 若

胎動不安下血不止每服加艾葉五七片更加葱

白阿膠末黃耆減四味之半當歸只用小半如疾

勢甚者以四味各半兩細剉以水四盞熟艾一塊

如雞子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作四

服一日令盡一方加粉草乾薑黃芪日二三服至

二臘以一七日 胎前產後每日可一二服亦治

血痢不止腹痛難忍宜加阿膠艾葉煎服名六物

湯如氣虛血海不調不妨一方四物加黃芪柏葉

阿膠甘草續斷平常經血淋瀝不斷或多或少或

赤或白非時漏下多服有效 受胎小腸氣痛加  
木香懷香胎前嗽加枳殼甘草欵冬知母馬兜鈴  
半夏木通葶藶人參苦梗麥門冬 胎氣衝肝腰  
脚痺行步艱難加枳殼木通連翹荆芥地黄羌獨  
山梔甘草燈心空心服 妊娠心煩加竹茹一塊  
如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟  
地黃以生者 妊娠作惡生寒面青不思飲食憔  
悴加陳皮枳殼白木茯苓甘草 損孕下血不止  
頭痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致加黃芩荆芥生地  
黃赤芍藥生薑 臨產小腹緊痛加紅花滑石甘

草燈心葵子 產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木  
牛膝 產後腹痛血塊攻腸加大艾沒藥好酒  
若因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑煎  
若產後被驚氣滯種種積滯敗血一月內惡物  
微少敗血作病或脹或疼胸膈痞悶或發寒熱四  
肢疼痛加玄胡索沒藥香白芷與四物等分爲細  
末淡醋湯或童子小便酒調下 如血風於產後  
乘虛發作或產後傷風頭疼發熱百骨節痛每四  
物湯壹兩加荆芥穗天麻香附子石膏各貳錢五分  
每服三錢水壹盞煎至七分服 產後傷風頭痛

通治

加石膏壹兩甘草兩半 若產後虛勞日久而脉浮疾

者宜柴胡四物湯乃本方與小柴胡湯合用也

若產後諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服

之甚效 產後虛憊發熱煩悶加生地黃 產後

腹脹加枳殼肉桂各錢 產後寒熱往來加柴胡

麥門冬各兩 產後敗血築心加地骨皮芍藥

產後潮熱加白朮北柴胡甘草牡丹皮地骨皮

產後病眼加北細辛羌活荆芥菊花甘草木賊石

决明草决明 產後浮腫氣急腹大喉中水雞聲

加牡丹皮荆芥白朮桑白皮赤小豆大腹皮杏仁

半夏馬兜鈴生薑葱白薄荷 產後失音不語加

訶子人參沙蜜百藥煎 產後悶亂加茯神遠志

各半兩 胎前產後痢後風加乳香龍骨茺蔚木香

肉桂蒼朮牡丹皮白薇人參甘草澤蘭大椒藿香

煉蜜爲丸木瓜酒下 一方等分爲籠末每服四

錢水一盞半煎至八分去滓取六分清者帶熱食

前服若平常血氣不調及常服只用本方日二三

服 一方爲細末湯酒調服或以醋糊煉蜜爲丸

治帶下赤白痢陳米飲下 心腹脹炒薑酒下

血氣艾醋湯下 渾身勞倦爲末炒薑酒陳青

通治

文身一

十一

蒿鹽和調下 虛證四肢黃甘草牡丹皮澤蘭白  
薇蒼朮桂心懷香蜜丸鹽湯溫酒下 陳氏經驗

方云吳興周端仁郎中頃赴省試照曠一隣云某  
本醫家凡婦人百病只以四物湯加茱萸無不效

者產難及胎前不下子死腹中入酒同煎凡用有  
效謹以此藥不知起於何氏或云自魏華

陀陀之術精分類單省傳稱陀鍼灸不過數處  
千金之云自三代以來醫方藥論未有如此詳備

其部之漢晉各公諸方今產寶方乃宋梁時節度  
巡之其藥有四物散後脩入聖惠方自

後醫者易散為湯蓋用者若馭良馬當隨意無不

得至焉命名醫於四物中增損品味隨意虛實寒

燥皆得其要者然亦非止婦人之疾可用而已

芎歸湯元治一切去血過多眩運悶絕傷胎去血

產後崩中去血拔牙去血金瘡去血不止舉頭欲

倒悉能治之

當歸 川芎 各等分

右每服五錢水煎服不拘時 產後眩暈加芍藥

產後腹痛不可忍加官桂童便酒浸 妊娠子

死或不死胎動酒水合煎即下未死者即安 若



虛損腹痛少氣頭眩自汗每服加羊肉壹兩生薑十片水煎 若臨月服之則縮胎易生 若室女婦人心腹疔痛經水不調水煎服 若妊娠胎氣不安產後諸疾酒煎服 若難生倒橫子死腹中先用黑豆壹大合炒熟與小便合煎服 若難產用百草霜香白芷等分童便好醋各一盞沸湯浸服甚者再服即分挽矣 若傷臟毒每服加槐花末五分三日取下血塊即瘡若吐血亦服此 若血氣上喘下腫空心煎艾湯調下 若產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁

煎服 若產後頭痛加荆芥 若崩中漏下失血不止加炒香附每兩入甘草壹錢沸湯點服 若有白帶者加芍藥半兩乾薑等分米飲調下

**抑氣**

異香四神散

又名四神湯

專調理婦人室女血

氣不調胎前產後諸疾皆主之蓋女人以氣血為主殊不知因氣先不調然後血脉不順即生諸證此方大有奧理

香附子

去毛炒半觔

烏藥

炒四兩

甘草

炙壹兩

右咬咀每服五錢重水壹盞生

薑三片棗一箇煎至七分去滓空心溫服或用葱

白三寸同煎如治諸證依後加減用之立見功效  
婦人氣血不順心胸痞滿加紫蘇葉同煎 驚  
憂悶氣喜怒傷神心滿腹痛面目虛浮及一切氣  
疾並加石菖蒲同煎 血脉不調血膈番胃嘔吐  
飲食以老薑一塊燒令黑切作五片入鹽少許同  
煎 脾胃感冷亦依前用 血積血暈悶血癥血  
刺血煎熟入好醋一呷服 經血行時被風雨或  
驚憂相併經候不時名曰搖脉腹痛緊脹腰腿疼  
痛每服加炒茴香一撮同煎 血氣不順喘滿氣  
急面目浮腫加生薑紫蘇葉同煎 唾血咯紅痰

喉中腥氣加黃桑葉三四皮花桑尤佳 血滯氣  
秘大便結滯不通宜加枳殼數片或去白青皮亦  
可 凡血臟虛冷血滯腹痛血海久冷血崩赤白  
帶下小便頻數又血脉妄行滲入大腸有似腸風  
並入炒吳茱萸末一七同煎亦名溫經湯 經絡  
感熱經水沸溢血脉妄行病曰熱崩加生地黃  
凡敗血攻冲脾胃血噎氣血咳逆加生薑三片柿  
蒂五箇 血氣昏悶心腹刺痛加良薑赤芍藥以  
水酒各半盞同煎 胎脈傷食胸膈不快噎氣食  
臭心腹緊滿加南木香或宿砂仁煎 懷胎臨月

近上逼心名曰子懸依舊用薑片紫蘇同煎 產後諸疾不明血脉去留不辨虛實冷熱且宜此藥通順血氣不致差互然後隨證調理 產後寒氣入腹硬緊臍下刺痛名曰寒疝加炒吳茱萸煎服 產後因產中用力太過子宮脫下俗名癩病先用此順氣安腸兼以樗樹根或枝梗同葱白以花椒煎湯熏洗子腸自定及平居女人患此亦然 蒲黃黑神散調理室女婦人風虛勞冷一切氣血之疾及胎前產後血滯血暈惡露不快收血為疾並宜服之凡生產之後首先進烏金散壓血暈逐惡

血第二日即便常進此藥逐敗血安新血自然百病不生此方常用百發百中悉得效驗若將調理女人諸疾用煉蜜為劑每一兩三錢仲分作十九或用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服三五十九隨證用湯使各以其病立名稱之名益陰丹又名通真丸又名勝金丹又名金釵煎又名保生丸又名名四順理中散 黑豆壹升炒熟去皮香附子末四兩乾薑兩炮生薑地黃各壹兩右為末每服貳錢食前溫酒調下或以酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒米湯任下 新產敗血不散兒枕塊鞭疼痛

通治  
者童子小便下 臨產胎死腹中或死胎不下以  
黑豆一合醋煮豆熟爲度調藥七分蓋服暖其胎  
卽自下 臨產之時胞衣不下以童子小便同煎  
酒調下 產後惡露不快血暈冲心眼昏黑悶昏  
口禁不省人事並用溫酒調下若稍重可用秤鎚  
淬酒服 前項黑神散以煉蜜和劑爲丸如梧桐  
子大名四順理中丸 新產五脂暴露羸弱少氣  
體常自汗以米飲吞下三十九空心服 若以煉  
蜜爲丸如彈子大治胎前名保生丸理婦人初受  
胎時胎氣不安多卧少起不進飲食名曰惡阻每

服一丸細嚼以苧根糯米煎飲送下或以秦艽糯  
煎飲亦可 又漏胎下血不止或下黃赤汁腰腹  
痛重以溫酒嚙下兼以膠艾湯法艾湯六物湯安  
胎飲 又有初結胎氣盛煩壅嘔逆痰涎不喜飲  
食過腹膨脹以淡竹刮青同橘皮煎湯送下兼以  
茯苓半夏湯或二陳湯下 若因房勞動胎下血  
名曰傷胎溫酒下 若妊娠數經墮胎多至半產  
漏下用溫酒服氣順揖血自然胎息安固 若妊  
娠日月不足而一向似欲產者以真知母煎湯下  
若 娠胎上逼心胎不近下川芎煎湯下 若

妊娠至七八月常服養胎益血安和子臟仍令易  
 產以枳殼糯米煎湯下但糯米飲下亦得 若產  
 後用名勝金丹治產後一切諸疾並以溫酒或米  
 飲下 若補理血虛血勞血氣血風等病名益陰  
 丹以溫酒米飲下 若女人血冷面白脫色青筋  
 迸露以酒服良驗 若調理經候滋養少女名金  
 釵煎丸是經候不調月水湛濁腹常刺痛及室女  
 血弱陰虛經脉不勻並依前酒飲送下 又一等  
 少女經脉已行一二次復至一二年又不行或有  
 四季一行或有三五箇月復至此本血脉柔弱未

克故行脉斷續宜以此藥 亦潤血血旺自通不  
 必攻之不爾成血癥積塊 成血劫勞氣傳為骨  
 蒸勞瘵兼百一方沉香勝金丹滋血湯佐之若婦  
 人時行雜病用大聖通真丸 治諸中風口禁角  
 弓反張手足躡曳並以羌活同黑豆炒酒下兼以  
 小續命湯烏荆丸之類 又婦人漏下五色及治  
 血少氣寒面色青白及產後百日内常服能除宿  
 血生養新血兼益氣補虛調和衝任不生諸疾皆  
 以溫酒米飲下  
 前蒲黃黑神散其中萬品佐助溫印看不上眼而

自有妙理與大局方法不同臨產對證且如妊娠  
一節至精纔媾一氣方凝經云祕法潮養胞源稍  
著寒溫卽致損墜故經云舉寒爲痛傷熱而驚峻  
僭湯劑勿可妄用怒傷胎氣及其生產之後百節  
開張去血過多津液燥少陰陽俱虛臟腑怯弱偶  
有疾傷卽成危殆故經云犯時微若秋毫感病重  
於嵩岳故涼冷之劑剛燥之藥尤戒輕用轉生他  
病若委有冒風感熱之疾亦是和解隨證調理縱  
有虛寒極冷之後亦宜用性溫平和之藥救療漸  
次加進太溫藥調治切戒粗疎若依此說則產後

胎前百無一失不可取目前之急亂投湯劑反致  
其禍罪福非輕切須記之

推氣養血 莪朮散

隨證斟酌量加入

莪朮

煨

川芎

當歸

去尾

熟地黃

酒蒸洗

白芷

茴香

楊芍藥

甘草

各壹兩

右爲細末每服貳錢鹽酒調下 月水不調銀器  
燈心 安胎黃芪生地黃 補虛調氣生薑紅棗  
遍身虛腫當歸酒 小便不通滑石末 心虛  
硃砂研末調 敗血冲心腹疼如刀刺燒秤鍾紅

淬酒如不退五靈脂酒 血閉身疼炒薑酒 吐

酸水丁香七粒煎湯 血風上攻眼目浮腫荆芥

小腹痛木瓜 渾身浮腫薑湯或葱湯 胃虛

惡心藿香 頭面腫赤豆荊芥湯下 血不止木

香湯 冷嗽桑白皮乾柿 頭痛川芎細辛 血

風潮熱生薑紅棗 虛汗麻黃根 吐不止青陳

皮 血風腰痛芸薹子搥碎 女人血結不通手

發攣急不知其數薺菜一撮順流水挪汁 手足

痺樟柳根浸酒 女人血氣成塊築心銀子燈心

血崩赤白帶真龍骨末好紅酒調 血風中心

狂言亂語渾身壯熱桃柳枝七寸 血刺成塊不

散菴藺 女人瘕氣膈氣炒茴香酒 婦人不問

虛熱傷風潮熱增寒一切百病先以三服隨證湯

引投之服以他藥調理無不應驗 冷嗽豬血

心燥豬肝酒 催生順流水滑石禹餘糧榆白皮

坯子乳香葵子酸車草汁煎湯黃柞葉垂下者

胎衣不下再加茂朮地黃竹青 行血菴藺生地

黃紅花蘇木陳艾減楊芍藥加赤芍藥稍

玉僊散

治婦人諸疾

香附子 瓦器炒黑 色勿焦

白芍藥 各壹兩

甘草 壹錢

右為細末每服三錢沸湯下 血崩不止竹葉煎  
 湯下 月水不行手足熱加生薑炒當歸煎木通  
 湯下 月水不勻當歸酒下 頻頻下血不住米  
 飲下 氣痛及老婦人忽下血加炒薑黃炒陳皮  
 湯任下

**理氣活血消積濟陰丹** 治婦人血海虛冷久無子

息及產後敗血冲心中風口噤子死腹中攣開口  
 灌藥須臾生下便得無恙治墮胎腹中攻刺痛橫  
 生逆產胎衣不下血暈血癖血崩血滯血入四肢  
 一應血臟有患及諸種風氣或傷風吐逆咳嗽寒

熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下  
 乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不定因此成  
 疾室女經脉不通並宜服之常服煖子宮和血氣  
 悅顏色退風冷能消除萬病

三稜 貳兩

蓬朮 壹兩切片煨

蒼朮 泔浸去皮

枳殼 去穢

大艾 去梗

劉寄奴

香附子 淨

敗薑 各壹兩半

烏豆 叁合已上九味以穀

醋叁升煮乾取出焙乾

當歸身 酒蒸

橘皮 去白細紅者佳

白芍藥 各壹兩半

蒲黃 隔紙炒

牡丹皮 去骨

官桂 去粗皮

赤芍藥

片薑黃



通治

青皮 去白各壹兩

生地黄 酒浸

熟地黄 酒浸

川芎 各七錢半

玄胡索 炒

五靈脂 酒煮

白朮 煨各半兩

右為細末以糯米粉穀醋打糊為丸如梧桐子大每服五十九丸空心沉香湯送下蘇湯鹽湯下亦可南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁已上諸疾皆令孕育不成以致絕嗣此藥治產後百病百

碎內常服除宿血生新血令人有子亦生子充實亦治男子亡血諸疾

木香 炮

京墨 煨

茯苓

桃仁 去皮尖麩炒各壹兩

蠶布 燒

藁本

秦艽

石斛 酒浸炒

桔梗 炒

人參

甘草 各貳兩

牡丹皮 去心

乾薑 炮

細辛

桂心

當歸

川芎 各半兩

蒼朮 米泔浸八兩

大豆卷 炒半升

川椒 去目并合口炒出汗

山藥 各叁兩

澤蘭葉

熟地黄 酒浸蒸焙

香附子 炒各四兩

通治

女科

三

糯米炒壹升

右為細末煉蜜和丸每兩作六丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒送下淡醋湯化服亦可空心食前服一方山藥川椒各三兩或以醋糊為丸如梧桐子大每服五十九丸依前服亦可

**理氣行血**

皴血丸

治婦人血海虛冷百病變生氣

血不調時發寒熱或下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白癥瘕癰塊攻刺疼痛小便緊滿脇肋脹痛腰重脚弱面黃體虛飲食減少漸成勞狀及經脉不調胎氣多損產前產後一切病患無不

治療

菊花去梗

茴香

玄胡索炒

香附炒酒浸一宿焙

肉桂去粗皮

當歸

芍藥

熟地黃

牛膝

蒲黃

蓬朮各叁兩

右為細末用烏豆一升醋煮候乾為末再入醋二盞煮至一盞留為糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒或醋湯送下血氣攻刺炒薑酒下癥瘕絞痛當歸酒下忌鴨肉羊血此藥煖子宮令人有子及治皴血損調衝任煖血海及胞絡傷損宿瘀乾血

理氣和血 加味五積散

蒼朮

壹兩米泔浸炒

白薑

陳皮

各壹兩

厚朴

去粗皮薑汁炒

半夏

洗

枳殼

炒

楊芍藥

香附子

炒去毛

桔梗

人參

去蘆

茯苓

去皮

川白芷

川芎

當歸

去土

茴香

炒

木香

肉桂

粉草

各壹兩

右剉碎生薑木瓜入鹽煎服

陰證傷寒生薑附

子 血脈不勻紫蘇

氣嗽烏梅薑錢

勻經棗

子 薑錢

補益血海蘇鹽

產後生薑醋炒陳艾

胃冷不納食陳皮縮砂

赤白帶陳米

冷氣

疾木香茱萸

心燥背筋急頭暈腰脚痠生地黃

當歸

脾虛蘇葉粉草月中被驚或因爭觸心頭

結塊五膈五噎茴香棗子

口苦舌乾吞酸噫氣

此為胃冷生薑鹽

腰痛桃仁木瓜杜仲川續斷

身疼秦艽

諸虛脾胃不和羸瘦冷氣蘇鹽

冷瀉炒過生薑烏梅肉荳蔻陳米各煎湯

養血潤燥

卷柏丸

治婦人衝任本虛血海不足不能流通經絡月水不調赤白帶下三十六疾並皆

治之常服和經絡煖五臟潤肌膚長髮去黥除風

治之常服和經絡煖五臟潤肌膚長髮去黥除風

令人有子

卷柏 去根

當歸 洗焙

艾葉 炒各

熟地黃 洗焙

川芎

白芷

柏子仁 微炒

肉苁蓉

牡丹皮 各壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九丸用

溫酒或米飲送下空心食前服

**溫經之劑氣血攻補備焉** 烏鷄煎丸 和劑 治婦人胎前

產後諸般疾患並皆治之

烏雄鷄 壹隻

烏藥

石牀

牡丹皮

人參

白朮

黃芪 各壹兩

蒼朮 木泔浸切焙壹兩半 海桐皮

肉桂 去粗皮

附子 炮去皮臍

白芍藥

蓬莪朮

川烏 炮

紅花

陳皮 各貳兩

玄胡索

肉苳蔻

木香

琥珀

熟地黃 洗焙

草菓 各半兩

右細剉用烏雄鷄一隻湯搯去毛及腸肚將上件藥安放鷄肚中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去鷄骨以油單盛焙乾為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸胎前產後傷寒蜜糖酒下

胎前氣悶壯熱炒薑酒下 赤白帶下生薑地黃

酒下 產後敗血注心童子小便炒薑酒下 產

後血塊填築心腹疼痛玄胡索酒下 胎前嘔逆

薑湯下 催生炒蜀葵子酒下 安胎鹽酒下

室女經脉當通不通四肢疼痛煎紅花酒下 血

氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒下 血暈櫻櫚燒灰

酒下 吞下 血邪研硃砂麝香酒下 血悶煎烏

梅湯研硃砂下 子宮久冷温酒或棗湯下空心

日一服 血風勞人參酒吞下 小腹疝痛炒茴

香鹽酒吞下 血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆

酒下 常服温酒醋湯任下並空心食前服

**温經瀉脫**

小白薇丸和治婦人衝任虛損子藏受寒

久無子息及斷續不產此由上熱下冷百病滋生

或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因

產乳不能將護路厠太早或久坐濕地或冷風從

下入血藏既虛風邪内乘或月水當行失於調攝

傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結

伏致使胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少

夜多盜汗面上黧黯齒搖髮落脚膝疼重舉動少

力竝宜服之

覆盆子

去梗

菖蒲

微炒

遠志

去心

桃仁

去皮尖麩炒黃

白茯苓

去皮

藁本

去苗

卷柏

去根

肉桂

去粗皮

人參

白芷

各參分

白龍骨

川椒

去日并合口者炒出汗

白薇

去苗各壹兩

乾薑

炮

細辛

去苗

蛇牀子

炒

當歸

去蘆

車前子

芎藭

各半兩

熟地黄

麥門冬

去心各壹兩半

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心用溫酒或米飲送下此藥常服壯筋骨益血氣煖子宮除風冷令人有子

白聖丹

劑和

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒咳逆煩滿抑息短氣心脇腰背肚腹與子藏相引痛漏下五色心常恐懼遇恚怒憂勞卽發皆是內傷所致

白聖

牡蠣

煨研

細辛

禹餘糧

火煨紅醋淬研

龍骨

煨研

附子

炮去皮臍

石葦

去毛

烏賊魚骨

煨

黃連

去毛

茯苓

去皮

肉桂

去麁皮

瞿麥穗

白欝

芍藥

白芷

白石脂

煨

當歸

去苗

乾薑

炮

人參

甘草 炙各壹兩

川椒

去目并合口者炒出汗半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空

心用溫酒送下一方無人參

**溫經養血**

琥珀澤蘭煎和治婦人三十六種血氣八

風五痺七癥八瘦心腹刺痛中風癱瘓手足痠疼

乳中結瘀妊娠胎動胎死不出產衣不下敗血湊

心頭旋眼花血症四肢渾身浮腫衝任久虛絕產

無嗣早晚服食或因有子經脈不調赤白帶下惡

心嘔逆身體瘦倦懷入月一日一服滑胎易產

琥珀

澤蘭葉 去梗

牡丹皮 去心

紫巴戟

去心糯米炒

茴香

五味子 去梗

五加皮

劉寄奴草 去枝

白芷

川當歸

酒浸

赤芍藥

金釵石斛

去根酒浸

川芎

白芍藥

生地黃

洗焙

熟地黃

洗焙

人參

白朮

附子

艾葉

醋炒糯米糊調成餅焙乾而末各壹兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用

溫酒磨化服 漏胎刺痛者糯米飲下 寒熱往

來四肢煩疼煎青蒿酒下 婦人室女經閉煎紅

花酒下 血暈不省人事童子小便和煖酒下

催生雞子清和酒下 血氣血塊攻刺心腹燒秤

錘淬酒下 傷寒及中風口噤煎麻黃湯下以被

蓋出汗即愈 心驚悸及頭痛薄荷酒下 咳嗽

煎桑白皮湯下 血風攻症渾身瘙癢頭面麻痺

炒黑豆浸酒下 產後產前常服不生諸疾甚效

**溫經通氣神血** 內灸散劑和治婦人產前產後一切血

疾血崩虛憊腹脇滿痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積

塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅

脹瀝血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷

劣弱月水不調下血墮胎血迷血暈血痕時發疼

痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛

多汗手足逆冷並宜服之

茴香 藿香 丁香

熟地黄洗焙 肉桂去皮各壹兩半 川芎

藁本 黃芪去蘆 乾薑炮各貳兩

木香壹兩 陳皮去白肆兩 白芍藥拾兩

當歸去蘆 山藥 白朮

白芷 甘草炙赤各捌兩

右為末每服三錢水一大盞入生薑五片艾一團



通治  
同煎至七分空心食前熱服溫酒調亦得 如產  
後下血過多加蒲黃煎 惡露不快加當歸紅花  
煎 水瀉加肉苳蔻末煎 嘔吐加藿香生薑煎  
上熱下冷加荊芥煎 但是腹中虛冷血氣不  
和並宜服之產後每日一服則百病不生丈夫虛  
冷氣刺心腹疼痛尤宜服之

**和血溫經勝金丸** 治婦人久虛無子及產前後一  
切病患兼治男子下虛無力此藥能安胎催生妊  
胎臨月服五七丸產時減痛婦人無子是子宮冷  
如服二十九丸男女自至又治積年血風脚手麻痺

半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結  
痛吐逆心痛子死腹中繞臍痛氣滿煩悶失蓋汗  
不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不  
禁中風不語口噤產後痢疾消渴眼前見鬼迷暈  
敗血上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無  
度血痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後  
血癖產後羸瘦凡婦人衆疾不問年深日近並宜  
服之一方名不換金丸治婦人諸虛不足心腹疼  
痛

藻本

當歸

石脂

赤白  
皆可

白芍藥

人參

白薇

川芎

不見火

牡丹皮

桂心

白芷

白朮

米泔浸

白茯苓

玄胡

甘草

炙江西安撫司甘草沒藥減半

沒藥

各壹兩

右為細末鍊蜜和丸如彈子大每服一九溫酒化下初產了用熱醋湯下食前服此方係王承宣惠祖傳渠家凡婦懷身便服此藥甚有神效常服尤妙係在京師於能家傳一方有沉香無沒藥一方有附子無沉香

溫經理氣 沉香煎丸

沉香

貳錢半

丁香

壹兩

麝香

貳兩

白朮

柒錢

官桂

乾薑

縮砂仁

白荳蔻

檳榔 各伍錢半

青皮

南木香

肉荳蔻

胡椒

人參

生薑屑

訶子肉

陳皮

甘草 各半兩

右為細末鍊蜜和丸如棗子大每服一九細嚼生薑湯下溫紅酒赤可空心食前日進三服

溫中龍骨散

治腹下十二經絕產一日

通治  
白帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子  
藏堅六曰藏癖七曰陰陽患痛八曰內強九曰腹  
寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼交  
並宜服之

龍骨 參二兩

半夏

黃蘗

竈中黃土

桂心

乾薑 各貳兩

石葦

滑石 各壹兩

烏賊魚骨

代赭 各肆兩

白殭蠶 伍枚

右治下節酒服方寸七日三白多者加烏賊骨殭  
蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃隨二

兩子藏堅加乾薑官桂各二兩以上多柏病增之  
服藥三月有子即住藥太過多生兩子當審方取  
好藥寡婦童女不可妄服

治諸雜之邪 妙應丹 治婦人衆疾無所不治

晚蠶沙 炒

鯉魚鱗 燒為末

當歸 去蘆

石膏 煨研

澤蘭 去梗

附子 泡去皮去蘆

木香 炮各貳兩

熟地黃 酒洗蒸焙

防風 去蘆

蕪荑 炒

馬牙硝

柏子仁 微炒別研

川芎

人參

黃芪

蟬蛻 去足洗焙

白薇

檳榔 不昇火

通治 女科一

川椒微炒各壹兩

吳茱萸湯泡赤次

紅花炒各半兩

藁本去苗

白薑炮

厚朴去粗皮薑製

甘草炙各參兩

右為細末鍊蜜搜和杵數千下丸如彈子大每服

一丸 血痕塊病綿灰酒下 催生細嚼溫酒下

血勞血虛桔梗酒下 血崩櫻櫚灰酒下 血

氣痛炒白薑酒下 血風荆芥酒下 血暈悶絕

胎死腹中胞衣不下並用生地黃汁童子小便酒

各一盞煎二沸調下 常服醋湯溫酒化下並空

心食前服

萬應紫苑丸 療臍腹久患疝癖如椀大及諸

黃病每地氣起時上氣衝心遶臍絞痛一切蟲咬

十種水病十種蠱病反胃吐食嘔逆惡心飲食不

消天行時病婦人多年月水不通或腹如懷孕多

血天陰即發又治十二種風頑痺不知年歲晝夜

不安夢與鬼交頭白多屑或哭或笑如鬼魅所著

腹中積聚腹痛及治小兒驚癇大人癲狂一切風

及無孕婦人身上頑麻狀如蟲行四肢俱腫呻吟

等疾並皆治之功效不可具述

紫苑去苗土

柴胡去鬚

菖蒲

通流

吳茱萸 湯泡七次焙乾 厚朴 薑製各壹兩

桔梗 去蘆

茯苓 去皮 皂角 去皮子炙

黃連 去鬚

桂枝 乾薑 炮各捌分

川烏 泡去皮柴錢

羌活 去蘆 獨活 去蘆

防風 去蘆

巴豆 去皮出油 人參 去蘆

蜀椒 去目并閉口者微炒

出汗各半兩

右為細末研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三丸漸加至五七丸食後臨卧生薑湯送下初有孕者不宜服 痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血痢米飲湯下 墮傷血悶四肢不收酒下

蛔蟲咬心檳榔湯下 氣噎憂噎荷葉湯下 打

撲傷損酒下 中毒蒂灰甘草湯下 一切風升

麻湯下 寸白蟲檳榔湯下 霍亂乾薑湯下

咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆淋酒下 陰毒傷寒

溫酒下 吐逆生薑湯下 食飲氣塊麩湯下

時氣井花水下 脾風陳皮湯下 頭痛茶下

心痛溫酒下 大小便不通燈草湯下 因物所

傷以本物湯下 吐水藜蘆湯下 熱病乾薑湯

下 小兒天風吊搖防風湯下防已亦可 小兒

疳痢葱白湯下 小兒乳食傷白湯下 月信不

通流

通流

通流

通流

通煎紅花酒下 婦人腹痛川芎湯下 懷孕半

年後漏胎艾湯下 有子氣衝心酒下 產血暈

溫酒下 血氣痛當歸酒下 產後心腹脹滿豆

淋湯下 難產益智湯下 產後血痢當歸湯下

赤白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲下

室女血氣不通酒下 子死葵子湯下

溫白丸 治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失

心憂愁思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹

中一切疾病有似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌

或哭者或如鬼所使但服此藥無不愈者

桔梗

柴胡

菖蒲

吳茱萸

湯泡七次焙乾

紫苑

去苗土

黃連

去毛

肉桂

去粗皮

厚朴

去粗皮薑汁炙

人參

去蘆

茯苓

去皮

皂角

去皮炙

蜀椒

去目并合口炒出汗

巴豆

去皮心膜出油炒細研各半兩

川烏

炮去皮臍貳兩半

右為細末研勻煉蜜丸梧子大每服三丸漸加至

五七丸食後臨卧薑湯送下

製

製

五斗水食對調曰薑湯送下

白燕末和曰刺蜜丸對干太再期三式漸成至

豆炒碎各半兩

荊苓去支

肉桂去脂皮

吳茱萸文部神

計對

阜佩去支

厚朴去支

紫菀去支

柴胡

川烏煮兩半

滑石去支

人參去支

黃蘗去支

葛根

調經門

經候總論

良岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣癸謂壬癸之水壬為陽水配丁而化木癸為陰水合戊而化火故曰水火者陰陽之徵也女子陰類故得癸焉衝為血海任主胞胎二脉流通經血漸盈應時而下天真氣降與之從事故曰天癸也常以三旬一見以像月盈則虧不失其期又名月信也若遇經行最宜謹慎否則與產後證相類若被驚恐勞役則血

調經

女斗

三六

氣錯亂經脉不行多致勞瘵等疾若逆於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血而瘵癰癆若經血內滲則竅穴淋瀝無已凡此六淫外侵而變證百出犯時微若秋毫成患重如山岳可不畏哉 薛血者水穀之精氣也和調五臟灑陳六腑在男子則化為精在婦人上為乳汁下為血海故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然 良婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脉損手太陽少陰之經蓋衝任之脉皆起於胞中

為經絡之海與手太陽小腸手少陰心經為表裏上為乳汁下為月水然月水為經絡之餘苟能調攝得宜則經應以時矣 薛經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行東垣先生謂脾為生化之原心統諸經之血誠哉是言也竊謂心脾平和則經候如常苟或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損心火妄動則月經不調矣有先期而至者有後期而至者其說詳見後條蓋血生於脾土故云脾統血凡血病常用苦甘之劑以助陽氣而生陰血也



辨色丹經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往往見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行溫熱之劑則禍不旋踵矣良由病原論月水諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑北方水色也紫淡於黑非冷而何予曰經曰元則害承

乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也况婦人性執而見鄙嗜欲加倍藏府厥陽之火無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋千百一二者也冷證外邪初感入經必痛或不痛者久則鬱而變熱矣且寒則凝既行而紫黑故非寒也

經色紫黑為熱

四物湯

時兩

黃芩

黃連

各壹兩

右為末醋糊丸服

丹月經黑口渴倦怠形短色黑脉不勻似數

赤芍藥

香附米

各半兩

黃蘗

炒

黃芩

各叁錢

甘草

貳錢

調經

女科

三八

右為末醋糊丸白湯下五六十九

永康胡八娘子二十歲二月經事不來忽行小腹痛有塊血紫色

白芍藥

白朮

陳皮各半兩

黃芩

川芎

木通各貳錢

甘草炙少許

何儒人氣滯血澀脉不澗經不調或前或後紫色口苦兩大腿外麻木有時痒生瘡大便秘滯

麻子仁

桃仁

芍藥各貳兩

枳殼

白朮

歸頭

威靈仙

訶子肉

生地黄

陳皮各伍錢

大黃煨柒錢

各為末粥丸如桐子大白湯下五六十九

經色淡為虛

丹經水色淡者氣血俱虛也宜八物湯之類八物者四物四君子也如兼它證隨證加藥

樓婦人年四十八因有白帶口渴月經多初血黑色

後來血淡倦怠食少臍上急

白朮壹錢半

白芍藥

陳皮各壹錢

木通

枳殼

黃芩各伍分

縮砂仁

甘草炙各叁分

紅花壹許

調經 右煎湯下保和丸參拾九抑青丸貳拾九

**審多少** 婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發疼痛醫者不審一例呼為經病不知陽勝陰陰勝陽所以服藥無效蓋陰氣乘陽則包藏寒氣血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當和血氣平陰陽斯為福也  
陽勝陰月候多者當歸飲  
當歸飲 抑陽助陰調理經脉  
當歸 微炒 地黄 酒蒸焙 川芎

白朮 白芍藥 黃芩 各等分

每服參錢水一盞半煎至八分空心溫服

陰勝陽月候少者七沸湯

七沸湯 治榮衛虛經水愆期或多或少腹痛

當歸 川芎 白芍藥

蓬朮 熟地黄 川薑

木香 各等分

每服肆錢水一盞半煎至八分溫服

經水過多為虛熱為氣虛不能攝血

海四物加黃芩白朮湯 治經水過多

調經 女科 巳

四物湯

肆兩

黃芩

白朮

各壹兩

丹經水過多

黃芩

炒

芍藥

炒

龜板

炙各壹兩

椿樹根皮

柒錢半

黃蘗

炒叁錢

香附

貳錢半

右為末酒糊丸空心白湯下五六十九

丹一婦人脉弦而大不數形肥初夏時倦怠月經來

時多此稟受弱氣不足攝血故行多

白朮

壹錢半

黃芪

生

陳皮

各壹錢

人參

伍分

甘草

炙叁分

經水澀少為虛為澀虛則補之澀則濡之

海四物加葵花湯

治經水澀少

四物湯

肆兩

葵花

壹兩

一方又加紅花血見然

四物湯加熟地黃當歸湯治經水少而色和

四物湯

肆兩

熟地黃

當歸

各壹兩

脉師曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師

曰曾更下利若汗出小便利者可何以故師曰亾其

津液故令經水反少設經下多於前者當所苦困當

言恐大便難身無復汗也

先期後期

王子亨曰經者常候也謂候其一身之陰

陽愆伏知其安危故每月一至太過不及皆為不調

陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致  
丹經不及期者血熱四物湯加黃連 肥人不及日數而多痰者血虛有熱南星白朮蒼朮黃連香附川芎作丸  
薛先期而至者 有因脾經鬱滯者宜歸脾湯 方見雜病健忘門  
味道遙散 有因肝經怒火者宜加味小柴胡湯 方見傷寒少陽病  
有因血分有熱者宜加味四物湯 即四物加柴胡片皮山梔 有因勞役火動者宜補中益氣湯 方見雜病勞倦門  
先期湯 治經水先期而來宜涼血固經

生地黄

川當歸

白芍藥

各壹錢

黃蘗

知母

條芩

各壹錢

黃連

川芎

阿膠

炒各捌分

艾葉

香附

炙甘草

各柒分

水二鍾煎一鍾食前溫服

金匱土瓜根散

治帶下經水不利小腹滿痛經一月再見者

月再見者

土瓜根

芍藥

桂枝

麈蟲

各柒錢半

右四味杵為散酒服方寸匕日三服

按仲景此方乃破堅下血之劑則經不及期有汗血者矣前論所未及也欲知汗血有無須以小腹滿痛與不滿痛別之

過期丹經水過期血少川芎當歸人參白朮與痰藥過期色淡者痰多也二陳湯加芎歸過期色紫有塊血熱也必作痛四物湯加香附黃連薛過期而至者有因脾經血虛者宜人參養榮湯有因肝經血少者宜六味地黃丸有因氣虛血弱者宜八珍湯三方並見雜病虛勞門過期飲治經水過期不行乃血虛氣滯之故法當

補血行氣

熟地黃

白芍藥

當歸

香附各貳錢

川芎壹錢

紅花柒分

桃仁泥陸分

蓬莪茂

木通各伍分

甘草

肉桂各肆分

水二鍾煎一鍾食前溫服

滋血湯治婦人心肺虛損血脈虛弱月水過期

人參

山藥

黃芪各壹錢

白茯苓去皮

川芎

當歸

白芍藥

熟地黃各壹錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

三月一  
來為居  
經

脉師曰脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為  
可否者此為居經三月一來師曰寸口脉微而澀微  
則衛氣不足澀則血氣無餘衛不足其息短其形躁  
血不足其形逆榮衛俱虛言語謬誤跌陽脉浮而濇  
濇則衛氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣澀則失液  
少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒濇則血不來  
此為居經三月一來 問曰婦人妊娠三月師脉之  
言此婦人非軀今月經當下其脉何類何以別之師  
曰寸口脉衛浮而大榮反而弱浮大則氣強反弱則

養血

少血孤陽獨呼陰不能吸二氣不停衛降榮竭陰為  
積寒陽為聚熱陽盛不潤經絡不足陰虛陽往一作實  
故令少血時發洒淅咽燥汗出或溲稠數多唾涎沫  
此令重虛津液漏泄故知非軀畜煩滿血月稟一經  
三月一來陰盛則瀉名曰居經謂右脉浮大  
左脉反弱也  
**調經平劑** 簡易方當歸散 治經脉不勻或三四月  
不行或一月再至

當歸

川芎

白芍藥

炒

黃芩

炒各  
壹兩

白朮

山茱萸肉

壹兩  
半

右為細末空心温酒調下貳錢日三服 如冷去

調經 黃芩加肉桂壹兩

人參養血丸和劑 治女人稟受素弱血氣虛損常服

補衝任調經候暖下元生血氣

烏梅肉叁兩 熟地黄伍兩 當歸貳兩

人參 川芎 赤芍藥

蒲黃炒各壹兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服八十九温酒米飲

任下

逍遙散和劑 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽

潮熱

當歸 白朮 白芍藥

柴胡 茯苓各壹兩 甘草炙半兩

右咬咀每服半兩入薑薄荷葉煎服

薛新甫加牡丹皮山梔炒各伍分名加味逍遙散

神巧萬全方無當歸芍藥甘草有人參黃芪各等

分

增損四物湯 治月事不調心腹疼痛補血温經注

顏

川芎 當歸 芍藥

熟地黄 牡丹皮 白朮各壹錢半

調經 六斗 四



地骨皮

壹錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

氣

濟生方論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒憂思悲恐驚者七氣也七情之外益之以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身血隨氣行氣一壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事將行預先作痛或月事已行淋瀝不斷心腹作痛或遵腰脇或引背脊上下攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀類驚癇或作寒熱或為癥瘕肌肉消瘦非特不

能受孕久而不治轉而為瘵疾者多矣

戴復菴云婦人每月經水應期而下不使有餘猶太陰之缺也其有或先或後或少或多或欲來先病或遇來而斷續皆謂之不調和氣飲加香附子半錢兼

燕獨附丸

升麻和氣飲

見雜病水腫門

澹寮煮附丸

治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭

暈惡心崩漏帶下並宜服之

香附子

擦去皮不以多少米醋浸壹日用瓦銚煮令醋盡

右醋糊為丸梧子大日乾每五十九淡醋湯下

調經

女科

五

一方香附壹斤艾葉肆兩當歸貳兩製同名艾附

丸

沉香降氣散 順氣道通血脈

烏藥

木香

香附子

縮砂仁

甘草 各等分

右為細末每服貳錢空心鹽湯調下

嚴氏抑氣散 治婦人氣盛於血變生諸證頭暈膈

滿

香附子 肆兩

茯苓

甘草 炙各壹兩

陳皮 貳兩

右為末每貳錢食前沸湯調下

紺珠正氣天香湯 治婦人一切氣氣上湊心心胸

攻築脇肋刺痛月水不調

台烏藥 貳錢

香附子 捌錢

陳皮

蘇葉 各壹錢

乾薑 半錢

右咬咀每七八錢水煎服

右抑氣例 煮附丸醋製佐以當歸則氣中之血

藥也今世以童便酒醋鹽水四製而以四物佐之

皆本於此人人知之故不著 氣鬱多者宜於雜

病氣證門中選用不必拘此

問

大

二

婦氣

東垣益胃升陽湯 治婦人經候不調或血脫後脉

弱食少水泄日二三行

黃芪 貳錢 白朮 叁錢 炒麴 壹錢半

當歸身 陳皮 炙甘草

人參 各壹錢 升麻 柴胡 各半錢

黃芩 半錢 秋去之

右咬咀每服半兩水煎腹痛加芍藥嗽去人參

補中益氣湯 治婦人室女經候不調脉微食少體

倦或熱 方見雜病首 冊勞倦門

四君子湯 六君子湯 方見雜病首 冊虛勞門

右補氣例

大溫經湯 治衝任虛損月候不調或

來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損

娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱並皆治之

吳茱萸 湯泡 牡丹皮 白芍藥

肉桂 去麤皮 人參 當歸 去蘆

芎藭 阿膠 碎炒 甘草 炙各 壹錢

麥門冬 去心 半夏 貳錢半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

小溫經湯 治經候不調血臑冷痛

婦經 婦人

當歸

附子炮各等分

右咬咀每服參錢水一盞煎捌分空心温服

温經湯劑和治婦人血海虛寒月水不調

川芎

當歸

芍藥

蓬朮各壹錢半

人參

牛膝各貳錢

桂心

牡丹皮各壹錢

甘草半錢

水二鍾煎至一鍾不拘時服

滋血湯 滋養榮血補婦人治血海久冷

當歸壹錢半

川芎

麥門冬去心

牡丹皮

人參

芍藥

琥珀另研各壹錢

半夏麴

官桂

阿膠炒

酸棗仁

甘草各半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

加味吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後

或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時

頭眩飲食或少氣滿心怯肌肉不澤悉皆治之

半夏貳錢

吳茱萸

當歸各壹錢半

麥門冬去心

乾薑

白茯苓

苦梗

南木香

防風

牡丹皮

甘草各壹錢

官桂

北細辛 各半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食前服

桃仁散 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四體虛倦不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來多忌酸物

桃仁 半夏 當歸

川牛膝 桂心 人參

蒲黃 牡丹皮 川芎

澤蘭葉 各壹錢 赤芍藥 生地黄 各壹錢半

粉草 半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

薑黃散 治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

薑黃 片子者 白芍藥 各貳錢 玄胡索

牡丹皮 當歸 各壹錢半 蓬朮

紅花 桂心 川芎 各壹錢

右作一服水二鍾酒半鍾煎至一鍾不拘時服

紫石英丸 本 治婦人病多是月經乍多乍少或前或

後時發疼痛醫者一類呼為經病不曾說是陰勝

陽是陽勝陰所以服藥少效蓋陰氣乘陽則胞寒

氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令  
乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂  
天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當別其  
陰陽調其血氣使不相乘以平為期宜服此丸

紫石英 細研水飛

川烏 炮

杜仲 炒去絲

禹餘糧 煨醋淬

遠志 去心

澤瀉

桑寄生

桂心

龍骨 別研

當歸

人參

肉蓯蓉 酒浸

石斛

乾薑 炮

五味子

甘草 炙各壹兩

牡蠣 煨

川椒 去目并合口者不用

炒出汗各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食  
前用米飲湯下

暖宮丸 治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕

育崩漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黃 陸兩

赤石脂 火煨

海螵蛸

附子 炮去皮臍各叁兩

禹餘糧 致兩火煨醋淬

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九空  
心用溫酒或醋湯送下

內補當歸丸 治血氣虛損月水不調或崩中漏下

去血過多肌體羸困及月水將行腰腿重痛並皆

治之

當歸去蘆炒

阿膠炒

白芷

續斷

乾薑炮

芩藟

甘草炙各肆兩

熟地黄半兩焙

附子炮去皮臍

白芍藥

肉桂各貳兩

吳茱萸湯泡焙

白朮各叁兩

蒲黃搗錢炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空

心用溫酒送下

熟乾地黄丸 治婦人風虛勞冷胃弱水穀不化或

腸虛受冷大便時泄或月水不調淋瀝不止或閉

斷不通結聚癥瘕久不成胎一切諸虛之證

熟地黄

五味子各壹兩半

栝子仁炒另研

牛膝去苗酒浸焙

芩藟

禹餘糧火煨醋淬

白茯苓去皮

肉蓯蓉酒浸

卷栢去根

山藥

厚朴去麤皮製

乾薑炮

白芷

細辛去苗

防風已上各壹兩

赤石脂貳兩煨另研

杜仲去麤皮炙

蕪荑炒

人參去蘆

川椒去目并合口者

蛇床子

艾葉炒

續斷各柒錢半

紫石英煨另研水飛

石膏

煨另研  
各叁兩

當歸

去蘆炒

澤蘭

去梗

官桂

去麝皮各  
貳兩貳錢半

石斛

壹兩壹  
錢半

甘草

炙壹兩  
柒錢半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒或米飲送下

崩漏

禹餘糧丸 治血虛煩熱月水不調赤白帶下漸成

禹餘糧

火煨  
醋粹

白石脂

各壹兩

附子

炮去  
皮臍

鼈甲

去羶醋  
炙

桑寄生

白朮

厚朴

去麝皮  
製

當歸

去蘆

柏葉

炒

乾薑

炮各壹  
兩

白芍藥

狗脊

去毛各  
柒錢半

吳茱萸

湯泡焙  
半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九空心用溫酒或米飲湯送下

鹿茸丸

治衝任虛損又為風寒所乘尺脉微小甚者

者可灸關元穴

鹿茸

炙

赤石脂

禹餘糧

各壹兩

續斷

貳兩

栢葉

附子

炮

熟地黃

當歸

酒浸

艾葉

各柒  
錢半

右為末酒糊丸梧子大每服五十九空心溫酒下按此足少陰厥陰藥也今人多用之故收入治血



虛實  
未調

虛濕勝帶下甚捷

升陽舉經湯東垣治經水不調右尺脉按之空虚是氣血俱脫大寒證輕手其脉數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲去也當溫之降之引之燥之此法大升浮血氣補命門之下脫也諸藥言根近苗處去苗便是

柴胡根

當歸根

白朮

黃芪各叁錢

藁本去土

羌活根

防風根各貳錢

紅花

白芍藥各伍分

獨活根壹錢半

桃仁去皮尖研拾枚

細辛陸分

川芎

熟地黃水中沉者

人參去蘆

黑附子炮去皮臍

甘草稍炙各壹錢

肉桂去麋皮秋冬伍分夏不用

右為麤末每服貳錢水二盞煎至八分空心稍熱服

調經破血之劑

紅花當歸散 治婦人血臟虛竭或

積瘀血經候不調或斷續不定時作腹痛腰膝重疼攻刺小腹緊硬及室女月水不通並皆治之

紅花

紫葳

牛膝

白芷

蘇木槌碎各壹錢

桂心壹錢半

醫

女

五

當歸尾

劉寄奴各貳錢

赤芍藥參錢

甘草半錢

右作一服水一鍾酒一鍾同煎至一鍾空心服

大玄胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘

悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

玄胡索

赤芍藥

川棟子去核

蓬莪朮

京三稜煨

厚朴薑製

當歸

黃芩

川芎

桔梗

檳榔各壹錢

木香

官桂去龍皮

甘草各半錢

大黃貳錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

鼈甲丸 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結

痛時發刺痛漸成勞狀

鼈甲去殼 醋炙

桂心

三稜醋煮 炒

牡丹皮

牛膝去苗

琥珀

訶子取肉

菝仁去皮尖雙 仁者麩炒

土瓜根

大黃煨已上 各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸食前用桃仁湯送下

針灸

心月經不調

陰獨

三分此穴大効須待經定為度在足四指間三壯

經

女科

五

東又法內踝下白肉際青脉上灸隨年壯

集又法 中極 三陰交 腎俞 氣海

心經閉久忽大崩復又斷絕復又大行不調者 豐

隆六分 石門五分

婦人五旬經斷後再行或多或少或癩或紅並下腹

中氣滿如胎孕 天樞 中脘 氣海各五分

甲婦人漏下苦血閉不通逆氣脹血海主之 女子

胞中痛月水不以時休止天樞主之千金作腹脹腸鳴氣上衝胸

小腹脹滿痛引陰中月水至則腰脊痛胞中瘕子

門有寒引瀘脾水道主之千金引瀘脾作大小便不通

身痛 產寶經水者行氣血通陰陽以榮於身者也氣

血盛陰陽和則形體通或外虧衛氣之充養內乏榮

血之灌溉血氣不足經候欲行身體先痛也

越痛散 治血氣虛寒身體作痛

虎骨伍銖 茯苓 甘草

藁本 防風 白芷

當歸 芍藥 續斷

白朮 附子各叁銖

右為麤末每服五錢水二盞薑五片棗二枚煎至

一盞不拘時服

腹痛良婦人經來腹痛由風冷客於胞絡衝任或傷

手太陽少陰經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂思氣鬱

而血滯用桂枝桃仁湯地黄通經丸方見經閉若血結而

而成塊用萬病丸薛前證若風寒傷脾者六君子

加炮薑方見雜病虛勞思慮傷血者四物加參朮方見雜病虛勞思

慮傷氣者歸脾加柴梔方見雜病健忘鬱怒傷血者歸脾道

遙兼服餘參前後論治之戴經事來而腹痛者經

事不來而腹亦痛者皆血之不調故也欲調其血先

調其氣四物湯加吳茱萸半錢香附子壹錢和氣飲

加茱萸半錢亦可用痛甚者玄胡索湯然又恐感外

邪傷飲食致痛痛不因血尤宜詳審和氣飲却能兼

治因冷而節因節而痛宜大溫經湯冷甚者去麥門

冬不用

丹抑氣丸治臨經之時腹痛以四物湯加玄胡索陳

皮牡丹皮甘草痛甚以豆淋酒痛少以童便煮香附

入條芩為丸經水將來而痛者四物湯加桃仁香附

黃連

海八物湯治經事將行臍腹絞痛臨經痛者血澀

故也

川芎貳錢

當歸

芍藥

將行時痛為澀

訓經

熟地黄

各貳錢

木香

檳榔

玄胡索

苦棟

碎炒焦  
各壹錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

經成塊  
為滯

本治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者

琥珀散

京三稜

蓬莪朮

赤芍藥

劉寄奴

牡丹皮

熟地黄

官桂

菊花

真蒲黃

當歸

各壹兩

濟生方無菊花蒲黃有玄胡索烏

藥

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衝心二服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥亦宜多合以濟人

大交加散

治榮衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛

經血諸疾並皆治之

生薑

貳斤搗取  
汁存滓用

生地黄

貳斤取  
汁存滓

白芍藥

周經

文斗

三八

當歸

桂心 各壹兩

紅花 炒無惡血不用

沒藥 另研各半兩

玄胡索 醋紙包煨熱用布擦去皮

蒲黃 隔紙炒各壹兩

右將地黄汁炒生薑滓生薑汁炒地黄滓各焙乾用諸藥為細末每服三錢温酒調下 若月經不

依常蘇木煎酒調下 若腰痛糖酒調下

交加地黄丸 治婦人經不調血塊氣痞肚腹疼痛

生地黄 搗汁存滓 老生薑 搗汁存滓各壹斤

玄胡索 當歸 川芎

芍藥 各貳兩 明沒藥 木香 各壹兩

桃仁 去皮尖 人參 各半兩 香附 半斤

右為末先以生薑汁浸地黄滓以地黄汁浸生薑滓晒乾皆以汁盡為度共十一味作一處晒乾研為末醋糊為丸空心以薑湯下

大交加散 治婦人榮衛不通經脉不調腹中撮痛氣多血少結聚為癥產後中風

生地黄 生薑 各伍兩各研取汁

右交互取汁浸一夕各炒黃漬汁盡為度末之尋常腹痛酒調下三錢產後尤不可闕

温經湯 方見前

雲桂枝桃仁湯

治經候前腹痛不可忍

桂枝

芍藥

生地黃

各貳兩

桃仁

肆拾枚

甘草

壹兩

右為麤末每服五錢水二盞薑三片棗一枚同煎

去滓溫服

玄胡索湯

濟生

治婦人室女七情傷感遂使血與氣併

心腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搗

搗經候不調但是一切血氣疼痛並可服之

當歸

去蘆酒浸剉炒

玄胡索

炒去皮

蒲黃

炒

赤芍藥

官桂

不見火各半兩

片子薑黃

洗

乳香

沒藥

木香

不見火各叁錢

甘草

炙貳錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分

去滓食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

丹痧血

香附子

醋煮肆兩

桃仁

去皮尖

牡丹皮

大黃

蒸

當歸

各壹兩

川芎

紅花

各半兩

瓦龍子

煨醋煮一晝夜貳兩

右炊餅為丸空心溫酒下三四丸

三神丸

治室女血氣相搏腹中刺痛引心端經

行澀少或經事不調以致疼痛

橘紅 貳兩

玄胡索 去皮醋煮

當歸 去蘆酒浸剉略炒各壹兩

右為細末酒煮米糊為圓如梧桐子大每服七十圓加至百圓空心艾湯送下米飲亦得

垣柴胡丁香湯 治婦人年三十歲臨經預先臍腰痛甚則腹中亦痛經縮二三日

柴胡

羌活

丁香

全蝎

當歸身

生地黄

右都作一服水四盞煎至一盞去查稍熱食前服沒藥除痛散 逐寒邪瘵腹痛

蓬朮 炮壹兩

當歸 焙

玄胡索

五靈脂

肉桂 去麋皮

良薑 炒

蒲黃 炒

甘草 炙

沒藥 各半兩

右為末每服五錢温酒調服

婁一婦人三十歲每因浴後必用冷水淋通身又嘗大驚遂患經來時必先少腹大痛口吐涎水然後經行行後又吐水二日其痛直至六七日經水止時方任百藥不効予診其脉寸滑大而弦關尺皆弦大而急尺小於關關小於寸所謂前大後小也遂用香附參兩半夏貳兩茯苓黃芩各壹兩半枳實玄胡牡丹



皮人參當歸白朮桃仁各壹兩黃連柒錢川棟遠志  
甘草各半兩桂叁錢茺蔚壹錢半分十五貼水煎入  
生薑汁兩蜆殼熱服後用熱湯洗浴得微汗乃已忌  
當風坐臥手足見水并喫生冷服三十貼全愈半年  
後又因驚憂前病復舉腰腹時痛小便淋閉心惕惕  
跳驚悸予意其表已解病獨在裏先與灸少衝勞官  
崑崙三陰交止悸定痛次用桃仁承氣大下之下後  
用香附叁兩蓬朮當歸身各壹兩半三稜玄胡索桂  
大黃青皮俱醋制青朮香懷香滑石木通桃仁各壹  
兩烏藥甘草縮砂檳榔苦楝肉各半兩木香吳茺萸

各貳錢分作二十貼入新取牛膝濕者貳錢生薑五  
片用荷葉湯煎服服訖漸安

右行血例

加味烏沉湯 治婦人經水欲來臍腹疔痛

烏藥

縮砂

木香

玄胡索

各壹兩

香附

炒去毛 貳兩

甘草

壹兩半

右細剉每服七錢水一盞半生薑三片煎至七分  
不拘時溫服

右抑氣例

薛 一婦人經行腹痛食則嘔吐肢體倦怠發熱作渴

此乃素稟氣血不足用八珍湯二十餘貼而愈後生子二年而經不行前證仍作服八珍湯逍遙散百餘劑方愈入珍湯即雜病虛勞門入物湯

右補虛例

汪一婦人瘦小年二十餘經水紫色或前或後臨行腹痛惡寒喜熱或時感寒腹亦作痛脉皆細濡近滑兩尺重按略洪而滑此血熱也或謂惡寒如此何謂為熱曰熱極似寒也遂用酒煮黃連肆兩香附歸身尾各貳兩五靈脂壹兩為末粥丸空腹吞之而愈一婦年二十一歲六月經行腹痛如刮難忍求死脉

得細軟而駛尺則沉弱而近駛汪曰細軟屬濕數則為熱尺沉屬鬱滯也以酒煮黃連半斤炒香附陸兩五靈脂半炒半生參兩歸身尾貳兩為末粥丸空心湯下三四錢服至五六料越九年得一子又越四年經行兩月不斷腹中微痛又服前丸而愈續後經行六七日經止則流清水腹中微痛又服前丸而痛亦止又經任只有七八日若至行時或大行五六日續則適來適斷或微紅或淡紅行後常流清水小腹大痛漸連遍身胸背腰腿骨裏皆痛自已至酉乃止痛至則遍身冷熱汗大出汗止痛減尚能飲食自始痛至

今歷十五年前藥屢服屢効今固効者何也汪復診之脉皆洪滑無力幸其尚有精神汪曰此非舊日比矣舊乃鬱熱今則虛寒東垣曰始為熱中終為寒中是也經曰脉至而從按之不鼓乃陰盛隔陽當作寒治且始病時而形斂小今則形肥大矣醫書曰瘦人血熱肥人氣虛豈可同一治耶所可慮者汗大泄而脉不為汗衰血大崩而脉不為血減耳其痛日重夜輕知由陽虛不能健運故亦凝滯而作痛以證參脉宜用助陽若得脉減痛輕方為佳兆遂投參芪歸朮大劑加桂附一貼來早再診脉皆稍寧服至二三十

貼時當二月至五月病且愈蓋病有始終寒熱之異藥有前後用舍不同形有肥瘦壯少不等豈可以一方而通治哉

丹經過後而作痛者乃虛中有熱所以作痛

新荷姐頭痛口乾經行後身痛腰甚痛

生地黄

白朮

芍藥 各壹錢

芩藻

歸身尾 各伍分

黃蘗 炒

甘草 炙各叁分

右用水入少酒煎服

按經後腹痛為虛明甚若脉不數證無顯熱未可斷其為熱也無熱八珍為宜有熱逍遙為宜

右寒熱例

吳茱山治一婦經血過多五心煩熱日晡潮熱諸藥不効以四物加胡黃連三服而愈薛新甫治一婦人發熱口乾月經不調兩腿無力服祛風滲濕之劑腿痛體倦二膝浮腫經事不通薛作肝脾腎三經血虛火燥證名鶴膝風用六味八味二丸兼服兩月形體漸健飲食漸進膝腫漸消不半載而痊前證若脾腎虛寒腿足軟痛或足膝枯細用八味丸若飲食過多腿足或臂內痠脹或骨腫作痛用補中益氣加茯苓半夏主之

用四物黃連之類反兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽薛曰脾為諸陰之首目為血脈之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸于目矣遂用補中益氣濟生歸脾一湯專主脾胃年餘尋愈一婦人月事未期而至發熱自汗服清熱止汗之劑反作渴頭痛手掉身麻此因肝經風熱用柴胡炒芍連炒山梔歸芍生地丹皮各壹錢參芪苓朮各壹錢伍分川芎七分甘草五分二劑其汗全止更以補中益氣而愈凡發熱久者陽氣亦自病須調補之一婦人氣血素虛經行不調飲食少思日晡熱甚用十全

大補加山茱萸山藥丹皮麥門冬五味子而愈次年  
秋患寒熱或用清脾飲而元氣愈弱仍以前藥而愈  
一婦人素勤苦冬初患咳嗽發熱久而吐血盜汗  
經水兩三月一至徧身作痛或用化痰降火藥口噤  
筋攣此血虛而藥益損耳用加減八味丸及補中益  
氣加來門五味山藥治之年餘而痊  
寒熱經水適來適斷者或有往來寒熱者先服小柴  
胡湯以去其寒熱後以四物湯和之  
本婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦

當歸

川芎

甘草

