


物

大
金
石
方



北
二
廿
四
尾

廿
八

新編婦人大全良方卷之二十二

四庫全書

產後傷寒方論第一

凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等疾證多是血虛或敗血作梗血虛者陰虛也陰虛者陽必湊之故發熱且以平和之劑與服必效如

王露散方

見十八卷第三論

或**四物湯**

以生地黃易熟地

黃加北柴胡等分煎服或人參當歸散秦芫驚中

散人參輕骨散人參百解散逍遙散皆可選用多

見不學無聞纔見產後發熱不退便以為熱入血

室便以**小柴胡湯**竟不可救者亦有用**竹葉石膏**

湯而死者亦有見前失而投以溫劑其熱愈熾者

諸如此等非不知罪福皆是不觀古典杜撰臆度

柱傷人命殊不知此等疾狀是產後去血過多而
陰虛發熱亦有寒極生熱但以上件之藥以脉證
選用無不獲安若是陰陽不和在寒在熱宜增損
四物湯如敗血不散者宜**奪命丹****大調經散****五積**
散加醋煎如效詳見二卷第三論
王子亨云婦人新產去血過多津液燥少陰陽但
虛大凡有疾如中風傷寒時氣之類雖當發汗如
麻黃謹不可用取汗毋勞過多以意斟酌
夫人觸冒寒氣而為病者謂之但寒產婦血氣俱
虛日月未滿而起早勞動為寒所傷則淅淅惡寒
翕翕發熱頭項肩背骨節皆痛至七八日乃差也
婦人產後亡血汗多故令爵冒其脉微弱不能食

大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必
冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故
但頭汗出所以為產婦無汗出者亡陰血陽氣獨
盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也
方可用小柴胡湯加生乾地黃主之
秦芫鱉甲散人參輕骨散神仙百解散並見和劑局方
人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛
生內熱內熱曰煩其證心胸煩悶呼吸短氣頭痛
悶亂骨節疼痛肺時輒息與大病虛煩相類急宜
治之

人參 當歸 生乾地黃
桂心 麥門冬 一五心各

白芍藥 二兩

右吹咀每服四大錢水二盞先將粳米一合淡竹葉十斤煎至一盞去米竹葉入藥并粳二枚煎至七分去滓溫服虛甚者用熟地黄

三物黃芩湯 治婦人草葶中傷風四服若煩熱頭疼與小柴胡湯若頭不疼但煩者

黃芩 半兩

苦參 一兩

生乾地黄 二兩

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

增損柴胡湯 治婦人產後虛羸發寒熱飲食少腹脹等疾

柴胡 三錢

人參

芍藥 橘紅

半夏 泡

甘草

清靈川芎

各三錢

右吹咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服

竹葉防風湯 治婦人產後傷風發熱面赤喘而頭

病宜服

淡竹葉 半把

防風

桂枝

苦梗

人參 甘草 各半

獨根 一兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服使汗出頸項強用附子炮去皮

臍剉如豆大抄一錢同煎嘔者加半夏煎服

陽旦湯 治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡

寒時有熱心下堅乾嘔汗出宜不

桂枝 各二 為藥 各三 甘草 失

黃芩 各二

右以咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服無時候自汗者去桂加炮熟附子一枚渴者去桂加枯樓根三兩下痢者去芍藥加乾薑三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時人膠飴為佳若脈浮緊無汗發熱者莫與也

治產後惡露方中忽耳斷絕書日明了暮則譫語寒熱往來如見鬼狀此由為熱入血室不即治之諸變不測宜服柴胡地黃湯 方見第六卷 四物湯

加北柴胡

芍藥湯 十金翼療產後虛熱頭痛身體發熱兼治

腹內拘急疼痛

桂心 三兩 牡蠣 若通 白芍藥 各五

黃芩 身發熱方加黃芩

右以咀每服五錢水一盞半煎至一錢去滓溫服

千金蜀漆湯 產後療虛熱往來心曾煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱日哺加甚又如瘧狀

黃耆 五兩 生地黃 一斤 蜀漆葉

桂心 各一 丹草 各一 黃芩 各一

知母 各二 芍藥 各二

右以咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

產後頭痛方論第一 凡三方

夫人頭者諸陽之會也凡產後五歲皆虛胃氣虧弱飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊於弱陽實陰虛則令頭痛也 又有產後敗血頭痛不可不知黑龍丹言之甚詳 方第八卷

川芎湯 治產後頭痛

真天台烏藥皮

大川芎

右為細末每服三錢枰鎚滓酒調服

芎附湯

治產後敗血作梗頭痛諸藥不効者

徐明仲

傳生

大附子一枚醱醋一椀用火四畔炙透蘸醋令

盡去皮臍川芎一兩並為細末每服二錢茶清

調下

奇散 治產後頭疼

取當歸川芎為細末每服二錢水一盞煎七分

溫服

產後咳嗽方論第三 凡四方

夫肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也 若產後喫鹽太早而咳嗽者難治 產後血氣不運咳嗽者何吞曰產後咳嗽多因食熱麪壅納或熱病或有氣塊發時克心痛氣急咳

嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛
肢體無力宜服局方真黑神散五積散加麥煎服

二母散治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服

此藥如傷風痰嗽却以尋常傷風藥主治

知母 貝母 白茯苓

人參 各半 桃仁 杏仁 並生去皮尖

右為細末每服三錢水一盞半煎至八分無時

溫服如覺腹痛併服之立有神效

集驗療產後感風傷寒咳嗽多痰唾粘產實

甘草 苦梗 各六分 款冬花 四分

生麥門冬 生地黃 各十分 葱白 一握

豉 二合 白與豉 無葱

右以水二升煮取七合去滓食後分二服

經効療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡 五味子 紫苑

貝母 各六分 桑白皮 茯苓 各八分

淡竹葉 二十片

右以水二升煎取八合去滓食後分兩服

療產後咳嗽氣喘

百部根 苦梗 各六分 桑白皮 二十分

乾百合 赤茯苓 各八分

右以水二升煮取七合去滓食後分兩服

論曰產後喉中氣急喘促者何答曰榮者血也衛

者氣也榮行脉中衛中脉外相隨上下謂之榮衛
因產所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故
令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不快敗血
停凝上熏於肺亦令喘急但服**奪命丹**方見十卷
論八

中血去喘自定
評曰產後喘急同可畏若是敗血上熏於肺猶
可責効**奪命丹**若感風寒或因憂怒飲食鹹冷
奪命丹未可拘濟况孤陽絕陰乎若榮血暴
絕宜大料煮芎藭湯亦自可救傷風寒宜**施瀉**

花湯性理齋發宜小調經散用桑白皮杏仁煎

湯調下傷食宜服見現圓五積散

芎藭湯方見第二卷第五論又名佛

旋瀉花湯治產後傷風感寒暑濕咳嗽喘滿痰涎
壅盛坐卧不寧

旋瀉花
半夏麴
茯苓
赤芍藥
前胡
荆芥穗
耳草
五味子
杏仁

麻黃各等

右以咀每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎
至七分去滓食前温服有汗者

小調經散方見十卷**五積散**方見**見現圓**方見二

參蘇飲治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死者

胡氏

人參一兩別

蘇木二兩

右以水兩碗煮取一碗以下去滓調參未隨時
加減服神效不可言

產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五凡方二

論曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者
經脈之海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之
右右之左產後氣消血散榮衛不理散亂入於諸
經却還不得故令口鼻黑起及變鼻衄此緣產後
虛熱變生此證其疾不可治名胃絕肺敗此證不
可治故不出方
經驗方云過有此疾急取維線一條并產婦頂心
髮兩條堅繫中指節上即上無藥可療亦厭穢之

一端也

海上方治產後鼻衄中風以荆芥為末童子小便
調下二錢七

產後咳癆方論第六凡六分

夫肺主於氣五臟六腑俱稟於氣產後則氣血傷
臟腑皆損而風冷搏於氣氣則逆上而又脾虛聚
冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣厥而
不順則咳癆也脾者主中焦為三焦之關五臟之

倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使榮衛氣厥逆則致

生斯病也經云吃噎者胃寒所生服藥血効者灸

期門三壯必愈期門穴乃胃之大絡穴見六卷
第十論

丁香湯治產後心煩咳癆不止

丁香 白豆蔻仁 各半 伏龍肝 一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散 治氣吃噫又治吐逆心怔目暈可思飲食

出婦人經驗方

石蓮肉 炒兩 白茯苓 一兩 丁香 半兩

右為細末每服三錢米飲調下無時候

產寶療產後咳逆三日不止欲死

桂心 半兩 薑汁 三合

右同煎取二合以大炷灸背摩令皆熱時塗藥

汁盡

產後咳逆方

乾柿 一分

右切碎以水一盞煎至六分熱呷

又方右辟鏡窠三四個水一小瓊煎至一半熱服

並出產寶

羌活散 治欬逆 出靈苑方

羌活 附子 炮 茴香 炒各 半兩

木香 白薑 炮各 一分

右五味為末每服二錢水一盞鹽一捻煎一二

十沸熱服一服止

產後血崩方論第七凡八方

論曰產後血崩者何答曰產卧傷耗經脈未得平復而勞役損動致血暴崩 止或因酸醎不

節傷盡采衛氣血衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝
經已壞為難治急服因經圓以止之

固經圓方

艾葉

木賊各半

赤石脂煨

補骨脂

附子一个

右為未陳米飲和圓如梧相子大食前温酒下
二十圓米飲亦可評曰血崩不是輕病况產後
有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能致之多
因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致
惡血不消爵滿作堅亦成崩中固經圓自難責
効不若大料煮
芎藭湯加芎藭方
芎藭湯加為藥候定續次隨證詣藥治之為得

芎藭湯加芎藭方

芎藭

右以胆每服四錢水盞半煮取七分出滓無時
熱服

熟乾地黃散治產後崩中頭目旋運神思昏迷四

肢煩亂不知人事

熟乾地黃

伏龍肝

黃耆

赤石脂各一

阿膠

甘草

白朮

艾葉炒

川芎

人參各半

當歸三分

右以胆每服三錢薑三片煎至七分去滓温服

白芍藥散治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損

宜... 治產後崩中不止... 鹿茸 酥炙

白芍藥 三錢 牡蠣 煅 乾薑 各一

熟地黃 鹿角膠 黃耆 各一

烏賊骨 鹿角膠 龍骨 各一

右為未食前温酒調下二錢

又方 熟地黃 赤石脂 各一 鹿茸 各一

牡蠣 當歸 各一

右為細末食前粥飲調二錢

阿膠圓 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 赤石脂 各一 續斷 甘草

川芎 當歸

丹參 龍骨 鹿茸 酥炙

烏賊骨 鱉甲 各一

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心温酒下二

三十圓

菖蒲酒 治產後崩中不止下血

菖蒲 一兩

右細剉以酒二盞煮取一盞去滓分温三服食

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮 百枚 燒 棕櫚 性燒 存 當歸

桂心 各一 鱈魚鱗 川芎 各三

檳榔 一兩 一枚

右為細末每服三錢煨薑酒調下如未止更進一服或非時血崩無藥可治但進三服即止

產後月水不調方論第八九二分

夫產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣容於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少或在月前或在月後故名不調也

琥珀散 治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日

漸羸瘦

琥珀 牛膝 生乾地黄

當歸 挑仁 赤芍藥

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至六分

去滓溫服

薑黃圓 治產後虛乏不足胸心短氣腹內緊急腰

皆疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃 當歸 熟地黄

牡丹皮 厚朴 桂心

川芎 續斷 桃仁

白朮 赤芍藥 木香

羚羊角屑

俱石為細末煉蜜圓如梧桐子大食前溫酒下三

論曰夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷

論曰夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷

論曰夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷

所傷血之為性得冷則凝結故風冷傷於經血結
於胞絡之間故令月水不通也凡血結月水不通
則血結成瘕水血相併復過脾胃衰弱肌肉虛者
則為水腹也六但於第一卷第七方
夫婦人衝仕之脈為經絡之海皆起於胞內而手
太陽小腸之經手少陰心之經也此二經上為乳
汁下為月水若產後月水不通者蓋新產之後勞
傷氣血或去血過多乳汁通行自是不通若乳子
歲半或一歲之內而月經不行此是常候即非病
如何必通之謗云妳候是也若半歲而行者成四
五箇月便經行者皆是小壯血盛之人注受極易
產乳必眾其子失乳必四肢羸壯大青筋頭大

髮焦好啖泥土病名無辜若經血有餘者不可以
藥止之若產後一二月月經不通而無疾苦何必
服藥或勞傷氣血衝仕脈虛氣血衰少而不能行
者但服健脾胃資氣血之藥自然通行右以牛膝
紅花蘇木乾漆壘虫水蛭等藥以通之門為害滋
大經水枯竭則無以滋養其能行乎初虞世所謂
譬猶索萬金於乞巧之手雖搖楚並下而不可得
也後之學者更宜詳審而療之自明補註

產後四肢浮腫方論第十凡九方

論曰產後四肢浮腫者何答曰產後敗血乘虛停
積於五臟循經流入四肢留滯日深却還不得腐
壞如水故令面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣

治之凡治水氣多用導水藥極虛人夫產後既虛
又以藥虛之是謂重虛往往因致夭柱但服小調
經散血行腫消則愈

小調經散方

沒藥

琥珀

當歸

桂心
細辛

芍藥

各半

當歸

細辛

右為細末每服半錢七薑汁溫酒各少許調停

服評曰產後浮腫多端有自懷姙腫至產後不

退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內作

喜怒憂驚血與氣搏留滯經絡氣分血分不可

不辨要當隨所因脈證治之宜得其情小調經

散治血分固効但力淺難憑不若吳茱萸湯枳

朮湯棄蠅散大調經散皆要藥也

經云產後肌浮相皮酒服

加減吳茱萸湯治婦人藏氣本虛宿挾風冷胸膈

滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡

寒戰慄或泄不止少氣羸因及因生產藏氣暴虛

邪冷內膝宿疾轉增

吳茱萸

一兩

苦梗

乾薑

甘草

麥門冬

防風

半夏

細辛

當歸

赤茯苓

牡丹皮

桂心各半

右為粗末每服四錢水琰半煎至七分去滓食

前熱服

枳木湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實 半一西

白朮 三西

右以生薑汁搜麩 裏半夏為七餅子炙焦熟為末水調一瓊小便利為効

奪魂散

治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑 二西

白麩 三西

半夏 七西

右以生薑汁搜麩 裏半夏為七餅子炙焦熟為末水調一瓊小便利為効

大調經散

最治產後腫滿喘急煩渴小便不利是

二十一卷 第三十論中

又論曰夫產後勞傷血氣膝理虛貝為風邪所乘邪搏於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便差也

洗漏瘡方

治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已

栝令

枳殼

桑白皮 各一西

商陸

耳草 各三

右為起末每服四錢水盞半薑三片煎至七分去滓溫服空心

治產後遍身青腫疼痛產後血水疾

出婦人經驗方

乾漆

大麥蘗 等分

右谷為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘗重

乾漆如此填蒲用鹽泥固濟火煨通赤放令研
為散但是產後諸疾熱酒調下二錢
張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉

防已等分

右為末每服二錢溫酒調下不能飲者醋湯調
亦可

產後腹痛及浮痢方論第十一凡七方

論曰產後腹痛及浮痢者何答曰產後陽胃虛怯
寒邪易使若未滿月欲冷當風乘虛襲留於有膜
散於腹脇故腹痛作陳或如錐刀所刺流入大腸
水穀不化洞泄腸鳴或下赤白眩暈脹或痛之
不定急服調中湯立愈若醫者以為積帶取之禍

不旋踵謹之謹之

調中湯方

高良薑

當歸

桂心

芍藥

附子炮

川芎

各一兩

甘草半兩

右為粗末每服三錢匕水三盞煎至一盞去滓
熱服

評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既

去飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜

怒憂思還從自性况勞逸飢飽皆能致病若其

洞泄可服調中湯赤白滯下非此能愈谷隨門

類別有正方今錄批膠散白頭翁湯以備用餘

從滯下門選之

桃膠散

證

治產後痢下赤白裏急後重疔刺疼痛等

桃膠

凡上焙乾

沉香

蒲黃

隔帛炒等分

右為末每服二錢食前陳米飲調下

白頭翁湯

治產後下痢虛極

白頭翁

甘草

阿膠

各三兩

黃蓮

蘘皮

秦皮

各三兩

右以咀每服四錢水盞半煎至七分去滓空心

服

張氏方

的奇散

治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉分過則愈雖洞泄不禁下青黑色物

亦驗同食傷動用調中湯

荆芥大者四五穗不盞內然火燒成灰不得把

油火入麝香少許研沸湯一兩呷調下此藥

雖微能愈大病宜勿忽之

產後諸痢方

煮薤白食之

又方

羊腎脂炒薤白空腹食尤佳

又方

炙肥羊肉食之

產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第

十二九三十一方

論曰產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿
虛之未復或勞動太早或誤食坐令若行起太早
則外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之
物傷於脾胃皆令洞泄水浮甚者變為痢也若血
滲入大腸則為血痢難治泄謂之產子痢是也得
冷則白或如魚腦得熱則赤黃或為驟血若冷熱
相搏則下痢赤白或膿血相雜若下痢青色則極
冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛
更加久痢不止無力瘦之愈見羸弱謂之虛羸下
利又有產後氣申不煩而不痢赤白謂之氣痢治
之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則謂之滑
者湯之虛羸者補之水穀不分者當利小便若產

婦性情執著不能寬解須當須其氣未有不妥者

也治之各有方

深師療產後冷熱痢

黃連圓

黃連

六兩

烏梅

三兩

乾薑

二兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下三

十圓忌猪肉

經效治產後赤白痢臍下氣痛

厚朴

八分

呵子肉

各六分

當歸

五分

枳殼

五分

肉豆蔻

五箇

右水一升煮取九合空心分為三服

張文仲治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

黃連

梔子仁各一兩
黃蘗皮三兩

阿膠

當歸半兩

蒲黃

黃芩二兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大飲下六十圓日

三夜一立定破血止痢

救急治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥

乾地黄

阿膠

艾葉

當歸

右水二升煮取八合分兩服空心

必效療新產後赤白痢疾心腹刺痛

薤白

地榆

粳米

阿膠

酸榴皮三兩

人參

耳草

黃連

半兩

右咬咀以水六升煮取一升日三服一方有厚

朴一兩千金方只右前五味

又療產後赤白痢腹中絞痛不下食

當歸

石榴皮

地榆

各二

白蘘荷

黃連

黃蘗

一分

犀角

黃芩

枳殼

耳草

升麻

薤白

茜根

粳米

一升

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下二十

療產後赤白痢疾

黃連 八分

阿膠 六分

赤茯苓

右為末煉蜜圓如梧桐子大粥飲吞下二十圓

空心

療產後下痢赤白有血

赤石脂

黃連

地榆

當歸

乾薑

耳草

厚朴

葱白

右水二升煎取八合空心分作兩服

廣濟療產後腹痛氣脹助下妨滿不能食兼微痢

茯苓

人參

厚朴

耳草

橘紅

當歸

黃芩

黃芩各六分一分方無

右為細末以飲調下方寸七至七半日三

又療產後下痢赤石脂圓大治冷痢也青鷺澹

赤石脂

耳草

當歸

白朮

黃連

乾薑

秦皮

川椒

附子

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大酒下二十圓

日三良忌猪肉冷水海藻菘菜

深師療產後下痢膠蠟湯

阿膠

當歸

蠟

粳米

黃連

維子

右細切以水六升先煮米令解日沸去米內藥
煮取二升入阿膠蠟煮令烱分温三服

千金療產後下痢腹痛 **當歸湯**

當歸

龍骨

乾姜

附子

甘草

熟艾 各

白朮 一兩

川芎 一兩

右八味細切以水五升煮取二升半去滓分為

三服日三服令盡忌猪肉冷水桃李雀肉毒

物

廣濟療產後赤白痢腹下絞痛

當歸

芍藥

地榆

龍骨

黃連

艾葉

此藥對草藥不禁 厚朴 枳實 黃芩 赤白小續

右乾薑 枳實 厚朴 枳實 黃芩 赤白小續

右以水八升煮取二升半去滓分温三服

即差思生冷油膩海藻菘菜猪肉

又療產後赤白痢臍下氣痛

熱氣當歸 枳實 厚朴 枳實 黃連 各十分

肉豆蔻 五枚 蘇合草 一分 丁香 一分

右以水八升煮取二升半去滓分温三服

并金療產後餘寒下痢硬膿血赤白日數十行腹

痛時時下血 **桂枝湯**

桂枝 芍藥 甘草 各二兩 大棗 十二枚 乾薑 二兩

赤石脂 十兩 當歸 三兩 附子 炮 一兩

蜜丸餅水兩當歸三兩右細切以水七升煮取三升入蜜再煎一二沸
蘇去滓分服三升

必效療產後痢且五疝行者方赤白日燒十許煎
取木裏蠹虫糞炒令黃急以水沃之稀稠得
所服之差正獨拔奈酒訥方

療產後虛羸下痢膿血腹痛

七煎黃連赤白痢煎芍藥

甘草

艾葉三分厚朴各三芍藥各八

右咬咀水七升煮取二升分為三服忌猪鹿肉

治產後下痢不禁止困乏氣欲絕無問赤白水穀

不分

黃連

黃蘗各二

厚朴各三

芍藥各八

右水六升煮取二升分溫二服

治產後羸困赤白痢疾心腹絞痛

薤白

當歸二兩

地榆三分

黃連各三

右水七升煮取二升半分為三服

療產後氣痢不止方

青木香五分

呵子核八分

酥炙黃去

右為細末空心米飲調下方寸匕一方有縮砂

仁三味等分為細末入蜜一起米飲調下二錢

療產後水痢

枳殼四分
黃連各六分

厚朴三分
當歸三分

茯苓

右水一升煮取入合空心分為三服

療產後水痢

黃連六分
赤石脂

烏梅五分
當歸各四分

石榴皮
乾薑三分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心米飲下
三十圓

療產後血痢

艾葉三分
芍藥

阿膠十分
黃蘗

黃連七分
甘草各六分

右為細末粥飲調下方寸匕

療產後下痢膿血相雜

赤石脂
白朮五分

五色龍骨
阿膠

黃連各十分
黃芩各六分

右為細末飲服方寸匕

硃砂煎圓治一切積滯化氣消食補益真氣產後

逐敗血補虛至喜

硃砂
天雄百許候
巴戟
木香

石粉五七
檳榔
附子炮

金鈴子去皮
當歸
船茴香炒

沉香各一
沉

阿魏

成膏入諸藥

肉蓯蓉

一西

右為細末以無灰酒煮白麩糊圓如梧桐子木

每服三十圓空心日午温酒下此方家家有于

家婦人常病葶中下痢日久甚困篤百方不差

士人李潛善醫曰葶中痢與他痢不同常痢可

用苦淡藥止之葶中痢生於血不足投淡藥則

血愈不行痢當更甚為子作礪砂法云此藥最

能治產後痢先以桂圓小下之次投礪砂圓日

九十圓利頗減半次日遂愈礪砂圓產後雖無

疾亦宜服之能養血氣去積滯

桂圓

方

沈氏方

桂心

耳遂

丁香

木香

芫花

巴豆

去心

右為細末麩糊圓如菜豆大每服二圓三圓温

水下加減更量虛實潜谷醫也云此圓取積最

又許仁則秘方

神麩末

五分

枳殼

十分

白木

各六分

人參

四分

赤石脂

十分

右為細末米飲調下方寸七

續命湯療產後血不止

白麩

一匙

生薑

一分

右同煎候盡色赤投童子小使一升去葶東煎

兩沸分為三次頓服之

療產後血痢小便不通脘腹痛

生馬齒莧

右搗取汁三大合煎一沸下蠶一合調頓服

療產後血痢不止

臭樗根六分

右為末水和圓如棗核大麩担作餛飩無度煮

二七箇熱吞之

療產後下血不止

桑耳灸

茜根

艾葉

芍藥灸

牛角思

雞蘗各四分

地榆

阿膠各六分

白龍骨十二分

右以水二升煮取八合分三服

新編婦人大全良方卷之二十二

兩藥分為三次頓服之
產後血崩小便不通肝腹

右精液汁三大分煎一湯下送一合調服
身瘦根六分

產後血崩大便不通
產後血崩大便不通

新編婦人大全良方卷之二十三
產後痢疾作渴方論第一

論曰產後下痢作渴夫水穀之精化為血氣津液
以養臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止及
溢水氣脾胃既虛不能剋水水自流溢浸漬皮膚
則令人腫但止其渴則自差
必効療產後痢而渴飲無度數

麥門冬分十二 烏梅二十

右細剉以水一升煮取七合細呷

經效療產後久痢津液竭渴不止

龍骨分十二 厚朴 茯苓
黃耆八分 麥門冬四分 人參各八分

生薑 六分

大棗 七四分

右水一大升煮取七合空心分兩服

古今錄驗療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥

冬瓜 一放

右以黃泥畏厚五寸煨令爛熟去皮攪汁服之

產後大便秘澀方論第二凡七方

論曰產後大便秘澀者何答曰產臥水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中間脹者此有燥屎在臍腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁圓以津潤之若誤以為有熱而

投以寒藥則陽消陰長變證百出性命危矣

麻仁圓方

麻仁

枳殼

人參 各四分

大黃 二分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下二十圓未通漸加元數不可大過

評曰產後不得利利者百無一生去血過多截燥大便秘澀則固當滑之大黃似難輕用唯葱涎調臘茶為圓復以葱茶下之必通

僕常以局方四物湯以生乾地黃

療產後五七日不大便切不宜安服藥先宜用

麥蘗散方

大麥芽木以多少

右炒黃為末每服三錢沸湯調下與粥間服

阿膠枳殼圓治產後虛羸大便秘澀

阿膠

右為末煉蜜圓如梧桐子大別研滑石末為衣
溫水下二十圓半日以來未通再服

許學士云婦人產後有三種疾貯胃則多汗汗則
大便秘故難於用藥唯麻子仁蘇子粥最佳穩當

紫蘘子

大麻子仁

右二味各二合淨洗研令極細用水再研取汁
一盞分二次煮粥啜之此粥不惟產後可服大
抵老人諸虛風秘得力

千金療產後熱結大便不通**蜜兌法**

白蜜五合慢火煎令如硬錫以投冷水中良久

取出捻如母指大長二寸內穀道中即通

產後大小便不通方論第二凡三方

論曰產後大小便不通者腸胃本挾於熱因產血
水俱下津液燥竭腸胃痞澀熱氣結於腸胃故令
大小便不通也

葵根湯千金療產後淋瀝

葵根

乾者

通草

車前子

一升

亂髮

乾者

大黃

桂心

各二兩

冬心汁

七合

生薑

六兩

滑石末

別研

一兩

右九味切以水七升煮取二升半去滓下滑石

未分三服以愚考之既者大黃亦可治大便不通故錄于此更宜斟量虛實而投之

集驗療產後津液燥竭大小便不通

為藥 大黃

枳殼

麻仁等分

右為細末煉蜜圓如梧子大空心熟水下二十圓一方有甘草山梔子

挑花散

治產後大小便秘澀

桃花

葵子

滑石

檳榔等分

右為細末每服二錢葱白湯空心調下產後遺糞方第四

廣濟療產後遺方

取故燕窠中草燒為末以酒調下半錢亦治男子

集驗方

礬石

枯

牡蠣

熬

右等分為末酒服方寸七日三亦治男子

又療產後遺糞不知出時方

白欬

芍藥

右各等分為末酒服方寸七

產後諸淋方論第五 凡十五方

論日產後諸淋因產有熱氣客於腑中內虛則起數熱則小便澀痛故謂之淋

又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血血即流參於胞中故血隨小便出而為血淋淋者如而之淋三因論曰治諸產前後淋秘其法不同產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最為產後要藥唯當尋其所因則不失機要

茅根湯治產後諸淋無間冷熱膏石氣結悉主之

白茅根

瞿麥穗

白茯苓各四

葵子

人參各二

蒲黃

桃膠

滑石

甘草各一

紫貝十箇燒

石首魚頭中石二十

右剉為散每服四大錢水一盞半姜三片燈心二十莖煎至七分去滓溫服亦可為朱木通煎湯調下二錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調服

集驗療產後患淋小便痛

通草 三兩

大棗 二十枚

葵子 一升

白朮 一兩

榆白皮 五兩

石葺

黃芩 二兩

右以水八升煮取二升半空心服溫呷千金有甘草生姜

療產後小便淋澀不通

葵子 一合

朴消 八分

右水二升煮取八合下硝分兩服

滑石散 千金療產後淋

滑石

葵子

研五分

通草

車前子

三右為末以漿水調服方寸匕至二匕為妙

療產後小便不通張不愚方

陳皮

去白

右為末空心溫酒調二錢一服便通

療卒不得小便

杏仁

去皮尖

右炒為末和飲頓服立通

古今錄驗療產後勞傷熱大小便赤澀

雞蘆一分

通草十分

冬葵子三合

芍藥

生地黃

十二分

滑石

右水三升煮取八合下芒硝空心分三服

療脬轉小便不通八九日

滑石

十二分

寒水石

八分

右水二升煮取入合空心分二服

經效療氣結成淋小便熱淋引痛成如豆汁面色

痿黃

具齒

三箇為末

葵子

一合

石膏

十二分

滑石

八分

右水一升煮取八合下猪膽汁半枚合煎三四

沸空心溫服

療產後小便澀痛或血淋者

瞿麥

通草 三兩

大棗 十二枚

冬葵子 各二兩

各二兩

右以水七升煮取二升半分作兩服

療產後血淋

車前子

瞿麥 各四兩

黃芩 三兩

爵金末 一兩

右水六升煮取二升下爵金末分三服

廣濟療產後卒患淋小便疼痛及至尿血

冬葵子 一升

通草 三兩

滑石 末別處

石韋 去毛

茯苓

黃芩 各二兩

右水九升煮取三升入滑石末空心服忌熱麪

醋物

療產後淋小便痛及血淋

白茅根 五兩

瞿麥

車前子 各二兩

冬葵子 二合

鯉魚鱗

一百介為末

通草 三兩

右水二升煮取一升入齒末空心服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於

產脬中積可與臍平却用葱白剥去麁皮十餘根作一縛切作一指厚安鹽上用大艾炷蒲葱餅子

大小以大灸之覺熱氣直入腹內即時便通神驗不可其述

出產乳集

木通散 治產後小便不通

大小木通各二兩 大麻仁一升 葵子一升 牡蠣一升 滑石一升 枳實一升 甘草各半

右為粗末每服三大錢水盞半煎至七分去滓溫服

產後小便數方論第六九二方

夫產後小便數者此由脬內宿有冷氣因產後發動冷氣入腹虛弱不能致其小便故數也

桑螵蛸散 千金翼治產後小便數及遺尿

桑螵蛸三箇 鹿茸酥炙 黃耆各三兩 牡蠣煨 人參 厚朴

赤石脂各二兩

右為末空心粥飲調下二錢外臺方無厚朴石脂有甘草生薑

枯樓湯 集驗療產後小便數煎湯

桑螵蛸 甘草並炙 黃連 生薑各二兩 枯樓根 人參各三兩 大麥介五十

右細切以水七升煮取二升半分三服忌豬肉冷水

產後小便不禁方論第七 凡四方

廣濟療產後小便不禁

以雞尾毛燒作灰細研溫酒調方寸匕服日

宋通志... 三鞭... 又方...

柔螺蛳炒... 龍骨... 右為細末...

千金翼療產後遺尿不知出... 右為細末食前粥飲調下二錢

白薇 為藥

右等分為細末以酒服方寸七日三服

固胎散 治婦人臨產時傷手胞破小便不禁

黃絲絹... 黃燻... 根二錢... 馬屎... 末二用

右用水一升再煎至一盞空心頓服服時飲氣... 服之不得作聲知無效

十金... 產後小便出血方論第八 凡三方

夫產後損於血氣血氣虛而扶於熱血得熱則流... 散滲於腠內故血隨小便出 治小便利血方

亂髮 研細為末

右米飲調服方寸匕一方有滑石等分每服一

錢生地黄汁調下

療產後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 生地黄 牡蠣 芍藥

右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

崔氏療產後血滲入大小腸

車前子草汁一升 蜜一大合

右相煎一沸分為兩服
產後陰脫五門不開方論第九與八卷第二方
凡八卷第二方

因三因論曰婦人產後勞力弩燕太過致陰下脫若
脫肛狀及陰挺下出逼迫腫痛舉動房勞能發作
清水續續小便淋露

硫黃散

治產後勞傷陰脫

硫黃

烏賊骨

各半

五味子

一分千

右為

方三錄無之一

細末研令極

細糝患處日三易

當歸散

治陰下脫

方見八卷論

千金方治產後陰下脫

以鐵精粉上推內之又灸臍下橫文二七壯

廣濟療產後陰腫下脫內出玉門不開此產寶只有
論

石灰

一升能燒草

右熱湯二升投灰中湯適溫冷澄清坐水中以
浸玉門斯須平復如故

當歸散

治產後陰下脫方傳心方

當歸

黃芩

燒存性

牡蠣

燒各二兩

芍藥

一分兩

蝟皮

半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調服米飲調服
亦可忌登高舉重

集驗療婦人產後虛冷玉門不開寬冷方千金同

蛇床子

硫黃各四分

兔絲子五分

吳茱萸六分

右為細末以湯一升投藥方寸匕以洗玉門日再用

陳氏王龍湯

治婦人產後用口大過產門惡出

以四物湯入真龍骨末少許煎空心連二進

服麻油湯熏洗

尉法

集驗療婦人產後陰下脫方

單炒蛇床子一升乘熱以帛裹尉患處亦治

產後陰中痛

桃仁膏

治產後陰腫妨悶

批仁去皮尖研為別

枯礬

五味子

鈔本作檮枝散是

皂角散

治產後子腸下出不能收拾不論年深者

皆治之

檮枝取皮焙乾一握

右用水五升連根葱五莖漢椒一撮同煎至三

升去滓傾在盆內乘熱熏候通手淋洗如冷傾

入三升瓶內再煎一沸依前用一服可作五度

用洗了睡少時忌鹽藏鮫醬濕麪發風毒物及

用心力房勞等事

古今錄驗療產後陰下脫方

驚頭

陰乾一介

葛根

一作一兩

右二味為末酒服方寸七日三服

皂角散治產後懸

皂角樹皮

川練樹皮

各半

皂角核一合

石連

去心

右為粗末用水煎湯乘熱以物圍定熏通午洗於淨房中就熏洗處鋪薦席纔熏洗了以帛挹乾便喫玉露通真圓熱酒下二圓便仰睡方見

古今錄驗療產後陰下脫方

川椒

吳茱萸二升

戎鹽

半雞子大

右為末以綿裹如半雞子大內陰中日一易二

十日愈
檗枝散婦人陰蝕五疝方論第十凡八方

凡婦人少陰脈數而滑者陰中必生瘡名曰蠶瘡或痛或痒如蟲行狀淋露膿汁陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡皆屬於心又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當補心養胃外以熏洗坐導藥治之乃可千金療瘡蝕瘡方

當歸

芍藥

甘草

芎藭

各二兩

地榆

三兩

右細切以次五升煮取二升去滓熏洗日三夜

又方

蒲黃

一升

水銀

一兩

右二味研均以粉入

又方 肥猪肉 三十斤

右以水三碩煮熟去肉入盆中浸之冷即易不
過三兩度

崔氏療陰蝕洗搨湯方

甘草 乾地黃 當歸 黃芩 芍藥 龜甲 五兩

右細切以次七升煮取一半去滓以綿帛肉湯
中以搨瘡處良久即易日二度每搨湯可行十
里許即裏乾捻取甘濕散薄傳瘡上便適可經

半日又以湯搨訖如前付藥搨就全家婢過此疾

飲處作仍以瘡深半寸余於湄子方中檢得此甘
草湯方仍救以自慶錫蛇膽散不經七日瘡乃平

甘濕散 又名 蚘蛇膽散 療疔蟲陰蝕方

蚘蛇膽 真者 青香木末 石硫黃

鐵精 麝香 各四分 隨時分之多步

先以相和蛇膽即無力
也舊用五月五日蝦蟆

百六味等分分為末更細研有患取如三碁子
和井花水日再服訖先令便利子即以後方挑
枝熏下部訖然後取藥如碁子安竹管裏吹入
下部中亦日再度老少量減其熏法每日一度
不用再為之良

又療疔蟲食下部及五臟方

取桃東南枝三七枚輕打頭使散以綿纏之又
搗石硫黃為末將此綿纏批枝撚轉之令未少
厚又截一短竹筒先肉下部中仍以所撚藥批
枝熟然熏之古文未更略

文仲療陰蝕欲盡者方

蝦蟇

兔屎

右等分為末傳瘡上良

狼牙湯

古今錄驗療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋

滴臭穢

狼牙 三兩

右以旦以水四升煮取半升去滓內苦酒如鷄

子中黃大沸湯一盃消盡夜適寒温以綿纏筋
頭大如蠶濡湯以瀝瘡中日四五度即差

產後乳汁或行或不行方論第十一凡十

論曰凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱
經絡不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令
乳無汁若乳盈溢可潑東壁上佳或有產後必有
乳若乳雖脹而產後嘗作者此年少之人初經產
乳有風熱其須脹清利之藥則乳行若累經產而
無乳者七津液故也須服滋溢之藥以動之若雖
有乳又却不甚多者須服通經之藥以動之仍以
羹臍引之蓋婦人之乳資於衝脈與胃經通故也
有屢經產而乳汁當多者亦婦人血氣不爽使然

也大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其色帶黃所生之子性弱而多疾三因論曰產婦有二種乳脉不行有氣血盛而壅閉不行者有血少氣弱流而不行者虛當補之盛當疎之盛者當用通草漏蘆土瓜根葷虛者當用成煉鍾乳粉猪蹄鯽魚之屬藥可見矣

漏蘆散 療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯你乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然內消乳汁通行

性漏蘆 半二兩 蛇脫 十條 瓜樓 燒令焦存

右為末温酒調下二錢無時候服藥後即以猪

蹄羹投之經驗方有牡蠣並燒存性一方只用牡蠣煨為末酒調下二錢

又方

葵菜子 炒香 縮炒仁 各等分

右為細末每服二錢热酒調下滋益氣脉榮衛行津液上蔡張不愚方常用極有驗

療乳婦氣少血衰脉流不行乳汁絕成煉鍾乳粉研濃煎漏蘆湯調下二錢

產寶療產後乳無汁

土瓜根 漏蘆 各三兩 甘草 二兩

通草 四兩

右水八斗煎取二升分温三服忌如常法

一方加桂心並為末飲服方寸匕

以猪脬如食法煮清粥食之驗

靈苑方下乳汁立效方
粳米 糯米 各半
生甘草 半兩
葛苴子 一合並
陶淨

又方 右煎汁一升研前藥令細去滓分作三服立下

漏蘆 一方
土瓜根 各四分
疥蟪 各三分
瓜樓根

右為細末酒調方寸匕日
一方無土瓜根有鍾乳沙糖水調服

又方

通草 十分
鍾乳粉
麥門冬 各六分

右為細末食後酒服方寸匕日三兩服效千金

方同有理石 二方出 產寶

一方

土瓜根為末酒調方寸匕日三兩服効

一方

猪蹄 一隻
通草 四兩

右以水一斗煮作羹食之最妙

漚泉散 療乳無汁成都教授單釀方亦治乳結癰

腫

穿山甲 洗一兩 炒令燥

右為細末酒調服方寸匕
下乳方

大麻仁去殼二分生緞三枚
右同研爛去滓用酒水各一盞瓦罌煇至一盞
半有飢食後臨卧温服仍用被覆睡乳即通流
劉柳 溪傳

又方

必用方云漏蘆枯樓皆要藥或云多食猪蹄羹
枯樓取子淨洗炒令香熟搥碎取仁研細瓦上
攤泥令白色研為細末温酒調下一錢服了合
面卧少時未効再作
一方瓜樓一枚熟擣以白酒一斗煮取四升去

崔氏療乳汁不下

鼠肉 五兩
羊肉 六兩
鹿茸肉 八兩

右三物作臠噉之勿令食者知

漏蘆湯 千金療乳無汁

漏蘆 通草 各一分 鍾乳 四分

黍米 一升

右先將黍米漬一宿研取汁三升煮藥三四沸去

滓作飲食經心錄同余弱布因產前食素得疾

十日服諸藥無效嬰兒甚苦偶有乳脈送亦行關本

斗逐如常煮赤豆粥食之當夜乳脈通行關本

產後乳汁自出方論第十二無方

論曰產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥以止之若乳多濕滿急痛者溫帛熨之產寶有是論却無方以治之若有此證但以漏蘆散亦可亦有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未曾論及

產後吹妳方論第十三

凡六方

夫產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡呼氣不通乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通腐結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不急治腫甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰遠至死者速與服皂角散枯樓散傳以天南星散以手揉之則散矣出指迷方

枯樓散方

乳香一錢

枯樓根末

一兩

右研令均濕酒調二錢服

天南星散

天南星為未用溫湯調以鵝翎塗之

皂角散方

詞曰

婦人吹妳意如何
熱酒一盃調八字

皂角燒灰蛤粉和
須臾揉散笑呵呵

治妳結硬疼痛出經驗方

百藥煎為細末每服三錢酒一錢煎數沸熱服

療乳硬作痛

嫩桑葉生採研以采飲調糲紙花貼病處

產後妬乳方論第十四 婦人女子乳頭生小淺熬瘡搗黃汁

夫妬乳者由新產後見未能飲之及乳不洩或乳服捏其汁不盡皆令乳汁蓋結與血氣相搏即壯熱大渴引飲穿強掣痛手不得近是也初覺便以手即捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱勢盛必成癰也

吹妬乳乳癰其實則一只分輕重而已輕則為吹妬妬乳重則為癰雖有專門不可不錄

療產後吹妬作癰

葵莖及子
右搗篩為散酒服方寸匕即愈

又方

雞屎為末酒服方寸匕須臾三服愈

又方

皂莢十條以酒一升攪取汁硝石半兩煎成

膏傳之

療產婦乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜樓生一箇半 大粒草生一寸半

生薑生一塊半

右同剉用酒一碗煮取一盞去滓服之其痛一

會不可思即搜去敗乳臨卧再一服順所患處

乳側卧於床上令其藥行故也

療乳腫次第結成癰方

右以馬溺塗之立愈

婦人女子乳頭生小淺熱瘡搽之黃汁出方附

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搽之黃

汁出浸瀋為長百種瘡不差者動經年月名為妬

乳病婦人飲兒者乳皆欲斷世論若抄乳是也宜

以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳二物飛鳥膏及飛

鳥散佳始作者可傳以黃芩漏蘆散及黃連胡粉

散迹佳

赤龍皮湯方

槲皮升切三

右以水一斗煮五升夏冷用水秋冬溫之分以

洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傳膏散千金同

天麻草湯方

天麻草升切三

右以水一斗半煎取一斗隨寒溫分洗乳以殺

痒也此草葉如麻葉冬生夏著花赤如鼠尾花

亦以洗浸淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭

瘡洗畢傳膏散千金同

飛鳥膏散方

用燒朱砂作水銀上黑煙

礬石燒三兩

右三味以縮篩了以甲煎和之令如脂以傳乳

瘡日三作散者不須和右汁自著可用散亦傳

諸熱瘡黃爛浸淫汁瘡瘻瘡犬夫陰蝕痒濕諸

小兒頭瘡疔蝕口邊肥瘡蝟瘡等並以此傳之

又黃連胡粉膏散方

黃連二兩 胡粉十分 水銀一分 同研

右三味搗黃連為末三物相和合皮裏熟按之
自和合也縱不成一家旦得水銀細散八粉中
也以傳乳瘡諸濕痒黃爛肥瘡若著中煎為膏
千金同

乳癰方論第十五 凡二十五方

夫婦人乳癰者由乳腫結聚皮薄以澤是成癰也
足陽明之經脉則血滯不通其血又歸之氣積不
散故結聚成癰千金云年四十以下治之多愈年

五十以上宜速治之即差若不治者多死中年又

懷胎發乳癰腫及體結癰此必無害也蓋懷胎之

癰病起於陽明陽明者胃之脉也主肌肉不傷截

故無害也診其右午關上脉沉則為陰虛者則病

癰乳癰久不差則變為瘻

開慶問塗川 嘉林曾都運恭人吳氏年已五十

而病癰後杲不起以此知聖賢不妄說也

產寶論曰產後宜勤去乳汁不宜蓄積不出惡汁

內引於熱則結硬堅腫牽急疼痛或渴思飲其妨

手近不得若成膿者名妬乳乃急於癰宜眼連翹

湯利下熱毒外以赤小豆末水調塗之便愈或敷

捏去乳汁或以小兒手摩動之或大人含水翯之

得汁吐之其汁狀如膿若產後不曾乳見畜積乳
汁亦結成癰

連翹湯療產後妬乳并癰

連翹子 升麻 芍藥 白鯁 芒硝 各十分

防己 甘草 杏仁 去皮尖 大黃 各十二分

又方 右以水九升煎取三升大黃次下硝分三服

蒲黃草

右熟擣傳腫上日三度易之并葉煎汁飲之亦
佳妬乳及癰並差

又方

以地黃汁塗即愈

又療諸癰不散已成膿懼針令自決破方

取白雞內翅第一翎谷一莖燒未服之即決

又方

取白丁香研塗乾即易

又療乳癰初得令消

赤小豆

苧草

右等分為細末苦酒和傳之愈

又療乳癰初覺有異

黃芩

甘草

防風

赤芍藥

黃耆

通草

桑寄生 麥門冬分各六 大枣五枚
右細切以水一升煮取凡合去滓入乳 六分
分為四服

療乳癰或瘡久不差膿汁出疼痛欲死不可忍
鹿角二兩 甘草半兩

右為細末用雞子白和於銅器中煖溫傳患處
日五七易即愈

一方只用鹿角石上磨取濃汁塗之乾即易
一方鹿角燒作灰酒調抹立愈

治乳癰

鹿角屑一兩

右為細末以猪膽汁調下一錢不過再服神驗

以醋漿水服之亦得集驗方以猪頰下清汁

張氏橘香散

治乳癰未結即散已結即潰極痛不

可忍者藥下即不疼神驗不可云喻因小兒吹妳
變成斯疾者並皆治之

陳皮 浸去白眼乾麵炒微黃為細末麝香研
酒調二錢初發覺赤腫疼痛一服見效每服有

效

療乳癰諸般癰癰疽

橘紅半兩

阿膠粉炒

粉草一兩

右吹咀分為二服每服用泉水一椀半煎至盡
半去滓溫服

療妳癰并無名癰癰

鼠糞不以多少燒存性二分入輕粉二十文
研停麻油調塗如有頭即潰無頭即消又瘡
療乳頭裂破

以丁香為末水調傳立愈又以蛤粉胭脂芽
分新水調傳

陳日華方 **一醉膏** 治妳癰

石膏不以多少煨通赤取於地上煨覆出火
毒細研每服三錢溫酒調下添酒盡醉睡覺
再進一服千金療乳無汁以水煮服

金黃散

治妳癰出婦人

川大黃

粉草各一

右為細末以好酒熬成膏傾在盞中放冷攤紙

上貼痛處仰面卧至五更未貼時先川溫酒調

一大匙就患處卧明日取下惡物相度強弱用

藥羸弱不亘服

療發背乳癰四收虛熱大渴

又方 生地黃六兩 黃芩

芍藥

人參 知母

甘草各二

升麻 黃耆

麥門冬

栝樓各三 大棗十二

右以竹葉切三升以水一斗二升煮取九升去

竹葉內藥煮取三升渴則飲之

療婦人發乳丈夫發背爛生膿血後虛成氣疾

黃耆

麥門冬

地黃

大參

升麻

茯苓

各二

當歸

芍藥

遠志

甘草

各一

大麥

十箇

右水二升煮取一升分溫三服若有是證局中

排膿內補十宣散亦妙

產乳療婦人乳癰已穿未穿出膿大止痛斂瘡口

以芙蓉花爛研如癩若無花只取根上皮先

用竹刀刮去麤皮但用內一層嫩白皮研如

癩却入蜜少許調停看瘡大小如未穿即留

中孔如已穿即塞其乳其膿根自然涸出盡

不倦頻頻更換此方大治一切癰疽發皆立

乾膿散

又斂七口

烏賊骨

黃丹

天竺黃

各二

輕粉二

麝香

老降真膏

三錢

右研為細末乾糝瘡口不數日乾

又方

降真節二錢

天竺黃

露蜂房

各一

麝香

輕粉

各少

右為末乾糝

又方

乳香

沒藥

黃丹

各一

龍骨

真坯子

血竭

半錢

麝香

降真節

一錢

則不可療矣辛而後破
翹湯方見二論卷一
每遇再服必消減矣
五香連翹湯方見二論卷一

新編婦人大全良方卷之二

新編婦人大全良方卷之二十四

拾遺方

烏喙圓

治腸覃病因寒氣客於腸外與胃氣相搏
正氣不榮擊癥內著惡氣乃起其生也始如雞卵
久久乃成狀如懷胎按之堅推即移月事時下故
日腸覃亦治乳餘疾大小便不利并食有伏蟲臙
脹癰疽毒腫久寒邪氣

烏喙

炮去皮
二錢

半夏

湯洗
七錢

石膏

煨

藜蘆

炒

牡蒙

茯苓

酒浸各

乾姜

炮

桂心

各一錢

巴豆

研膏

右為末蜜圓如綠豆大每服三五圓食後酒飲
任下亦治男子疝痛

木香散 治婦人脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱

木香 甘草 一分

陳皮

桂心

茴香 半炒 兩

右洗焙為末空心日午溫陳米飲調下二錢忌

沈香

刺芎

人參

乾姜 炮

天茄 五兩 乾秤 赤

乳香 研

胡椒

晉礬 各半

縮砂 各一

石莖散 治婦人血結胞門或為癥瘕在腹脇間心

腹脹滿腫急如石水狀俗謂之血蠱

石莖 一兩 紅花 炒

當歸尾

烏梅肉 各半

馬鞭草

蓬莪茂

中出三陵 並炮

琥珀 別研 各

蘗木節

甘草 錢一

沒藥

右為末濃煎蘗木酒調下二錢不飲酒薑棗煎

湯調亦得

大腹皮飲 治婦人血癭單單腹腫

大腹皮

厚朴 姜製

枳殼 麩炒

陳皮

防己

栝樓

桑白皮 炙

青皮

木通

黃芪

大黃 蒸

五味子 各等

右吹咀每服秤一兩水一碗煎至六分盞去滓
八酒一分溫服不以時候

大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如敦之狀小便微難

而不渴由產後為水與血並結在血室也

大黃蒸四兩 甘遂炮 阿膠炒二兩

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服其

血當下

竹筴湯 治婦人汗血吐血尿血下血

竹筴 熟地黄各三兩 人參

白芍藥 桔梗 川芎

當歸 甘草炙 桂心各一兩

右吹咀每服四錢水一大盞煎至七分去滓不

以時服

膏髮煎 治婦人穀氣實胃氣下泄陰吹而正喧陰

中出血

頭髮灰 猪脂

右調停綿裹如枣核大納陰中

瓜子湯 治產後腸頭如以針刺連穀道又如痔痛

小便如淋狀或寒熱此產時用力氣併腸間亦由

陰虛陽邪乘之毒氣攻衝恐成腸癰宜

薏苡仁四兩 桃仁去皮 牡丹皮

瓜樓子各一兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫

服

固真丹 治圓臟久虛及小腸腎餘膀胱疝氣五般

淋疾精滑精漏小便白濁及婦人赤白帶下漏下

血崩子宮血海虛冷等疾並皆治之高司法方續

製蒼朮法 洗去土米 浸七日 換新片 五日
焙乾 秤一 斤 分 四 慶 小 白 帶 平 藏 下

蒼朮 四兩 入 炒 香 木 黃 兩 監 一 兩
蒼朮 四兩 入 川 烏 一 兩 炮 裂 去 皮 核 劈 開 同 炒 令

蒼朮 四兩 入 紅 椒 一 兩 去 目 并 合 口 者 破
蒼朮 四兩 入 紙 醋 一 兩 同 炒 令 木 黃 為 度

蒼朮 四兩 入 醋 二 兩 同 煮 三 十 沸 取 木 焙 乾
右一處為末 用煮藥酒醋打麪糊為圓 如梧子

大每服二十圓 男子溫酒或鹽湯下 空心食前
婦人醋湯下 藥性溫無毒 小便頻數為効

大効內補圓 治受氣虛弱及五勞七傷 臟腑積冷
瘰癧塊 虛脹或經脈不調 疝冷赤白帶下 口若

古乾面色萎黃 黑野心煩驚悸 頭目旋暈 不羨飲
食 痰涕黏涎 手足百節 批疼無力 肌肉消瘦 子息
斷緒 服一月 當妊娘百病皆愈

草薺 四兩 牛膝 五加皮
白朮 各二兩 川烏 炮 枳實
丹參 各一兩

右為細末 煉蜜圓 如梧子 大溫酒下 二十圓 空
心 日午晚食前 各進一服

南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷 無子及數

經墮胎 皆因衝任之脈 虛損胞肉 宿揆疾病 經水
不時暴下 不止 月內再行 或前或後 或崩中 漏下
三十六疾 積聚癥瘕 膝下冷痛 小便白濁 以上疾

證皆令孕育不成以致絕嗣此藥治產後百病百
亦治男子亡血諸疾

桃仁

京墨

人參

蠶布

桂心

牡丹皮

山藥

香附子

大豆卷

木香

秦艽

桔梗

藁本

乾姜

川芎

澤蘭葉

蒼朮

糯米

茯苓

甘草

石斛

當歸

細辛

川椒

熟地黃

右為細末煉蜜圓每兩作六圓每服一圓細嚼
溫酒送下淡醋湯調亦可空心食前服
治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不効者
惟有此藥可治神妙不可有每以少許臨臥時洗
面令淨如面油用之數日間瘡腫處自平赤亦消
如風刺粉刺一夕見效但塗藥勿近眼處

生硫黃

臍粉

荒青

香白芷

全蠍

瓜樓子仁

瓜樓子仁

蟬蛻

蟬蛻

右為細末麻油黃蠟約度如合面油多少熬溶
取下離火入諸藥在內每用少許塗面上林提

點方

烏雞煎治婦人百病

吳茱萸 良姜 白芍 延胡索 赤芍藥 合

破故紙 川椒 蓬莪茂 生乾地黃

劉寄奴 川芎 荷葉灰

音皮 各一

右為末醋煮麵糊圓如梧子大每服三五丸

湯使于後

月經不通紅花蘇木酒下

白帶牡蠣粉調酒下

子宮久冷白茯苓煎湯下

赤帶建茶清下

血崩豆淋酒調綿灰下

胎不安蜜和酒下

腸風陳米飲調百草霜下

心疼菖蒲煎酒下

漏胎下血烏梅溫酒下

耳聾耳蠟點茶下

胎死不動班猫三十箇煎酒下

脚腰痛當歸酒下

胎衣不下芸臺研水下

頭風薄荷點茶下

血風服黑豆甘草湯下

生瘡地黃湯下草炭下
身體疼痛黃耆末調酒下

四肢浮腫麝香湯下

咳嗽喘滿杏仁桑白皮湯下

腹痛芍藥調酒下

產前後痢白者乾姜湯下赤者甘草湯下赤白

雜者二宜湯下常服溫酒醋湯任下並空心食

前服

產乳集將護嬰兒方論

凡新生兒坐婆急以綿纏手指繳去兒口中惡物
令盡不可遲若嚥入腹中必生諸疾聖惠方寶鑑
疾先斷兒脐帶可只留二寸許更看帶中如有小

虫急撥去之留之必生異病或以線繫扎定然後

洗兒不然則濕氣入腹必作脐風之疾須是坐婆

并段輕疾既朋裹了取生甘草一寸搥剉用水一

合煎濃汁用綿蒙子蘸令兒啞之當吐出惡汁盡

半合不妨今人以濃煎黃連并甘草汁以線蒙

下謂之脐屎此好辰砂一字研細蜜調置兒口中

吮之以去驚邪然後飼乳自此飼乳之後須依時

量多寡與之勿令大飽恐成喎孺久則吐孺不可

節也三朝洗兒可用虎頭骨桃枝猪膽金銀煎湯

洗之則兒少驚尋常浴即用猪膽汁每日頻就無

風處看兒上腭并兩頰內存白泡如咳起者速以

指中刮破更生更去之保無即不須妄動更看舌

不恐生重舌皆由兒在胎中母喫炙轉肥臆飲酒
服熱藥所致自保童必効方三日烙疳帶或灸之外
不可別加火艾恐成驚癇者舊矣兒疳有二七壯又
天寒時兒用父母常著舊衣作衣服不可用新綿
絹只用舊者若太溫暖則令兒筋骨軟弱若天色
和緩無風可令妳婆抱孩兒頻見風日則血壯氣
剛肌體硬密堪耐風寒不致疾病又擇乳母須精
神爽健情性和悅肌肉充肥無諸疾病知寒溫之
宜能調節乳食孀汁濃白則可以飼兒不得與妳
母大段酸醎飲食仍忌纔衝寒或衝熱來便餵兒
孀如此則必成妳癖或驚疳浮利之疾切須忌之
夜間不得令兒枕臂須作一二豆袋令兒枕兼左

右附之可近乳母之側蓋西復衣衾須露兒頭面一
向仰臥恐成驚疾須時復回動之夏月須涼簟如
夜間妳須妳母起身坐地抱兒餵之如陰陽交
接之際切不可餵兒妳此正謂之交孀也必生癖
或換易衣綳三月房中不可太煖妳母不可頻喫
酒恐兒作痰嗽驚熱昏眩之疾至於變蒸次芽孀
乳所傷夜啼潮熱之類自有專於小方脈者此略
見之若能調和妳食并看承愛護如法則別無疾
病亦不須令兒常服湯藥此尤宜審之也見楊氏

巢氏病源嬰童寶鑑方程甫備要方

初生浴兒良日

寅卯酉日大吉

壬申丁巳癸巳大凶

木瓜圓療兒初生口中穢惡不盡入喉中即便吐自復縵啼聲一發則又嚥下因生異疾矣

木瓜

麝香

膩粉

木香

檳榔末各一字

右水麪糊圓如小黃黍米大每服一二圓甘草水下不拘時候

延胡素散療兒初生下盤腸刺痛面青色啼哭不止

延胡索一錢

乳香

木香各半錢

右為細末水一大錢煎七分無時與服少許

新編婦人大全良方卷之二十四



