





保嬰撮要卷十三

續集

明太醫院院使薛己著

喉痺

一附五臟虛羸傳變喉間內潰或鼻中垂出息肉或鼻外患瘡

一小兒喉痺因膏粱積熱或稟賦有熱或乳母七情之火飲食之毒當分其邪蓄表裡與症之輕重經之所主而治之若左腮色青赤者肝膽經風熱也用柴胡梔子散右腮色赤者肺經有熱也用瀉白散額間色赤者心與

小腸經熱也用導赤散若兼青色風熱相搏  
也用加味逍遙散鼻間色黃脾胃經有熱也  
用瀉黃散若兼青色木乘土位也用加味逍  
遙散兼赤色心傳土位也用柴胡梔子散頰  
間色赤腎經有熱也用地黃丸凡此積熱內  
蘊二便不通者當踈利之風邪外客而發寒  
熱者當發散之外感風邪大便閉結煩渴痰  
盛者當內踈外解若因乳母膏粱積熱者母

服東垣清胃散若因乳母恚怒肝火者母服  
加味逍遙散稟賦陰虛者兒服地黃丸大槩  
當用輕和之劑以治其本切不可用峻利之  
藥以傷真氣也

一小兒喉間腫痛驚悸飲水服驚風降火之  
藥益甚仍欲攻風痰余曰驚悸飲水心經虛  
症也蓋胃爲五臟之本先用五味異功散以  
補胃加桔梗甘草以消毒諸症頓退後用牛

勞子湯加柴胡而愈

一小兒喉間腫痛左腮色青赤此心肝二經之熱也用柴胡清肝散而愈後因驚服至寶丹吐痰發搐手足指冷此肝木虛而肺金乘之用補中益氣湯以補脾肺六味地黄丸以滋肝腎而痊

一小兒發熱飲冷大便黃色手足並熱不能吮乳視口內無患捫其喉間則突此喉內作痛乃脾胃實熱也用瀉黃清胃二散各一劑母子並服而愈後因乳母飲酒兒躁不安口內流涎仍用前二散而愈

一小兒喉間腫痛口角流涎手足並熱用瀉黃清胃二散母子服之而愈後因母大怒兒憎寒發熱仍復流涎用柴胡清肝散加漏蘆母子服之而愈

一小兒喉間腫痛發熱咳嗽大便秘結此肺

與大腸有熱也先用牛蒡子湯加硝黃一服  
大便隨通乃去硝黃再劑頓愈審其母有肝  
火發熱用柴胡清肝散母子並服而痊

一小兒嗜膏粱之味喉間腫痛痰涎壅盛服  
巴豆丸前症益甚口鼻出血唇舌生瘡大便  
不實余用犀角地黃湯解膏粱之熱用東垣  
安胃散解巴豆之毒又用甘桔湯而愈

一小兒喉腫作渴大便乾實右腮赤色此肺  
與大腸經實熱也用柴胡飲子一服而愈後  
因飲食停滯服峻厲之藥喉間仍腫腹中脹  
痛此脾氣復傷也用異功散加升麻當歸而  
痊

一小兒因母忿怒患前症兼咬牙呵欠余謂  
肝經虛熱之症子用甘桔湯加柴胡山梔牛  
蒡子母服加味道遙散而愈

一小兒肌體瘦弱嗜土炭煤灰後鼻間不利

恪服清熱之劑肌體愈瘦食少熱甚善驚善  
怒小便良久變白鼻中出息肉二寸許耳下  
頸間結小核隱於筋肉之間余謂肝脾虛羸  
之變症不信乃內清肺火外用腐蝕喉間亦  
腐余先用五味異功散加升麻柴胡蕪荑為  
主更用四味肥兒丸為佐脾氣漸健夕用九  
味蘆薈丸為主以五味異功散為佐而愈  
一女子六歲喉間腫痛鼻中息肉寒熱往來

小便頻數良久變白此肝疳之症先用加味  
逍遙散加炒黑焦龍膽草熱痒漸退乃去龍  
膽草佐以四味肥兒丸而愈

一女子七歲鼻生息肉搽攻毒之藥成瘡腫  
痛外以黃連甘草黃柏末付之以解藥毒更  
以加味逍遙散清肝火佐以四味肥兒丸而  
愈

一女子鼻中及下部常出息肉屢用毒藥蝕

之各挺出一條三寸許先與龍膽草湯為主  
以加味道遙散為佐而愈

一小兒額間赤足心熱喉中常痛服清胃敗  
毒之藥余謂稟腎水不足而心火熾甚也當  
用地黃丸壯水之主以制陽光不悟口舌赤  
烈小便如淋而歿

一女子十四歲患前症雜用清熱敗毒等藥  
前症益更患陰挺詳見下疳瘡

牛蒡子湯

治風熱上壅咽喉腫痛或生乳

蛾

牛蒡子

炒杵

玄參

升麻

桔梗

炒

犀角

鎊

黃芩

木通

甘草

各等分

右每服一二錢水煎服

拔萃桔梗湯

治熱腫喉痺

桔梗

炒

甘草

炒

連翹



梔子

炒

薄荷

黃芩

各等分

右為末每服一二錢水煎服

柴胡飲 解肌熱積熱或汗後餘熱脉洪實

弦數

實者

黃芩

七分

草

四分

大黃

八分

芍藥

炒七分

人參

各五分

當歸

一錢

右每服一錢薑水

東垣人參安胃散治脾胃虛熱口舌生瘡或

傷熱乳食嘔吐瀉痢

人參

一錢

黃芪

炒二錢

生甘草

炙甘草

各五分

白芍藥

酒炒七分

白茯苓

四分

陳皮

三分

黃連

炒二分

右為末每服二錢水煎

三因玉鑰匙治風熱喉閉及纏喉風

焰硝

一兩半

鵬硝

兩半

片腦

一字

白殭蠶錢一

右研勻用半錢吹入喉中立愈

九味蘆薈丸治肝經積熱咽喉口舌生瘡或  
牙齦蝕爛兩目生翳耳中出水或肝積瘵  
瘰疬下疳陰腫或莖出白津拗中結核或小  
水良久變白大便不調肢體消瘦等症

胡黃連

宣黃連

蘆薈

木香

白蕪荑炒

青皮

白雷丸

鶴虱草

各一兩

麝香

錢三

右各另為末米糊丸麻子大每服半錢空

心米湯下仍量兒大小用

甘桔湯治風熱上攻咽喉疼痛及喉痺妨悶

苦梗

兩一

甘草

兩炒二

右每服二錢水煎

濟生犀角地黄湯治膏梁積毒脾胃有熱喉  
咽腫痛或口舌生瘡

犀角

牡丹皮各一兩

生地黄錢八

赤芍藥錢七

右每服一二錢水煎

五味異功散方見敗毒之藥

六味地黄丸方見作渴不止

柴胡清肝散方見脇癰即柴胡梔子散

補中益氣湯方見肌肉不生

瀉黃散方見頭面瘡

腮癰二附耳症

腮屬足陽明胃經其生癰者多因兒食甘甜

厚味脾胃積熱所致亦有乳母鬱怒兒受其

患者若因熱積於內二便不通者用涼膈散

風邪相搏二便如常者用漏蘆湯胃經風熱

或兼咽喉腫痛用升麻防風湯若稟賦陰虛

火動頰間或兩耳內生瘡或出膿不止者宜

用地黃丸若因乳母肝火乘脾用加味道遙

散脾經鬱熱用加味歸脾湯膏梁積熱用東垣清胃散脾胃風熱用清咽利膈湯仍叅口瘡治之

一 小兒腮腫肉色不變大便不實屬胃經虛熱用五味異功散加升麻柴胡而愈又乳母飲酒兼怒兩腮赤腫憎寒發熱用加味清胃散一劑加味道遙散一劑治其母兒亦飲數滴而愈

一 小兒嗜炙燻腮腫發熱作渴飲冷用加味清胃散而消後仍不戒厚味腮腫赤痛熈連舌本先用瀉黃散而退次用加味清胃散而消

一 小兒腮患瘡作渴飲湯飲食少思服敗毒散益甚余謂此胃經虛熱先用七味白朮散次用五味異功散而渴止後因母怒兩腮赤腫作渴發熱用加味道遙散治其母兒患亦

愈

一小兒十六歲腮患此三年不愈色黯下陷此胃經症也宜滋化源以生腎水外散寒邪以接陽氣不信妄用雜方元氣益虛七惡蜂起始信余言後用前藥果驗

一小兒頰腫敷寒涼之藥色白腫硬久而不愈此胃氣虛而寒邪凝滯也用葱熨法以散寒邪異功散以助元氣遂愈若用攻毒之劑

則誤矣

一小兒酷嗜甘味藥餌惟甘者乃服後患腮腫余知其胃症也經曰酸能勝甘當用酸味之藥遂以烏梅肉作丸甘草末為衣服至二兩許始惡甘味腮腫漸消

一小兒腮腫痛外敷鐵箍散內服寒涼藥日久堅硬其色不變夫藥之寒涼者外敷則氣色凝滯內服則脾胃有傷故氣血有虧而肉

不潰色不赤也用四君子加柴胡升麻白芷  
當歸外散寒邪內補脾氣更用葱熨法不數  
日膿潰而愈

一小兒顛頰常焮腫服清熱敗毒之藥更口  
渴足熱面色微黑余謂腎疳症用六味地黃  
丸與子服母服加味逍遙散而愈後因別服  
伐肝之藥前症復作寒熱面青小便頻數此  
肝火血燥耳用柴胡梔子散以清肝六味地

黃丸以滋腎遂痊

一小兒顛頰腫痛後耳內出膿久而不愈視  
其母兩臉青黃屬鬱怒所致朝用加味歸脾  
湯夕用加味逍遙散母子皆愈

一小兒顛間發熱手足並熱用清胃瀉黃二  
散而愈後頰間腫痛焮連耳內余謂此腎經  
所屬之地不信雜用降火之藥耳出膿水或  
痒或痛稍加用心即發熱倦怠兩腿乏力用

補中益氣湯及六味地黃丸稍愈畢姻後朝  
寒暮熱形氣倦怠足心發熱氣喘唾痰仍用  
前二藥佐以六君子湯而愈後不守禁惡寒  
發熱頭運唾痰余謂腎虛不能攝水而為痰  
清氣不能上升而頭運陽氣不能護守肌膚  
而寒熱遂用補中益氣湯各加蔓荊子附子  
各一錢不應乃用人參一兩附子二錢二劑  
而應乃用十全大補湯百餘劑而痊

一小兒先頰間腫痛用敗毒之藥耳中流膿  
項間結核兩目或連劄或赤痛小便或作痒  
或赤澁皆肝膽二經風熱用四味肥兒丸悉  
愈

一小兒顛頰腫痛服敗毒藥後耳出穢水余  
謂肝腎之症先用九味蘆薈丸而痊畢姻後  
面黃發熱用黃栢知母等藥更胸膈痞滿食  
少痰壅乃利氣化痰加噫氣下氣用六君子

補中益氣二湯加乾薑木香尋愈

一小兒腮腫搽石灰末久而不散余用四君子加升麻白芷及葱熨之法漸消又用仙方活命一劑而瘥夫石灰乃辛熱燥血之藥小兒氣血虛者搽之反致難治慎之

一小兒腮間腫痛用鐵箍散敗毒散之類出膿久不愈面色鰲足心熱口舌乾余謂此稟腎水不足之虛症當補肺金滋腎水為主不

信仍服前劑脾土益虛絕生氣而歿

升麻防風湯治胃經實熱咽痛口燥腮癰等

升麻

防風

黃柏炒

茯苓

芍藥炒

陳皮各五分

連翹

當歸各七分

右每服二錢水煎仍量大小用之

清咽利膈湯治心脾蘊熱或咽喉腮舌腫痛

玄參

升麻

桔梗炒



甘草炒

茯苓

防風

黃芩炒

黃連炒

牛蒡子炒

芍藥炒各等分

右每服一二錢水煎

東垣清胃散方見腹癰

異功散方見用敗毒之藥

地黃丸方見作渴不止

神効葱熨法方見流注

仙方活命飲方見瘡瘍熱毒

臂癰三

臂癰之症當分經絡所屬受症之因而治之

上廉屬手陽明經下廉屬手太陽經外廉屬

手少陽經內廉屬手厥陰經內之上廉屬手

太陰經內之下廉屬手少陰經或經絡熱鬱

風邪外干氣血有乖即生癰毒若因心經有

熱者導赤散加黃連心胞絡有熱者柴胡梔

子散肺經有熱者瀉白散大腸經有熱者大連翹飲焮腫作痛者氣血凝結也用仙方活命飲腫痛不消者欲作膿也用托裡消毒散膿熟不出者氣血虛也用托裡消毒散膿出反痛者氣血虛甚也肌肉不生者脾胃氣虛也用五味異功散不可外傳生肌散恐反助其邪而肌肉難長也

一小兒臂上生癰腫連肘間此屬手少陰三焦二經先用仙方活命飲殺其大勢次用柴胡清肝散以清心肝之熱諸症頓退又用托裡消毒散出膿而愈

一小兒臂外側患毒此屬肺經部分先用神效解毒散加桔梗二劑腫痛頓減次用托裡消毒散而膿潰將愈因母食炙燻之味患處復腫兼發熱咳嗽子服瀉白散母服清胃散而痊

小兒臂腕漫腫敷寒涼藥又常以冷水潤之腫熱徹上至肩兩月餘而潰四月餘不斂膿出清稀面色痿黃余曰此氣血虛不能充榮於肌肉也先用異功散加升麻柴胡脾胃漸健又用托裡散而愈

一 小兒臂患癰久不愈手足時冷用異功散加木香佐以八珍湯手足溫和乃用托裡散將斂因飲食停滯傷脾患處腫硬用六君木香及托裡散而愈

一 小兒臂癰久不愈潰出碎骨飲食少思不時寒熱膿水清稀此氣血俱虛也用八珍散加肉桂桔梗漸消又用托裡散加肉桂及豆豉而斂

一 小兒臂膊赤腫發熱作渴飲冷症屬胃火先用加味清胃散而愈後因母食厚味復腫痛先用瀉黃散二服再用清胃散母子服之

並愈

一女子臂瘡腫焮作痛用仙方活命飲痛止成膿用加味八珍湯而膿潰漸斂用加味道遙散與母服而痊

一小兒因母食膏粱臂瘡潰而作痛脈洪數有力用清胃散與母服子服瀉黃散漸愈又用加味道遙散母子俱服而愈

一小兒臂瘡服敗毒散嘔吐腹脹作痛手足並冷用六君薑桂諸症漸退飲食漸進次用五味異功散而愈

一小兒臂癰腫硬色白寒熱倦怠此血氣虛弱而不能潰散先用五味異功散加乾薑其腫漸退飲食漸進又用托裡散如聖餅濃潰而愈

一小兒臂患癰腫硬不消食少自汗此脾肺氣虛而不能潰先用六君子湯而汗止乃佐

以葱熨法而膿成又用八珍湯而膿潰用托  
裡散而瘡斂

一小兒臂患瘡敷寒涼之藥腫硬不消用補  
中益氣湯加木香薄桂及如聖餅助其陽氣  
而消

一小兒臂患瘡腫硬作嘔面色痿黃飲食少  
思此脾氣虛也用六君子湯嘔止食進又用  
五味異功散如聖餅而消

一小兒臂瘡作痛不止肌肉不生先用托裡  
消毒散而痛止用五味異功散托裡散而肉  
生

一小兒臂患瘡久而不斂肌肉消瘦日晡體  
熱此脾氣虛而不能生肌肉也朝用補中益  
氣湯夕用五味異功散諸症漸愈又用托裡  
散如聖餅而愈

一小兒臂瘡腫痛焮赤右顙赤色傳服皆敗

毒之藥余謂此肺胃二經之症也當用瀉黃  
瀉白二散主之不信恪用前藥泛擾諸經虛  
症蜂起而歿

神効解毒散治一切瘡瘍初起腫者即消已  
潰仍腫者即散已潰毒不解者即愈

金銀花一兩

甘草節五錢

黃芪

皂角刺炒

當歸各三錢

乳香

沒藥各二錢

右爲散每服二錢酒煎溫酒調服亦可嬰  
兒病乳母亦服如瘡已潰腫痛已止者去  
乳沒金銀花倍加黃芪甘草

白芷升麻湯治手明陽經分臂上生瘡

白芷

升麻

桔梗各一錢

黃芪炒

黃芩酒炒各二錢

生黃芩半錢

紅花

甘草炙各五分

右水酒半鍾煎食後溫服

瀉白散治肺經有熱生瘡又化痰止嗽治氣  
進食

地骨皮

桑白皮

炒各一兩

甘草

炙五分

右為末每服一二錢入粳米百粒水煎

瀉心散治心經實熱生瘡作渴發熱飲冷手

足並熱者

詳見心臟瀉心湯

導赤散治小腸實熱生瘡作渴發熱小便秘

赤

生地黃

木通

甘草

等分

右為末每服一錢入淡竹葉水煎

大連翹飲即大連翹湯治肺熱生瘡

連翹

瞿麥

荊芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬殼

甘草

炒

山梔子

黃芩

各等分

右為末每服二錢加紫草水煎服之大便  
不通量加大黃

補中益氣湯 方見肌肉不生

加味道遙散

六味地黃丸 二方見發渴不止

十全大補湯 方見便癰

四味肥兒丸 方見貼骨癰

九味蘆薈丸 方見喉痺

柴胡梔子散 方見腹癰

東垣清胃散 方見腹癰

五味異功散 方見用敗毒之藥

托裡消毒散

托裡散 二方見熱毒瘡瘍

腋癰 三謂癰生於脇之前膚  
之傍白者五下皆是也

腋癰屬足少陽手少陰手厥陰三經小兒患  
之多稟賦肝火所致初起先用活命飲次用



柴胡梔子散五七日間作膿焮腫作痛者亦用活命飲殺其大勢雖潰亦輕而易斂若膿已成用托裡消毒散已出用托裡散如有變症當隨症治之

一小兒患前症腫痛用仙方活命飲而痛止用托裡消毒散而潰因母飲酒復加腫痛母服清胃散兒服活命飲托裡散而愈  
一小兒患之因乳母恚怒所致子用仙方活

命飲母用柴胡梔子散加味道遙散並愈後復患令母仍服前藥子服托裡消毒散而膿潰用托裡散而斂

一小兒腋下常患一枚此稟肝膽怒火也用牛黃解毒丸母服柴胡梔子散逍遙散而愈後每發即服前藥而愈或用荆防敗毒散外敷鐵籬散以杜後患幾至不救

一小兒十四歲患之內外皆用寒涼敗毒之

藥腫硬作痛上連肩髀膿成不潰或用針之  
膿仍不出余曰此氣血虛甚當峻補之不信  
半載後肩骨潰解惟皮相連瀝盡氣血而歿  
一小兒患之恪服敗毒之藥久不潰色不變  
腫硬如石余用葱熨之法及托裡散二十餘  
劑患處微赤作痛又數劑腫起針出穢膿氣  
息淹淹用人參一兩乾薑一錢棗子十枚四  
劑仍用前散尋愈

一小兒患之膿肉潰久不出色不變亦不痛  
余謂氣血虛甚當先大補而用火針不信或  
用冷針膿果不出更氣喘自汗余用獨參湯  
二劑喘汗少止膿仍未出又二劑膿出甚多  
喘汗大作又用前湯四劑諸症悉退乃用八  
珍湯漸愈後因傷風咳嗽誤用表散之藥煩  
躁自汗面目赤色脉洪大無倫按之如無此  
血脫發躁也先用當歸補血湯諸症頓愈再

用八珍湯而安又飲食過多發厥手足並冷  
用五味異功散加升麻柴胡生薑二劑而愈  
一小兒患之色黯不斂三年不愈用十全大  
補湯及豆豉餅三月餘將愈後勞倦怒氣腋  
下腫痛以加味道遙散十全大補湯相間服  
之月餘而愈

豆豉餅治瘡瘍腫痛硬而不潰及潰而不斂  
并一切頑瘡惡瘡用江西豆豉爲末唾津和

成餅大如銅錢厚如三四錢置患處以艾壯  
於餅上灸之灸乾則再易如瘡大作大餅覆  
患處以艾鋪餅上灸之未成者即消已成者  
祛毒間有不効者乃氣血虛敗之症也叅疔  
瘡類灸法用之

方見

四物湯治瘡瘍血虛發熱日晡益甚或煩躁  
不寐

當歸

熟地黄

各二錢

芍藥炒

川芎

各一錢

右水煎服

參朮柴苓湯治瘡瘍脾氣虛弱肝氣內動肢

體抽動者

人參

白朮

茯苓

陳皮

各一錢

山梔

炒

釣藤鈎子

各七分

甘草

炒五分

柴胡

升麻

各三分

每服一二錢薑棗水煎嬰兒用大劑與母

服子少服之

黃連安神丸治心經血熱發熱驚悸不安

黃連

五分

生甘草

二錢五分

生地黃

五錢

當歸

硃砂

三錢

右為末飯糊丸小豆大每服十五丸滾湯

下如二三服不應當服歸脾湯嬰兒乳母

並服

柴胡梔子散

方見脇癰一名柴胡清肝散

托裡消毒散

托裡散

二方見熱毒瘡瘍

清胃散

方見腹癰

加味道遙散

方見發熱不止

牛黃解毒丸

方見胎毒瘡疥

十全大補湯

方見便癰

脇癰

五

脇肋者足厥陰少陽之經相火之司也乃木

之主肝膽之氣不平則風火內搏榮逆血鬱  
熱聚為膿而癰腫之所由生也亦有稟賦母  
氣肝膽之熱恚怒之火而致然初患焮腫作  
痛者宜用柴胡梔子散未消者用仙方活命  
飲其熱既殺而腫不消者則必成膿也乃用  
托裏消毒散其膿既成以代針膏決之仍用  
托裏散自愈若膿出而痛止腫消則不必用  
藥也

傷嬰推要卷三  
一 小兒四歲脇間漫腫一塊甚痛色如故服  
流氣敗毒等藥加寒熱作嘔食少作瀉此稟  
肝脾氣滯之症元氣復傷而甚耳乃擇乳母  
氣血壯盛者與加味歸脾湯加味逍遙散服  
之兒飲其乳半載而消

一 小兒左脇生瘡寒熱作嘔右關脉弦數此  
肝症傳於脾也先用柴胡清肝散次用五味  
異功散又用托裏散瘡斂而愈其時同患是

症專用敗毒者俱致不起

一 小兒左脇下生瘡漫腫色赤此肝膽經形  
傷氣也先用托裏散消毒散加味小柴胡湯  
間服腫痛漸減又用托裏消毒散加味小柴  
胡湯瘡潰而愈

一 小兒四歲患脇癰色赤腫痛肝脉弦而遲  
此肝膽經血虛有熱先用加味逍遙散數劑  
大勢已消中間成膿又用托裏消毒散加柴

胡山梔膿潰而斂

一小兒肩患癰痛甚腫至背乃膀胱經部分  
血瘀滯也先用仙方活命飲毒解痛止又用  
加味小柴胡湯加連翹山梔金銀花其勢漸  
退乃用加味逍遙散加金銀花黃芪漫腫悉  
消但中間不退此欲作膿也用托裏消毒散  
膿成而潰又用托裏散地黃丸補血氣滋  
水而痊

一小兒患之久不愈左關脉弦數右尺脉按  
之而弱此稟腎虛而然也用地黃丸為主佐  
以八珍湯托裏散而愈

一小兒未暮脇間赤腫此稟肝火所致用加  
味逍遙散數劑與母服子日服數匙漫腫悉  
退佐以托裏消毒散加山梔柴胡瘡潰而愈  
後因母恚怒勞役子脇復腫亦用加味逍遙  
散加味歸脾湯母子服之並愈

一 小兒脇癰服伐脾之藥膿清不斂呵欠咬牙飲食少思仍欲伐脾余曰此脾虛之症也胃為五臟之主當補脾胃則肝不侮而肌肉自生矣不信仍伐肝木遂致不救

加味歸脾湯治小兒因乳母憂思鬱怒胃脇作痛或肝脾經分患瘡瘍之症或寒熱驚悸無寐或便血盜汗瘡口不斂等症

人參

黃芪炒

茯神去木各一兩

甘草炒

白朮炒

木香五分

遠志去心

酸棗仁

龍眼肉

當歸

牡丹皮

山梔炒各一錢

右水煎乳母服兒亦服之

小柴胡湯治肝膽經分一切瘡瘍發熱潮熱

或飲食少思加山梔牡丹皮名加味小柴

胡湯

柴胡一錢五分

人參五分

黃芩七分



半夏

五分

甘草

炒三分

作三二服服薑棗水煎

柴胡清肝散治肝經風熱或乳母怒火患一

切瘡瘍

柴胡

黃芩

炒

人參

川芎

各一錢

山梔

炒各一錢五分

連翹

甘草

各五分

桔梗

炒八分

右水煎母子服之

梔子清肝散

一名梔子柴胡散

治三焦及足少陽經

風熱生瘡或發熱耳內生瘡作痒或出水

疼痛

柴胡

梔子

炒

牡丹皮

茯苓

川芎

芍藥

炒

當歸

牛蒡子

炒各七分

甘草

三分

右水煎母子並服

龍膽瀉肝湯治肝膽經有熱小腹脇間患瘡

瘍或玉莖便毒懸癰囊癰腫痛或潰爛作痛小便澀滯或畢丸懸掛方見下疳陰痿

加味道遙散治小兒肝脾血虛內熱脇腹作

痛頭目昏黑怔忡頰赤口燥咽乾或發熱

盜汗食少不寐或口舌生瘡胃乳膨脹小

便不利或女子患前症經候不調發熱咳

嗽寒熱往來等症方見發熱不止

六味地黃丸治肝經血虛發熱或風客淫氣

瘰癧結核或四肢發搐眼目抽動痰涎上

湧或傷損出血發熱抽搐等症方見作渴不止

仙方活命飲

托裏消毒散

托裏散三方見熱毒瘡瘍

八珍湯方見發熱不止

腹癰六

腹癰者患於臍下或傍二寸許屬脾經近脇

屬膽經蓋因脾經陰虛氣滯血凝或因脾虛  
飲食積熱所患若炊腫作痛者瀉黃散堅硬  
腫痛者清胃散腫痛便秘者清涼飲如此而  
仍痛者瘀血凝滯也活命飲既用此藥而不  
消則內欲作膿也用托裏消毒散若膿出而  
痛不減者毒未解也亦用前藥若膿出而反  
加痛及膿水清稀者氣血虛也用參芪托裏  
散若食少體倦者脾氣虛也用五味異功散

加當歸柴胡升麻晡熱內

者脾血虛也用

四君當歸丹皮如有他症

隨症治之

一小兒患此漫腫微痛肉色不變面色痿黃  
飲食少思此脾氣虛而食積內熱也用五味  
異功散加升麻當歸及如聖餅其腫漸消又  
用托裏散而愈

一小兒患此腫痛寒熱活命飲末二  
瓜腫痛  
頓止用托裏散如聖餅而腫漸消又用神効

散及托裏消毒散數劑而痊

一小兒患之內潰作渴飲食少思屬元氣虛弱先用托裏消毒散四劑膿潰而發熱惡寒肢體倦怠此邪氣去而真氣虛也用八珍升麻補之稍愈又用托裏散異功散間服而痊

一小兒腹瘡大便秘結發熱飲冷此熱蓄於裏也用內疎黃連湯一劑大便通而痛止又用清熱消毒散內熱退而瘡愈

一小兒腹患瘡敷寒涼之藥其腫益甚腹中陰痛手足並冷此陽氣虛寒之症也余用回陽湯抑陰散而腫漸消毒漸散又用托裏散而斂

一小兒患此膿成不潰面色黃白惡心少食發熱惡寒大便不實此脾胃虛弱也先用六君升麻柴胡諸症漸退飲食漸進又朝用益氣湯夕用異功散而潰又用八珍湯而愈

傷寒指要卷之三  
一 小兒腹中作痛肉色不變三月矣診其脉滑數而有力此腹癰內潰也用托裏散大便出膿甚多乃用薏苡仁湯及托裏散而愈  
一 小兒小腹赤腫服流氣敗毒等藥肉色如故食少體倦余謂此肝脾氣血虛而藥傷之也用六君肉桂及葱熨之法飲食漸進其腫漸消又佐以八珍湯而愈

一 小兒患此而潰腫不消恪服敗毒之藥飲食少思膿清發熱余謂脾胃之氣復傷不信仍行氣清熱腫痛益甚服消導化痰之藥腹脹作瀉余先用異功散加升麻柴胡木香佐以二神丸二十餘劑諸症漸愈乃用異功散加當歸黃芪元氣漸復却用八珍湯內芍藥炒黃數劑改用托裏散而愈次年因勞心發熱作渴用當歸補血湯而安畢姻後寒熱往來患處作痒用十全大補湯六味地黃丸而

愈

四君子湯

加陳皮半夏即六君子湯

治脾胃虛弱或因寒

涼傷胃致腫不能消或潰而不能斂者但

以此藥溫補脾胃諸症自退如誤用攻伐

則七惡隨至矣若脾胃氣虛瘡口出血或

吐血便血則加當歸脾胃克健則血自歸

經若脾虛血弱不生肌或晡熱內熱者更

加熟地黃不可投四物沉陰之劑能傷脾

胃也若胃氣虛弱剋伐傷脾飲食少思或

食而難化若作嘔作泄者尤宜用之如兼

痰嗽氣逆肢體倦怠面目浮腫者亦因脾

虛不能生肺而然也最宜用之

人參

白朮炒

茯苓

甘草各等分

右每服二錢薑棗水煎

清胃散 治脾胃有熱生瘡或胃火牙痛或

連頭面

升麻五分

生地黄

牡丹皮

黃連炒

當歸各三分

右水煎服加柴胡山梔即加味清胃散

六君子湯治瘡瘍脾胃虛弱腫痛不消或不

潰斂宜用此藥以壯營氣諸症自愈即四

君加半夏陳皮

清涼飲 治瘡瘍脾胃實熱煩躁飲食燥痛

脉實大便秘結小便赤澀

赤芍藥

當歸

甘草

大黃各等分

右每服一錢水煎

當歸補血湯治瘡瘍肌熱面赤煩渴脉洪大

而虛重按全無此血虛脉也誤服白虎湯

必死方見發熱不止

益氣養榮湯治氣血損傷四肢頸項等處患

腫不問堅軟赤白痛否日晡發熱或潰而不斂者 方見鶴膝風

十全大補湯治諸瘡血氣虛不能潰腐收斂或膿出發熱惡寒汗出煩眩口眼歪斜或肌瘦少食發熱口乾等症須多服為善 方見便癰

參芪托裏散 不打空

補中益氣湯 方見肌肉不生

托裏消毒散

托裏散 二方見熱毒瘡癤

五味異功散 方見用敗毒之藥

如聖餅 方見流注

神功散 方見胎毒發丹

八珍湯 方見發熱不止

腎癰七

腎癰屬膀胱經濕熱或稟賦陰虛若腫硬作



痛用內托羗活湯微腫微痛用托裏消毒散  
若初起大痛或五日之間似消不消似潰不  
潰者先用仙方活命飲後用托裏消毒散若  
已潰食少體倦瘡不生肌脾胃虛弱者用五  
味異功散加柴胡升麻稟賦陰虛小便數而  
不斂者加減八味丸氣虛久不生肌收口用  
豆豉餅及補中益氣湯培養元氣若用解熱  
攻毒及敷圍寒涼之劑則氣血受傷必成敗

症矣

一小兒患此腫硬不赤旬餘矣面色痿黃飲  
食少進此脾氣虛弱也先用異功散飲食漸  
進漫腫漸消乃用托裏散少加肉桂而潰又  
用八珍湯而斂

一小兒患此久不收斂四圍微黯瘡口黑色  
膿水清稀寒熱晡熱脉浮而數兩寸按之如  
無此陽氣虛而陰血弱也朝用補中益氣湯

夕用異功散半載而愈

一小兒腎瘡潰而不斂面色時赤此稟肝腎陰虛也朝用八珍湯加五味子夕用加減八味丸諸症漸退又用托裏散間服而愈

一小兒腎瘡久不收斂肢體倦怠哺熱作渴此稟足三陰虛也用五味異功散加減八味丸漸愈又用托裏散而斂

一小兒腎癰久不生肌面色痿黃仍欲敗毒以收斂余曰脾主肌肉脾健則肉生遂朝用補中益氣湯夕用五味異功散及葱熨法脾氣壯肌肉生而愈

一小兒腫硬不消肉色不變此脾胃之氣虛怯不能運及患處耳朝用補中益氣湯夕用五味異功散以接虛怯之氣月餘而消其時同患是症外敷寒涼之藥內服犀角丸者無不受害

一小兒十五歲久不愈發熱體瘦面白噯氣  
恪服消食清熱等藥余謂心火虛而脾氣弱  
也先用八味丸為主佐以六君子湯補中益  
氣湯尋愈畢姻後腎間患疽漫腫堅硬肉色  
不變手足時冷脉浮大按之微細兩尺為甚  
先用八味丸料四劑又用十全大補湯患處  
色正而消  
內托羌活湯治尻腎生癰堅硬腫痛

羌活

黃柏

酒製各一錢

防風

藁本

當歸尾

各五分

肉桂

連翹

甘草

炙

蒼朮

陳皮

各三分

黃芪

八分

右作二劑水一鍾入酒一杯煎空心服

仙方活命飲

托裏消毒散

托裏散

三方熱毒瘡瘍

神効解毒散

方見臂癰

加味八味丸

方見作渴

八珍湯

方見發熱不止

葱熨法

方見流注

### 腿癰八

腿癰之症所主之經不同而所治之法亦異發於內側者屬肝脾二經發於外側者屬膽胃二經漫腫堅硬者元氣虛弱也用內補黃

芪湯腫勢高熅者元氣未虛也用內托柴胡黃芪湯外並用隔蒜熨法若瘀血凝結而不消或不作膿者用活命飲血氣虛弱而不能潰及不生肌者用托裏散此其梗槩云爾  
一小兒內腫痛惡寒發熱此屬肝膽經分乃用神効解毒散加柴胡白芷二劑漫腫頓消惟中央一塊尚腫又二劑而成膿以托裏消毒散潰膿而愈

一小兒腿內側前腫患毒潰後腫硬色黯膿清不斂面色青黃此脾虛肝旺兼寒邪襲於患處也當壯元氣為主先用異功散加柴胡升麻及葱熨法脾氣漸復患處漸愈佐以八珍湯豆豉餅而愈

一小兒腿內焮赤大腫發熱此血熱內鬱而欲為膿耳當先殺其大勢用隔蒜灸法灼艾試蒜熱移患處二十餘炷痛始減再三十餘

炷腫漸消又用仙方活命飲瘡頭出水而愈  
一小兒腿內側患此膿內潰惡心倦怠面色痿黃右關脈弦大按之微細此脾胃虛弱肝木所乘也先用六君升麻柴胡四劑元氣漸復乃佐以托裡散而愈

一小兒腿外側腫痛肉色如故用托裏消毒散二劑而腫始赤又四劑而腫赤亦退又六劑潰而膿出清稀食少體倦用異功散加芎

歸仍用托裏散補其元氣而愈

一小兒漫腫堅硬肉色不變此陽氣虛而不能成膿也用托裏散如聖餅腫起色赤用托裏消毒散而膿成針之用八珍湯加肉桂漸愈因傷食吐瀉患處天白飲食少思先用六君乾薑次用八珍湯及葱熨法而愈

一小兒患此久不愈膿水清稀面色痿黃腹大青筋此脾氣虛而肝所侮也朝用補中益氣湯夕用五味異功散元氣稍復乃佐以四味肥兒丸及葱熨之法兩月餘而愈

一小兒腿外腫一塊服消毒之藥其腫益甚肢體羸瘦飲食少思更加作痛余曰先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也當補接陽氣不信仍投踈泄之藥後果歿機要云榮衛之氣充滿抑遏不能行故閉塞氣血腐而爲癰者當泄之以奪盛熱之氣若

人飲食踈精神衰氣血弱肌肉消薄故榮衛之氣短促而滯滯故寒搏腠理閉鬱而為癰者當補之以接虛怯之氣信矣

四味肥兒丸治肝脾不和患瘡瘍久不愈或兼疳症腹脹作瀉或食積脾疳發熱瘦怯遍身生瘡

黃連

炒

蕪荑

神麩

麥芽

炒各等分

右為末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滾湯送下

附子餅治潰瘍氣虛不能收斂或風邪所襲氣血不能運於瘡口以致不能收斂者用炮附子去皮臍研末以唾津和為餅置瘡口上將艾壯於餅上灸之每日灸數壯但令微熱勿至熱痛如餅灸乾用唾津再和灸之以瘡口活潤為度

六君子湯治瘡瘍因脾氣虛弱不能生肌以致瘡口不斂若脾氣既充而瘡口不生肌肉者此寒邪所襲也更用豆豉餅或附子餅熨之

仙方活命飲

托裡消毒散

二方見熱毒瘡瘍

葱熨法

如聖餅

二方見流注

內托羗活湯

方見醫癰

五味異功散

方見用敗毒之藥

附子餅

方見腹癰

十全大補湯

方見便癰

補中益氣湯

方見肌肉不生

八珍湯

即四君四物

豆豉餅

方見腋癰

鶴膝風



鶴膝風者其腿漸細其膝愈麤狀如鶴膝是以名之此因稟腎經不足外邪所乘而患之初則膝內作痛外色不變伸屈艱難若一二月間焮腫色赤而作膿者可治腫硬色白而不作膿者難治初起者用大防風湯爲主佐以益氣養榮湯膿成者用補中益氣湯爲主佐以大防風湯切勿用十宣流氣等藥若不潰不斂或發熱等症者須調補脾胃爲善否

則必變敗症矣

一小兒九歲患此作痛用葱熨法及大防風湯腫起色赤用仙方活命飲補中益氣湯間服二三日用葱熨一次至兩月餘而消服腫漸消又以獨活寄生湯與補中益氣湯間服二三日用葱熨一次至兩月餘而消一小兒患此大潰不斂體倦食少口乾發熱日晡尤甚此脾氣虛甚也用補中益氣湯五劑以補元氣乃用大防風湯一劑以治其瘡

如是月餘諸症悉退遂用十全大補湯佐以太防風湯而斂

一小兒患此潰而不斂不時寒熱小便赤澀此血氣虛也用十全大補湯加麥門冬五味諸症頓退乃去桂令常服佐以和血定痛丸而愈

一女子左腿作痛服流氣飲之類左膝腫硬頭運吐痰余謂此鶴膝風也其脉弦數而無

力乃稟賦脾肝腎三經之症此形氣病氣俱虛者當先調補脾胃為主不信仍攻邪氣諸症蜂起余先用五味異散加升麻乾薑肉桂脾氣稍健又用異功散八珍湯而潰却間服大防風湯地黃丸而痊

一小兒兩膝漸腫傳服皆消毒之藥足脛赤腫此稟父腎氣不足用地黃丸八珍湯而消若用流氣敗毒等藥必致不起

大防風湯治鶴膝風腫痛不消或潰而不斂

附子炮

牛膝酒炒各一錢

白木

羌活

人參

防風各二錢

杜仲去皮薑製

川芎

肉桂去皮

黃芪炒

熟地黃自製

芍藥炒各一錢五分

甘草一錢

右每服三五錢水煎仍量兒大小用之

益氣養榮湯治氣血虛弱四肢頸項等處患

腫不問腫潰日久不斂俱宜服之

人參

茯苓

陳皮

貝母

香附炒

當歸酒洗

川芎

黃芪炒

熟地黃自製

芍藥炒各一錢

甘草炙

桔梗各五分

白木炒二錢

柴胡六分

右每服二三錢薑水煎

獨活寄生湯

獨活

桑寄生

杜仲炒

細辛

牛膝酒洗去土

秦艽

茯苓

白芍藥炒

桂心

川芎

防風

甘草

人參

熟地黄

當歸各等分

右每服二三錢水煎空心乳母同服

八珍湯

方見發熱不止

十全大補湯

方見便癰

補中益氣湯

方見肌肉不生

和血定痛丸

葱熨法

二方見流注

保嬰撮要卷之十三

畢

傳夏推要

