

卷三十九

婦人規

下

景岳全書

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄

上

二卷

金言卷一
傳忠錄

中

道集

三卷

傳忠錄

下

四卷

脈神章

上

有目二張

五卷

脈神章

中

六卷

脈神章

下

須集

七卷

傷寒典

上

有目二張

八卷

傷寒典

下

從集

九卷

雜證謨

全書卷一

總目

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

痙證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘧氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

玄運

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

恶心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

鵶雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲瘡

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

腳氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴斂

瘡閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒

附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規上 有目四張

三十九卷

婦人規下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹証

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上
有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈐上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈐下

大集

四十八卷

本草正上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共六十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宦集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

因陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書卷之三十九婦人規下

大集

增補 張介賓 訂 倭卿著

增補 魏超謙 瞻瞻訂

產育類

滑胎

三十二

妊娠滑胎之法惟欲其坐草之期易而且速而難易之由則在血之盈虛不在藥之滑利蓋血多則潤而產必易血虧則滑而產必難故於未產之前但宜以培養氣血爲主而預爲之

地如四物湯滑胎煎五福飲小營煎入珍湯之類卽皆滑胎
之要藥若不知此而過用滑利等物或產期未近無火無滯
而妄用清火行氣沉降苦寒等藥必皆暗殘營氣走泄真陰
多致血虧氣陷反爲臨期大害若果肥盛氣實者則紫蘇飲
保生無憂散滑胎枳殼散之類皆可擇用

催生

三三

凡妊娠胎元完足彌月而產熟落有期非可摧也所謂催生者
亦不過助其血氣而利導之耳直待臨期乃可用脫花煎或
滑胎煎隨證加減主之或經日从產母困倦難生俱宜服滑

胎煎以助其氣血令兒速生其有氣虛無力艱於傳送者必
用獨參湯隨多隨少接濟其力皆爲催生要法若期未至而
妄用行氣導血等劑以爲催生亦猶摘方苞之尋覓宋人之
苗耳

一臨盆將產腹痛已甚凡催生之藥無如脫花煎少用肉桂五
七分爲最穩最妙若氣虛無力者加入參二三錢虛甚者任
意加用之

一催生若水血下多子道乾澁難出者宜用滑利之物如猪脂
油蜜酥油葱白葵子牛乳滑石榆白皮之類以潤之亦濟急

之法也

滑胎催生論外方

達生散

婦四十

生化湯

婦四二

加味芎歸湯

婦四四
難產

良方當歸湯

婦五
滑胎催生

經驗滑石散

婦五二
胎乾難產

佛手散

婦四一

穩婆

三四

產婦臨盆必須聽其自然弗宜推逼安其神志勿使驚慌直待

花熟蒂圓自當落矣所以凡用穩婆必須擇老成忠厚者預

先囁之及至臨盆務令從容鎮靜不得用法推逼余嘗見有

穩婆忙冗性急者恐顧此失彼因而勉強試湯分之招之逼
之使下多致頭身未順而手足先出或橫或倒爲害不小若
未有緊陣不可令其動手切記切記又或有生息不順及雙
胎未下之類但宜穩密安慰不可使產母聞知恐驚則氣散
愈難生下又嘗見有奸詭之婦故爲哼訝之聲或輕事重報
以顯已能以圖酬謝因致產婦驚疑害尤非細極當慎也

立齋醫按載一穩婆云止有一女於分娩時適當巡街侍御行
牌取我視其內室分娩女爲此驚嚇未產而死後見侍御更
以威顏分付迨視產母胎雖順而頭偏在一邊此時若以手

人推正可保順生因畏其威不敢施手但回稟云此是天生
一天化非人力所能因是子母俱不能救由此觀之可見產時
一常用靜鎮自然而一毫驚恐疑畏有不可使混於其間者

產要 三五

凡孕婦臨月忽然腹痛或作或止或一二日或三五日胎水少
來但腹痛不密者名曰美胎非當產也又有一月前或半月
前忽然腹痛如欲產而不產者名曰試月亦非產也凡此腹
痛無論胎水來與不來俱不妨事但當覓心候時可也若果
欲生則痛極連腰乃將產也蓋腎繫於腰胞繫於腎故耳又

試捏產母手中指本節跳動即當產也此時兒逼產門穀道挺近水血俱下方可坐草試湯瓜熟蒂懸此乃正產之候也一產婦腹痛未甚且須寬心行動以便兒身舒轉如腰腹痛甚有產之兆卽當正身仰臥或起坐舒伸務宜安靜從容待兒轉身向下其產必順而且易最不宜預爲驚擾入手以致產婦氣怯胞破漿乾使兒轉身不易則必有難產之患

一產婦初覺欲生便須惜力調養不可用力妄施恐致臨產之力若兒方轉身而用力太早則多致橫逆須待順而臨門一逼自下若時候未到用力徒然

一臨產房中不宜多人喧囂驚慌宜閉戶靜以待生

一將產時宜食稠軟白粥勿令饑渴以乏氣力亦不宜食硬冷難化之物恐產時乏力以致脾虛不能消化則產後有傷食之病

一產婦產室當使溫涼得宜若產在春夏宜避陽邪風是也產在秋冬宜避陰邪寒是也故於盛暑之時亦不可衝風取涼以犯外邪又不宜熱甚致令產母頭疼面赤亦不宜人衆若熱氣薰蒸亦致前患其或有熱極煩渴而血暈血溢者亦可少與涼水暫以解之然亦不可多用若冬末春初餘寒尚盛

產室不可無火務令下體和緩衣被亦當溫厚庶不爲寒氣所侵可免胎寒血滯難產之患且產後胎元既落氣血俱去乘虛感邪此時極易故不可不慎

一凡富貴之家過於安逸者每多氣血壅滯常致胎元不能轉動此於未產之先亦須常爲運動庶使氣血流暢胎易轉則產亦易矣是所當預爲留意者

一妊娠將產不可詹卜問神如巫覡之徒咷嚇謀利妄言凶險禱神祇保產婦聞之致生疑懼夫憂慮則氣結滯而不順多至難產所宜戒也

一產時胞漿未下但只穩守無妨若胞漿破後一二時辰不生
卽當服催生等藥如脫花煎滑胎煎或益母丸之類蓋漿乃
養兒之主漿乾不產必其胎元無力愈遲則愈乾力必愈乏
所以速宜催之

一產婦與酒不可多而致醉凡產前醉則乏力而四肢不用產
後酒多恐引入血分四肢致後日有動血及四肢無力髓骨
痠痛之患

六逆產

三十六

一橫生者以兒方轉身產母用力逼之太早故致兒身未順而

先露手臂但令母安然仰臥穩婆以手徐推兒臂下體令其
正直復以中指摸其肩弗使脰帶攀繫卽生○二倒生者因
兒未及轉身產母努力故令兒先露足令母正臥以手徐推
足入良久仍推兒身徐俟轉正近門卽生○三偏生者因兒
未順生路產母努力逼兒頭偏一邊雖若露頂實額角也亦
照前法推正卽生若兒頂後骨偏扭轂道傍以手從外後傍
輕輕托止卽生○四凝產者兒身雖順門路雖正但不能下
乃因胎轉時脰帶絆肩而然令產母仰臥以手輕推兒向上
乃用中指按兒兩肩理順脰帶卽生○五坐產者因兒將產

其母疲倦久坐椅褥抵其生路而然須用手巾一條拴繫高處令產母以手攀之輕輕屈足舒伸以開生路兒卽順生。○六盤腸產者臨產母腸先出子產而腸未收故曰盤腸產古法以醋水各半盞默然喫產母面背則收一法以草麻子四十九粒研爛塗母頭項待腸收上急洗去俗以水喫面背驚之而腸亦收但恐驚則氣散反致他疾戒之

一方治橫逆產難令產母仰臥以小針刺兒手腳心三五次用鹽擦之手腳卽縮上轉身卽生

一方治盤腸產以半夏爲末用少許搐鼻中腸自上

又方用大紙燃以麻油潤滲點著吹滅以烟薰產婦鼻中腸即

上

又方腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸即上

胞破產難三七

凡產婦胎未順而胞先破者其因有一蓋一有母質薄弱胞衣不固因兒轉動隨觸而破者此氣血之虛也一有兒身未轉以坐草太早用力太過而胞先破者此舉動之傷也若胞破久而水血乾產路溢則兒難下宜急用大料四物湯或五物煎脫花煎滑胎煎五福飲當歸湯之類助其氣血并濃煎葱

湯薰洗產戶使其暖而氣達則自當順下若持久力乏血已
耗涸則甚危矣當用八珍湯料一斤益母草四兩水數碗煎
熟不時飲之亦有得生者或以黃芪芍歸數斤以大釜煎藥
氣氤氳滿室使產母口鼻俱受其氣亦良法也○大抵產難
之證多患於鬱悶安佚富貴之家治法雖云胎前清氣產後
補血然不可拘泥若脾胃不健氣血不克必當預爲調補不
然臨產必多患難

一產難經日不下別無危證者宜用脫花煎催之極妥極妙
一醫宿客店治店婦臨產數日不生下體俱冷無藥甚篤令取

椒橙葉茱萸共煎湯一盆令產婦以小凳坐盆內薰洗良久

小腹皆煖氣溫血行遂產

一方以紫蘆煎湯薰洗大抵遇嚴寒時月產火傷冷氣血必凝此薰洗之法亦要法也外以淋湯內以羊肉湯必效

一方令產婦以自己髮稍含於口中令其惡心作嘔卽下亦治

胞衣不出

三八

胞衣不出

胞衣不出有以氣血疲弱不能傳送而停閼不出者其證但見無力而別無痛脹治當補氣助血宜速用決津煎或滑胎煎

保生無憂散局方黑神散之類主之○有以惡露流入胞中
脹滯不出者蓋兒既脫胞帶必下墜故胞在腹中形如仰葉
仰則盛聚血水而脹碍難出惟老成穩婆多有識者但以手
指頂其胞底以使血散或以指摸上口攀開一角使惡露傾
瀉則腹空自落矣○又一法以本婦頭髮攬入喉中使之作
嘔則氣升血散胞軟亦自落矣凡胎胞不出者多死授以此
法甚效○若血滲胞中停蓄既久而爲脹爲痛或喘或急則
非逐血破血不可也宜速用奪命丹或用失笑散以熱酒調
服使血散脹消其衣自下若氣血兼虛者亦惟決津煎爲善

一方用草蓀子仁一兩研爛貼母右足心衣下速洗去緩則腸亦出如腸不收卽以此膏塗腦頂則腸自入

一方用紅花一兩酒煮濃汁服

一方用產婦鞋底炙熱熨小腹上下卽出

一方用皂角刺燒爲末每服一錢溫酒調服

胞衣論外方

牛膝散

婦四九

胎衣不下腹脹

氣脫血暈

三九

產時胎胞旣下氣血俱去忽爾眼黑頭眩神昏口噤昏不知人

古人多云惡露乘虛上攻故致血暈不知此證有二日血暈
曰氣脫也若以氣脫作血暈而用辛香逐血化瘀等劑則立
刻斃矣不可不慎也○一氣脫證產時血既大行則血去氣
亦去多致昏暈不省微虛者少頃卽甦大虛者脫竭卽死但
察其面白眼閉口開手冷六脈細微之甚是卽氣脫證也速
用人參一二兩急煎濃湯徐徐灌之但得下咽即可救活若
少遲延則無及矣余嘗救此數人無不隨手而愈此最要法
也又嘗見有禁參而斃者云新產後不可用參用參則補住
惡血必致爲害卽勸之亦不肯用直待斃而後悔者亦數人

矣又有云產後必遇七日方可用參此等愚昧訛傳不知始
自何人悞人不淺萬萬不可信也○一血暈之證本由氣虛
所以一時昏暈然血壅痰盛者亦或有之如果形氣脉氣俱
有餘胸腹脹痛上衝此血逆證也宜失笑散若痰盛氣粗宜
二陳湯如無脹痛氣粗之類悉屬氣虛宜大劑芎歸湯入珍
湯之類主之○一猝時昏暈藥有未及宜燒秤錘令赤用器
盛至床前以醋沃之或以醋塗口鼻令酸氣入鼻收神卽醒
或以破舊漆器或用乾漆燒烟薰之使鼻受其氣皆可但此
法惟輕而暴暈者所宜若氣虛之甚而昏厥者非用大補之

金匱卷三十九
刺終無益也

兒初生 初誕法 詳小兒門

四十

凡嬰兒初生當隨手包裹切不可爲風寒所侵蓋兒在腹中遮護最密及其初脫胞胎肌膚脆嫩極易感邪若在夏令自所無慮但覺稍寒卽須慎之嘗見兒生未久多有驚風發熱抽搐等病者率由乎此○一小兒初生天氣微涼卽大忌洗沐恐腠理不密元氣發泄而外邪乘之也○凡產母分娩艱難勞傷胎氣多有兒雖脫胞而之力垂危或已死者切不可便斷臍帶當急用大紙擦蘸香油於臍帶上往來燒斷之取其

陽氣以續胎元俄頃見得啼聲卽已活矣且可免胃寒泄瀉
之病凡見此者若以刀斷臍帶則子母皆多難保此出立齋
醫按○一凡燒帶之法惟素多陽虛及產時氣脫者最宜用
之以助陽氣若母氣陽強或見聲洪亮者皆不宜用恐火從
臍入日後致生熱毒則反爲害不小

子死腹中

四

凡子死腹中者多以觸傷或犯禁忌或以胎氣薄弱不成而殞
或以胞破血乾持久困敗但察產母腹脹舌黑者其子已死
若非產期而覺腹中陰冷重墜或爲嘔惡或穢氣上衝而舌

見青黑者皆子死之證宜速用下死胎方下之下後察其虛實隨加調補自愈若唇舌面色俱青則母子皆危之兆也

補遺方 治胎死腹中用紅花以酒煮汁飲二三碗卽下

新法下胎方 用當歸一兩厚朴三錢陳皮二錢入酒水各一

碗煎至一碗加朴硝三五錢再煎十餘沸去粗熟服死胎自

下○或止用脫花煎更妙

死胎論外方

迴生丹

婦六六

下死胎方

婦五九

桂香散

婦五五

琥珀丸

婦一三四

產門不開不閉子宮不收

四二

交骨不開產門不閉無非陰氣不足陰不足則氣不達所以不開不開則產必艱難宜加味芎歸湯補而開之大有奇效或十全大補湯亦可

產門不閉山陰氣大虛不能收攝或由陰火下流而然故或爲陰挺突出或爲腫脹或爲淋瀝不禁○若氣血俱虛者宜十全大補湯加五味子補而欬之○或痛而覺熱者宜加味道遙散○若憂思傷脾血熱者加味歸脾湯○若暴怒傷肝動火者龍胆瀉肝湯

子宮不收而外墜者宜補中益氣湯加醋炒芍藥飲而舉之或外以黃芪煎湯薰洗亦妙或以硫黃湯薰洗硫黃散傅之
一方 治產後子宮不斂用荆芥藿香椿根白皮煎湯薰洗神效

一方 產後子腸不收外用枳殼訶子五倍子白礬煎湯薰洗若不收再炙頂心百會穴數壯卽上

一方 子宮脫出用草麻仁十四枚研爛塗頂心入卽洗去

一方 治產後陰脫用絹袋盛炒熟蛇床子熨之亦治陰痛又法用蛇床子五兩烏梅十四個煎水日洗五六次

小產

四三

小產之證有輕重有遠近有稟賦有人事由稟賦者多以虛弱
由人事者多以損傷凡正產者出於熟落之自然小產者由於
損折之勉強此小產之所以不可忽也若其年力已衰產
育已多欲其再振且固自所難能凡見此者但得保其母氣
則爲善矣若少年不慎以致小產此則最宜調理否則下次
臨期仍然復墮以至二次三次終難子嗣係不小矣凡此安
之之法見前數墮胎條中旣產調理之法亦與大產相似詳
後產後條中俱當按而用之

一凡婦入年及中衰胎元無力則常有胎不能長及多小產昏
暈之患此氣血衰敗而然血氣既衰則凡於小產之後多有
胎既落而復又下墜如更有一胎欲產者此非胎也乃因氣
虛而胞宮隨胎下陷也產母不知必至驚慌此無足慮但以
壽脾煎或入珍十全大補芎歸補中湯之類主之則自安矣
又凡小產有遠近其在二月三月爲之近五月六月爲之遠新
受而產者其勢輕懷久而產者其勢重此皆人之所知也至
若猶有近者則隨孕隨產矣凡今艱嗣之家犯此者十居五
六其爲故也總由縱慾而然第自來人所不知亦所不信茲

謹以筆代燈用指述者倘濟後人實深願也請詳言之蓋胎
元始肇一月如珠露二月如桃花三月四月而後血脉形體
具五月六月而後筋骨毛髮生方其初受亦不過一滴之玄
津耳此其橐籥正無依根荄尚無地輩之則固決之則流故
凡受胎之後極宜節慾以防泛溢而少年縱情罔知忌憚雖
胎固慾輕者保全亦多其有兼人之勇者或恃強而不敗或
旣敗而復戰當此時也主方欲靜客不肯休無奈狂徒敲門
撞戶顧彼水性熟腸有不啓扉而從隨流而逝者乎斯時也
落花與粉蝶齊飛火棗共交梨金逸合汚同流已莫知其昨

日孕而今日產矣朔日孕而望日產矣隨孕隨產本無形迹
蓋明產者胎已成形小產必覺暗產者胎仍以水直溜何知
故凡今之術家多無大產以小產之多也娶娼妓者多少
子息以其子宮滑而慣於小產也今嘗見艱嗣求方者問其
陽事則曰能戰問其功夫則曰儘通問其意況則怨嘆曰人
皆有子我獨無亦豈知人之明產而爾之暗產耶此外如受
胎三月五月而每有墮者雖衰薄之婦常有之然必由縱慾
不節致傷母氣而墮者爲尤多也故凡恃強過勇者多無子
以強弱之自相殘也縱肆不節者多不育以盜損胎元之氣

也豈悉由婦人之罪哉欲求我方者當以此篇先讀之則求
方之恩已過半矣

小產論外方

人參黃芪湯

婦四入
小產氣虛血不止

當歸川芎湯

婦四三
小產瘀血痛

敗胞煎

新因十
小產後腹痛

下胎斷產

四四

下胎斷產本非仁者之事然有婦人臨產艱危或病甚不勝產
育者則下胎斷產之法有不得已亦不可廢者也至若水銀
藍虫水蛭斑蝥之屬不惟傷胎且傷母矣用者不可造次

下胎方

千金去胎方

婦六一

下胎小品方

婦五六

扶羸小品方

婦五入

廣濟下胎方

婦五七

良方桂心散

婦五四

蓖麻子一

一方 不拘生胎死胎用蓖麻仁二個巴豆一個麝香一分研貼臍中并足心卽下○月一粒溫酒吞下○又方下生胎用

斷產方

斷產小品方

婦六入

千金斷產方

婦又六七

丹溪斷子法

婦六九

斷產灸法

婦六七

產育類論列總方

四五

四物湯

補八

八珍湯

補十九

十全大補湯

補二十

五福飲

新補六

五物煎

新因三

補中益氣湯

補三一

當歸湯

婦五

小營煎

新補十五

保生無憂散

婦四七

羊內湯

婦七一

脫花煎

新因十一

加味道遙散

補九四

壽脾煎

新熟十六

決津煎

新因二

加味歸脾湯

補三四

滑胎煎

新因九

益母丸

婦六四

滑胎枳殼散

婦二四

紫蘇飲

婦二八

奪命丹

婦六五

加味芎歸湯

婦四四

失笑散

婦百四

芎歸補中湯

婦四六

龍胆瀉肝湯

寒六二

硫黃湯

婦六三

局方黑神散

婦五十

芎歸湯

婦四一

產後類

論產後當大補氣血

四六

產後病治嘗見丹溪云產後當大補氣血卽有雜證以末治之
一切病多是血虛皆不可發表此其意謂血氣隨胎而去必
屬大虛故無論諸證皆當以大補爲先其他皆屬可緩余於
初年誠然佩服及執而用之則每爲所困經者數次始悟其
言雖有理而未免言之過也卽今產科所宗無非此法余目
覩其誤及親爲解救者蓋不少矣故敢剖析於後實有所見
不得不言非存心自衒故譏先賢若然則徒爲笑罵之招耳
賓雖至愚必不爲也觀者其深察此意

凡產後氣血俱去誠多虛證然有虛者有不虛者有全實者凡此三者但當隨證隨人辨其虛實以常法治療不得執有成心概行大補以助邪此辨之不可不真也

一產後虛證無非隨人元氣必素弱之人多有之或於產後血氣俱去而更弱者亦有之此當因人察脉因脈察證若脉氣形氣病氣俱不足此當以全虛治之若形氣不足病氣有餘或兼火邪或兼外邪或以飲食停滯是亦虛中有實不得不詳審而治此中委曲未能言盡惟明者悟之

一產後不虛證蓋或其素日無病或以年少當時或以素耐辛

苦貧勞之質此輩本無不足及其一旦受孕乃於無病腹中
參入此物故致血氣壅塞爲脹爲嘔是皆添設有餘之病及
其既產始見通快所留得去仍復故吾常人之產此類極多
果何虛之有然或以內傷或以外感產後之病難保必無倘
有所犯去之卽愈若概行大補果能堪否卽臨盆帶去血氣
未免暫見耗損然以壅滯之餘不過皆護胎隨從之物去者
當去生者旋生不出數日必已來復此生化自然之理何至
是產皆虛也凡治此類但當因證用治若執云產後必當大
補氣血則實實之病必所不免而輕者必甚甚者必危矣由

此觀之則立言者固不易而用言者又豈易哉

一產後全實證有如外感風寒頭痛身熱便實中滿脈緊數洪大有力者此表邪之實證也○又火之盛者必熱渴躁煩或便結腹脹口鼻舌焦黑酷喜冷飲眼眵尿管痛赤脈見洪滑此內熱之實證也○又鬱怒動肝胸脇脹痛大便不利脈弦而滑此氣逆之實證也○又惡露未盡瘀血上衝心腹脹滿疼痛拒按大便難而小便利此血逆之實證也○又凡富貴之家保護太過或過用參芪术以致氣壅或過用糖酒炭火以致內熱或產本不虛而妄用太補之藥以致增病此調

攝之實證也○又或因產過食恐其勞困固令勉強以致停蓄不散此內傷之實證也○以上諸證姑舉要者以見其槩然既有表邪則不得不解既有火邪則不得不清既有內傷停滯則不得不開通消導且人有強弱產有虛實病有真假治有逆從固不可以同日語也觀六元正紀大論曰婦人重身毒之何如曰有故無殞亦無殞也此自經常不易之大法亦何庸贅辨之若此第因丹溪之言人多偏執故不得不詳盡其說以解後人之惑也諸虛實治法詳具後條

論產後三禁

四七

觀病機機要五治胎產之病當從厥陰證論之宜無犯胃氣及上二焦是爲三禁謂不可汗不可下不可利小便發其汗則一同傷寒下早之證利大便則脈數而傷脾利小便則內亡津液胃中枯燥但使不犯三禁則營衛自和而寒熱自止矣凡用治之法如發渴則白虎氣弱則黃芪血痛則當歸腹痛則芍藥大抵產病大行從加減柴胡雜證從增損四物宜察脉證而用之詳此說雖爲產育之大法然病變不同倘有是證則不得不用是藥所謂有病則病受之也第此經常之法固不可不知而應變之權亦不可執一也

產後腹痛

四八

產後腹痛最當辨察虛實血有留瘀而痛者實痛也無血而痛者虛痛也大都痛而且脹或上衝胸膈或拒按而手不可近者皆實痛也宜行之散之若無脹滿或喜揉按或喜熱熨或得食稍緩者皆屬虛痛不可妄用推逐等劑

凡新產之後多有兒枕腹痛者摸之亦有塊按之亦微拒手故古方謂之兒枕皆指爲胞中之宿血此大不然夫胎胞俱去血亦豈能獨留蓋子宮畜子既久忽爾相離血海陡虛所以作痛胞門受傷必致壅腫所以亦若有塊而實非真塊腫

既未消所以亦頗拒按治此者但宜安養其臟不久卽愈惟
一殿胞煎爲最妙其次則四神散五物煎皆極佳者若誤認爲
一瘀而妄用桃仁紅花玄胡青皮之屬反損臟氣必增虛病○
一有母體本虛而血少者卽於產時亦無多血此輩尤非血
滯若有疼痛只宜治以前法或以大小營煎黃雌雞湯主之
○一凡新產之後其有陽氣虛弱而寒從中生或寒由外入
以致心腹作痛嘔吐不食四肢厥冷者宜九薑煎大巖薑湯
或理陰煎主之○一產當寒月以致寒氣入腹臍下脹痛手
不可近者宜羊肉湯主之若氣實寒甚者宜蟠蕊散○一產

後惡露不盡留滯作痛者亦常有之然此與虛痛者不同必
其由漸而甚或大小便不行或小腹鞭實作脹痛極不可近
手或自下上衝心腹或痛極牙關緊急有此實證當速去其
血近上者宜失笑散近下者宜通瘀煎奪命丹廻生丹如或
未效當用決津煎爲善○一產後有脾虛腎虛而爲腹痛者
此不由產而由臟氣之不足若脾氣虛寒爲嘔吐爲食少而
兼腹痛者宜五君子煎六君子湯溫胃飲之類主之若腎氣
虛寒爲瀉爲痢而兼腹痛者宜胃關煎理陰煎之類主之○
一產後有飲食停滯及氣逆作痛亦當因其類而消去之如

排氣飲大和中飲之類皆可酌用

仲景曰產後腹中疼痛當歸生薑羊肉湯主之并治腹中寒疝

虛勞不足

立齋曰前證若因氣滯用延胡索散○若因外寒用五積散○

若因怒氣用四物加木香柴胡○若因血虛用四物參木炮

薑○若因陽氣虛弱用四君當歸炮薑○若因脾虛血弱用

六君當歸炮薑

產後發熱

四九

產後發熱有風寒外感而熱者○有邪火內盛而熱者○有水

虧陰虛而熱者○有因產勞倦虛煩而熱者○有去血過多
頭暈悶亂煩熱者諸證不同治當辨察

一產後有外感發熱者蓋臨盆之際多有露體用力無暇他顧
此時或遇寒邪則乘虛而入感之最易若見頭疼身痛憎寒
發熱或腰背拘急脉見緊數卽產後外感證也然此等外感
不過隨感隨病自與正傷寒宿感者不同故略加解散卽自
痊可勿謂新產之後不宜表散但當酌其虛實而用得其宜
耳○凡產後感邪氣不甚虛者宜三柴胡飲○若氣虛脾弱
而感者宜四柴胡五柴胡飲○若肝脾腎三陰不足而感者

宜補陰益氣煎若虛寒之甚者宜理陰煎○若產婦強壯氣一實而感者宜正柴胡飲○若兼內火盛而外邪不解者宜一柴胡飲○若風寒俱感表裏俱滯者宜五積散

一產後有火證發熱者但外感之熱多在表火證之熱多在裏此必以調攝太過或時令熱甚或強以酒或誤用參木薑桂大補之藥或過用炭火或窓牖太密人氣太盛或氣體本實而過於動作凡屬太過皆能生火火盛於內多見潮熱內熱煩渴喜冷或頭痛多汗便實尿赤及血熱妄行但無表證脉見緩滑不緊而發熱者便是火證宜清化飲保陰煎之類主

之若本元不虛或火之甚而勢之急者卽從薪飲抽薪飲亦所常用不必疑也

一產後有陰虛發熱者必素稟脾胃不足及產後氣血俱虛故多有之其證則倏忽往來時作時止或晝或夜進退不常或精神困倦怔忡恍惚但察其外無表證而脉見弦數或浮弦豁大或微細無力其來也漸非若他證之暴至者是卽陰虛之候治當專補真陰宜小營煎三陰煎五陰煎之類隨宜主之○若陰虛兼火而微熱者宜一陰煎○若陰虛兼火之甚而大熱者宜加減一陰煎○若陰虛火盛熱而多汗者宜當

歸六黃湯○若陰中之陽虛火不歸源而熱者宜大營煎理
陰煎右歸飲之類主之○若血虛陽不附陰煩熱作渴者宜
人參當歸湯○若氣血俱虛發熱煩躁面赤作渴宜入珍湯
十全大補湯若熱甚而脈微者宜急加桂附或認爲火則禍
在反掌

一產後有去血過多發熱者其證必煩渴短氣頭痛頭暉悶亂
內熱是亦陰虛之屬宜人參當歸湯主之

立齋曰大凡元氣虛弱而發熱者皆內真寒而外假熱也但用
六君或補中益氣加炮薑溫補脾氣諸證自退若四肢畏冷

急加附子○凡新產陰血暴傷陽無所附而外熱宜用四物

炮薑補陰以配陽若因誤服寒涼尅伐之劑而外熱此爲寒氣格陽於外宜用四君子加薑桂如不應急加附子若或肌膚發熱面目赤色煩渴引飲此血脫發躁宜用當歸補血湯

產後乍寒乍熱

五十

產後乍寒乍熱總由血氣虛損陰陽不和而然若陽勝則乍熱陰勝則乍寒○凡陰勝而寒多者宜增損四物湯理陰煎○若陽勝而熱多者宜四物湯三陰煎○若陽氣陷入陰中而乍寒乍熱者宜補中益氣湯補陰益氣煎○若陰陽俱虛而

寒熱者宜入珍湯十全大補湯○若敗血不散流入陰中而一作寒熱者宜決津煎胞煎○若血實氣壅者宜奪命丹陳無擇曰敗血流閉諸陰則寒流閉諸陽則熱宜五積散○若有外感者宜從前產後發熱調治

蓐勞 五一

蓐草薦也產婦坐草艱難以致過勞心力故曰蓐勞此卽產後勞倦也其證則或爲寒熱如瘧或頭疼自汗或眩暈昏沉或百節疼痛或倦怠喘促飲食不尅形體虛羸之類皆其候也悉當以培補元氣爲主○若初產後蓐勞困倦惟猪腰湯爲

妙或用黃雌雞湯白茯苓散○若蓐勞虛汗不止宜母雞湯

○若兼臟寒者宜羊內湯○若氣血俱虛者宜五福飲十全

大補湯○若兼外邪發熱者宜補陰益氣煎補中益氣湯○

若兼外邪發熱而中寒背惡寒者宜理陰煎詳加減法治之

○若兼陽虛內寒者宜五君子煎或理陰煎○若陽盛陰虛

兼內熱者宜五福飲加芍藥黃芩地骨皮之類隨宜用之

產後喘促

五二

產後喘急有二乃一以陰虛之極一以寒邪在肺蓋產後既以太虛焉得氣實而喘若肺無寒邪而見喘促者此以血去陰

虛孤陽無主故氣窮短促而浮脫於上此實肝腎不接無根一將脫之兆最爲危候經曰肝苦急急食甘以緩之正此類也惟貞元飲爲治此之神劑○若氣虛兼寒者宜大補元煎或理陰煎○若風寒外感邪氣入肺而喘急者此必氣粗胸脹或多欬嗽自與氣短似喘上下不接者不同治當以踈散兼補爲主宜金水六君煎或六君子湯○若單以寒邪入肺氣實氣壅而本無虛者宜六安煎或二陳湯加蘇葉之類主之

喘嗽論外方

婦八六

二物參蘇飲

婦八四

瘀血入肺喘嗽

產後惡露不止

五三

產後惡露不止若因血熱者宜保陰煎清化飲○有傷衝任之絡而不止者宜固陰煎加減用之○若肝脾氣虛不能收攝而血不止者宜壽脾煎或補中益氣湯○若氣血俱虛而淡血津津不已者宜大補元煎或十全大補湯○若怒火傷肝而血不藏者宜加味四物湯○若風熱在肝而血下泄者宜一味防風散

一止血方 用蒲黃二兩水煎頓服

血不止論外方

人參當歸湯

婦百十四

佛手散

婦四
血多煩暈

產後發癢

五四

產後發癢乃陰血大虧證也其證則腰背反張戴眼直視或四肢強勁身體抽搐在傷寒家雖有剛痙柔痙之辨然總之則無非血燥血枯之病而實惟足太陽與少陰主之蓋膀胱與腎爲表裏腎主精血而太陽之脉絡於頭目項背所以爲病若此若其所致之由則凡如傷寒誤爲大汗以亡液大下以亡陰或潰瘍膿血大泄之後乃有此證故在產後亦惟去血過多或大汗大瀉而然其爲元氣虧極血液枯敗也可知凡

遇此證速當察其陰陽大補氣血用大補元煎或理陰煎及十全大補湯之類庶保其生若認爲風痰而用發散消導等刺則死無疑矣

產後大便秘澁

五五

產後大便秘澁以其失血亡陰津液不足而然宜濟川煎加減主之及後立齋法俱妙

立齋曰前證若計其日期飲食已多卽用藥通之禍在反掌之間矣必待其腹滿覺脹欲去不能者此乃結在大腸宜用猪胆汁潤之若服苦寒躁通反傷中氣通而不止或成他證○

全書卷三十九
婦人科
若去血過多用十全大補湯○血虛火燥用加味四物湯○氣血俱虛用八珍湯○雖數日不通飲食如常腹中如故仍用入珍加桃仁杏仁治之若泥其日期飲食之多而通之則誤矣

產後雜證方 五六

良

黃龍湯

婦八五

方

產後外感

海藏愈風湯

和二一七失血筋急搐搦

良方交加散

婦百

方

產後中風

交加散

和二五二產後類風不省人事

七珍湯

婦七九產後不語

補脬飲

婦入一產後脬破淋瀝

良人參湯

婦七七產後諸虛

麻黃根湯

婦入三產後虛汗

趁痛散

婦八十一
產後發熱骨節疼痛

加味小柴胡湯

散二十
乳母肝火發熱

產後類論列總方

五七

四君子湯

補一

五君子煎

新熱六

金水六君煎

新和一

六君子湯

補五

大補元煎

新補一

十全大補湯

補二十

四物湯

補八

五物煎

新因三

補中益氣湯

補三一

大營煎

新補十四

小營煎

新補十五

補陰益氣煎

新補十六

五福飲

新補六

八珍湯

補十九

當歸六黃湯 寒六五

溫胃飲 新熱五

胃關煎 新熱九

加味四物湯 補九

壽脾煎 新熱十六

理陰煎 新熱三

增損四物湯 婦百十

三陰煎 新補十一

一陰煎 新補八

加減一陰煎 新補九

五陰煎 新補十三

貞元飲 新補十九

人參當歸湯 婦百十四

保陰煎 新寒一

固陰煎 新因二

一味防風散 婦百十五

右歸飲 新補三

蟠葱散 热百十一

當歸補血湯 補四五

羊肉湯 婦七十一

婦七十二

猪腰湯 婦七十四

黃雌雞湯 婦七二

母雞湯 婦七十三

決津煎 新因二

胎胞煎 新因十

通瘀煎 新因五

濟川煎 新補二二

清化飲 新因十三

失笑散 婦百四

奪命丹 婦六五

四神散 婦七五

二陳湯 和一

六安煎 新和二

五積散 散三九

抽薪飲 新寒三

徙薪飲 新寒四

延胡索散 婦九八

白茯苓散 婦七八

正柴胡飲 新散六

二柴胡飲 新散一

三柴胡飲 新散三

四柴胡飲 新散四

五柴胡飲 新散五

九蜜煎 新四十二

大岩蜜湯 婦七六

廻生丹 婦六六

排氣飲 新和六

大和中飲 新和七

帶潤遺淋類

帶下五八

凡婦人淋帶雖分微甚而實爲同類蓋帶其微而淋其甚者也
總由命門不固而不固之病其因有六蓋一以心旌之搖之
也心旌搖則命門應命門應則失其所守此由於不遂者也
一以多慾之滑之也情慾無度縱肆不節則精道滑而命門
不禁此由於太遂者也一以房室之逆之也凡男女相臨遲
速有異此際權由男子而婦人情興多致中道而止止則逆
逆則爲濁爲淋此由於遂而不遂乃女子之最多而最不肯
言者也以上三證凡帶濁之由乎此者十居八九而三者之
治必得各清其源庶可取效然源未必清而且旋觸旋發故

藥餌之功必不能與情竇爭勝此帶濁之所以不易治也此三者之外則尙有濕熱下流者有虛寒不固者有脾胃虧陷而不能收攝者當各因其證而治之

心旌搖心火不靜而帶下者先當清火宜硃砂安神丸清心蓮子飲直指固精丸之類主之○若無邪火而但見心虛帶下者宜秘元煎人參丸心虛白濁歌茯菟丸之類

一慾事過度滑泄不固而帶下者宜秘元煎壽脾煎固陰煎等

木兔絲丸濟生固精丸鎖精丸金鎖思仙丹之類主之

人事不暢精道逆而爲濁爲帶者初宜六味地黃湯或威臺

丸之屬以利之久不止者宜固陰煎芩术菟絲丸之屬以固之

一濕熱下流而爲帶濁脉必滑數色見紅赤證有煩渴而多熱者宜保陰煎加味逍遙散或經驗猪肚丸亦佳若熱甚兼淋而赤者宜龍胆鴻肝湯

一元氣虛弱而帶下者宜壽脾煎固陰煎鬼絲煎七福飲十全大補湯九龍丸之屬○若陽氣虛寒脉見微濇色白清冷腹痛多寒者宜加薑附或用家韭子丸

一脾腎氣虛下陷而多帶者宜用壽脾煎固陰煎歸脾湯補中

卷之九
九
益氣湯之屬

立齋曰前證或因六淫七情或因醉飽房勞或因膏粱厚味或服燥劑所傷或虧損陽氣下陷或濕痰下注蘊積而成故言帶也凡此皆當壯脾胃升陽氣爲主佐以各經見證之藥○若色青者屬肝用小柴胡加山梔或濕熱壅滯小便赤澁龍膽瀉肝湯○色赤者屬心用小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷用妙香散等藥○色白者屬肺用補中益氣加山梔○色黃者屬脾用六君子加山梔柴胡不應歸脾湯○色黑者屬腎用六味地黃丸○若氣血俱虛入珍湯○陽氣陷下補

中益氣湯○濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃柏○氣虛
痰飲下注四七湯送腎氣丸○不可拘肥人多痰瘦人多火
而以燥濕瀉火之藥輕治之也

帶濁論外方

醋附丸

婦百七

氣滯帶濁腹中急痛

金櫻膏

補百一

克應丸

婦一二八

虛滑帶濁

固元丹

固三一

白芷散

婦一二六

下元虛滑

益母丸

婦六四

帶濁諸病

白芍藥散

婦一二七

帶濁疼痛

白濁遺淋

五九

淫濁與帶下之不同者蓋白帶出於胞宮精之餘也淫濁出於膀胱水之濁也雖膀胱與腎爲表裏故帶濁之源無非皆出於陰分然帶由脾腎之虛滑者多淫濁由膀胱之濕熱者多此其所以有辨也○若淫濁初起而見熱澁者宜大分清飲○若初起無火而但有窒塞者宜小分清飲或五苓散○若肝經怒火下流宜加味逍遙散○若肝火盛而見痛澁者宜龍胆瀉肝湯○若服寒涼利藥太過以致下焦虛寒不固者宜草薢分清飲○若元氣虛寒下陷者宜壽脾煎補中益氣湯○若脾濕下流者宜歸脾湯六君子湯○若久而不愈肝

腎虛滑下陷者宜壽脾煎秘元煎家卦子丸

淋濁論外方

滑石散

婦一二九
熱淋

牛膝膏

和三四六
死血作淋

三味牛膝湯

寒一二六
血熱淋痛

婦人夢與鬼交

六十

人稟五行正氣以生氣正則正氣邪則邪氣強則神旺氣衰則鬼生如刺法論曰神失守位則邪鬼外干卽此類也然婦人之夢與邪交其證有二一則由慾念邪思牽擾意志而爲夢者此鬼生於心而無所外干也一則由稟賦非純邪得以入

故妖魅敢於相犯此邪之自外至者亦有之矣病因有內外
則證亦有不同病由內生者外無形迹不過於夢寐間常有
所遇以致遺失及爲恍惚帶濁等證亦如男子之夢遺其機
一也但在女子多不肯言耳至若外有邪犯者其證則異或
言笑不常如有對晤或喜幽寂不欲見人或無故悲泣而而
色不變或面帶桃花其脉息則乍躁乍數三五不調或伏沉
或促結或絃細或代易不常是皆妖邪之候凡此二者若失
於調理久之不愈則精血日敗真陰日損乃致潮熱發熱神
疲體倦飲食日減經水日枯肌肉消削漸成勞損脉見緊數

多致不救矣○凡治此者所因雖有不同而傷精敗血其病
則一故凡病生於心者當先以靜心爲主然後因其病而藥
之神動者安其神定其志精滑者因其精養其陰尤當以培
補脾腎要約門戶以助生氣爲主若爲妖魅所侵則內當調
補正氣如歸神湯之類外宜速灸鬼哭穴以驅邪氣則自當
漸愈其穴以兩手大指相並縛定用艾炷於爪甲角騎縫灸
之務令兩甲連肉四處着火方效或七壯或二七壯兩足大
指亦名足鬼眼

帶濁類論列總方

六一

人參丸 補百六

八珍湯 補十九

朱砂安神丸 寒一四二

歸脾湯 補三三

六君子湯 補五

清心蓮子飲 寒三二

妙香散 固十五
十六

九龍丸 固四二

十全大補湯 補二十

壽脾煎 新熟十六

秘元煎 新固一

加味逍遙散 補九四

兔絲煎 新固三

固陰煎 新固二

心虛白濁歌 補百二

威喜丸 固四五

茯兎丸 固三八

補中益氣湯 補三二

鎖精丸

固二十六

保陰煎

新寒一

濟生固精丸

固二十九

四七湯

和九七

五苓散

和一入二

金鎖思仙丹

固十九

歸神湯

婦一二五

腎氣丸

補一二二

六味地黃湯

補一二二

七福飲

新補七

家韭子丸

固三四

小分清飲

新和十

直指固精丸

固三十

小柴胡湯

散十九

大分清飲

新寒五

芩木兔絲丸

散四五

草薢分清飲

熟一六五

經驗猪肚丸

固四十

龍胆瀉肝湯

卷六三

乳病類

乳少

六三

婦人乳汁乃衝任氣血所化故下則爲經上則爲乳若產後乳
一遲乳少者由氣血之不足而猶或無乳者其爲衝任之虛弱
無疑也治當補化源而兼通利宜猪蹄湯○若乳將至而未
得通暢者宜湧泉散

產婦乳汁不來其原有二蓋一因氣血不足故乳汁不來宜用

猪蹄湯是卽虛者補之也○一因肥胖婦人瘀氣壅盛乳滯
不來者宜用漏蘆湯之類是壅者行之也

乳出

六三

產後乳自出乃陽明胃氣之不固當分有火無火而治之無火
而泄不止由氣虛也宜入珍湯十全大補湯○若陽明血熱
而溢者宜保陰煎或四君子湯加梔子○若肝經怒火上衝
乳脹而溢者宜加減一陰煎○若乳多脹痛而溢者宜溫帛
熨而散之○若未產而乳自出者以胎元薄弱滋溉不全而
然謂之乳泣生子多不育

卷三十一

吹乳妬乳

六四

產後吹乳因兒飲乳爲口氣所吹致令乳汁不通壅結腫痛不急治之多成癰腫速服括萎散外以南星末敷之更以手搃散之○勢甚者惟連翹金貝煎最妙

產後妬乳因無兒飲乳或兒未能飲餘乳蓄結作脹或婦人血氣方盛乳房作脹以致腫痛增寒發熱不吮通之必致成癰一若腫不消用麥芽二三兩炒熟水煎服立消

一方用陳皮一兩甘草一錢水煎服

一方治吹乳乳癰腫痛用萱草根擂酒服之以滓罨患處

袖珍方用猪牙皂角去皮蜜炙爲末酒服一錢○又詩云婦人
吹奶法如何皂角燒灰蛤粉和熟酒一盃調八字管教時刻
笑呵呵

乳癰乳巖

六五

腫痛勢甚熱毒有餘者宜以連翹金貝煎先治之甚妙

立齋法曰婦人乳癰屬胆胃二腑熱毒氣血壅滯故初起腫痛
一發於肌表肉色焮赤其人表熱發熱或發寒熱或憎寒頭痛
煩渴引冷用人參敗毒散神效瓜蔞散加味逍遙散治之腫
自消散若至數日之間膿成潰瘍稠膿湧出膿盡自愈若氣

血虛弱或誤用敗毒久不收斂膿溝脈大則難治○乳巖屬
肝脾二臟鬱怒氣血虧損故初起小核結於乳內肉色如故
其人內熱夜熱五心發熱肢體倦瘦月經不調用加味逍遙
散加味歸脾湯神效瓜蔞散多自消散若積久漸大嶐岩色
赤出水內潰深洞爲難療但用前歸脾湯等藥可延歲月若
誤用攻伐危殆迫矣○大凡乳證若因恚怒宜疏肝清熱○
煥痛寒熱宜發表散邪○煥腫痛甚宜清肝消毒并隔蒜灸
○不作膿或膿不潰補氣血爲主○不收斂或膿稀補脾胃
爲主○膿出反痛或發寒熱補氣血爲主○或肺熱內熱補

血爲主○若飲食少思或作嘔吐補胃爲主○飲食難化或作泄瀉補脾爲主○勞碌腫痛補氣血爲主○怒氣腫痛養肝血爲主○兒口所吹須吮通操散成癰治以前法潮熱暮熱亦主前藥○大抵男子多由房勞耗傷肝腎婦人鬱怒虧損肝脾治者審之○世有孕婦患此名曰內吹然其所致之因則一惟用藥不可犯其胎耳

乳病論列總方

猪蹄湯

婦八七

湧泉散

婦八八

漏蘆湯

婦九十

八珍湯

補十九

四君子湯 補一

十全大補湯 補二十

保陰煎 新寒一

歸脾湯 補三十三

加味歸脾湯 補三四

括萎散 婦九一

神效瓜萎散 外一八一

加味逍遙散 補九四

加減一陰煎 新補九

人參敗毒散 散三十六

連翹金貝煎 新因三

子嗣類

天地網繪萬物化醇男女構精萬物化生此造化自然之理也
亦無思無爲之道也故有人道卽有夫婦有夫婦卽有子嗣
又何有之嗣之說然天有不生之時地有不毛之域則人不
能無乏嗣之流矣然則生者自生乏者當乏而求嗣之說又
何爲也果可求耶果不可求耶則其中亦自有說亦自有法
矣所謂說者非爲不生不毛者而說也亦非爲少壯強盛者
而說也蓋不生不毛者出於先天之稟賦非可以人力爲也
少壯強盛者出於妙合之自然不必識不必知也惟是能子
弗子者無後難堪本非天付衰老無見者精力日去豈比少

年此所以有挽回之人力則有說而有法矣雖法之垂諸古者已不爲少然以余覺之則若有未盡其妙蘊者焉因而臚列其法曰天時曰地利曰人事曰藥食曰疾病總五類二十四條但凡其一便足敗乃公事矣賓於晚年得子率鑒乎此凡苦於是者惟察之信之則祚胤之猷或非渺小故命之曰宜麟策

時氣天時一

凡交會下種之時古云宜擇吉日良時天德月德及干支旺相當避丙丁之說顧以倉穀之墳亦安得擇而後行似屬迂遠

不足憑也然惟天日晴明光風霽月時和氣爽及情思清寧
精神閑裕之況則隨行隨止不待擇而人人可辦於斯得于
非惟少疾而必且聰慧賢明胎元稟賦實基於此至有不知
避忌者犯天地之晦冥則受愚蠢迷蒙之氣犯日月星辰之
薄蝕則受殘缺刑尅之氣犯雷霆風雨之滌暴則受狠惡驚
狂之氣犯不陰不陽條熱條寒之變幻則受奸險詭詐之氣
故氣盈則盈乘之則多壽氣縮則縮犯之則多夭顧人生六
合之內凡生長壯老已何非受氣於生成而知愚賢不肖又
孰非稟質於天地此感兆元始之大本苟思造命而贊化育

則當以此爲首務

陰陽

天時二

乾道成男坤道成女此固生成之至道然亦何以見之亦何以用之蓋乾坤不用用在坎離坎離之用陰陽而已夫離本居陽何以爲女以陽之中而陰之初也坎本居陰何以爲男以陰之中而陽之初也蓋中者盛於上盛者必漸消初者生於下生者必漸長故陽生於坎從左而漸升升則爲陽而就明陰生於離從右而漸降降則爲陰而就晦此卽陰陽之用也而千變萬化莫不由之由之推廣則凡冬至夏至一歲之陰

陽也子東午西一日之陰陽也有節有中月令之陰陽也或明或晦時氣之陰陽也節前節後消長之陰陽也月光潮汛盈虛之陰陽也再以及人則老夫女妻陰若勝矣有顛之倒之之妙彼強此弱陽亦在也有操之縱之之權顧無往而非陰陽之用也知之而從陽避陰則乾道成男不知而背陽向陰則坤道成女矣明眼人其鑒而悟之筆有難於盡意也

地利 地利一

地利關於子嗣非不重也有陰宅之宜子孫者常見螽斯之多有陽宅之宜子嗣者惟生氣天乙方爲最吉然吉地吉人每

多不期而會所謂有德斯有人有人斯有土此其所致之由
自非偶然故曰必先有心地而後有陰地信非誣也第其理
深義遠有非一言可悉然宗枝攸係誠有不可不知者此外
如寢室交會之所亦最當知宜忌凡神前廟社之側井竈冢
柩之傍及日月火光照臨沉陰危險之地但覺神魂不安之
處皆不可犯倘有不謹則天枉殘疾飛災橫禍及不忠不孝
之流從而出矣驗如影響可不慎哉

基址 地利二

欲縣瓜瓞當求基址蓋種植者必先擇地砂礫之場安望稻黍

求子者必先求母薄福之婦安寧熊羆倘欲爲子嗣之謀而不先謀基址計非得也然而基址之說隱微叵測察亦誠難姑舉其顯而易者十餘條以見其槩云耳大都婦人之質貴靜而賤動貴重而賤輕貴厚而賤薄貴蒼而賤嫩故凡唇短嘴小者不堪此子處之部位也耳小輪薄者不堪此腎氣之外候也聲細而不振者不堪此丹田之氣本也形體薄弱者不堪此藏蓄之宮城也飲食纖細者不堪此倉廩血海之源也髮焦齒豁者不堪肝虧血而腎虧精也睛露脣削者不堪藏不藏而後無後也顏色嬌艷者不堪與其華者去其實也

肉肥勝骨者不堪于宮隘而腎氣詘也嬾娜柔脆筋不束骨者不堪肝腎虧而根幹不堅也山根唇口多青氣者不堪陽不勝陰必多肝脾之滯逆也脉見緊數弦濇者不堪必真陰虧弱經候不調而生氣杳然者也此外如虎頭熊項橫面豎眉及聲如豺狼之質必多刑剋不吉遠之爲宜又若剛狠陰惡奸險刻薄之氣尤爲種類源流子孫命脉所係烏可近之雖曰堯亦有丹朱舜亦有瞽瞍然二氣相合未必非一優二劣之所以致倘使陰陽有序種址俱宜而稼穡有不登者未之有也惟一有偏勝則偏象見矣是種之不可不擇者有如此

不然則麟趾之詩果亦何爲而作者耶余因人艱嗣之苦復見人有不如無之苦故願天常生好人所以并慮及之

十機人事一

陰陽之道合則聚不合則離合則成不合則敗天道人事莫不由之而尤於斯道爲最合與不合機有十焉使能得之權在我矣

一曰閨闥乃婦人之動機也氣靜則閨氣動則闥動緣氣至如長鯨之飲川如巨觥之無滴斯時也吸以自然莫知其入故未有關而不愛者未有受而不孕者但此機在瞬息之間若

未闢而投失之太早闢已而投失之太遲當此之際自別有影響情狀可以默會不可以言得也惟有心人能覺之帶雨

施雲鮮不熟矣

二日遲速乃男女之合機也遲宜得遲速宜見速但陰陽情質
真有不齊固者遲不回者速遲者嫌速則猶饑待食及喫不
能速者畏遲則猶醉添杯欲吐不得遲速不侔不相投矣以
遲遇疾宜出奇由遲勿逞先聲以疾遇遲宜靜以自持挑而
後戰能反其機適逢其會矣

三日強弱乃男女之畏機也陽強陰弱則畏如蜂薑避如戈矛

陽弱陰強則聞風而靡望塵而北強弱相凌而道同意合者鮮矣然撫弱有道必居仁由義務得其心克強固難非聚精會神安奪其魄此所以強有不足畏弱有不足虞者亦在乎爲之者之何如耳

四曰遠近乃男女之會機也或以長材排闥唐突非堪或以偷覬跼門敢窺堂室欲拒者不能欲吞者不得喚隔如斯其能姤乎然歛迹在形致遠在氣歛迹在一時養氣非頃刻使不有教養之夙謀恐終無剛勁之銳氣又安能直透重圍而使

鳩若鵲巢也

五曰盈虛乃男女之生機也胃有盈虛飽則盈而饑則虛也腎
有盈虛蓄則盈而泄則虛也盛衰由之成敗亦由之不知所
用則得其章而失其常耳

六曰勞逸乃男女之氣機也勞者氣散而怯逸者氣聚而堅既
可爲破敵之兵機亦可爲種植之農具動得其宜勝者多矣
七曰懷抱乃男女之情機也情投則合情悖則離喜樂從陽故
多陽者多喜鬱怒從陰故多陰者多怒多陽者多生氣多陰
者多殺氣生殺之氣卽孕育賢愚之機也莫知所從又胡爲
而然乎

入日暗產乃男子之失機也勿謂我強何虞子嗣勿謂年壯縱亦何妨不知過者失准期强者無酸味而且隨得隨失猶所莫知自一而再自再而三則亦如斯而已矣前有小產論所當并察之

九日童稚乃女子之時機也方苞方萼生氣未舒甫童甫笄天癸未裕曾見有未實之粒可爲種否未足之蚕可爲繭否強費心力而年衰者能待乎其亦不知機也矣

十日二火乃男女之陽機也夫君火在心心其君主也相火在腎腎其根本也然二火相因無聲不應故心宜靜不靜則火

由欲動而自心挑腎先心後腎者以陽燥陰出乎勉強勉強則氣從乎降而丹田失守已失元陽之本色腎宜足腎足則陽從地起而由腎及心先腎後心者以水濟火本乎自然自然則氣主乎升而百脉齊到斯誠化育之真機然伶薄之失每從勉強故多犯虛勞訖云子嗣朴厚之子常由自然故品物咸亨奚慮後人知機君子其務陽道之真機乎

畜妾 人事二

無故置妾大非美事凡諸反目敗亂多有由之可已則已是亦齊家之一要務也其若年邁妻衰無後爲大則勢有不得不

置者然置之易而畜之難使畜不有法則有畜之名無畜之
實亦仍與不畜等耳而畜之之法有情況焉有寢室焉以情
况言之則王母見妾大都非出樂從所以或多嗔怒或多罵
詈或因事責其起居或假借加以聲色是皆常情之所必至
者而不知產育由於血氣血氣由於情懷情懷不暢則衝任
不充衝任不充則胎孕不受雖云置妾果何益與凡畜妾之
不可過嚴者以此再以寢室言之則宜靜宜遠宜少近耳目
者爲妙蓋私構之頃銳宜男子受宜女人其銳其受皆由乎
氣當此時也專則氣聚而直前狃則氣餒而不攝此受與不

受之機也然勇怯之由其權在心蓋心之所至氣必至焉心
有疑懼心不至矣心有不至氣亦不至矣倘臨期驚有所聞
則氣在耳而不及器矣疑有所見則氣在目而不及器矣或
分或畏則氣結在心而不至器矣氣有不至則如石投水而
水則無知也且如兩陣交鋒最嫌奸細之須同一心無二何
堪讒間以相離閨思兵機本無二致凡妾室之不可不靜而
遠者以此雖然此不過爲錦囊無奈者設倘有高明賢淑因
吾言而三省惟宗祀之是慮不惟不妬而且相憐則愈近愈
懲而遠之之說豈近人情又若有恭謹良人小心奉治則求

上

容已幸又安敢有遠而敬之之念其然其然吾未如之何也

已

藥食 藥食一

種子之方本無定軌因人而藥各有所宜故凡寒者宜溫熱者宜涼滑者宜澁虛者宜補去其所偏則陰陽和而生化者矣今人不知此理而但知傳方豈宜於彼者亦宜於此耶且或見一人偶中而不論宜否而徧傳其神競相製服又豈知張三之帽非李四所可戴也今錄十方於後擇宜用之庶獲濟矣

一婦人血氣俱虛經脉不調不受孕者惟毓麟珠隨宜加減用之爲最妙其次則八珍益母丸亦佳○若臟寒氣滯之甚者用續嗣降生丹亦妙

一男子臟氣平和而惟精血不足者宜還少丹全鹿丸無比山藥丸○若右腎陽氣不足者宜右歸丸或毓麟珠俱妙○若陽痿精衰虛寒年邁難嗣者必宜贊育丹○若陽盛陰虛左腎精氣不足者宜左歸丸或延年益嗣丹○若火盛水虧多內熱者宜大補陰丸○此外如河車種玉丸烏雞丸黑錫丹之類皆可酌用

用藥法

藥食二

凡男女胎孕所由總在血氣若血氣和平壯盛者無不孕者亦育無不長其有不能孕者無非氣血薄弱育而不長者無非根本不固卽如諸病相加無非傷損血氣如果邪逆未除但當以煎劑畧爲搬正搬革之後則必以調和氣血爲主斯爲萬全之策所以凡用種子丸散切不可雜以散風消導及敗血苦寒峻利等藥蓋凡宜久服而加以此類則久而增氣未有不反傷氣血而難於孕者也○再若香附一物自王好古曰乃婦人之仙藥多服亦能走氣而後

金匱要略 卷三十九 妊娠
世不言走氣但相傳曰香附爲婦人之要藥由是但治婦人則不論虛實無弗用之不知香附氣香味辛性燥惟開鬱散氣行血導滯乃其所長若氣虛用之大能泄氣血虛用之大能耗血如古方之女金丹及四製香附丸之類惟氣實血滯者用之爲宜凡今婦人十有九虛顧可以要藥二字而一槩用之平用之不當則漸耗漸弱而胎元之氣必反將杳然矣

飲食藥食三

凡飲食之類則人之臟氣各有所宜似不必過爲拘執惟酒

多者爲不宜蓋胎種先天之氣極宜清楚極宜充實而酒性淫熱非惟亂性亦且亂精精爲酒亂則濕熱其半真精其半耳精不充實則胎元不固精多濕熱則他日痘疹驚風脾敗之類率已受造於此矣故凡欲擇期布種者必宜先有所慎與其多飲不如少飲與其少飲猶不如不飲此亦胎元之一大機也欲爲子嗣之計者其母以此爲後着

男病

疾病

疾病之關於胎孕者男子則在精女人則在血無非不足而然凡男子之不足則有精滑精清精冷者及臨事不堅或

流而不射者或夢遺頻數或便濁淋澁者或好色以致陰虛陰虛則腰腎痛憊或好男風以致陽極陽極則亢而亡陰或過於強固強固則勝敗不治或素患陰疝陰疝則肝腎乖離此外則或以陽衰陽衰則多寒或以陰虛陰虛則多熱若此者是皆男子之病不得盡諉之婦人也倘知其由而宜治則治之宜反之必先其在我而後及婦人則事無不濟矣

女病 疾病二

婦人所重在血血能構精胎孕乃成欲察其病惟於經候見

之欲治其病惟於陰分調之蓋經卽血也血卽陰也陰以應月故月月如期此其常也及其爲病則有或先或後者有一月兩至者有兩月一至者有枯絕不通者有頻來不止者有先痛而後行者有先行而後痛者有淡色黑色紫色者有瘀而爲條爲片者有精血不充而化作白帶白濁者有子宮虛冷而陽氣不能生化者有血中伏熱而陰氣不能凝成者有血癥氣痞子藏不拔月水不通者凡此皆真陰之病也真陰既病則陰血不足者不能育胎陰氣不足者不能攝胎凡此攝育之權總在命門正以命門爲衝

任之血海而胎以血爲主血不自生而又以氣爲主是皆
真陰之謂也所以凡補命門則或氣或血皆可謂之補陰
而補陰之法卽培根固本之道也凡自壯至老乃人人之
所不可缺者而矧以先天後天之肇基又將舍是而何求
乎是以調經種子之法亦惟以填補命門顧惜陽氣爲之
主然精血之都在命門而精血之源又在二陽心脾之間
蓋心主血養心則血生脾胃主飲食健脾胃則氣布二者
謂
亦無非補陰之源也使不知本末先後而妄爲之治則又

烏足以言調經種子之法

以上宜麟策終

盈虛吟 六入

誰識雌雄在坎離

玄關消息有真機

坎虛離實云非是

坎實離虛亦是非

天以至剛方得體

地緣無日乃成泥

三生同有金丹在

試問仙翁知不知

辨古 六九

種子之法古人言之不少而余謂其若未盡善者蓋亦有疑而
云然謹并列而辨之亦以備達者之裁正

一廣嗣訣云三十時辰而日半二十八九君須笑落紅滿地是
佳期金水過時徒霍亂霍亂之時枉費功樹頭樹底覓殘紅
但解開花能結子何愁丹桂不成叢○按此言婦人經期方
止其時子宮正開便是布種之時過此佳期則子宮閉而不
受胎矣然有十日半月及二十日之後受胎者又何爲其然
也又一哲婦曰若依此說則凡有不端者但於後半月爲之
自可無他慮矣善哉言也此言果可信否

一道藏經曰婦人月信止後一日三日五日合者乾道成男二
日四日六日合者坤道成女○按此以單數屬陽故成男偶

數屬陰故成女果若然則誰不知之得子何難也總未必然
一褚氏遺書云男女之合二情交暢若陰血先至陽精後衝血
開裹精精入爲骨而男形成矣陽精先至陰血後參精開裹
血血入爲本而女形成矣○按此一說余初見之甚若有味
有理及外察之則大有不然蓋相合之頃豈堪動血惟旣結
之後則精以肇基血以滋育而胎漸成也卽或以血字改爲
精字曰陰精先至似無不可然常見初笄女子有一合而卽
孕者彼於此時畏避無服何云精泄但其情動則氣至氣至
則陰闢陰闢則吸受吸受則無不成孕此自然之正理也若

一褚氏之說似穿鑿矣

一東垣曰經水斷後一二日血海始淨精勝其血感者成男四五日後血脉已旺精不勝血感者成女○按此說亦非確論今見多生女者每加功於月經初淨而必不免於女者豈亦其血勝而然乎

一丹溪曰陰陽交構胎孕乃凝所藏之處名曰子宮一系在下上有兩岐中分爲二形如合鉢一達於左一達於右精勝其血則陽爲之主受氣於左子宮而男形成精不勝血則陰爲之主受氣於右子宮而女形成○按此乃與聖濟經左動成

男右動成女之說同第以子粒驗之無不皆有兩辨故在男子亦有二丸而子宮之義諒亦如此信非謬也惟左受成男右受成女之說則成非事後莫測其然卽復有左射右射之法第恐陰中闔闢自有其機卽欲左未必左欲右未必右而陰陽相勝之理則在天時人事之間似仍別有一道雖知此說終無益也

述古七十

褚氏遺書曰建平孝王妃姬皆麗無子擇民家未笄女子入御又無子問曰求男有道乎證對曰合男女必當其年男雖十

六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆
欲陰陽完實然後交而孕孕而育育而子堅壯強壽今未笄
之女天癸始至已近男色陰氣早洩未完而傷未實而動是
以交而不孕孕而不育而子脆不壽此王之所以無子也然
婦人有所產皆女者有所產皆男者大王誠能訪求多男婦
人至宮府有男之道也王曰善未再期生六男夫老陽遇少
陰老陰遇少陽亦有子之道也

子嗣類論列總方

七

右歸丸

新補五

贊育丹

新因又

還少丹

補七

全鹿丸

補九

無比山藥丸

補七入

延年益嗣丹

婦五

大補陰丸

寒七

八珍益母丸

婦六

續嗣降生丹

婦六

女金丹

婦三

四製香附丸

婦二

河車種玉丸

婦一

烏雞丸

四方九

黑錫丹

熟百九

癥瘕類

論證七二

癥瘕之病卽積聚之別名內經止有積聚疝瘕並無癥字之名
此後世之所增設者蓋癥者徵也瘕者假也徵者成形而堅
硬不移者是也假者無形而可聚可散者是也成形者或由
血結謂之血癥或由食結謂之食癥無形者惟在氣分氣滯
則聚而見形氣行則散而無迹此癥瘕之辨也然又有痛者
有不痛者痛者聯於氣血所以有知氣血行則愈故痛者易
治不痛者不通氣血另結氣囊藥食難及故不痛者難治此
又治之有辨也其他如肺之積曰息奔心之積曰伏梁脾之

積曰痞氣肝之積曰肥氣腎之積曰奔豚以至後世有曰痃
癖曰痞塊之屬亦不過以形見之處有不同故名亦因之而
異耳總之非在氣分則在血分知斯二者則癥瘕二字已盡
之矣但血癥氣瘕各有虛實而宜攻宜補當審之眞而用之
確也諸經義另詳積聚門所當參閱

竹空論曰任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚張子和曰
遺溺閉癃陰痿脬痺精滑白淫皆男子之疝也若血涸月事
不行行後小腹有塊或時動移前陰突出後陰痔核皆女子
之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕

血癥七二

瘀血留滯作癥惟婦人有之其證則或由經期或由產後凡內傷生冷或外受風寒或恚怒傷肝氣逆而血留或憂思傷脾氣虛而血滯或積勞積弱氣弱而不行總由血動之時餘血未淨而一有所逆則留滯曰積而漸以成癥矣然血必由氣氣行則血行故凡欲治血則或攻或補皆當以調氣爲先○羅謙補曰養正邪自除必先調養使營衛克實若不消散方可議下但除之不以漸則必有顛覆之害若不守禁忘縱嗜慾其有不喪身者鮮矣

一血瘀作痛或成形不散在臍腹之下若暫見停蓄而根盤未
固者只宜五物煎或决津煎加減主之則血無不去痛無不
止足稱神劑

一婦人形氣病氣俱實或腹脹或痛甚而新有所逆但欲行滯
止痛者宜通瘀煎失笑散立胡當歸散加減四物湯之類疏
之導之氣通滯去痛必自愈○若稍久且堅而欲消之磨之
宜三稜煎萬病丸之類主之

形氣強壯而瘀血不行或大病結閉或腹脹痛甚有非下不
可者宜良方桃仁承氣湯下之最捷或用奪命丹桃仁煎川

山甲散赤金豆之類皆可然下須詳慎非有大實不得已之證不宜妄用

一養正之法當察陰陽上下病之外新及邪正強弱之勢其有停瘀雖甚而元氣困弱者不可攻病久而弱積難搖動者不可攻凡此之類皆當專固根本以俟其漸磨漸愈乃爲良策○如鬱結傷脾者宜用歸脾湯逍遙飲壽脾煎○脾胃虛寒者宜溫胃飲養中煎六君子湯○肝腎虛寒者宜大營煎煖肝煎理陰煎或良方爻加散亦可○脾胃虛寒大便泄瀉或不實者宜胃開煎理陰煎○病久脾腎氣滯而小腹痛脹者

宜入味地黃丸○肝火不清血熱而滯者宜加味逍遙散○
以上諸證凡虛中帶滯者不妨於前藥中各加行氣導滯之
品此在用者之圓活也

一婦人久癥宿痞脾胃必虧邪正相搏牢固不動氣聯子藏則
不孕氣聯衝任則月水不通內治之法宜如前外以阿魏膏
貼之仍用熨瘡方或用琥珀膏亦可然必須切慎七情及六
淫飲食起居而不時隨證調理庶乎可愈

食癥

七十四

凡飲食留聚而爲癥痞者或以生冷或以風寒或以忿怒氣逆

或以勞倦饑餒而飲食疊進不用消化則積而成癥矣然胃氣強者必不致留聚飲食而飲食之不能化者必由脾胃氣弱而然所以治此者宜酌虛實而爲攻補庶乎得效也諸治法詳積聚門宜參而用之

立齋曰前證若形氣虛弱須先調補脾胃爲主而佐以消導若形氣亢實當先疏導爲主而佐以補脾胃○若氣壅血滯而不行者宜用烏藥散散而行之○若脾氣虛而血不行者宜用四君子湯歸補而行之○若肝腎血燥而不行者宜用加味逍遙散清湯解而行之○若肝腎血燥而不行者宜用歸脾

而行之○大抵食積痞塊之證皆以邪氣盛則實真氣薄則虛但當養正辟邪而積自除矣雖曰堅者削之客者除之若胃氣未虛或可少用若病久虛者不宜輕用

氣瘕七五

瘕者假也所謂假者謂其形雖若癥而原無根窠非若癥痞之堅頑有形者也蓋有形者或因血積或因食積積有定形所不可移易者也無形者病在氣分氣逆則甚氣散則緩聚散無根者也惟其無根故能大能小或左或右或近脇肋而如臂如指則謂之痃癖或下臍腹而爲脹爲急則謂之疝瘕難

經曰病有積聚何以別之然積者陰氣也陰沉而伏聚者陽氣也陽浮而動故積者五臟之所生聚者六腑之所成也然則癥由於積積在陰分而有淵藪故攻之非易瘕由於聚聚在陽分而猶烏合故散之非難此癥瘕之辨有如此惟散之法最有因通因塞之妙用而人多莫之知也

一凡病在氣分而無停蓄形積者皆不可下蓋凡用下者可除有形而不可以除無形若氣因形滯者去其積則氣亦順自無不可若全在無形氣分卽下亦不去而適足以敗正氣也宜切識之

一散氣之法止在行氣蓋氣行則散也但行氣之法大有權宜
如氣實則壅滯宜破而行之氣閉則留蓄宜利而行之氣熱
則乾涸宜寒而行之氣寒則凝結宜溫而行之此散氣治瘕
之大法也然瘕聚之證使果氣強力健則流行不息又何瘕
聚之有惟正氣不行而後邪氣得聚經日邪之所湊其氣必
虛故凡爲此病必氣虛者多虛不知補則正氣不行正氣不行
則邪氣不敢安望其有瘳乎但實者有據故顯而易見虛
每似實故隱而難知此所以當辨其真也

一破氣行氣之劑凡氣實氣壅之甚而爲脹爲痛者宜排氣飲

木香順氣散○木香調氣散○四磨湯諸七氣湯之類主之○若血中之氣滯而爲瘀爲痛者宜失笑散通瘀煎○調經飲甚者良方奪命丹○疝瘕氣聚者荔枝香散甚者天台烏藥散○氣結膀胱小水不利者小分清飲四苓散五苓散○氣結大腸乾秘不行者搜風順氣丸○麻仁丸水虧血虛而秘滯者濟川煎○肝氣逆而爲聚者解肝煎兼火者化肝煎○氣聚兼熱火鬱不行者抽薪飲大分清飲○寒滯不行氣結脹聚者抑扶煎和胃飲丁香茯苓湯○三焦壅滯氣道不清而中滿腫脹者廓清飲○痰飲水氣停蓄胸膈而爲吞酸嘔逆者苓木

二陳煎六安煎和胃飲括痰丸之類主之○以上諸法惟氣實痰聚者宜之凡元氣不足者皆不可用

一補氣以行氣之劑如聖愈湯參歸湯七福飲皆能調心氣之虛滯○五味異功散參木湯能理心脾之氣虛不行○獨參湯參附湯能助肺以行五臟之治節○若脾胃氣虛而滯者惟六君子湯歸脾湯爲宜○脾胃虛寒而滯者必溫胃飲理中湯五君子煎最佳○若虛在脾胃陰分氣有不行而或爲痰飲或爲脹滿或爲嘔吐腹痛等證非理陰煎不可○若虛在血中之氣而爲滯爲痛微則四物湯甚則五物煎決津煎

大營煎方可○若肝腎寒滯小腹氣逆而痛者必煖肝煎以溫之○若脾胃氣虛門戶不要而爲滯爲痛者必關胃煎以固之○若元氣下陷滯而不升者宜補中益氣湯舉元煎以舉之○若元氣大虛氣化不行而滯者必五福飲十全大補湯大補元煎或六味回陽飲以培補之○以上皆補氣行氣之法也亦不過爲之筌蹄云耳而此中之用誠有未可以言悉者然常人之情猶爲氣之滯者惟破之散之爲宜而反云補之必不然也不知客之强者以主之弱邪之勝者惟正之虛凡今人之病虛者最多而用補者最少治與病違而欲以

藥濟人蓋亦罕矣卽余以多虛少實諱諱爲言而人亦未信
姑以人事喻之其或可曉然乎夫人之虛實亦猶人之貧富
氣實者若富翁氣虛者若貧士今人於千百中而富者其幾
舍富之外盡貧人矣其多其少卽此類也又有華其貌而蔽
其室者人多難測亦此類也但貧人之情可益不可損增一
分猶然未足削一分其窘何堪使以潛消暗剥之術而加之
貧寒窘乏之士陰移人祚而人不之覺亦甚堪憐矣此道以
仁爲術其可以此爲心乎嗟乎人生以氣爲主得氣則生
失氣則死夫知者知人之命不知者知人之病若强不知以

爲知而徒資便給以人命爲常試者則其槩可知矣

癥瘕類論列總方

七十六

四君子湯

補一

五君子煎

新熱六

六君子湯

補五

四物湯

補八

五物煎

新因三

五味異功散

補四

五福飲

新補六

七福飲

新補七

十全大補湯

補二十一

聖愈湯

補九一

大補元煎

新補一

補中益氣湯

補三

參木湯

補四一

參歸湯

補三九

六味回陽飲

參附湯

獨參湯

補三十六

六味地黃丸

補二二

舉元煎

新補十七

大營煎

新補十四

八味地黃丸

補二二

壽脾煎

新熱十六

逍遙飲

新因一

加味逍遙散

補九四

歸脾湯

補三三

養中煎

新熟四

苓木二陳煎

新和四

溫胃飲

新熟五

胃關煎

新熟九

丁香茯苓湯

熟六四

理中湯

熱一

理陰煎

新熟三

天台烏藥散 和三二十九

燮肝煎 新熟十五

和胃飲 新和五

木香調氣散 和四四

解肝煎 新和十一

化肝煎 新熟十

木香順氣散 和四三

排氣飲 新和六

抑扶煎 新熟十一

搜風順氣丸 和三四

烏藥散 和七四

六安煎 新和二

桃仁承氣湯 攻四

四磨湯 和五二

廓清飲 新和十三

大分清飲 新和五

抽薪飲 新寒三

濟川煎 新補二

小分清飲 新和十

七氣湯 和四七

調經飲 新因四

良方交加散 婦百

決津煎 新因三

通瘀煎 新因五

加減四物湯 婦百十

失笑散 婦百四

玉苓散 和一入二

玄胡當歸散 婦九八

三棱丸 攻三七

荔香散 新因二八

四苓散 和一八七

奪命丹 婦六五

括痰丸 新和十九

川山甲散 攻四十

桃仁煎 攻三丸

赤金豆 新攻二

麻仁丸 攻九二

萬病丸 婦一四三

熨瘡方 攻八八

琥珀膏 外三一七

阿魏膏 外三一

前陰類

陰挺 七七

婦人陰中突出如菌如芝或挺出數寸謂之陰挺此或因胞絡傷損或因分娩過勞或因鬱熱下墜或因氣虛下脫大都此證當以升補元氣固澁真陰爲主○如陰虛滑脫者宜固陰

益陰丸 攻九二

煎秘元煎○氣虛陷下者補中益氣湯十全大補湯○因分
娩過勞氣陷者壽脾煎歸脾湯○鬱熱下墜者龍胆瀉肝湯
加味逍遙散

木楊湯 治婦人陰中生物痒痛牽引腰腹多由房事太過或
因淫慾不遂或因非理所爲以致陰戶有傷名曰陰挺

金毛狗脊 五棓子 一枯礬 魚腥草

水楊根 黃連

各一兩

古爲末分四劑用有嘴瓦罐煎湯外預以竹筒去節接罐嘴
引熱氣薰入陰中或透挺上俟湯溫仍用洗沃之仍服治挺

全書卷三十九
諸藥

陰腫

七八

婦人陰腫大都卽陰挺之類然挺者多虛腫者多熱○如氣陷而熱者升而清之宜清化飲如柴胡防風之屬○氣閉而熱者利而清之宜大分清飲徒薪飲○肝腎陰虛而熱者加味逍遙散○氣虛氣陷而腫者補中益氣湯○因產傷陰戶而腫者不必治腫但調氣血氣血和而腫自退○或由損傷氣滯無關元氣而腫者但以百草湯薰洗之爲妙

一方 治陰中腫痛○用枳殼半斤切炒乘熱以帛裹熨之以

消其外仍用少許乘熱裹納陰中冷卽易之不三次愈

一方 用小麥朴硝白礬五倍子葱白煎湯浸洗

甘菊湯 治陰戶腫○用甘菊苗葉不拘多少搗爛以百沸湯

淋汁薰浸洗之

陰瘡 七九

婦人陰中生瘡多由濕熱下注或七情鬱火或縱情敷藥中於
熱毒其外證則或有陰中挺出如蛇頭者謂之陰挺如菌者
謂之陰菌或如雞冠或生重濕痒或內潰腫爛疼痛常流毒
水其內證則或爲體倦內熱經候不調或爲飲食不甘晡熱

發熱或爲小腹痞脹腰脇不利或爲小水淋瀝亦白帶下○
凡治此之法若腫痛內外俱潰者宜芍藥蒺藜煎爲最佳或
四物湯加梔子丹皮胆草荆芥或用加味逍遙散○若濕痒
者宜芍藥蒺藜煎或歸脾湯加柴梔丹皮○淋漓者宜龍胆
瀉肝湯加白朮丹皮○淋漓而火盛痛脹者宜大分清飲或
抽薪飲○腫而墜毒者補中益氣湯加山梔丹皮○可洗者
用百草煎○可敷者宜螺旋散完瘡散

蛇退散 治婦人陰瘡先以荆芥蠅床子湯薰洗挹乾敷藥

一條燒

枯礬

黃丹

扁蓄

藁本 各一兩 硫黃 荆芥穗 蛇床子 各五錢

右爲細末香油調搽濕則乾摻

陰痒

八十

婦人陰痒者必有陰虫微則痒甚則痛或爲膿水淋瀝多由濕熱所化名曰蠶○內宜清肝火以龍胆瀉肝湯及加味逍遙散主之○外宜桃仁研膏和雄黃末或同雞肝納陰中以制其虫然無如銀硃烟搽雞肝以納之尤妙

椒茱湯 治婦人陰痒不可忍惟以熱湯泡洗有不能住手者

花椒

吳茱萸

蛇床子

各一
兩

藜蘆

半兩

陳茶 一撮 炒鹽 二兩

以水五升煎湯乘熱薰洗

杏仁膏 治婦人陰痒不可忍

杏仁 燒存性 射香 少許

右爲末用舊帛裹之縛定火上灸熱納陰中

椿根皮湯 治陰痒突出

臭椿皮 荆芥穗 藿香 等分

右剉煎湯薰洗卽痒止而入

一方 治疳虫下部用蒲黃水銀研勻傳入外以鵝虱草

煎湯薰洗

灸肝散 治婦人陰痒虫蝕○用牛肝或猪肝切三寸長大如錢灸熟納陰中引虫出盡即愈

一方 治陰中虫痒搗桃葉綿裹納陰中日易三四次

一方 治陰痒同蛇床子一兩白礬五錢煎湯淋洗

陰冷入一

婦人陰冷有寒證有熱證寒由陽虛真寒證也熱由濕熱假寒證也假寒者必有熱證如小便澁數黃赤太便燥結煩渴之類是也真寒者小便清利陽虛畏寒者是也○真寒者宜補其陽如理陰煎十補丸加減續嗣降生丹○假寒者當清其

火宜龍胆瀉肝湯加味道遙散○肝腎虛寒者宜緩肝煎鎮
陰煎大營煎○脾胃虛寒者宜理中湯理陰煎壽脾煎之類
主之

交接出血而痛

八二

先婦人交接卽出血者多由陰氣薄弱腎元不固或陰分有火
而然○若脾虛氣陷不能攝血者宜補中益氣湯或補陰益
氣煎○若脾腎虛弱陰氣不固者宜壽脾煎歸脾湯○若肝
腎陰虛不守者宜固陰煎○若陰火動血者宜保陰煎

前陰類論列總方

八三

、固陰煎

新固二

、保陰煎

新寒一

補中益氣湯

補三

理陰煎

新熟三

理中湯

熱一

補陰益氣煎

新補十六

歸脾湯

補三

壽脾煎

新熟十六

加味逍遙散

補九四

四物湯

補八

秘元煎

新固一

續嗣降生丹

婦一三六

清化飲

新因十三

大營煎

新補十四

芍藥蒺藜煎

新因五

鎮陰煎

新熱十三

、煖肝煎

新熱十五

龍胆瀉肝湯

寒六二

全書卷三十九

婦人方

十補丸 熱一七四

徒薪飲 新寒四

大分清飲 新寒五

百草煎 新因

螵蛸散 新因三八

銀硃烟 新因五

抽薪飲 新寒三

完瘡散 新因