

名醫類案卷第十

新都篁南江瓘集 後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇玉橫
仁和沈煇數會
鮑廷博以文 重校

背癰疽瘡

宋戶部尚書沈誥為仁厚一兵卒患背疽乞假親為合藥

治之時早蝗當致齋園邱猶丁寧料理藥內用酒恐市酤

不中用自取酒入藥服之即愈其法用瓜蒞子一枚乳香

沒藥各一錢甘草三錢用醇酒九盞臨服嚼沒藥一塊飲

此酒極妙葦航紀談

羅謙甫治一人年踰六旬冬至後數日疽發背五七日腫勢約七寸許痛甚瘍醫曰膿已成可開發矣病者恐不從三日醫曰不開恐生變症遂以燔針開之膿泄痛減以開遲之故迨二日變症果生覺重如負石熱如熛火痛楚倍常六脈沉數按之有力此膏粱積熱之變也邪氣酷熱固宜以寒藥治之時月嚴寒復有用寒遠寒之戒乃思內經云有假者反之雖違其時從證可也

琇按脈實症實必用涼解舍時從症夫復何疑

急作清涼飲子加川黃連一兩五錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除月餘平復

京師人司仲父患背瘡若負火炭晝夜呼叫司仲泣於途遇

道人曰：子何憂之深也？子當求不耕之地，遇野人糞，爲蟲鳥所殘，卽以杖去其糞，取其下土，篩而敷之，乃如其言，用之立愈。父曰：豈以冰著吾背耶？吾五臟俱寒矣。

房州虞候張進本，北方人，因送郡守還，逢道人飲之酒，得其治癰疽方。文錄曹子病背瘡，醫不能療，聞進有此方，索之。進元無手訣，但以成藥敷之，旬日而愈。一兒五歲，鬢邊生瘡，繼又發于腦後，症候可憂，亦以敷進。凡所用皆一種，不過三夕，二患皆平。其方但擇阿膠透徹者一兩，水半升，煎令消，然後入號丹一兩，慢火再熬，數數攪勻，俟三五沸，乃取出，攤令極冷，貯磁餅中，用時以毛掃布瘡四面，而露其

口如瘡未成則遍塗腫處良久自消切勿犯手更無他法
一切惡瘡皆可敷不特癰疽也類說

虞奕侍郎背中發小瘡不悟只以藥調補數日不疼不癢又
不滋蔓疑之呼外醫灸二百壯已無及此公平生不服藥
一年來唯覺時時手脚心熱疾作不早治又誤服補藥何
可久也蓋發背無補法諺云背無好瘡但發于中正者爲

真發背泊宅編

揚州名醫楊吉老其術甚著有一士人狀若有疾厭厭不聊
莫能名其爲何苦往謁之楊曰君熱症已極氣血消鑠且
盡自此三年當以疽死不可爲也士人不樂而退聞茅山

觀中一道士、醫術通神、但不肯以技自名、未必爲人致力、士人心計交切、乃衣童僕之衣、詣山拜之、願執役左右、道士喜、畱寘弟子中、誨以誦經、日夕祇事、頤旨如意、經兩月餘、覺其與常隸別、呼叩所從來、始再拜謝過、以實告之、道士笑曰、世豈有醫不得的病、當爲子脈之、又笑曰、汝便可下山、吾亦無藥與汝、但日日買好梨啖一顆、如生梨已盡、則取乾者、泡湯飲之、仍食其滓、此疾自當平、士人歸、謹如其戒、經一歲、復往揚州、楊醫見之、驚其顏貌腴澤、脈息和平、謂之曰、君必遇異人、不然、何以至此、士人以告、楊立具衣冠、焚香望茅山設拜、蓋自咎其術之未至也、

類編

程明佑治槐克胡嫗年六十疽發背大如孟頭如蜂窠嘔逆
咽不下。瘍醫藥之毒雖殺而胃寒泄。程曰病必分陰陽虛
實。胃傷於寒令人嘔逆。溫補則榮衛充而氣血周貫。則毒
隨膿出而肌肉漸生。依方投藥四五劑咽遂下嘔止。已癰
潰體漸平。

陳斗崑治王主政福建人臂患一癰痛甚發咳逆十餘日水
穀不下脈伏如絕醫皆不治。陳視之曰此寒涼過甚中氣
下陷以四珍加薑桂三進而病如失癰亦漸愈。

丹溪治一人背癰徑尺穴深而黑急作參芪歸朮膏飲之。三
日畧以艾芎湯洗之。氣息奄奄然可飲食。每日作多肉餽。

飽。大碗與之。盡藥膏五觔。餽飽三十碗。瘡漸合。肉與餽飽。補氣之有益者也。

一老人背發疽。徑尺。已與五香十宣散數十貼。嘔逆不睡。素有淋病。急以參芫歸朮膏。以牛膝湯入竹瀝飲之。淋止。思食。盡藥四觔。膿自湧出而愈。

一人發背癰疽。得內托十宣多矣。見膿。嘔逆發熱。發熱決非如熛火

又用嘉禾散加丁香。時天熱。脈洪數有力。此潰瘍尤所忌。然形氣實。只與參膏竹瀝飲之。盡藥十五六觔。竹百餘竿而安。後不戒口味。夏月醉坐水池中。經年餘。左脇旁生軟塊。二年後成疽。自見脈。症嘔逆如前。仍服參膏等而安。若

與十宣其能然乎。

一婦因得子遲服神仙聚寶丹背生癰甚危脈散大而濇急以加減四物湯百餘貼補其陰血幸其質厚易于收救。

一人形實色黑背生紅腫近髀骨下痛甚脈浮數而洪緊正冬月與麻黃桂枝湯加酒栢生附子瓜蒌子甘草人參羌活青皮黃芪半夏生薑六貼而消。

一男子年五十餘形實色黑背生紅腫及胛骨下痛甚脈浮數而洪緊食亦嘔。琇按與前案同只多此三字正冬月與麻黃桂枝湯。

加酒黃栢生附子瓜蒌子甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此亦內托之法也。

周評事觀患背癰瘡口久不合，召瘍醫徐廷禮療治，恒以托裏十宣二散與服，不效。徐謂周曰：「更請盛用美來，共事料理，則可。否則吾技窮矣。」既而盛至，按脈用藥，率與徐類，但多加人參五錢附子，稍行功耳。服後兩足俱煖，自下而上，謂其子曰：「今之藥何神哉！」頓覺神爽快，服之旬日而宿口平復。俞子容曰：「國初吾吳中老醫多見其用附子，往往治病如庖丁解牛，近醫者多棄而不用，何耶？」近日則以附子為常服之品，所

謂過猶不及

一人患發背，腸胃可窺，百藥不差。一醫教以楸葉膏敷其外，又用雲母膏作小丸子服，盡四兩，不累日，雲母透出膚外。

與楸葉膏相黏著，瘡口遂平，功亦奇矣。其方立秋日，太陽

未升之時，採楸葉熬為膏，敷瘡瘍，一切惡瘡腫毒立愈。按

此方簡而神，瘍醫罕用何也。謂之楸葉膏云。葛常之韻語陽秋

南史曰：薛伯宗善徙癰，公孫太患發背，伯宗為氣封之，徙置

齋前柳樹上，明日而癰消，樹邊倏起一瘤如拳大，稍稍長

二十餘日，瘤大膿潰爛，出黃赤汁升餘，樹為之痿損。此祝由法

一方士嘗貨藥淮西，值兵變，竄入深山，遇老姥年二百許歲，

自謂金亡避兵來此，元完顏氏之醫姥也，傳以背瘡方，用

鮮射干一味，每用三錢研細，溫酒調服，乾者為末，每服一

小錢許，酒下，在上即微吐，在下即微利，功效如神，仍用膏

藥收口。又傳壽星散治惡瘡痛莫當者。糝之不痛。不痛者知痛。大天南星一味爲末。養生主論

古朴翁治一人患背癰。有醫者已爲驅熱拔毒。痛腫已熾。告技窮。翁診之曰。此易易耳。無用藥也。遂煎醋一碗。入鹽少許。以紙數重漬塌腫上。再以銅斗盛火熨之。不數易而病如失。

汪石山治一老人患背癰。請汪診視。脈洪緩而濡。癰腫如碗。皮肉不變。按之不甚痛。微發寒熱。乃語之曰。若在臍胛。經絡交錯。皮薄骨高之處。則難矣。今腫去胛骨下掌許。乃太陽經分。尙可治。遂用黃芪五錢。當歸羌活甘草節各一錢。

先令以被蓋煖。藥熟熱服。令微汗。寢熟。腫消一暈。五服遂安。

薛已治進士張德宏。背疽微腫。微赤。飲食少思。用托裏藥。膿成而潰。再用大補湯之類。肉生而斂。忽寒熱作嘔。患處復腫。其脈浮大。按之若無。形氣殊倦。薛謂之曰。此胃氣虛憊。非瘡毒也。彼云。侵晨登廁。觸穢始作。仍用補藥而斂。立齋名重

一時所治俱膏粱富貴之家。故每以溫補取效。若執此法以治背疽。是癡人說夢。

一人大背患疽年餘。瘡口甚小。色黯陷下。形氣怯弱。脈浮緩。而瀦。此氣血虛寒也。用十全大補。加附子少許。數劑而元氣漸復。卻去附子。又三十餘劑全愈。

一婦年五十餘。四月初。背當心生疽。如栗大。三日漸大。根盤五寸許。不腫。痛不寒熱。薛診其脈微而沉。曰。脈病而形不病者。忌也。實則痛。虛則癢。陰症陽症之所由分也。不發不治。潰而不斂。亦不治。乃與大補陽氣之劑。色白而黯。瘡勢如故。至十二日。薛復診其脈沉。瘡勢不起。神疲食減。小便淋瀝。乃與大補氣血。加薑桂二劑。瘡亦不起。十五日。因怒嘔瀉並作。復大補藥一劑。瘡仍不起。薛畱藥二劑而去。病者昏憤不服。或勸之省悟。依方連進七劑。十六日。瘡起而潰。色紅而淡。膿亦如之。十九日。薛至。喜曰。瘡已踰險處。但元氣消鑠。尙可憂。連與大補二十餘劑。五月十一日。病者

因勞自汗。口乾。舌強。太陽髮際腦頂俱脹。復延薛至診之。曰。此氣血俱虛。肝膽火上炎。用補中益氣湯。加山梔。芍藥。頓愈。但內熱少睡。手足發熱。不時霍熱。用逍遙散。加山梔。熱退。復用歸脾湯。瘡乃愈。計瘡發及斂四十二日。

內翰楊皋湖。孟夏患背疽。服剋伐之劑。兼旬。漫腫堅硬。重如

負石。隔蒜灸五十餘壯。背遂輕快。先服剋伐。又灸則毒盡矣。且無壯熱。故溫補而

愈。乃以六君子。加砂仁。二劑。涎沫湧出。飲食愈少。此脾虛

陽氣脫陷。又用溫補。反嘔不食。仍用藥作大劑。加附子。薑

桂。又不應。遂以參芪各一觔。歸朮。陳皮各半觔。附子一兩。

煎膏服。三日而盡。流涎頓止。腐肉頓潰。飲食頓進。再用薑

桂等藥托裏健脾腐脫而瘡愈。此等治法非明眼不能

儒者顧大有年幾六旬仲冬背疽初起入房患處黑死五寸

許黯暈尺餘漫腫堅硬背如負石發熱作渴小便頻數兩

耳重聽揚手露體神思昏憤脈沉而細右手為甚。以脈為主症屬

假陽便秘二十七日計進飲食百餘碗腹內如常衆欲通

之薛曰所喜者此耳急用大劑六君子加薑附肉桂三劑

瘡始焮痛自後空心用前藥午後以六味丸料加參芪歸

朮五劑復用活命飲二劑。看他先溫補後解毒針出黑血甚多瘀膿

少許背即輕軟仍用前藥便亦通利薛他往四日神思復

昏瘡仍黑陷飲食不進皆以為殞薛以參芪歸朮各一兩

背癰疽瘡

八知不足齋正本

炮附子五錢。薑桂各三錢。服之即索飲食。并鴨子二枚。自後日進前藥二劑。肉腐膿潰而愈。

少叅史南湖之內。夏患疽不起。發脈大而無力。發熱作渴。自

汗盜汗。用參芪大補之劑。益加手足逆冷。大便不實。喘促

時嘔。脈微細。按之如無。惟太衝不絕。太衝乃肝俞在足大指本節後二寸半或

一寸半。初大而無力。用補而反見虛症。并見細脈。所謂真虛若投涼解之劑。脈必愈大。搏指此中玄機。識者有幾

仍以參芪歸朮茯苓陳皮計。酌許加附子五錢。煎膏作二

服。諸症頓退。脈息頓復。翌日瘡起而潰。前藥仍用四劑。後

日用托裏藥。調理兩月而愈。

操江都憲伍松月。背瘡愈後。大熱誤為實火。用苦寒藥一鍾。

寒熱益甚。欲冷水浴身。脈浮大。按之全無。薛曰：此陽氣虛。浮在肌表。無根之火也。急用六君加附子一劑。卽愈。

一男子背瘡不斂。焮腫發熱。小便赤澁。口乾體倦。脈洪數而無力。用參芪歸朮熟地黃芩芍陳皮麥冬五味炙草肉桂補元氣。引虛火歸經。脈症益甚。此藥力未能及也。再劑頓退。卻去肉桂。又數劑而愈。此症因前失補元氣故耳。

憲副陳魯山年五旬。居官勤苦。勞傷元氣。先口乾舌燥。後至丙午仲夏。背發疽。漫腫中央。色黯四畔微赤。微痛。脈舉之浮大。按之微細。左寸短而右寸若無。十餘日腫未全起。薛曰：此屬病氣元氣虛寒。當捨時從症。朝用參芪薑桂歸朮。

陳皮半夏炙草溫補其陽夕用加減八味丸滋其肝腎各
四劑而腐潰但膿水清稀盜汗自汗內熱晡熱脈浮而數
用補而見數浮改用八珍湯復發熱而夜陽舉此腎虛而火妄動
仍用加減八味丸料煎服而安又因怒動肝火瘡出鮮血
二蓋許左關弦數右關弦弱此肝木侮脾致肝不能藏血脾
不能統血也用十全大補兼用前藥料各二劑而血止再
用前藥調理而痊

一人仲夏疽發背黯腫尺餘皆有小頭如鋪黍狀四日矣此
真氣虛而邪氣實也外用隔蒜灸內服活命飲二劑其邪
稍退仍純補其氣又將生脈散代茶飲瘡邪大退薛因他

往三日復視之，飲食不入，中央肉死，大便秘結，小便赤濁。曰：此間斷補藥之過也。蓋中央肉死，毒氣盛而脾氣虛，大便不通，胃氣虛而腸不能送，小便赤濁，脾土虛而火下陷，治亦難矣。急用六君加當歸、柴胡、升麻，飲食漸進，大便自通。外用烏金膏塗中央三寸許，四圍紅腫漸消，中央黑腐漸去，乃敷當歸膏，用地黃丸料與前藥間服，將百劑而愈。中翰鄭朝用背疽潰，發熱吐痰，飲食無味，肌肉不生，瘡出鮮血。薛曰：此脾氣虧損，不能攝血歸源也。法當補脾，朝用不信，用消毒涼血，加惡寒嘔吐，始悟其言，用六君加炮薑、半夏、茯苓數劑，諸症悉退矣。又用十全大補，瘡口漸斂，後因飲

食稍多，泄瀉成痢。此脾胃虛寒下陷，用補中益氣送四神丸而痢止。繼以六君子湯而瘡愈。

御醫王介之內，年四十背疽不起，泄瀉作嘔，食少厥逆，脈息如無。純是虛寒屬陽氣虛寒，用大補劑加附子、薑桂而不應。

再加附子二劑，瀉愈甚。更以大附子一枚、薑桂各三錢、參芪歸朮各五錢作一劑，腹內始熱，嘔瀉乃止。手足漸溫，脈息遂復。更用大補而潰，托裏而斂。十年後終患脾胃虛寒而歿。

職方王的塘背疽潰後，小便淋瀝，作渴引飲，煩熱不寐，瘡口

焮赤如灼。時或小便自遺。潰後不寐自遺雖焮赤亦屬無根之火此腎虛之

惡症用加減八味丸加麥冬五味數劑而痊

太守朱陽山患背疽漫腫色黯微痛作渴瘡頭數十左尺脈數按之有力此腎經之症先用活命飲二劑以殺其毒午
前以參芪歸朮之類壯胃氣午後以加減八味丸料固腎
氣喜其未用敗毒之藥元氣未損故膿出肉腐而愈

駕部林汝玉冬不衣綿作渴飲冷每自喜壯實診其脈數大
無力薛謂至火令當發毒不信三月間果背熱便秘脈澁
用四物加芩連山梔數劑大便始和却去芩連加參朮茯
苓二十餘劑及八味丸半劑許琇案此等症必舍六味
而用八味其義何居渴
減六七背熱亦退至夜背發一疽純用托裏之劑而愈

封君袁懷雪背疽發熱作渴脈數無力用四物加黃柏知母
玄參山梔連翹五味麥冬銀花脈症漸退又加白芷參芪
腐肉悉潰因停藥且勞熱渴仍作乃與參芪歸芷炙草山
藥山萸茯苓澤瀉肉桂而安又以六味地黄丸及十全大
補而斂

一男子背瘡出血煩燥作渴脈洪大按之如無此血脫發燥
用當歸補血湯二劑又以八珍加黃芪山梔不數劑而愈
一婦人背瘡潰後吐鮮血三碗許薛用獨參湯而血止用四
君熟地芎歸瘡愈此血脫之症當補其氣使陽生陰長若
用降火涼血沉陰之劑則脾胃生氣復傷不惟血不歸源

而死無疑矣。

都憲周宏崗在南京刷卷時背患疽腫而不潰脈大而浮此陽氣虛弱邪氣壅滯用托裏消毒散潰而色欠紅活此氣血俱虛也用托裏散倍用參芪反內熱作渴脈洪大鼓指潰而脈洪大鼓指所謂陰盛格陽用前散加肉桂脈症頓退仍用托裏而愈若誤為熱毒而用寒涼則殆矣

太僕王的塘初起大勞又用十宣散之類加喘渴內熱脈大無力此陽氣自傷不能升舉下陷于陰分而為內熱以補中益氣加酒炒芍藥麥冬五味治之而愈

秋官高竹真患之色黯堅硬重如負石神思昏憤遂以蒜杵

爛置瘡頭以艾如錢大灸二十餘壯竟不知又以蒜隨攤
黯處以艾鋪蒜上灸亦不知乃著肉灸良久方知再灸方
痛灸法可師內用大溫補劑而起

上舍張克恭塗貼寒涼及服敗毒之類遍身作痛欲嘔少食
晡熱內熱惡寒憎寒薛曰遍身作痛榮衛虛而不能營養
肉理也欲嘔少食脾胃虛寒而不能消化飲食也內熱晡
熱者陰血內虛陽氣下陷于血分也惡寒憎寒陽氣外虛
不能護衛肌膚腠理也皆脾胃之氣不足所致治以補中
益氣湯諸症悉愈更以十全大補湯腐肉漸潰又以六君
芎歸肌肉頓生

儒者周在魯、懷抱久鬱、背患疽、宛然如一粟、有數頭如黍、五
日矣。肝脈弦、洪、脾脈浮、大。按之微細。以補中益氣加桔梗、
貝母。少用銀花、白芷。二劑、肝脈頓退、脾脈頓復、腫起色淡。
乃以活命飲。二劑、膿潰腫消。肝脈仍弦。此毒雖去而胃氣
復傷。仍用補中益氣加半夏、茯苓而愈。夫脈縱有餘、當認
爲不足。此句非先生不能道、亦非先生不能如此用補。故先用前湯補脾解鬱、怒
則脾氣既充、肝脈自退。若不審其因、遽用敗毒以伐肝、非
惟無以去毒、而反害之。前湯所用銀花、白芷、非取其治瘡。
特解患者之疑耳。

上舍蔡東之、年踰五旬、患背疽、用托裏之藥而潰、但瘡口少

許久不收斂。時值仲冬。兼咳嗽不止。薛曰。瘡口未斂。脾氣虛也。咳嗽不止。肺氣虛也。蓋脾爲母。肺爲子。治法當補其母。一日與蔡同會宴。見其忌食羊肉。因謂羊肉性與人參同功。誤以爲毒可乎。自是更不忌。不旬日而瘡口斂。嗽亦漸愈。嗣後每歲至冬。雖常膳亦不撤。嗽亦不復發矣。

顧色泉老醫。年六十有五。因盛怒。疽發於背。大如盂。四圍色黑。召瘍醫治之。用冷藥敷貼。敷已覺涼。約曰。七八日後。爲用刀去瘀肉。顧俟其去。曰。四圍色黑。乃血滯。理妙更加冷藥。非其治也。乃更治熱敷藥。去舊藥敷之。覺甚癢。終夜。明日色鮮紅。焮腫亦消。惟中起數十孔如蜂房。一日許。又覺惡。

心作噦視一人頭如兩人頭自診曰此虛極症也用參附
大劑進二服視已正矣不數日竟愈

一人患腫毒潰後不時出一細骨用生桐油調蜜陀僧如膏

絹攤貼妙

馬嗣明治楊令患背腫以練石塗之便差作練石法以麤黃

石鶯鴨卵大猛火燒令赤內醇醋中自屑頻燒至石盡取

石屑曝乾擣下篩和醋以塗腫上無不愈北齊書

山陰余南橋治上虞葛通議公年九十餘患背疽初進仙方

活命飲穿山甲蛤粉炒黃甘草節防風真沒藥赤芍白芷各六分

當歸尾乳香各一錢貝母花粉皂刺各八分金銀花陳皮各三錢

作一服。酒煎服。繼服蠟磬丸。黃蠟融化。入細磬末等分爲丸。百沸湯下八十九。次服忍冬丸。金銀花晒乾一觔。同粉草二兩。共爲細末。無灰酒打糊爲丸。酒下八十九。九日三服。若以金銀花趁濕搗爛。水酒各半熬成膏。丸前末尤效。毒未潰。以麥飯石膏圍之。白麥飯石二兩。火煨米醋淬十二次水洗白歛二兩。鹿角灰四兩。三味各研極細末。用經年米醋入砂鍋內調勻如稀醬。文武火熬。以槐枝不住手攪起魚眼泡。取出。入大磁餅封固。勿使塵垢。頓井水中一晝夜。先將猪蹄湯洗淨。雄豬後蹄約二觔半。不用鹽。井花水瓦罐煨爛。其肉取出。著鹽少許。與病者下飯。其湯吹去油。以鶩翎蘸。

湯洗患處。以抵子塗。麥飯石膏。但有紅暈處。盡塗。遍毒既

盡。以神異膏貼之。玄參五錢不黃芪三兩杏仁一兩去全蛇

脫五錢鹽水男亂髮五錢洗露蜂房一兩有黃丹五六兩

細真麻油一觔。同亂髮入銅銚中。文武火熬。候髮熔盡。以

杏仁投入。候黑色。用布濾去渣。再後入玄參黃芪。慢火熬

一二時。取出稍冷。旋入露蜂房。蛇脫。將槐枝急攪。卻移火

上。慢火熬至紫黃色。用布濾去。復入銚。乘冷投黃丹。急攪

片時。又移火上熬。候油變色。滴水成珠。再熬少時。候將冷

傾入水中。三日。退其火毒。取出置器內。封收待用。前藥品

皆臨時製備。效亦隨手而應。膿乾肉長。百日奏功。其孫太

守葛焜刻而傳布名曰廣仁編

此法千金方亦有本艸綱目言之甚詳有中流一壺

鈔本竟挾前人之美爲已有秘本豈非欺人

餘姚史嗣元祖母年六十餘三月背心偏右四五分生一核如粟大上一白頭僅如菘苳初不爲異但癢甚令婢磨擦數日白頭內出膿少許癢如故旬日滿背焮腫週迴闊尺許日夜呻吟背若負石米非壯婦莫能扶起迎外科馬醫視之云毒已成非藥所能必開刀乃可舉家猶豫不忍馬曰譬之救焚火在屋下必穴其頂否則不盡不止若復一日必內潰不可爲矣不得已從其說馬舉刀用麻札露刃止四分曰外科不得已用刀針唯背上不宜針緣肉薄破

其膏肓卽死矣。刀亦不敢深用。但破其腐肉。舉家懼甚。馬
舉刀縱橫審視。各寸許。去腐肉若雞卵大。膿血迸流。隨以
米醋煎滾。用羊毛筆蘸洗之。人人惶懼。不忍視。而病者稱
快。且云。背上輕若干矣。馬云。毒勢正甚。瘡口卽當合。合則
不可再破。卽用桃枝竹。以瓦鎌去其上青皮。取次層竹衣。
揉擦若軟綿。以香油潤濕。塞在瘡口。朝夕一易之。易時仍
以滾醋洗。有腐肉黑色者。用竹枝摘起。剪刀剪去。乃日服
十全大補之劑。又十餘日。方見長肉。嗣元年十四日。待湯
藥。頗得其詳。因述其顛末。以仁後世。恐畏懼刀針而坐視
其斃也。

武昌張啟明述其父治江西商人背左偏中瘡起根紅腫頭

白點癢甚張取蘄艾隔蒜灸三七壯愈而不發此上策也

楚夢山沈君回楚有謝張醫文畧曰予疽發於背初如粟漸

如盤先生至以忍冬草三飲之調劑活命有散護心有丸

既潰洗有法予獲更生實先生賜也與前余南橋治法同

揮使郭君爲人魁肥右背疽發腐潰遍體張用刀割四圍忽

敗肉塊下如拳既愈明年左背再發亦張活之

袁姓者軀肥胖疽發於背止紅暈遍背硬腫無白黍米點肉

緊皮厚若負巨石然張云陽中陰症不可藥不得已用大

針寸許入皮有聲不知痛竟不起

按素問云癰疽不得頃時。回言不得治法。則頃刻殞命也。然癰疽之名雖多。而要不出陰陽二証而已。發於陽者爲癰。爲熱。爲實。發於陰者爲疽。爲冷。爲虛。故陽發則皮薄。色赤。腫高。多有椒眼。而痛。陰發則皮厚。色淡。腫硬。狀如牛皮。而不痛。又有陽中之陰。似熱而非熱。雖腫而實虛。若赤而不燥。欲痛而無膿。既浮而復消。外盛而內腐。陰中之陽。似冷而非冷。不腫而實微。赤而燥。有腫而痛。外雖不盛。而內實煩悶。陽中之陰。其人多肥。肉緊而內虛。陰中之陽。其人多瘦。肉緩而內實。而又有陽變爲陰者。涼劑之過也。陰變爲陽者。熱藥之驟也。然陽變陰。

者其證多。猶可返於陽。故多生。陰變而陽者。其證少。不復能爲陽矣。故多死。然間有生者。必得明醫調治合法。百中得一耳。癰疽有寒熱虛實。皆由氣鬱而成。當委之明醫。量人虛實。察病冷熱。推其因。究其原。而後治之。則內外相應。而無失誤矣。

濮陽傳云。凡患腫毒無名者。用長青草酒煎服。出租貼患處。屢驗。其草四季長青。似菘菜葉。一名雪裏青。一名荔枝草。濮陽傳云。有一人患對口瘡甚急。遇方士取鶩子初出時。收黃不盡。死在殼內者。用新瓦焙乾爲末。以好酒調服。愈。

癰疽

齊王侍醫遂病，自煉五石服之。臣意往過之，遂謂意曰：「不肖有病，幸診遂也。」臣意即診之，告曰：「公病中熱。論曰：中熱不洩者，不可服五石。石之爲藥，精悍。公服之，不得數洩，亟勿服。色將發臃。」遂曰：「扁鵲曰：陰石以治陰病，陽石以治陽病。夫藥石者，有陰陽水火之劑。故中熱，卽爲陰石柔劑治之。中寒，卽爲陽石剛劑治之。意曰：公所論遠矣。扁鵲雖言若是，然必審診起度量，立規矩，稱權衡，合色脉，表裏有餘不足，順逆之法，參其人動靜與息相應，乃可以論。」

千古明眼治法無出

于論曰。陽疾處內。陰形應外者。不加悍藥。及鑱石。夫悍藥

入中。則邪氣辟矣。而宛氣愈深。診法曰。二陰應外。一陽接

內者。不可以剛藥。剛藥入。則動陽。陰病益衰。陽病益著。邪

氣流行。為重。困于俞。忿發為疽。意告之後。百餘日。果為疽。

發乳上。胃熱入缺盆。死。此謂論之大體也。必有經紀。拙工有

一不習文理。陰陽失矣。史記。琇按此。案已見中熱門。

齊侍御史成。自言病頭痛。臣意診其脉曰。君之病。惡不可言

也。即出。獨告成弟昌曰。此病疽也。內發于腸胃之間。後五

日當臍腫。後八日。嘔膿死。成之病。得之飲酒。且內。成即如

期死。所以知成之病者。臣意切其脉。得肝氣。肝氣濁而靜。

此內關之病也。脉法曰：脉長胃而弦肝，不得代四時者，其

病主在于肝和。即經主病也。代則絡脉有過，經主病和者。

其病得之筋髓裏。腎肝其代絕而脉賁者，病得之酒且內，所

以知其後五日而癆腫。八日嘔膿死者，切其脉時。少陽初

代代者，經病。病去過人，人則去絡。脉主病當其時。少陽初

關一分，故中熱而膿未發也。及五分則至少陽之界。肝心相去

五分故曰五日盡也及八日則嘔膿死。故上二分而膿發，至界而癆

腫盡泄而死。熱則上薰陽明，爛流絡。流絡動則脉結發。脉

結發則爛解。故絡交熱氣已上行，至頭而動，故頭痛。史記

唐李勣嘗疾，醫診之云：得鬚灰服之方止。太宗遂自翦鬚燒

灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云翦鬚燒灰賜功
臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕翦髭與卿合
藥表朕意也

一人淵疽之發于肋下久則一竅有聲如嬰兒啼灸陽陵泉
二十七壯聲止而愈

向友正淳熙中爲江陵支使攝公安令癰發于胸臆間搔療
半歲弗愈嘗浴罷病甚委頓而臥似夢非夢見一丈夫微
揖而坐傳藥方與之曰用沒藥瓜萋乳香三味酒煎服之
且言桃源許診知縣亦有此方但不用瓜萋若用速效宜

服此向卽如所戒不終劑而愈後詣玉泉禱雨瞻壽亭關

王像蓋所感夢者因繪事于家

類編

丹溪治一人性急味厚嘗服熱燥之藥左脇一點痛脉之輕

弦重芤知其痛處有膿作內疽治

眼明

與四物湯加桔梗香

附生薑煎十餘貼痛微微腫如指大令針之少時屈身而膿出與四物調理而安

薛已治一儒者患流注發熱作渴頭痛自汗脉洪數按之無力此氣血虛也用十全大補加麥冬五味治之益甚仍用前藥加附子一錢四劑諸症悉退却去附子加肉桂二十劑氣血漸復又因勞心發熱惡寒飲食減少此脾胃復傷

各醫類案卷十
元氣下陷，用補中益氣加附子一錢，二劑熱止，食進，仍用大補元氣而安。後因考試不利，懷抱不舒，更兼勞役，飲食日少，形氣日衰，吐痰作渴，頭痛惡寒，或熱或止，仍用補中益氣數劑，諸症漸愈，元氣漸復，乃去附子，再加肉桂五分，百餘劑而愈。

東侍御左脇下近腹，肝膽經部分結一塊，四寸許，漫腫不赤，按之即痛。薛曰：此當補脾胃，彼謂腫瘍宜表散，乃服流氣飲，胃氣頓虛，七惡併臻。薛乃用四君加芎歸，酒炒芍藥，薑桂治之，胃氣平而惡症退，乃去乾薑，加黃芪數劑，瘡赤微痛，又三十餘劑，膿成，針之，用補中益氣，加減八味而愈。蓋

肝膽屬木。因腎水虛弱。不能滋生。況肝膽之血原少。豈可復行消散。且腫瘍內外皆壅。宜托裏表散爲主。蓋先于補氣。而佐以行散。非專攻之謂也。

一男子元氣素弱。臀腫硬。色不變。飲食少。將年餘矣。此氣虛而未能潰也。先用六君爲主。加芎歸芍藥治之。元氣漸復。飲食漸進。患處漸潰。更加黃芪肉桂。并日用葱熨之法。月餘膿熟。針之。以十全大補湯及附子餅灸之。而愈。

一男子脇腫一塊。日久不潰。按之微痛。脉微而濇。此形症俱虛。當補不當瀉。乃以人參養榮湯及艾炒熱熨患處。膿成。以火針刺之。更用豆豉餅十全大補湯百劑而愈。

各醫類案卷十
一婦人左臂患之年許不潰。堅硬不痛。肉色不變。脉弱少食。月經過期。日晡益熱。勞怒則痛。與參、芪、歸、朮、川芎、芍藥、貝母、遠志、香附、桔梗、丹皮、甘草百餘劑而消。

一婦人因怒。脇下腫痛。胸膈不利。脉沉滯。用方脉流氣飲。數劑少愈。以小柴胡對二陳加青皮、桔梗、貝母。數劑頓退。更以小柴胡湯對四物湯二十餘劑而瘥。

一婦人因閃肭。肩患腫。遍身痛。遂以黑丸子二服而痛止。以方脉流氣飲二劑而腫消。更以二陳對四物加香附、枳殼、桔梗而全愈。

汪石山治一司訓。年近六十。長瘦色蒼。赴福建考試回。病背

腿癰腫。一腫愈。一腫作。小者如盞。大者如鍾。繼續不已。俗曰流注是也。醫皆欲用十宣散。五香湯。托裏散。汪診之。脉皆濡弱。曰。此非前藥所宜也。夫以血氣既衰之年。冒暑遠涉熱瘴之地。勞傷形熱。傷氣矣。經云。邪之所湊。其氣必虛。理宜滋補。使氣運血行。腫不作矣。遂用大補湯。減桂。倍加參。芪。歸。朮。佐以黃栢。黃。芩。紅。花。服至二三十貼。視腫稍軟者。用砭決去其膿。未成者。果皆消釋。仍服二三十貼。以防後患。

江應宿治刑部正郎昆石容公。肋下近腰軟處。患癰腫。外科用消毒藥。既潰。月餘。瘡口不斂。肌瘦神悴。診得六脉緩弱。

無力。乃用補中益氣人參。加作三錢。黃芪五錢。時值七月。少加黃栢。以救腎水。麥冬五味。以滋養化源。亦可食進而瘡斂。三十餘劑而痊。

腦頂疽

東垣治一人因飲酒太過。脉沉數。腦之下。項之上。有小瘡。不痛不痒。謂是白瘡。慢不加省。二日後覺微痛。又二日。腦頂麻木。腫勢外散。熱毒熾發。又三日。七日痛大作。一醫以五香連翹湯。又一醫云。此疽也。然而不可速療。須四月可愈。果如二子言。可畏之甚也。乃請東垣視之。談笑如平時。且

謂瘡固惡。可無慮耳。且膏粱之變。不當投五香。疽已七八日。當先用火攻之策。然後用藥。午後用火艾炷。如二核許者。攻之。至百壯。乃覺痛。次爲處方云。是足太陽膀胱之經。其病逆。當反治。脉中得弦緊。陰按之洪大。陽而數。陽中且有力。必當伏其所主。而先其所因。其始則同。其終則異。可

使破積。可使潰堅。使氣和則已。必先歲氣。毋伐天和。以時

言之。可收不可汗。經病禁下。太陽經不可下法當結者散之。鹹以

奠之。然寒受邪。脉緊而禁針。以諸苦寒爲君。爲用甘寒爲佐。

酒熱爲因。用爲使。以辛溫。和血。夫辛以散結。爲臣。三辛三

甘。益元氣。而和血脉。淡滲以燥溼。扶持秋令。以益氣瀉火。

以入本經之藥以和血。且為引用。既以通經。以為主用。君

用芩連黃栢君 生地黃知母佐 酒製之。本經羌活獨活防

風藁本防已當歸連翹和血散熱 以解結。黃芪人參生甘草補元

陳皮佐 蘇木澤瀉使 桔梗配諸苦寒者三之一。多則滋榮

氣補土也。生甘草瀉腎之火。補下焦元氣。人參陳皮以補

胃。蘇木當歸尾去惡血。生地歸身補血。酒製漢防已除膀胱

留熱。澤瀉助秋令。去酒之溼熱。必以桔梗為舟楫。乃不

下沉。此方可通治太陽經毒 服後疽當不痛大折。精氣大旺。飲啖進

形體健。投牀大斲。日出乃寤。以手捫瘡。腫減七八矣。李疑

瘡適透喉。遽邀視之。驚喜曰瘡平矣。不五七日。作痂而愈。

東垣又曰。凡瘡皆陰中之陽。陽中之陰。二証而已。我治此瘡。陽藥七分。陰藥三分。名曰升陽益胃散。勝十宣也。老人宜之。亦名復煎散。

陳錄判母年七十餘。亦冬至後。腦出疽。形可甌面大。瘍醫診視曰。俟瘡熟。以鍼出膿。因怒答侍妾。瘡輒內陷。凹一韭葉許。面色青黃不澤。四肢逆冷。汗出身清。時復嘔吐。脉極沉細而遲。溫補無疑。身不熱而清。可想。蓋緣衰老之年。嚴寒之時。病中苦

楚。飲食淡薄。已滌肥膿之氣。獨存瘦瘁之形。加之暴怒。精神愈損。故此有寒變也。病與時同。速製五香湯一劑。加丁香。附子各五錢。劑盡。瘍復大發。隨症調治而愈。內經曰。凡

治病必察其下。謂察時下之宜也。諸痛瘡瘍皆屬心火。言其常也。如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也。固當察時下之宜而權治。故曰經者常也。法者用也。醫者意也。隨所宜而治之。可收十全之功矣。

石山治一人形肥色紫年逾五十頸項少陽之分癰腫如碗診之脉浮小而滑曰少陽多氣少血之經宜補若用尋常驅熱敗毒之藥癰潰之後難免他患遂煎參芪歸朮膏一二觔用茶調服無時蓋茶能引至少陽故也旬餘癰潰而起

丹溪治一婦年將七十形實性急而好酒腦生疽纔五日脉強

緊急且瀉用大黃酒煨細切酒拌炒爲末又酒拌人參炒入薑煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已失此內托之法也

煨按此案已見瘡瘍門

一人患腦疽面目腫閉頭焮如斗此膀胱溼熱所致以黃連消毒散二劑次以槐花酒二碗頓退以指按下腫卽復起此膿成也于頸額肩頰各刺一孔膿並湧出口目始開更

以托裏藥加金銀花連翹三十劑全愈

正治法

薛已治閣老翟石門子耳中作痛內服外敷皆寒涼敗毒更加項間堅硬肉色如故焮連于胸寒熱欲嘔飲食少思薛視之腫雖堅而脉滑數此膿內潰也雖屬手三陽熱毒之

名醫類案卷一
症然其元氣已傷寒涼凝結不能外潰先用六君子湯補中益氣各二劑調補脾胃升發陽氣患處赤軟針出膿穢甚多仍服數劑而愈

一武職河南人年踰五十患腦疽內潰熱渴頭面腫脹如斗胸背色焮如塗丹煩熱便秘此表裏俱實時雖仲冬若非苦寒之劑內疎外泄不救遂針周頂出膿及用清涼飲內加大黃五錢再用消毒散而愈

正治

一人腦患疽發熱口渴醫用苦寒藥膿水益多發熱益甚面目赤色唇舌燥烈小便淋痛晝夜不寐

陰虛

死在反掌請薛

治之乃以加減八味丸料

從治

加參芪歸朮麥冬甘草煎服

之熟睡半日、覺來諸症悉退、不數劑而瘡愈、薛曰、病雖愈、當固其本元、彼不經意、且不守禁、次年患中風、後患背疽而歿、

錦衣葉夫人患腦疽、口乾舌燥、內服清熱、外敷寒涼、色黯不
煥、胸中氣噎、症屬陽氣虛寒、彼疑素有痰火、不受溫補、薛
以參芪各五錢、薑桂各二錢、一劑、頓然腫潰、又用大補藥
而愈、

一婦冬患腦腫痛、熱渴、用清熱消毒潰之而愈、次年三月、其
舌腫大、徧身發疔、如紫葡萄、不計其數、手足尤多、乃脾胃
受毒、各刺出黑血、服奪命丹七粒、出臭汗、瘡熱益甚、便秘

各醫門類卷一
二日與大黃芩連各三錢。升麻白朮山梔薄荷連翹各二錢。生草一錢。水煎三五沸服之。大小便出臭血甚多。下體稍退。乃磨入犀角汁再服。舌本及齒縫出臭血。諸毒乃消。更以犀角地黄丸而愈。

一男子素善怒。左項微腫。漸大如升。用地黃補中益氣而愈。

多骨疽

薛已治一男子。年將三十。上腭腫硬。年餘方潰。半載未愈。內熱作渴。肢體消瘦。用補中益氣六味地黃治之。元氣漸復。出骨一塊。仍服前藥。諸症悉去。瘡口亦斂。

一男子自十四歲閃足腫痛，服流氣飲，外敷寒涼，腐潰而至十六，瘡口開張，足背漫腫黯，骨黑露出，形體消瘦，盜汗不止，發熱，口舌乾燥，天真已喪，用十全大補湯，六味地黃丸，各五十餘劑，元氣漸復，患處漸赤，脫落骨一塊，又各服五十劑，愈。

一婦人年二十餘，素清弱，左手背骨漸腫，二年後潰而膿水清稀，患處色黯，連背發腫，形體愈瘦，內熱晡熱，自汗盜汗，經水兩月一至，朝用歸脾湯，夕用逍遙散，患處并腫背，頻用葱熨，兩月，諸症漸愈，瘡出一骨，仍服前藥，又三月，前後用三百餘劑，喜主母體恤得愈。

癩瘕

薛立齋治閣老楊石齋子年十七發熱作渴日晡頰赤脉數而虛用補陰八珍湯五十餘劑。又加參芪歸朮爲主佐以熟地白芍麥冬五味。膿水稠而肌肉生更服必效散一劑癩毒去而斂。

容臺張美之善怒患之時孟春或以爲肝經有餘之症用剋伐之劑不愈薛以爲肝血不足用六味地黃補中益氣以滋化源至季冬而愈此症果屬肝火風熱亦因肝血不足若主伐肝則脾土先傷木反剋土此症或延于脇腋或患

于胸乳。皆肝膽三焦之經也。亦當以前法治之。

一儒者缺盆間結一核。薛謂此肝火血燥筋攣法。當滋腎水生肝血。彼反服行氣化痰。外敷南星商陸之類。漸如覆碗。仍用前藥以滋化源。間與蘆薈丸以清肝火。年餘元氣復而腫消。

一男子頸間結核大潰。年餘不愈。又一男子鬢間一核。初如豆粒。二年漸大如桃。又一婦人左脅及髮際結核年餘矣。皆與清肝火養肝血益元氣而並愈。此症亦有大如升斗者。治以前藥無不取效。

一婦人瘰癧久不愈。或以木旺之症。用散腫潰堅湯代之。腫

硬益甚，薛以為肝經氣血虧損，當滋化源，用六味地黃丸，補中益氣湯，至春而愈。此症若肝經風火暴病，元氣無虧，宜用前湯。散腫潰堅若風木旺而自病，宜用瀉青丸。虛者用地黃丸。若水不能生木，亦用此丸。若金來剋木，宜補脾土。生腎水。大凡風木之病，壯脾土則木自不能剋矣。若用代肝則脾胃先傷而木反剋土矣。

一婦患之，恐不起，致少寐，年餘癱破，膿水淋漓，經水或五十一日，或兩月餘一至，誤服通經丸，輾轉無寐，午前惡寒，午後發熱，薛以為思慮虧損脾血，用歸脾湯作丸，午前以六君送下，午後以逍遙送下，兩月餘得寐，半載後經行如期，年

餘瘡愈

一婦癰潰後發熱煩燥作渴脉大而虛以當歸補血湯六劑

而寒熱退又以聖愈湯聖愈湯 生地 熟地 川芎 歸身 人參 黃耆數劑

而痊更以八珍加貝母遠志三十餘劑而斂

一婦人項結核寒熱頭痛脇乳脹痛內熱口苦小便頻數症

屬肝火血虛用四物加柴胡山梔膽草妙方而愈又用加味

逍遙散而安

一婦癰癰後遍身作痒諸痒為虛脉大按而虛以十全大補加香

附治之而愈大凡潰後午前痒作氣虛午後痒作血虛若

作風症治之必死

一婦人項核腫痛。察其氣血俱實。先以必效散一服下之。更以益氣養榮湯補之。三十餘劑而消。常治此症。若必欲出膿。但虛弱者。先用前湯。待其氣血稍充。乃用必效散。去其毒。仍用補藥。無不效。未成膿者。灸肘尖。調經解鬱。及隔蒜灸。多日。稍有膿。卽針之。若氣血復而核不消。却服散。堅之劑。月經不應。氣血不損。須用必效散。其毒一下。卽多服。益氣養榮湯。如不應。亦灸肘尖。如瘡口不斂者。更用豆豉餅。琥珀膏。若氣血大虛。或不慎飲食七情者。不治。然此症以氣血爲主。氣血壯實。不用追蝕之劑。亦能自腐。但取去使易于收斂耳。血虛而用追蝕。不惟徒治。適以取敗耳。

江應宿治休寧吳氏子年十七患癩癰三年矣。瘍醫用爛藥刀砭破取瘡口甫平卽復腫累累如貫珠遍體瘡疥兩脇腫核如桃予診之微弦而數卽語之曰肝腎虛熱則生癩矣當從本治內消可法可師以柴胡當歸連翹黃芩黃連牛蒡三稜桔梗花粉紅花十餘劑再與黃連海藻昆布乾葛石膏山梔龍膽連翹花粉爲丸以清其上更令空心服六味地黃丸以滋化源二者兼治藥無遺憾未盡一料癩消瘡愈不復作矣

鬢疽

薛立齋治侍御朱南臯患鬢疽腫痛發熱日晡尤甚此肝膽
二經血虛火燥用四物加元參柴胡桔梗炙草而愈又因
勞役發熱畏寒作渴自汗用參芪歸朮炙草陳皮五味麥
冬炮薑而瘥

州守胡廷器年七十有少妾患前症腫焮作痛頭目俱脹此
腎水不足肝膽火盛血燥用六味丸料四劑瘡頭出水而
愈二年後七情失宜飲食勞役仍腫痛煩熱喘渴脉洪大
而虛用補中益氣以補脾胃用六味地黃以補腎肝而愈

如此症而純用滋化源之藥非
先生不能不如江案之可法也

附骨疽

東垣治一男子于左大腿邊近膝股內出附骨疽不辨肉色

漫腫皮澤堅硬瘡勢甚大其左脚乃脛之髀上也更在足

厥陰肝經之分陰包穴少侵足太陰脾經之分血海穴其脉左

三部細而弦按之洪緩微有力用生地一錢黃栢二分肉桂

三分羌活五分歸稍八分土瓜根三分柴胡稍一錢連翹一

錢黃芪二錢作一服酒一盞水二盞煎至一盞去滓空心

熱服

一老人年七十因寒溼地氣得附骨癰于左腿外側足少陽膽

經之分。中竇微侵足陽明分。陰市潤六七寸。長一小尺。堅

硬漫腫。不辨肉色。皮澤深。但行步作痛。以指按至骨。大痛。

與藥一貼立止。照前案方再日柔軟而腫消。與內托黃芪酒煎

湯愈。湯見集成

孫彥和治一人。年踰五旬。季夏初。患右臂膊腫盛。上至肩。下

至手指。色變。皮膚涼。六脉沉細。而微。此乃脉症俱寒。瘍醫

莫辨。孫視之曰。此乃附骨癰。開發已遲。以燔針啟之。膿清

稀。解次日。肘下再開之。加呃逆不絕。孫與丁香柿蒂散兩

服。稍緩。次日呃逆尤甚。自利。臍腹冷痛。腹滿。飲食減少。時

發昏憤。于左乳下黑盡處。灸二七壯。千金妙法又處托裏溫中

湯用乾薑、附子、木香、沉香、茴香、羌活等分，咬咀一兩半，欲與服。或者曰：諸痛痒瘡瘍皆屬心火。又當盛暑之時，用乾薑、附子可乎？孫曰：法當如是。內經曰：脈細皮寒，瀉利前後飲食不入，此謂五虛。況呃逆者，胃中虛寒極也。諸痛痒瘡瘍皆屬心火，是言其常經也。此症內外相反，須當捨時從症，非大方辛熱之劑，急治之則不能愈。遂投之，諸症悉去，飲食倍進，瘡勢溫膿，色正，復用五香散數劑，月餘平復。吁！守常者衆人之見，知變者智者之事。知常而不知變，奚以爲醫。

南司馬王荆山，腿腫作痛，寒熱發渴，飲食如故，脈洪數而有

力。此足三陽經溼熱壅滯。用檳蘇敗毒散一劑。而寒熱退。再劑而腫痛消。更用逍遙散。而元氣復。兩月後。因怒。腫痛如錐。赤暈散漫。用活命飲二劑。而痛緩。又用八珍加柴胡。山梔丹皮。而痛止。復因勞役。倦怠懶食。腿重頭暈。此脾胃氣虛也。用補中益氣加蔓荊子而安。

一膏梁酒色之人。患四日而入房。兩髻硬腫。二便不通。不可為實

腎開竅于二陰。此屬肝腎虧損。用六味丸料。加車前牛膝。而便利。用補中益氣。而腫硬消。

一上舍內腫如錐。外色如故。面黃體倦。懶食或嘔。痛傷胃也。用六君湯。以壯脾胃。更以十全大補。以助其膿。針之。用前

湯倍加參。芪。芎。歸。麥。冬。五。味。遠。志。貝。母。而。瘡。斂。

丹溪治一壯年，叡骨疼，以風藥飲酒一年，乃以防風通聖散去硝黃，加生犀角、浮萍與百餘劑，成一疽，近皮革膿出而愈。後五六年，其處再痛。朱曰：舊病作，無能為矣。蓋發于新娶之後，多得香辣肉味。若能茹淡遠房勞，猶可生也。出膿血四五年，沿及腰背皆空。又三年而死。此純乎病熱者。

一女髀樞穴無考生附骨疽，在外側廉少陽之分。始末悉用五

香湯十宣散。一日惡寒發熱，膈滿。猶大服五香湯，一夕喘死。此升散太多，陰血已絕，孤陽發越于上也。

一少年天寒極勞，叡骨痛。兩月後生疽，深入骨邊，臥二年，取

名醫類聚卷一
剝骨而安。此寒轉熱者也。

肺癰

丹溪治一少婦胸膈間潰一竅膿血與口中所咳相應而出。以參芪當歸加退熱排膿等藥而愈。一云此因肺痿所致。項彥章治一人病胸膈壅滿昏不知人。項以杏仁薏苡之劑灌之立甦。繼以升麻黃芪桔梗消其膿。服之踰月瘳。項所以知其病者。以陽明脉浮滑。陰脉不足也。浮爲風而滑爲血聚。始由風傷肺。故結聚客于肺。陰脉之不足。則過于宣逐也。諸氣本乎肺。肺氣治則出入易。菀陳除。故行其肺氣。

而病自已。已見前
痞滿門

石山治一婦年近三十。形色瘦白。素時或咳嗽一二聲。月水或前或後。夏月取涼。遂咳甚。不能伏枕者月餘。嗽痰中或帶血。或兼膿。嗽急則吐食。醫用芩連二陳不效。復用參芪等補藥。病重。汪視左脉浮滑。右脉稍弱而滑。幼傷手腕。掌不能伸。右脉似難憑矣。乃以左脉驗之。恐妊兼肺癰也。遂以清肺泄肺之劑進之。三服而能著枕。痰不吐。膿不咯。惟時或惡阻。汪曰。此妊之常病也。教用薏苡仁。苡仁胎前禁
用有肺癰亦不禁。可見有病病受如此。白朮、茯苓、麥冬、黃芩、阿膠煎服。病減。月餘復為診。脉皆稍緩而浮。曰。熱已減矣。但吐紅太多。未免傷胃。

教用四君子加陳皮黃芩枳殼煎服調理。妊至六月食雞
病作。却雞而愈。至九月病又復作。聲啞。令服童便。獲安。汪
曰。產後病除。乃是佳兆。病若復作。非吾所知。月足而產。脾
胃病作。加泄。竟不救。

一儒者鼻塞流涕。咳吐膿血。胸膈作脹。先用消風散。亂髮灰。
二服而鼻利。又用四君芎歸及桔梗湯而愈。後因赴選勞
役。咳嗽吐膿。小便滴瀝。面色黃白。此脾土不能生肺金。肺
金不能生腎水。用補中益氣六味地黃而愈。

一儒者素善飲。咳痰項強。皮膚不澤。此肺癰也。蓋肺系于項。
故項不能轉側。非風痰而項焉能強。斷之肺癰見亦神。肺氣虛弱。故皮膚不

澤先用桔梗湯以治肺。後用八珍補肺湯以補脾土生肺金而痊。

一男子吐膿血，飲食少思，胸腹脹，脾肺心脉皆洪數。洪數脉不佳

此火不能生土，土不能生金，用桔梗湯為主，佐以補中益氣而愈。

一男子不時咳嗽，作渴自汗，發熱便數，彼恃知醫，用清肺降火，理氣滲利之劑，小便不通，面目赤色，唇裂。似火痰壅肺脾

胃三脉浮大，按之而數，此足三陰虧損，不能相生，當滋化源，否則成癰。彼不信，仍用分利之劑，後果患肺癰，始悟其言，用桔梗湯及滋化源而愈。

一男子面赤吐膿發熱作渴煩躁引飲脉洪數而無倫次此
腎火傷肝先用加減八味丸加麥冬法妙大劑一鍾熱渴頓
止久睡覺而神爽索食再劑諸症又減六七仍用前藥更
以人參五錢麥冬二錢五分五味二錢水煎代茶日飲一
劑月餘而安此症面赤者當補脾腎面白者當補脾肺故
用此藥

江應宿治貢士汪賓篁患滯下赤白月餘逆予診視投藥數
劑而愈六脉洪數不減卽告之曰公年高足三陰虛損不
能相生當滋化源否則恐生他病與六味地黃丸加生脉
散因循半月未及修製遂覺右乳傍牽痛面赤吐痰腥臭

脉洪大浮數。按之無力。予曰。脉數不時見。此肺癰也。次日。

吐膿血甚多。投以桔梗湯加羚羊角。未應。再與升麻湯。

湯升麻桔梗苡仁地榆赤芍生甘草丹皮黃芩十餘劑。更以前丸滋其化源而愈。

胃癰

薛立齋治一膏粱之人。寒熱作渴。不時咳吐。口內血腥。又五日。吐膿血。皮毛錯。縱用射干湯四劑。膿血已止。但氣壅痰多。以甘桔湯二三劑而愈。

一男子用射干湯之類。乍愈。但氣喘體倦。發熱作渴。小便頻數。用補中益氣。加山藥山茱萸麥冬五味。時仲夏。更以生

脈散代茶飲而愈。

一老婦素味厚吐膿已愈但小便淋瀝用補中益氣加麥冬五味及加減八味丸而愈膏粱之人初起清胃散亦可用江應宿治上舍汪中宇患喉腫不進飲食腹中不飢但日飲清茶數盞召予視之診得氣口緊數此胃癰也膿已成宜引下行法可投以涼膈散稍稍利一二度次早吐膿血再服射干湯一劑卽知餓索飲食六劑全愈。

腸癰

丹溪治一女子腹痛百方不治脈滑數時作熱腹微急曰痛

病脉當沉細。今滑數。此腸癰也。妙妙以雲母膏一兩。雲母膏即陽起

石丸。梧子大。以牛皮膠溶入酒中。并水下之。餉時服盡。下

膿血一盆而愈。

一婦以毒藥去胎後。當臍右結塊。塊痛甚。則寒熱。塊與臍高

一寸。有形痛不可按。脉洪數。謂曰。此瘀血流溢于腸外。育

膜之間。聚結為癰也。遂用補氣血行結滯。排膿之劑。三日

決一鋒針。膿血大出。內如糞狀者。臭甚。病婦恐。因謂氣血

生肌。則內外之竅自合。不旬日而愈。

羽林婦病。醫者脉之。知其腸中有膿。為下之。即愈。蓋寸口脉

滑而數。滑則為實。數則為熱。滑則為榮。數則為衛。脉法衛

數下降。榮滑上升。榮衛相干。血爲濁敗。小腹痞堅。小便或澁。或時汗出。或復惡寒。膿已成。設脉遲緊。聚爲瘀血。下之卽愈。

滄洲治郡守李母龐。病小腹痛。衆醫皆以爲瘕聚。久藥不效。呂診循其少陰脉。如刀。及之切手。胞門朮而數。知其陰中痛。癰結小腸也。告之曰。太夫人病在幽隱。不敢以聞。幸出侍人語之。乃出老嫗。呂曰。苦小腸癰。以故臍下如瘕聚。今膿已成。痛迫于玉泉。當不得前後溲。溲則痛甚。嫗拜曰。誠如公言。遂用國老甘將軍大黃爲向導。麒麟竭。虎珀之類。攻之。膿自小便潰。應手愈。

虞恒德治一人得潮熱微似瘧狀小腹右邊有一塊大如雞

卵作痛。右脚不能伸縮。琇按俗名一醫作臏脈氣治十餘

日不驗。虞診其脈左寸芤而帶濇右寸芤而洪實。積血未成膿故

寸芤若膿已成則洪數兩尺兩關俱洪數曰此大小腸之間欲作癰

耳幸膿未成猶可治與五香連翹湯加減與之間以蜈蚣

炙黃酒調服之三日愈。

儒醫李生治一富家婦有疾診之曰腸胃間有所苦耶婦曰

腸中痛不可忍而大便從小便出。琇按交腸症亦如此醫皆謂古無

此症不可治李曰試為籌之若服我之藥三日當瘳下小

丸子數十粒煎黃芪湯下之下膿血數升而愈其家喜問

名醫真案卷之二 腸癰 三六 知不足齋正本

治法李曰始切脉時覺芤脉見于腸部脉訣云寸芤積血在胸中關內逢芤腸裏癰此癰在內所以致然所服者乃雲母膏爲丸耳切脉至此可以言醫矣

王仲言餘話

薛已治一男子裏急後重下膿脹痛用排膿散蠟礬丸而愈後因勞寒熱體倦用補中益氣而安

一婦人小腹脹痛小便如淋此毒結于內先以神效瓜萋散二劑少愈更以薏苡仁湯而安

一婦人小腹脹痛而有塊脉芤而濇此瘀血爲患以四物加元胡索紅花桃仁牛膝木香二劑血下而愈

一婦人小腹脹痛大便秘濇轉側有水聲脉洪數以梅仁湯

一劑下瘀血。諸症悉退。再以薏苡湯二劑而瘥。

一婦人膿成脹痛。小便不利。脉洪數。服太乙膏三錢。下膿甚多。脹痛頓止。以瓜萋散蠟礬丸及托裏而安。

一婦人產後惡露不盡。小腹作痛。服瓜子仁湯下瘀血而瘥。凡瘀血停滯。宜急治之。緩則腐化爲膿。最爲難治。若流注關節。則爲敗症。

江汝潔治一男子。病小腸癰初起。左小腹近脇。下一塊如掌大。甚疼。江以蜂蜜調大黃末敷于痛處。再以生薑一大塊切片。置于大黃之上。以火熨之。妙法可師四五度。痛卽止。逾半

月而塊自消。

一入腸破，腸出臭穢，急以香油抹腸送入，卽不出。又以人參、枸杞子煎湯淋之，皮自合。喫豬腎粥十日愈。

江應宿治汪上舍之內，當臍結痛，發熱惡寒，脈洪數。此腸癰也。投以仙方活命飲、五香翹湯、瓜萋散，俱不應。過七日，小便間有膿血，乃製雲母膏爲丸，十數服而愈。可見藥之對病，其驗如此。

懸癰

穀道外腎之間，所生癰毒，名爲懸癰。醫書所不載，世亦罕有。知者初發，唯覺痒甚，狀如松子大。漸如蓮實。四十餘日後，

始赤腫如胡桃。遂破。若破則大小便皆自此去。不治。其藥用橫紋大甘草一兩。截長三寸許。取山澗東流水一大盃。并水河水不可用。以甘草蘸水。文武火慢炙。不可性急。須用三時久。水盡爲度。擘視甘草水中潤爲透。却以無灰酒兩碗煮。俟至一半。作一服溫飲之。初未便效驗。二十日始消。未破者不破。可保平。雖再進無害。興化守姚康朝正苦此癰。衆醫拱手。兩服而愈。

薛已治趙州守膿多作痛。五月餘矣。晡熱口乾。盜汗食少。體倦氣短。脉浮數而無力。用補中益氣加製甘草五味麥冬三十餘劑。食進勢緩。又以六味丸料五十餘劑。膿潰瘡斂。

後因怒作痛少食脇痛發熱仍用前湯而安喜其稟實慎疾而得愈

江應宿治族弟應楚在燕京患懸癰氣短欬逆面赤口期期不能成語素有痔漏多服寒涼解毒大傷中氣脉浮數而無力用補中益氣一服而欬逆定數劑而膿血潰五十餘劑而愈

便癰

薛立齋治一儒者年二十左患便癰用托裏藥潰而將愈入房發熱作痛右邊亦作膿水清稀虛証悉具脉洪大可畏

用十全大補加附子一錢脉症頓退繼用大補湯三十劑而歛

一儒者腫痛便瀉用八正散清肝火導溼熱二劑而腫痛愈再用小柴胡加芎歸澤瀉山梔二劑以清肝火補脾血而小便利

一男子腫痛不止用活命飲一劑而痛止再劑而腫消

一男子痛甚發熱用前飲一劑痛止再以神效瓜萸散加山梔柴胡二劑而消

一男子腫而不潰用參芪歸朮以補托元氣用白芷皂角刺柴胡甘草以排膿清肝數劑而潰復以八珍加柴胡補其

氣血而愈

江應宿治一男子患便毒兩胯間墳起，焮赤大如鵝卵，服敗毒散及消毒利藥不應，過予求治，投以知母貝母各五錢，僵蠶川山甲俱各炒一錢，大黃三錢，妙方作一服，利下膿血，從大便出，痛腫減半，再劑而已。後治人皆驗。大黃以強弱加減。

下疳瘡

薛立齋治庶吉士劉華甫，莖中作痛，或出白津，或小便秘澇。先用小柴胡加山梔澤瀉黃連木通膽草茯苓二劑，以清

肝火導溼熱諸症漸愈。因勞倦忽寒熱。用補中益氣湯治之而安。又用六味丸以生肝血滋腎水。諸症全愈。

一儒者莖中作癢。發熱倦怠。外皮浮腫。二年矣。此肝腎陰虛。用八珍加柴胡山梔及六味丸而愈。有兼陰毛間生蟲。作癢。當以桃仁研爛塗之。

一人因勞而患焮痛。寒熱體倦。頭疼。小便赤澇。用補中益氣加車前山梔而消。

一士人患下疳。寒藥傷胃。腐潰腫痛。日晡熱甚。口乾體倦。食少欲嘔。先用六君加柴胡升麻。脾胃醒而諸症退。更以補中益氣加炒黑山梔。肝火退而腫痛痊。

肩癰

丹溪治一人肩井後腫痛。身熱且嗽。其腫按之不堅。此乃酒痰流結也。遂用南星、半夏、瓜蒌、葛根、芩連、竹瀝作煎飲之。燒葱根燻腫上。另用白芥子、白礬作小丸。用煎藥吞二十丸。須臾痰隨嗽出。半日約去三四碗而愈。

薛已治一婦臥牀十二年矣。遇回祿益加憂鬱。甲辰三月。右肩下發一塊。焮腫如甌。中赤外白。用涼藥一劑不解。次用

十宣散四劑。

〔十宣散方〕人參、黃耆、當歸、甘草、白芷、川芎、桔梗、厚朴、防風、桂。

加痛。畧紅。迎

徐醫視之。連投參、芪、丁、桂、防風、白芷之類。膿潰。徐云。無患。

矣。辭後眩暈嘔逆。惡寒戰慄。頂陷膿清。其夫檢外科發揮。至發背門云。若初起一頭如黍。不腫不赤。煩躁便秘。四五日間生頭。不計其數。瘡口各含一粟。名曰蓮蓬發。云云。始駭爲惡症。治法雖詳。不諳于行。迎薛至診云。辛涼解散。氣血兩虛者忌之。連投參芪歸朮地黃薑附大劑。腫高膿稠。兼維烏金膏數日。果腐落筋如脂膜者數筋。仍用前劑。每服人參加至八錢。日進二服。踰二月平復。

乳癰

天寶中有隴西李生。自白衣調選桂州參軍。旣至任。以熱病

旬餘覺左乳痛不可忍。及視之，隆若癰腫之狀，卽召醫驗其脉。醫者云：臟腑無他，若臆中有物，以喙攻其乳，乳痛而癰不可爲也。又旬餘病甚，一日癰潰，有一雉自左乳中突而飛出，不知所止。是夕，李生卒。宣室志

一婦形脉稍實，性躁，難於後姑。乳生隱核，以本草單味青皮湯間以加減四物湯，加行經絡之劑，治兩月而安。

一後生作勞，風寒夜熱，左乳痛有核如掌，脉細澁而數。此陰滯於陽也。詢之，已得酒，遂以瓜蒌子、石膏、乾葛陽明胃經、台芎

白芷、蜂房、生薑同研入酒服之，四貼而安。

時康祖爲廣德宰，事張王甚謹。後授溫倅，左乳生癰，繼又胸

臆間結核。大如拳。堅如石。荏苒半載。百療莫效。已而牽掣
臂腋。徹于肩。痛楚特甚。亟禱王祠。下夢聞語曰。若要安。但
用薑自然汁。製香附服之。方妙覺呼其子。檢本草視之。二物
治證相符。訪醫者亦云有理。遂用香附去毛。薑汁浸一宿。
爲末二錢。米飲調。才數服。瘡膿流出。腫硬漸消。自是獲愈。

庚志

薛立齋治一儒者。兩乳患腫。服連翹飲。加堅硬。食少。內熱。胸
脇作痛。日晡頭痛。小便赤澇。此足三陰虛。而兼鬱怒。前藥
復損脾肺。先用六君加芎歸柴梔。四十餘劑。元氣復而自
潰。乃作痛惡寒。此氣血虛也。用十全大補。六味地黃而愈。

封君袁陽涇左乳內結一核。月餘赤腫。此足三陰虛兼怒氣所致。用八珍加柴梔丹皮四劑。赤腫漸退。內核漸消。又用清肝解鬱湯而愈。時當仲秋。兩目連劄。肝脉微弦。此肝經火盛而風動也。更加龍膽草五分。并六味地黄丸而愈。若用清熱敗毒化痰行氣鮮不誤者。

一儒者兩脇作脹。兩乳作痛。服流氣飲瓜蒌散半載後。左脇下結一塊。如核。肉色不變。勞則寒熱。此鬱結氣傷而爲患。虛而未能潰也。八物加柴胡遠志貝母桔梗。月餘色赤。作痛。膿將成矣。又服月餘。針之出膿碗許。頓然作嘔。此胃氣虛而有痰也。令時啗生薑。服六君子湯嘔止。加肉桂而瘡

愈彼後出宰。每傷勞怒。胸乳仍痛。并發寒熱。服補中益氣
加炒山梔愈。

一婦人內熱脇脹。兩乳不時作痛。口內不時辛辣。若臥而起
急。則臍下牽痛。此帶脉爲患。用小柴胡加青皮黃連山梔
二劑而瘥。

一婦人久鬱。右乳內腫硬。用八珍湯加遠志貝母柴胡青皮
及隔蒜灸。兼服神效瓜萋散。兩月餘而消。

一婦人左乳內腫如桃。不痛不赤。發熱漸瘦。用八珍加香附
生薑汁製遠志青皮柴胡百餘劑。又兼服神效瓜萋散三十餘
劑。膿潰而愈。

一婦人稟實性躁。懷抱久鬱。左乳內結一核。按之微痛。以連翹飲子二十餘劑。少退。更以八珍加青皮。香附。桔梗。貝母二十餘劑而消。

一婦人發熱作渴。至夜尤甚。兩乳忽腫。肝脉洪數。乃熱入血室也。用加味小柴胡湯。熱止腫消。

一婦人因怒。左乳作痛。發熱表散太過。腫熱益甚。用益氣養榮湯數劑。熱止膿成。不從用針。腫脹熱渴。針膿大泄。仍以煎湯。月餘始愈。此症若膿未成未破。有薄皮剝起者。用代針之劑。其膿自出。不若及時用針。不致大潰。若膿血未盡。輒用生肌。反助其邪。慎之。

一婦人膿清腫硬、面黃食少、內熱晡熱、自汗盜汗、月經不行、此肝脾氣血俱虛。用十全大補加遠志、貝母及補中益氣各三十餘劑。外用葱熨患處。諸症尋愈。

一婦人膿成脹痛。欲針之不從。數日始針。出敗膿三四碗許。虛証蜂起。幾至危殆。用大補兩月餘而安。若元氣虛弱。不作膿者。用益氣養榮湯補之。膿成卽針。若腫痛寒熱怠惰食少。或至夜熱甚。用補中益氣兼逍遙散補之爲善。

一產婦因乳少。服藥通之。致乳房腫脹。發熱作渴。以玉露散補之而愈。夫乳汁乃氣血所化。在上爲乳。在下爲經。若衝任之脉盛。脾胃之氣壯。則乳汁多而濃。衰則淡而少。所乳

之子亦弱而多病。又有屢產無乳。或大便瀉滯。乃亡津液也。當滋化源。

一婦人右乳內結三核。年餘不消。朝寒暮熱。飲食不甘。此乳巖。以益氣養榮湯百餘劑。血氣漸復。更以木香餅熨之。年餘而消。

一婦人年二十有五。素虛弱。多鬱怒。時疫後。脾胃愈虛。飲食愈少。又值氣忿。右乳脇下紅腫。應內作痛。用炒麥麩熨之。腫雖少散。內痛益甚。轉側胸中如物懸墜。遂與加減四物湯。內腫如鵝卵。外大如盤。胸脇背心相應而痛。夜熱勢甚。時治者皆以攻毒爲言。薛云。此病後脾弱。而復怒傷肝。治

法惟主於健脾氣。平肝火。則腫自消而病自愈矣。病後惠治法
方以八物。加陳皮。黃芪。柴胡。山梔。白芷。服八劑。病減六七。
去白芷。加青皮。木香。桔梗。又六劑而全愈。若用攻毒之劑。
病胡能瘳。

一婦產後。忽兩乳細小。下垂過小腹。痛甚。名乳懸。用芎歸各
一觔。內用半觔。水煎。餘用燒烟薰口鼻。二料乃效。

腹癰

呂滄洲治一小兒十二歲。患內癰。腹脹臍凸而頗銳。醫欲刺
臍出膿。其母不許。請呂視之。見一僧擁爐熾炭。燃銅筋一

枚烈火中。瞪目視翁曰。此兒病癰發小腸。苟舍刺臍。無他法。呂諭之曰。臍神闕也。針刺所當禁。矧癰舍于內。惟當以湯丸攻之。苟如而言。必殺是子矣。僧怒趨而出。呂投透膿散一七。明日膿自氣合潰。繼以十奇湯下。萬應膏丸而瘥。薛已治給事錢南郭。腹內患癰。已成而不見。欲用托裏之藥。發之。彼用行氣破血。以圖內消。形體甚倦。飲食益少。患處頓陷。色黯堅硬。按之不痛。仍用大補之劑。色赤腫起。膿熟針之。再用托裏。腫潰漸愈而消。

一男子腹內作痛。腹外微腫。或欲藥汗之。薛曰。肉色如故。脉數無力。此元氣虛損。毒不能外發。遂與參芪歸朮之類。數

劑漸發于外。又數劑。膿成而欲針之。彼惑于人言。用大黃
白芷川山甲之類。引膿從便出。以致水瀉不止。患處平陷。
自汗盜汗。熱渴不食。仍用前劑。加半夏陳皮薑桂四劑。形
氣漸復。又數劑。針去其膿。仍用補劑。幸幼未婚。故得痊也。
鴻臚蘇龍溪。小腹內腫脹作痛。大小便秘結。作瀉。欲飲冷脉
洪數而實。用黃連解毒散二劑。熱痛頓止。二便調和。用活
命飲而愈。

大司馬李梧山。腹痛而勢已成。用活命飲一劑。痛頓退。用托
裏消毒散。腫頓起。此膿將成。用托裏散補其元氣。自潰而
愈。

錦衣掌堂劉廷器仲夏腹患癰潰而膿水清稀發熱作渴。腹
脹作嘔。飲食不入。諸醫以爲熱毒內攻。皆用芩連大黃之
劑。病加劇。邀薛診。投以參芪薑附等藥一劑。嘔止食進而
安。再用托裏補劑而瘡愈。

進士邊雲莊腹痛惡寒。作溼痰食積治之。益甚。脉浮數。薛曰。
浮數之脉更惡寒。疽瘡之症也。彼不信。旬餘復請視之。左
尺洪數。知內有膿矣。仍不信。至小腹腫脹。連及兩臀。始悟。
薛曰。膿潰臀矣。氣血俱虛。何以收斂。服活命飲一鍾。臀潰
一孔。出膿斗許。氣息奄奄。勢誠可畏。用大補藥一劑。神思
方醒。每去後糞從瘡出。且出血甚多。痛不可忍。欲求死而

不可得時小腹間若覺有物上挂卽發瘧牙關緊不省人
事發熱煩躁脉洪大舉按皆實省而診之脉仍洪大按之
如無大則爲虛況出膿之後耶此氣血虛極以十全大補內用參芪至
四觔餘加附子二枚而瘧止又用大補湯五十餘劑而瘡
斂

囊癰

薛已治給事陸貞山腫赤脹痛小便澁滯寒熱作渴法當清
肝火除溼毒遂用柴胡炒黑龍膽吳茱炒連當歸銀花角
刺赤芍防風木通生草節一劑腫痛頓退三四少加防風

木通、川芎、茯苓作飲下。滋腎丸熱腫亦退。但內見筋一條不消。此當滋腎水養肝血。用山茱、山藥、熟地、丹皮、澤瀉、五味二劑。其筋消矣。復用補中益氣加茯苓送滋腎丸而愈。朱京兆患囊脹痛。彼以爲疝症。夜診其脉數而滑。曰：此囊癰也。膿已成。服活命飲一劑。黎明而膿潰。更用補陰托裏而斂。

一儒者考試不利。一夕飲燒酒而入房不遂。至夜半寒熱煩渴。小便不利。翌早囊腫脹焮痛。與除溼熱清肝火之劑。城暮閉不得歸。服翌早報云。夜來囊悉腐。玉莖下面貼囊者亦腐。如半邊筆帽。仍以前藥加參、芪、歸、朮四劑。腐肉盡脫。

罌丸懸挂，用大補氣血，并塗當歸膏、囊莖，悉復而愈。

一男子醉後入房，囊腫大如斗，小腹脹悶，小便淋赤，發熱口渴，痰涎壅盛，命在須臾。此腎水虛弱，陰虧難降，津液濁敗。用六味丸料，加車前、牛膝，作飲下。滋腎丸諸症頓退，再加五味、麥冬二劑而愈。

腰疽

僉憲張碧崖腰患疽，醉而入房，脉洪數兩尺，爲甚。薛辭不治。將發舟，其子強留頃間，吐臭血五六碗。此腎經虛火，惡血妄行，必從齒縫出。將合肉桂等補腎制火之藥，各用罐另。

煎熟聽用血止拭齒視之果然遂合一鍾冷服之熱渴頓止少頃溫服一鍾脉息欲脫氣息奄奄得藥則脉少復良久仍脫其子疑內有膿欲針之薛曰必無也乃以鵝翎管經內果無次日脉脫脚冷至膝腹內如水急服六君加薑附始溫琇按真陰大損之病呆用燥熱治亦未善膿始潰瘡口將完又患小便秘結此因愛妾侍疾思色以致精不出而內敗莖道然也用加減八味丸料加參芪白朮一劑小便雖通瘡口不斂而沒

一婦人暴怒腰腫一塊胸膈不利時或氣走作痛與方脉流

氣飲

方脉流氣飲紫蘇檳榔川芎當歸白芍烏藥茯苓枳實桔梗生薑半夏青皮枳殼黃耆防風陳皮甘草木

香大腹
大棗
數劑而止更以小柴胡對四物加香附貝母月餘而愈

臀癰

薛已治巡撫陳和峰脾胃不健常服消導之劑左腿股及臀患腫薛曰此脾虛下注非瘡毒也當用補中益氣白朮倍

之。白朮本草消臍腹水腫脹滿彼惑于衆論云白朮潰膿仍主散腫消

毒其腫益甚體益倦始悔前藥用白朮一味煎飲而消蓋

白朮腐潰生肌之主藥也

一儒者左臀患之敷貼涼藥腫徹內股服連翹消毒左體皆

痛用補中益氣以補脾肺。用六味丸加五味以補肝腎。股
內消而臀間潰。又用十全大補而瘡口斂。蓋此症原屬足
三陰虛弱。三陰者少陰腎太陰脾厥陰肝也。膽者肝之府。
行人身之側故耳。不治本而治末。未見其愈也。

一男子漫腫而色不變。脉滑數而無力。膿將成矣。薛欲托裏
而用針。彼畏針而欲內消。乃用攻伐之劑。頓加發熱惡寒。
自汗。用十全大補湯數劑。腫起色赤。針之。仍以大補而愈。
一人年三十。脉如屋漏。如雀啄。腫硬色天。膿水清稀。此涼藥
復損脾氣。薛用六君子加歸芪附一錢。二劑腫潰色赤。後
數劑附子五分。元氣復而瘡愈。

上舍患痔。外敷寒涼。內服消毒。攻潰於臀。膿水清稀。脉洪大。而數。寒熱作渴。薛辭不治。果歿。此三陰虧損之症。

腿癰

附腿腫

薛已治地官李北川腿癰。內外用敗毒寒涼。因痛極。刺出膿。瘀方知爲癰。瘡口開張。肉黯冷陷。外無腫勢。此陽氣虛寒。不能少斂。用豆豉餅六君。加藿香。砂仁。炮薑。飲食進而患處暖。再以十全大補湯。元氣復而瘡口愈。

一男子腿腫一塊。經年不消。飲食少思。強食作脹。或作瀉。肢體消瘦。兩尺脉微細。此命門火衰。不能生土。以致脾胃虛。

寒與八味丸飲食漸進腫患亦消

銀臺鄭敬齋腿患癰疽愈而不斂兩月矣時薛考績京師請

治謂薛曰治者皆用十宣散

亦是溫補劑

之類云旬日可斂今

未應何也面色痿黃脉浮大按之微細此脾氣虛弱也遂用補中益氣加茯苓半夏壯其脾胃數日而瘡斂

一男子腿患癰因服剋伐虧損元氣不能成膿爲之托裏而潰大補而斂但大便秘結用十全大補加麥冬五味而潤月餘仍結彼惑于人言自服潤腸丸而瀉不止用補中益氣送四神丸數服乃愈

一男子左腿腫痛肉色如故寒熱惡心飲食少思此脾氣不

足而感外邪用六君加藿香桔梗川芎而寒熱止又用補

中益氣而腫痛消

江云外科樞要
仍有餘症方法

一男子遍身生瘡似疥非疥時或膿水淋漓兩腿爲甚肢體
倦怠作痒煩躁年餘不愈薛作腎經虛火用加減八味丸
而痊

一男子腿內作痛用滲溼化痰藥痛連臂肉面赤吐痰脚跟
發熱曰乃腎虛陰火上炎當滋化源不信服黃柏知母之
類而歿

一男子腿患腫色不變痛不作真氣虛也以補中益氣加半
夏茯苓爲少用枳殼木香飲之以香附餅熨之彼謂氣無

補法。乃服流氣飲。胃氣愈虛。復求治。以六君加芎歸數劑。飲食少進。再用補劑。月餘而消。夫真氣奪則虛。邪氣勝則實。今真氣既虛。邪氣愈勝。苟不用補法。氣何由而行乎。

脚跟瘡

薛立齋治大尹陳汝鄰兩腿酸軟。足跟腫。或赤或白。或痛或痒。後破。而或如無皮。或如皴裂。日晡至夜。脹痛燉熱。用補中益氣。加減八味丸而愈。

一婦所患同前。亦用前丸。及逍遙散。加熟地。川芎。百劑而愈。
一男子足跟作痛。熱渴體倦。小便如淋。誤用敗毒散。致頭痛。

惡寒。欲嘔不食。咳嗽吐痰。薛用十全大補湯。加減八味丸。各五十餘劑而愈。

一男子足跟腫痛發熱體倦。用補中益氣六味丸而瘥。後勞役盜汗發熱遺精。吐痰如湧。仍服前藥而愈。

一男子患前症。乃服消毒散。搽追蝕藥。虛症疊出。其形骨立。自分死矣。薛用十全大補。加山茱山藥。兩月餘而痊。

江應宿曰。足跟乃督脉發源之所。腎經所過之地。因飲食失節。起居失宜。元氣虧損。足三陰所致。若漫腫寒熱。或體倦少食。此脾虛下陷。宜補中益氣。若晡熱作痛。頭目不清。此屬脾虛陰火。用前湯并六味丸。若痰涎上升。

或口舌生瘡。屬腎水乾涸。用前湯并加減八味丸主之。
此皆虧損之症。當滋其化源。若治其外。則誤矣。

漏

時康祖大夫患心漏二十年。當胸數竅。血液長流。醫皆莫能
治。或云竅多則愈損。閉則慮穴他岐。當存其一二。猶爲上
策。坐此形神困瘁。又積苦腰痛。行則傴僂。不飲酒。雖雞魚
鱗蛤之屬。皆不入口。淳熙間。通判溫州郡守韓子溫見而
憐之。爲檢聖惠方。載腰痛一門。冷熱二症。示之。使自擇。康
祖曰。某年老久羸。安敢以爲熱。始作寒症治療。取一方用。

鹿茸者服之、逾旬痛減、更覺氣宇和暢、遂一意專服、悉屏他藥、洎月餘、腰屈復伸、無復呼痛、心漏亦愈、以告醫者、皆莫能測其所以然、後九年、康祖自鎮江通判、滿秩造朝、訪子溫、則精力倍昔、飲啖無所忌、云漏愈之後、日勝一日、子溫書吏吳弼亦苦是疾、照方服之、浹旬而愈、其方本治腰痛、用鹿茸去毛、酥炙微黃、附子炮去皮臍、皆二兩、鹽花三分、爲末、棗肉丸三十九、空心酒下、己志

天聖中、工部尚書忠肅公家有媪、病漏十餘年、一日有醫過視之、曰、此可治也、卽取活鱧一竹針五七枚、乃擲鱧于地、鱧困屈盤、就盤以竹針貫之、覆瘡良久、取視、有白蟲數十、

如針著鱗卽鉗置杯中蠕動如線復覆之又得十餘枚如是五六醫者曰蟲固未盡然餘皆小蟲請以常用藥傅之時得檳榔黃連二味卽爲散傅之明日乃以乾艾作湯投白礬末二三錢先洗瘡口然後傅藥蓋老人血氣冷必假艾力以佐湯而艾性亦能殺蟲也如是者再卽生肌不逾月愈醫曰瘡一月不治則有蟲蟲能蠕動氣血亦隨之故瘡漏不可遽合合則結毒實蟲所爲又曰人每有疾經月不痊則必虛憊婦人則補脾血小兒則防驚疳二廣則并治瘴厲由此醫名大著

良方

有人脚肚上生一瘡久遂成漏經二年百藥不效自度必死

一村人見之云此鱧漏耳但以石灰二三升白沸湯泡薰洗如覺瘡痒卽是也如其言用灰湯淋洗果痒三兩次遂乾

一婦項下忽生一塊腫漸緣至妳上腫起莫知何病偶用刀刺破出清水一碗日久瘡不合有道人見之曰此蟻漏耳緣用飯誤食蟻得此耳詢之果然道人云此易治但用穿山甲數片燒存性灰爲末傅瘡上遂愈蓋穿山甲蟻之畏也

柳休祖者善卜筮其妻病鼠癩積年不瘥垂命休祖遂卜得頤之復按卦合得石姓人治之當獲鼠而愈也旣而鄉里

有奴姓石，能治此病。遂灸頭上三處，覺佳。俄有一鼠，逕前而伏，呼猫咋之。視鼠頭上有三灸處，妻遂瘥。拾遺記

擲撲損傷

葛可久善武藝，一日見莫徠桑弓，可久挽之而彀，歸而下血。亟命其子煎大黃四兩飲之。其子惡多，減其半，不下。問故，其子以實對。可久曰：少耳，亦無傷也。來年當死，今則未也。再服二兩，愈。明年果卒。

松陽縣民有被毆，經縣驗傷。翊日引驗，了無癍痕。宰怪而詰之，乃仇家使人要歸，飲以熱麻油，酒臥之，火燒地，覺而疼。

腫盡消。吹劍續錄。

丹溪治一老人墜馬，腰痛不可轉側，脉散大，重取則弦小而長。朱曰：惡血雖有，不可驅逐，且補接爲先。用蘇木、參、芪、芎、歸、陳皮、甘草，服半月，脉散漸收，食進，以前藥調下，自然銅等藥，一月愈。

虞恒德治一人，因勸鬪毆，脊稜骨被打破，得打傷風，頭面發大腫，發熱。虞適見之，以九味羌活湯取汗，外用杏仁搗爛入白麪少許，新汲水調傅瘡上，腫消熱退而愈。後累試累驗。

一人因結屋墜梯，折傷腰勢，殊亟。夢神授以乳香飲，其方用

酒浸虎骨、敗龜、黃芪、牛膝、葶藶、續斷、乳香、七品、覺而能記、

服之二旬愈

已志

許元公入京師赴省試、過橋墜馬、右臂臼脫、路人語其僕曰、急與按入臼中、若血漬曰、則難治矣、僕用其說、許已昏迷、不覺痛、遂僦轎昇歸邸、或曰、非錄事田馬騎、不能療此疾、急召之、至已入暮、秉燭視其面曰、尚可治、乃施藥封腫處、至中夜方甦、達旦痛止、去其封、損處已白、其青瘀乃移在、曰、上自是日日易之、腫直至肩背、於是以藥下之、瀉黑血、三升、五日復常、遂得赴試、蓋用生地黄、研如泥、木香爲細末、以地黃膏攤紙上、糝木香末一層、又再攤地黄貼腫上、此

正治打撲傷損及一切癰腫未破令內消云

類說

台州獄吏憫一囚將死頗憐顧之囚感語曰吾七犯死罪苦遭訊拷坐是肺皆控損至於嘔血適得神方荷君庇拊之恩持此以報只白芨一味米飲調耳其後陵遲劊者剖其胸見肺竅間皆白芨填塞色猶不變洪貫聞其說爲郢州長壽宰規之赴洋州任一卒忽苦嘔血勢絕危貫用此救之一日卽止

一人腕折傷筋損疼痛不可忍或教宜用生龜尋捕一龜將殺患人夢龜告言勿相害吾有奇方可療用生地一觔切藏瓜薑糟一觔生薑四兩切右都炒令均熟以布裹罨傷

折處冷則易之奇效

本事方

長安石史君嘗至通衢有從後呼其姓第者曰吾無求于人念汝將有難故來救汝出一紙卷授石曰有難則用之乃治折傷內外損方書也明年因趨朝坐馬爲他馬所蹠折足墜地又蹋一臂折家人急合此藥且灌且裹至半夜痛止後手足皆堅全如未傷時方本出良方用川歸鉛粉各半兩礪砂二錢同研細濃將蘇木汁調服一大匙損在腰以上先食淡粥半碗然後服藥在腰以下卽先藥後食仍頻頻呷蘇木汁別作糯米粥入藥末拌和攤紙上或絹上封裹傷處如骨碎用竹木夾定仍以紙或衣物包之其妙

如神

汀州市民陳氏事佛甚謹慶元初出行癩折一足痛楚念佛不置夜夢一僧拄杖持鉢告曰接骨膏可治此可取菜豆粉于新鐵銚內炒令真紫色旋汲井水調成稀膏然後厚傅損處須教遍滿貼以白紙將杉木縛定其效如神陳寤如方修治用之良愈

紹熙初湖口人林四日暮騎馬顛墜折一足骨斷經旬痛甚偶一道人來視曰續筋接骨非敗龜殼不可林召衆醫議之皆云一足所傅多少龜殼灰可辦茲去五里許江畔有大龜身濶二尺常踰伏泥中捕而脫其殼燒灰傅損處計

其收功賢于小者數倍也。時屬昏暮，未暇往捕。半夜鄰人張翁夢烏衣人來訪，自通爲江畔老龜。云林四折足，醫欲殺吾取殼以療傷，望一言救護。張謝曰：老夫何能爲力。烏衣人云：只煩丈人詣林氏諭衆醫曰：往日曾有龜傳一方于人而贖命者，用淹藏瓜糟罨斷處，次將杉木板夾縛定，方書亦嘗記載，如更增赤小豆一味拌入糟中，然後夾板，不過三日卽十全安愈。願翁告之，後當圖報。黎明張如所戒，林與醫皆喜而從之。果驗。

類編

崔給事頃在澤潞，與李抱真作判官。李相方以毬杖按毬子，其軍將以杖相格，乘勢不能止，因傷李相拇指，并爪甲，孽

裂遽索金瘡藥裹之。強坐頻索酒，飲至數盃，已過量而面色愈青。忍痛不止，有軍吏言取葱新折者，便入溏灰火煨熟，剝皮擘開，其中有涕，取罨損處，仍多煨取，續續易熟者。凡三易之，面色却赤。斯須云已不痛，凡易十數度，用熟葱并涕裹纏，遂畢席笑語。

本事方

定州人崔務墜馬折足，醫令取銅末和酒服之，遂痊。及亡後十餘年，改葬視其脛骨折處，有銅末束之。

朝野僉載

宣和中有國醫，忽承快行宣押，就一佛刹醫內人，限目今便行。鞭馬至，則寂未有人，須臾臥轎中，扶下一內人，快行送至，奉旨取軍令狀，限日下安痊。醫診視之，已昏死矣，問

其從人皆不知病之由。良久有三老內人至，下轎環泣，乃云：因蹴鞦韆，自空而下墜死。醫者云：打撲損傷，自屬外科。欲申明，又恐後時。參差不測，再視之，微覺有氣，忽憶藥篋中有蘇合香丸，急取半兩，于火上焙去腦麝，酒半升，研化灌之。至三更方呻吟，五更下惡血數升，調理數日得痊。予謂正當下蘇合香丸，蓋從高墜下，必挾驚悸，血氣錯亂，此藥非特逐去瘀血，而又醒氣，醫偶用之，遂見效。此藥居家不可闕，如氣逆鬼邪，殞殍傳尸，心痛時疾之類，皆治。良方載甚詳，須自合爲佳耳。

本事方

道人詹志永，信州人，初應募爲卒，隸鎮江馬軍，二十二歲，因

習騎墜馬、右脛折爲三段、困頓且絕、軍帥命舁歸營醫救、鑿
出敗骨數寸、半年稍愈、扶杖緩行、骨空處骨皆再生、獨脚
筋攣縮不能伸、旣落軍籍、淪于乞丐、經三年、遇朱道人、亦
舊在轅門、問曰、汝傷未復、初何不求醫、曰、窮無一文、豈堪
辦此、朱曰、實不費一文、但得大竹管長尺許、鑽一竅、繫以
繩、挂腰間、每坐則置地上、舉足搓袞之、勿計時日、久當有
效、如其言、兩日、便覺骨髓寬暢、試猛伸之、與常日差遠、不
兩月、筋悉舒、與未墜時等、予頃見丁子章、以病足、故作轉
軸踏脚用之、其理正同、不若此爲簡便、癸志

張七政、荊州人也、善治傷折、有軍人損脛、張飲以藥酒、破肉

去碎骨一片，大如兩指，塗膏封之。數日如舊。經二年，脛忽痛。張曰：前爲君所出骨，寒則痛，可遞覓也。果獲于牀下，令以湯洗貯絮中愈。

吳太醫治孫和寵夫人，常醉舞如意，誤傷鄧頰，血流嬌惋，彌苦。命太醫合藥，言得白獺髓、雜玉與虎魄屑，當滅此痕。和以百金購得白獺，乃合膏。虎魄太多，及瘡痕不滅。左頰有

赤點如痣。

酉陽雜俎

江少微治一商人，被杖皮破，血流。以真麻油一觔，熬滴水成珠，入黃丹飛過，再熬。試軟硬，加入鉛粉、黃蠟，收起攤膏藥貼患處，血止腫消，數日而愈。

予因鑿銀損破小指腫大灌膿亦以前膏貼上痛止腫消不復有膿三日一換三換而愈

游讓溪翁云被廷杖時太醫用粗紙以燒酒貼患處手拍血消復易之又用熱豆腐鋪在紫色處其氣如蒸其腐紫色卽換須待紫色散後轉紅爲度則易愈矣

死枕愈病

齊書曰徐嗣伯常有嫗患滯冷積年不瘥嗣伯診之曰尸注也當得死人枕煮服之乃愈于是往古塚中取枕枕已一邊腐闕服之卽愈秣陵人張景年十五腹脹面黃羣醫莫

能治。以問嗣伯。此石虬耳。極難療。當得死人枕煮服之。依
語取枕。以湯投之。得大利。并虬蟲頭。堅如石者。五升。病瘥。
後沈僧翼患眼痛。又見多鬼物。以問嗣伯。嗣伯曰。邪氣入
肝。可覓死人枕煮服之。服竟。可埋枕于故處。如其言。又愈。
王晏問之曰。三病不同。而用死人枕俱瘥。何也。曰。尸注者。
鬼氣伏而未起。故令人沉滯。得死人枕促之。魂氣飛越。不
得復附體。故尸注可瘥。石虬者。久虬也。醫療旣癖。虬蟲轉
堅。世間藥不能遣。所以須鬼物驅之。然後可散。故令用此
也。夫邪氣入肝。故使眼痛。而見魍魎。應須邪物以鉤之。故
用此。氣因枕去。故復埋于塚間也。

尸歷

附鍼驗

趙簡子疾五日不知人，大夫皆懼，於是召扁鵲。扁鵲入視病，出，董安子問扁鵲，扁鵲曰：「血脈治也，而何怪？昔秦穆公嘗如此，七日而寤。寤之日，告公孫支與子輿曰：『我之帝所甚樂，吾所以久者，適有所學也。』帝告我晉國且大亂，五世不安。其後將霸，未老而死。霸者之子，且令而國男女無別，公孫支書而藏之。秦策於是出，夫獻公之亂，文公之霸，而襄公敗秦師於殽而歸，縱淫，此子之所聞。今主君之病，與之同，不出三日，必間，間必有言也。居二日半，簡子寤，語諸大

夫曰我之帝所甚樂與百神遊於鈞天廣樂九奏萬舞不
類三代之樂其聲動心有一熊欲援我帝命我射之中熊
熊死有羆來我又射之中羆羆死帝甚喜賜我二笥皆有
副吾見兒在帝側帝屬我一翟犬曰及而子之壯也以賜
之帝告我晉國且世衰七世而亡嬴姓將大敗周人於范
魁之西而亦不能有也董安于受言書而藏之以扁鵲言
告簡子簡子賜扁鵲田四萬畝

史記

扁鵲過虢虢太子死扁鵲至虢宮門下問中庶子喜方者曰
太子何病國中治穰過於衆事中庶子曰太子病血氣不
時交錯而不得泄暴發於外則爲中害精神不能止邪氣

邪氣蓄積而不得泄。是以陽緩而陰急。故暴蹙而死。扁鵲曰。其死何如時。曰。雞鳴至今。曰。收乎。曰。未也。其死未能半日也。言臣齊勃海秦越人也。家在於鄭。未嘗得望精光侍謁於前也。聞太子不幸而死。臣能生之。中庶子曰。先生得無誕之乎。何以言太子可生也。臣聞上古之時。醫有俞跗。治病不以湯液醴灑。鑱石撝引。案杌毒熨。一撥見病之應。因五藏之輪。乃割皮解肌。訣脉結筋。搦髓腦。櫟荒爪。幕湔浣腸胃。漱滌五藏。練精易形。先生之方能若是。則太子可生也。不能若是而欲生之。曾不可以告咳嬰之見。終日扁鵲仰天歎曰。夫子之爲方也。若以管窺天。以郄視文。越人之

爲方也。不待切脉望色聽聲寫形言病之所在。聞病之陽論得其陰。聞病之陰論得其陽。病應見於大表。不出千里。決者至衆。不可曲止也。子以吾言爲不誠。試入診太子。當聞其耳鳴而鼻張。循其兩股。以至於陰。當尚溫也。中庶子聞扁鵲之言。目眩然而不瞋。舌橋然而不下。乃以扁鵲言入報虢君。虢君聞之大驚。出見扁鵲於中闕。曰。竊聞高義之日久矣。然未嘗得拜謁於前也。先生過小國。幸而舉之。偏國寡臣。幸甚。有先生則活。無先生則棄。捐填溝壑。長終而不得反。言未卒。因噓唏服臆。魂精泄橫。流涕長潛。忽忽承睫。悲不能自止。容貌變更。扁鵲曰。若太子病。所謂尸歷。

者也。夫以陽入陰中。動胃纏緣。中經維絡。別下於三焦。膀胱。是以陽脉下。遂陰脉上。爭會氣閉。而不通。陰上而陽內行。下內鼓而不起。上外絕而不爲使。上有絕陽之絡。下有破陰之紐。破陰絕陽之邑已廢。脉亂。故形靜如死狀。太子未死也。夫以陽入陰。支蘭藏者生。以陰入陽。支蘭藏者死。凡此數事。皆五藏蹙中之時暴作也。良工取之。拙者疑殆。扁鵲乃使弟子陽厲鍼砥石。以取外三陽五會。五會謂百會。胸會聽和煮之。以更熨兩脇下。太子起坐。更適陰陽。但服湯二旬而復故。故天下盡以扁鵲爲能生死人。扁鵲曰。越人非能

會氣會
臍會也

五會謂百
會胸會聽

生死人。此自當生者。越人能使之起耳。史記

故濟北王阿母自言足熱而懣。臣意告曰：熱蹙也。則刺足心

各三所。案之無出血。病旋已。病得飲酒大醉。史記○琇按已見厥案

菑川王病。召臣意診脉。曰：蹙上。蹙逆氣上也為重頭痛。身熱使人

煩懣。臣意即以寒水拊其頭。刺足陽明脉左右各三所。病

旋已。病得之沐髮未乾而臥。診如前。所以蹙頭熱至肩。史記

程約字孟博。婺源人。世攻醫。精針法。同邑馬荀仲。自許齊名。

約不然也。太守韓瑗嘗有疾。馬為右脇下針之。半入而針

折。馬失色曰：是非程孟博不可。約至。乃為左脇下一針。須

臾而折針出。疾亦愈。由是優劣始定。

張濟無爲軍人，善用針，得訣于異人，能觀解人而視其經絡，則無不精。因歲饑疫，人相食，凡視一百七十人，以行針無不立驗。如孕婦因仆地而腹偏左，針右手指而正。久患脫肛，針頂心而愈。傷寒反胃嘔逆，累日食不下，針眼眥，立能食。皆古今方書不著。

郭玉者，廣漢雒人也。和帝時，治中貴人，時或不愈，帝乃令貴人羸服，變處一針，卽瘥。召問其狀，玉曰：「醫者意也，腠理至微，隨處用巧，針石之間，毫芒卽乖。神存于心，手之際，可解而不可言也。夫尊貴者，處尊高以臨臣，臣懷怖懾以承之，其爲療也，有四難焉：自任意而不用臣，一也；將身不謹，二

也骨節不疆不能使藥三也好逸惡勞四也針有分寸時
或有破漏重以恐懼之心加以裁慎之志臣意且猶不盡
何有于病哉此疾所以不愈也帝稱善

督郵徐毅得病華佗往省之徐謂佗曰昨使醫曹吏劉租針
胃管訖便苦咳嗽謂何佗曰此誤中肝也五日當不救果
然

魏時有句驪客善用針取寸髮斬爲十餘段以針貫取之言
髮中虛也其妙如此酉陽雜俎

色診

扁鵲過齊，齊桓侯客之。入朝見曰：「君有疾在腠理，不治將深。」桓侯曰：「寡人無疾。」扁鵲出。桓侯謂左右曰：「醫之好利也，欲以不疾者爲功。」後五日，扁鵲復見曰：「君有疾在血脉，不治恐深。」桓侯曰：「寡人無疾。」扁鵲出。桓侯不悅。後五日，扁鵲復見曰：「君有疾在腸胃間，不治將深。」桓侯不應。扁鵲出。桓侯不悅。後五日，扁鵲復見，望見桓侯而退走。桓侯使人問其故。扁鵲曰：「疾之居腠理也，湯熨之所及也；在血脉，針石之所及也；其在腸胃，酒醪之所及也；其在骨髓，雖司命無奈之何。今在骨髓，臣是以無請也。」後五日，桓侯體病，使人召扁鵲。扁鵲已逃去。桓侯遂死。使聖人預知微，能使良醫得

早從事則疾可已，身可活也。人之所病，病疾多而醫之所

病，病道少。

所病猶療病也

故病有六不治：驕恣不論於理，一不治

也；輕身重財，二不治也；衣食不能適，三不治也；陰陽并藏

氣不定，四不治也；形羸不能服藥，五不治也；信巫不信醫

六不治也。有此一者，則重難治也。扁鵲名聞天下，過邯鄲

聞貴婦人，卽爲帶下醫。過雒陽，聞周人愛老人，卽爲耳目

痺醫。來入咸陽，聞秦人愛小兒，卽爲小兒醫。隨俗爲變，秦

太醫令李醯自知伎不如扁鵲也，使人刺殺之。至今天下

言脉者，由扁鵲也。

史記

扁鵲見秦武王，示之病。扁鵲請除左右，曰：君之病在耳之前

目之下、除之未必已矣、將使耳不聰、目不明、扁鵲怒而投石曰、君與知之者謀之、而與不知者敗之。國策

東坡曰、士大夫多秘所患、以驗醫能否、使索病於溟漠之中、吾平生求醫、必盡告以所患、然後診之、故雖中醫治吾疾、常愈、吾求疾愈而已、豈以困醫為事哉、

宿按、望而知之、謂之神、望見顏色而知其病者、上也、經

曰、大肉已脫、九候雖調、猶死、予見儒生汪巽山善風鑑、

斷人生死禍福無不奇中、家貧不肯以術自售、予素慕

其為人、一日患嘔血、召予診視、叩其占五臟生死法、汪

曰、脾之死色、唇之四白、青如馬牙、琇按、木剋土也、紅唇上起黑

斑譬如木朽而生菌耳。死期在半年。語未畢，嘔血數口。予視其色，正合死脾之色，果如期而逝，惜乎未竟其說。後遍訪，未聞相術有如汪君者。

黴瘡

附結毒漏爛

邵文泉僕者患楊梅瘡，遍體疼痛。遇友人傳示一方，用胡黃連五錢、銀柴胡人參當歸牛膝各一錢、甘草五分，作三服。每服加土茯苓猪肉各四兩，水煎服，痛止，其瘡亦漸愈。任栢峰傳沈狀元所得二苓化毒湯，白茯苓、土茯苓、金銀花各八兩、當歸尾四兩、紫草二兩、甘草節五錢，分作十服，水

酒各半煎服任云屢試之輒效

程魯齋傳徽瘡用苦參三錢牙皂二錢紅花五分當歸二錢五分土茯苓四兩水酒各半煎服

李心田傳授治徽瘡用防已苦參各一錢五分水酒煎服

蔡上舍春樓云曾一人患徽瘡取枳子黃熟時採陰乾扎碎連皮帶核炒黑存性爲細末每服二三錢無灰酒調下愈

潘養源曾傳一單方治徽瘡殊驗取兔耳草不拘多少搗取汁一碗對頭生酒一碗露一宿熱服熱水洗浴透絮被罨取汗透次取蛇夢草六瓣者搓二丸塞鼻孔另搓一大丸不住手搓待倦臥去拔去鼻中塞藥不過二次全愈

江應宿治蒼頭患黧瘡在下部用銅綠杏仁去皮焙熟研如泥塗瘡上乾加醋點又一人用蝦蟆子卽科斗取入磁餅內化爲水點效一用杏仁膽礬輕粉研如泥搽用過三方俱效

江會川云家僮患黧瘡結毒已屢年腫塊遍體得方士煮酒藥服之愈當歸牛膝各一錢杜仲川芎各二錢真桑寄生地蕨金銀花各一兩土茯苓四兩取頭生酒十五觔入藥懸胎煮三炷香置泥地上三日後任服

陳瑩窗患黧漏用爐甘煨以黃連水淬七日水銀各三錢大楓子油三錢肉須用六錢葶麻子油二錢肉三錢二物各研如泥用

白相油四兩，入銅鍋熬化，先入爐甘石水銀煎數沸，再大
楓草麻煎數沸，以真韶粉六錢收之，油紙攤貼患處，先以
葱椒水洗淨貼藥，再不可洗，任其臭穢，三日一換，以好爲
度。

江應宿傳授慈谿羅伯成黃華酒，治徽瘡頑癬疥癩，不拘遠
近，曾在祁門治一商販，患癬遍身如癩，服此酒一料，全愈。
方用烏梢蛇酒浸，去頭尾皮骨，取淨肉一兩，木香、人參、川
烏、川芎、白芷、花粉、麻黃、防風、天麻、硃砂、當歸、金銀花，各三
錢，白蒺藜、僵蠶、白蘚皮、連翹、蒼朮、荆芥、獨活、羌活，各二錢，
沉香一錢，皂角刺、川草薺，各五錢，兩頭尖一錢，麝香二分。

核桃肉、小紅棗各四兩。好頭生酒十五觔、燒酒五觔。以絹袋盛入壘，懸胎煮三炷香，取出置泥地，過七日服之。另熬蒼耳膏，每服加一匕。後以治諸頑癬、瘡疥，積年不愈者，俱效。

程文彬治一人楊梅結毒十餘年，蜀中傳一方云：輕粉毒，必須仍以輕粉引出其毒，真輕粉四分半，硃砂一分二厘，雄黃八厘，三味爲細末，煉蜜爲丸，金箔爲衣，分作九九，每日三丸，作三次服，三日服盡。一日鮮魚湯送下，二日羊肉湯送下，三日鮮雞湯送下，至四日牙腫，遍身作脹，肚中作瀉，至十日其毒盡出，再服黃芪、肉桂、茯苓、甘草、當歸、麥門冬。

五味數服果獲全愈永不再發

名醫類案卷第十

終