


斗登行集繩三之一



漢書門類	11010	二	三	函	號	册
	110	二	三	架	函	册



內閣文庫			
番號	漢	13010	
冊數	120 (78)		
函號	301	64	




幼科證治準繩集之三

金壇王肯堂字泰甫輯

心

錢心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則困臥悸
 動不安心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水
 視其睡口中氣溫或合面睡及上竅咬牙皆心熱也
 導赤散主之心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有
 就冷之意故合面臥心氣實則氣上下行瀉若合
 面臥則氣不得通故喜仰臥使氣得上下通也瀉心



湯主之。心病見冬火旺心勝腎也當補腎治心輕者心病退重者下竄不語腎怯虛也。補腎地黃丸治心瀉心湯潔心主熱自病或太熱瀉心湯主之。實則煩熱黃連瀉心湯主之。虛則驚悸生犀散主之。肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之。肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大青丸主之。脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之。腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之。劉凡心臟得病必先調其肝腎兩臟腎者心之鬼肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求於肝清其源也五臟受病必先傳其所勝水能勝火則腎

之受邪必傳於心故先治其腎逐其邪也故當退腎氣益肝氣兩方或診其脉肝腎兩臟俱和而心自生疾然後審其心家虛實治之。露仰面臥者因其心胸實熱故喜仰面而向虛也合面臥者因心胸虛熱故喜合臥而就實也實則調治心肝虛則調補脾肺二者別之盡其狀矣其咬牙等證多有雷同不必拘泥如用瀉心導赤等劑邪氣雖去而病仍作當調補元氣或反甚急溫補元氣其心氣各見或亥子時病益甚或下竄不語者乃腎水虛而心火甚也用地黃丸其乳下嬰兒須母服之。若時發熱作渴飲水

抽搖有力仰面而睡者屬心經實熱用瀉心湯導赤散若發熱飲湯抽搖乏力驚竄咬牙合面而睡者屬心經虛熱用補心散若喘嗽面赤壯熱飲水肺乘心也用瀉白散若搖頭劄目身熱抽搖肝乘心也用柴胡清肝散若合目昏睡泄瀉身熱脾乘心也用瀉黃散若竄視驚悸咬牙足熱腎乘心也用安神丸海心苦緩急食酸以收之五味子心欲軟急食酸以軟之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉之人參黃芪甘草心虛以炒鹽補之虛則補其母肝乃心之母以生薑補肝如無他證錢氏安神丸是也

安神丸錢氏治心虛疴熱神思恍惚

麥門冬去心 馬牙硝 白茯苓

乾山藥 寒水石研 甘草各半

硃砂壹兩 龍腦壹字

右末之煉蜜為丸芡實大每服半丸沙糖水化下

無時

八物定志丸海藏補益心神安定魂魄治痰去胸中

邪熱理肺腎

人參壹兩 菖蒲 遠志去心

茯苓壹兩 茯苓去皮各壹兩 硃砂貳錢

心下 刀十三

白朮

麥門冬

去心各半兩

牛黃

貳錢另研

右為細末煉蜜丸如桐子大米飲湯下二十九無時

髓竭不足加生地黄當歸肺氣不足加天門冬
麥門冬五味子心氣不足加上黨參茯神菖蒲
脾氣不足加白朮白芍藥益智肝氣不足加
天麻川芎腎氣不足加熟地黄遠志牡丹皮
膽氣不足加細辛酸棗仁地榆神昏不足加硃
砂預知子茯神
心實以甘草瀉之如無他證重則瀉心湯輕則導赤

散

瀉心湯

錢氏

瀉了心

黃連

壹兩去鬚

右為極細末每服一字至半錢壹錢臨臥溫水調下
海藏云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也
實則瀉其子

導赤散

錢氏

瀉丙小腸

生乾地黄

木通

甘草

各等分

右同為末每服參錢水壹盞入竹葉同煎至伍分
食後溫服一本不用甘草用黃芩

薛瀉心散導赤散瀉心小腸實火之劑益心為脾
母脾為心子然心既病則脾土益虛矣用者審之
生犀散錢氏治心經虛熱

生犀

錯取未

地骨皮

自採

赤芍藥

柴胡根

乾葛

甘草

右為麤末每服壹貳錢水壹盞煎至柒分溫服食
後

醒前方云治心經虛熱其所用藥多屬瀉心瀉肝
脾之劑虛熱二字恐魯魚也如心經自病而血虛
熱者用祕旨安神丸脾虛奪心之氣而熱者用祕

旨補脾湯肝木不能生心火而虛熱者用地黃丸
祕旨安神丸 治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而

作

人參

半夏

酸棗仁

茯神

當歸

橘紅

赤芍藥

五味子

甘草

右為末薑汁糊丸芡實大每服壹丸生薑湯化下

發熱

發熱錢風溫熱壯熱相似 潮熱時發熱過時即

止來日依時又熱此欲發驚候也 壯熱者一向熱

而不已甚則發驚痛也 風溫者身不熱而口中氣

熱又有風溫證者但溫而不熱 傷寒熱口熱呵欠

頓悶項急曾云傷寒熱十指稍冷鼻流清涕 痘瘡

熱噴嚏悸動耳尖冷曾云麻豆熱面赤足冷身發壯

驚腹痛自刺及中 變蒸熱唇上白泡珠起耳冷曾

指獨冷者是也 變蒸熱溫溫微熱氣龐驚少嘔乳瀉黃上唇尖 疳

癰丸辨證

刀寸三

六

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

熱面黃喫炭土羸瘦鼻下赤爛驚風熱發搐悸痲
 脈數煩躁顛叫恍惚曾云驚風熱偏身發熱面光自汗心悸不寧脈數煩躁治法與急驚證同所用藥餌必先解表楊小兒之病惟熱居多夫熱有朝
 熱驚熱夜熱餘熱食熱疳熱壯熱煩熱積熱風熱虛
 熱客熱癖熱寒熱血熱瘡疹熱十六者大同而小異
 熱之始發必有所因也其潮熱發歇有時驚熱顛叫
 恍惚夜熱夕發日止餘熱寒邪未盡食熱肚腹先發
 疳熱骨蒸盜汗壯熱一向不止煩熱心躁不安積熱
 頰赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去
 不定痰熱涎嗽飲水寒熱發如瘡狀血熱辰巳發熱

瘡疹熱耳鼻尖冷諸證得之各有所歸其間或有三
 兩證交互者宜隨其輕重而處治之薛小兒之熱
 有肝心脾肺腎五藏之不同虛實溫壯四者之不一
 及表裡血氣陰陽浮陷與夫風濕痰食各當詳之心
 熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而噦或壯熱飲水
 已午時益甚肝熱者左頰先赤便難轉筋尋衣捻物
 多怒多驚四肢困倦寅卯時益甚脾熱者鼻上先赤
 怠惰嗜臥身熱飲水遇夜益甚肺熱者右頰先赤手
 搯眉目喘咳寒熱飲水日西熱甚腎熱者頰下先赤
 兩足熱甚骨蘇蘇如蟲蝕熱甚不能起於牀夜間益

甚仍當辨其虛實實則面赤氣麤口燥唇腫作渴飲
冷大小便難或掀衣露體煩啼暴叫伸體而臥睡不
露睛手足指熱宜用表下虛則面色青白恍惚神緩
口中虛冷噓氣軟弱喜熱惡寒泄瀉多尿或乍涼乍
溫怫鬱驚惕上盛下泄夜則虛汗屈體而臥睡而露
睛手足指冷宜用調補壯熱者肢體大熱熱不已則
發驚癇溫熱者肢體微熱熱不已則發驚搐陰虛則
內熱陽盛則外熱以手輕捫之則熱重按之不熱此
皮毛血脉之熱熱在表也重按之筋骨之分則熱輕
手則不熱此筋骨之熱熱在裡也不輕不重按之而

熱此肌肉之熱熱在表裡之間也以虛實分屬表裡
而言之壯熱惡風寒為元氣不充表之虛熱也壯熱
不惡風寒為外邪所客表之實熱也壯熱飲湯為津
液短少裡之虛熱也壯熱飲水為內火銷爍裡之實
熱也若夫內外皆熱則喘而渴齒乾煩冤腹滿四肢
熱逢風寒如炙於火能冬不能夏是皆陽盛陰虛也
脉尺寸俱滿為重實尺寸俱弱為重虛脉洪大或緩
而滑或數而鼓此熱盛拒陰雖形證似寒實非寒也
熱而脉數按之不鼓此寒盛格陽雖形證似熱實非
熱也發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脉

洪大按之無力或無目痛鼻乾者此血虛發躁也當
補其血如不能食而熱自汗者氣虛也當補其氣仲
景論內外不足發熱自汗之證禁不可發汗如飲食
勞役雖病發熱誤發其汗則表必虛也身熱而汗出
者風也發熱身疼而身重黃者濕也增寒發熱惡風
自汗脉浮胸痞者痰也發熱頭痛脉數者食也寸口
脉微爲陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脉弱爲陰
不足陽氣下入陰中則發熱陰陽不歸其分則寒熱
交爭也晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷入陰
中也晝則發熱煩躁夜則安靜是重陽無陰也當亟

瀉其陽峻補其陰至若身熱脉弦數戰慄而不惡寒
者瘧瘧也發熱惡寒脉浮數者溫病也若四肢發熱
口舌咽乾是火熱乘土位濕熱相合故煩躁悶亂也
若身體沉重走注疼痛乃濕熱相搏風熱鬱而不得
伸也

五藏熱

錢肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之

壯熱飲水喘悶瀉白散主之
醒肝熱者左頰先赤
便難轉筋多怒多驚四肢困倦寅卯時益甚宜瀉青
丸柴胡飲子

心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上竅咬牙皆心

發熱... 心氣熱則心胃亦熱欲言不能

熱也導赤散主之能而有就冷之意故合面卧 [薛]

心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而噦或壯熱飲

水巳午時益甚宜瀉心湯導赤散安神丸

脾熱則目黃肚大怠惰嗜臥身熱飲水四肢不收瀉

黃散主之 [薛]脾熱者鼻上先赤其熱在肌肉遇夜

益甚

肺熱手搯眉自鼻面甘桔湯主之咳嗽寒熱壯熱飲

水涼膈散主之若肺虛熱唇深紅色少服瀉白散

[薛]肺熱者右頰先赤日西熱甚輕則用瀉白散重則

用涼膈散及地骨皮散

腎熱兩足不喜衣覆地黃丸主之 [薛]腎熱者頰下

先赤兩足熱甚骨酥酥如蟲蝕熱甚不能起於牀夜

間益甚宜用滋腎丸

瀉青丸見肝臟 瀉心湯

導赤散 安神丸並見心臟

瀉黃散見脾臟 瀉白散見肺臟

梔子清肝散一名柴胡梔子散 治三焦及足少陽經風熱

發熱耳內作癢生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛

寒熱往來

柴胡 梔子炒 牡丹皮各壹錢

卷九十五 發熱 刀斗三

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛旁子炒各

甘草參分

右水煎服

柴胡清肝散

治肝膽三焦風熱怒火或乍寒乍熱

往來寒熱發熱或頭發瘡毒等證

柴胡壹錢半

黃芩炒

人參

川芎各壹錢

山梔炒壹錢半

連翹

甘草各伍分

桔梗捌分

右水煎服

柴胡飲子

解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脉洪實

弦數大便堅實

黃芩柒分

甘草肆分

大黃捌分

芍藥柒分

柴胡

人參各伍分

當歸壹錢

右每服壹錢薑水煎

龍腦飲子

此瀉脾經熱可代瀉黃散用治小兒蘊

熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡臥

不寧及除痰熱咳嗽中暑煩躁一切風壅

甘草肆兩

大梔子參兩

藿香葉半兩

石膏壹兩

縮砂

括萸各柒錢半

右為末每服壹錢蜜水調服不拘時治傷寒餘毒潮熱虛汗加竹葉煎服

滋腎丸 治腎熱

黃柏酒拌炒

知母錢貳

肉桂分伍

右為末熟水丸桐子大每服二十九至三十九食前百沸湯下

實熱小兒實熱者頭昏頰赤口內熱小便赤澀狀如豆汁大便堅鞭或祕澀不通腹急宜四順飲子大黃枳硝湯八珍散畧揆動臟腑即安楊實則面赤濃黃氣麤口熱燥渴脣腫大小便難掀揭露衣煩啼暴

叫宜四順清涼飲加柴胡薛氏又有伸體而臥睡

不露睛手足指熱等證按實中宜分表裏表實宜

汗裏實宜下半表半裡宜和解今一以利下為主非

通論也治法并方更於後表裏條內求之雲岐云

小兒實熱在內者四順飲之類在上者吐之丹溪

云小兒熱病六一散妙藥也

茅先生三解牛黃散

治實熱潮熱

白殭蠶

全蠍炙

防風

白附子

桔梗

川大黃

甘草炙

白茯苓

川黃芩

人參

川鬱金阜角水煎

等分末服半錢壹錢薄荷蜜湯調

牛黃涼膈丸

治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心

煩潮熱痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡臥不安

口乾多渴唇焦咽痛頰赤腫口舌生瘡

牛黃壹兩壹分

甘草兩壹拾

寒水石

牙硝枯

石膏各貳拾兩

紫石英飛

腦麝各伍兩

膽星半兩

末之蜜丸每兩作叁拾丸溫薄荷人參湯嚼壹丸

食後服常服半丸治急驚並薄荷水化

虛熱 虛熱者因患後平復血氣未勻四體羸弱時多

發熱治宜調氣補虛其熱自退如錢氏白朮散異功

散四君子湯之類或未退人參生犀散治之 **楊虛**

則面色青白恍惚神緩口中清冷噓氣軟弱泄瀉多

尿夜出虛汗宜惺惺散 **薛**又有喜熱惡寒乍涼乍

溫怫鬱驚惕上盛下泄屈體而臥睡而露睛手足指

冷等證 **曾**虛熱因病後發熱無時一日三五次者

此客熱乘虛而作先以胃苓湯加黃耆末溫米清湯

調服次投錢氏白朮散或固真湯帶涼服及用溫鹽

湯參入涼水送下黑錫丹固守元氣 **海藏**云風熱

全七 卷九 三

邪熱四君子湯加生薑荊芥煎 雲岐云小兒客熱
在內先用導赤散次用益黃散 薛氏以虛實分屬
表裏及熱盛拒陰寒盛格陽血虛氣虛發熱等證俱
仲景東垣諸聖醫辨證妙法宜詳玩而熟記之則虛
熱似實熱之證庶幾不至誤認而全活衆矣 錢朱
監簿子五歲忽發熱醫曰此心熱也頰赤而脣紅煩
燥引飲遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯下之來日
不愈反加無方而不能食又下之便利黃沫錢曰心
經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病
也錢先用白朮散生胃中津液次以生犀散治之朱

曰大便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止虛熱也朱曰
醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者黃連一物耳黃連
性寒多服則利能寒脾胃也坐久衆醫至皆曰實熱
錢曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃
頰赤五心煩躁不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃
沫錢笑曰便黃沫者服瀉心湯多故也錢與胡黃連
丸治愈 鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽臟
熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉
五行其子困睡齊言子睡多驚又與青金膏一服又
瀉三行加口乾身熱齊言尚有微熱未盡又與青金

膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至
曰已成虛羸先用前白朮散時時服之後服香朮丸
十三日愈嘉靖甲寅敬臣之女年十二患脾胃素
弱自夏入秋時瀉時止小腹微痛至八九月間遂成
疝積之證發熱凡二十餘日不止汗泄熱解汗已復
熱自中脘至小腹膨脹堅直大便溏氣喘咳嗽作嘔
俱晝輕夜重徹夜煩躁不睡鼻塞眼暗讖語其母以
為必歿矣立齋先生診之曰脉浮大而無根此大虛
證也非獨參湯不可乃用參壹兩加熟附叁分煨生
薑三片日進二劑仍併查煎服之天下疝積其氣甚

腥腹漸寬熱漸減脉漸斂然手猶尋捻不已鼻孔出
血先生曰此肝證也煎六味丸料與之一服如脫乃
晝服獨參薑附湯夜服六味丸料脉漸有根諸證漸
退先此手足恒熱至是乃始覺寒先生喜曰此病邪
盡退而真氣見矣然猶飲食不進乃單用六君子湯
加炮薑遂能食咳嗽獨甚與補中益氣湯嗽遂止夜
始有睡凡弱女之得生皆先生力也向非先生卓有
定見專治其本而其末自愈則為丘中之骨必矣敬
書施療之顛末以告同患此者幸無所悞亦推廣先
生一念之仁於萬一二云爾王敬臣書

惺惺散

方見

錢氏白朮散

方見

異功散

方見

人參生犀散

見後

固真湯

見慢

黑錫丹

見雜病

當歸補血湯

治肌熱躁熱目赤面紅煩渴晝夜不

息其脉洪大而虛重按全無此脉虛血虛也若候

服白虎湯必效宜此主之

黃芪

錢參

當歸

錢壹

右水煎服

補中益氣湯

治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴

等證

人參

黃芪

各捌分

白朮

甘草

陳皮

各伍分

升麻

柴胡

各貳分

當歸

叁分

右薑棗水煎空心午前服

加味逍遙散 去牡丹皮山梔即逍遙散治肝脾血

虛等證

當歸

甘草

炙

芍藥

酒炒

茯苓

白朮

炒

柴胡

各壹錢

牡丹皮

山梔

炒各柒分

右水煎服

愚按前方若乳母肝脾血虛內熱寒熱徧身搔癢
肢體作疼頭目昏重怔忡頰赤口燥咽乾或發熱
盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛胸乳腹脹
小便不利致兒為患尤宜用之又治婦人陰虛發
熱兒飲其乳以致患瘡者

表裏錢身熱不飲水者熱在外身熱飲水者熱在
內海四順飲子治熱在內而不厥連翹飲治熱
在外而不厥醒壯熱惡風寒為元氣不充表之虛
熱也壯熱不惡風寒為外邪所客表之實熱也壯熱
飲湯為津液短少裏之虛熱也壯熱飲水為內火銷

爍裏之實熱也按傷風惡風傷寒惡寒豈可以惡風
寒為元氣不充而不惡風寒為外邪所客乎薛氏之
意本圓而語則滯癡人前豈可說夢須以東垣外感
內傷辨細別之則無失矣

表熱薛云熱而二便調和風邪蘊結於裏而發者用
惺惺散加麻黃汗之

敗毒散 治傷風瘟疫風濕頭目昏眩四肢作痛增
寒壯熱項強睛疼或惡寒咳嗽鼻塞聲重

柴胡

前胡

川芎

枳殼 炒

羌活

獨活

茯苓

甘草兩半

桔梗

人參各壹兩

右每服貳錢生薑薄荷水煎

消風散

治小兒解脫致令風邪客於皮毛入於藏

府則令惡風發熱胸膈痰涎目澀多睡即消風丸見風癩

清解散

治感風發熱頭疼鼻塞涕流及温壯悉主

之

北參

防風

天麻

北前胡

茯苓

北梗

枳殼剉

甘草各貳錢

細辛

柴胡各壹錢半

川芎錢叁

右末每壹錢水小盞薄荷乾參葉畧煎温和服

集驗荆朮散

治小兒傷風傷寒或瘡或疹此藥無

寒無熱疎風順氣一切諸熱證

荆芥穗

赤芍藥各壹兩

蒼朮貳兩製

甘草兩半炒

細末隨大小壹貳錢又名冲和散傷風傷寒壯

熱咳嗽鼻塞聲重生薑葱白湯下傷風潮熱或

變蒸發熱薄荷湯下風熱傷肺鼻涕氣麤紫蘇

湯下暴卒急驚風熱宜急驚門疎風散久病

後急慢驚熱保嬰全蠍散 發汗去節麻黃湯調

盜汗自汗牡蠣浮麥湯調 丹毒風熱煎四順

飲湯調 眼暴赤熱腫煎羌活黃芩生地黃湯調

口舌腮項熱腫生瘡煎防風牛旁子湯調 咽

喉重舌煎升麻枳殼大黃防風薄荷湯調

人參羌活散 治傷寒發熱頭痛身疼或潮熱煩渴

痰實咳嗽 治傷寒發熱頭痛身疼或潮熱煩渴

羌活 白獨活 柴胡

川芎 人參 甘草

白茯苓 枳殼 前胡

桔梗 地骨皮 天麻

吹咀每壹錢水半盞薑壹片棗半箇薄荷壹葉煎

溫服無時瘡疹未發亦可服

羌活散 治傷風時氣頭痛發熱身體煩疼痰壅咳

嗽失音鼻塞聲重及解時行下痢赤白

人參 羌活 赤茯苓

柴胡 前胡 川芎

獨活 桔梗 枳殼

蒼朮 甘草

右剉每服貳錢水壹盞薑壹片薄荷參葉煎柒分

無時温服發散風邪入葱白同煎刺證薑倉米煎
人參辛梗湯 治小兒傷風發熱鼻塞咳嗽時行瘡
疹

人參米分

細辛伍分

桔梗

乾葛

升麻

白朮

茯苓

柴胡各柒分

薄荷

甘草各伍分

每服水壹鍾薑叁片煎伍分不拘時服

紅綿散 治小兒四時感冒寒風徧身發熱變蒸諸
驚胎驚丹毒等熱並皆治之及急慢驚風亦宜服

之

人參貳錢半

天麻洗

殭蠶炒

麻黃去節

全蠍去毒各貳錢

甘草炙

辰砂壹錢半細研

右件為末然後入硃砂和勻再乳極細每服半錢
用米半盞煎數沸入乾胭脂少許再煎一沸溫溫
服不拘時

惺惺散見痘

魚鱗四順清涼飲

治小兒血脈壅實藏府蓄熱頰

赤作渴五心煩熱睡臥不安四肢驚掣及因乳哺

不時寒溫失度令兒血氣不順腸胃不調大小便
澀欲發驚癇或風熱結核頭面生瘡目赤咽痛瘡
疹餘毒一切壅滯挾熱泄瀉不止加木香煨大黃

赤芍藥

當歸

甘草

大黃各等分

剉碎參歲小兒用貳錢水陸分薄荷貳葉煎搗

沸去渣不拘時服小便不通加燈心木通

大黃朴硝湯 治小兒驚熱涎風前後不通

川大黃

蒸

甘草

生

朴硝

各壹兩

右剉碎每服貳錢水半盞入蜜少許煎至參分不

拘時服

柴胡飲子 治傷寒五六日發熱潮熱大便秘乳母

多服

木柴胡

人參

芍藥

當歸

黃芩 大黃

甘草

炙各半兩

咬咀隨大小加減薑煎

五和湯 主宣利藏府積熱調和榮衛

當歸

酒洗

赤茯苓

去皮各半兩

甘草

炙

大黃

枳殼

水浸潤去穢剉片麥

炒微黃各柒錢半

右件咬咀每貳錢水壹盞煎柒分無時溫服

寬熱飲主伏熱在裏風壅滿氣促昏悶或脾胃停滯日久飲食減少面黃脉實發熱無時並宜服之

枳殼去穰壹兩剉片巴豆拾伍粒作貳片去殼膜心同炒枳殼見微黃色去巴豆

大黃壹兩粉草柒錢玄明粉貳錢

右前參味剉焙為末臨入玄明粉乳鉢內同前藥末杵勻無時調服半錢至壹錢兒小者抄壹字並用薑蜜湯或薄荷湯

三黃丸治三焦積熱眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡心膈煩躁不美飲食大小便秘澀五臟實熱或

下鮮血瘡癩熱證

黃連壹兩黃芩壹兩大黃壹兩

右為末煉蜜丸桐子大每服參拾丸白滾湯下量大小加減服

表裏俱熱七寶散治小兒溫壯伏熱傷寒煩躁面

赤氣喘夜熱曉涼此藥涼心臍消風熱

川大黃蒸赤芍藥炙甘草炙

川當歸各貳錢半麻黃壹兩白朮

荆芥穗各貳錢

右為末壹歲壹錢水半盞葱白壹寸薄荷壹葉煎

至參分不拘時溫服

雙解飲子 即通聖散合六一散方見傷寒太陽病發熱條

白虎湯 治傷寒或吐或下後七八日邪毒不解熱

結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲數升者宜服之又治夏月中暑汗出惡風寒

身熱而渴

大知母 兩參

甘草 壹兩炙

石膏 捌兩另研

糯米 合參

右每服貳參錢水煎至米熟為度

半表半裏熱 小柴胡湯 治傷寒溫熱身熱惡風頭

痛項強四肢煩疼往來寒熱脇痛耳聾嘔噦痰實

中暑瘧疾並服之 方見傷寒少陽病

愚按前方若肝膽經風熱肝火瘰癧寒熱往來日

晡發熱潮熱不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或

脇痛脘滿小便不利或泄瀉吐酸苦水或肢體搖

動脣自抽掣及乳母有前證致兒為患者並宜服

之

餘熱餘熱者謂寒邪未盡傳經之遺熱也仁齋曰傷

寒汗下後而熱又來乃表裏俱虛氣不歸元陽浮於

外不可再用涼藥蓋熱去則寒起古人戒之法當和

胃氣使陽氣收斂歸內其熱自止宜以參苓白朮散
主之曾有小兒熱證用表裏藥後其熱俱退既退
復熱者何也療病至此難以緊舉或再解表攻裏或
施涼劑熱見愈甚以陰陽辨之何者為是推其原乃
表裏俱虛而陽浮於外陰伏於內所以又發熱宜用
溫平之藥和其裏則體熱自除投錢氏白朮散去木
香加扁豆水煎及黃耆六一湯安神散自然平復若
日又汗多煩渴食減脈微緩喜飲熱可服真武湯雖
附子性溫取其收斂陽氣內有芍藥性寒一寒一溫
停分得宜用之無不驗矣薛汗後血虛而熱益甚

者六神散加粳米汗後氣虛而惡寒發熱者補中益
氣湯汗後陰虛陽無所附而熱者用四物湯加參耆
汗後陽虛陰無所附而熱者用四君湯加芎歸
實脾散治小兒餘熱不除

川芎

茯苓

甘草

白朮

右劉散用水煎食遠服

參苓白朮散

主脾胃虛弱飲食不進多因少氣中

滿痞噫嘔吐逆此藥不寒不熱性味和平常服調

脾悅色順正去邪

人參去蘆

白茯苓去皮

粉草

白朮

白扁豆如前製

山藥去黑皮

縮砂仁

薏苡仁

桔梗剉炒各壹兩

蓮子肉去心

右剉焙為末每服半錢至壹錢用棗湯空心調服或溫米湯亦可

安神散 治吐瀉諸病後心虛煩悶觸物易驚氣鬱

生涎涎與氣搏睡不得寧預防變生他證

人參

白茯苓

半夏製

甘草炙

陳皮去白

枳實製各伍錢

右剉每服貳錢水壹盞薑貳片棗壹枚竹茹小團煎柴分無時溫服有微熱渴入麥門冬去心同煎簡易凝神散 治小兒經汗下熱去復作收斂胃氣清涼肥表神效

人參

白朮

白茯苓

山藥炒各壹兩

扁豆

粳米

知母

生地黄

甘草各半兩

淡竹葉

地骨皮

麥門冬各壹分

細末每貳錢水小盞薑貳片棗壹枚煎無時

錢氏白朮散見方

黃芪六一湯見方

真武湯見自

六神散見夜

壯熱壯熱者一向不止由血氣壅實五臟生熱蒸熯於內則眠臥不安精神恍惚熏發於外則表裏俱熱煩躁喘麤甚則發驚癇也輕劑火府丹地黃煎重劑雙解飲七寶散大黃朴硝湯

地黃煎 治小兒壯熱煩心眠臥不安

生地黄汁壹 白沙蜜合叁 酥合叁

生門冬汁叁 右重湯煮至成膏每服數匙

火府丹 治小兒壯熱

生地黄 木通 甘草

黃芩

右水壹鍾煎服

金蓮飲子 治小兒蘊積壯熱赤眼口瘡心煩躁悶

咽乾多渴潮熱不止

防風 甘草炙 連翹

柴胡去蘆 山梔子各半

右為末每服貳錢用水陸分煎至參分食後服

黃龍湯 治發熱不退或寒熱往來

柴胡伍錢 黃芩炒 甘草炙各貳錢

赤芍藥叁錢

右每服壹錢薑棗水煎

牛黃膏 治壯熱咽喉涎響或不省人事或左右手
偏攙或唇口眼鼻顫動此熱涎內蓄風邪外感也
宜急服之

蝎尾 肆拾枚

辰砂 研貳錢

麝香 壹錢

巴豆肉 去油膜壹錢半

鬱金 參錢皂角水煮

牛黃 許少

右為末每服壹匙蜜水調下量見虛實用之

梔子仁湯 治陽毒壯熱百節疼痛下後熱不退者

梔子仁 炒酒

赤芍藥

大青

知母 各壹兩

升麻

黃芩 炒酒

石膏 各貳兩

柴胡 壹兩半

甘草 伍錢

杏仁 貳兩浸去皮炒微黃

右每服參錢生薑參片水煎服

六物黃芩湯 治壯熱腹大短氣往來寒熱飲食不

化

黃芩 炒酒

大青

甘草 炙

麥門冬 去心

石膏 各半兩

桂 壹錢

右每服壹貳錢水煎服

五物人參飲 治壯熱咳嗽心腹脹滿

大熱壯熱

刀身三

三二

人參

甘草各半

麥門冬去心

生地黄各壹兩半

茅根半握

右每服貳錢水煎服

溫壯溫壯與壯熱相類而有小異一向熱而不止是壯熱也但溫溫然不甚盛是溫壯也若大便臭而黃者此腹內有伏熱以四順飲子治之若糞白而酸臭則挾宿食不消當服紫霜丸輕者少服重者節乳哺增加丸藥當取微利可也

紫霜丸

見癖積

柴苓湯

治小兒溫壯伏熱來去

柴胡

參錢半

麥門冬

去心

人參

去蘆

赤茯苓

甘草

各貳錢半

黃芩

伍錢

右剉散用水煎入小麥貳拾粒竹葉參片

二黃犀角散

治溫壯心熱神不安大腑秘結

犀角屑

大黃

酒浸

釣藤鈎

梔子仁

甘草

黃芩

各半兩

右為末每服伍分熱湯調下量兒加減

牛黃散 治溫壯常熱或寒熱往來

牛黃

研

甘草

各半兩

柴胡

梔子

酒炒

龍膽草

酒炒

黃芩

各貳錢半

右為末每服半錢以金銀薄荷湯調下

驚熱驚熱者徧身發熱或熱而不甚面青自汗睡夢虛驚顛叫恍惚有因驚而生熱者有因熱而生驚者錢氏導赤散涼驚丸安神之類皆其治也

七寶散見前

天竺黃散 治小兒驚風熱

天竺黃 研

川鬱金

山梔子

白殭蠶 炒去絲角

蟬殼 去土

甘草 各等分

右為末壹歲半錢熟水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散 治小兒驚熱通利小腸去驚涎清心腑止

煩渴安神穩睡加硃砂名加硃甘露散

寒水石 研軟而微青中

壁如無以方解石代之

石膏 研各貳兩

堅白有牆

生甘草末 壹兩

右件為末和勻量兒大小或壹錢或半錢熱月冷服寒月熱服用薄荷湯調或燈心湯調被驚心熱不安臥皆可服小便不通快麥門冬燈心湯若驚熱入硃砂少許不拘時服一方有赤茯苓壹兩蘇沈方用滑石不是石膏錢氏名玉露散每服壹字或半錢或壹錢食後温白湯調下

辰砂金箔散

治小兒心膈邪熱神志不寧驚惕煩

渴恍忽怔忡夜臥不安齒齩腫爛及痰實咳嗽咽
膈不利

辰砂研

桔梗各貳錢半

人參

白茯苓各壹錢半

蛤粉肆錢飛研

牙硝枯壹錢半

甘草貳分壹錢

片腦壹分半

金箔壹片

右為末壹歲半錢薄荷湯調不拘時百晷小兒藏
府多熱睡臥不穩大便不利蜜湯調壹字

本治小兒驚熱

全蝎

天南星取心為末壹錢人參叁錢

蛇蛻叁錢

右為末薄荷蜜湯調下

骨蒸熱小兒一歲至十歲衣絮皆不得着新綿又不
得冬月以火烘衣被勿令食桃李杏楊梅果實又不得
食炙煨熱麪之類皆令兒體熱或因傷寒後食肉太
早令兒體熱者有之或作骨蒸者宜服生犀散克効
湯地骨皮飲七寶散金蓮飲子治之
曾骨蒸熱身
體虛羸遇晚而發有熱無寒醒後渴汗方止此乃疳
病之餘毒傳作骨蒸或腹內有癖塊有時微痛用參
苓白朮散薑棗三稜煎湯調服或投化癖丸先療脾
虛宿滯次以柴胡飲為治仍忌雞酒羊麪毒物

人參生犀散 治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱夜有盜汗五心煩躁四肢困倦及大病瘥後餘毒不解或傷寒病後食羊肉體熱不思食

麝半角鎊

地骨皮

秦艽去土

麥門冬去心

枳殼炒

川大黃蒸

柴胡去蘆

赤茯苓去皮

赤芍藥

桑白皮炒

黃芪

人參

鼈甲去裙醋炙

右剉碎每服貳錢水半盞烏梅半箇煎至參分不

拘時服

地骨皮飲 治小兒骨蒸潮熱往來心膈煩悸及傷

寒後氣未解

柴胡去蘆

地骨皮各貳兩

知母

甘草炙

鼈甲醋炙

黃芩

人參各貳錢半

赤茯苓兩半

右剉碎壹歲貳錢水陸分薑梅各壹片煎參分不

拘時服

柴胡飲 治骨蒸疢氣五心煩熱日晡轉盛口乾無

味渴多身瘦胸滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡

人參

當歸酒洗

黃芩

赤芍藥

甘草炙各壹兩

大黃

桔梗去蘆剉炒

北五味去梗

半夏各半兩

右剉每服貳錢水壹盞烏梅小角薑貳片煎柒分無時溫服

鄭氏犀角飲

治小兒骨蒸潮熱盜汗肌瘦

犀角屑

鼈甲醋炙

柴胡

知母各半兩

地骨皮

胡黃連各壹兩

川大黃

桃枝各半兩

咬咀參歲壹錢服水半盞煎服無時

靈犀飲

治骨蒸潮熱盜汗咳嗽可食多渴面黃肌瘦肚急氣麤虛熱餘熱通用

犀角屑

胡黃連各半兩

白茯苓

人參

川芎

秦朮

甘草

羌活

柴胡

桔梗

地骨皮各壹兩

咬咀參歲壹錢水半盞烏梅竹葉各少許煎

尅効湯見潮熱

化癖丸見癖

煩熱

五心熱甚煩躁不安手足時欲露出小便赤澀

謂之煩熱八珍飲子七寶散皆可服之若唇深紅飲

水不止以竹葉石膏湯加硃甘露散治之

一粒金丹 治小兒五臟蘊熱胸膈煩悶五心煩熱

人參 犀角 玳瑁

琥珀 防風各壹錢 茯苓

寒水石煨 甘草各貳錢 龍腦

硃砂水飛各半錢

右為細末入麝半錢用陳米糊丸芡實大金箔貳拾伍片為衣麥門冬去心煎湯下

絳雪丹 治小兒煩熱

芒硝壹兩 硃砂壹兩

右為末飯丸芡實大參歲壹丸沙糖水化下

地黃煎丸 治小兒風壅上膈熱煩鼻衄口瘡咽喉

腫痛口舌生瘡或血熱五心常熱多渴飲水

生地黄 熟地黄各壹兩 薄荷葉壹兩

甘草微炙 山梔仁 玄參各柒錢半

片腦半錢

右為末煉蜜為丸如芡實大每服壹丸白湯磨化

乳後服

竹葉石膏湯 治小兒虛羸少氣氣逆欲吐四體煩

熱ハナフ

癸九煩熱 刀斗三 三三

石膏兩

半夏洗

人參各半

麥門冬去心

甘草炙

淡竹葉把

右剉碎每服貳錢用水陸分粳米參肆拾粒生薑

貳片煎至參分去粗不拘時服

加硃甘露散見驚

潮熱有作止每白應時而發謂之潮熱如潮信之不失其期也錢氏云假如潮熱是一臟實一臟虛而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈其如日中發潮熱者是心虛也肝為心之母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平以潮熱愈也醫見潮熱妄

謂其實乃以大黃朴硝輩諸冷藥利之利既多矣不能禁約而津液內竭縱取一時之瘥鮮有不成疴病而身瘦也 薛潮熱有風寒疴積食癖之分陰陽虛實五藏之異如汗出身熱呵欠面赤者風熱也傷寒時疫陰陽相勝外感熱也肌瘦口乾骨蒸盜汗疴熱也大小便秘澀汗下不解積熱也腹背先熱夜發且止食熱也涎嗽飲水乳食不消癖熱也又有煩熱者氣麤喘促心躁不安頰赤口瘡無發癩證瘡疹熱者耳鼻尖冷血熱者已午間發至夜則涼虛熱者困倦少力發於病後陽邪干心則來去不定陰陽相勝則

寒熱如瘧前證在小兒有因乳母或妊娠七情厚味
遺熱或飲食停積衣衾過暖及頻浴熱湯而為患若
寅卯辰時熱而力盛飲水者肝經實熱也用柴胡清
肝散熱而力怯飲湯者肝經虛熱也用六味地黄丸
巳午時熱心經也實用導赤散虛用秘旨安神丸申
酉戌時熱肺經也實用瀉白散虛用秘旨保脾湯亥
子丑時熱腎經也用地黃丸大凡壯熱飲水太便秘
結屬實熱用二黃犀角散下之熱渴飲湯太便秘如常
屬血虛用四物湯補之若下後陰虛陽無所附而仍
熱用四物參芪汗後陽虛陰無所生而仍熱用四君

芎歸若汗下後煩渴面赤血虛發躁也當歸補血湯
若見驚搐等證肝血虛而内生風也用四物天麻鈞
藤鈎頰赤口乾小便赤澀太便秘黃表裏俱實熱也
用清涼飲子如太便秘利或熱未止表邪未解也惺
惺散未應加麻黃微汗之既汗而仍熱此表裏俱虛
氣不歸源陽浮於外而虛熱也六神散加粳米陽氣
下陷於陰中而發熱者用補中益氣湯若乳下嬰兒
當兼治其母曾氏先用百解散發表次以當歸散
及三解散治之脈實者以大柴胡湯下之虛浮數者
百解散微汗之若發熱而嘔者小柴胡湯和解之

錢地骨皮散

治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母

甘草

半夏

銀柴胡

人參

地骨皮

赤茯苓

如有驚熱加蟬蛻天麻黃芩若

加秦艽名秦艽飲子

右為細末每服貳錢生薑參片水煎食後溫服量

大小加減海藏云地骨皮散即小柴胡湯加減法

湯仲景所用錢氏改諸丸散加減並出古法

生犀散

犀角散

治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾晚潮熱夜

有盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末

地骨皮

麥門冬

枳殼

大黃

柴胡

茯苓

赤芍藥

黃芩

桑白皮

人參

鼈甲

右為麤末每貳錢入青蒿少許水煎量兒大小加

減壹鍾煎捌分食後溫服

丹小兒潮熱盜汗胡黃連柴胡等為細末煉蜜丸

實大每貳丸酒化開入少水煎小沸服

錢秦艽散

治潮熱減食蒸瘦

秦朮去頭切焙 甘草炙各壹兩 薄荷葉切焙半兩

右為麤末每服貳錢水壹鍾煎捌分食後温服

潔潮熱有時胸滿短氣者桃枝丸見積熱

人參芎歸散 治小兒虛勞内熱潮熱或徧身瘡

北參 當歸 遠志浸取肉薑製焙

北前胡 柴胡 地骨皮

防風 北桔梗 枳殼製

半夏曲各壹錢半 川芎 赤芍藥

茯苓 麥門冬去心各貳錢 甘草叁錢焙

右剉細每服貳錢水小盞薑叁片紫蘇葉叁肆葉

發瘡者無服猪肚黃連丸方見疳門別作小丸不

惟治瘡治渴其發熱而脹者可與服貳拾丸

十味人參散 治潮熱身體倦怠

柴胡 甘草 人參

茯苓 半夏 白朮

茵芩 當歸 芍藥

葛根

右吹咀水壹鍾薑叁片煎服

薛方

柴胡清肝散見肝熱

六味地黃丸見腎

導赤散見心部

秘旨安神丸見心部

瀉白散見肺部

秘旨保脾湯見脾部

二黃犀角散見温壯

四物湯見朱血

當歸補血湯見唐熱

六神散見夜啼

曾氏方

百解散 主和解百病虛慢陰證不宜

乾葛貳兩半

升麻

赤芍藥各貳兩

黃芩壹兩

麻黃製柒錢半

薄桂去鹿皮貳錢半

甘草壹兩半

右碎每服貳錢水壹盞薑貳片葱壹根煎柒分無

時温服有風熱盛加薄荷同煎

當歸散 順調氣血和解表裏藥利心腹踈理百病

及治温熱停積自痢煩躁不寧

當歸去蘆酒洗

赤芍藥各貳兩

甘草半生半炙壹兩

大黃半生半泡壹兩貳錢

麻黃製各半兩

右碎每服貳錢水壹盞薑貳片煎柒分無時温服

三解散一名寧心湯

主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁

氣急渴水驚啼煩悶丹毒口瘡痰嗽搐掣

人參

防風各去蘆

天麻

茯神去皮木根

鬱金如無山梔仁代

白附子

大黃各貳錢半

赤芍藥

黃芩

殭蠶各伍錢

全蝎拾伍尾去尖毒

枳殼貳錢如前製

粉草陸錢

右碎焙為末每服半錢至壹錢用温薄荷湯無時

調下或燈心湯

大柴胡湯 解利風熱痰嗽腹脹及裏證未解

柴胡去蘆

黃芩

芍藥各壹兩半

大黃

半夏如前製各柒錢半

枳實如前製柒錢

甘草壹兩小方故加用

右碎每服貳錢水壹盞薑貳片煎柒分無時温服

小柴胡湯半表半裏熱

書全嬰方小兒每早食後發熱夜則涼世醫多謂

虛勞或為疳熱不知此血熱證也宜龍膽丸地黃膏

之類時時與服即瘥按全嬰方所云血熱者已午

發熱遇夜則涼與東垣所謂夜則發熱晝則明了不

同然東垣所云血熱者指陰虛而生內熱也夜則發

熱晝則明了取其晝陽夜陰也鄭氏所云血熱者指

小兒血盛實而言也蓋謂已午者心火用事之時也

心主血血氣行至巳午則陽氣盛陽氣與正氣相搏

故至期而發熱非其時者非血熱也

薛一小兒寅

刀斗三

三七

卯時發熱或無搖有痰服抱龍瀉青二丸而愈後復
患服前藥無咳嗽氣喘不時發搐面赤色或青黃或
浮腫或流涎予謂咳嗽氣喘脾肺氣虛也不時發搐
肝木乘脾也面青黃肝入心脾也浮腫流涎脾氣虛
也用益智丸以養心血補中益氣湯以補脾氣而愈
一小兒巳午時發熱驚悸發時形氣倦怠面黃癩
食流涎飲湯予謂心氣不足所致不信反服涼心之
藥更加吐瀉睡而露睛手足並冷幾至慢脾風先用
六君薑桂湯佐以地黃丸而愈一小兒申酉時發
熱面赤腹中作痛或用峻利之劑下之致發搐吐痰

作渴腹痛按之即止此脾胃傷而變證也用七味白
朮散補中益氣湯頓安
龍膽丸 治小兒食後多發熱或夜則涼此血熱證
疳熱皆可治

宣黃連去毛

赤芍藥各半

草龍膽去苗

青皮去穰各

檳榔壹箇大者

麝香少許

右爲末猪膽汁少以麪糊爲丸蘿蔔子大每叁貳
拾丸米飲空心服

六合湯 治小兒血熱每日巳午間發熱遇夜則涼

當歸

大黃

川芎

熟地黄

右為朱參歲壹錢水半盞煎至參分無時服

猪膽丸

治小兒每白早飯後發熱夜則身涼此血

熱也

胡黃連

貳錢

宣黃連

赤芍藥

各半

右為朱猪膽汁和成劑入在膽中懸用漿水煮熟

取出飯為丸如豆大參歲參拾丸米湯送下日三

服無時

夜熱

海藏云夜熱屬陰四順飲之類此血熱在夜也

脉經云小腸有宿食嘗暮發熱明日復止此宿食

夜熱也

薛治一小兒亥子時發熱形氣倦怠面黃

懶食流涎飲湯用益黃散而愈後復發服前藥及清

熱之劑病發不時嗜臥露睛作渴少食大便頻黃此

脾虛而肝木勝之無元氣下陷也用補中益氣湯佐

以地黄丸而愈又治一小兒夜間發熱腹脹此脾虛

肝盛朝用五味異功散夕用四味肥兒丸熱止乃朝

用六味地黄丸夕用異功散而痊 錢朱監簿子五

歲夜發熱曉即如故眾醫有作傷寒治者有作熱治

者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉

丸下涎其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之乃

夜熱

四十三

日七

取白朮散壹兩煎藥汁參升使任意取足服朱生曰
飲多不作瀉否錢曰無生水不作瀉縱多不足怪也
但不可下耳朱生曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱
清神皆此藥也至晚服盡錢視曰更可服三升又煎
白朮散三升服盡得稍愈第三日又服白朮散三升
其子不渴無涎又投阿膠散二服而安湯風痰熱
晚熱早涼喫水無時此候乃痰作潮而生風熱即宜
金星丸下之或氣弱者不可下宜奪命散以控下涎
次服惺惺散加南星白附子
四順飲見裏熱

益黃散見脾

補中益氣湯見虛熱

地黃丸見腎

異功散見吐瀉

四味肥兒丸見痛

白朮散見渴

金星丸

治風熱結聚喉內痰鳴喘麤咳嗽面紅頰

腫咽膈壅塞發熱狂躁多渴

鬱金末

雄黃另研各壹分膩粉半

巴豆朱枚去油

右為朱米醋糊丸麻子大薄荷臘茶下

奪命散見驚

惺惺散見痘

四物二連湯

治血虛勞五心煩熱晝則明了夜則

癸亥夜熱

刀月三

四

發熱脇肋并一身盡熱日晡肌熱

當歸

生地黄

白芍藥

川芎

黃連

胡黃連

各等分

右水煎服

積熱久熱也疳熱亦久但無面黃喫炭土鼻下爛也

三因小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾

小便赤大便焦黃先以四順清涼飲子利動藏府則

熱去既去復熱者內熱已解而表熱未解也當用惺

惺散紅綿散加麻黃微發汗表熱乃去表熱去後又

發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再

解表或以謂不可醫誤致天傷者甚多此表裏俱虛

氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用

六神散入粳米煎和其胃氣則收陽歸內身體便涼

熱重者用銀白散 曾積熱眼胞浮腫面黃足冷發

熱從頭至肚愈甚或聞飲食之氣惡心及腸疼嘔吐

治法詳載傷積論中 按曾氏所謂積熱乃指腹中

有癖而熱與久積之積不同不妨並存之

清涼飲子

裏熱

惺惺散

疳疹

紅綿散

白殭蠶

炒貳兩

天麻

生用壹兩

南星

切薄片油浸黃貳兩

蘇木節 是研貳兩半

右為末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至六分溫服凡小兒風熱頭自不清並宜服之若傷寒有表證發熱者每服入去節麻黃末五分有裏熱心燥渴者入滑石末半錢同煎服之

六神散

人參

白茯苓

乾山藥

白朮

白扁豆

甘草 各等分

右為末每服一大錢水一小盞棗一枚薑二片同煎至五分服此藥用處甚多治胃冷加附子治風

證加天麻治痢加鶯粟殼

銀白散

乾山藥

白朮

白茯苓 各半兩

人參

白扁豆

知母

甘草 炙

升麻 各等分

右為末每服一大錢水一小盞棗一枚生薑二片同煎溫服不拘時候

桃枝丸 踈取積熱及結胸又名桃符丸

巴豆霜

大黃

黃檗 各壹錢

輕粉

礪砂 各半錢

右細末麩糊丸粟米大煎桃枝湯下一碎兒五七
丸五七歲二三十丸未碎兒二三丸臨臥服

梔鼓飲子 治小兒畜熱在中身熱狂躁昏迷不食

梔子仁柒枚 豆豉兩半

右用水三盞煎至二盞看多少服之無時或吐不

吐立效

梔子湯 治小兒積熱心臟小便赤腫口内生瘡

梔子仁 木通 當歸尾

白芷各貳錢 防風 甘草各壹錢

右為細末麥門冬煎湯送下

三黃丸裏一熱

曾玉露飲 治頰赤咽乾心煩躁睡不穩身熱頭痛

兼中暑發渴昏悶小便不通驚氣入腎夢中咬牙

加金珠散薄荷湯空心調服

寒水石中有細紋者可碎者 石膏潔白堅硬而有

甘草參錢晒乾天陰火焙

右除前二味外甘草剉曬或焙同為細末每服半

錢至一錢溫湯無時調服或麥門熟水

益元散 解暑毒利小便理煩渴除驚悸

滑石陸兩 粉草壹兩細剉

右二味或曬或焙研為細末每服一錢至二錢溫
熱水無時調服凉水亦可

萬安飲一推陳致新除邪輔正和益脾胃宣通氣血

調順飲食疎解風寒寧心化痰去煩理熱不拘證

在表裏並宜可投常服百病不生真元益固補養

諸虛亦有奇驗此與宣明論當歸飲相類不遠治

法最多其藥品之外惟加枳殼半夏

人參去蘆 當歸酒洗 大黃生用

此胡去蘆 枳殼去瓢 半夏泡裂

芍藥洗淨 黃芩 防風去蘆

甘草十味各壹兩 滑石末陸兩

右剉除滑石末臨入和勻每服二錢水十盞薑二

片煎七分無時溫服或加棗一枚同煎

調胃散 桃枝丸取積熱後服之

人參叁錢 白朮貳錢 甘草炙

白茯苓 鸞粟子各壹錢 白附子半分

藿香 丁香各半錢

右為末紫蘇湯下半錢或一錢

寒熱者證如瘧狀陰陽相勝也先寒而後熱陽
不足先熱而後寒陰不足寒多而熱少陰勝陽也熱

多而寒少陽勝陰也寒熱相半陰陽交攻也寒熱隔
日陰陽乍離也陽盛發熱陰盛發寒也其有頭疼汗
出者有嘔吐不食者有增寒而飲水者壯熱而飲湯
者有筋骨疼痛者或瀉或秘或內寒而外熱或內熱
而外寒又有寒而腹中痛熱而腹中鳴是有食積也
治法因於食積者當用白餅子下之次行補助以錢
氏白朮散寒多熱少者小柴胡湯加桂熱多寒少者
白虎湯加桂寒熱相半者並用小柴胡湯主之
經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則
因寒寒熱往來此乃陰陽相勝也故寒氣并於陰則

發寒陽氣并於陽則發熱寸口脉微為陽不足陰氣
上入陽中則惡寒尺脉弱為陰不足陽氣下入陰中
則發熱陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒陰
陽不歸其分則寒熱交爭也又上盛則發熱下盛則
發寒陽勝則乍熱陰勝則乍寒陰陽相勝虛實不調
故邪氣更作而寒熱往來或乍寒乍熱也少陽膽者
肝之府界乎太陽陽明之間半表半裏之分陰陽之
氣易於相乘故寒熱多主肝膽經證以小柴胡湯加
減調之若祇見寒熱起居如常久而不愈及大病後
元氣未復悉屬陰虛生熱陽虛生寒宜用八珍湯補

之甚者十全大補湯有食積為病亦令寒熱用保和
丸消之若兼嘔吐泄瀉用六君子湯厥冷飲熱人參
理中丸作渴不止七味白朮散食積既消而寒熱尚
作者肝邪乘脾所勝侮所不勝也用異功散加柴胡
山梔其瘡證寒熱詳見瘡門

白餅子 癰

白朮散 渴

小柴胡湯 半表半裏熱

白虎湯 表裏俱熱

八珍湯 虛羸

十全大補湯 虛羸

保和丸 宿食

六君子湯 脾

人參理中丸 吐瀉

異功散 吐瀉

變蒸 變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就
是五臟之變氣而七情之所由生也蓋兒生之日至
三十二日一變每變蒸畢即覺性情有異於前何者
長生臟腑意智故也何謂三十二日長骨添精神人
有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經
絡故初生至三十二日一變生癸屬足少陰腎藏精
與志六十四日二變一蒸生壬屬足太陽膀胱其發
耳與聾冷至九十六日三變生丁屬手少陰心經心
藏神其性為喜一百二十八日四變一蒸生丙屬手
太陽小腸其發汗出而微驚一百六十日五變生乙

變蒸

力斗三

四一

屬足厥陰肝肝藏魂喜哭一百九十二日六變三蒸
生甲屬足少陽膽其發目不閉而赤二百二十四日
七變生辛屬手太陰肺肺藏魄生聲二百五十六日
八變四蒸生庚屬手陽明大腸其發膚熱而汗或不
汗二百八十八日九變生巳屬足太陰脾脾藏意智
至三百二十日十變五蒸生戊屬足陽明胃其發不
食腸痛而吐乳又手厥陰心包絡手少陽三焦此二
經俱無形狀故不變而不蒸也前十變五蒸乃天地
之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故云始全
也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日爲

一大蒸計三百八十四日長其經脉手足手受血故
能持握足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而足
一歲之日有餘也師曰不汗而執者發其汗大吐者
微止不可別治又六十四日爲一大蒸計四百四十
八日又六十四日三大蒸計五百一十二日共五百
七十六日變蒸既畢兒乃成人也變者變生五臟也
蒸者蒸養六腑也所以成人變者上氣蒸者體執每
經一變一蒸情能既異輕則發熱微汗其狀似驚重
則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼躁渴輕者五日
解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘

續感寒邪者但變蒸則耳冷骭冷上脣發泡狀如泡
珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲
日夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則
噎嗽毛聳凡五臟六腑筋脉骨節循環各有證應其
治法和平之劑微表之熱實者微利之或不治亦自
愈湯千金變蒸論云凡兒生三十二日一變六十
四日再變變且蒸九十六日三變一百二十八日四
變變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變變
且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且
蒸二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積

三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸蒸後六十四
日復大蒸蒸後一百二十八日復人蒸凡小兒自生
三十二日一變再變為一蒸凡十變而五小蒸又三
大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成入小兒所
以變蒸者是榮其血脉改其五臟故一變竟輒覺情
態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕
重其輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如
魚目珠子微汗出重者體壯熱而脉亂或汗或不汗
不欲食食輒吐喎目白睛微赤黑睛微白又云目白
者重赤黑者微變蒸畢自精明矣此其證也單變小

微兼蒸小劇凡蒸平者五日而遠者十日而衰先
期五日後期五日為十日之中乃除耳或違日數
不歇切不可妄治及灸刺海藏云言變蒸通一十八
次蓋前三百二十日為十
小蒸後二百五十六日為十
蒸也現乎典切不嘔而吐也無若身熱耳熱尻
亦熱此乃他病可作別治薛變蒸治法平和者微
表之實熱者微利之古方紫霜光黑散子柴胡湯皆
可有寒無熱并吐瀉不乳多啼者當歸散調氣散主
之前證蓋小兒所不免者雖勿藥亦可也前藥峻厲
非惟臟腑不勝亦且反傷氣血余嘗見一小兒至
變發熱有痰投抱龍丸一粒卒至不救慎之慎之其

有不熱不驚略無證候而暗變者蓋受胎氣壯實故也

紫陽黑散 治小兒變蒸壯熱亦治傷寒發熱

麻黃貳錢半
去節 大黃壹錢同
炒黑為末 杏仁去皮小大
貳錢半

右件同一處搗和並略燒存性再以杏仁研膏和
之密器盛每服一豆許乳汁調和灌之

紫霜丸 癖積

柴胡湯 治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參 甘草微炙 麥門冬去心各
貳錢
龍膽草酒炒 防風各壹
錢 柴胡伍
分

右每服壹錢水煎

當歸散 治變蒸有寒無熱

當歸 貳錢 木香 官桂 辣者

甘草 炙 人參 各壹錢

右每服壹錢薑棗水煎

調氣散 治變蒸吐瀉不乳多啼欲發慢驚

木香 香附子 人參

橘皮 藿香 甘草 炙各壹錢

右為末每服壹錢薑棗水煎服 幼科類萃此方有製厚朴壹錢

半和飲子 治嬰兒變蒸於三日後三日進一服可

免百病百日内宜服

人參 去蘆 甘草 炙各半錢 白茯苓 壹錢 去皮

升麻 貳分 煨

右咬咀用水煎不以時候服稟受弱者加白朮一錢肥大壯實者不用

參杏膏 治小兒變蒸潮熱

人參 去蘆 杏仁 去皮 川升麻 煨各半錢

甘草 貳錢 炙

右為極細末百白已前每服一字用麥門冬去心煎湯食遠調服

