

ANHANG.

A.

*Nach der Krankheitsname aufgestellte
Rezeptformeln nebst
therapeutischen Winken.*

Acne rosacea.

Die lokale Behandlung entspricht in leichteren Fällen der der Acne vulgaris (s. d.). Bei höheren Graden ist Ekzkarifikation der Knoten geboten.

1. Anthrasol. 2.5,
Collod. 25.0,
S. Äusserlich.
2. Thiol. liquid. 30.0,
Glycerin.
Aq. aa. 10.0,
DS. Zum Bepinseln.
3. Naphthol β 5.0,
Sulf. praecip. 25.0,
Lanolin.,
Sap. virid. aa 10.0,
M. f. Pasta.
S. Früh und abends dick aufzutragen, nach $\frac{1}{2}$ Stunde abzuwaschen und Amylum aufzustreuen.
4. Resorcin. 4.0,
Zinci oxydat.,
Amyli aa. 1.0,
Vaselin. 40.0,
S. Wie das Vorhergehende.

附 録

A.

病名に従ひ配列せる處方

附治療的指示

酒 渣 鼻

局所療法は、軽度の場合なれば尋常性痤瘡の療法と同じ。高度のものは結節の亂刺をなす。

1. アントラゾール 2.5
コロゲウム 25.0
用法 外用 (S=Signetur)
2. 流動チオール 30.0
グリセリン
水 各 10.0
用法 塗布
3. ペーターナフトール 5.0
沈降硫黄 25.0
ラノリン
加里石鹼 各 10.0
混和して泥膏をなせ
用法 早朝及び夜間濃く塗り、半時間後洗滌して
澱粉を撒布す。
4. レゾルチン 4.0
酸化亞鉛
澱粉 各 1.0
ワセリン 40.0
用法 前者と同様

Acne vulgaris.

Wenn gesteigerte Darmfäulnis nachzuweisen, Menthol (0.6-1.0 pro die in Gelatinekapseln) oder Salimenthol (mehrmals tägl. 15-30 Tropfen). — Ausdrücken des Sebumpfröpfe.

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Resorcin. | 10.0, |
| Zinci oxydat. | |
| Talc. ven. | aa. 25.0, |
| Paraffin. liquid. | 40.0, |
| S. Salbe. | |

Bei starker entzündlicher Röte:

- | | |
|-------------------------|-------|
| 2. Lycopodii cuticolor. | 2.5, |
| Zinci oxydati | 5.0, |
| Sulfuris praecipit. | 2.5, |
| Eucerin. ad | 25.0, |
| S. Pasta. | |

Bei ganz schwerer und veralteter Akne:

- | | |
|--|----------|
| 3. Bismut. subnitr., | |
| Hydrarg. praec. alb., | |
| Ichthyol. | aa. 2.0, |
| Vaselin. | 20.0, |
| S. Vor dem Schlafengehen dick auftragen. | |
| (Schälpaste bei voluminöser Acne.) | |

- | | |
|---------------------|-----------|
| 4. Naphthol-β | 10.0, |
| Sulf. praecip. | 50.0, |
| Lanolini puriss., | |
| Sapon. virid. | aa. 25.0, |
| M. f. pasta mollis. | |

S. Pasta. (Messerrückendick 15-30 Minuten auflegen, darauf abwischen und bepudern.)

Alopecia.

Berücksichtigung des Gesamtzustandes. Tonisierende

尋常性座瘡

腸腐敗の昂進するを證明するときはメントール (0.6-1.0 一日極量を膠囊に入れて用ふ) 或はサリメントール (一日數回15-30滴)。一脂肪栓を壓出すること。

- | | |
|----------|--------|
| 1. レゾルチン | 10.0 |
| 酸化亞鉛 | |
| 滑石 | 各 25.0 |
| 流動パラフィン | 40.0 |

用法 軟膏

強き炎症性發赤に於ては

- | | |
|------------|---------|
| 2. 石松皮 | 2.5 |
| 酸化亞鉛 | 5.0 |
| 沈降硫黃 | 2.5 |
| オイツェリンを加へて | 25.0 さす |

用法 泥膏

重症の而して陳舊の座瘡には

- | | |
|----------|-------|
| 3. 次硝酸着鉛 | |
| 白降汞 | |
| イッヒチオール | 各 2.0 |
| ワセリン | 20.0 |

用法 就寝前に濃く塗る (大部の座瘡に於ては剝皮泥)

- | | |
|--------------|--------|
| 4. ナフトールベーター | 10.0 |
| 沈降硫黃 | 50.0 |
| 純ラノリン | |
| 加里石鹼 | 各 25.0 |

混和して柔軟なる泥膏となせ。

用法 泥膏(刀背大を塗り、其後洗滌して散粉する)。

禿 髮

全状態を顧慮し。強壯療法及び衛生。第一に皮脂漏を除く、それ

Behandl. und Diät. Zunächst Beseitigung der Seborrhoe (s. d.), sodann Bepinselung der Kopfhaut mit alkoholischen Mitteln, z. B.:

1. Acid. salicyl. 1.0,
Tinct. Benzoës 2.0,
Spir. vin. Gallic. 200.0,
S. Äußerlich.
2. Sulf. praecip. 1.0,
Ung. simpl. 20.0,
S. Salbe.
3. Anthrasol. 3.0,
Sulf. sublimant. 2.0,
Resorcin.
Acid. salicyl. aa. 1.0,
Lanolin.,
Vaselin.,
Ol. amygdalar. aa. 25.0,
Ol. lavand. gutt. II.
S. Z. Einreiben der Kopfhaut.

Ehrmann empfiehlt Faradisation der Kopfhaut. Reinigung der kahlen Stellen mit Benzin, hierauf Einreibung derselben mit 50%iger Trikresol-Lösung. Das zweite Mal weniger stark einreiben.

Angioma.

Exstirpation mit Messer und darauf folgende Naht, Galvanokaustik, Akupunktur, Ätzungen mit Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure; Versuch einer systematischen Behandl. mit Kohlensäureschnee. Bei Tumor cavernosus auch Injektionen von Wasserstoffhyperoxyd.

1. Hydrogen. hyperoxyd. 10.0,
S. Einige Tropfen zu injiz.

Bei flachen Geschwülsten:

からアルコール剤にて頭皮に塗布す、例へば

1. サリチル酸 1.0
安息香丁幾 2.0
フランデー酒 200.0
用法 外用
2. 沈降硫黄 1.0
單軟膏 20.0
用法 軟膏
3. アントラゾール 3.0
昇華硫黄 2.0
レゾルチン
サリチル酸 各 1.0
ラノリン
ワセリン
苦扁桃油 各 25.0
ラベンデル油 2 滴
用法 頭皮に擦入する

エールマンは頭皮に感傳電流をかけることを勧めてゐる。ペンチにて禿髪部を清淨にし、その上に 50 プロセントのトリクレゾール溶液をそれに擦入する。第二回目にはやゝ強さを減じて擦入する。

血管腫

小刀にて切除其後縫合、電気焼灼法、鍼治、硫酸、萆酸及び鹽酸にて焼灼。雪狀炭酸を以て系統的の療法を試みる。海面状腫瘍に於ては又過酸化水素の注射をなす。

1. 過酸化水素 10.0
用法 數滴を注射する

扁平腫瘍に於ては

2. Empl. adhaesiv. 10.0,
 Tart. emetic. 1.0,
 S. Auf Leder zu streichen und 8 Tage liegen
 zu lassen.

Carbunculus.

vide: Pustula maligna.

Chloasma.

vide: Ephelides.

Clavus.

vide: Tyloma.

Comedones.

Ausdrücken der Sebumpfröpfe, fortgesetztes Einpinseln
von Essig, Bepinseln mit verdünnter Salzsäure beseitigen
die schwarzen Köpfe der Comedon.

1. Spir. sap. kalin. 50.0,
 S. Zum Einreiben.
 2. Naphthol. 5.0,
 Sulf. praecip. 25.0,
 Vaseline.,
 Sapon. virid. aa. 15.0,
 M. f. ungt. S. Salbe.

Mit dieser Salbe wird das Gesicht 2-3mal wöchentlich
bestrichen und nach 10-15 Minut. (sobald leichte Röte
sichtbar und Brennen verspürt wird) abgewischt und
eingepudert. In der Zwischenzeit Behandlung mit in-
differenten Salben und Amylum. Hier und da Was-
chungen mit Spir. sapon. kalin.

S. auch Acne vulg.

Ekzema.

Entfernung der Borken nach Befettung derselben mit

2. 粘着硬膏 10.0
 吐酒石 1.0
 革の上に展ばし (て用い) 八日間放置す

カルブンケル

悪性膿疱を見よ。

褐色斑

夏日斑を見よ。

鶏眼

胼胝を見よ。

粉刺

脂肪栓を壓出するこゝ、持續して醋を塗用するこゝ、稀薄の鹽酸
を塗布して粉刺の黒色頭を除く。

1. 加里石鹼精 50.0
 用法 塗擦
 2. ナフトール 5.0
 沈降硫黄 25.5
 アセリン
 加里石鹼 各 15.0

混じて軟膏を作る、用法軟膏

此の軟膏を一週二三回顔面に塗る而して十分乃至十五分間後 (輕
度の發赤を見、灼熱を感するまゝすぐに) 洗滌して、粉末を撒布する。
間歇時には無刺激性の軟膏及び澱粉にて治療す。折々加里石鹼精に
て洗滌。

又尋常性瘰癧を見よ。

濕疹

肝油、單軟膏或は苦扁桃油にて脱脂の後痂皮を除くこゝ。沐浴、

Lebertran, Ung. simpl. od. Mandelöl; nicht baden, nicht waschen, nicht naß machen; Anwendung einer Salbe; erst später, und zwar nur im geeigneten Zeitpunkte (bei den chronischen trockeneren Formen) Schmierseife und Teer. Passender Verband. Bei akuten Ekzemen Bepinseln mit 2%iger Kokainlösung; bei heftiger Entzündung Bleiwasser- od. Resorcinumschläge, Amylumeinstreuung; bei chronischem und rezidivierendem Ekzem Berücksichtigung d. Allgemeinzustandes.

1. Ung. Diachyli (sine Ol. lavand.) 50.0,
S. Salbe (messerrückendick auf Leinwand gestrichen, 2mal täglich aufzulegen).
2. Empl. Diach. simpl.,
Vaselini aa. 50.0,
Ol. Bergamotti 1.0,
S. Salbe.
3. Thiol. liquid. 50.0,
Aq. dest. 45.0,
Glycerin. 5.0,
DS. Zum Pinseln.
4. Empyroform. 5.0,
Vaselin.,
Lanolin. aa. 25.0,
MD. Salbe.
5. Zinc. oxydat. 5.0,
Benzoës pulv. 1.0,
Axung. Porc. 30.0,
S. Salbe. (Ung. Wilsoni.)
6. Dermatol.,
Zinci oxyd. alb. aa. 2.0,
Vaselini flav. 20.0,
S. Salbe.
7. Cutoli 4.0-8.0,

洗滌、濕潤等をなす可らず。軟膏の適用。其後初めて、然かも適切なる時期に（慢性乾性の型に於ては）綠石鹼及びテール。適合せる繻帶。急性濕疹に於ては 2%のヨカイン溶液。烈しき炎症には鉛糖水罨法或はレゾルチン罨法、澱粉撒布。慢性の及び再發せる濕疹にては一般状態を顧慮する。

1. 單鉛軟膏(ラベンデル油なき) 50.0
用法 軟膏(刀背大を麻布に塗り、一日二回貼用する)。
2. 單鉛軟膏
ワセリン 各 50.0
ベルガモット油 1.0
用法 軟膏
3. 流動チオール 50.0
蒸餾水 45.0
グリセリン 5.0
用法 塗布
4. エンピロフォルム 5.0
ワセリン
ラノリン 各 25.0
混和して與ふ、軟膏
5. 酸化亞鉛 5.0
安息香酸末 1.0
家猪脂 30.0
用法 軟膏(ウイルソン氏軟膏)
6. デルマトール
白色酸化亞鉛 各 2.0
黄色ワセリン 20.0
用法 軟膏
7. クトール 4.0-8.0

Ol. olivar.	10.0,
Lanolin ad	40.0,

S. Salbe (bei nässendem akuten Ekzem, besonders des Gesichtes, der Kopfhaut und der Ohren bei Kindern).

In Fällen akuten Ekzems, wo die Haut keinerlei Salben verträgt, Amylumeinstreuungen oder

8. Oxydi Zinci.	
Cerussae	aa. 2.5,
Pulv. Talc. ven.	50.0,
S. Streupulver.	

Gegen das heftige Jucken: Eintupfen mit Spir. vini Gall. und darauf folgende Bestreuung mit Streupulver.

Bei intensiver Entzündung der Haut mit starken Schmerzen Umschläge mit Burow'scher Lösung.

Bei inveteriertem Ekzem und Verdickung des Epidermis Applikation von Schmierseife und nachträglich Salbenbehandlung.

Ekzema marginatum.

Gegen das Jucken Waschungen mit Sapo viridis, Spiritus saponatus kalinus, flüssige Glyzerinseife.

1. Chrysarobini	5.0,
Lanolin.	30.0,
Vaselini	20.0,
S. Salbe.	
2. Naphtol.	2.5,
Vaselin.	50.0,
S. Salbe.	

Ephelides.

Bei ausgebreiteten Sommersprossen des Gesichtes Bedeckung der erkrankten Stellen mit Leinwandläppchen, welche in

オリーブ油	10.0
ワノリン	加へて 40.0

用法 軟膏 (濕潤性急性濕疹、特に小兒に於ける顔面、頭皮及び耳の濕疹に用ふ)。

皮膚がどんな軟膏にも耐えない急性濕疹の場合には澱粉の撒布剤は。

8. 酸化亞鉛	
鉛白	各 2.5
滑石末	10.0
用法 撒布劑	

烈しき痒痒に對しては、ブランデー酒にて塗撫し後次いで撒布劑を撒布す。

烈しき疼痛を有する皮膚の甚だしき炎症にてはピューローの液にて瘳法する。

頑固の濕疹及び表皮の肥厚に際しては綠石鹼の適用而して後に軟膏療法。

頑 癬

痒痒に對しては加里石鹼、加里石鹼精、液狀グリセリン軟膏にて洗滌。

1. グリサロピン	5.0
ワノリン	30.0
ワセリン	20.0
用法 軟膏	
2. ナフトール	2.5
ワセリン	50.0
用法 軟膏	

夏 日 斑

顔面に於ける擴大なる夏日斑には

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Merc. sublim. corros. | 0.5, |
| Aq. dest. | 50.0, |

getaucht und durch 4 Stunden mit dieser Flüssigkeit feucht erhalten werden. Blasen seitlich anzustechen und zu entleeren. Reispuder. Statt diesser forcierten Behandlungsweise Waschen der Haut mit 1% Sublimatseife mehrm. tägl. und abends Einreiben von:

- | | |
|-------------------|-------|
| 2. Acidi salicyl. | 2.0, |
| Sap. vir. | 3.0, |
| Vaselini | 20.0, |
| S. Salbe. | |

Erythema.

Einfache od. zusammengesetzte Streupulver. Nur in manchen Fällen kalte Umschläge. Bei gleichzeitigem Fieber Chinin. Bei E. nodosum Umschläge mit verdünnt. L. Burowi.

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. Oxyd. Zinci | 5.0, |
| Amyli pur. | 30.0, |
| S. Streupulver. | |

Favus.

Wiederholt. Begießen des Favusmassen mit Öl (Lebertran) und Verreib. desselben mittelst eines steifen Borstpinsels. Entfernung der erweicht. Massen, Abwaschen mit Seife oder Seifengeist und tägl. Epilation. Einreibung mit Teer oder Salizylsäure-, Karbolsäure-, Resorcinlösung oder Petroleummisch. Röntgentherapie.

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Saponis viridis | 50.0, |
| S. Schmierseife. | |
| 2. Ichthyol. | 5.0, |
| Acid. salicyl. | 3.0, |
| Glycerin., | |

- | | |
|-------|------|
| 1. 昇汞 | 0.5 |
| 蒸餾水 | 50.0 |

の中に浸たし、四時間此の液體にて濕潤せしめたる麻布片にて患部を蔽ふ。水泡は側方を衝き、内容を出す。米粉。この烈しい療法に代りに 1%の昇汞石鹼を以て毎日數回皮膚を洗滌し、而して夜には。

- | | |
|----------|------|
| 2. サリチル酸 | 2.0 |
| 加里石鹼 | 3.0 |
| ワセリン | 20.0 |
| 用法 軟膏 | |

紅 斑

單純或は複方の撒布劑。大抵は只冷電法。同時に熱の存するときはヒニン。結節性紅斑に於ては稀薄なるピュローの溶液

- | | |
|---------|------|
| 1. 酸化亞鉛 | 5.0 |
| 純澱粉 | 30.0 |
| 用法 撒布劑 | |

黃 癬

油(乾油)を黃癬に反復注ぎ、硬毛刷子にて摩擦す。軟化物を除去し、石鹼或は石鹼精にて洗滌而して毎日脱毛。テール或はサリチル酸溶液、石炭酸溶液、レゾルチン溶液或は石油混合液にて摩擦す。レントゲン療法。

- | | |
|------------|------|
| 1. 加里石鹼 | 50.0 |
| 用法 加里石鹼 | |
| 2. イッヒチオール | 5.0 |
| サリチル酸 | 3.0 |
| グリセリン | |

Spir. vini	aa.	50.0,
S. Äußerlich.		
3. Chrysarobin		5.0,
Ac. salicyl.		2.5,
Collodii		30.0,
S. Äußerlich.		
4. Resorcini		5.0,
Vaselini		100.0,
S. Äußerlich.		

Auch Bepinselungen mit Essigsäure mit Erfolg zu verwenden. Bei Favus unbehaarter Teile Anwendung von Seife, darauf Öl und schließlich Teersalbe.

Furunculus.

Im Stadium der derben Infiltration heiße Umschläge, Thermophor, Heißluftapplikation. Rechtzeitige Eröffnung mit dem Messer, eventuell Biersche Saugbehandlung.

1. Ammon. sulfo-ichthyol. 3.0,
Hydrarg. bichl. corros. 0.1,
Vaselin. 30.0,
S. 2mal täglich einreiben (Unna).

Herpes.

Behandl. exspektativ. Während der Bläschenbildung Bestreuung mit Amylum; Einreibung mit Salimenthol-salbe.

1. Oxydi Zinci 5.0,
Amyl. pur. 30.0,
S. Streupulver.
2. Ung. Plumb. 10.0,
Ung. emollient. 20.0,
S. Salbe.

酒精	各	50.0
用法	外用	
3. クリサロビン		5.0
サリチル酸		2.5
コロザウム		30.0
用法	外用	
4. レゾルチン		5.0
ワセリン		100.0
用法	外用	

醋酸の塗用も効果あり。毛髪なき部の黄癬には石鹼、其の後油最後にテール軟膏を適用す。

瘡 瘡

強靱なる浸潤の時期には熱罨法、湯婆、熱氣適用。適当な時期に小刀にて切開、場合によつてはピールの吸引療法。

1. 硫化イッヒチオールアンモン 3.0
昇汞 0.1
ワセリン 30.0
用法 一日二回塗擦 (ウンナ)

荷 行 疹

療法は待期的。水疱形成の間は澱粉の撒布。サリメントール軟膏の塗擦。

1. 酸化亜鉛 5.0
純澱粉 30.0
用法 撒布劑
2. 鉛白軟膏 10.0
緩和軟膏 20.0
用法 軟膏

Gegen die Schmerzen bei Herpes Zoster subkutane Morphium- oder Chloroform-Injektionen oder:

- 3. Extr. Belladonn. 5.0,
- Vaselini 30.0,
- S. Salbe.

Herpes tonsurans.

Bei gering. Ausbreit. Schmierseife u. dgl. ausreichend; bei größerer Ausbreitung Seifenbäder u. nachträgl. Einreibung v. Karbol- od. Salizylsäurelösungen, hierauf Amylum. Bei Herpes tonsurans capillitii das Verfahren wie bei Favus.

- 1. Spir. sap. kal. 50.0,
S. Zum Abreiben.
- 2. Acid. salicyl.,
Spir. Lavandul. aa. 2.0,
Spir. vini Gall. 100.0,
S. Zum Einreiben.
- 3. Anthrasol. 5.0,
Vaselin. flav. 50.0,
S. Salbe.

Ichthyosis.

Ausschließl. lokale Behandlung; lauwarme, prolong. Bäder; Einreibungen mit Fett, Öl, Lebertran, Lanolin, Eucerin.

- 1. Naphtol. 2.5,
Vaselin. 20.0,
Lanolin. 30.0,
S. Einreibung.

Nach Abstoßung der verdickten Haut Einreibung mit:

- 2. Lanolin. 40.0,

帯状疱疹に於ける疼痛に對してはモルフィウム或はクロロフォルムの皮下注射或は。

- 3. ベラドンナエキス 5.0
- ワセリン 30.0

用法 軟膏

剪髮性疱疹

軽度の擴延にては綠石鹼等にて充分である。非常に擴延したるときは石鹼浴及び其後石炭酸溶液或はサリチル酸溶液の塗擦、其後澱粉。頭部の剪髮疱疹にては黄癬と同様の方法。

- 1. 加里石鹼 50.0

用法 塗擦

- 2. サリチル酸 各 2.0
- ラベンデル精 各 2.0
- ブランデー 100.0

用法 塗擦

- 3. アントラゾール 5.0
- 黄色ワセリン 50.0

用法 軟膏

魚鱗癬

全く局所療法。微温の持續浴、脂肪、油、肝油、ラノリン、オイチュリンを塗擦すること

- 1. ナフトール 2.5
- ワセリン 20.0
- ラノリン 30.0

用法 塗擦

肥厚せる皮膚の脱落后次のものを塗擦す。

- 2. ラノリン 40.0

Ol. oliv. 10.0,
S. Äußerlich.

Impetigo.

Erweichung der Borken durch Fett (Borglyzerin, Lanolin) oder Öl, sodann Bäder und Umschläge mit bloßem Wasser oder medikamentösen Zusätzen; Salben, Karbolverband.

- 1. Bismut. subnitr. 3.0,
Ung. simpl. 30.0,
S. Salbe.
- 2. Merc. praecip. alb. 2.0,
Vaselin.,
Lanolin. aa. 15.0,
S. Salbe.

Intertrigo.

In leichten Fällen Trennung der sich berührenden Hautflächen durch Gaze, Streupulver, dünn aufgelegte Zinksalbe. In Fällen von Exkorationen u. Geschwürsbildung Salben nach vorhergeh. Waschungen mit lauwarmem Seifenwasser.

- 1. Amyl. pur. 50.0,
S. Streupulver.
 - 2. Oxydi Zinci (od. Acid. borici 5.0),
Amyli pur. 50.0,
S. Streupulver.
- Streupulver eignen sich für Fälle ohne Exkorationen.
- 3. Oxydi Zinci (od. Acid. borici), 5.0,
Vaselini 50.0,
S. Salbe.
 - 4. Resorcin. alb. 1.0,

オリーブ油 10.0
用法 外用

膿 痂 疹

脂肪 (硼酸グリセリン、ラノリン) 或は油にて痂皮を軟化し、後水或は之に醫藥を加へて沐浴及び巻法。軟膏石炭酸の綿帯。

- 1. 次硝酸蒼鉛 3.0
單軟膏 30.0
用法 軟膏
- 2. 白降汞 2.0
ワセリン
ラノリン 各 15.0
用法 軟膏

間 擦 性 濕 疹 (濕 爛)

輕度の場合には接觸せる皮膚面をガーゼ、撒布劑、薄く塗れる亞鉛軟膏にて分離するこゝ。剝脱或は潰瘍形成の場合には豫じめ微温の石鹼水にて洗滌せし後軟膏。

- 1. 純澱粉 50.0
用法 撒布劑
- 2. 酸化亞鉛(或は硼酸) 5.0
純澱粉 50.0
用法 撒布劑
- 3. 酸化亞鉛(或は硼酸) 5.0
ワセリン 50.0
用法 軟膏
- 4. 白色レゾルチン 1.0

Lanolin.	20.0,
Oxyd. Zinci,	
Vaselin.	aa. 5.0,
Tumenol. salicyl.	0.1,
S. Salbe.	

Lepra.

Chaulmoogra-Öl innerlich 2.0-8.0 pro die lange Zeit hindurch oder in subkutanen Injektionen (5.0 g pro die).

Lichen.

Bei L. scrophulosorum innerlich und äußerlich Lebertran; bei L. pilaris Seifenwaschung u. Einreibung irgend einer weich. Salbe; bei L. ruber Arsenikpräparate (vide Psoriasis). Innerl. Levicowasser. Statt der innerlichen Behandlung wird Karbol-Sublimatsalbe empfohlen.

1. Acid. carbol. 20.0,
M. subl. corr. 0.5-1.0,
Ung. simpl. 500.0,
S. Mehrmals des Tages über d. ganzen Körper einzureiben. (Unna.)
2. Merc. praec. alb. 3.0,
Vaselin.,
Lanolin. aa. 15.0,
S. An den juckenden Stellen einzureiben.

Lupus.

Auskratzen mit dem scharfen Löffel, multiple, lineare Skarifikation bei lokaler Atheranästhesie; Wattedruckverband. Ätzung d. Knoten und Infiltrate, besonders im Gesichte zweimal wöchentlich mit einem gut gespitzten Lapisstifte, Einreibung der lupösen Stellen mit 3-5%iger Tuberkulinsalbe, täglich 12-15 Min. Röntgentherapie, Finsentherapie.

ラノリン	20.0
酸化亜鉛	
ワセリン	各 5.0
サリチル酸ツメノール	0.1
用法 軟膏	

癩 病

大楓子油 2.0-8.0 (一日の極量) を長く持続す或は皮下注射 (5.0 一日の極量)

苔 癬

腺病性苔癬には肝油の内服及び外用。毛髪苔癬にては石鹼にて洗滌而して何かの軟膏の塗擦。赤色苔癬に於ては砒素劑 (鱗屑疹を見よ) 内服には鐵砒水。内服療法に代りに石炭酸昇汞軟膏も勧められる。

1. 石炭酸 20.0
昇汞 0.5-1.0
單軟膏 500.0
用法 毎日數回全身に塗擦す (ウナナ)
2. 白降汞 3.0
ワセリン
ラノリン 各 15.0
用法 癢痒部に塗擦す

狼 瘡

銳匙にて搔爬、局所のエーテル麻酔にて澤山の腺状の亂刺、綿花の壓迫縛帶。結節及び浸潤特に顔面に於けるものは一週二回銳尖の硝酸銀棒にて腐蝕。3-5% のツベルクリン軟膏にて狼瘡部を塗擦す、一日十二乃至十五分。レントゲン療法。フィンセン療法。

1. Kalii caust. fusi 20.0,
S. Ätzkali.
2. Acid. lactic. 10.0,
S. Mit Pinsel od. Watte zu applizieren.
3. Acid. pyrogallici 5.0,
Vaselini 20.0,
S. Früh u. abds. einzureiben.

Morbus maculosus Werlhofii.

Regelung der Diät (frische Gemüse), Ruhe, gute Luft, Verbesserung der Wohnungsverhältnisse. Bei Nasenbluten Ausspülen mit kaltem Wasser, eventuell Tampnade; bei Bluterbrechen Eispillen.

1. Calcii chlorat. 20.0,
Syrup. spl. 40.0,
Aq. dest. ad. 400.0,
S. 2-3 stündlich 1 Eßlöffel voll.

Morpiones.

Anwendung des Mittels zur Beseitigung derselben am zweckmäßigsten des Abends; am darauffolgenden Tage ein Seifenbad,

1. Ung. Hydrarg. 5.0,
S. Salbe.
2. Merc. praecip. alb. 1.0,
Vaselini 20.0,
S. Salbe.

Naevus

vide: Angiom.

Pediculi capitis.

Mechan. Entfernung der Nisse bei kurzgeschnittenem

1. 溶液寄性加里 20.0
用法 腐蝕加里
2. 乳酸 10.0
用法 刷子或は綿を以て適用す
3. 焦性没食子酸 5.0
ワセリン 20.0
用法 早朝及び夜塗擦

ウェルホッフ氏紫斑病

食養生の整調(新鮮なる野菜)安静、善良なる空氣、居住状態を改良すること。鼻出血には冷水にて洗滌、場合によりてはタンポン。吐血には氷片

1. 鹽化カルシウム 20.0
單舍利別 40.0
蒸餾水 加へて 400.0
用法 二乃至三時間毎に一食匙

陰部虱

之を除去する薬の適用は夜が最もいい。其の翌日に石鹼浴

1. 水銀軟膏 5.0
用法 軟膏
2. 白降汞 1.0
ワセリン 20.0
用法 軟膏

母斑

血管腫を見よ

頭虱

短く剪髪せるものには虱卵を器械的に除く、婦人に於ては飽和曹

Haare, bei Frauen durch häufige Waschungen mit einer gesättigten Sodalösung. Die Parasiten werden durch mehrmaliges Einsalben des Kopfes mit

- 1. Ol. petrae 20.0,
- Ol. olivar.,
- Balsam. Peruv. aa. 10.0,
- S. Äußerlich.

(eventuell dem teureren Peruol) getötet. Hierauf wäscht man mit Spirit. saponat. kalin.

Pediculi pubis vide: Morpiones.

Pemphigus.

Bei zerstreut stehenden Blasen Streupulver (vide Ekzem); dicht gedr. Blasen zu eröffnen. Mit Krusten belegte, der Epidermis beraubte Stellen mit indiff. Salben zu bedecken. Bei entzündeter Haut kalte Umschläge. Bei P. vulgaris Bäder zu versuch. Bei P. foliaceus kontinuierl. Bad; bei P. pruriginosus protrahierte Teerbäder.

- 1. Ichthargan. 5.0,
- Tragacanthi 1.5,
- Aq. dest. ad 50.0,
- DS. Nach Abtragung der Blase auf die Wundfläche zu streich. u. mit Watte bedecken.

Pityriasis vesicolor.

Therapie. Dieselbe wie bei Herpes tonsurans (s. d.)

Prurigo.

Bei Kindern lauwarne Bäder und gleichzeitige Abreibung mit Schmierseife, nach d. Abtrocknung Einreibung mit Fett oder Lebertran; auch Sodabäder. Bei Erwachsenen kalte Bäd., Schmierseife.

遠液にて頻度に洗滌して除く。此の寄生蟲は。

- 1. 石腦油 20.0
- オリーブ油
- ペルバルサム 各 10.0
- 用法 外用

(場合によつては高價なペルオール)にて塗擦するを殺される。後加里石鹼精にて洗ふ

陰部虱 モルビオーネス 陰部虱 (第二百〇三頁)を見よ

天 疱 瘡

散在せる水疱に於ては撒布劑 (濕疹を見よ) 密接せる水疱は切開す。痂皮にて蔽はれ、表皮の消失せる部分は無刺戟性の軟膏にて蔽ふ。炎症を起せる皮膚には冷罨法。尋常性天疱瘡には浴を試む。葉狀天疱瘡には持續浴、痒疹狀天疱瘡にては持續テール浴

- 1. イッヒタルガン 5.0
- トラガカンタ 1.5
- 蒸溜水 加へて 50.0
- 用法 水疱を切れる後創面に塗り或は綿花にて蔽ふ。

癩 風

療法。剪髮癩疹に於けると同様、参照

痒 疹

小兒に於ては微温浴、同時に綠石鹼にて塗擦し、これが乾ける後脂肪或は乾油の塗擦、又曹達浴。大人に於ては冷浴、綠石鹼。

1. Bals. Peruvian.,
Glycerin. aa. 25.0,
S. Mit. Pins. aufzutragen.
2. Naphtoli 10.0,
Axung. Porc. 100.0,
S. Salbe. (Ung. Naphtol. simplex.)
3. Acid. carbol. 1.0,
Glycerin. 10.0,
Aq. dest. 100.0,
S. Zu Waschungen.

Pruritus vulvae.

Ermittlung der Ursache (Blennorrhöe, Carcinoma uteri, Diabetes!), Behandl. etwaiger Ekzeme der Genitalien. Ichthyoltampons. Bei Anämie Eisenpräparate, Levicowasser. Innerlich Brom.

1. Pittylen. 0.2-2.0,
Cocain. mur. 0.02,
Ol. Cacao 6.0,
M. f. bol.
S. Vaginalkugeln.
2. Adrenalin. 1% 3.0,
Lanolin. 8.0,
Vaselin. 12.0,
S. Salbe.

Psoriasis.

Warme Bäder u. Einpackungen, systematische Einreibungen mit Schmierseife; zweimal tägl. durch 3 Tage, einmal täglich durch 6 Tage, sodann nach fünftägiger Pause am 14. Tage ein Bad (Schmierseifenzyklus); an d. behaarte Kopfhaut Spir. sapon.

1. Saponis virid. 100.0,

1. ヘルバルサム
グリセリン 各 25.0
用法 刷子にて塗用
2. ナフトール 10.0
豚脂 100.0
用法 軟膏 (ナフトール単軟膏)
3. 石炭酸 1.0
グリセリン 10.0
蒸餾水 100.0
用法 洗滌

陰部 瘙 痒。

原因 (淋疾、子宮癌、糖尿病) の發見、從つて起る生殖器の濕疹の治療、イッヒチオールのタンボン。貧血に於ては鐵劑、砒鐵水、内服には臭素。

1. ヒチーレン 0.2-2.0
鹽酸コカイン 0.02
カカオ油 6.0
混和して巨丸となせ
用法 陰球
2. アドレナリン 1% 3.0
ラノリン 8.0
ワセリン 12.0
用法 軟膏

鱗 屑 疹

溫浴及び纏包、綠石鹼にて系統的に塗擦す。即ち三日間は一日二回、六日間は一日一回、それから五日の間歇をおいて十四日目には沐浴 (綠石鹼周期) 有髮頭皮には石鹼精。

1. 加里石鹼 100.0

S. Schmierseife.

- | | |
|--------------|--------|
| 2. Naphtoli | 15.0, |
| Axung. Porc. | 100.0, |
| S. Salbe. | |

Sehr wirksam ist Ung. Wilkinsii nach Hebras Modifikat.:

- | | |
|-------------------|------------|
| 3. Sulf. citrin., | |
| Ol. Fagi | aa. 50.0, |
| Sapon virid., | |
| Axung. porci | aa. 100.0, |
| Pulv. cret. alb. | 10.0, |

S. Durch 6 Tage täglich 2mal mittelst Borstenpinsels einzureiben, am 10.-12. Tage 1 Bad.

- | | |
|-----------------|-------|
| 4. Anthrarobin. | 10.0, |
| Alcohol. | 90.0, |

S. Zum Einpinseln. (Auch im Gesichte anwendbar.)

Pustula maligna.

Kauterisation d. Infektionsstelle mit Kali caust., Salpetersäure od. Paquelins Thermokauter. Auch tiefe Kreuzschnitte. Antiseptische Wundbehandlung. Umschläge von Karbolgaze in 1/2-2%ige warme Karbollösung getaucht.

Scabies.

Nach einem halbstünd. Seifenbade Einreibung mit einer der folgenden Salben früh u. abends durch 2-4 Tage nebst Einhüll. in wollene Decken; hierauf ein Reinigungsbad. Allenfalls zurückbleibende Ekzeme nachträglich zu behandeln.

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Florum sulf. | |
| Olei Cadini | aa. 20.0, |

用法 緑石鹼

- | | |
|----------|-------|
| 2. ナフトール | 15.0 |
| 豚脂 | 100.0 |

用法 軟膏

甚だ有效なるはヘブラの變法によるウイルキンソン軟膏である。

- | | |
|---------|---------|
| 3. 黄色硫黄 | |
| 山毛櫸油 | 各 50.0 |
| 加里石鹼 | |
| 豚脂 | 各 100.0 |
| 白聖劑 | 10.0 |

用法 六日間は一、二回刷子にて塗擦す、十日乃至十二日に一浴。

- | | |
|------------|------|
| 4. アントラロビン | 10.0 |
| アルコール | 90.0 |

用法 塗用 (顔面にも適用す)

悪性膿疱

苛性加里、硝酸或はパケランの焼灼器にて傳染部を焼灼す。又深き十字切開。制腐的創傷治療。1/2-2%の温石炭酸溶液に浸したるカルボールガーゼにて覆法

疥癬

半時間の石鹼浴の後次の軟膏の一を以て二乃至四日間早朝及び夜間に塗擦し、毛布にて纏包す。後浴をこりて清淨にする。常に残存する濕疹は後より治療す。

- | | |
|--------|--------|
| 1. 硫黄花 | |
| カデヌム油 | 各 20.0 |

- | | |
|-------------------|---|
| Cretae albae | 2.0, |
| Saponis viridis, | |
| Axung. Porci | aa. 40.0, |
| S. zum Einreib. | (Wilkinsonsche Salbe mod. von Hebra.) |
| 2. Naphtholi | 15.0, |
| Axung. Porc. | 100.0, |
| Sapon virid. | 50.0, |
| Cretae alb. p. | 10.0, |
| S. Zum Einreiben. | (Ung. Naphtholi comp.; eine einmalige Einreibung genügt.) |

Seborrhoea.

Entfernung der Borken nach hinlänglicher Erweichung derselben mit Öl etc.; Waschung mit flüssiger Glycerinseife, Seifenwasser oder Spir. sapon. kalinus; Befettung und Waschung mit nachfolgenden Mitteln später fortzusetzen, bis zur Sistierung d. Borkenbildung.

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Plumb. carbon. | 10.0, |
| Ung. emoll. | 50.0, |
| S. Salbe. | |
| 2. Sapon. viridis | 50.0, |
| Spir. vini conc. | 20.0, |
| Spir. Lavandul. | 5.0, |
| S. Zum Einreiben. | (Spir. saponis kalinus.) |

Sudamina.

Bestreuung mit Amylum, Semen Lycopodii oder Alumen plumosum pulver.; jede andere Medikation überflüssig, Reizmittel schädlich.

Sykosis.

Erweichung vorhand. Borken mit Fett und Beseitigung

- | | |
|----------|------------------------------|
| 白堊 | 2.0 |
| 加里石鹼 | |
| 豚脂 | 各 40.0 |
| 用法 | 塗擦 (ヘブラの變法せるウイルクソン軟膏) |
| 2. ナフトール | 15.0 |
| 豚脂 | 100.0 |
| 加里石鹼 | 50.0 |
| 精製白堊 | 10.0 |
| 用法 | 塗擦 (複方ナフトール軟膏、一回の塗擦にて充分である)。 |

皮 脂 漏

油等を以て充分軟化せし後痂皮を除くこま。液状のグリセリン石鹼、石鹼水或は加里石鹼にて洗滌。痂皮形成のやむ迄其後次の薬にて塗脂し洗滌す。

- | | |
|---------|------------|
| 1. 炭酸鉛 | 10.0 |
| 緩和軟膏 | 50.0 |
| 用法 | 軟膏 |
| 2. 加里石鹼 | 50.0 |
| コンニヤック | 20.0 |
| ラベンデル精 | 5.0 |
| 用法 | 塗擦 (加里石鹼精) |

汗 疹

澱粉、石松子或は石綿粉末を撒布す。他の醫薬は餘計なこまである。刺戟薬は有害。

鬚 瘡

脂肪にて現存する痂皮を軟化し、それを除く。綠石鹼及び石鹼精

derselb.; Waschungen m. Schmierseife u. Spiritus saponatus. Täglich Rasieren und Epilieren. Bedeckung der Haut mit Salbe. Abschaben mit d. scharfen Löffel empfohlen; Röntgentherapie.

1. Ung. Diachyl. 30.0,
S. Messerrückendick auf Leinwand aufzu-
streichen und über Nacht aufzulegen.
2. M. praec. alb. 2.0,
Lanolin. 15.0,
Vaselin. 5.0,
S. Salbe. (Wie das vorige.)
3. Anthrasol. 40.0,
S. Äußerlich.

Tyloma.

Abtragen der harten Epidermis und Ausschneiden des Hühnerauges mit darauffolgender Anwendung von Salben. In neuester Zeit wurde von Roesen folgendes Verfahren empfohlen: „Das zu entfernende Gebilde wird mit einer aseptischen Lösung (Bor oder Salizyl) etwas befeuchtet, dann mit einer ziemlich dicken (0.4-0.5 cm) Lage reiner, kristallinischer Salizylsäure bedeckt; darauf gibt man als reizlosestes Verbandmittel feuchten Borlint, vielfach zusammengelegt, darüber ein gut deckendes Stück Guttapercha, so daß das Objekt nach allen Seiten gehörig abgeschlossen ist, u. verbindet. Dieser Verb. bleibt bei nicht zu dicken Hühneraugen, Schwielen, nicht zu großen Warzen nur 5 Tage liegen.“

1. Merc. praec. alb. 2.0,
Ung. emollient. 20.0,
S. Salbe (mit Guttaperchapapier u. dgl.
bedeckt).
2. Ung. Diachyl. 20.0,

にて洗滌。毎日剃毛し、脱毛す。軟膏を以て皮膚を蔽ふ。鋭匙にて削去することも勤むるを得。レントゲン療法。

1. 單鉛膏 30.0
用法 刀背大を麻布にのばし、夜間中之を置く。
2. 白降汞 2.0
ラノリン 15.0
ワセリン 50.0
用法 軟膏 (前者の如くす)
3. アントラゾール
用法 外用

胼 胝

硬き表皮の切除及び鶏眼の切斷、然る後軟膏の適用。近時レーゼンから次ぎの方法を勧められる。除く可き生産物を消毒液 (硼酸或はサリチール) にて少しく濡らし、それから稍厚き (0.4-0.5 cm) 純粹の結晶サリチール酸にて蔽ふ。其の上に無刺戟性の繃帯材料とし、て濕潤せる硼酸リント布を澤山積み重ね、其の上に能く被蔽するグッタペルカをおく、故にこの對象物はあらゆる方面から閉ち込められて、繃帯されてゐる。この繃帯は餘り大ならざる鶏眼、胼胝、餘り大ならざる疣贅には只五日間放置すればよい。

1. 白降汞 2.0
緩和軟膏 20.0
用法 軟膏 (グッタペルカ等にて蔽ふ)
2. 單鉛膏 20.0

S. Salbe. Täglich, auf Leinwandläppch gestrichen, frisch aufzutragen bis zur Erweichung der Epidermis.

- 3. Acid. salicyl.,
- Acid. lact. aa. 1.0,
- Ung. cerei 8.0,
- S. Salbe.

Urticaria.

Berücksichtigung des Kausalmomentes, Sodabäder, Alaunbäd., kalte Bäder. Bei hartnäckigen Formen Atropin innerlich.

Gegen d. Jucken Abwaschung mit kaltem Wasser, spirituösen Flüssigkeiten. Hernach Einstreuen mit Puder.

- 1. Spir. vin. Gall. 100.0,
- S. Zum Betupfen der juckenden Teile.
- 2. Acid. acet. 5.0,
- Spir. vin. 200.0,
- S. Äußerlich.
- 3. Chloral. hydrat. 5.0,
- Ol menth pip. 1.0,
- Spirit. vini ad 200.0,
- S. Äußerlich.

Verruca.

Abrasio im Niveau der Haut. Ätzung der Stelle mit:

- 1. Acid. nitr. fumant. 5.0,
- S. Äusserlich.

Wiederholte Ätzung ohne Abtragung mit:

- 2. Acid. carbol. liquef. 5.0,
- S. Äußerlich.
- 3. Chloral.,

用法 毎日、麻布片に塗り、表皮の軟化する迄新らに載せる。

- 3. サリチル酸
- 乳酸 各 1.0
- 蠟軟膏 8.0
- 用法 軟膏

蕁麻疹

原因的關係を顯慮するこゝ、曹達浴、明礬浴、冷水浴。頑固のものにはアトロピンの内服。

癢痒に對しては冷水、酒精にて洗滌。後粉末を撒布す。

- 1. フランデー酒 100.0
- 用法 癢痒部に塗布
- 2. 醋酸 5.0
- 酒精 200.0
- 用法 外用
- 3. 抱水クロラール 5.0
- 薄荷油 1.0
- 酒精 加へて 200.0
- 用法 外用

疣贅

皮膚の表面にて剝除。次のものにて其場所を腐蝕する。

- 1. 發烟硝酸 5.0
- 用法 外用
- 切除せず次のものにて反復腐蝕す。
- 2. 溶解石炭酸 5.0
- 用法 外用
- 3. クロラール

Acid. acetic. aa. 1.0,
Acid. salicylic.,
Aether. aa. 4.0,
Collodii 15.0,

S. Zur tägl. Einpinselung.

Bei zahlreichen Verrucae jugendlicher Individuen wird
Sol. Fowleri in steigender und fallender Dosis (2-15-2
Tropfen täglich) empfohlen.

醋酸 各 1.0
サリチール酸
エーテル 各 4.0
コロゲウム 15.0

用法 毎日塗布す。

青年に於ける無数の疣贅に於てはフォーレル液を量を高め後低め
て用ふるこそが勧められる (2-15-2滴)

B.

Nach dem pharmazeutischen Form
aufgestellte Rezepte.

I. Streupulver.

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Zinc. oxydat. | |
| Amyl. | aa. |
| 2. Oxydi zinci | |
| Cerussae | aa. 2.5, |
| Pulv. Talci ven. | 50.0, |
| 3. Zinc. oxyd. | |
| Amyl. | |
| Talc. | aa. 30.0, |
| Magnes. carbonic. | 10.0, |
| 4. Aïrol „Roche“ | 10.0, |
| Talc. | 90.0, |
| 5. Tannoform | 10.0, |
| Talc. | 20.0, |

II. Pasten und Pflaster.

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Zinc. oxyd. | 25.0, |
| Amyl. | 1.5, |
| Vaselin | |
| Lanolin | aa. 1.0, |
| (Lassar's Paste) Sommer. | |
| 2. Anthrasol | 10.0, |
| Eucerin | 90.0, |
| 3. Zinc. oxyd. | |
| Amyl. | |
| Vaselin. | |
| Lanolin. | aa. |

B.

薬形に従ひ配置せる處方

1. 撒布劑

- | | |
|---------------|--------|
| 1. 酸化亞鉛 | |
| 澱粉 | 各等分 |
| 2. 酸化亞鉛 | |
| 鉛白 | 各 2.5 |
| 滑石 | 50.0 |
| 3. 酸化亞鉛 | |
| 澱粉 | |
| 滑石 | 各 30.0 |
| 炭酸マグネシア | 10.0 |
| 4. アイロール ロッシュ | 10.0 |
| 滑石 | 90.0 |
| 5. タンノフォルム | 10.0 |
| 滑石 | 20.0 |

2. 泥膏及び硬膏

- | | |
|--------------|-------|
| 1. 酸化亞鉛 | 25.0 |
| 澱粉 | 1.5 |
| ワセリン | |
| ラノリン | 各 1.0 |
| (ラッサールの泥膏) 夏 | |
| 2. アントラゾール | 10.0 |
| オイチェリン | 90.0 |
| 3. 酸化亞鉛 | |
| 澱粉 | |
| ワセリン | |
| ラノリン | 各等分 |

(Lassar's Paste) Winter.

- 4. Zinc. oxyd. 6.0,
- Sulfur. praecip. 4.0,
- Terr. Siliceae 2.0,
- Adep. benzoat. 28.0,

(Unna's Zinkschwefelpaste)

- 5. Zinc. oxyd. 10.0,
- Terr. Siliceae 2.0,
- Adep. benzoat. 28.0,

(Unna Zinkpaste)

- 6. Kali caust.
- Calcis vivae aa 20.0,
- Spir. vini conc. q. s.

(Wiener Aetzpaste)

- 7. Zinc. oxyd.
- Amyl. aa 4.0,
- Oesyphi
- Ol. oliv aa 3.0,

(Berliner Paste)

- 8. Acid. salicylic 1.0,
- Zinc. oxyd.
- Amyl aa 12.0,
- Vaselin 25.0,

(Lassar's Salicylpaste)

- 9. Tumenol 5.0,
- Acid. salicylic. 1.0,
- Zinc. oxyd.
- Amyl. aa 12.0,
- Vaselin 25.0,

(Neisser's Tumenol-Salicylpaste)

- 10. Naphtol (β-Naphtol) 10.0,
- Sulfur. praecip. 50.0,
- Vaselin.

(ラッサールの泥膏) 冬

- 4. 酸化亜鉛 6.0
- 沈降硫黄 4.0
- 無水珪酸 2.0
- 安息香酸豚脂 28.0

(ウンナの亜鉛硫黄泥膏)

- 5. 酸化亜鉛 10.0
- 無水珪酸 2.0
- 安息香酸豚脂 28.0

(ウンナ亜鉛泥膏)

- 6. 苛性加里
- 生石灰 各 20.0
- コンニャック 適量

(ヴェイーン腐蝕泥膏)

- 7. 酸化亜鉛
- 澱粉 各 4.0
- エジューブス
- オリーブ油 各 3.0

ベルリン泥膏

- 8. サリチル酸 1.0
- 酸化亜鉛
- 澱粉 各 12.0
- ワセリン 25.0

(ラッサール氏サリチール泥膏)

- 9. ツメノール 5.0
- サリチル酸 1.0
- 酸化亜鉛
- 澱粉 各 12.0
- ワセリン 25.0

(ナイセル氏ツメノールサリチル泥膏)

- 10. ナフトール (ベーターナフトール) 10.0
- 沈降硫黄 50.0
- ワセリン

- Sap. virid. aa 25.0,
(Lassar's Schälpaste)
11. Resorcin purissim
Past. zinc. vulgar Unnae aa 10.0,
(Unna's Schädelpaste)
12. Anthrasol 5-20%
Lassar's Paste
13. Anthrasol 5-20%
Zinkschwefelpaste
14. Chrysarobin 2-5%
Anthrasol 10.0,
10% Salicylseifenpflaster Ad 100.0,
15. Desinfectol 5.0-20.0,
Unna's Zinkschwefelpaste ad 100.0,
16. Desinfectol 20.0,
Pic. liquidae (Teer) 5.0,
Sulfur. 15.0,
Ung. zinc. vulg. Unnae ad 100.0,
17. Formalin 1.0,
Tannoform
Talc. aa 5.0,
Zinc. oxyd.
Amyl. aa 25.0,
Vaselin
Lanolin aa 20.0,
18. Formalin 5.0,
Lanolin 10.0,
10% Salicylseifenpflaster ad 100.0,
19. Ichthyol
Anthrasol aa 5.0-10.0,
10% Salicylseifenpflaster ad 100.0,

- 加里石鹼 各 25.0
(ラッサール氏剥皮泥膏)
11. 純レゾルチン
ウンナ氏尋常亞鉛泥膏 各 10.0
(ウンナ氏剥皮泥膏)
12. アントラゾール 5-20%
ラッサール氏泥膏
13. アントラゾール 5-20.0%
硫亞鉛泥膏
14. クリサロビン 2-5%
アントラゾール 10.0
10% サリチル酸石鹼硬膏 加へて 100.0
15. デシンフェクトール 5.0-20.0
ウンナ氏硫亞鉛膏 加へて 100.0
16. デシンフェクトール 20.0
テール 5.0
硫黄 15.0
ウンナ氏尋常亞鉛軟膏 加へて 100.0
17. フォルマリン 1.0
タンノフォルム
滑石 各 5.0
酸化亞鉛
澱粉 各 25.0
ワセリン
ラノリン 各 20.0
18. フォルマリン 5.0
ラノリン 10.0
10% サリチル酸石鹼硬膏 加へて 100.0
19. イッヒチオール
アントラゾール 各 5.0-10.0
10% サリチル酸石鹼硬膏 加へて 100.0

- | | | |
|-----|---------------------------|-----------|
| 20. | Ichthyol | 1.0, |
| | Zinc. oxyd. | |
| | Amyl. | aa 12.0, |
| | Vaselin | 25.0, |
| 21. | Acid. salicylic | 2.5-10.0, |
| | Zinc. oxyd. | 60.0, |
| | Ol. oliv. | ad 100.0, |
| 22. | Pic. liquidae | 5.0, |
| | 10% Salicylseifenpflaster | ad 100.0, |
| 23. | Zinc. oxyd. | 70.0, |
| | Ol. oliv. | 30.0, |
| | (Sommer) | |
| 24. | Zinc. oxyd. | 60.0, |
| | Ol. oliv. | 40.0, |
| | (Winter) | |

III. Zinkleim.

- | | | |
|----|--------------|--------|
| 1. | Gelat. albae | 30.0, |
| | Zinc. oxyd. | 50.0, |
| | Glycerin | 20.0, |
| | Aquae | 100.0, |
| 2. | Zinc. oxyd. | 25.0, |
| | Ichthyol | 2.5, |
| | Glycerin | 10.0, |
| | Gelat. albae | 15.0, |
| | Aquae | 50.0, |

IV. Salben.

- | | | |
|----|-------------------|-------|
| 1. | Acid. salicylici | 2.0, |
| | Acid. suill. | 4.0, |
| | Lanolin. | 16.0, |
| 2. | Extrac. Belladon. | 1.0, |
| | Lanolin | 9.0, |

- | | | |
|-----|---------------|-----------|
| 20. | イッヒチオール | 1.0 |
| | 酸化亜鉛 | |
| | 澱粉 | 各 12.0 |
| | ワセリン | 25.0 |
| 21. | サリチル酸 | 2.5-10.0 |
| | 酸化亜鉛 | 60.0 |
| | オリーブ油 | 加へて 100.0 |
| 22. | テール | 5.0 |
| | 10% サリチル酸石鹼硬膏 | 加へて 100.0 |
| 23. | 酸化亜鉛 | 70.0 |
| | オリーブ油 | 30.0 |
| | (夏) | |
| 24. | 酸化亜鉛 | 60.0 |
| | オリーブ油 | 40.0 |
| | (冬) | |

3. 亜鉛膠

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | 白阿膠 | 30.0 |
| | 酸化亜鉛 | 50.0 |
| | グリセリン | 20.0 |
| | 水 | 100.0 |
| 2. | 酸化亜鉛 | 25.0 |
| | イッヒチオール | 2.5 |
| | グリセリン | 10.0 |
| | 白阿膠 | 15.0 |
| | 水 | 50.0 |

4. 軟膏

- | | | |
|----|----------|------|
| 1. | サリチル酸 | 2.0 |
| | 豚脂 | 4.0 |
| | ワノリン | 16.0 |
| 2. | ベラドンナエキス | 1.0 |
| | ワノリン | 9.0 |

3.	Lanolini	20.0,
	Jodform.	2.0,
	Coffeae tost.	1.25,
	Axung	2.5,
4.	Ichthyol	2.0,
	Lanolin	18.0,
5.	Kalii jodat.	1.0,
	Adipis lanae	7.0,
	Axung. benzoat.	2.0,
	M. f. Ungt. Bohnengroß einzur.	
6.	Ol. oliv.	100.0,
	Cerae flavae	40.0,
7.	Cerae flavae	15.0,
	Adep.	85.0,
8.	Zinc. oxyd.	20.0,
	Adep. benzoat.	80.0,
	(Willson's Zinksalbe)	
9.	Pyrogallol	
	Ichthyol	aa 5.0,
	Acid. salicyl.	3.0,
	Vaselin	100.0,
10.	Resorcin	
	Ichthyol	aa 5.0,
	Acid. salicyl.	3.0,
	Vaselin	100.0,
11.	Chrysarobin	
	Ichthyol.	aa 5.0,
	Acid. salicyl.	3.0,
	Vaselin	100.0,
12.	Styrac	
	Sulfur.	aa 20.0,
	Sap. virid.	
	Vaselin	aa 40.0,

3.	ラノリン	20.0
	ヨードフォルム	2.0
	珈琲	1.25
	豚脂	2.5
4.	イッヒチオール	2.0
	ラノリン	18.0
5.	沃度加里	1.0
	獸脂	7.0
	安息香脂	2.0
	混和して軟膏を作れ	蠶豆大を塗布
6.	オリーブ油	100.0
	黄臘	40.0
7.	黄臘	15.0
	豚脂	85.0
8.	酸化亞鉛	20.0
	安息香脂	80.0
	(ウイilson氏亞鉛軟膏)	
9.	ピロカルロル	
	イッヒチオール	各 5.0
	サリチル酸	3.0
	ワセリン	100.0
10.	レゾルチン	
	イッヒチオール	各 5.0
	サリチル酸	3.0
	ワセリン	100.0
11.	クリサロピン	
	イッヒチオール	各 5.0
	サリチル酸	3.0
	ワセリン	100.0
12.	蘇合香	
	硫黃	各 20.0
	綠石鹼	
	ワセリン	各 40.0

	Cretae	10.0,
	(Willkinson's Styraxsalbe)	
13.	Ol. rusci	
	Sulfur.	aa 20.0,
	Sap. virid.	
	Vaselin	aa 40.0,
	Cretae	10.0,
14.	Emplastr. Lithargyri simpl.	
	Ol. oliv.	aa.

V. Kosmetica.

Kosmetica der Haut.

1.	Boracis	10.0,
	Glycerin	50.0,
	Aq. rosar.	250.0,
	Spirit.	20.0,
	Ol. Rosae	gtt. I.
2.	Alkohol	40.0,
	Glycerin	40.0,
	Aq. destil.	100.0,
	Kal. caustic.	1.0,
	Ol. Bergamott.	X gtt.
	(Baelz's Hautwasser)	

Haarmittel.

1.	Acid. carbolie	5.0,
	Acid. salicyl.	6.0,
	Vaselin	40.0,
	Ol. Bergamott.	X gtt.
2.	Tinc. cantharid.	10.0,
	Tinc. benz.	10.0,
	Alkohol	10.0,
	Glycerin	10.0,
	Acid. salicyl.	1.0,
	Ol. Bergamott.	X gtt.

	白堊	10.0
	(ウイルキンソン氏蘇合香軟膏)	
13.	樺木テール	
	硫黄	各 20.0
	加里石鹼	
	ワセリン	各 40.0
	白堊	10.0
14.	單鉛硬膏	
	オリーブ油	等分

5. 美容劑

皮膚の美容劑

1.	硼砂	10.0
	グリセリン	50.0
	薔薇水	250.0
	酒精	20.0
	薔薇油	一滴
2.	アルコール	40.0
	グリセリン	40.0
	蒸溜水	100.0
	苛性加里	1.0
	ベルガモット油	十滴
	(ベルツ氏皮膚水)	

毛髮劑

1.	石炭酸	5.0
	サリチル酸	6.0
	ワセリン	40.0
	ベルガモット油	十滴
2.	苧蓉丁幾	10.0
	安息香丁幾	10.0
	アルコール	10.0
	グリセリン	10.0
	サリチル酸	1.0
	ベルガモット油	十滴

C.

Kosmetica (Schönheitsmittel).

Kosmetica nennt man Medikamente zur Erhaltung, Pflege und Verbesserung von Aussehen und Funktion der äußeren Körperanteile, der Haut, der Haare, des Mundes und der Zähne.

A. Kosmetik der Haut.

1. Fette. Mandel-, Oliven-, Vaselineöl, Kakaobutter, Lanolin, Unguentum emolliens, ferner u. a. z. B.:

Lanolinpomade:

Lanolini anhydr. p.	80.0,
Ol. Cacao	20.0,
Liquata misce et adde:	
Ol. Rosae guttas II.	

Lanolinmilch:

Lanolini p.	10.0,
Boracis	1.0,
Aq. Rosar.	100.0,

Cold-Cream:

Cerae albae,	
Cetacei aa. g.	20.0,
Ol. Amygdal.	180.0,
Aq. flor. Aurant.,	
Aq. Rosae	aa. 90.0,
Ol. Rosae,	
Ol. Geranii	aa. gtt. 12,
Ol. Amygd. amar. aeth.	gtt. 1,
Ol. Bergamott.	gtt. 4,

C.

美容劑

美容劑は外部の身體部分、皮膚、毛髪、口及び齒の外見及び機能を維持し、涵養し、良好ならしむる藥である。

A. 皮膚の化粧藥

1. 脂肪類、扁桃油、オリーブ油、ワセリン油、カカオ酪、ラノリン、緩和軟膏、更らに其他例へば。

ラノリンボマード

無水ラノリン	80.0
カカオ油	20.0

液を混じり而して

薔薇油 二滴 を加へよ

ラノリン乳

純ラノリン	10.0
硼砂	1.0
薔薇水	100.0

コールドクリーム

白蠟	
鯨腦	各 20.0 グラム
扁桃油	180.0
燈花水	
薔薇水	各 90.0
薔薇油	
メラニウム油	各 十二滴
揮發苦扁桃油	一滴
ベルガモット油	四滴

Ol. Neroli gtt. 3,

2. **Glycerin** zu Waschungen u. Einreibungen bei Rhagadenbildung an den Händen.

3. **Spirituöse Mittel.** Waschungen mit Franzbranntwein, pur oder verdünnt.

4. **Harze und Balsame** (Teerpräparate), Perubalsam, flüssiger Storax, Benzoe und verharzter Tolubalsam.

5. **Alkalische Mittel.**

a) Seifen. Toiletteseifen, ferner Spiritus Saponis kalinus. Zur Parfümierung der Seifen dienen die oben angeführten Duftmittel und zur Färbung verschiedene Stoffe (Zinnober, Ultramarin etc.) Waschen der Haut mit Spirit. saponatus nach vorherigem Einreiben mit Crème céleste fördert wesentlich ihre Schönheit.

Seifencrème:

Sapon. kal. alb.	20.0,
Spirit. vin.	5.0,
Ol. Amygdal. q. s.	

Lait des Roses:

Rasurae Sap. oleacei	14.0,
Cetacei	14.0,
Cerae alb.	14.0,
Aq. Rosae	1113.0,
Furf. Amygd.	250.0,
Ol. Rosae	1.0,

Ein Waschmittel für zarthäutige Teile ist Tet. Quillajae, mit etwas Bergamottenöl und der fünffachen Wassermenge verdünnt.

b) Boraxlösungen, z.B.:

Lotio cosmetica:

Natr. borac.	g. 2.0-4.0,
Aq. Ros.	100.0,
Tet. Benz.	1.0,

ネロリ油 三滴

2. 手に於ける皸裂形成に際してはグリセリンを洗淨或は塗布用に供す。

3. **酒精劑**、純粹に或は薄めてブランデー酒にて洗淨。

4. **ハルツ及びバルサム** (テール劑) ハルバルサム、液狀蘇合香、安息香、ハルツ化せるトルバルサム。

5. **アルカリ劑**

a) **石鹼** 化粧石鹼、更らに加里石鹼精。石鹼に香氣を與ふるには上述の香藥而して之を染むるには種々の物質を用ふ(朱、紺青等)。豫じめヨールドクリームにて塗擦せし後、石鹼精にて皮膚を洗へば眞に其の美を増す。

石鹼クリーム

白色加里石鹼	20.0
酒精	5.0
扁桃油	適量
薔薇レート	
オリーブ油石鹼刮屑	14.0
鯨腦	14.0
白臘	14.0
薔薇水	1113.0
扁桃フルフラン	250.0
薔薇油	1.0

繊弱なる皮膚部分の洗滌薬は、少量のベルガモット油を加へ、五倍の水にて薄めたるクイルラヤチンキである。

b) 硼砂溶液 例へば

洗滌美容劑

硼砂	2.0-4.0 グラム
薔薇水	100.0
安息香丁酸	1.0

c) Kohlensäure und ätzende Alkalien (gegen abnorme Fettabscheidung und Comedonen), z. B.:

Schönheitswasser:

Kali carbon.	g. 2.0,
Tet. Benz.	10.0,
Aq. Ros.	200.0; 1 EBl. dem

Waschwasser beizumischen.

6. Schwefelpräparate bei Akne, Sykosis etc. S. diese.
7. Säuren. Essig- und Zitronensäure gegen Pigment- und andere Hautflecken; ferner Chromsäure zur Beseitigung stinkender Fußschweiße.
8. Jodpräparate werden vorzugsweise zur Heilung von Frostbeulen verwertet (Jodtinktur, Jodglyzerin, Jodcollodium).
9. Deck- und Färbemittel (Schminken). Zu weißen Schminken werden feine Stärkemehlsorten, venetianischer Talk etc., verwendet. Rote Schminken werden durch inniges Mischen der Deckmittel mit Karmin, Safflorrot, Krapplack bereitet.

B. Mittel zur Verschönerung des behaarten Teiles des Kopfes. (Kosmetik der Haare.)

1. Mittel gegen trockene und spröde Haare (Haaröle und Haarpomaden); O. Amygd., Ol. Olivar. provinc., Ol. Avellanae, Ol. Sesami, Lanolin u. a. Fette mit den oben geschilderten Duftmitteln. Weiters Rosenpomade, Vanillen-, Jasmin- und andere Pomaden, welche mit duftenden Fettextrakten versetzt werden.

2. Mittel, die Haare zu fixieren und zu formen.

Brillantine liquide:

Glycerini,
Olei Ricini,

c) 炭酸及び腐蝕アルカリ (異常の脂肪排泄及び粉刺に對して) 例へば

美容水

炭酸加里	2.0 グラム
安息香丁幾	10.0
薔薇水	200.0

一食匙を洗滌水に混す。

6. 硫黄劑は座瘡、鬚瘡等に用ふ、其條參照
7. 酸類 醋酸或は枸橼酸は色素斑或は他の皮膚斑に對して用ふ。更らにクロム酸は足汗を除くために用ふ。
8. 沃度劑は特に凍瘡の治癒に適用される (沃度丁幾、沃度グリセリン、沃度コロザウム)
9. 顔料 白色の顔料には微細なる澱粉類、ヴェネチアの滑石等が適用せらる。赤色の顔料は被粧劑をカルミン、サフラン赤、潤脂と密に混合して作る。

B. 頭部有髮部の美容劑(毛髮の美容劑)

1. 乾燥し、脆弱なる毛髮に對し用ふる藥劑 (毛髮油及び毛髮ボマード) 扁桃油、オリーブ油、樺實油、胡麻油、ラノリン等、上述の香氣藥を有する脂肪。尚薔薇ボマード、ヴァニリンボマード、素馨ボマード及び芳香ある脂肪エキスを加へたる他のボマード。

2. 毛髮を固定し、形を賦與する藥劑。

最上液

グリセリン
蓖麻子油

Alkohol. aa. p. aeq.,
Olei odor. q. s.

3. Mittel zur Entfernung von Kopfschuppen. (S. Seborrhoea.)

4. Haarwuchsmittel. (S. Alopecia.)

5. Entfernung von Haaren an naturgemäß unbehaarten Stellen. Mechanisch durch Ausreißen derselben mittelst einer Cilienpinzette, durch Elektrolyse (höchstens 12 Haare in Intervallen von 1 bis 2 Wochen); mit Röntgenstrahlen.

6. Haarfärbemittel. a) Vegetabilische Haarfärbemittel: Grüne Walnußschalen u. a. m.; wenig wirksam.

b) Mineralische Haarfärbemittel:

1. Salpetersaures Silber, meist in ammoniakalischer Lösung, mit oder ohne Kupfervitriol, um Haare dunkelbraun oder schwarz dauernd zu färben.

2. Wismutpräparate färben, mit alkalischen und Schwefelmitteln (Natrium sulfuratum, Natrium subsulfurosum) in Verbindung gebracht, die Haare hell- bis dunkelbraun.

3. Kupfervitriollösung, nach dieser Ferrocyankalium oder Calciumsulfhydratlösung behufs Braunfärbung der Haare.

4. Bleipräparate zum Nachdunkeln von ergrauten Haaren; gesundheitsschädlich.

5. Wasserstoffhyperoxyd, ein Mittel, um rote Haare rötlichgelb oder hellblond zu färben. Zur Blondfärbung eignen sich sehr gut Waschungen mit 150 g Rheum in 1/2 l Weißwein bis auf die Hälfte eingekocht. Nach dem Waschen trocknen lassen.

C. Mittel zur Pflege und Erhaltung der Schönheit der Mundgebilde.

1. Lippen. Ein lebhafteres Rot erteilt man den

アルコール 各等分
香油 適量

3. 頭垢を除去する薬劑 (皮脂漏を見よ)

4. 毛生薬 (禿髪を見よ)

5. 元來無毛部に於ける毛髪^{よけ}の除去 織毛ピンセットにて器械的に引き抜くこゝも、又電氣分解 (精々乃至二週間の間歇に於て毛髪十二本)。レントゲン照射

6. 毛髪^{よけ}の染色薬 a) 植物性毛髪染色薬 綠色胡桃殻等效果少なし。

b) 礦物性毛髪染色薬

1. 蓍酸銀、大抵はアンモニヤ溶液に於て、硫酸銅を加へ或は加えずして、毛髪を暗褐色或は黒色に持續的に染める。

2. ヴィスミット劑 (蒼鉛劑)はアルカリ及び硫黄劑 (硫化ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム) と化合せしめ、毛髪を鮮褐色乃至暗褐色に染色す。

3. 硫酸銅溶液 此のフェロチアンカリ或は硫化水素カルシウム溶液によりて、毛髪を褐色に染むる爲めに用ふ。

4. 鉛劑 灰白色になつた毛髪を更らに濃くする爲めに用ふ。健康に害あり。

5. 過酸化水素 赤色の毛髪を帶赤色或はヘルプロントに染める薬である。プロントに染むるには、百五十グラムの大黃を半リテルの白葡萄酒に入れ半分になるまで煮沸せしものにて洗滌すると好い。洗滌後に乾燥す。

C. 口創造物の美を涵養し維持する薬劑

1. 口唇 口唇の鮮紅色は赤色の顔料水による。乾燥し、裂けた

Lippen mit Hilfe roter Schminkwässer Trockene aufgesprungene Lippen werden mit Crème céleste, Honigsalben, roten Lippensalben etc. bestrichen.

2. Zähne und Zahnfleisch.

Zahnreinigungsmittel. Um Zähne ohne Nachteil chemisch zu reinigen, sind milde alkalische Mittel, wie Seife, Borax oder Soda, anzuwenden.

1. Zahnpulver. Das einfachste und zweckmäßigste Zahnpulver:

Pulvis dentifr. simpl.:

Cretae praep.	40.0,
Pulv. Sapon.	5.0,
Ol. Menth. pip.	gtt. 4.

2. Zahnpasten. Pasta dentifricia mollis u. dura, Odontine, Pasta dentifricia Schleich.

3. Zahnseifen.

3. Mundhöhle. Mittel, den übelriechenden Atem zu verbessern. Liquor Natri chlorati, als Mundwasser zu 1/2 Eßlöffel in einem halb gefüllten Glase Wasser mit Zusatz von Weingeist (Liq. Calcar. chlor. 100, Alkoh. 10) Auch Kali hypermangan., Boraxsäure, Salol als Mundwasser (Salol. 1.0, Spirit. 100.0, Tinct. Coccionellae 3.0, Ol. Rosar. gtt. 1, Ol. Menth. pip. gtt. 2). Ein Teelöffel auf ein Glas Wasser.



る口唇はコールドクリーム、密軟膏、赤色口唇軟膏を塗る。

2. 齒及び齒齦

齒の清潔藥 齒を損傷せず化學的に清潔ならしむるには石鹼、硼砂或はソーダの如き溫和なるアルカリ劑を用ふ。

1 齒磨粉 最も簡單にして合目的な齒磨粉は。

單純齒磨粉

精製白堊	40.0
石鹼粉末	5.0
薄荷油	四滴

2. 齒泥膏 流動或は硬性齒泥膏、オドンチーネ、シユライッヒ齒泥膏。

3. 齒石鹼。

3. 口腔 惡臭の呼吸を改良する藥。鹽酸ナトリウム液、含嗽劑としては水半盈のコップに半食匙を入れ、酒精を加ふ。(鹽酸カルシウム水 100. アルコール 10) 過マンガン酸加里、硼酸、ザロールも含嗽劑として用ふ。(ザロール 1.0 酒精 100.0 臘脂丁幾 3.0 蕃蔽油一滴 薄荷油二滴) 一茶匙を一コップの水に入る。



SACHREGISTER.

	Seite.
A	
Akne rosacea	24, 180
Akne vulgaris	20, 182
Aktinomykose	108
Alopecien	172, 182
Alopecia areata	174
Anämie	10
Angina	184
Aplasia pilorum moniliformis	174
Atherom	134
Atrophie des Pigmentes	128
Atrophien	124
C	
<i>Siehe auch K und Z.</i>	
Callus	112
Chloasma	110
Combustio	36
Comedo	18, 186
Congelatio	36
D	
Dermatozoonosen	150
Diagnostik, allgemeine	2
E	
Effloreszenzen	6
Ekzem	56, 186
Ekzem, chronisches	60
Ekzem, akutes	56
Ekzema intertrigo	60
Ekzema marginatum	166, 190
Elephantiasis	120
Entzündungen	32
Entzündungen, bakterielle	40
Entzündungen, chemische	34
Entzündungen, mechanische	32
Entzündungen, talgdrüsen	20
Entzündungen, thermische	36
Epheliden	108, 190
Epizoonosen	154
Erysipel	50
Erythema	192
Erythema exsudativum mul-	68
tiferne	68
Erythema induratum (Bazin)	102
Erythema nodosum	70
Erytheme, toxische	72
Erythrasma	170
F	
Favus	158, 192
Fibrom	130
Fischschuppenkrankheit	116
Folliculitis barbae	26
Furunculosis	46, 194
Furunkel	46
G	
Gangrän, symmetrische	12
Geschwür, miliare, tuber-	98
kulöses	98
Gneis	16
H	
Haarerkrankungen	172
Haare, Farbenveränderungen	196
Hämangiome	136
Hämothragien	12
Hautatrophie, totale	124
Hauterkrankungen, parasitäre	150
Hauterkrankungen, durch	154
Milben verursacht	154

Sachregister.

2

	Seite.
H ₂ gangrän, akute multiple	144
neurotische	144
Hauthorn	112
Hautkrankheiten entzünd-	50
licher Natur	50
Hautkrebs, oberflächliche, fla-	138
cher	138
Hautkrebs, tiefer, knotiger	138
Herpes	194
Herpes simplex	80
Herpes tonsurans	162, 196
Herpes zoster	78
Hyperaemiae cutis	10
Hyperidrosis	14
Hyperkeratosen	112
Hypertrichosis	172
Hypertrophie des Bindegewe-	120
bes	120
Hypertrophie des Pigmentes	108
Hypomykosen	158
I	
Ichthyosis	116, 196
Impetigo	198
Impetigo contagiosa	44
Impetigo herpetiformis	46
Impetigo simplex (Bockhart)	40
Infektionskrankheiten, chro-	92
nische	92
Intertrigo	198
K	
Kankroid	138
Keratosis pilaris	18
Kleiderlaus	156
Knollen	8
Knötchen	8
Knoten	8
Kopflaus	154
Kosmetica	228, 230
Krätze	150
L	
Lepra	104, 200
Lichen	8, 200
Lichen acuminatus	88
Lichen pilaris	18
Lichen planus	88
Lichen ruber	88
Lichen scrophulosorum	100
Lichen simplex chronicus	66
(Vidal)	66
Lipom	132
Lupus	200
Lupus erythematosus	28
Lupus vulgaris	92
M	
Molluscum contagiosum	116
Morbus maculosus Werlhofii	12, 202
.....	12, 202
Morphologie	6
Morpiones	202
Mycosis fungoides	142
Myom	130
N	
Naevus	134
Nagelerkrankungen	178
Nesselsucht	50
Neubildungen, bösartige	138
Neubildungen, gutartige	130
Neurosen	146
P	
Papula	8
Pasten und pflaster	218
Pediculus capitis	154, 202
Pediculus pubis	156
Pediculus vestimentorum	156

Pemphigus	Seite. 204
Pemphigus vulgaris chronicus	74
Phlegmone	50
Pityriasis rosea	168
Pityriasis rubra	88
Pityriasis vesicolor	170, 204
Pr rigo	54, 204
Pruritus cutaneus	146
Pruritus vulvae	206
Psoriasis	206
Psoriasis vulgaris	82
Psostula maligna	208
R	
Rhinosklerom	108
Ringelhaare	174
S	
Salben	224
Sarkom	140
Scabies	150, 208
Scham- oder Filzlaus	156
Schweißsekretionsanomalien	14
Scrophuloderma	98
Seborrhöa	16, 210
Sklerodermie	120
Sommersprossen	108
Spindelhaare	174
Streupulver	218
Sudamina	210
Sykosis	210
Sykosis parasitaria	164
Sykosis simplex	28

T

Talgsekretionsanomalien	Seite. 16
Therapie, allgemeine	4
Trichophytien	162
Trichorrhexis nodosa	176
Tuberkulide	102
Tuberkulose	92
Typhma	212

U

Ulcus	142
Ulcus rodens	138
Ulzerationen	142
Urticaria	50, 214
Urticaria pigmentosa	54

V

Verruca	114, 214
Vitiligo	128

W

Warze	114
-------	-----

X

Xanthom	132
Xerosis	18

Z

Siehe auch C.

Zinkleim	224
Zirkulationsstörungen	10

索引

い		乾燥症	19
衣服虱	157	汗腺分泌の異常	15
萎縮	125	よ	
陰部虱	157	痒疹	55
は		た	
白癩風	120	大結節疹	9
に		帯状疱疹	79
肉腫	141	苔癬	9
ほ		多發性出血性特發肉腫	141
蜂窠織炎	51	多汗症	15
疱疹状膿痂疹	47	多形渗出性紅斑	69
紡錘状毛髪及び捲毛	175	多毛症	173
母斑	135	丹毒	51
へ		單性疱疹	81
疥癬	113	單性膿痂疹	41
扁平苔癬	89	單性鬚瘡	27
と		そ	
トリヒコフイチイ	163	粟粒性結核潰瘍	99
動物性皮膚寄生蟲病	151	象皮病	121
頭部剪髮性疱疹	163	つ	
禿髮	173	爪の疾患	179
ち		ね	
中毒性紅斑	73	念珠様毛髪成形不全症	175
り		ら	
療法一般	5	癩病	105
良性新生物	131	う	
か		ウエルホッフ氏紫斑病	13
海綿状肉芽腫瘍	143	お	
疥癬	151	黄色腫	133
角質増殖症	113	黄癬	159
夏日斑	109	温熱的炎症	37
肝色斑	111	く	
カンクロイド	139	化學的炎症	35

潰瘍.....143
 火傷及び凍傷.....37
 癩癧.....167

ま

慢性単性苔癬.....67
 慢性の濕疹.....61
 慢性傳染病.....93
 慢性尋常性天疱瘡.....75

け

形態學.....7
 結核.....93
 結核疹.....103
 血管腫.....137
 結締織増殖.....121
 結節疹.....9
 結節性裂毛症.....177
 結節性紅斑.....71
 結節状深部癌.....139

ふ

粉瘤.....135
 粉刺.....19

こ

紅斑性狼瘡.....29
 硬結性紅斑.....103
 紅色陰癬.....171

え

炎症.....33
 圓形禿髮症.....175

て

傳染性軟屬腫.....117
 傳染性膿痂疹.....45
 癩風.....171

あ

悪性新生物.....139
 頭虱.....155
 アクチノミコービ.....109

さ

相對的壞疽.....13
 細菌性炎症.....41
 蠶蝕性潰瘍.....139

き

急性多發性神經性皮膚壞疽.....145
 急性濕疹.....57
 器械的炎症.....33
 鞏皮病.....121
 寄生性鬚瘡.....165
 寄生性皮膚疾患.....151
 寄生性皮膚病.....155
 筋腫.....131
 魚鱗癬.....117

ゆ

疣贅.....115

し

脂肪腫.....133
 濕疹.....57
 小結節疹.....9
 薔薇色糠枇疹.....169
 色素の萎縮.....129
 色素の増殖.....109
 色素性蕁麻疹.....55
 出血.....13
 酒渣鼻.....25
 循環障害.....11
 新生物.....131
 蕁麻疹.....51
 診斷學一般.....3
 神經病.....147
 尋常性狼瘡.....93
 尋常性鱗屑疹.....83
 尋常性瘰癧.....21

ひ

皮角.....113
 表層性扁平皮膚癌.....139

ヒフオミチューテン病.....159
 皮膚癢痒症.....147
 皮膚充血.....11
 皮脂漏.....17
 皮脂分泌の異常.....17
 皮脂腺の炎症.....21
 貧血.....11
 鼻硬結症.....109

も

毛髮角化症.....19
 毛髮苔癬.....19
 毛髮及び爪の疾患.....173

毛髮の變色.....177
 毛髮の疾患.....173

せ

癩瘡.....47
 赤色苔癬.....83
 赤色糠枇疹.....83
 纖維腫.....131
 髪性天疱瘡.....163
 尖銳苔癬.....89
 腺病性苔癬.....101
 腺病性皮膚病.....99
 全身皮膚萎縮.....125

處方索引

陰部虱.....203	い	粉刺.....187	ふ
陰部瘙癢.....207		紅斑.....193	こ
狼瘡.....201	ろ	硬膏.....219	へ
葡萄疹.....195	ほ	胼胝.....213	て
禿髮.....183	と	天疱瘡.....205	
鱗屑疹.....207	り	癩風.....205	
黃癬.....193	を	泥膏.....219	あ
夏日斑.....191	か	悪性膿疱.....209	
間擦性濕疹.....199		頭虱.....203	
疥癬.....209		亞鉛膠.....225	さ
汗疹.....211		撒布劑.....219	き
痒疹.....205	よ	魚鱗癬.....197	ゆ
苔癬.....201	た	疣贅.....215	し
軟膏.....225	な	酒渣鼻.....11	
癩病.....201	ら	濕疹.....107	
ウエルホッフ氏紫斑病.....203	う	尋常性瘰癧.....183	
膿疱疹.....199	の	鬚瘡.....211	
癩癬.....191	く	蕁麻疹.....215	ひ
血管腫.....185	け	皮脂漏.....211	
		美容劑.....229, 231	せ
		剪髮性疱疹.....197	
		癬瘡.....195	

第壹圖表




Urticaria pigmentosa
色素性蕁麻疹



Pemphigus Neonatorum
初生兒天疱瘡

第貳圖表



Psoriasis
鱗屑疹



Herpes zoster
帶狀ヘルペス

第參圖表



Leprosy
神經性癩疹



Lupus vulgaris
尋常性狼瘡

第四圖表



Hautkrebs
皮膚癌



Haemangiom der Nase
鼻部血管腫

發行所

電話下谷六三三八番
振替東京六三三八番

南山堂書
東京市本郷區龍岡町三十四番地



印刷所

報文社
東京市麴町區有樂町二丁目一番地

印刷者

中村政雄
東京市麴町區有樂町二丁目一番地

發行者

鈴木幹太
東京市本郷區龍岡町三十四番地

纂著者

花田邦彦



大正四年三月廿七日發行
大正四年三月廿七日印刷

正價一圓二十錢

皮膚科學

和對 獨逸醫學叢書

▼獨逸醫語研究者の絶好の指針!!

第一編

醫學博士 田代義徳序
醫學博士 工藤外三郎校閲
醫學士 野田政治纂著

獨和對譯 病歴文選

全一冊 增補第二版
正價金二圓三十錢
郵税金十四錢

第二編

醫學博士 小川劍三郎校閲
醫學得業士 莊司秋次郎纂著

獨和對譯 眼科學

全一冊 正價金一圓
郵税金八錢

第三編

醫學士 岡田昭雄纂著

獨和對譯 臨牀診斷學

全一冊 正價金二圓三十錢
郵税金十二錢

第四編

醫學士 花田邦彦纂著

獨和對譯 皮膚科學

全一冊 正價金一圓二十錢
郵税金八錢

▼臨牀醫家學生諸君座右の寶典!!

7

57
39

終