

△ 脱肛

有寒。有熱。久瀉脾氣下陷者。補以升之。○瀉痢後虛脫脈兼無力倦怠者。八珍十全選用。○赤腫作痛。屬大腸風熱。生地赤芍槐花槐角升麻。腸胃燥滯。大便祕結。努瀆太過。因而脫肛。宜涼補以潤之外。用收肛散壅之良。

熊膽五分。孩兒茶茶三分。冰片乙分。乳調塗肛上。

丹溪治久瀉脫肛。參苓白朮散。加升柴五味子。  
○用力過多者。十全大補湯加升提。○大腸虛

脫肛

而挾熱硝砂湯。槐花散。薄荷散。○大腸虛而挾寒。蠅皮散。香荆散。○日久不上。收腸養血和氣。湯。潤脫龍骨散。潤腸散。

無火症。久脾虛。岸肛丸加減。

舉肛丸

半夏 天南星 柯白礬 各五錢 雞冠花 炒

白附子 各五錢 藥子肉 煅黑 附子 各

蠅皮 火二枝

瓜萎 仁一枚燒存性 胡桃仁 十五個燒存性

共為末。醋糊丸。空心溫酒下三十丸。

魚荳散

魚附 荆芥 一方加砂仁

每用三錢食前白湯下

又方

五倍子末三錢白礬山槐

水煎沈 ○葱湯洗軟芭蕉葉托上

又方

木賊草燒灰擦肛門輕輕擦上或加龍骨

又方

入 脱肛

蔓陀羅花連殼一對橡斗十六個搗碎水  
煎三五沸入朴硝熱洗其脫自上

內用槐花槐角子等分炒黃色以羊血蘸藥炙  
熟食之以酒送下

蝟皮散

蝟皮山貝燒磁石研醋淬七次桂心三錢

鼈頭山枚炭黃

右為末每食前米飲下三錢

收腸養血和氣丸治脫肛日久腸虛大腸不時

脫

白朮 當歸

白芍各二錢 川芎

槐角炒

山藥錢半 莲肉二兩 人參七錢 龍骨煅

五倍子 赤石脂各五錢

右末米糊丸 桐子大米飲下七十丸

龍骨散 治大腸虛肛門脫出

龍骨 藜子錢半 没石子二枚 粟殼

赤石脂錢半 炸末每服一錢米湯下

潤腸散 治久痢大腸脫

脫肛

阿子 赤石脂 龍骨各等分

右為末茶調擦腸頭上紗帛擦入

參术芎歸湯 治鴉癩後及產育氣虛脫肛脈  
濡而弦者即補中益氣湯去紫胡加白芍川

芎白芍芩生薑煎服

○參术竊脾湯 治久鴉滑肚

白朮 人參各一錢半 肉果麵色煨 白芍

白芍 陳皮各一錢半 甘草炙七分

水二鍾薑三片棗二枚煎服

經云出為虛入為實肛門之脫非虛而何

老人產育小兒久痢後元氣下陷肛門脫出

志屬虛大劑參术芪草加製升麻柴胡

用力過多而脫者十全大補湯外以葱湯洗軟

芭蕉葉托上

必脈弦數大腸有熱而脫者必赤腫涼血祛風

為主涼血清腸散

氣血虛而挾熱者八珍湯加生地赤芍槐角槐

花黃枯萎雞冠花疎風防風羌活荆芥外用五

脫肛

倍子朴硝煎湯飲之。木賊燒存性入麝少許搽之。腫痛用蝸牛加冰片點之。熊膽冰片亦妙。鼈頭燒灰塗。

穀道癢痛

痒痛多因濕熱生蟲。欲成痔瘻。宜以雄黃和艾燒烟熏之。並納蟻娘丸。此丸專治肛門痒痛。或出膿血。有虫傍有孔竅。用蟻娘七箇。五月五日收。去翅足。炒為末。新牛屎半兩。肥羊肉一兩。炒令香。右共膏丸如蓮子大。火令熱。以新綿薄裹。

納下部。半日少喫飯。俟大便中有蟲。三五度瘥。  
穀道蟲赤腫或痒或痛用杏仁。外臺治下部  
蟲。杵桃葉一斛。蒸之令極熟。內小口器中坐定  
熏之。蟲立死。

肛門腫痛。用木蟹子肉四五枚。研泥沸湯泡洗。  
另用少許皂患處。

診匿蟲陰脫其脈虛小者生緊急者死

痔瘡蟲蟲作痒槐白皮濃煎汁浸之冷再換良  
久欲大便當有蟲出

附註

或用水銀棗膏各二兩研勻捏成棗形綿裹納  
之明日蟲出

汗

○平人無分晝夜。不因飲食熱湯。自然汗出者。為自汗。屬陽氣虛。腠理不密。心火盛。所致。謂心熱。則出汗也。肥白人宜補中益氣。倍參芪术。加白芍酸以收之。汗多則亡陽。

○陰虛陽必湊。故發熱而自汗。當歸六黃湯加地骨皮。○陽虛陰必乘。發厥而自汗。黃芪建中湯。甚者加附子。或芪附湯。

瘦人脉弦數。血虛有火。宜補陰降火。○火氣炎

汗

上。胃中之溫。不能作汗。可用涼膈散。○有氣不順而自汗不止。須理氣。使榮衛調和。小建中湯加木香。○睡中汗出。覺則止。乃盜然屬陰虛。黃湯最妙。亦有酒客多火人。睡中汗多者。亦宜滋陰。除渴解熱。

平人脈弱虛微細者喜盜汗出也。汗多氣血傷故脈濡弱若不汗出是逆也。故云喜。

睡醒時。別處無汗。獨心口一片時心悸者。名心汗。屬心虛。多思慮所致。宜養心甯神。古方用艾

暑

煎湯調茯苓二錢服。不若補心丹。一方用人參耆歸丸也。犢豬心一個帶血割開入參歸。縫煮熟去藥吃。○脾胃不和又挾外濕身重汗出煩躁。羌活勝溫湯主之。○兩陰汗屬下焦濕熱。龍膽瀉肝湯加風藥。風能勝濕也。當用當歸龍鬚丸及二妙丸殊效。外用蜜陀僧研細加蛤粉撲炒傷暑。傷風。傷濕。濕溫。風溫吐瀉俱有汗。

宜憑脈并兼症。

一切內傷虛損自汗不止。總用補中益氣湯少

汗

加麻黃根製附子浮麥為導。其效必影響。  
但升柴須用蜜炙以制其升散剽悍之性。又欲  
其引參芪至表殊不可缺。○脾胃素弱食不運  
化。滞于中宮。蒸蒸出汗。氣口多弦滑。只消導健  
脾不必止汗。

兩寸浮洪而自汗者。心火炎也。率方倍參芪。加  
五味子。黃連。各五。○兩關脈絃而自汗者。挾風  
邪也。率方加桂枝芍藥。若不陰虛。只用桂枝湯。  
寸口浮洪無力而自汗者。只宜率方倍參芪。

兩尺洪大無力而自汗者。相火挾火心之勢而  
憇肺金也。當歸六黃湯。

當歸六黃湯 治盜汗陰虛藥也

黃柏 黃連 黃芩 生地黃 熟地黃  
黃芪 當歸 加麻黃根或浮麥

水煎服

麻黃根 桂枝 浮小麥 俱能調和榮衛

又引諸藥至肌表可以能止汗也

牡礪 白芍 五味子 乃酸以收之之義

王屏風散

汗

黃芪配白朮  
防風或加浮麥  
扶神  
牡蠣 麻黃根 捸黃芪畏防風得防風  
而功愈大蓋相畏而相使也  
製方之妙力此

一人氣血俱虛身羸大汗以十全大補湯倍參  
芪加製過附子一片一服知二服已

獨勝散方專治盜汗用五倍子末調津液調填  
滿臍中以絹縛定加枯礬最效

火氣上炎蒸胃中之濕。尙能作汗涼膈散主之。  
氣虛自汗用參芪少佐桂枝陽虛附子各可。凡  
癆病亦有汗。

滑伯仁治一歸暑月自汗口乾煩躁欲卧泥水。  
中脈浮而數按之豁然虛散素向曰脈至而從。  
揭之不鼓諸陽皆然乃陰盛格陽得之食生冷。  
乘涼所致以真武湯冷飲之一進汗止再進躁。  
去三進全安。

東垣曰飲酒中風多汗。食即汗出必油。久不治

必消渴。白朮散主之。

汗

四製白朮散 治盜汗

白朮而黃芪配石斛而炒皮配牡蠣而

逐味同炒不必竟同用炒只用朮為末每服三錢粟米湯下

丹溪曰仲景桂枝湯治外感風邪自汗藥也。

○黃芪建中湯治外感挾氣虛自汗藥也。戴復庵  
法用黃芪建中湯加浮麥及黃芪六一湯或玉

屏風散

○補中益氣湯治內傷自汗藥也。甚者六脈浮濡

而虛率方加製附子以治陽虛其效甚捷  
汗出如膠之粘如珠之綴及淋漓如雨揩拭不  
逮者死即三陽絕汗也

丹溪法用桑樹第二葉焙乾為末空心米飲調  
服最止盜汗

○傷寒脈緊。麻黃葱豉發之。汗出于榮。○傷風脈  
緩。白朮桂枝和之。汗出於衛。○往來寒熱。眩運。  
紫胡連翹和之。汗出於少陽。○體若燔炭。地骨  
皮秦艽解之。汗出於三焦。○厥而挹鬱。紫胡麻

汗

黃發之汗出於血。○敷蠻於胃。大黃芒硝下之。  
汗出於足陽明。○陰毒大汗。附子乾薑溫之汗  
出於三陽。

○平人脈虛濡而弱或微細必喜汗盜然虛勞之  
病或得於大病後陰氣未復遺熱上留或得之  
勞役七情色慾之大衰耗陰虧精或得之飲食  
藥味穢成內熱皆有以傷損陰血衰憊形氣陰  
既虛不能配陽于是陽亢內蒸外為盜汗灼而  
不已陽能久存乎。

宜潤劑者六黃湯宜燥劑者亟氣湯無內熱者  
防風散白朮散○肝火當歸龍膽丸○虛者連  
翹黃芪湯實者三黃連翹湯○身熱加地骨皮  
紫胡黃芩秦艽○肝虛加酸棗仁○肝實加龍  
膽草○右尺窪大黃、蘡知母○煩心黃連生地  
當歸枳砂麥冬○脾虛人參白朮白芍山藥扁  
豆浮麥或山藥一味為末臨睡酒下三錢  
○此服藥汗仍出者有熱牡礪散無熱小建中湯  
加熟附子一錢不去皮或止正元散仍以溫粉

汗

撲之大汗不止於諸藥中加煅牡礪或錢半并  
算珠丹常自汗出經年累月久病及大病新愈  
汗出者亦可用此若不宜熱補須文際其陰陽。  
自愈常以靈砂丹主之凡此皆無他病而汗出  
者設非謂有兼病者也若服止汗固表藥不應。  
愈歟愈出止當理心血蓋汗乃心之液心無所  
養不能攝血故溢而為汗宜大補黃芪湯加酸  
棗仁有微熱者兼下石斛兼下靈砂丹。

無汗

陽氣虛則不能為汗。丹溪云：盛夏治食無汗，為

表實治一人。夏月無汗久嗽。用半夏紫蘇二味。

為末入魚附末枕流末。

蜋殼灰蛤粉之屬。仁陷末即神麴。

以括萎穰桃仁泥半兩為丸。先服三拗湯却服

此。○半身出汗。夏月止半身有汗。皆氣血不足。

所致夭之兆也。

趙養葵一生以此年至八十。自言藏氣偏枯。豈其說未盡然歟。鼓峰云：氣血不足。必有他症可驗。

頭汗雜病食滯中宮熱氣上炎則頭汗。

熱聚於胃。上炎則頭汗。以三陽會於頭也。病後

產後悉屬陽虛。悞治必死。

汗

○大補黃芪湯

黃芪蜜防風    山茱萸    當歸    白朮炒  
炙

肉桂    川芎    炙甘草    五味子    人参參

各一錢    白茯苓半錢    熟地黃兩錢    肉蓴蓉

酒浸參兩    每服水二錢薑三片棗二枚煎八分不拘時溫服

草硃丹    見頭痛門

涼膈散    見火門

三拗湯    見喘門

小建中湯    見腹痛門

靈砂丹    見嘔吐門

卷活勝濕湯    見濕門

龍膽瀉肝湯

二妙丸見痛風門

當歸龍鬚丸

並見腸痛門

十全大補湯見虛損門

桂枝湯

真武湯並見傷寒門

三黃連翹湯

防風散

防風五錢 川芎半錢 人參二錢 或分半

右為末每服或錢臨卧米飲調下

正氣湯

黃柏錢半 知母錢半 甘草分半 炎五水煎服

白朮散

白朮 不拘多少 浮麥二升

右用水煮乾為朮尚硬又為水二升煮軟  
取出去麥不用切作片焙乾研為細末每  
食白湯下二錢

汗

此與痘癧同類

## 黃汗

黃汗身熱腫。若出汗沾衣如柏汁。古云汗出入水所致。宜分表裏虛實治。身腫脈浮。作寒熱。關節疼。羌活勝濕湯仍表之。

一法蔓菁子搗末平旦井水下一匙。如加玉面匙以知為度。每日小便中浸少帛子者。日色漸退白則瘥。不過五升。

脉沉外不熱。小便亦黃。宜分利解熱。

黑脈弱無力。汗多無大病者。依古法黃芪白芍

桂枝作湯服。

黃疽日久變為黑疽死不治。氣塞者急以土瓜  
根搗汁六合頓服。黃水從心腸出愈。

諸疽口淡怔忡耳鳴脚弱微熱小便白濁又當  
作密瘻治之四君子香八味丸

古方養榮湯不若八物加養心藥隨症增損妙  
若悞用涼藥分利水枯面黑死

疽無熱症小便白屬虛從瘻治

茶癬用白朮炒蒼朮米泔浸軟石膏煅乙而  
或加

白芍藥炒 片芩各一 薄荷葉七錢

膽星

陳皮各二

右為末砂糖水調神麴糊桐子大每服五六  
十九丸砂糖水下一方用石膏分麻為末砂糖  
水調服一方花椒為末糊丸桐子大每服十

丸茶下

、指迷七氣湯 治大人小兒諸般痞積面色痿

黃肌停羸瘦四肢無力皆緣內有蟲積  
或食生米或好食壁土或好食茶葉炭

酸辣等物者是一服除根

薰汗

蓬术 三棱俱醋製 薤香 甘草 官桂

桔梗 青皮 益智子 老附 大黄

槟榔

右㕮咀水二鍾煎七分再用水煎一次空心  
溫服不得些少飲食不然則藥力不到而蟲  
積不行服後食頃腹必疼當下以魚凍或長  
蟲或血蟹互日午蟲盡下方用溫粥止之服  
退黃丸以除其黃虛者大健脾氣宜用。  
虛者服綠藜必死即實者亦不

退黃丸

平胃散六兩

綠礬三兩

右用鵝糊丸桐子大每服六十九丸棗湯送下  
忌生冷油膩湯麵等物

好吃泥壁黃、病亦屬蟲

黃泥一斤 砂仁四兩炒

右為末黃連膏丸桐子大每服六十九丸空心

糖湯下

脈洪大大便利而渴者死 瘡毒入腹喘滿者

黃汗

危 沐病渴者難治不渴易治

黃疸死症

寸口近掌無脈口鼻冷有黑色起俱不可治  
戴復庵諸失血後多面黃然面色紅潤者血榮  
之也血去則面見黃色譬之竹木春夏葉綠澤  
遇秋黃萎潤與燥別之也宜養榮湯枳歸湯十  
全大補湯妨食者四君子加黃芪扁豆各一錢。  
即黃芪四君湯加陳皮名異攻散亦有遍身黃  
者但不及耳目

病瘡後多黃乃脾受困也。理脾為先。累攻散加  
黃芪扁豆各一錢。諸病後黃者皆宜。

食勞病黃。一名黃胖。

大小溫中方俱見前黃疸門

夫黃疸者暴病也。仲景以十八日愈。食勞黃  
者久病也。至有久不愈者。用大小溫中丸。以  
針砂伐肝。以木米助脾。一方以礬醋之酸灣  
肝棗肉之甘補脾。實人及田家作苦之人宜  
之。虛人膏粱柔脆者。宜佐補劑。

女勞疸。屬脾胃兩傷。補脾滋腎。補中益氣。或四

黃汗

君子六味丸選用

年壯氣實脈來有力者易愈耳。寒氣弱脈來微濇者難瘥。五十以後酒色慾鬱而得額黑者死。疽疾者宜汗者兼身痛惡寒者是濕熱鬱于表也。桂枝加黃芪湯。

初起脉有力九味羌活湯妙

吐法瓜蒂散藜蘆散二陳湯探吐上焦阻塞者

宜之

內熱口乾大便不通宜下梔子大黃湯大黃硝

石湯黃連散

小便短少脈實數宣利小便五苓散益元散  
除濕熱茵陳互苓散 橘鼻瓜蒂散


有宜溫者是脾胃有寒飲不運也茵陳附子乾

薑湯

久病脈弱倦怠宜補養紫陽湯補中湯小建中湯

理中湯

往來寒熱一身盡痛者小柴胡加梔子



不眠

病後及汗下後與癆瘍。不得眠屬虛。人參茯  
神炒酸棗仁陳皮麥冬龍眼肉為主。有火脈數  
口乾加花粉知母玄參炒黃連竹茹。心煩用炒  
黑梔子。

脈數竄滑有力而不眠者。中。有宿溼痰火。所謂  
胃不和則卧不安也。心下硬。而屬宿溼不硬。而  
兼惡心口乾者。屬痰火。宜分別治。

婦人肥盛多鬱不眠者。宜吐之。從鬱結痰火治。

不眠

大抵膽氣宜靜。濁氣若火。若痰擾之。則不眠。  
治法曰。膽虛不眠。用熟酸棗仁為末。竹葉湯調  
服。膽實多眠。用生酸棗仁為末。薑茶湯調下。

有寐中覺魄飛蕩驚悸多魔。通夕不得安眠。是  
肝虛受邪也。其人易怒平。人卧則魂歸於肝也。  
肝有邪。魂不得歸。是以飛揚。方用珍珠丸母。龍

齒

龍齒安魂 虎睛定魄

、溫膽湯 治病後虛煩。內有枳實半夏。乃痰火  
不眠。之藥用者宜審。

諸水腫脹滿不得卧。卧則氣上喘。分虛實治。  
虛勞咳嗽形脫。不得卧。治不可治。

戴云不寐有二。有病後虛弱及年高陽衰不寐。  
有痰在膽。經神不歸舍。尗令不寐。虛者六君子  
加炒酸棗仁。炙黃芪各一錢。痰者溫膽湯減竹  
茹半。加南星。炒酸棗仁各一錢。下青靈丹。

大抵驚悸健忘。怔忡失心。風不寐。皆是膽。痰。  
沃心。以致心氣不足。若涼心太過。則心火愈  
微。痰愈盛。病愈劇。惟當理氣為急。導痰湯。

不眠

加石菖蒲末半錢。

溫膽湯

青靈丹

煩躁

有表。有裏。有虛。有實。

表症不得汗。內外皆熱。則躁亂不甯。取汗即定。  
裏症。熱鬱。大便不通。傷寒雜病。心神不安。脉數。  
實有力。下之定。

火害心胞。或酒客膏粱。上焦不清。勿令煩躁。黃連梔子等涼藥妙。

、病後年高及素弱人。脈虛大。或微細。心煩不眠。  
為虛煩。補心丹加減。或以生脈散。加柏子。茯神。

煩躁

當歸。首穴口乾加涼藥一二味。花粉炒梔子玄參竹茹。

熱病脈絕之不鼓。躁亂欲坐卧於泥水中。口中和乃虛陽上攻也。即陰盛格陽。陰極發躁。冷服附子理中湯佳。

產後悉屬虛煩者惡露上攻者。肚腹必痛脹。左側必大實。亦有多食不能運化而煩躁者。補養藥稍加消導。

成無已曰煩為擾亂而煩。躁為憤激而躁。合而

方之煩躁為熱。析而言之。煩陽也。躁陰也。煩為  
熱之輕。躁為熱之重。少看妙。

針經五亂篇曰。氣亂於心則煩。蓋熱客於肺則  
煩。入於腎則躁。大抵心火旺。則水虧金鍊。惟大  
獨熾。故肺腎合而為煩躁。

◎先賢治煩躁俱作。有屬極者。有屬寒者。治獨煩  
不躁者。多屬熱。唯惶而煩者。為虛寒。治獨躁不  
煩者。多屬寒。蓋煩者。心中煩為內熱也。躁者。身  
倅手足躁擾。或裸倅不欲近衣。或欲在井中。為

煩躁

外熱也。內熱者有率之熱。放多爲熱。外熱者多是無根之火。故屬寒也。

虛煩類傷寒。乃虛火煩心作熱。脉必右氣口大而無力。左脈平和。胸中不痞不飽。頭身不痛為異。補中益氣加麥冬。香砂安神丸。

丹溪治一婦人素強健。六月發煩悶。脈沉細而弱。數時妄語。用炒香丸。以針三孔涼水下。稠痰數升而愈。金匱曰。昔肥而今瘦者瘧也。

溫膽湯治大病後虛煩不得眠。有飲者宜之。虛

人禁用

金匱酸棗湯治虛勞虛煩不得眠

細看。

○右九法治熱煩入前五法煩熱怔忡。知熱在心  
肺也。故用竹葉石膏。硃砂鎮降其熱。使下行也。  
第六法煩熱下利。知熱在上也。故用梔子豉湯。  
吐之。第七法煩而汗出不解。知表裏有邪也。故  
用表裏飲湯。第八法脈沉口渴。知熱在裏也。抄  
魚丸下之。第九法溫膽酸棗。治者飲煩而不眠  
也。心虛則煩。

煩躁

大法津液充多。內枯燥而煩者。八珍湯加竹葉酸棗仁麥門冬。

榮血不足。陽盛陰微。而煩者。人參生地麥冬地骨皮白芍竹茹之屬。或人參養榮湯。砂砂安神丸。

腎水竭。下心火上炎。而煩者。竹葉石膏湯。下滋腎丸。

病後虛煩。有飲溫膽湯。無飲遠志湯。

產後一切瘡疽。病後虛煩。為血液耗散。心神不

家危矣。宜猛進獨參湯。煩而小便不利互苓。

散心中虛熱而煩。清心蓮子飲。煩而嘔不

喜食陳皮湯。脣前煩。妊娠煩。名曰子煩。按。

產寶曰。是心肺虛熱。或痰積於胸。若三月而煩者。但熱而已。若痰停而煩者。吐涎惡食。二陳白

朮黃芩枳殼。內熱者竹葉湯。竹茹湯。益母丸。

氣鬱者。紫蘇飲。或分氣飲加川芎。脾胃虛弱

者。六君子加紫蘇山梔。

產後煩去血過多。虛火泛上而煩。與大病後。

煩躁

同。大劑人參當歸散加童便妙。古方謂惡露攻心而煩者用羊血一盞頓服不若芎歸湯加童便薑汁為佳。虛甚加參。

經曰諸躁擾狂越皆屬於火又曰陰盛者躁名曰陰躁欲坐井中惟宜熱藥治之成無己曰雜躁欲坐井中但飲水不得入口是也東垣曰陰躁之極口中和舌不燥欲坐卧泥水井中陽已先亡醫猶不悟謬指為熱重以涼劑死也無疑急煎麝靈散理中湯救之冷服即定