

鼻

三錫曰：肺開竅于鼻，世所共知也。然陽明之脈，挾鼻絡目，結于迎香，左之右，右之左，去鼻孔各開五分是穴。風邪從面而來，則入陽明，脈道拂鬱，氣不通暢，故清涕時出，久變為濁，所謂外寒束內熱論極有理。須辛散之，方書多用升麻、葛根、白芷、葱白，乃陽明經藥也。鬱熱既久，頓發不開，必加辛涼。酒枯、芩、薄荷之類。至如酒客膏粱，辛熱炙燂，太過火邪炎上，孔竅壅塞，則為鼻淵。

鼻中濁涕如湧泉，漸變鼻衄，衄血，息肉，鼻痔等症，卽素問所謂膽移熱于腦之義。

鼻塞時值寒月，必加麻黃、細辛、干升麻、葛根湯中，佐以枯芩、蘇葉，多加甘桔爲舟楫，庶易成功。已經發散，未得全開，脈洪有力，口乾鼻燥者，君以辛涼清之，酒芩、梔子、薄荷之屬，仍佐荊防升芷，不可驟用寒涼法也。

氣虛之人，氣弱不能上升，則鼻塞滯，所謂九竅不利，腸胃之所生是也。多服補中益氣湯，自通。

乃屢驗者。

戴復菴曰：平人多涕，或黃或白，或帶血如膿狀，皆腎虛所生，不可過用涼劑，亦有痰用南星散兩寸脈浮洪而數，爲鼻衄鼻熱。右寸脈浮緩爲傷風鼻塞清涕。

丹溪曰：鼻爲肺竅，肺家有病而鼻不利也。有寒有熱，暴起爲寒，久鬱成熱，寒傷皮毛，氣不利而壅塞，熱壅清道，氣不宣通，先須表散，後以酒芩連梔子清之。

久患鼻膿極臭者冷水調百草霜末服。

腦漏氣弱色白人右氣口虛大補中益氣湯加川芎防風細辛白芷辛荑半飽服。

酒齕鼻乃熱血入面爲寒所拂熱血得寒污濁凝滯而然服前藥外用梧桐子取油入黃連以天吊藤燒油熱傅之。

又方用山硫黃入蘿蔔內煨乳香輕粉烏頭尖酥調傅或用膽礬傅之。

面鼻紫黑面爲陽中之陽鼻居面之中一身之

血運到面鼻皆爲至清至精之血，多酒之人酒氣薰蒸，面鼻得酒血爲極熱，熱血得寒污濁凝結而不行，故色紫黑。治宜化滯血，生新血，四物加酒片苓、紅花、酒浸陳皮、茯苓、甘草、生薑煎調。五靈脂末服，氣弱者加黃芪。

酒浸

上焦火盛，酒客膏粱，脈洪數有力，而面生酒刺及糟鼻，山梔仁酒浸微炒爲末，蜜丸彈子大，臨臥嚼一丸白湯下，或加連翹仁更佳。

鼻淵濁涕如淵，內經謂膽移熱于腦，則入額鼻。

淵要皆陽明伏火所致防風通聖散一兩加薄荷黃連各二錢半水煎服。一法本方硝黃滑石石膏減半倍加辛荑。

鼻中息肉塞久氣不通用枯礬爲末面脂絳塞耳中數日自消乃屢驗者又法用木通細辛附子炮蜜和綿裹塞鼻中又用防風通聖散加荆三稜山茱萸肉海藻并用酒炒爲末每服錢半酒調下。

宣明防風散

治鼻淵濁涕不止久而不已

成衄

黃芩

人參

甘草

炙

川芎

麥門冬

去心

各一兩

防風

半兩

右為末每服二錢沸湯調食後服日三

寒月鼻塞不聞香臭晨起者麗澤通氣散

黃芪

八分

蒼朮

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

各六分

甘草

炙

四分

麻黃

加

嚴寒

川椒

白芷

各二分

薑三片棗二枚葱白三寸水二鍾煎一鍾溫

服忌一切冷物及風涼處坐臥

鼻中流臭黃水腦亦痛名控腦沙有蟲食腦中
用絲瓜藤近根三五尺許燒存性爲細末酒調
服卽愈 不已灸法妙顛會在鼻心直上人髮
際二寸再容豆是穴灸七壯通天在顛會上一
寸兩傍各一寸灸七壯隨臭左右灸常晷灸後
去臭肉一塊從鼻中出臭不可言而愈

塞鼻藥

通草散 治鼻雖氣不通不聞香臭

木通

細辛

附子

各等分

右為末蜜和綿裹少許納鼻中

治同上

皂角

各等分

右為末綿裹塞鼻中

痰火鬱結于上焦胸中盲瘻之上上竅不通則

玄門閉密而鼻不聞香口不知味或耳聾目昏

良由大氣弱不能上衝濁氣得以擅權是虛為

本而痰火為標也當補中益氣加升柴諸風藥

引上行兼用清上化痰開竅丸藥戒性慎口欠
之自全此錫屢驗者

鼻淵

火鬱上焦氣不通抑遏成涕內經所謂肺熱則
出涕是也方書謂腦滲為涕恐未

防風湯治同上

防風

附

黃連

人參

甘草

炙

麻黃

麥冬

上

心各

右細末每服一錢涕湯點服日三

丹溪治一中年人右鼻管流濁且臭脉弦小右寸滑左寸瀼灸上星三里合谷次以酒苓二兩蒼朮半夏各一兩辛荑川芎白芷石膏人參葛根各半兩分七貼服之全愈乃痰鬱火熱之疾也

防風通聖散去硝黃減石膏滑石一半加辛荑先服三五貼再用此爲丸早晚白湯下半斤愈
蒼耳散 治鼻流濁涕不止

辛荑兩半 蒼耳子炒二 香白芷兩一 薄荷葉五分

右爲末葱茶湯臨睡下

冬月勢盛者辛荑散佳

辛荑

細辛

藁本

升麻

川芎

白芷

木通

防風

甘草

右爲末每服一錢食後茶清下

鼻鼽

謂流清涕也

丹溪曰肥人鼻流清涕乃飲食痰積也要亦濁液挾火壅塞而然

蒼朮

片苓

南星

川芎

白芷

辛荑 甘草

或末或丸白湯下世傳鼻流臭膿百草霜研

細冷水下三錢効

塞鼻藥

治鼻斃

通草

辛荑

各五分

細辛

甘遂

桂心

芎藭

附子

各一兩

右為末蜜丸麻子大綿裹塞鼻中

又方辛荑膏

治同上

細辛

川椒

乾薑

川芎

莫茱萸

辛荑

附子

各三分

皂角屑

半兩

桂心

一兩

猪脂

六兩

右煎猪脂成膏先一宿以苦酒浸前八味入

油煎附子黄色止以綿裹少許塞鼻中

息肉

羊肺散

治肺虛濕熱壅塞鼻生息肉不聞香

臭

羊肺

一具

白朮

四兩

菴蓉

木通

乾薑

川芎

各一兩

右爲細末水調灌羊肺中煮熟焙乾細研爲末食後米飲下此從治法也

三錫曰息肉必由上焦積熱鬱塞已久而生然有諸中然後形諸外必內服清火利膈藥二陳涼膈加減須斷酒薄味

韓氏醫通曰雨霽地生菌息之像也

一中貴鼻中肉贅臭不可言痛不可搔束手待斃以白礬末加硃砂少許吹上化水而消內服勝濕湯加瀉白散

又一方息肉因胃中有食積熱痰流注治本為
佳

蝴蝶礬

錢一

細辛

錢一

白芷

五分

右為末綿裹塞鼻孔頻換又方蝴蝶礬二分

號丹一分細辛一錢如上塞之三因方枯

礬一味為末綿裹塞鼻中數日息與藥俱

落

辛萸膏

治息肉時作痛

辛萸

二兩

細辛

木通

木香

白芷

杏仁

湯浸去皮尖各半兩

右用猪脂髓猪脂二兩和藥于石器內慢火

熬成膏放冷加龍腦麝香合一錢為丸綿

裹塞鼻中數日內脫落

有人卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不得出以牛脂或羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸入須更脂消物逐脂出也

輕黃散 治同上

輕粉

杏仁

湯泡去皮尖及雙仁各一錢

雄黃

兩半

麝許少

右四味用淨乳鉢先研杏仁如泥後入雄黃麝香同研極細磁盒蓋定每有患者不拘遠近夜臥用筋點米大在息上半月效

消鼻痔方

菴蒂炒 甘遂各四錢 白礬枯 螺青炒

草烏尖各五分炒

右為末用真麻油搜和令硬些不可爛旋丸如鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔

化爲水日一次妙甚

方

苦丁香

卽瓜蒂

赤小豆

丁香

各四箇

慢火焙乾爲末入腦少許口中先含水次將

小竹管吹藥入鼻中如半鍾茶時覺頭痛

時取下

酒齏鼻

鉛紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺

癰疹俗呼肺風以肺主皮毛也

硫黃 白礬灰 各五錢

右細末入黃丹少許染與病人面色同每上

五分津液和塗之臨臥洗漱罷行之

赤鼻須內服升麻湯下抑青丸以治其本

又方

枇杷葉 一兩去毛陰乾新者佳

梔子 苦參

蒼木 米泔浸各等

右為末每服三錢空心服先退左紅臨睡服

先去右邊

一方用硫黃一兩白果燒灰一錢琥珀三分輕粉五分白礬五分各爲末燒酒一碗入酒浸藥封固重湯頓一二時放冷日用燒酒塗夜用沉底藥塗妙

栴榔散 治鼻赤

硫黃

各等分

片腦

少許

栴榔

右爲細末用粗絹帛包時時于鼻上搽磨妙
又加草麻子肉爲末油調臨睡搽

一法硫黃入大菜頭內煨碾塗之或以白礬研

未洗時置掌中酒滴搽患處數日即白鹽亦可

烏犀丸

烏犀角 鎊 羚羊角 鎊 牛黃 研 柴胡 淨各一兩

天門冬 去心 丹砂 研 貝母 胡黃連

人參 各半兩 麥冬 去心 知母 各七錢 黃芩

炙甘草 各二錢半

右共末煉蜜丸桐子大每服二十九空心温

酒下

椿根湯 治疰蝕口鼻

椿根

升一

葱白

升半

豆豉

升半

鹽

合半

川椒

去月并合口者

炒出汁

右一處醋及清泔各三碗煎一碗分三次服

有惡物下即效小兒量大小加減

烏香散

治鼻痔侵蝕鼻柱

草烏

燒灰

麝香

研各等分

右研極細以少許貼瘡上

人參順氣散

治感風頭痛鼻塞聲重一切上

焦風熱先用此疏通氣道即理中湯加乾葛

苦梗、川芎、厚朴、陳皮、白芷、麻黃、薑棗煎服，或加葱白。

葫蘆酒 治鼻塞、眼昏、頭疼、腦悶。

右取苦葫蘆子搗碎，酒浸，春三夏一，秋五冬七，日少少注鼻中，一方用童便浸。

黃蘗、苦參、檳榔爲末，豬脂調傅。

鼻痛 風火鬱于上則痛，初宜升麻、葛根、白芷散之，有氣道壅而痛，人參順氣散。

鼻瘡 內服烏犀丸、甘露飲、黃連阿膠丸。

外治地黃煎辛荑膏 杏仁青黛槐花研乳汁

傳 **鼻疳蝕** 必 椿皮湯 所烏香散 藍錠傳熱

鼻塞眼昏疼痛濕在上也苦葫蘆酒 腎衰其或

目火上升亦令人痛兩尺必共大而虛宜培腎

陰函逢張亦屬陰虛六味丸佳右寸關脈洪弦

屬陽中風熱作有餘心

上下牙痛不可忍牽引入腦或喜寒惡熱脈洪

數有力者涼膈散倍酒蒸大黃瀉之稍緩乃以

苦梗川芎厚朴陳皮白芷麻黃藜蘆煎服或

加葱白

治鼻塞眼昏頭疼腦悶

右取苦藜蘆子搗碎酒浸春三夏一秋五冬

日少少注鼻中一方用童便浸

鼻塞眼昏刺鼻熱玉土出苦藜蘆子

鼻熱腫 替文匙 烏香燭 藜蘆散

松油以黃煎辛美膏 杏心膏為匙芬無與比

齒痛

齒痛悉屬胃火熱極生風則浮腫痛風熱鬱久亦或生蟲未必如方士所取之大蟲也不知熱勝則肉腐非蛀也暮年齒動疎豁屬腎衰其或相火上炎亦令人痛兩尺必洪大而虛宜培腎陰齒縫脹亦屬陰虛六味丸佳右寸關脉洪弦屬腸中風熱作有餘治

上下牙痛不可忍牽引入腦或喜寒惡熱脉洪數有力者涼膈散倍酒蒸大黃瀉之稍緩乃以

清胃散加減胃火清自止、
牙根腫痛、延及兩腮、先以辛涼發散、後用涼膈
散解之、

胃中實熱太甚、口臭不可近、牙根疳蝕、脫落血
出、乃恣食肥甘美酒肉食所致、古方用禹功丸
余以爲不若清胃散、加茵陳、香薷、少佐白豆寇
妙、先須用熟大黃瀉一二次、妙、陽明之濕熱去、
則牙床清寧、而齒自安固矣、

胃熱齒痛、口臭、用黃荆條大者、煮瀝入薑汁少

許時時噙嗽

丹溪曰、牙大痛、必用胡椒、萹撥、能散其中淫熱、
煎以升麻、寒水石、佐以辛涼、薄荷、荆芥、細辛之
類

牙痛用清涼藥轉痛者、從治之、

萹撥 川椒 薄荷 荆芥 細辛

樟腦 青鹽

右爲末、搽牙上

潔古方牙痛不止 露蜂房 川椒去目等分

右爲粗末煎漱禁言語

牙痛百藥不効用荔枝殼包青鹽燒灰存性擦
牙痛處累驗一云荔枝核亦可

丹溪方茱萸煎酒含之佳

東垣馘鬼散治牙痛常暖風涼乃止屬胃中濕
熱用黃連梧桐淚之苦寒薄荷荆穗之辛涼四
味相合作風寒之藥治其濕熱升麻引入陽明
經齒爲骨之餘以羊脛骨灰補之爲佐麝香人
肉爲引共細末擦牙神効外以調胃承氣湯去

硝加黃連以瀉腸胃中濕熱行三二次更屏厚
味永不再舉梧桐淚清涼太妙第難得耳出山西

清胃散 治厚味炙煉酒麪過度積毒上攻或

過服補味暖藥致牙痛用此清之甚者加大

黃石膏

生地黃三分升麻一分牡丹皮五分歸身三分

黃連六分夏倍之

水煎服

一方齒斷宣露而痛生地黃一兩水白內搗入

鹽二合和之外用白麩裹可厚二寸煨于燂火
中以烟斷爲度去麩加麝香一分研末用少許
貼牙床上

一方香附炒黑三分炒鹽一分揩齒妙

青龍散 治同清胃散

大黃 香附

各燒灰存性入青鹽搗勻擦牙

擦牙方

青鹽兩軟石膏半白芷 香附末各三錢

右爲細末早晚擦

又方 骨碎補、大黃各四兩、燒灰存性、青鹽二

兩、石膏四兩爲末擦亦佳、更能烏鬚、一方用

蒲公英燒灰、香附末、白芷、青鹽爲末擦

丹溪當歸龍膽散 治寒熱牙痛

升麻 麻黃各一錢 生地 白芷 羊脛骨灰

各五分 膽草 黃連各一錢 歸稍五分 草豆寇一錢

右爲末擦牙

蟲牙蛀空、作痛、用黃蜂巢一箇、以川椒填滿其

竅更以白鹽一錢，封口燒存性，入香白芷、羊脛骨、灰各一錢，同研爲細末，先以茶清漱口淨，後以此藥擦之，及傳蛀處。

牙痛用絳雪、碧雪擦，是治標也。內必瀉胃火，或花椒、雄黃、白芷爲末，擦一錢。

追風散 治諸牙痛

貫衆

鶴虱

荆芥

各等分

每用二錢，川椒五十粒，水煎，漱口吐去，極効。

蒼耳子煎湯含漱，亦妙。

牢牙散 去風冷蛀齲宜露之症甚効

槐枝 各長四寸 柳枝 四十九枝 皂角 不蛀者七莖 塩 五錢

入磁罐中、塩泥固濟、糖火燒一夜、候冷取出

研細早晚擦牙

甘露飲子 治男婦胃中客熱口臭齒根腫悶

宣露心中煩、饑不欲食、咽中有瘡、並治

黃芩 天門冬 麥門冬 枇杷葉

甘草 枳殼 生地 茵陳 石斛

熟地 煎服先漱

腎水弱火盛膏梁積熱釀毒于中毒隨經血入于齒中則痛先須瀉火以治其標久之必培腎陰慎口絕慾使水升火降自無齒病方中用升麻白芷牡丹皮者引陽明經也用細辛獨活羌活荆防草寇萆撥者散浮熱鬱火也用川椒鶴虱蜂房雄黃貫衆者殺蟲解蝕也石膏大黃木律木黃連生地薄荷者降火清胃也用青蘗滋腎羊脛補骨至如旱蓮沒石故紙首烏固齒兼烏鬚也或服或擦或漱或含無非辛散苦降殺

蟲固本神而明之存乎人昧者執一法欲兼治之恐難取效一法用蟾酥銀珠摻和黍米大塞痛處引濃涎數口愈又法用川烏末點痛處與蟾酥意同不過取一時麻住不痛耳

一切齒病久之必培陰水補腎氣則火自降六味地黃丸加減最妙

一法牙動豁蒺藜燒灰一味摻妙

青塩固齒滋水也食塩亦妙

齒禹齒悉屬濕熱惟分虛實耳一法用郁李根煎

湯含漱之、冷卽易。

猪牙皂角及生薑、西國升麻、熟地黃、木律、旱蓮、槐角子、細辛、荷葉、要相當、青鹽等分、同燒燬、研細、將來用最良、揩齒、牢牙、髭髮黑、誰知世上有僂方。○按西國卽沒石子。

蛀牙用新燒石灰、蜜丸塞蛀孔中、痛立止。

齒縫中出血不止、用燒鹽、竈突煤、二物研勻、擦牙妙、塩勝血、血見黑則止。

牙疳方、用五倍子炒焦、銅青、明礬各二兩、麝少。

許研末鹽湯醋洗淨搽之

土池散 治牙痛不牢

地骨皮 白芷 升麻 防風 細辛

川芎 槐花 當歸 藁本 甘草

煎湯熱漱冷吐去亦可服

血竭散 治牙疳并惡瘡久不瘥如神

寒水石 燒熟四兩研 龍骨 兩 蒲黃 兩 血竭 五錢

枯白礬 兩 共末用少許搽之以紙封

一方走馬牙疳

黃栢 藜蘆 石膏 銅青 膽星

麝香 少許 龍骨 病急多加

共末每五分搽

男子八歲腎氣實而齒更三八真牙生五八則齒稿八八而齒去矣女子亦然以七為數蓋腎主骨齒乃骨之餘隨之所養也故隨天癸之盛衰也足陽明之支者入于上齒手陽明之支者入于下齒若骨髓不足陽明脉虛則齒之諸病生矣何以言之陽明金也齒屬腎水也陽明之

支入齒間此乃母氣榮衛其子也故陽明實則
齒堅牢陽明虛則齒浮動所以齒痛者乃陽明
經有風冷濕熱之邪乘虛而入聚而爲液爲涎
與齒間之氣血相搏擊而痛也若熱邪壅盛則
腫而痛也熱不盛則齒斷微腫而根浮也有蟲
牙痛者由濕熱生蟲蝕其根而作痛也有齒間
血出者由陽明之支有風熱之邪入齒斷搏于
血故血出也有齒齲者亦以陽明入風熱之邪
搏齒斷氣血腐化爲膿出臭汁謂之齒齲亦曰

風齧有齒蠹者是蟲蝕齒至斷膿爛汁臭也有
齒挺者由氣熱傳入脉至齒斷間液沫爲膿氣
血竭肉斷消故齒根露而挺出也有齒動搖者
陽明脉虛氣血不榮故齒動搖也有齒歷蠹者
由骨髓氣血不能榮盛故令牙齒黯黑謂之歷
齒其齒黃黑者亦然以此而言豈非諸齒病皆
因陽明之所致哉

薛新甫曰濕熱甚而痛者承氣湯下之輕者清
胃散大腸熱而齧腫痛者清胃散重則加大黃

六鬱而痛者，越鞠丸。中氣虛而痛者，補中益氣湯。思慮傷脾而痛者，歸脾湯。腎經虛寒，迫火上炎而痛者，還少六味丸補之。腎經虛熱而痛者，丹重則八味丸。其屬風熱者，獨活散不愈，茵陳散。大寒入腦者，羌活附子湯。病原非一，因時制宜可也。風雨寒濕之氣犯腦，項筋急，齒痛，羌活散。冬月犯寒，腦痛，齒亦痛，麻黃湯。或加細辛、白芷，不可用涼藥。

獨活散 治風毒牙痛，或牙齦腫痛。

獨活 羌活 川芎 防風各五 細辛

荆芥 薄荷 生地黃各二

右每服三五錢水煎漱

茵陳散 治牙齒腫痛及骨膈風熱

茵陳 連翹 半夏 荆穗 麻黃

升麻 黃芩 麝干 二活 牡丹皮

大黃 薄荷 僵蚕各二 細辛五 牽牛一

右為末每服三錢水一盞先煎熟下藥攪勻

急瀉出食後連滓服

麻黃散

麻黃根

羊脛骨

灰

龍膽草

酒炒

生地

各二錢

羌活

錢半

草豆寇

當歸身

藁本

升麻

熟地黃

黃連

防風

各六分

細辛

少許

共末搽牙

羌活附子湯

治冬月大寒犯腦令人腦齒連

痛名曰腦風為害甚速非此莫救

麻黃

黑附子

炮各三分

羌活

蒼朮

防風

黃芪

一分

甘草

三分

升麻

白殭蚕

各五分炒

黃蘗

白芷

各五分

咳嗽加佛耳草

水煎服

越鞠丸

見鬱門

補中益氣湯

見內傷門

歸脾湯

見癲狂門

六味丸

俱見虛損門

還少丹

咽喉

脉法兩手脉浮洪而上溢者，喉痺也。此痰火上

湧，脉亦如之。

脉出寸口上，魚際為溢。

丹溪曰：喉痺多屬痰，宜用吐法。或只以桐油燈
脚用鷺羽探吐，病輕者取園中李實根噙之，更
研水傳項上。暴腫不下食，吹藥吹之，或用射
干和逆水吐之。纏喉風屬痰熱，亦用吐之。
一方遠志去心為末，傳項上。又方燈心草燒
灰吹之。

咽喉腫痛。甘桔湯加歸身、荆芥、枳殼，漱而服之。
口乾火盛，加花粉、炒芩。甚者刺少商穴，出血立
愈。去手大指甲一菲葉內側 不已前方加玄參、薄荷、炒梔子，
或刺照海亦妙。

喉乾燥痛，四物加甘桔、荆芥、知蘘、玄參，屬陰虛。
愈後服六味、地黃丸，加坎離。

喉中生瘡，久不愈，多屬虛火遊行，無製用人參。

黃栢密、荆芥煎濃，加竹瀝、陰虛、身熱、脉數、相火。

盛者，四物加竹瀝。

陰虛咳嗽久之喉中痛者必有瘡名肺花瘡坎
離加玄參甘桔不可用冰片吹藥恐辛散瘡轉
潰也

平人喉中有瘡必是楊梅毒或有染來者或身
上已有而延及于喉者並服葶藶湯佳一切喉
瘡久者多服自効卽俗所謂土茯苓是也氣虛
加參芪血虛加四物
古方治喉瘡用紅燈籠草炒焦爲末酒調傳喉
中今人浸水漱亦妙

瀉實熱火黃連荆芥薄荷硝石爲末薑汁調嚙
化

丹溪曰喉舌之病多屬火熱雖有數種之名輕
重之異乃火之微甚耳微而輕者可以緩治重
而急者惟用針砭刺血最爲上策以針刺喉中
腫處立愈

喉痺用鴨嘴膽礬三分或五分爲細末吹喉中
吐痰立愈

可氣喉腫用普濟消毒飲

金陵黃泥巷楊馬軍擊法以中指蘸藥少許于
喉中用力一捻腫處出血并痰涎隨即能下湯
水絕妙即前用針刺之意妙在指法藥恐偽也
青龍膽 治咽喉閉塞腫痛并單乳蛾雙乳蛾
大有神効 用好鴨嘴膽礬盛于青魚膽內
陰乾爲末吹入喉中加熊膽三分牛黃三分
冰片三分甚妙

雙乳蛾方

黑牛膽

一個

膽礬

三錢

礪砂

二錢

山豆根

一錢

右爲末入膽中用線掛陰乾點喉中吹亦妙
牛旁子飲 治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡
如有肉腐

牛旁子 錢二 玄參 升麻 桔梗 去蘆 犀角

黃芩 木通 甘草 各一錢

水二鍾煎八分食遠服

甘桔湯 治少陰喉痛諸咽病引經藥

甘桔各等分水煎服或加荆芥當歸熱其
加黃芩枳殼

喉痺喉痛外症惡寒寸脈小于關尺者皆爲表
症宜甘桔湯加羌活荆防枳殼川芎辛以散之
乃寒鬱火邪在上焦古方用半夏桂枝甘草湯
恐太熱果嚴冬聲啞兼咳嗽有表邪者乃可若
水漿不得入口者先以解毒雄黃丸四五粒以
極酸醋磨化灌入口內吐出濃痰却與上藥間
以生薑自然汁一蚬殼嚥下取辛散鬱熱之義
婁全善喉閉惡寒者是邪氣鬱于表切忌膽礬
酸寒等劑吹喉使熱毒不能發越又更忌硝黃

芩連等下劑使毒氣下陷禍不旋踵韓祗和曰寸脉弱小于關者宜消陰助陽東垣曰寸脉不足乃陽氣微故用表藥提其氣升以助陽也竊以爲寸脉沉伏而實第小於諸部而有喉病者乃可用此法如果寸脉微小元氣耗于上焦卽是陽虛應從肺絕喉痺治豈宜辛散耶學者當會其意勿謬其說乃爲上工

喉痺傳染是疫癘先須表散荆防敗毒散從木門出入切忌酸藥吹點閉住毒立見傾危

肺絕喉閉喉中有痰如鼾響者是脉必浮散而
微細速煎獨參湯加竹瀝薑汁服遲不救參膏
亦可早則十全七八次則十全四五

備急如聖散 治時行纏喉風漸入咽塞水穀

不入牙關緊急不省人事

雄黃

細研

藜蘆

去皮

白礬

飛

猪牙皂角

去皮

炙黃

右等分爲細末每用一豆大搐鼻中立效

散毒雄黃丸 治纏喉風及急喉閉卒然倒仆

牙關緊急不省人事

台去藥八卷 因疾

雄黃

研飛

鬱金

各一兩

巴豆

去皮十

四枚

右為末，醋煮麩糊丸，菜豆大，茶清下，七丸吐
出，頑痰立甦。未吐再服，如至死者，心頭上
熱，卽以刀尺鐵匙幹開口灌之，下咽無有
不活。如小兒急驚，用二丸或三丸，量大小
加減。一法用醋磨灌，吐痰尤速。

急喉痺牙關緊，急用巴豆去殼，以紙壓出，巴豆
油將紙作撚子，點燈吹滅，以烟薰鼻中，卽時口
鼻涎流，牙關開矣。

喉閉不惡寒者及寸脉實大滑數有力于諸部屬裏症宜硝石青黛等藥降之或礬石酸味俱可用韓祗和曰寸脉大于關尺者宜助陽消陰東垣曰兩寸脉實為陽盛陰虛下之則愈

玉鑰匙 治風熱喉痺及喉風

焰硝半一兩 硼砂半兩 腦子半錢 白殭蚕一分

右為細末以竹管吹喉中立驗

世方川碧雪絳雪治喉病妙惟實火更佳

喉痺神驗因于熱者為宜朴硝一兩細細含嚥

汁立愈

丹溪方喉痺呼吸不通須臾欲絕給石草二兩水升半煎出二盞去查細細呷之立通

靈苑方急喉痺逡巡不救者蠶魚膽臘月收陰乾為末每用少許點患處藥至即瘥病深則水調灌之

開關散 治喉風氣息不通

白殭蚕

炒

枯白礬

各等分

右為末每服三錢生薑蜜水調下細細呷之

本草治纏喉風用白礬末半錢烏鷄子清一個
一味調勻細灌喉中立効此法活人殊多幸勿
忽或枯礬一味研吹入喉卽以燈盞油脚灌之
取吐妙

喉閉一握金一握燒灰拌白礬末炒青色爲度
用筋三四根壓下舌看喉中端的吹入妙此草
一名八角荷一名山荷葉如川芎樣生深山
曰一葉一枝花深山是我家硫黃怕我處水銀
化作砂癰疽與喉痺一似手拈拏

又方牙皂和霜梅爲末兮之

喉中腫痛已用吐法不減須消汚血杜牛夕卽馬

韃取自然汁和醋呷之或茜草煎汁服能降血

中之火或用紅花搗汁亦妙用乾者浸爛取汁俱是消汚血之法

丹溪曰咽痛諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻桃垂掛咽

門而止口中飯食不入須用杜牛夕根直而獨

條者洗淨入好醋三五滴同研細就鼻孔滴二

三點則絲斷珠破其病立安

咽痛

咽痛必用荆芥 陰虛火炎上者必用玄參

氣虛人參竹瀝 血虛四物加竹瀝

勞碌火過陰氣太虛孤陽飛越痰結在上遂成

咽痛脉必浮大重取必瀋宜人參一味濃煎湯

細細呷之或補中益氣湯加玄參炒黃栢

虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡利膈湯主之忌

苦寒鷄蘓葉甘桔荆防人參牛旁子水煎服妙

台去黃人參 因疾 七十三

在參

咽痛有服涼藥不愈宜用姜汁

詳見喉門是從治法

咽瘡多虛火遊行無制客于咽喉宜用人參蜜

炙黃栢荆芥治之

倘急丹治喉痛痺不惡寒者

青黛

芒硝

白薑

各一兩

甘草

四兩

右為細末用臘月內牛膽有黃者盛藥其中

增損如聖湯治風熱上攻會厭語聲不出咽

喉妨悶腫痛並治之

桔梗

甘草

錢各一

枳殼

防風

分

煎成入酥少許攪勻食後服取潤之義一法

加連翹鼠粘子

大抵治法視火微甚微則正治甚則反治捺痰
出血隨宜而施更刺少商出血行氣若腫達于
外者必傳其外地龍韭根伏龍肝之類有表症
加甘桔荆防羌活枳芎表而出之不惡寒可用
酸藥吹喉取痰嘗以鷺翎蘸米醋繳喉中摘去
其痰蓋酸以收之隨翎而出即用膽礬義同

仲景曰婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之

此亦痰火客上焦也

即四七湯
是氣門

切咽中腫痛、擦痰外、利膈湯妙

乳蛾

一邊有白泡腫痛或紅者名單乳蛾兩邊有者名雙乳蛾生于關上者易治關下者難療初起作寒熱須荆防敗毒散散之不俾寒口乾燥穢氣熱毒甚者辛涼解毒玄參 甘桔 連翹

薄荷 牛旁子 歸尾 赤芍之類熱浮于

上內以酸味收之雄黃 鬱金 各五錢 白礬 生一錢半

膽礬 五分 為末吹喉中立能言語便實火盛勢

急者前方加硝黃或用玄參散玄參 一兩 蒺藜

台去藥八卷 乙七

麝香 大黃各半兩 甘草 水煎時時哈呷此

方亦治懸癰痛不下食即會壓垂長懸而壅塞

妨礙飲食是也一法用白礬一兩燒灰鹽花一

兩共研細以筋頭點腫處立消俗云筋下咽喉

用鹽點上

乳蛾實熱結滯腫塞不開宜從治粉香散主之

白礬三錢 巴豆三粒去油皮 輕粉 麝香各少許

右于鐵器中燒礬沸時入巴豆在礬上待枯

去巴豆和三味研細吹喉中

乳蛾紅腫不消，杜牛夕根紅者，研爛，男加女乳，
汴女用男乳，調納鼻中，即前破汚血法。

黑牛膽 一個 膽礬 三錢 礪砂 二錢 山豆根 一錢

右為末，入膽內懸陰處吹咽中。

華陀危病方，治纏喉風，喉閉，其症先兩日，胸膈
氣急，出氣短促，驀然咽喉腫痛，手足厥冷，氣急
不通，頃刻不治。

巴豆七粒 三生四熟生者去殼 雄黃 皂子

者 鬱金 一個 蟬肚 研末

台去... 卷... 七... 七...

右三味研細每服半匙茶調細呷如噤咽塞
用小竹管納藥吹喉中須臾吐利卽醒如
無前藥用川升麻四兩剉碎水四碗煎一
碗灌服又無此用皂角三椀搥碎搗水一
盞灌服或吐或不吐卽安

走馬喉痺、或在須臾、用巴豆去皮、綿紙微裹、隨
左右塞于鼻中、立透、如左右俱有者、左右各塞
一粒、巴豆乃斬關奪門之將、熱則流通、雖是以
熱攻熱、自不妨也。

面

葉氏曰、手足六陽之經皆上至于頭而陽明經
脉起于鼻交額中、入上齒中、俠口環唇、循頰車
過客主人、故人之面部、陽明經之所屬也、胃中
有火則面熱、中氣虛則面寒、且不耐寒、畏風、亦
有中氣虛、虛火上炎、而面熱者、必怠墮、脉大正
補中益氣湯症也、實火脉必數實有力、精神茂
澤、升麻湯加黃連、甚者涼膈散、針經曰、面熱
者、足陽明病、勢甚者、調胃承氣湯下之、面黃

白面鼻冷氣弱大劑參芪加附子升麻升麻是
陽明經引也風熱上攻面目浮腫或紫黑或風
刺隱疹消風散加減鬱悒不得志婦女輩面
色慘慘反生黥黑舒鬱爲主越鞠加減土焦
風熱則生小瘡通聖散消風解熱脾胃虛或
吐瀉後面目浮腫者脉必緩弱或氣口虛大參
苓白朮加減

面青肝虛
面白肺虛
面黃脾虛
兩頰紅

陰虛

素問曰、五入陽明脉衰于上、面始焦、故面色弱者、必用補中益氣湯。一人面色忽黑、乃因登厠、臭氣所冲而成、令燒沉檀于座右、及帳中、旬日如故、以臭腐屬水、香屬土、土勝水也。

洗面藥、七白散、白歛、白朮、白牽牛、白附子、白芷、白芍、白殭蚕、面上細瘡、常為黃水、桃花陰乾、加當歸、或杏仁、作末洗面、指爪破面、用輕粉、生薑自然汁、調傅、無癥痕。

顛腫屬風熱、乾葛、甘桔、升麻、薄荷、有火脉、洪大

者、羌活勝濕湯加黃芩、桔梗、甘草治之。如耳鳴、目黃、頰頰腫、頸肩臑肘臂外廉痛、面赤、脈洪大者、以羌活、防風、甘草、藁本通其經血、加芩連消其腫、人參、黃芪益氣而瀉火邪。疝顛同法、外以赤小豆末、雞子清調傅。

三因方凡伸欠頰車蹉、但開不能合、以酒飲之、令大醉、睡中吹皂角末、搐鼻嚏透卽上。

一婦常錯下頰、古謂脫金鈎、兩手脈弱、用八物加升柴、遂全愈、先用手法拏上、正骨科當知。

髮

方書曰、髮乃血之餘、焦枯者、血不足也、勞心之人、未老先黃、黃而白、理可見矣、若忽然脫落、或頭皮痒、鬚眉亦落、乃血熱生風、風搖落之象、酒客膏粱、多此、或婦人天癸已行、尚黃悴、其身必夜熱、屬稟來陰虛、若病後產後、瘡疔後、精血耗而髮落者、悉屬虛、大補氣血爲主、十全湯、補中益氣湯、選用、若脾胃弱而食少、不運化者、理脾節食爲上、脾胃壯而多火、六味丸、平人烏鬚

髮七寶美髯丹多服妙一方人參紫梗加諸香浸油搽頭極妙乃物理之不可曉者

一儒者飲食勞役及惱怒眉髮脫落余以爲勞傷精血陰火上炎所致用補中益氣加麥冬五味及六味地黃丸加五味子眉髮頓生

一男子年二十巔毛脫盡脉數先以通聖散宣其風熱次用六味地黃丸不數日髮生寸許兩

月復舊

風字從虫，虫風化也。濕熱鬱久，則生虫。腐草爲螢，陳麥爲蛾之類。稟實外穀完整，虫生于內，人之腸胃無物不受，豈得無虫。三尸九遁，理或有之。其猖狂於腸胃爲痛，爲嘔，爲噉，爲嗜，種種煩苦。須仗醫藥，至蛔虫乃人之消化搬運者，偶爲食傷，則或吐或瀉出，和中自安，不可攻伐。昧者不知，妄用雷丸、史君之類，禍不旋踵。

仁齋直指云：平時嗜酒，血入于酒，則爲酒鱉。平

時多氣血凝于氣則爲氣驚虛勞痼冷敗血雜
痰則爲血驚搖頭掉尾如虫之行止上浸胃脘
食人脂膜或附脇背或隱胸腹惟蕪荑炒煎服
之兼養胃益血理中乃可殺之若徒以雷丸錫
灰不能去也

治虫要藥

蕪荑

史君子

鶴虱

檳榔

百部

苦楝根

化虫丸

治諸虫心下痛得所嗜之物則止者

是

鶴虱

去土

檳榔

苦楝根

東行不出者

胡粉

炒各一兩

明白礬

燒二分

右為末米糊丸桐子大一歲兒五丸量入天

小加減丸數溫漿水入麻油三四點打勻送

下清米飲亦可不拘時其虫細小者化為水

大者自下

丹溪曰上半月虫頭向上易治下半月虫頭向

下難効先以糖蜜肉汁香穢物引起後用殺虫

藥亦不可令其知、知則虫先迴避矣、一說上半

日向、上

集効丸

木香 鶴虱 檳榔 訶子 麩裹 蕪荑 炒

附子 水炮去 臍皮 乾薑 各七分 大黃 一兩五錢

烏梅 十四個 去核

右為末、煉蜜丸、麻子大、陳皮湯、或醋湯下、

方加黃連、黃柏、各七錢半、

烏梅丸

檳榔

五兩

大黃

八兩

黑丑

四兩共為末

皂角

十條不蛀者

苦楝根皮

右以皂角楝根皮水二大碗熬成膏搜和藥

末丸桐子大又以沉香雷丸木香各一兩為

末為衣先上沉香次上雷丸次上末香服三

丸四更時砂糖湯下

一方治寸白虫用雞子炒白蠟塵酒糊丸服

黑鉛炒成灰檳榔木等分和勻米飲調下

苦楝根鶴虱檳榔濃煎湯飲之

檳榔丸 治小兒疳病積氣塊痛腹大有虫

三稜 蓬朮 細切醋炙 各五錢 青皮 麩炒 橘紅 五錢

蕪荑 二錢半 雷丸 五錢 鶴虱 炒 三錢 畧

乾漆 五錢 炒 木香 二錢 分 良薑 炒 二錢 陳土

砂仁 一錢 去殼 麥蘖麴 炒 胡黃連 炒 三兩

茸草 炙三錢 史君子肉 五錢 神麴 炒 五錢

醋米糊丸 菘豆大 每三五十九 空心淡薑湯

下

古方前胡湯 茱根湯 利膈下氣丸 千金散 三聖

飲五鳳丸、分治五臟勞重、恐氣血虛者、未可輕
試、務起壯實、可用之、大抵不越雷丸、貫衆、棟根、
茱萸根、鶴虱、蕪荑等、各加引經藥、學者變而通
之、可也。

如或希奇怪病、除痰血外、百治不効者、卽是虫
爲患、視其經絡虛實、察脈症、消息治之。

婦人陰蝕瘡、濕熱客于肝經、而然、陰戶生虫、痒
不可忍、入臟腑、卽灰、令人發熱惡寒、與勞相似、
先用蛇床子煎湯薰洗、拭乾、付後藥。

梓樹皮不拘多少、焙爲末、入枯礬四分之一、麝香少許、付之立愈、

一法用熟豬肝、切長條、乘熱內陰中、以取虫、虫聞腥俱出肝上、如此數次、妙、內服瀉肝和血、藥傷寒過經、腸胃虛熱、虫上來食、上唇有瘡、虫食其臟、曰惑、下唇有瘡、虫食其肛、曰狐、豚虛小者、生急疾者、成、

治慝桃仁湯

桃仁

槐子

艾

各五錢

大棗

十五錢

用水二盞半煎盞半分二次服

雄黃銳散 治前症

雄黃

青廂子

苦參

黃連

各二錢

桃仁

一錢

右為細末新艾搗汁和小指大條納肛中

應聲虫

昔有人得奇疾每語喉中必有物作聲相應

有人教讀本草藥至藍遂默然遂取藍搨汁

飲之少頃吐一肉塊長二寸餘人形悉具聲

遂已、千金翼云、藍主痺蝕、又一人讀至雷丸
不應、服雷丸亦愈、

虫在肝、則令人恐怖、眼中赤壅、在心、則心煩、發
躁、在腎、勞熱、四肢腫急、在肺、則咳嗽、氣喘、醫者
不察、謬指爲時動、屬火、屬痰、寒涼、轉傷脾胃、卒
至夭枉、自非垣視一方者、烏能辨哉、

按古方殺虫、如雷丸、貫衆、乾膝、蠟虫、百部、鉛灰
皆所常用者、有加附子、乾薑者、壯正氣也、加苦
參、黃連者、蟲得苦而安也、加烏梅、訶子者、虫得

酸而靜也。加藜蘆瓜蒂者，欲其帶虫而吐也。加
芫花黑丑大黃已豆者，欲帶虫而下也。又雄黃
川椒蛇床獐腦水銀檳榔治疥虫，胡桐淚韭子
蟾酥治齧齒虫，川槿海桐皮治癬虫，青箱子覆
盆葉治尤竅虫，敗鼓桃符板虎糞骨灰人枕須
瓜鶴骨驅瘰虫，或用東引茱萸棟根后檣皮煎
湯吞藥者，取其先得天地生長之氣，以助吾發
生之氣。又性能殺虫，皆有至理，妙用莫能殫

寸白虫

月初叁日先炙猪肉一臠置口中咀嚼其津而勿食諸虫聞香爭啞如箭攻檳却以檳榔細末一兩取石榴東引根煎湯調服之虫盡下有長丈者有蠕蠕能動者

九蟲一曰伏虫長四寸爲群虫之長二曰白虫相生至形長二寸其母長至四五尺三曰肉虫狀如爛杏令人煩悶四曰肺虫其狀如蚕令人咳嗽聲嘶五曰胃虫狀如蝦蟆令人吐嘔逆六曰弱虫狀如瓜瓣令人多唾七曰赤虫狀

如生肉令人腸鳴八曰蟻虫至微細狀如菜虫
居洞腸間居則爲痔漏癰疽諸瘡九曰蛇虫長
一尺貫心則死又有三尺虫如馬尾薄筋依脾
而居有頭尾長三寸又有勞虫膈噎虫癩虫蠱
虫狐惑虫未易枚舉推類而治之可也

八仙妙應丹 治男婦小兒外感內傷以致水

穀停留腸胃生虫成積惡心嘔吐若膈

雜瘧痢黃疸水腫鼓脹膈噎翻胃及婦

人癥瘕積聚心腹疼痛小兒疳積面黃

肌瘦肚大脚細一切蠱積並治

雷丸

一兩

錫灰

兩半

白蕪荑

一兩

木香

一兩 不見火

錦紋大黃

一兩

檳榔

十二兩 雞心者

史君子肉

一兩

黑丑

頭末 三兩

右八件共為細末葱白一斤煮沸露一宿為

丸粟米大每服四錢

病深者五錢量虛實加減葱白湯下氣滯用

木香湯下空心妙服後如欲大便須在內易

不可見風泄下如敗絮筋不斷或如魚腸或

如雞子黃、或如米泔、屋漏水、或如馬尾、或如
血鱉、或如蚕、或如蝦蟆、樣子一切等物、一
服即出、有虫即取下、虫有積即取下、積有氣
即消了、氣必効之、藥年高、弱人、小兒、減半、積
消後、用四君湯、加減、補助胃氣、

虱癢、因咬虱、嚙下而成、時吐下出虱、用敗梳篦
燒末、另用煮湯調下、即淨、徐鉉、稽神錄云、浮梁
李生、背起如盂、惟癢不可忍、人皆不識、一人云
此虱癩也、以藥付之、一夕癩破、出虱數升、即日

體輕但小竅不合時時出虱竟死又臨川一人
項生瘤癢不可忍惟以火灸一醫剖之出虱無
數後出二大虱頓愈今人陰毛中多生陰虫癢
不可當肉中挑出皆八足而扁或白或紅方書
不載世以銀杏擦之或銀硃薰之皆妙

跌撲損傷

肢體全仗血氣，傷損必加補養。最忌惡血一絲
攻心卽斃。初治消瘀和血爲急。在上先消瘀，
血在下先補養。更審胃氣，去血過多，脈微欲死，
獨參湯加童便服。接任元氣，卽處大法。傷損及
金瘡去血過多，與產婦同，脈來和緩者生，急疾
者死。宜虛細，不宜數實。
氣血凝滯，肌肉傷損，則腫。或紫或青，痛不可忍。
宜活血行氣，乳香、沒藥、歸芍、紅花、蘇木爲主。乳

沒通滯血傷損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅
瘀則經絡滿經絡滿故痛且腫導而行之則痛
腫消矣

自然銅爲接骨要藥性散而燥須佐補氣血藥
不可多服逐瘀血須分輕重輕者芎歸桃仁
紅花蘇木赤芍酒煎加童便服甚者加大黃
碎硝

打撲跌傷內損經絡吐血不止童便調白芨末
服

折傷最忌者惡血攻心與破傷風二症凡血上
逆者卽以逐瘀爲急口噤牙關緊卽是冒風切
須仔細慎之慎之傷損着寒痛不可忍用葱
杵爛入鹽少許炒熱罨上其痛立止冷則溫之
昔一人傷指甲裂痛不可忍用葱炮灰火中劈
破取其間有涕者罨痛處續續換之遂止
惡血上攻薑汁和童便飲半盞佳

又法出血不止薑汁香油各四兩酒調服之
傷骨出血用益元散人參湯調服外用生薑自

然汁一盞、米醋一盞、獨核肥皂四個、敲破、按薑汁、米醋中、紗片慮過去、渣入牛皮膠煎成膏藥、貼之、

接骨散

沒藥 乳香 各五錢
自然銅 一兩 碎
滑石 一兩

龍骨 三錢
赤石脂 三錢
麝香 另研

右為末、好醋浸沒、煮乾、就焙燥、入麝伴勻、每

以一茶匙、抄舌上、溫酒下、分上下為食前

後、如骨已接、去龍骨、赤石脂、

又方

冬瓜皮 阿膠 等分

右炒乾為末以酒調下

加味芎歸湯 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔

黑血如豆汁

當歸 白芍 芎藭 荆芥穗 百合水浸

半日各 加酒煎服 等分

紫金散 治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或

有瘀血停積於內心腹脹

紫金藤皮二兩 降真香 續斷 補骨脂

無名異 琥珀另研 蒲黃 牛膝酒浸 當歸

桃仁去皮尖 各一兩 大黃紙煨 朴硝另研各 兩五錢

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒下連進

二服妙利去惡血

復元活血湯 治從高墜下惡血留于腸胃兩

脇痛不可忍

柴胡 花粉 當歸 紅花 甘草

大黃 桃仁研泥 川山甲

酒水煎服以利為度

當歸導滯湯

治瘀血脹悶

大黃

兩一

當歸

錢半

麝香

少許

右為末每服三錢熟酒下

鷄鳴散 治同上

熟大黃

兩一

當歸尾

錢五

桃仁

七粒

右為末酒一碗鷄鳴時煎服利下惡物為愈

從高墜下一切損傷氣欲絕不能言急以熱小

便灌之即醒

奪命丹 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損

瘀血凝積心腹疼痛二便不通

大黃 黑牽牛 各二兩 紅蛭 用石灰慢火炒令乾黃色半兩

共為末每服三錢熱酒調下如人行四五里

再用熱酒下牽牛末二錢催下惡物為佳

花蕊石散 治一切金刃所傷打撲傷損身體

出血者急于傷處搽藥其血自化為黃水如

有內損血入臟腑熱酒童便入酒少許調一

錢服立效若牛觸腸出不損者急送入用細

絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上搽藥立
活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封爨
瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之後搽藥
婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎
衣不下並用童子小便調服

硫黃

上色明淨者四兩搗為粗末

花蓋石

一兩同上

右二件和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子
一箇候泥乾入藥在內用泥封口候乾安
在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤

直至經宿火冷炭銷又放經宿確冷取出
細研以細絹羅了羅極細磁盒內盛依前
法用

治打撲閃筋斷骨折寧急痛

腫不能屈伸及榮衛虛弱身久月
絡筋骨緩縱皮內刺痛肩背拘急

川烏頭生去皮臍

骨石補去

白芍

沒藥

乳香研

自然銅

人煨醋淬十二次
研為末木飛過

當歸

洗焙各一錢

生地 川芎 各半

錢

共末生薑自然汁 蜜丸每一丸二錢五分

每用一丸搥碎水酒各半盞蘇木少許同

煎去蘇木熱服

內傷筋骨疼不可忍

沒藥 乳香 芍藥 川芎 川椒 去目及開

口 當歸 各一兩 自然銅 二錢半 炭火燒

右為末黃臘二兩溶化入藥末不住手攪勻

丸彈子大每服一丸好酒煎乘熱服之連

進二服

乳香定痛散 治打撲傷損落馬墜車一切痛

腫

乳香 沒藥 川芎 白芷 芍藥

甘草 生地 牡丹皮

右為末每服二錢溫酒並童便調下

沒藥乳香散

白木製五錢 當歸焙 白芷 沒藥另研 肉桂皮

乳香另研 甘草炒各一兩

右爲末每服二錢温酒調下

經驗方 治打撲傷損服之自頂心尋病至下

兩手遍身遇受病處則颯颯有聲覺藥力習

習往來則愈矣

乳香 沒藥 蘇木 降真香 松明節

川烏 去皮 自然銅 火煨醋浸七次各一兩 龍骨 半兩

地龍 半兩去土炒 水蛭 油炒半兩 血竭 三錢 土狗 十個油浸

焙乾爲末 卽螻蛄

右爲末每服五錢無灰酒調下隨上下進藥

又方

糊猴薑研爛取汁酒煎服渣傳患處

接骨散 並治惡瘡

金頭蜈蚣

一個

金色自然銅

半兩燒紅醋淬研末

乳香

一錢

銅錢

重半兩者或二文或五文燒紅醋淬研細

金絲水蛭

錢半每個作三斷瓦上培去氣道為度

右為末如瘡腫處津調半錢

之自止痛如

見膿先用

粗藥末少許麻油少半匙同打

勻再入半匙再打勻又入前藥接骨散半

錢以釵脚打成膏子用鷄翎掃在瘡上痛處立止痛天明一宿自破

如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一盞熱調連渣溫服如骨折損以接定不疼未折但痛服後即止

神效

神聖接骨丹 治同上

水蛭 用糯米于砂鍋內炒黃三錢 兔絲子 好綿灰

髮灰 沒藥 乳香 血竭 各一錢 半兩錢

一文燒七次醋
淬七次另研
射香
另研 錢

右研勻每服三錢熱酒調下隨上下食前後
用約人行六七里聞骨作聲忌聽鐘磬鼓
柳砧聲恐震動生蘆節忌驢肉一服見效
續服散 治折傷筋骨

半兩錢七個以桑柴火燒紅好醋淬之取
錢上碎末再入珍珠末一分乳香沒藥少
許同研極細酒調下

止痛散

黃麻

燒灰二兩

頭髮

燒灰一兩

乳香

錢五

右爲末每服三錢溫酒調下

滴傷處并查討

茴香酒

治打撲肢體凝滯瘀血腰脇疼痛

破故紙

炒

茴香

炒

竦桂

各一錢

每服二錢食前熱酒調下

泥固齊服過爲末

南京下浮橋梁回回丹藥每用二三厘瓜仁搗包酒下極驗遠近患損傷者翫覓之要皆不外土鱉自然銅第製法精爾

土質自然融榮樂去辭爾
謂下隨上下食前後

已既下對無效並患財為昔棘資之要皆不於

南京不判辭采回回長藥每用二三風瓜二歲

尋則二翅食前煎既開下

如好絲
以荷香
以救封
紅好醋沖之取

荷香既
以白林對丸
以帶極血
以飄飄
以參

日為末尋則三翅為既開下

正黃和
二兩煎
一兩香

筋斷

丹溪法接筋用旋覆花根、杵汁滴傷處，將渣封瘡。上半月筋自續，卽金沸草根。

接耳鼻法

治擦落耳鼻，用髮入礮子，塩泥固濟，煨過爲末。乘急以所落耳鼻蘸灰綴定，以軟絹縛定，効。昔一僧爲驢咬下鼻，用之効。

肩破

負重肩破者，剪猫兒頭上毛，不語唾貼之。

遠行打破脚起泡調生麩糊貼過夜卽乾不可
擦破又法用飯粘貼過夜以紙蓋之次日平復
從高墜下惡血流于脇下痛不可忍復元活血
湯主之脇乃肝肺之位故以柴胡爲君當歸三
錢活血肝苦急甘草二錢緩之炮川山甲瓜蒌
紅花桃仁各三錢行血化滯酒大黃蕩滌敗血
水酒煎服方大有理

從高墜下惡血在骨節間疼不可忍芸臺散主
之

荆芥 藕節 各二兩 陰乾 芸臺子 碎硝

馬齒莧 各一兩 陰乾

右為末用蘇子半兩酒一大盞煎七分調下

二錢隨上下同

傷損愈後肌膚青腫用茄子種通黃極大者切

片一指厚瓦上焙乾為末酒調二錢臨睡服一

夜消盡無痕

四脫白急用手法拏上遲則惡血填滿白中難

上矣

白... 中...

...

...

...

...

...

...

...

...

破傷

身體偶有所傷或風從瘡口入名破傷風多疾最急症也其症身體搖擗口噤自汗身熱如火勢急非常藥可治者必以防風全蝎為主口不能開用十個為末酒調下

破傷風汚血凝心鴉翎燒灰存性研末細酒調下一錢

已汗而身熱不清用瓜萋九錢滑石南星

蒼朮 赤芍 陳皮一錢 黃柏炒 黃芩

白芷 錢五 甘草 薑一片煎服

防風湯 治破傷風同傷寒未傳入裏宜急服

防風 羌活 獨活 川芎 各等分

水煎不時服甚者加藁本細辛或調蜈蚣散

大効

蜈蚣 一雙 江鱧 五錢 左盤龍 五錢炒煙盡

右爲末每服二錢用防風湯調下如前藥解

不已覺轉入裏當服左盤龍丸服之看臟

腑軟硬加巴豆霜

左盤龍丸 治風毒在

衣直視

左盤龍

殭蚕

炒

江鰈

炒五錢

雄黃

一錢

右為末燒餅丸桐子大每服十丸酒下如裏

不減將末一半入巴豆霜五分如前丸每

左盤龍一服加一丸漸加至利為度如搗

不止再服羗活湯

羗活湯

羗活 獨活

地榆

防風

各一錢

水煎服如熱加黃芩有痰加半夏

若病久氣血漸虛脾胃受邪宜養脾祛邪為王
養血當歸地黃湯

四物湯加藁本細辛防風白芷

水煎服

如汗不止或服發散藥後不止服白朮防風

即二味加黃耆是也

破傷臟腑秘小便赤用表藥汗不休宜速下之

先用芎黃湯不已用大芎黃湯

芎黃湯

川芎 錢三 黃芩 錢二 甘草 錢一 溫服

大芎黃湯

川芎 錢二 羌活 黃芩 大黃 各五錢

煎服取利為度

羌活湯 治半在表半在裏者

羌活 菊花 麻黃 川芎 白茯苓

防風 石膏 前胡 黃芩 細辛

甘草 枳殼 薄荷 白芷 蔓荊子

水煎通口服

金匱要略 卷八 皮湯 一百三

白朮散 治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮 葛根 芍藥 升麻 黃芩

甘草 水煎溫服

玉真散 治破傷風及金瘡冒風

天南星 防風 等分

右為末破傷風以藥敷瘡口後以溫酒調下

一錢如牙關緊急魚弓反張以二錢調下

歐打欲死內損以溫酒下如已昏絕心口

尚溫者童便灌下二錢連進二服然

爲防風所製服之不麻衛生寶鑑名定風散治風狗咬破先以口嚙漿洗淨用綿乾貼再不發

如聖散 治破傷風止血定痛

蒼朮

六兩

川烏頭

炮去皮四兩

防風

草烏頭

炮去皮

細莘

各二兩半

兩頭尖

炮去皮四兩

天麻

川芎

白芷

各兩半

損骨加乳香

右爲細末每服一錢酒調下

經驗方 治破傷風極效

初覺有風時急取熱糞堆內蟻螞蟲二個
用手捏住待蟲口中吐些小水就沫在破
傷處身穿稍厚衣裳待片時瘡口覺麻兩
脇微汗風出立效

如風緊急速取此蟲三五個剪去尾將肚
內黃水塗瘡口再滴些水入熱酒內飲之
汗出立效

四惡症不可治一頭目青黑二額上汗珠不流
三眼小目瞪四身汗如油又痛不在瘡處者傷

經絡死症也。

外治初覺瘡腫起白痂身寒熱急用玉真散傅之。或用杏仁去皮細嚼和雄黃飛羅麩傅之。腫消爲度。○若腰脊反張四肢強直牙緊口噤用鼠一頭和尾燒灰細研臘猪脂和傅。○牙關緊不能開用蜈蚣一條焙乾研末擦牙吐涎立愈。狗咬破傷風人參不拘多少桑火上燒烟盡用盞子合研爲末摻瘡上仍以魚鱉烱封固。

益于合冊為末對藥工所以魚黠羊桂固

味如麴麴風入參不味多少桑火土熱飲盡用

不損開用知此一斜飲葶而末對平如致立愈

岸一更味身熱又除而難辭味軒○平關紫

前為與○苦烈香又藥四却觀直平潔口禁用

之更用杏二去支除體味熱黃紫羅變斬之觀

代出味覺熱動味白無良寒煎急用王真精製

孫益及並也

在卷處者

諸哽

不幸而悞哽于喉、當察明是何物、以所勝能制者治之、如魚畏橄欖、椰魚刺哽用之、無則用核磨水服、狗涎治骨哽、鷺涎治稻芒哽、鴨涎治螺螄哽、磁石治鐵哽、水銀治金銀哽、要在變而通之、諸法不若咒由妙、金陵秣陵鄉中一人姓李號守泉符水絕妙、遠近求無不立效、其法命哽者坐自己佛堂中、佛前放一盃淨水、令親屬往求、燒符用法訖、徐以小箋卜之、云已愈矣、其人歸

者更

家看淨水中所哽之物在內隨愈乃親見者
本草云楮實軟骨諸骨哽者搗自然汁服或用乾
者爲末和水取汁亦可楮皮亦効

玉簪花根爛骨研細取汁用竹管灌喉中不可
着齒犯之齒酥萱草根亦治骨哽

又法槿樹葉油馬屁勃砂糖三味熬膏爲丸
化屢驗

又法水牛屎上生蕈晒花爲末用砂糖爲丸
徐禁吞下仍以砂糖爲衣不然損齒

金鳳子嚼爛噙化無子用根極能爛骨

又法用野苧根洗淨搗泥每用龍眼大如被鷄骨傷以鷄羹化下魚則魚湯鷄骨哽用水簾草搗汁飲之骨自下

魚骨在肚中刺痛煎茱萸湯一盞飲之骨軟而出魚哽百法不應餵糖丸鷄子大吞之立下誤吞錢及環餵糖一斤漸漸食之自出

錢哽艾一把水五升煎至一升頓服便下

丹溪

又法南竹根燒灰湯調下

又法百部根煮酒下

相傳錢銅哽、勃菴生嚼效。山居方用加茨菰汁、誤吞錢及金銀物，以胡粉一兩搗調之，分再服。如在腹中不消，服水銀自化。又法服砂仁湯自下。

諸哽用薤白煮半熟，以線縛定，手執線頭少嚼。薤白嚥之，度薤至哽處，便牽引哽，卽隨出。又法用絲綿一小塊，如上法亦妙。

骨哽外宜燒乳香，或用皂角末取嚏出。

關格

關則不得小便，格則吐逆。寒在胸中，格絕不通，熱結下焦，津液不行，關者甚熱之氣，格者甚寒之氣。大法宜吐以提其氣之橫格，不必在出痰也。有痰者宜吐，二陳湯吐之，吐中便有降。有中氣虛而不運者，補氣藥中升降之，或用針以升降其氣。兩手寸口俱盛四倍以上多死。婦人久吐不尿，頭汗出，即死，乃氣脫也。九竅五臟陰極自地而升，是行陽道，乃東方之

金石之變上壅是也極則陽道不行反閉于
上故令人吐逆是地氣之不能上行也逆而下
降及行陰道故氣填塞而不入則氣口之脈大
四倍于人迎此清氣反行濁道也故曰格
下竅六腑陽極自天而降是行陰道乃西方之
氣膏粱之物下泄是也極則陰道不行反閉于
下故不得小便是天之氣不得下通也逆而上
行反行陽道故血脈凝滯而不通則人迎之脈
大四倍于氣口此濁氣反行清道也故曰關

祝由科 治咽中刺塞

以左手屈中指及無名指作三山印坐水盞于其上右手捏金鎗印脚踏丁字立望太陽或燈火取氣一口在淨水盞中咒曰吾取太上老君東流順水老君奉勅攝去毒水吾托太帝尊所到稱吾者各現帝身急急如律令攝念七遍吹在盞中虛攪卓三次為定即與水飲之即愈取諸骨骸神符

- 魘魚
- 魘雞
- 魘猪
- 魘
- 魘
- 魘
- 魘
- 魘
- 魘

合夫彙八卷 祝由科 百二十一 頁三

② 咒水此碗化爲東洋大海，咽喉化爲萬丈
龍潭，龍歸洞，吾奉

太上老君急急如律令奉勅，吸東方生氣三口，
吹入碗中，每行此法，正面朝東，用淨水大碗放
卓上，左手執拳在胸前，右手執劍訣于碗中書
前符號，假如魚哽，就書上龜宗除龜龜三字，勿
書，再書下八符，餘倣此。

咒水治諸哽

湯火瘡

凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍半時卽不痛
慎不可以冷物塌之及井底泥傅之使熱氣不
出爛入見肉

火燒以好酒洗之又以鹽傅其上如皮塌以酒
熬牛皮膠傅之如湯傷以淋過二次灰查傅
上立安熱酒傷糯米粉炒黑末調傅之

治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰鷄子黃和
傅之如成瘡白蜜封以竹中膜貼上日三

經驗方湯火瘡麩皮炒黑灰爲末傅神妙此方
有補性始終皆可用

千金方火瘡未起穉子仁燒灰麻油和封之厚
乃佳已成瘡燒白糖灰傅之燥卽瘥

冰霜散治火燒皮爛大痛

寒水石

生牡礪燒

朴硝

青黛

輕粉

各等分

共末井水調搽

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂

寒水石

大黃

各等分

右爲末以新汲水調塗

丹溪方火燒用桐油水銀等分二件以柳條不住手攪成膏再入大黃石膏末和以牛皮膠入少水溶開外用貓兒肚底毛細剪摻上貼之

苦參末油調搽亦佳又方火瘡痛不可忍用尿坑底下泥加老薑汁麻油十分之一研勻搽傷處立愈青黛敷亦可

火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器收之入水些少待爛成水傅上神妙

熱油傷蜜搽佳。火瘡敗壞雲母粉同生羊髓和塗之。湯火瘡先以酒洗次以楊梅樹皮爲末香油調敷。

又方用髮一束香油煎以髮盡爲度放冷搽患處。

又方熱油及火傷定痛以丹參細挫水調和羊脂煎三上三下敷瘡立愈。

又方鷄子十數個石器中熬自然油敷之。

竹木刺肉

凡諸竹木刺入肉中不出，用蟻螯研敷立出。
一方白茅根，搗傅亦妙。一方嚼牛膝根，罨之。
又方竹木刺入深不得出，烏羊屎研爛，罨傷處。
蘆葦刺入肉，細嚼栗子查，盒痛處。諸刺已出，
而痛不止，螻蛄研傅。針入肉不出，用螻蛄腦
子，同硫黃研細，調敷。以紙花貼定，如覺痒時，其
針自出。又方車脂攤紙上，如錢厚，二日一換。
三五次，其針自出。又方用烏鴉翎三五枝炙。

黃色研末，好醋調膏塗瘡上，一二時針出效。

又方：雙仁杏仁搗爛，以車脂調勻，貼自出。已

出而痛不減，黃泥罨之。諸骨刺入肉不出，水

煮白梅肉研調，象牙末傅自軟。咽中刺，象牙

水調飲之。牙梳爲末亦可。魚骨在肉中不出

者，嚼莫菜莖封之。

破傷風血凝心，針入肉三症，如神方。烏鴉翎燒

灰存性，細研服一錢，滾湯下。

箭頭入肉

箭鏃入骨不可拔。巴豆去殼研爛，蟻娘共研勻，塗所傷處，須臾痛定，漸痒不可忍，使撼動拔之。又法：蟻娘不拘多少，麝香共末，搽箭瘡上。

萬全神應丹：出箭頭魚骨針、麥芒等，遠近皆治之用。葺荇科，卽天僊子苗也。於端午前一日，持不語戒於野中，尋得揀科根實全者，口念先生爾，却在這裡，卽以柴灰自東南頭圍了，用木篋擻起，週迴土。次日端午日未出時，依前持不語，用水擻，只一擻，取出水洗淨，不令婦人、鷄犬見。

淨室中石柏內搗爲泥丸如彈子大以黃丹爲衣以紙袋封懸在高處陰乾若遇箭不出者以緋帛絹袋盛此藥一丸放臍中綿束肚緊先以象牙末貼瘡上後用此藥若箭瘡口小卽用刀刮開以象牙末貼之

孫真人治箭頭在咽喉胸膈不出以螻蛄搗汁滴三五度妙

瓜萇根搗傅亦妙

循衣摸床

循衣撮空摸床，多是大虛之候，乃精神耗散，不能主持也。不問雜病傷寒，以大劑補之，多有生者。海藏云：婦人血風，因大脫血，崩漏或前後失血，因而枯燥，其熱不除，循衣撮空，摸床閉目，不醒，揚手擲足，搖動不寧，錯語失神，脈浮弦而虛，內躁熱之極也。氣竈鼻乾，不潤，上下通燥，此爲難治。宜生地黃黃連湯。傷寒熱邪傳裏，有此症而脈實者，大承氣湯。

診法 病人循衣縫譫語者不治 病人陰陽

俱絕掣衣撮空妄言者死

笑不休

內經曰神有餘則笑不休所謂神者心火是也
火得風而焰笑之象也黃連解毒湯加半夏竹
葉竹瀝薑汁戴人用滄鹽成塊者二兩火燒赤
放冷細研以河水煎服探吐出痰而愈

悲

仲景曰婦人臆蹶喜悲傷欲哭象如神靈所作

數欠伸、甘麥大棗湯主之、甘草三兩、小麥一升、大棗十枚、煮三升、溫分三服。

邪祟

病者見神見鬼、皆自己粗神飄蕩、非真有神鬼也。如果山居野處、宅近古廟、神堂、氣血虛者、感而作祟。正人君子、神旺者、無有也。丹溪曰：血氣者、心之神、神既虛乏、邪因而入、理或有之。若夫氣血兩虛、痰滯心竅、妨碍升降、不得運行、以致十二官各失其職、視聽言動、皆爲虛妄、以邪治

之其人必死。

脈乍疎乍數，乍大乍小，祟也。

丹溪曰：俗云衝惡者，謂衝斤邪祟而病也。如病此者，未有不由氣血先虧而致者焉。

病人自見五色鬼屬五臟元神，神不守舍，實非有神也。當詢之傍人，如不見，卽是乃元氣極虛之病。肺虛見白鬼，兼見面青唇青、洒淅等肺家病，參著大補肺氣，自安。舉此他臟可類推矣。

五邪剝法

肝虛見白屍鬼

屍症卽邪祟其狀面色時五色如含愧赧語言不倫動搖跳躍時見異症脉來乍大乍小是爲邪鬼所憑而然古方用死人枕煎湯飲之則鬼邪觸類而出大瀉數行卽愈仍以其枕送還原處

秦承祖灸鬼法用排繩將兩手大指相並令縛緊去甲一韭葉肉與甲要四處着艾灸七壯神效

經驗辟邪丹 治衝惡怪及九尾狐精為患

人參 茯神 遠志 鬼箭羽 白朮

九節菖蒲 蒼朮 各一兩 當歸 一兩 桃奴 焙乾五錢

雄黃 辰砂 各三錢 另研 甘草 一個 另研 金箔 二十片

或加麝香

右共為末以酒調米粉打糊丸龍眼大金箔為衣時時木香湯化下一丸諸邪迴避更以絳紗囊盛五六丸懸之帳中尤妙

又法人指甲燒灰吹入喉中更糝硼砂亦可
子和法一小兒誤吞一錢在喉中不下諸醫不
能出亦不能出亦不能下乃命戴人戴人孰思
之忽得一策以淨白表紙令卷實如筋以刀縱
橫剖其端作鬚鬆之壯又別取一筋縛鐵線釣
于其端令不可脫先下咽中輕提輕抑探之覺
釣入錢眼中然後以紙納咽中與釣尖相抵覺
釣紙入紙卷之端不礙肌肉提之而出
一人誤吞一針刺于喉中不得出想得一法用

磁石能吸鐵者磨光小棗大打一眼線繫定懸入咽少頃提出針在石上

竹木刺哽不下用多年陳籬笆片煎湯下

祝由科

呪水治諸哽

以淨器盛新汲水一盞捧之面東默念云謹請太上東流順水急急如南方火帝律令勅一氣念遍卽吹一口氣入水中如此七次以水與病者立下或用此水可以吞針筋竹刺

關格脉沉細手足冷既濟丸主之

熟附子 人參各一錢 麝香少許

右糊丸桐子大麝香為衣燈心湯下七丸

栝榔益氣湯 治關格因勞後氣虛不運者

栝榔用多人 人參 白朮 當歸 黃芪

陳皮 升麻 甘草 柴胡 枳殼

生薑煎服

中脘疼後小便不通兩寸關滑實是痰膈中焦氣滯下焦用水通二陳枳殼加薑先服後吐更

不通下小胃丹或滾痰丸

脉微弱關格兼心煩者栝子仁湯二陳加人參
栝子仁生薑煎成人麝少許或加郁李更妙
吐逆二便俱秘導氣清利湯佳二陳藿香止嘔
參朮益氣栝子仁潤燥木通梔子猪苓澤瀉利
水道牽牛大黃檳榔厚朴枳殼利穀道
麝香生薑開結爲川兼服木香和中丸吐不止
灸氣海及天樞或下用蜜導

吐逆而大小便秘急者加味麻仁丸妙大黃二

兩白芍、厚朴、當歸、杏仁、麻仁、檳榔、南木、香、枳殼、
各五錢、麝香少許、蜜丸白湯下、

一法、經五、六日、大小便不通者、皂角散一味、大
皂角為末、枳殼研末、米湯下一錢、外以豬脂一兩、
煮熟、以汁及脂俱食之、乃服八正散、加檳榔、桃
仁、枳殼、朴硝、燈心、