



神農本草經疏

二

特別
79
173
2



門 173
號 2
卷 2

神農本草經疏卷之二

諸病應忌藥總例

讀本記

補氣

人參

黃耆

二朮

人胞

紅鉛

溫補

人胞

紅鉛

白膠

鹿茸

巴戟天

人參

黃耆

二朮

本草經疏卷二

綠君亭

神農本草經疏

淫羊藿

肉苁蓉

補骨脂

當歸

狗陰莖

菟絲子

蛇床子

大熱

附子

肉桂

仙茅

陽起石

烏頭

硫黃

海狗腎

羊肉

雀肉

天雄

葫蘆芭

破氣

青皮

枳實

枳殼

檳榔

厚朴

牽牛

閉氣

銀杏

米麩食

豬脂油

二朮

黃耆

降氣

降真香

蘇子

鬱金

枇杷葉

橘紅

沈香

烏藥

破血

桃仁

紅花

蘇方木

延胡索

乾漆

五靈脂

花蓋石

乳香

沒藥

薑黃

三稜

蓬茂

水蛭

蝨蟲

麝蟲

肉桂

桃梟

穿山甲

騏驎竭

升提發散

升麻

柴胡

川芎

紫蘇

麻黃

乾薑

羌活

獨活

防風

白芷

生薑

細辛

荆芥

前胡

藁本

芎白

薄荷

辛溫辛熱發散

吳茱萸

乾薑

桂枝

麻黃

細辛

羌活

獨活

防風

藁本

川芎

白芷

芎白

吐

瓜蒂

梔子

豉

皂莢

藜蘆

常山

人參蘆

鰕汁

鹽湯

下

大黃

芒硝

巴豆

牽牛

玄明粉

枳實

厚朴

降泄

山梔

知母

天門冬

玄參

利水

猪苓

澤瀉

木通

瞿麥

車前子

葶藶

滑石

海金沙

商陸

茯苓

扁蓄

烏柏根皮

琥珀

芫花

甘遂

大戟

續隨子

漢防已

郁李仁

損津液

郁李仁

白礬

礬紅

半夏

欽攝

白芍藥

五味子

醋

烏梅

白梅

酸棗仁

固澀

龍骨

牡蠣

栗殼

訶黎勒

益智子

山茱萸

桑螵蛸

蛇床子

肉果

蓮鬚

阿芙蓉

金櫻子

原蠶蛾

汁導

山查

麥芽

草果

檳榔

三稜

蓬茂

神麴

枳殼

枳實

綠礬

萊菔子

紅麴

橘紅

砂仁

開竅

龍腦香

麝香

蘇合香

檀香

安息香

香燥

沈香

麝香

龍腦香

縮砂蜜

豆蔻

藿香

香附

丁香

烏藥

木香

辛燥

火酒

蒜

半夏

南星

二朮

辛熱

乾薑

吳茱萸

胡椒

蒜

懷香

生薑

巴豆

龍腦香

溼潤

地黃

當歸

肉蓯蓉

天門冬

知母

猪脂油

麻仁

栝樓仁

滯膩

猪羊犬肉

鷺

地黃

南麩

油膩

炙燂

滑利

冬葵子

榆皮

牛乳

椿根白皮

柿

瓜

李

桃

梨

蜜

青菜

蓴菜

酥

茄子

發溼

鱖魚

南麩

苦寒傷胃

山梔

黃檗

黃芩

黃連

大黃

苦參

玄參

知母

盧會

補命門相火

鹿茸

巴戟天

附子

人胞

紅鉛

白膠

肉桂

仙茅

陽起石

膾肭臍

淫羊藿

補骨脂

狗陰莖

菟絲子

原蠶蛾

補腎水苦寒

黃檗

天門冬

玄參

知母

酸寒

白芍藥

牛膝

烏梅

鹹寒

童便

芒硝

玄參

秋石

生冷

菱

梨

菜

李

甘

甘草

飴糖

大棗

蜜

鹹

食鹽

商陸

咸水

鹿茸

蛤蜊

蠟黃

鹽

續序列下

○陰陽表裏虛實門

陽虛卽真氣虛其證惡寒或發熱自汗汗多亡
陽陽虛不發熱單惡寒者居多

忌破氣 降泄 利水 苦寒 又忌
辛熱發散

青皮 枳殼 厚朴 牽牛

檳榔以上破氣 大黃 石膏 山梔

知母

天門冬

生地黃

栝樓

已上降泄

澤瀉

木通

瞿麥

木相根皮

漢防已

葶藶

猪苓

滑石

海金沙

商陸

已上利水

黃芩

黃連

黃檗

玄參

槐花

已上苦寒

芍藥

烏梅

醋

已上酸

吳茱萸

麻黃

羌活

獨活

前胡

防風

荆芥

已上辛熱發散

宜補

甘

溫

熱

人參

黃耆

二朮

炙甘草

當歸

白膠

淫羊藿

人胞

紅鉛

補骨脂

巴戟天

桂

附子

仙茅

鹿茸

大懷香

陽起石

羊肉

雀肉

陰虛即精血虛其證為欬嗽多痰吐血咯血嗽血鼻衄齒衄盜汗自汗發熱寒熱潮熱骨乏無

力不眠氣急腰背痛

忌補氣 復忌破氣 燥熱辛溫 又忌大

寒大苦傷胃 并升提發散 利水

人參 黃耆 二朮 人胞已上補氣

南星 半夏 附子 官桂

桂枝 仙茅 鹿茸 乾薑

硫黃 陽起石 海狗腎 丁香

胡椒 烏頭 火酒 吳茱萸

烏藥 生薑已上燥熱辛溫 山梔

黃芩 黃連 大黃 芒硝

玄明粉已上大寒大苦傷胃 麻黃 升麻

柴胡 羌活 獨活 藁本

川芎 防風已上升提發散 破氣利水藥見前

宜生精補血兼清虛熱 欽攝 酸寒 甘

寒 甘平 鹹寒 畧兼苦寒

地黃 栝子仁 人乳 沙苑蒺藜

枸杞子 牛膝 麋角膠 阿膠

沙參 酸棗仁 白芍藥 五味子

山茱萸 石斛 麥門冬 薯蕷

牡丹皮 續斷 地骨皮 車前子

溺白堊 鼈甲 黃檗 知母

青蒿

表虛其證自汗惡風洒淅寒熱喜就溫暖脉浮無方

忌破氣 升發 辛熱

麻黃 升麻 防風 柴胡

羌活 獨活 前胡 乾葛

紫蘇 薄荷 白芷 生薑

荆芥 已上 吳茱萸 桂枝 表虛而中寒者不思

乾薑 已上 破氣藥見前

宜補飲 益氣實表 甘 酸

人參 黃耆 白芍藥 甘草

桂枝 有熱者勿用

五味子

裏虛其證洞泄或完穀不化心腹痛按之即止
或腹脹或傷寒下後痞滿

忌破氣 下 苦寒

大黃

芒硝

巴豆

玄明粉

牽牛 下 上 黃芩

黃連

山梔

知母

黃檗

天門冬

茗 已上 破

氣藥見前

宜溫補 甘 佐以辛熱

人參

炙甘草

朮

大棗

糯米

肉桂

附子

有熱者勿用

乾薑

汗 陽實即表邪熱盛其證頭痛寒熱遍身骨痛無

忌補斂 下 大熱

黃耆

人參

二朮

桂枝

芍藥 五味子 米麩食 猪羊犬肉

醋已上補歛 附子 胡椒 乾薑

肉桂 蒜 吳茱萸已上大熱 下藥見

前

宜辛寒發散 天寒畧加辛熱辛溫佐之

石膏 知母 葛根 麥門冬

前胡 柴胡 黃芩 紫蘇

薄荷 升麻 防風 葱白

荆芥 羌活 麻黃冬月可用春夏忌之

陰實即裏實外感證屬邪熱內結者其證胸腹
鞭痛手不可近大便七八日不行或挾熱下痢

忌辛溫發散 補歛

諸藥俱見前

宜下 苦寒 鹹寒 甘辛

大黃 厚朴 枳實 滑石

山梔 黃芩 黃連 藍

茵陳

芒硝

桃仁

陽厥卽熱厥其證四肢厥逆身熱面赤唇燥大渴口乾舌苦目閉或不閉小便赤澀短少大便燥結不省人事

忌升發

補斂

燥熱辛溫

諸藥俱見前

宜下

清熱

甘寒

苦寒

鹹寒

大黃

芒硝

石膏

黃芩

黃連

山梔

知母

童便

如挾虛有痰者宜麥門冬竹瀝蘆根汁梨汁牛黃童便

如婦人熱入血室因而厥者藥中以童便爲君加赤芍藥生地黃牛膝牡丹皮桃仁甚者大便結燥加芒硝大黃下之通卽止勿盡劑

陰厥卽寒厥其證四肢厥逆身冷面青踈臥手

指爪青黯腹痛大便澹或完穀不化小便自利
不渴不省人事

忌下 破氣 苦寒 鹹寒 酸寒

食鹽 太陰玄精石

童便已上鹹寒

芍藥

醋已上酸寒 下破氣苦寒諸藥俱見

前

宜補氣 溫中 甘溫 辛熱

人參

乾薑

附子

桂

吳茱萸

上盛下虛屬陽盛陰虛

忌升散 下 助陽補氣 復忌破氣 燥

熱辛

諸藥俱見陰虛條下

宜降 益陰 甘寒 酸寒 佐以鹹寒

苦寒

蘇子 枇杷葉 麥門冬 枸杞子

生地

沙參

白芍藥

山茱萸

五味子

牛膝

童便

玄參

黃檗

天門冬

○五臟六腑虛實門

心虛

八證

忌升發

破氣

苦寒

辛燥

大熱

諸藥俱見前

宜補血

甘溫

酸飲

佐以鹹寒

鎮墜

生地黃

龍眼肉

人參

炙甘草

石斛

酸棗仁

五味子

栝子仁

丹參

茯神

遠志

鹿茸

炒鹽

丹砂

驚邪屬心氣虛

忌升 破氣

諸藥俱見前

宜降 清熱

豁痰

平經曰驚者平之

犀角

丹砂

琥珀

真珠

龍齒

金箔

牛黃

代赭石

羚羊角

麥門冬

石斛

桔梗

麝香

麝香

竹瀝

天竺黃

遠志

鬼臼

癩癧屬心氣虛有熱

忌補斂 升

諸藥俱見前

宜降

清熱

豁痰

諸藥見驚邪條加

貝母

丹參

釣藤鈎

鬱金

鉛丹

神水

白礬

不得眠屬心血虛有熱

忌升

辛燥

熱

諸藥俱見前

宜斂

養陰血

清熱

酸棗仁 五味子 龍眼肉 丹參

芍藥 人參 石斛 竹葉

生地黃 茯神 遠志 黃連

玄參 麥門冬 辰砂六一散

竹茹 木通 生甘草

心煩屬心家有熱

忌升 破氣 燥熱

諸藥俱見前

宜清熱 生津液 甘寒 和平 辛酸

參用不得眠中諸藥

竹葉 麥門冬 生甘草 石斛

丹參 龍眼肉 生地黃 玄參

沙參 茯神 遠志 知母

酸棗仁

怔忡屬心血不足

忌宜俱同心虛

心澹澹動

忌宜俱同心虛

盜汗屬心血虛汗者心之液也

忌破氣 辛散 燥熱

諸藥俱見前

宜補斂 清虛熱 甘酸 甘平 甘寒

苦寒 鹹寒

生地黃 當歸 茯神 龍眼肉

黃耆 五味子 白芍藥 酸棗仁

黃芩 黃檗 黃連 牡蠣

伏梁屬心經氣血虛以致邪留不去

忌破血 汗 下

三稜 蓬茂 薑黃 蜜蟲

麤蟲 紅藍花 水蛭 桃仁已上破血

汗下諸藥俱見前

宜活血 涼血 散熱通結 辛鹹

鬱金 五靈脂 乳香 沒藥

當歸 延胡索 赤芍藥 遠志

菖蒲 茯神 牡蠣 參用東垣

伏梁丸治之

肝虛 十證

忌收斂 破氣 升散 苦寒 下

諸藥俱見前

宜辛散 甘緩

當歸 陳皮 生薑 地黃

甘菊 甘草 胡麻 穀精草

決明子 刺蒺藜 羊牛兔肝

因鬱而虛者加 細辛 木香

縮砂蜜 沈水香 川芎 香附

胸脇痛屬肝血虛肝氣實因而上逆

忌斂 補氣 破血

諸藥俱見前

宜降氣 養血 和肝 辛甘 平緩

蘇子 鬱金 番降香 川通草

當歸 生地黄 橘皮 甘草

白芍藥 續斷 鹿角膠

轉筋屬血虛

忌下 復忌升 燥熱 閉氣 苦寒 破

氣

一 疝

黃耆

銀杏

豬脂

羊肉

麩已上餘忌藥俱見前

宜酸 辛 甘平

木瓜 牛膝 當歸身 白芍藥

石斛 續斷 炙甘草 陳皮

縮砂蜜

日光短屬肝血虛及腎水真陰不足

忌破氣 升 燥熱

諸藥俱見前

宜補肝兼滋腎 甘溫益血 甘寒除熱

甘枸杞 生地黃 甘菊花 沙苑蒺藜

穀精草 五味子 决明子 天門冬

麥門冬

目昏屬肝血虛有熱兼腎水真陰不足

忌同前目光短

宜同目光短加黃檗 羚羊角

目翳屬肝熱兼腎水不足

忌破氣 升 燥熱 苦寒

諸藥俱見前

宜補肝血 除熱 退翳

甘菊花 生地黃 决明子 石决明

沙苑蒺藜 女貞實 青羊膽

羚羊角 犀角 空青 黃連

天龍 伏翼糞 木賊 穀精草

蜜蒙花 人爪 蟬蛻 瑪瑙

石蟹

珊瑚

真珠

琥珀

馬目毒公

貝子

亡血過多角弓反張屬肝血虛有熱

忌風燥

升

破氣

下

諸藥俱見前

宜補血清熱

甘寒

甘溫

酸寒

鹹寒

辛潤

當歸

生地黃

白芍藥

炙甘草

牛膝

麥門冬

牡丹皮

甘菊花

童便

有汗加人參

黃耆

五味子

酸棗仁

少腹連陰作痛按之則止屬足厥陰經血虛

忌同角弓反張

宜同角弓反張加白膠

偏頭痛屬血虛肝家有熱不急治久之必損目

忌升

燥熱

苦寒

諸藥俱見前

宜養血清虛熱

甘寒

酸寒

辛寒

生地黃

天門冬

甘菊花

白芍藥

當歸

川芎

烏梅

炙甘草

土茯苓

金銀藤

黑豆

有實火者

可加黃芩

酒炒

大黃

酒蒸

雨前茶

石膏

月黑暗眩暈屬血虛兼腎水真陰不足

忌破氣

燥熱

辛溫

諸藥俱見前

宜養血補肝

清熱

甘寒

甘平

酸寒

苦寒

生地黃

枸杞子

甘菊花

當歸

薯蕷

五味子

白茯苓

甘草

山茱萸

白芍藥

天門冬

黃檗

肥氣屬氣血兩虛肝氣不和逆氣與瘀血相併

而成

忌破氣 下 苦寒

諸藥俱見前

宜和肝散結氣 兼行氣血凝滯 甘溫

甘平

川芎 當歸 沈香 乾薑

肉桂 橘皮 紅花 鬱金

延胡索 香附 山查 赤芍藥

紅麴 砂仁 參用東垣肥氣丸法

之

脾虛 十二證

忌下 降泄 破氣 苦寒

諸藥俱見前

宜甘溫 佐以辛香 酸平

人參 大棗 黃耆 薯蕷

炙甘草 蓮肉 白茯苓 白扁豆

縮砂蜜 橘紅 白豆蔻 藿香

木瓜 白芍藥 酸棗仁

飲食勞倦傷脾發熱

忌破氣 發散 下 苦寒

諸藥俱見前

宜補中益氣 甘溫 升 酸

人參 黃耆 朮 炙甘草

大棗 柴胡 升麻 石斛

麥門冬 橘紅 白芍藥 酸棗仁

飲食不消化屬脾氣虛

忌破氣 消導 剋伐 苦寒 復忌燥

草果 枳實 檳榔 蓬茂

三稜 綠礬已上消導 餘忌藥俱見前

宜益真氣 香 甘溫 甘辛

同脾虛加穀藥 麥蘖 肉豆蔻

傷食必惡食

忌潤溼 苦寒

當歸 肉從蓉 瑣陽

天門冬

地黃 知母 玄參

猪脂

茄子 酒 糟

麩食已上潤溼

苦寒諸藥見前

宜健脾消導 甘溫 辛香

橘皮 薯蕷 蓮肉 白蘊豆

白芍藥 白茯苓 草果 山查

麥芽 草豆蔻 縮砂蜜 穀蘖

如腹痛大便不通宜下之枳實檳榔厚朴

大黃元氣虛人不可下宜加參朮

傷肉食輕者宜蒜山查兼黃連重者宜礬

紅棗肉為丸服二錢不可過終身忌蕎麥

傷麩食宜炒萊菔子

停飲為恣飲湯水或冷茶冷酒所致

忌下 酸斂 溼潤 滯膩

諸藥俱見前加忌栝樓根及仁

桃仁 郁李仁

宜健脾利水 淡滲 兼辛散

人參 白朮 半夏 茯苓

橘皮 澤瀉 猪苓 木通

桑白皮 旋覆花 紫蘇 白豆蔻

水腫屬脾氣虛

忌破氣 下泄 溼潤 鹹 苦寒

食鹽 商陸 以上餘忌藥俱見前

宜補脾益氣 燥溼 利水 辛香 甘潤

佐以淡滲

人參 二朮 橘皮 薯蕷

木瓜 薏苡仁 桑白皮 茯苓

赤小豆 香薷 烏蠡魚 車前子

猪苓 澤瀉 薑皮 烏芋

縮砂蜜 通草

脾虛中滿屬脾氣虛兼脾陰虛

忌破氣 下 消導 利水 甘

飴糖 大棗 蜜 甘草已上

餘忌藥俱見前

晝劇夜靜屬脾氣虛宜補氣健脾 甘溫

淡滲 佐以辛香

人參 二朮 白芍藥 桑白皮

茯苓 車前子 橘紅 薑皮

藿香 縮砂蜜 無熱證者佐以桂

夜劇晝靜屬脾陰虛宜補脾陰 兼制肝清

熱 甘平 酸寒 淡滲

酸棗仁 白芍藥 石斛 白蘊豆

蓮肉 橘皮 山藥 蘇子

五味子 木瓜 桑白皮 車前子

茯苓

噎膈屬氣血兩虛由於血液衰少而非痰氣壅

逆所成

忌破氣 升 復忌下 消導 燥 苦寒

辛熱

諸藥俱見前

宜降 清熱潤燥 甘溫甘平以益血 畧

佐辛香以順氣

蘇子 橘紅 枇杷葉 人參

白芍藥 酸棗仁 龍眼肉 人乳

牛乳 蔗漿 梨汁 韭汁

蘆根汁 薑汁 白豆蔻仁

脾泄屬氣虛

忌破氣 下 消導 苦寒

諸藥俱見前

宜溫中補氣 升清 甘溫 甘平 佐以

辛香

人參 朮 炙甘草 薯蕷

蓮肉 白蘊豆 茯苓 車前子

白芍藥 升麻 柴胡 肉豆蔻

縮砂蜜 橘皮 木香 丁香

藿香 白萊菔 兼有溼及痰經年不

愈糞色白者須服九製松脂

健忘屬氣血兩虛

忌升 燥熱 復忌苦寒 辛散

諸藥俱見前

宜益脾陰兼補氣 酸欽 甘溫 甘寒

辛平以通竅

酸棗仁 白芍藥 五味子 人參

炙甘草 黃耆 龍眼肉 柏子仁

麥門冬 丹參 茯苓 茯神

石菖蒲 遠志

倦怠嗜臥屬脾氣不足

忌破氣 消導 苦寒

諸藥俱見前

宜補氣 兼健脾 甘溫 辛香

人參 白朮 黃耆 茯苓

薯蕷 炙甘草 穀蘖 白扁豆

縮砂蜜 橘皮 藿香 白豆蔻

脾虛腹痛按之則止屬血虛

忌破氣 破血 香燥 苦寒

諸藥俱見前

宜益氣補血 甘溫 酸平

人參 炙甘草 龍眼肉 大棗

酸棗仁 石斛 麥門冬 白芍藥

痞氣屬脾氣虛及氣鬱所致

忌破氣 下 溼潤 苦寒

諸藥俱見前

宜健脾 兼散結滯 甘溫 辛香

人參 白芍藥 橘紅 縮砂蜜

藿香

吳茱萸

穀蘖

麥蘖

紅麴

香附

木香

參用東垣

痞氣丸治之

肺虛 七證

忌補氣

升散

辛燥

溫熱

諸藥俱見前

宜清熱

降氣

酸

潤燥

天門冬

麥門冬

蘇子

枇杷葉

貝母

沙參

百部

百合

桑白皮

五味子

杏仁

五倍子

蜜

梨

柿

無熱者加

人參

齶喘屬肺虛有熱因而痰壅

忌破氣

升

發散

收澀

訶子

亞芙蓉

栗殼

收澀

餘忌藥俱

見前

宜降氣 消痰 辛涼 甘寒 苦平

蘇子 枇杷葉 貝母 桑根白皮

栝樓根 竹瀝 天門冬 麥門冬

百部 百合 薄荷 馬兜鈴

款冬花 沙參 前胡 白前

射干

欬嗽吐血痰屬肺熱甚

忌升 破氣 復忌補氣 破血 辛燥

溫熱 收澀

諸藥俱見前

宜降氣清熱 潤肺生津液 涼血益血

甘寒 甘平 鹹寒 佐以苦寒

鬱金 生地黃 蒲黃 側柏葉

茅根 剪草 白及 阿膠

童便 知母 餘藥肺虛條內參用

聲啞屬肺熱甚

本草經疏卷二

綠君亭

忌宜俱同欬嗽

咽喉燥痛屬水涸火炎肺熱之極此證法所難

治

忌宜俱同欬嗽

肺痿屬肺氣虛有熱

忌宜俱同肺虛

龜胸屬肺熱有痰

忌宜俱同齶喘欬嗽

息賁屬肺氣虛痰熱壅結所致

忌破氣 辛熱 補斂

諸藥俱見前

宜降氣 清熱開痰 佐以散結

橘皮 白豆蔻 白芥子 射干

桔梗 旋覆花 桑白皮 參用東垣

息賁丸治之

腎虛即腎水真陰不足 十八證

忌升 破氣 利水 溫熱 辛燥 補命
門相火

仙茅 巴戟天 葫蘆芭 人參

補骨脂 鹿茸 人胞 已上補命餘忌

藥俱見前

宜滋陰 潤 生精補血 除熱 甘寒

酸寒 苦寒 鹹寒

地黃 枸杞子 牛膝 人乳

肉蓯蓉 柏子仁 胡麻 沙苑蒺藜

杜仲 續斷 天門冬 麥門冬

五味子 山茱萸 薯蕷 牡丹皮

兔絲子 車前子 地骨皮 知母

黃檗 鼈甲 青蒿 童便

腎虛腰痛屬精氣虛

忌破氣 燥熱

諸藥俱見前

宜同腎虛

骨乏無力屬陰精不足腎主骨故也

忌宜俱同腎虛

骨蒸潮熱屬精血虛極以致陽無所附火空上炎

忌宜俱同腎虛

傳尸勞

忌同腎虛

宜除熱益陰 殺勞蟲 兼清鎮

諸藥同腎虛加 鬼白 乾漆

漆葉 盧會 象膽 獺肝

胡黃連 安息香 丹砂 磁石

神水

五心煩熱屬真陰不足

忌宜俱同腎虛

夢遺泄精屬腎虛有火

忌同腎虛

宜滋陰

生精補血

除熱

酸斂

佐以

澀精

蓮花蕊

生甘草

石斛

縮砂蜜

龍骨

覆盆子

魚膠

蓮肉

牡蠣

遠志

韭子

桑螵蛸

餘藥同腎虛條

小便短澀熱赤頻數屬腎虛有火

忌宜俱同腎虛

溺有餘瀝屬氣虛

忌同腎虛

宜同腎虛以五味子黃蘗人參為君加菟絲

子覆盆子為臣益智為佐如覺平日肺家有

熱或欬嗽有人者忌人參用沙參

溺血血淋屬腎虛有火熱傷血分

忌同腎虛

本草經疏卷二

綠君亭

宜同腎虛加側柏葉

阿膠

茅根

韭白

乾地黄

戎鹽

蒲黃

傷精白濁屬房勞過度以致精傷流出似白濁

證

忌利小便

燥

辛熱

諸藥俱見前

宜同腎虛

五淋屬腎虛兼有溼熱

忌同腎虛

宜同腎虛加清溼熱

茯苓

黃檗

車前子

石斛

車前子

薏苡仁

石斛

精塞水竅不通屬房慾不竟或思慾不遂或懼
泄忍精或老人氣不足以送精出竅

忌破氣

下

利小便

燥熱

諸藥俱見前

宜行敗精 壯實人宜兼泄火 老人宜兼

補氣血外治用吮法

牛膝 生地黃 當歸 桃仁

紅花 車前子 鹿角霜

齒浮真牙搖動及下齦軟或齒疳屬腎虛有熱

忌同腎虛又忌當歸芍藥

宜益陰 涼血 固腎

諸藥畧同腎虛應以地黃黃檗五味子為

君桑椹牛膝沙苑蒺藜鹿茸天門冬為臣

龍骨牡蠣為使

下消屬腎陰虛火伏下焦

忌同腎虛

宜清熱 及峻補真氣 潤 酸斂

諸藥同腎虛宜以黃檗五味子生地黃天

麥門冬人參為君石斛牛膝知母人乳童

便為臣地骨皮青蒿側柏葉為佐

善恐屬腎氣虛腎藏志故也

忌破氣 苦寒

諸藥俱見前

一宜補氣強志 辛平 甘溫 佐以辛香

人參 遠志 茯苓 鹿茸

酸棗仁 柏子仁 石斛 沈水香

陰竅漏氣屬腎氣虛不固腎主納氣虛則不能

納故見是證

忌破氣 降 香燥 辛熱

蘇子 鬱金 降香 沈水香

橘皮 通草已上降 白豆蔻 木香

香附已上香燥 餘忌藥俱見前

宜補真氣 酸斂 固澀

人參 五味子 山茱萸 沙苑蒺藜

覆盆子 枸杞子 益智子 遠志

龍骨 牡蠣 金櫻子 蓮鬚

參用腎虛條內諸藥

疝屬腎虛寒溼邪乘虛客之所致丹溪謂與腎經絕無相干者誤也又有先因溼邪為病後成溼熱者藥宜分寒熱先後二途

忌升 破氣 苦寒 溼潤

諸藥俱見前

宜補氣 通腎氣 除溼 又有陰虛有熱

之人病此兼宜除熱

人參

黃耆

楠核

合歡子

荔枝核 川棟子

牛膝

木瓜

杜仲

萆薢

巴戟天

虛寒而痛加桂

藁香

補骨脂

仙茅

虛熱而痛加黃檗

車前子

溼盛者加

朮

奔豚屬腎虛脾家溼邪下傳客腎所致

本草經疏卷二

綠君亭

忌同疝 兼忌燥

諸藥俱見前

宜補氣 健脾 辛溫 散結

人參 薯蕷 桂 山茱萸

牛膝 懷香 蛇床子 參用東垣

奔豚丸治之

命門虛即元陽真火不足 四證

忌下世 破氣 發散 辛寒 苦寒 淡

滲 燥 補腎水 苦寒藥

黃檗 知母 生地黃 天門冬

補腎水 苦寒藥 餘藥俱見前

宜益真陽之氣 甘溫 鹹溫 甘熱 酸斂

人參 紅鉛 人胞 鹿茸

白膠 肉蓯蓉 菟絲子 枸杞子

覆盆子 五味子 巴戟天 山茱萸

附子 補骨脂 仙茅 陽起石

陰痿屬命門火衰下焦虛寒

忌同命門虛

宜同命門虛加海狗腎

原蠶蛾 狗陰莖 雀卵

白馬陰莖

蛇床子 牛膝

精寒精薄屬命門火衰陽氣不足

忌宜俱同陰痿

屬命門真火不足

忌同命門虛

宜益氣 甘溫 酸斂

人參 薯蕷 蓮肉

砂仁 補骨脂 木香 肉豆蔻 吳茱萸

五味子

畏寒足冷

忌宜俱同命門虛

小腸虛

一證

忌破氣 辛散 燥熱

諸藥俱見前

宜補氣 甘溫 酸溫

人參 黃耆 麥門冬 五味子

山茱萸

遺尿屬小腸氣虛兼腎氣虛

忌同小腸虛

宜同小腸虛兼固澀

牡蠣 益智子 龍骨 金櫻子

膽虛 二證

忌汗 吐 下 苦寒 破氣 燥

山梔 瓜蒂 藜蘆 鹽湯

常山 吐上 餘忌藥俱見前

宜甘溫 甘平 酸斂 佐以微辛

人參 當歸 穀精草 決明子

木賊草 甘草 竹葉 竹茹

白芍藥 酸棗仁

易驚屬膽氣虛

忌破氣 升發 燥熱

諸藥俱見前

宜補膽氣 甘溫 辛溫 酸平

人參 酸棗仁 甘草 竹葉

當歸

白芍藥

竹茹

橘皮

病後不得眠屬膽虛

忌宜俱同膽虛

胃虛 七證

忌下 破氣 苦寒 燥熱

諸藥俱見前

宜益氣 甘平 甘淡 酸

人參 白朮 白扁豆 蓮肉

石斛 橘皮 白茯苓 木瓜

白芍藥 兼寒加生薑

白豆蔻

縮砂蜜 兼熱加竹茹

枇杷葉

麥門冬 蘆根汁 蔗漿

胃弱不納食及不思飲食

忌同胃虛

宜同胃虛仍分寒熱治

胃虛嘔吐宜分寒熱

忌宜俱同胃虛

霍亂轉筋屬胃虛猝中邪惡氣及毒氣兼有候

滯所致 轉筋與肝經血虛不同

忌閉氣 滯膩 收斂 溫補 大熱

諸藥俱見前

宜調氣和中 辛散 消導

由於暑必口渴或口乾齒燥口苦小水短

赤

白梅 白藕豆并葉 絲瓜葉

滑石

石膏

甘草

橘皮

香薷

木瓜

石斛

童溺

食鹽

泥漿

縮砂蜜

厚朴

由於寒則小水清白不渴不熱

縮砂蜜

丁香

橘皮

藿香○甚

者加吳茱萸肉桂外治用杉木楠材煎湯

浸洗

絞腸痧屬胃氣虛碎中天地邪惡穢汚之氣鬱

於胸腹間上不得吐下不得瀉以致腸胃絞痛

異常胸腹驟脹遍體紫黑頭頂心必有紅髮急

尋出拔去之急以三稜鏡針刺委中擠出熱血

可立蘇次用新汲凉水投入鹽兩許恣飲得吐

瀉即止委中穴在兩膝下灣橫紋中間兩筋之

中刺入一分

忌溫補 飲

諸藥俱見前切忌火酒生薑蒜及穀氣米

飲熱湯入口即死

宜通竅辟惡 辛散 鹹寒

龍腦香 蘇合香 藿香 檀香

乳香 芒硝 童便 煎藥亦宜

冷服

中惡腹中疔痛屬胃氣虛惡氣客之所致

忌補 酸斂

諸藥俱見前

宜辟惡氣 通暢胃氣 辛散

龍腦香 檀香 麝香孕婦忌用 牛黃

乳香 蘇合香 丹砂 雄黃

鬼臼 藿香 橘皮 木香

沈水香 白豆蔻 遠志 石菖蒲

乾薑 桂

反胃屬胃氣虛

忌破氣 升 苦寒 甘 燥熱

諸藥俱見前

宜補氣 降氣 和胃 清熱 酸飲以制

肝

人參 蘇子 橘皮 枇杷葉

木瓜 竹茹 麥門冬 蘆根汁

石斛 白茯苓 白芍藥 梅醬

蔗漿

此石因虛寒而得者加生薑

白豆蔻

中酒屬胃弱

忌閉氣 升 甘溫 燥熱 收澀

諸藥俱見前

宜養胃 酸 辛散 淡滲

人參 麥門冬 白菡豆 葛花

五味子 梅醬 橘皮 白豆蔻

黃連 縮砂蜜 白茯苓 澤瀉

大腸虛 四證

忌破氣 下 燥熱

諸藥俱見前

宜補氣 潤燥 甘溫

人參 黃耆 麥門冬 五味子

白芍藥 炙甘草

虛熱便閉不通屬血虛津液不足

忌破氣 下 燥熱 苦溫 損津液

郁李仁 液 損津 餘忌藥俱見前

宜生津液 潤燥 涼血 益血

五味子 麥門冬 芝麻 麻仁

生蜜 天門冬 肉蓯蓉 生地黃

當歸 盧會 炙甘草

虛寒滑泄不禁屬氣虛

忌破氣 下 溼潤 苦寒

諸藥俱見前

本草經疏卷二

綠君亭

宜補氣 升 甘溫 酸斂

人參 黃耆 白朮 蓮肉

升麻 炙甘草 吳茱萸 肉豆蔻

補骨脂 五味子 木瓜 赤石脂

腸鳴屬氣虛

忌破氣 下 苦寒

諸藥俱見前

宜同大腸虛加升麻柴胡以佐之

脫肛屬氣虛兼有溼熱

忌同大腸虛

宜補氣 升提 除溼熱

人參 黃耆 炙甘草 白朮

蓮肉 白扁豆 升麻 乾葛

柴胡 黃檗 防風 黃連

黃芩 樗根白皮 白芍藥

外用五倍子傅之

膀胱虛 三證

忌破氣 燥 利小便

諸藥俱見前

宜補氣 酸斂

五味子 山茱萸 益智子

金櫻子

小便不禁屬氣血虛

已心降下 溼潤 燥熱

諸藥俱見前

宜同膀胱虛加牡蠣 龍骨 鹿茸

桑螵蛸 雞胫脰

頻數不能少忍加麥門冬 五味子

黃檗 山茱萸 天門冬 鼈甲

牛膝 柏子仁 甘枸杞子

遺尿屬本經氣虛見小腸虛條內因膀胱虛亦
能致遺尿故復列此

忌宜俱見小腸虛

膀胱氣

忌宜俱同疝

三焦虛 二證

忌破氣 降 復忌升發 苦寒

諸藥俱見前

宜補中益氣 佐以辛溫

人參

黃耆

白朮

益智子

沈香

五味子

腹寒屬中氣虛

忌宜俱同三焦虛

短氣少氣屬氣虛

忌同三焦虛

宜補氣益精 甘溫 甘寒 酸溫

人參 黃耆 麥門冬 五味子

心實即實火實熱 五證

本草經疏卷二

綠君亭

忌補斂 升 熱 溫燥

諸藥俱見前

宜降火清熱 苦寒以折之 辛寒以散之

甘寒以緩之 鹹寒以潤之

黃連 犀角 石膏 丹砂

牡丹皮 滑石 生甘草 麥門冬

竹葉 童便 便結燥加芒硝大黃

發狂亦如之

論語五節屬心家邪熱

忌宜俱同心實

舌破屬心火

忌宜俱同心實

煩躁屬心家邪熱及心火內炎

煩屬心 躁屬腎

忌宜俱同心實

自笑屬心家有熱邪

忌宜俱同心實

發狂屬心家有邪熱甚

忌宜俱同心實

肝實

五證

忌補氣 升 酸 斂 辛熱 辛溫 燥

諸藥俱見前

宜清熱降氣 苦寒 辛寒 甘寒 酸寒

橘皮 青皮 蘇子 黃連

黃芩

龍膽草

柴胡

生甘草

赤芍藥

竹葉

青黛

善怒怒則氣上逆甚則嘔血及飧泄

忌補 升 熱燥 閉氣

諸藥俱見前

宜降氣 清熱 甘寒 酸寒 鹹寒 佐

以辛散

蘇子 鬱金 番降香 生甘草

青黛 麥冬 生地黃 赤芍藥

橘皮

蒲黃

當歸

延胡索

砂仁

香附

童便

善太息忽忽不樂

忌宜俱同善怒

脇痛嘔血屬肝氣逆肝火盛肝血虛

忌宜俱同善怒

發搐屬肝家邪熱熱則生風風定倬眩故也

忌心同善怒

宜清熱

降氣

利小便

緩中

生地黃

白芍藥

黃連

丹砂

羚羊角

童便

蘇子

麥門冬

生甘草

竹葉

甘菊花

白茯苓

木通

目赤腫痛屬血熱

忌同肝實善怒

宜涼血清熱

甘寒

苦寒

酸寒

本草經疏卷二

綠君亭

生地黄 赤芍藥 甘草 甘菊

穀精草 蜜蒙花 荆芥 黃蘗

大黃 黃連 連翹 玄參

山梔 竹葉 龍膽草 空青

會青 木通 童便 外治銅青

芒硝 石膽 蕤核急者宜以三稜

針刺破眼眶腫處將出熱血立解遲則血

貫瞳人目損矣

脾實即溼熱邪勝 六證

忌溼潤 收澀 滯膩 熱 鹹 甘

諸藥俱見前

宜除溼清熱 利小便 辛散 風燥 苦

寒

朮 山梔 猪苓 澤瀉

滑石 車前子 茯苓 白豆蔻

防風 乾葛 黃連 枳實

成 蠱脹由於脾家溼熱積滯或內傷瘀血停積而

忌補氣 甘溫 燥熱

諸藥俱見前

宜除溼 清熱 利小便 消積

木通 防已 車前子 猪苓

澤瀉 茯苓 葶藶 烏蠶魚

桑白皮 山查 紅麴 三稜

蓬朮

易饑屬脾家邪火

忌升 辛溫 大熱 香燥

沈香 麝香 龍腦 縮砂蜜

豆蔻 藿香已上香燥 餘忌藥俱見前

宜清火除熱 生津液 益脾陰 甘寒

苦寒 酸寒

黃連 青黛 連翹 山梔

本草經疏卷二

綠君亭

石膏

竹葉

麥冬

石斛

白芍藥

酸棗仁

口唇生瘡

忌溫燥 熱

諸藥俱見前

宜甘寒

酸寒

苦寒

辛寒

麥門冬

生地黃

甘草

白芍藥

烏梅

黃連

黃蘗

玄參

連翹

栝樓根

乾葛

石膏

龍膽草

大青

竹葉

口糜

忌宜俱同口唇生瘡

中消屬脾家實火

忌破氣

下

溫燥

熱

諸藥俱見前

宜服諸藥同口唇生瘡加人參

本草經疏卷二

綠君亭

溼熱腹痛按之愈甚

忌悶氣 酸斂 溫熱 燥

諸藥俱見前

宜利小便 兼升提 苦寒

滑石 車前子 木通 黃連

黃芩 升麻 柴胡 葛根

防風 不愈加熟大黃即土鬱則奪之

之義也

肝實

忌斂澀 補氣 升 燥熱 酸 鹹

諸藥俱見前

宜降氣 潤 甘寒 苦寒 佐以辛散

蘇子 枇杷葉 桑白皮 天門冬

貝母 栝樓根 杏仁 白前

前胡 知母 車前子 桑黃

石膏 黃芩

本草經疏卷二

綠君亭

喘急屬肺有實熱及肺氣上逆

忌同肺實

宜同肺實加桔梗

甘草

栝樓仁

玄參

青黛

氣壅屬肺熱氣逆

忌宜俱同肺實

聲重痰稠屬肺熱

忌同肺實

宜同肺實加薄荷

竹瀝

肺癰屬肺熱極

忌同肺實

宜清熱

消痰

降火

解毒散結

甘寒

苦寒

辛寒

桑白皮

桑黃

黃芩

貝母

栝樓根

薏苡仁

葶菜

虎耳草

鼠黏子

連翹

甘草

敗醬草

百年醃芥菜汁

肺脹悶屬肺熱

忌同肺實

宜同肺實并參用肺癰諸藥

吐膿血血痰欬嗽嗽血屬肺家火實熱甚此正邪氣勝則實之謂

忌同肺實

宜清熱降氣

涼血

豁痰

童便

蘇子

枇杷葉

桑白皮

麥門冬

剪草

蒲黃

生地黃

天門冬

百部

桑黃

百合

薏苡仁

甘草

貝母

白芍藥

白及

桔梗

款冬花

紫苑

喉癰屬肺熱

忌同肺實

宜同肺實加鼠黏子

玄參

射干

本草經疏卷二

綠君亭

上消屬肺家實火及上焦熱

忌同肺實

宜降氣 清熱 補肺 生津 甘寒 苦

寒 酸寒 辛寒

蘇子 麥門冬 枇杷葉 桑白皮

桔梗 百部 百合 黃芩

天門冬 沙參 黃連 栝樓根

葛根 知母 玄參 石膏

甘草 五味子 白芍藥 篋竹葉

蘆根 冬瓜 人乳 天酒

腎無實故無瀉法

命門實 二證

忌補氣 溫 熱

諸藥俱見前

宜苦寒 甘寒 鹹寒

黃檗 知母 玄參 天門冬

麥門冬 牡丹皮 車前子 木通

澤瀉

強陽不倒屬命門火實孤陽無陰所致此證多不治

忌同命門實

宜同命門實加五味子 童便

生地黃

小夜溫痛屬命門實火

忌同命門實

宜清熱 利竅 甘寒 苦寒 鹹寒 佐

以淡滲

黃蘗 知母 車前子 生地黃

天門冬 生甘草 黃芩 牛膝

麥門冬 童便 茯苓 木通

小腸實 一證

忌斂澀 補氣

本草經疏卷二

綠君亭 卅一

諸藥俱見前

宜通利 淡滲 苦寒 甘寒 鹹寒

車前子 白茯苓 木通 生甘草

黃檗 知母 黃芩 連

牛膝 麥門冬 生地黃 童溺

小水不利及赤或澀痛尿血

忌宜俱同小腸實

膽實 一 證

忌汗 吐 下

諸藥俱見前

宜和解 辛寒 甘寒 苦寒 辛溫

柴胡 黃芩 半夏 生薑

甘草 橘皮 龍膽草

耳聾脇痛往來寒熱

忌同膽實

宜用仲景小柴胡湯隨所見兼證加減

本草經疏卷二

綠君亭

鼻淵屬膽移熱於腦

忌辛溫 燥熱

諸藥俱見前

宜清熱 補腦 甘寒 甘平 佐以辛寒

天門冬 甘菊花 生地黃 沙苑蒺藜

山茱萸 沙參 薄荷 柴胡

辛夷 黃芩 玄參 知母

田月實 六證

忌升 補斂 辛溫 燥熱 溼潤

諸藥俱見前

宜下 如邪未結宜清熱發散 苦寒 立

寒 甘寒

大黃 枳實 知母 石膏

葛根 竹葉 大青 小青

青黛 麥冬 甘草

譫語發狂發斑棄衣而走登高而歌屬胃家邪

熱實

忌同胃實

宜同胃實如大便結者加芒硝亟下之發斑者加鼠黏子玄參栝樓根多用石膏為君便結亦加大黃下之

口臭數欲飲食屬胃火

忌同胃實

宜清熱降火 苦寒 甘寒 辛寒

黃連

青黛

連翹

麥門冬

石斛

蘆根汁

竹葉

石膏

嘈雜屬胃火

忌同口臭

宜同口臭畧兼消導

山查

麥芽

橘紅

神麴

口淡屬胃熱

忌宜俱同口臭

本草經疏卷二

綠君亭

嘔吐屬胃火者必面赤小便短赤或澀大便多
燥口苦或乾渴

忌同胃實

宜同胃實加枇杷葉

竹茹

木瓜

蘆根

橘皮

通草

白茯苓

吞酸屬胃火

忌同胃實

宜同胃實

大腸實

四診

忌補斂 燥熱

諸藥俱見前

宜潤下 苦寒 辛寒

生地黃 麻仁

桃仁

黃連

黃芩

槐花

大黃

石膏

知母

枳殼

便鞭閉

本草經疏卷二

綠君亭

忌同大腸實

宜同大腸實加芒硝

猪膽

檳榔

郁李仁 石蜜

腸風下血屬大腸溼熱

忌下 燥熱

諸藥俱見前

宜清熱涼血

兼升

甘寒

苦寒

生地黃

槐花

地榆

黃連

黃芩

荆芥

防風

甘草

紅麴

白芍藥

側柏葉

白頭翁

蒲黃

雞子

葛穀

臟毒屬血熱

忌同腸風下血

宜同腸風下血加忍冬

麥門冬

倍加地榆

蒲黃

腸癰屬大腸實火

本草經疏卷二

綠君亭

忌同腸風下血

宜下 苦寒 解毒

大黃 白藥子 白芷 白及

白欵 連翹 忍冬藤 天明精

甘草 黃耆 生地黃 明礬

黃蠟 生蜜已上三味作丸

膀胱實 一證

忌燥熱 收澀

此兩藥俱見前

宜潤 淡滲

知母 黃檗 車前子 木通

瞿麥 滑石 茯苓 猪苓

澤瀉

癃閉屬膀胱實熱

忌破氣 發散 燥熱 如屬水液不足兼

忌利小便

本草經疏卷二

綠君亭

諸藥俱見前

宜同膀胱實佐以升提

升麻 柴胡

三焦實 三證

忌補斂 升 燥熱

諸藥俱見前

宜降 清熱 調氣 甘寒 苦寒 鹹寒

蘇子

麥門冬

知母

黃芩

玄參

山梔

黃芩

黃連

童便

喉痺即纏喉風屬少陽相火少陰君火竝熾經
曰一陰一陽結為喉痺一陰者少陰君火也一
陽者少陽相火也

忌同三焦實

宜辛散 佐以苦寒 鹹寒 急則有鍼法

吹法 吐法

本草經疏卷二

綠君亭

鼠黏子 山豆根 射干 黃連

黃檗 知母 玄參 童便

蘇子 麥門冬 貝母 甘草

生犀角 山慈菇 苦桔梗 續隨子

急治用膽礬朴硝牛黃為末和勻吹入喉

中又法用礪礬三錢巴豆七粒去殼同礬

煨礬枯去巴豆即取礬為細末吹入喉中

流出熱涎即寬

頭面赤熱屬上焦火升

忌同三焦實

宜降 清熱 甘緩 佐以酸斂

蘇子 枇杷葉 天門冬 麥門冬

玄參 薄荷 枯樓根 梨

柿 蔗 童便 白芍藥

五味子

赤白遊風屬血熱熱則生風故善遊走俗名火

本草經疏卷二

綠君亭

丹小兒多患此大人亦時有之

忌同三焦實

宜清熱 涼血 兼行血 辛寒 甘寒

苦寒 鹹寒

生地黃 黃連 黃檗 生甘草

牡丹皮 蒲黃 紅藍花 連翹

玄參 鼠黏子 牛膝 藍汁

苦根

重便

赤芍藥

宜兼外治 砭出熱血及用漆姑草慎火
搗爛敷之即易愈

○六淫門

風○諸暴強直支痛痲戾裏急筋縮皆屬於風
真中風猝僵仆口噤不言不省人事如遺尿直
視口開手撒汗出如珠屬不治證西北高寒之
地有此東南無之

忌破氣 下 吐 苦寒 酸斂

本草經疏卷二

綠君亭

諸藥俱見前

宜辛甘發散 峻補真氣

桂枝

附子

甘草

獨活

羌活

天麻

麻黃

防風

芎藭

細辛

藁本

蔓荊實

牛黃

辛夷

牡荊實

白芷

人參

黃耆

有痰加竹瀝

南星

半夏

薑汁

類中風口眼歪斜語言蹇澀半身不遂口噤不言四肢不舉痰涎壅盛昏眊不省人事

忌汗

吐

下

大忌破氣

溫熱

苦寒

及一切治風溼辛燥發散

并開竅走真氣

行血諸藥慎勿犯之犯之則輕必重重必斃

麝香

蘇合香

檀香

龍腦香

安息香

已上開竅走真氣

餘忌藥俱見前

宜滋補

陽虛者補氣

陰虛者補血

陰

陽兩虛則氣血雙補 兼宜清熱降氣豁痰

及保脾胃

天門冬 脾胃薄弱者勿多用 麥門冬 荆瀝

蘇子 栝樓根 貝母 橘紅

枇杷葉 甘草 竹瀝 童便

霞天膏 梨汁 黃檗 次益血於

前藥中加胡麻仁 石斛 牛膝

生地黃 五味子 甘菊花 何首烏 薯蕷 菟絲子 白芍藥

丹參 山茱萸 白茯苓 酸棗仁

柏子仁 車前子 竹葉 羚羊角

鼈甲 木瓜 青蒿 遠志

栝樓仁 沙參 巴戟天 茯苓

茯神○如便閉加肉蓯蓉當歸倍麻仁○

如兼氣虛加人參黃耆有肺熱者勿入人

參

感冒風寒俗名傷風其證或頭疼身熱輕者則
否鼻必塞兼流清涕必惡風寒或聲重或聲啞
甚者痰壅氣喘欬嗽

忌補氣 酸斂 閉氣

諸藥俱見前

宜發散 辛甘 溫

芎藭 細辛 藁木 防風

甘草 荆芥 白芷 前胡

桑白皮 桔梗 紫蘇 薄荷

杏仁 石膏

傷風熱

忌同感冒風寒

宜辛寒 甘寒 發散

石膏 知母 甘草 竹葉

麥門冬 前胡 桔梗 薄荷

葛根 桑白皮○久而不愈者屬虛陽

虛者加人參黃耆陰虛者加五味子地黃
倍門冬白芍藥

寒○諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癰疽
堅痞腹滿急痛下利清白食已不饑吐利腥穢
屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒

凡中寒必本於陽虛

忌破氣 苦寒 下 甘寒 辛寒

諸藥俱見前

宜補氣

散寒

辛甘

溫熱

輕者解表

重者溫補

桂枝

乾薑

麻黃

人參

附子

黃耆

傷寒冬月即病宜從仲景法

傷寒古今時地不同因之六經治法宜異
夫傷寒者大病也時者聖人所不能違者也以
關乎死生之大病而藥不從時顧不殆哉仲景

醫門之聖也其立法造論後之明師如華佗孫思邈輩莫不宗之漢末去古未遠風景猶厚形多壯偉氣尚敦龐其藥大都為北方感寒即病而設况南北地殊厚薄不侔故其意可師也其法不可改也循至今時千有餘年風氣澆矣人物脆矣况在荆揚交廣梁益之地與北土全別故其藥則有時而可改非違仲景也實師其意變而通之以從時也如是則法不終窮矣故作

斯議條列其方稍為損益以從時地俾後之醫

師知所適從庶幾患斯疾者可免於天枉爾

辨驗外感真偽法

凡外感必頭疼其疼也不間晝夜探其舌本必從喉嚨內乾出於外多兼煩躁不煩躁者即輕證也不頭疼而發熱不發熱而頭疼頭雖疼而有時暫止口雖乾而舌本不燥骨雖疼而頭不疼雖渴而不欲引飲至夜或偶得寐遇食不好

亦不惡居處雖若庭怯而神氣安靜凡若此者皆非傷寒也

三陽治法總要

太陽病其證發熱惡寒惡風頭痛項強腰脊強
遍身骨痛脉雖浮洪而不數多不傳經煩燥脉
數急者是欲傳經宜先發汗以解表邪其藥以
羌活湯為主羌活 三錢 前胡 二錢 甘草 八分 葛

根二錢 生薑 三片 棗 二枚 杏仁 九粒 大黃 研爛 皮 水煎

用秋深冬月應用此方亦可量加紫蘇芎白如
冬月天氣嚴寒感邪即病服此藥不得汗本方

加麻黃 一錢 生薑 四片 共前七片得汗勿再服

如病人自覺煩躁喜就清涼不喜就熱兼口
渴是即欲傳入陽明也若外證頭疼遍身骨疼
不解或帶口渴鼻乾目疼不得卧即係太陽陽
明證羌活湯中加石膏知母麥冬大劑與之得
汗即解 如自汗煩躁頭疼遍身骨疼不解者

羌活 一錢 桂枝 七分 石膏 二錢 麥冬 六錢 知母

三錢 竹葉 十片 白芍藥 二錢 甘草 八分 如

冬月即病太陽證惡寒畏風頭疼遍身骨疼自

汗不渴宜用桂枝 八分 芍藥 二錢 甘草 一錢 大

棗 二枚 生薑 一片 太陽病不解熱結胸臑其

人如狂血自下下之愈其外證不解者不可下

當先解表表證罷少腹急結者乃可下之桃仁

承氣湯無蓄血證大承氣湯

正陽陽明病正陽陽明者胃家實熱是也其證

不大便自汗潮熱口渴咽乾鼻乾嘔或乾嘔目

眴眴不得眠畏人聲畏木聲畏火不惡寒反惡

熱或先惡寒不久旋發熱甚則譫語狂亂循衣

摸床脉洪大而長宜急解其表用竹葉石膏湯

大劑與之不嘔無汗與葛根湯亦須大劑若表

證已罷脉緩小便利是病解矣 若表證罷後

邪結於裏大便閉小便短赤宜用調胃承氣湯

或小承氣湯下之下後按其腹中不作痛而和病即已解如作痛是燥糞未盡也再用前藥下之以腹中和二便通利為度 陽明病不能食若其人本虛勿輕議下 陽明病頭眩欬而咽痛者用葛根甘草桔梗麥冬四味濃煎數數與之 陽明病無汗小便不利心中懊憹者當發黃急用梔子麥冬淡豆豉大劑濃煎與之如已見身黃急加茵陳為君主之 陽明病衄血此

緣失於發汗宜用荆芥 二錢 葛根 三錢 麥門冬 五錢

牡丹皮 一錢 五分 蒲黃 二錢 茅根 二兩 側柏葉

二錢 生地黃 三錢 濃煎與之兼飲童便 陽明

病心下硬滿者此邪未入於腹中慎勿下之用

竹葉石膏湯加桔樓一筒桔梗 二錢 黃連 一錢

陽明病邪結於裏汗出身重短氣腹滿而喘潮熱手足濇然汗出者此大便已鞭也六七日已來宜下之用小承氣湯不行換大承氣湯勿

大其劑若大便不鞭者慎勿輕下 陽明病發

汗不解腹滿急者亟下之 傷寒六七日目中

不了了睛不和無表證大便難宜承氣湯下之

陽明病下之早外有熱手足溫不結胸心中

懊憹不能食但頭汗出梔子豉湯主之 陽明

病發潮熱大便溏胸滿不去者與小柴胡湯去

參加栝樓黃連 陽明病自汗出或發汗後

小便不利津液內竭大便雖硬不可攻之須俟其

日不大便煩不解腹滿痛本有宿食宜再用承

氣湯下之 食穀欲嘔屬陽明非少陽也胸中

煩熱者竹茹湯主之竹茹 三錢 麥門冬 五錢 枳

杷葉 三片 大蘆根 三兩 內無熱證者小便利口不

渴此為陽明虛也吳茱萸湯主之吳茱萸 二錢

人參 三錢 生薑 一錢五分 大棗 三枚 水煎日三服

凡陽明病多汗津液外出胃中燥大便必鞭鞭

則譫語以小承氣湯下之若一服譫語止者勿再服 陽明病譫語發潮熱脉滑而數者小承氣湯主之服藥後腹中轉氣者更與一服若不轉氣者勿更與之若服藥後次日不大便脉反微澀者裏虛也為難治勿復議下 陽明病下血譫語者此為熱入血室汗止在頭用荆芥

錢 葛根 三錢 黃芩 五錢 麥冬 五錢 牡丹皮 五錢

生蒲黃 二錢 濃煎以童便對飲之 陽明病脉

若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上有胎者梔子豉湯主之 若渴欲飲水舌燥者白虎湯加人參主之 若脉浮發熱口渴小便不利者猪苓湯主之 陽明病協熱下利者宜六一散心下痞者以黃連栝樓湯調服之 脉浮遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之附子乾薑甘草 趺陽脉浮而澀小便數大便鞭其

脾為約麻子仁丸主之麻仁十三兩芍藥四兩枳

實四兩大黃八兩厚朴三兩杏仁六兩蜜丸如

梧子大每用十九日三服陽明實則譫語虛

則鄭聲鄭聲者重語也直視譫語喘滿者死下

利者亦死發汗多若重發其汗譫語脉短者

死脉和者不死若吐若下後不解不大便五

六日或至十餘日日晡時發潮熱不惡寒獨語

如見鬼狀若劇者發則不識人循衣妄撮惕而

不安微喘直視脉弦者生濇者死見陰脉也微

者但發熱譫語者大承氣湯下之利勿再服

陽明病發狂棄衣而走登高而歌此陽明實也

以承氣湯亟下之如便不結者大劑白虎湯灌

之石膏四兩麥冬二兩知母一兩加大青一兩

甘草七錢太陽陽明病協熱下利者宜六一

散以黃連煎湯調服之太陽陽明并病六七

日表證仍在其人發狂者以熱在下焦少腹當

硬滿小便自利下其血乃愈當用桃仁承氣湯

又二陽并病太陽證罷潮熱汗出大便難譫

語者宜大承氣湯

少陽病其證口苦咽乾目眩往來寒熱胸脇

痛胸滿或痛耳聾脉法弦細頭痛發熱者屬少

陽少陽不可發汗發汗則譫語胃和者當自愈

不和者則煩而悸傷寒三日少陽脉小者欲

已也凡太陽病不解傳入少陽者脇下硬滿

乾嘔不能食往來寒熱未經吐下脉沉緊者與

小柴胡湯柴胡二錢四分人參九分黃芩九分甘草

九分半夏一分五錢生薑九分大棗二枚水煎溫服

日三加減法若胸中煩而不嘔去半夏人

參加栝樓實一枚若心下痞鞭去大棗加牡

蠣二錢半若渴者去半夏加人參栝樓根若

腹中痛者去黃芩加芍藥三錢若心下悸小

便不利者去黃芩加茯苓二錢若不渴外有

微熱者去人參加桂一錢夏溫覆取微汗愈

若效者去人參大棗加五味子一錢少佐以乾

薑陽明少陽并病必下利脉滑而數有宿食

也當承氣湯下之若吐下發汗溫針譫語柴

胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之

三陽合病脉大上關上但欲睡眠目合則汗藥用

百合一兩麥門冬五錢炙甘草一錢知母二錢

竹葉五十片栝樓根二錢龍甲如法白芍藥二錢

合主之傷寒六七日無大熱其人煩躁者此

為陽去入陰故也傷寒三日三陽為盡三陰

當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪

也

三陰治法總要

二陰病其證有二一者病發於三陽不時解表

以致邪熱傳入於裏雖云陰分病屬於熱糞結

本草經疏卷二

綠君亭

宜下腹滿不可按宜下有燥糞協熱下利宜下
 腹痛下利宜芍藥黃芩炙甘草以和之如便膿
 血即加滑石黃連佐以升麻乾葛如邪雖入
 裏糞猶未結宜清其熱渴者用白虎湯竹葉石
 膏湯不渴或心下痞者宜黃連黃芩芍藥枳殼
 麥冬枯樓輩以清之或邪未結於下焦少腹
 不堅痛而誤用芒硝以伐真陰洞泄不已元氣
 將脫宜用人參白朮炙甘草大棗乾薑芍藥大

補與之不止佐以升提升升麻葛根柴胡之類

若從無陽邪表證從不頭疼發熱寒邪直中陰
 經此必元氣素虛之人或在極北高寒之地始
 有是證法宜溫補以接其陽附子人參乾薑官
 桂大劑與之陽回寒退即以平補之劑調之勿
 過用桂附以防其毒
 三陰各經見證悉從仲景傷寒論法治之如少
 陰咽痛咽中生瘡聲不出用苦酒湯到咽即效

故知古人立法非今人可及也

春溫夏熱病大法

冬傷於寒至春變為溫病大都頭疼發熱或渴或不渴三陽證俱然亦間有先微寒後即發熱者大抵發熱其常也藥用辛溫佐以辛寒以解表邪太陽宜羌活湯陽明宜白虎湯無汗不嘔者間用葛根湯少陽往來寒熱等證不可汗吐下宜和解小柴胡湯渴者去半夏加栝樓根耳

龍熱盛去人參加麥冬知母栝樓根渴亦加之

至夏變為熱病其表證大約與春溫同但熱比於溫則邪氣更烈耳解表用白虎湯竹葉石膏湯有太陽證則加羌活有少陽證則加柴胡黃芩如發斑白虎湯竹葉石膏湯加玄參梔子桔梗鼠黏子連翹大青小青黛大劑與之二證若大便秘宜按之其邪已結於內便鞭宜察邪結中焦小承氣湯調胃承氣湯下之邪結下焦

少腹堅痛始用大承氣湯下之

傷寒溫疫其不可治及難治者皆屬下元虛

傷寒溫疫三陽證中往往多帶陽明者以手陽

明經屬大腸與肺為表裏同開竅於鼻足陽明

經屬胃與脾為表裏同開竅於口凡邪氣之入

必從口鼻故兼陽明證者獨多

邪在三陽法宜速逐遲則胃爛發斑或傳入於

裏則屬三陰邪熱熾者令陰水枯竭於法不治

矣此治之後時之過也

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏

急或引陰中拘攣熱上衝育頭重不欲舉眼中

生花膝脛拘急者燒裊散主之取婦人中裊近

陰處剪燒灰以水和服方寸七日三小便即利

陰頭微腫則愈婦人病取男子裊襠燒灰

大病差後勞復者枳實梔子湯主之枳實三枚

梔子十四枚豉一升綿裹以清漿水七升空煮

取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗若有宿食者加大黃如博棋子大五六枚

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者以汗解之脉沉實者以下解之

百合病者百脉一宗悉致其病也其證神思常默然飲食不美亦不惡如寒無寒如熱無熱口

苦小便赤百合地黃湯主之汗後者百合知母

湯下後者滑石代赭湯吐後者百合雞子湯

近代醫師鹵莽既不明傷寒治法又不識雜證類傷寒往往妄投汗下之藥以致虛人元氣變證叢生元氣本虛之人未有不因之而斃者矣戒之哉汗下之藥焉可嘗試也

時氣傷寒 除陰證不可服

苦參 一兩 水酒各一碗煎八分重者水醋各半

服之一汗而愈不論傷寒久近立效本草云天

行尤良

暑○諸病喘嘔暴注下迫霍亂轉筋身熱瞤鬱
小便濁赤皆屬於暑

忌破氣 升 復忌下 溼潤 辛溫 辛

燥 熱 發散 閉氣

諸藥俱見前

宜清暑益氣 健脾 甘寒 甘溫 辛寒

酸寒 苦寒

黃連

香薷

葛根

石膏

知母

甘草

人參

黃耆

白朮

白藜豆

神麴

橘皮

白茯苓

木瓜

麥門冬

五味子

白芍藥

白梅

烏梅

大約用清暑益氣湯香薷飲生脉散凡病
暑之人其氣必虛暑傷氣無氣以動故當
補氣為本惟肺熱多火者忌人參朮

中暑猝昏暈急以童便灌入即省

忌宜俱同暑

又方用絲瓜葉一片白鹽梅肉一枚并取核中仁共研如泥新汲水調灌立瘥兼治中暑霍亂有神

太陽病中暍

忌同暑

宜人參白虎湯有肺熱火病人不能服參者

用竹葉石膏湯脾胃作瀉者水調六一散

霍亂見胃虛條內忌宜俱同

症夏由於脾胃薄弱胃家有溼熱及留飲所致

忌同前

宜益氣健脾

酸寒

苦寒

淡滲

人參

白朮

半夏

橘皮

白茯苓

白朮豆

白芍藥

木瓜

澤瀉

兼服生麥散

溼○諸瘧強直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重
附腫肉如泥按之不起皆屬於溼經曰地之溼
氣感則害人皮肉筋脉故其病筋骨疼痛腰重
痛不可轉側身重四肢不利溼在上病嘔吐頭
重胸滿溼在中病腹脹中滿泄瀉溼在下病足
脛跗腫脚氣臙瘡久不愈

忌溼潤 甘 鹹

諸藥俱見前

宜散 滲泄 燥 辛 苦

木瓜 薏苡仁 朮 石斛

萆薢 石菖蒲 茯苓 佐以防風

葛根 寒溼加半夏 五加皮

風溼加獨活 溼熱加黃檗

車前子 木通 甚者加漢防已

脚氣由於溼熱

忌溫燥 溼熱 補氣 復忌破氣 升

本草經疏卷二

綠君亭

諸藥俱見前

宜清熱 除溼 利小便 甘平 酸寒

苦寒 辛溫 淡滲

黃檗 石斛 麥門冬 木瓜

石菖蒲 薏苡仁 車前子 茯苓

木通 澤瀉 草薺 防已

燥○諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥角弓反張筋攣急不舒舌強不能言口一便閉澀口渴口乾

以致飲食不化噎膈吐食

忌升散 破氣 下 辛燥 大熱 溫

諸藥俱見前

宜潤 益血 辛 甘寒 酸寒 鹹寒

有熱證者宜兼清熱

麥門冬 當歸 地黃 肉蓯蓉

酥 人乳 牛乳 蜜

胡桃	甘菊花	麻仁	胡麻
柏子仁	人參	松實	天門冬
五味子	酸棗仁	白芍藥	蕉漿
蘆根汁	童便	梨汁	韭汁
佐以薑汁			

火○諸熱瞽瘖暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭
 肘腫疼酸氣逆上衝禁慄如喪神守嘔嘔瘡瘍
 喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注

開痰暴病暴死皆屬於火

忌補斂 升發 閉氣 辛燥 溫熱

諸藥俱見前

宜降折	下	鹹寒	苦寒	辛寒	甘寒
大黃	童便	芒硝	黃芩		
黃連	黃檗	連翹	石膏		
山梔	玄參	生甘草	知母		
天門冬	麥門冬	生地黃	藍汁		

虛者宜甘寒鹹寒以滋水不宜用苦寒傷

胃

猝眩仆九竅流血多不治

忌同火

宜服童便

鹽湯

竹瀝

藍汁

梨

生犀角汁

猝心痛

忌同火

宜服山梔

白芍藥

延胡索

生甘草

鹽湯

蘇子

目暴赤腫痛甚見肝實條內忌宜俱同

二便忽閉以利小便為先

忌同火

宜降潤

苦寒

甘寒

辛寒

利竅

大黃

蘇子

生蜜

麻仁

桃仁

石膏

知母

天門冬

本草經疏卷二

綠君亭

麥門冬

黃芩

山梔

滑石

石瀉

猪苓

車前子

木通

海金沙

頭面赤腫

忌同火

宜清熱解毒

發散

苦寒

辛寒

甘寒

鹹寒

甘菊花

鼠黏子

連翹

薊茶

薄荷

蠅蛻

大黃

玄參

石膏

知母

竹葉

生甘草

童溺

忽大渴思水水

忌同火

宜潤

生津液

辛寒

甘寒

鹹寒

石膏

知母

玄參

麥門冬

竹葉

栝樓根

五味子

梨汁

蔗漿

童便

凉水

冰

口乾舌苦

忌宜俱同火

暴瘡

忌同火

宜降氣

發音聲

苦

甘寒

辛涼

鹹

寒

蘇子

枇杷葉

貝母

桔梗

百部

竹瀝

梨汁

天門冬

麥門冬

甘草

薄荷

玄參

桑白皮

童便

暴注

忌同火

宜利水

苦寒

酸寒

茯苓

黃連

黃芩

白芍藥

生甘草

葛根

滑石

木通

本草經疏卷二

綠君亭

虛者加人參

蓮肉

白菹豆

躁擾狂越罵詈驚駭

忌同火

宜清鎮

苦寒

辛寒

鹹寒

丹砂

牛黃

黃連

黃芩

山梔

滑石

石膏

知母

童便

大便閉者加大黃下之不行加

林示慄如喪神守

忌同火

宜同躁擾狂越

氣逆衝上

忌同火

宜降氣

酸斂

甘寒

苦寒

鹹寒

蘇子

枇杷葉

橘紅

五味子

番降香

山茱萸

白芍藥

麥門冬

石斛

黃蘗

牛膝

桑白皮

童溺

潤瘕瘖瘵

忌同火

宜清熱和肝

酸寒

苦寒

辛寒

甘寒

白芍藥

生甘草

竹葉

玄參

黃連

黃蘗

生地黃

甘菊花

麥門冬

知母

石膏

○雜證門

瘧經曰夏傷於暑秋必痃瘧其證大都多熱多
 寒或熱多寒少或寒多熱少或單熱不寒或單
 寒不熱或先寒後熱或先熱後寒或有汗無汗
 或汗少汗多或自汗盜汗或頭疼骨痛或大渴
 引飲口苦舌乾或嘔吐不思食或煩躁不得眠
 或大便燥結或瀉利或連發或間發或三日發
 或發於陽或發於陰要皆中氣不足脾胃虛弱

本草經疏卷二

綠君亭

暑邪乘虛客之而作雖隨經隨證投藥解散必先清暑益氣調理脾胃為主有食者兼消導奪食有風兼散風有老痰伏飲者兼豁痰逐飲感瘴癘者兼消瘴癘汗多者固表無汗者解表泄利者升發兼利小便便燥者兼益陰潤燥病有陰陽藥分氣血證有緩急治因先後人有虛實法異攻補久而不解必屬於虛氣虛者補氣血虛者補血兩虛者氣血兼補非大補真氣大健脾胃不得瘳也

忌破氣 下

諸藥俱見前

瘧必由於中氣虛破氣則傷中氣邪不得解甚則中滿不思食作泄惡寒口乾惟傷食宜消不同此法
誤下則邪氣陷於內變為滯下或腹滿腫脹嘔惡不思食凡屬破氣下泄藥切戒勿

施

宜清暑益氣 健脾胃 兼消痰 宜分

臟腑手足六經所見證施治 先清暑熱多

者宜服白虎湯加減

硬石膏 自一兩至四兩 知母 自四錢至二兩 竹葉 自一百片至四兩

麥門冬 自八錢至三兩 粳米 自一小撮至二大撮 病

人素虛或作勞者加人參 自三錢至一兩 ○有痰

加廣橘紅 三錢 竹瀝 一杯 大渴者加栝樓

根 三錢至六錢 ○不渴者用清暑益氣湯 ○兼

飲食停滯者加枳實青皮草果一二劑食

消即止勿多服多服則損中氣其藥俱宜

黃昏煎以井水澄冷須露一宿五更時溫

服蓋瘧乃暑邪為病暑得露則散也

足太陽經屬膀胱其證令人腰痛頭痛頭重寒

從背起先寒後熱焯焯暘暘然熱止汗出難已

或遍身骨痛小便短赤

本草經疏卷二

絲君亭

羌活

一錢至三四錢

廣陳皮

去白二錢五分

黃芩

二錢前

胡

二錢

甘草

炙五分

猪苓

一錢

知母

二錢五分

若口渴者即兼陽明宜加石膏麥門冬倍

知母渴而汗少或無汗并加葛根○若涉

深秋或入冬無汗宜多加薑皮○因虛而

無汗或汗少者加人參

三五錢

麥門冬

四五錢

佐以薑皮

二二三錢

露一宿發日五更溫服○

因虛汗多者加黃耆

三四錢

桂枝

七八分

即去桂枝不可多服○若病人素有熱者

勿服桂枝以芍藥五味子代之○若發於

陰并加當歸○小便短澀或赤者與六一

散二三服○有溼者以猪苓茯苓代滑石

下午服理脾健胃藥

橘紅

二錢五分

白豆蔻

五分

白茯苓

三錢

山查

三錢

麥芽

炒三錢

藿香

一錢

人參

三錢

白朮

二錢

白芍藥

三錢

白扁豆

三錢

○有肺火

者去人參白朮加麥門冬 五錢 石斛 三錢

烏梅肉 一枚 ○停食者必惡食加山查傷

肉食者加黃連紅麴傷穀食者加枳實草

果 各七分 傷麪食者加炒萊菔子食消即已

不可多服多服則損中氣○胃家素有溼

痰者其證不渴寒多方可用半夏橘紅二

朮大劑與之嘔甚者兼用薑皮

足陽明經屬胃其證發熱頭眩鼻乾渴欲引飲

目眴眴不得眠甚則煩躁畏火光人聲水聲

宜服大劑竹葉石膏湯無汗或汗少不嘔者

可加乾葛 錢二三 ○病人虛而作勞者加人

參○汗多加白朮○痰多加貝母橘紅得

汗即解○寒熱俱甚渴甚汗多寒時指爪

皆紫黯者加桂枝 七八分 ○久而不解屬氣

虛用人參 兩許 薑皮兩許煎成露一宿五

更溫服○下午服理脾健胃藥如前方加

減亦如之

足少陽經屬膽其證往來寒熱口苦耳聾胸脇痛或嘔

宜服小柴胡湯○渴者去半夏加石膏麥門

冬○肺家有熱者去人參加知母倍門冬

○有痰不渴者本方加貝母三錢至八錢 苧苳

苓各三錢至三四錢 ○病人陰虛而有熱

者雖嘔吐忌用半夏生薑誤投則損大津

液令人聲啞宜用竹茹橘皮麥門冬白茯苓

苓烏梅以代之

○以上三陽經瘧邪客之者其證多熱多渴亦易得汗藥宜大劑急逐暑邪毋使遲留則病易愈繼以理脾開胃大補真氣蔑不瘳矣邪在三陽藥宜辛寒如石膏知母柴胡甘寒如葛根麥門冬竹葉粳米苦寒如黃芩之屬為君乃可以散暑邪除熱渴墜

頭疼兼寒甚者則間用辛溫如薑皮桂枝
 以為嚮導以伏其邪則病易退凡寒甚者
 病因於虛或作勞者亦因於虛皆宜甘溫
 以人參黃耆朮為君佐以辛甘如桂枝薑
 皮之屬脾胃虛弱飲食不消者則補之以
 參朮佐以消導如白豆蔻麥芽砂仁草豆
 蔻枳實橘皮山查之屬在陰分者則以當
 歸牛膝為君佐以薑桂如熱甚而渴者去

薑桂加知母麥門冬竹葉牛膝鼈甲

足厥陰經屬肝其證先寒後熱色蒼蒼然善太
 息甚者狀如欲死或頭疼而渴

宜先服三黃石膏湯加柴胡鼈甲橘皮以祛

暑邪後用當歸 兩許 橘皮 三四錢 鼈甲 四五錢

牛膝 兩許 柴胡 一二錢 濃煎露一宿發日五

更溫服○如熱甚而渴加枯樓根 三四錢 麥

門冬 五六錢 竹葉 一百片 知母 三四錢 鼈甲 五六錢

○如脾胃薄弱或溏泄去當歸加人參三五

錢 ○如有肺火不可服參者祇照本方多

服自愈 ○寒多或寒甚指爪青黯者加桂

枝薑皮人參

足太陰經屬脾其證先寒後熱或寒多若脾瘧必寒從中起善嘔嘔已乃衰然後發熱熱過汗出乃已熱甚者或渴否則不渴喜火

宜服桂枝湯建中湯 ○病人虛者以人參薑

皮許兩濃煎露一宿五更溫服 ○有痰者

宜加朮橘皮 各三錢

足少陰經屬腎其證寒熱俱甚腰痛脊強口渴寒從下起小便短赤

宜先服人參白虎湯加桂枝以祛暑邪後用

鼈甲 四五錢 牛膝 兩許 熱甚者加知母麥門冬

各四錢 ○寒甚者加桂枝 錢許 ○嘔則兼加薑

皮 三四錢 ○如熱甚而嘔者去桂枝薑皮加竹

茹 三錢 人參橘皮 各三錢 用牛膝桂枝者肝

腎同一治故也

○瘧病多挾痰以故熱痰須用貝母為君自三錢至八錢竹瀝竹茹栝樓根橘紅白茯苓稱是以佐之甚者可加霞天膏如寒痰發瘧寒多不渴者用半夏白朮橘皮為君多加生薑皮

○瘧病多挾風有風者必用何首烏為君白朮

橘皮為臣葛根薑皮羌活以佐之不頭痛者除羌活

○暑邪盛解散不早陷入於裏則變為滯下急投芩連芍藥滑石紅麴甘草佐以葛根升麻柴胡以表裏分清之脾胃薄弱者加人參藊豆蓮肉大劑與之以愈為度滯下若愈瘧亦隨止即不止其熱必輕仍隨經隨證以治之不煩多藥而自止也

又暑熱溼之邪內伏百藥不效者用獨雄丸立愈

○凡勞瘧病人陰不足或作勞或房勞病發於陰或間日一發或三日一發三日一發為病深須以鼈甲牛膝何首烏為君橘皮為佐發於夜而便燥者加當歸脾胃弱者勿加佐以薑皮熱甚勿入大劑與之日三乃差

附錄諸瘧主治

熱多宜

貝母

石膏

麥門冬

橘紅

乾葛

滑石

竹葉

牛膝

知母

黃芩

柴胡

白茯苓

烏梅

何首烏

牡蠣

鼈甲

寒多宜

桂枝

薑皮

人參

二朮

黃耆

當歸

橘紅

半夏

草豆蔻

白豆蔻

炙甘草

汗多宜

人參

白朮

黃耆

秋冬加桂枝

無汗宜

乾葛

柴胡

石膏

羌活

薑皮

人參

蒼朮

瘧母宜

鼈甲

射干

牡蠣

三稜

縮砂蜜

桂

橘皮

青皮

人參

○凡瘧疾多熱久不解者其人必本陰虛法當

光益陰除熱非鼈甲牛膝不能除也多寒而久

不解者其人必本陽虛非人參白朮黃耆不能除

○按瘧有山嵐瘴氣停痰留飲而發者古方類用常山砒霜等吐之今人誤執其方見瘧輒用不知二藥有大毒損人真氣犯之多致危殆慎之慎之

滯下俗呼痢疾其證腹痛便膿血或赤或白或

赤白相雜或下純血或下紫黑血塊或如豆汁
 或如魚凍或如屋漏水或下純黃積類多裏急
 後重數登圜而不得便小便短赤不利或發熱
 或口渴甚則嘔惡不思食此皆暑溼之邪與飲
 食積滯膠固腸胃而作必先祛暑溼安胃為
 主傷氣分則調氣益氣傷血分則和血補血挾
 瘀血則行血藥雖因證而設要皆以補養胃氣
 為急故其證以噤口痢為最重胃氣一絕則不

可以治矣故曰安穀則昌絕穀則亡俗治多藉川

迎而奪之之說用大黃朴硝及誤用巴豆牽
 牛以致洞泄腸開而斃又有妄投訶子栗殼亞
 芙蓉肉豆蔻收澀之劑以致便閉腹脹或溼熱
 上攻肢節腫脹拘攣痛不可忍難以救療慎之
 慎之

忌破氣 閉氣 收澀 燥 溫熱 鹹寒
 滑膩

諸藥俱見前

宜清熱消積 開胃氣 升 利小便

黃連 黃芩 白芍藥 紅麴

山查 廣橘紅 升麻 葛根

甘草 滑石 蓮肉 白蘊豆

烏梅 如胃弱加人參三四錢 蓮子四十粒

橘紅二錢 升麻七分 ○如腹痛以黃連四

錢白芍藥三錢 炙甘草五錢 黃蘖一錢 升

麻七分煎服 ○如裏急同上藥加當歸二

錢 ○如後重甚加檳榔五分 枳殼五分 木

香汁七匙 ○如口渴去木香倍滑石 ○如

小便赤澀短少或不利亦倍之 ○赤多倍

烏梅 山查 紅麴 ○白多加吳茱萸七分 ○

惡心欲嘔即噤口痢多用人參 蓮肉 蘊豆

白芍藥以綠色升麻七分 佐之 ○久痢不

止加肉豆蔻一錢 人參三錢 砂仁五分 白

茯苓 二錢

○凡滯下非元氣壯實多噉能食之人慎勿輕用大黃巴豆牽牛等下藥

○復有毒痢一證或痧毒內陷下膿血各藥不效者加忍冬藤為君地榆丹砂犀角汁次之

○凡產後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參

白芍當歸紅麴升麻益母草炙甘草滑石末是矣若惡露未盡兼用乳香沒藥各七分炒

砂仁 一錢 久之自愈血虛可加阿膠 三錢

○凡胎前滯下宜用黃芩黃連白芍炙甘草橘紅赤麴枳殼蓮肉畧用升麻未滿七月勿用

滑石

瀉利俗呼泄瀉因於溼

忌溼潤 破氣 下 苦寒 滑利

諸藥俱見前

宜安胃補脾 升 利小便

人參 白茯苓 蓮肉 白蘆豆

白朮 車前子 升麻 橘紅

藿香 木瓜 乾葛 炙甘草

白萊菔 虛寒者加肉豆蔻 補骨脂

吳茱萸 虛熱者去白朮加 川黃連

倍芍藥 蓮肉

○暑溼為病則小水短赤或口渴倍用薑炒黃

連為君佐以乾葛升麻○由於感風寒者二

朮吳茱萸砂仁陳皮乾薑紫蘇主之○若由

飲食停滯者兼消導山查麥芽神麴陳皮肉

豆蔻

五疸方書所載五疸酒食大饑後過飽女勞失

治而成然其證必由溼熱傷脾及飲食停滯又

有瘀血發黃一證方所不載分別一誤則藥不

對證多致不救慎之慎之

本草經疏卷二

綠君亭

忌破氣 閉氣 下 鹹 滑利 滯膩

潤 燥熱 有瘀血者兼忌酸寒

諸藥俱見前

宜清熱 利水 除溼 養胃氣 有停滯

者宜消積滯 有瘀血者宜行血

茵陳蒿 黃連 苜蓿 酒煎非此不愈

梔子 紫草 栝樓根 秦艽

黃芩 滑石 車前子 白蘚皮

仙人對坐草 白茯苓 連錢草

蟹 屬草一名九里香取汁入薑汁少許飲之良 ○虛者加人參 ○

停滯者加紅麴橘紅穀麥蘗山查 ○瘀血

加琥珀牡丹皮紅麴紅花桃仁延胡索蒲

黃五靈脂韭 ○元氣壯實者服前藥瘀血

不行可加熟大黃虛者勿用

痰

○由於熱

忌燥 溫熱 補斂 升

諸藥俱見前

宜降 潤 清熱 苦寒 辛寒 佐以鹹

寒

蘇子 橘紅 天門冬 枇杷葉

麥門冬 黃芩 桑白皮 薄荷

百部 栝樓根 栝樓仁 桔梗

貝母 蛤粉 竹瀝 童便

膠固者加霞天膏并用猫兒刺

○由於風寒

忌補斂 溼潤 酸 鹹

諸藥俱見前

宜降氣 辛散

橘紅 蘇子 杏仁 天麻

前胡 半夏 南星 葛根

桑白皮 薄荷 白前 生薑汁

○由於溼

忌潤 鹹 酸 滯膩 發溼

諸藥俱見前

宜健脾 燥溼 辛散 佐以淡滲

人參 二朮 橘紅 半夏

桑白皮 白茯苓 澤瀉

飲如涎而薄者或如涎而稠者伏於胸中及脾

胃間或吐酸水苦水黃水綠水或伏而不吐上

支心胸胃脘作痛不可忍按之不得下或發寒

熱嘔吐不能飲食

忌宜俱同脾虛證內停飲條

諸氣氣有餘即是火

忌升 閉氣 酸斂 滯膩

諸藥俱見前

虛者宜降 補斂 調 溫 酸 辛 甘

蘇子 枇杷葉 橘紅 麥門冬

蘆根汁

甘蔗

番降香

沉水香

白豆蔻

鬱金

甘草

童便

白芍藥

五味子

因虛極而氣不得行

者加人參

實者宜破散

香燥

辛苦

辛寒

枳殼

青皮

檳榔

厚朴

木香

沉香

香附

烏藥

降香

藿香

縮砂蜜

忌酸斂

滯膩

補氣

閉氣

諸藥俱見前

屬情抱者宜開發志意

調氣散結

和中

健脾

遠志

貝母

鬱金

石菖蒲

香附

蘇子

橘紅

白豆蔻

木香

蘇合香

縮砂蜜

麥門冬

屬五臟者○木鬱達之宜升 吐

升麻 柴胡 川芎 瓜蒂

人參 蘆

火鬱發之宜散

升麻 葛根 柴胡 防風

羌活

土鬱奪之宜下

檳榔

枳實

厚朴

大黃

金鬱泄之宜降

橘紅 蘇子 桑白皮 猪苓

澤瀉 木通 赤小豆 車前子

烏蠡魚

關格不得大小便為關是熱在丹田也吐逆水
漿不得下為格是寒反在胸中也是陰陽易位
故上下俱病先投辛香通竅下降之藥以治其
上次用下泄苦寒之藥以通二便此急證法難

緩治縱有裏虛通後再補

忌升 補斂 閉氣 酸

諸藥俱見前

宜降下 辛寒 辛溫

沉香 白豆蔻 丁香 蘇子

龍腦香 蘇合香 橘紅 生薑

藿香 次用大黃 黃檗

知母 滑石 木通 車前子

治 噦俗呼呃逆久病沉痾而發者屬真氣虛多不

忌破氣 升 散

諸藥俱見前

宜補斂 甘溫 甘寒

人參 黃耆 炙甘草 麥門冬

五味子 益智子 白芍藥 石斛

○傷寒失下而發者

忌補斂 酸 燥熱 滯膩

諸藥俱見前

宜下大小承氣之類便不鞭閉按之腹中和

軟未經汗吐者宜辛寒解表白虎湯之類

○氣逆衝上而發者

忌升 補

諸藥俱見前

宜降氣 甘寒 鹹寒

蘇子 橘紅 枇杷葉 竹茹

蘆根汁 麥門冬 童便

○因痰水停膈而發者

忌升 潤 苦寒 甘寒 酸寒

諸藥俱見前

宜降氣 開痰 辛散

橘紅 蘇子 貝母 桑白皮

半夏

旋覆花

生薑

白豆蔻

吐血咯血鼻衄齒衄耳衄舌上出血

忌升提發散

下

破血

補氣

閉氣

破氣

溫熱

辛燥

復忌極苦寒傷胃

諸藥俱見前

宜降氣

清熱

涼血益陰

兼行血

鹹

寒

酸寒

甘寒

蘇子

麥門冬

橘皮

枇杷葉

降香

鬱金

天門冬

沙參

牛膝

阿膠

生地黃

枸杞子

五味子

鼈甲

白芍藥

犀角汁

牡丹皮

青蒿

剪草

白藥子

童便

側柏葉

小蘗

茅根

櫻灰

藕節

當歸

蒲黃

蓄血俗名內傷或積勞或多怒或飽後行房或負重努力或登高墜下或奔逐過急皆致蓄血

其證多發熱其熱類外感而不頭疼不作渴天明少間至午復劇有汗汗多劑頸而還自汗無氣以息目光短不思飲食不得眠二便自利小便或赤大便或泄

忌破氣 復忌補氣 下 苦寒 辛燥

諸藥俱見前

宜行血 辛溫 佐以鹹寒 瘀血行後宜

補血益脾和肝

桃仁

紅藍花

延胡索

桂 有火之 人勿用

鬱金

當歸尾

蘇方木

乳香

番降香

沒藥

穿山甲

麝蟲

赤芍藥

五靈脂

蒲黃

紅麴

騏驎竭

韭汁

童便

桃梟

甚者用大黃花蓋石瘀行則止勿過劑如元氣虛脾胃素弱者慎勿輕用大黃如瘀血行後宜生地黃 川續斷 白膠

當歸身 麥門冬 牛膝 白芍藥

炙甘草 酸棗仁 大棗 龍眼肉

枸杞子 山茱萸

頭痛

○挾風寒者

忌補斂

諸藥俱見前

宜辛溫發散

羌活

防風

細辛

荆芥

薄荷

川芎

藁本

升麻

白芷

蔓荊子

生薑

葱白

○挾邪熱者

忌同挾風寒

宜辛寒 苦寒 解散

石膏

薄荷

黃芩

酒炒

芽茶

黑豆

烏梅

甘菊花

土茯苓

熱極目昏便燥者加酒蒸大黃

○挾痰者

忌升 補欽 酸甘 滯膩

諸藥俱見前

宜豁痰降氣 辛燥

蘇子 橘紅 貝母 半夏

前胡 竹瀝 朮 天麻

○陰虛者

忌辛熱發散

諸藥俱見前

宜補血益陰 甘寒 酸寒

生地黃 甘菊花 當歸 天門冬

麥門冬 枸杞子 黃檗 白芍藥

忍冬 五味子 烏梅

○眉稜骨痛

忌宜俱同陰虛頭痛

齒痛

忌升 補斂 燥熱 辛溫

諸藥俱見前

宜清熱涼血 苦寒 辛寒 甘寒 鹹寒

麥門冬 生地黃 赤芍藥 牡丹皮

竹葉 知母 黃連 黃芩

黃檗 玄參 石膏 薄荷

蘇子

甘草

童便

上下齟屬胃與大腸火宜石膏

熟大黃

麥門冬 黃芩 黃連 赤芍藥

生地黃 生甘草 青黛 細辛

西瓜皮灰 薄荷 枇杷葉

蘇子 水通

真牙浮動及黑爛屬腎虛有火已見腎虛條
內忌宜俱同

胃脘痛

○因火者

忌補飲 燥熱

諸藥俱見前

宜降 苦寒 甘寒 鹹寒 辛寒

蘇子 橘紅 黃連 山梔

麥門冬 炙甘草 石膏 知母

玄參 童溺

○因寒者

忌破氣 滯膩 苦寒

諸藥俱見前

宜辛溫發散

橘皮 草豆蔻 益智子 丁香

桂 白朮 藿香 白豆蔻

縮砂蜜 吳茱萸 厚朴 香附

乾薑

○因宿食者

本草經疏卷二

綠君亭

忌升 補飲 苦寒

諸藥俱見前

宜消導 兼降氣

山查 橘皮 草果 紅麴

枳實 朮 檳榔 草豆蔻

青皮 厚朴 穀麥蘖 縮砂蜜

因脾胃虛弱以致食停者消導藥中加人

○因瘀血者

忌補氣 酸飲

諸藥俱見前

宜辛溫苦溫以行血

桃仁 延胡索 紅麴 紅花

山查肉 牡丹皮 韭菜 通草

番降香 鬱金 肉桂 三稜

童溺 琥珀 菴藺子 牛膝

赤芍藥

○因血虛者按之則痛止

忌破氣 復忌補氣 燥熱 辛溫

諸藥俱見前

宜潤 補斂 甘寒 甘溫

麥門冬 炙甘草 酸棗仁 石斛

白芍藥 生地黃 當歸

○因蟲者

忌補 升 發散 甘

諸藥俱見前

宜殺蟲 苦 酸

錫灰 苦棟根 檳榔 鶴虱

雷丸 使君子 蕪荑 薏苡仁根

大黃 烏梅

○因惱怒者

虛弱人忌破氣 壯實人忌補氣 總忌酸

本草經疏卷二

綠君亭

欵升

諸藥俱見前

宜降氣 辛溫

蘇子

枇杷葉

白豆蔻

番降香

縮砂蜜

木香

橘紅

延胡索

五靈脂

○因痰飲者

忌宜俱見痰飲證下

腹痛

○因於寒

忌苦寒 下利

諸藥俱見前

宜溫中 辛散

白朮

厚朴

乾薑

吳茱萸

桂

炙甘草

木香

縮砂蜜

橘皮

○因於熱火在少腹則絞痛

忌辛熱 香燥 補斂

諸藥俱見前

宜甘 苦寒

山梔仁 麥門冬 石斛 白芍藥

甘草 桔梗 黃芩 黃連

滑石 木通 戎鹽

○諸痛不可按屬實

忌心補氣 大熱

諸藥俱見前

宜破散 疏利 苦寒

枳實 青皮 檳榔 三稜

滑石 蓬莪茂 木通 大黃 有積 滯宜

用無者 勿用

○諸痛可按屬虛

忌破氣 破血 下利 發散

諸藥俱見前

宜補氣血 甘溫 酸斂

人參 黃耆 二朮 生地黃

當歸 炙甘草 白芍藥 薯蕷

酸棗仁 五味子

痺拘攣而痛也 因風寒溼三者合而成風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺溼氣勝者為着痺

忌下 收斂 酸寒 苦寒 鹹寒

諸藥俱見前

宜辛散 行氣 燥溼 甘溫 淡滲

漆葉 續斷 黃耆 甘草

甘菊花 草薺 防己 白朮

防風 羌活 獨活 秦艽

牛膝 木瓜 天麻 茯苓

澤瀉 菖蒲 車前子 桑寄生

狗脊 蔓荊實 杜仲 白蘚皮

石斛

細辛

松節

松葉

菖耳

原蠶沙

威靈仙

海風藤

痿屬溼熱經日治痿獨取陽明

忌破氣

升

辛熱發散

諸藥俱見前

宜大補氣血

清熱除溼

甘寒

甘溫

苦寒

酸寒

人參

黃耆

二朮

炙甘草

生地黄

麥門冬

白芍藥

木瓜

石斛

薏苡仁

黃檗

茯苓

澤瀉

車前子

木通

黃連

黃芩

交腸其病大小便易位而出或因大怒或因醉飽遂至臟氣乖亂不循常道法當宣吐以開提其氣使闢門清利得司秘別之職則愈矣

忌破氣

燥熱

諸藥俱見前

宜升清降濁 兼補氣 淡滲

升麻 柴胡 蘇子 降香

橘紅 人參 朮 茯苓

澤瀉 猪苓 木通 滑石

車前子

鬼疰尸疰飛尸客忤此係天地陰邪殺厲之氣
乘虛中人或遍身青黯或忽消瘦聲啞面色青

黃不定或忽驚厥目直視手握拳或遍身骨節
疼痛非常

忌破氣 復忌補氣 升 燥熱 酸斂

諸藥俱見前

宜辟惡氣 安神鎮心 辛香發散 金石

鎮墜

牛黃 丹砂 蘇合香 天竺黃

琥珀 沉水香 龍腦香 乳香

安息香

檀香

木香

麝香

真珠

雄黃

鬼臼

龍齒

犀角

金銀箔

虎骨

代赭石

天靈蓋

獺肝

生地黃

苜蓿

遠志

○婦人門

赤白帶下婦人多憂思鬱怒損傷心脾肝火時發血走不歸經所以多患赤白帶也白帶多是

脾虛蓋肝氣鬱則脾受傷脾傷則溼土之氣下

陷是脾精不守不能輸為榮血而下白滑之物矣皆由風木鬱於地中使然耳法當開提肝氣補助脾元宜以補中益氣湯加酸棗仁茯苓山藥黃檗蒼朮麥門冬之類濃煎不時飲之再用六味地黃丸中加牡蠣粉海螵蛸杜仲牛膝蜜丸光大如豆空心饑時吞下五六錢陰虛火熾加枸杞子五味子黃檗白帶多屬氣虛補氣健

脾治法之要領也

帶下如濃泔而臭穢特甚者溼熱甚也且多有溼痰下墜者宜蒼朮白朮黃蘗黃芩茯苓車前子為主佐以升提

帶下如雞子清者脾腎虛極也面色必不華足脛必浮腰腿必酸宜五味子八味丸間用開脾養心之劑如歸脾湯之類陰虛有火宜八味丸中加五味子菟絲子車前子黃蘗叔和云崩中

日久為白帶漏下多時骨水枯蓋言崩久氣血虛脫而白滑之物下不止耳此證雖有氣血寒熱之分要歸總屬於虛

赤淋多因於心火肝火時熾不已久而陰血漸虛中氣漸損遂下赤矣治宜養心為主兼以和肝緩中涼血清氣

赤帶久不止則血虛宜膠艾四物湯加便煨牡蠣粉酸棗仁麥門冬

標急而元氣不甚憊者先救其標標急而元氣衰劇者則當本而標之可也

忌破氣 降 溫熱

諸藥俱見前

宜補飲 清熱 辛甘 苦寒 佐以淡滲

生地黃 人參 白芍藥 阿膠

山茱萸 黃蘗 五味子 麥門冬

白膠 枸杞子 續斷 杜仲

牛膝 白茯苓 車前子 澤瀉

蛇床子 香附 補骨脂 牡蠣

艾 二朮

血枯經閉由於脾胃薄弱氣血不生

忌破氣 破血 燥熱 膩膈滑腸 升發

苦寒

諸藥俱見前

宜補脾胃 甘溫 甘平

人參

蓮肉

酸棗仁

白蘊豆

甘草

茯苓

薯蕷

橘紅

白芍藥

縮砂蜜

菟絲子

牛膝

牡丹皮

白膠

阿膠

芡實

麥門冬

經行先期為血熱

忌升

補氣

辛溫

燥熱

香附

當歸

烏藥

艾辛溫上

餘忌藥俱見前

宜涼血清熱

補肝腎

兼降氣

甘寒

酸寒 苦寒

生地黃

牡丹皮

白芍藥

天門冬

麥門冬

枸杞子

杜仲

青蒿

枇杷葉

蘇子

鼈甲

阿膠

黃蘗

黃芩

知母

經行後期為血虛

忌行血 破氣 燥熱 苦寒

諸藥俱見前

宜補肝腎 甘溫 酸溫

熟地黃 薯蕷 人參 菟絲子

山茱萸 杜仲 續斷 阿膠

艾 五味子 當歸 枸杞子

白膠 牛膝

月事過多屬心火盛脾氣弱

忌破氣 降 辛溫 苦寒

諸藥俱見前

宜涼血 斂攝 酸平 甘寒

麥冬 生地 瀉泄 禁用 青蒿 生甘草

牡丹皮 白芍藥 酸棗仁 五味子

崩中屬氣血兩虛有熱

忌破氣 行血 降 溫熱 辛燥 苦寒

諸藥俱見前

宜補氣血 兼清熱 甘溫 甘寒 酸斂

人參 黃耆 生地黃 熟地黃

地榆 芍藥 白膠 阿膠

香附 續斷 甘草 麥門冬

山茱萸 杜仲 五味子 白茅根

蒲黃炒 桑耳灰 側柏葉 艾葉

木耳灰

熱入血室類傷寒或經事適來忽住或屆期不

行忽發大熱口渴或厥但不頭疼為異於此陽實

耳

忌補氣 溫燥 辛燥 收斂 下 大

熱 升發

諸藥俱見前

宜行血清熱 甘寒 鹹寒 苦寒

生地黃 牡丹皮 蒲黃 蘇木

牛膝 延胡索 麥門冬 犀角

白芍藥 黃芩 童溺 荊芥穗

如便閉加大黃

種子

內分男女氣虛血虛精寒
血熱火熾精滑因證選用

忌破氣 破血 燥 過用辛熱

諸藥俱見前

宜調氣補血 男子宜固精

桑螵蛸

溫平治男
子精滑

柏實

甘溫治男
子精滑精寒

海狗腎

鹹熱治男
子精寒

魚膠

平治男
子精滑

陽起石

熱治男
子精寒

覆盆子

甘溫治男
子精滑

車前子

鹹寒治男
子火熾

鹿茸

溫鹹治男
子精寒

蓮鬚

甘溫治男
子精滑

巴戟天

溫治男
子精寒

何首烏

苦溫益男
子氣血

牛膝

苦平治男
子血虛陰痿

補骨脂

辛溫治男
子精寒陰弱

沙苑蒺藜

甘平男
子固精益血

白膠

溫平治男
子血兩虛精寒

肉蓯蓉

溫酸鹹治男
子血虛精寒

黃檗

苦寒治男
子火熾

人參

微溫治男
子虛脾胃薄弱

麥門冬

甘寒男
子血熱

五味子

酸溫治男
子精滑精寒

山茱萸 酸溫治男女 天門冬 苦寒治男女

蓮肉 甘平治男女 熟地黃 甘寒治男女

白薇 溫平 當歸 辛溫

白芍藥 酸寒 紫石英 溫女

艾葉 辛溫

妊娠惡阻

忌破氣 升散 燥熱 苦寒 滑腸 膩

隔

諸藥俱見前

宜順氣 甘寒 酸寒

蘇子 橘紅 枇杷葉 白茯苓

麥門冬 蘆根 竹茹 木瓜

白芍藥 竹葉 人參 縮砂蜜

白梅 烏梅

安胎

忌破氣 破血 升散 辛熱 辛燥

本草經疏卷二

綠君亭

諸藥俱見前

八月以後及胎前滯下者方可用枳殼氣
虛者不用

三月以前宜養脾胃四月以後宜壯腰腎補
血益陰順氣總宜清熱

茯苓 麥門冬 薯蕷 人參

芍藥 白朮 橘紅 炙甘草

縮砂蜜 艾葉 杜仲 生地黃

益母草 白膠 阿膠 續斷

黃芩 枸杞子 青蒿子 桑寄生

鯉魚 烏雌雞 葱白

胎漏屬氣血虛有熱

忌宜俱同安胎條

難產

忌破氣 破血 收斂

諸藥俱見前

宜補氣血 滑利 潤

人參 柞樹枝 魚膠 冬葵子

千里馬 白芷梢 牛膝 桂心

當歸 芎藭 益母草 百草霜

石燕 弓弩 麻油 猪脂

酒 生雞子 兔頭 滑石

麝香

預防血暈一腹痛坐草時即用蘇木菊花心者

一兩生地黃一兩降香末二錢水三盃煎一盃
 加童便半盃兒墮地卽飲之永無惡血衝心之
 患房中常打醋炭萬一血暈亦須此藥更以家
 寶丹一丸灌下神效○凡婦人氣弱者無氣力
 送子出產門須服人參此藥能兼治橫生倒產
 世鑿不知也○凡臨產交骨不開惟濃煮柞木
 枝湯飲之則自開柞木俗名一葉一刺其木枝
 榦直上每一葉下必發一刺○胞衣不下用乳

香沒藥末各七分五釐麝香一分芒硝一錢五分研細以酒調服立下飲熱童便以滋藥力更妙

產後諸病

忌破氣 升 汗 吐 下 燥 苦寒

大熱

諸藥俱見前

宜行血 次宜補血清熱 總宜補養脾胃

腎 辛溫 甘寒 酸寒

蘇木 黑豆 鹿角末 紅花

乳香 沒藥 牛膝 炮薑

當歸 脾胃弱者勿用 桃仁 胃弱者禁用亦不可過用

桂 天寒無火之人可用 益母草 澤蘭

乾地黄 續斷 白膠 杜仲

山茱萸 人參 青蒿 麥門冬

白芍藥 五味子

產後少腹痛按之痛甚有結塊名兒枕痛

忌酸飲 補氣 破氣 升 下 汗 燥

諸藥俱見前

宜行血活血散結 兼健脾

延胡索 紅藍花 牡丹皮 蘇方木

山查肉 益母草 蓬莪茂 蒲黃

白膠 當歸 黑豆 生地黃

澤蘭 牛膝 五靈脂 縮砂蜜

橘紅 童便 桃仁 乾薑

痛極加乳香沒藥各六分七分天寒加桂暑月勿

用肺熱有火勿用

產後少腹痛按之即止者屬血虛

忌行血 破氣 汗 吐 下 燥 苦寒

大熱

諸藥俱見前

宜補血 補脾 和肝

乾地黄 白芍藥 當歸 續斷

白膠 阿膠 牛膝 人參

酸棗仁 麥門冬 炙甘草 大棗

薯蕷 橘皮

產後泄瀉

忌消導 滑腸 膩膈 發散 生冷 破

氣 苦寒

諸藥俱見前

宜溫中補氣 健脾開胃

人參 甘草 薯蕷 蓮肉

菡豆 茯苓 白芍藥 橘皮

車前子 肉豆蔻 內熱津液不足者少用

藿香 五味子 補骨脂 內熱火熾者勿用

縮砂蜜

產後發熱或自汗盜汗

忌苦寒 發散 升提 破氣 破血 下

辛燥 大熱 寒滑傷脾

諸藥俱見前

宜補血 涼血 補肝 補心 生津液

兼斂攝實表

乾地黄 炙甘草 白芍藥 五味子

麥門冬 酸棗仁 牡丹皮 童便

青蒿 鼈甲 澤蘭 黑豆

黃耆

人參 肺熱者 禁服用

產後頭痛由於血虛

忌發散 破血 升提 辛燥 大熱

諸藥俱見前

宜益血 涼血 降 甘溫 甘寒 佐以

酸寒

生地黄 甘菊花 烏梅 麥門冬

蘇子 童便 甘草 當歸

白芍藥 黑豆 五味子 鼈甲

產後發渴由於血虛有熱

忌同產後發熱

宜同產後發熱加蔗漿倍麥門冬五味子

產後氣喘由於氣血兩虛

忌同產後發熱

宜補氣血 潤肺 下降

人參

橘紅

生地黃

天門冬

麥門冬

蘇子

枇杷葉

栝樓仁

栝樓根

童便

五味子

竹茹

產後惡寒由於氣血兩虛

忌同產後發熱

宜補氣血 溫中 甘溫 佐以辛溫

人參

黃耆

炙甘草

乾地黃

龍眼肉

當歸

炮乾薑

產後小便不利或短赤由於腎水真陰不足

忌利小便 餘忌同產後發熱

諸藥俱見前

宜生津液 益陰 補血 涼血 清熱

甘溫 甘寒 酸寒

天門冬 麥門冬 生地黃 枸杞子

山茱萸 白芍藥 車前子 牛膝

五味子 青蒿子 鼈甲 竹葉

產後大便閉結由於血枯內熱

忌補氣 行血 辛熱 燥 下 升 苦

寒

諸藥俱見前

宜益血 涼血 潤燥 滋肝腎 生津液

生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬

五味子 蔗漿 牡丹皮 肉蓯蓉

當歸 麻仁 人乳 蜜

產後不得眠

忌同產後大便閉結

宜補心 降心火 補肝 補脾陰 兼清

內熱

生地黃 麥門冬 茯神 丹參

沙參 酸棗仁 白芍藥 竹葉

遠志 蓮肉 龍眼肉

產後腹脹由於陰血虛脾陰虛

忌破氣寬中 升提發散 消導 吐下

甘 苦寒 鹹寒 大熱 溫燥 滯膩

諸藥俱見前

宜益脾陰 補脾 和肝 酸寒 收斂

甘溫

白芍藥 酸棗仁 人參 茯苓

石斛 橘皮 薯蕷 五味子

木瓜 蓮實 車前子 芡實

產後惡心欲嘔或吐由於胃虛

忌升提發散 溼潤 滯膩 苦寒 生冷

燥熱

諸藥俱見前

宜降氣

補氣

安胃

酸寒

佐以辛溫

蘇子

枇杷葉

竹茹

人參

橘紅

麥門冬

白芍藥

藿香

石斛

木瓜

白豆蔻

生薑

由於寒倍生薑白豆蔻藿香由於熱倍竹茹去生薑白豆蔻藿香

下乳汁

漏蘆

狗四足

猪四足

麥門冬

人參

栝樓仁

土瓜根

葵子

猪胰

木通

○小兒門

痘瘡

○血熱證

忌溫補

燥熱

本草經疏卷二

綠君亭

天靈蓋

雞冠血

桑蠹

鮫鯉甲

人齒

官桂

附子

丁香

木香

冰片

巴上燥熱

餘忌藥俱見前

宜涼血

活血

解毒

甘寒

苦寒

犀角

生地黃

人中黃

紫草

黃連

麥門冬

牡丹皮

白芍藥

童溺

連翹

金銀花

玄參

貝母

蟬蛻

鼠黏子

○虛寒證

忌汗 吐 下

下

苦寒

酸寒

諸藥俱見前

宜辛甘發散

補氣

溫

瘡密者佐以解

毒

人參

紅鉛

黃耆

甘草

桂枝

丁香

當歸

胃弱大便不閉者禁用

蓮肉

糯米

大棗

龍眼肉

乾葛 木香 忍冬藤

痧癰此證多有嘔吐者勿治嘔吐但治痧毒則嘔自止况嘔中便有發散之義

忌破氣 溫補 酸斂 燥熱 辛溫 滯 膩

諸藥俱見前

宜清熱透肌 辛寒 甘寒 苦寒

石膏

鼠黏子

赤檉木 即西河柳

知母

甘草

玄參

麥門冬

連翹

薄荷

竹葉

黃連

黃芩

葛根

黃蘗

蟬蛻

栝樓根

青黛

蔗漿

貝母

如冬月佐之以辛散

荊芥

麻黃

去節沫蜜酒炒只可用一劑

痧癰者手太陰肺足陽明胃二經之火熱發而為病者也小兒居多大人亦時有之殆時氣瘟

疫之類歟其證類多欬嗽多嚏眼中如淚多泄瀉多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏是其候也治法當以清涼發散爲主藥用辛寒甘寒苦寒以升發之惟忌酸收最宜辛散誤施溫補禍不旋踵辛散如荊芥西河柳乾葛石膏鼠黏子麻黃清涼如玄參竹葉栝樓根青黛薄荷甘寒如麥門冬生甘草蔗漿苦寒如黃芩黃連黃檗貝母連翹隨證輕重制劑大小中

病則已母太過焉

痧癘乃肺胃邪熱所致初發時必欬嗽宜清熱透毒不得止嗽癘後欬嗽但用貝母苦梗甘草薄荷栝樓根玄參麥門冬以清餘熱消痰壅則自愈慎勿用五味子等收斂之劑多喘喘者邪熱壅於肺故也慎勿用定喘藥惟應大劑竹葉石膏湯加西河柳兩許玄參薄荷各二錢如冬天寒甚痧毒鬱於內不得透出者加蜜酒炒麻

黃一劑立止凡熱勢盛者卽用白虎湯加西河柳忌用升麻服之必喘多泄瀉慎勿止瀉惟用黃連乾葛升麻甘草則瀉自止癰家不忌瀉瀉則陽明之邪熱得解是亦表裏分消之義也癰後泄瀉及便膿血皆由熱邪內陷故也大忌止瀉惟宜升散仍用升麻甘草乾葛黃連白芍藥白蘊豆便膿血則加滑石末必自愈

癰後牙疳最危外用牡黃牛糞尖煨存性研極細加真片腦一分研勻吹之內用連翹乾葛荆芥穗升麻玄參黃連甘草生地黃水煎加生犀角汁二三十匙調服緩則不可救藥

痧後元氣不復脾胃薄弱者宜用白芍藥炙甘草爲君蓮肉山藥白蘊豆麥門冬青黛龍眼肉爲臣多服必漸強慎勿輕用參朮

痧後生瘡不已餘熱未盡故也宜用金銀花荆芥穗連翹玄參甘草懷生地鼈虱胡麻黃連木

通濃煎飲之良痧癘不宜依證施治惟當治本
本者手太陰足陽明二經之邪熱也解其邪熱
則諸證自退矣
嘔吐因傷乳食者

忌升 苦寒

諸藥俱見前

宜溫中 消導

橘皮

縮砂蜜

枳實

厚朴

穀麥蘗

草果

山查

紅麴

半夏

人參

○因寒者

忌破氣

升

苦寒

諸藥俱見前

宜辛熱

溫中

藿香

橘皮

丁香

人參

白朮

生薑

半夏

白豆蔻

本草經疏卷二

綠君亭

○因暑者

忌升 破氣 溫熱

諸藥俱見前

宜清暑 補氣 安胃 兼利小便

黃連 香薷 人參 木瓜

茯苓 竹茹 石斛 橘皮

甘草 白藕豆 麥門冬 白梅

滑石 木通 澤瀉

○有蟲者

忌升 甘

諸藥俱見前

宜酸斂 佐以苦寒

白芍藥 五味子 木瓜 黃連

棟根 烏梅 檳榔 梔子肉

木香 使君子 總之數嘔吐宜安胃

久則宜補氣

泄瀉

總忌破氣 下 滑利 滯膩

諸藥俱見前

○因食者

宜和胃消食

橘皮 草果 紅麴 穀麥蘖

白豆蔻 白朮 山查 白茯苓

肉豆蔻 縮砂蜜

○因溼者

宜燥脾 利水

二朮 橘皮 木瓜 茯苓

澤瀉 車前子 石斛 黃連

薯蕷 猪苓 升麻 葛根

○因暑者

前藥中加人參 蓮肉 白蘊豆

總之當補脾胃兼升兼利小便

急驚

忌補斂 升 燥熱

諸藥俱見前

宜降 清熱 鎮墜 豁痰 和肝

丹砂 琥珀 牛黃 天竺黃

貝母 竹瀝 釣藤鈎 殭蠶

犀角 金箔 膽星

真珠 全蝎 龍腦 麝香

白檀香

慢驚多因久吐瀉大病後陰陽兩虛而成

忌破氣 下 升 苦寒 及治急驚藥

諸藥俱見前

宜補脾健胃 和肝益氣 甘溫 酸平

佐以辛熱

人參 黃耆 茯苓 白芍藥

甘草 龍眼肉 酸棗仁 石菖蒲

遠志 麥門冬 茯苓 冬瓜仁

橘紅

疝積

忌破氣 酸飲 燥熱

諸藥俱見前

宜除疝熱 兼消導 苦寒 甘寒 佐以

辛寒 辛溫

胡黃連 川黃連 肉豆蔻 穀麥蘖

神麩 山查 木香 橘皮

白蕪荑 使君子 蘆會 白朮

白芙蓉花 五穀蟲 雷丸

青黛 厚朴

諸蟲

忌升 甘

諸藥俱見前

宜殺蟲 酸寒 苦寒 佐以辛寒

檳榔

雷丸

使君子

苦楝根

錫灰

鶴虱

盧會

芍藥

烏梅

黃連

黃芩

牽牛

胎毒

忌補斂

燥熱

辛溫

諸藥俱見前

宜涼血清熱

解毒

兼發散於外

勿從

外治以致熱毒內攻

生地黃

玄參

牡丹皮

黃蘗

黃連

忍冬藤

甘草

連翹

麥門冬

貝母

犀角

荆芥

鼠黏子

牛黃

○外科

癘風

忌破氣

酸斂

燥熱

下

諸藥俱見前

宜涼血 殺蟲 祛風 苦寒 佐以辛寒

辛平

豨薟 天門冬 甘菊花 生地黄

青黛 漆葉 苦參 何首烏

鼈虱胡麻仁 白芷 荆芥

天麻 續斷 羌獨活 半枝蓮

白花蛇 烏梢蛇 皂角刺

癰疽先後發渴

忌升 破氣 辛溫 燥熱 吐 下

諸藥俱見前

宜活血 涼血 解毒散結

生地黄 連翹 忍冬藤 白芷

白及 白欬 茜草 紫花地丁

夏枯草 甘菊花 地榆 貝母

鼠黏子 黃檗 栝樓根 乳香

沒藥 芍藥 生棗豆 半枝蓮

白藥子 紅藥子 黃蠟 明礬

已潰者加人參黃耆麥門冬五味子

腫瘍

忌宜俱同癰疽先後發渴更忌當歸

癰疽毒氣攻心發譫語

宜以生菜豆粉丹砂乳香為丸服之

潰瘍

忌閉氣 苦寒 破氣 又忌燥

諸藥俱見前

宜補氣血 甘 酸溫 佐以解毒

人參 紅鉛 胎骨 黃耆

當歸 地黃 芍藥 甘草

白及 白欽 忍冬藤 甘菊花

貝母 薯蕷 大棗 五味子

麥門冬

○散毒 外傳

雄黃

雌黃

粉錫

礬石

龍腦香

松脂

地榆

水銀粉

鐵鏽

白及

白歛

漏蘆

槩木

青箱子

棟實

簡茹

石灰

鐵漿

苦參

菖蒲

槲皮

葵根

柳華

五加皮

梓葉

苧根

紫草

馬鞭草

艾灸

○止痛排膿

外傳

白及

白歛

天黃

乳香

沒藥

丹砂

紅藥子

龍腦

金華

白藥子

麥飯石

米醋

蜜

○去瘀肉

外傳

巴豆膏

輕粉

粉霜

烏梅肉灰

○蝕膿

外傳

蛙竹屑 藺茹

雄黃

白芷

大黃 巴豆

地榆

枯礬

○長肉收口 外傳

仙人杖 燒油 人參

金華

白蠟

黃蠟 血竭

蛙竹屑

枯礬末

黃芩末 珠末

象牙末

鉛丹

紅粉霜 胡粉

芝蔴油

猪蹄湯

疥癩

忌補斂 溫熱

諸藥俱見前

宜涼血活血 解毒 祛風 汗 下

生甘草 辟虺雷 茜草 生地黃

貝母 紫花地丁 蒼耳草 白藥子

大黃 金銀花 礬石 內上 連翹

夏枯草 鼠黏子 礬石 內上 半枝蓮

牛黃 蟾酥 紅藥子 白及

白欵已上內外龍腦

鐵鏞

桑礪

銅青

雄黃已上外

瘰癧

馬刀附

同屬少陽膽經治法亦同

忌補氣

辛熱

酸欵

諸藥俱見前

宜清熱散結

和肝涼膽

苦寒

甘寒

鹹寒 佐以辛寒

連翹

玄參

忍冬藤

紫背天葵

乳香

麝香

夏枯草

鼠黏子

貝母

天明精

沒藥

薄荷

肥皂莢

皂角子

何首烏

柴胡

黃芩

甘草

昆布

牡蠣

鼈甲

栝樓根

惡實

漏蘆

守宮煨

貓頭

天荷葉

映山紅

海藻

海蛤

蘇合油

雄黃

礬石

斑貓

蟾酥

鼈虱胡麻

回燕窩泥

瘦瘤

忌宜俱同瘰癧兼宜

辟荔

半夏

文蛤

南星

通草

生薑

痔

有內外
二證

忌破氣

降

燥熱

辛溫

諸藥俱見前

宜涼血

活血

除大腸熱

兼升

去血

過多者宜補血

甘寒

苦寒

酸寒

佐

以辛寒

生地黃

五倍子

黃連

黃芩

白芍藥

地榆

蟬皮

大小薊

黃蘗

側柏葉

槐實

皂莢灰

熊膽

升麻

鼈甲

紅藍花

龍腦香

茜草

黃耆

赤石脂

猪懸蹄

蛇蛻

樞實

白礬

金銀花 青黛 象牙末 蛙竹屑

牛角鯁 白蠟

通腸漏

忌破氣 下 發散 溫燥 辛熱

諸藥俱見前

宜涼血 清利溼熱 解毒 消漏管 補

氣血 長肉

槐實 黃連 黃芩 青黛

地榆 白及 忍冬藤 半枝蓮

生地黃 已上涼血解毒 猪懸蹄 黃牛角鯁

刺蝟皮 蛙竹屑 明礬 金頭蜈蚣

已上消漏管 黃耆 熟地黃 當歸

人參 白芍藥 五味子 牛膝

山藥 枯礬 黃蠟 白蠟

麻皮灰 鉛華 月經布 沒食子

已上補氣血長肉 天明精 地骨皮 俱要鮮者

皮硝 文蛤已上煎濃湯熏洗

乳巖乳癰內外吹

忌補氣 升 溫補 辛熱 燥 酸斂

諸藥俱見前

宜散結氣 和肝 涼血活血 清熱解毒

貝母 橘葉 連翹 栝樓根

山慈菇 山豆根 蒲公英 紫花地丁

黃連 甘草 柴胡 白芷

青皮 橘皮 牡鼠糞 王不留行

乳香 沒藥 漏蘆 夏枯草

忍冬藤 栝樓仁 頭垢 人爪

鮫鯉甲 半枝蓮 茜根

陰蝕 即下部 蝨瘡

忌同乳巖

宜涼血活血 除熱散毒 苦寒 辛寒

青黛 茜草 苦參 鮮地骨皮

黃蘗

小薊

艾葉

馬鞭草

木瓜

牛膝

木通

全蝎外

蛇床子外

橄欖核外

蛙竹屑外

猪脊髓外

青箱子外

膩粉外

官粉外

杏仁外

珠末外

皂角末外

鉛丹外

象牙末外

龍腦香外

白殭蠶外

粉霜外

煙膏外

天靈蓋外

滴乳石外

白蠟外

金瘡

忌破氣

閉氣

升散

酸斂

苦寒

冷

利燥

酸寒

諸藥俱見前

宜止血

和血

涼血

甘溫

甘寒

佐

以辛溫

地黃

麤蟲

當歸

續斷

牛膝

甘草

麥門冬

地榆

半夏

茜草

白膠

杜仲

芎藭

乳香

沒藥

艾葉

水楊花

釣樟根

黃荆子

炒黑

王不留行

古錢

自然銅

狗頭骨

黃麻皮灰

蘆竹籜

韭

大小薊

內

劉寄奴

外

花蓋石

外

騏驎竭

外

古石灰

外

白蠟

外

降香

外

海螵蛸

外

桑柴灰

外

人骨灰

外

紫檀末

外

三七

外

破傷風

忌同金瘡

宜同金瘡佐以祛風藥如白芷荆芥防風柴

胡之屬

跌撲傷損

忌同金瘡

宜同金瘡有瘀血停滯者宜加行血藥如桃

仁紅花蘇木自然銅麝蟲千年灰古文錢之

屬

踉折挫閃

忌宜俱同金瘡跌撲

火灼

忌燥熱 及寒物塗罨

井泥

水

凉水

芭蕉根

醋已上寒物塗罨餘忌藥俱見前

宜拔散火毒

辛散

潤

甘寒

辛寒

苦寒

柴胡

葛根

甘草

升麻

黃連

麥門冬

連翹

栝樓根

石膏

黃檗

雞子油

柏白皮

生胡麻

食鹽

豆醬

黃芩

地榆

山梔

外用好酒滿浸傷處溫即易之如遍體破傷用酒滿浸時時易之即不死一方用蜜水潤之一方石灰水和生芝麻油敷治已

天甚者神驗一方用黏米炒黑爲末將菜汁調敷神效

漆瘡

宜蟹

茱萸皮

雞子白

杉材

石蟹

漆姑草

葑菜

炒熱

井中苔萍

神農本草經疏卷之二



