

泰西熱病論

二



和書門類			
二七〇六七	函	架	冊
七五	函	架	冊

內閣文庫		
二七〇六七	冊	和書
九五	函	架
一五	架	冊

內閣文庫		
番號	和	27067
冊數	6 (2)	
函號	195	302





泰西熱病論卷二



泰西

王函夫古撒謨

著

加賀醫官

吉田成徳直心

譯

蕪山侍醫

足立世茂松父

門人

沼津侍醫

程田國道玄悦

校

長府侍醫

松岡士藏道遠

固形質篇第三

固形質トハ人身中ノ實形結成シテ捉摸スベク身體ノ
幹立共ニ倚頼スベキ諸物ヲ云フ凡ソ身體ノ強弱固形


等是レナリ皆身命ニ混和ノ充盈結成ノ勢ヲ為スニ足
ヲ養護スル液ナリニ混和ノ充盈結成ノ勢ヲ為スニ足
ラナル者ナリ

○總テ纖維諸管共ニ充張勢力ノ性甚夕壯ナル者ハ其
裡ニ容ル、處ノ血液ニ大過ノ運動ヲ増加ノ強ク推蕩
摩擦ヲ為シ此レニ因テ壯熱ヲ生シ其勢ヲ以テ間斷ナ
ク精微水樣ノ稀液ヲ費耗消散ス因テ血球夥多累積シ
稠厚ヲ成シ其究リ遂ニ充填壓迫シ諸液盡ク粘凝スル
ニ至ル常人ト雖モ強ク勞力ヲ事トスル産業ノ者ハ其
血液皆此ノ如キ弊ヲ致ス是レ其証ナリ

○此ノ如キ人身自然ノ究理法ヲ以テ辨識分定スルニ

上件ノ如キ稟受ノ者ハ必ス譬留熱ヲ發シ遂ニ身體ノ
營養ヲ失ヒ全ク銷鑠ニ歸スル者ナリ又熾盛熱ノ諸病
ヲ患ヘ速ニ退キ難キ者ハ皆此弊アルガ故ナリ是以テ
其固形質ノ強拘血液優多稠厚ノ者ハ纖維軟弱血液稀
淡乏弱ノ者ヨリハ却テ危篤ノ症ニ至ル者ナリ此體質
ノ者ハ一失一得アリ是ヲ譬フルニ芳香ノ玫瑰ニ刺棘
アルカ如シ其刺棘ノ失ハ從來勢力強ク壯健ノ極ヨリ
出ル者ナリ

○此等ノ稟質ノ人ハ和緩柔軟ノ効アル粉麵ノ物品大
イニ良ナリ又敷温浴法成德云ク附
録ニ載スヲ施シテ佳ナリ也



モ寒冽乾燥ノ時ニ施スヲ佳トス
 ○此質ノ者多クハ熱病兼焮衝熱ノ患ニ嬰ル即チ肺焮
 衝熱腸焮衝熱等ノ類ノ如シ此症ニハ緩和融解スル水
 様ノ潤灌劑ヲ微々繼續シテ用フベシ此劑ノ温氣ニ因
 テ患處及ヒ肺藏中ノ諸管弛緩シ因テ血液ノ運行快利
 シ次テ痰唾夥シク快泄スル者ハ是レ血液ノ最モ稀解
 洩流スル微ナリ又手足上腰胸肋ノ部分ニ緩和稀解ス
 ル蒸溺劑寒温中ヲ得テ用フヲ施スベシ一大奇効アリ此術古今
 通用ノ一良法ナリ時師或ハ纖維強拘ノ人ニ冷水浴法
 ヲ施ス者アリ是レ甚々錯誤ニ屬ス此法ヲ冒セハ纖維

愈強拘ヲ成シ牽縮ノ勢増多スレハナリ凡ソ冷水浴法
 ハ纖維弛緩ノ者ニ用ヒテ強拘充張セシメンカ為ナリ
 ○往年一貴客體質瘦薄然レ凡神志活潑日常能ク動作
 シ逸居セス此人寒冷ノ日ト雖モ動モスレハ海水ニ浴
 ス是レニ因テ漸ク肌肉脱削シ神思乏弱沉重ス予案ス
 ルニ是レ其浴水ニ因テ纖維強拘ヲナシ精微竄透ノ稀
 液及ヒ靈液等蒸氣孔ヨリ漏洩シ耗散スルニ因テ然リ
 其故ハ患者飲食過不及ナク却テ二便秘溢スレハナリ
 此時ニ當テ緩和營養ノ食物ヲ與ヘ浴水ヲ禁ス後チ將
 愈ノ期ニ及ニテ又浴水ヲ為サシム爾來精神欣暢シ肌

肉再生シテ快復ス

○纖維ノ緩弱ヲ強實ニスルニハ浴水ヨリ善ナルハナシ故ニ虚脆緩弱ノ佻儂ノ小兒ハ此法ヲ用ヒテ速ニ快復シ健強ニ至ルナリ

○邏媽都中ニ一寺アリ奸婦ノ法徒相黨メ愚者ヲ欺ク其事ハ飛泉ヲ以テ人ノ疾病ヲ除ク其奇効アルヲ以テ神授ト稱シ衆モ亦信受ス然レモ浴水ノ効アルハ皆前説ノ如キ者ニシテ敢テ神意ノ關ル所ニ非ス

○古昔私多利古都謨及ヒ刺古修護能ク醫學ノ原理ヲ建定ス時師皆崇信尊奉ス然レモ其説紛雜適從シ難キ

ト多シ後子普兒華黒出テ、許多ノ究理ニ因テ纖維ノ強弱ト緩弱トニ就テ病因ヲ辨識ス是レ醫學療法ノ要鍵ニノ後進ノ者皆此標準ニ倚ラサルハナシ

○強弱纖維ノ外ニ一種ノ纖維アリ是レハ固形諸部ノ質甚タ感觸シ易キ者ナリ凡ソ喜樂悲憂ノ事皆速ニ感動スルト最モ甚シ殊ニ纖維ノ質モ薄弱ナル者ハ僅ノ疾患ニモ毀傷スルヲアリ

○身體嬌嫩其色純白形質脆柔ノ者ハ其人極ノテ賢慧敏疾ニノ殊ニ聰明ナル者ナリ然レモ肌肉軟弱ナルカ故ニ肺血或ハ其他失血ヲ生シ易ク且ソ肺傷勞瘵ヲ發

素問經義疏 卷三 補虛養榮

シ易キ者ナリ故ニ此等ノ稟受ヲ勞瘵負ノ人ト名付ルナリ

○以上固形質ノ強拘緊張ノ害ヲ論ス以下ハ其柔緩弛弱ノ害ヲ論ス

○今夫レ纖維諸管ノ軟弱ナル者ハ其裡ニ包容スル血液ヲ適宜ニ運管スルニ足ラス又人身營養ノ根基タル

乳糜ノ成徳云ク腸ヨリ乳糜諸道ヲ歴テ成ル處ノ純白精粹

ノ血ニ混シ心ノ肺ヲ經テ動脈ニ流注ス其間ニ漸ク化シ

テ血トナル凡ソ血ノ性質ヲ致シ諸液ヲ分利スルハ皆

合融スル各ノ其功用ヲ為スニ因ル故ニ藥ヲ服シテ効

驗アルモ亦其性味乳糜ニ和シテ血ニ混シ動脈ニノ性


ヲ精微揮發ニ變スルニ足ラス又血液中ノ慄悍銳尖ノ鹽氣ヲ分利スルノ常度ノ如クナルノ能ハズ又自ラ圓形ヲ成シテ全ク結成セル血液ニ化熟スルノ能ハズ是ニ加フルニ飲食ヲ消化スル諸器モ亦全善ノ乳糜ヲ製造スルノナシ蓋シ諸管纖維常度ノ如ク健強ナレバ胃中ニ賦在スル所ノ胃液成徳云胃ノ裏面ノ膜ヨリ常ニ津唾ノ如キ稀液ヲ滲出ス是レヲ胃液ト云フ此液飲食ニ混和シ能ク釀熟ス等ニ力ヲ

加ヘテ能ク健運ス然ル時ハ食後沙時間ニ食物ヲ糜爛

消化ス故ニ血中ニ未熟ノ乳糜不良ノ汚液ヲ生スルノ

ナシ虚弱粘液病質ノ人ハ此機ニ反ス然ル者ハ時月ヲ

ナシ



費シ血球及ヒ鹹渣ヲ良性ニ復治スルニ在リ

○又纖維軟弱ノ人ハ血ヲメ充分ニ揮發有力ノ性ヲ成
 シ充張進輸シテ活潑ノ温暖氣ヲ保持シ常度ノ如ク運
 行スルヲ能ハズ又鹽氣硫氣油氣等ヲ稀解メ中和ノ度
 ニ混和シテ生活ノ自然ニ使用スルヲ能ハズ今夫レ血
 球ハ生活温暖ノ淵源ナリ然ルニ血液常度ノ如ク包充
 スルヲ能ハズ且ツ圓形全成スルヲ無キ時ハ其血自ラ
 纖維諸管ニ充填シ鹹渣及ヒ水液皆粘膠ヲ為シ元運ノ
 靈液衰微シテ諸般ノ分利ヲ為ス所ノ機關衰頹シ遂ニ
 顔面ヨリ全軀ニ彌テ色澤ヲ亡シ翁傑達安篤竭意度ハダラキ徳成

云其病因症候治方共ニ内科選粘液病水腫等ノ諸症ヲ
 要其他諸書ニ出ス併考フヘシ
 發ス或ハ發作次序ナキ間歇熱或ハ替留熱或ハ遷延神
 經熱等ヲ發ス是皆血液腐敗ヲ為シ適宜ナル運行ノ常
 度ヲ失シ其血液ハ細絡末梢ニ凝滯留結スルニ因テ暫
 モ間斷ナク閉塞シテ休ズ又脈管轉輸ノ勢力衰エテ諸
 液快流スルヲ能ハサルニ因ル

○諸液凝滯ノ弊ハ體中ニ在テ輒ク腐敗シ且ツ酷厲ノ
 性ヲ成シ動モスレバ險惡ノ熱病ヲ發ス凡ソ血及ヒ諸
 液共ニ流瀉運行ノ微弱ナルハ皆脈管進輸ノ勢ノ衰弱
 ニ因ル其血液ノ酷厲ヲ以テ頻頻ニ刺動攻衝スレバ壯

熱ヲ羨ス處女病積成德業スルニ處女病ハ漢醫ノ所謂五
科書ニ詳ナリ内ヨリ轉スル熱病ハ海ニ惡性危險ナル
ヲ以テ證スベシ又足部腫起シテ殆ト水腫ノ如ク其始
メ寒冷ナリト雖厄後千羅思注成德云羅思ハ第一篇ニ或
ハ熱燥疽成德云燥疽ハ原多嘔吐熱燥疽知修兒吸ハ云フ寒熱ニ症有
ニ比スルニ其害稍輕ク又燠衝熱ニ絞スレバ重シニ症
ノ中間ニ在リ其症候先ツ柔軟ノ部分腐敗蝕蝕シ劇シ
キ燠熱ヲ羨シト又云其因ヲ論スレハ病毒ノ層脈絡神經等
ニ生シ易シト又云其因ヲ論スレハ病毒ノ層脈絡神經等
ヲ神氣共ニ循流スルヲ強テ開達セシ然レバ自然良知能ノ妙用
ヲ以テ死敗焦燥スルヲ故ニ其用ヲ經スルニ能ハズ因
テ近傍ノ諸部ヲ擦亂シ靈液衝突ノ勢劇シク煖腫ヲ羨
メ烙ガナリ猶細論スル外トキハ必ス寒冷ヲ覺工内水氣
熱スルナリ

多ク充溢スルニ因リ一ハ管養ノ一ハ諸般ノ毒アハ外部
燠熱スル極ノ因リ一ハ管養ノ一ハ諸般ノ毒アハ外部
獸等ノ咬螫ニ因リ一ハ管養ノ一ハ諸般ノ毒アハ外部
ヲ成ル者ナリ又云冬時凛烈凍互ノ候ニ當テ氷雪
ヲ成ル者ナリ又云冬時凛烈凍互ノ候ニ當テ氷雪
是レ初熱燠疽ナリ其手足等ノ敗壞ニ至ル者ハ先
ツ初熱燠疽ナリ其手足等ノ敗壞ニ至ル者ハ先
此病ノ候ニ至ル者ハ先ツ初熱燠疽ナリ其手足等ノ敗壞ニ至ル者ハ先
張スルトキハ汗孔塞シ蒸氣鬱結ニ至ル者ハ先ツ初熱燠疽ナリ其手足等ノ敗壞ニ至ル者ハ先
ス然ルトキハ汗孔塞シ蒸氣鬱結ニ至ル者ハ先ツ初熱燠疽ナリ其手足等ノ敗壞ニ至ル者ハ先
ト雖モ經旧ニ其勢疲斃シ營養ノ温煖氣消燼ノ遂ニ熱
燠疽ト為ルト又云病ハ專ラ血液神氣ノ缺ク盡ル
ニ因ル物ノ人身ニ在テ相保ツテ殆ト猶此他其因症ヲ
加シ膏油無ケレバ燈火從テ減スト猶此他其因症ヲ
其說クテ取テ暇アスルナリ僅ニノ類ニ變ス是亦同一徵
ナリ


泰西熱病論 卷二 蘭馨堂藏

○固形質ノ鑿法ハ醫家ノ家ニ要事ニノ持リ遷延持久ノ疾病ノミナラズ酷厲諸病モ亦是レニ因テ懸斷ス其故ハ固形質ハ流動質ノ根基ナレバナリ是以テ體質強實纖維強硬ニノ常ニ動作ニ習ヒ血液優多ナル者ハ血液必ズ粘稠ニ傾キ或ハ焮衝熱ヲ發シ又其他ノ熱性ノ諸病ヲ發シ易シ此質ノ者ハ速ニ刺絡ヲ施シ其滂溢ヲ防制シテ可ナリ又體質虛弱脆軟ニシテ血液モ亦稀淡乏少且ツ水氣多キ者ハ慎テ刺絡及ヒ驅泄劑成德案ス并ニ汗唾吐等ヲ強クヲ用フルト勿レ催進スル劑ヲ云フ

○固形質ヲ詳明ニスルトハ刺絡ノ可否ヲ分別スル一

大緊要ナリ殊ニ酷厲熱ノ初發ノ時并ニ痘瘡及ヒ其他ノ熱病ニ發瘡有ル者等ニ最有用ナリ

○譬へハ一男子アリ稟賦強實脈亦實洪此人若シ痘瘡ニ嬰リ諸症劇發スルトアラニニ痘發見ノ前ニ當テ速ニ刺絡スベシ若シ刺瀉セザレバ其熱轉險惡ニ進ムヲ待ヨリ他ナケレバナリ又虛弱ノ者ハ急迫ノ諸症ニ非ルヨリハ刺絡スルヲ錯誤トス又平常ニ刺絡或ハ嘔吐ニ慣レタルモノハ痘瘡ヲ患ヘンニ見點ノ時ニ臨ンテ速ニ刺絡スベシ精氣ノ衰弱ヲ恐レテ此術ヲ闕クトキハ焮衝熱ヲ發シ死ニ至ラシム是等ノ失アルトハ病毒




ト症候トヲ分明ニ辨識セサル弊ニ因ル
 ○凡テ患者ヲ鑒察スルニ能ク其稟賦ヲ辨識スル時ハ
 其症ヲ區別スルヲ甚々難カラズ大抵身體壯熱シ皮膚
 乾燥面目赤色煩渴引飲氣息熱シ大劇痛脈浮數疾實其
 他強實ノ諸徴ヲ備ヘ纖維ノ充張勢力強盛ナルハ是レ
 熾盛熱兼燥衝熱ノ候ニメ其人元來強實ノ質ナリ又脈
 軟弱大熱及ヒ赤色ナク渴少ク小便黯淡皮膚潤澤肌肉
 柔軟惡寒スルヲ發作時ナク遷延メ休マズ汗多ク懈惰
 困重煩悶甚シク疼痛寡ク舌上苔アリト雖モ潤滑ニシ
 テ清白色是皆虛弱質ノ徴ナリ然レモ今醫タル者逐一

ニ先哲ノ教示ノミニ拘泥センヨリハ親ク自ラ試驗シ
 テ詳明センニハ若カズ故ニ證據ヲ煩引セ又醫家偏ニ
 苦心焦志シ自餘ノ事實ヲ辨明センヲ冀望ス

流動質篇第四

此篇血質ヲ鑒察スルヲ論ス前編ニ説ク如ク血液
 ハ專ラ固形質ニ管統スル者ナリ

○第一ノ血質ハ甚々粘稠ニメ細血球過多累積シテ充
 填ス其中ニ含蓄スル處ノ鹹渣モ亦同ク粘凝ヲ成スナ
 リ緊メ云ヘバ血液粘稠ニメ增多シ固形中ニ充填盈満
 スルナリ



○體質強壯纖維強拘緊張平生動作シテ善ク食スル者ハ常ニ上件ノ血質ヲ成ス

○細血球増益充填シ諸脈管モ亦甚々強拘且ツ充張ノ勢力實盛ナル時ハ血液ノ進輸スルノ大過急疾ニメ壯熱ヲ生ズ以上兩件ノ因ニ由テ血中ノ稀潤液費耗シ粘稠ノ弊轉増進ス是以テ殘餘ノ血液殊ニ稠厚膠着シ細動脈ノ未稍毫管ノ纖維ニ通達スル順宜ヲ失ヒ閉塞凝滯メ焮衝熱ヲ生ズ其熱至テ熾盛ナル時ハ鹹渣亦凝固ス其熱度尋常ノ稽留熱ノ度ヨリ過クル者ハ血中ノ鹹渣變メ恰ニ膏ノ如シ是レヲ徵スルニ熾盛熱兼焮衝熱

ノ患者ヲ刺絡スルニ其瀉シタル所ノ血ハ甚々粘稠ニシテ必ス薄膜ヲ被フ又腸焮衝熱ノ人ヲ瀉血セシニ其瀉スル所ノ血中ニ鹹渣一按钮ノ如クニ凝結スル者ヲ見タリ是レ其熱ニ由テ然ルヲ明徵又試ニ熱病ノ初發ニ當テ刺絡スルニ其第一回ハ血稍稠厚ニシテ色鮮紅ナリ爾後施スルニ三四其熱指稽留メ解セズ漸ク増盛ノ極ニ至テハ其血甚稠厚粘膠尤モ厚キ膜皮ヲ被フ故ニ其熱愈熾盛ナリ殊ニ體質強實ノ者ハ刺ス處ノ血液極メテ粘稠ナル者ナリ

○熱病兼刺痛ノ症ハ腸焮衝熱及ヒ聖京健成德云前等

ノ類ナリ其劇痛ノ由ヲ檢スルニ血液ノ運行大イニ
 増益シ且ツ壯熱ヲ發シ從テ血中ノ鹹渣檢稠固スルガ
 故ナリ此機ノ微甚ニ從テ痛モ輕重アリ又其燄衝ノ病
 毒諸膜ノ纖維ナル細絡中ニ滯積壓迫シ非常ニ其部分
 ヲ引展牽張スル時ハ其處必ス燄衝疼痛ヲ生ス然レテ
 猶血中ノ病毒相次テ常ニ循行シ來テ止ス攻壓ヲ為ス
 トキハ其狀殆ト稟受強壯ニシテ血液稠厚ナル久一時
 大イニ動作勞カスレハ脈強實疾數ニメ頓ニ熱ヲ發シ
 猶増盛ノ極ニ至レバ遂ニ劇症ヲ發スルト同一機ナリ
 此時ニ當テ速ニ刺絡或ハ清涼劑潤灌劑和緩ノ飲煎ヲ

用ヒサレバ忽チ危險ノ症ヲ發メ死ニ至ルナリ

○平全ノ良血液ト雖モ體中ニ充填滿刺ナル時ハ亦善
 ク危篤ノ疾病ヲ生ス詳ニ候ト加刺得私ノ書ニ見ユ設
 兒修私モ亦其事ヲ説ケリ並ニ其書ニ就テ見ベシ今聊
 カ此ニ約言センニ凡ソ血液滿刺ナル時ハ動脈管牽張
 ス故ニ血液實滿シテ其究リ脈管ヲ破裂スルニ至ル猶
 且ツ鹹渣及ヒ水液ヲ輸ル細動脈ノ管口ヲ展開ス此因
 始メハ僅僅ニ起リ漸ク脈管口ニ壓入シ遂ニ頓路ヲ失
 フテ結滯閉塞ス爾後漸次ニ腦及ヒ肺ニ波及ス是以テ
 此症ハ刺絡ヨリ善ナルハナシ然レ過度ニ刺絡スル

勿レ唯其刺血ヲ減損シ脈管ト血液ト相適ノ常度ヲ得
 セシムルヲ要トス
 ○故ニ此ノ如キ人ハ飲食起居平常ニ異ナラズ疾病無
 キニ似タリト雖モ血ノ滿盈スルトハ既ニ病アルニ齊
 シ
 ○又稟賦柔脆虚弱ニメ性多血ナル者ハ飲食時有ツテ
 減シ時有ツテ陪ス是レ其徵ナリ毎時何レノ部カ失血
 ヲ患フルトアリ其失血ノ期必ス時ヲ以テスルトアリ
 テ婦人ノ月經適來スルト正ニ同シ然レモ婦人月經ノ
 常規ニ類セス皆虚脆ヨリ衰スル者ニメ是レヲ凶兆ト

ス

葛布パウ温ウ雄雞キウ畢ヒ九クヲ截セ
リ去ル者ナリヲ養フニ油膩膏粱ノ食ヲ以テ

肥腴ナラシムレバ鬪雞ニ用ヒテ甚夕剛勇ナリ是レ脂

肪ヲシテ異常ニ衆多ナラシムレバナリ然ルニ鬪抗ノ

後チ養養スルト一晝夜ナラ非レバ勢力頓ニ脱スルト

實ニ怪シムヘキカ如シ其理詳ニ堙テ兒ル貌フ藜イ安ア魯ル私シ洪フ

カ書中ニ論ス就テ見ルベシ成徳業スルニ其全文ヲ引

雞ノ多脂多血ナル者鬪フニ因テ熱ヲ生シ血液ノ運行ニ

大過急疾ヲ成シ血中ノ稀液耗散シテ其血液稠厚ヲ為

シ脈管ニ充填滯瘀ス其充填ヲ減セサレハ血液ノ運行ノ

強壯人多血ノ人ノ熱ヲ患ルモ此理ト同一ニ故ニ多


血ノ壯人多血ノ人ノ熱ヲ患ルモ此理ト同一ニ故ニ多

泰西熱病論 卷二 蘭馨堂藏

ナラニカ見ル 設兒修私モ亦云ク凡ノ血液優多ナルト
者猶考究セヨ
キハ必ス諸脈管ニ充填シ其部ヲ壓迫ス其理ハ血ノ滯
澁甚ク衆多ナレバ脈管ノ末梢ニ至テハ皆膠固シテ流
滯スル道ナシ故ニ逆行メ大管ニ還流シ遂ニ引テ心臟
ニ及フナリ


○第ニノ血質ハ前説ト相反シ其血固ヨリ球ヲ為ス
少ク且ツ脈管中ニ包容スルヲ鮮ナシ其含蓄スル處ノ
鹹渣モ稀淡ニメ水ノ如シ或ハ又粘膠ヲ成ス者アリ是
ノ如ク稀淡ニ少ニメ且ツ滲汁ノ如クナル血質ノ者ハ
常度ノ如ク血中ヨリ諸液ヲ分利泌別シ化成ヲ遂ル
ル

能ハズ又汚濁揮發ノ勢ヲ專ニスルヲ能ハズ是レニ加
フルニ膽液ノ勢力少ク元運ノ靈液乏弱缺衰メ人命ヲ
資給スルニ足ラズ津唾ハ清淡ニシテ粘滑ナリ其餘ノ
症候皆是等ノ類ナリ是以テ飲食諸液トモニ常度ノ如
ク消化熟成スルヲ能ハズ神氣乏弱ニメ常ニ寒冷ヲ苦
シミ且ツ皮膚淡白ニメ滑澤無ク常ニ惡液ヲ生シ又水
腫等ニ罹ルヲアリ聚メ言ヘバ是等ノ人ハ諸液ノ運行
遲緩ニメ終ニ適宜ノ運行ヲ缺損シ凝滯滿盈ノ質ニ傾
クナリ因テ各處ノ脈管閉塞シ血液モ亦各部ニ留積鬱
滯シ漸ク腐敗ヲ生シ終ニ酷厲ノ性トナリ次テ惡性危



險ノ熱病ト為ル是レ他ナシ脈管ノ充張勢カト血中ニ
 含蓄スル元運靈液ト大イニ減衰スルニ嬰ル凡テ粘膠
 ニシテ運行遲緩ナル血ハ能ク心室ニ成德業スルニハ
 二其形チ未開紅蓮ノ倒ニ懸ルカ如シ上頭ヲ豐頂ト云
 七下端ヲ尖尾ト云フ其内ハ空虚ニメ繼ニ中隔アリ故
 二分レテ兩室トナル是レ右ノ室ト云フ其體質ハ
 悉ク筋ヲ以テ織成マ血ノ出納ニ從ヒ常ニ動テ縮脹ス
 縮ム時ハ左室ノ血ハ動脈幹ニ射出シ右室ノ血ハ肺動
 脈ニ射出シ兩室空シ張ルトキハ靜脈幹ノ血ハ右室ニ
 射入シ肺靜脈ノ血ハ左室ニ射入シテ兩室盈ツ此ノ如
 ク互ニ盈虛出納シノ須臾モ休ムナク常ニ全身ニ環
 流ス猶解體諸 諸留スル者ナリ又腐敗ノ惡液ハ好ンテ
 書ニ詳ナリ 體中ノ最モ柔軟ニメ觸知シ易キ貴要ノ部分ヲ腐蝕損
 敗ス故ニ殊ニ腦髓ノ部ニ甚シ總テ生路ニ最モ貴要ナ

ル部分ハ諸液ノ運動最モ遲緩ニメ其諸脈管ノ質モ甚
 夕柔脆ナルヲ以テ或ハ血液ノ運行大過急疾ナル時ハ
 直ニ微細ノ纖維破裂ヌ其血液脈管外ニ溢出ス此溢出
 スル者ハ運行甚夕遲緩ニメ留滯鬱滯シ因テ腐敗シ終
 ニ侵蝕ノ性ヲ為シ漸漸ニ脈管ヲ穿破スルナリ
 ○以上兩件ノ血質其本源ヲ云ヘバ全ク固形質ニ關係
 ス其壯實優多ノ者ハ必ス脈管ノ充張勢カノ強實ナル
 ニ因リ其匱淡弱少ノ者ハ體質ノ軟弱脆薄ニ因ルコノ
 兩弊人身中ニ在テ何レカ過不及ノ大甚ヲ為ヒバ皆疾
 病ヲ生ズ是以テ日常此機筈ニ覃心シテ諸病ノ起發ス



ル條理ヲ研究スベキナリ

○譬へハ譬留熱兼嫩衝熱ノ症ハ纖維ノ充張勢力強實ニ過ギ因テ血液甚々稠厚粘膠ヲ成スヨリ發ス又遷延神經熱ハ脈管大イニ脆弱勢力不足ニ因テ血液匱乏淡稀ナルヨリ發ス諸般ノ疾病此ニ因ヨリシテ發スル者ナリ殊ニ傳染ノ諸疾ハ皆此兩件ニ關係セザルナシ是以テ諸般ノ疾病ヲ鑑斷シ處療ノ方法ヲ定ムルモ皆是レヲ準據トシテ研究考定スベキナリ

血液洋崩腐敗篇第五 成德素スルニ此篇論スル惡症ハ世ニ直中傷寒或壞症

ト稱シ不治ノ症トスル者ナリ

前篇兩種ノ血質ノ外ニ猶危險惡性ノ血質アリ前ノ二質ニ對メ是レヲ第三等ノ血質ト名付ク

○此血質ハ非常ニ洋解洩崩メ腐敗ニ傾ク者ナリ是レ

敗血病 成德云和蘭ニ是レヲ失勢兒儲ト云フ内科選要其他ノ諸書ニ因症治方アリ漢人ノ所謂青腿

分府ハ此類ナリ敗血病ノ名ハ予力新定ニ出ツ 質ノ人ニ係ル此症ハ從來病患

ノ明カニ識辨スベキナク多ハ唯疲倦勞憊困重等ヲ

發ス然テ其人ノ皮膚俄ニ輕紫色或ハ青色ト為リ全軀

ニ黑色或ハ青色ノ斑點ヲ發シ爾後卒爾トシテ大イニ

失血シ猶其他危險ノ惡症ヲ發ス故ニ患者モ自ラ何ノ

故ナルヲ解セズ或ハ他ノ一箇ノ疾病ニ罹ルカト疑



フ此症ハ小兒大人ヲ論セズ失血有ルハ預メ察知ス
 ベシ○婦人此ノ如キ黒色青色ノ斑點ヲ發シ其狀或ハ
 縦條ヲ成シ或ハ廣闊ニメ宛モ打撲傷ノ如クニメ外ニ
 失血ノ患無キ者ハ必ズ大イニ崩漏ヲ發ス○前説ノ症
 ニメ或ハ兩症ヲ兼子發スル者ハ僅ニ割傷スト雖モ必
 ス多ク滴血ス其狀連綿トシテ迸出セズ或ハ割傷ナシ
 ト雖モ齒衄或ハ便血尿血等ヲ發スルアリ

○此症ノ患者ヲ刺絡スルニ刺絡ヲ施ス者ハ血ノ失脱ヲ遏止セシカ為メナリ然レバ錯誤ニ屬ス其血凝結シテ塊ノ如ク平全ノ血
 ノ如ク稠血ト鹹渣ト分利セズ半ハ凝結シテ塊ヲ為シ

テ鬆散セズ其色大抵紫色或ハ黯黒色ナリ或ハ暫時鮮
 紅ナリト雖モ多クハ速ニ腐敗スルナリ

○患者發斑スル前ヨリメ口氣甚タ惡臭ヲ為シ小便モ
 亦腐穢ノ臭アリ此ノ如キ症ハ血液既ニ腐敗シ稍酷厲
 ノ性ヲ成シ終ニ尿管ヲ腐蝕スル顯徴ナリト知ベシ其
 故ハ此種ノ失血アル人嘗テ多血ノ徵候ナク脈亦強實
 ナラズ又疾數ナラズ熱微ク或ハ全ク熱ナク又平生劇
 シク身體ヲ勞動スルヲナキニ今尿管破綻スル者ハ是
 レ其腐敗ノ酷厲液ニ因テ穿破スル者ニシテ彼ノ血液
 ノ運行大過急疾ニ因テ發スル失血トハ異ナリ然レモ



體質脆弱ノ者ハ血ノ運行纔ニ衝激スレバ微細ノ尿管
 ヲ破綻スルヲアリ然ル時ハ時時肺血ヲ痰シ或ハ僅僅
 タル事件ニ因テ吐血ヲ痰スル等是ナリ然テ此症ノ失
 血ハ紫斑等ヲ痰スルヲナシ故ニ多血ノ候ナシト雖凡
 少シク刺絡スルヲ善トス此術ニ因テ軟弱ノ尿管中ニ
 大イニ血液充填シ衝激スルヲ減セシム然レバ失血自
 然ニ止ム

○以上ニ論スル失血ハ大抵血液酷厲ノ性ヲ成シ中和
 ノ性毀損敗類シ動脈ノ末梢ヲ腐蝕スルヨリ痰ス又考
 ルニ其血球甚タ膠固メ聚滯シ心及ヒ動脈等ノ勢力ヲ

以テ包括維持シテ輸送スルニ足ラサルヨリ致ス處ナ
 リ人身平生完全ノ血球齊整ニ運行スベキニ今缺損不
 整ノ血球泛濫妄行スルニ因テ常度ノ如ク固充セズ直
 線ノ運行ヲ缺ク者ナリ○試ニ上件ノ血球ヲ檢セント
 欲セバ先ツ顯微鏡ヲ以テ其人ノ透視シテ見ルベキ部
 分ヲ日輝ニ映シ細血球ノ動脈末梢ノ纖絡ニ流滴スル
 ヲ觀察スベシ其血液圓球ヲ成サズ悉ク細長ノ態ニ變
 フ是レ其最モ細微ノ小管スラ既ニ然リ況ヤ自餘ノ大
 管ニ緩滯留瀦スル血球ハ凝塊殊ニ大ナレバ尿道中ニ
 通利シ難ク遂ニ尿管ヲ損破スルニ至ル其勢先ツ細薄

ノ尿管ヲ破傷シ次テ脈外ニ溢出シ其血ハ自ラ滲透管
(滲透管ハ古ヘ云フ處ノ尿管ノ衣膜トリ○成徳云動脈ノ末梢ニ厚キ衣膜アリ其質ハ靜脈水脈脂肪脈及ヒ其
 他許多ノ尿管集結會組スル者ナリ其官能ハ一ハ營養ノ液ヲ分利シ一ハ有用ノ廢液ヲ驅逐スト猶解體諸書
 ナリ詳ヨリ滲泄スルナリ是以テ此症ノ失血ハ疼痛ニ關
 ルナク又過刺ノ動作疾患無フメ大小便ニ血ヲ交フ
 ル等ノフアリ○予嘗テ惡性熱ノ血液運行ノ甚々急疾
 ナルニ因テ腋下ニ血汗ノ類ヲ發スル者ヲ見ル其相衣
 ハ宛モ博兒臥泣亞蒲挑酒ヲ以テ凍ムルカ如シ又忽度
 傑私云ク疫熱ニ紫汗或ハ血汗ヲ發スル者アルヲ見ル
 ト○此症ノ失血ハ鼻衄ト為テ出ル時ハ其血稀淡ニメ

水ノ如ク或ハ血ニ水ヲ交ヘタルカ如ニメ凝固スル
 無シ平常ノ人ノ衄血及ヒ熱病兼焮衝熱ノ血ハ是レニ
 及メ甚々稠厚ニメ光澤アリテ且ツ鮮明ナリ○又少婦
 ノ處女病前ニ注ス有ル者ハ好ンテ衄血ヲ患フ其血白キ
 殆ント白布ノ如シ然メ身體各處ニ紫色蒼色ノ傷痕ノ
 如キ斑ヲ發スルヲアリ是レハ細血球洋解腐蝕メ鹹渣
 ヲ輸送スル細動脈及ヒ蒸氣管等ニ滲透シ其部ニ固着
 ノ此斑ヲ發スル者ナリ○予嘗テ歷試スルニ腐敗惡性
 熱ニ夥シク小疹ヲ發スル者ハ佳徵ナリ殊ニ黃疸ノ類
 ニ此小疹ヲ發スル者ハ死徵ニ非ズ其故ハ既ニ腐蝕セ



ル血球今其本質ニ復シ因テ其圓活ノ状ヲ表現スルカ
 故ナリ○惡性腐敗熱ノ類ニハ汗出テ其狀煤ノ如ク或
 ハ小便黯赭色或ハ黑色ニメ黒塗アル者ハ是レ皆血球
 ノ毀敗腐蝕ヨリ來ル者ナリ又小便白色ニメ塗甚々多
 ク其色殆ント骨喜飲成德素スルニ帶癖ハ樹子ノ名ナ
 邦ノ人ノ茶ヲ飲ニ異ナラヌ其形狀毛治ノ本
 詳カニ予カ選スル處ノ蘭藥鏡原ニ載ス稠厚ナルカ
 如キ者アリ○又其顔面手腕等強メテ清潔ヲ要スルモ
 スベテ汚垢アルカ如ク煤ヲ帶ルカ如ク見ユル者アリ
 ○以上ノ諸候ヲ研究スルニ皆血液ノ順路ヲ失ヒ非常
 ノ道路ニ泛濫妄行スル者ナリ初メノ症ハ血液毀頽ス

ルニ因テ自家ノ赤色ヲ見ハシ次ノ症ハ血中ノ水性飲
 穢腐敗スルニ因テ其徵ヲ見ハス一ハ是レヲ尿塗ニ見
 ハシ一ハ是レヲ蒸氣ニ因テ皮表ニ見ハス能ク辨識ノ
 區別スベシ

○又血球毀敗損頽シ其中ニ含蓄スル處ノ鹹渣球ノ分
 利滲出愈進シテ洩出スル者アリ或ハ月桂皮露ヲ過服
 シ血液諸脈ニ包充スルヲ少ク脈絡弛緩衰弱シ鹹渣赤
 色ニ變メ博兒博兒臥臥亞蒲桃酒ノ如クニ為ルアリ亞格
 兒私及ビ蘭孤利私ノ試タル説ニ云ク蛇咬傷ノ患者此
 ノ如キ血ノ渙崩腐敗ヲ發スト是レ皆身體諸部ノ汗孔

ヨリ血ヲ漏泄シ死スルカ故ナリ○又夥ク漏汗シ大イ
 二下利ヲ糞シ尿管成徳云尿管ハ小便過利シテ止マハ
 者ニノ則チ消渴ナリ其因症ハ内
 科撰要其他諸ヲ生シ又涎唾流泄ノ止マサル者ハ皆是
 書ニ詳ナリ
 レ鹹渣球ノ烱解腐敗スル候ナリ○又多ク水銀劑ヲ服
 スレバ血質稀解メ水ノ如クニ為ルナリ○前説ノ如ク
 血球毀敗スル者ハ大抵酷厲毒ノ處為タリ猶是ヲ微ス
 ルニハ先ツ刺絡ヲ施シ其瀉スル處ノ血ニ排闥露劑ノ
 ヲ注クバ一睫時ニ血球忽チ毀敗シテ烱解渙崩ス○又
 鹿角精ヲ過服スレバ失血ヲ糞ス蓋會ノ製劑ヲ過服ス
 ルモ亦然リ屢歴驗スル處ナリ


○總テ烱解腐敗ノ血質ハ大凡酷厲ノ諸飲食藥劑等ニ
 因テ糞スルナリ此故ニ長途航海ノ人鹽藏ノ品腐敗毀
 蝕ノ物等ヲ食シ諸液漸漸腐敗シ酷厲ニ變シ生活資給
 ノ常度ヲ失ヒ大イニ衰弱虚敗シ遂ニ遊走痛攣絞痛氣
 息惡臭齒齲腐爛メ海棉ノ如ク或ハ青黑色ノ斑點ヲ生
 シ或ハ潰瘍ヲ糞シ虚鬆ニメ青黑色膿穢淋漓或ハ死肉
 等ヲ生スルコト有リ又代兒代兒ト云フ者安摠名地ハ航海
 シテ微スルコトアリ敗血病前ニ注スノ者ハ毎ニ炭斑熱赤痢
 下血其他諸失血等ヲ糞ス行人中敗血病ヲ患ヘテ胸間
 ニ瘡ヲ生シ尋デ熱病ニ嬰ル者ハ其瘡口常ニ漏血シテ

止マズ後千三十年ヲ經テ始メテ愈エタリト予又歴試
 スルニ健康壯實ノ人航海メ二三月間ニ盡ク敗血病ニ
 罹リ歸國ノ後千其人三分ノ一ハ身體腐敗メ使用ニ堪
 非ルヲアリ又航海四週或ハ五週間ニ此病ニ嬰リ初メ
 一二人ヨリ漸ク傳染シ終ニ十數人ニ至リ皆業ヲ廢ス
 ルヲアリキ又往歲船司官麻兒丁ノ部下ニ二百人一齊
 ニ此病ニ罹レリ然レモ其人悉ク稟受強實ナルニ因テ
 凡ソ八十日或ハ百日ニメ皆快復セリ

○敗血病ハ多ク船師ノ患フル處ナリ軍艦ノ甲必丹及
 ヒ外科ノ説モ亦然リ又千七百四十七年本邦ノ元文某
 二年ニ當ル

艦ノ將軍及ヒ其後千建多禮滿私麻尾支人ヨリモ其
 名事ヲ聞ケリ予此兩説ニ因テ大イニ發明スル處アリ猶
 覆案メ此症ノ失血スル處由ト處療ノ方法トヲ考定セ
 リ

○又按スルニ凡ソ揮發走竄ノ固結灰汁鹽及ヒ此ノ如
 キ散劑或ハ蘆薈ノ製劑ヲ過服スルトキハ必ス此疾ニ
 罹ル又灰汁鹽槎及石鹼性ノ藥劑即チ私發腎ノ母私
 麻私艇配私魯等ニ其他石鹼性ノ劑ヲ久シク服スレバ枯瘦熱敗血病其他
 失血下利等ヲ發ス予又近歲某ノ久シク灰汁鹽ヲ服シ
 テ膀胱中ニ結石ヲ生スルヲ療セリ又虛弱ノ人ハ灰汁




鹽ヲ久服スレバ齒齲腐爛シテ水棉狀ヲ為シ焮熱シ色
 紫黒ニ變シ漸ク潰爛スル時ハ肉中ニ間竅ヲ生シテ分
 斷ス少シク指頭ヲ以テ押壓スルニ大イニ出血シ或ハ
 水ノ如キ稀淡ノ血ヲ流シ淋漓トシテ休マス又全身手
 足ニ斑點ヲ發ス其色淺油綠色或ハ淺青蓮色ナリ其部
 位ハ尤モ脚股間ニ夥シトス其色ハ赤蒲桃酒ノ如ク或
 ハ黯黒色ト為ル黯黒ト為ルニ至テハ遂ニ死肉トナル
 ヲ恐ル、ナリ○又此血液焮解ノ事ハ予嘗テ賓孤私東
 ノ説ニ因テ詳明スルヲアリ前ニ説ク處ノ如キ藥劑ニ
 因テ血質然ク變スル者ト熱病ニ因テ灰汁鹽様ノ腐敗

液ヲ釀シ因テ血液焮解煖崩スル諸症ト皆同一般ノ理
 ニメ最モ恐ル可キ者タリ是以テ治方ハ必ス機那機那
 煎或ハ機那灌加石膽渥成徳云クニ方トモニ附録ニ載スヲ用ヒ且ツ酸
 收ノ飲食等ヲ兼用ス此劑ハ焮熱及ヒ齒齲腐癢シテ失
 血スルヲ止ム且ツ紫黒斑腿股ニ發スルヲ防制ス預メ
 此劑ヲ服スレハ此斑發スルモ亦速ニ消除ス是ヲ用フ
 ル一二週或ハ三週ヲ經テ後チ全身騷ク小疹ヲ發シ焮
 熱赤色アルハ善徵トス又二週三週ノ後チ甚夕疲弱シ
 内陷腐蝕シ遷延勞瘦熱ヲ發シ全ク消耗羸瘦スル者ハ
 必ス死ス○又一人此症ニテ死スル者死後膀胱ヨリ大

イナル石ヲ出ス_テアリ形千梨ノ如シ其重廿六十六錢
 其端末ノ細薄ナル處ハ尖リテ膀胱口ニ當居ス○私_ス參_テ
 賢私ノ邏_ハ孤_ハ殿_ハ圍_ハ弗_ハ魯_ハ烏_ハ (其方、法兒多、熱、略、詢、及、ヒ、莫、蘭、慶、
 其他諸書ニ載ス併セ見ルヘシ)
 ○成德云即子_ハ灰汁鹽劑ナリ_ヲ過服スレバ小便灰汁鹽樣ニ變シ血中
 ノ鹹渣共ニ分利泄出ス此劑結石ヲ破碎消融スル剝勢
 アルヲ以テ膀胱中ニ生スル結石ヲ灰汁樣ト為シ速ニ
 驅泄スル功アリ故ニ此等ノ劑ヲ久服スレハ諸般ノ危
 險惡症ヲ發スル_ト實ニ恐ルヘシ此ノ如キ藥劑ヲ過服
 ノ血液焔解渙崩スルヲ予毎ニ見ル_トアリ殊ニ稟受虛
 弱ノ人ハ最モ此剝劑ヲ禁スヘキナリ○刺絡ヲ施スニ

常人ノ血液ト雖モ揮_テ發_シ走_リ竄_ルノ灰汁鹽ヲ和スレバ凝固
 ヒズ又血液ト鹹渣ト分利セズ是以テ考フルニ彼ノ敗
 血病ノ人其血液既ニ腐敗シ灰汁鹽樣ノ液多ク血中ニ
 滋生スル故ニ全身ニ斑ヲ發シ且ツ失血ス故ニ腐敗發
 斑熱ト敗血病トハ血液同質ナル_ト明徵スベキナリ
 ○諸液トモニ腐敗スルトキハ總テ慄悍ノ揮_テ發_シ鹽性ト
 為ル又其腐敗ノ血液ヲ瀉スルニ瀉後須臾間ニ變ノ膿
 血ノ如ク其色穢シク黯黄ナリ又腐敗發斑熱ノ最極ニ
 至ル者ヨリ瀉スル處ノ血ハ其色ハ上ニ言フガ如シト
 雖モ一増ノ惡臭アリ小便ノ臭氣モ亦然リ此症諸液ノ



腐敗已ニ經久ナレバナリ然レトモ患者猶死ニ至ル
 ナシ○死屍ノ最モ速ニ腐敗シ易キ者ハ疫斑熱ヲ患ヘ
 シ病者ナリ六時或ハ八時中ニ成德案スルニ彼ノ邦晝
 夜ヲ二十四時ニ分ツ六
時ハ本邦ノ三時
 八時ハ四時ナリ 惡臭ヲ發スルヲ殊ニ甚シ宛モ尋常
 ノ死者ノ七八日ヲ經タルガ如ク且ツ汚臭ノ膿血諸竅
 ヲリ流泄ス此流泄スル穢物ハ沸熱ニ因テ諸脈管ニ充
 填シ漸ク腐敗ヲ成セシ者ナリ是等ノ屍ハ速ニ瘞莖ス
 ルヲ要トス○中毒ニ因テ血液腐敗スルヲ明了スベキ
 者ハ蝮蛇咬傷或ハ烈毒ノ蟲獸傷ナリ血液頓ニ腐敗シ
 焔解渙崩シ黄色ノ膿血ト為ル○疫毒ノ厲氣モ速ニ血

質ヲ毀敗シ諸液ヲ腐敗シ且ツ熱燥痘前ニヲ生セシム

是以テ其症劇シク失血ヲ發シ或ハ甚惡臭ノ漏汗嘔吐

下利ヲ發ス此等ノ症候アル者ハ皆生氣廢シテ熱燥痘

前ニト為ル徵ナリ忽度傑私能ク其事ヲ詳明ニセリ○

又疫斑熱ノ甚惡頑強ニメ治シ難キ症ニ動モスレハ大

イニ失血ノ休マホル者アリ其血ヲ見ルニ平全ノ血ノ

如ク凝固スルヲナシ是レ血液焔解腐敗スル徵ナリ

○痘瘡ニ傳染セララル、者ハ其體質ノ稟受ニ因テ疫斑

腐敗或ハ諸部ヨリ多ク失血スルヲアリ其狀ハ痘熱傳

染四五日間ニ全身ニ紫斑ヲ發シ諸道ヨリ夥ク失血ス

泰正熱病論 卷二 續


殊ニ尿道鼻孔婦人ニ在テハ多ク子宮ヨリ漏泄ス斑瘡
全ク黒色ニ變シ痘粒ヨリハ多ク水ノ如キ血ヲ流泄ス
然レ凡劇烈ノ候ナシ

○一兒女五歲許前説ノ如キ痘ヲ發ス壯熱疼痛其他劇
症ヲ備ヘ紫黒色ノ大斑ヲ發シ全身痘粒少ク特リ唇頰
ノ内廣及ヒ舌最モ黒色ニ變シ多ク流血ス且ツ連リニ
輕キ昏眩ヲ發シ玩物ヲ棄擲ス終末ニ多ク鮮紅血ヲ嘔
吐シ又大便ヨリ黒色ノ凝血ヲ下シ知覺迷乱シ九日ニ
ノ死スルヲ見ル

○又一處女温熱ノ日ニ當テ痘瘡ニ傳染セラレ偶遊歩

騎馬戲踊等ヲ為シ大イニ疲憊ス爾後稠痘ヲ發シ全身
ニ夥多ノ青黒斑ヲ發ス三日ヲ經テ其痘皆内陷シ足腿
全ク紫色ニ變シ齒齦鼻孔ヨリ夥シク流血ス又經水適
洪漏ス平常ノ經期ニ先ツテ六日許ナリ病ムテ六日ニ
ノ死ス此患者始メヨリ胸中烈シク壓迫シ大イニ煩悶
シ頻ニ昏眩ヲ發セリ脈殊ニ急疾小弱ニメ齊一ナラズ
是レ痘瘡中ノ最モ惡症ニメ恐ルベキ者ナリ

○以上論擧スル症ハ皆死症ナリ凡ソ痘ノ發見ノ時ニ
當テ發斑及ヒ失血ヲ發スル者ハ其死大抵九日ヲ出ル
テ稀ナリ是レ血液非常ニ烊解渙崩シテ腐敗スルカ故



ナリ ○予嘗テ歷試スルニ此ノ如キ危症ヲ疾スル者ハ
 千百人中ニ一モ治シ難シ殊ニ發癩紫黑色ニノ稠密ナ
 ル者ハ愈治路ヲ得難シトス此ノ如キ重症ニハ適宜ノ
 酸收劑機ナ那機ナ那劑收滯ノ消疫劑ヲ用フベシ此等ノ劑
 ハ發斑熱兼失血ノ症ニ大効アリ墨亞獨ナ此發斑熱兼失
 血ノ方論ヲ詳説ス其書ニ就テ見ルベキナリ

○前論ノ如キ焯解渙崩シ易キ血質ノ者ハ動モスレハ
 惡性腐敗熱ニ感ノ發ス又單ニ血液及ヒ諸液ノ酷厲ヲ
 為スヨリ來ル者多シ此症ハ殊ニ敗血病ノ者ニ多キナ
 リ案スルニ腐敗熱ノ毒ハ蝮蛇咬毒成德云其症ハ予カ
 選スル處ノ蘭藥鏡

原ノ蝮蛇ノ血中ニ襲入シ血液焯解スル處為ト全ク
 條ニ詳ナリ

同一ナリ血液ノ酷厲ヨリ來ル者ハ血中固有ノ慄悍鹽
 ノ銳尖ナル勢ニテ刺動攻衝スルニ因テ血液熱蒸沸騰
 スルノ劇シキヨリ疾スル處タリ凡ソ人身健全強壯
 ノ稟受ニシテ儻シ此ノ如キ患害ヲ受ルトキハ自然ニ
 一箇ノ腫ヲ發シ焮熱膿潰シテ病毒ヲ排出ス然レ凡血


及ヒ諸液共ニ酷厲ニ變スル者ハ或ハ寒燥疽成德案ス
 ルニ縲尹
 厄ハ私云寒燥疽理原
 比吸各
 寫
 熱燥
 疽其
 因症
 異ナル
 ナリ
 寒燥疽ハ熱燥疽ニ比スレバ重篤トス其患處黒色ニシ
 絶テ寒熱痛痒ヲ知ラズ甚レハ刺傷ストイヘ凡痛楚
 ヲ知ルナシ又是レニ觸ルニ屍肉ノ如キ惡臭アリ又
 指ヲ以テ其處ヲ壓セバ忽然ト陥テ再ヒ起ルナリ
 是レ靈液神氣等ノ逆注絶テ無ガ故ナリ此病寒熱二種



ニ分ツ共標準ハ患處ヲ刺傷シ或ハ烙クモ嘗テ僅少ノ
知覺無キ者ヲ寒燂疽ト名付ケテ稍知覺アル者ヲ熱燂疽
ト名付クト因テ其概別ヲ知ルベシ熱燂疽ハ前ニ注ス
併セ見ルベシ又案スルニ漢人ノ脱疽ト云フ者ハ此屬
症ニ在リ從來ノ譯書ニ寒火ノ如キ膿血ニ變シ或ハ癰
或ハ寒脱疽ト譯スル者ナリノ如キ膿血ニ變シ或ハ癰
ノ如キ惡臭アル汁液ニ變ス

○凡ソ熱ヲ發スル機ハ人身ヲ保護スル處ノ元運生氣
ノ運動ニ因ル即チ血中ノ慄悍鹽ノ處為ニ係ル譬へハ
餓死スル人ノ如キ無病壯健ノ人ト雖モ一切ニ飲食ヲ
禁絶スレバ血中ノ鹽氣漸次ニ酷厲ニナリ頓ニ一箇ノ
熱ヲ發シ或ハ譫語ヲ發ス爾後鹽氣大イニ衝動シ彌煎
熬ノ勢ヲ逞フシ因テ直チニ腐敗ヲ醸シ遂ニ死ニ至ル

ナリ○血液腐敗ニ登進スル徵ヲ見ントスルニハ乳婦
ニ若ク一ナシ凡ソ無病健全ノ乳婦ハ飲食後三四時ニ既
注スハ其乳白色稀淡味モ亦甘美ナリ若シ十六七時既ニ
許飲食ヲ禁絶スル時ハ其乳稠厚黄色其味鹹ニメ甘美
ナラズ尚一二時モ全ク絶ツトキハ濃黄色ニ變シ氣味
甚タ惡シク殊ニ惡臭有テ嘔噦スベシ尚絶ツ一經久十
レバ發熱シ且ツ乳ヲ出スヲ見テ却テ血ノ如キ液ヲ出
スナリ○此ノ如キ者ハ體中ノ緩和ヲ司トル稀潤液ヲ
多ク酸收ニ傾カシメ又膽液中ニ水ノ如キ稀淡ノ液ヲ
生ズルナリ



○血液沸熱シ及ヒ其運行過度劇烈ナル時ハ忽チニ腐敗ヲ成ス其急速ナルノ怪ムベキカ如シ其證ハ普兒プイ華ワ黒カ狗ヲ以テ試タルカ如シ其法狗ヲ捕ヘ大イニ熱スル碎計サイケ兒ル刺非那豆兒ナトウ私シ成德成徳云云砂糖ヲノ中ニ入レ封閉シ蒸スニ全身ノ血液須臾間ニ盡ク腐敗變體シ惡臭ヲ發メ耐ヘ忍フベカラズ血質全ク烱解ン涎唾血ノ如シ其沸騰ノ蒸氣尤モ惡臭ヲ為シ強實ノ人ト雖モ此氣ニ觸レバ忽チ昏冒スルニ至ル

○日常ノ飲食ニ酸收ノ物品ヲ用ヒホレバ血液自然ニ烱解潰崩シテ腐敗ニ傾クナリ是以テ獨リ肉類魚類香

竄ノ草菜類ヲ恣食スレバ速ニ腐敗熱ヲ生ス○故ニ蒸

餅ハ特リ身體ヲ養フノミナラズ酸收味育ルヲ以テ能

ク腐敗液ヲ回復ス成徳案スルニ蒸餅ハ穀類ノ粉末ヲ以テ製ス必ス蒸餅母ヲ入レテ膨脹

セシム蒸餅母ハ酸收ノ品ナリ製法主治詳ニ予カ選スル處ノ蘭藥鏡原ニ載ス

○伊思把居亞及ヒ拂郎察ノ軍中ニテ肉類ヲ過食シテ

夥シク熱病ヲ發セシナリ時人皆肉ヲ過食ノ死セリ

ト云フ然ニハ非ズ皆肉食ニ因テ血液腐敗變體シテ然

ルナリ

○案スルニ血中ニ灰汁鹽様ノ酷厲液ヲ生スレバ總テ

諸患ヲ發スルノ前説ノ如シ猶詳考スルニ人身固有ノ

鹽氣ハ本來生活ノ用ニ供スベキニ此時ニ當テ共ニ灰
汁鹽採ノ性ヲ為シ腐蝕穿蝕ノ質ヲ逞フシ血球及ヒ細
織ノ脈管等ヲ毀敗ノ休マホルナリ又固有ノ生活ニ必
用ナル油脂モ今亦腐敗シテ酪厲ヲ成シ鹽氣ト混淆ス
レバ最モ烈シキ腐爛酪厲ノ膽液性ト為リ駁ニトノ元
運精氣ヲ穿壞スルナリ

○又身體ノ一邊ハ血質酪厲ニメ纖維強硬ヲ為シ血液
粘稠ニノ焮衝ヲ兼子一邊ハ其血稀淡焮崩シ纖維軟弱
ナル者アリ

○又傳染ニ因テ血液酪厲ニ至ル者ハ痘瘡ナリ其中子


或ハ血液甚タ粘稠其熱甚シク焮衝劇痛肺痛腦焮衝ノ
類ヲ兼ヌル者アリ又血液匱乏焮解渙崩シ脈遲緩軟弱
或ハ急數或ハ遷延神經熱ノ諸症アリテ小便稀淡各處
ヨリ夥シク失血シ疼痛少ク或ハ全ク疼痛無ク漫腫等
ヲ為ス等ナリ上件ニ云フ處其初症ハ熱最モ盛ニシテ
熾クカ如ク故ニ痘ヲ發スルヲ能ハズ次症ハ其熱痘ヲ
充托ノ發出熱成スルニ足ラズ痘狀平塌ニメ膿ヲ熟成
スルヲ無キナリ是レ血及ヒ諸液共ニ腐敗變壞シ侵蝕
スベキ稀淡ノ血液ト變シ或ハ腐敗斂腫惡臭ノ液トナ
レハナリ

○稀淡酷厲ノ血質ノ人ハ肺傷熱及ヒ脇痛兼肺傷熱ヲ
發ス尚嫩衝熱ノ最極ノ症ヲ兼ヌル者アリ此症ハ舟人
ノ敗血病アル者ニ發ス

○千七百四十年四十五年 本邦享保十五
五二十年 疫熱流行ノ衆人


一般ニ其患ニ罹ル其症先シ惡寒振慄後チ大熱ヲ發シ
呼吸促迫乾咳嗽ヲ發シ甚シフメ連綿トシテ休マズ胸
脇背脊疼痛ノ刺スカ如ク 痺ルカ如ク動モスレバ頭痛
シ顛顛疼痛ス脈多クハ急數弦緊ニメ沉小ナリ呼吸甚
熱シ促迫メ利セス始メハ稀淡ノ清水白沫ヲ吐シ後ニ
ハ黃水ヲ吐ス或ハ其色洎夫藍ノ濃煎ノ如キ者アリ然

レ凡多クハ稀薄ニメ其狀膿ノ如ク且ツ惡臭アリ或ハ
氣管喉頭大イニ喰痛シ或ハ嘶嘎シ或ハ咽喉ノ薄皮脱
傷ス其刺絡スル處ノ血ハ黯紫色ニメ薄膜ヲ被フ或ハ
綠色或ハ ヲナンドキ 淺油綠色ナリ或ハ ニ 纔ニ鮮明ノ色アルモ冷ル
ニ隨テ亦大イニ烱解液崩シ較緩ノ質ト為ル○此ノ如
キ症ヲ刺絡スルニ其血ニハ厚シテ稠固ナル皮膚ヲ圍
被ス其圍被スル處ノ皮膚ノ色ハ尋常ノ肺嫩衝熱脇嫩
衝熱ヨリ瀉スル處ノ血ト異ニシテ黃色ナラヌノ殆ン
ト山茱萸子ノ如ク又赤覆盆子煎ノ如シ此色ノ皮膚ア
ル者ハ惡徵ナリ是レ大イニ粘稠液ヲ生シ酷厲ノ鹽氣



夥ク血中ニ増進シ遂ニ細血球ヲ毀敗シ腐敗斂體スル
 ニ因テ血液烱解シ其碎破セル細血球ヲ燬衝スル處ノ
 粘膠液ノ然ク圍繞スルナリ○又脇燬衝熱ノ劇症アル
 患者ヲ刺絡シ試ニ揮糞ノ灰汁鹽ヲ以テ其血中ニ交フ
 レバ血ノ上面ハ上件ノ説ノ如シ因テ考フルニ是等ノ
 症ノ血中ノ鹹渣ハ必ズ薄皮膜有テ赤色ニノ血ノ如ク
 又博鳥兒卧泥亞蒲挑酒ノ如シ又其血質ニ因テ特リ其
 鹹渣ノミ暗黄色ヲ見ハスヲアリ○大抵小便濃赤色或
 ハ黯赤色其塗ハ淺油綠色ナリ且ツ微々涓滴シテ快利
 セズ患者昏眩シ又其他許多ノ諸症ヲ兼子且ツ諸部ヨ

リ漏汗メ休マズ殊ニ頭面ニ甚シ此漏汗多クハ垂死ノ
 際ニ臨ンテ夥シク漏泄崩解ス或ハ失血ヲ糞ス又黯紫
 黒斑ハ毎ニ此症ノ極登ニ見ハスヲアリ故ニ此等ノ症
 アル者ハ必ズ鬼籙ヲ免ル、ト能ハズ○黒色或ハ赭色
 ノ鵝口瘡ヲ糞スル者ハ毎ニ此症ノ終末ニ至テ糞ス必
 善徵ニ非ス○然レ正尋常ノ燬衝熱ノ終末ニ至テ鵝口
 瘡ヲ生シ痒ヲ糞シ或ハ遂ニ進ンテ肩頸腕臂ニ甚大ノ
 腫疱ヲ糞シテ癢ヲ為シ殊ニ鼻唇ニ多キ者ハ良トス
 ○熱病兼脇痛ノ諸症ハ予既ニ各處ニ説與ス今又特ニ
 考究スルニ其中チ惡性ノ者アリ布略莫烏多ト名付ク



其疼痛スル一處ヲ移サ、ル者ナリ又彼此ニ遊走ノ定處無ク其痛劇シキ者ハ脇肺痛熱ト名ク又概シテ是レヲ惡症肺脇焮衝熱ト稱ス此症ハ大抵險惡ナル焮衝熱ノ類ナリ寒燥セル東北風ノ經久ニ吹ク時ニ多シ大抵此類ノ患者血液稠厚粘膠ニメ且ツ厚キ皮膜ヲ圍繞ス其皮色或ハ白ク或ハ淡黄色ナリ若シ其患者刺絡ヲ施ノ其症減スル者ハ一度ニ百餘錢ヲ瀉スルヲ良トス○又惡性ノ肺脇焮衝熱ニ前説ト相反スル血質アリ前説ノ如ク覆被スル處ノ膜甚タ厚シト雖モ前證ニ異ナル一ハ一二度刺絡シテ後チ患者甚タ精力脱落シ脈強緊

胸中大イニ苦迫シ脇肋刺痛シ咳嗽甚シフシテ止マズ終末ニ稀淡不熟ノ液或ハ膿ノ如ク血ノ如キ痰唾ヲ吐出ス然レ厄病勢少シモ減スル一無キ一アリ又此レニ反ノ最初ニ夥シク痰唾ヲ快吐スル者ハ將愈ノ徵ナリ○又兩症ヲ併發スル一アリ此レハ腐敗疫斑熱大イニ流行シ訟門闔境是レヲ患ル時ニ在リ殊ニ船師或ハ軍卒ニ多シ其症先ツ腐敗疫斑熱ニ嬰リ後チ惡性肺脇焮衝熱ヲ兼ヌル者アリ又肺脇焮衝熱ニ嬰リ後チ腐敗疫斑熱ニ感スル者アリ是レハ傳染ノ酷厲毒血中ニ襲入シ酷厲鹽ト為リ血液ヲ焔崩ス此ノ如キ惡性肺脇焮衝熱

ハ血液酷厲ナル質ニアリ

○上件ノ症ノ熱病ハ血液粘稠ニノ焮衝熱ヲ兼ル者アリ又酷厲ノ至極ヲ雜ル者アリ或ハ中毒ニ因テ血液ノ腐敗渙崩スルカ如キ症ヲ兼ル者アリ

○又一症アリ諸液最モ酷厲ニノ且ツ脈管ノ質甚タ軟弱血球運行ノ勢力弛緩衰頹ナル者アリ此人必ス腐敗疫斑熱ヲ幾ス又好ンテ失血ヲ兼ヌル一常症ナリ

○今此ニ熱病中最モ險惡ナル症ノ治驗一二ヲ擧ケテ其治方ヲ教示ス唯コノ症ノミナラス猶自餘其理同シキ險惡ノ諸症ハ差等異同アリト雖モ是レニ因テ治法

ヲ求ノハ其要領ヲ得ルヲ思ヒ半ニ過クベシ

○高名ノ瘍醫アリ其人體質薄瘦ニノ稍脆弱ナリ然レ

凡居常能ク動作營為シテ止マズ然ルニ毎ニ熱病ヲ患

ヘ寒氣ニ感ノ敗血病性ノ聖^シ京^{ナシ}律ノ患フ後^子千七百四

十一年^{本邦享保}ノ十月遷延神經熱ノ類ヲ患ヒ少シク

支節拘強シ頭大イニ焮熱シ脈急數ニノ力ナク飲食進

マズ胸中大イニ壓迫シ呼吸不利ス然レ凡業ヲ怠ル

ナク騎馬メ近隣ニ往來ス四五日間ニノ俄ニ疲倦勞敝

ヲ覺ノ予偶某處ニシテ此人ニ逢ヘリ時既ニ呼吸惡臭

アリ予預メ能ク保護スヘキヲ懇諭ス後予二日ヲ經

テ急ニ昏眩ヲ發シ椅子ヨリ暈倒セリ時亦猶某家ニ在
 リ衆驚テ扶起スルニ已ニ腕臂及ヒ頸肩ニ顆多ノ斑ヲ
 發ス其色紫黑或ハ濃紫色人皆擁護シテ其居ニ歸ラシ
 ム行程四里許途中連リニ昏眩ヲ發シ病勢速ニ兇惡ニ
 變シ大イニ疲倦衰弱シ且ツ疼痛シ又胸中甚夕壓迫シ
 呻吟痛楚シテ休マズ氣息惡臭有テ近クベカラズ齒齦
 ヲ汚汁血ヲ交ル者ヲ流メ休マズ又全身四肢ニ數千
 ノ紫斑等ヲ發ス此人自ラ腕ヨリ成德案スルニ腕ヨリ
 刺絡ストハ肘中横紋
 ナリヲ云フ刺絡シ九十六錢ノ血ヲ瀉ス然レ厄少シモ愈ル
 一ナク胸中轉壓迫シ呻吟昏眩煩燥愈増劇シ又兩鼻孔

ヨリ烈シク衄血ヲ發シテ止マズ初時ノ刺絡ヨリ十二
 時本邦ノ六ヲ經テ復八十錢ノ血ヲ瀉ス然レ厄猶愈ル
 一ナク却テ疲敝衰憊シ煩燥苦迫不寐曾迫スル一前ノ
 如ク晝夜少シモ睡ル一ナシ且ツ齩鼻ノ失血ノミナラ
 ス咳ノ且ツ唾血ス或ハ衄血少シク止ントスレハ齩血
 甚夕多フノ休ム一ナシ又眼ノ羅紋膜ヨリモ徐々ニ失
 血ス及ヒ舌上唇裡且ツ胃間ニ紫色ノ潰瘍ヲ發シ血ヲ
 交ヘタル稀液ヲ夥シク漏泄ス諸失血少シク減スレバ
 又血痢ヲ發シテ烈シク重墜怒責シ強ク昏眩ヲ發シ須
 臾モ睡ル一ナシ且ツ壯熱ヲ發シ其脈急疾ニ變シ六七

蘇西刺病論 卷二 三十一 臨馨堂藏

至ニノ間歇ス肌肉潤動シ手足振惕慄慄トノ諸部ノ腱
 成徳云腱ハ筋ノ首尾ニアル處ノ白細硬固ノ處ヲ
 云フ凡ノ骨上ニ布置スル者ハ骨ニ連リテ起ル筋
 首トシ骨ニ連リテ終ル處ヲ筋尾トス手足ノ筋ニ就テ
 云ハハ骨及ヒ脛骨ノ上端ニ連ル處ヲ筋首トシ指骨
 二連テ屈伸セシムル者ヲ筋尾トス是レ即チ腱トシ然
 凡其首尾トモニ或ハ一條或ハ二條或ハ三條トナル
 者アリ其質ハ神經ノ纖維ヲ以テ成ル故ニ白色ニ一知
 覺モ銳敏ナリ此物筋ノ首尾ニ在リト雖モ筋ノ狀一
 様ナラサレカ故ニ其狀モ亦各異ナリ其腱ト云ノ又尾
 二筋ノ外圍ニ展被スルアリ是レヲ單腱ト云ノ又筋尾
 二入リ其端ニ織經ニ循ヒ一條長クシテ筋ノ裏面ノ中央
 二在テ岐シテ二徐トナリ見エ難キ者アリ或ハ筋ノ裏面
 者アリ此ニ條ノ筋ヲ復筋ト云フ故ニ腱ハ筋ノ首尾表
 冊或ハ其裡面ニ在テ筋ノ纖維ヲ統括持シ筋ノ纖維
 八皆腱ニ輻輳維結ス是レ其大略ナリ猶詳ナルハ解
 體諸書ニ見ヘタリ今此條慄毒ヲ受ルト雖モ忽チ振惕
 知覺尤モ敏ナル故ニ微毒ヲ受ルト雖モ忽チ振惕

スルナリ是レ精密ニ其源由ノ機ヲ論スル者ナリ掣癢
 粗説スレバ振々トノ動搖シ筋惕スル等ノナリ掣癢
 シテ休マズ總テ諸部ノ失血スル一處休止スレバ又
 速ニ一處ヨリ迸出シ或ハ尿血ヲ糞シ利スル毎ニ眩冒
 シ尿中黯黒色ノ物アル等ナリ刺絡二回ノ後ニ至テ予
 ヲ招ク速ニ行テ診スルニ諸症既ニ記載スルカ如シ猶
 煩躁苦悶名狀スベカラズ然レ凡全ク譫語ヲ發セス唯
 數日間晝夜嘗テ眠ル一無シ舌甚タ黒色氣息惡臭有テ
 近クベカラズ遠ク隔ツト雖モ耐フベカラズ大便モ亦
 腐臭アツテ人ヲ襲フ是レニ觸ルレバ嘔噦スベク故ニ
 利スル毎ニ自ラ其氣ヲ嗅テ昏暈スルニ至ル初時刺絡

本草綱目卷之六十一 蘭馨堂

スル處ノ血ハ時ヲ經ルト雖凡血ト鹹渣ト分利セズ且
 ツ半ハ凝結シ上面青紫色ナリ少シク觸撼スレバ烱解
 渙崩シ易ク又速ニ膿血トナル其血ヲ受ル器底ニ煤ノ
 如キ粉ヲ溜^タフ然レ凡猶失血止マズ殊ニ舌上齒齦ヨリ
 漏泄シ又鼻孔ヨリ稀淡ノ血水ヲ流シテ休マズ身體極
 ノテ衰弱シ又臆慄惕ノ休マス動モスレハ昏眩ヲ叢ス
 用フル處ノ藥ヲ問ヘハ亞禮機支巴兒麻加^キ熱性強心劑
 揮叢ノ強心劑炭疽膏等ナリ衰弱疲脱昏眩胃中苦悶惛
 動等ヲ標的トシ用フト見ユ然レ凡是ノ如キ劑ハ大イ
 ニ錯誤ニ屬ス^{ソアラ}成德業スルニ亞禮機支巴兒麻加^キ熱性強心劑
 意漢醫ノ附子劑ニ似タリ然レ凡甚緩ニ


メ毒ナシ是レヲタニ西醫ハ猶寧アリトマ但神經熱水
 昌痘等ニハ此劑ヲ用フル^ルア^リ其用法ハ本篇ニ就テ
 見ルベシ此症ト神經熱トハ其候相似テ其因大イニ異
 ナル^ルハ^ハ此書ニ論スルヲ見テ知ルベシ西洋人スラ瘍
 醫^ノ徒^ハ此症ノ血液^ヲ烱^ル崩^ヨリ^ノ叢^スル^レバ^ハ洋醫ヲ學ブ
 亞禮機支巴兒麻加^キ熱性強心劑ニ始メテハ是非ヲ
 者此症ニ附子ヲ用ヒ比々人ヲ斃スハ猶短ナリ獨リ怪
 ムベキハ西洋醫ヲ學ブ者此症ニ遇ヘバ始メテハ是非ヲ
 言テ主方漢法ニ異ナル^ルア^レ凡^レ其^レ危^ニ臨^ンテ^ハ冀^フ
 舊習ヲ出シ^シ附子ニ依^ルシテ性命ヲ保護セン^ルヲ^ハ冀^フ
 何ソ居常ニ漢醫ヲ排シテ其究^リ却^テ其^レ道^ニ依^ルフ^ル予
 ヲリ^メ是^レヲ見^レバ^ハ僞^儒ノ常^ニ佛^ヲ排^シテ^ハ其^レ死^ニ臨^ン
 テ佛名ヲ唱フル^ルカ^シ如^シ余^ノ和^蘭ノ醫^術ヲ學^ビ其^レ理^既
 融解シテヨリ^リ以^テ來^ル絶^テ附^子ヲ用^フル^ル無^シ然^ルニ^モ
 功ヲ取ル^ルハ却^テ他^日ニ倍^スル^ル功^ヲ奏^スル^ル附^子ノ^甚
 有^テ血液ヲ凝^スル^ル他^日ニ倍^スル^ル功^ヲ奏^スル^ル附^子ノ^甚
 雖モ後來^ル害^ヲ遺^シテ^ハ救^治ス^ベカ^ラホ^ルト^ノ詳^説ハ^此
 予ガ選^スル^ル處^ノ蘭^藥鏡^原附^子ノ^條ニ^載ス^ルヲ^ハ詳^説ハ^此
 劑ヲ用フレバ酷厲液ノ刺動攻衝ヲ増盛シ壯熱ヲ叢シ

泰西熱病論

蘭馨堂


血ノ和合充維ノ機ヲ毀損シ焯解淡崩シテ腐敗凝瘀ノ
 血ヲ釀シ死期ヲ促スルヨリ他ナケレバナリ予乃チ是
 ニ投スルニ機那機那ヲ以テス此物能ク諸物ノ腐敗ニ
 進ムヲ防制伏禦スル大効アリ予毎ニ惡性疫斑熱ニ用
 ヒテ屢良驗ヲ得タル處ナリ微微ニ是レヲ與ヘ且ツ少
 シク石膽涯ニ附録ニ 大黃ヲ加ヘ數度飲服セシム○又
 別ニ玫瑰花准ニ肉桂露ニ方共ニ附ヲ加ヘ酸收味ト為
 シ用フ或ハ回青橙皮誤利設ノ 玫瑰猪肉桂ニ少シク
 百藥煎ヲ加ヘ間ニ乘ジテ之レヲ與フ○又赤蒲挑酒或
 ハ波兒杜瓦兒赤蒲挑酒成徳云クニ酒ノ造ニ水各半ヲ

加ヘ患者ノ嗜好ニ應シ與フ○後チ機那機那ノ量ヲ増
 シ少シク竜蕪太蜜糕子附録ニヲ加ヘ用ヒテ血痢ヲ減
 ス○又間少許ノ大黃ヲ與ヘ是レニ因テ内藏留滯ノ血
 ノ如ク膽液ノ如ク膿汁ノ如キ敗液ヲ導泄ス○又時時
 或ハ粳米或ハ蒸餅水或ハ沙孤米又ハ鹿角膏等ノ強壯
 ニスル食物ニ酸收ノ物品ヲ和シ與ヘ或ハ炒蒸餅ニ赤
 蒲挑酒波兒杜瓦兒赤蒲挑酒ヲ加ヘ用フ○又芳香收瀟
 ノ藥劑ヲ赤蒲挑酒ヲ以テ煮テ蒸湯劑ト為シ頻々ニ下
 腹ヲ熨蒸ス香竈蒸湯劑ハ
 ○上件ノ方法連綿トシテ用フルニ自ラ神効ヲ得ル



アリテ腐敗ノ勢增長セズ漸々ニ故ニ復ノ熱亦全ク消
 解ス然レ凡患者甚夕疲倦衰憊シ動モスレバ鼻衄ヲ發
 シ又齒齦ハ少シク觸ル、ト雖モ失血シ易ク氣息猶經
 久ニ汚穢惡臭アリ因テキナ機ナ那ナ灌加石膽渥附録ニ載等ヲ久服
 セシノ諸症遂ニ全愈セリ猶足脚ノ腫起久シク退カズ
 全身ノ肌肉軟弱ニノナ撫ナ觸ナスレバ痛甚フノ耐ヘ忍ヒガ
 タシ○因テ又微々ニ大黃ヲ用ヒテ下利ヲ取リ且ツ輕
 キ健胃ノ剛錢劑附録ニ載スニ石膽渥同上酸壙泉同上ヲ和シ且
 對症ノ利尿劑同上ヲ加ヘ用ヒ又身體相應ノ運動ヲ為サ
 シム此ノ如クスルト二三月遂ニ諸症全愈ヲ得タリ

○千七百四十五年本邦享保二十年夏秋ノ間疫斑熱兼失血ノ
 症大イニ流行ス一處女此患ニ嬰ル諸症大抵前説ノ患
 者ト同シ然レ凡前説ノ如ク最極ノ者ニ非ス其婦定期
 ニ非スノ子宮ヨリ大イニ崩血シ後テ劇シク衄血シ又
 齒齦ヨリ失血シ且ツ譫語シ遂ニ血痢ヲ發ス又全身ニ
 多ク黯紫斑ヲ發ス大廿錢ノ如シ予又前説ノ法方ヲ用
 ヒテ全愈ヲ得タリ後子足猶大イニ腫脹シ日ヲ經テ疲
 勞衰憊ス此患者最初ニ在テ刺絡スルト二回ナリ初時
 ノ血ハ予見ルトヲ缺ク傍人記スルトアリ云ク色鮮紅
 ニノ多ク出テス然レ凡甚夕軟脆ニノ微シク帶赤色ノ



鹹渣アリキト第二回ノ刺絡ハ予自ラ是ヲ行フ色黯黒
且ツ帶綠色ノ薄皮ヲ被フ小便其色終始白蒲桃酒或ハ
菓醬ノ如シク風處ニ晒セバ黑色ニ變ス其塗ハ黯
黑色ニノ粉ノ如シ

○熱病兼寒燦疽前ニ注スノ類ハ血質腐敗烱解渙崩スル者
ナリ其腐敗スル處ノ膿ノ如キ敗血全身ノ血中ニ泛濫
シ又次テ諸液中ニ其毒ヲ滋生シ平全ノ血球ヲ烱解腐
敗ス因テ發斑失血黑胎譫語妄言等ヲ發スセ設ル兒修私曰
熾盛熱ニ譫語大渴氣息惡臭有ル證ハ寒燦疽前ニ注スヲ兼
ヌル者ニノ血液腐敗シ最モ酷厲ノ極ニ至ル徵ナリ此

症ノ患者ハ血液運行ノ定度ヲ失スル一殊ニ甚シトス

○一處女二十五歳稟賦虚弱體質惡性嘗テ月經順利七

ス千七百四十二年本邦享保十七年ノ五月下旬ニ右足ノ大指

ニ近キ處ニ痛ヲ發シ全足頑痺ス漸々ニ增長ノ全ク運

動ヲ廢ス題謁兒人ニ治ヲ請フ題謁兒人其婦ヲノ瘍科魯


胡ノ處ニ至ラシム魯胡患處ニ火酒加樟腦ヲ塗リ強神

經劑又強心劑ヲ用フ然レ氏敢テ寸効ナシ又芳香竄透

ノ煎ヲ以テ其患部ヲ温蒸シ且ツ烈精氣ノ液汁又ハ的

里亞加等ヲ加ヘテ足ニ布貼ス患處俄ニ色變シ足脚寒

冷ニシテ全ク知覺ヲ失フ因テ予ヲ召テ診セシム予鉞



鍼ヲ以テ深ク患處ヲ刺スニ絶テ血意ヲ見ス纔ニ黒血
 一二滴ヲ流ノ豆粒ノ如シ後子一二日ヲ經テ午前ニ至
 テ皮肉ヲ切り其骨ヲ鋸切ス爾後皮表ニ疱ヲ發スル
 ナク又少シモ惡臭ナク膿血出ルナシ予即機那灌ニ
 石膽渥附録ニ扶羸糕子同上ヲ加ヘテ酸味ノ清涼飲ト為
 シ多ク温服セシム是レ患者甚タ昏眩衰弱スルカ故ナ
 リ然テ午後ニ至テ右股鼠鼯劇痛ヲ發シ忽チ發熱シ内
 臟強ク牽掣絞痛シ血ノ如キ物ヲ瀉下シ大イニ疲脱シ
 連リニ昏眩ヲ發シ煩悶シテ殆ト死セントス其翌夜大
 イニ譫語ヲ發シ舌全ク黒色言語分明ナラズ脈尤モ急

數軟弱又臆前ニ牽掣憫動ノ休マズ予案スルニ用フル
 處ノ機那機那ノ胃中及ヒ内臟ニ在テ化セズ善良ノ營
 為ヲ為ス不能ハズ因テ瀉下スル者ナリ故ニ機那機那
 灌ノ強烈ナルヲ製シテ龍蘓糕子附録ニ石膽渥同上等ヲ
 加ヘ用ヒテ大イニ良効ヲ得タリ此ノ如キ慘酷ナル病
 症ハ三四日間モ止マサレバ唯死ヲ頃刻ニ俟ツノミナ
 リ然ルヲ此婦幸ニ寒燂疽前ニ增長セズ故ニ全肢劇痛
 アリ殊ニ其毒骨膜ニ着ト雖モ未タ膝上ニ上ラズ終末
 ニ至テ膝關ノ周圍及ヒ膝下ニ遍ク黯紫色ノ條ヲ發シ
 自ラ死肌ト生肉トノ分界ヲ現シ其厓限遂日ニ明ナリ

因テ瘍醫主肌ノ膏ヲ用ヒテ是レヲ扶ク爾後漸々ニ生
 肉ノ端邊ヨリ死肌ノ部分ハ逐日ニ腐レ去リ遂ニ七月
 十四日ニ至ル頃ニ膝下ノ死骨ヲ關節ヨリ切斷ス其術
 ヲ施スニ患人痛ヲ覺エズ爾後殊ニ愈ルニ近ク日ニ良
 食ヲ撰用シ且ツ對症ノ藥劑ヲ用ヒテ不日ニシテ全愈
 セリ

泰西熱病論卷二

