




漢書門	
一三四六三	
四六三三	
四六三三	
冊架函號類	

庫文閣內	
漢書	
一三四六三	
四六三三	
冊架函號類	

內閣文庫	
番號	漢 12463
冊數	44 ( 35 )
函號	301 90



大學東  
校典藉  
局之印



赤水玄珠痘疹心印後跋

生生子曰人知醫學之難也而

不知小兒之醫為猶難也先正

有言寧醫十男子莫治一婦人

寧醫十婦人莫治一小兒蓋甚

言小兒為啞症非質稟靈明性

赤水玄珠痘疹心印後跋

通造化者不易治也矧瘴疹又  
為小兒最急者哉世之業是者  
未嘗不言秘密稱專科究其  
所蘊顯淺衷而徒執方書鮮有  
融洽理道識諳經絡而隨症通  
變者又何怪其有偏熱偏寒遺

此失彼之誤也余不敏固嘗研  
究此術而師問囊中游心象外  
晝思夜惟遠蒐近探積有歲年  
頗得肯綮彙而成帙命曰指歸  
乃夢一老人黃冠羽扇揖余而  
語曰此集固後學指歸矣子以

心融千古之秘故纂輯撰著可  
以印證前賢而博之後蓋命名  
心印以誌子苦心乎余夢而敬  
諾覺則更名痘疹心印云欲鐫  
而附於赤水玄珠之末苦力綿  
而未授剞劂會良韻張君慨然

捐貲以梓君端慤恬靜三代古  
心不務外好而樂與人為善且  
天性惻隱生平濟痾瘵惠孤歿  
梁津舟渡除道築堤莊嚴象教  
修輯梵宇他若排難解紛用恩  
於人所不知者種種不可枚舉

歲丁亥戊子江南大饑疫癘盛行死者載道漲河君拊膺而深憫之願謂鄉人曰此皆我同類可忍使若此耶且水者人之藉以生活毒染於水沿流而飲者必疾此爲害非小而去此害者

勢不可緩出金傭人收百里之暴骸而瘞之疫亦尋息君之德被鄉人澤及枯骨童叟較著者若以及臺院議加旌獎君堅辭之再三有而不居君又有烏余自甲戌交君驩迄今二十四年

如一日也先是君二子皆厄於痘因銳意訪痘書以惠元又見余集而擊節稱賞曰此不啻大海慈航異日令赤子登彼岸者繡之梓以副吾夙願然則君之德與是集並傳不朽也余不佞

有感於君而并記其事於末簡君名瑤字良韞世爲茗上人萬曆丁酉長至日新安生生子孫一奎書於茗之水晶仙館



海枯痘

諸痘及起而耳後方員一寸獨不起

又云

頭面過身四肢耳上俱已起灌膿惟

齒乾如不急救

有根痘

凡痘出頭面多四肢密者十分危險若

生蓋腎為根本

無根痘

諸痘俱好而地角方員陷伏乾枯

抱鼻痘

面部俱稀而鼻梁左右密如蚕種者此

單瑣口

諸痘獨大者名曰單瑣口

雙瑣口

若口角兩邊各有二粒者

瑣項托

痘出過身稀疎惟項下稠密一片

猪頭痘

出而頭項窩太多者急用山豆根玄參

逆痘

上少下多者名

兩頭痘

初標時省自胃而上自臍而下俱有而

救

參芎芪湯去桂加蘘葉桔梗山查白芷厚

鬼捏痘

痘出過身全無點粒其斑成片恰如打

鬼痘

痘標既定手足背俱多而頭面全無

者名曰鬼痘又曰無頭痘五日之內可



### 賊痘

救五日之外難救蓋氣血下行不能上  
先急用升麻川芎白芷蘼葉前胡甘草  
桔梗防風當歸第尖姜水煎服如不  
曲池生毒一月見骨而死若身上四肢  
稀少者不可  
遂作鬼痘者  
痘初出便如綠莖過一日便如黃莖大  
再一日又如員眼大名曰賊痘其痘根  
窠與項全無血色形雖起脹按至虛軟  
至四五日上下出血而死但此諸痘  
獨大其大甚速者就是  
不必大其大甚速者就是

### 蛇皮痘

頭面遍身再無空地平塌而色白者俗  
名蛇皮以必乾枯不能作漿至十一二  
日必死  
死

### 藥患痘

初標紅潤至四五日忽變陷伏不起將  
至裏虛以名為藥患急用扶表裏為上

### 九焦痘

當額地閣顛骨背耳後手足皆有  
二箇黑陷者名曰九焦痘不治

### 伏陰痘

痘不貫膿而瀉膿血  
故名伏陰急宜溫裏

### 空倉痘

痘雖肥滿而內實乾枯全無血水  
乃空倉也決死之症

### 石白痘

痘中有凹而四弦特起明亮好者內實  
漿板不化以手摸之其硬如石因形  
石白故名之

### 菜萸痘

痘不甚起而中亦有凹四弦皆有縐紋  
以其形似菜萸故名之也若得根窠紅  
活者服內托散去防風白芷頂中發黑  
點者保元湯加芫桂身非熱者入酒炒  
黃

### 虫痘

痘瘡痒甚者不必夏月中蠅生蛆雖寒  
月亦有用簪挑去而愈或謂用柳條鋪

下今兒卧於上則蛆自出以蓋毒留於皮膚疔綿日久臍腐熱腐故耳譬之腐草為螢朽木生蠹其理一也

血疱痘

血疱痘者血協熱毒而自漿也刺血猶紅者尚可治急與犀角地黃湯加白芍以制血解毒血黑者不治身熱者小柴胡湯加生地血漿不能收靨者紫草煎湯調下

血靨痘

痘出稀少四五日胖如碗豆六七日血靨而乾亦似丹砂九日而落以氣血充足毒少故隨出隨落不及釀膿也必痘極佳百無一二

白漿痘

痘初起發瘡頭便帶白漿者以疫癘痘也但有以便不可治主七日死

四圍痘

若瘡起發根窠四畔又旋出小痘攢簇本瘡或發似粟米不待養漿即加搔痒

漏瘡痘

瘡出頭有孔膿水漏出堆聚乾結其色如天疱瘡及癩頭之形者或清水非膿無事自破水去而乾黑者以皆屬氣所為傳染相似以俗名漏瘡未有能治者矣起腫時瘡上有小孔不黑不白名曰蛙痘皆腠理不密而有是瘡大泄元氣急用保元湯加丁香肉桂

隱血斑

其形如豆壳灰白全無血色擦破而後血出亦無膿血故曰隱血斑也不治

赤萍瘡

痘已出齊或未齊如赤萍落微高起若爬出有血急以解毒升發藥救之如成爛痘則無妨矣

紫萍瘡

痘已出齊紫色不起不灌漿如浮萍貼在肉上者不治

白萍瘡

同上

草尾珠

其痘遍身俱陷惟髑骨一團飽滿如珠以此症可治補托灌膿即痊矣

黑痘

盧廉夫曰黑痘多屬血熱黑痘本為惡証世醫恒棄而不治然形狀多端猶可解救須當辨而治之但血不活者則難救矣

一痘紫黑或黑點子隱在皮膚之間者無此

散或人牙散用猪尾血三五滴酒調下見

三分大  
入五分

一初出便是黑點急用紫草茸二三錢醇酒

半盞煎至三分瀝查與服為妙

一其形如痣皮膚發青紫紋者服透肌散或

加防風荆芥

一形如牽牛而色瘀敗又黑痕併黑靨者並

用蟬退二十五箇紫草茸一錢水煎服

一痘黑如煤炭血不紅活者用活血散一錢

酒煎紫草湯下

一痘黑而皮膚皆黑成片者化毒湯加蟬退

地骨皮酒炒黃芩

一痘黑大而軟者氣弱而熱毒盛也用保元

加紫草

一痘焦黑潮熱煩躁者小無比散并水磨

角調下一錢

氣血兩敗痘

近看犹如水蓼花 遠望如脂  
紫可誇 臨漿清水 不成膿  
古聖神農 無治法

復出痘

先見標一二點于面部或口唇上下如  
常起脹貫漿收靨不知者以為痘本稀  
故也然以火照之紅點隱隱然藏于  
皮膚之內急用內托解散則痘復出不  
然願下決發一毒不急散  
其毒而發其痘即死

雲翼子二十八般異痘姑錄于后以備參者

一彤雲繞頂

遍身痘好但頭頂一片紅赤者

一紫雲灌頂

遍身痘好但頭頂紫黑乾陷伏不

一烏紗覆頂

其症必咽喉腫塞鼻氣大粗乃

一梨花漫頂

用保元湯加天樞

一雲掩天庭

遍身磊落光澤惟額上一片血

一紫萍鋪額

其症熱甚咽痛悶亂發狂用小

一烏紗落額

無比散加玄參升麻犀角

一灰撲印堂

此症心家少血也若兼腹脹咽

一 揚花撲面

好湯用內托散加天雄

一 赤珠繞唇

此乃脾經極熱也小比散加雄黃用

一 烏飯沾唇

此証必声啞神昏目精不轉四肢厥冷喉响如鋸三朝七日乃死期

一 霞錦穿胃

此因火毒滯盛不治之症

一 紫雲佈胃

此症血枯氣滯毒來攻胃也其症必咬牙戰掉口唇焦裂頃刻矣

一 黑棋排胃

三朝決死

一 柳絮飛膏

此乃血氣枯弱也加芎歸附主之保元湯

一 桃花映背

此症清火解毒可生

一 紫萍浮背

不治

一 黑砂落背

不治

一 雪鋪魚背

此血已枯也不治

一 赤鱗穿腹

此症必大便秘家熱甚也用五苓甘露以和此症必肚內膨脹声音

一 黑段纏腹

此二日終矣唾

一 白梨墮腹

氣血衰敗也半月

一 葡萄落地

唇間紅紫一命終葡萄者兩日命終

一 爛栗居臀

遍身俱好惟臀上一片如栗壳臭爛者托補下元可轉

一 榴花散野

諸痘俱好惟四肢紅赤而唇口崩裂者乃心脾肺三經熱也須涼血清火解毒

一 黑珠遍躰

四肢枯黑如火燒紫頭口中涎出氣冷朝夕死矣

一 楊花墮枝

手足獨灰白者氣凝血滯也八珍湯加附子治之

婦女痘

童女出痘與童男相同無以議也但天癸通者則治法不能不異且夫發熱之初適遇經水如期而至則熱隨血解痘出亦輕不須服藥若過三

四日而熱不止痘不出者以熱入血室血必妄行為內動中虛之患宜涼血地黄湯加人參治之

一 非經行之期於發熱之際而經忽至者此毒火內熾逼血妄行之故必痘多而毒盛急用涼血解毒湯倍加連翹牛蒡使熱得清毒得解痘得出經得止始無他變遲則內虛痘必陷矣柳花散佳

一 正當起發灌漿之時適遇經行過三日不止痘

一應起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌或灰白或黑陷以為經血去多陰血虧耗必為陷伏壞疔矣急以八物湯去地黃加黃耆木香熟附子以調元氣或葫荽酒噴之使痘起發灌漿或出增痘者為吉若寒戰咬牙喘急腫滿手足厥冷者為內脫不治之症矣

一起發灌漿之時經水適來忽口瘡而不能言者乃血入少陰不能上榮於口也宜先以當歸養心湯主之俟其能言後以太補湯治之或猪心

血調服亦可

一經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神思昏沉言語狂妄如見鬼神尋衣撮空以行經之後血室空虛天行邪熱乘虛而入犯於衝脉蓋肝藏血開竅於目神思昏者魂亂也目妄見者視亂也妄言者肝移熱于心也宜瀉肝散或小柴胡湯加生地丹皮

一正直崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘以必不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯八物

湯加木香黃芪官桂主之使裏氣充足毒無留  
 一 停更能飲食則可保全否則倒塌不治矣  
 一 向來經閉不通血海乾涸適逢出痘毒氣拂鬱  
 於衝任之間二陽之併發其熱必甚若攻擊之  
 則血妄行不止痘亦不出為喘急為腫脹為陷  
 伏矣須調其心脾使毒得發洩庶可以保其生  
 以歸脾湯逍遙散治之脾和食進然亦方可收  
 功  
 一 痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如

常若當出時忽然行經者人但知厭穢以觸正  
 痘殊不知此乃本身之血不為之厭但恐血去  
 裏虛防生陷伏之變急宜救裏解毒大補湯主  
 之  
 一 妊婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則血氣衰敗  
 痘必不能起發灌漿命其危矣故孕婦出痘深  
 為可慮蓋痘之用藥多主溫補如半夏肉桂之  
 類皆妊婦所忌而烏附又非痘家所宜凡遇此  
 症者不問輕重悉以清熱安胎為主不可觸動



其胎宜安胎散加黃芩芍藥主之血動者四物湯加芩連治之及暈胎散佐之身熱足冷腹脹者八物湯加木香脾氣虛不進飲食毒發不出者四君子湯加木香糯米紫草胎動不安者安胎散加砂仁痘出稠密者參芪肉托散加紫草芍藥當歸單身熱有外邪無內症者參蘓飲加木香更以如聖散為主隨症加減如初發熱加升麻葛根連翹痘出太甚加酒炒黃芩太力子山查連翹不起發加大力子白芍藥口渴加麥

冬知母天花粉痰多加半夏所謂可擾而擾似乎無擾故雖有胎不忌半夏也  
 一痘正在起發灌漿之時忽遇坐草分娩之期此氣血俱虛之候宜大補湯加熟附子主之以補氣血固表裏若產後小腹急痛者此血未盡也黑神散畧與行之不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者以脾胃內虛外作假熱也木補湯加熟附一二劑更用四君子湯加黃芪當歸陳皮木香多服止者吉不止者凶

一疹後十日或半月之間適逢出痘以無胎孕繫累只以大補氣血為至以大補湯或八物湯去芍藥痘出多加連翹太力子大便自利者加肉苳蔻只照常一躰用藥施治不必妄為而多疑之反致誤事

一痘疹要訣曰姪婦出痘收靨之時胎落者多無事若發熱初出之時胎落者猶或可救若時當起脹灌膿而有犯此者多死蓋血氣衰敗無以逐其毒也

一痘已出未出不起不發隱在皮膚并治麻疔斑症用梅花一兩桃仁二錢絲瓜五錢辰砂二錢甘草二錢為末每服五分參藕湯下

一痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢川山甲一兩仙靈脾五錢射香一錢為末每服三五分咬牙寒戰加人牙二三厘內托散送下

快斑散

貫衆 赤芍藥 各一兩  
甘草 升麻 枳殼 各五錢  
右為末每服一錢水一盞竹葉七片煎至五

分温服看大小與之按貫衆主腹中諸熱邪  
毒其性微寒凡瘡瘡煩渴咽燥喘急大便秘  
小便赤澁目赤皆裏熱也急宜服之

西來甘露飲

清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不  
退痘色紅紫口渴大便結燥服之即能紅潤  
亦治疹家煩熱口乾咳嗽疹色枯燥或謔語喘  
急睡卧不安

絲瓜藤 霜降後三日近根二尺剪斷將根頭

一節倒挿入新瓦瓶中上以物掩之勿使灰塵  
飛入次日以好新罈一隻將瓶中之汁傾在罈  
中仍將藤照前挿入瓶內三日後汁收尽將罈  
封固收藏听後取用○若發熱煩躁口渴未見  
紅點將茜根一兩水煎濃汁二酒盃搥絲瓜藤  
汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕○若已見  
標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯冲服便  
見紅潤○若夾斑者犀角紫草茜根煎湯冲服  
寒月用酒煎冲服○蓋此汁極能解毒清熱尤

治天行時疫每以生姜汁少許加蜂蜜調勻服  
乏有神功

渾元汁 即熬河車不拘男女初胎者尤妙入新  
瓦罐內封固其口上以碗覆埋於土中久則化  
而為水是也

專治氣虛血熱痘色紅紫乾枯黑陷等症以  
此汁清而補之其效立見氣虛甚者人參紫草煎  
濃湯沖入服之已上二方有力之家可多收  
貯愈久愈佳臨症極便勝如積金寶造浮屠也

李氏敗毒散 治初熱壯盛等症

即前敗毒散加升麻荆芥牛蒡子蟬退山查地  
骨皮薄荷紫蘓紫草 減獨活柴胡茯苓人參  
右姜一片水煎臨服加葱白汁五茶匙 如

熱甚加柴胡黃芩 夏加香薷 冬加麻黃

瀉加猪苓澤瀉

蘓解散 治痘初壯熱頭疼腰痛腹疼作脹  
一切熱毒甚者

紫蘓 葛根 防風 荆芥 白芷 蟬退  
紫草 升麻 牛子 木通 甘草 各等分

加灯心葱白各七根水煎熱服

升麻葛根湯 治初熱壯盛疑似未明服此或痘

已出而表熱甚不退 李氏加紫蘇五分笋尖

山查牛子各一錢冬月加麻黃一錢令痘易出

易斂

和鮮湯 鮮表和中

升麻 乾葛各一錢半 白芍一錢 人參 防風各七分

川芎八分 甘草五分 姜一片水煎服

鮮毒疎痘湯 預服鮮熱去毒已出鮮熱毒斑疹

防風 荆芥 羌活 枳胡 川芎 白芷

當歸 連翹 黃芩 黃連 麻黃 紫草

蟬退 右姜葱水煎服

加味葛根湯 治痘失表發熱譫語

升麻 葛根 赤芍 甘草 桔梗 枳胡

荆芥 防風 連翹 牛旁子 木通

右水煎服

大灵丹 治壯熱顛狂驚搐譫語紅紫斑焦乾陷

一切惡疔

白滑石 飛過 三兩 雄黃 飛過 犀角 各三錢 辰砂 飛過 三錢

牛黃 各一錢 射香 五分

右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷灯草

牛子紅花紫草黃連各三錢水二碗煎至半

碗細絹濾去渣加蜜四兩同熬滴水成珠和

前藥丸如小龍眼大金箔為衣每用一九灯

心湯下暑月冷水化下

無比散 初熱服之甚能稀痘 又治痘夾黑點

子 及黑陷黑痘等症

辰砂 一錢 水片 射香 牛黃 各五分如無牛黃用牛胆南星

代 膩粉 二錢 一方有蟾酥

右研細末一歲兒服一字大者五分刺猪尾

血三兩點新汲水調和送下取下惡毒如爛

魚腸葡萄穗狀即愈

小無比散 治痘壯熱口渴小水瀝大便秘口氣

熱煩躁不寧或焦紫或紅斑自發熱至起壯時

有熱者皆可用痘後餘熱亦可用

桂府滑石 飛過 六兩 石膏 飛過 一兩 粉草 寒水石

赤小豆

各五錢錢 蟬肚小者甘草湯煮乾為末七錢

勻每五歲者服二錢大人再加冬月灯心

湯下夏月井水調下 熱甚不解者井水

磨犀角汁調下若紅紫頂陷不起加川山

甲末一分射香半分紫草煎湯加酒一二匙

調下即起

大無比散 治熱毒大甚驚狂譫語引飲痘瘡紅

紫黑陷

桂府滑石飛過粉草一辰砂飛三雄黃飛一

右末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之

初用敗毒散調下亦能稀痘若報痘後用

灯心湯下

退火回生散 治痘熱甚發渴紅紫黑陷

天滑石錢一辰砂分 冰片三厘 右末冷水調下

得睡少時神安氣靜痘轉紅活

龍腦膏 痘毒出不透心煩狂亂如見鬼神或已

出未出晉伏黑惡毒等症

冰片 研末新宰猪心血和丸員服核大小

赤小豆

赤水

水兒服半丸 大人服一丸 凡狂妄煩躁者

出心經毒盛也 紫草湯下 昏瞽不醒者伏熱

在心經也 井花水下 血疱漿不回者紫草

湯下 漿坐疱陷者温酒化下

天真膏 治黑陷乾枯紅紫及斑不退用吹救之

十全四五

初生小兒解下黑糞用磁罐收貯加水銀二兩

射香一錢黃蠟封口埋於土中愈久愈妙久

則化而為水每遇前症看見大小熱毒盛者

量與二三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之

立時紅潤活澤真秘方也較之天靈蓋枯臭

無益之物萬矣綠以糞原係母之真血所

化蓋以血補血且入土日久又得陰氣多故

能解毒百日內小兒熱而煩躁啼哭不止

用少許點入眼角二三次便能神安氣和而

睡蓋又能清心熱也

猪尾膏 治全龍腦膏但吹二方俱以龍腦為劑

虛寒者不可用惟實熱則有功

赤水

卷

卷



凡痘過服熱藥昏昧不知人事者取猪尾血以  
龍腦和為丸鼻眼核大溫酒化下物取其血用

之使毒活動化漿而達於外也

一凡痘倒靨心神不安者片腦五分辰砂一錢猪  
尾血爛研膏用木香磨湯化下

一凡痘不化漿倒靨者片腦一分猪尾血一錢同  
研新汲水調下

歲靈龍腦散治痘黑陷一錢炒片腦一分右用溫水調下取下

瘡癩為効

獨聖散痘不起頂或紫黑陷倒靨服以即時紅  
活起發有起死回生之功又名奪命丹

川山甲酒炒成珠錢取麝香一分

右末每小兒三分大者五分用木香煎湯入  
少酒調下熱甚者紫茸湯下

宋杏庄方內加炒紅麴川烏炒焦各五分名曰一  
心金葱湯下

大成散治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切

不起發之症俱可用之

川山甲酒炒 甘草末錢二 雄黃 硃砂各一錢半

紫草錢三 射香分二 右每五歲兒用二分 冷症熱

酒調下 熱症紫草湯下 寒者加入 治中

散內用 熱症加入 小無比散內

人牙散 治痘不起發黑陷或紅紫黑斑咬牙寒

戰人牙自落者不拘多少火煨存性入韭

末入射香一分 或加紅麴二分 右用雞冠血調成膏好酒半

盞入乳半盞入葱白一撮煎湯送下

凡服牙齒不可過多每服止三分多則陽氣盡出

於表恐痘斑爛無血色陰氣內盛必重寒而濡

泄急以四君子加芎歸服之

無憂散 治臨危痘症寒戰咬牙

人牙如上製 雄黃 珍珠各五分 一方有牛黃五

分 右朱每服三五分多則一錢荔枝煎湯下

無價散 治黑陷欲死者

用無病小兒糞臘月將傾銀確二箇上下合定

盞泥固濟火煨通紅取出為末蜜水調服一錢

烏金膏 治發熱至七日已前或因風寒痘不起

發或紅紫或驚搐俱可用 全蠍 去足尾 甘草 紫草 白附子

姜蚕 洗酒 全蠍 酒洗 甘草 紫草 白附子

味苦內白 麻黃 各五錢 川山甲 炒末 二錢 蟬退 去頭

者真 洗淨 右為末 將紅花紫草各一兩好酒二鍾

二錢 熬去大半去渣入蜜五兩慢火同熬滴水成

珠為度丸如龍眼核大每服一丸灯心湯化

下 亦治遠年不愈惡

紫金散 治出不快及倒靨 亦治遠年不愈惡

瘡 紫草 蛇退 牛旁子 炒各五錢

右為細末每服一錢水半鐘煎減半溫服

連翹升麻湯 治痘一發密如針頭形勢重者當

輕其表而涼其內 連翹 升麻 黃芩

葛根 錢各一 麥門冬 去心 右水煎服

清地退火湯 治痘帶熱而出名為火裏苗急用 此方以退其熱則後無青黑變隴

地骨皮 地膚子 牛旁子 紫草

葛根 各八分 連翹 六分 當歸 五分 木通 三分 蟬退 二分

右加姜一片水煎服 如熱不退再服一劑

或為末灯心湯服

紫草透肌湯 治痘熱而出不快及頂隔者

紫草一錢升麻五分牛子五分防風一分荆芥一分黃耆各八分

甘草三分木香五分右姜水煎服 如色紫腹

痛加蟬退一錢

化毒湯 治痘已出而熱毒未解宜清熱涼血毒

一解不致黑陷血一涼不致紅紫

紫草 升麻 甘草 蟬退 地骨皮 黃芩

酒木通 各等分水煎服

解毒散 治毒先發腫者名為痘母後發者十有

九死先發者吉 金銀花五兩甘草一兩木通

防風 荆芥 連翹 牛子各三錢

右用酒水各一鍾煎服 如泄加訶子葶藶

痘紅者加炒黃芩為藥 瘡痒者加歸身生

地或加何首烏尤佳 疼痛者加赤藥

透骨解毒湯 治寒戰咬牙

紫草 甘草 當歸 防風 陳皮 赤芍

右等分水煎服

赤芍

當歸

陳皮

消毒飲 痘已出上焦熱胸膈不快及痘後癰毒

麻疹熱毒 荆芥 牛子各二錢 甘草一錢

右姜二片水煎服

如聖湯 痘已出身熱如火

紫草 升麻 葛根 白芍 甘草 木通

猴梨各等分加姜一片葱白三莖水煎熱服

心煩加麥冬赤茯苓煩渴加生脉散 七八

九白身如火者加酒炒黃芩地骨皮

四聖散 黑陷倒靨不起發不紅活小便不利

紫草 黃耆 甘草 木通 右水煎服 熱

甚色紫倍加紫草荅連紅花大便秘加枳壳

如常加糯米

加味四聖散 痘出不快及變陷倒靨小便赤身

熱未退或復冒風者

紫草 黃耆 人參 甘草 川芎 蟬退

木通 木香 大便秘加枳殼 不秘加糯米

百粒水煎服

涼血解毒湯

痘出熱不退紅不分地或痘苗乾 枯黑陷急用此方可起壯灌將服

紫草 錢一 生地 紫胡 各八分 牡丹皮 七分 赤芍

蘇木 防風 荆芥 黃連 木通 各三分 牛子

分四天麻 紅花 甘草 各二分 姜一片 灯心二十

根糯米百粒水煎服

惺惺散 治痘頭痛壯熱喘急以攻毒散熱之劑

人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗 細辛

川芎 各五分 薄荷 一方無川芎加天花粉

姜三片 枣一枚 水煎服

內托散

痘不起發根窠不紅或灰白色 咬牙寒戰等症

人參 黃耆 甘草 川芎 當歸 防風

白芷 桔梗 白芍 厚朴 木香 肉桂

右姜一片 枣一枚 水煎服 色紅紫者去肉

大桂木香加紫草 蟬退 漿不滿水酒各半煎

服 色淡白者去 防風 白芷 加糯米 大便

服燥加人乳

蟬退膏

蟬退 酒洗去 當歸 防風 甘草 川芎

荆芥穗 升麻 白芍 各一分 右為末煉蜜丸

赤水珠

柴實大每服一丸薄荷湯化下

粉紅丸 又名溫驚丸 治痘後癩癩症

牛膽南星 兩四辰砂半一錢 天竺黃 錢五 冰片 分五

胆脂丕 錢一 右為末牛膽汁和為丸雞童子大

每服一丸小者半丸沙糖溫水化下

大保元湯 治頂陷根窠雖紅而皮軟薄血有餘

而氣不足 黃芪 錢三 人參 半一錢 甘草 川芎 各一

錢 官桂 分一 加姜枣水煎服 如氣不行加木

香減去桂 若不食加人乳半鐘 又方加

白荷首烏黑豈蒸過用

生脉健脾湯

治漿既成皮軟色白乃氣不足也 氣不足當補氣血不足宜養脾脾

固其本也 黃芪 半一錢 人參 錢一 炙甘草 官

桂 各三 當歸 川芎 白芍 白朮 各八 茯苓

分五 紫草 分四 姜 一片 紅棗 一枚 糯米 五十粒 或

加酒洗紅花三分 通天散 治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參 陳皮 桂枝 各八 川芎 熟地 芍藥

錢各一 當歸 錢各一 紅花 木香 各三 甘草

赤水珠

卷四

五

六分知母八分荔枝殼十箇右用鷄汁一鍾三枚糯米一撮煎服初服到頸再服到臍三服到

升天散

即灌膿起頂散治痘灰白或紅紫黑陷

乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

人參六分黃芪六分山查八分白朮五分當歸五分川芎五分

橘紅各五分甘草三分淫羊藿五分川山甲各二分

肉桂三厘木香二分姜一片東一枚

水煎服或為末服亦可如嘔吐生薑湯

血下瀉米飲下肚痛神麩煎湯下煩躁

麥門冬湯下渴用麥冬五味煎湯下吐

瀉藿香陳皮湯下痘不成漿多服數帖無

效

補漿湯痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿三分人參八分川山甲三分黃芪一分

枸杞子錢川芎五分當歸八分甘草五分木香一分

白朮六分山查八分陳皮五分官桂三厘

黃荳三十粒筴尖三箇加姜枣糯米水煎服



方有白芷防風

補元湯 治痘頂充滿而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而血不足也

川芎 當歸 白芍 熟地 各一錢 紫草

紅花 各酒洗 陳皮 甘草 各三分 白朮 錢半

酒水各半盞糯米五十粒粿二枚煎服

活血散 治痘色淡白

當歸 赤芍 紫草 川芎 紅花 各五錢

血竭 錢一 木香 錢二 右為末每五歲者服一錢

十歲已上者服二錢好酒調下 熱極血焦

不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散 治氣血俱虛灰白色不灌膿面漿者

紫河車 一具 磨末 龜板 酥炙 一方有鹿茸五錢

吳右末每服五七分或一錢氣虛者保元湯下

血虛芎歸紫草煎湯下

渾元散 治全上

紫河車 一具 分作 用白糯米三合水淘淨入

無油銚內同炒以米黃色為度同為末每用

五七分兒天者一錢極補氣血能助灌漿如  
神緣糯米性溫得紫河車之氣純化為河車  
故其補功最速譬之造酒米從麴化意也極  
妙絕

異功散 此方調順陰陽充實表裏凡痘灰白痒  
癩寒戰泄瀉腹脹並宜服之非虛寒者不可輕  
用 人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮  
半夏 厚朴 木香 丁香 肉果 大附  
子 官桂 右姜東水煎服

內助丹

黃耆 酒炒 人參 酒炒 白朮 茯苓 陳皮  
半夏 厚朴 肉桂 山查 姜三片 棗一枚  
糯米五十粒水煎服 如不食加入乳一盃  
痒甚加大附子 寒戰不止加附子防風  
渴加麥冬 瀉加澤瀉猪苓不止加訶子肉  
果

助陽丹

痒塌不起根窠不紅  
黃耆 人參 白芍 各酒炒 甘草 三川芎

赤水珍珠

三品考

三

當歸各一錢 紅花五分 陳皮八分 官桂二分 姜朮水煎

服 如食少加山查厚朴各五分餘加全煎

回生起死丹 治痘灰白寒氣逆上不合腹脹嘔

吐肚痛泄瀉清水手足俱冷

丁香九枚 乾姜一錢 水煎熱服被蓋片時令脾胃

溫煖陰退陽回痘自紅活

治中散 虛寒瀉利不進飲食

黃芪 人參 茯苓 白朮 川芎 當歸

肉桂各五錢 肉果麵包煨熟 丁香一錢 木香三錢

右末每五歲用五分好熱酒調下衣被蓋煖

少頃痘變紅活而起

和中湯 虛吐不止即鎮胃止吐湯加入參

人參 茯苓 甘草各五分 白朮 半夏各八分

陳皮 藿香 砂仁各一錢 生姜水煎服

藿香正氣散 治初熱乾嘔

藿香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗 甘草

茯苓 半夏 厚朴 白芷

右姜朮煎服

赤水珍珠

三品考

三

定痛散 傷寒肚痛及冷氣痛

神麴 香附各錢 山查錢二 良姜 當歸

甘草各五分 姜三束二水煎服 手足逆冷加

大附子二分

桂枝為藥湯 治腹痛

桂枝 炙甘草各錢 白芍藥酒炒 姜三片 束

二枚水煎服

黃連湯 治熱毒在胃腹痛時或欲吐此藥能升

降陰陽 黃連 炙甘草 乾姜 桂枝各錢

半夏 人參各八分 束二枚水煎服

益黃散 胃冷嘔吐而利

陳皮 青皮各錢二 丁香五分 木香分三 訶子分七

右水煎服 一方無木香有荳蔻一錢

堅腸湯 治痘泄瀉不止

黃芪 白朮 肉果炮去油 山查分七 川芎

陳皮各五分 升麻分三

加牙束三枚水煎服

豆蔻丸 治痘灰白泄瀉清水不止 又方止用

赤水後珠

三下如

三

龍骨訶子肉蔻三味治同

木香 砂仁 龍骨 訶子肉 肉果 麩煨各五錢

赤石脂 枯礬 各七錢半 右末 麵糊丸 黍米大每

服三十九米飲下

加味犀角飲 痘已出不勻心煩壯熱口舌生瘡

犀角 木牛子 荊芥 甘草 防風 升麻

桔梗 麥冬 水煎服

犀角地黄湯 治諸失血

犀角 磨汁 赤芍藥 生地 丹皮 各等分水

煎服 二寶散 治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴亂

語 犀角 玳瑁 二味磨汁頓服即愈

斬關散 痘紫發熱鼻紅不止

地黃 丹皮 黃芩 各五分 升麻 三分 藕節

茅根 各一錢 藜蘆 各九粒 水煎服

梔子仁湯 煩躁譫語驚狂發斑

梔仁 黃芩 石膏 各二錢 知母 杏仁 各一錢半

大青 紫胡 山豆豉 赤芍 各一錢 升麻 八分

赤芍藥 升麻

甘草五分水煎服

人參白虎湯 暑盛煩渴痘出不快又解麻痘斑

疱等熱毒 人參五分石膏四分知母一錢炙甘

草三分加粳米一撮水煎服

竹葉石膏湯 治痘不惡寒壯熱煩渴小水赤澀

石膏 知母 甘草 麥冬 竹葉

右水煎服

麥門冬湯 治斑疹煩渴吐瀉及痲後餘熱

麥冬 人參 甘菊 赤芍 赤茯苓 升麻

各一錢 甘草五分

石膏三錢水煎服

生脉散 止煩渴首尾通用

人參 五味子 麥冬 水煎當茶飲

參苓白朮散 治痘已痲未痲身熱不退煩渴不

正以藥極能清神生津乃治脾虛之聖藥也

人參 白朮 茯苓 甘草 乾葛 木香

麥冬 藿香 各等分水煎服

柴胡麥門冬湯 治痘壯熱經日不退

柴胡 麥門冬 甘草 人參 玄參 龍胆

赤水珠

草水煎服熱退即止 一方無人參

涼膈散 上高積熱口舌生瘡煩渴

連翹 薄荷 黃芩 梔子 甘草 大黃

朴硝 各等分水煎服 如痰火嗽加桔梗竹

葉蜜一匙

四順飲 治大便秘

大黃 當歸 芍藥 甘草 各等分水煎服

通幽湯 大便秘結

當歸 紅花 生地 熟地 桃仁 升麻

甘草 火麻子 水煎服

通腸散 大便秘結

枳殼 當歸 大黃 錢各二 芝麻 錢三 牛膝 分五

水煎服

葱白湯 治頭疼

連鬚葱白 生姜不拘多少 水煎溫服

當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 黃芪 黃芩 黃連 黃柏 生地

甘熟地 各等分水煎服

赤水珠

三和法

三

甘露飲 治牙根腫痛腐爛口臭牙疳出血喉舌

生瘡 天冬 麥冬 生地 熟地 黃芩

積殼 石斛 茵陳 枇杷葉 甘草

各等分水煎服

吹口丹 治口疳

黃連 青黛 孩兒茶 冰片 為末吹之

赴筵散 口瘡神效

薄苛 黃栢 等分為末入青黛少許搽之

牙疳方 痘後餘毒攻牙根疳腐 內宜服甘露飲

人中白 枯礬 鹽梅 射香

白礬子灰 五穀虫 為細末先將葱

茶洗去腐肉須見鮮血然後搽藥

鈎藤湯 痘後口噤僵直透臍腹痛

鈎藤 紅花 木香 川芎 當歸 白芍

甘草 白木 青皮 黃連 官桂 生姜

各等分水煎不拘時服

消風散 治痰盛驚搐譫語狂急口張目作上視

羌活 獨活 姜蚕 藿香 枳壳 防風



并... 全...

天麻 地骨皮 蝉退各八分 前胡一錢半 柴胡

黄芩 天花粉 桔梗 茯苓 荆芥 紫草

牛子各一錢 人参 川芎各七分 甘草四分

甘姜枣水煎服

瓜蒌散 治痘熱極生風發搐

瓜蒌根二錢 白姜蚕一錢 慢火全炒老黄色為

禾每服二三分薄苜湯下

保命丹 下切驚風發熱

天麻 白鬱金 全蝎去尾各五錢 防風 甘草三錢

青黛三錢 白附子炒 姜蚕炒 薄苜五錢 大半夏

炒滾湯浸晒乾又用南星製全上 辰砂飛五錢

射香五分 鈎藤 牛黄二錢 蝉退 茯神

桔梗各五錢 右朱煉蜜為丸 芡實大每服一丸

灯心湯下

蝉花散 治痘發熱發痒抓破

蝉退 地骨皮各一兩 為末每服二三匙白酒

服二三次

回漿散 治痘不收漿結痂

赤水珍珠

三五

三五

何首烏 白芍 黄耆 人参 甘草 白朮

白茯苓 姜水煎服

象牙散 治同上

人参 黄芪 白朮 甘草 七分茯苓 一钱

何首烏 右加糯米二钱 枣二枚 水煎调下

象牙末 一钱

玄参升麻汤 治温毒发斑

玄参 升麻 甘草 水煎服

陽毒升麻湯 面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮

喉痛 升麻 犀角 射干 黄芩 人参

甘草 各半 右水煎服

陰毒升麻湯 治陰斑

升麻 當歸 川椒 鱉甲 椎黄 甘草

右水煎服

四聖膏 治瘡疔挑破以點之

七粒珍珠火上燒 碗蓋七七鍋內炒 男髮

不拘灰多少 加入胭脂真箇好

二聖散 治同上

赤水珍珠

三五

三五

雄黃錢二 紫草錢三 右研末用油胭脂調下

敷方 痂後痘疔潰爛成坑內見筋骨以以敷之

赤石脂 膩粉 黃栢 杭粉炒 血竭各一錢

四飛丹炒八分 髮灰五分 乳香 沒藥各三錢 冰片三厘

伏龍肝錢一 蜜陀僧飛過二錢 有臭氣加阿魏三

四分 右為細末綿帛篩過敷之外用膏藥貼

內服 人參敗毒散加川山甲蟬退連翹

人參敗毒散 治餘毒癰腫

人參 赤茯苓 羌活 獨活 前胡 薄荷

柴胡 枳殼 川芎 桔梗各等分 甘草減半

牛旁子 防風 荆芥 連翹 金銀花即荆

散 頭上加白芷升麻 上身倍加桔梗

手加薄桂 腰加杜仲 腿足加牛膝木瓜

金花散 痘後肥疔疥癬等瘡以能收水解毒

黃丹 黃栢 黃芪 黃連 大黃 輕粉

射香 右為細末濕瘡乾搽燥用臘猪油熬化

調敷

必勝膏 治腫毒

馬齒莧搗汁 猪脂膏 石蜜 三味熬膏塗

之即消

三莖散

痘後癘毒初起紅腫 黑豆 赤莖 菜莖用

醋浸研漿時時以鷲翎刷上隨手可消

敗草散 治斑爛不止

爛茅草 不拘多少用 夏年蓋牆屋者經露風

霜年久感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不

能盡述取來晒乾或焙乾為極細末敷瘡上

或攤在蓆上令兒坐卧於上即愈

又方 荔枝殼微燒存性 草紙燒灰存性 多

年敗茅 三味共為細末或搽或搽自能收水

結痂

又方 黃莖壳燒白灰為末搽之 如痘風癩以

莖殼煎湯洗

綿鹽散 治爛瘡 治身及肢節疔蝕瘡膿水不

絕 鹽子不拘多少將生明礬末裝入滿火上

燒令汁乾枯為末搽之

秘傳茶葉方 痘爛遍身無皮膿水流粘粘衣

被茶葉要多揀去粗梗入滾水一漂即撈起

再揀去梗濕鋪床上用草席隔一層令兒睡

上一夜則膿皆乾

乳香韶粉散 痂欲落不落用以薄塗當滅癩痕

又治熱瘰瘋遍身膿水不絕

乳香 韶粉 輕粉 右末猪油拌鵝

翎敷上

地黃散 痘毒入眼腫痛赤縷或白膜遮睛

熟地 當歸 防風 蝉退 羌活 白芍

刺 穀精草 木賊 玄參 犀角末

黃連 大黃 炙甘草 木通 為細末

小兒每服一字大人二字羊肝湯食後調服

白日三夜一忌口將息

蜜蒙花散 治痘入目翳膜遮睛

蜜蒙花 菊花 石決明 白蒺藜 木賊

羌活 右末每服二三錢茶清調下

兔糞散 治痘入眼 亦可煉蜜為丸酒送下三

赤水滋朱

五十九 兔糞炒黃為末用蟬退木通甘草煎

湯頓服

兔糞丸 治痘入眼或生翳障

兔糞炒四 石決明煨 草決明 木賊去節

白芍防風各一 當歸五錢 穀精草二錢

右末蜜丸菴豆大每服三五十九荆芥湯送

吹耳丹 飛丹 為細末左眼翳吹右耳右眼吹

左耳只吹一二次

又方加雄黃射香少許外用石燕子一對煑

即一對二味磨末常服

單胎散 治妊婦出痘 一方有陳皮枳殼木熟

加鬱金

川芎 川歸 芍藥 人參 白朮 茯苓

甘草 柴胡 條芩 防風 荆芥 白芷

葛根 砂仁 紫草 阿膠 桔梗 糯米

水煎服

赤水滋珠

...

...

...

...

...

...

...

安胎散

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 白朮  
甘草 條芩 陳皮 紫蘓 砂仁 炒 阿膠 炒  
香附 改兼 紫草 人參 白朮 白朮  
各等分加姜枣水煎服

安胎飲

大腹皮 酒洗 人參 陳皮 白朮 白芍  
紫蘓 砂仁 香附 甘草 加糯米水煎服  
胎漏加阿膠百草霜

柳花散 室女發熱經行

柳花 五錢 紫草 一兩 升麻 九錢 歸身 七錢

右末每服七錢葡萄酒煎湯調下

鉄箍散 治痘後癩毒

鳳凰退燒灰醋調圍四畔留頭出毒氣甚佳

蒼麥粉法 痘瘡破者用與敷之潰爛者以與遍

撲之極佳 蒼麥粉以絹袋盛撲於瘡上或以

與攪於床褥上

温粉撲法 治汗出不止

赤水絃珠

字如春

四

黃連各末 牡礪粉五錢 貝母五錢 粳米粉一和勻

絹袋盛周身撲之

蟬花散 治爛痘生疽虫及夏月諸虫咬傷臭惡

不可近者服之虫皆化而為水蒼蠅亦不敢近

蟬退洗淨 青黛澄去灰土 北細辛半錢 蛇退兩

性燒存 右為細末每服三錢酒調下仍以生寒

水石細末搽之

青黛散 治痘未作膿痛甚心膈煩躁睡卧不安

並宜服之 真青黛如枣核大水調服之即安

樟皮散 治痘瘡及乳癰并一切腫毒

樟皮木剉煎溫服以藥味苦平無毒 若治乳

癰取樟皮燒存性為末酒調服之立消

獨勝散 治早晨微熱晚發大熱目黃脇動身熱

手冷發甚如驚者又名牛旁姜蚕散

牛旁子錢五 白姜蚕錢二 紫草寸七 水煎服速

進三四服其痘便出蓋姜蚕治遍身癰疹疼

痛牛旁發痘透肌紫草利竅要知痘疹無虛

寒証者服以痘立出也

赤水散

...

...



蘿蔔湯 治痘疹出不快者

右用開花蘿蔔煎汁時時飲之蓋痘疹氣勻即出快蘿蔔治嗽定喘下氣消脹解毒

紫河車散 治小兒痘瘡毒氣不解上攻咽喉聲

音不出舌頰生瘡遍逆煩悶潮熱面赤

紫河車 即金線重樓 茵根 貫衆 各三錢 白芍藥

甘草 各五錢 右每服三錢生姜一片水煎服

一方有牛旁子

野通散 治痘瘡出不快及傷寒不語

乾野人糞 即彌猴糞火燒存性 水片 真麝香 各等分

右為細末每服五分看大小用新汲水入蜜

調下十歲以上者服一錢按野人糞治蜘蛛

咬瘡以治痘出不快大效蓋蜘蛛咬瘡久

而不愈其絲生皮膚延蔓遍身不愈者加雄

黃青黛水調以蜘蛛試之立化為水屢驗蓋

此三味是治瘡疹當用之藥取山中者若人

家所養之猴食物味雜即不効失其本真也

南金散 治痘已出而復擷其勢甚危諸藥不効

赤白痢疾 一合 者萬無一失本家印貼此方施人全活甚衆

紫背荷葉 霜後搭水 紫背者 白姜蚕 洗去糸 炒乾

右為末等分每服看大小大者一錢小者五

分研芫荽汁和酒下米飲亦可 治此症多

有用龍腦人牙者卒難措辦惟以無毒而効

且速但紫背者甚難得可於鹽舖內尋之

橄欖飲 治倒靨

橄欖從中截斷水服少許服之立發

乳香猪血膏 治痘不起發

乳香 末研 猪心血搗為丸櫻桃大每服一丸水

磨化下

鈎藤紫草散 治痘疹不快

鈎藤鈎子 紫草茸 等分為細末每服三五

正分温酒調下蓋紫草滑竅利小便散十二經

毒氣鈎藤治小兒寒熱十二驚癇緣驚癇出

於心肝瘡疹亦心所主也

鴉片散 治痘當起脹灌膿時泄瀉不止諸藥不

効者如神 真鴉片 錢一 蓮肉 錢一

赤白痢疾

一合

錢一

右每服半分或一分米飲調下立止

葛根黃芩湯 治喘有汗發熱咳嗽

乾葛 黃芩 各二錢 黃連 芍藥 石膏 各一錢

五味子 粒十一分 甘草 五分 水煎服

五味子湯 治喘促而厥

五味子 半錢 人參 一錢 麥冬 杏仁 各三錢

右姜三片束三枚水煎服

清肺飲 治咽乾声啞

麻黃 半錢 麥冬 二錢 知母 天花粉 荆芥

錢各一 訶子 葛蒲 各八分 桔梗 錢二

水煎入竹瀝姜汁服

天花散 治痘後失音

天花粉 桔梗 茯苓 訶子 石菖蒲

甘草 各等分竹葉七片黃荊一寸水煎服

補肺散 治痘未出声啞

阿膠 蛤粉炒成珠 牛子 炒三分 杏仁 去皮尖 三粒

甘草 二分 馬兜鈴 黃芪 各五分 糯米 炒一錢

水煎食後時時嚥之

蘇水

蘇水

四

利咽解毒湯 治痘咽喉痛首尾皆可用

山苳根 麥冬 各一錢 牛子 炒 玄參 桔梗 各

分 甘草 分二 防風 分五 菴苳 九粒 四粒

右水煎服

三黃熟艾湯 痘後咽塞喉痺

黃連 黃芩 黃柏 艾葉 各等分水煎服

玉鎖匙 咽喉腫痛或帝鍾拖下不收及喉舌強

硬 硼砂 錢一 朴硝 分五 姜蚕 條一 冰片 分半

為末吹入

羌活當歸湯 治腰背痛初發熱時便宜服之

羌活 當歸 獨活 各一錢 柴胡 一分 桂枝 分七

防風 川芎 黃柏 各一錢 桃仁 紅花 各八分

酒水各半煎服 又方治腰痛有蒼朮漢防

已

如神湯 治腰痛

當歸 桂皮 玄胡索 各等分為末酒下

三錢

活血解毒湯 治餘毒

赤芍 丹皮 黃芩 黃連 各一錢 甘草 一分

赤水後朱

防風 荆芥 生地 赤芍 當歸 連翹

牛子 黃連 紫草 甘草 蒼朮 薄荷

川芎 木通 各等分水煎服

胎元散 痘不起發不紅潤是血氣俱虛

胎元焙乾為末加射香少許酒調服三五分

水楊湯 治痘乾尅不起者

水楊柳 春冬用枝秋夏用枝兼生水邊細葉經梗枝上有圓葉滿葉有白鬚散出俗名

梅水楊 右以枝葉切碎水煎七八沸先將一分

置盆內手拭不寒不熱令痘兒先服內托之

劑然後浴洗漸漸添湯不致太冷浴洗久許

乃以帛撚火照之纒然有起勢起處竟有

暈暈有系乃漿影也如漿不滿再浴若弱者

只浴頭面手足可也既不赤腫不厭多洗灯

照如無起勢乃氣血敗無生意矣

温膽湯 治痘血寒顏色灰慘血凝不活腹脇脹

滿面青筋縮嘔清水或瀉青菜色

白茯苓 橘紅 半夏 甘草 枳實 麩

各等分竹茹一錢姜朮水煎服

赤水後朱

赤水後朱

四二

陳氏木香散 治痘氣寒鼻流清涕咳嗽惡風自

汗身軀寒戰瘡色慘白

木香臨時磨服大腹皮黑豈汁洗淨人參各三錢赤茯苓

前胡 青皮去穢炒半夏炮七次丁香 訶子肉

炙甘草各二錢半灯心一錢半每服三錢姜棗水

煎服者大小加減

中和湯 治全上

人參 黃耆 厚朴姜汁炒白芷 川芎

當歸 粉草 桔梗 白芍酒炒肉桂去粗皮

防風 藿香 各等分酒水各半姜棗煎服

瀉肺散 治痘氣熱鼻乾燥皮毛枯槁咳嗽瘡色

焦紫即瀉白散

桑白皮蜜炙地骨皮 甘草 各等分加竹葉二

計十片灯心水煎服

清肺飲 治症全前

麥冬 桔梗各二錢知母 荆芥 天花粉各一

錢石菖蒲 訶子肉各八分水煎服

清金湯 治口氣臭

朱

赤芍藥

知母 黃芩 石膏 桔梗 甘草 天門冬

麥冬 馬兜鈴 木通 山梔 天花粉 各

等分水煎服

解毒托裏散 治痘稠密

桔梗 牛旁子 人中黃 防風 荆芥穗

酒紅花 歸尾 蟬退 升麻 乾葛 赤芍

連翹 各等分水煎入燒人屎調服

四物快斑湯 治痘火盛乾燥

當歸 川芎 赤芍 生地 荆芥穗 牛子

升麻 葛根 連翹 紫草 地骨皮 水煎

入燒人屎服

四君快斑湯 治痘氣虛滯濕

人參 黃耆 白朮 茯苓 甘草 桂心

白芷 荆芥穗 防風 陳皮 白芍 酒炒

各等分水煎服

大補保命湯 治痘皮嫩易破者

人參 黃耆 當歸 生地 川芎 赤芍

甘草 牛旁子 防風 荆芥穗 連翹

赤芍藥

二四

四

赤白痢疾

全書

四

官桂 水煎入燒入屎服

清金導赤飲 治痘熱乘肺金當痂不痂作喘煩

躁譫語小水不利垂危

當歸 白芍 陳皮 貝母 軟石膏 白茯苓

甘草 黃芩 黃連 杏仁 桑白皮

枳殼 木通 滑石 麥冬 車前子

四 人參 玄參 各等分水煎服

人參固肌湯 治痘表發太過致肌肉不密痘痂

粘肉久不落者

人參 黃耆 甘草 當歸 蟬退

各等分入糯米一撮水煎服

人參清神湯 治痘痂不落昏迷沉睡者

人參 黃耆 甘草 當歸 白朮 麥冬

陳皮 酸棗仁 黃連 茯苓 各等分加

東糯米水煎服

馬齒莧散 治痘痂不落成斑痕者

馬齒莧搗汁猪脂膏石蜜共熬膏塗腫處

當歸桂枝湯 治痘後手足不能屈伸

赤白痢疾

全書

四



當歸 川芎 黃耆 甘草 薄桂 黃柏

蒼木炒 各等分水煎 如氣虛少加川烏以

行經加入參為主 如感風寒以致骨節疼

痛加羌活防風

玄參化毒湯 治痘後赤遊丹毒

玄參 歸尾 紅花 連翹 軟石膏 赤芍

防風 地骨皮 木通 荆芥穗

各等分加竹葉水煎服

蚕退散 敷牙疳

枯礬 塗 即屎桶中垢也 五倍子 各二錢 蚕退 燒存

性一 為細末先以米泔水用蟬蟪虫翻轉蘸

水洗净瘰癧以藥敷之

黃連陰隱丸 治狐惑瘡

黃連 二錢 芩會 乾蟾 煨各一錢二分 史君子肉 二錢

半 蕪荑 一錢五分 川棟子肉 一錢

右末烏梅洗净去核搗膏和丸米飲下

蜆子湯 治痘後發癩

蜆子不拘多少活者以水養五七日旋取其水

洗之 蜆衣煮湯亦佳

十三味敗毒散 治癰毒

當歸 白芷 川山甲炒土 金銀花 防風

乳香製 甘草 陳皮 赤芍 皂角刺

貝母 沒藥製 天花粉 各等分酒水各半

煎服

凉肝明目散 痘後羞明

當歸 龍胆草 密蒙花 川芎 羌胡

防風 酒連 各等分雄猪肝煮湯煎服

望月沙散 痘後暗室中不能開者

穀精草 密蒙花 酒洗 蟬退去翅足 望月沙一兩

右為末雄猪肝一兩竹力批破用藥一錢入肝內 水煮熟飲汁食肝効

羊髓骨髓 治痘痂欲落不落癩痕

羊髓骨髓 煉入輕粉一錢研成膏塗之

小靈丹 解毒發痘之聖藥治紅斑黑陷不起

切危惡如服此而不見効者决無可生之理矣

硃砂 雄黃各二錢 乳香 沒藥各製一錢半

赤水珍珠

全書

五

赤水煎服

大蟾蜍取心肝瓦上焙乾五錢射香三分為細末取猪心

血雞冠血丸皂子大每服一丸身無大熱

生酒化下熱甚不飲酒煎草灯心湯下即

時紅活而起

神功散治痘作渴 紅花 生地

人參 黃芪 甘草 牛旁子

前胡 紫草 白芍 水煎服

紅花湯治全上 紅花或子隨意煎湯飲其渴即止 絕口中如烟

飲之即止 加牛旁子无妙

加味鼠粘子 治咽中有瘡作嘔

桔梗 射干 山荳根 防風 乾葛 陳皮

荊芥 連翹 水煎細細呷之

灯心竹葉湯 治乾嘔

竹葉三十片 灯心三十根 水煎服

潤腸湯 治虛秘

歸梢 甘草 生地 火麻仁 桃仁泥

水煎服

赤水煎服

拔毒膏 治瘰疬

雄黃 研 胭脂 重浸水 令濃 調雄黃 點疔 疔上

立時紅活 亦神法也 蓋雄黃能拔毒 胭脂能

活血也

涼血地黄湯 室女出痘 遇經不止 熱入血室

當歸 川芎 白芍 生地 白朮 升麻

黃連 甘草 人參 山梔仁 玄參

水煎服

涼血解毒湯 治女人出痘 非經期 於發熱時而

血忽至

當歸 二錢 白芷 五分 升麻 四分 紫草 一錢

紅花 一分 赤芍 一錢 桔梗 一分 連翹 三分

燈心 二十根 水煎服

當歸養心湯 治女人出血 口瘡 不能言者

人參 當歸 麥冬 甘草 升麻 生地

各等分 加燈心 水煎服

瀉肝散 女人經水不斷 適逢出痘 發熱昏沉 言

語狂妄 羌活 川芎 防風 各八分 當歸 一錢

赤水

三二

海

山梔仁

龍胆草各五分

大黃酒蒸三次一錢

水煎服

一方有木通 柴胡 黃芩

歸脾湯 女人經閉不通 血海乾涸 適逢出痘 以

妄調其心脾 不使血妄行 加柴胡 山梔 名加味

歸脾湯 人參 白朮 茯苓 黃耆 遠志

地骨皮各一錢二分 甘草三分 木香五分 酸棗仁一錢

姜棗煎服

逍遙散 女人出痘寒熱不時 經水不調 服其

血不致妄動 白朮 茯苓 當歸 芍藥

甘草 柴胡 各等分 加棗 一枚 水煎服 加

丹皮 山梔 名加味 逍遙散

如聖散 妊婦出痘 安胎

白朮 黃芩 當歸 枳殼 黑豈 大腹皮

砂仁 甘草 桑上 羊兒藤 即桑寄生 各等

分水煎服

黑神散 婦人出痘 分脫後 痂血作痛

當歸 川芎 熟地 炮姜 桂心 蒲黃炒

香附童便炒 木香 青皮 黑豈 酒水各半

煎服

原疹

生生子曰麻疹，浙地呼為瘡子，又曰沙子，吳地呼為疹子，新安呼為麻，總由有生初之淫火伏於命門之間，命門具太極之理，而陰陽五行繫焉。臟腑之所由生也，蓋五行一陰陽，陰陽一太極也。天之與人，咸相感通，由其通故，天寒則人身寒，天熱則人身熱也。天之瀉氣一動則所稟之毒隨感而發，陽感之則疹出焉，陰感之則痘出焉。

焉陽浮而淺，故疹易出，易歛。陰凝而深，故痘難出，難痂。陰陽二劫之毒，尽出則自安矣。余故曰：人之出疹出痘，猶蚕之一眠、二眠、三眠也。痘雖出於陰而實成於陽，以氣為之固也。疹雖出於陽而實藉於陰，以血為之資也。何見之？痘非氣行則血不附，安得結痂？疹非血濟則氣失依焉。能收斂斯陰陽升降之理，一開必一闔，血之附氣氣之依血，陰根於陽，陽根於陰，陰陽互為其根也。前人謂痘出於臟，不知指何臟。疹出於腑。

不知指何腑而云之也又謂疹出心肺故鼻涕而咳嗽余謂此皆臆度套詞而非有真知一定之見也既曰疹出於肺心肺獨非臟乎按內經鼻為肺之門戶通天氣陽毒上發熱毒薰蒸蓋心肺位尊鬲上又肺主毛竅毒從竅出是干於肺而非出於肺也要知痘之與疹皆出於命門之陰陽也右釋麻疹

一發熱之初多似傷寒惟疹則咳嗽噴嚏鼻流清涕眼泡腫其淚汪汪面浮腮赤惡心乾嘔為異

耳但見此候便宜謹避風寒戒葷腥厚味急表散之使皮膚通暢腠理開豁而疹毒易出也

一疹痘之發雖曰胎毒未有不由于天行病故用藥必先明歲氣薰之時令如溫煖時月以辛涼發之如防風解毒湯暄熱時月以辛寒發之黃連解毒湯大寒月以辛溫熱劑發之桂枝解毒湯時寒時煖以辛平之藥發之升麻葛根湯以因時投劑不可悞作傷寒妄施汗下而伐天和也又須看人虛實如大便秘結煩熱甚而發不

赤火法珠

出者以酒大黃微利之吐利不止以參芍之類  
補之  
一用前藥發散而疹隨見為美若發不出再加發  
之如加味麻黃散之類外以芫荽酒糟蒸熱擦  
之看其疹自頭至足為之出齊頭面愈多為佳  
若遲延日久而不出則腹脹氣喘昏眩悶亂煩  
躁而死矣  
一看疹之法灸於耳後項上腰腿先見其頂尖而  
不長其形小而均淨淡紅為吉若色紅甚兼火

化也化斑湯主之參白虎湯佐之如色白者  
此血不足也養榮湯如色紫赤乾燥暗晦乃火  
盛毒熾宜六一散解之四物湯加熟地  
葛紅花牛蒡子連翹之類滋陰涼血而熱自除  
所謂養陰退陽之義也以亦五死一生之症外  
太青湯玄參解毒湯皆可選而用之若黑色者  
則熱毒尤甚為十死一生之症須明察之勿妄  
施治  
一表後看疹隱隱然見於肌膚成片切忌風寒生



一冷如<sup>レ</sup>一<sup>レ</sup>犯<sup>レ</sup>之<sup>レ</sup>則皮膚閉塞毒氣壅滯遂變為渾  
身青紫而毒反<sup>レ</sup>內<sup>レ</sup>攻煩躁腹痛氣喘悶亂諸症  
作矣欲<sup>レ</sup>出<sup>レ</sup>不<sup>レ</sup>出危亡立至  
一疹已<sup>レ</sup>出而忽沒者乃風寒加逼而然也若不早  
治毒成<sup>レ</sup>內<sup>レ</sup>攻必致瘁癘而死急用消毒飲合升  
麻湯熱服則復出而安矣  
一發熱之時遍身汗出者此毒從汗散<sup>レ</sup>邪<sup>レ</sup>解<sup>レ</sup>疹  
易出也有鼻中血出者此毒從血解也俱不可  
遽止之若汗出太多血出不止者此又火甚逼

迫太過致液妄流妄行矣急宜當歸六黃湯加  
浮小麥以止汗茅花湯加玄參百草霜以止血  
遲則汗出多而元氣虛血出多而精神<sup>レ</sup>竭<sup>レ</sup>矣  
治之症矣  
一發熱之時或嘔吐或自利或滯下者此火邪內  
逼毒氣上行則吐下行則利毒甚則裏急後重  
而為滯下也吐者竹茹石膏湯利者升麻澤瀉  
湯滯下黃芩為藥湯加黃連生地木通人參枳  
殼或少加<sup>レ</sup>大黃微下之

赤白痢

五

五

一發熱之時未有口渴者但宜以菴荳灯心炒  
米湯飲之入參白虎湯佐之取生津解毒而已  
若恣飲冷水恐生水蓄之疝故水入於肺為喘  
為咳宜用葶蘇子以洩肺中之水水入於脾為  
腫為脹為自利水入於胃為嘔為利宜用猪苓  
澤瀉茯苓以瀉脾胃之水水入於心為悸為驚  
宜赤茯苓灯心湯以洩心之水水入於膀胱為  
小便不利為陰囊腫用車前子木通以洩之皆當隨症

而治

一疹出之時咽喉腫痛不能飲食者以毒火拂鬱  
上薰也宜甘桔湯加玄參牛旁連翹以散之  
散玉鎖匙吹之不可妄用鍼出血也  
一疹出之際咳嗽口渴心煩者以毒在心肺發未  
及也瀉白散加天花粉連翹玄參黃連以瀉之  
或黃連杏仁湯  
一疹出之時自利不止或瀉稀水頻數者有吉有  
凶但要審其疹若遍身稠密太盛或紫色或紅

赤水漫珠

五五

三

色以則為吉蓋毒在大腸非瀉則毒不解惟用  
平胃散加蒼根連翹以解之而已疹一發透依  
期而收瀉自止也若疹已收而瀉尤未止者驗  
其軀熱疹必未及再用前藥加連翹黃連牛旁  
木通澤瀉以分利之六一散亦妙絕若用訶子  
肉果等滯滯之劑則變喘急腹滿痞脹不治之  
症矣若疹色淡而軀不熱口不渴大便不利飲  
食少進此為凶乃虛寒之症方可溫補或兼收  
瀉

一疹出常以六時辰即收為率如子時為陽午後  
收午後為陰子後即收乃陽生陰成陰生陽成  
造化自然之妙也故漸出而漸收者其毒難  
若一出之後熱不退連綿三四日而不收者此  
毒火太盛外發未及內有餘邪所致須以化班  
湯三味消毒飲加玄參石膏桔梗為治  
一疹出後自然熱退若遍身既出而猶拂拂煩熱  
頻作嘔吐者此毒尚未及晉連於肺胃之間宜  
化班湯如大便秘少加大黃微利之

一疹已收去，渾身反發熱，日夜不退，以毒未盡解，邪火鬱於肌肉之間，久則毛髮焦乾，皮膚枯槁，肌肉消瘦，為骨蒸癆瘵之症，宜芳會肥兒丸，加龍胆草當歸連翹等治之。遲則有變，睡則露睛，口鼻氣冷，手足厥逆，癩瘰，慢脾風，為不治之症矣。

一疹收之後，身雖不見羸瘦，但時發壯熱，煩躁不安，寧搗擊驚悸，神昏悶亂者，以陰血衰耗，致餘毒入肝而傳於心也。宜養血安神四物湯，加麥門

冬酸棗仁、淡竹葉、灯心、甘草、石菖蒲、龍胆草、茯神、黃連、辰砂為治。或以前藥為末，用餛餅、猪心血為丸服亦可。

一疹毒入胃，久而不散，致成牙齦黑爛，血出為走馬疳，傳於兩頰，浮腫久而穿頰，破腮缺唇，破鼻為崩砂，狐惑等危症矣。外用文蛤散、雄黃散，搽之內，用人中白、芳會、史君子、龍胆草、黃連、五靈脂、餛餅為丸，滾水服之，以清胃火，亦或有得生者，但不多見也。

一疹出之時曾作瀉痢未經清解至疹退之後變為休息痢不問赤白裏急後重日夜無度以餘毒在大腸也須分虛實治之實者三黃丸利之或香連丸和之後用黃芩湯虛者從補

一疹退之後微咳嗽者以餘毒未盡也用清肺飲加消毒飲主之若咳甚氣喘連聲不住名為頓嗽甚至飲食湯水俱噎出或咳出血者以熱毒乘肺而然也宜多服麥門清肺飲加連翹若見胸高如龜背作喘血從口鼻出搖首抽頭面

色或白或青或紅或枯黯者乃不治之症然亦有肺氣為毒所遏而發喘連聲不已但無咳嗽血出噎食之症者宜用清肺飲倍加人參治之尤不可拘於肺熱之一端而純用清肺解毒之藥

一疹退之餘聲啞不出或咳或喘或身熱不退以致日久而不愈者以熱毒未盡肺金受尅故也宜清金降火湯加竹瀝姜汁主之

一疹退之後飲食如常動止如故而卒然心腹絞

赤水

卷

三

一痛遍身汗出如水者以因元氣虛弱失於補養  
 外雖無病裏實虛損偶然為惡氣所中謂之中  
 惡以朝發夕死之疔間有用蘓合香丸而甦者  
 一疹退之後有餘熱未及或發癰毒肢節疼痛者  
 以羌活散微汗微利  
 一疹退之後有餘熱未及或熱甚而失血者犀角  
 地黄湯合解毒湯或四物湯加茵陳木通犀角  
 之類以利小便便熱氣下行而愈  
 一疹收之後餘熱未及日夜煩躁譫語狂亂者辰

砂益元散灯心湯下或辰砂五苓散加苓連治  
 之若初起煩躁譫語者升麻葛根湯調辰砂益  
 元散主之  
 一麻疹一疔比之出痘似輕然調治失宜其禍反  
 不旋踵蓋痘由胎毒而發其形勢多少輕重皆  
 凶自可預斷至疹之出則雖由感受邪氣而發  
 然其輕者可重重者可輕皆在於調治有方故  
 其飲食禁忌比痘尤甚若誤食雞魚則終身皮  
 膚粟起如雞皮之狀但遇天行出疹之時又令

赤水痘

...

...

重出誤食猪肉則每歲出疹之月必然下痢膿血誤食鹽醋致令咳嗽則每臨出疹之月必復咳嗽誤食五辛之物則生驚熱不時必待四十九日或百日後方無禁忌也  
一孕婦麻疹但當以四物湯倍加白朮條芩艾葉安胎清熱為主使胎無虞而疹易沒也如胎氣上衝急用苧麻根艾葉煎湯磨枳柳并服之更多服上藥為妙  
一熱毒薰胎胎受傷而母實無恙也蓋疹與痘

不同痘宜內實故胎落而母亡疹宜內虛故胎下而母安雖與其胎去而母存孰若子母而全之為愈也

麻疹輕重不治三症要訣  
或熱或退五六日而後出輕發透三日而斯沒者輕頭面多而勻淨色澤者輕頭面不出者重紅紫暗燥者重咽喉腫痛不食者重冒風沒早者重移熱大腸交痢者重黑暗乾枯一出即沒者不治鼻扇口張目無神者

赤心

三

六

赤小豆湯

卷之五

五

不治 鼻清糞黑者不治 心前吸氣喘者不

治 水痘

夫水痘亦類傷寒之狀身熱二三日而出或咳嗽  
面赤眼光如或噴嚏或唾涕與正痘不同易出  
易靨不宜燥濕苟或燥之恐結痂多變成瘡之  
疔

麥湯散 古本只此一方或作湯服亦可

地骨皮 活石 甘草 各五分 甜葶藶 麻黃

大黃 知母 羌活 人參 各一錢 右為末每服

五分用小麥七粒煎湯調下

防風葛根湯治痘發癰疹及疹麻發熱

防風 葛根 升麻 赤芍 甘草

各等分水煎服

防風解毒湯 治麻痘初發熱如時令溫煖用與

辛涼之藥發之

防風 薄荷 荆芥 石膏 知母 桔梗

牛子 甘草 連翹 木通 枳殼 竹葉

赤小豆湯

卷之五

五



灯心各等分水煎服

黄連解毒湯 治麻痘初發熱如時令暄熱用此

辛寒之劑發之

黃連 黃芩 黃柏 山梔 牛旁子 甘草

防風 荆芥 知母 石膏 桔梗 桑葉

木通 姜三片水煎服

桂枝解毒湯 治麻痘初熱如時令太寒用此

溫熱之劑發之

桂枝 麻黃 赤芍 防風 荆芥 羌活

甘草 桔梗 人參 川芎 牛子

生姜水煎服

升麻解毒湯 治麻痘初熱如時煖時寒用此

平之劑發之

升麻 葛根 羌活 人參 柴胡 前胡

甘草 桔梗 防風 荆芥 牛旁子 赤芍

連翹 竹葉 水煎服

加味麻黃散 麻痘發不出以此發之

升麻 酒洗 麻黃 酒炒 人中黃 牛旁子 蟬退

各等分水煎服

化斑湯 治麻痘色紅

人參 知母 石膏 甘草 牛旁子 連翹

升麻 地骨皮 竹葉 糯米 水煎服

養榮湯 治麻痘色白

人參 當歸 紅花 赤芍桂水炒 甘草

水煎服

大青湯 麻痘紫赤暗晦乾燥

玄參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻

石膏 木通 梔子仁 水煎入燒人屎服

如大便秘加酒大黃

茅花湯 治麻痘鼻衄

茅花 歸頭 丹皮 生地 甘草 各等分

水煎服

竹茹石膏湯 治麻痘嘔吐

橘紅 半夏 石膏 白茯苓 竹茹 甘草

右水煎服

升麻澤瀉湯 治麻痘自利

赤水... 全四卷

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草 黃連

酒炒 升麻 各等分水煎服

黃芩芍藥湯 治麻痘滯下

條芩三錢 白芍各二錢 升麻各二錢 甘草一錢

水煎服

十全散 麻疔咽喉腫痛

黃芩 黃連 黃栢 苦參各酒炒 玄胡各五

三 分 硼砂 乳香製各二分 孩兒茶 雄黃各五分

共為細末 每用少許吹入

芦會肥兒丸 麻後發熱日夜不退肌肉消瘦骨

蒸癆瘵

芦會 龍胆草 木香 蚰皮 人參 麥芽

炒 使君子肉各二錢 檳榔 黃連酒炒 白蕪荑

各三錢 胡黃連五錢

右末猪胆汁糊為丸黍米大每服五六十丸

米飲下

文蛤散 麻毒入胃牙肉黑爛出血走馬疔疔

雄黃五錢 五倍子二錢 枯凡五分 蚕退帛燒存一

赤水... 全四卷

雄黃散

治全上

雄黃錢一 黃栢錢二

射香分一

先用艾湯淨洗

後搽藥

麥冬清肺飲 麻後咳嗽出血或噎湯水

知母 貝母

天門冬 桔梗

甘草 杏仁

牛旁

石膏煨

馬兜鈴蜜水炒

糯米

右各

煎服

清火降火湯

麻後熱乘肺金聲啞不出或咳或

喘冬 當歸 白芍 生地 陳皮 貝母

瓜蒌仁 甘草 白苓 枯苓酒炒 山梔炒

玄參 天冬 麥冬 杏仁 葉白皮 石膏

紫蘓梗 酒連 右各等分姜一片水煎服

生生子曰麻疹咳嗽喘急每用痘門中大小無比

散每服五七分大者一錢即刻喘定而睡醒後

神安氣和而愈屢用屢驗乃熱毒從小便出也

加減四味升麻湯 此升發之劑但一二帖則止

不可過表 升麻 葛根 赤芍 甘草

赤芍

升麻

葛根

赤芍

甘草

本草綱目卷之五十四

卷之五十四

防風 桔梗 紫蘓 蒼朮 陳皮 枳殼

柴胡 姜朮煎服 此方治一切瘡毒

水痘赤痘即以此服而愈不必他方雜治

### 大宮詹少溪吳馭閱校

蘇蘇野 西藥 古法 藥方 藥方 藥方

天冬 麥冬 杏仁 藥方 藥方 藥方

甘草 白朮 蘇合 山蘇

白朮 刺朮 貝母 終

