


K242

62.328
5



床臨 應用 漢方 醫學 解說

東
洞
學
社
刊
行



0955094

復陸

未だ指詰めの方と添すを得共、拙者古見に乃るき由りて、此に其
 類を定むらむに、此は宜に克子のまゝと存言、此等の又高昇は
 復蛇(まむし)と撰^九其形を短尾、斑紋の色彩著明^明、^九其邦特産
 の毒蛇にして、體短尾は其、短尾に類して短尾、致しく怪因する、^九唯
 己有し四肢短尾にして、堅き爪あり、尾も亦短尾の如く、^九然るに
 土中に棲息し、主として蚯蚓を食す、^九其の如く、^九而して
 小生は之等の現物と異、併使用す、^九事案に之等と異、^九黒焼とせし
 もの、^九其類より購入するが故に見かして、現物とは自に別なり、^九
 ば至種、^九其有るを、^九若し、^九此の平化、^九今にして有るを、^九澤者、^九常
 神田區五軒町、^九存立、^九黒焼、^九本舗、^九に、^九注、^九文、^九方、^九此は、^九生、^九取、^九わら
 んと、^九ね、^九申、^九す、^九又、^九其、^九用、^九法、^九禁忌、^九等は、^九拙、^九者、^九に、^九記、^九載、^九せ、^九ら
 判、^九明、^九な、^九す、^九と、^九な、^九ま、^九高、^九此、^九の、^九他、^九に、^九記、^九載、^九せ、^九ら、^九は、^九法、^九中、^九載、^九せ、^九ら、^九
 何、^九時、^九に、^九も、^九記、^九載、^九せ、^九ら、^九は、^九先、^九は、^九而、^九の、^九用、^九法、^九を、^九記、^九載、^九せ、^九ら、^九

九月二十七日

湯を求む

序

誰謂草根木皮爲無用者。其亦一知半解者流之過言耳。方今化學雖有長足之進步。然吾人所知之有機性藥物。豈得全依集成作用而製成乎。間或依法製造。關於取材之費事。反不若逕求自然界爲有利也。彼近今之西洋醫學界。猶不能捨毛地黃之浸葉。或昆儒蘭格（Candorego）之皮煎。次之。規尼涅以及嗎啡等之鹽基類。其原料有不取諸自然界者。

言多數之漢藥。固仰給於自然界。初不外草根木皮爲大宗。雖曰草根木皮。亦未必不奏有神效。蓋至少積數千年悠久之實驗。此根深基固所成立之漢醫方。苟能從事科學而下觀察。且更加之實驗。其裨益國際上之醫學。尤屬我國醫者所引足自豪也。

友人湯本求真篤學士也。肄業金澤專門學校。脩日新之醫學。夙有研究漢醫方之旨趣。現揭漢醫榜於兵庫。日前過訪。見示應用漢方醫學解說之原稿。謂欲公之於世。竊贊其舉。爲述所感於茲焉。

序

近世醫林作者。淵雅莫如徐靈胎。精當莫如柯韻伯。尤在溼。皆見劉文九說少於世。東邦當隋唐之際。竊中土之緒餘。以爲三島文明。其於醫學亦然。而弈世鑽研。頗有青藍之勝。所見彼國醫書。如吉益氏父子。精當不讓柯尤。而淵雅過之。丹波氏父子。淵雅不讓靈胎。而精當過之。其他若尾臺榕堂。山田正珍。中西惟忠等。皆風發踵厲。卓然成家。余於上海國醫學院。授大論要略之課。搜采舊籍。取數子之說特多。蓋非阿好也。近有湯本求真者。著皇漢醫學三卷。取吉益氏類聚方。附以前賢注釋。間下己意。有精要處。又有臨床應用漢方醫學解說一卷。方雖不多。皆可施於實用。效驗卓著者。蓋湯本氏先習西醫。苦西醫治療之不效。乃改習漢醫。積二十年經驗。以成此書。故其書不爲淵博。以治療實用爲指歸。審證用藥。大抵師吉益氏。去其偏激峻下之弊。而於血證。尤有心得。此其所長也。至於精思冥悟。妙合古今。抽繹陳言。張皇科學。則寡人未皇多讓焉。今湯本之書先行。拙着傷寒今釋金匱今釋亦不日脫稿。將以問世。劉子泗橋既譯皇漢醫學。復譯此卷。而索序於余。余謂此書卷雖少實湯本一生之精粹。且使中土醫師。知東邦之復興漢醫。乃張仲景之學。非葉天士吳鞠通之學。所謂漢方。乃麻桂薑附。苓連膏黃。非豆卷豇豆。菊花桑葉。卽劉子此譯之有功於醫界。豈但供臨床採擇而已。民國十八年十二月陸淵雷雷序。

皆習游牧者也。今之美國西部。東三省北部。皆習大農者也。俄國此次革命。其最大原因。不外由大農化為小農之爭也。中國腹地。純爲小農。已經五千年於茲矣。此四者外。惟英國現象稍有不同。謂之游牧不可。謂之大農更不可。乃牧而不游。名之曰坐牧斯爲當也。何也。英國之地。除工廠而外。各以其所有者。圈之以爲圃。牧牛與羊而餉之。偏國中無耕者。名之坐牧。不亦當乎。職是之故。生活狀態不同。遂影響於生理衛生醫藥。今之言者曰。今日之世界。科學世界也。中國醫理。不合於科學之體。中國醫藥。不合於科藥之用。非根本廢除中國之醫藥。不足以謀進化而適合於科學。噫。爲此言者。殆不知進化爲何物。又不知科學爲何物。科學云者。物與物相值。有特別徵候。智者見之而加以修明。以貢獻於社會者之謂也。簡單言之。則曰碰彩。吾友馬君武恆道之。譬之瓦特發明蒸氣。以病中見爐火煎水而起。牛董發明吸力。無意見蘋果落地。勢作弧形。華人發明火藥。乃入廁中以石擊壁爲樂。得暴裂徵候。因思取硝。諸凡此類。不可勝計。豈在歐人碰彩則謂之科學。在華人碰彩則不得謂之科學。歐人之歷史短。則其碰彩之時間短。歐人之國家小。則其碰彩之範圍亦小。歐人之人數少。則其碰彩之人亦少。且科學之發明。有已經定論者。有未經定論者。蒸氣之發明。已經明効大驗矣。至於吸力之說。西方學者。方經羣起而疑之。不但此也。昔時歐人以喜馬拉雅山爲世界之最高峯。近日有云喜馬拉雅山非最高峯。當居世界之第四位。第一高峯在赤道南斯里伯。昔時歐人以龍之爲物。爲中國人之理想神話。自巴拿

馬開運河以來。發見龍骨。狀似華人之言。學者遂斷定龍爲古時動物。如在中國則漢時曾開渠發見。龍首渠因以得名。無俟今日也。昔時以地球爲橢圓形。近日又復疑之。昔時以龍之騰雲致雨爲荒誕之言。自近日德人乘飛機。見有動物在空中盤繞吐霧。乃取機關槍射之。而人亡機折。遂疑空中有吐霧之物。昔時美國人以華僑食醬油乳腐。望而畏之。驗之。果有微生物。禁止入口。近日復見華人食之無病。再驗之。始斷定此微生物非害人之微生物。乃益人微生物。復弛其禁。然則科學云者。有已經確定者。有未經確定者。不能以科學二字。即可震而驚之。奉爲金科玉律也。且進一般科學而言醫藥科學。一般科學。適於所用之謂也。醫藥科學。適於療病之謂也。不但文明人有科學。野蠻人亦有之。苗人善放蠱。亦苗人能治蠱。苗人善製毒箭。亦苗人能治毒箭。不但野蠻人有科學。獸類亦有之。鹿性好淫。當春夏之交。牡鹿尤縱慾。因之奄奄欲斃。牝鹿含草藥以療之則蘇。見人奪之則自吞。不但獸類有科學。蟲類亦有之。恆見蜘蛛張網於屋角。蜂過則羅而捕之。追蜂反抗。蛛亦受傷。徐徐而退。至於屋頂。尋嚙瓦松以自療。人以瓦松治蜂傷。亦効。適用爲科學。適病亦爲科學。不能以野蠻人之科學。獸之科學。蟲之科學。而鄙夷不用而坐以待斃也。况中國文明古國。其良法多多耶。余弱冠負笈海外。卽信西藥。中藥不入口者二十餘年。好食瀉丸。年少能支。無大害。及民國三年亡命。復走日本。以過食糕團。腹痛而瀉。入胃腸病院。瀉後復結。醫者以皮管貫腸。豁然而通。通後復結。結後復貫。終成腹痛之病。民國五年

。到北京開會。冬日左腳漸冷。年甚一年。至十四年而劇。十五年回漢。兩足俱麻而木。臥不能起。倩中醫金針家魏廷蘭治之。兼旬膝下較熱而起。然未能健也。十六年來滬。遇王秀峯。大食附子而身輕能步履。至太原復以此法治之。今則步履如壯年矣。不但余爲然也。老友曾錕三十五六時。卽患麻木。至癱臥年餘。厥後單食附子一味。每服自五錢至二兩餘。至今已能步履矣。且西醫不治之症。華醫能治者亦多多也。吾友蕭實字級秋。娶日婦林氏。當民國七八年間。在滬舉一女後。生乳癖。乳房紅腫而硬。旁有小孔流膿。赴日醫篠崎醫院。日醫曰。非凍割不可。林氏難之。級秋翻閱傳青主產後篇瓜蒌散古方。方開瓜蒌一個連皮搗。生甘草五分。當歸三錢。乳香五分。燈心炒。沒藥五分。燈心炒。金銀花三錢。白芷一錢。青皮一錢。二服而愈。而乳漿復源源來也。篠崎以爲奇事。林氏遂變中國無醫之觀念。而轉信華醫也。緊記此方。次年舉一男。復紅腫作痛。林氏以原方購服一劑而愈。以後皆如之。余家小兒乳母。十五年亦患此症。舍弟不信中醫。送往申江醫院劉之綱治之。不效。余告之曰。非余治不可。當以醒消丸五錢。分二次用熟酒服。參以瓜蒌散治之而愈。此後凡遇癰疽之症。余以醒消丸及仙方活命飲參服。三年以來。無不効者。民國十一年余自廣州回滬時。神州女學校長張默君之母患腹痛。遍延西國各醫治之。皆曰此盲腸炎也。非速割不過三日矣。母難之。有舉中華新報小說家譚善吾治之。善吾至。母已于足俱冷。惟心中尚有餘熱。投以中藥而愈。工部局案方化驗。終無所得。又見多年不愈之淋症。西醫治之罔

効。服山西太谷縣北洸村吳會龍之龜齡集一兩而全愈。愈後元氣亦復。此藥並治頭暈。家母年老頭暈。服之甚効。西醫不善^治糖尿症。華醫陸仲安重用黃芪而治。美國人襲其法。製黃芪精。口外黃芪近年因以大貴。中醫以冰片治痛。冰片之中。重用樟腦。以其善散也。西人亦襲此法。故其止痛諸藥。無不如此。大元帥府參軍長林修梅。患牙痛。中國視爲小症。廣州法國韜美醫院主拔之。拔之血流不止。一夕而逝。國民軍主將胡景翼。肘生節。中國亦視爲小症。開封德醫主割。一割未愈。將再割。重用麻藥。一麻不起。中國藥主草木。治之不效。不致重其病。西毒主礦物。治之不效。必重其病。中國人力主廢止中醫中藥^{之學}。外國人方徧求中醫中藥之法。余在山西口外見輸出藥材。逐年增長。吾邑明代李時珍以四十年之功著本草綱目。非徒空言。乃自經實驗者也。近日德人大爲尊重。而譯之。清人吳其濬著植物名實圖考。山西官書局刊行之。歐美日本人赴太原者。每人或購十部二三十部不等。中國人以當歸川芎爲血藥。西人近來亦何嘗不於此求之。中國人知種痘。西人亦^效之。中國人以升藥治楊梅。西人亦效之。且上古之民族生理。與今日之民族生理不同。上古強。今日弱。中國民族生理與歐洲民族生理不同。歐洲強。中國弱。何以故。去火化愈近者愈強。去火化愈遠者愈弱。火化久雖弱。惟自然解毒之法亦在其中。故中國人口自然繁榮也。攷漢末華佗爲關羽治箭傷。關羽屹然不動。今人能堪之耶。西人發熱墮以冰帽而無傷。友人徐壁原在日本杏仁堂就醫。醫者以冰帽退熱。墮頭及胸。無何熱雖退而人亦與冰俱冷以終古矣。古人之所堪

者。今人不必能堪之。歐人之所能堪也。華人不必能堪之。我之發明已久。爲社會應用之術。離出學校研究範圍。我則輕視而不以科學視之。西人恆以爲奇事。乞人弄蛇。知蛇性理蛇傷。在不知者不能不以爲奇。制豆腐。小藝也。歐人以爲奇。學之久而不能精。扇豬扇狗之類。賤藝也。德人學之六年。自試豬狗皆死。渠塘養魚。華人不學而能。德國則屬之大學科。江湖跌打損傷。非有深奧之學也。所治奇症。較醫院爲妙。大凡科學之過程。分三大時期。第一時期爲思想發動時期。何由發動。卽碰彩也。碰彩之中。分有心碰彩與無心碰彩。神農嘗百草。有心之碰也。硝能製火藥。無心之碰也。第二時期。爲衆人研究時期。此時期亦爲矜誇時期。成功失敗。尙未爲定。惟研究者必故神其說。信其藝者。亦旁加附會。第三時期。爲應用時期。脫離研究範圍。人人不學而能者。如農業。如豆腐。如養魚。如扇豬扇狗之類。惟其不學而能。遂輕視其已往之科學。不但不矜誇。而且卑賤之也。夫中國醫藥。與西方不同。西方。科學也。中國始於科學。成於哲學。終於混合應用。科學。規矩也。哲學。神明也。中國醫藥之至精者。神明與規矩。而不離其宗者也。西方之治病也。有一病則一次治之。有二病三病則二三次治之。四病五病則四五次治之。中國不問其有若干病。皆以一次治之。且病愈而人亦健。謂之神明於規矩。夫何待言。西方視病爲多元。他國視病爲一元。華人謂治事不得要領者曰。頭痛醫頭。脚痛醫脚。有以也。日本人漸明此理。余當留學時代。日本方廢漢醫。行西醫。十年以來。又大唱漢法復興。研究者甚夥。外人尙謀行之。而我反謀廢耶。且中

國醫藥。四民皆有關係。醫師。士也。藥商。商也。種藥者。農也。爲國家謀建設。所以安民也。如廢醫藥。四民失業業者。其數不知凡幾。將以何業代之乎。如曰中國有庸醫。誠有之矣。行政者設法取締。何患無方。醫師之不善。不能遷怒於醫理。況普行西醫之國。如英如法如意。每年人口有減少之傾向。中國人口。則逐年增加。是天然衛生天然醫藥。適合人類生存之道。可爲左證矣。獎之不暇。而况廢之乎。

臨床應用漢方醫學解說目次

古醫學之精神

一、桂枝湯桂皮(桂枝)·芳香性神葷藥之通性·芍藥·生姜·緩相藥之通性·大棗·甘草	一
一、甘草湯治驗·與麻黃湯證衄血之別·與桂枝茯苓丸證衄血之別·適應症	六
一、桂枝加桂湯	一三
一、桂枝加芍藥湯適應症	一四
一、桂枝加芍藥大黃湯適應症	一五
一、桂枝加附子湯	一五
一、桂枝加茯苓湯茯苓·朮·適應症	一六
一、桂枝加茯苓附湯附子烏頭應用之法則·適應症	一九
一、真武湯	二三
一、苓姜木甘湯與八味丸之鑑別·適應症	二四
一、苓桂木甘湯本方與八味丸之別·適應症	二六

一、苓桂甘棗湯	二八
一、茯苓甘草湯	二八
一、芍藥甘草湯腹證	二九
一、芍藥甘草附子湯腹證·適應症	二九
一、黃耆建中湯	三〇
一、當歸建中湯當歸	三一
一、歸耆建中湯腹證·治驗	三一
一、黃耆芍藥桂枝苦酒湯適應症	三三
一、五苓散適應症	三四
一、茵陳五苓散適應症	三六
一、豬苓湯腹證·適應症	三七
一、麻黃湯適應症	三八
一、麻黃杏仁甘草石膏湯適應症	三八
一、小青龍湯腹證·適應症	三九
一、大青龍湯治驗	四〇

一、越婢加木湯治驗	四一
一、麻連翹赤小豆湯連翹·赤小豆·桑白皮·適應症	四二
一、葛根湯葛根湯本方與桂枝湯之別·本方與當歸四逆湯別之·適應症	四三
一、葛根加苓朮附湯(著者之創方)適應症	四六
一、葛根加半夏湯適應症	四七
一、葛根黃連黃芩湯適應症	四八
一、小陷胸湯 ^肉 適應症	四八
一、小柴胡湯腹證·適應症·治驗	五〇
一、小柴胡加大黃湯適應症	五七
一、小柴胡加石膏湯適應症	五八
一、柴胡桂枝湯適應症	五八
一、柴胡桂枝乾姜湯牡蠣·炭酸·腹證·適應症·治驗	五八
一、大柴胡湯枳實腹證適應症	六二
一、大柴胡加石膏湯適應症	六四
一、四逆散腹證·適應症	六五

一、排膿散腹證·適應症·····	六五
一、排膿湯適應症·····	六六
一、白虎湯石骨·知母·適應症·····	六七
一、白虎加人參湯適應症·····	六九
一、白虎加桂枝湯·····	七〇
一、竹葉石膏湯竹葉·麥門冬·適應症·····	七一
一、小承氣湯腹證·適應症·····	七二
一、大承氣湯大黃·厚朴·芒硝·礬炭·腹證·····	七四
一、舌黑胎·····	八一
一、舌芒刺適應症·····	八二
一、調胃承氣湯腹證·····	八三
一、茵陳蒿湯茵陳蒿·山梔子·適應症·····	八六
一、瀉心湯腹證·適應症·····	八七
一、桃仁承氣湯腹證·適應症·····	八八
一、大黃牡丹皮湯牡丹皮·冬瓜子·腹證·適應症·····	九〇

一、桂枝茯苓丸腹證・適應症	九十二
一、澤海湯腹證	九十四
一、當歸芍藥散芎藭・腹證・適應症・言瘀血多在身體左側之故	九十五
一、下血丸腹證	九十七
一、抵當丸	九十八
一、大黃廩虫丸適應症 <small>（瘰癧）</small> ・一肺結核・二癩毒・三淋疾・四疔腫 <small>（疔瘡）</small> ・五血行器血液病及新陳代謝病・六癩疾	九十九
一、甘草小麥大棗湯腹證	一百一十二
一、酸棗仁湯適應症	一百一十三
一、八味丸腹證・適應症・治驗	一百一十四
一、三物黃芩湯腹證・適應症	一百一十六
一、炙甘草湯腹證・適應症・治驗	一百一十七
一、芎歸膠艾湯艾葉・腹證	一百一十九
一、黃土湯膠證・適應症	一百二十
一、人參湯腹證・適應症	一百二十一
一、乾姜黃連黃芩人參湯腹證・適應症	一百二十三

一、半夏瀉心湯	適應症	二四
一、生姜瀉心湯	二六
一、黃芩湯	腹證・適應症	二八
一、黃芩加半夏生姜湯	適應症	二九
一、白頭翁湯	適應症	三〇
一、白頭翁加甘草阿膠湯	三〇
一、小半夏湯	三一
一、半夏茯苓湯	虎翼飲・伏龍肝湯・適應症	三一
一、生姜半夏湯	三三
一、半夏厚朴湯	紫蘇葉・適應症	三四
一、乾姜人參半夏丸	三六
一、橘皮枳實生薑湯	橘皮	三六
一、橘皮湯	三七
一、橘皮竹茹湯	竹茹・適應症	三七
一、橘枳茶	腹證・適應症	三九

○	木防己加茯苓湯	腹證・適應證	一四〇
○	木防己去石膏加茯苓湯	腹證・適應證	一四一
○	大建中湯	蜀椒・飴・腹證・適應證	一四九
○	附子粳米湯	腹證	一四三
○	當歸四逆湯	腹證	一四四
○	兼用法	多分の色然已者 牛中並下五三受	一四六
○	伯州散	適應證	一四六
○	疔病之解		一五〇
○	走馬湯		一六一
○	大陷胸湯		一七〇
○	十棗湯		一七一
○	桃花加芒硝湯		一七三
○	參連湯		一七四
○	鷓鴣菜湯		一七四
○	附錄 藥品用部		一七六

緒言

本書之目的

余之爲本書。在以西洋醫學原理。解說醫聖張仲景師所創設之東洋古醫學。而昌明其長處。同時探出近代治療術之短處。以期二醫學之融合統一。鈍劣如余輩。雖未足以當斯大任。苟得爲其連鎖之媒妁人。固所願也。讀者諸君。幸勿以余爲妄信漢醫學之頑愚者。斯可矣。

對於初學者之注意

古醫學初似曖昧漠然。視之雖難捉摸。實則不然。蓋自具始終一貫之條理。蔚爲成功之一大學術。譬之數學。雖些微之謬誤。亦未許介在其間。故若行之不顯乖條理。自得克奏出奇的偉效。偶一反之。非特無功。且從而爲害。欲究此道者。先於此點。不可不留意也。

古醫學於方於證。如影隨形。實須臾不可離者。蓋離方則無證。忽證則無方。必明於證之一面。復合以其他方面方意之研究。此亦不容意忽也。

於古醫學診斷之標的。主在腹症。脈證次之。舌候及其他之各種的症狀又次之。故初學者。先宜就學腹證。尤不可忽略視之。欲明究方意。亦可謂卽方劑之精神。當究其組成藥物之性能爲第一。學者宜以仲師及東洞翁之所論爲經。諸子百家之說爲緯。（經之對）精研以得之。

本書內容中之備考

古劑之用量。蓋以大人用量而言。小兒可準洋方之例。減量用之。煎方皆食前一時間與之。施用丸散時。亦可兼取此法。後之二三十方。當以此爲規矩也。

對於讀者希望及其他

關於下瘀血丸、大黃廔蟲丸、抵當丸、三方之所說。係著者之新發見。爲平生心血之結晶。雖無發明。讀者其勿輕輕看過。引用諸說。亦有不用和譯者。限非費解之處。故儘採錄原文。不僅爲欲避免和譯冗長之弊。蓋恐沒却其真也。讀者諒之。

恩師和田先生著醫界之鐵椎。宜與本書參閱併讀。古醫學之面目。益判然也。

著者口所欲言。只以筆鈍行文晦澀。有缺意義之澈底者。在所難免。亦請讀者諒之。

著者識

臨牀應用漢方醫學解說

湯本求真著



醫學得業士 湯本求真 著
中醫士 劉泗橋 譯述

古醫學之精神

古醫學之目的。於人體內之病毒。或依汗吐下和之四方法。排除於體外。或使之中和。總在致其無毒。故以下所說幾多之論說。與什百之方劑。盡皆以達此爲目的。要不外爲最完善之方法也。

桂枝湯

桂枝 芍藥 生姜 大棗各九、〇 甘草六、〇

右以水二合半。煎至一合。去滓。一日三回溫服。

此方爲衆方之嚆矢。尤爲諸方之基本。以下當詳論之。

漢方劑多據經驗而成。非如洋藥之注意化學的研究。其組成藥物之生理的作用。及醫治效用。雖缺乏明瞭之判別。然可旁探洋方藥物學之原理。以爲解說之也。

但關於藥物之詳說。據全部集成藥物學。

桂枝

桂枝（桂皮）

桂枝產中國南部及安南。為樟科之樹皮。主要成分為桂皮油。傍含鞣酸、樹枝護膜等。

桂枝之作用。其揮發油與鞣酸。似為主要之物。能亢進胃液。及唾液之分泌。以振起消化器。

桂枝對於健胃驅風及子宮出血。可與施服。然在產婆催產藥。間亦有用之者。桂枝屬芳香性

神經藥。

芳香性神經藥之通性

芳香性神經藥之通性

本類之屬。以含有揮發油取效。此揮發油得有之於植物性及其動物部分者。與含有其他香蠟性

不明物質之一二動物性產物也。本類之藥物。隨藥效的分類法。多屬於亢奮藥。及回蘇性腦

藥之物。往往亦依其用量之差異。奏有鎮痙藥之效用也。

藥徵（東洞翁著）曰。桂枝主治衝逆也。旁治奔豚、頭痛、發熱、惡風、汗出、身痛。

芍藥

藥徵曰。芍藥主治結實而拘攣也。旁治腹痛、頭痛、身體不仁疼痛、腹滿、咳逆、下利、腹脹。

生薑

生薑（薑根）產於熱帶亞細亞。以及其他之溫帶熱帶各地。所培養姜科之宿根草。其根莖皆

致乾燥物也。（中略）有特異佳快之臭氣。味頗辛烈。其主成分。為其香味之要素者。由成

於尚未明瞭之一種揮發油。(一乃至二%)

生姜在粘膜上。逞刺激作用至強。即施皮膚上。亦來嫩灼及變質之狀。若內服則感芳香佳快之辛味。胃中生有溫感。

爲食用最汎。(殊行於東洋諸國)多食能奏促進消化之功。醫療上實罕有倫比者。爲健胃驅風藥。一回〇、二乃至一〇與之。

但以上所說生姜之與乾姜。亦頗混同也。

續藥徵(村井大年氏)有曰。

生姜主治嘔。故兼治乾嘔噎氣。(噎氣)乾噎(乾噎)食臭(自覺食物之臭氣)噎逆。(吃逆)故如咳唾。吐涎沫不止。似噦不噦。亦生姜所兼治也。

緩和藥之通性

緩和藥之通性

緩和藥。多能減弱身體各部之緊實性。使其部分弛緩。隨呈軟化鬆解爲目的。爲該類藥物總稱之謂也。是以欲求其功效最顯著所呈現之醫療的有力物。實爲濕溫。(濕潤與溫熱之協同作用)本類所列之藥物。多辨濕溫之力。或爲濕溫之保持者。始獲奏効也。凡生體組織構成之特殊收縮性。對於濕溫之緩解作用。因毛細管血液充盈。吸收部分而愈增其容積。同時對於局部過敏之知覺。以及刺戟性之減退。皆以弛緩始達安然之狀態也。

澱粉護膜。及含有粘液之植物部分。亦屬緩和藥。其他動物性膠質亦得列入也。然此等之物質。非自有特立得爲緩和之性質。惟與水結合之後。始能逞此作用。卽本類物質之比較的少量。同水（溫度殊高之水）則生物混和之溶液。其中蘊蓄濕溫。爲保護接觸生體部分固有之濕溫。亦賦有功效也。

糖質。雖缺乏前記之緩和作用。然與澱粉以下之諸物。於化學上實相接近。其緩解刺戟及調和之功用。在應用上與其他之緩和藥。實有共通之處。故得列入本類也。

緩和藥除其中具有若干之滋養的效力外。更有第二之應用。卽以一般調和的之效力爲限。如表皮與上皮或又粘膜及痂皮。苟當創傷的表面。能爲補償物作用。又對炎症之刺戟局部。或外氣溫冷。器械的化學的侵襲。完成防禦之任務。斯又緩和藥稱保庇藥又名包攝藥之由來也。以故關於此點。消化器之炎性。及潰瘍性疾患。腐蝕性及苛烈性物質之中毒。氣管之刺戟狀態。（咽喉內乾燥有粗糙青辣之感覺且在輕咳頻發時）用此處方。若爲外用。卽炎症剝脫潰瘍等。至有知覺過敏之部。可用爲保護的防衛。於含嗽水。注射劑。罌場劑。塗敷劑。亦得如綳帶料可採用之。以上兩種之目的。於用緩和藥之際。欲奏效迅速。而達完全之成功。其藥物當爲液狀。（少現柔軟）且以溫和多留存於局部爲貴。茲不備論。

漢方於甘草、大棗、蜂蜜等之既屬無害。且富滋養力。兼有機性緩和藥。以之溫服。能現鎮瘧_{瘧疾}。

大 棗

作用。此於上述之理相符。洋方家大抵非冷服無滋養力。即無機性之水劑。或以有毒之麻醉劑注射。企圖達此目的。謂其能解前理。又烏足以語此哉。

其他本類之藥物。應用於滑膩藥。又有至以粘合藥爲用者。甲（如脂肪類）生體器官之表面。與之接觸時。能減物體之粘著。並促進體腔之凝固物、結塊、壅塊、及異物之排泄。

大 棗

大棗富於糖質。有甘味以供藥用。

藥徵曰

大棗主治羸引強急也。旁治咳嗽、奔豚、煩躁、身痛、疥痛、腹中痛。

甘 草

甘 草

甘草含有葡萄糖及 (Glycyrrhizin) 之甘味物。其生理的作用。與一般糖質無大差異。惟 (Glycyrrhizin) 較其他糖質。似稍多促進便通之作用。其至純粹者一〇、〇乃至一五、〇即有緩瀉下之功。又咽頭及喉頭於乾燥粗糙之感覺。亦有緩和之效也。

甘草（中略）與甘草羔。古來稱能緩和爲呼吸器管之加答兒症。及有祛痰之作用。

藥徵曰

甘草主治急迫也。故治裏急、急痛、羸急、旁治厥逆、煩躁、衝逆、悸、咳、驚、狂、悲、

傷、痞鞭、利下。

又曰

仲景用甘草也。其急迫劇者則用甘草亦多。不劇者則用甘草亦少。由是觀之。甘草之治急迫也明矣。古語曰。病者苦急。急食甘以緩之。其甘草之謂乎。

甘草湯

甘草 八、〇

右以水一合。煎五勺。去滓。溫服。

師曰『少陰病二三日咽痛者。可與甘草湯。』

此方之治咽痛。漢方雖共承認之。然非只限此症。不問何部分。苟呈急迫。卽緊縮性急劇時。可悉用此方。東洞翁擴其應用。云治病逼迫及咽痛。實至論也。

尾臺榕堂氏曰

凡用紫圓、備急丸、梅肉丸、桔梗白散等。未得快吐下。惡心、腹痛、苦楚悶亂者。用甘草湯吐瀉俱快。腹痛頓安。

孫遜思氏曰

凡服湯嘔逆不入腹者。先以甘草三兩。水三升。煮取二升服之。得吐但服。不吐益佳。消息定後。服餘湯。卽流利更不吐也云云。湯者煎藥也。三兩三升二升者。中國之衡量也。得吐但服者。初服之時。却有嘔吐。但可不顧而遲服之謂也。消息定後者。爲鎮吐後也。然此嘔吐症。與半夏生薑之主治水毒。因有異者。卽在胃筋_筋急_急。而增加急劇之緊縮性。得緩和藥之甘草。用以濕溫之。胃筋卽復常態。嘔吐却自止矣。

以上所舉。只言其內用之點。若施之外治。其效果亦無差異。明於以下之治驗。便可知矣。

治 驗 一五十餘歲之婦人。醫以婦人科的治法投之。或因藥液之強烈。其後陰部腫脹糜爛。疼痛不能忍。余變本方爲局部療法。痛忽鎮靜。創面亦隨而全愈也。

腹證奇覽(和久田寅叔虎氏著)有曰

夫桂枝湯之方。在三陽(云太陽·少陽·陽明也解見下)之首。爲百病風證用於解肌救表之主劑也。其所主爲桂枝。蓋桂枝氣味芳香辛甘。能托正氣與津液於肌表。正氣既達肌表。津液得潤軀殼。衛榮於以和諧。(衛榮血管血液也)邪氣自能解散。瘀水却自回降。上衝之氣。隨得平低。病之所以愈也。然正氣已有鬱塞。水血爲之瘀滯。筋脈_筋急_急。血管欲_欲舒不能。外現拘攣疼痛。乾嘔等之證。是非桂枝獨力所能解也。故以芍藥爲臣。解其血分。佐之生薑大棗。以祛胸膈胃管之水。甘草爲使。以和諧藥。且緩內外之急。合用則健胃陽。宣正氣。蓋芍藥能解血脈之拘攣。甘草能

緩諸急迫。二味相合。名爲芍藥甘草藥湯。治見脚掣急處。大棗治胸膈間停水。以緩掣急。若十棗湯。甘草小麥大棗湯。葶藶大棗瀉肺湯之類。皆治懸飲、悍急、喘鳴、諸證之劑。不可不知也。生薑之辛味。能解胃管之停水。且能健胃氣進飲食。生薑雖善治嘔。古方獨無專主生薑以治嘔者。(中略)其治乾嘔者。夫亦能解胃口之停水故也。案禮記檀弓曾子曰。『喪有病。飲酒食肉。中有草木之滋焉。以爲薑桂之謂也。』此言心喪而身有病。從而血氣衰弱。雖曰養生重用酒肉。但用酒肉。恐其氣滯。必配諸草木之藥物。使酒肉之氣不滯。得以流行四肢。曾子爲桂枝生薑言者此也。滋訓爲增。正氣與津液得榮於外也。是生薑善開胃口。進飲食。調停滯。桂枝善助正氣。兼能輸飲食精液外達於肌表。古之養生法。必用桂姜者。要非無故。孔子食不撤姜。亦非徒嗜也。蓋意在斯乎。於古方生薑配合之法。尙宜並考之。

師曰

太陽師曰。太陽之爲病。脈浮、頭、項、強痛、而惡寒。(此即太陽之義。必當知也)中風(中風者、傷風也、卽感冒也)、陽浮而陰弱、(此言脈法、陽者爲外、陰者爲內、脈浮於外、則內反弱也、桂枝證之脈狀也)翕翕惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。(翕者縮也、謂畏寒者然有退色也、淅者如受冷水灌注、猝然凜冽者也、惡風者見風色然而畏、畏則猶水之灌春貌也、翕者合也、言熱勢併合、一如鳥毳外張、而有發熱義也。)鼻鳴乾嘔(鼻鳴乾嘔者、衝逆之候、卽表邪

感冒之證也。者。桂枝湯主之。(以下言何湯主之之字皆略之)

又曰。『太陽病。頭痛、發熱、汗出、惡風者。』此不必解。

又曰『太陽病下之。氣上衝者。可

與桂枝湯。不上衝者。不可與之。』

此太陽病宜發汗者。由於誤下。因

而反動。以致血衝身半以上。故宜平

其上衝。宜以本方治之。若不上衝

者。則不可與。

又曰。(上略)『若其人脈浮緊。發

熱汗不出者。不可與也。』本方有浮弱之脈狀。如治以自汗出之劑。則大禁忌。此為麻黃湯之

適應證。若加煩躁或口渴者。為大青龍湯證矣。

又曰『太陽病。外證未解。脈浮弱者。當以汗解之。』此已發汗。大勢已解。尚有頭痛、發熱、

惡風等外證。(或曰表證)惟浮弱之脈未去。宜以本方發汗之。

又曰『太陽外證未解者。不可下也。下之為逆。欲解外者。』謂此與前條同證者不可下。下之則

逆。宜發汗。若欲發汗者。常用本方治之。

桂枝湯頭項強痛圖

第一圖



又曰。「太陽病先發汗不解。而復下之。脈浮者不愈。浮為在外。故令不愈。今脈浮。故知在外。當須解外則愈。」此太陽病發汗後不愈。而用下劑誤下之。(仲師示本方之用途故假設此條也)然脈浮亦無用下之必要。何則。以脈浮病在肌表之徵。本當發汗。而反下之。若以脈浮為主。即以本方治之可矣。

又曰「病常自汗出者。(中略)復發其汗。榮衛和則愈。」此無故而自汗出者之證。以本方發汗之則愈。

又曰「病人臟無他病。時發熱自汗出而不愈者。此榮氣不和也。先其發汗則愈。」臟者指腹中也。先其時者。發熱自汗出症。發作前意也。

桂枝湯氣衝上腹拘急圖 第二



亦不大便。頭痛、發熱、小便赤色。雖似桂枝湯證。然桂枝湯治病毒在於肌表。其證小便清白。

以上二證。若證而不治。則轉入為黃芪建中湯。此理要宜知也。

「傷寒不大便六七日。頭痛有熱。小便反赤者。與承氣湯。其小便清者。不在裏仍在表也。當須發汗。若頭痛者必衄。宜桂枝湯。」此勝(室扶斯)六七日

決無赤色者也。此頭痛、發熱、小便赤者。爲病毒在裏證也。故宜大承氣湯。反之若小便清白者。卽病不在裏而在表。卽用桂枝湯以發汗之。是故漢方有正確之法則。尤當習知也。『若頭痛者必衄』者。病在表也。卽『若頭痛者必衄血』之略也。然頭痛及衄必上衝達於極度。若以本方平之。則二證卽同時而得解也。

與麻黃湯證衄血之別

麻黃湯中亦有桂枝。故雖有衄血上衝之證。然此則喘而無汗。脈浮緊之衄血也。桂枝湯證者脈浮弱、自汗出。至右直腹筋掣急。(其掣急壓痛因不顯著若非精於診斷者不能彷彿得之)而衄血者也。

與桂枝茯苓丸證衄血之別

桂枝茯苓丸證。(方中有桂枝)雖有上衝衄血者。然非前二方證爲生理的血液(比較的云)上衝之比。此由瘀血(變敗血)之上衝。故桂枝湯證。雖有右直腹筋掣急上衝。若桂枝茯苓丸證。在臍之周圍或臍下必有瘀血塊。左直腹筋掣急。心下悸。上衝衄血。於桂枝茯苓丸證衄血外。雖有種種之出血。然之二方證者。要不脫乎衄血也。

又曰

『傷寒醫下之。續得下利清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯』此卽「醫」室扶斯「醫以下劑誤下。故續得下利。清穀(卽完穀下利而糞

不臭) 不止。身體疼痛者。宜急救裏。卽用止瀉劑以救消化器也。後身體疼痛。消穀自調。(卽正規如平時之常便)者。宜急救表。卽以發汗劑救濟肌表也。欲救其裏者。宜用四逆湯。欲救其表者。宜用桂枝湯也。

又曰

(上略)『又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脈實者宜下之。脈浮虛者宜發汗。下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。』此猶麻拉利亞之熱。日暮時發熱者。陽明也。(陽明之解在小承氣湯條下)此證脈充實者可以下之。脈若浮而虛。(張介賓曰虛脈無力也、無神也。何夢瑤曰、虛不實也、虛甚則中空名芤。)者。宜發汗也。欲下者則與大承氣湯。欲發汗者。宜以桂枝湯也。

又曰。『太陰病脈浮者可發汗。』何謂太陰病。師曰。『太陰之爲病。腹滿而吐_利。食不下。自_下利_益甚。時腹自痛。』故明爲下痢病者。然本方雖屬下痢。脈若浮者。亦與本方汗之則愈。

生生堂治驗(中神琴溪氏門人編)曰

御幸街三條南俵屋治兵衛之妻。患痢數年。食少。身體羸弱。肌膚枯錯。(枯錯意謂狀如鯨魚皮也)起臥須人。醫與人參附子等之止瀉劑不癒。先生診之。與大劑(比尋常量增加)桂枝湯。重衣溫覆。發汗後。下痢自愈。

上撰師論之要者詳釋之。外此難免挂一漏萬。可依前說類推也。

適應症 頭痛、感冒、熱性病之初起等。

桂枝加桂湯

桂枝加桂湯

桂枝二、〇 芍藥 大棗 生姜 各七、〇 甘草五、〇

煎法用法同桂枝湯。

奔豚

師曰。(上略)『必發奔豚。氣從少腹上衝心者。』奔豚者何。金匱要略曰。『奔豚病從少腹起。上衝咽喉。發作欲死。復還止。』少腹者。下腹也。藤田椿齋氏曰。奔豚者、言悸而衝逆甚之狀也。

以此義解之。又東洞翁對本方之定義。曰治桂枝湯證而上衝劇甚者云云。宜參照前文以自得之。

古方便覽曰。

奔豚

奔豚者氣也。如物塊自少腹急起。上衝心下。其痛如刺。有兼積氣(胃滯)者。宜兼用三黃丸。或

硝石大丸案即大黃芒硝甘草人參治腹中結毒亦治心下痞鞭(若余則決兼用三黃丸)即瀉心湯方改爲丸)或下瘀血丸)一男

子年十六。患積聚數年。發作有時。奔豚氣上衝心。不得息。無力不能以俯仰。不思飲食。用此

方兼服三黃丸。愈後。竟不復發。

余妹二十歲時。患頭痛恰如錐刺。劇痛不可忍。盡余所知。投以「安知必林」「臭剝」等劑。不效。

後據本方用之。一服少安。二服大輕快。不出二日全快矣。

頭痛

桂枝加芍藥湯

桂枝 大棗 生姜各七、〇 芍藥一四、五 甘草 五、〇

煎法用法同桂枝湯。

師曰『本太陽病。醫反下之。因而腹滿時痛者。屬太陰也。』此宜發汗之太陽病。醫反誤下之。因腹部滿時痛者。以本爲太陽病。下則變爲太陰。故當用本方。若非真爲太陰病者。亦可用治太陽病之桂枝湯。以腹滿時痛下痢之症。皎然若揭。故方中增加大量之芍藥爲主藥。別立一方。名曰桂枝加芍藥湯、與太陽病之腸浮者可發汗之用桂枝湯。其理正同。其分別在以芍藥爲主藥。與桂枝爲主藥耳。惟其症狀。亦不無差異也。

本方證之腹滿。只腹^時膨滿也。因腹內無充實之病毒。故按之不鞭。右直腹筋亦強度攣急。且感壓痛。現芍藥甘草湯之類似證。東洞翁曰。治桂枝湯證、而腹拘攣之劑者也。可謂言得其要矣。本方分言之圖如左。

桂枝

大棗

生姜 桂枝湯

桂枝加芍藥大黃湯

芍藥甘草湯

芍藥
甘草

適應症

有熱性下痢、消化不良症、腹痛、手足攣急、難以屈伸等症。

仙方桂枝湯加芍藥大黃湯

桂枝加芍藥大黃湯

桂枝 大棗 生薑各七、〇 芍藥之四、五 甘草五、〇 大黃二、五

煎法用法同桂枝湯

師曰『本太陽病。醫反下之。因而腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。』本方證與桂枝加芍藥湯證相同。其所異者。腹內有多少充實之病毒。故按之稍鞭痛。即為當下之要點也。

適應症 輕症赤痢、消化不良、及同性下痢、腹痛等。

桂枝加附子湯

桂枝加附子湯

桂枝 芍藥 大棗 生薑各七、〇 甘草五、〇 附子一、〇

煎法用法同桂枝湯

師曰。『太陽病發汗。遂漏不止。其人

惡風。小便難。四肢微急。難屈伸者。

』此太陽病發汗太過。遂致汗漏不止。

（非表證之自汗出所謂脫汗也）惡風

（非表證之發熱惡風蓋汗後衰弱體表

及末梢血液循環減少故也）小便出不

快。四肢掣急。難於屈伸者。謂即本

方所主治也。然本方異於桂枝湯者。

僅附子一味之增減。於症狀即大相逕

庭矣。故附子之應用。不可不知也。

東洞翁曰。治桂枝證而惡寒。或四肢微痛者。宜併考之。

桂枝加苓朮湯

桂枝加苓朮湯。

桂枝 芍藥 大棗 生姜 茯苓 白朮各七、〇 甘草五、〇

桂枝加附子湯之圖

第三圖



茯苓

苓

煎法用法同桂枝湯

茯苓

藥徵曰

茯苓主治悸及肉瞤筋惕也。旁治小便不利。頭眩煩躁。悸者。心悸動。見其波及於腹部也。肉瞤筋惕者。震戰搖擗也。

又曰

曰心下悸。曰四肢聶聶動。曰身瞤動。曰頭眩。曰煩躁。同一悸類也。若小便不利而悸者。用茯苓則治。無悸證者。用之則未見其效也。然則悸者。茯苓所主治。而小便不利者。是其旁治也。頭眩煩躁亦然。聶聶身瞤動者。震戰搖擗之類也。

著者曰

茯苓主尿量減少。或尿意頻數（皆屬尿管排泄之減弱）之症。或心悸亢進。或眩暈。或震戰搖擗。或煩躁。或驚悸。或如上二症或數症相兼者。

尤

藥徵曰


尤主利水也。故能主治小便自利不利。旁治身煩疼、痰飲、失精、眩冒、下利、喜睡。

師曰

『服桂枝湯或下之。仍頭、項、強痛。翁翁發熱。無汗。心下滿微痛。小便不利者。』
東洞曰。治桂枝湯證而悸。小便不利者。

此皆至當之說。闡發本方效力。可無遺憾矣。然著者之意見。果何謂哉。曰。本方者。認為桂枝湯、茯苓附朮湯、^{桂朮}茯苓甘草湯三方之合方。故當見三方之合併證也。欲知此證者。當先貫通以上三方之證。綜合而觀之。尙宜參照二大先生之說。

本方分解之圖如左



適應症

頭痛、眩暈、耳鳴、眼疾、心臟病、脚氣、胃疾患等。

桂枝加苓朮附湯

桂枝 芍藥 大棗 生姜 茯苓 白朮各七、〇 附子一、〇 甘草五、〇
煎法用法同桂枝湯。

附子（與烏頭異名同物）

雙鸞菊根（即草烏頭與烏頭附子同質）之作用。在於（Aconitum）故茲將該物作用。概述如左。於局所（皮膚及粘膜）則起焮灼及劇痛。漸次鈍麻。故內服覺有劇烈之苦辣味。先起口腔、食道、食管之灼熱。惡心嘔吐。腹中雷鳴。後感全身灼熱如蟻行。自覺顏面潮紅。種種之特異。後呈全身知覺麻鈍。次則三叉神經之第一枝劇痛。發現頭痛、眩暈、耳鳴、瞳孔散大。陷於無慾。及精神昏惰。心動一時增進。漸復徐緩。遂至休止。血壓斷絕。呼吸始則徐緩。終則停止。體溫亦比較低。筋肉痿弱。甚或強直不能步行。惟腦官能比較的能得長時間保存耳。其他則尿、唾液、汗液、之分泌。漸次增加。但於各器官作用之原因。大抵尙屬不明。

醫藥上對雙鸞菊根本質（一日三回〇、〇二五乃至〇、五極量一回分〇、一、日〇、五）照此應用者實不多觀。多用越幾斯、或丁幾。如關於種種之神經痛、三叉神經痛、肋間神經痛、股神經痛、痛風、僵麻質斯等之疼痛症。概為末梢的知覺過敏而用。次或有因於熱性及炎症疾患

用者。(急性氣管支加答兒、肺炎、胸膜炎等。)心臟作用之亢進、神經性心動悸、亦皆應用之。稱有鎮痛及解熱之效。又心臟之器質的變化。及漿液膜之炎性滲出物等。亦有用爲利尿藥者。然其奏效。常有可疑。致漸來醫界之排斥。

附子烏頭應用之法則

附子烏頭應用之法則

使用附子烏頭。有下列一定之法則。若不顯背此例。未必定發中毒症者。然因藥力之反應。亦能呈一時的之不快現象。但無繼續持久者。待其經過。病即大減。故知非中毒症也。余常審爲本藥之適應症。毫不遲疑。竟投一日量一、〇(成人)再隨症之輕重。雖逐漸增至一日量一〇、〇以上。亦無大害。惟附子原於熱性及炎性疾患。如心臟作用之亢進者。則大所禁忌。若不慎用之。功效未見。反有害焉。斯非附子之罪。實取用者之過也。不省己之不明。而嫁罪藥品。此又神藥爲醫界所排斥之由來歟。

藥徵曰

附子主逐水也。故能治惡寒。身體四肢。及骨節疼痛。或沉重。或不仁。或厥冷。旁治腹痛。失精。下利。


附子用量之多寡。及配合如何。使呈種種之作用。然吾人日常皆小量。或中量者。即準下述之

理。

心力若較常態沉衰。則流入動脈系之血量。速度減退。故脈現沉微弱遲象。良以末梢及體素之血量減少。卽該部之新陳代謝及發溫生機。亦隨之衰弱。遂來惡寒。甚或厥冷。此時靜脈血及淋巴之歸流。失其活動。致來末梢部下肢之停滯。而感覺沉重。若滲漏機亢盛。則或浮腫。外如靜脈中之尿酸。及其他老廢物質。若刺戟知覺神經。則又發生疼痛。果其強度持久。終必知覺麻痺。又或局部之營養不足。亦致運動神經及筋肉麻痺。倘有心力比前更爲衰弱。此則不僅末梢及表部而已。且亦波及腹部。發生疼痛麻痺下利等症。此時若用附子。不但心力可告旺盛。卽血行亦可恢復。鬱滯之水毒。或從汗。或從嘔吐。或從下利。或從小便。排出於體外。諸患頓如雲消霧散矣。故附子用於心力沉衰。脈沉微弱遲等之脫候。或惡寒或厥冷。或知覺不全麻痺。或全麻痺。或運動不全麻痺。或全麻痺。或沉重疼痛。或隤急。或腹痛。或下利。或浮腫。或失精。或前二證乃至數證兼發爲目的而應用之。前述附子證。僅以新陳代謝及發溫生機減衰。不涉其他純粹之附子劑症。稍在重篤者。呼氣寒冷。舌不生胎（舌無胎，其色恰如混合墨汁，有呈潤澤者卽附子證也。）且溼潤。肌膚粟起而却冷。腹部軟弱無力。尿色必清白也。

本方認爲桂枝湯、桂枝加附子湯、桂枝加蒼朮湯、真武湯、苓桂朮甘湯、茯苓甘草湯六方之合方也。故欲熟知此方者。宜先理解六方之證。綜合而苦索之。俾有所獲耳。

本方分解之如左圖



本方應用極廣。爲吾人一日不可或缺之要方。當專心努力以自得之。

運動症 頭痛、眩暈、腦出血、半身不遂、顏面神經麻痺、眼疾、耳鳴、慢性氣管支炎、心臟操

能不全、肺氣腫、喘息、慢性胃疾患、腳氣、麻痺性疾患、神經痛、「佝僂質斯」微毒性骨

痛、同性潰瘍骨及關節結核等。

治驗 一男子年六十餘。由高下降。頭部打撲。失神。後罹外傷性神經症。續發眩暈頭痛。耳

鳴健忘。精神鬱幽。震戰脚弱等症。身神無主。廢業數年。診之。目閉。脈沉弱。起則震戰動惕欲倒。診腹。直腹筋兩側俱見孳急。但左側較強。臍之周圍及臍下有瘀血塊。按之則痛。腹袋

軟弱覺冷。下肢冷却。尿意頻數。大便祕結。據本方倍加附子三倍。與桂枝茯苓丸（三倍）合方。兼用抵當丸。（五、〇一日三回）處服一週。久不再至。後伴家中病者來曰。服後尿意增加。且下多量之黑便。藥服未盡。而病竟告癒矣。

眞武湯

茯苓 芍藥 生姜各一、〇 白朮七、〇 附子一、〇

右以水二合五勺。煎一合去滓。一日三回溫服。

師曰

『太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩身動。振振欲僻地者』。太陽病發汗後。汗出仍發熱者。謂真寒假熱之症是也。（真者寒證即陰證、爲附子所主治、假面的之熱證者、似陽證而實非也。）頭眩者眩暈也。身動振振者。搖擗震戰也。僻地之僻字。倒之義也。言欲僻地者。即欲倒於地上也。

又曰

『少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此爲有水氣。其人或咳或小便自利。或不下利。或嘔者。』此條之證。非語言所能達。若強解之。恐失命意耳。一

任讀者自究之。然不悟入本條。則桂枝加苓朮附湯。葛根加苓朮附湯。亦必不能運用。實有不容忽視者。要當潛心探討也。

真武湯之圖
第四圖



本方與桂枝加苓朮湯所異者。在桂枝之有無也。故首揭桂枝別之。然於實地。本方證少。而桂枝加苓朮附湯症為多。

尾台氏曰。治痿躄病腹拘攣。脚冷不仁。

小便不利。或不禁者。不仁者。知覺及運動麻痺也。小便不禁者。與小便自利同。自利之解。見於後。

腰痛腹痛惡寒下利日數行。夜間尤甚者。稱_為痲痺。宜此方。又久痢見浮腫。或

咳或嘔者。亦良。產後下痢腸鳴腹痛。小便不利。支體酸軟。或麻痺有水氣。惡寒發熱。咳嗽不止。漸成勞狀者。尤為難治。宜此方。支體酸軟者。四肢軟弱無力也。勞狀者肺結核狀也。

苓姜朮甘湯

苓姜朮甘湯

久痢或
浮腫
產後下痢

甘草 白朮各六、〇 乾姜 茯苓各一二、〇
右以水二合。煎一合。去滓。一日三回溫服。

藥徵曰

乾姜主治結滯水毒也。旁治嘔吐、咳、
下利厥冷、煩躁、腹痛、胸痛、腰痛。

師曰

『腎着之病。其人身體重。腰中冷如坐
水中。形如水狀。反不渴。小便自利。
飲食如故。病屬下焦。身勞汗出。衣
裏冷濕。久久得之。腰以下冷痛。腰
重如帶五千錢。』形如水狀者。身體見
水腫之象也。小便自利者。失禁或其
輕度。即尿道括約筋之全麻痺。或不
全麻痺之徵也。下焦者。即言臍以下之身體部位也。

與八味丸之鑑別

苓 姜 木 甘 湯 圖
第 五 圖



八味丸證亦有小便自利症。然其他尙有小腹不仁手足煩熱。或厥、冷、渴等證。以此別之。尾台氏曰此方加杏仁名腎着湯。治妊婦浮腫。小便自利。腰痠冷痛喘咳者。亦宜參考之。

適應症 夜尿症者。兼用伯州散有奇效。

苓桂朮甘湯

苓桂朮甘湯

茯苓一四、五 桂皮一一、〇 白朮 甘草 各七、〇

煎法用法同苓姜朮甘湯

師曰。『心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。身爲振振搖者』。心下逆滿者。自下向心下部上逆而膨滿也。此逆滿之水氣者。讀後條即可知矣。

上氣衝胸者。亦自下向胸上而衝也。起則頭眩者。欲立則眩暈也。身爲振振搖者。震戰症也。

又曰。『心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。』痰飲者停水也。心下痰飲云者。即胃內有停水也。支滿者。言有停滯膨滿之感也。故胸脅支滿者。其即心下及肋骨弓下。有此感覺也。目眩者。眩暈也。

又曰。『夫短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之』。短氣者。呼吸短息。心悸亢進之徵。有微飲者。胃內有小量之停水也。當從小便去之者。胃內之停水。言當從小便外

茶桂朮甘湯之圖
第六圖



治心下悸。上衝。起則頭眩。小便不利者云云。誠卓見也。

本方與八味丸之別

二方同治短氣。胃內停水。然其所主則不同。蓋本方以胃內停水爲目的。八味丸則以小腹不仁爲目的。其治胃內停水短氣者。猶其餘事。此其大別也。

適應症 眩暈症、震戰症、神經性、心悸亢進、心臟瓣膜病、胃疾患、水胞性結膜炎、虹彩炎、網膜炎、耳內疾患等。患眼者。宜加車前子六、〇——八、〇——一二、〇——二四、〇有奇

泄也。總之。因胃有停水。致心悸亢進。故宜用利尿劑。將停水排之體外則愈也。此即茶桂朮甘湯。或腎氣丸即八味丸之主治也。仲師之說如此。知二方之證。必有小便不利。卽尿量減少之症。故水氣蓄積體內者。必至胃內停水。及發短氣之症。用此利尿劑。則蓄積之水既去。前症亦即消散矣。外此若前條之症。其爲因亦同此理。故東洞翁對本方之定義曰。

效。

苓桂甘棗湯

苓桂甘棗湯

茯苓一四、五 甘草五、〇 大棗六、五 桂枝七、〇

右以水三合。煎一合。去滓。一日三回溫服。

奔豚

師曰『其人臍下悸者。欲作奔豚。』東洞翁曰治臍下悸。攀急而上衝者。臍下悸者。即有動悸在臍下也。茯苓之主治也。攀急者。言右直腹筋也。此大棗之主治也。上衝者主以桂枝。奔豚之解。在桂枝加桂湯條下。

適應症 發作性失神症

治 驗 一男子五十歲。患發作性失神症。一日一二回。間歇時毫無異狀。每日或隔日發作。不能外出。諸治無效。乞診於余。以本方增二倍爲主。兼用芎黃散。案即川芎大黃服後二三日。發作減少。續服二十日。竟獲全治。後不復發。

茯苓甘草湯

茯苓甘草湯

茯苓一四、五 桂枝九、五 生姜一四、五 甘草五、〇

芍藥甘草湯

右以水二合。煎一合去滓。一日三回分服。

東洞翁曰

治心下悸。上衝而嘔者。本方與苓桂朮甘湯異者。僅生姜與白朮一味而已。故此證可由苓桂朮甘湯證推知之。

芍藥甘草湯

芍藥 甘草各一四、五

右以水二合。煎一合去滓。一日三回溫服。

腹證

師曰『(前略)更作芍藥甘草湯。與之。其脚卽伸。(後略)』尾台氏曰治腹中攣急而痛者。小兒夜啼不止。腹中攣急甚者。亦有奇效。

右以直腹筋攣急爲此證之要的。腹痛或手足攣急不得伸者。宜以本方治之。

芍藥甘草附子湯

芍藥 甘草各一四、五 附子一、〇

芍藥甘草附子湯

右以水三合。去滓。一日三四回溫服。

腹證

卽前方證。但加附子證狀而已。

適歷症 腰神經痛。坐骨神經痛。關節

強直症等。

黃芪建中湯

桂枝 生姜 大棗 各五、五 甘草

三、五 芍藥一、〇 黃芪五、五 飴糖一兩二錢

右以水二合。煎一合。去滓。內飴糖微火煮融。一日三四回溫服。

藥徵曰

黃芪主治肌表之水也。故能治黃汗。盜汗。皮水。又旁治身體腫。或不仁者。

師曰「虛勞。裏急、悸、衄、腹中痛。夢失精。四肢裏痛。手足煩熱。咽乾口燥。」「虛勞者。病名也。古人命名。無不取諸於證。虛之云者空無物也。如骨皮爲外。其內則血肉精液也。今精液不榮肌肉。血滅流動之勢。肉引筋縮。顏面薄白無血色。但存皮骨。以內不充實。故謂之虛。」

芍藥甘草湯之圖



黃 芪 建 中 湯 之 圖



勞者疲也。血不榮肉。精不守骨。虛熱內入骨髓。故手足心熱。四肢痿軟。夜夢出精。手足前瘦。不能遠行。故名曰勞。裏急之裏。即表裏之裏。裏急者。言皮膚之裏引急。亦筋脈之謂也。悸乃心中悸。即胸內跳動也。衄者鼻血也。此衝逆所致也。腹中痛者。因於裏急故也。夢失

精者。妄夢而泄精也。精者主靜。法主內守。今內虛失守。故夢而為遺。亦下焦之虛也。手足煩熱。言手足心蒸熱也。痠痛者。良以肢體瘦弱。痠瘳且痛也。咽乾口燥者。血氣衝逆。虛熱之候也。是異於口舌乾燥者。若口舌乾燥。則為胃中實熱之候。故除去舌字。曲為咽乾口燥說耳。均屬虛勞之見證。(腹證奇覽)

當歸建中湯

桂枝 生姜 大棗各五、五 甘草三、五 芍藥一、一、〇 當歸七、〇 飴糖一兩二錢
煎法用法同黃芪建中湯

當歸

尾台氏曰。有運血和血之效。摘要曰。主治婦人漏下。藥選曰。治婦人產後惡血上衝。和田先生曰。培養血液。

師曰。『婦人產後。虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦小腹拘急。痛引腰背。不能飲食。產後一月。日得服四五劑爲善。令人強壯。』刺痛者。如鍼刺作痛也。吸吸少氣者。吸氣短弱。因於急迫也。

右二方之證。源於桂枝湯證。經桂枝加芍藥湯證而成者。故欲明此二方證者。尙宜參照桂枝湯及桂枝加芍藥湯也。

歸著建中湯

桂枝 生姜 大棗各五、五、甘草三、五芍藥一、〇 黃芪五、五 當歸七、〇 飴糖二兩二錢
煎法用法同黃芪建中湯

此卽右二建中湯之合方也。余用此方。常較前二方時爲多也。

腹 症 兩旁直腹筋皆孳急。上下引張如弓弦。甚則其他腹筋俱見孳急。腹裏一面如板狀。腹內若空虛者然。其他尙宜參見前二方證。卽可知矣。

黃耆、苦參、桂枝、苦酒湯

治 驗 一十三歲之女兒。育時九月即離母懷。此因胎養不足。生來虛弱貧血。易侵感冒。身

體瘦長。雖盡種種方法。亦不肥滿。近忽無故涕泣不止。夜不安眠。診之知為虛勞質者。面汚

兼作黃蒼白色。脈微弱而數。胸廓面扁而纖長。胸骨及脇骨。皆露於外。心動及腹部之大動脈。

搏動強盛。微有胸脇苦滿之狀。腹筋變急著明。臍下有瘀血塊。以本方合柴胡桂姜湯。兼用大

黃廔虫丸。(二、〇一日三回)服之。五日涕泣全止。且能入睡。迨服續劑。益見佳良。當本春

流行性感冒盛行時。亦不罹患。通計月餘。苦患悉解。

一八歲之女兒。近來頻發眩暈卒倒。來院求診。與前病者同證。但不瘦削為異耳。與前同方減

二分之一。服三日不復發作。後再服二週。即告愈矣。

黃耆芍藥桂枝苓酒湯

黃耆一九、〇 芍藥 桂枝各一一、〇

右以水二合五勺、煎至一合去滓、一日三回分服。

適應症 於腋臭有效。但本方宜與柴胡桂枝乾姜湯、桂枝茯苓丸合方。兼用下瘀血丸、或桃花加

芒硝湯。

五苓散

澤瀉三、三 豬苓 茯苓 朮各二、五 桂枝一、七

右爲末混和。一日三回分服。或以水二合五勺。煎至一合去滓。一日三回溫服。

藥徵曰 澤瀉主治小便不利冒眩也。旁治渴。豬苓主治渴而小便不利也。

本方中之澤瀉、豬苓、朮皆利尿藥。惟澤瀉、豬苓兼有治渴作用。桂枝治發熱或上衝。故本方治發熱或上衝、渴、小便不利（腎臟機能障礙）之方也。師說（前略）『若脈浮小便不利。微熱消渴者。五苓散主之。』然小便不利。卽腎臟之機能障礙。若稍高度時。則胃內停水。遂起胃部停滯膨滿之感。師所云（前略）痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利者。卽昭示此狀態也。前證若再高度。則胃充滿停水。雖渴飲水。然以無可容積。有至吐水者。故師以中風發熱六七日。不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。（表裏證之表證者、發熱汗出身疼痛等之症、裏證謂胃內停水也、）解釋出之。言腎臟之障礙。苟達其極。不惟在胃腸內亦來停水。遂至發代償性之吐瀉。師曰『霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。』何謂霍亂。病原論證曰。揮霍撩亂。揮霍者疾速之貌。撩亂者、急卒腹痛、吐瀉、煩躁悶亂之意也。然霍亂爲吐瀉病。卽今謂亞細亞虎列拉。或歐洲虎列拉之疾病也。然仲師對霍亂之吐瀉。主用利尿作用之五苓散。由此推想。關此霍亂症狀。皆如前述之腎臟機能障礙者明矣。上論亟避多歧之論。故本方只解說利尿作用之方面。然方中之桂枝有發汗解熱治衝逆及鎮靜等作用。故師論中之脈浮微熱。表裏證中

之表證。頭痛發熱、身疼痛、熱多之症狀。皆桂枝之主治也。

尾台氏曰

霍亂吐下後。有厥冷煩躁。渴飲不止。而水藥共吐者。嚴禁湯水果物。每欲飲水。與五苓散。但一貼藥。二三次服爲佳。不過三貼。嘔吐煩渴必止。吐渴共止。則必厥復而熱發。身體脛痛。仍用五苓散。則熱熱汗出。諸證脫然而愈矣。

余讀此兩說。再涉獵西洋學說而熟思

之。夫虎列刺病者。由腸內感染虎列

刺菌。此不待論也。然其產生之毒素。

對於腎臟細胞。比於他臟細胞有容易

侵入之特性。當侵襲他臟器之時。已

先擾亂腎臟。致發代償性吐瀉。考本

病之症狀。亦腎臟障礙之結果也。故於

本病初期。知其力所能及。宜急投大量之本方。散藥尤屬相宜。列本說之論據如左。

一 最早起尿閉。

二 於初期渴(發熱)・口燥・水逆等之五苓散證。

五苓散第九圖



三 尿利者可救。

四 經過中。發尿毒症。

五 成胎後病之慢性腎炎糖尿病。

六 驗之腎臟之變化最甚。

師曰假令瘦人臍下有悸。吐涎沫而顛眩。此水也。古人以本方治顛癩者。蓋本之此條也。以上爲本方證之定型的。然亦難必。蓋因病症之強弱。或其他之關係。有出意料者。

一 有他證不著明。而發爲眼患之事。

二 同上。有發龜頭水腫。陰囊亦腫之症。(多在小兒)

三 有下利浮腫。

四 有不下利但浮腫。

五 有小便頻數多量。且作劇渴。

東洞翁下本方證之定義曰。治消渴。小便不利。或渴欲飲水。水入則吐者。可供參考。

適應症 腎臟炎、尿崩症、糖尿病、虎列刺等。

茵陳五苓散

猪苓湯

茵陳蒿一〇、〇 五苓散五、〇

右爲散、一回四〇、一日三回、

遍應症 爲五苓散之證。發黃疸者。

猪苓湯

猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉 各

七、〇

右以水二合。煎一合。去滓。入阿

膠溶之。一日三回冷服。

藥徵曰

滑石主治小便不利也。旁治渴。

腹症 據右表

方名 膀胱尿道之出血 膀胱尿道痛

猪苓湯 有

五苓散 無

有

無

猪苓湯之圖 第十圖



心煩

腹後滿
按之濡

在膀胱之部
即痛

利尿

不利淋
頻數
或

浮腫

局所性
全身性

發熱

發熱汗
不出

睡眠

不眠

渴

有

脈

有
浮

適應症 膀胱炎、膀胱結核、淋疾、和田先生謂本方能治膀胱結石。

麻黃湯

麻黃湯

麻黃 杏仁各一、〇 桂枝七、〇 甘草三、五

右以水三合。煎至一合。去滓。一日三回溫服。

藥徵曰

麻黃主治喘咳水氣也。旁治惡風無汗。身痛骨節痛。一身黃腫。杏仁主治胸間停水也。故治喘咳。而旁治短氣。結胸心痛。形體浮腫。

師曰。『太陽病。頭痛發熱。身疼腰疼。骨節疼痛。惡風。無汗而喘者。又曰。傷寒脈浮緊。不發汗。因致衄者。』宜以二章中之無汗而喘。與脈浮緊爲標的。

適應症 感冒流行性感冒、氣管支炎、喘息、麻疹、腸室拉^埃斯、其他熱性病之初期等。又乳兒鼻液乾涸、鼻孔閉塞、不能哺乳者有奇效。

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃九、五 杏仁甘草各五、〇 石膏一九、〇

右以水二合五勺。煎至一合。去滓。一日三回溫服。
本方證雖似麻黃湯證。然無頭痛。身疼。腰痛。骨節疼痛。衄血之症。故無桂枝而有石膏。類
似白虎湯之症狀。宜比較三方藥物之異同以自得之。
適應症 肺炎、其他概同麻黃湯。

小青龍湯

小青龍湯之圖
第十圖



麻黃 芍藥 乾姜 甘草 桂枝 細
辛各三、五 五味子六、〇 半夏七
、〇

右以水三合。煎至一合。去滓。一
日三回溫服。

藥徵曰

細辛主治宿飲停水也。故治水氣在心
下而喘滿。或上逆。或脇痛者。

腹證 師曰。『傷寒表不解。心下有

水氣。乾嘔發熱而咳。或渴。或利。或噎。或小便利。少腹滿或喘者。』表不解者。言發熱等之不去也。心下有水氣。謂胃內停水也。或利之利。爲下利之症。噎爲食阻咽嗔之象也。少腹。下腹也。又曰『傷寒。心下有水氣。咳而微喘。發熱不渴』又曰『咳逆倚息不得臥。小青龍湯主之。』倚息者。同肩息。又曰婦人吐涎沫。(中略)治其吐涎沫。小青龍湯主之。

以上諸症內。爲本方之目的者。卽爲胃內停水之症也。故有此證而發熱咳嗽。及其他之症狀者。皆本方主治之處也。

適應症 百日咳、其他略同麻黃湯。

大青龍湯

麻黃一、〇 桂枝 甘草 杏仁 各三、五 生姜 大棗 各五、五 石膏 一四、五
右以水四合五勺。煎至一合。去滓。一百三回溫服。

師曰。『太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脈微弱。汗出惡風者。不可服。(下略)脈浮緊者。言脈雖浮而力強。恰如錐之觸指。身疼痛。指身體言也。固不待論。痛無定處。故單言身疼痛也。煩躁者。躁煩不甯也。其他不解可

自明矣。

東洞翁曰。治喘及咳嗽。渴欲飲水。上衝。或身疼。惡風寒者。宜參照二說以處方也。其他水腫症等。以無經驗略之。

治驗 一婦人五十餘歲。患眼疾。來院求診。兩側有顆粒性結膜炎。角膜噴奴司。爲角膜瘍翳。膿潰已將穿孔。流淚羞明。眼珠及前額(顴)部之疼痛劇甚。不得安眠。脈浮大有力。少渴。舌胎微黃而乾燥。微有咳嗽。余以本方倍半。加車前子八錢爲主方。每夜兼用芎藭散四、〇一六、〇一八、〇爲時二週。了無稍遺痕而愈矣。

越婢加木湯

麻黃七、〇 石膏九、五 大棗五、〇 甘草二、五 生姜三、五 朮五、〇

右以水二合。煎至一合。去滓。一日三回溫服。

本方之證據如左表

方名	咳嗽	喘	上衝	脚弱	小便不利
越婢加木湯	無但非全無者	有	無	有又脚有緊急浮腫	小便不利
大青龍湯	有	有	有	全無	全上

右之外與青龍湯同

治 驗 本皮膚病。因內攻致發腎臟炎。據證兼用伯州散、桃花加芒硝湯、紫圓。均得偉効。有發結核性脊椎炎之流注膿瘍者。以本方合桂枝茯苓丸。或當歸芍藥散。兼用伯州散。及下瘀血丸。或大黃廩虫丸。每每得全効也。

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃 連翹 (連軛即連翹) 生姜 杏仁 各二、五 赤小豆二四〇 大棗三、五 甘草一、二 桑白皮六、〇

右以水三合。煎至一合。去滓。一日三回溫服。

連 翹 療疥瘡、癬瘡、雜瘡。(藥選)主療癩、癬疽、惡瘡、結熱。(摘要)

赤小豆 原南陽氏曰。利水之奇品也。著者曰。有利尿兼緩下之作用。

桑白皮 療咳嗽。(藥選)宜上氣喘息、水氣喘息。(梅花無盡藏)

尾台氏曰

疥癬內攻、一身瘙痒、發熱、喘咳、腫滿者。加反鼻有奇効。

適應症 皮膚病性腎炎。而發熱喘咳者。兼用伯州散。或再造散有奇効。

葛根湯

葛根八、五 麻黃生薑大棗各六、五 桂枝芍藥甘草各四、五

右以水三合。煎至一合。去滓。一日三回溫服。

葛根

葛根

葛根爲豆科之宿根草。葛根塊之乾燥物也。由本藥所得之澱粉。與車前葉。山慈姑（百合科之宿根草）球根所採者。同爲無異臭異味之純料澱粉。攷日本藥局方。亦有搗載。然本藥含有粘滑性緩和藥中最良之澱粉。

藥徵曰

葛根主治項背強也。旁治喘而汗出。

本草別錄曰

葛根解肌發表出汗。

以含有緩和藥之澱粉。故主治項背強症。兼發汗平熱之作用。旁治喘而汗出之藥物也。

師曰。『太陽病。項背強。凡凡無汗。惡風。』何謂項背強凡凡。成無已氏曰。凡之音爲孫。引頸之貌也。短羽之鳥。不能飛騰。動則引伸其頸。項背強之人。欲動之時。狀亦如之。素問腰

痛論曰。腰痛俠背而痛。至頭几几然。由此考之。項背几几者。不外形容項筋及背筋之變結。或瘰癧狀之詞也。故師說爲太陽病有此證。汗出惡風者。皆本方之主治也。彼之腦膜炎者。必有項瘰癧。甚者且發全身瘰癧。故本方之適應症。亦不難推知也。

又曰

『太陽病。無汗。而小便反少。氣上衝胸。口噤不得語。欲作剛瘰』。口噤爲牙關緊急。剛瘰有強直性瘰癧。故本條與前條主證。併考之時。知本條爲論治破傷風之症。卽本方之爲治破傷風症也。證。

又曰

『太陽與陽明合病者。必自下利。』太陽者。病在外表也。言陽明者。病爲在裏。卽腹內也。今有項背強。發熱。惡寒等之表症。而兼腹內症狀之下痢。故名曰太陽與陽明合病。表明自下利之原由。及症狀也。

本條當與第一章參照之。本方爲感冒性下利。卽赤痢。疫痢之治劑。亦可得而明瞭也。

東洞翁下本方之定義曰

治項背強急。發熱惡風。或喘。或身疼痛者。故本方有治喘息神經痛「偃蹶發斯」之稱。不可不知也。

本方與桂枝湯之別

本方卽桂枝湯加葛根麻黃之方也。桂枝湯所主治者。此方非不能治也。本方以葛根爲主藥。麻黃爲佐藥。桂枝湯不過爲臣藥而已。故於此證。葛根麻黃之症多。而桂枝湯證爲少。抑其病度亦弱。是二方鑒別之要點也。

本方與當歸四逆湯之別

此二方證雖酷似。而不易分別。然本方證之主證在項背。且能波及上下。當歸四逆湯證之主證在於腰部。而蔓延於上下。此其大別。

適應症 腦膜炎之初期者。寒熱能膽參連湯、瀉心湯、紫圓、以兼用之。

麻疹有隨證加石膏。

赤痢之初期發熱惡寒者。以本方發汗之後。兼用適證之下劑。疫痢初期者。先以紫圓盪滌消化器。復以本方或葛根黃連黃芩湯本方多服之。

肺結核。結核性助膜炎之用本方者。雖屬和田先生之發見。然以本方。隨症得與小柴胡湯湯、柴胡桂枝乾姜湯、小陷胸湯、歸善建中湯、當歸芍藥散、排膿散、排膿湯等合方。或兼用伯州散。或下瘀血丸。或大黃蟬虫丸等用之。可期全効。

頭部或其他之濕疹者。本方加芎黃散。(有膿者更加桔梗)兼用伯州散。頑固性者。兼再造散

用之。丹毒照證可合瀉心湯。兼用伯州散。或再造散。

眼・耳・鼻之疾病。本方與芎黃散、排膿散、桂枝茯苓丸、當歸芍藥散、茶桂朮甘湯、瀉心藥湯等。隨症合方。再造散、下瘀血丸、大黃廩虫丸、抵當丸而兼用之。

咽喉炎。耳下腺炎者。宜以本方加桔梗、大黃、石膏。隨證兼用再造散、瀉心湯、黃連解毒湯。

疥癬。下疳毒者。本方宜加伯州散、再造散、第一解毒散、第二解毒散、解毒丸、而兼用之。

癰腫。乳腺炎。蜂窩織炎等之化膿性疾患。宜本方兼用伯州散。若化膿者。施以小切開排膿後。隨處排膿散及湯。亦可施用大黃牡丹皮湯、瀉心湯、大柴胡湯。兼用伯州散。

尋麻疹。及其他發疹性・癢痒性・皮膚病者。宜與桂枝茯苓丸。兼用再造散。上述諸症外。如偏頭痛。感冒。流行性感冒。麻疹腸窒扶斯。及其他熱性病初期等用之。

葛根加朮附湯 (著者之創方)

葛根八、五 麻黃 生姜 大棗各六、五 桂枝 芍藥 甘草各四、五 茯苓 朮各七、〇 附子二

煎法用法同葛根湯

本方實地上爲不可或缺之要方。應用甚廣。故其方意尤當精究也。本方即爲葛根湯・桂枝加朮

湯
葛根加朮附湯

龍附湯之合併者。更宜由此二方意中求之。

適應症 肥厚性鼻炎、鼻茸、上顎竇蓄膿症。前額竇、篩骨竇、蝶竇、骨竇炎。以本方隨症合用桂枝茯苓丸、當歸芍藥散、瀉心湯、排膿散、再造散。但鼻茸宜兼施礮砂末。或瓜蒂末之吹鼻法。慢性氣管支炎、喘息、肺氣腫者。宜本方依證合於柴胡桂枝乾薑湯、排膿散、桂枝茯苓丸、當歸芍藥散用之。兼用伯州散、下瘀血丸等。

腐骨疽、骨瘍神經痛「癱麻折斯」等。取本方與桂枝茯苓丸。或當歸芍藥散。亦可合用伯州散。或再造散。或下瘀血丸。

半身不隨。顏面神經麻痺者。宜與瀉心湯。或黃連解毒湯。或

葛根加半夏湯

葛根加半夏湯

葛根七、〇 桂枝 芍藥 甘草各三、五 麻黃 生姜 大棗各五、五 半夏 二、〇

煎法用法同葛根湯

適應症 治葛根湯證。且兼治嘔吐。

葛根黃芩黃連湯

葛根黃芩黃連湯

葛根一九、〇 甘草五、〇 黃連、黃芩各七、〇

右以水四合。煎至一合。去滓。一日三回溫服。

師曰

『太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者』病在太陽證。宜與桂枝湯發汗。因醫誤下之。遂致下利不止。脈呈促象者。（促脈爲急促之義）卽寸部。比關尺兩部。較靜顯著也。寸關尺之解。見大承氣湯下。此蓋外證未去也。若此加以有喘而汗出之症者。本方之主治也。然不僅限此耳。東洞翁治項背強急、心下痞、心悸而下利者。宜從此義證而用之。今將本方分解觀之。爲主藥之葛根。主治項背強急症。且治發熱。及喘而汗出之作用。又有粘滑性緩和藥。故能包攝止瀉。黃連主治心悸之症。旁治心下痞、吐下之症。黃芩主治心下痞。旁治嘔吐下利之症。甘草和諸藥。緩急迫。觀此其可深長思矣。

適應症。急性胃腸加答兒、疫痢。外如吐、瀉、痙攣、昏睡。一時發作者用之。

小陷胸湯

黃連七、〇 半夏二一、五 土瓜實九、五

右以水三合。煎至一合。去滓。一日三回溫服。但有熱之時當冷服。

藥徵曰

括婁實主治胸痺也。旁治痰飲。但土瓜實其効較括婁實爲優。故以代括婁實用也。

腹證 本方與大陷胸湯、大陷胸丸。(本書不載)治如方名所示。胸廓之一部沿身體之前後凸出者。(爲鳩胸繩背漢方稱之結胸)以復常態之方也。其所以稱小者。對待前記二方之詞也。但不

如二方之峻下。惟其作用較緩耳。往

昔吉益東洞翁。曾治有此證。且兼嘔

痢之小兒。以本方爲日用。每七日或

十日。則大陷胸丸以瀉下之。經一年

有餘。竟得全愈。余本此治驗。企救

濟此種之病兒。曾不數回。奈渠中途

休藥。不得全効。故欲治難症者。必

具忍耐方。若不然。初不如不下手之

爲愈也。

師曰。『小結胸。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。小陷胸湯主之。』此如前述。雖非重症。即

胸廓無變形。卽有之。亦其度甚弱。心下部硬。以指頭按之。其人卽訴痛者。卽小結胸本方之

主治也。然據著者之實驗。此症之實地上。比前症反爲緊要。彼所稱之腺病質・勞瘵質・及肺

小陷胸湯之圖



結核病者之胸廓。皆爲扁平。而胸骨部之多少凸出者。本方證也。惟其扁平。故胸廓之前後徑。不如橫徑之大。橫徑大者。爲柴胡之胸肋膨脹證也。胸骨部之凸出。則爲本方證也。此即二方合併之證。而柴胡之症強。本方之症弱。故尙宜精診他證之存在與否。若果存在者。更施以合方。隨症兼用大黃廔虫丸。或下瘀血丸等。不問是否結核菌之感染。苟非限於死證。皆可全愈。不惟理論上爲然。余之日常經驗。可以證之。

小柴胡湯

柴胡九、五 黃芩 人參 甘草 生姜 大棗各三、五 半夏七、〇

右以水三合。煎至一合。去滓。一日三回溫服。但熱。及有嘔氣之時。冷服亦佳也。

藥徵曰。柴胡主治胸脇苦滿也。旁治寒熱往來。腹中痛。脇下痞鞭。

腹證 本方與柴胡桂枝乾姜湯、大柴胡湯、四逆散。皆爲日常必用之神方。然非確知如上之區別。亦難奏効。今執其大要論之。凡加入柴胡之方。必有胸脇苦滿之證。故此症之有胡柴。其病可知。即得決定柴胡症之主治也。然則胸脇苦滿者。何謂哉。曰。一。病者使仰臥。醫以指頭自左右肋骨弓下。沿其內面。向胸腔深按之。觸有抵抗物時。以指稍強壓之。若訴痛者。卽爲有胸脇苦滿證。又有此苦滿證不明。而呈胸廓之變形者。此卽所謂胸肋膨脹證也。亦爲柴胡劑

所應用之目標。其變形有胸部之中央。沿胸廓之左右徑而凸出。如西洋槍狀者。亦有向胸廓之下部。向內側而反轉者。又有胸廓之前後徑短少。而左右徑反爲大者。所謂扁平胸廓也。此皆柴胡劑所治也。然必以胸脇苦滿證爲正證。胸肋膨脹證爲奇證。故尤以前者爲主目的。後者爲副主的。診得胸脇苦滿證。欲知何者爲柴胡劑證。悉見左表。

(方名)	胸脇苦滿	心下	發熱	舌胎	口苦	嘔吐
小柴胡湯	度少	少痞鞭	無	有	白胎	有
柴胡桂枝乾湯	度最少	軟	無	有	有白胎灰	有
柴胡桂枝湯	度最少	軟	無	有	有白胎灰	有
大柴胡湯	度大	鞭	有	有	有白胎	有
四逆散	度大	鞭	有	有	有白胎	有
(方名)	側胸痛	腹痛	渴	脈	盜汗	上衝
小柴胡湯	有	有	度少	不定	浮細	不定
柴胡桂枝乾湯	無	少有	著明心	有	最弱	有
柴胡桂枝湯	無	少有	著明心	有	最弱	有
大柴胡湯	有	有	有但少	有力	無	無
四逆散	無	有	有但少	無	中等	無

以上不過舉其大要。亦非經常如斯者。不可深泥。

師曰『太陽病。十日以去。脈浮細而嗜臥者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。』太陽病汗之。病愈大半之後。脈浮細嗜臥者。發汗劑主治之機會既去。若有胸滿（胸脇苦滿之略也）之

證者。宜與本方也。肋膜炎等。亦有此症。若無胸脇苦滿者。不可與也。

『傷風五六日中風。往來寒熱。胸脇苦滿。

默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而

不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞭。或

心下悸。小便不利。或不嘔。身有微熱。

或咳者。』傷寒腸室扶斯也。此處稱傷

寒。亦稱中風也。心煩之心。指精神煩

者。悶亂之意也。喜嘔。喜為屢屢之

意。脇下痞鞭。謂胸脇苦滿之強度也。

下悸。小便不利者。謂本方治心臟病及腎臟炎之可能也。或胸中煩而不嘔。以下之症狀不定。

為或有或無之象。故以或字冠之。心煩喜嘔以上為主症。然其主症中之主證。實胸脇苦滿等也。

非僅此證。即為上列之症狀。盡皆本方之主治。此一方治數病之妙。可不深味也。

小柴胡湯之三圖



心

又曰『得病六七日。脈遲浮弱。惡風寒。手足溫。醫二三下之。不能食。而脇下滿痛。面目及身黃。頸項強。小便難者。與柴胡湯。』

『諸黃。腹痛而嘔者。小柴胡湯主之。』

『陽明中風。脈弦浮弦大。而短氣腹滿。脇下及心痛。又按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜臥。一身及面目悉黃。小便難。有潮熱。時時

噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。

小

病過十日。脈續浮者。與小柴胡。』柴第

以上三章。最爲複雜。言之不易。茲

胡十
湯四

將比較的簡單者解其一二。第一章云。

面目及身黃。第二章云。諸黃腹痛而

圖

嘔。第三章云。一身及面目悉黃。考

之本方之能治黃疸症。已無間言矣。然第一章之頸項強急。第二章之時時噦。耳前後腫之症者。以本方應用上。有重大之關係。試詳論之。

本方之主證。胸脇苦滿。頸項強。及耳前後腫。一貫而觀察之。是等之症。皆在直腹筋之胸廓附着點。與乳嘴突起中間。引起之一假線上也。然以今日之眼光自他而觀察之。內乳動脈者。



自鎖骨下動脈起而下行。今心囊縱隔動脈。第一第二前肋間動脈。復漸次下降。再分外枝。內枝。前枝。後枝。而司心囊縱隔竇。氣管支。肺肋膜。橫隔膜。肋間筋。肋間神經。肋骨。胸骨。胸乳腺之營養。終成爲上腹壁動脈。而與直腹筋後側上行之下腹壁動脈吻合。然而椎骨動脈。殆與內乳動脈相對。而同起自鎖骨下動脈。入棘孔而上行。分枝於頸筋。神經。淋巴腺。耳下腺。乳嘴突起。耳輪。外聽道。鼓膜。中耳等處。入頭蓋左右相合。成爲基礎動脈。又分爲後大腦動脈。與他動脈。形成動環。而與內聽動脈交通。今假令此動脈之頭蓋外終點。與內乳動脈之終點。通之成爲一線。此二動脈之經路。假如在線內。然則前假線與此假線。不相一致。而本方主證之胸脇苦滿者。在肋骨弓之後面。而通過內乳動脈。密接於胸壁。成爲腫瘤狀。故有此證之時。內乳動脈之血行。及血液之變狀者可明矣。由此影響於此動脈支配下之氣管支。肺肋膜。縱隔竇。橫膈膜。心臟。肋間筋。肋間神經。肋骨。胸骨。胸筋。乳腺等處。其餘波及於椎骨動脈。及同動脈配下之頸筋。神經。淋巴腺。耳下腺。乳嘴突起。外聽道。鼓膜中耳等處。而發變狀。亦甚明瞭。如斯種種之臟器。及組織之病變。畢竟亦不外一苦滿證之結果也。故若除去此一障礙物。諸患悉如烟散霧消。亦顯然可知也。而仲師以一苦滿證爲目的。而與以本方。胸滿脇痛。(肋膜炎等)時時噦者。吃逆也。(吃逆者橫隔膜之間代性痙攣也)心下悸。(心臟病)咳。(呼吸器病)頸項強。(頸筋及項筋之攣縮)耳前腫。(耳下腺炎)耳

後腫。(乳嘴突起炎)少陽中風。兩耳無所聞云云。(在傷寒論爲本方證)即治耳聾。原南陽氏以本方加石膏治療癱。和久田氏以本方加櫛皮治婦人乳腫。其與前述適合者。亦不外此理由。即此可證前論之非牽強附會也。更見古聖施設。非科學的所能知。此其實昭彰。尙得謂漢方之爲陳腐乎。

『婦人中風。七八日續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。』此婦人月經中。罹感冒。感冒之熱。適與經血相結。致月經休止。故發出作瘧狀之象也。血室者。子宮也。

『婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。日暮譫語如見鬼狀者。此爲熱入血室』此婦人罹腸室扶斯之際。適逢月經來潮。如前述熱與血結。晝則精神明了。入暮。即夜間則譫語。舉動至怪之謂也。以上之二症狀。一中風。一傷寒。不論中風傷寒。皆能發此二症狀也。然亦非中風必發瘧象。而傷寒必發譫語狂狀。然二症狀。雖曰皆本方主治之。若據著者之實驗。以小柴胡湯、桂枝茯苓丸、加大黃合方。或小柴胡湯、桂枝茯苓丸合方。兼用下瘀血丸之例亦甚多也。

『嘔而發熱者。小柴胡湯主之。』無論何病。嘔吐發熱。二症狀同時併起者。本方之主治也。

『婦人在草蓐。自發露得風。四肢苦煩熱。頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛。但煩熱者。三物黃芩湯主之。』

雖曰此際不限有無頭痛。惟精診二方之腹痛。以爲區別。依余之實驗。以本方對於產褥熱之症。其効不能充分。故當用本方。或本方加石膏湯。合桂枝茯苓丸。隨證兼用下瘀血丸。若更有三物黃芩湯證時。宜以同方。與前方合用之。

尾台氏曰。凡四肢苦煩熱。頭痛者。不特產後中風。男女諸血證。久咳、勞瘵。及諸出血後。多有斯症。宜撰用二方。亦可併考之。

適應症 瘧疾、產褥熱、其他之熱性病。頸腺結核、中耳炎、百日咳、（和田先生發見）氣管支炎、肺結核、肋膜炎、胃疾患、黃疸等。

治 驗 一七歲之女兒。生來虛弱。偶罹百日咳。遍服諸藥。行吸入濕布等法。雖經數醫協力盡技。亦無寸効。乞余往診。診之爲腺病性體質。貧血稍著明。胸肋膨脹。左有腹筋攣急。臍下有瘀血塊。與小柴胡湯三分之一。加桔梗三〇。當歸芍藥散二分之一。合爲主劑。兼用大黃蘗虫丸一、〇一日一回。處三日分。後其母來院深謝曰。服藥當夜。卽現佳効。痙攣性咳嗽之強度。及發作數皆減少。前之不能安眠。亦得入睡。目下無苦腦狀。只時時有普通之咳嗽而已。續服二週日。貧血亦皆治。

十四歲之女兒。五歲之時。罹猩紅熱性腎炎。爾後雖盡力醫治。貧血及尿中蛋白不去。額面及下肢時來浮腫。診之。胸脇苦滿。左直腹筋攣急。臍下有瘀血塊。以小柴胡湯、合當歸芍藥

散。(二倍)兼用大黃廕虫丸一日一回。處五日分。浮腫悉去。蛋白亦減少。續服一週間。蛋白全部消失。遂感精神爽快。貧血稍去。父母喜甚。而命其長服。其面目比之往日倍覺燥發也。二十二歲之男子。罹肺結核。咳嗽咯痰血。(多量鮮血)發熱。(近四十度)盜汗不食羸瘦。病者之父母。與余頗知己。因余用漢方之故。轉求他醫治之。不但無寸効。且病勢增進。不得已。乞治於余。診之。(胸中之診候略之)胸廓扁平細長。胸骨部少隆凸。胸脇苦滿。心下以指頭按之。隨即訴痛。腹筋攣急。恰如板狀。臍下按之有抵抗物。比他部更痛。兩個腎臟部外側之腰筋。按之覺攣急。壓之訴疼痛。據此與小柴胡湯。小陷胸湯合方。增量一倍半。加桔梗丸(〇)。更與歸善建中湯、當歸四逆湯合方。再處黃連解毒丸六、〇。一日二回。大黃廕虫丸五、〇爲一回。處一日分。次日診之。病狀依然。於是中止黃連解毒丸不服。而大黃廕虫丸改爲一日三回。不兼用前方。與一日分。至次日咯血大減退。僅咯痰褐赤色。體溫下降一度。再用前方一日。咯血全止。體溫益下降。後二日。復爲平溫。食慾稍振。患者非常喜悅。非言語所可喻。後去小陷胸湯。其他如前。持長至三個月餘。病全告愈矣。

小柴胡加大黃湯

柴胡九、五 黃芩 人參 甘草 生姜 大棗各三、五 半夏七、〇 大黃三、五

煎法用法同小柴胡湯

適應症。小柴胡湯證之應下者。

小柴胡加石膏湯

小柴胡加石膏湯

柴胡九、五 黃芩 人參 甘草 生姜 大棗各三、五 半夏七、〇 石膏二九、〇

適應症 小柴胡湯證。而有石膏證者。

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝湯

桂枝 黃芩 人參 芍藥 生姜 大棗各三、〇 甘草二、〇 半夏六、五 柴胡八、五

適應症 小柴胡湯證。與桂枝湯證併合者。

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡九、五 桂枝 乾姜 黃芩 牡蠣各三、五 括蕪根五、〇 甘草二、五

煎法用法。同小柴胡湯。

牡蠣

牡蠣

碳酸。〔Carbonium〕由牡蠣中製出。故碳酸質牡蠣之主要成分也。

碳酸。(Carbonium)

碳酸胃中或釀酸過多。有下利傾向之時。小兒吐瀉。(酸性物質之嘔吐。及便青下利。)胃痛。食思缺乏。熱饑。慢性嘔吐。妊婦嘔吐。下利兼瘦削之痿酸尿。及其他次條之燐酸。(Acidum Phosphoricum) 所主治實質諸病。

藥徵曰

牡蠣主治胸腹之動也。旁治驚狂煩躁。此說雖是。然無腹胸動證。亦有用牡蠣者。深不可泥。又未旁及本藥對自汗。盜汗。臭汗。不眠等之醫治作用。不可謂非粗略也。

碳酸。即牡蠣之治胃中釀酸過多。治胃痛。食思欠乏。下利者。洋說雖亦首肯。顧其他亦驟難索解。此或著者之淺學。存疑可也。

續藥徵曰括萋根有治口內粘氣渴者。

腹 症 師曰「傷寒五六日。已發汗。而復下之。胸脇滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此爲未解也。」胸脇苦滿微結者。即弱度之胸脇苦滿證。以余實驗。若不注意。最易忽略看過。小便不利。即心臟衰弱之結果。渴而不嘔之渴症。宜與石膏劑之煩渴而爲區別。即本方之渴。多不劇甚。宛若食糊。口有粘氣也。舌胎多灰白色而粗糙。熱少或有寒狀。或雖有熱。其脈力亦弱。此不可不知也。不嘔者。示異于小柴胡湯處也。但頭汗出者。多

于前額。甚則髮際部出汗。由食時或僅少之動作而誘起。甚則發盜汗症。東洞翁曰。頭汗者。是衝逆也。以余之實驗。患此症及頭髮部濕疹。頭部癢痒。乾性皮脂漏。頭髮脫落等症者。均有衝逆之候。多為本方之主治。故翁之所說可信也。心煩之心。指精神。煩者悶亂不甯之

意。同于衰弱者。神經衰弱。歇斯的里

之神經症病也。然以上之症狀。皆為本

方之主治。宜以之為正證。故先為說也。

又曰瘧寒多有微熱。或但寒不熱者。本

方雖多有此症。特非僅限於瘧。假使有

此證狀。而無前記之正證者。亦非本方

之主治也。

東洞翁曰。當有胸腹自動症。此示本方

有心臟及腹部大動脈搏動亢進症。心臟

辨膜病之代償機障礙等。用本方有著効者。即以翁說證之也。如無正證者。不可與也。

柴胡桂枝乾姜湯證圖
第十圖



尾台氏曰

勞瘵、肺痿、肺癰、癰疽、癰癧、痔漏、結毒、微毒等。經久不愈。漸就衰憊。胸滿乾嘔、塞

石管吐瀉伯州
散應用於肺結
核者亦非余之
發見非非模倣
四許學術已也
醫聖張仲景師
既論之矣近來
漸知(Carro
iain)之效
用是執今日之
四年醫與漢醫
較遠不及二千
年前詳察家問
感之未知作若何

熱交作、動悸、煩悶、盜汗、自汗、痰嗽、乾咳、咽乾、口燥、大便溏泄、小便不利、面無血色、精神困乏、不耐原藥者。宜此方。要當參考之。

據著者多年之實驗。本方證中。有現桂枝之證。(上衝)乾姜之證。(厥冷下利)黃芩之證。(熱·口苦·舌胎)牡蠣之證。(如上說)有括萸根之證。(如上說)或兼有二證。或兼有三四證者。或有全部齊發。既無一定之疾狀。正故主藥之柴胡勿論。即其他藥物之性能。要當熟知精診以處劑也。

近來洋醫家多稱炭酸治結核症有偉効。因而賞用者良多。余雖不明奏効之故。惟隨其發顯之症候。如柴胡湯證。有煩渴肌熱者。同方加石膏。大熱煩渴羸瘦者。以竹葉石膏湯。若柴胡桂枝乾姜湯證。無內熱而虛弱者。以同方兼用伯州散。屢奏奇効。考之前二者中之石膏。為天然含水硫酸也。柴胡桂枝乾姜湯中之牡蠣。為炭酸。伯州散為磷酸。顯此雖同一之證狀。若異其為用。必取不同之物性。洋方家無此區別。果得謂之是乎。

適應症 上述之外。發狂、失神、神經衰弱、不眠症、齒痛、氣管支炎、肺結核、喘息、肺氣腫、心臟瓣膜病、衰弱性腳氣。慢性胃病。腸室扶斯、穢毒等。

治 驗 四十五歲之男子。自數年前。患胃痛吐食。醫治無効。診脈數弱無力。身體瘦削。面色污穢。如帶褐黃白之色。口唇紫黑。舌有灰白色之胎。舌尖及舌緣帶有「紫藍色」。口苦而渴

● 食機不振。胃痛嘔吐。心悸亢進。惡寒。下肢冷厥。尿意頻數。倦怠脫力等之自覺症。狀若安臥。溫覆則感輕快。疾行若觸寒氣。則覺憎寒惡風。心臟部雖認無器質的變化。然心動疾數。腹部大動脈搏動著明。腹診之。左脇下有胸脇苦滿證。腹壁軟弱。兩側腹筋孳急。按之痛。左側更爲著明。臍下有瘀血塊。胃弛緩抵臍。振振有水音。上腹部呈微弱蠕動之運動。腹部及下肢。按之冷却。據此與柴胡桂枝乾姜湯、(二倍)大建中湯、桂枝加蒼朮附湯、當歸芍藥散(二倍)四方合用。兼用大黃蘗蟲丸五、〇二回。下瘀血丸五、〇一回。三日嘔吐全止。後九日。病見痔疾。疼痛劇甚。茲爲增加當歸芍藥散七倍。附子三、〇。其他如前用之。三日痔痛少安。自此附子漸次增量。(最終用附子達五、〇)續服前方二週⁵。多年宿疴。脫然而祛。

大柴胡湯

大柴胡湯

柴胡九、五 黃芩 芍藥 大棗各三、五 半夏七、〇 生姜六、〇 枳實五、〇 大黃三、五

煎法用法同小柴胡湯

枳實

枳實

藥徵曰 夫枳實主治結實之毒也。旁治胸滿、胸痛、腹滿、腹痛、結實之毒者。自心下及肋骨弓下面。至全腹壁。病毒凝着充實。而有強度抵抗。較芍藥證高度更甚。胸滿者。心下部結實。有自他覺之膨滿也。

臍證 於腹診能爲醫之目標者。如柴胡、枳實、大黃、芍藥、之證也。卽柴胡胸脇苦滿證。其抵抗之度。雖不著大。而枳實證則增強之。故本方之胸脇苦滿。脇下痞鞭證。比之小柴胡湯尤著強大也。而枳實芍藥之證。亦發於心下。故心下急。(筋張也)或心下痞鞭。(與人參之痞鞭異。此則屬實。人參屬虛也。)又前

證現於腹筋。故直腹筋實孳急而有壓痛。右側更甚。大黃量微。故其證亦隨之不甚。然心下之腹底。亦有呈出充實抵抗及壓痛之證。要之胸脇苦滿。心下筋急張。上腹之內部充實有毒。按之則痛而且鞭。右直腹筋孳急而有壓痛者。多有閉便。

大柴胡湯之證圖

第六十圖



師曰。『太陽病。過經十餘日。反二三下之後。四五日。柴胡證仍在者。先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。爲未解也。與大柴胡湯』初有之嘔。與小柴胡湯不止。而心下筋張。初之心煩「見小柴胡湯之條下」爲鬱鬱微煩者。於小柴胡湯爲不治之徵也。若不下之。則治愈難。故有枳實大黃。且與生姜多量

之本方也。所以本章者。爲表示此二方之區別而設也。

又曰『傷寒。十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯主之』此示本方爲下劑。亦解熱劑也。

又曰『傷寒。發熱。汗出不解。心下痞鞭。嘔吐而下利者。此痞鞭與人參之痞鞭不同。前記腹證之輕焉者也。然上文本方雖爲下劑。此示亦爲止瀉劑也。』

又曰『傷寒後。脈沈實者。內實也。下之解。』此腸窒扶斯之初期。脈浮之時。應與發汗劑。其脈至沈實者。爲內實。卽病毒集於消化器之徵。故下之則治。

又曰『按之心下滿痛者。實也。當下之。』此言凡病。按心下有膨滿壓痛者。此爲病毒充實。謂非下不愈也。

以上之論。多述傷寒之治療法。然決非限此。若有右記之定型。卽凡百之病。皆可主治之。是故東洞翁所唱爲萬病一毒。諸方何莫不然。且本方證。常無舌胎。卽有之。亦只白胎或黃胎。口苦。脈沈實。或洪（如洪水之來爲大脈也）實。弦（如按弓之弦之脈。數者也）。

適應症 大抵同小柴胡湯。不可下者除大黃。其他脚氣、（本方證極多）瘧腫、瘰癧、癰、肛門周圍炎、痔疾等。

大柴胡加石膏湯

四逆散

柴胡九、五 黃芩 芍藥 大棗各三、五 半夏七、〇 生姜六、〇 枳實五、〇 大黃二、五 石膏一九、〇 煎法用法。同小柴胡湯。
適應症 卽大柴胡湯症。而有石羔症者。

四逆散

甘草 枳實 柴胡 芍藥各三、〇

右以水二合五勺。煎至一合。去澤。一日三回溫服。

腹證 腹證有枳實芍藥柴胡之腹證。故雖與大柴胡湯證酷似。然內實之毒少。比較的呈有虛狀。多無舌胎。以有芍藥、甘草。故有芍藥甘草湯之類似症狀。

適應症 慢性腹膜炎

排膿散

枳實 芍藥各五、〇 桔梗二、〇

右以水三合。煎至一合。去滓。一日三回溫服。服時食雞卵一個益佳。又可爲散藥用之。

腹症 以有枳實芍藥。亦類似大柴胡湯。以及四逆散證。然無柴胡黃芩。故無熱候及胎可_音知。然必有粘痰難出。或排膿。或排血之症。可爲區別。

東洞翁曰治瘡家胸腹拘滿。或吐粘痰。或便膿血者。謂膿血與大便同出也。

尾台氏曰。

東洞先生合此方排膿湯。名排膿散及湯。治諸瘡癰。兼用芎黃、再造、伯州、七寶。各隨其症。骨槽風。

膿潰後不收口者。毒之根蒂必著齒根。故非拔去其齒。決不全治也。須先拔去其齒。而後與此方。必有効。兼用伯州散。骨槽風者。齒根骨膜炎也。

產後惡露壅滯。發小腹癰。臀癰等。腹拘滿而痛。大便泄利。心下痞塞。不欲飲食。而有嘔有咳者。亦宜此方。兼用伯州散。

咽喉結毒。腐爛疼痛。頸項生結核者。兼用鼈鼠丸。則咽喉更加腐爛。而後漸復如平日。結核去隨消卻矣。以便參考之。然亦無用鼈鼠之必要。兼用伯州足矣。

依余經驗。化膿性中耳炎。呼吸器病者。則單用時多。瘡癰等則合方之時多。

適應症 總之化膿性疾患。排膿血諸疾患。並粘痰難出。咳嗽諸疾患。有前記之腹證者用之。

排膿湯

甘草九、五 桔梗一四、五 生姜五、〇 大棗一二、〇

煎法用法。同排膿散。但不用雞卵。

藥徵曰桔梗主治濁唾腫膿也。旁治咽喉痛。

本方之主藥爲桔梗。故亦有主桔梗之症狀。其多用甘草者。以急迫之症特強。又用多量之大棗者。其引痛之症。當亦著明也。又有生姜者。以時亦發嘔吐故也。

東洞翁曰治諸湯有膿血。或吐粘痰而急迫者。

又曰。有粘痰。或膿血而急迫者主之。可爲參照。

依余經驗。患排膿性疾患。疼痛不可忍者。(甘草之證)及粘痰難出。咳嗽頻發。腹筋引痛(大棗之症)遂至嘔吐者。本方之所治也。

適應症 同排膿散。

治 驗 三十餘歲之男子。患慢性淋疾。雖經注射療法。膿亦不止。余依腹證。合用排膿散、(三倍)排膿湯、桂枝茯苓丸。(三倍)兼用大黃蘗虫丸。(五、〇一日三回)至一月全治。後不再發。

白虎湯

知母七、〇 石膏一九、〇 甘草二、五 粳米一四、五

石羔。右以水三合。煎一合。去滓。一日三回冷服。
羔（天然含水硫酸〔Crude Calcium Sulfate〕）

藥徵曰石羔主治煩渴也。旁治譫語、煩躁、身熱發狂、齒痛、頭痛者。雖曰至當之論。然無煩渴證。當與下記師說參照之。

知母。

續藥徵曰主治煩熱。

粳米之解。在附子粳米湯條下。

師曰「傷寒脈浮滑。此表有寒。裏有熱也。」浮者。浮為在外。滑者。為血液流通圓滑也。有此脈者。肌表雖寒冷。而裏。即腹內竟有熱。即為本方之主治也。

又曰「三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁。面垢。語。遺尿。身汗出者。」本方之腹滿者。雖腹裏緊張。以



白虎湯證之圖
第十七圖

腹內無充實之毒。按之亦不硬。芒硝（大承氣湯）之腹滿者。抵抗強而充實也。口不仁者。乾燥不知食味也。面垢者。謂面部不淨也。不及煩渴症者。為熱甚而譫語也。

又曰『傷寒脈滑而厥者。裏有熱也。』此言全身厥冷。雖似附子劑之證。然脈滑者。裏有熱之候也。故以本方主治之。然此最易誤認。故診脈之外。再細診是否有呼氣之焦臭。口舌乾燥。舌胎。尿色赤等症。有之。爲本方證無疑。

適應症 麻疹、瘡、腸室扶斯。其他之熱性病。日射病、頭痛、眼目痛、齒痛、齒牙發生困難症。咽喉痛、狂症、熱性下利等。

白虎加人參湯

知母六、〇 石膏五、五 甘草三、〇 粳米三、〇 人參三、〇 煎法服法。同白虎湯。

本方與白虎湯異者。只在人參一味。爲有心下痞鞭證耳。

師曰『服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。』洪爲脈大也。

又曰『傷寒後。病若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴、舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。』此本方證之至著明者也。

又曰『傷寒無大熱。口燥渴心煩。背微惡寒者。』無熱而背微惡寒者。與附子之證。尤易誤認。然以口內、脈、與尿色而分別之。

又曰『太陽中熱者。暍是也。汗出惡寒。身熱而渴。』說文曰。暍。傷暑也。故亦可曰日射病

也。余用不方。或白虎湯。有咳嗽者。與小柴胡湯合方。大勢解後。以竹葉石膏湯九折。或以小柴胡與石膏湯五折。或竹葉石膏湯合方。每每收効。

尾台氏曰。

治霍亂吐瀉後。大熱煩燥。大渴引飲。心下痞鞭。脈洪大者。於白虎加桂枝湯條又曰。霍亂吐瀉後。身體灼熱。頭疼身痛。大渴煩燥。脈浮大者。宜此方。

愛氏內科書虎列刺條下曰

於第二種之反應期。有輕度之熱候。及發生上衝。結膜充血。顏面灼熱之徵。有多數之患者。自訴頭部潮血。時發譫妄。若於第三種。則上記之障礙稍稍著明。其狀頗望扶斯。故或有虎列刺望斐士之稱。卽體溫非常昇騰。脈搏疾速而充實。舌乾燥如樹皮狀。又如被煤。腹部脹滿如鼓。軀幹之皮膚上。發見不少之薔薇疹。加之下痢意識昏愢云。

虎列刺望斐士之症狀者。與尾台氏所說極符。豈非賴此二方乎。雖無經驗。聊述其所感。以資篤學者參考云爾。

適應症 同白虎湯

白虎加桂枝湯

知母六、○ 石膏五、五 甘草二、○ 粳米一二、○ 桂枝三、○

煎法用法同白虎湯

師曰『溫瘧者。其脈如平人。身無寒但熱。骨節疼煩。時嘔。』

東洞翁曰 治白虎湯證而上衝者。宜以白虎湯。及桂枝之證。併考悟入也。

竹葉石膏湯

竹葉三、五 石膏一四、五 半夏五

、○ 人參二、五

甘草二、○ 粳八、五 麥門冬二、○

右以水三合。煎至一合。去滓。一日

三回冷服。

竹葉 療傷寒時疫之熱煩虛煩。(藥

選)

麥門冬 療煩熱、止嗽、潤燥。(藥選)肺熱而渴。胸之煩熱者為宜。(梅花)

師曰傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐者。少氣謂息急切也。

竹葉石膏湯證圖 第十第八圖



東洞翁曰當有枯燥證。

尾台氏曰

治傷寒餘熱不退。煩冤、咳嗽、渴而心下痞鞭。或嘔。或噦者。麻疹痘瘡亦同。

治骨蒸勞熱。咳而上氣。衄血唾血。燥渴悶不能眠者。骨蒸勞熱。謂肺結核發熱也。

治消渴貪飲不止。口舌乾燥。身熱不食。多夢寢汗。身體枯槁者。

適歷症 日射病、肺結核、麻疹、腸窒扶斯。其他之熱性病等。

小承氣湯

大黃一四、五 厚朴一一、〇 枳實一一、〇

右以水三合。煎至一合。去滓。一日三回冷服。

腹證 本方用大黃枳實之量。較大柴胡湯多嗜。故有強度之心下痞鞭。及內實之證。且不限於心下。甚亦波及腹部。以有厚朴。又有腹脹滿之證。東洞翁下本方之定義曰。治腹滿而大便鞭者。雖亦近是。然下痢病。亦有用者。故難爲定義也。尤宜參考前說。及下記師論也。

師曰「陽明病。脈遲。雖汗出。不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濼然而汗出者。此大便已鞭也。大承氣湯主之。若汗出多。微發熱惡寒者。外

未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹滿大便不通者。可與小承氣湯。』陽明病者何。曰。師曰『陽明之爲病。胃家實是也。』師之謂胃。卽胃腸之意。實者有如果實成熟。是則內實。爲有張裂狀充實之也。故上文謂陽明病者。卽指消化器內有充實之毒也。又曰『何緣得陽明

病。答曰。太陽病。若發汗。若下。若

利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬

陽明。不更衣。內實。大便難者。此名

陽明。』不更衣者。古之貴人。上固必

更衣。以排便爲更衣。故卽言不排便之

意也。其他不及備解。又曰『陽明病外

證云何。答曰身熱。汗自出。不惡寒。

反惡熱也。』此示陽明爲何病。故移解

有表證而脈浮數爲熱之本文。若內攻

之則變遲脈。是爲陽明之脈證（雖略稱

曰遲、而與附子之遲脈有異、乃沈實而遲者也。）雖汗出不惡寒者。如前述。卽陽明病之外證

也。身必重者。熱氣內實。由不得外越也。短氣者。因內實壓迫橫隔膜。而發爲呼吸息迫也。

小承氣湯證之圖
第十圖



腹滿而喘。亦同一此理。潮熱。謂一日一回至。不達時而熱發也。此外欲解。可攻裏也。言有以上之證者。發汗劑所主之表證（亦云外證故云外）已去。而移於下劑所適應之內實證。故宜下之。有此證而手足濇然者。卽手足繫繫自汗出也。謂大承氣湯主治之症也。然若汗多微發熱惡寒者。爲外未全去。未至潮熱者。不可與大承氣湯也。卽宜與適方之桂枝湯發汗也。陽明病。若有腹滿大便不通之證。而言宜與小承氣湯者。爲全文之旨意也。又曰『陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞭。鞭則譫語。小承氣湯主之。若壹服。譫語止。更莫復服。』於腸窒扶斯之所以便閉、譫語。理由極明瞭。有此理。而洋醫家尙得以下劑爲禁忌乎。又曰『太陽病。若吐。若下。若發汗。微煩。小便數。大便鞭者。與小承氣湯和之愈。』又曰『下利譫語者。有燥屎也。』燥屎者。因水分被熱吸收。而成乾固之糞塊也。然下利而發譫語者。以燥屎不去。若與本方下之。則二症皆可愈。又曰『大便不通。噦數譫語者』吃逆譫語。因大便之不通。故以本方下之則止。與橘皮湯等之治噦劑證大異也。

適應症 腸窒扶斯、赤痢、脚氣、胃腸病等。

大承氣湯

大黃七、〇 厚朴一四、五 枳實八、五 芒硝一一、〇
右以水五合。煎一合去滓。入芒硝溶之。一日三回冷服。

大黃

大黃者。隨用量之大小。其性効呈著明之差異。若以小量。則呈大黃鬆緩。及苦味質之作用。可制罹加答兒胃腸之異常發酵。亦可止惡心嘔氣。並下利。然若稍大量。始呈「Cathartic Sa-
[e.]」酸之作用。能下腹痛便粥狀之痢。

其用少量。則爲強壯及消化藥。並止瀉藥。用於慢性胃腸加答兒。消化不良症。於下利者用之。亦能遏止。中等量則單爲推促便通之藥物。若大量者。頓服之則能大瀉下。適用於病弱者、老人、小兒等。(中略)概爲有害作用極少之藥物。對常習便秘者。久用之爲當。

大黃單味之應用。研究之者。稱爲盡善。與他藥配合。能發揮其妙用者。此漢方獨得之方法。非洋方所遠能企及也。

藥徵曰

大黃主治通利結毒也。故能治胸滿、腹滿、腹痛、及便秘、小便利。旁治發黃、瘀血腫脹。即本藥配以枳實、厚朴。能治胸腹滿。配黃連能治心煩、心下痞有血熱者。配以甘遂、阿膠。則治水毒與瘀血。配水蛭、虻虫、麤虫、桃仁能治瘀血。配黃蘗、梔子、茵陳蒿、治黃疸。配甘

草治急迫。配芒硝治堅塊。配葛根湯治腫脹。其他不能枚舉。

厚朴

藥徵曰

厚朴主治胸腹脹滿也。旁治腹痛。

芒硝〔硫酸 Sodium〕

硫酸〔Sodium〕其他之鹽類性瀉下藥。並含有此之礦水者。大抵用於同一之目的。特本品刺戟性甚少。且兼有清涼作用。有充血及炎症症狀者。或有兼熱之內部臟器之疾患。即因常習性糞便蓄滯。便秘。及其他之原因。(肺及心臟患)而致下腹臟器之靜脈鬱積。又因之而膽汁不泌之障礙。胆石。脾臟腫大。肝臟腫大。及硬結。全身脂肪過多。肝臟脂肪變性。慢性胃病等均極賞用之。

藥徵曰

芒硝主^力奠堅也。故能治心下痞堅。心下石硬。小腹急結。結胸、燥屎、大便鞭。而旁治宿食。腹滿、小復腫痞等。諸般難解之毒也。奠堅。即使堅爲之柔輭也。此說雖非大誤。然亦非無不備之點。宜參之以下諸說。并上記之洋說。

腹症 東洞翁曰。治腹堅滿。或下痢臭穢。或燥屎者。腹堅滿者。較甚於小承氣湯腹滿。自

心至臍之間。膨滿充實。按之而抵抗之甚大者。以有此證。而下痢臭穢。或有燥感者。蘇皆爲本方所主治也。然亦有腹堅滿證。而大便鞭。亦爲本方所_得。此宜加以備及也。

師曰『傷寒、若吐、若下、後不解。不大便五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸牀。惕而不安。微喘直視。脈弦者生。澀者死。微者但發熱譫語者。大承氣湯主之。』自傷寒起至十餘日。可以免解。日晡所者。爲日暮時獨自言也。如見鬼狀。卽獨語時之恰如見鬼神。而恐悸之狀也。惕者。恐也。微喘者。少喘也。直視者。眼球不轉。注視一所也。脈弦者生。澀者死。如有右之症狀。脈弦者。以本方。尙能得救。脈之澀者。(卽如循鉄鑄之澀。)卽以與之。亦不免死之謂也。自微者以下。與此無關係。但與上文初期之傷寒。若吐、若下、後不解。不大便五六日。上至十餘日之句。接成爲一章。雖久不大便。而致脈微。苟無餘症。但發熱譫語者。可勿遲疑。逕以本方與之。

又曰『陽明病。潮熱大便微鞭者。可與大承氣湯。不鞭者。不可與之。』

又曰『陽明病。譫語、有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎也。能食者。但鞭爾。』但鞭者。未變爲燥屎。但謂大便鞭而已。

又曰『汗出譫語者。以有燥屎在胃中也。須下之。』

又曰『大下後。六七日不大便。煩而不解。腹滿痛者。此有燥屎也。』

又曰『病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。』乍難乍易。意為大便難。而竟有易通時。謂無一定也。

又曰『傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此為實也。急下之。』目中不了了者。為眼光之不明瞭也。睛不和。瞳孔部不潤澤之謂也。無表裏證之表證。即為發汗之太陽證。裏證。在此

非言純裏證。而指半表半裏之少陽

承大

證。(柴胡劑之證也)何謂少陽之氣

證。師曰『少陽之為病。口苦、咽

乾、目眩也。』又曰『傷寒脈弦細。頭

痛發熱者。屬少陽。少陽不可發

汗。發汗則譫語。此屬胃。胃和則愈。

不和煩而悸。』口苦、咽乾、目眩之證。為病在於胃也。傷寒之病。有頭痛發熱之症者。雖似

當汗之太陽證。然有脈弦細、口苦、咽乾、目眩之證者。則屬少陽病也。少陽病。不可發汗。

若汗。則變為譫語。且少陽者。有胃障礙之應徵也。故與柴胡劑以調和胃氣。胃和則愈也。

若胃不和。則煩躁而至心悸也。何以故。蓋以少陽證為半表半裏。云傷寒初期。呈太陽之證。



第二十一圖

則處發汗劑。若病劇不愈。遂至發現少陽證。此時宜以柴胡劑。若病重不癒。遂致進爲陽明之證。故柴胡證。卽少陽病。位在太陽之表證。與陽明裏證之中間者也。雖非嚴正意義之發汗劑。以能排汗解熱之小柴胡劑與之。似屬表證。又以略同小柴胡。兼有瀉下作用之大柴胡湯。又似屬裏證。故稱柴胡之證。卽少陽病爲半表半裏也。以此將本文解之。自傷寒初起經六七日。目中不了了。睛不和。無表證。及半表半裏之證。大便難。身微熱者。卽自太陽之表證。不經少陽。此由表直達於裏之劇證。故不可緩。宜急下也。

又曰『陽明病。發熱汗多者。急下之。』發熱汗多。則生燥屎險惡之證。故言不可緩治也。有此證。因失下之故。而發怪症之例實多。見下之治驗。

又曰『發汗不解。腹滿痛者。急下之。』此與前條略同。

又曰『陽明少陽合病。必下利。脈滑而數者。有宿食也。當下之。』此陽明證與少陽合併症。必發下利。有此下利。而脈兼數滑。則有不消化。食餌停滯之徵。謂當急下也。

又曰『少陰病得之二三日。口燥咽乾者。急下之。』少陰病者云何。師曰『少陰之爲病。脈微細。但欲寐也。』以此便知其病狀。然本條之少陰病者。非真之少陰病。乃陽實之極。急迫而呈此症狀也。卽真熱假寒之證。雖體表爲陰證。而脈微細。然體內則呈陽證之口燥咽乾。故亦宜急下之。

又曰『少陰病。六七日。腹脹不大便者。急下之。』此僅腹脹不大便之症為異。其理同前條。
又曰『少陰病。自利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。急下之。』清同固。言利純青之固水。（水樣之便）謂之自利。外證故雖有異。但其理同於前條。

大承氣湯之圖
等十二一圖



又曰『下利。三部脈平。按之心下痞鞭者。急下之。』三部之脈者。云寸關尺三部也。寸者。當醫之示指。關當中指。尺當便指。平。平脈也。即云常脈也。故上文之意。為下利症。寸關尺之三脈。皆為平脈。心下按之鞭者。故宜急下之之謂也。

又曰『下利脈遲而滑者。內實也。利未欲止。當下之。』

又曰『下利不欲食。以有宿食故也。當

下之。』

又曰『下利差後。至其年月日復發者。以病不盡故也。當下之。』差者。謂外觀的如治癒也。

又曰『下利。脈反滑。當有所去。下之乃愈。』此下利病。不宜脈滑。而反有滑脈者。爲病毒自欲脫之徵。亦下之愈也。

又曰『病腹中滿痛。此爲實也。當下之。』

又曰『溼爲病。胸滿口噤。臥不著席。脚攣急。必齩齒』口噤爲牙關緊急。臥不著席。角弓反張也。齩齒。謂齒咬合所發音也。故上文若以破傷風症治爲說。則更明矣。然余之本病之經驗。姑以尾台氏方技雜誌所載者。錄供讀者之參考。同書曰。破傷風者。多自發於足趾也。如切疵、打撲、屢拔等。雖曰小疵。過五日七日乃至十五日升日。已覺忘之。而亦有發此風者。故醫者則誤以輕易失診。甚者有角弓反張。兩便不利。手足拘急。不省人事者。然其症輕。可用大劑之葛根加附子湯。重者烏頭湯大承氣湯。手足拘攣。牙關緊閉者。與紫圓六七個。或一錢。稍遲則畢命矣。又有心下痞塞。時時鬱冒者。此宜瀉心湯。

明之吳有性氏。著溫疫論。其中有益之論甚多。揭載於左。以明本方所應下之諸症。

舌黑胎

但無胎。其舌恰如含墨汁之黑而濕潤者。屬附子之證。妊婦等極多。此不可下。

舌芒刺

但有老人患輕症塞扶斯。無下證者。亦有呈此舌候。不可下。

舌裂 舌短硬 舌卷

白砂胎。(舌之白胎乾硬如皴之皮者)

舌燥裂 唇焦色 口臭 鼻孔如烟煤

口燥渴(類白虎湯證但白虎無腹堅滿之證)

目赤 咽乾 氣噴如火(言呼氣如火)

小便赤黑涓滴作痛 小便極臭 揚手躡足 脈沈而數

齟語 潮熱

但僅此一證。有不可下者。

善太息 心下滿 心下高起如塊 心下痛

腹脹滿 腹痛按之愈痛 心下脹痛 頭脹痛

小便閉

大便閉 轉屎氣極臭(轉屎氣放屁也)

但有此證。血液枯渴者。亦不宜下。當灌腸也

大腸膠閉(素無大便硬。因惡塞扶斯)。下粘膠極臭之便。

熱結傍流（同前記之少陰病自利清水色純青）

四逆（四肢之末端厥冷者）

脈厥（內熱之極脈伏不可觸者）

體厥（內熱極脈呈脫候全身如水之厥冷者）

發狂

以上仲師及吳氏之論。皆關於急性熱性病。特爲窒扶斯等。及其他之疾病。外此現斯症狀者甚稀。然亦有從腹證脈證而運用本方者。

適應症 上記之外。頭痛、發狂、眼疾、脚氣、赤痢、胃腸病等。

治 驗 十七歲之男子。數月前罹熱性病。雖受醫治。諸症增進。發熱便閉。出汗如雨。雖醫治不忘。迄無效果。診之。病者起居不能。聲如猿啼。涕泣以外。不能言語。全身枯燥。背部及四肢。發生長毛。四肢屈曲不利。與之食。亦能食。二便失禁。余隨脈腹證。與大柴胡湯、大承氣湯、桃仁承氣湯、大黃牡丹皮湯之四方合用。然因畏藥故。混入食物。爲三日分之藥。服七八日始完。雖無顯効。然其父母能信余極深。故前方服至三個月。意識回復。手足之運動稍自由。兼用抵當丸。約一月則全治矣。

調胃承氣湯

大黃一九、〇 甘草 芒硝各九、五

右以水三合。煎一合。去滓。一日三回冷服。

腹 症 本方以有大黃芒硝。故其腹內有充實之毒。雖似大承氣湯證。然其度較弱。且無枳實厚

朴。故亦無腹滿證。以有甘草。故知

有急迫之證。東洞翁曰。但急迫而大

便不通主之。雖非完備之說。亦足以

資參考。師曰『發汗後。惡寒者。虛

故也。不惡寒。但熱者。實也。當和

胃氣。』太陽病於發汗後。而惡寒。

以體液隨汗亡失。精氣虛而惡寒也。

即芍藥甘草附子湯之證也。若汗後更

發熱甚者。乃陽病不愈於發汗劑。而

不經少陽。直入陽明也。無腹滿等症。故不用大承氣湯。而與本方也。

又曰『傷寒十二三日不解。過經譫語者。以有熱也。當以湯下之。』有熱而譫語者。法當以湯下

之。紫圓、備急圓、與大承氣湯。於腹證雖難區別。然丸藥罕有施之熱性病者。故其間知有分

調胃承氣湯證之圖
第二十二圖



別也。此條之證。有譫語發熱。與大承湯小承氣湯亦難爲別。故於腹證上決之也。

又曰『太陽病。過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反澀。腹微滿。鬱鬱微煩。』澀。不凝結而柔也。溫溫。欲吐不吐。而惡心云也。以下之症。皆因急迫所致也。故有甘草。卽本方所以有調胃之名也。

又曰『陽明病。不吐不下。心煩者。』此亦急迫所致。用本方主之。

又曰『太陽病。三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。』蒸蒸發熱。如釜烹物。與表證之發熱惡寒病狀大異。而與第一條略同。故見同條下。便能知也。

以上所說。皆爲熱性病。若其他之疾病者。宜定腹證以處劑。

尾台氏曰

瘡瘡、麻疹、癰疽、疔毒內攻衝心、大熱、譫語、煩躁、悶亂、舌上燥裂。不大便。或下利。或大便綠色者。宜此方。

又曰牙齒疼痛。齒齦腫痛。齦齒枯折。口臭等。其人平日多大便祕閉而衝逆。宜此方。以資參考。

十四歲之男兒。罹腸窒扶斯。差後。無故再發。發熱四十度。不食便閉而渴。洋醫數名。協力盡技。無効。來余乞診。余急行八里之路程。夜半甫達患家。診之。病狀如前述。『口唇色微

紫藍」。胎白而乾燥。脈雖沈微數。幸而有神。腹診之。胸脇苦滿。腹內稍充實。按之微痛。軀幹皮膚。雖困燥。然四肢微冷。據方一回量之三分之一與之。少時腹微痛。遂如蠶便下降之狀。經六時餘。雖下至直腸。但硬固不得出。不得已以手探之。出如石之糞塊多數也。續排臭惡多量之軟便。忽然體溫下降。復至平溫。迄今苦腦之病者。已破顏微笑。低聲吟詩。其父母之喜悅。無物可譬也。後用小柴胡湯。以二週日體復健康矣。

茵陳蒿湯

茵陳蒿二、五 山梔子 大黃各七、〇

右以水三合。先煮茵陳蒿。至二合去滓。入二味。再煮至一合去滓。一日三回冷服。但大黃之量。隨症之輕重而加減之。

茵陳蒿 主治發黃也。(藥徵)

山梔子 主治心煩也。旁治發黃。(藥徵)目赤、熱痛、面赤、心煩、溺痛、黃臍症、上部內外之

熱。(藥選)宜熱證之黃臍。吐血衄血。(梅花)

東洞翁曰 治一身發黃。心煩大便難。小便不利者。發黃謂臍症也。

適應症 急性黃臍。

治 驗 二歲之小兒。罹鵝口瘡。次發黃膽。全身橙黃色而有光澤。發熱不食。便秘。余給本方八分之一投之。只一日。黃胆鵝口瘡。皆脫然治癒也。

瀉心湯

大黃四、八 黃芩 黃連各二、四

右以湯五勺漬之。頓服。但有熱者宜冷服。

藥徵曰。黃連。主治心中煩悸也。旁治心下痞。吐下腹中痛。

腹 證 東洞翁曰治心氣不定。心下痞。按之濡者。今略說之。心氣不定。爲精神不安之意。心下痞。謂胃部膨滿有停滯之感。按之濡者。謂心下痞。而淺按之則軟。若深按之。稍有抵抗也。然致精神不安者。以有血熱。亦因於心悸動亢進也。故本證之心悸亢進。有異於心臟衰弱者也。夫心力旺盛。心動疾速。脈亦隨之數而有力。甚則上逆。顏面潮紅。便秘或大便艱等。一切壯實。而有熱狀。或竟發熱也。

師曰。『心氣不足。吐血衄血者。瀉心湯主之。』然不惟主治吐血衄血。亦能治一般之出血。但與桂枝茯苓丸等之驅瘀血煎方。及下瘀血丸、驅瘀血丸方之用途。則有不同者。卽本方能奪血行瘀之血。因於有熱而出血之熱。且從而發揮止血作用。後者所止者。乃因瘀血而成凝血之

出血也。至阿膠劑者之止血功效。又在血管之薄弱。或血液之凝固力減退。因而出血之時。斯其用途各異。未容混同。然此三因中之二或三之證。顧或合併發現者。所見實多。更宜留意也。

適應證 用途多端。未遑枚舉。要其大略。則如腦出血、半身不遂、顏面神經麻痺、衄血、肺結核、(熱發咳嗽咯血)胃出血、胃潰瘍、痔出血、眼疾、耳疾、鼻疾、口腔舌及咽喉之疾。與發狂等。火傷後大熱煩躁嘔吐下利者。及船車眩暈症等。亦有奇效。

桃仁承氣湯

桃仁七、○ 桂枝 芒硝 甘草各七、○ 大黃一二、○

右以水二合五勺。煎一合。去滓。內芒硝化溶。一日三回分服。但有熱者宜冷服。

藥徵曰桃仁主治瘀血。少腹滿痛。故兼治腸癰。及婦人經水不利。

腹證 東洞翁曰。「治血症。少腹急結。上衝者。」此證起諸傍臍左側之腹底。延長互於上下方。可觸知如細長之索狀物。若以指頭按其橫徑。則有強度之抵抗。且疼痛特甚。時有少腹急結之證。此乃瘀血急結。欲衝於上方而乘上衝。故其定義曰。「血證少腹急結上衝。」以其當劇重之時。不惟少腹急結。聞有上衝迫及左肋骨弓下及心下部。而發出胃痛。嘔吐。胃出血等

證。且上衝之時。侵及心臟或呼吸器。卽致心狹窄痛、喘息等證。若上衝極。則及於頭腦。故仲景論此曰。『太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下之愈。其外不解者。尙未可攻。當先解外。外解已。但少腹急結者。』

右論之（少腹急結者）與（其人如狂）者。乃上下相應。以少腹急結之瘀血。若上衝襲於腦中。而發出如狂者也。故但言少腹急結者乃可攻之。卽示以少腹急結者爲目標。乃可以此方攻下也。

如上所述。雖曰病毒多衝逆上部。然亦有急結於右側。或波及下部。而發膀胱、尿道、生殖器、直腸、肛門諸種之疾病。東洞翁之定義。究非全屬適合。故亦宜從仲師之說。以少腹急結證爲主目的而用之。此方分釋之其圖如左

桃核承氣湯證之圖
第二十三圖



桃仁

桂枝

芒硝

甘草

大黃

女醫調胃承氣湯

如進以上表式。故本方證。亦能發調胃承氣湯之類似證狀。

適應證 產後諸症。經閉帶下。男女之生殖器疾患、淋疾、徵毒、痔疾、脚氣、神經痛、「癱瘓質斯」頭痛、發狂、眼疾。齒痛、腹痛、腦出血、吐血、衄血、喘息、赤痢、打撲疼痛等。

大黃牡丹皮湯

大黃牡丹皮湯

大黃九、五 牡丹皮散七、〇 桃仁六、〇 冬瓜子九、五 芒硝一、一、〇

右以水四台五勺。煎一合。去滓。內芒硝化溶。一日三回分服。

牡丹皮 宜脈實數。而吐血衄血者（梅花）除癥堅瘀血。治女子經脈不通。血澀腰痛。（摘要）
冬瓜子 有逐水氣之効。（古方丸散解）夫葦莖、薏苡仁、桃仁、瓜瓣、皆有化血釀膿之功也。

（續藥徵）瓜瓣者冬瓜子也。

腹證 東洞翁曰治臍下有結毒。按之卽痛。及便膿血者。卽治臍下腹底有堅塊。按之則疼痛

者。或有此證。而便膿血（大便混合膿血者。）亦可以本方主治之。然以余之實驗。有堅塊不

在臍之正下。而發現近臍之左右側。（按）

薺宛（按）相對者亦多。

師曰。『腸雜者。少腹腫痞。按之卽痛

如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。

復惡寒。其脈遲緊者。膿未成。可下

之。當有血。脈洪數者。膿已成。不可

下也。』膿（按）癰卽盲腸炎。少腹痞按之卽

痛者。殆盲腸部腫脹。觸之如痞。按之

則疼痛。『按之』與『痛』字中間之『卽』字

者。卽示隨「按」而「痛」之間不容髮也。

如淋。小便自調者。由盲腸疼痛。放散

於尿道。一若淋狀之痛也。然以排尿無障礙。故知非淋也。時時發熱自汗出。復惡寒者。形容

發熱之狀也。其脈遲緊者。卽有以上之狀態。願脈在遲（吳山甫曰遲、醫者一呼一吸、病者脈

大黃牡丹皮湯證之圖
第二十四圖



來三至曰遲、二至、一至、則又遲也。若二呼二吸一至、則遲之極矣。程應旆曰、遲脈、亦有邪聚熱結、腹滿胃實。阻住經隧而成者。又曰、今驗有癥瘕疝氣、壅遏隧道、而見遲脈者。緊（脈學輯要曰。蓋緊不散也、謂其廣有界限、而脈與肉、劃然分明也。）之間也。膿未成者。謂尚未化爲膿也。可下之者。言可以本方下之也。當有血者。本來因瘀血之病。言可以此方下其瘀血也。脈洪數者。膿已成。不可也者。謂脈洪（吳山甫曰、洪猶洪水之洪、脈來大而鼓也。）數（吳山甫曰、數、醫者一呼一吸、病者脈來六至、曰數、若七八至、則又數也。九至十至、十一至十二至、則數之極矣。）者。已化膿。故（此化膿者雖不載本書。然即薏苡附子敗醬散之證也。）非本方之主治。故有不可下也。往聖之旨既如此。與余之實驗。可謂全然一致。然於西洋醫術。則與此正相反對。執此而與阿片使之便秘。謂竟得良策之異者。誠不能無疑也。

適應症。盲腸炎、癰瘤腫、下疳、便毒、徽毒、淋疾、痔疾、男女之生殖器官病、瘰癧、陳久疥癬、痔瘻、乳癌、腳氣等。

桂枝茯苓丸

桂枝 茯苓 芍藥 桃仁 牡丹皮各二、四

右以水二合五勺。煎一合。去滓。一日三回分服。

腹證 東洞翁曰。治經水有變。或胎動。拘攣上衝。心下悸者。本方之用途。不僅限於婦人。定義中所揭（經水有變或胎動）之文字。此大誤也。然婦人之經水。亦有變與不變。胎動者。亦在妊娠以內之病。又上衝心下悸之症。亦非常有。故以上之症。雖有參考之必要。要難定爲正確之目標也。然將以何者爲準據乎。曰。必於病者之左右直腹筋。而齊按之。如右側痛。或其度弱。左側痛。或其度強。或臍之周圍。或臍下有不固形之瘀血塊。或按之則疼痛。而無貧血者。可決爲本方證也。

師曰「婦人宿有瘕病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍上者。爲瘕痼害妊娠。六月動者。前三月經水利時胎也。下血者。後斷三月也。」所以血不止者。其瘕不去故也。當下其瘕。』此文義之不明者。先輩有言之者矣。或以闕文解之。今取文意之易會者。與余之實驗。近於一致之點而試釋之。宿者久也。瘕病之瘕（玉篇曰瘕腹結病也、史扁鵲傳曰、見五臟瘕結、尾台氏曰。蓋謂腹中有凝結之毒、按之應手。可徵而知）者。言瘀血塊也。（經斷未及三月。而得漏下不止）者。謂已妊娠。未滿三月。而子宮出血不止也。「胎動在臍上者。爲瘕痼害妊娠」如上述之狀態。卽臍上有覺胎動。因瘀血塊而爲妊娠之障害也。（所以血不止者。其瘕不去故也。當下其瘕）因前之漏下不止。瘀血塊結在體內。故用此方下其血塊也。

瀉症 原本方乃治血行器及血液之變常。因發爲諸病者。故其應用範圍。廣大無邊。難以枚舉。茲將其主要舉之。頭痛、眩暈、耳鳴、腦出血、半身不遂。眼耳鼻諸疾患。心臟病。動脈硬變。各種之出血。神經病〔Rheumatismus (癱麻痧瘧)〕發疹病、腫痛、皮膚病、輕症盲腸炎、胃腸痙攣。男女之泌尿。生殖器病、痔核。脫肛等。

澤瀉湯

澤瀉二九、〇 白朮九、五

右以水二合、煎一合、去滓、一日三回分服。

腹 證 師曰。『心下有支飲。其人苦冒眩。』心下者。在此當爲胃內。支飲之飲者言水也。支者。支障之意。故支飲者停水也。而心下有支飲者。蓋謂胃中有停水。有此症之人。而苦冒眩（此解宜見左記尾台氏之說）者。即本方之主治也。然東洞翁曰治苦冒眩。小便不利者。按之師說。觀察點雖異。而其實則同。蓋小便不利者。必變胃內停水。有胃內停水者。亦必有小便不利症。設有胃內停水者。而其症不明。但小便不利。或頻數之症。而屬冒眩者。此爲本方之主治。

尾台氏曰支飲冒眩症。其劇者。昏昏搖搖。如居暗窟^壹。如坐舟中。如步霧裏。如冒空中。居室

牀褥。如迴轉而走。雖瞑目斂神。亦復此然。是非此方不能治。斯當參攷也。

當歸芍藥散

當歸 芍藥一、〇 茯苓 白朮各一、三 澤瀉二、三 芍藥四、八

右以酒及水。各一合二勺。同煎一合。去滓。一日三回分服。但忌酒。或與他方合方者。宜用水煎。

考 藥 治中風入腦、頭痛、風痺、筋攣、婦人血閉。……(摘要) 溲便毒、瘀血、結毒、癰疽、諸瘡。……(藥選)


腹 證 同桂枝茯苓丸之腹證。而有貧血別也。或貧血兼衰弱。或貧血兼水氣爲目的。顧在疑似難決之時。宜先與桂枝茯苓丸。試其應否。若不效者。則爲本方證。且本方亦有澤瀉白朮。所以亦常發冒眩症。故宜留意與單純之澤瀉湯判別之。

師曰『婦人懷妊。腹中疼痛。婦人腹中諸疾痛。』本方雖不限於婦人專用之方。然亦爲婦人科病不可少之要方也。因此特以婦人二字冠其上。然其痛之部位。皆在腹部之左側。而無在右側之經驗。

適應症 本方亦應用最廣。故難舉適應證。然其主治者腦貧血、眼症、(特顯視弱)心臟衰弱、衰

弱性脚氣、慢性胃腸病、胃腸痙攣。腎藏炎。不妊症。流產癖。及其他之婦人病。痔核等。其他亦治桂茯苓丸適應症之貧血。

此方分解之其圖如左



言瘀血多在身體左側之故

古人以左側之病。變為瘀血。要非全無根據之說也。依解剖學所告。當總頸動脈之大動脈弓起。右側者與動脈弓作為直角。左側則為鈍角。分歧為鈍角者。以直角比之。血液易於流入。故其血量、血壓。及其流速。皆比右側強大。故腦動脈栓塞。右側為少。而常發於左側者。蓋本此理也。又如分歧於腹部大動脈之總腸骨動脈。左側動脈與腹部動脈。幾無成角。觀之恰如此動脈終枝。而右側偏有不然。故左側比右側。其血液之流速、壓力、容量皆大。斯又子宮動脈。

左側動脈比右側動脈較著。血液之流入量亦多者。此則當然之理也。以此左側比右側。其血量既多。故瘀血亦隨之較多也。非獨動脈爲然。卽靜脈亦猶是也。何以言之。蓋靜脈大抵皆與同名動脈全相一致者。古人立言。信不我欺也。

下瘀血丸

大黃一六、○ 桃仁七、○ 蟅蟲二一、○

右爲末以蜂蜜爲丸。用量一回一、○乃至五、○一日三回。以酒或白湯服。

腹證 師曰『產後腹痛。法當以枳實芍藥散。假令不愈者。此爲腹中有乾血。著臍下。宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。』

對於本方師說。僅右之二證。古來醫之用此方者。非無其人。率皆拘泥此論。關於前證以外。頗鮮能活用之者。究師之所以乍發此論。以瘀血多見於婦人。且皆在臍下。遂執婦人病爲標本。而噫瘀血。聊示診察之目標。亦非定謂無右二證。卽爲不可用之意存也。故假無腹痛經水不利之症。或婦人病者。苟察臍下宿有瘀血。皆當選用本方也。然瘀血治劑。豈本方所能獨占。其他尚有數方。惟瘀血之部位。殊難斷定何者卽爲本方證。欲知憑何種瘀血而始用本方。此大有研究之價值。且至難之問題也。余遭此難題。千辛萬苦不得其解。或從自體。或以家族。用

爲研究材料。思案揣摩。積之久矣。後乃發見此證者甚多。始悉本方者。除去著明之貧血。或

下痢症而衰脫以外。一如大凡方劑。於

治療血煎劑中。皆得兼用之。要不失爲

最通用之治療血丸也。論大黃廩蟲丸及

抵當丸二方。亦爲治療血丸。雖如下列

所揭之定證。姑勿論其標準。然於臨床

上。與本方最難區別。當先以本方試之

。設不效。則用大黃廩蟲丸。或投與抵

下瘀血湯證之圖
第十二卷第五圖



當丸。此屬最後之方法也。

抵當丸

大黃一五、〇 桃仁 虻蟲 水蛭各五、〇

右丸法用法。同下瘀血丸用量。一回五、二〇日三回。

本方之腹證脈證等解說。在大黃廩蟲丸條下。

下瘀血丸之鎮痛、止痛作用。並大黃廩蟲丸及抵當丸之止血作用。

下瘀血丸治疼痛之理由何如。曰。血管有瘀血凝滯之時。(如血塞之血管內。出血硬塞之在血管外之時者也。)將壓迫刺激之瘀血塊除去。故疼痛自散退矣。與西洋醫術由麻醉劑。而鎮痛知覺機麻痺之一時的方法。不可同日語也。以此理。故不限臍下疼痛之症。無論全體何部。苟有血塞、血栓、動脈瘤。靜脈瘤出血性硬塞等。凡因瘀血凝滯而發疼痛者。盡可以此治之。苟無疼痛症。即不可用之。非如前記因於瘀血者。皆得施之也。何以言之。雖有瘀血塊。但因部位及狀態而異。斯則爲無壓迫刺激知覺神經故也。此方得爲止血藥者。蓋瘀血凝滯於主要之血管。而妨礙血液之流行。或全塞止時從而副枝之血行血壓反高。甚至出血。此時用本方除去血行障礙之瘀血塊。血液得以順流。則血自止矣。理實易明也。大黃廕蟲丸及抵當丸之止血作用。要不外乎此耳。然其二者之瘀血。比前述更加陳久。皆已變成組織。或迨將化爲組織之際。乃二者應用標準之異點也。且於臨床上。亦難分別。尤當先用下瘀血丸。比較的下新瘀血。若無效者。見有因陳久瘀血之徵。則與緩和之大黃廕蟲丸先試之。若再不效者。則宜與抵當丸以上三方證。但往往由他覺的。於下腹不易認其膨滿。而病者訴之不止者。宜將三方選用之。

大黃廕蟲丸

大黃二〇〇、黃芩一六〇、甘草二四〇、桃仁六五〇、杏仁五六〇、芍藥三二〇、

地黃八、〇〇、乾漆八、〇、蟲虫一〇七、〇、水蛭一六六、〇、麝虫七二、〇、
右爲末以蜂蜜爲丸。用量一回一、〇乃至五、〇一日一回乃至三回。用法同抵當丸。

瀰靡症 五勞、虛極、羸瘦、腹滿不能飲食、食傷、憂傷、飲傷、房室傷、飢傷、勞傷、經絡榮
衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。緩中補虛。

仲師之論文雖難解。今余釋之如下。蓋食傷爲銷化器病。憂傷爲神經系及血液病（古人指血管
系爲經絡。以血液衛養身體。故稱榮衛。）之意。有因此等疾病。而成五勞虛極。（衰弱之至甚）
羸瘦。腹滿不能飲食。重而其血乾着體內。（久久變爲敗血）以故肌膚甲錯（即云如皴膚）兩目黯
黑。若用此方，即可去體內之乾血。變虛弱爲強壯云。

欲知此釋有無大誤。試引仲景及先哲之所論爲參照。則更明瞭矣。

金匱要略婦人病篇仲師曰

『婦人之病。因虛積冷結氣。爲諸經水斷絕。（以上說月經閉止之由來、以下述經閉之原因、及發
生種種多雜之病變。）至有歷年。寒結胞門。（胞門即云子宮。積結乃集積而凝着也。）寒傷經
絡。（病變波及血管系）凝結在上。嘔吐涎唾。久成肺癰。形體損分。（古以人體分爲三段。即
胸廓以上爲上焦。胸中以下至臍爲中焦。臍以下爲下焦。故在上之上。乃指上焦。若瘀血凝着
於此。則嘔吐涎唾之症。若久久不驅逐而放置之。則變肺疾患。身體漸次衰弱。）在中盤

結。(瘀血結於中焦。如盤之固着)繞臍寒痛。或兩脇疼痛。與癥相連。(藏指子宮。謂兩脇骨部之疼痛。與子宮有關連。)或結熱中。痛在闔元。(臍下三寸爲闔元。)脈數無瘡。肌若魚鱗。(若魚鱗與甲錯同意。卽言宛若魚鱗癩。)時着男子。非止女身。(以婦人多瘀血。故論謂婦人病。然亦不限女子。則男子亦復不少。)在下未多。經候不勻。(下焦之瘀血不多。亦不致月經閉止。只爲不順而已。)令陰墜痛。少腹惡寒。或引腰背。下根氣衝。氣衝急痛。膝脛痛煩。奄然眩冒。狀如厥癲。或爲憂慘。悲傷多嘔。此皆帶下。(古人稱婦人病爲帶下。婦人科醫爲帶下醫)非有鬼神。(雖怪怪之症狀。亦非鬼神。皆爲瘀血。)久則羸瘦。脈虛多寒。三十六篇。千變萬端。(後略)久字爲有瘀血。而不速爲驅逐。有久久放道之意。

原南陽氏著叢桂亭醫事小言曰

(上略)斯其爲因。根源皆屬瘀血。是藥尤能通治萬病。蓋人之血氣流注。全身貫通。循環若有障礙。結滯不必定屬何處。其云瘀血。亦非因於折傷打撲。其因蓋遙傳諸父母受胎之時。(中略)初生兒不以瘀血名之。而稱爲胎毒。蓋因蓄於胎毒內之血氣。因此而滯。迨長成初無多端之變形。惟初生之時。或發於頭上。或口中。或眼目。甚至聲啞。不能涕泣。要皆同一毒也。雖不如此。亦或成疔。或爲瘡。或爲馬痺風。或腹痛哭泣不分晝夜。如在痘疹。尤可知其輕重。有至中年發者。此毒不榮新血。結於大絡中。發爲有形。苟因外邪。或爲飲食之所動。則變出

前述之象。而現多端之症。內蓄者多積結而成塊。顯有因食而發者。實非食塊。雖上衝頭痛或偏痛。臂痛脚痛。亦非概依絡之左右上下而分。大致痛者宜以溫散爲主。此理不可不知也。如中風痛風。亦因於此。其他噎膈。(古人對食道癌、胃癌、皆稱爲噎膈或膈噎。)諸癥疥。鼓脹。脹滿。(卵巢腫瘍)癆瘵等。則亦同其因而異其形。故分種種名目。但泥其名目。故皆稱爲積病不治。又如癥、瘕、伏梁。外見雖異。其因何莫不同。蓋因絡結節。障礙血流。其絡則漸脹大如瘤。所以兩邊之筋。因此絡而血流不能順利。按之皮膚有癥塊可覺。時或動觸於物。則發疼痛。或不流注。瘀血遂結於絡而成堅塊。間因天氣寒涼。而不流注者。則服藥針刺。使之頓流。筋絡亦得柔軟。此等或謂聚。或謂癥。若立筋之大絡。攣引而急張者。或謂拘急。或謂伏梁。關於此絡不通之處。亦有不擾腹中而引脊背。如在手足而作痛者。更有疑於腰部。因寒涼而痛者名爲疝。此亦同因也。然疝比積尤大。以其從山故知也。若氣血順流之人。既無此積。則亦無胎毒。故血不凝而流利。其痘疹亦輕。所謂無病之人也。若有瘀血之人。病癥則作塊。所謂瘧母也。(脾臟腫大)卽至於傷寒痘疹等。亦皆較甚。若婦人則因此而經水不調。或不能懷孕。或成鼓脹。或脹滿。並將病因考之。內發之病。因此而起。故當以腹候之心得爲第一也。

尾台氏於本方條下曰

治婦人經行不利。漸爲心腹脹滿。煩熱咳嗽。面色煤黃。肌膚乾皮細起。狀如玳片。目中暈暗。

或赤澀羞明怕日者。

治小兒疳眼生雲翳。臉爛。羞明。不能視物。并治雀目。

乾漆別錄曰癢咳嗽。消瘀血痞結腰痛。女子疝瘡。去蛔蟲。

大觀本草蠹虫條曰。

大黃蠹虫丸主久瘕積結。

尾台氏於下瘀血丸條下曰

下瘀血湯加乾漆二兩。蕎麥糊爲丸。治小兒疳疾。癍塊。諸藥無效。羸瘦脹滿。不欲飲食。面身痿黃浮腫。唇舌刮白。或殷紅。肌膚紫澤。巨里（巨里卽心臟部）跳動如黃胖。（黃胖者貧血之一種）兼有蛔虫者。有奇效。

仲師舉抵當湯之適應症曰（抵當湯與抵當丸藥味相同）

『太陽病六七日。表證仍在。脈沉而微。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當滿。小便自利者。下血乃愈。（後略）』

因而瘀血。若少腹硬滿發狂者。』以少腹硬爲目的。與本方下其瘀血。故云乃愈也。

『太陽病身^其脈沈結。少腹鞭。小便不利者。爲無血也。小便自利。其人如狂者。血證謬也。』身黃者輕症之黃疸也。余嘗驗一老人。肝臟腫大。全身微黃。且瘙癢甚。不食。大便祕。脈沉

微。與大黃蠱虫丸服之。黃蘗癢痒竟豁然全愈。卽此可以立證。師曰。小便不利者無瘀血。小便自利者。則尿利無障礙。故云必有瘀血。然亦屢有未盡然者。必以少腹硬爲目的。再參考其他之證狀。庶可決定瘀血之有無。

『陽明病其人善忘者。必有蓄血。所以然者。本有久瘀血。故令善忘。屎雖鞭。大便反易。其色必黑。』

喜忘卽健忘。蓄血卽久瘀血也。謂因久瘀血而健忘也。有此症之人。大便雖鞭。病人無表裏症。發熱七八日。雖脈浮數者。可下之。假令下已。脈數不解。合熱則消穀善饑。至六七日。不大便者有瘀血。消穀善飢者。言雖食食亦尙覺飢也。有此症而有瘀血者。應以本方治之。言雖有此症。若無瘀血。則不然也。以消穀善飢。多發於有精神病之症狀。依此則可見精神病之發。多因於瘀血。然西醫對此症。皆用臭素劑阿片劑等。而不用驅瘀血方法者。不可謂無大誤也。

『婦人經水不利。下抵當湯主之。』

尾台氏於抵當湯條下曰

婦人經水不利者。棄置不治。後必發胸腹煩滿。或小腹鞭滿。善饑健忘。悲憂。驚狂等症。或釀成偏枯。(半身不遂)癱瘓、癆瘵、鼓脹、膈噎、等證。遂至不起。宜早用此方。通暢血隧。以

防後患焉。

墮撲折傷。瘀血凝滯。心腹脹痛。二便不通者。經閉。少腹鞭滿。或眼目亦腫疼痛。不能瞻視者。經水閉滯。腹底有癥。腹皮見青筋者。並宜此方。

產後有惡露不盡。凝結成塊爲宿患者。平素用藥。難收其效。須待再妊。分娩之後用此方。不過十日。其塊盡消。

此說亦似是而非。有此症者。不必待其產後。雖妊娠中。與此方服之亦效。但不如產後之神靈耳。

徵之往聖先賢。其治驗既如斯。今余以科學爲基礎。與西醫學一對照之。其契合與否。從可研究矣。

一肺結核

愛氏內科學曰

於原發性肺結核。是否患者自罹本病。其原因雖曰決由肺臟感染結核菌所致。然其時所要注意者。必有助結核菌寄生繁殖之誘因。設無此因。即決不能感染。然若以結核菌爲本病之原因。則皮想之淺見。蓋此菌僅爲此病原因之一部分。實非全部也。過言之。愛氏所謂之誘因。可稱爲真因。爲真因之結核菌者。亦誘因也。何以言之。假令此菌侵入體內。若無氏所謂誘因。則不能

罹患。蓋人體中。有此菌寄生繁殖最適好之培養基後。始來此菌之寄生繁殖。然亦非先有此菌。而後生培養基。俗云物腐而後虫生。非虫生而後物腐也。

氏又曰

對於體質疾患。最大影響者。莫如肺癆。如身體薄弱。抵抗力少。且貧血之人。最易罹患。乃因結核菌。隨塵埃滋蔓於空氣中。最恐者。各人隨處而吸攝。如健康體者。固不能寄生。若體質虛弱之時。則容易固着。而漸次增惡。其他並無別途之理會。

然余之說。可謂漸固確。而氏所謂體質。即身體薄弱。抵抗太少。且當貧血之人也。此即仲景所謂五癆虛極之證。仲師對此體質之由來。并說治方之詳密。亦可謂義無餘蘊矣。故有此體質之人。若受仲師之治方。則不但改造體質。亦可得免疫結核菌。假令雖感染此病。若不失其治期。亦可待全治期。何則。蓋師之治方。雖不能完全滅殺侵襲體中之結核菌。然能除却此菌立脚之培養基。譬之絕其糧道。此菌有不失其戰鬥力哉。余從此點。深得仲師之方意。賴以救濟無數之病人。事實足以證之。豈現今之治法。徒以誘因視爲結核菌而攻伐之。一忘改良真因之體質。彼無治績可舉者。亦固其所也。然一因此菌。自不能付之等閑。夫以結核菌之猛毒。苟無能致體內細胞免受其害之理想藥。將亦如之何哉。

二 蠱毒

本病與前者相反。有殺滅病原「*Spirrochaete Pallida*（梅毒之原虫）」之特效水銀劑。况復所發見「*Saraisan*」對本病之治療。有如鎧甲所至。無不立呈粉碎。然事實常亦再發為難治症。或不能防止之後貽病。其故仍等諸肺結核病。因重視外因之微毒菌。對此傳染最有力之內因。反置於閑散之結果也。抑本病亦不單因微毒菌而成立。觀與有病毒者相接觸。斯應感染。而竟不能傳染。即此益可明東洋的「*Saraisan*」（生乳）矣。

水銀（九錢）砒石（三錢）硝石（十六錢）明礬（十二錢）

綠礬（十八錢）雲母（十五錢）食鹽（十五錢）青鹽（三錢五分）

右八味。各別搗篩為末。以次調合之。內甕中密封之。積凡十旬以上。而取出燒焉。但燒一次之藥末。約二十錢許（燒法九法略之）服法如胡麻子大。以辰砂為衣。一九或二丸。砂糖湯送下。發見者陳子成著徵瘡秘錄曰

或入門。有人與患者同寢共食。不傳染者何也。余曰。此緣先天之氣充固。邪氣無間而入。所以有終身為妓。半世作風流客者。竟無此恙。洋醫學者。認本病有先天的免疫性。故微毒菌對本病。不能單獨成立。蓋必要與內因共鳴者也。然其內因為何。余曰瘵血也。以下為詳論之。

擲人身之有瘵血。多於循環之中途。因瘵血自家之重量。而沉着於身體之最下部。或回陷部。

其節西醫所謂血塞乎。當沉着最多之部位。莫如骨盆腔者。顧獨何哉。蓋此爲體腔之最下部。以其狀呈凹陷。且欠運動。則血流緩慢。易爲形成血塞也。然依所瘀部位。與其波及部位之異。或爲痔核。或爲膀胱炎。或攝護腺肥大。或成精系靜脈瘤。或辜丸炎。在女子則爲卵巢炎。外膜炎。實質炎。內膜炎等。發現千變萬化之疾病。斯無外因者既其然矣。况更乘以外因乎。蓋瘀血或變爲敗血。不但欠乏抵抗微毒之抗毒素。彼之肉汁及血液培養基。從而反爲細菌寄生繁殖最適合之須者。要不外此耳。有瘀血之人。接觸病毒與否。定必感染較易。理固然也。而病毒之感染。一部分以淋巴系爲介。一部份直入血行之中。兩者皆與血液共行循環。病毒既撒佈於滿身。於茲則瘀血助強病毒。病毒從爲瘀血。因變爲果。果化爲因。兩者鉤結而漫逞毒性。症狀之發現。以之千態萬狀。時則欲施內服之驅微藥。或施注射「Spirillae」其菌雖或滅盡。然爲此菌所瘀濁之血液。及既存之瘀血。有不受其影響。故用殺菌藥者。若乖驅瘀之方法。當難期待完全之治愈。依多數之經驗。婦人之微毒比男子易治者。蓋爲病毒與經血排出故也。如妊婦有重症之微毒者。因病毒無由謝出之途。又如微毒之重症。多於娼婦者。良以職業上而荒蕪生殖器官。且無月經也。執此數端。足證前說之不架空。又本病後胎症之腦梅毒。及後胎症之血管及血液變化之因。皆明示於病理解剖學。其爲術皆偏於攻擊「Spirillae」。而不行排泄瘀血之方法。故古人治本病。多於殺菌劑中而配合驅瘀血藥用之。卽如七寶丸 此吉益東洞翁之方。和田先

生常用之。先生曰。極能破碎護膜腫之妙方也。

輕粉牛膝各十兩 土茯苓五兩 丁子二兩半 大黃四兩

右爲末糊丸。

輕粉丁子殺菌藥。土茯苓利水藥。牛膝驅瘀血藥。

治瘡方 甲斐德本氏方

龜板 辰砂 大黃各四錢 輕粉五分

右研末以糊爲丸。

辰砂輕粉殺菌藥。龜板與鼈甲同效。驅瘀血藥也。

排膿黑散 同氏方

雞霜(去腹中之穢物將骨肉腹背煨霜)五錢 反鼻霜二錢五分 芷(卽水銀以硫黃製成)鹿角霜

鼈鼠霜 藥萐草霜各二錢

右六味。取爲散。或以糊丸。以溫酒送下二錢。日二三。

花乃殺菌藥。雞霜。反鼻霜。鼈鼠霜。鹿角霜。乃驅瘀血兼強壯藥。藥萐草「卽八口八」藥能尙

未明。

主治諸瘡毒。廢疾微毒。或惡瘡痔。癩癬鶴膝風。痘疽黑陷等症。用之於內托排膿。亦大有神效也。

果執上述之理。余之治本病。皆精診病者之腹脈證。與適應之仲景煎方。若在上部之輕症者。與第一解毒散。在表位之重症者。與第二解毒散。設或潛伏性者。兼用解毒丸。以此治之。無不愈者。然此論之目的。欲喚起凡用殺菌藥者。必當併用驅瘀血藥也。蓋余用驅微藥以外。既非不兼他藥。且無排斥洋方之「Sarsalan」及汞劑也。

三 淋疾

慢性淋疾及其續發症之所以難治。亦同於梅毒。余對此症。與適應之仲景方。兼以再造散、下瘀血丸、抵當丸、大黃蟄虫丸、治之。靡不獲治者。

四 癰腫

癰之主因。皆爲瘀血。仲師與南陽尾台諸氏說之明矣。余取西說以證此說之不誤。雖曰涉獵無幾。方欲就其接近。而下綜合之斷定焉。偶讀小極博氏之胃潰發生論。博士於剖見鏡檢上。有多數之立論曰。胃潰之最多數。殆言近其全部。皆嘗因含胃潰瘍（潛在性胃潰瘍）之痕痕組織爲前驅期而發生。其由他部位發生者。未之見也。若此說爲無誤。則本病之原因。當必求之於胃潰瘍。然胃潰瘍由何發生。則爲血拴血塞也。謂由胃壁之血行障礙。致胃粘膜貧血。榮養告絕。而爲粘膜之胃液。被其消化故也。此多數洋醫其所承認者。然中醫則認此病爲瘀血上攻之結果。應用驅瘀血煎丸。下其臭黑血及糞便。雖不即愈。然無再發之虞。此知血塞血拴之爲瘀血

明矣。然每見洋醫對此病源之血拴血塞。全不謀及驅除。反周章其結果之出血、疼痛等。或用止血、鎮痛、緩和、包攝等藥。或行絕食、安靜等法。以勉求其獲治。斯意實難案解。夫以姑息之療法。苟得一時之僥倖。亦止固着於病原之局所。以成發生癆腫之張本耳。

余根據以上中西二醫學之所示。隨用適證之煎方。兼用下瘀血丸、大黃蠱虫丸、抵當丸。並由他醫所斷定之胃癌。及胃部有可觸知之硬固腫瘤。或兼消化障礙。貧血衰弱。且自年齡等。放出充分之診定爲初期胃癌者。亦屢屢治愈之矣。然宿有如咖啡樣吐血證等之吐血症狀具備。顧無往驗。未能斷定用治癆劑與否。有濟生篤志之君子。幸勿輕視余輩爲無名無識之立言。儘有陷於絕望之淵。而呻吟之病者。勿以爲無效而不試。若比從來之療法。尚有多少之增進者。又豈獨余之榮譽也哉。

五 血行器血液病。及新陳代謝病。

此病殆皆兼瘀血。讀者試之。

六 癩病

本病余未曾經驗。然以中西二說。及由他病所得之經驗的智識。而推斷之。斑紋癩、及結節癩者。可以驅瘀血煎丸散。及瀉血法治之。神經癩者。考用附子劑、驅瘀煎丸散、生乳主治之。茲舉先輩之治驗。以資參攷。

一婦人三十歲。患癩病三年。眉毛脫落。鼻梁腫。赤斑如雲。手足麻痺。月經不通。予作抵當丸飲之。日三錢。服後三十日。下血數升。後一百日全愈。(古方便覽)

一婦人面色紫黑色。全身肉脹。余刺委中(膝膈窩)出血。與拆衝飲(桂枝茯苓丸之類方)服之而愈。(生生堂醫談)

淡州人某。患惡疾。一身不知痛痒。兩便失度。其面微腫有光。眉毛脫落。先生與桂枝朮附湯(桂枝加朮附湯中、去茯苓者。)兼用應鐘散。(川芎大黃等分爲末)及七寶丸。服數月。疾自若。未差。更用伯州散三錢。服五日。小便悉血。二日又吐涎沫。臭不可近。爾後瘳復常。(續建殊錄)

一男子全身乾燥。觸之如柿漆紙。眉毛脫落。余一日與化毒丸。(生生乳加味)一日與龍門丸。如此者一月餘。後與浮萍加大黃湯乃愈(生生堂醫談)

甘草小麥大棗湯

甘草小麥大棗湯

甘草五、五小麥二九、○大棗五、○

右以水二合。煎一合。去滓。一日三回溫服。

著者曰小麥者緩和藥也。故能治急迫。

酸棗仁湯

腹證 師曰『婦人臍躁。悲傷欲哭。象如神靈所作。數欠伸。』臍言子宮。象者。病形也。數者。屢屢之意也。尾台氏曰此方治臍躁者。以能緩急迫也。婦婦室女。平素憂鬱無聊。夜夜不眠等人。多發此證。發則惡寒惡熱戰慄錯語。心神恍惚。居不安席。酸泣不已。服此方立效。又痲症、狂症。髣髴前症者。亦有奇驗。本症爲瘀血迫急神經系。此宜緩和。故爲本方之主治也。然單以此方。其作用亦不能達到本源之瘀血。故其效亦一時的而已。故先以本方。治其急迫。後隨腹證。以柴胡桂枝乾姜湯。桂枝茯苓丸。苓桂朮甘湯。或兼用驅瘀血丸。此按本的之治法也。或視爲不可思議之『(歇私的里)』者。乞有以此試之。則立能解也。

酸棗仁湯

酸棗仁二九、○甘草一、二 知母茯苓 芎藭 各二、四
右以水二合五勺。煎一合。去滓。一日三回分服。

藥徵曰

酸棗仁治胸膈煩燥不能眠也。

師曰虛勞。虛煩不得眠。

尾台氏曰諸病久久不愈。尪羸困憊。身熱寢汗。怔忡不寐。口乾喘嗽。大便溼。小便澀。飲漿

無味者宜此方。

健忘、驚悸、怔忡三症。有宜此方者。

脫血過多。心神恍惚眩冒不眠。煩熱盜汗。見浮腫者。宜此方合當歸芍藥散。

東洞翁治一病人。昏昏不醒如死狀。及五六日者。用此方速而有效。

讀者歷觀之。當知其主治。

適應症 不眠症。神經衰弱。(歇斯的里)等。

八味丸

地黄三、五山茱萸薯蕷各一、五澤瀉茯苓牡丹皮各一、三

桂枝附子各〇、九

右以水三合。煎一合去滓。一日三回分服。

著者曰地黄主治小腹不仁。兼治手足或兼身熱之煩熱。口舌乾涸、出血。

山茱萸溫中焦止小便。(梅花)

薯蕷主治泄精健忘。止泄瀉「摘要」補腎虛。溫下焦「梅花」

腹 證 師曰「脚氣上入小腹不仁。虛勞腰痛。小腹拘急。小便不利者。夫每氣有微飲。當從小

便去之。桂苓甘朮湯主之。腎氣丸亦主之。男子消渴小便反多。以飲一斗。小便一斗。問曰婦人病。飲食如故。煩熱不能臥。而反倚息者何也。師曰。此名轉胞不得溺也。以胞系了戾。故致此病。但利小便則愈。」

短氣者。呼吸促迫。微飲者。胃內有少量之停水也。腎氣丸者。八味丸之別名也。消渴者。渴欲飲水而小便反少也。倚息者。肩息也。轉胞之胞者膀胱也。故轉胞者。膀胱一部之位置。或形體之有變常也。胞系者。即輸尿管。了戾者。言曲屈或捻轉之意也。本方為一日不可或缺之要方。言其用途極廣。然不熟知腹證。則反有害而無效。

八味丸證之圖
第十二圖



小腹不仁若狗急
凡不仁ハ其處我身ノニトク覺レハカクノヲ三
又按ニ虚薄ク締結ス如ク得弱カモノ亦不仁

顯可不注意哉。凡仲師方之有地黃者。只本方、三物黃芩湯、芍歸膠艾湯、炙甘草湯、黃土湯之五方。其腹狀皆下腹軟滿無抵抗物。恰如按真綿之軟。而無何種引緊之觸覺者也。(恩師和田先生發見)然本方中。地黃之外。尚有

附子。故前症之外。定有膀胱尿筋。或括約不全。或全麻痺之症狀。「余之發見」有此二症狀。與手足煩熱。或足冷或煩熱與足冷之變化。及有脚弱麻痺之症狀者。皆可決定之爲本方證。

適應症 脚氣「尤以婦人脚氣爲甚」產後之痿蹙、腎藏炎、糖尿病、女子生殖器官病、「特多於子宮下垂症。白帶下」男女陰痿等。

治 驗 三十歲之婦人。產後罹脚氣。終至口唇麻痺。腰脚疼痛難急。不能屈伸起立。衰弱瘦削而便秘。經數醫無寸效。乞余診之。余從腹脈證。與柴胡桂枝乾姜湯。桂枝加苓朮附湯。桂枝茯苓丸。(三倍)當歸四逆湯。(倍半)八味丸(三倍)合方。兼用大黃鹽虫丸五。○一日三回兼施之。徐徐增入八味丸。積漸至七倍。當歸四逆湯。增至二倍半。柴胡桂枝乾姜湯。達至倍半。自初診起。通計二十日。起居動作如常矣。

三物黃芩湯

三物黃芩湯

黃芩苦參各八、五地黃一七、〇

右以水三合。煎一合去滓。一日三回冷服。

著者曰苦參似有解熱及殺虫、殺菌之作用。

腹 證 師曰「婦人在草蓐。自發露得風。四肢苦煩熱。頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛。但煩熱

者。三物黃芩湯主之。『草薶者產薶也。

尾台氏曰

治骨蒸勞熱。久咳。男女諸血證。肢體煩熱甚。口舌乾涸。心氣鬱塞者。骨蒸勞熱者。肺勞之發熱也。

治每至夏月。手足煩熱難堪。夜間尤甚。不能眠者。

治諸失血後。身體煩倦怠。手掌足下熱更甚。唇舌乾燥者。

此腹證者以有地黃。故類似八味丸。然本方有身體煩熱。四肢苦煩熱。唇舌乾涸之症。皆比八味丸較強。且無消渴小便不利之症。及麻痺足冷等之附子症狀。以此判別之。且二證亦無併發同一之理。故更當注意之。余嘗治產後罹肺氣。漸次兼發肺結核。乃與八味丸。桂枝茯苓丸合方。兼用大黃廩虫丸。終見胃痛〔病者曾患胃弱〕肺氣。漸漸輕快。然勞熱等之呼吸器症狀依然。

迨後認有本方證合併之處。故再與前方。乃得全治矣。

適應症 肺結核、產後熱等。

炙甘草湯

甘草三、五、生姜桂枝各二、五、人參阿膠各二、〇、地黃二、〇、〇

麥門冬八、五麻子仁五、五大棗二、五

右以水五合。煎一合去滓。內阿膠化溶。一日三回冷服。

麥門冬 療煩熱。止嗽。潤肺。(藥選)宜肺熱而渴。胸中之煩熱(梅花)

麻子仁 植物性脂肪藥。有緩和及緩下之作用。

腹 證 師曰「傷寒。脈結代。心動悸。」

又曰「虛勞不足。汗出而悶。脈結心悸。行動如常。不出百日危急者。」

又曰「肺痿。涎唾多。心中溫溫液液者。」

溫溫液液者。不可名狀苦惱之義也。

腹證雖同三物黃芩湯。然心臟及腹部大動脈有著明之搏動。以此區別之。

適應症 肺結核

治 驗 四十歲之婦人。罹肺結核。醫治無效。來院診之。羸瘦衰弱。口舌乾涸。食不知味。脈

弱數而結代。右肺尖及上下葉之部。聽之有觸音咳嗽咯痰。時時咯血。心臟及腹部大動脈搏動著

明。腹部凹陷如舟底狀。腹袋殊軟。臍下尤甚。左直腹筋攣急。壓之甚痛。臍下有瘀血塊。自

訴口舌乾涸。而不欲食。四肢苦煩熱。復兼不眠動悸咯血便秘等。余與本方(倍半)桂枝茯苓丸

(三倍)酸棗仁湯三方合方。兼以黃連解毒丸八、〇一日二回。下瘀血丸五、〇一日一回。是夜

稍得安眠。自後皆能熟睡。且無咯血。至四五日。除去酸棗仁湯。續服前方。約二週日。煩熱悉除。故將黃連解毒丸。改與大黃蟄虫丸五、〇二回。下瘀血丸五、〇一回。再續服前方。約一月餘。疾患根治如洗矣。

芎歸膠艾湯

芎藭阿膠甘草各三、五艾葉當歸各五、五芍藥七、〇地黃二、〇

右以酒及水各一合。煎一合。去滓。內阿膠化溶。一日三回溫服。或以水煎亦佳。

續藥徵曰。阿膠主治血證。故兼治心煩不得眠。著者曰。阿膠者。能爲出血藥以外。亦一種緩和強壯藥也。

艾葉 灸百病。止吐血下血。療腹痛。(藥選)

腹證 師曰『婦人有漏下者。有半產後。因續下血都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻。』漏下者。謂子宮出血之甚。胞阻之胞者。謂子宮也。金鑑曰。胞阻者。胞中血氣不和。而阻其化育也。

本方亦有地黃。故下腹之狀態。有如前述。卽左直腹筋攣急。按之則痛也。有此腹狀而下腹痛。或出血。或不妊娠。或流產者。皆本方所主治也。

東洞翁曰。凡治吐血下血諸血症者。不別男子婦人矣。

尾台氏曰

妊婦顛躓。胎動冲心。腹痛引腰背。或覺胎痿縮狀。或下血不止者。可用此方。胎不殞者即安。若胎殞者即產。

治腸痔。下血綿綿不止。身體痿黃。起則眩暈。四肢無力。小腹刺痛者。若胸中煩悸。心氣鬱塞。

大便秘結者。兼用黃連解毒湯、瀉心湯。

血痢不止。而無腹滿實熱症。惟腹中^字疼痛。唇舌乾澀者。此方間亦有效。

婦人有每妊墮胎者。有每產不育者。若壽人。始終服此方。五月以後。嚴慎枕席。可以免不育之患。若浮腫小便不利者。宜當歸芍藥散。

黃土湯

黃土湯

甘草、地黃、白朮、附膠、黃芩各五、○附子一、○黃土一二、○

右以水二合五勺。煎一合去滓。內阿膠溶化。一日三回溫服。

伏龍肝(黃土)止嘔吐。(產論)治心痛、反胃、中惡。產後惡血攻心而痛者。崩漏、帶下、吐血、咳血、催生下胞衣有特效。(腹證奇覽)

腹證 腹證頗似八味丸然者。所異爲無消渴膀胱麻痺之證耳。而有出血及動悸之狀。可以分別之。就其動悸之點。亦類似炙甘草湯。然本方之動悸者。乃自下而向上升騰狀也。且有附子證。亦足以此別也。

適應症 師曰「下血。先便後血。此遠血也。黃土湯主之。亦主吐血衄血。」

尾台氏曰。

吐血下血。久久不止。心下痞。身熱惡寒。面青體瘦。脈弱舌色刷白。或腹痛下利。或微腫者。治臟毒、痔疾、膿血不止。腹痛瀉瀉。小便不利。面色痿黃。日漸羸瘠。或微腫者。（臟毒者子宮病也）余曰亦可治有痔核而脫肛。或脫血甚。或有衰弱腦貧血之症。和田先生治因腸室扶斯之腸出血而衰弱者。（見醫界之鉄椎第二版）

人參湯

人參甘草白朮乾薑各九、〇

右以水二合五勺。煎一合。去滓。一日三回溫服。

藥徵曰

人參主治心下痞堅、痞鞭、支結也。旁治不食、嘔吐、喜睡、心痛、腹痛、煩悸。

腹證 東洞翁曰。治心下痞脹。小便不利。或急痛。或胸中痺者。夫心下痞脹者。言胃部有停滯膨滿之感也。按之恰如薄板。鞭而不痛。此爲人參應用之標準。有此證而有尿利減少。或尿利頻數。或胃痛。或胸痺之證。皆本方之主治也。然尚有心中部稍高。胃內有停水。心下部以下。肉

筋軟弱。按之不痛。食慾不振。或頻吐。若非軟便。亦必下利。有虛寒之狀。而無實熱之證。此可稍補上說之不足。

將本方分解之圖如左

人參湯證圖
第七十二圖



如上面頗類似苔姜朮甘湯之症狀。

師曰「霍亂。頭痛發熱。身疼。多欲飲水者。五苓散主之。寒多不用水者」。而本法之症。言霍亂之有寒氣不欲飲水。爲五苓散症之反對證也。然其利尿之點則同。

又曰「太陽差後。喜睡。久不了了者。胃上有寒。當以丸藥溫之」。重病後。屢有吐睡久久

者。爲胃內有停水。以本方爲丸劑溫之。（人參與乾姜皆溫藥）則愈。

又曰「胸痺心中痞。留氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。枳實薤白桂枝湯主之。人參湯亦主之。」胸痺者。胸中有閉塞之感。或竟有痛覺。肋下逆搶心者。由肋骨弓下。衝逆於心臟。而感疼痛者也。此證爲枳實薤白桂枝湯之正證。雖無人參湯之必要。然以人參湯能治此症之緩弱。故云亦主之。適厥症 心臟神經痛。食道不全麻痺。慢性消化不良症。慢性腸胃加答兒等。老人最多本方證。有如小兒之下利證。變爲亞急性性。而肉脫四肢微冷。脫汗。脈微弱。吐乳下利不止。陷於頻死者。以本方與歸耆建中湯。有速效也。


乾姜黃連黃芩人參湯

乾姜黃連黃芩人參各九。〇

右以水三合。煎一合。去滓。一日三回分服。

胸證 本方即瀉心湯之去大黃。與人參湯之去朮甘草合方。故似瀉心症而無實狀。似人參湯證而無小便不利或頻數之症狀。執此而熟思經驗之。自當有得也。」

將本方分解之其圖如左



尾台氏曰

治胃反心胸鬱熱。心下痞鞭。或嘈雜者。胃反爲吐食病。胃弛緩下垂擴張症也。骨蒸勞熱。心胸煩悶。咳嗽乾嘔。或下利者宜此方。

適應症 肺結核


半夏瀉心湯

半夏一一、〇甘草人參黃芩乾姜大棗各五、五黃連二、〇

右以水三合。煎一合去滓。一日三回分服。

本方治心下痞鞭。心下至臍之間雷鳴。嘔吐或不利。然雷鳴有幽微者。或全若不明者。故宜注意之。

將本方分解之其圖如左



尾台氏曰

痢疾腹痛。嘔而心下痞鞭。或便膿血者。及每飲食湯藥下腹。直漉漉有聲轉泄者。可選用以下三方。以下三方者。即本方。與甘草瀉心湯、生姜瀉心湯。因甘草瀉心湯。未嘗經驗。故無揭載焉。

瀉心症，急性及慢性之胃腸加答兒赤痢。

治驗 三十歲之婦人。患痢症數年。一日四五回。請治名醫。亦無寸效。求診於余。一見如貧

血狀。心下痞鞭。腹中雷鳴。左直腹筋攣急有壓痛。同側腸骨窩。有柔軟之瘀血塊可觸知。余以本方與當歸芍藥散（三倍）合方。服二三日下痢止。續服三週日則全治。竟不再發。

半夏瀉心湯圖
第八十二號



生薑瀉心湯

半夏一一、〇甘草人參黃芩大棗各五、五黃連乾姜各二、〇生姜七、〇

煎法同半夏瀉心湯


本方與半夏瀉心湯所異者。僅乾姜之量少。特加多量之生姜。只此二點。故當知比前方證。惟多加生姜證耳。

將本方分解之其圖如左

人參湯去茶

瀉心湯去大黃

乾姜半夏人參丸



小半夏湯

黃芩加半夏生薑湯去藥

師曰「胃中不和。心下痞鞭。乾噎。(噎者食物之臭氣也)食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴。下利者。」然有不下利。有嘔吐。有嘔吐下利。有雷鳴。亦有不雷鳴者之別。此正不必拘泥也。

尾台氏曰。凡患噎氣乾嘔。或嘈雜吞酸。或平日每飲食覺惡心妨滿。脇下水飲升降者。其人多心下痞鞭。或臍上有凝塊。常服此方。灸自五椎至十一椎。及章門。日數百壯。兼用消塊丸。消石大丸等。自然有效。此說正半是而半非也。余於此證(臍上有凝塊)以桂枝茯苓丸或當歸芍藥散與本方合方。時更與大建中湯合併。或兼用下瘀血丸、大黃廩虫丸、抵當丸。惟不用灸法。早則一月。遲則三月。靡不全治者。曰凝塊在臍上。斯則大抵皆胃壁弛緩下垂。或下界於臍。或竟至臍下者。皆胃壁有腫瘤故也。嘗治六十餘歲之男子。而患此症下黑便。衰弱至甚。

黃芩湯

經二三醫。斷為胃癌。宣告其必死。而余以前記之方法。約二月有餘。竟獲全治。瘡之云乎哉。

黃芩大棗各一、甘草芍藥各七、〇

右以水三合。煎一合。去滓。一日三四分服。

藥徵曰。黃芩主治心下痞也。旁治胸脇滿。嘔吐下利也。

腹證 本方證為心下痞。(即胃部停滯膨滿之感)有左右直腹筋強而繃急腰痛。兼有腹瀉下利。

舌胎黃稍乾燥。口苦發熱等。

適應症。熱性下利症。即赤利也。初期

者加大黃。以驅除病毒。至無粘液血

液則去之。

治驗 為五十歲之婦人。羅赤利。二

十餘日不治。余隨腹證。以本方增加

一倍半。加大黃一日量二、五〇與三

日分。殆已得間。去大黃。再投三日分

黃芩湯之圖 第二



。終復健康。

黃芩加半夏生
藥湯

黃芩加半夏生薑湯

黃芩大棗生薑各五、五甘草芍藥各三、五半夏二、〇

煎法用法同黃芩湯。

適應症 同黃芩湯症能治乾嘔。

白頭翁湯

白頭翁湯

白頭翁黃連黃栢秦皮各九、〇

右以水三合。煎一合。去滓。一日三回分服。

藥徵曰。白頭翁主治熱利下重也。

黃 藥 主治腹胃中之結熱。(摘要)去腎熱。宜瀉利。赤白帶下。痢疾。「梅花」

尾台氏曰。熱利下重。渴欲飲水。心悸腹痛者。熱而下利。及裏急後重。亦有渴而好水。掌觸於心尖部。則心悸動而作心煩之狀。【心煩者無思念而心懸懸謂也】腹痛。舌苔微黃【或白苔】而稍乾燥者。本方證也。

尾會氏曰赤利每欲大便。則肛門熱而火燒者。爲本方證也。

又曰治眼目鬱熱。赤腫陣痛。風淚不止者。

適應症 熱性下利。赤痢。

白頭翁加甘草阿膠湯

白頭翁加甘草
阿膠湯

白頭翁黃連黃蘗秦皮各七、○甘草阿膠各五、○

師曰「產後下利虛極。」虛極者。衰脫也。

東洞翁曰治白頭翁湯證。而有血證急迫者。此以阿膠治出血。甘草治急迫故云。

尾台氏曰治產後下利腹痛。荏苒不已。羸瘦不食。心悸身熱。唇口乾燥。便血急迫者。又曰痔核

肛中焮熱疼痛。或便血者。若大便燥結加大黃。

余於產後下利及赤痢之經驗。有可言者。如赤痢之於白頭翁症。其或本方證者。尙有不明之處。間當與白頭翁湯。不效者則與本方。症如稍重者。則加除大黃。與黃芩湯同法也。

小半夏湯

小半夏湯

半夏一〇、〇生姜六、〇

右以水二合。煎五勺。去滓。服之。「一回量」

藥徵曰。半夏主治痰飲嘔吐也。旁治心痛逆滿。咽中痛。咳悸。腹中雷鳴。

師曰「諸嘔吐穀不得_レ下者。」又曰。「黃疸病噦者。」東洞翁曰治吐而不渴者。此方治諸病有嘔吐症。而不能服適方。故先以此方鎮吐。然後用適方之謂也。又黃疸病有呃逆(或嘔吐)者。本方之主治也。然若嘔吐症而兼渴症者。則非本方證也。

本方雖治呃逆。(非止黃疸病)然若腸窒扶斯病。大熱譫語。腹滿便閉等之症。而間作呃逆者。則非本方所治矣。其治前記之主證者。非治客證之呃逆。但只消失而已。惟呃逆過劇者。亦可兼用主方也。

小半夏加苓湯

半夏七、〇生姜五、〇茯苓二、五

煎法同小半夏湯

師曰。「卒嘔吐心下痞。膈間有水眩悸者。」卒乃突然意也。心下痞者。或有胃部停滯膨滿。因胃內有水而生之感覺也。眩者眩暈。悸者心悸亢進也。又曰「先渴後嘔。爲水停心下。此屬飲家。」飲家者。謂水停胸腹所變之病者也。

與五苓散之別

五苓散證者。渴欲飲水。水入胃中即直吐。且有發熱小便不利等證。本方證爲狀。則先渴而後嘔。且其渴證非持續的。必其度亦輕弱也。

虎翼飲（本方即小半夏加茯苓湯、合橘皮湯、加伏龍肝也。故有此名。）

半夏三二、○茯苓一二、○青皮四、○生姜六、○

右以伏龍肝湯二合半。煎一合半。去滓。分服。迄至奏效。以知爲度。

伏龍肝湯 古竈之燒土（或辨黃土）一二、○研細末。以水三合內之。攪拌靜置之。後取上清者二合

五勺。

適應症 對妊娠及其他之嘔吐有神效。或只與伏龍_{肝湯}亦佳。（日本產科學鼻祖賀川_{功任}之創方）

生姜半夏湯

正
姜
半
夏
湯

半夏一二、○生姜汁四勺

右以水一合二勺。先煮半夏八勺。內生姜汁。再煮六勺。去滓。放冷。三四回分服。

師曰。『病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。微心中憤憤然無奈者。』憤憤者心亂或昏眩之狀。即心胸昏悶。無可奈何之謂也。

尾台氏曰

凡諸病痰飲卒迫。咽喉閉塞不得息。湯藥不下咽者。非此方不能開通也。當先以此方解其急。而後處方從宜。加能胆者效尤速。又治噦逆。

半夏厚樸湯

半夏一四、五厚樸三、五茯苓五、〇生姜六、〇蘇葉二、五

右以水二合。煎一合。去滓。一日三回分服。

紫蘇葉 發汗進食散氣（梅花）解肌之薄品。稍行氣。利膈。（藥選）

師曰。『咽中如有炙燂。』

千金方曰。胸滿心下堅。咽中帖帖。如有炙肉。吐之不出。吞之不下。

燂者小肉也。謂咽中如有肉片粘着之感。

以有厚樸。可知胃部感有抵抗之滿。故曰胸滿心下堅。帖即垂者之義。帖帖如有炙燂。言覺肉片垂下之感。

適應症「神經家」歇斯的里家。多有本方證。以本方試之。當知其奇效。或用於妊婦嘔吐。及其他之嘔吐。

乾姜人參半夏丸

乾姜人參各八、○半夏一六○

右爲末。以生姜汁。糊爲丸。用量一回四、○一日三回。

師曰。『妊娠嘔吐不止。』東洞翁曰治嘔吐不止。心下痞鞭者。本方證一如小半夏湯以下諸方證。要非急劇也。嘔吐多者徐緩之。以有人參可知也。且知有心下痞鞭。食機不振。及衰弱之候也。

橘皮枳實生姜湯

橘皮枳實生姜湯

橘皮一四、五枳實七、○生姜一四、五

右以水二合五勺。煎一合。去滓。一日三回溫服。

橘皮 藥徵曰。橘皮主治呃逆也。旁治胸痺者。胸停痰。胸痺（中）閉塞而痛。停痰者。胸廓停水也。

東洞翁曰治胸痺。心下痞滿嘔噦者。本方以有枳實。當知肋骨弓下及心下部痞滿。恰如大柴胡湯之腹證。然無大黃。以腹內無充實之者。

千金方曰。胸痺。胸中輻輳如滿。噎塞不利。習習如痒。喉中澁燥唾沫。輻輳者。填塞之義

橘皮湯

也。故幅幅如滿者。言自咽喉部。至胃之上部。感覺如溢滿狀也。噎者。塞也。塞者不通也。不利者。滯滯也。故食事之時。爲形容食物難進狀也。以上之症。多見於老人。然亦類似人參湯證狀。須當注意之。凡有喉內澀而作乾痒之感覺。若有前記腹證者。卽本方主治也。

橘皮湯

橘皮四、○生姜八、○

右以水一合。煎五勺。去滓。服之（一回量）

東洞翁曰治胸中痺嘔噦者。願與小半夏證所異者。以本方有胸痺之證。彼則無之。又本方以呃逆爲主。以嘔爲副。彼則以嘔吐爲主。以呃逆爲副。此可判別之。若能決其兼證。則出以試驗的治療。或竟二方合用之。

橘皮竹茹湯

橘皮竹茹湯

橘皮一九、○竹茹五、○大棗四、六生姜五、○甘草三、○人參〇、六

右以水三合。煎一合。去滓。一日三次溫服。

竹茹 主傷寒、勞復、小兒熱疳、婦人胎動。（摘要）

東洞翁曰。治胸中痺、噦逆者。本方與橘皮湯證所異者。以本方嘔證少。而有咳嗽及擘引急迫之證。彼則嘔證多。而無前證也。

尾台氏曰

小兒塊乳。及百日嗽。此方加半夏極有效。

三因方曰

治欬逆嘔噦。胃中虛冷。每一噦至八九聲相連。收氣不回。至於驚人。

本方與小柴胡湯合方之處極多。

適應症 百日欬、肺結核、慢性胃腸患等。

茯苓飲

茯苓人參朮各七、○枳實五、○橘皮六、○生姜九、五

右以水三合。煎一合。去滓。一日三回溫服。

腹證 師曰。『胸中有停飲宿水。自吐出水。後心胸間虛氣滿。不能食。消痰氣。令能食。』

心胸中云者。以胸中有停痰。胃中有宿水。同時述及也。故本方爲呼吸器病。及消化器病之兼用方也。虛氣滿不能食者。言腹饑欲食不下狀也。消痰氣者。言能消停痰宿水也。

東洞翁曰

治心下痞鞭而悸。小便不利。胸滿而自吐宿水者。

診腹證者。宜從此說。即治心下痞鞭而動悸。小便不利或頻數。胸滿。(胃部滿鞭之意)胃之停滯宿水也。治吐出云者。本病一則因胃障礙而致停水。一則因尿利不充分。故欲治胃症者。必以茯苓朮利水。庶胃內之停水去。而吐水止。食慾漸進。則可達於全治矣。

尾台氏曰

治胃反吞酸嘈雜等。心下痞鞭。小便不利。或心胸痛者。又治每朝噦心。吐苦酸水。或痰沫。兼用南呂丸陷胸丸等。

治老人常苦痰飲。心下痞滿。飲食不消。易下利者。又治小兒乳食不化。吐下不止。并百日欬。心下痞滿。咳逆甚者。俱加半夏有殊効。若脇腹有癥塊。或大便難者。兼用紫圓。

此說似是。至於兼用方。多有與余持異議者。即余多數之實驗。本方單獨之證極少。而兼於痰血者獨多。故若非因宿便、寄生虫、不消化物停滯者。以生姜瀉心湯下所述之方法治之。無不效者。

本方有橘皮枳實生薑湯。可知有橘皮枳實生薑湯證之類似症狀。

將本方分解之其圖如左

腹中之所以多瘀血。

橘皮枳實生姜湯

茯苓
人參
木
枳實
橘皮
生姜

依解剖生理學所示。門脈者。爲集合腹腔內諸臟器組織全部之靜脈血。卽老廢血者。而盡輸送於肝臟之任務也。此靜脈之入肝腔內。復分歧爲無數之小靜脈。以增大其抵抗面。及通過充實之肝內。故肝內之血流速。狀極徐緩。惟其末流之血行遲緩也。則動或向上而逆流。於生理的既如斯矣。故一朝肝病變起。則血行蒙其阻害。而影響及於門脈。或起逆流。或成鬱滯。理至易明也。且此靜脈者。以無瓣膜裝置。不能抑止其逆流。顯因血壓及自家之重力。漸次洗墜而至集積。遂形成血塞。蓋門脈既容納腹部諸內臟組織之靜脈血。故血壓亦隨各種之臟器而發生。

臍下最多瘀血。

之原理。腸間膜靜脈者。起自臍下部。與門脈成一直線。故門脈系若成血塞。則以此靜脈之起始部爲多。故臍下之多瘀血者。此極明瞭也。而仲師以此部爲瘀血診察之目標者。非無故也。

大建中湯

蜀椒六、五 乾姜一七、〇 人參八、五 赤飴四十々

右以水三合。煎一合。去滓。內入飴。少煮。俟飴溶。一日三回溫服。但飴可減半也。

蜀椒 溫中焦。治蟲積。(梅花)

飴 膠飴之效。蓋似甘草。故能緩諸積。(續藥徵)著者曰。亦滋養之效也。

腹 證 師曰。『心胸中大寒痛。嘔不能飲食。腹中寒。上衝。皮起出見。有頭足上下。痛而不可觸

近者。』

本方以胃腸蠕動之不安爲目的。師所述之皮起出見有頭足上下者。卽形容此狀態者也。故有蠕動不安症。而心胸中大寒痛者。或嘔而不能飲食者。或上衝即向心下者者。或痛不可觸近者。用之皆有大效。不然者。卽爲無效也。所謂大寒痛與腹中寒者。蓋謂犯有本症之病者。無熱而反覺寒冷。按腹部亦得觸知此病狀。故示無熱而有寒狀者。常用之也。雖然。亦時有蠕動不安症。而潛伏不顯者。此時按摩其腸管。或以指頭衝動之。當能發現。又有破格而並無蠕動不安狀。惟呈左症者。

適應症 和田先生曰膽石病者。以本方加半夏爲主。兼用承氣丸(大黃芒硝二味糊丸)卽可根治。

以下至適左症因
前方一段在大建中
建中湯前中間一
段又在在大建中
湯一段內

大建中湯之圖
木防已加茯苓湯
(第一圖十三第)

鄙見則當兼用下瘀血丸。鑿胆囊炎之嘔吐呃逆。與前同方亦佳。
木防已加茯苓湯(吉益南涯先生之創方)

防已七、○ 石膏一九、○ 桂枝五、○ 人參茯苓各九、五

右以水三合。煎一合。去滓。一日三回

冷服。

藥徵曰。防已主治水也。

腹證 東洞翁曰治水病喘滿。心下痞堅

。煩渴而上衝者。卽治腫而喘息。心下

部痞且堅。(此堅比痞鞭猶強故人參之

分量宜多)煩渴。(此症似有石膏參照

白虎湯條下)上衝。爲由下衝上之意味

。或逆上之症。(皆稱上衝桂枝之症也。)

仲師之原方。稱爲木防已湯而無茯苓。然

演爲此方者。吉益南涯先生之創意也。

適應症 心臟病、腳氣水腫性、(心臟性)



喘息、尿閉症。

木防己去石膏加茯苓湯（著者之例方）

防己七、○ 桂枝五、○ 人參茯苓各九、五

右以水三合。煎一合。一日三回溫服。

腹證 治前方證。無煩渴。而動悸強也。仲景原方名爲木防己去石膏加茯苓芒硝湯。此方除前藥外。尚有芒硝。余所實驗之證。本方多與前方或苓桂朮甘湯、桂枝茯苓丸、當歸芍藥散、桃仁承氣湯。間或一二症而併發者。故宜隨證合方。若兼驅瘀血丸方、或桃花湯、桃花加芒硝湯者。不但無用芒硝之必要。且爲運用上之障礙。故芒硝宜去之。

適應症 同前方

蠕動不安者。其症狀如左

- (一) 呈腹襞軟弱。凹凸不平。
- (二) 同上。胃腸有可動性之腫瘤及停水。
- (三) 同上。腸蹄系可顯然觸知。
- (四) 同上。腹內自覺有物塊遊走。
- (五) 同上。腸內充滿瓦斯。呈謂鼓脹症者。
- (六) 同上。臍部之皮肉柔軟。衝動時有振水音或蛙鳴音。

以上經余焦心苦慮所發見者。取廣本方之應用。

大建中湯之圖

(第三十圖其二)



1411

。適應症 腸重疊、腸捻轉、腸窄狹、腸閉塞、(嵌頓性者未有經驗。)臍部雷鳴、劇痛而嘔吐者。先以本方與附子粳米湯合方。鎮吐之後。兼用下瘀血丸。洋醫於此症。則嚴禁下劑。然決無可恐者。其故何也。蓋腸重疊者。多因下部腸管麻痺。嵌入於上部腸管。因而血行障礙。并起痙攣。

故煎方者治麻痺及痙攣。丸方者調節血行。又本病雖由腸腫瘤之重力的牽引所自發。然欲察其腫瘤。則當以瘀血塊爲目的。而用此丸方。亦無發見所忌。至如腸捻轉、腸狹窄、腸閉塞之腸管腫瘤、腸間膜腫瘤。腸膜炎之生產物。而有索狀物之壓迫或牽引等。亦猶然也。何則。蓋以上之原因。皆不外乎瘀血。設或諸證。假令因於蛔虫。則煎方中之蜀椒乾姜附子者。用治麻痺及痙攣之外。傍能發揮殺虫性。斯又無應用驅虫劑之必要。而仲師方之神妙。要可想見矣。其他胃弛緩症、胃擴張、胃腫瘤、腸腫瘤、腸間膜腫瘤、鼓脹症麻痺性下痢、麻痺性便秘、腹膜炎等。食後欲廁者。亦有本方證。

附子粳米湯

附子一、〇 半夏一四、五 甘草二、五 大棗、六、〇 粳二四、〇

右以水三合。煎一合。去滓。一日三回溫服。

粳米 陶宏景氏別錄曰益氣（滋養之效）止煩（治煩悶）止渴止洩（止下利）肘後方以粳米一味治腹痛。以粳米含有澱粉。故為緩和藥。可知治法所在矣。且仲景於白虎湯及本方之配合粳米。宜窺探其精神也。

腹 證 師曰腸中寒氣。雷鳴切痛。胸脇逆滿。嘔吐。

東洞翁曰治腹中雷鳴切痛。嘔吐惡寒者。

本方之腹證。限於篇幅。不能盡載。讀者可自得也。

本方與半夏瀉心湯證之分別如左

方名	雷鳴	疼痛	嘔吐	下痢	一般狀態	心下痞鞭
附子粳米湯	臍部	在臍部痛劇	有	有	寒冷	無
半夏瀉心湯	胃部	胃部	有	有	無寒狀	有

右者所列。為二證完備之狀態。然非常此判然也。或有嘔吐無下利。或有下利而無嘔吐。當於臨

當歸四逆湯

當歸 桂枝 芍藥 細辛 大棗各五、五甘草通草各三、五
 右以水二合半。煎一合。去滓。一日三回溫服。

牀自得之。

當歸四逆湯之證圖
 第十三圖



腰脚拘急。手足寒。小便不利者。
 治婦人血氣痛。腰腹拘攣者。

腹證 師曰：『手足厥寒。脈細欲絕者。當

歸四逆湯主之。』此就本方一般狀態之劇症解之。知非腹證云也。余爲本方腹證。苦心慘澹。漸得明了者。卽兩側腎臟之外側。及後側部之腰筋。按之覺痛。或不論左^右偏側之同部。若按之痛。手足厥寒。脈細欲絕者。或脈弱身體感覺冷者。無論何病。皆可決定爲本方證。尾台氏曰。治疝家發熱惡寒脇腹攣急。

治經水不調。腹中變急。四肢酸痛。或一身習習如虫行。日頭痛者（一身習習如虫行者形容輕微麻痺狀語也。）

適應症、脚氣、腎臟炎、輕症尿毒證、輕症子痢、頭痛肩凝、胸痛、咳嗽、腎臟部疼痛、下痢、腰脚變急、手足變急、微毒等用之最多。

當歸四逆加吳茱萸生姜湯

當歸 桂枝 芍藥 細辛 大棗 各三、五 甘草 通草 各二、五

吳茱萸一、二〇 生姜九、五

右以酒及水。各一合二勺。煎一合。去滓。一日三回溫服。但與他方合方者。皆宜水煎。

吳茱萸 主治嘔而胸滿。（藥徵）溫中止痛（摘要）治虫進食。（梅花）

腹證 師曰『手足厥寒。脈細欲絕者。當歸四逆湯主之。若其人內有久寒者。當歸四逆加吳茱萸生姜湯主之。』久寒者。願當自得之。非語言所能明也。然爲參攷計。茲揭先輩之所說。如尾台氏曰。久寒謂宿飲也。（飲卽水也）和久田氏曰。久寒者水毒之寒使然也。乃下焦之虛寒。疝毒宿飲之類。集於胃口。陽氣爲之抑塞。而妨碍飲食之剋化也。或指爲吐利。今余得之經驗。爲宿食滯於中焦。吐酸吞酸等症。或冷氣衝逆。迫於心下。攻於胸脇。乾嘔吐涎沫。或腹痛。或吐利

。或轉筋。(筋之痿痺)婦人積冷血滯。經水短少。腹中拘攣。迫於心下脇下。肩背強急。頭項重痛之類者。概爲久寒所致。苟熟讀之。當能扼要而得也。惟本方及前所稱之厥冷。疑似難別。然厥冷者。爲仙覺的。經醫撫其部。若有冷氣可覺者。厥寒者爲自覺的。非他覺的所能證明也。又附子吳茱萸皆治冷脫之證。然彼主下利厥冷。此主衝逆嘔吐煩躁也。以一下而一爲上。斯得區別之。要之本方證。卽當歸四逆湯之脈證。間有病勢急劇危重者。故初學者當先執當歸四逆湯。見其應否。再以本方處之。實爲良圖也。

適應症 衝心性脚氣、尿毒症、子癩、胃擴張等。

兼用方

以下諸方。非主單用者。乃煎劑之兼用方也。

伯州散

反鼻 騾鼠鹿角各霜(燒黑)等分

右爲末混和。用量一回二、〇四、〇一日二回或三回。以溫酒或湯服之。

適應症 本藥與洋藥之燻酸『Calcium Phosphate』及肝油。有同一之醫治所用。略舉此之詳說

。以明本藥之適應症

磷酸〔Calcium Phosphate〕

磷酸〔Calcium Phosphate〕爲一般生體之營養分。對於骨質之成育上。殊爲緊要。骨軟化證。佝僂病等。皆骨質中磷酸土類之減少。若以磷酸補諸生體。則俾益營養。尤能增進構成骨質之作用。然實際上之奏效。有不如理論之顯著者。蓋一方雖由此而吸收〔Calcium Phosphate〕鹽之一部分。一方凡因食物中。又或其他石灰化合物爲〔Calcium Phosphate〕_N在血中。而常變爲酸鹽。願雖攝取。特於生體上。爲效亦未易言也

余對此疑問有左之二見解

人類之生命保續上。其由外界新攝取之營養分。若以化學的覺察之。要不出含水炭素蛋白質脂肪質鹽類水等外者。故由理論推之。或以有此五者。而取給足矣。然僅此原素之物質。究不足以維持命脈也。必也攝取自然含有此等物質之飲食物。則近之矣。抑亦疾病者。有特種之性質。要之。但爲生理的之變調已爾。於藥物言。如洋藥固難其純粹也。欲期欲如原素的者。毋亦求正其角。而殺其牛。不但有損維他命〔Vitamin〕而失其不可解之妙用。且從而變成吸收同化困難之物。無理論所期之效果。自不能與前記營養品等論也。反之若利用自然性之藥物。則不但毀損其可及之本性。且不失維他命之應用。則吸收同化容易。故巨有佳効。

余嘗多年取用石膏、牡蠣、伯州散。而石膏之爲石膏。牡蠣之爲牡蠣。伯州散之爲伯州散。各有所主之適應症。苟用之不當。不但無寸效已也。且從而有害。洋醫見不及此。只眩惑於磷酸〔Calcium Phosphate〕之美稱。彼此混用。期欲收效難矣。且磷酸在理論。往時則認有治骨軟化症、佝僂病。及其他石灰不給諸症而實用之。卽近代顧稱其効者。亦復不少。言其他之腺病。年少者之貧血痿黃病。並授乳及子宮出血所致之衰弱症。或如廣大之化膿腺病性骨瘍。體液亡性之衰弱等者。皆可應用之（中略）次則同於碳酸。〔Calcium Phosphate〕亦可用於有下利傾向之胃腸加答兒及與釀酸過多諸症。（中略）其他咯血、子宮出血、腎臟出血、盜汗等。可與一回一、五乃至二、〇之大量。但不得確實之奏效耳。（下略）

上記諸病中。除病軟化症、佝僂病、萎黃病（未經驗）之症外。假令雖有表熱。而無內熱者。可與伯州散。（多兼煎方用之）無不効者。故將本藥之磷酸。〔Calcium Phosphate〕與適應症相等之點。及本藥爲動物質之點。一一推究之。可證伯州散中含有磷酸。又斑斑可考也。

肝

油

肝油。

肝油者。滋養性脂肪藥中。應用爲最廣。而效力卓絕之品也。首推諸般慢性衰弱症。體質減少者。肺病等殊貴用之。對於直接影響病機之作用。固不待論矣。間或改良患者之營養。或間接阻止病機之進行者。其偉效無可疑義。但熱之時。或有急性炎症之存在。或胃腸疾患而下利者。不

不可禁忌。又如腺病之用沃度劑。[Jodine] 再幸與肝油者。爲最有效之療法。故對於結核及腺病性之骨痛。(屬骨疽、關節炎。)皮膚病及粘膜炎(鼻鼻潰瘍性疾患)等、頗著良績焉。

上記疾病。與伯州散皆有神效。且禁忌症。亦略同一致。從知本藥含有肝油類似之動物性脂肪分。考與肝油所異者。即無內熱之下利症。非因內臟之急炎症者。不必禁忌之一點也。本藥由前記三動物。以燒熬不全炭化爲度。故乏誘起下痢作用之脂肪過剩。肝油則反甚豐富也。伯州散既爲動物質。且有著明之止血性。可知含有膠質。

茲舉漢方動物質應用例。以明本藥之適應用症。

黑瞳散(原商陽氏方)

理小兒疳癍羸瘦下溪。鼻孔常赤。睡中驚悸。戲遊了戾。嗜爪或嗜生米壁土炭等物。疳利經日不治。疳眼赤目。一切小兒諸病。

烏 一隻臘月捕之。去翼足嘴并腸。填滿紅花車前子。漬之廁糞中三十日。燒存性。右研細末。鱧鱺魚俗唱蒲燒太寸許。塗藥日兩三次。

以燒黑之烏。含有磷酸。(Calcium Phosphate) 且鱧鱺魚亦有肝油之類似成分。故能奏效。

雞肝丸(全氏方)

理小兒疳癍虛羸。疳眼成翳赤子。一切眼目或痘毒入眼者方。

雞肝一具 胡黃連 肉苳蓉各五分 芙蓉六月花落者佳二分

右四味細到。水一合。無灰酒（上酒）半合。煮肝及心。至水殆盡。出肝心切片片餌之。日三四次。以藥渣煮汁。和寒製米粉。至可丸爲度。梧子大每服三十九。非特小兒可用。大人眼目暗黑或翳障者。并老少雀目。用之有異驗。

本方主用雞肝。與洋方用肝油同理。只鳥類與魚類之差也。又非必爲肝油不可者。以其用心臟。亦可明矣。

金匱要略曰

肝後癩肝散治冷勞。又主鬼疰一門相染。

癩肝一具。炙乾末之。水服方寸匕。日三服。冷勞無熱之肺勞也。鬼疰一門相染者。言惡性肺勞全家族傳染也。方寸七者。約一匁。

肝藏者。無拘魚類鳥類獸類。其效皆同。從可知也。

疔病之解

萬病回春（上略）又因久吐之後。久瀉之後。久利之後。以致久渴、久汗、久熱、久瘧、久嗽、久下血。久瘡之後。皆能亡失津液。並成疔病。此論疔病之原也。南陽氏曰。此久字至有意。皆久病之後而發者。又曰疔之症候。面色青黃。事事物物。皆不合意。指右爲左。指左爲

右。或使其坐則立。使其立則坐。或暫時不遊戲。好爲乳母背負。此因腹部有滯。故喜以背壓其腹。而覺爲快也。或常挖鼻孔紅赤出血。或嚼爪等。兩眉之間有青筋者。必四肢瘦。頭頸細。日晡作寒熱。所謂疳癖者。則嗜食壁土或炭或線香或生米。夜不安臥。睡則驚動。眠則半眼而不合。此外爲小兒所好者反惡之。所惡者反好之。忌甘反嗜辛鹽。其狀不一。難以盡數。

又曰。疳勞者。寒熱如成人之勞瘵。咳而盜汗。瘦極。成人者必死。小兒者十可救四五六。煎方如成人。兼用水狗丸。(獺也)驗當特著。

古人治疳病。上記之外。亦嘗用左列之動物。

赤蛙。 臭梧桐。 鱧。 鱈「カナカラシ」(魚) 鮓雞卵

以上列記處方及藥物之適應症。總不外因人體內動物質之減少。或竟告缺乏所發之疾病。今有動物質藥物中最優秀之伯州散。良足多焉。自無探索區區某種藥物之必要也。

伯州散及其類方

、叢桂亭醫事小言(原南陽氏著)曰

香龍散 治遺溺方

反鼻十笏 丁香二分

右研細末。臨臥白湯送下。後溫酒任性。

同書痘疽條下曰

夫化膿之藥品者。爲穿山甲、鹿茸。試其最能追逐內毒而膿者。尤當首推反鼻。此古書所不載也。若加於葛根湯中。卓效如神。治諸惡瘡癰疔。殊有神驗。與伯州散兼用之。卽如凹陷（痘疽發疹毒邪內攻之凹陷）者。能伸張之。效非他藥能及也。

同書水腫條下曰

（上略）能發表。用於通利方。赤小豆湯。或琥珀湯。煩渴者越婢湯。（中略）用反鼻之方者。能再化瘡爲膿。當須注意。

琥珀湯 理產後水腫。或諸毒生腫者。

琥珀一匁 商陸丁香各三匁 反鼻五分細剉 猪苓七分

右五味。以水二合。煎一合。溫服日二劑。或三劑。

赤小豆湯治諸結毒內攻腫滿方

赤小豆五匁 丁香三分 大黃二分或三分 麻黃八匁 反鼻五分猪苓七分 商陸二匁生用

右七味。以水三合。先煮赤小豆減一合。內諸藥煎一合溫服。日二劑或三劑。

同書婦人病編曰

產後之腫。主用琥珀湯。首以反鼻之力故也。蓋彼有關瘀血。要當知也。

同書癩病條下曰

反鼻霜一勿。發日(發症前日)早且空心服。

同書眼耳病條下曰

雀眼者驟鼠、反鼻、兩霜皆可。

同書積聚條下曰

血積者。甲字湯、髓甲湯、皆可用。或有用反鼻。(血積者瘀血性之腹痛也)

○微厲新書(片倉元周氏著)

伯州散治一切頑瘡、結毒、瘰癧。(中略)按此方本出伯善州民間。舊名黑龍散。主治癰疽、疔腫。癩癧、乳癰、下疳潰爛難愈。及痔瘻、脫疽等症。人人屢試有效驗。故世稱之。云伯善妙藥。而不呼方名。其方名黑龍散名。遂湮晦矣。今人遂呼伯州散。

○古方丸散方(東洞翁著)伯州散主治曰

治惡毒難發出者。見一方曰。治一切打身瘧疾、瘡毒、疼痛。或諸瘡內攻者。又見一方曰。治毒腫又有膿者。

○藥園雜纂(淺田宗伯氏著)曰

驟鼠散治微毒。諸藥無效。骨節疼痛者。

騾鼠霜 右一味溫酒送下

又曰

蝮蛇芎黃散。治下疳便毒。骨節疼痛毒深者。

大黃二匁 川芎反鼻芎各十一匁 右爲末溫酒或白湯送下。

續名家方選曰

縛血妙方 凡軍陣爭鬥。預持之臨事。止折傷金瘡出血如神。

反鼻燒霜存性 人參各二分 紫椴血竭各一匁 騾鼠燒存性三分

右五味各極研末。擦疵口。服方寸七卽止。

同書曰

治膈奇方 反鼻一味。先作鹽豉稀湯。煮之三沸。俱米子攪下湯內服驗。

食道窄狹、幽門窄狹、胃瘡等。古人皆稱曰膈。或曰膈噎。

叢桂亭醫事小言曰。烏神散治膈噎食不下。河豚一尾去腸胃。以紅花填滿。燒存性。白湯送下。

右二方中之反鼻、河豚。其毒力最猛烈。對於河豚之作用。著者尙未詳悉。然反鼻有驅瘀血之功。如於難治之瘡腫。無或不效。總之有此事實治法。深可見矣。特附記之。

此外伯州散之類方極多。且適應症。亦復不少。然執上論推究之。苟兼仲師本方。則更感左右逢

〇再造散

源矣。此於類方。不可謂非必要也。余之特揭多數類方者。欲使讀者有悟於伯州散之用途。蓋亦一片婆心也。伯州散尚有亢奮、強壯、鎮痙、鎮痛、祛痰、排膿、止血、止瀉之作用。讀者宜從此意。就各種之疾患。擴而用之。然其主要作用者。則在於亢奮強壯。其他願皆副作用耳。若有內熱舌苔之亢奮狀態。換言之。卽內藏有急性炎症。審有膿腸出血之症狀者。當須禁用。又本方用爲冷性衰弱者之目的。若強壯肥滿之人。當須斟酌與之。竹、木、針、釘、刺入肉中不得出者。以本散內服之。則異物周圍化膿而排出。其創面卽復自愈。(著者之發見)

鬱金二、五 皂角刺白牽牛子伯州散各六、〇 大黃五、〇

右爲散一回二、〇——四、〇一日一回。或二三回。空腹時。溫酒或白湯送下。

此方或稱爲通天再造散。載於三因方。山脇東洋氏再加反鼻。亦稱爲東洋再造散。日本普及之名方也。而反鼻改爲伯州散者。則著者也。

適應症 因欲明本方之精神。及適應症。故將關於本方之諸說。及其方類。列記於左。

〇山脇東洋氏曰

再造散治大風痙毒。不擇新痼服之可也。大風者癩也。不擇新痼者。不問初期末期之意也。

〇原南陽氏曰

再造散治厲風及諸血毒。無療久淋方。厲風者癩也。諸血毒者。因瘀血之毒也。

仲景師皂莢丸

皂莢大棗等分

右爲蜜丸。以白湯送下。四、〇一日三回。

證曰『欬逆上氣。時時濁唾。但坐不得眠。』尾台氏曰唾。吐也。濁。濁痰也。然則皂莢之治吐濁痰者明矣。何則。因大棗治擘引強急之嗽。蜜療急迫。雖不能盡治前症。然皂莢者即莢實。皂角刺（一名皂莢刺）者。卽其枝間之刺。時珍陳其效曰。皂莢刺治風殺虫。其效與莢相同。所異者。但其銳利直達病所。以故皂角刺。能治吐濁痰症亦明矣。

皂莢治痰癰。咽喉不利腫痛（藥選）

尾台氏射干麻黃湯

射干三、五 麻黃生姜各五、〇 細辛紫苑款冬花各三、五 五味子六、〇 大棗二、五 半夏七、〇

右以水四合。煎一合。去滓。一日三回溫服。

主治曰。治久咳不止。或產後喘欬。頸項生痰癭。累累如貫珠者。去細辛、五味子倍射干。加皂角子有效。以此可知皂角子。能治頸部淋巴腺腫大矣。

獨味庵主著漫遊雜記曰

癩癧。服瀉心湯。兼服再浩散可也。

徵厲新書曰

紅花散瘀血湯治便毒

當歸 紅花 蘇木 殭蠶 連翹 貝母 乳香 皂角刺 穿山甲 石決明各一匁 大黃三匁 牽牛子二匁 右十二味

右內之有力藥品。爲皂角刺、穿山甲、大黃、牽牛子。惟穿山甲之效。劣於伯州散。宜參見再浩散之主治也。

葉園雜纂曰

透膿散。治癰疽諸毒。內膿已成。不穿破者。服之立破。

黃耆 穿山甲 川芎 當歸 皂角刺

右五味

黃芪川芎當歸於此既無所短長。以故。足見穿山甲與皂角刺之能力矣。

如神丸（大黃牽牛子甘遂三味爲丸）治腹脹、水腫、小便不利者。（古方丸散方）

此方甘遂雖爲主藥。然大黃牽牛子之力量。亦足想見矣。

治瘡風風毒妙劑。牽牛子（一部分燒黑一部分焙黃一部分生用）爲丸服（名家方選）

水腫利水方 黑牽牛子一味爲丸。日服二三丸（同上）

皂角散治大風（同上） 皂角 大黃各一匁 輕粉五分

右三味爲末。空心酒調下。

加減金花散（同上）

積雪草 鬱金 大黃 各三分 檳榔 紅花 沈香 各二分 木香 升麻 枳殼 丁香各一分
香一分半

右十三味。治胎毒搖擗。或肌膚赤色血毒。小瘡。吐乳或小便黃。大便不通。此方藥味獨多。不明各味藥之主治。然觀其以鬱金大黃爲主藥。約略推之。當知治法所在矣。痧脹於玉衡爲鬱血。

曰治瘀血者。益可瞭然。

適應症 再造散即伯州散之證。惟主治則在其下。

第一解毒散

川芎大黃各二〇、〇 金硫黃五、〇 甘汞四、〇

右爲散。用量一回一、〇——一、五——二、〇一日三回。以賴衣（糯米紙）包服。

適應症 輕症微毒。殊重於病毒之在上部者。及消化障礙中毒等。爲不現中毒狀。平穩而效偉。誠

第二解毒散

良方也。(亡師和田啓十郎氏創方)

第二解毒散

鬱金二、五 白牽牛 皂角刺 伯州散各六、〇 大黃五、〇 金硫黃〇、五 甘汞〇、四
右爲散一回四、〇一日一回。或二三回。空腹時服之。

適應症 微毒 殊適於病毒在體表者。

解毒丸

解毒丸

大黃一、六 桃仁〇、七 麤虫二、一 金硫黃〇、〇八 甘汞〇、〇七
右爲丸。用量一回五、〇一日一回。或二三回。空腹時服之。

適應症 潛伏性微毒。適用第一解毒散。即古之芎黃散。再加入金硫黃(與砒素同屬。有毒)及
Olaeta Pellidum『微毒原虫』之Scruphin:atm Antimong『安的毛泥』(硫化物)與水銀劑中最
緩和之甘汞。實折衷洋漢之方劑也。余承師意。嘗將二藥加於再造散、下瘀血丸中。創立第二
第三之洋漢折衷方。獲有佳效。今也余師往矣。嗚呼。

巴豆油

巴豆油對於粘膜之作用。若內服之際。以半滴或一滴爲量。則有口腔焮灼。或咽頭感覺持續之苦辣。
。胃中生有溫感。或引起焮灼。時而惡心嘔吐。腹中雷鳴。之兼輕微之腹痛。經半小時至三小時

巴豆

後。則排泄多量之硬便。次則下泄滄便。過服劇量（於成人二十滴）則更引起吐瀉。狀如腸炎虎列拉。陷入高度之虛脫。但無分人類與動物。各隨個體之稟賦。嘗有只用尋常藥量。而起前記之強劇作用。亦有用三、〇而始發現者。

尋常之用量。變起強烈之吐瀉。陷於高度之虛脫者。卽漢方所謂陰虛。腹脈衰弱。此宜禁忌巴豆劑也。然至三、〇始發同症者。卽所謂陽實。而脈實腹實之人也。洋方家則不論陰陽虛實。且不精查藥物之適應症。漫然投藥。所以有此弊害者。此非藥物之罪。亦豈稟賦之反常也。

巴豆油乃最強烈之瀉下藥。於他種峻下劑所不克奏效者。亦能逞其作用。然易引起消化道之炎性。及過劇之吐瀉。故不滴久用。又如停滯菴塊之頑固性便秘。尤於腸之器械的狹窄。或與腦脊髓病兼發之便秘。如他藥無效者。亦可與之。故最適於精神病者之頑固性便秘。其他如鉛毒疝痛。亦頗有效。或曰可防止再發。

虛實陰陽之方則

金匱要略曰『病者腹滿。按之不痛者爲虛。痛者爲實。可下之。舌黃未下者。下之黃自去。』此以患腹滿之病者而分虛實焉。按其腹部不訴痛者爲虛。卽精氣衰脫。故不可下。痛者爲實。以病毒充實。故可下也。舌黃者卽舌有黃苔。未投下劑者。投之可不治而黃胎自消矣。何以故。曰黃胎者。爲病毒集積消化管之標徵也。若以適應之下劑。驅除病毒。則一分證之黃胎。自然

消退。固不易定理也。然洋醫家不解此理。視發生黃胎。則漫指爲口腔炎。徒與含嗽等劑。未免倒果爲因矣。

又曰『腹滿時減。復如故。此爲寒。當與溫藥。』此言雖曰腹滿。然旣自減退。時或猶然滿者。此爲寒證。乃陰虛證也。當與附子等藥溫之。

大承氣湯證曰

〔上略〕『發汗不解。腹滿痛者急下之。』

〔同上〕『腹脹不大便者急下之。』

『病腹中滿痛者此爲實也。當下之。』

『下利三部脈皆平。按之心下鞭者急下之。』

三部脈者。乃寸關尺之三脈。當醫者示指爲寸脈。中指爲關脈。便指爲尺脈。皆平脈。卽常脈也。

梔子豉湯證曰

『下利後更煩。按之心下濡者。爲虛煩也。』就上熟讀之。乃是否可投下劑之兩針。

走馬湯

巴豆杏仁各二個

右二味。以白木棉包鉄椎令粉碎。以熱湯五勺。振盪而頓服之。

師曰『通治飛尸鬼擊病。中惡身痛。腹脹大便不通。』飛尸者何。病源臥論曰。飛尸者發無由漸。忽然而至。若飛走之急疾。故謂之飛尸。其狀心腹刺痛。氣息喘急。脹滿上衝心胸者是也。鬼擊病者何。曰鬼着病者。卒然著人。如刀刺狀。胸脇腹內切痛不可抑按。或吐血下血鼻血。一名鬼排。中惡者。肘後方曰。中惡道間。門外得之。令人心腹刺痛。氣衝心胸。胸脹。不治害人云云。然此皆症候的病名。不足爲準據。東洞翁之定義曰。治胸腹有毒或心痛。或腹痛者。非不近理。顧漠然有難捉摸者。不得稱爲完備之說。而尾台氏所謂卒中風。急驚風。脚氣疥癬內攻。乾霍亂諸般卒病。其熱險急。逼胸臆不得息者。皆宜此方云云。要可謂有具體的之得矣。尾台氏曰此方與備急丸。其用大抵相似。惟病專於胸臆者宜此方。

治 驗 六年以前。初冬之時。一農夫年二十一。罹脚氣。乞余治之。與大柴胡湯。遂更醫。醫與止瀉藥。其後連身浮腫。二便閉止。不食。呼吸促迫不得息。大驚。再來求診。病狀如上。仰臥不能動。呼吸促迫。咽喉閉塞。言語難出。苦悶煩躁。脈實而數。腹部石硬。與本方一劑。頓服無效。再投一劑。則微利。欲更進一劑。而病者訴口內喉頭苛辣灼熱。胃部堅滿。拒而不服。然家族有贊成之色。余乃厲聲爲說利害。強而服之。未幾忽暴瀉如注。氣息安靜。煩躁悉止。絕食

數日之病者亦能求食。以魚類爲下物。與之數碗。稱快不止。

備急丸

大黃 乾姜 巴豆各二、〇

右爲散劑。或爲蜜丸。用量普通〇、四——一、〇頓服。

師曰『主心腹諸暴百病。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤者。』口噤者即牙關噤急。因有此證。不能用丸藥。故亦可以爲散藥。以水攪溶。可由齒間灌入。

尾台氏曰治飲食傷。霍亂。一切諸病暴發。心腹滿痛者。又曰妊娠水腫。死胎冲心。便秘脈實者。用之胎即下。紫丸亦佳。但宜審其人之強弱以處之。

此方有止瀉鎮痛性。配乾姜者。一則緩和腹痛。一則牽制巴豆。抑其猛力。當深知古方複合的處方之妙味。

紫 圓

巴豆(去殼)赤石脂 代赭石各一、〇 杏仁二、〇

右研末以糊爲丸。用量同備急丸。

赤石脂

赤石脂者天然產於佐渡國。國人俗稱之爲止血石。然不易得。故以人工製造之。法用鉄砂百斤

。食鹽十匁。混合之。內壺中。蓄積十個月。將腐化時取出。燒至失去鐵色爲度（古方丸散方和譯）

右之製法。及其效果推究之。赤石脂爲過格魯兒鐵者無疑義矣。古人以收斂止血目的而用之。可謂合理的處置。然赤石脂稱爲驅水毒。有水氣者可用之。其原因不可解者久矣。偶讀集成藥物學。於鉄劑一般之醫療的應用條下曰。第三則爲麻拉利亞。對惡液質之應用。皆配用規尼涅及砒石爲通例。次如麻拉利亞後。急性病後。經久的化膿後。所發之惡液質性。貧血性水腫。謂於水血狀態之原因者皆用之。又如因腎臟之澱粉變性之水腫者。亦可用之。見此記事。方知古人不我欺也。又鉄劑一般之生理的作用條下曰。鐵鹽。就中如與鑛酸之化合物者。能制微生物。特具制殺腐敗〔*バクテリア*〕（發酵菌）之作用。然而氯化鉄鹽 *Ferri Pero Chloratum*（過格魯兒鐵）爲腐敗。故有消毒局部組織之效。

讀此記事。可知赤石脂有殺菌之功。亦可悟仲師用桃花湯（赤石脂粳米乾姜三味）赤石脂禹餘糧湯。（赤石脂禹餘糧二味）治慢性排膿血。衰脫性之赤痢者。可以了解矣。

代赭石

代赭石者。稱有逐水氣迫於胸下之症。著者淺學。未知其化學物質爲何。然竊恐類屬酸化鐵。

Ferri Oxidatum 或酒石酸鉄 *Ferri Acid tar Tartari*（孕鉄酒石）之類。

紫圓者爲唐代孫思邈氏之創方。揭載於所著千金方中。迄今數千年間最常用之名方也。且此方尤以適應小兒爲目的。千金方曰。凡小兒內發之病。悉可用之。又曰紫丸者。無所不療。雖下不慮人云云。原來小兒之病。多因食滯性消化不良而發者。故與對小兒有比較的鈍感性之巴豆。（雖不知其故。然小兒對於巴豆皆平氣）同逐水殺菌之杏仁。以牽制收斂殺菌。配合赤石脂者能掃除滯食、停水、細菌毒素等。杜絕病根。且不至虛脫。可謂千歲不朽之良方矣。

吉益東洞曰。本方雖主小兒之病。然成人亦可服。如治腹胸痛結毒。或腹滿不大便。或有水氣者。其子南涯先生曰

治胸腹水停滯。血氣攻心者。其症心腹脹痛大便不通也。或痢疾熱病或食滯或留飲胸痛。或所謂痛風卒中、中暑、驚風、癩癩、胎毒、疳疾、發狂之類。迫心胸者。用之有效也。讀者宜精思熟讀。發明其用途。

本方之適應症。雖如上述。然一言以蔽之曰。以腹部（臍以上）堅滿便閉。脈實諸急劇症狀爲目的。如習於此等之症。則可達自得之域。但又不可拘泥此等規則。尙須變通活用於種種多雜之病症。庶發揮其妙用也。

本方與備急丸之別

紫丸主小兒。備急丸主成人。前者治水毒。後者治食毒。

參攷方技雜誌。有論說經驗。亦揭於左。

腸胃爲飲食受容消化之器。諸種食物之入也。必經熟化轉輸。其不能無歪濁瘵液者。此自然之勢也。反之患痢疾者。卽此留滯之毒故也。苟若無之。則氣血宣通。毛蒸理泄。決無罹此之理。疫痢流行之時。預以紫丸六七分。或至一錢。使其峻瀉八九行。蕩滌腹中。翌日則糜粥靜養。莫不神氣快然。可免患痢之厄。法至善也。試爲言之。卽知余言之非妄。

紀藩之吉岡宅右衛門息芳太郎。右眼瞳子。常發星翳。至第三年。目之星翳胞腫。遂潰。其痕白。恰如痘痕。不能視。余診之不膠淚不痛痒。無赤脈。但潰破之迹。呈新月形而色白。覆於瞳子上。據云二三歲時。曾患頭瘡。余思因其毒不淨盡。潛伏痼滯。成爲星翳胞腫之禍胎。告其難治。與葛根湯加桔梗反鼻。兼服紫丸。務使其便日二三行。(中略)服前方一月許。白色漸次稍薄。凹陷處亦稍淺。仍服前方。漸能視物。(中略)用前方二十日許。能觀論語之本文。又服前方二十日許。亦能視讀註文。斯時白色已極薄。凹處亦填高。再用前方一月許。眼睛復常。今已三十年。曾無些少之患。因其始終一貫。不轉他方。驅盡病毒。故無再患。

瘍科小池龍雪之妻。患大疫。經余種種苦心。解退其熱。然腰不動不能起牀。一日。有三四歲之小兒。遊嬉其中。不知何故。忽墜圍中。病人吃驚。急欲引救。奈腰病不起。乃大聲呼救。近鄰男女奔來救起。爲之澀衣澡洗。急診於余。余探之旁人。咸云飲下糞汁不少。因以紫丸三

分許服之。少頃吐出糞汁。逾時下痢數行。至日暮快然復常。豈不大奇哉。

余嘗嘗金魚。諸小兒輩不知其饑飽。頻食以燒燄。腹滿浮於水上。陷於頻死之態矣。推究其理。以紫丸一粒。押入口中。將近半小時。下糞二三條。狀如素麵。長約三寸。少頃圍圍如常焉。

桔梗白散

桔梗貝母各〇、六 巴豆〇、二去殼

右爲散用量普通一、〇頓服

貝母

貝母主治胸膈鬱結痰飲也。然考之本草。古人用貝母主治鬱結痰飲。旁治咳嗽。乳汁不下也。

其功於桔梗大同小異也（藥徵）

師曰『咳而胸滿振寒，脈數咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久吐膿如米粥者。爲肺癰。』

原南陽氏曰

肺癰之始發。與風邪咳嗽無異。引膈而欬。覺隱隱微痛。在左右之肋骨間。此症有聲音啞者。或連欬不止。狀如麻疹之欬也。濁唾腥臭物也。其中或混如米粥之凝固物。痰膿兩種。頗難分別。投於水中。膿則沉降。而凝結於底間。或帶血腥臭尤甚。醫燈續焰曰。試肺癰法。凡人覺隱隱痛。咳嗽有臭痰。吐在水內。沉者是癰膿。浮者是痰。且其人言語氣息亦臭。并自覺其臭。

氣。然其人膈膜之痛。亦有強弱。或背脊亦隱隱微腫。張載人云。微寒熱自汗盜汗。似勞瘵者尤妙。其脈浮弦。或大數或滑數者。皆可治。(中略)肺癰。飲食如故。氣脈候調者未必死。能用古方桔梗白散。仲景謂非難治之症。故不問何種。苟具此證者。當以桔梗爲主藥。

一士人久咳。午後微寒熱。人以爲勞瘵。飲食不甘。半日臥牀。經醫不效。迎余至其家。未診時聞其咳嗽。卽斷爲肺癰。診之脈不細數而浮大數。嗽則左膈間引痛。背亦隱隱微痛。晝夜吐痰甚多。間或帶血。驗其痰如米粥。卽有膿也。與肺癰湯。(排膿湯中去大棗、加貝母、括蕒根、杏仁、白芥子。)兼用桔梗白散二次。經數十日而愈。

綜此觀之。肺癰者爲腐敗性氣管支炎。氣管支擴張症。肺膠瘍。肺壞疽之總稱也。桔梗白散者。主治前症未脫之候也。

向陽氏謂其脈浮弦。或大數。或滑數等。皆可治者。以其尙未有脫候也。故爲本藥之適應症。然若脈細數。卽呈脫候者。不可復用此方。

尾台氏之言曰

肺癰用此方。當在其咳逆喘急。胸中隱痛。黃痰息臭之時。斷然投之。以掃蕩鬱毒。斷除根抵。若猶後不決。持重曠日。至毒氣浸淫。胸背徹痛。膿穢湧溢。極臭撲鼻。蒸熱柴瘦。脈細數者。噬臍不及也。醫者不可不小心。又不可不放膽。良以此也。

由此觀之。明瞭甚矣。病常未呈脫候。不能用桔梗白散治之。則爲必死。因之有南涯氏之治驗。

一男子某。患肺癰。其朋友佐佐氏投藥。爾後膿出於口鼻。兩便皆帶膿。或身有微熱。時惡寒。身體羸瘦。殆如不可藥也。乃來求治。先生與排膿湯。及伯州散。經日瘳。依此亦可明也。

尾台氏曰

此方不特治肺癰。所謂幽癰、胃脘癰。及胸膈中有頑痰作胸背癢痛者。咳家膠痰纏繞。咽喉不利。息有臭氣者皆效。幽癰者雖不知爲何病。然胃脘癰者。該當胃之蜂窩組織矣。胃膿瘍也。諸君如遇此種病者。請有以試之。

又曰卒中風。馬脾風。痰潮息迫。牙關緊閉。藥汁不入者。取一字吹鼻中。吐痰涎。咽喉立通。蓋以不能入口。故因鼻中吹藥於咽喉。刺戟其部之知覺神經。摧促反射的之咳嗽發作。此祛痰之絕妙方法也。解剖生理學不知此理。反爲漢醫家所悟。其理法之活用。可謂巧於洋醫家者遠矣。

亡師和田氏以此方治急性肺炎。聞其方法。謂診斷確定時。則與一、〇一、一五。少頃則下痢。(間或有吐)發熱及其他之症狀。殆如全失。若不效可再投與之。俟其大勢解後。施以對症

的處置。

此方者。用於實扶帝里 Diphtherie 之血清療法無效時。若呼吸困難。或將施切開氣管術之必要時而內服之。或由鼻中吹入咽喉。經暫時之強咳嗽。義膜剝離。則呼吸安靜。易如反掌。洵起死回生之妙方也。且不僅此爾。即初期無施血清治療者亦然。故感毫無血清之必要。以上之外。如氣管支及喉頭之格魯斯肺炎。Cramp 試用之。亦信有價值也。

大陷胸湯

大陷胸湯

大黃六、四 芒硝四、〇 甘遂一、

二

右以水一合五勺。先煮大黃五勺。去

滓。內芒硝化溶。入甘遂末。攪拌頓

服。

甘遂

藥徵

甘遂主利水也。辛治墜痛、咳煩、短氣、小便難、心下滿。

大陷胸湯證之圖

(圖二十三第)



十棗湯

本方之腹證者。心下部如石鞭。腹部或肩胛部及項部有不可忍之劇痛。

適應症 心臟神經痛、腳氣衝心、急性肺水腫、等服之則大水瀉。掃除一切苦患。

芫花 甘遂 大戟〇、七——一、三

十棗湯之證圖
(第三十三圖)



右爲末。先以大棗二〇、〇水一合。煎

五勺去滓。將右之藥末。納中攪和頓服

芫花

藥徵曰

芫花主逐水也。旁治咳掣痛。

大戟

藥徵曰

大戟主利水也。旁治掣痛咳煩。

本方證者即心下鞭滿。(非如大陷湯證之內實)胸部有劇烈牽引之痛。雖或未盡然者。亦可供劇咳之用。

適應症 濕性肋膜炎性疼痛及咳嗽。肋間神經痛者。用之則大水瀉而速治。

滾痰丸

甘遂二、〇 大黃八、〇 黃芩 青礬石各五、〇

右各別爲末。先取與青礬石末同量之硝石末。混和入土鍋。烈火燒至呈黃金色爲度。下火放冷

。與諸藥末混和。以糊爲丸。用量一回二・〇四・〇一日一回。乃至三回。

著者曰青礬石能治水氣性咳嗽。其說散見諸書。

適應症 輕症之濕性肋膜炎性及嘔噦輕症肋間神經痛。

控涎丹

甘遂 大戟 白芥子等分

右爲末。以蜂蜜或糊爲丸。用量用法同滾痰丸。

著者曰白芥子屬刺戟藥。能刺戟病毒之固着。使其發動。兼治水氣性咳嗽。有利尿作用。

適應症 劇性之濕性肋膜炎性疼痛及咳嗽。劇性肋間神經痛。

十棗湯與滾痰丸控涎丹之別

十棗湯者以大棗爲主藥。以牽引痛爲目的。此二者者。只以疼痛咳嗽爲目的者也。若除胸膈之

停水。其止痛止欬。功則同一。

桃花加芒硝湯

漢方對濕性肋膜炎。不用穿刺法而得治者。蓋有此三方也。記之於此。以資洋醫家之參攷。

桃花加芒硝湯

白桃花（用本年之花）八、〇 芒硝二、五以上

右以水一合。煎五勺。去滓。內芒硝化溶。頓服。

著者曰。桃花有利水之作用。

適應症 酒客宿醉實證之水腫。（其原因未能與心臟病肝臟病腎臟病同論）實證之水腫性腳氣等

。用之須臾。則水瀉如注。所患脫然若矢矣。

芎黃散

芎黃散

川芎 大黃 等分。

右爲散用量一回二、〇——四、〇一日一回。乃至三回。

適應症 身半以上之病當下者。

黃連解毒丸

黃連解毒丸

黃連三、六 黃芩大黃山梔子各二、〇

右爲末以糊爲丸。用量一回五、〇——一〇、〇一日一回。一回乃至三回。

參連湯

適應症 治瀉心湯證而有熱性強者。

參連湯

人參 黃連 二、〇——四、〇

右以水一合。煎五勺。去滓頓服。

適應症 本方用於在施瀉心湯。恐致脫力。爲此進退維艱之時。應用之方也。

鷓鴣菜湯

鷓鴣菜湯

鷓鴣菜八、〇 桂枝一、〇

右以水一合。煎五勺。去滓。頓服。

但欲急速之治効者。當加甘草大黃。(加桂枝者調其臭味爲主也)

適應症 蛔虫陳久腹痛。(能治非蛔虫性之腹痛者以本藥能驅除腸內之汚濁故也)

熊膽 用量一回〇・八淨水溶化頓服。

適應症 失神卒倒痙攣腹痛等之急發性脫力者。殊有神效。或以家豬膽代之亦可。

雄黃

雄黃 爲末〇、六一日三回分服。

適應症 本品爲硫化砷素。Arseni Sul Euratum 有殺虫菌性。古人配驅微藥而用於微毒。或爲麻拉里亞、赤痢之兼用方。或配番木鱉子杏仁等治狂犬貓鼠之咬傷。或單用治蛇毒。其他禽獸虫魚之咬刺症。或將本品燒薰肛門。驅除燒虫。余常用於蝮蛇咬及昆虫刺二症。每得奇效。近來之鼠毒症。有用 Sarua Lera 得效之報告。究其質與此略同。用之且不繁雜。故勸告讀者諸君特開業諸君。儘將本藥試於此等疾病。

治帶球

明礬 蛇床子仁各六、〇 樟腦三、〇 杏仁二、〇 白粉一、〇（白粉稱爲唐之士鉛白之類也）

右爲末。以蜂蜜爲膠球狀。白粉爲衣。隔日一個插入腔內。

明礬爲收斂藥兼止血性。

蛇床子有止痒治瘡之作用。

樟腦有亢奮殺虫殺菌之作用。

杏仁有祛痰鎮咳殺虫殺菌之作用。

白粉有收斂止血殺虫殺菌之作用。

適應症 治白帶下陰中癢痒症。子宮腔部及腔粘膜之小潰瘍有奇效。

附

錄

附

錄

「藥品用部」

白反貝麥芒白巴半鹿菌
 桃鼻門頭角藤
 花霜母冬硝翁豆夏霜蒿

名

花全塊球硫酸根種球角葉

藥

用

部根根子根部

代 大 大 大 芥 經 厚 乾 甘 甘 葛 黃 黃 黃 黃

赭

石 戟 棗 黃 葉 米 朴 姜 遂 草 根 善 土 藥 芥

鑛 根 實 根 葉 種 皮 地 根 根 根 球 竈 皮 地
下 之 燒 中
物 子 莖 根 土 莖

附 茯 菴 桂 麻 麻 苣 滑 括 鬱 烏 通 連 當 澤

子 蕒

子 芥 花 枝 黃 仁 參 石 根 金 頭 草 翹 歸 瀉

種 地 花 皮 莖 種 根 珪 根 根 種 蔓 實 根 地

中

下

子 根

子 酸

子

莖

杏 枳 桔 蒼 皂 桑 山 山 酸 柴 細 阿 吳 五 粉

角 白 楮 菜 棗 菜 味

仁 實 梗 朮 刺 皮 子 莢 仁 胡 辛 膠 莢 子 錫

種 實 根 根 刺 根 實 實 實 根 根 皮 實 實 鉛
製 白
之 之
子 皮 膠 類

橘 熊 雌 明 蜀 樟 赤 車 芍 赤 鷓 生 麝 蛇 藜

小 前 石 鳩 床

皮 膽 黃 礬 椒 腦 豆 子 藥 脂 菜 姜 蟲 子 損

果 皮

膽 砒

硫 化 砒

硫酸亞爾射紐謨加留謨

實

Camphor

種 子

子

根

過 格 魯 兒 鐵

海 草

地 下 莖

昆 蟲

種 子

根

臨床
應用漢方醫學解說終

水 川(芍) 小 石 沫 麩
 蛭 蕪 薺 薺 已 霜
 防 鼠

全 根 種 天然含水硫酸 根 全
 部 子 部
 共
 仔

中國科學社

中華民國十八年十一月十六日印刷
中華民國十八年十一月十九日發行

每冊定價大洋二元

外埠酌加運費



完必印翻

原著者

日本湯本四郎右衛門

發譯
行述者

鎮海劉泗橋

校訂者

丹徒章成之

印刷者

東洞學社

總發行所

上海

二馬路口西藏路平樂
里電話六三二八六號

東洞學社

