

卷十一

春溫門

冬傷於寒春必病溫為一大例

金匱啟鑰

二

金匱啟鑰卷十一

漸江黃朝坊妙山輯著

春溫門

讀仲景書，其論傷寒詳矣。獨治溫法度錯出傷寒之中，後人鮮悉義例，漫無成法可師。西昌喻氏嘉言：舊起百世之下，勒爲定論。如云：冬傷于寒，春必病溫；卽傷寒邪中三陽之謂也。又云：冬不藏精，春必病溫；卽傷寒邪中三陰之謂也。兼云：冬傷於寒，冬不藏精；卽陰陽兩感之謂也。于是併分三大例以爲綱，大開二十九條法門以爲目。夫固班班可考矣，乃世之業醫者，見聞未廣，如三註上論等篇及治溫諸

書所謂春陽大泄解肌自散均未一覩故一見寒熱輒舉麻黃湯暨五積九味表劑諸方此初後繼展轉於表藥中者不一而足夫以陽藥治不藏精者勢必令陰中之真陽因之外越能不促其亡耶且以啜汗治冬傷於寒者汗愈出而邪愈熾甚至津枯便燥本非邪入內結又投通聖等药内外俱傷而有不危困而同歸于斃者未之有也此子素所目擊心愴不勝撫膺而悼嘆矣仍臚列三條采証治之錯散集而成歌焉但其中有以芩連干葛施于汗下后汗出而喘者有以麻黃升麻湯治下后咽痛唾血下利不止者有醫以丸藥誤下投枝子干薑者謂此爲叔和之僞撰誠如集註所逐指也且兩感中領

邪則用桂枝加生地。清陽潤火則用桂枝加大黃立法如斯。不幾事治大陽而遺少陰乎。况生地能領少陰之邪。彼溫經散表之方。將安用哉。久懷疑實以俟明哲。其折之焉。

金匱要略 卷十一 着澑

二

嘗往喻西  
昌而汎不  
受使者玷  
不兄得病  
亦辨耶

謹辨冬傷於寒春必病溫定爲一大例。  
人之冬傷于寒也。其始藏于肌膚。感春月之溫氣。而乃發焉。肌膚者。  
陽明胃經之所主也。陽明經久鬱之熱。一發而外達於大陽。脈多浮  
緩。間亦浮數。有畧惡寒而卽發熱者。有大熱而全不惡寒者。有表未  
除而裡已先寔者。有邪久據大陽一經者。有從陽明而外達大陽。有  
從大陽轉歸陽明。不傳他經者。有自三陰傳入胃腑者。亦有從大陽  
循經偏傳三陰。如冬月傷寒之例者。大率大陽陽明二經是邪所蟠  
踞之地。在大陽。則寒傷營之証十不一見。在陽明。則譖語發斑衄血  
發黃肿約等証。每每兼見。而凡發表不達熱之法。適足以增溫病之。

困阨耳。况乎治大陽之症。其法不與冬月同。益春月風傷衛之証。或有之。而寒傷營之証。則無矣。若用大發大表之藥。則必大汗出。而變起矣。一解肌而自散。比之傷寒大有不同。而世之掘指云。某日某經。某日傳經已盡。究竟於變病之經。不能摸索。以求良治。所謂一盲而引衆盲。將入火坑也。冤哉。生命古今。誠無所控告矣。

証治歌

內有三法。解肌法。吐法。下法。

治瘧法。首解其肌。發熱頭疼湯。桂枝有汗惡風。桂枝加葛妙。汗無升。

麻葛根湯相宜。葛根葱白湯難少。憑症施方莫妄爲。人參敗毒散。參

蘇飲。醫概用春和。未熟始當時。熟時溫病暑病。據此二方。药性之帶溫。解肌未罷寒。

仍惡風寒。治風寒濕熱。新加湯。葛根  
維持解肌。多汗悸。恩按桂枝草湯。拔古用之。不及附著湯極美。桂枝  
不用畏陽離。奔豚砍作臍。痺悸。茯苓桂枝甘草大棗湯。投謬后批。桂枝散。陽  
陰愈盛。吳萸四逆湯。治無遺。肌經散。後腹中滿。厚朴。生薑。人參。湯。欠  
養滋過汗傷中。厚朴又損。黃芪湯。服效堪期。解肌熱渴。脈微數。溺濶  
五苓正可。醫肌解渴。煩洪大脈。人參白虎湯。難移渴而身熱。洪長脈。  
白虎湯。投壽考祺。溫熱重身。蒼朮入桂加白虎。可清肌元。參升麻。桂枝湯。  
胃兼清腎。竹葉石羔湯。徹熱熾。氣結痰凝痛。用吐。枝子豆豉。湯。火。引。子。  
散無分歧。未經悞。下方宜用切莫輕投。致怨咎。和鮮小柴胡最妙熟。

微參去桂枝隨渴兼寒熱亦參去花粉當加無細疵。薑棗人參因咳  
棄于薑五味可加齊蹠風小續命除麻黃附獨活湯風引湯皆起危。  
發熱脈浮渴欲飲猪苓湯利下開鍼辰砂天水散獨天水散分利兼  
清人少知瘥后脾虛腎水泛腫浮腰下漫驅馳古方牡力澤鴻散不  
無議新立鹿參湯思匪夷胸按痛疼需蕩結一投小陷胸湯功堪推。  
古人三物散難尋全賴醫通酌解圍肌解渴蒸寒不惡湯宜調胃承  
氣蕩中羈僅形惡熱症無下知母石羔清莫追胃熱無虛津液燥便  
軟腹滿舌芒藜大柴湖湯調胃大承氣湯視病輕重分倍從下后仍  
煩有燥矢大承氣湯進貞印須下而脈促滿胸膈去芍桂枝湯轉變

湯加附。因寒冷。鮮合新方。或附不余。斯用丸。誤下微煩。勦梔子干  
湯。內忌梔。大下氣衰陽外薄。六君薑附復陽虧。下而汗利脈促兼喘。  
干葛芩連恐愈衰。下損脾陽腎氣渙。湯宜參附建功奇。下而身熱結  
痛。用梔豉砂蔻理中湯有異思。下后腹疼煩不卧。若投梔子厚朴散  
譏詞。胸陽下損難宣布。砂半湯投福履綏下。后利頻脈不至厥而寸  
脈切沉遲。咽喉不利吐膿血。雖進麻黃升麻湯。莫起瘻也。連附湯加  
阿膠麥冬。入此湯不效。尙依誰下而傷血脈來濇。葶藶苦酒湯調不  
可。師汗下陰陽俱已敗。十全大補湯。加附而培滋。黃連湯妙熱清解犀  
角黃連涼不辭。黃連龍骨湯。黃連阿膠湯及黃連解毒湯。橘皮湯同。

上黃連隨發斑瘡毒嘔而逆。芍藥汁黑膏和豕脂養血生津。

甘草湯

妙棗仁湯五味子散起衰羸。

芍藥甘草

阿膠散古定均於養血是專

司滋陰涼血亦難緩犀角地黃湯一卮補益養營。

湯君子六理中湯

好或歸脾湯建中用小助脾胃不足虛勞加熟耆兩角大陽疼痛苦。

鼻中爪蒂出黃水愈。

薑鼻

薑揚眉

## 脈

傷寒之脈弦緊溫病之脈浮弱是故脈浮者須知邪熱之勝微浮者必是胸中有寒。乍緊邪結在胸脈數客熱在胃脈寢晡熱症在腸明。兵脈浮虛大陽之病脈見微數陰虛陽熾之診若見洪大虛中皆熱。

之候。解后脈細症未罷。解后脈沉虛。宜知身熱洪長。陽盛之症。發熱脈浮。寒鬱之形。下后脈促寒未罷。汗下脈促損陽虧。下后不至或沉遲。寒邪真陽宣升舉。下后脈濶必陰被戕。六部不至。陰陽俱敗。細審詳診。庶幾無悞。

方歌

葛根葱白湯

葛根葱白及川芎。知母生薑芍藥均。配合水煎宜熟服。溫中解散古方遵。

人參敗毒散 治傷寒頭痛憎寒壯熱。項強睛暗。鼻塞身重。風痰咳嗽。

嗽及時氣疫厲等証。

人參敗毒

甘草、雲苓枳壳、桔梗

柴胡、前胡、羌活

獨活、川芎

芍藥、杏仁、荳蔻

少許薑三片。時行疫癘用皆靈。

參蘇飲

治外感內傷。發熱頭痛。嘔逆咳嗽。疫塞中焦。眩運嘈煩。復

風泄瀉。及傷寒已汗。發熱不止。

參蘇飲內有陳皮。只壳前胡半夏。宜乾葛木香甘草。桔梗。杏仁。荳蔻。

生薑紅棗紫蘇隨。

人參新加湯 治傷寒汗后。身痛脈來沉遲。

新加本是桂枝湯。加入人參與生薑倍芍。收陰薑解表。和同甘

獨活湯 治風虛癆症。昏憤不覺。或爲寒熱。

獨活湯中羌

活獨活。風川芎當歸細辛半夏桔梗人參曹

蒲甘草。昏憤癆症用皆良。

### 風引湯

風引湯治風火熾骨石石羔龍

骨牡

蠣甘草大

黃役赤石脂

白石脂

石脂紫石英干薑桂枝凝水石。

天水散 治傷寒中暑。表裏俱熱。煩燥口渴。小便不通。瀉痢熱瘧霍亂吐瀉。下乳滑胎。解酒食毒。偏主石麻。

亂吐瀉。下乳滑胎。解酒食毒。偏主石麻。

河間天水卽六一散滑石甘草配宜的研末調服用之良可療  
寒暑痢瘧疾。

辰砂天水散

辰砂天水药無多。卽是六一滑石甘草和加入辰砂水飛研服。  
之亦可起沉疴。

元參升麻湯 治發斑咽痛。

元參升麻甘草襄散毒制火用皆良。一入陽明一入腎。發斑咽  
痛急須嘗。

砂蔻理中湯

人加減施。

### 麻黃升麻湯

麻黃升麻湯內首麻黃當歸白芍條芩  
葛根白朮甘草襄蕤參石羔天冬桂枝  
陰虛陽陷脈沉良。

### 葶苈苦酒湯

葶苈苦酒艾汁妍艾無新葉陳猶鮮。一酸一苦交相濟瀉熱助  
陰和服痊。

### 黃連龍骨湯

黃連龍骨湯。黃連、龍骨、黃芩、芍藥全不用引煎。溫服好熟清毒。  
解效通仙。

### 黃連橘皮湯

黃連橘皮湯。麻黃、干葛、橘皮厚朴良。甘草杏仁不用引。水煎二服自然康。

### 黑膏

黑膏治瘧。嘔逆艱。猪脂生地。淡豉。摻入。雄豆大射少許。服之諸症自能刪。

炙甘草湯。治傷寒脈結。代心動悸。及脈痿。咳唾多。心中溫溫夜夜。

炙甘草湯有生薑火麻肉桂生地黃大棗麥冬阿膠炒虛勞脈  
痿效非常。

酸棗仁湯 治虛勞虛損不得眠。

酸棗仁湯用棗仁川芎甘草及雲苓虛勞不寐燥煩解。知母爲  
臣滋腎津。

五味子散

五味子散用麻黃細辛紫菀黃芩蘇子甘草桂心半夏人參當  
歸併水煎熟服引須薑。

芍藥甘草阿膠散

芍藥甘草阿膠散。芍雖三味性平坦。和脾養血。此方良醫師活法在加減。

治中湯 治腹滿痞悶。兼食積者。

治中湯內有人參。白朮。干薑。甘草同。更有青陳二皮。并。痞悶食積服皆靈。

六君子湯

六君子湯本四君。人參。白朮。甘草。雲苓。加入陳皮。并半夏。臺東前服效通神。

歸脾湯

歸脾湯用白朮。人參。宜黃芪。甘草。茯神。遠志。隨木香當歸龍眼。  
肉東仁。薑棗益心脾。

升麻葛根湯

桂枝湯

芪附湯

吳萸四逆湯

均六經

梔子豉湯

五苓散

小柴胡湯

調胃承氣湯

白虎湯

大柴胡湯

大承氣湯

連附湯

黃連阿膠湯

理中湯均見六經

桂枝甘草湯

芍甘草附子湯

桂枝甘草大棗湯

黃連湯

瓜蒂散

人参白虎湯

厚朴半夏人參湯

小陷胸湯

參附湯

桂枝去芍藥湯

生姜半夏人參湯

梔子干薑湯

薑附六君湯

小建中湯

犀角地黃湯

梔子厚朴湯

砂牛湯均見太陽

竹葉石羔湯

黃連解毒湯經六

猪苓湯方見陽明

牡蠣澤泄散

鹿參湯

小續命湯均見變症

人參養營湯

十全大補湯均見婦人傷寒

附錄喻氏切指仲景原文

二大陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病

原文

按溫者春令之氣也冬夏秋雖有氣溫之日不如春令之正且久也不惡寒三字內有奧義蓋時令至春則爲厥陰風木主事而與太陽之寒水不相涉矣故經雖從太陽而症則從春令而

寒者衛虛則惡風。營虛則惡寒。又不可因是。遂指爲非溫病也。然卽有之。亦必微而不甚。除太陽一經。則必無之矣。

二形作似。傷寒其脈不弦緊而弱。非傷寒也。弱者必渴。被火者必譫語。弱者發熱。所以脈浮。解之當汗出愈。原文渴也。

風性弱緩。故脈亦弱。弱者發熱。卽內經諸弱發熱之義也。脈既浮。當以汗解之。使汗出而愈。取解肌。不取發汗之意。

按溫熱病原無風傷衛、寒傷營之例。原無取于麻黃桂枝二方也。表藥中卽敗毒散。參蘇飲等方。亦止可用于春氣未熱之時。

若過時而發之。溫病暑病。尙嫌其藥性之帶溫。况于桂麻之辛  
熱乎。然仲景不言桂麻之不可用者。有二說焉。一者以剔出桂  
麻。則三陰絕無表藥也。一者以桂麻用之不當。在冬月已屢致  
戒。春月更可無贅也。後之紛紛訾議桂麻之熱者。未嘗計及于  
冬不藏精之始耳。惟知春夏有不得不。用也。庶知仲景立方之  
神哉。

三脈浮熱甚。反灸之。此爲寔。寔以虛治。因火而動。必咽燥吐血。原文  
脈浮熱甚。邪氣勝也。邪氣勝則寔。反灸之。是寔以虛治也。血隨  
火炎而妄逆。在所必至矣。咽燥者。火勢上逼枯固之應耳。若是

少陰見病當不止此一端故不入冬不藏精一例  
四病如桂枝症。似乎頭不痛項不強。則太陽無外入寸脈微浮。則邪  
出而不胸中痞。鞭疫江氣上衝咽喉不得息者。胸中有寒也。當吐之。  
當過表。中風頭不痛項不強。則太陽無外入寸脈微浮。則邪  
宜瓜蒂散。病人有寒復發汗。胃中冷必吐。原文

按仲景不曰病似中風症。而曰病如桂枝症者。恐後人悞以治  
溫一例。混入太陽中風之例。而滋擾故更換其名也。吐法多用  
梔豉湯。此用瓜蒂散者。取其吐頑疫而快膈。湧風涎而逐水也。  
有疫而悞發汗。徒亡津液。胃中空虛。蠭失所養。故悖逆上出也。  
五病人手足厥冷。似涉陰脈乍緊者。邪結在胸中。并厥心中滿而煩飢。  
厥陰脈乍緊者。邪結在胸中。并厥心中滿而煩飢。

不能食者。病在胸中。當須吐之。宜瓜蒂散。

原文

按此症乃疫邪自內而作。卽四症內傷寒之瘧症也。仲景云。病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。表裏虛身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。表裏虛此以互合之表裡。言設合臟腑而統言之。則皆謂之表矣。

六病在陽。表未罷。熱未除。應以汗解之。反以冷水與之。其熱被却不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。寒邪爲水。服文蛤散。若不瘥者。與五苓散。寒寢結胸。無熱症者。兩寒相搏。與三物小陷胸湯。白散亦可。

拔病在躁則不寐。陰可知正合第一例也。

七病人臟無他病。裡氣時發熱。或然或和也。先其時未發熱。自汗出而不愈者。此胃氣不和也。先其時發汗。則愈。宜桂枝湯主之。原文

之時

八病嘗自汗出。無時不然此爲營氣和。營氣和者。外不諧。以衛氣不共營。

氣和諧。故爾。以營行脈中。衛行脈外。復發其汗。嘗衛和則愈。宜桂枝湯。原文

湯。原文

按臟無他病。但衛氣不和。亦陽病而陰不病之例也。

再按春

溫之症。由肌肉而外達于皮膚。則大陽膀胱經之邪。傳自陽明。胃經。與冬月外受之風寒。始先便中大陽。而傷其營衛者。迥乎

不同故此但言衛氣不與營和。其無大過可知也。既衛不與營和。當用麻黃。乃但用桂枝者。可見溫症中發汗之法。皆用解肌。蓋久鬱之邪。一解肌而自散。若大汗而傷津液。反變起矣。此先聖用法之大閑也。

五病人脈數。數爲熱。當消穀引食而反吐者。此以發汗令陽氣微。脇氣虛。脈乃數也。數爲客熱。不能消穀。以胃中虛。令故吐也。原文

按發汗而令陽微。悞之甚也。陽微則胃中虛冷。而脈反數者。不過客熱之微。溫其胃而客熱不留。斯脈不數矣。再按此但言胃中之陽微。與不藏精之真陽。微弱者。不同。

十病八煩惑也

汗出則角如瘡步曰暱所發熱者屬陽明也脈

毫者明宜下之脈浮虛者陽宜發汗下之宜承氣湯若汗之宜桂枝湯

原文

十一微數之脈慎不可灸。因火爲邪。則爲煩逆追虛遂寢。血散脈中。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。

原文

按此一條垂戒。雖在溫症項下。然不耑爲溫症而設。所以不言症而但言脈也。脈見微數。則是陰虛而陽熾。重以火力追逐其血。有筋骨焦傷已耳。奈世之灼艾者。不識亦辨脈之微數耶。其爲陰虛火勝之人。漫用灸法者何也。

十二病人耳聾無聞者。以重發汗虛故也。原文

此與傷寒耳聾爲少陽邪盛者迥異。益見溫症禁過汗也。

十三病人不大便五六日。繞臍痛煩燥發作有時者。此爲燥屎故使大便硬也。原文

十四病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘不能卧者。胃有燥屎也。宜大承氣湯。原文

十五大下后六七日。大便煩不解。腹滿痛者。此爲燥屎也。宜大承氣湯。原文

接仲景治溫症。凡用表法。皆用桂枝湯。以示微發於不發之意。

也。凡用下法皆用大承氣湯以示急下無所疑之意也。不知者鮮不以爲表在所輕而裏在所重殊大不然。蓋表裏無可軒輊所以然者祇慮熱邪久據陽明胃中津液先傷故當汗而惟恐過于汗反重傷其津液當下而惟恐不急于下以大存其津液十六本發汗而復下之此爲逆也。若先發汗治不爲逆本先下之而反汗之此爲逆也。若先下之治不爲逆原文

觀此則溫症比傷寒大陽經之變症爲差減而汗下之次第亦爲不同矣。

十七凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽和者必自愈原文

觀此則病溫之人素無內傷及不藏精之類者爲易愈也

謹制冬不藏精春必病溫分爲一大例

人之所重者腎。腎之所重者精。時至寒冬。陽氣藏於至陰之中。內經教人。此時若伏若匿。重藏精也。世久不維其義。不能保護。精動則開。開氣泄。而寒風得乘隙而入矣。屢開頻泄。則寒風亦得屢入矣。且腎主閉藏。賊無門出。及至春月。地氣上升。肝木用事。肝主疏泄。于是吸引腎水。而久伏之邪。即因而勃勃內動。刲其家寶矣。夫當其伏也。邪不遽出。及將發時。但覺憤憤無奈而已。若動而發熱。脈多沉數。熱從骨內蒸蒸。自覺極熱。捫之反不烙手。皮間未熱。耳輪上下。先已熱矣。始發之時。多兼微寒。不同一條之全不惡寒。以少陰居北方。寒水之

位也。及至大熱灼身。多不惡渴。不同一條之大渴。以熱邪初動。而陰精尚足持之也。其後則不惡寒而惡渴。與一條之症。渾然無別矣。然雖無別。究竟表裏不同。標本互異。須先用藥深入腎中。溫經散邪。則重者必輕。而輕者卽愈矣。

証治歌

篇中十一法。溫經散邪。溫經急溫通陽。溫胃。灼艾助陽。惺經鎮水。和陰急下。清解。清咽分利。

少陰邪熱久蟠據。法度溫經入腎。按麻黃附子細辛。溫寓散風淫寒。鬱熱滿中休。若無吐利渴煩燥。麻黃附子甘草湯。求陰甚。附子湯。陽不越陽回四逆湯。陰堪收陽閑。陰格白通湯。美猪胆汁加導最優。而

古法求病既中寒兼下脫此方僅固未云周法治固脫須兼補惟有  
北參湯第一籌逆令口和服熟藥外頂門百會灸良謀溫經鎮水因  
沉重下利咳嘔宜真武湯修不寐心煩裏熱甚黃連阿膠湯服陰和  
柔咽乾口燥利清水湯用大承急下瘳清解古方四逆散陰經此药  
不無尤外無協熱頭寒症腹痛瀉泄四肢逆虛寒証咳逆心悸氣陷泄利下重大陰症  
宏莫與儕下利咳嘔煩不卧猪苓分利非嘉猷証非協火虛寒証桂  
夏湯新稱上流風挾熱疫甘草湯美桔梗湯半下湯均醫喉咽瘡聲  
語寢難出苦酒湯調無久憂人藉火生願盡識莫將附子視如仇

全  
間  
居  
錄  
卷  
一  
春  
溫  
七

脈

少陰初病。脈沉反熱。邪表根裏之診。得病已數。發熱脈沉。病裏餘表之候。沉細而數。裏熱之症。少陰脈微。亡陰之故。尺脈弱濶。陽已虛少。陰緊數邪。在陰緊去。但微病初愈。陰陽俱緊。陽立亡。分別詳言。須同審慎。

方歌

北參湯

北參湯內有乾薑。曰尤人參肉桂襄。北味炙草破故紙。更加附子定回陽。

苓尤湯中用肉桂黃芪茯苓附子砂仁隨干薑白朮法夏強脾  
胃逐飲祛陰補內宜

麻黃附子甘草湯

麻黃甘草附子溫甘草和之性便純少陰病發無裏症服之微  
汗自然鬆

苦酒湯 治咽中生瘡語聲不出者

苦酒湯中半夏良一枚雞子黃除黃留青研牛夏和米醋同入  
雞殼中煎熟嘗

桂夏湯

桂夏湯治煩渴嘔。阿膠半夏砂仁。升人參內桂白朮炮薑隨逐飲補中治不苟。

麻黃附子細辛湯 甘草湯

附子湯

四逆湯

通脈四逆湯 白通湯

黃連阿膠湯

大承氣湯

均見六經

吳萸湯 見陽明

真武湯 方見太陽

桃花湯

桔梗湯

半夏湯 均見少陰

猪胆導法

少陽

附錄喻氏切指仲景原文

一小陰病始得之。反發熱脈沉者。麻黃附子細辛湯主之。原文

按脈沉病在裏也。而表反發熱則邪雖在表而其根原是在裏在裏之邪。欲其盡透於表。則非顓經之藥不可。故取附子細辛以匡麻黃爲溫經散邪。千古不易之正法。奈何後人全不知用。明明見脈沉身重嗜卧倦語之症。即知爲風溫又知爲冬不藏精。尙且漫用三陽經之表藥。屢表不應。十中不能活一。復謬之傷寒偏死腎虛人。是則是矣。但不知果行溫經散邪而人死耶。抑未行溫經散邪而人死也。噫。業傷寒者之詫顓門。直是操刃之齒人。寧爲芻蕘之童子已哉。

二少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯。微發汗。以二三日無裏症。

故微發汗也。原文

按麻黃主散邪。附子主溫經。二者皆大力之藥也。前症發熱脈沉。則表裏俱急。惟恐二物不勝其任。更加細辛之辛溫。取其爲少陽引經之藥。而又有辛散之能。以協贊二物。共建奇功也。此云無裏症。非是并脈沉嗜卧等症。俱無也。但無吐利躁煩嘔渴之症耳。似此則表裏俱不見其急。而麻黃附子二物。尙恐其力之大過。故不用細辛以助之。而反用甘草以和之也。謹并製方之意。嘔心相告。凡治冬不藏精之虛症。始發二三日間。請決擇於斯二方焉。

三病發熱頭疼脈反沉若不瘥身體痛當救其裏宜四逆湯

原文

按此一段文義可得仲景治冬不藏精之奧旨。病發熱頭疼症見于表矣而脈反沉則病又在裏矣而有可疑也。既發熱頭疼勢必先治其表。若不瘥則治表無益矣。凡治表者皆治其陽也。陰病治陽豈惟無益將見陰中之真陽因之外越而身體反加疼痛一圍陰寒用事矣。此所以當用四逆湯而急回其在經之陽也。再按若不瘥三字甚活蓋發熱頭疼表之原不爲悞但一切三陽經表藥俱不對症惟麻黃附子細辛湯與麻黃附子甘草湯二方始爲少陰經對症之表藥而又不敢必人之能用。

所以不說。悞表而但說。若不瘥。正見表药中原無瘥法也。  
四少陰病。脈沉細而數。病爲在裏。不可發汗。原文

按脈細而數。裏熱也。發汗虛其表。且亡其津液。內熱愈熾。  
五少陰病脈微。不可發汗。亡陽故也。陽已虛。尺脈弱澁者。復不可下。  
之。原文

按前段云。脈沉細數則爲熱。此云脈微則爲虛。熱而發汗。則陰易亡。虛而發汗。則陽易亡。故兩戒之。然則脈不微數者。一概禁汗。不爲懲噎廢食耶。況于不藏精之症邪。發之初。未必即見微數之脈。惟可用麻黃附子二方。而不即用。則至脈數且數到千

六少陰病。欬而下利。讝語者。被火劫故也。小便必難。以強責少陰汗也。原文

按少陰少血。強責其汗。是劫奪其血也。小便難者。源先竭也。再按少陰病。強汗則小便必難。悞下則小便不利。直視失溲。可見腎以膀胱爲腑。臟病而腑未有不病。臟傷則臟先告絕也。傷寒症中云。直視讝語。循衣撮空。小便利者。其人可治。則是少陰之臟氣絕與不絕。全于小便之利與不利。窺其中藏。孰謂冽彼之下泉。非回枯澤槁之善物哉。

七少陰病脈繁至七八日自下利脈暴微手足反溫脈繁反去者爲欲解也雖煩下利必愈原文

按邪在陰者多自利。自利則邪氣湧正氣而脫者多矣。其候必脈繁數而四肢逆冷。脈繁去而但微。則陰邪已散。手足溫則陽未傷。雖有心煩下利之危急。而可直決爲必愈。蓋陰陽不相乖亂。則別無死法也。然非腎氣素旺。受邪原輕者。不易得之數也。

再按此邪在陽。脈數而熱。得汗而脈和。身涼數去。爲欲愈之意。同然陽病輕。而從汗解則易。陰病重。而從利解則難。所以仲景于陽邪內陷下利不止之症。惟用逆流挽舟之法。望裡邪還。

便。但少陰賊氣堪爲主人。送出客邪。尚快乎。有餘地則善也。而不藏精者。日爲床褥作主人。安望重閨設險。以待暴客乎。

八少陰病八九日。一身手足盡熱者。以熱在膀胱必便血也。

原文

按膀胱爲腎之府。腎邪傳膀胱。則裏熱達表。故一身手足盡熱也。大陽多血。爲熱所亂。則血出于二。便然比之少陰少血。悞動其血。而從鼻口耳目出者。則天淵矣。再按熱邪雖從便血而解。經年調理。陰氣難復。况旣開血一竇。漫無止期。何如一身手足方熱之頃。預識勢所必至。而極圖之于早邪。奪膀胱熱。用桂

金匱要略

卷十一  
君藏久不辨者

### 枝大黃入四苓散

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者虛故引水自救口燥舌乾症具小便色反白下焦虛有寒也勿認爲熱以致悞原文

此一段因仲景原文難解自會其意而言之也按冬不藏精之

症此一段最肖仲景證已欲人辨識之矣

下病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也無陽以爲之外護也此屬少陰法咽痛而後吐利原文

按冬不藏精之症此一段更肖少陰爲水臟吐利者陰盛而水無制也

言其後方失其名不難精。春月同時病發定爲一大例。

冬既傷寒又不藏精。至春月雨邪同發。傷於寒者陽分受邪。大陽膀胱經主之。冬不藏精。陰分受邪。少陰腎經主之。與雨感傷寒。証中一日大陽受邪。卽與少陰同病。則頭痛口乾。腹滿煩渴。臟毫不差。切其脈。則多沉細。卽有在中。亦必遲緩。若傷寒自外入內。轉入轉深。故三日傳徧六經。溫症自內達外。則從大陽之戶牖而出。勢下傳徧他經。卽在此二經爲恒也。所以溫症兩感之例。原有可生之理。如嘉言治法。先以麻黃附子細辛湯。汗之次以附子瀉心湯。下之。是汗法下法。要不能離乎溫法。一药異用。而收功反掌。在人之善用也。今人見熱

煩枯燥之証。不敢用附子者。蓋惡其以熱助熱也。孰知不藏精之人。腎中之陽氣不鼓。精液不得上升。故枯燥外見。必用附子助陽。則陰氣上交于陽位。如釜底加火。則釜中之水氣上騰。潤澤有立至者。仲景方中。輒用附子一枚。令人一錢。亦不敢用。總由其識之不充耳。失汗藥中。可不用溫。下藥中。可不用溫。是與治傷寒陽邪之法全無差等矣。學者苟能參透此關。其治兩感之溫。証萬無一失耳。

証治歌

篇中十五法桂枝領邪清表溫中清陽散火脈浮先表

先溫后表溫經止汗汗后惡寒下后惡寒汗后發熱汗

后裏虛汗后心悸汗后汗

汗

后脅痛

汗

后心悸汗后腹

汗晝靜夜燥汗后變通

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

兩感溫經表卽散麻黃附子細辛湯

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

汗

小陰地更變加附桂枝刑始出尤宜附子熟生全溫中活表主何  
芍惟有桂枝人參湯可痊。鴻火清陽法有定。桂枝加大黃湯黃入純陽邊。

桂枝附子瀉心湯方如病交濟陰陽治不偏先表脈浮症可識外症必有

頭痛如劈腰脊強痛莫移。胸高氣喘種種危候桂枝加附邪堪宜利清不止下因悞。因逆湯

加遞後賢胸胃中陽宜速救尤芪加入效通仙利停身痛當攻表附

子桂枝病不延漏汗溫經汗自止桂枝加附古方傳芪附湯法由孫

氏固腎腥脾理迥然汗后惡寒溫因表方芍甘草附子湯寒能蠲惡

寒下后乃生惡加附桂枝芍半牽芪附舒方法最妙投之屢驗獨超

前既經汗下熱偏發調胃承氣湯和病解懸汗后脈遲身苦痛新加

湯進却除痛

音淵骨  
痛也

汗多心悸欲操按不越參芪

湯病自捐古用桂

枝甘草法桂枝恐散陽飛遷吳萸四逆湯治膽悸

茯苓桂大棗湯不

宜見首篇解后腹中病脹滿不將厚朴甘草生薑煎

厚朴生薑半枝甘草大棗湯不人參湯傷

中因汗朴仍損不若黃芪湯免愆夜重日輕汗下后桂枝湯入紅花

鮮服之不效古方採五物煎由景岳編日重夜輕無大熱乾薑附子

湯似甘泉脈浮自汗寒仍惡溺數心煩腳急攣誤表桂枝湯得便厥

甘草干薑湯服陽回旋厥溫更進芍藥甘草脚自獲伸不再踰悞汗

症生變愈大總在四逆是真詮

方歌

桂枝附子瀉心湯

桂枝附子瀉心湯。內有黃芩、黃連並大黃。附子一枚生熟半桂枝加入效非常。

五物煎

五物煎中熟地川芎當歸芍藥桂枝從滋營養血功非小。病是陰虛克奏功。

麻黃附子細辛湯

桂枝湯見六經加附桂枝湯

曉太桂枝加大黃湯

全圖居錄 卷十一 著溫病

調胃承氣湯

氏芪附湯

吳萸四逆湯

孫芪附湯

四逆湯

均見六經

黃芪湯

桂枝人參湯

芍甘草附子湯

茯苓甘草大棗湯

桂枝新加湯

甘草干薑湯

厚朴生薑半夏

人參湯

均見大陽

參芪湯

桂枝紅花湯

見婦傷寒

干薑附子湯

陽明

附錄

婦溫病症潮熱發斑余診其脈靜而無力斑小淡紅知其屬陰証也以大補元煎輕加附片數劑不愈反見舌裂似鐵黑痂有一文錢厚重用熟地之故。昏厥不口大便自瀉脈沉

在微氣息咸工熱証事也

余以爲寒投生脈散用大參

錢奈唇腫舌硬不能進藥以蜜潤舌徐徐以藥浸之旋進回陽返本湯併進八味地黃湯每日二劑交進數日方甦作嘔腹先痛起然后一身痛知是寒淫於內治以辛熱以真武湯重用生薑附子加人參數劑証平舌竟脫黑皮后服石歸丸併回陽飲二方服至三月全愈后算用人參六兩零上桂一筋零附片二百餘兩熟地八九筋

春余自病惡寒發熱自知其爲溫病也自切脈細而無力用大劑麻黃附子細辛湯囑男輩此病恐有昏憚倘爾等請別醫切不

可用發藥果黃昏時服藥后熱愈大昏憒不省人事舉家惶惶醫來余昏不知止聽得問大便余猶大聲不可用抽篩后伊等用方余均不知至四更時熱盡退卽醒問服何方答曰十全大補湯配人參問加薑附否答云止加附子一錢余云此藥一進必嘔舌必黑天明果嘔旋進真武湯三四劑后服六味回陽飲漸愈始知陰症心中更寒前因薑附輕故知其必嘔矣

一人病溫症脈緩無力初用麻黃附子細辛湯熱退舌旋黑余知此非內熱乃是水刑心火大劑真武湯二劑全愈

一家溫病大作逝首已五人矣云二月中之日

空。譴語。脇仍痛。始接余診。其脈浮洪無力。用節菴升陽散火湯。  
配人參。加青皮一劑。証悉除脈細無力。臍下奔豚痛。用茯苓桂  
枝湯愈。胸滿痛。用理中湯加枳實。愈后。服六味回陽飲。右歸飲  
等藥。大愈。

一人病溫。醫治不愈。始接余往視其症。大熱。目赤舌乾有刺。小便  
赤短濁。口大渴。診其脈遲緩無力。竟無表時。有醫已開柴芩湯。  
幸未服。余思病人必圖速效。用真武湯大劑。加附片八錢二劑。  
愈。

一婦病溫。往視舌黑。大熱微寒。脈無力。用四味回陽。以桂代參。寒熱退。嘔吐。用烏梅丸除黃柏。嘔止。脅下忽大痛。用桂枝茯苓湯。愈后服六味回陽飲及五福飲加薑附。全愈。

一女二月初病寒熱。脈浮無力。有汗。始以疎邪寒表湯。一劑病減。二劑全愈。但一身痛。投新加湯。愈后服十全大補湯數劑。

一婦二月間大熱。延數日。精神衰減。余診脈沉細而緊。帶濁。以麻黃附子細辛湯。加熟地當歸。熟晝退。但精神未復。旋以養榮湯多服。全愈。

一婦病溫。進五瀆散二劑。反多汗。清申辰巳。口渴。余以其脈沉

之過其亡陽之變旋踵矣。以麻黃附子甘草重用附子六錢。麻黃一錢。併加黃芪白朮各五六錢。二劑瘥。但精神未復。以朮亦當歸熟地薑附敷大劑全愈。

一人病寒熱脈浮緩雖是冬傷寒一條而年老體弱又兼頻嘔以薑附六君子加桂枝生薑大棗砂仁一劑嘔止熱減二劑熱盡退后除桂枝加黃芪多服而強。

一人病寒熱煩燥不渴胸滿腹脹且嘔顯是兩感之症。以麻黃附子細辛湯合理中湯加枳實厚朴。余意未經汗下枳厚之類亦

不妨用。服一劑病懸。兩劑未全愈。而咽反乾。予思此病不早圖之。恐有遺患。以桂枝大黃湯而愈。后服補養之劑。

一人溫症。大潮熱。面目俱赤。口唇亦熱爛。舌生芒刺黑。而猶潤切其脈。沉細。用麻黃附子細辛湯。時有嫌藥大熱者。另開九味羌活湯。予謂不服此單。必大汗亡陽而斃。強服予單一劑。熱退。以上溫病。皆屬陰症。或年老體弱者。倘悞汗則變起矣。故錄之。其餘陽症。或兼體壯者。悉以解肌爲主。或桂枝湯。有嗽加桔梗。或參蘇飲。至天熱甚時不用。脈浮緩無力者。統以大溫中飲。除麻黃加桂枝附片。一劑而愈者。亦頗多。細按。易寒與溫病二症。易分。易

治而陰分者難。陰陽二字總在脈上辨。然辨之中亦有難易者。如脈沉細無力。人皆知陰症。至於發熱面赤煩燥口渴。揭去衣被。脈浮大緩而無力。人多不識是陰症誤投涼藥必斃。不知陰陽不專在浮沉辨。只在指下有力無力分。若浮緩無力重按全無。卽是浮脈中之陰症。當以大溫中飲加附子。說者曰。旣屬浮何以謂之陰症。反用辛熱之藥。不思緩無力卽陰也。旣屬陰。何以不用麻黃附子細辛湯重按全無。卽血虛之極。非薑附兼熟地。斷不能成功。至於黑舌陰症。由火土已虛。水將刑心。稍投熟地。以助浮水。速卽變黑矣。遇此症。必用大劑真武湯。不妨重用。

附子。方內白芍一味。最妙。以防陽亢。數劑后。症必平。舌必退。即不退。必不加。然后用六味回陽。或右歸芍藥自愈。嘗聞病者舌黑。醫人鮮不以爲熱症。妄投承氣白虎。而斃良可悲也。

溫瘧論

諸病標本創自內經。而其立言多意深而理微。不有明者大暢厥旨。則后起者莫得成規可師。如溫寒二症。傷寒則賴仲景。春溫則有嘉言。皆從內經闡出至理。獨內經所云溫瘧。得之冬中于風。寒氣藏于骨髓中者。考厥諸書。僅著寥寥治方。而其中意義終隱匿而莫宣。况世之業醫者。卽或稍知讀書。類多模糊。不求溫字甚解。遂與庸輩同爲胸無成竹。一遇此症。卽與大發大表之药。使汗愈出而邪愈不解。甚至常山草菓。一應列陳。坊也目覩心痛。因以夙昔之揣摩。詳爲敍焉。夫溫瘧之由來也。時届冬月。風中大陽。而肝木主風。以風召風。遂

傳少陽。少陽亦認賊爲好。且時值閉藏。因蟠踞而不達。及至春月。地氣上升。少陽木旺。卧榻之下。豈容他人鼾息乎。于是鼓驅其邪。邪亦乘陽外泄。故其病發也。或從少陽。仍出大陽。或從少陽轉達陽明。有先寒而后熱。有先熱而后寒者。抑或但寒不熱。但熱不寒者。治之徒以大陽之表藥而發汗。適以增溫瘡之困阨耳。噫。不入虎穴。焉得虎子。是宜直抵少陽。而平其賊。則柴胡之甘辛。在所必用。其從少陽而出大陽。桂枝之辛甘。又何可缺。如斯而治。則溫瘡之法度。庶几有得。而世之病溫瘡者。宜無不出水火而登衽席也。

溫瘧不與秋瘧同病。源屬中陽。年冬先升。春始按加烙。后起暉。其欲

近烽。羌活。麻黃。須禁用。小柴胡湯。薦服成功。先寒后熱。有加法。桂枝

入小柴理極通。但熱不寒。亦異。桂枝白虎湯。服之。但寒不熱。用

芍藥。古用柴胡湯。加薑。桂增牡蠣。天花粉。不驗。小柴薑附桂加工。汗

多小便赤而澀。水土不服。難。瘴氣籠。嘔吐。渴煩。多腫。証。五苓散。服妙推

祟脈。彤尺寸俱來。盛漫道脈弦自。瞤。醫透此。閏治台法。明人聞見。

免冲冲。

脈

尺寸脈盛而弦。爲瘧之候。否則非瘧。浮緩風盛。沉緊寒盛。浮大有力。

五國圖金卷十一 湘鄉  
夾熱緩濶或滑因溫。

### 方歌

桂枝白虎湯 治溫瘧。但執無寒。骨節疼痛時嘔。

桂枝白虎湯 石膏研知母。桂枝甘草全粳米。一匙同湊合。熱米煎服病安然。

### 小柴加桂附薑湯

小柴加桂附薑湯。附子乾薑肉桂襄。半夏黃芩甘草合柴飼薑。棗服之安。

### 扶氣追瘧飲

批氣追瘧用黃芩白芍首烏附桂草柴  
膏煎服效堪期。

小柴胡湯

五苓散均見

柴胡桂枝干薑湯見少

柴胡加桂枝湯見大

六經

柴胡桂枝干薑湯見少



一人病溫瘧已用青皮草菓常山等藥一二劑。余至力阻脈洪太  
有力之極。但緩耳額痛用十味人參散。重用柴芩加石羔桃辛  
一劑。后用製方扶氣追瘧飲。稍愈。後用八仙長壽丹十劑全愈。  
一人病溫瘧用補中益氣加桂枝石羔法。夏、黃芩干薑附片一劑。

后用扶氣追瘧飲重用首烏加薑附二劑。稍平除石羔進四劑。  
又除柴芩石羔等大配二十餘劑全愈。

一人病溫瘧寒重熱輕先自用草藥絕之病更甚。余用六味回陽  
飲加柴芩桂枝一劑。后除黃芩桂枝服四劑全愈。

一婦病溫瘧久不愈。脈浮無力。初用扶氣追瘧飲二劑后除柴芩、  
法夏石羔數劑而愈。胃氣痛纏延。用溫胃湯一劑而愈。

一婦年已六十零。病溫瘧先寒后熱。但口不渴其精神虧弱。不時  
昏憤難以自起。切其脈溫瘧之脈雖云尺寸諸盛未有如此之

浮空。均似陽閏陰格。且帶散。予不勝驚恐。舉家亦惶惶。曾記傷

一錢。二劑而脈稍平。又以扶氣追瘧飲除柴芩石羔。加附子炮  
薑。又以右歸飲。伊本性難受地黃。以首烏易地黃。二劑各重有  
八九兩。每日各服一劑。止服頭到次。到藥水又前頭到漸服漸  
減。一月全愈。細思此病若執溫瘧之法治。輒用柴芩石羔。不無  
貽慮。可見溫瘧若脈虛敗。而見寒熱者。卽以假熱一條施之。乃  
克有濟。

一荆室是年患帶病。每曰服藥二劑不甚培補。忽五月間。又病溫  
瘧。伊本脈是弱。診其脈浮而微洪。每日先寒后熱。口不渴。精神

如故以補中益氣湯合柴胡桂枝湯。加干薑附子二劑。次除桂  
芩等。服二三劑。未見愈。熱雖減半。而寒仍如初。切其脈。見木性。  
脈而弱。予思脈復本弱。而寒不減。顯是陽不足以附子生薑各  
一兩。蜜芪二兩。首烏一兩。一劑病退。二劑全愈。

婦年已七十有零。病溫瘧。已經屢發屢表。又進絕藥不效。仍先  
寒后熱。但口渴甚。而精神頗減。后詰余。余思既見溫瘧。可不必  
臨症。卽開扶氣追瘧飲。加薑附。伊配二劑。服一劑病減。二劑全  
一人五月患病。每日但寒二時。予切其脈。浮洪而緩。局桂枝柴  
胡湯。加附子炮薑。一劑愈。

一人年七十有零。病溫瘧。以桂枝柴胡湯加附子。干薑二劑。病退。后用六君子湯加黃芪。熟地。薑附服數劑而愈。

一人五月間。忽半夜大寒。至次早猶未休。切其脈則沉緊。予思是溫瘧又無休時。且脈沉緊。以爲夏熱。又不見熱。予憑脈治。雖麻黃。熟時所禁。然有是証。脈又不得不。以麻黃附子甘草湯二劑。而寒退。次日微寒。而熱繼進。柴胡桂枝湯加附子炮薑。次日病退。后以薑附六君子湯愈。

以上數人。俱年高病隙。及體弱者。但溫瘧年強體壯。脈浮洪微有力者。均以小柴胡。如前証治。歌隨証加減。若年高體弱者。脈

金匱要略 卷十一 湿病 三

緩而無力。但以扶氣追瘧飲。或加桂枝。寒重者。加薑附。熱甚或渴甚者。重用石羔。后服芩桂石羔。但不可用。卽有餘熱。溫而散之。或先用補中益氣湯。加桂枝。黃芩。法夏。石羔。或加薑附。后用扶氣追瘧。除石羔。柴芩。加薑附等藥。溫散收功。以上二方。或陽未虧。附子可不必加。臨病見症而用之可也。

內經論病。惟瘧最詳論邪則有風寒暑濕論邪入客處。則有腸胃之外營氣之舍。脊骨之間。五藏膜原與人客於臟腑淺深不同。語其病狀。則分寒熱。先后多寡。然熱由邪傷。皆因其客在營氣之舍。故瘧有發止之定期。營氣有舍。猶行人之有傳舍也。營衛之氣。日行一周。歷五臟六腑。十二經之界。分每有一界。分必有其舍。瘧邪與日行之衛氣相集。則病作。離則病休。其作不惟脈外之衛虛。并入於陰靈樞所謂足陽明與營俱行者。亦虛以從之。陽明之氣虛。則天因水穀而充大者。亦暫衰。所以瘧作之際。禁勿進藥。用刺。恐傷胃氣與天真也。但

瘧病分經而言之。則十二經皆有瘧。而其治方亦異。今慮其煩。而削之約。而言之。總不外氣血二字括之也。在氣則發早。在血則發晏。氣卽陽也。邪淺則一日一作血。卽陰也。邪深則間日一作或夜發。發於

處暑前脈浮有汗宜桂枝羌活湯無汗麻黃羌活湯夜發則以麻黃

黃芩湯或麻黃桂枝湯加地黃紅花。不止用四物湯合小柴胡湯。知升麻提出陽分。后用四君子湯加烏梅、常山、枳榔、截之。其寒熱多少

**不同多熱但熱者桂枝白虎湯** 脈空虛微弱者當虛多寒但寒者桂  
寒治不可輕用白虎

**附小柴胡湯** 治洪寃或滑當作溫熱。治之不可便用桂附。然瘧之發於風寒暑湿之邪亦

當悉風瘡者惡風自升桂枝白朮湯不退小柴胡湯加常山兵  
藥

標截之久不愈多服補中益氣湯兼瘧惡風無汗養胃湯加桂心不  
止平胃散加枳榔草莫截之久不愈六君子湯加薑桂暑瘧煩渴而  
垢但熱不寒柴胡白虎湯不止去石羔加貝母常山枳榔截之久不  
止補中益氣湯濕瘧體重肢節痛胃苓湯不退平胃散加茯苓常山  
枳榔截之久不愈參苓白朮散食瘧飢不飲食嘔逆脹滿腹痛四獸  
飲不止以六君子湯加青皮薑桂瘧痢交作小柴胡湯加當歸白芍  
茯苓白朮或柴芩湯六君子湯補中益氣均可用瘧而衄血或大便  
血絲當於瘧藥加靈脂桃仁爲佐入生薑蜂蜜同煎治之瘧久不愈  
結爲塊痞名曰瘧母可用鱉甲飲子瘧后浮腫五皮飲或用薑桂六

君加砂仁附子。吞下理中丸。八味丸。異攻散擇而用之。愈后或因勞役復作用。補中益氣合小建中湯加鱉甲。或投十全大補湯。久病外邪已散而疾不休。宜人參一兩。生薑一兩。先煎熟。莫待發時服之。愈近因參貴。曰用白朮生薑。夜用當歸生薑各一兩。然用當歸又不若用首烏一兩之爲愈也。大概治法。先用表散。繼用薛氏擬方。后用補中益氣湯加桂附首烏。如陽虛則用薑附六君子。或八味丸。陰虛六味丸。大補元煎。則得矣。

### 証治歌

人身營氣有其舍。恍與行人傳舍同。營氣晝宵身遍至。邪和衛氣日

相逢忽然寒熱寒難過邪與氣病自鬆內經論病詳且憲法分條  
例不相蒙。分言臟腑各經異。大約難逃氣血中。早發氣急平晏血分。  
凌邪曰。乍間邪深。每日發邪淺處暑前發名暑瘧。脈浮而弦若畏風。  
有汗桂枝羌活湯。好麻黃羌活湯。汗無從。麻黃黃芩湯。夜發正如病。  
勇汗有無麻黃桂枝湯。工生地雖加陰分藥。少加活血花名紅。不應。  
四物湯小柴胡湯合。更用升麻陽始烘。繼進常山。枳郎君子四烏梅。  
清熱亦無窮。熱寒多少還須問。治法收分不可謬。多熟桂枝加白虎。  
寒多桂附少柴充。總之虛寢脈中辨。暑熱風寒始有憑。風瘧汗淋桂  
枝白朮湯。美進如不效。小柴逢常山併用烏梅肉。莫畏枳榔降氣雄。

久不愈。今藥必慎。補中益氣治攸隆。因寒無汗脈浮緊。養胃湯投再  
不重。亦有時乎效不奏。醫方平胃散可推宗。枳榔草莫須添入。未止  
薑桂用六君。暑瘧渴煩面垢熱。柴胡白虎病離身。不應平當去石羔  
服。加入常山貝母楨。榔久發不收其痛苦。補中益氣頌神功。濕生瘧  
病身疼痛。平胃須投合胃苓。茯與常楨均可入。參芩白朮散水煎濃  
食。傷病瘧飢難食。嘔逆脹痛飲投四獸效如神。不止六君子湯可進。青皮  
還用桂薑衝。瘧兼痢作柴胡小歸芍。云苓朮取冬。或用柴芩隨証治。  
補中君子六無齒。瘧而便血或成衄。薑蜜靈脂與桃仁。病成瘧母是  
堅痞。飲投驚甲自消融。瘧后腫浮無別藥。五皮飲進詎無功。理中先

和上藥吞下六君薑桂附砂仁八味丸異功散隨擇用古方補法備書中愈后或因勞役反補中益氣合小建中更加鱉甲炙黃芩一服平安莫愁齒或用十全大補進保無延久病瘻癰外邪已散病仍發各用參薑一兩供未發先投莫待病立時人見藥熙雍近因參貴日投丸晚用當歸功亦洪日用白朮生姜夜用當歸生姜但用當歸不如用首烏大概藥宜先表散擬方繼用薛醫翁方出立齋補中益氣後投好桂附首烏功更崇陽虛八味丸六君子六味丸大補元煎用補陰。

脈

脈弦爲瘧不弦則非浮緩有汗爲風瘧浮緊無汗爲寒瘧虛而面垢

有汗爲暑瘧。右閑緩濶。或滑爲濕瘧。

方歌

桂枝羌活湯 治瘧疾發在處暑以前。頭項痛。脈浮有汗惡風。

桂枝羌活湯防風。羌活桂枝甘草同。有汗惡風脈浮者。投斯邪  
散自安寧。

麻黃羌活湯

麻黃羌活湯。甘草羌活防風。麻黃四味好。無汗脈診浮緊來服。  
投此劑自然保。

藥草分湯最工。甘草、桃仁、黃芩、桂枝及麻絃等發夜間須此劑。醫人切莫掉輕心。

### 桂枝白朮湯

桂枝白朮入川芎半夏青皮白芷雲苓。桂枝白朮桔梗薑枣引如病相投可奏功。

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉。

參苓白朮扁豆蓮肉陳皮山藥甘草砂仁薏苡仁桔梗性上浮能保肺。棗湯調服益脾神。

### 胃苓湯

湯名胃苓澤瀉陳皮白朮猪苓與茯苓。蒼朮肉桂并甘草。厚朴同煎服之。寧。

桂附小柴胡湯

湯名桂附小柴胡。肉桂附子人參甘草。薑棗俱。柴胡法夏黃芩并水煎溫服保無虞。

養胃湯 治脾胃虛寒。嘔逆惡心。腹脇脹疼。腸鳴泄瀉。

養胃湯中有白朮茯苓。厚朴。半夏草菓藿香陳甘草附子人參

薑棗引可醫腹脹與腸鳴。

六君子湯 治氣虛有痰。脾虛鼓脹。

六君子。芍性中和。柴胡。人参。草。夏。陳。羅氣虛有痰。  
脾鼓脹。水煎溫服。起沉疴。

柴胡白虎湯 治暑瘧煩渴面垢。但熱不寒。

柴胡白虎。芍性寒石燕知母粳米甘。草加入柴黃芩及半夏。  
此療暑瘧最爲良。

四獸飲 治五臟氣虛。七情兼併。結聚發癰。與衛相搏。發爲瘧疾。亦  
治瘡瘍。

四獸飲中用橘紅。人參。茯苓。草。夏。甘草。冬同生薑。白朮。烏  
梅並大棗。和煎瘧自除。

柴芩湯 治泄瀉發熱口渴。瘧疾熱多寒少。口燥心煩。

柴芩湯是三方成柴 胡牛夏人 参甘草 薑棗黃芩 猪茯苓 白

尤澤 濁桂 古人配合號柴芩。

鼈甲飲 治瘧久不愈。腹中結塊。名曰瘧母。

鼈甲飲中 鼈甲陳皮 黃芪 白朮 菖草 菘白芍 桔梗 厚朴 甘草  
等分 薑棗引烏梅少許水煎服。

五皮飲 治水病腫滿。上氣喘急。或腰以下腫。

五皮飲治水腫宜大腹皮生薑皮五加皮地骨皮 茶皮。或易

陳皮或桑白皮。脾肺氣虛此可醫。

薑桂六君藥最良。人參白朮茯苓甘草陳皮半夏加薑桂。如病配合自安康。

異功散 調理脾胃。

異功散藥卽四君。人參白朮甘草及茯苓。加入陳皮理脾胃。此方錢氏製。何精。

大補元煎 治男婦氣血大壞。精神失守。危劇等証。

大補元煎熟地人參杜仲山藥當歸增茱萸枸杞炙甘草培元救本此方能。

薛氏擬方

薛氏擬方白朮苓

朮柴胡乾葛並陳皮甘草

古人配合咸稱善。

療瘧醫家第一方。陽分午前曰一發半夏

黃芩茯苓任意匡頭

疼熱甚石羔川芎好知母麥冬

石羔治口乾。間作夜來陰分瘧

知母紅花熟地當歸川芎白芍首烏升麻能解補中益氣繼宣

青桂丸 治瘧疾於未發之前二三時。薑湯送下。其效如神。

青桂丸治瘧疾工。青蒿一不肉桂一不

及明雄少許飯碾成丸

湯送下。此方截瘧效如神。

一方大蒜不拘多少。黃丹少許和研極爛。以聚爲度。丸如芡實大。每

一方用硫黃硃砂等分研末水調服之。

一方搗旱蓮草發日清晨男貼左寸口女貼右寸口以銅錢壓之外以帛繫之良久起小泡謂之天灸瘧即止。

一方取大毛一握水洗净焙乾竹紙包裹燒存性研細末酒調服之。

小柴胡湯

補中益氣湯

六味地黃湯

八味丸

均見六經

麻黃桂枝湯

薑附六君子湯

小建中湯

均見太陽

十全大補湯

四君子湯

四物湯

平胃散

均見婦人傷寒

理中丸

見麥粒症

桂枝白虎湯

見溫瘧



一人病溫。自服表藥。與青蒿丸不愈。後寒多熱少。余欲用桂。伊以爲毒。不敢服。延數日一發。但寒竟不轉熱。切其脈沉細而微。初以附子理中湯。附子僅用五錢。次日又發。繼進元方附丸各用一兩。愈。

一人患瘧。寒多熱少。脈沉細。但在關沉弦。進小柴胡加附子一劑。愈。

一人發瘧。大狂妄走狂言。面赤口渴。脈洪弦有力。右關尤甚。初以大柴胡湯一劑。次投青皮飲而安。

人病瘧久延以十全大補湯加烏梅煎好露一宿次早煎熱服之卽愈。

一人病瘧。一曰一作。屢治不效。以白朮生薑各一兩。截之驗。

一人病瘧。以擬方一劑卽效。此方余每用之。或一日或間日及午後夜發。照依加減試屢驗。活人頗多。切勿以簡便之方爲不足。重輕也。