

瘍醫大全目錄

卷二十四

前陰部

龜頭腫痛門主論 附方

陰頭癰門主論 附方

魚口便毒橫痃門主論 附方

陰腫如斗門主方

下疳門主論 附方

初婚玉莖傷損門主論



傷寒瘥後內外瘡門主論

囊癰門主論

附方

腎囊風門主論

附方

腎囊生瘡門主方

主論

濕陰瘡門主論

胞漏瘡門主論

陰囊出汁門主方

疔氣偏墜門主論

附方

陰器部

陰吹門主論

陰瘡門主論 附方

陰蠱門主論 附方

陰菌門主論 附方

陰挺門主論 附方

陰癢門主論

陰戶腫突門主論

陰脫門主論 附方

產婦陰戶傷損門主論 附方

陰戶交接出血門主論

陰戶開張門主論

女子新嫁陰戶痛門主論

陰冷門主論

實女無竅門主方

瘍醫大全卷二十四

燕湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之楮東陽

男 槲燮用和 全校

前陰部

自外腎起至前陰腎囊止一切癰疽疔疔疔疔皆彙於此部中以便檢閱參治

馬醫大全 卷二十四 前陰部 一 顧氏秘書

龜頭腫痛門主論

澄

曰龜頭腫痛有因肝經濕熱下注其腫紅脹宜龍胆瀉肝湯主之外搽介靈丹有因塗搽春藥交接違理其腫滲痛宜用松蘿茶洗外搽玉紅膏有因嫖妓變童沾染穢毒其腫紫黯上有黃衣溺管必痛小便淋瀝否則莖皮收緊包住龜頭卽成袖口疔瘡亦有龜頭之下紅胞如瘤堅硬亦有所患之胞如水光亮卽爲雞嗉疔瘡治之大法以大黃下之撤毒爲主亦有新婚損傷龜頭腫者以濃甘草

湯洗之擦玉紅膏

卷二十四

龜頭腫

顧氏秘書



龜頭腫痛門主方

龜頭腫大硬痛 沈員濟

用雞蛋三個去黃留蛋清將龜頭插入一炷禪香
時拔出再以捫青布燒灰存性碾末一錢加水片
一分搽上過夜其腫即消

龜頭腫痛

蟹蟄二隻炭火炙去皮肉將骨炙酥爲極細末每
一分加冰片一分碾勻細細搽上

又方

鬼饅頭嫩枝即木蓮蓬三四兩煎湯薰洗止痛消腫

又方

蝸牛焙乾火枯生礬各等分

碾細濕則乾摻乾則香油調搽

陰頭癰門主論

玉背堂曰陰頭癰生於陰頭準繩

陰頭癰門主方

驗方

蟹甲為末鷄蛋清調敷



五宗

刺實也曰空餘魚口奇無助毒

魚口

便毒

魚口 橫痃

魚口便毒橫痃門主論

陳實功曰左爲魚口右爲便毒兩腿合縫之上名橫

痃 正宗

鬼遺方云腿胫兩處起爲便毒

王肯堂曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初

發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎爲作強之

官所菽者情與智也男女大慾不能直遂其志故

敗精搏血留聚經隧乃結爲便毒矣蓋腿與小腹

合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心戰

夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念
故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒涼
之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱
散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

準繩

孫曰商賈中野合不潔淫妓便構此證或疔瘡或楊
梅者皆由慾火淫熾一旦交合不潔爲淫火冲動
膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之
藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣與毒邪
下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宣發汗其

次利小便膚腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆
肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便
中出所治皆順也故治之不旬日便可奏功若曾
發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒
活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之
亦不失先後着也

陳寶功曰左爲魚口右爲使毒總由精血交錯生於

兩胯合縫之間結腫是也

魚口生於左腿兩胯合縫之間便毒生於右腿

兩胯合縫之間

生於小腹之下近之陰毛之傍結腫名曰

橫痃又名外疔是也此三症得之於奔走勞役濕熱下注者少得之於人房忍精強固不泄或慾念已萌停而不遂以致精血交錯凝滯結而爲腫淫毒內攻者多然其毒從便而入亦當從便而出治當散滯行瘀通利大小二便初起宜通水丹逐之不應用九龍丹山甲內消散七日已後根本堅固恐其作膿宜用火針法刺之亦妙已出膿者十全大補湯服之庶易收斂遲則恐生別症難愈謹戒

房事

正宗

又曰因奔走勞役而得者卽用四妙湯補而消之甚

驗

馮魯瞻曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間小兒是

肝火肝疔總屬肝經熱毒治宜瀉肝再視血分毒

氣爲之斟酌若大人犯此者多因慾火不能直遂

其志故敗情搏血留聚經隧乃結爲毒治宜散鬱

散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣間有因

交合不潔爲淫火衝動是以受毒所致者治宜先

爲發汗次利小便可也

錢囊

又曰婦人痲痲或肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝脾
其候兩均小腹腫痛或玉門焮腫作痛憎寒壯熱
小便澁滯腹內急痛或小腹痞悶上攻兩脇者肝
經濕熱鬱滯也龍膽瀉肝湯玉門腫脹者肝火血
虛也加味逍遙散若槩投散血攻毒之劑則誤矣
周文采曰便毒初發寒熱交作兩腿合縫之間腫起
疼痛是也夫腎爲作強之官所藏者精與志也男
女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚中途而
結爲便毒矣夫人脚腿與小腹合縫之間乃精血

所出之道路或觸景而動心或夢寐而不泄既不
得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而
成腫結也初起慎不可用寒涼之藥恐氣血愈結
不得宣散反成大患惟當發散寒氣清利熱毒使
精血宣暢則自然愈矣

集驗

申斗垣曰勇疽卽俗名魚口生衝門穴

啟玄

薛立齋曰魚口者言其形如魚口張而不合也潰後

慎勿行動伸縮恐難斂口此症有公有母之分公

者小而形長易治母者大而形圓公則只一箇母

則三四個若母魚口只用艾炷灸初起者則餘者
白消

心法曰橫疔疽在左腿夾縫摺紋中形長如蛤陰疽
在右腿夾縫摺紋中形長如蛤屬三陰經由七情
鬱滯凝結而成漫腫堅硬時疼甚則痛牽羣丸上
及少腹形長如蛤一兩月方能潰破其膿深可知
破後膿稠可愈敗漿最難斂口久必成漏

又曰若膿水淋漓日久有生蟲形類虻蟲亦係膿深
鬱久之所化也屬逆

心法曰便毒又名血疔又名便癰無論男女皆可以
生發於少腹之下腿根之上摺紋縫中屬肝腎二
經由強力房勞忍精不洩或慾念不遂以致精搏
血留聚於中途壅遏而成或因暴怒傷肝氣滯血
凝而發魚口因生於摺紋縫中其瘡口潰大身立
則口必合身曲則口必張形如魚口開合之狀故
名之也

魚口便毒橫痃門主方

九龍丹

魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者

穿山甲炒

沒藥

青木香

血木竭

滴乳香

兒茶

各一錢

共為末用當歸尾三兩紅花二兩酒煎膏丸如
桐子大每服二錢熱酒送下數服自消

魚口

不見水猪腰子一個剖開入雄黃三錢貼患上

山甲內消散

魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者

歸尾

甘草節

大

黃

各三錢

白殭蚕

一錢

穿山甲

炒三片

黑

丑

打碎一錢

土木鱉

去殼三個

酒水全煎搗再煎服大便行三四次喫淡粥補

住避風為妙

魚口便毒初起

生明礬三錢或青礬粗末用生酒吞下欲吐忍

之出汗卽愈一半次日全消

胡桃散

大胡桃一個剖開去肉將全蠹二枚裝入燒存性
研末熱酒調服

綠鳳散

魚口便毒癰癤痰核初起

雞蛋一個入瓦罐煮三四滾取起用銀簪打三四
十孔再入罐內加芫花末一錢全煮一二十滾去
藥食蛋

通水丹

治下部諸瘡魚口便毒橫痃腹癰初起人壯氣

實小便淋瀝者

芫花不拘多少揀淨晒極乾研為極細末磁瓶收貯每用五分將大棗二三枚去核夾藥在內空心嚼下冷茶過口

便毒

白殭蚕炒

當歸

生大黃各三錢

甘草

穿山甲

各一錢五分

研細空心酒調服三四錢

魚口

穿山甲 炙

白殭蚕

左顧牡蠣

煨七次各五分

大黃 一分錢五分

研細酒調服

魚口復毒

芙蓉葉

大黃 金銀花

桔梗

天花粉

陳皮

皂角刺

穿山甲

各等分

研細爲丸如桐子大每服三十九白湯送下

又方

魚膠切碎蛤粉拌炒研細每服五錢空心酒調下
蓋被出汗連服十次外用胡椒一兩研碎燒酒調
敷患處卽消

又方

大蝦蟇一個剝去皮入葱五錢連腸搗爛敷患處
再以皮覆其上半日消散且無留毒之患如毒盛
未消再如法敷一次

又方

肥皂一枚去核鹽一合醋半觔煮如泥搗敷患處

婦人魚口

川貝母 三錢

甘草 一錢

皮酒煎服孕婦忌服

消魚口便毒橫痃奇方

范令聞

九頭獅子草 一錢

貝母 三錢

白水煎服瀉一二次自消重者不過三劑必消

橫痃 長興莫氏

青殼雞蛋 一個

刺蒺藜 一合

好酒全煮蛋熟剝去殼再煎連蛋服立消

立消便毒 陳古公

廣膠 穿山甲 炒

連翹 各二兩

當歸 一兩 荆芥 防風

紅花 各二錢 斑蝥 七個去頭足炒 金銀花 八錢

車前 大黃 各五錢 弱人只用三錢

芫三根好酒二三觔煎好空心服之儘量飲醉

出汗或下卽消

便毒

油核桃

淨肉七

瓜兒血竭

一兩

二味槌勻丸如蛋大以鹽泥固濟火煨烟盡安

泥地上以碗蓋熄去泥研為細末無灰酒調下

儘量飲醉即消

便毒

槐花

一兩

防赤風

穿山甲

灸

連翹

僵蠶

荆芥

各三錢

金銀花

五錢

甘草節

八分

酒水全煎不效加乳香沒藥

俱去油各一錢

立消

魚口

獨子肥皂泥封煨赤去泥將肥皂研細每服二錢酒調服取汗立消

魚口便毒橫痃將成膿者

小粉漿全小活鱖魚搗爛敷上即消

便毒魚口已潰不能長肉收口

狗肉二三觔煨爛取湯洗瘡口淨將狗肉漸漸推

入瘡口內令滿外用絹帛紮定不可行走安息敷

日瘡肉漸生狗肉漸出狗肉出盡瘡口長平

魚口初起三五日

五倍子炒黃研末百草霜和勻醋調敷一日夜全

消

魚口便毒一日至七日未潰紅腫寒熱

黑丑研

白丑研

僵蠶炒去絲

當歸尾

甘草節

金銀花各二錢

土木鱉五個去殼切片

大黃五錢

穿山甲二片

猪牙皂二條

朴硝一錢

漿右作一劑酒水各一碗煎空心服行三四次温

粥補之輕者一服重者兩服消孕婦忌服虛人

當減半

便毒初起 李岳

皂角子二十一粒洗淨空心好酒吞下儘量飲醉

一覺即消

便毒

生大黃 六錢

全一蝎 去頭足 穿山甲 各三錢

白芷 四錢

水煎服外用千年石灰一兩明礬三錢鹽少許
米湯調敷卽消

焦口便毒橫痃初起立消

用雞蛋煮熟劈開去黃將蛋連殼合在腫上以艾
圓如荳大灸三五壯如未全消隔日再灸之

魚口

白魚膠五錢剉銅鍋炒黑色畧帶黃些斫細未用
老酒調成團空心時以匙挑放舌上須多用酒香
下其藥直達患處如瘡大可再製五錢服之卽消

如已潰亦效思與咬入口內使正逾過之

芝西歸如團空心報以錫封效古上彭參用醋

白魚翅五錢性酸除炒黑甘果帶黃些海膠未用

魚翅

圖咬其大灸三疔快咬未全削即日事灸

用鑿畫其線製開去黃雜並乾燒合在蠟上以艾

煎日圖其線必亦效立散

水煎

水煎服以用干平五分一兩開水煎服少

陰腫如斗門主方

男子陰腫如斗其色紅赤不能治者

馬鞭草搗爛敷之或煎洗亦效

陰腫大如斗核痛

白礬 二兩

雄

黃 一兩

甘草 五錢

水煎先薰後洗神效

囊腫必方 錦囊

川椒

麥蘖菜

地膚子

各一兩

葱白頭

連鬚二十一根去十淨不必洗

煎湯淋洗囊上良久次日再洗以消爲度

小兒風熱外腎焮赤腫痛日夜啼哭不數日退皮如

雞卵殼狀

回春

老杉本燒灰入膩粉清油調敷神效

陰癩腫大不消

黃

甘

草

硼砂水胡塗之大有效

小兒坐地多時或風邪或蠱蟻吹呵陰囊腫硬

蟬蛻五錢水一大碗煎洗不過三次腫消痛止更

服五苓散加燈心煎服

又方

葱園中蚯蚓屎研細以甘草湯調敷

小兒外腎赤腫

老杉木煨存性

官

粉各等分

研細清油調搽並治大人繡毬風

腎囊罩丸腫大

棉花子仁一兩煎湯常洗自消

氣卵胞

老絲瓜皮

老生薑皮

未共入鍋內炒沖生白酒熱服得汗即消

深限風

麻茶干寸一兩煎為常服白散

有姜澤戎蠶大

一兩麻散出臨將並茶大人麻狂風

赤沐木

狀如

宮

小良收習衣風

熱園中地地氣兩味以甘

入式

受小如林聖蹟... 疾黃微類... 謝... 疾... 疾...

疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾...

疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾...

疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾...

疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾...

疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾...

疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾...

疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾...

疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾... 疾...



下疳門主論

王肯堂曰下疳瘡生竅口

準繩

又曰小腹至陰之下玉莖之根癢極沸湯沃之稍止而復作有三四竅黃水淋漓若幼時曾患惡瘡後來亦有此症作結毒治之

陳實功曰下疳者乃淫慾邪火鬱滯而成其求有三一由男子慾念萌動陽物興舉淫火猖狂而未經發泄以致敗精濁血流滯中途結而爲腫初起先必小便淋瀝溺痛次流黃濁敗精陽物漸漸破損

甚則腫痛腐爛治當踈利肝腎邪火爲主用清肝
導滯湯主之一由婦人陰器瘀精濁氣未淨接與
交媾以致淫水毒精傳襲而成初起必先皮腫光
亮甚如水晶皮破流水腫痛日生麻癢時發治當
解毒消風爲主如龍膽瀉肝湯合平胃散主之一
又由房術熱藥塗抹玉莖洗搽陰器興助陽火煽動
陰精僥倖不衰久戰不泄多致精阻火鬱未發而
成皆由蘊毒所致初起陽物癢痛堅硬紫脹疙瘩
漸生腐爛漸作膿水淋漓不時興舉治當瀉火解

毒為主如黃連解毒湯蘆薈丸主之

正宗

蔣示吉曰又有先發時瘡候用薰條擦藥收斂結毒

於此者最重必成蠟燭卸矣

說約

又曰如肝經濕熱下注者不過澁淋黃濁莖中作痛

不紅不腫者輕

又曰濕熱下注者輕淫火毒發者重

又曰下疳又名鬪精瘡潰爛日甚者名蠟燭卸

又曰若小便淋瀝漸爛漸開色紫無膿疼如針刺者

難治

馮魯瞻曰下疳者王莖生瘡甚至蝕透而久不愈宜
內服燥濕解毒外用薰摻可也多係肝經濕熱故
尤宜清肝除濕

錦囊

李東垣曰妬精瘡因壯年精氣盈滿久曠房室陰上
生瘡赤腫作害妨悶癢痛者是也

精義

申斗垣曰龜頭及頸上有瘡腫焮於內而外則皮暴
不見其瘡如袖口之包手故名曰袖口疳最爲難
治何也蓋藥不能擦至疳上治法用眼藥加冰片
膏子入雞蛋殼內套龜頭上浸之內服清肝腎濕

執藥 啟玄

又曰玉莖有瘡癢而痛赤窠窠中有水此乃交妬不
洗肝經濕熱所致肝性主臊故瘡亦臊名曰臊瘡
宜用兒茶敷之

又曰妬精瘡用地骨皮泔水洗過取室女首經布燒
灰之立效

卿曰玉莖內生瘡名內蛀稗玉莖外生瘡名外
桿

公弼曰妬精瘡乃陰頭潰爛成膿或癢或痛蓋緣

後生未娶精氣溢盛陽物興起當泄不泄強泄脹裂龜頭嫩皮日久潰爛腐肉成膿間有害其生命者治之當戒房事外以黃柏皮散煎洗拭乾再摻訶子灰散或銀粉神丹

青囊

陳遠公曰龜頭生疔瘡服敗毒藥毒盡從二便而出倘大腸燥結則敗毒藥不能走大腸勢必趨小便而出小便口細毒難盡泄於是毒不留於腸中而單結於外勢毒盛必發安得不腐爛哉往往連龜身爛盡人多以藥外敷雖外藥亦不可少然不先

消火毒遽用外過不啻如石之壓草也故必先內
治之用散毒神丹茯苓一兩黃栢生甘草黑梔仁
各三錢肉桂一錢水煎服四劑火毒盛盡從小便
而出疼亦少止後用生勢丹敷之炒黃栢三兩兒
茶生甘草各一兩大黃三錢丹砂勿見火乳香沒藥
各一錢水片麝香各三分爲末摻之疼卽止數日
膿血乾筋肉再長一月全愈但不能長龜頭也愈
後服十全大補湯一二月則外勢仍能伸縮尙可
種子若多服敗毒泄火之劑無論命門寒冷而外

勢亦且水冷安得陽和之驟復哉此治法之次序

也 冰鑑

心法曰下疳統名疳瘡又名妬精瘡生於前陰經云

前陰者宗筋之所主督經脈絡循陰器合篡間又

云腎開竅於二陰是瘡生於此屬肝督腎三經也

其名異而形殊 生於馬口者名下疳 生玉莖

上者名蛙疳 莖上生瘡外皮腫脹包裹者名袖

口疳 龜頭外腫如瘤者名雞嗉疳 疳久而偏

潰者名蠟燭疳 痛引辜丸陰囊腫墜者名鷄腕

瘡 痛而多癢潰而不深形如剝皮爛杏者名瘡
瘡 生馬口傍有孔如棕眼眼內作癢捻之有微
膿出者名錠根瘡 生楊梅瘡時或候用薰擦等
藥以致腐爛如白者名楊梅瘡 又生楊梅時服
輕粉水銀打成劫藥以致便溺尿管內刺痛者名
楊梅內瘡

澄

曰凡治下瘡第一戒患者喫鹹若肯飲食喫淡一
月收功只消半月

下疳門主方

九味蘆薈丸

當歸

胡黃連

川芎

燕黃

白芍

各一兩

龍膽草

酒浸炒
焦七錢

真蘆薈

五錢

廣木香

甘草

各三錢

右為末米粥搗丸麻子大每服一錢或一錢五分白湯送下若虛者佐以加味歸脾湯加味消

遙散治之

珍珠散

下疳皮損腐爛痛極難忍及諸瘡新肉已滿不能生皮又治新婚玉莖損傷新娶陰戶傷痛搽之極效並治湯潑火傷皮損肉爛疼痛不止

新白珍珠

一錢入豆腐內煮數滾研極細以研至無聲爲度

上好花青

卽青黛五分

真輕粉 一兩

三味共研干轉細如飛麩磁瓶收貯初起搽之卽愈若腐爛疼痛甘草湯洗淨猪春髓調搽又治婦人陰蝕瘡極效湯潑火傷痛者以玉紅膏

調搽

滑石

沒

藥

去油

龍

骨

各等分

右研極細乘瘡膿汁未乾搽之不可見水自結

痂矣

又方

張化儉

紅棗去核將銅絲整塊者包在棗內放炭火上煨

存性研極細末加大尼冰片再研磁瓶密貯先將

瘡上用陳松蘿茶洗淨軟絹拭乾將藥搽上雖

頭爛半者無不奇效

又方

又螳螂子 火煨

白殭蚕 火煨

兒茶

輕粉 各等分

研極細用甘草湯洗爭搽之

又方

玉莖疳瘡或漸至蝕透有爛去一半服此而愈

扁蓄 四兩

黃連 二兩

甘草 一兩

水煎內服外洗

又方

甘蔗頭 煨灰一兒

茶 三分

冰片 一分

疔瘡簡便方

用戴舊油透羅緞帽沿燒灰杭粉瓦上煨黃色各等分共研極細磁瓶收貯先用紅棗十五個甘草三錢煎湯溫洗患上挹乾搽之

又方

蟾蛛窩拭淨貼之

又方 安慶僧授

白螺螄

要叮在岸上的四十九枚陰陽瓦煨枯如叮在水底者無用

研細生酒調服蓋被取汗外用大田螺二個將

厲挑開入冰片三分伺螺化水雞翎攪上如未
痊可如法再製服

又方

蠟殼煨研加冰片少許搽之

又方

鉛粉一錢冰土片一分

研細外以銀花蘄艾花椒煎湯洗淨乾搽

又方

血竭

皂茶

乳香去油

龍研骨細末摻沒

藥去油各二分

研細摻之

又方

旱田螺煨灰

麝香

輕粉

冰片各等分

研細香油調搽

又方

燈草灰入輕粉麝香少許乾摻

又方

防風煎湯洗

下疳妬精瘡

七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之

金螺散

大田螺數枚水養吐盡泥沙俟靨開入研細冰片
末伺螺化水以鉛粉填滿仍用靨合上放新瓦上
煨令紅赤去殼研細又填入第二螺內又煨如此
三次研細密貯任用

二靈丹

下疳初起流膿

兒茶 一錢
冰片 二分

研勻將瘡先用冷茶或甘草湯洗淨挹乾以雞

翎將藥掃上

龜頭爛半

竹蚌 虫糞 銀粉

臘肉 骨髓 松香 各等分

研細和勻用燒酒將瘡洗淨搽之內單服土茯苓

苓湯當茶

七寶攢榔散

玉莖疔瘡或漸至蝕透久不愈者

擯榔 密陀僧 牛黃 輕粉

黃連 黃栢 朴 稍各等分

研末先將葱白漿水洗淨軟帛拭乾如瘡濕乾

摻瘡乾油調搽

聖粉散

下蛙疔瘡蝕臭腐爛痛不可忍

密陀僧 黃丹 黃栢蜜炙

孩兒茶 孔香各三錢 輕粉一錢五分

研極細用葱湯洗瘡濕則乾搽乾則香油調搽
兼治小兒疳瘡

玉莖生疳爛去大半

吧嗒杏二錢研細紙包壓去油取淨白霜一錢加
水片三分再乳絕細聽用 先以甘草煎湯洗淨

挹乾摻上

疔瘡不可忍 賈氏

黑羊角 煨

穿山甲 煨各二錢

乳香 去油

沒藥 去油各一錢

研細酒調服

下疳大爛

黃

蠟

八錢

白

蠟

面

粉

各一兩

冰

片

一錢

麻

油

三兩

先將油與二蠟熬化隨下面粉次下冰片和勻
作隔紙膏貼之五日後痛止肉即生矣

銀粉散

胡公彌

治下疳母論新久腐爛作痛及楊梅瘡薰後結

毒玉莖腐爛或陽物爛半者

好錫六錢化開入硃砂末二錢攪炒砂枯去硃砂
留錫再化開入水銀一兩和勻傾出聽用又將杭
粉一兩鋪夾紙上捲成一條以一頭點火燃至紙
盡吹去紙灰單用粉同前錫末加輕粉一兩共研
極細末收貯凡遇前症先用甘草煎湯淋洗拭乾
以此藥摻上卽能止痛生肌收斂

妬精瘡玉莖爛一二寸者兼用柯子灰散神方

周鶴
能

黃栢荆芥甘草馬鞭草葱全煎洗去膿靨

柯子灰散

黃栢炒存性 何子灰各二錢 麝香少許

共研極細摻患處令睡醒服冷水兩三口勿

令陽道興起脹斷瘡靨二十即愈一方無黃栢

銀粉神丹曹振

專治玉長如初止少元頭者或舌頭

被人上此丹亦能長全大有神功

黑鉛錢 寒水石三錢五 輕粉二錢五

水銀二錢五 硼砂 珍珠各一錢

先將黑鉛化開投水銀研不見星共為細末收

貯遇前症先用葱艾花椒煎湯洗淨若怕洗畏
痛須先薰止了痛再洗拭乾上藥若舌頭咬去
先用乳香沒藥煎水口噙之止痛後上藥自然
生長全愈

兒茶散

下疳蛙桿

銅綠不拘多少煨紅放地上冷定又煨又冷定乳
細加兒茶等分和勻將下疳洗淨搽之

下疳久不愈

海藏

豫斗子二枚合盛黃丹令滿以亂髮厚纏定燒烟
盡爲度同研細末先以葱白熱漿水洗瘡膿淨再
上藥甚者不過三次如神

陰頭生瘡

孫真人

蜜煎甘草末頻頻塗之

竹節霜

百效

龜頭因熱毒馬口結蕊或龜衣擦損

取新竹節上霜刮下一攤卽愈

下疳蝕爛

白菓樹葉包裹

下疳抄木

蘆甘石

乳麝香

血二竭

川黃連

各二錢

輕茶粉

五分

冰片

一分

研末米泔水洗淨搽上立效

又方

蝸牛

焙乾

枯白礬

各一錢

研末濕則乾搽乾則以香油調塗

疔瘡疔

靈秘丹藥

二蚕繭出過蛾者輕粉二錢 枯礬五分

紅絹方圓三寸兒茶一錢 五倍子一個

研末酸漿水葱白川椒煎湯洗淨搽奇效無比

疔瘡疔程

銀硃水飛見茶各一錢 輕粉五分

黃柏灰 老茶葉各二分

研末用黃蠟二錢熔化為丸作二十粒每服

丸好酒空心送下神效無敵

下疳陰瘡邵真人

蘆甘石一兩火煨醋淬五次加皂茶三錢研末

油調敷

蠟燭卸

周鶴仙

紅杷子燒灰每一錢加梅花水片五厘麻油調搽

下疳

圓厚五倍子一個去頂以砂仁三顆搗碎入於內
仍以頂合好用濕紙包裹火內煨極黑取出爲末
摻患處卽愈

又方

五倍子燒灰存性一錢真冰片少許

研極細摻上立效

疔瘡周小庵

鳳凰衣焙

橄欖仁去油

人參各五分

皂莢煨紅存性二錢

珍珠一分

金箔十張

共乳細末摻上立刻定痛生肌 此方加南北

鉛製白霜一錢紅升丹三分乳勻摻上更妙

疔瘡舌爛鼻爛龜頭爛

黑鉛一兩裝入黑拘腦內以鹽泥封固八

每用法製鉛末一錢五分加

乳香去油

沒藥去油

鉛霜各三分

硼砂二分五厘

雄黃一分

金箔十張

寒水石生用四分

輕粉二分

共乳細末磁瓶密貯 舌斷者用米泔水菘菜

煎湯溫漱拭乾上藥待長時洗去藥又漸漸搽

之一龜頭爛者以菘湯薰洗過搽藥

疔瘡常立庚

龍膽草

山梔生用

當歸尾

木通

黃芩

柴胡

澤瀉

生甘草

白水煎

痛加紅腫加

荆芥川連

防風大黃

白芷稍

蛙痔爛去半段者

先用苦茶洗淨用黃連末搽三四日待腐肉去盡

取雄犬陽莖連肉火上炙黃煨乾存性為末每用

少許加八黃連末內摻之犬莖末只可逐日漸加

不可驟用太多則收口速而反裂破矣至多亦不

過與黃連末等分為率

下疳

輕粉

黃

栢錢

共研細末先用麥門冬煎湯澆洗摻之

下疳紅腫熱痛

鯉魚膽汁敷

人荳甘草湯

黑荳 一合

生甘草 一兩

赤皮葱 三根

槐條 六十寸

煎洗一切疳瘡

一子消毒散

肥皂子

杏仁

炒

蟬蛻

僵蠶

皂角子

各七枚

土茯苓

八兩

猪牙皂 一條

荆芥

防風

牛藤 各一錢

金銀花 三錢

猪板油 二兩

水八碗煎三碗早午晚分三次服如結毒服二

十一日全愈

袖口疔

加黃

栢 一錢

肥皂子 加倍

楊梅瘡

加菜

豆

側相葉

糯米各三錢

皂角刺各二錢

丙瘡 加海金砂 白 丑 五加皮 五分 錢

鳳衣散

抱鷄卵淨殼 煨 黃丹各二錢 冰片二分

輕粉四分

研極細乾摻或鴨蛋清調搽

耳螺散

冰片 麝香各三分 日田螺殼煨三錢

輕粉一錢

研極細香油調搽

白玉膏

貼疔瘡一切瘡

白芷

蘆甘石煨

甘松

當歸尾

乳香去油

五靈脂

三柰

北細辛

樟冰各五錢

沒藥去油

象皮

白蠟各三錢

松香

冰片

麝香各一錢

鉛粉十三兩

先將麻油二筋熬至烟起離火入白蠟松香又

熬不住手攪看有大泡便將鉛粉陸續下但滾
卽取起稍停又入火如此數次見有菊花紋小
泡便入前諸藥末仍取起滴水成珠入冰麝攪
勻待凝定傾水兩三盞入罐收貯聽攤貼

鳳凰散

治男女下疳腫爛疼痛難惡並一切皮破腫爛
諸瘡卽時消腫定痛拔毒生肌

抱雞蛋殼

連衣殼焙

乳細末每一錢加冰片二分密貯用時或乾摻

或猪膽汁或麻油調搽

黑香散

治男女下疳癢不可當者並一切極癢諸瘡

橄欖核

燒灰
存性

研極細末每一錢加水片二分密貯或乾搽或

麻油猪膽汁俱可調搽

蠟燭卸疳

抱過鷄蛋殼

焙存性

黃連

輕粉

各等分乳細香油調搽立時止痛結癩

下疳

陳拾灰

橄欖核 煨灰

兒茶

輕

粉各三錢

水片一錢

研極細末搽上用鷄蛋軟皮

黃連湯煮過

貼之

初婚玉莖傷損門主論

陳實功口凡初婚玉莖擠夾傷損出血痛疼者先以

葱湯洗淨隨用珍珠散加水片搽之腐皮漸乾痛

自漸止 正宗

傷寒瘥後內外瘡門主論

馮魯瞻曰傷寒瘥後若小便澁有血者亦是餘熱毒也名曰內外瘡亦皆有膿若不出膿者死宜用黃連解毒湯加生地當歸尾連翹木通滑石牛膝扁蓄琥珀甘草稍之類

錦囊

囊癰門主論

王肯堂曰囊癰乃足厥陰肝經所主乃濕熱流入肝經而成治當清肝家濕熱佐以養陰固腎

又曰腎陰毒卽陰囊疽乃坐臥濕地久着汗濕衣衾寒濕下攻陰注經絡久而不散遂生此症初起陰囊紅腫疼痛者是也

朱丹溪曰囊癰卽外腎癰也此癰生陰囊之上其症最酷陰道多虧濕熱相聚致生此毒若不速治則囊裂翠丸外懸可用青荷葉包之或紫蘇葉洗去

癩醫大全
包之或單油紙煮過包之

陳遠公曰有陰囊左右生癰者名曰便毒生於囊之下
下糞門之前名曰囊癰三處相較便毒易治囊癰
最難治以囊之下爲懸癰其皮肉與他處不同在
他處皮肉或橫生直生俱易合口而囊下橫中有
直直中有橫不易收功此皆少年貪於酒色忍精
而戰耐飢而交或苟合有毒之婦或鬪精有瘡之
妓所謂欲洩不洩化爲膿血是也治必大補其虛
佐以化毒之味以毒因虛而成不治虛得乎逐邪

至神丹 金銀花 四兩 蒲公英 二兩 人參 一兩 當歸

二兩 生甘草 一兩 大黃 五錢 天花粉 二錢 水煎二

服全愈潰者三劑收功此方用金銀花公英佐以

參歸人黃之大料未免霸氣然大虛之症又用大

黃祛逐似乎不宜誰知毒盛乘初起之時正氣未

甚衰大補瀉火之為得乎倘因循不敢治及至流

膿出血正氣蕭索始用參芪補氣徃徃用至數斤

尙未能復元何若早用于化毒之中正又無揚毒

又易散此因勢利導之法不可不知也 冰鑑

易醫大全 卷二十四 囊癰 顧氏秘書

又曰有飲火酒入房精不得泄至半夜寒熱煩渴小便淋赤痰涎湧盛次日囊腫焮痛又次日囊處盡腐玉莖下貼囊者亦腐人以為酒毒也誰知肝火得酒毒濕而肆虛乎夫酒何至作腐蓋火酒大熱之物也人過飲火酒多致醉死死後身體腐爛以火酒乃氣酒遇熱自焚人身五臟六腑原自有火以火引火安得不炎燒耶飲火酒入房鼓動精房之火宜是命門之火非肝火也然木能生火肝木生相火理之常也入房借火酒之力火勢必猛火

動無根後能久乎必精泄而火解矣無奈精欲泄而阻抑之火無泄路又無可依火酒又無可解於是火入于肝將依母自歸也惟是相火內火也可附肝以爲家而酒火外火也反得木而焚體囊與玉莖乃筋之火也筋屬肝因人房而聚陰器之際故夾發而囊腫囊腫極而莖亦腐矣治法解酒之毒益以補氣血之品則濕熱解而腐肉長矣用救

腐湯人參 一兩
當歸 二兩
黃芪 二兩
白朮 一兩
茯苓

苓 五錢
黃栢 三錢
炒梔子 三錢
苡仁 五錢
澤瀉 三

錢白芍 一兩 葛根 三錢 水煎服 四劑腐肉去而新

肉生又四劑囊莖悉平復矣酒毒成於拂抑平肝
泄火利濕解毒宜也何以用參芪歸木大補氣血
耶大凡氣血盛者力能勝酒縱醪飲無碍服火酒
而腐必成于火酒之毒亦其氣血之衰力難勝酒
所以兩火相合遂至焚身外腐苟不急補氣血則
酒毒難消腐肉又何以速長哉

陳實功曰夫囊癰者乃陰虛濕熱流注於囊結而爲
腫至潰後羸九懸掛者猶不傷人以其毒從外發

治當補陰清利濕熱取效者十有八九近時人誤
用疝家熱藥多致熱甚爲膿必難收斂初宜龍膽
瀉肝湯稍久滋陰外敷金黃散如腫痛日久內膿
已成脹痛者卽針之內服十全大補湯加山萸肉
丹皮澤瀉治之間以六味地黃丸服之自安

正宗

馮魯瞻曰書曰癰疽人囊者死是屬肝經濕熱初起
腫痛小便赤澀治宜清利解毒爲主若膿已成而
小便不利者是毒氣未散也當針泄之若膿旣出
而反痛者是氣血虛也當補益之倘元氣未虧而

陰囊悉潰羸丸懸露者亦不爲害

錦囊

又曰若小兒患此而由乳母多怒者宜子母並服清

肝之藥

又曰陰囊潰爛羸丸脫露名曰脫囊用紫蘇葉莖爲

細末如濕乾敷如未破用香油調塗將青荷葉包

上內服苓連目草木通當歸之類多得保全患者

勿懼

竇漢卿曰囊癰倘膿熟開刀須待膿熟用油頭繩紮

住腎子以小刀開海底穴其膿血卽流盡矣

李東垣曰經謂癰人囊者死用以爲屬腎耶予治數人悉以濕熱入肝經施治而以補陰藥佐之雖膿潰皮脫羸丸懸外亦不致死但未知下虛人老者何如耳

精要

汪省之曰囊癰乃濕熱下注濁氣順下流人膀胱陰道有虧濕熱不利有作膿者故滋陰除濕之藥斷不可缺膿盡則自安耳

理例

胡公弼曰又有因腹腫脹漸流入囊腫甚而囊自裂開羸丸懸掛在外水出不止用杉木炭末敷上外

以紫蘇葉厚厚包裹令患人仰臥養息內以龍膽

瀉肝湯加滋陰藥服之自愈

青囊

不可見飄盪風自安其

世傳

故不識其法不保其效

致皆之曰藜蘆以鳥糞示其動辰則不為人親也

附錄

藜蘆軍武綴必亦不廷孫卧未映下証人考考

人悉以屬此入和強賦而以此蘇製藥之類

本頁只日錄前所人藥性要因以此製藥之類

囊癰門主方

驗方

新都醫案

瓜 萆

甘草節

金銀花

各五錢

連 翹

柴 胡

青 皮

各二錢

水煎服

囊癰潰後

蚌 殼

煨

黃 連

青 黛

各等分

研細搽之

囊癰囊漏皮硬厚而出水者皆能治

蒼木

吳茱萸炒

川芎

當歸身

各一錢

白木

天花粉

官桂

木

通

各八分

青木香

一錢五分

生黃芪

二錢

龍膽草

五分

蛇盤菓

二錢如無以草代之

右剉一劑白酒一碗煎空心服

囊癰渾身發熱口苦咽乾囊上紅腫疼痛是也

杜仲

鹽水拌炒斷絲磨為細末用篩揉去絲淨末一兩

生酒一觔煎半觔服之取汗即消腫定痛如未

愈再用一服即愈如外敷用明雄黃一兩

草霜 一錢 研勻蜜水調敷如乾以鷄翎蘸水潤

之愈後再用除根藥 用生南星蘇木紫蘇葉

各五錢 陳香櫟 一個 共為細末取未曾下水的犍

猪尿胞一個以酒煮爛搗化全藥末搗勻做餅

晒乾烘脆再磨為細末蒸餅打糊為丸空心燒

鹽湯送下八九十九服此一料永遠除根不發

囊癰

海螵蛸

蛤粉

兒茶

各等分

研極細摻之

又方

乾荷葉 焙

紫蘇葉 各等分焙

研極細酒調厚敷赤肉上外用油紙包紫

蘇葉末入於中其頭地一煉取殼剝下

蘇葉末入於中其頭地一煉取殼剝下

蘇葉末入於中其頭地一煉取殼剝下

蘇葉末入於中其頭地一煉取殼剝下

蘇葉末入於中其頭地一煉取殼剝下

蘇葉末入於中其頭地一煉取殼剝下

腎囊風門主方

王肯堂曰腎臟風即腎囊風瘡生隱處瘙癢成瘡挾
有耳鳴目癢鼻赤齒浮指里縫白等臨足也

準編

戴院使曰癩風俗名腎臟風瘡因精水調外為風濕

所襲從陰囊濕汗作癢臟流注四肢手子白色悉

生瘡瘍

蛇床子吳茱萸或甘草節煎洗外用莧菜
根莖栗燒存性乾摻並治陰汗生瘡

陳實功曰腎囊風乃肝經風濕而成其患作癢喜浴

熱湯其形腎囊疙瘡頑麻破流脂水者是

正宗

蘇散其多皆 藥家容煎 和蘇 和蘇 和蘇

刺實散曰 膏藥 風凡 風凡 風凡

心骨 風骨 風骨 風骨 風骨 風骨 風骨 風骨 風骨 風骨

耳耳 耳耳 耳耳 耳耳 耳耳 耳耳 耳耳 耳耳 耳耳 耳耳

音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音

音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音

腎囊風門主方

繡毬風

老杉木一段燒存性研細用熟雞蛋黃炒枯取油

調搽

又方

若參

蛇床子 各二兩
吳茱萸 一兩

水四碗煎一半放溫洗之帶濕撲上後藥寒
水石硫黃各等分研細摻上絹帛包緊

又方

豆殼煎水洗

又方

磨古鏡水搽

又方

落蘇葉煎湯洗並燒灰搽

又方

韭菜煎水洗

又方

苦

參

二兩

白蒺藜

五錢

甘

草

四錢

楊柳葉煎湯乘熱燻洗後用蛭蚓屎焙燥研搽三

四次愈

陰毬開花 單方

狗橘子七個煎湯入罐內將陰毬掛罐口離湯一

二寸俟薰待溫傾盆內洗如此三日全愈

腎囊癢

荷葉

吳茱萸

蒼

朮

各一兩

木煎滾臨洗加皮硝一兩洗之

繡毬風

五倍子一個錐一眼入銀硃一錢刪陰陽瓦焙研

細末蘇油調搽

洗方

歲靈仙

蛇床子

土大黃

苦參

各五錢

砂仁殼

三錢

老菱頭

七個

煎湯薰洗

腎囊風

山萸肉田核子煎湯溫洗

蛇床子

艾葉

吳茱萸 各一兩

水煎百沸放盆內加芒硝五錢化盡頻洗

又方

柴蘇

明礬

菖蒲

臭樹花

萍

花椒

共煎湯薰洗數次除根

又方

乾荷葉不拘多少煎湯薰洗二三次

又方

又絲瓜子仁酒煎臨臥服之出汗即愈

又方 姚伯玉

又繡毬花煎洗

又方 艾草煎洗

牆頭上醬板豆草或鮮或陰乾煎洗

囊風癢痛黃水不乾者

又蚯蚓泥 鉛粉

井木調敷

囊風癢不可忍

腎囊生瘡門主方

卵袋生瘡抓之流水

陳紫蘇

大紅椒

煎湯薰洗三次

外腎生瘡

蚯蚓尿

二兩

菜豆粉

一兩

水研塗乾又敷

李東

濕陰瘡門主論

李東垣曰濕陰瘡由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之

瘙癢成瘡浸淫汗出狀如疥癬者是也

精義

胞漏瘡門主論

申斗垣曰肝經濕熱外胞囊上起窠子作癢甚則滴

水濕透中衣名曰胞漏瘡

啟立

又曰又有梅毒結於此以致腎囊破裂漏水腥鼻

久治不痊宜土茯苓湯加人參等補藥治之

疝氣偏墜門主論

夫疝者是陰氣積於內復爲寒氣所襲而發故素問
以下論疝皆以爲寒然不可單論曰寒蓋雖爲寒
鬱而作亦由醉飽無度內蒸濕熱痰積流於厥陰
木性急速又爲寒束是以痛甚症雖見於腎病實
本乎肝厥陰肝脈絡於陰器耳可見內積濕熱鬱
寒於中外被寒邪鬱束於外且有痰飲食積死血鬱
結爲病故謂專主肝經而與腎絕無相干也其候
翠丸牽引少腹或無形無聲或有形如爪有聲如

癩 醫 方 全
蛙激搏而痛無有定處不堪忍也其症有七寒水

癩血氣狐筋是也

馮氏錦囊

寒疝者厥陰經中受寒故筋攣卵縮其狀囊冷結便
如石陰莖不舉或控辜丸而痛此必得之於久坐

濕地寒氣鬱於外也

水疝者囊腫痛而狀如水晶陰汗時出癢癢而出黃
水小腹按之而作水聲此必得之於醉酒房勞汗
出遇風濕熱乘虛流結囊中二便脹秘不通也

癩疝者陰囊腫大如斗升不癢不痛此因感受濕氣

是以陰核氣結亦有癆痛者寒熱大而無脈也
血疝者狀如黃瓜在於小腹兩傍橫骨兩端俗名便
癰此乃得之重感春夏大燠勞動使內氣血流溢
慘人脬囊結成癰腫也

氣疝者上連腎區下及陰囊是或號哭忿怒氣鬱急
迫而脹痛此必因父精怯陰痿強力入房成胎乃
胎病也

狐疝者其狀如瓦臥則入腹行則乃出腹入囊似狐
之晝出穴而溺夜入穴而不溺故名狐疝也蓋環

陰器上抵少腹者乃肝經之部分是受疝之處也
一切疝氣非肝木受邪卽肝木自病此乃肝經自
病也

筋疝者陰莖腫脹或潰膿而痛裡急筋縮或莖中痛
痛極作癢或陰不收白物如精而隨溺出此得於
房勞或邪術所致也

更有木腎者蓋心火下行腎水自溫真陽下降腎氣
日和既溫且和焉有木强者哉此因嗜慾內戕腎
虛以致陰陽水火不接乃沉寒脹大而痛硬也

畢九所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也故患左九者痛多腫少患右九者痛少腫多也

又有身體發熱耳後忽生痒腮紅腫脹痛腮腫將退而畢九忽脹一九極大一九極小似乎偏墜而實非葢耳旁乃小陽膽經之分與肝經相爲表裏少陽感受風熱而遺發於肝經也

婦人小腹傍逼近陰處併結脹痛或皮裏頂起如鵝子大乃寒氣聚於厥陰所致小腹受寒其病卽發

是謂陰疝女子血涸不月足蹇咽乾癯秘小腹有塊前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不名疝而名瘕而數發然其致也

古方以烏頭梔子等分加鹽酒煎服之名梔附湯其效亦速後因此方隨症加減無有不應須分濕熱多少而治之丹溪曰烏頭治外束之寒梔子治內鬱之熱則內熱外寒之理昭然矣况二物皆下集之藥梔子爲烏頭所引則勢下急速不容少緩於胃中矣若按之痛止者尤屬虛寒須加肉桂以薑

汁九服若速欲定痛用枳核山查核荔枝核川練
子吳茱萸各炒爲末白湯調服

小兒偏墜多因食積不消脾濕下行流入肝部

又有陰莖全縮不見而陰囊光腫不痛此因肝氣虛
損不能舒達也宜溫補之

陳實功曰水疝腎囊皮色光亮無熱無紅腫痛有時
內有聚水宜用針從便處引出水氣自安如腫痛
日久內膿已成脹痛者可卽針之內服十全大補

湯加山萸肉丹皮澤瀉正宗

林慕我曰或問氣以疝稱其義何居答曰積土成山積氣成疝疝者山也其氣日積月累聚而不散而成疝猶之積土成山自小至大由卑至高之義但氣本無形因虛而凝聚不散隨其所聚之處為痛故五臟遂皆有痛蓋即五臟之元氣失其溫養生發之性營運轉輸之常虛則滯寒則凝自無而有自微而著自閉塞以至於不通而痛矣

活人書

又曰或問既由無形之氣積久成疝為痛自應痛無已時緣何亦有不痛之日以為散而不痛則能散

似無成疝之法以爲不散則疝從何歸可以不痛
或有時止時發甚至終身不愈者亦由此氣時聚
時散之所致耶抑此氣暫時隱伏耶答曰若氣能
散能聚何由成疝惟其積而不散遂成爲痛爲硬
之勢但元氣之虛有輕重不同爲病亦有新久深
淺之異大約痛之緩急止發亦存乎其人之氣血
虛實而五臟有病有不病也

又曰或問今之所爲疝者必責之寒濕之氣但寒本
足太陽膀胱寒木受病濕乃足太陰脾經濕土用

事緣何又言足厥陰肝家之病既曰肝病則當責
 之濕熱復與寒濕無干矣寧無說乎答曰五臟有
 疝出於內經何得獨繫之肝况寒濕二氣鬱久皆
 能化熱大凡五行六氣傳變自有不同學者當擴
 克其義焉

又曰或問男子固有辜丸大小及小腸膀胱崑崙諸
 氣為疝者矣據云五臟皆疝則婦人亦當病疝疝
 將何法以驗之而愈之耶答曰男婦一體五臟俱
 各有疝外腎雖無而少陰厥陰之絡脉畢具治法

必依五臟男婦豈有別乎但碍於俗不敢直言耳
又曰或問疝爲積氣所成五臟槩有積氣所成爲病
何獨此積又以疝稱也哉答曰聚而不散之爲積
積久而成高大之形爲疝前後似是而實非蓋五
積由乎本經之氣各因七情六鬱而成積而此症
不獨本經因虛自病且有感觸傳變之不同卽如
肺與肝腎無有不從內外感觸而發虛實傳變而
盛者也若正言疝已具七種之名已見醫統準
指掌諸書可以不贅今以五臟之疝詳列於後以

詔後學 肺疝者或爲風寒深入肺俞冷飲寒氣
直達肺竅本經元氣素虧復爲寒邪所襲初由聚
而不散漸至積而成疝蓋肺症有三一曰肺痺痺
者閉也閉而不通似喘非喘咽嗑不利者痺也非
疝也二曰息賁乃肺氣膈滿不能下降日久月深
胸中似有物碍氣道不利語言因之塞者息賁
也非疝也三曰肺疝疝則較前二症不同鼻息粗
暴呼吸短促胸膈與雲門中府之間梗塞爲痛者
疝也其名有三爲病亦不相遠惟氣口脉弦急有

力者當以疝治 心疝者心氣久鬱不舒積而成
疝正氣日衰結聚日盛稍有感觸窘迫而痛如割
如痛則四肢厥冷汗出如浴左寸關沉而弦急
者虛寒之疝也弦濇而數心煩嘈雜而痛者陰虛
內熱而氣鬱復兼火化也 脾疝者其濁氣自下
逆上連噎不寬脹滿作痛痛則嘔吐清水或苦水
痰涎之類其脉兩關弦急者爲實沉滑者爲虛
肝疝者陰囊亦腫堅硬而痛痛連兩脇小腹之間
以厥陰之絡絡於陰器也右關尺弦急而數兼有

寒熱外症此濕熱之氣無由疎泄傳爲囊癰也若
婦人則有小腹脹痛兩胯間大筋偏墜及痛連腰
胯者甚有肝氣下陷戶中陰挺突出爲痛者濕熱
下陷傳爲陰戶掀腫發癢甚則生虫
凡此皆
肝家積氣所化猶男子之疝者也其脉左關尺亦
有沉弦而數或弦急而數者 腎疝者大多縱慾
房勞之人裏氣先虧寒濕之氣得以乘之積久成
疝其痛自腰腎下連陰莖小便兼之淋濁艱澁其
脉微而澹或沉細而濡軟 肺疝以辛散之以苦

順之所爲分清也心疝寒者治以溫散之劑熱者
兼補兼清脾疝專於溫散若濕熱甚者必先化濕
理痰肝疝必須升清利濁分清濕熱之氣腎疝當
於溫補之中佐以分清之藥更當以古人之七疝
參酌爲治尤爲詳盡無疑

又曰或問丹溪纂要一書爲世首推獨云疝主肝病
與腎無涉况肝無補法故前人之治疝者多用苦
辛之味以破氣散堅爲主今子主以參朮歸苓治
疝已爲背謬而又立腎疝一門豈不與丹溪散爲

矛盾耶答曰肝腎之有疝不獨本於內經卽今之患者了然有二蓋厥陰肝經之絡循環乎陰器上連小腹左右之旁以至乎脇下系外腎二子之根故肝虛有子脹偏墜痛連小腹之症若腎者開竅於前陰絡脉於兩腰其疝則痛自陰莖上連腰腎者是也然肝爲腎之子子能令母虛故肝病無有不補腎者母能令子實腎實則肝病無有不愈者况世之患疝由腎虛而致者尤多故治肝必兼顧腎治腎必兼顧肝又治疝之捷要不可不知也

余所以治肝病之有餘者原不出乎踈泄溫散以
肝家之客邪有餘不得不由踈導而去之耳若病
久肝家之正氣自虛或有挾虛而發其脉不甚沉
急甚則空豁無方面青肢厥者苟非參朮補益而
兼用桂附溫補豈能獲效此正所謂補其母而子
自實之義也世俗苦執肝無補法之說但逢疝症
不分肝腎不論虛實過用剋伐豈知肝虛復盜母
氣以自益而腎氣亦因之虧損故有肝病未已而
腎家虛寒之氣上衝心胃而危急者也此正所謂

子能令母虛也昔仲景治寒疝腹中痛及脇痛裏
急者用當歸生薑羊肉湯無不愈者豈非補肝之
驗而王肯堂繆仲淳治疝氣上攻心腹窘迫者用
八味地黃丸投之立應者又非補腎之一証乎甚
有疝症大便不通者當利大便如許叔微羅謙甫
皆用芫花是已小便不通者當利小便如許叔微
治宋荀甫以五苓散是已若據纂要於腎經無涉
則五苓不當用又言疝無下法則芫花不當用所
列之藥及諸書所用七疝之方無非辛苦破氣寒

熱雜收既不能補肝腎之真陰又不能通利二竅
使邪有所洩而徒耗其氣於冥冥之中豈不悞哉
昔有久疝不愈只於每日空心以淡飛鹽滾湯漱
口嚥下無遺不半疝而愈永久不發蓋齒乃骨之
餘夜臥口閉精氣聚於齒間而成垢以垢補腎正
補之以屬也又補腎之一徵也

醫論選要曰夫疝氣者羣丸連小腹急痛也有七疝
一曰厥疝謂厥逆心痛足寒飲食吐逆不下二曰
癥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如管三曰寒疝

因寒飲食積脇下腹中盡痛四曰盤疝腹中氣痛
盤結臍傍五曰氣疝腹中乍滿乍減而痛六曰附
疝腹中臍下有積聚七曰狼疝小腹與陰相引而
痛大便難此七疝之形症也又有所謂心疝饑疝
疝痺小腸氣膀胱氣奔豚氣橫弦豎弦偏墜木腎
腎餘陰腫其名不同皆疝之類也原其所由未有
不因七情四氣之所干也夫任脉爲病男子內結
七疝女子帶下癥聚河間以爲聚寒丹溪以爲濕
熱無擇以爲有寒有熱子和以爲專屬厥陰肝經

觀內經所論則五臟皆有痛而太陽小腸膀胱與
厥陰肝經爲痛之主其氣相通連而外腎系於辜
丸此三經乃相連相會者也蓋肝者筋之合也聚
於陰器凡痛之發其部分故曰痛本肝經治法當
以疎導爲主或溫之或散之要在隨其各經之症
施治則無不愈矣

古人用五苓散內加行氣之藥蓋猪苓澤瀉分理陰
陽以和心與小腸之氣白朮既滲腰臍間濕與死
血又助中氣以佐運行藥力茯苓淡滲而利膀胱

水桂能伐肝邪而溫散通行茴香治小腸之氣金
鈴子橘核去膀胱之滯檳榔下氣開導少加水通
以導小腸之火立方之工穩極矣蓋痛症未有不
因內虛外襲然必先疏泄其氣所謂通則不痛若
驟加補益攻心入腹變成危症

凡陰囊大而陰莖反縮於內小便淋漓行履滯礙乃
膀胱氣也蓋腎與膀胱爲表裡腎不能藏爲邪所
客遺於膀胱小便滲入腎囊耳宜滲利之有陰莖
全縮不見而陰囊光腫不痛此因肝氣虛損不能

舒達也宜溫補之

回回俗善保養者無他法惟護外腎使不着寒見南
人着夏布褲甚以爲非恐涼傷外腎也又云夜卧
當以手握之令煖謂此乃生人性命之根本不可
不保護也

觚不觚錄

不果妻也 喻不厥終

當人主與之合則出以主人主命之是本不

人妻也 不果也 喻不厥終 喻不厥終 喻不厥終

喻不厥終 喻不厥終 喻不厥終 喻不厥終

喻不厥終 喻不厥終

疝氣偏墜門主方

茴香丸

治疝神效
大錢眼六十五式空心盤影河盤

白米

白茯苓

八靈角

炒

吳茱萸

荔枝核

山查核

各一兩

橘木核

三兩

枳殼實

八錢

白木

各二兩

研細煉蜜為丸重一錢五分空心細嚼一九薑

湯送下

橘核消腎丸

濟生

蘇林一切疝氣

海藻

川棟肉

海帶

昆布

酒洗

橘重核

桃心仁

各四兩

廣木香

白茯苓

白朮

各二兩

人萊參

木通

當查歸

肉桂

玄胡索

各一兩

仙靈脾

五錢

酒糊丸桐子大每服六十九空心鹽湯或鹽酒

面香任下

消疝丸

康盈堂門主式

橘核鹽炒

藿香各一兩

大茴

荔枝核炒

青皮醋炒

陳皮各五錢

沉香二錢

硫黃三錢 酒煮 火

爲末酒糊丸每服七十九空心溫酒鹽湯任下

崑崙九

內消疝氣

橘核鹽炒

川楝肉鹽炒

香附童便浸炒 各二兩

茅蒼朮炒

青皮

吳茱萸鹽酒泡七次去苦水

檳榔各一兩 玄胡索

枳實

小苗鹽水炒

廣陳皮

山

查

各一兩五錢

真川椒去日焙

木香各五錢

肉

桂

去粗皮二錢五分

右為極細末醋煮米糊為丸每服六七十丸空

心淡鹽湯下

海藻散堅丸

治木腎大如斗硬如石

海藻洗

川楝肉鹽水炒

昆

布

洗

吳茱萸鹽湯泡七次壓去苦凍水

橘

核

炒

海帶洗

桃

仁麥炒各一兩

木

通

七錢

荔枝核打碎

青皮醋炒

玄胡索炒

小茴鹽水炒

廣木香

肉桂各五錢

研細酒糊為丸如桐子大每服六七十丸空心

淡鹽湯溫酒任下

疝氣

核桃七個放燒餅爐上炙極脆連殼研極細末無

灰酒調服

又方

烏藥六錢

天門冬五錢

水煎服

陰腫或偏墜腎子大小疼痛欲死者

木鱉子

一朔取肉
淡醋

黃栢

芙蓉葉

各二兩

研細醋調敷立刻止痛

木鱉

用艾葉不拘多少用瓦罐一個以好酒浸約淺罐口半寸紗紮罐口門下以糯米放在紗上文火煎滾俟米熟成飯為度去飯埋土中三日去火毒取起每用艾酒一茶甌冲白酒一茶甌頓服即效

陰丸腫大痛不可忍

川棟肉

小茴各二錢 沉香

木香

大茴香炒 食鹽

青鹽

各一錢 荔枝核新者佳十四枚燒存性

研細末每服三錢空心執酒調服

偏墜

大茴

葫蘆芭 山查

吳茱萸

官桂 橘核仁

小茴

青木香 枳實

荔枝核 各等分

研細末每服二錢溫酒調服

消疝丹

治小腸疝氣

白朮 荔枝核 炒 山查

小茴香 炒 研 枳 榔 木 通

猪 苓 崗 橘 子 昆 布

白 茯苓 海 藻 官 桂

澤 瀉 川 棟 子 各 等 分

水二鍾煎一鍾食前洗浴溫服如房勞腎虛加

人參五分

椒目九

真川椒目不拘多少畧焙為極細末糊丸梧子大
每服二錢空心酒服初服有微汗久服諸疝皆消

葵花湯

膀胱有熱腹脹陰囊腫脹而痛小便不通

猪苓

葵子

滑石

赤茯苓

枳實

瞿麥

木通 各二錢 車前子 一錢

黃芩 酒炒七分

炙甘草 六分

薑三片煎空心服

穿腸疝氣立刻住痛灸方

用手搯大敦穴一炷香之久即止如不止須灸三

五壯 大敦穴在足大指端去爪甲如韭葉

偏墜不向左右

川棟肉 鹽炒

蒼木

石菖蒲

大木茴

廣木香

各等分

右爲末水法疊丸鹽豆大每服三錢空心淡鹽
葱薑湯送下安臥片時必得微汗立止

疝疾重墜如斗

張師正倦游錄

薏苡仁東壁土炒過水煮爲膏服數次卽消

斗大疝氣

孫真人

臭梧桐嫩枝葉酒拌九蒸九晒爲末每服三錢空
心煖酒調下數日全消其皮垂下再用皮硝明礬
各等分煎水洗之卽上

偏墜疝氣

凌氏

葫蘆巴半觔炒香研細每服三錢白湯調服安臥

片時數服即愈

通治五疝主方

活人錄

半夏三錢

陳皮二錢

延胡索一錢五分

川棟子

紫蘇葉

猪苓各一錢

生姜三片水煎空心午前服

蓋人身營衛二氣與三焦之氣出入升降晝夜
循環無一息之停合於常度則何病之有苟失
其常致血脈稽留經絡閉塞因而臟腑不和三
焦不利變症無窮此六味固為治疝平劑其中
具有營運升降出人之用後復詳以對症加減
之法肺疝加桑皮杏仁各一錢五分枳殼一錢

去延胡川練如氣虛久病者加紫苑蘇子茯苓
 各一錢五分人參車前各一錢減半夏二錢去
 延胡蘇葉川練猪苓實則定肺膏青金丹神祕
 丹沉香滾痰丸虛則瓊玉膏金匱腎氣丸和中
 益氣丸 心痛加丹參二錢石菖蒲當歸各一
 錢益智仁五分去蘇葉猪苓減半夏三錢癆久
 氣血虛弱加當歸二錢茯神一錢五分人參二
 錢遠志益智菖蒲各五分去蘇葉猪苓川練減
 半夏二錢陳皮延胡各五分服寧志丸 脾癰
 加山查肉二錢蒼朮一錢服香砂健脾丸申氣
 久虛加白朮二錢茯苓一錢五分砂仁一錢減
 延胡川練陳皮各五分服沖和資生丸三因沖
 和丸 肝疝加山查肉三錢柴胡一錢五分青
 皮一錢木香五分吳茱萸三分去紫蘇減半夏
 一錢五分或病初得或人壯實者服沉香乳氣
 丸如病久氣血虛或挾虛而發者其脈空弦滿
 弱或虛豁無力加當歸三錢白朮二錢人參茯
 苓各一錢五分柴胡一錢減半夏二錢陳皮一

錢延胡川練各五分去紫蘇猪苓服雙補分消
九婦人治法相同惟陰挺陰癢陰虱諸症凡氣
實火盛二便秘結者服當歸龍薈丸清鬱丸血
虛氣滯鬱火下陷濕熱不清者服加減逍遙散
腎痛加澤瀉一錢五分茴香川椒肉桂各五
分去蘇葉半夏減陳皮一錢服分消丸如房勞
不足腎家氣血兩虧者加當歸二錢人參澤瀉
各一錢五分補骨脂肉桂各五分附子三分去
延胡半夏蘇葉猪苓服益氣丸沉香腎氣力

雙補分消丸 活人錄

治肝腎之氣血兩虧以致沉寒不散濕熱不清

單丸冷脹陰囊腫大者此丸久服兼補兼消

- 山振仁
- 香附
- 川椒子
- 山查

陳皮

川練子

各一兩

橘

核

茯苓

苓

當歸

白朮

各二兩

陳米炒熟為末醋湯打糊為丸每早空心百滾

湯吞服二錢

偏墜

地膚子

橘核

升麻

各等分

研末每服一錢空心滾酒調下不愈再一服

疝氣

筆峯雜興

大茴

小茴

各一兩
研末

大猪尿胞一具裝藥砂罐內加酒煮爛連胞搗丸
梧子大白湯送下三十九

木疝 秘方

卽木腎凡人心火下降則腎水不患其不溫真
陽下行則腎氣不患其不和溫且和安有所謂
木强者哉木強則傷腎矣故不可純用燥藥當
用溫和散利以逐其邪則邪自消榮衛流轉則
愈宜服枸杞丸

甘枸杞

昆布

吳茱萸

天南星 炮

半夏

白芷

山查肉

神麴 炒

滑石 炒

蒼朮

鹽

黃柏

酒炒各三兩

磨末酒和丸梧子大每服七十九空心鹽湯下

秘方

陳香櫟核焙脆研細每服二錢熱酒調下取汗

痛氣並治諸氣痛神方

周鶴仙

荔枝核

四十九個燒焦

陳皮

九錢

硫黃

四錢

共爲末鹽水打麵糊爲丸如菜豆大遇痛時空

心溫酒服九九良久再服不過四五服奇驗

又方

梔子炒黑 吳茱萸各一錢二分 枳殼

山查各一錢六分 牛膝二錢 木通各一錢

荔枝核七個長流水全煎服

疝氣

荔枝七個殼上開一口人鹽令 研細空心酒調服

腎子大小

吳茱萸七粒熱酒吞下

偏墜

紫蘇

連鬚芩

玉葡萄籐

煎湯薰洗

小腸疝氣偏墜

荔枝核

七個草紙打濕煨焦

研末熱酒調服

偏墜

野馬料荳生用每早淡鹽湯送下久服自消

疝氣

大蒜梗煎湯入罐內薰之自愈

偏墜疝氣

五去風

即五倍子五六個
煨灰存性研末

好酒調服以醉俟醒時

即愈

囊子大

九孔石決明煨研生薑汁調敷即消

偏墜

橘核

三十粒

荔枝核

火煨

大

苧

各二錢

小苧

一錢

共為細末生酒調服蓋煖取汗

偏墜

麥珠炒香研細每服三錢熱酒調服小兒即放在糕內食之亦效

疝氣

除夕夜躲大門背後喫小紅橘七枚連皮瓢子嚼下勿與人知永不再發

導氣湯

治寒疝疼痛

木香

三錢

茴香

二錢

吳茱萸

一錢五分湯包

易經大全

卷二十四

疝氣方

七

顧氏秘書

川楝子 四錢

長流水煎服

烏藥散

治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

木香

茴香

良薑

薑炒

青皮 去白

檳榔

烏藥

藥 姜酒浸一宿各五錢

川楝子 十個用巴豆七十粒打碎同麩炒川楝子黑色去麩與巴豆只用川楝子

為末每服一錢溫酒調下痛甚者炒生姜熱酒

服

陰丸腫大痛不可忍

沉香

大茴香炒

木香

青鹽

食鹽各一錢

新荔枝核十四枚燒存性

川楝肉

小茴香各二錢

為末每服三錢空心熱酒調服

當歸四逆湯

當歸尾七分

熟附子

官桂

茴香炒

柴胡各五分

赤芍藥四分

延胡索

川楝子

茯苓各三分

澤

瀉分二

水煎空心服

木香棟子散

疝氣久不愈者服之神效

石菖蒲

炒

青木香

炒各一兩

荔枝核

二十枚炒

川草薺

五錢

川棟子

三十個巴豆二十枚同炒黃赤色去巴豆不川

為末每服二錢入麝香少許空心炒茴香鹽酒

調下

羊肉湯

治寒疝腹痛裡急

羊肉 一觔

當歸

三兩

生薑

五兩寒者加用

水八碗煮取三碗温服一碗一日飲盡

疝痛氣衝心下築塞欲死手足冷者

硫黃

不拘多少火中鎔化即投水中六毒

荔枝核

橘核

炒黃

陳皮

焙燥各等分

為末飯丸桐子大每服四五丸酒下甚者六七

丸不可多也

寬脹散

婦人陰疝

檳榔 官桂 木香

大腹皮 沉香 青皮 各一錢

香附 小茴香 各一錢五分

薑引煎服

青木香丸

治腎冷疝氣脹疼

吳茱萸 一兩分作二分酒醋各浸一宿焙乾

香附 一兩

萆澄茄 青木香 各五錢

爲末米糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下
或乳香茛白湯亦可

疝氣腫墜疼痛

猪脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川楝子
各等分填半滿入青鹽一塊縛定好酒煮熟先食
猪脬以酒下之將內藥焙乾爲末酒糊丸桐子大
每服五十九空心溫酒或鹽湯下

甘草黑豆湯

解百藥毒兼治筋疝莖中痛脹不堪春方邪術

所致

甘草稍 二兩

黑 荳 半升

水煎服

葫蘆巴丸

治大人小兒盤腸奔豚疝氣偏墜陰腫

葫蘆巴 炒一

茴香 炒十

吳茱萸 湯洗七次

川棟子 炒十

川 烏 泡去皮尖

大巴戟 去心炒

為末酒煮麩糊為丸桐子大每服十五丸空心

溫酒下小兒五丸茴香湯吞下一方加黑牽牛

偏墜初起

木香

蘇林外黃西

穿山甲 茴香 二味為末 酒調下 乾物壓之外 用煨

牡蠣 高良薑 等分為末 津調塗於腫大之處 須臾

火熱其痛即安

肥人腫痛寒熱

五苓散 加茴香煎服神效

木香金鈴丸

全疝氣外腎腫痛如神

木茴香

大附子

泡去皮臍

人時參

小茴香鹽水炒

乳香

延胡索

全椒去核川楝子去核

沒藥各等分

木香為末好酒為丸桐子六每服一百丸空心黃酒

下其痛即止

神妙丸

治疝氣小腸氣膀胱氣盤腸氣木腎氣及偏墜

下部等症

沉香鹽酒炒吳茱萸鹽酒炒

橘核

乳香各一錢木香

荔枝核搗碎炒黃色

大茴香

各一錢五分

硫三黃

出研末三分

川芎

鹽水煮透取起切片五分

好姑蘇炒香散薄煎未煎

為末酒丸每服五十丸空心米湯下

香棟酒

川治偏墜氣

南木香 習氣熱川棟肉 不可小茴香

金大茴香

各三錢

右作一服鍋內炒至香入芎白連鬚五根用水

壹碗淬入鍋內以碗合住候煎至半碗取出去

渣加好酒半碗和入炒鹽一茶匙空心熱服至

痛者一服立愈

金鈴子丸

治釣腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川棟子

五兩剉作五分製 一分用斑猫一箇去頭翅同炒去斑猫 一分用茴香二錢鹽

香薷散

五分炒熟去鹽留茴香八藥 一分用破故紙牽牛三錢同炒去牽牛 一分用蘿蔔子三錢同炒留故紙八藥 一分用蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子

右將棟子去核同破故紙炒香焙乾為末酒糊

大丸桐子大每服三十九溫酒空心下

陰吹門主論

金匱云胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣既不能上升
清道復不能循經下走後陰陰陽垂僻如腸交之
義是也甚或簌簌有聲如後陰之失氣狀宜補中
益氣湯加五味子主之

見聞隨錄云產婦不得食葱如悞食之必成陰吸

陰瘡門主論

王肯堂曰陰器屬足厥陰肝經任脉之會

年纒

又曰運氣陰瘡皆屬寒經云太陽之濕陰中乃瘍隱
曲不利治以苦熱是也

素問云厥陰之脉絡陰器繫於肝

又云督脉者其絡循陰器合篡間是也至於足太陽
外合清水內屬膀胱而通水道手太陽外合淮水
內屬小腸而水道出焉則又屬手足太陽也腎主
水則又屬足少陰也飲入於胃游溢精氣上輸於

脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則又屬手太陰也素問又謂前陰者宗筋之所聚太陽陽明之所合則又屬脾與胃矣癰瘡生其間須細心求而責之不可專主一厥陰肝經而惟清肝導濕之為事斯無悞矣

靈樞云筋者聚於陰器而脉絡於舌本肝者筋之會

也又屬督脉

張仲景云少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕爛

者狼牙湯洗之

用狼牙二兩以木四升煮至半升以綿漚筋如繭洗湯漚陰中繭三

遍

岐天師曰大約暗疾婦人十居其九或生於兒門之
外或生於兒門之中止可陳說然猶有羞愧而不
肯盡言者止可意會而默思之也大約兒門之病
非癢則痛當以默治湯主之此湯皆是平肝去濕
之品毋論有火無火有風有濕俱奏奇功正不必
問其若何癢若何腫若何痛苦何爛也

秘錄

陳實功曰婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下
注爲患形多不一總由邪火所化也

正宗

薛立齋曰陰戶毛際正中發毒名曰陰蓋毒紅腫疼痛此乃肝火鬱結而成治當清肝養血外用敷消如已成膿冷同癰疽法

又曰陰戶一邊結腫亦有兩邊結腫其形如繭名曰陰禍內膿成自潰頭得之於肝火濕熱或新婚傷損或交合不潔染毒均能成之

又曰陰戶內子宮腫痛潰爛名曰孔毒肝火鬱結者重交合所傷者輕俱用海浮散油調灌入仰臥良久後換王紅膏護海浮散以綿潤透插入自效

陰瘡門主方

論不必味

陰戶潰爛

竇氏

兒茶

雞內金

各一錢

輕粉

五分

冰

片

三分

研細乾摻

婦人陰瘡

杏仁不拘多少燒存性麝香少許細細研勻如瘡

口深用小絹袋盛藥繫口炙熱納陰戶內

津調散

錦囊

治妬精婦人陰濕瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

欵冬花

各等分

麝香

少許

研細末先用沐浴長春散煎洗軟絹拭乾律調

入搽之忌以全湯洗

默治湯

岐天師

當歸

一兩

白茯苓

白芍

各五錢

梔子

三錢

柴胡

一錢

棟樹根

五分

水煎服

有痰加白芥子

有火加黃芩

有寒加肉桂

餘不必加

化毒生肌散 雷公

治產門外生瘡久不愈兼治一切瘡毒神效

黃栢炒

白薇炒

鉛粉炒

兒茶

蚯蚓屎炒

潮腦各三錢

乳香去油二錢

麝香三分

輕粉

冰片各五分

研細摻瘡口二日即愈

陽明參茸口

水

甘

谷

正

米

香

二

雞

香

香

香

香

香

香

香

香

香

香

良

茶

香

香

香

香

香

香

香

香

香

香

香

香

黃

酥

香

香

香

香

香

香

香

香

香

香

香

香

尚書門於手...

許毒上照端

不...

陰蟻門主論

陳實功曰婦人陰戶生蟲蟻如小蛆者乃心氣鬱而

又邪火所化 正宗

又曰又有婦女久居寘室淫火妄而又鬱鬱而又妄

邪火久注多致陰中作癢生蟲食入內臟陰中腐

爛攻刺疼痛臭水淋漓口乾發熱形削不食咳嗽

生痰有此證者非藥能愈終歸於死此又名失合

又證與癆瘵相似 正宗

又曰陰蟻瘡宜四物湯加黃連龍膽草木通古菖蒲

又以通散心竅鬱滯外以銀杏散納入陰中

又曰陰器外生疔瘡內生細虫作癢不可忍者此蟲食人臟腑卽死令人多發寒熱與癆瘵相似畏羞不說因循日久面黃肌瘦咳嗽生痰往往不治者多矣急與逍遙散吞蘆薈丸外以銀杏散綿裹塞入殺蟲止癢半月漸愈

又曰陰器內生紅蟲長者一寸短者五六分

治法宜歸脾湯加山梔白木牡丹皮甘草主之

竇漢卿曰婦人之性多偏而多鬱若有不遂則心肝

胃三經之火勃然而起遂致陰內生瘡或生疔瘡
或生翻花瘡陰中極癢名匿瘡又名陰蝕瘡極痛
極癢狀如蟲行淋漓膿汁皆由濕熱與心火相擊
而生

李東垣曰婦人陰蝕瘡乃腎臟虛邪熱結下焦經絡
痞澁氣血不行或房慾洗浴不潔以致生瘡隱忍
不醫焮腫尤甚因瘡在裏措手無方疼痛注肉或
小便如淋或經十數日潰爛膿血肌肉侵蝕或血
熱出不止以成下疳男子則陰丸腫潰

十書

張景岳曰陰蝕患於陰戶之中一癢則酸麻徹骨一痛則痛楚連心良由產後保護不慎以致風寒內逼臨經調攝失宜致延濕熱中生新產未曾滿月交接房勞經血不曾乾淨淫慾所傷或惹疳瘡或因肝鬱是以子宮生蟲作癢潰流穢水失治則子宮散而陰戶脫矣宜用鷄肝散絲瓜散插之葶藶

湯洗艾葉散薰

林檎散七首白芷散地黃散山入肝散

在土儲芥藥到中藥熱合置散又各針筒發針

胃三器之火燒然而法後姪針內土藥如坐臥

陰匿門主方

產門內生蟲

華真人

用雞肝一副以針刺無數孔納入產門內則蟲俱
鑽入雞肝之內矣三副全愈不必添人藥味也止
要刺孔甚多則重有入路三副後再服去濕化痰

湯

去濕化痰湯

白木 白芍

當歸 各五錢

白茯苓

澤瀉

黑山梔

生甘草 各三錢
陳皮 五分

水煎服四劑再不發

鷄肝散

蕪黃 蛇床子 硫黃

川椒 潮白腦 枯丹

雄黃 海螵蛸 全愈不黃 連各等分

麝香 少許 以酒陳無雙并餘入室門內

共研細末取旋宰鷄肝一具將藥末塗肝上

瘰癧時挿入陰戶內

絲瓜散

蕪荑

蛇床子

硫

黃

潮腦

枯礬

川

椒

各等分

共研細末用鮮絲瓜

刮去皮

一段將藥末厚塗絲

瓜上推入陰戶內

艾葉湯

艾葉

苧蔴葉

槐葉

柳葉

白芷

防風

白芷

升麻

各等分

右曬燥為粗末入麝少許以器貯馬桶內點着

冷患者坐馬桶上遮緊勿走烟薰兩個時辰

草麻湯

扁栢葉

槐葉

青蒿葉

柳葉

草麻葉

桃葉

金銀花

艾葉

各等分

煎湯薰洗

陰戶生黃臭水甚痛

先蟲一二三錢燒存性研細酒調以鴨毛掃上即效

陰菌門主論

陳實功曰陰菌形如雞冠四邊腫痛爲肝鬱脾虛

且宗

竇漢卿曰陰中腫塊匾如葦者名陰葦陰菌如棗核

者名陰茄皆由濕熱與心火相擊而生惟陰茄難

未治性氣和緩之婦胸次坦夷服藥易愈若性急悍

又妬之婦習與性成服藥百貼方愈必須忌口絕慾

戒性爲要治當補心養胃爲主

馮魯瞻曰陰中突出如菌四圍腫痛便數埔熱似小

似痛小便墜重此肝火濕熱而腫痛脾虛不陷而

重墜也先以補中益氣湯加山梔茯苓青皮以清

肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生

猪油和藜蘆末塗之而收

錦囊

又曰或歸脾湯加山梔川芎荻神香附陳皮治之

朱丹溪曰陰疝乃生產未曾滿月因取重物膀胱墜

下若是紅茄紫茄可治白茄不治

而主白茄

實錄曰白茄中甄聖國收葷芥各白葷白茄收葷芥

白茄中甄聖國收葷芥各白葷白茄收葷芥

白茄中甄聖國收葷芥各白葷白茄收葷芥

陰菌門主方

蘆散

婦人陰中突出如蛇或似雞冠菌樣者並治

鰲

頭

煨黃色

輕

粉

雄

黃

各一錢

冰

片

二分

葱管藜蘆

二錢研如細麵

煎干

以上各研細末和勻再研磁瓶收貯先用芎歸

湯薰洗隨後搽藥早晚二次其患漸收

芎歸湯

當

歸

龍膽草

白

芷

川芎

甘草 各一錢

煎湯浴洗患上隨後擦藥

婦人陰中忽生雞冠肉並生瘰癧方

其患漸外

龍膽草 酒拌炒 大黃 澤瀉 各一錢

生地 黑山梔 車前子

木通 當歸 甘草 各一錢

黃芩 炒各五 出取強短少穢尿菌對香並印

水煎服

陰疽 聖藥門卷六

硫磺五分
海螵蛸二錢

陳功研細用鴨蛋清調搽
墜重流水瀉瀝為藥氣下

陷卅火從之

馮魯瞻曰

川芎

草

各一錢

煎湯服洗患之隨後探藥

婦人陰中忽生雞冠肉並生瘰癧方

龍膽草

大黃

澤瀉各一錢

生地

黑山施

車前子

木通

當歸

甘草

黃芩

各五

照用聖壽膏料

極

黃正

病

二錢

陰挺門主論

陳功實曰陰挺一條如蛇墜重流水瀦澁為膠氣下

陷肝火從之

正宗

馮魯膽曰陰挺逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水

續續小便淋瀝宜內服升補外以硫黃烏賊骨五

味子為末敷之

錦囊

又曰陰中齋肉出如蛇頭數寸者名翻花瘡用硫

黃末敷之即縮

胃氣主

汪省之曰陰挺宜朝進補中益氣湯晚服龍膽瀉肝

湯外塗雄黃藜蘆散其患漸收

理例

竇漢卿曰補心養胃為主

朱丹溪曰子宮脫出名陰癩俗名癩葫蘆由氣血俱

虛所致宜補中益氣湯去柴胡倍升麻加益母草

服之外以草麻子肉搗貼頂心以枳殼半劬煎湯

惡薰洗曰剗斑蝥或蠶融聚重其藥於前發於散水

又曰如思慾不遂肝氣鬱結而成者必先於小便時

刺似有指塞之意因而努掙久之子宮隨努而下速

令穩婆扶正癩葫蘆患婦仰臥以枕墊腰用嚏藥

取噴卽收收入卽緊閉陰戶隨以布帛將腿縛定
服補中益氣湯

薛氏曰陰挺下脫牽引腰腹膨痛者或因胞絡傷損
或因子臟虛冷或犯非理房事或因分娩用力所
致當以升補元氣爲主若肝脾鬱結氣虛下陷補
中湯若肝火濕熱小便赤澁龍膽湯

寶漢卿曰補心養胃為主

朱丹溪曰子宮脫出名陰崩俗名續命崩由氣虛血

中懸若用大熟地小熟地黃蘗黃芩白朮知母芍藥

延壽以代斷云產後主昏狂眼變眩暈盡不即蘇

返因平細盡令海味非野真事也因公效用代也

下血代野真事也因公效用代也

野真事也因公效用代也

野真事也因公效用代也

陰挺門主方

逍遙散

林氏活人錄彙編加減法

用脾血虛發熱或潮熱晡熱或自汗盜汗或頭
痛目澁或怔忡不寧或頰赤口乾或月經不調
肚腹作痛或小腹重墜水道澁痛或陰挺突出
為痛或陰戶焮腫發癢陰臭陰風或腫痛出膿

內熱作渴等症

當歸

白朮芍

白朮

白茯苓

柴胡

各一錢

粉丹皮

山茱萸

炙甘草 各五分

水煎午後臨睡服

白木

逍遙者乃輕揚消散之義蓋肝脾血虛氣鬱以
 致熱鬱於內不得舒泄甚至鬱陷於下焦積久
 而成發熱則照前方如脈虛數無力則如
 人參一錢生地一錢五分當歸五分減柴胡五
 分汗多乃包絡脾胃之火脈實可加黃連五
 分生地一錢五分麥冬一錢去柴胡虛則加人
 參一錢五分麥冬一錢五味子二分去柴胡頭
 痛自瀝加當歸一錢熟地二錢川芎薄荷各一
 錢怔忡不寧實則加生地麥冬各一錢黃連
 五分虛則加棗仁二錢生地一錢五分人參麥
 冬各一錢當歸五分減柴胡五分日赤口乾
 則加生地一錢五分麥冬一錢白芍五分黃連
 五分乾葛粉一錢虛則加熟地三錢麥冬一錢
 五分人參一錢五味二分當歸白芍各五分

柴胡五分 月經不調肚腹作痛實則加山查
三錢延胡二錢蘇梗當歸各一錢虛則加熟地
三錢當歸川芎各一錢白芍五分人參延胡各
一錢五分減柴胡五分去山梔 小腹重墜水
道澀痛實則加澤瀉猪苓車前各一錢生地麥
冬各一錢五分黃連五分虛則加熟地二錢當
歸白芍肉桂各五分人參黃芪各一錢升麻三
分減柴胡五分去丹皮山梔 陰挺突出乃肝
經虛氣挾濕熱之氣下陷也卽前方加人參一
錢黃芪一錢五分白朮二錢防風當歸白芍茯
苓丹皮各五分升麻三分 其餘焮腫至作渴
等症皆濕熱有餘隨氣下陷之故加防風車前
杜仲各一錢金銀花三錢黃連當歸
白芍茯苓白朮丹皮山梔各五分

白岑英岑自木畏史山謝谷正袋

華帝督攝燕洋翁制疎下謂之姑賦初賦軍滿

岑典史答在袋代和三袋其節賦觀運於保

發黃熱一袋正袋白木二袋初賦當觀白芒若

衣對樂附氏袋志代史山謝一創到突打也相

道出前實帳城郭萬泰琴車前袋袋袋袋袋袋

三對五袋二袋發發發發發發發發發發發發

樂時正袋其發不確其鄭并歐實四成四成

陰癢門主論

陳實功曰產後交骨未合驟爲風所侵作癢

正宗

又曰陰戶作癢四邊黃泡乃風濕下滲用苦參金銀

花甘草白芷蛇床子煎湯薰洗

又曰有抓之血出不痛者莫不由癢毒

澄曰婦人陰戶作癢乃肝脾風濕流注亦有肝火鬱

結而成

馮魯瞻曰陰癢陰瘡多屬蟲蝕所爲始因濕熱故生

三蟲在腸胃間因臟虛乃動其蟲侵蝕陰中精華

故時作癢甚則痛癢不已潰爛成瘡在室女寡婦
尼姑多犯之因積想不遂以致精血凝滯釀成濕
熱久而不散遂成三蟲癢不可忍深入臟腑卽死
令人發熱惡寒與癩相似亦有房室過傷以致熱
壅腫癢內痛外爲便毒莫不由慾事傷損肝腎腎
陰虧而肝火旺木鬱思達肝經鬱滯之火走空竅
下下注爲癢爲蟲當用龍膽瀉肝湯逍遙散以主
其內外用蛇床子煎湯薰洗再以菟仁研膏和雄
黃末雞肝研餅納陰中以制其蟲若肢體倦怠陰

中悶癢小便赤者歸脾湯加山梔白朮甘草丹
皮若徒以濕熱爲事燥濕清熱則氣血日衰所害
不止陰癢矣

... 成始在至文... 我...

... 所以致...

... 火走...

... 不止...

... 史... 日...

... 中... 自...

陰癢門主方

陰戶作癢

取淨桶內置瓦一片以破布燒烟薰之

銀杏散

婦人濕熱下注陰中作癢或內外生瘡

杏 仁

去皮尖

水

銀

鉛製

輕 粉

雄 黃

各等分

研細和勻每用五分棗肉一枚和丸用絲綿包

裏留一綿條撚線在外先用塌癢湯煎洗將藥

瘡醫之全
三
毳納入陰戶留線在外恐小便取出再入一日

一換重者用四五枚痊愈仍宜兼服煎藥

塌癢湯

鶴虱草

一兩

苦參

威靈仙

歸尾

蛇床子

狼毒

各五錢

用河水十碗煎數滾濾清貯盆內乘熱先薰後

洗臨洗和入公猪膽汁二三枚同洗更妙

陰癢生瘡

紫稍花一兩胡椒五錢煎湯温洗數次

陰戶腫突門主論

陳實功曰陰戶忽然腫突作痛乃勞傷血風濕火下

流正宗

又曰亦有陰戶半邊痛者

又曰治當四物湯加丹皮澤瀉柴胡花粉

朱丹溪曰陰戶忽然腫而作痛者名曰陰腫又名蚌

疽由勞傷血分所致宜四物湯加牡丹皮澤瀉柴

胡天花粉煎服外用艾葉一兩防風六錢大戟五

錢煎湯薰洗

馮魯瞻曰婦人陰腫有因胞絡虛損風冷之與血
氣相搏而腫者有因鬱怒傷損肝脾者有因房勞
過度濕熱下流者有慾勝而熱甚生蟲以致腫癢
並作者皆宜戒房室而速治之否則邪氣
戶潰爛不取矣若氣血虛弱補中益氣湯舉而升
之肝經濕熱龍膽瀉肝湯滲而清之肝脾鬱怒元
氣下陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加升柴解鬱結補
脾氣夕用加味道遙散清肝火生肝血除熱去濕

陰癢三蟲作祟

大黃 微炒

黃芪 蜜炙

黃芩 各一兩

山萸肉

元參

蛇床子

丹參

赤芍 各五錢

共為末每服貳錢食遠溫酒調服

陰戶癢極難忍

用鹽塗之即止

陰癢生瘡

蛇床子 三錢

杏仁 炒研

白礬 各五錢

煎洗

又方

蛇床子

一兩

花椒

白

礬各三錢

煎洗

又方

蛇床子

一兩

艾葉

五倍子

明礬

杏仁

各五錢

川連三錢

煎洗

陰戶腫突門主方

陰戶疼痛

鹽三合炒熱包熨之立止

婦人陰中腫痛及生瘡濟生

黃連酒炒二錢龍膽草酒洗

小柴胡去蘆各一錢

青皮二分

水煎服腫甚加大黃一錢

子宮大痛不可忍入門

五倍子

白礬各等分

煎湯薰洗又爲末搽之

產後陰戶兩傍腫痛手足不能伸

入門

用四季芎入乳香末同搗成餅安於陰戶兩傍良

久即愈

產戶硬如石衣若撞着痛不可忍

青魚膽

七個或鯽魚膽七個亦可

絲

綿

三錢燒存性

以膽汁調勻鴨毛掃上其硬不過半個時辰即

軟

陰戶腫痛

風突門主式

陰脫門主論

經曰前陰所過之脉有二一曰肝二曰督脉足厥陰
之脉入毛中過陰器抵少腹是肝脉所過也督脉
起於小腹以下骨中央女子繫廷孔循陰器男子
循莖下至篡與女子等是督脉所過也

馮魯瞻曰產後陰脫者多由婦人生產用力太過致
陰下脫宜內服升補為主

丹心云陰戶脫出蓋因努力太過所致若脫肛狀逼
麴腫痛清水續續小便淋瀝宜當歸黃芪飲

陳實功曰陰脫乃陰戶開而不閉癢痛出水乃憂思

太過所致宜逍遙散歸脾湯俱加柴胡山梔白芍

牡丹皮外用荆芥枳殼訶子五倍子大劑煎洗正宗

...

...

...


...

...

針頭門主編

大戟一兩
防風二兩
芟葉五錢

煎湯熱洗避風外以鯽魚膽汁搗之



前... 風... 以... 離... 魚... 書... 對... 文...

大... 湖... 風... 葉... 菜...

陰脫門主方

當歸黃芪飲 丹心

治陰脫

黃芪 酒炒三 當歸 人自人人 參

升麻 各二錢 甘草 一錢

水煎服

外治 丹心

硫黃 各五錢 烏賊骨 各五錢 五倍子 二錢五分

研細敷患處即效

產後生腸不收

丹心

入物湯加防風升麻須用酒炒黃芪爲君煎服外
以樗根白皮五錢荆芥升麻藿香各二錢煎湯薰
洗患處卽入

又方

丹心

枳殼二兩煎湯溫浸良久自入

又方

良方

取大紙撚蘸油點火吹滅以烟薰產母鼻卽上

產後陰戶突出

入門

用四物湯加龍骨或五倍子連服二貼外以香油

和湯洗患處

硫黃湯 正傳

治產後玉門不斂

硫黃 四兩

吳茱萸

兔絲子 各一兩
五錢

蛇床子 一兩

共研末每用五錢水一碗煎湯乘溫頻薰洗自

斂

又法 丹心

香油五筋煎熱盛盆坐其中一食頃以皂角末吹
鼻作嚏即收

產後用力太過陰門突出

當歸

川芎

赤芍

熟地

水煎入龍骨朮少許和勻連服二劑外用蒜油
和湯薰洗即收

產婦陰戶傷損門主論

洽曰凡產婦陰戶或一邊炊腫或兩邊均腫難以起坐更有陰戶兩墻爛破出膿痛引小腹兩股皆由分妣艱難或是息胎憶婆用手分理骨眼或用手伸人指取胎胞粗手指甲抓損皮肉而成殊不知產戶皮嬌肉嫩何堪經此再加瘀血淋漓愈淹愈爛况陰戶乃肝脾腎衝任脉絡之地既破之後所以牽引少陰腰股作痛也宜用洗藥煎洗破處用玉紅膏珍珠散搽之日愈

產婦陰戶傷損門主方

陰戶腫痛

枳殼一兩煎洗

陰戶腫潰

當人歸短銀赤芍芍甲附蘇白肉芷

甘草草蕪返景苦參各等分

坐前湯洗

產婦陰戶腫痛

蛇床子三錢

白蘿蔔

五個撲碎

煎湯薰洗

陰戶交接出血門主論

陳實功曰婦人交接出血者乃丹虛有火不能藏血

脾虛不能攝血當以補中益氣歸脾二湯主之

正宗

又曰或用四物湯加龍膽草柴胡山梔黃芩治之

馮魯瞻曰九交接出血者此肝火太旺而踈泄過度

且肝虛不能藏血脾虛不能攝血也宜補中歸脾

二法消息用之若六脉俱洪者此腎陰虛而不能

閉藏也宜六味湯加麥冬五味主之

錫囊

困類也宜六和處以參正和主六

險難

二吉能息伊之咎六利則共濟也習則處而不殆

且損氣不損德也氣盡不損壽血也宜辭中謂

六三與四比也卦中此道也夫六五可與也

又曰之用四也為心而動也樂則由誦其言而

其氣不化也血也也存其益氣也則二也主六宗

則皆以四散入交也由血者代其血而火不損德也

則可矣卦中血以主歸

陰戶開張門主論

陳實功曰陰戶開而不閉者乃憂思過度

正宗

又曰治當逍遙散歸脾湯加柴胡山梔白芍藥牡丹

皮開服

女子新嫁陰戶痛門主論

陳實功曰新嫁傷而腫痛者宜舒鬱和血

正宗

馮曾贍曰新嫁孔痛宜四物湯加香附紅花主之

錦囊

蔣示吉日新交房事傷而腫痛者珍珠散

搽說約

陰冷門主論

馮曾瞻曰婦入陰冷因勞傷子臟風冷客之若小便
澁滯小腹痞痛宜龍膽瀉肝湯若小便澄清飲食
少思大便不實治以八味地黄丸八味九治
不能榮養臟腑津液枯澁寒客子臟陰冷者甚效

錦囊

實女無竅門主方

實女無竅

以鉛作擬逐日維之久久自開

蓋鉛能入肉故也

陰戶腫突門主方

陰戶疼痛

鹽三合炒熱包熨之立止

婦人陰中腫痛及生瘡濟生

黃蓮

酒炒二錢

龍膽草

酒洗

上柴胡

去蘆各一錢

青皮

一分

水煎服腫甚加大黃一錢

子宮大痛不可忍

八門

五倍子

白礬

各等八

煎湯薰洗又爲末摻之

產後陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸 入門

用四季芍八乳香末同搗成餅安於陰戶兩傍良

久即愈

產戶硬如石衣若撞着痛不可忍

青魚膽

七個或蒲魚膽七個亦可

絲

綿三錢燒存性

以汁調勻鴨毛掃上其硬不過半個時辰即

軟

陰戶腫痛

大戟

一兩

防

風

二兩

艾

葉

五錢

煎湯熱洗避風外以鮑魚膽汁搯之

光緒二十九年

元

地盤風快以喻成朝古詩云

東風吹雨
東風吹雨
東風吹雨
東風吹雨

陰脫門主論

經曰前陰所過之脉有二一口肝二曰督脉足厥陰之脉入毛中過陰器抵少脛是肝脉所過也督脉起於小腹以下骨中央女子繫廷孔循陰器男子循莖下至篡與女子等是督脉所過也

馮管瞻曰產後陰脫者多由婦人生產用力大過致陰下脫宜內服升補爲主

錦囊

丹心云陰戶月出蓋因努力太過所致若脫肛狀逼迫腫痛清水續續小便淋瀝宜當歸黃芪飲

陳實功曰陰脫乃陰戶開而不閉癢痛出水乃憂思
 太過所致宜逍遙散歸脾湯俱加柴胡山梔白芍
 牡丹皮外用荆芥枳殼訶子五倍子大劑煎洗正宗

此方乃治陰脫之良方也
 凡患此症者宜早服此方
 庶幾不致成疾矣
 此方乃治陰脫之良方也
 凡患此症者宜早服此方
 庶幾不致成疾矣

此方乃治陰脫之良方也
 凡患此症者宜早服此方
 庶幾不致成疾矣
 此方乃治陰脫之良方也
 凡患此症者宜早服此方
 庶幾不致成疾矣

此方乃治陰脫之良方也
 凡患此症者宜早服此方
 庶幾不致成疾矣

陰脫門主方

當歸黃芪飲丹心

治陰脫

黃

芪

酒炒三錢

當歸

人參

升

麻各二錢

甘草

錢

水煎服

外治丹心

硫黃

烏賊骨

各五錢

五倍子

二錢五分

研細敷患處即效

產後生腸不收 丹心

八物湯加防風升麻須用酒炒黃芪爲君煎服外
以枳椇根白皮五錢荆芥升麻藿香各二錢煎湯薰
洗患處卽入

又方 丹心

枳殼二兩煎湯溫浸良久自入

又方 良方

產後大紙熬蘸油點火吹滅以州薑產母鼻卽上

癸後陰戶突出 入門

用四物湯加龍骨或五倍子連服二貼亦以香油和湯洗患處

硫黃湯 正傳

治產後玉門不斂

硫黃 四兩

吳茱萸

兔絲子 各一兩

五錢

蛇床子 一兩

共研末每用五錢水一碗煎湯乘溫熨薰洗自

斂

又法丹心

香油五觔煎執盛盆坐其中一食頃以皂角末吹
鼻作嚏卽收

產後用力大過陰門突出

當歸

川芎

赤芍

熟地

水煎入龍骨末少許和勻連服二劑外用麻油
和湯薰洗卽收

產婦陰戶傷損門主論

澄曰凡產婦陰戶或一邊焮腫或兩邊均腫難以起
生更有陰戶兩墻爛破出膿痛引小腹兩股皆由
分妣艱難或是息胎穩婆用手分理骨眼或用手
伸入指取胎胞粗手指甲抓損皮肉而成殊不知
產戶皮嬌肉嫩何堪經此再加瘀血淋漓愈淹愈
爛况陰戶乃肝脾腎衝任脉絡之地既破之後所
以牽引少陰腰股作痛也宜用洗藥煎洗破處用
玉紅膏珍珠散搽之自愈

產婦陰戶傷損門主方

陰戶腫痛

枳殼一兩煎洗

陰戶腫潰

當歸

赤芍

白芷

甘草

苦

參

各等分

煎湯洗

產婦陰戶腫痛

蛇床子

三錢

白蘿蔔

五個
撲碎

煎湯薰洗

陰戶開張門主論

陳實功曰陰戶開而不閉者乃憂思過度 正宗

又曰治當逍遙散歸脾湯加柴胡山梔白芍藥牡丹

皮間服

女子新嫁陰戶痛門主論

陳實功曰新嫁傷而腫痛者宜舒鬱和血 正宗

馮魯瞻曰新嫁孔痛宜四物湯加香附紅花主之 錦囊

將示吉日新交房事傷而腫痛者珍珠散猪春髓調

搽說約

陰冷門主論

馮曾贍曰婦人陰冷因勞傷子臟風冷客之若小便
 澀滯小腹痞痛宜龍膽瀉肝湯若小便澄清飲食
 少思大便不實治以八味地黄丸八味丸治血弱
 不能榮養臟腑液枯澀寒客子臟陰冷者甚效

錦囊

實女無竅門主方

無竅

以鉛作挺遂日經之久久自開

蓋鉛能入肉故也

陰戶交接出血門生論

陳實功曰婦人交接出血者乃肝虛有火不能藏血
脾虛不能攝血當以補中益氣歸脾二湯主之正宗

又曰或用四物湯加龍膽草柴胡山梔黃芩治之

馮魯瞻曰凡交接出血者此肝火太旺而踈泄過度

且肝虛不能藏血脾虛不能攝血也宜補中歸脾

二法消息用之若六脉俱洪者此腎陰虛而不能

閉藏也宜六味湯加麥冬五味主之

錦囊