

壽世保元三



南京中医药大学图书馆版权所有

太医院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

司邑後學周亮登元就校

痰飲

脉雙弦者寒飲也○其脉偏弦者飲也○肺飲不弦但喘短氣○又云脉浮而

細滑傷飲○脉弦數有痰飲春夏難治○脉沉而弦者懸飲內痛○其人短

氣四肢癱節走痛脉沉者有留飲○左右手關前脉浮弦大而實膈上有稠

痰也宜吐之○病人百藥不効關上脉伏而大者痰也眼胞及眼下如炭烟

薰黑者亦痰也○久得瀉脉痰飲膠固脉道阻澁也卒難得開必費調理

痰者病名也生於脾胃然脾胃氣盛飲食易尅何痰之有或食後因之氣惱勞

碌驚恐風邪致飲食之精華不能傳化而成痰飲矣有流于經絡皮膚者有

鬱于臟腑支節者游溢遍身無所不至痰氣既盛客必勝主或奪於脾之經

絡也氣則倏然什地此痰厥也升於肺者則喘急咳嗽迷於心者則怔忡恍



惚走於肝則眩暈不仁脇肋脹滿閉於腎則冷而多痰湮流於中腕則嘔瀉
而作寒熱注於胸則咽膈不和肩膝骨痛人於腸漉漉有聲散於胸背則揪
觸一點疼痛或寒如手足或背痺一辺片則有聲聚則不利一身上下變化
百病治當各從所因是以虛宜補之火宜降之氣宜順之鬱宜開之食宜導
之風寒溫熱宜發散清燥以除之故曰治病必求其本

○一論有 濕痰 熱痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰

宜後方加減

一陳湯

陳皮一錢 半夏湯 白茯苓一錢 甘草五分

石劉一劑生姜三片水煎溫服

一溫痰盛者身軟而重加蒼朮白朮

一熱痰加黃連黃芩痰因火盛逆上降火爲先加白朮黃芩軟石膏黃連

一眩暈嗜睡者火劫其痰也亦加山桅黃連黃芩之類

一風痰加天麻枳殼南星白附子僵蚕牙皂之類氣虛者加竹瀝氣實者加荆



瀝俱用薑汁

一老痰用海石半夏瓜蒌香附連翹之類五倍子佐此藥大治頑痰宜丸藥服
中有物咯不出嚔不下此痰結也用藥化之加鹹藥軟堅之類宜瓜蒌古
海石桔梗連翹香附少佐林消薑汁煉蜜和丸嚙服之脉濇者卒難得開必
費調理氣實處熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣滯者難治

一寒痰痞塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛亦加半夏
一食積痰加神曲麥芽山楂炒黃連枳實以消之甚者必用攻之宜丸藥兼血
虛者用補血藥送下中焦有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不使虛若攻之
盡則虛矣○噫氣吞酸此係食積而鬱有熱火氣動上加黃芩南星

一而虛有痰加天門冬知母瓜蒌仁香附冰竹瀝薑汁帶血者更加黃芩白芍
桑白皮血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生薑汁韭汁飲三五盞必胸中煩
燥不寧後愈

一氣虛有痰加人參白朮脾虛者宜補中氣以運痰降下加白朮白芍神曲麥
芽兼用升麻提起內傷痰加人參黃芪白朮之類薑汁傳送或加竹瀝尤



妙

痰在膈上必用吐法瀉之不去膠固稠濁者必用吐脈浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就有發散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐如防風小葛桔梗麥芽生姜薤汁之類或瓜蒂散凡吐用布緊勒肚於不通風處行之痰在腸胃間可下而愈枳實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰用利藥過多則氣易虛則痰易生而多

痰在脇下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生姜非汁膈間有痰或癩狂或健忘或風痰俱在竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐下後方用藥

凡人頭面頸頰身中若結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥之消

凡痰之為物無處不到為隨氣升降故也

一論竹瀝大治痰皮能養血清熱有痰厥不肖人事幾死者得竹瀝灌之



迷離詭起死回生藥也

用水竹早筆竹截長二尺許

浸一時許以薄磚二塊排定

迫之兩頭以盆盛瀝每六分

耳用以竹瀝知入湯藥內服

○一論痰屬濕乃津液所化因風

濁變為痰飲故曰痰因火動降

加減二陳湯

橘紅去白

白朮去芦

香附便炒

右剉生姜三片水煎温服

○一論熱痰在胸膈間不化吐咯

開結化痰湯

小者每以劈作二片大者劈作四片入井水

將竹片架於磚上兩頭露一二寸下以

中加姜汁一分服之痰熱甚者可

之尤妙取荆瀝亦治熱痰亦照此法

寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆

火為先火因氣逆順氣為要

半夏製一

連翹五分

甘草三分

白茯苓去皮

不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結

不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結



言十...
...
...
...
...

陳皮

半夏製

茯苓

桔梗

枳殼

貝母

瓜蒌仁

黃連

黃芩

梔子

蘇子

桑皮

朴硝

杏仁

甘草

右剉水煎入姜汁磨末香服

○一論遍身四肢骨節走注疼痛

難轉側或四肢麻痺不仁或苦

絡關節不利故也

清濕化痰湯

南星炮

半夏製

陳皮白

茯苓去皮

蒼朮米甘炒

羌活

酒苓

白芷

白芥子

甘草

右剉水煎入竹瀝姜汁磨末香

塊加乳香沒藥海石朴硝○

南星至膏處

頂痛加川芎威靈仙○手臂膊痛加薄桂引

○一論內傷七情痰迷心竅神

守舍神出舍空空則痰生以致增寒壯熱頭



清熱導痰湯
痛昏沈迷悶上氣喘急口出涎沫證類傷寒兼治中風痰厥氣厥不省人辯

人參

白水去芦

茯苓去皮

陳皮去白

半夏

姜製南星姜製

枳實炒

桔梗

黃連

黃芩

瓜蒌仁

甘草

右劉生姜煎入竹瀝姜汁同服

家傳清氣化痰丸

製造其得法

化痰清火開膈順氣消痞除脹醒酒消食

大南星四兩

大半夏四兩

二味先用米泔水各浸三五日以透為度

洗淨切片以碗一箇盛貯晒乾先姜汁次皂汁又次礬汁又取硝水晒乾

一用生姜汁浸一日又晒乾

一用皂角煎水去渣浸一日又晒乾

一用白礬一兩煮水浸一日又晒乾

一用朴硝一兩水煮浸一日又多洗晒乾

青皮去穰

陳皮去白

枳殼炒

枳實炒

白朮去芦

白茯苓去皮

蘇子炒

白芥子炒

萝卜子炒

香附炒

瓜蒌仁

乾葛

桔梗去芦

杏仁去皮



黄芩 酒炒 神曲 炒 麥芽 炒 山查 蒸去子 白豆蔻 壳前 胡 玉芦 甘草 各

右為細末用前浸四味藥水加竹瀝一碗泡蒸餅為丸如梧子大每服五七

十九丸或茶或姜湯任下

○一論健脾胃清火化痰頑痰能軟結痰能開疎風養血清上焦之火除胸膈

之痰清頭目止眩暈

千金化痰丸

胆星 四兩 半夏 姜礬牙皂同煮 陳皮 去白 白茯苓 去皮 二兩

枳實 炒 海石 大 天花粉 二兩 片苓 二兩 黃栢 酒炒 白附子 煨 二兩

知母 酒炒 當歸 酒洗 天麻 火燻 防丰 去苦 白附子 煨 二兩

甘草 生三兩 大黃 酒蒸九 木 炒 氣虛 加人參 八兩

右為細末神曲二兩打糊為丸如梧子大每服七八十九茶任下

○一秤金一名金珠化痰丸治嗽如神又治勞嗽

用半夏十斤米泔水浸十日換水三次取出切作兩半晒乾用白礬五斤

水一桶八銖鍋內化開將夏入礬水內浸二十日取出切作四瓣晒乾



用生薑十斤另研取汁再入半下
十斤去皮為粗八鍋內添水者數
熬成膏子和成劑每病重者用藥
與病人噙化忌房事此藥神効不可輕忽

○一治痰壅方

梨汁一鍾

生薑汁半鍾

蜜半鍾

南薄荷末三兩

右和勻重湯煮十餘沸任意食降痰驗如奔馬

○一論痰飲為病或狂或眩暈等症無不奏効

白丸子

中州傅明岐傳

用南星四兩

半夏十兩

白附子五兩

小川烏三兩

石俱切片春七夏三秋八冬十日水浸一日一換日晒夜露其星半夏放磁
器內少加薑汁同浸去麻性次將前藥磨又將絹巾濾去渣澄白粉晒乾白
米糊為丸如梧子大每服五六十丸薑湯滾水任下其藥放舌上不麻為度

方妙



針痰仙方 曾府秘方

礪砂 一不

白礪 牛生牛 柑一錢 磁青 上

細磁器打下 研細一錢

瓜蒂 狂青 礪石 煨紅洋

石共研細末 每用二釐 薄荷濃湯調

入鼻內即愈

○一人氣短有痰小便赤澁足眼作痛

尺脉浮大按之則澁此腎氣丸補飲也

用四物送六味丸不用而張仲景先

生云氣虛有飲用腎氣丸補而遂之誠

開後學之家賈濟無窮之天枉腎氣丸即六味丸也

○一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳 芩連益甚加桑皮杏仁盜汗氣促加貝

母煨殼不時發熱余以為脾肺虛寒 用八味丸以補土母補中益氣以接中

氣而愈

○一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物 二陳芩連枳殼之類不應更加祛風之

劑半身不遂筋漸攣縮四肢痿軟日 晡益甚內熱口乾形骸倦怠余以為鬱

怒傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙 散補中益氣湯六味地黃丸調治喜其

謹疾年餘悉愈形骸康健

補中益氣湯 見內傷

六味丸

八

味丸 俱見補益



咳嗽

脉咳嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞
極肝衰浮短肺傷法當咳嗽五臟之
多痰弦濇少血形盛脉細不足以息
夫咳謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰
脾濕也病本須分六氣五臟之殊而
云因風寒者鼻塞声重惡寒者是也
盜汗出兼痰者多作惡熱肺脹者動
痰出嗽止五者大槩耳亦當明其早
散之火熱則清之痰涎則化之濕熱
血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之
○一論四時感冒發熱頭疼咳嗽声重
膈不致傷脾此藥大解肌祛潮熱將
欲成勞痰嗽喘熱並効用



參蘇飲

紫蘇 前胡

桔梗

枳殼 去穢 乾葛

陳皮

半夏 湯洗

白茯苓 去皮各

甘草 三分

人參 五分

木香 三分

熱瀼 去之

石剉一劑姜炙煎服○若天寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗鼻寒

吉重加麻黃三不杏仁一不金沸草一錢以汁散之○若初感冒肺多不熱

加杏仁桑皮黃芩烏梅○胸滿痰多加瓜蒌仁○氣促喘嗽加知母貝母肺

寒咳嗽加五味乾姜○心下痞悶煩熱嘈雜惡心或停酒不散加姜炒黃連

枳實乾葛陳皮倍用之○鼻衄加烏梅麥門冬白茅根○心盛發熱加柴胡

黃芩○頭痛加川芎細辛○咳嗽吐血加升麻牡丹皮生地黃○人熱咳嗽

久不愈加知母貝母麥門冬○見血加阿膠生地黃烏梅赤芍牡丹皮○吐

血痰嗽加四物湯名茯苓補心湯○經脈傷寒去半夏加香附子

○一論二氣喘逆咽喉不利痰滯咳嗽口舌乾渴

二母清順湯

天門冬 去心 麥門冬 去心 知母 湯浸 貝母 洗 人參 五分



當歸身一錢 枯苓一錢

山梔子炒一錢

桔梗一錢

天花粉一錢 薄荷七分

生甘草三分

右剉水煎服

清熱寧嗽化痰定喘丸

橘紅五錢

青黛三錢

貝母七錢

胆星一兩

天花粉七水

桑白皮七錢

杏仁去皮尖七水

桔梗七錢

黃芩五水

前胡七水

甘草三錢

石為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸淡薑湯化下

○一論痰嗽服前方不効者多屬氣血虛弱四肢沉困宜入物湯加黃相知母

貝母麥門五味瓜蒌紫蘇陳皮等分薑棗煎服

一論咳嗽早間吐痰多夜間喘急不寐然早間多痰乃脾虛飲食所化夜

間喘急乃肺虛陰火上衝以後方服之

補中益氣湯

方見內傷

依本方加麥門冬五味子

六味地黃丸

方見補益依

本方加麥門冬五味子



○一論傷風寒鼻流清涕寒禁噴嚏此脾肺氣虛不能實膜理以補中益氣湯
主之

○一論咳嗽面白鼻流清涕此脾肺虛而兼外邪

補中益氣湯加茯苓半夏五味而愈

○一論咳嗽吐痰失音聲啞此元氣虛弱而致也

補中益氣湯加黃柏知母天門冬麥門冬五味杏仁黃芩瓜蒌仁

○一論咳嗽吐痰手足時冷此脾肺虛寒以補中益氣湯加炮乾薑半夏

○一論聲音不出用新槐花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷中補中時時將一

二粒口中咀嚼嚥之使喉中常有味久聲自出

○一治語言不出用

真蘇子二升訶子三箇杏仁三升百藥煎二兩

右為末每服二錢熱酒調服

○一治久嗽語音不出

訶子去核杏仁泡去皮通草二升



右到每服四錢烟薑五片水煎食後溫服

○一論云老人日久咳嗽不能臥者多年不愈用

猪板油 四兩 蜂蜜 四兩 米糖 四兩

右三味熬化成膏時時刻刻挑一匙口中噙化三五日其嗽即止

○一論久年咳嗽吐痰

杏膏

陳細茶 四兩 夏焙 烏紐末

白果肉 四兩 一半 去紅 去白膜 核桃肉 搗

家蜜 半斤

右藥入內煉成膏不拘時服

○一治久嗽不捷并虛勞喘嗽

紫苑 去告 頭 款冬花 各二兩 百部 五錢

右為末每服三錢生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後臨睡各一服

一論久嗽并連嗽四五十聲者用連皮生薑自然汁一勺加白堊二茶匙同

放茶碗內煎一滾溫服三四次即止



○一切咳嗽上氣者一道士專賣此藥不拘新久皆效

乾薑

桂心紫者

皂莢

肥去皮子肥入無孔者

右三味並另搗下篩了各秤分兩和合後更搗師一遍煉白蜜搜和又搗師二千杵每服三丸如梧桐子大不限食之先後嗽發即服日進三五服忌葱

蒜油膩麪物

○一論年久近日咳嗽哮喘喘急等症

神吸散 國子博士顏心吾傳

鴉管石火煨好醋碎七次一不

餘糧石火煨醋碎七次一不

官桂三分

粉草三分

枯白礬五分

款冬花五分

石膏五分

煨五分

右為細末每服三分二釐秤至夜食後靜坐片時將藥放紙上以竹筒五寸長直插喉內用力吸藥速亦不怕吸藥今畫為度以細茶一口嗽而嚥之忌雞魚羊鵝一切受風發物并生冷諸物惟食白煮猪肉雞子戒三七日日宜用公猪肺一副加肉半斤梔子一歲一箇炒成炭桑白皮不拘多少用水同炒至熟爛去藥至五更病人不要開口言語令人將湯肺嚥之病人嚼吃



任用餘者過時再食効

○一論久嗽痰喘百藥不効并久年不瘥者或能飲酒人久嗽尤効

清金膏 曲阜令孔桂宿傳

天門冬去心 麥門冬去心 貝母四兩

杏仁去皮 半夏姜製

右五味切片水熬去渣取汁五碗入白粉葛末四兩蜜一斤共煎汁入罈內

重湯煮一日成膏取出每日無時頻頻服之

○一人時唾痰涎內熱作渴肢體倦怠勞而足熱用清氣化痰益甚余曰此醫

水泛而為痰法當補腎不信另進滾痰丸一服吐瀉不止飲食不入頭暈眼

閉始信余用六君子湯數劑胃氣漸復却用六味丸月餘諸症悉愈

一人咳嗽氣喘鼻塞流涕余用參蘇飲一劑以散寒邪更用補中益氣以實

勝理而愈後因勞怒仍作自用前飲益甚加黃連枳實腹脹不食小便短少

二陳四苓前症愈劇小便不通余曰腹脹不食脾胃虛也小便短少肺腎虛

也悉因攻伐所致投以六君子加黃芪炮薑五味二劑諸症頓退再用補中

益氣加炮薑五味救劑全愈



○一治咳嗽秘方

款冬花三錢

石羔三錢

礪砂七厘

甘草三錢

右為末吹入喉內用細茶漱下即好

喘急

脉滑而手足温者生脉沉瀆而四肢寒者死救者亦死為其形損故也○肺受

邪則喘手太陰肺專主外感無汗而喘屬表實有汗而專屬表虛

凡久喘未發扶正氣為要已發攻邪為主大槩喘急甚者不可便用苦藥火氣

盛故也

○一論外邪在表無汗而喘者

五虎湯

麻黃三錢

杏仁三錢

石膏五錢

甘草一錢

細茶一撮

有痰加二陳湯

石劉一劑生姜葱水煎

肥加桑白皮一錢尤良



北京中醫藥大學
1954
中國醫藥大學圖書館版

○一論在裏邪不能便脈實而喘者

三乙承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實

甘草

加木香

檳榔

右劉生薑三片水煎熱服

○一論痰盛而喘者 此治痰喘不能卧人扶而坐數日一服而安

于緝導痰湯

南星 一錢

半夏

七個 水炮去皮分四片

赤茯

枳殼

麩炒各一錢

皂角

一寸炙 去皮一錢

甘草 一寸炙

右劉生薑一片大水煎服

○一論七情鬱上氣而喘者用

四磨湯

人參

檳榔

沉香

烏藥

右四味各用水磨汁合一處溫服之

三子湯 治氣喘如神

壽世果元

內集 三卷



蘇子 白芥子 蘿蔔子 水煎服立愈

○一論腹脹氣喘坐臥不得者宜服

沉香散

沉香^{二錢} 木香^{二錢} 枳殼^{三錢} 蘿蔔子^{三錢}

右判三劑生姜三片水煎温服

○一論喘急因內傷元氣氣不接續而喘者宜用

補中益氣湯^{方見內傷}

○一論陰虛火動火炎上攻而喘者宜此

清離滋坎湯^{方見勞瘵} 一用六味丸加黃栢知母亦効

○一論虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘促短氣咳嗽而喘者

蘇子降氣湯

蘇子^{三錢} 陳皮 厚朴^{姜汁炒} 前胡 肉桂^{各一}

半夏^{姜炒} 當歸^{三錢} 甘草^{一錢}

右判姜棗煎服



○一論一人痰嗽氣喘宜服
三子養親湯

白芥子研八分 蘿蔔子研八分 蘇子研八分 南星水泡八分 半夏水泡八分

陳皮去白六分 枳實炒六分 片苓去朽八分 赤茯苓去皮八分 甘草一分

石到一劑生薑三片水煎溫服

○一人體肥善飲仲秋痰喘用二陳苓連益甚加桑皮杏仁益汗氣促加貝母
枳殼不時發熱子以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣湯接補中

氣八味丸見補益

哮喘

脉大抵脉浮而滑易治微細而濇難治

夫哮喘以聲響名喉中如水雞聲者是也專土於痰宜用吐法亦有虛而不可

叶者治之有以紫金丹導痰小胃丹劫之而愈者有以六味地黃丸補中益

氣湯兼而進而愈者必須量虛實而治之也



于金定喘湯 治哮喘如神

麻黃 三錢 桑白皮 三錢 杏仁 一錢 蘇子 二錢 白果 炒二十

款冬花 三錢 黃芩 一分 炒 半夏 一錢 甘草 一錢

右剉白水煎食遠服

諸病原來有藥方 喘急胸喘最難當 麻黃桑杏尋蘇子

白果冬花更又良 甘草黃芩同半夏 水煎百沸不須薑

病人遇此仙方藥 靈效方知定喘湯

○一論人素有喘急遇寒膈不常發則不已哮喘夜不得睡者用此

蘇沉九寶湯

紫蘇 薄荷 麻黃 杏仁 桂皮 桑白皮

大伏皮 官桂 甘草

右剉用生薑三片烏梅一箇水二碗煎至八分食後服即効且住服唯填勞碌戒厚味節慾日間常服些順氣化痰丸夜卧時服抑火潤下丸如除根須修合六味地黃丸加黃柏知母人參紫苑五味子百合各二兩淨小麥粉熟



蜜四兩打糊爲丸每服百丸空心柿餅湯送下餅隨食之

二母丸 治哮喘

知母 去皮毛

貝母 去心

百藥煎 一兩

右爲細末將烏梅肉蒸熟搗爛爲丸如梧子大每服三十九丸臨臥或食後連

皮薑湯送下

○一論喘氣哮吼上喘不休或是鹽飮水飮肺竅俗謂之喘氣病用此

秘方

小薊草一把用猪脷肉四兩入水同燉令熟食肉并湯立已其草三月生

七八月有四稜莖葉尖妙有花子

○一論凡遇天氣欲作雨者便發齆喘甚至坐卧不得飲食不進此乃肺竅中

積有冷痰乘天陰寒氣從背自鼻而入則肺脹作聲此病有苦至終身者亦

有子母相作者每發即服不過七八次覺痰腥臭吐出白色是絕其根也用

此方

紫金丹

壽世果元

方集三卷

三



中醫藥大學圖書館藏

白砒一錢 生用

枯白礬三錢 研

淡豆豉出江西省一兩水潤去皮蒸研如泥旋加二味未合勻

右攪作丸如棗豆大但覺寒發用冷茶送下七丸甚者九丸以不喘為命再

不必多增丸數慎之小兒服一二丸

導痰小胃丹方見痰飲治哮喘經年不愈宜久久服之斷根

○一論哮喘氣急而不得息者宜用

均氣八仙湯

麻黃二錢

杏仁二錢

石膏三錢

桔梗一錢

片苓二錢

知母二錢

貝母一錢 分

用北細辛三湯許炒二母

生甘草一錢

右劉一劑水煎溫服

○一治上氣喘急經年咳嗽訶訶久不愈遇發即服服三五次永不再發

奪命丹

人言一錢

白礬二錢

白附子二錢

南星四錢

半夏泡五錢

右先用人言與白礬一處於石器內火煨紅出火黃色為度切不可犯鐵器

却和半夏南星白附為末生薑汁煮麪糊為丸黍米大硃砂為衣每服七丸



小兒三九并水化下忌食熱物

哮喘靈秘丹 方上異人傳

胆南星 二兩 大半夏 二錢 同反 白礬 五錢 牙皂 五錢

苦草 二兩 大貝母 三兩 沉香 一兩 青蒙石 五兩 天竺黃 二錢

珍珠 三小豆 羚羊角 二錢 烏犀角 三錢 白礬 一兩 礪砂 一兩

風化硝 五錢 花蕊石 五錢 孩兒茶 五錢 欵冬花 一兩 鉛白霜 五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸臨臥淡薑湯下外製六味地

黃丸空心服百發百中直仙方也

○一治素患哮喘之疾發則喘急痰嗽上壅不時舉發令慎勞役戒厚味節慾

早服六味丸加黃精知母入參紫苑五味百合各二兩浮小麥粉蜜四兩打

糊為丸每服百丸空心柿餅湯下餅隨食之夜臥時服總方各一料而愈

千金定吼丸

南星 半夏 各四兩 用生薑牙皂各二兩煎湯後星半一宿切片再

用星 貝母 枳實 黃連 黃芩 酒炒



連翹 去心

白附子

天麻

僵蚕 炒

桔梗

瓜蒌仁 略一

錦紋大黃

晒九

青蒙石 用醋炒

沉香 五錢

右為細末竹瀝薑汁和為丸如彈子大每服一九臨臥口嚙化下或丸如茶

米大薑湯下亦可

○一人哮喘十數年發則上

喘促咳嗽吐痰自汗四肢厥冷六脉沉細此

虛脾弱

黃芪 蜜水

人參

白朮 去芦

白茯苓 去皮 半夏 姜炒

杏仁 去皮

五味子

麥門冬 去心

天門冬 去心 陳皮

甘草

右劉薑棗煎服

○一人自幼患哮喘之病每遇寒即發發則上氣喘急咳嗽痰涎上壅年久不

瘥已成痼疾百藥罔效子製此方三料全愈

清上補下丸

懷生地黃 補鍋內酒拌

白朮 酒蒸去核二兩

懷山藥 二兩

白茯苓 去皮一兩五錢

牡丹皮 一兩五錢

澤瀉 二兩五錢



遼五味子 一兩五錢

大門冬 去心一兩五錢

麥門冬 去心一兩五錢

枳實 炒一兩五錢

貝母 一兩五錢

枳殼 去片一兩五錢

黃連 薑炒一兩五錢

杏仁 去皮一兩五錢

半夏 薑炒一兩五錢

瓜蒌仁 去油一兩五錢

枯苓 酒炒一兩五錢

甘草 五錢

右為細末煉蜜為丸如梧
桐子大每服三錢空心淡薑湯下

瘧疾

脈弦數滑實皆順沉細虛微為逆○瘧脈自弦微刺為虛代散則死

瘧症皆因先傷於暑次感於風客於榮衛之間腠理不密復遇風寒閉而不由

合於腸胃之外與榮衛並行晝行於陽夜行於陰並則病作離則病止併於

陽則熱併於陰則寒淺則日作深則間日在氣則早在血則晏按本經曰瘧

脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦短者傷食弦滑者多痰弦而緊者宜下

浮大者宜吐弦遲者宜溫此治瘧之大法其病熱多寒少心煩少睡者屬心

名曰溫瘧用柴苓湯俱寒少熱腰疼足冷者屬腎名曰寒瘧用桂附二陳湯



先寒而後大熱咳嗽者屬肺名曰癰瘡用參蘇飲熱長寒短筋脈掣縮者屬肝名曰風瘡用小柴胡湯加烏藥香附寒熱相停嘔吐痰沫者屬脾名曰食瘡用清脾飲瘡愈之後陰陽兩虛夢遺咳嗽不善保養遂成勞瘵若其氣虛養體節食避風如此調治無不愈矣

○一論瘡疾無汗要有汗散邪為主大凡瘡疾初起宜服此發散出汗立愈

此方

散邪方

川芎 白芷 麻黃 白芍 防風 荆芥 紫蘇

羌活 甘草

右剉生薑三片葱白三根水煎露一宿次早溫服○有痰加陳皮○有濕加蒼朮○夾食加香附

○一論瘡疾有汗要無汗正氣為主宜用

正氣湯

柴胡 前胡 川芎 白芷 半夏 麥門冬



檳榔

草果

青皮

茯苓

桂枝

甘草

右剉薑棗煎預先執服

○一論瘧疾不論先寒後熱先熱後寒諸瘧通用

清脾飲

青皮

大蘆厚朴

姜炒白朮

去苦

半夏

姜炒

柴胡

黃芩

茯苓

草果

甘藷

右剉生薑五片水煎溫服

○一論諸瘧寒熱交作陰陽不分口乾發渴小便赤澀或作吐瀉用

加減柴苓湯

柴胡

黃芩

半夏

姜製

猪苓

澤瀉

蒼朮

米泔 青皮

厚朴

姜炒 檳榔

草果

烏梅

甘草

右剉姜棗煎服

○一論五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾并

治諸瘧

壽世保元

卷之三

左



四獸飲

人參 白朮 去苦 白茯苓 去皮 橘紅 半夏 姜製 草果仁 烏梅 去核

甘草 生薑 棗子 各等分

右剉以鹽少許淹食頓用厚皮紙包裹以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服

一兩水一碗煎半碗溫服未發前連進數服神效

○一論人平素不足兼以勞役內傷挾感寒暑以致瘧疾寒熱交作肢體倦怠

之力少氣成瘧發經年不愈則氣血皆虛瘧邪深入名曰瘵瘧此方主之

加味補中益氣湯

黃芪 蜜炒 人參 八分 白朮 去芦 陳皮 六分 當歸 八分

柴胡 一錢 升麻 三分 白芍 八分 黃芩 一錢 半夏 製 八分

甘草 五分

右剉姜棗煎空心服○有汗加桂枝五分倍黃芪○熱盛倍柴芩○渴加麥

門冬 天化粉

○一治傷暑發瘧宜服



論瘧疾一日一發或二日一發或三五日一發或經三兩月或半年一發或試用止截太過久不能愈者此元氣脾胃太虛以

補中益氣湯方見玉傷依本方加常山檳榔知母貝母一二劑效已愈後去四

味只用本方調呷多服自然正氣盛邪氣自退矣

○一論患瘧寒熱用止截之劑反發熱惡寒飲食少思神思昏倦脈或浮洪或

微細此陽氣虛寒以

補中益氣湯方見內傷依本方參芪歸朮各用三錢甘草一錢五分加炒乾薑

炮附子各一錢一劑寒熱止數劑元氣復

○一論經年久瘧氣血俱虛而三日五日一發者以

十全大補湯方見補益依本方益邪氣在陽分淺而易治邪氣在陰分深而難

治宜多服為良

○一治三年久瘧不瘥用揀參乾生薑各五錢酒調服汗出立止

○一凡瘧後形體骨立發熱惡寒食少體虛補中益氣內參芪歸朮各加二錢

甘草一錢五分炮薑二錢一劑而寒熱止數劑而元氣復



○一婦人瘧久不已發後口乾倦甚用七味白朮散加麥門冬味作大劑煎服
次飲再發稍可乃用補中益氣加茯苓半夏十餘劑而愈凡截瘧余常以參
朮各一兩生薑四兩煨熟煎服即止或以大劑補中益氣加煨薑尤効生薑
一味亦効

○一凡久瘧多屬元氣虛寒益氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱
陰火下流則寒熱交作或吐涎不食戰慄泄瀉手足厥冷皆脾胃虛弱宜補
益湯諸症悉愈若手足厥冷加大附子

○一婦人久患瘧瘧作則經不行形虛脉大頭痛懶食大便泄瀉小便淋瀝口
乾唇裂內執腹脹益由久瘧正氣已虛陰火獨旺以益氣湯治之尋愈惟不
時頭痛加蔓荊子而止又兼六味丸而經行

痢疾

松花一水宜浮滑大不宜弦急身寒則生身熱則死

一治用川芎一服他多由感受風寒暑濕之氣及飲食不節有傷脾胃宿積

麻黃一兩

桂枝二兩

黃芩三錢

桃仁十枚

甘草炙三錢

右剉水煎服桃仁散血經肝之藥

○一久瘧腹中有癖用水壓沉香不雄黃解毒丸打下黑血如泥極臭是其驗也
方見通治

○一海外高僧傳于周少峰治瘧疾不問新久虛實寒熱諸般鬼瘧邪瘧瘧瘧

瘧瘧一服立愈其効如神

番木鱉即馬錢子去殼

雄黃一錢

硃砂一錢

甘草一錢

右共為細末每服四分其瘧將發預先吃飯一碗將藥水酒調服被蓋卧即愈

○一治瘧先寒後熱熱多寒少或單熱不寒者

桂枝五錢

石膏五錢

知母一兩

黃芩二兩

右剉水煎服

○一治瘧疾服藥寒熱轉天者知太陽陽明少陽三陽合病也

小柴胡湯加石膏知母桂枝水煎服



○一治久瘧不能食胸中鬱鬱欲吐而不吐以此吐之

雄黃

甜瓜蒂

赤小豆

各等分

右為末每服五分溫水調下以吐為度

○一論久瘧結成癥瘕癖在胸脇之間諸藥不愈者宜

麥瘧飲

蒼朮 米泔浸

草果 去皮

桔梗

青皮

陳皮

良薑 各五錢

白芷

白茯苓

半夏 湯洗

枳殼 麩炒

桂心

乾薑 炮

蘇葉

川芎 鎔二

甘草 錢二

右每服二兩水煎入鹽少許空心服

○一治久瘧腹中痞塊川

阿魏丸

鱉甲 醋炙

三稜 醋浸

莪朮 醋浸

香附子

米泔浸各一兩五錢

陳皮 一兩

真阿魏

右為末醋糊為丸梧桐子大每服三十九淡薑湯送下



香菇散

香菇四錢 厚朴姜汁

扁豆各一錢 烏梅一箇

右水煎臨熟入薑汁一匙 溫服

○一論熱藥火盛舌卷焦黑 鼻如烟色六脉弦洪而緊此乃陽毒而深治以青布摺疊數重新汲水浸之 搭于胸上須臾再易如此三次熱勢稍退即服

龍虎湯

柴胡一錢五分

黃芩七分

半夏七分

石膏二錢五分

知母一錢

黃連一錢五分

黃柏八分

梔子八分

粳米五十

右剉薑棗煎服

○一治瘧瘧大熱煩燥宜用

地龍飲子

生地龍三修研入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調和服如熱加龍

腦少許

○一治虛弱之人患瘧初起感寒者宜



五積散依本方用薑芎煎服

方見中寒

○一論體虛之人患瘧寒多，久不愈者，不可用截藥，宜用

分利順元散

川烏一兩去皮 附子一兩去皮

生半熟 南星二兩半

木香五錢

右剉每服四錢，生薑十片，藥七枚，水一盞，煎七分，當發早晨速進二三服，生半熟能分解陰陽也。

○一論諸瘧不問先寒後熱，或先熱後寒，或寒熱獨作，或連日并發，或間日一

發，頭疼惡心煩渴，引飲氣息喘急，口苦咽乾，諸藥不効者，宜服此截之。

常山飲子

常山一錢

草果不去皮 知母二錢

良薑一錢

烏梅一錢

甘草多一錢

右剉一兩一劑，棗五枚，未發時前連進二服。

○一論瘧疾夜發者，乃陰經有邪，此散血中之風寒也，宜此

麻黃桂枝湯



結而成也其症大便窘迫裏急後重致至圍而不能便腹中疼痛所下或白或赤或赤白相雜或下鮮血或如豆汁或如魚腦膿血相雜或如屋漏水此為感之有輕重積之有淺深也其濕熱積滯于於血分則赤于於氣分則白赤白兼下氣血俱受邪也雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治之但分新久更量元氣用藥片痢初患元氣未虛必須下之下後未愈隨症調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下大便了而不了者血虛也數至圍而不便者氣虛也

○丹溪曰痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來

下痢不治症
下如魚腦半生半死
下若屋漏水者必亡
下若塵腐色者必死

下純黑者死
下如竹筒直出者死
下純紅者難治

身熱脉大者死是亦大槩言之耳小便絕不通為胃絕

鎮國將軍丸 治痢之總司也

錦紋好大黃一斤切薄片分作四處聽用



一分用川黃連去毛一兩切片水浸汁拌大黃同炒乾為度
一分用吳茱萸去梗一兩用水泡出汁拌大黃同炒乾為度

一分用人乳汁浸拌大黃同炒乾為度

一分用童便浸大黃炒乾為度

右四分共合一處為細末酒打米糊為丸如梧子大將一牛三蒸三晒將

分晒乾各包聽用

如白痢用吳茱萸煎湯送下三十九半生半熟

如赤痢用黃連煎湯送下三十九半生半熟

如赤白痢用吳茱萸黃連煎湯送下三十九半生半熟

○一論赤白痢疾初起積滯不行裏急後重頻登周而去少腹痛等症宜先用

此下之

香蓮化滯湯

當歸尾一錢 白芍一錢

黃連一錢

黃芩一錢

黃柏一錢

枳殼一錢五分

檳榔一錢

大黃三錢

滑石三錢



甘草三分 水香一錢

右剉水煎空心熱服

○一論下痢白多不拘新久或用前藥下後未愈者用此和之

白木和中湯

當歸 酒洗上

白芍 炒上

白茯苓 去皮陳皮

黃芩 炒中

黃連 炒有礙

甘草 下

水香 少煎

右剉水煎食前服

○一論下痢紅多不拘新久或用前藥下後未愈者用此調之

當歸調血湯

當歸 一錢

川芎 一錢

白芍 三錢

黃連 一錢

黃芩 一錢

桃仁 一錢

去皮尖升麻 五分

右剉一劑水煎空心服○如白痢加吳茱萸炒一錢琴連用酒炒○赤白痢

加白木茯苓陳皮香附各一錢

○一治赤痢血痢痛不可忍又治血痔其効如神病雖垂殆一服即愈



逐瘀湯

阿膠炒

枳殼麩炒

茯苓

茯神

白芷

川芎

赤芍

生地黄

莪朮

木通

五靈脂炒

生薑炒

生甘草銹

桃仁去皮

大黃各一分

錢

右剉一劑小一鍾半入蜜三匙再煎溫服

○一治素有積熱下痢白膿腹痛膨脹晝夜無度漸至大便閉結小便不通此

三焦有實熱也服此即愈或下痢純紅或赤白相雜皆

青臙解毒湯

黃連

黃芩

黃栢

梔子

大黃

連翹

滑石

木通

車前子

海金沙

枳實

莪朮

右剉水煎空心服

○一治脾疳泄瀉痢疾屬氣虛宜此

加味六君子湯

人參

白朮去苳

白茯苓

令去黃芪銹

懷山藥二

砂仁銹

甘草五分



右剉一劑棗三枚水煎空心溫服○如腹痛加炒黑乾姜木香各五分烏梅一箇

○一論下痢赤白膿血相雜腹痛裏急後重晝夜無度日久不愈不能起牀不

思飲食疲倦之甚或服寒涼峻利之過者宜

加減補中益氣湯方見內傷依本方去柴胡加白芍炒澤瀉木香砂仁白豆蔻

地榆御米殼醋炒三分

○一論曾經服推滌藥過多又服攻擊殺伐等他醫而不効者以致形氣極弱

去無休息積色惡候出者並與救之

養臟復元湯

人參三錢

白朮去蘆炒一白茯苓去蘆

白豆蔻去壳研

乾姜炒黑一錢

粟殼去殼炒五分一製附子五分

烏梅二箇

木香一錢

甘草炒五分

右剉一劑北棗三枚水煎空心溫服渣再煎服謹節飲食

○一論噤口痢其症有冷有熱有令熱不調者須先發散表裏如手心熱且赤



是熱宜敗毒散加陳米煎服如手心冷及純下白痢者是寒宜用蓮肉不去心爲末明米飲調服三錢○敗毒散方見或胃又治疫痢發熱合境皆然者神効加白芍黃連尤効

○一治虛弱人噤口痢飲食不下

參苓白朮散方見內傷依本方加石蓮肉石菖蒲各二兩或有氣加木香

五錢

右共爲末每服二錢棗湯調下噤口痢梗米湯下○休息痢砂糖湯下

○一治下痢噤口諸藥不効者以

醇酒半盞姜汁半盞倉米湯半盞三味合一處入陳乾松朮一撮揉爛

并食之胃口立開如口不開用鐵筋撥開牙齒灌下立已

○一治噤口藥食俱不受用

田螺數枚連壳搗爛入麝少許調勻填滿臍內引熱下降服藥再不吐矣

○一治噤口痢食不下

老倉米炒香熟爲末淮鹽火煨每米粉三四匙鹽少許白滾水下



○一治下痢噤口點眼方 黃貫江

用首胎糞炙乾研一錢加雄黃一粉 胡黃連細粉片腦少許共為細末羅

點兩眼角

傅明岐傳

○一治下痢噤口

用首胎糞磁器收入水銀養任入瓶 少許點眼角即能食

○一治下痢噤口

胡養桓傳

用雞一隻去毛糞切片入罐內用胡椒末五錢入水同煎用皮帚重重密

對待熟用簍子刺孔令患人鼻聞孔之氣立時思食

○一治下痢噤口飲食不下多是胃氣熱其

用黃連三錢人參五分 廿早五分 一方加石蓮肉多一錢

右用水煎終日呷之如吐再強飲但得二呷下咽便好

又方以秤錘燒紅用好醋淋令病人開口吸氣吞之即効

○一治痢疾發餽益尤散用人參白朮前湯調下頻服自止

○一治久痢休息不止百方不効用黃連末木香末十分之一猪膽頭丟油入



藥水煮爛搗爲丸如梧子大每服五十丸空心米湯下

○一人年老久痢不止肌瘦如柴晝夜苦楚命已垂危用人參一兩水煎服之

鼻有微汗而甦後用十全大補湯調理而安

○一人下痢小腹急痛大便欲去不去此脾胃氣虛而下陷也用痢中益氣送

八味丸二劑而愈此等症候因利藥致損元氣肢體腫脹而死者不可枚舉

○一人停食患痢腹痛下墜或用疎導之劑兩足腫脹食少體倦煩熱作渴脈

洪數按之微細予以六君子加姜桂各二錢吳茱萸五味各一錢煎熟冷服之

即睡覺而諸症退再劑全安此假熱而治以假寒也

○一人嘔吐不食腹痛後重自用大黃等藥一劑腹痛益甚自汗發熱昏憤脈

大予以參朮各一兩炙甘草炮乾姜各三錢升麻一錢水煎一服而甦又用

補中益氣湯加炮乾姜二劑而愈

○一人痢後兩足浮腫胸腹脹滿小便短少用分利之劑遍身腫兼氣喘予曰

兩足浮腫脾氣下陷也胸腹脹滿脾虛作痞也小便短少肺不能生腎也身

氣喘脾能生肺也予以補中益氣湯加大附子而愈牛載後因飲食勞倦

兩目乳腫小便短少仍服前藥頓愈

○一人下血服犀角地黄湯等藥其血愈多形體消瘦發熱少食裏急後重此

脾氣下陷余用補中益氣加炮姜一劑而愈

○一人血痢及下血不止以六味丸加地榆阿膠炒黃連黃芩生地黃

○一人患痢後重自知醫用芍藥湯后重益甚飲食少思腹寒肢冷予以芍脾

胃虧損用六君湯加木香炮姜三劑愈

泄瀉

脉多沉傷於風則浮傷於寒則沉細傷於暑則沉細傷於濕則沉緩洩而腹脹

脉弦者死又云脉緩時微小者生浮大數者死

夫泄瀉屬濕屬氣虛有火有痰有食積有寒有脾泄有腎泄凡瀉水腹不痛者

濕也飲食人胃不佳完谷不化者氣虛也腹痛瀉水如熱湯痛一陣瀉一陣

者火也或瀉或不瀉或多或少者痰也腹痛泄而泄瀉瀉後痛減者食積也

肚腹痛四肢冷者寒也常常泄瀉者脾泄也五更泄者腎虛也宜分別而治



也大槩泄瀉因濕傷其脾者居多以胃苓湯加減主之

○一論中暑傷濕停飲夾食脾胃不和腹痛泄瀉作渴小便不利水穀不化陰陽不分者濕也

胃苓湯 主方

蒼朮

米泔浸

厚朴

姜汁炒

陳皮

諸苓

澤瀉各一升

白朮

去其皮

白茯苓

五分

白芍

五分

肉桂

甘草

炙

右剉一劑生姜三片棗二枚水煎溫服○泄瀉稍久加升麻防風○有熱者

加酒炒黃連○有寒者加炒乾姜○暴泄服瀉加滑石○食積加山查神曲

○有痰加半夏烏梅○氣虛加人參白朮○氣腦加木香○久瀉加乾姜肉

蔻○暴痢赤白相禱腹痛裏急後重去桂加檳榔木香黃連水煎服

○一論泄瀉飲食入胃不住完穀不化者氣虛也

益氣健脾湯

人參

白朮

去其皮

白茯苓

去皮

陳皮

白芍

炒

糯米

未泔浸

乾姜

炒黑

梔子

煨

肉桂

麩炒

升麻

酒洗



甘草

右判姜棗煎服○腹痛加桂心忌油膩

○一論泄瀉腹痛瀉水如熱湯痛一陣瀉一陣者火也宜

加味四苓散

白朮法皮 白茯苓法猪苓

澤瀉

木通

梔子

黃芩

白芍

甘草

右判燈心十莖水煎空心服

○一論泄瀉或多或少或瀉或不瀉者痰也宜

加味二陳湯

陳皮

半夏姜炒

白茯苓法皮

白朮法皮

蒼朮米泔浸炒

厚朴姜汁炒

砂仁

山藥

車前子

木通

甘草法猪

右判一劑生姜三片烏梅一箇燈心十莖水

煎溫服

○一論泄瀉腹痛甚而泄瀉七後痛滅者食積也用

香砂乎胃散

壽世保元

方集三卷

三四



南京中医药大学图书馆版

蒼朮

米泔浸

陳皮

厚朴 姜炒

白朮 去青炒

曰茯苓皮半夏姜炒砂仁

香附 炒

神曲 炒

白芍 炒

甘草 炙

右劉生姜煎服

○一論劉草窗痛瀉要方傷食腹痛得瀉便減合瀉而痛不止故貴之注敗木

賊也

白朮 炒 三錢 白芍 炒 一錢 陳皮 炒 一分 防風 一糸

右劉水煎溫服

○一論泄瀉肚腹疼痛四肢厥冷者寒也宜

附子理中湯

白朮 土炒

乾姜 炒

人參

白茯苓 去皮

砂仁

厚朴 姜炒

蒼朮 米泔浸炒

熟附子

甘草 炙

右劉生姜水煎服

○一論泄氣弱易飽常常稀澹者此脾泄也用

扶脾散



連肉去心 陳皮 白茯苓 白木陳壁 麥芽炒

右為細末每服二錢白沙糖二錢滾白水送下補脾助元氣令人能食止瀉

○一論滑瀉日夜無度腸胃虛寒不禁宜服

八柱散

人參

白木去心 炒

肉蔻煨

乾姜炒

柯子煨

大附子

麩裏煨 去皮脐

栗殼蜜水炒

甘草炙

右判一劑姜一片烏梅一箇燈心一團水煎溫服

補脾丸

症治同前

白木

去芦十兩分四分一肉蔻二

薑三圓昏

蓮肉

去心炒 人參 甘草

白芍炒 絡

木香煨 四條

山藥

炒 陳皮 各 七條 乾姜炒 三條

右為細末煮粥加炒神曲木打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心淡姜湯

下專治老人弱人脾泄噴泄殊中

○一論泄瀉脾腎虛弱侵晨五更作瀉或全不思食或食而不化大便不實者



此腎泄也凡飯後隨即大便者蓋脾腎交濟所以有水穀之分脾氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而大腑為之發泄也治法用二神丸主之

神丸

破故紙 四兩炒 肉豆 蔻 二兩生瓦

右為末用大紅棗四十丸箇生姜四兩切碎同水煮熟去姜取棗肉和為丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下加吳茱萸炮炒一兩五味子二兩

名四神丸治經年久瀉不止者神効

○一人善飲便滑瀉泄食減胸滿腿足漸腫症屬脾胃虛寒以金匱腎氣丸食進腫消更用八味丸胃強脾健而愈

○一人病瀉每至五更嘔即利此腎泄也用五味子散數服而愈因起居不慎泄復作年餘不瘥此命門火虛不能生脾上法當補其母火者土之母也遂用八味丸補其母瀉即止食漸進東垣云脾胃之氣盛則能食而肥虛則不能食而瘦全賴命門火為生化之源滋養之根也故川八味丸靈効只用六味丸亦可



○一論大便滑利小便閉
澀或肢體漸腫喘嗽唾痰為脾腎氣血俱虛

十全大補湯 方見補益送 下四神丸

○一論腎虛久瀉不止用
六味地黃丸加五味子破故紙肉豆蔻吳茱萸

大抵久瀉多由泛用消食
利水之劑損其真陰元氣不能自持遂成久瀉非

補中益氣湯四神丸滋
其本源後必胸痞腹脹小便淋瀝多致不起

○一人患泄瀉日久不止
以致元氣下陷飲食入胃不住完谷不化肌肉消削

肢體困倦面目兩足腫
滿上氣喘急此元氣脾胃虛之甚也宜

補中益氣湯 方見內傷 依
本方減當歸加酒芍茯苓澤瀉山藥蓮肉木香乾姜

炒黑止泄瀉之良方也
食化遲化瀉及脾胃素蘊濕熱但遇飲食勞倦即發

○一泄瀉因內傷勞倦飲
而肢體酸軟沉困泄瀉 宜以益氣湯去當歸加炒芍茯苓蒼朮猪苓澤瀉姜

束之前服

按右諸方治泄
瀉有濕瀉有氣虛瀉有火瀉有痰瀉有食積瀉有土

敗木賊瀉有寒
瀉有脾瀉有脾胃瀉有元氣下脫瀉有腎瀉有虛寒



北京中医药大学图书馆藏

滑脫久瀉不止者宜依病對方而用也

○一人食下即響響而即瀉不敢食一些食之即瀉諸藥不効以生紅柿核

包水濕灰火燒熟食之不三四箇即上

○一秘方治泄瀉

用雞子一箇將小頭破開人胡椒七粒紙糊頂煨熟好酒送下燒酒更妙

將胡椒完吞下

○一泄瀉二三日或腹疼痛生姜豆豉胡椒煎湯熱服立止

○一治暴泄不止小便不通車前子炒為末每服二錢米飲調下其根葉亦可

搗汁服此藥利水道而不動元氣

○一治泄瀉用積豬肚一枚淨洗去脂膜入大蒜在內以水煮爛搗膏入蒼朮

汁製陳皮厚朴姜炒甘草炙等分為末同杵為丸如梧桐子大每服二三十

丸空心米湯下鹽湯亦可

○一治許州黃太守患泄瀉二三年不愈每飲燒酒三鍾則止二三日以為常

畏藥不治召余診之大脉弦數先服此藥以解酒毒後服理氣健脾丸加澤



瀉而愈方見傷寒門

宜黃連一兩 主姜 四兩

右為一處以慢火炒令姜乾脆色去姜取連搗末每服二錢空心服茶清下甚者不過二服專治久患脾洩

○一大便澹泄米谷不化用

黃連酒炒 白芍煨 吳茱萸炒各等分

右為細末用小米飯為丸如梧子大每服五六十丸空心米湯送下

○一治泄瀉手足冷不渴腹痛用人參白朮乾姜甘草水煎熱服中寒重者加

附子

○一治久瀉大腸滑泄五倍子炒五兩為末麩糊為丸如梧子大每服五丸米飲下日一服

六味丸 金匱腎氣丸 八味丸 十全大補湯俱見補益

補中益氣湯見內傷

補遺



三白散 治一切瀉泄如神

白朮 去芦炒 白芍 炒一分 白茯苓 去皮 澤瀉 一分 厚朴 姜炒

黃連 炒各 乾姜 分五 烏梅肉 煎服

如兼傷食加 神曲炒 麥芽炒 各一錢

右劉生姜三片 水煎食前服為末 神曲為丸服九粒

霍亂

脈大者生○脈微弱而遲者死○脈代者霍亂氣少不語舌捲囊縮者皆不治

夫霍亂者揮霍變亂也其證心腹卒痛嘔吐下利發熱增寒頭痛眩暈或瀉而

不吐或吐而不瀉先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚

則轉筋頰頓手足厥冷死生反掌問耳治宜藿香正氣散加生姜為上不惟

可以溫散風邪抑亦可調理吐瀉蓋有吐有瀉名溫霍亂死者少也若上不

得吐下不得瀉名乾霍亂而死者多也治之急須以鹽湯灌之令其大吐庶

有可生者切草與穀食雖米飲一呷入口即死必待吐瀉過二三時直至飢



甚方可與稀粥慢慢調服可也轉筋不仕男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩邊此千金妙法也

○論四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣兩濕蒸氣或中寒腹痛吐利中暑胃風吐瀉中濕身重泄瀉或不服水土脾胃不和飲食停滯復感外寒頭痛增寒或嘔逆惡心胸膈痞悶或發熱無汗者並治

藿香正氣散

藿香 二錢

紫蘇

陳皮

厚朴 姜汁炒

半夏 姜汁炒

白朮 去芦炒

白茯苓

去皮 桔梗 去芦

大腹皮

白芷 各一錢

甘草 五分

右對一劑生姜棗子煎服○霍亂轉筋加木瓜○腹痛加炒白芍○寒痛加官桂冷甚加乾姜○飲食不化心下痞悶加香附砂仁○米穀不化加神曲暑冒風加香茹扁豆○時氣增寒壯熱加柴胡乾葛○發熱加麥門冬淡竹葉○口渴作瀉小便不利合五苓散○濕熱相搏霍亂轉筋煩渴悶亂合黃連香茹散○心腹絞痛加木香○若頻欲登園不利者加枳殼



南京中醫藥大學圖書館藏

○一論霍亂之疾未有不由內傷生冷外感風寒而致也余用藿香正氣散治之百發百中一歲之內常治百人未有弗甚者加乾姜萬無一失又腹痛加桂痛甚去藿香加吳茱萸小使不利加茯苓如乾霍亂加枳殼白茯苓官桂最嘉

○一治虛弱之人上吐下瀉霍亂手足厥冷腹痛脈微者乃陰症也

理中湯

人參

白朮去苦炒

乾姜炮

甘草炙各等分

若為寒氣濕氣所感者加附子一兩

名附子理中湯

若霍亂吐瀉加青皮陳皮各治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以益湯頓服候吐出即進此藥

若嘔吐者於治中湯內加香半夏生姜干片

若泄瀉加橘皮茯苓名建中湯

若溏瀉不已於補中內加附子一兩

若不喜飲食米穀不化加砂仁附子陳皮茯苓



若霍亂吐不心腹作痛手足厥冷去白朮加附子各四順湯

若傷寒結胸先以桔梗湯再下想及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起急煎

手不可近者加枳實茯苓枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯加天花粉○渴欲飲水加白朮

若霍亂轉筋理中湯加火煨石膏

若臍上築者腎氣動也去白朮加桂腎惡燥去白朮恐作奔豚故加官桂

若悸多加茯苓

若腹滿去白朮加附子

若飲酒過多或啖炙煖食發為鼻衄加川芎

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈

○一論轉筋霍亂上吐下瀉腹內疼痛及乾霍亂俗名攪腸沙真陰症手足厥

冷宜服

理中丸

人參

乾姜炮

白茯苓 去皮甘草炙各等分



右為末煉蜜為丸每重一錢細嚼淡姜湯下忌食米湯此即理中湯改為丸取土能寒水之義若仍前湯則不効矣

○一論乾霍亂者俗名攪腸痧其症因宿食不消心腹攪痛欲吐不吐欲瀉不瀉揮霍撓亂所傷之物不得出洩故也死在須臾急宜多灌益湯探吐之令物出盡却服理中湯或理中丸亦可針刺十指出血并委中出血

○一霍亂身熱口渴此熱暑中也加減如苓湯

猪苓

澤瀉

香茹 各七分 乾葛

赤茯苓 一升

右剉一劑生姜煎服○如執極加石羔知母○泄極加升麻滑石○腹痛加炒芍藥五分桂三分寒痛亦如此

○一霍亂吐瀉用生姜細切以新汲水調益元散頓熱服之立止

○一論霍亂吐瀉因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘車舟傷動胃氣令人上吐下瀉不止頭暈眼花手足轉筋四肢厥冷用藥遲緩須臾不救

百沸湯



吳茱萸、五苓木瓜、五苓、食鹽、五苓

右三味同炒焦用百沸湯煎隨病人意冷熱服之

一方用枯白礬為末每服一錢百沸湯點服

○一治傷食吐瀉腹脹

順逆丹

白朮去昔上炒

白茯苓去皮 陳皮

川厚朴去皮姜炒 澤瀉各一兩

猪苓八分

蒼朮米泔浸神曲炒七分

麥芽炒七分 砂仁三錢

木香二分

甘草各五分

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每一丸米湯研化下

○一治脚虛氣陷吐瀉煩渴用

參朮散

人參

白朮炒

白茯苓去皮 山藥

藜蘆

葛根

升麻

右為細末每服二錢米湯調下



○一論霍乱已愈煩熱多渴小便不利宜
麥門冬湯

人參

白朮 去芦

白茯苓 去皮

陳皮

半夏 姜炒

麥門冬 去心 甘草

小茴

烏梅

右劉生姜五片水煎

○一論乾霍乱上不得吐下不得利出冷汗欲絕者

鹽一大把炒令黃入童便一碗溫和服之少頃吐下即愈

○一治霍乱吐瀉心腹作痛

炒鹽三碗紙包紗護頓其胸前并腹肚上截以熨斗火熨氣透則甦續又

以炒鹽熨其背則十分無事

○一治霍乱轉筋用皂角末入筆卓吹入鼻中得吐即愈

○一霍乱轉筋用大蓼一握煎湯盪洗此人以麥糖代之便腠理開洩陽氣散

則愈也河間云熱氣燥燥於筋則壅痰而痛也

○一轉筋入腹欲死者生姜二兩搗搗以酒五盃煎服



○一霍亂上吐下瀉 鄧對峰傳

用葦菜瀉汁一盞重湯煮熱服之立止

○一霍亂吐瀉腹痛服藥即吐無法可施

用百沸湯半碗井泉水半碗合而服之即安各陰陽湯極効

○一霍亂吐瀉

樟樹皮一把 水煎温服立止

○一論霍亂不拘 寒暑吐瀉不出腹痛煩燥謂之乾霍亂死在旦夕急將病人

腿腕黃紋上蘸 温水拍打紫紅脉見以布針或磁瓦刺破出紫血即愈

○一治霍亂吐瀉

藿香梗一味 煎水服立効一方加陳皮尤妙

嘔吐

脉滑數為嘔代者 霍亂微滑者生 澹數凶斷

嘔吐者飲食入胃 而復逆出也有声無物謂之噦 有物無声謂之吐 嘔吐謂有



聲有物胃氣有所傷也中氣不足所致有外感寒邪者有內傷飲食者有氣逆者三者俱以藿香正氣散加減治之有胃熱者清胃保中湯有胃寒者附子理中湯有嘔噦痰涎者加減二陳湯有水寒停胃者茯苓半夏湯有久病胃虛者比和飲醫者宜審而治之也

藿香正氣散 方見 霍亂治諸嘔吐照後加減

○一論外感寒邪嘔吐者 依前方

○一論內傷飲食嘔吐者 依前方 加砂仁山查神曲

○一論有氣逆嘔吐者 依前方 加木香砂仁白豆蔻

○一論胃虛有熱作嘔吐者宜後方

清胃保中湯

藿香 一系
白朮 一土炒
陳皮 八分
半夏 姜炒
白茯苓 去皮八分

砂仁 三分
黃連 一土炒
黃芩 二土炒
梔子 姜炒
甘草 二分

加枇杷葉 去毛

右判一劑生姜三片長流水和黃泥攪澄清二鍾八藥煎至一鍾稍令服○



吐逆甚加伏龍肝一塊○因氣加香附炒一分枳實炒八分白朮○心煩

不寐加竹茹○酒傷脾胃加乾葛天花粉白豆蔻

○一論嘔噦痰涎者

加減二陳湯

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮甘草

人參

白朮

竹茹

砂仁

山梔炒

麥門冬去心

右剉一劑生薑三片鹽一枚水煎徐徐溫服

○一論水寒停胃作嘔吐者

茯苓半夏湯

茯苓去皮

半夏姜炒

陳皮

蒼朮米泔浸厚朴姜炒各

砂仁五分

藿香八分

乾姜炒三分

烏梅一個

甘草三分

右剉一劑生薑三片水煎徐徐服

○一論陰症嘔吐或手足厥冷腹痛屬虛寒冷甚者附子理中湯方見中寒門

○一論久病胃虛嘔吐月餘不納水穀聞食即嘔聞藥亦嘔者



比和飲

人參 一小

白朮 一小

白茯苓 一小

藿香 五分

陳皮 五分

砂仁 五分

神曲 炒 一

甘草 三分炙

右剉一劑用唾倉米一合順流水二鍾煎沸泡伏龍肝研細攪渾澄清取一
鍾生姜三片連二枚同煎七分稍冷服別以陳倉米煎湯時啜之日進藥三

三服即止神效

○一論卒暴嘔吐虛弱困乏無力及久病人嘔吐飲食不入口即吐者

人參 一兩切片水煎徐徐服之立已

○一治胃氣冷吃食即欲吐白豆蔻五錢為末以好酒一盞微溫調服日三服

○一治冷涎嘔吐陰症乾嘔

吳茱萸 兩湯泡

生姜 一兩五小

人參 三分

大棗 五箇

右剉水煎食前服

○一治患嘔吐問藥即嘔百方不效以伏龍肝為末水丸塞兩鼻孔却服對症

藥遂不再吐如神



○一治執症嘔吐或增寒發熱口苦

小柴胡湯多加生姜人參須分兩或加烏梅

○一治胃熱而嘔吐欲知胃執手足心皆執者是

竹茹湯

半夏 姜汁治 乾葛

青竹茹

甘草

右剉姜棗煎服或加前胡

○一治嘔吐屬執者

黃連 姜炒 石膏 火煨

右為末白滾水送下

○一治執嘔不止

梔子 炒黑 朴硝 各等分

右為末每服二三匙白滾水送下

○一論大腸結燥嘔吐不止湯藥不

門嘔吐泛滿之症法須先以蜜導八老人虛人多有此症幽門不通上冲窾 則通其幽門然後服藥蓋人身之氣上下



周流不通必宜其上如前吐法是也上不安必轍其下也

藿香

厚朴姜炒

陳皮

白朮去芦炒

半夏姜製

白茯苓去皮各

甘草二分

砂仁炒五分

枇杷葉搽去白毛三片

生薑一分

到水煎服

一治嘔吐宿滯臍腹痛甚手足俱冷脉緩細用附子理中丸一服益甚脉浮

大按之而細用參附湯一劑而愈

一論陰虛於下令人多嘔者乃諸陽氣浮無所依從故嘔咳上氣喘以大味

地黃丸監送下

一嘔吐不食腹痛後重自用大黃等藥一劑腹痛益甚自汗發熱昏憤脉大

予用參朮各一兩炙甘草煨姜各三錢升麻一錢水煎服而甦又用益氣湯

加炮姜二劑而愈

翻胃



脉淨緩者生沉澇者死○脉澇而小血不足脉大而弱氣不足

夫翻胃之症其來也未有不由膈噎而始者膈噎者喜怒不常憂思勞役驚恐

無時七情傷於脾胃鬱而生痰也與氣搏升而不降飲食不下血氣留於咽

嗑五噎結於胸膈者為五膈法當順氣化痰温脾胃如陽脉緊而澇者為

難治之症夫番胃即膈噎膈噎乃番胃之漸大法有四血虛氣虛有痰有熱

血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫

但見沫大出者必死有執者脉必數而有力有痰者脉必滑數二者可治血

虛者則以四物湯為主左手脉無力氣虛者則以四君子為主右手脉無力

糞如羊屎者斷不可治大腸無血故也痰以二陳湯為主寸關脉沉或伏或

大有氣結滯通氣之藥皆可用寸關脉沉而澇大不可用香燥熱劑宜薄滋

味又曰膈噎番胃之疾得之六淫七情遂有火熱炎上之作多升少降又有

外為陰火上炎番胃者作陰火治之大便必結用童便竹瀝韭汁姜汁牛羊

乳分氣而用

○一論膈有十般之病其實同出於一源皆因動性不能發洩則鬱於肝入之



膈膜屬肝木否則木乘土位木曰曲直作醎酸然酸則能收塞胃脘因之而收小窳碍乃作膈症宜用此湯

當歸活血潤膈湯

當歸酒洗一分

桃仁去皮尖一分

廣陳皮有色者八分

川厚朴姜炒一分

黃連吳茱萸煎湯炒一分

大腹皮甘草洗一分

紅花七分

片白朮益水炒

炙甘草二分

善酒者加葛根止份

右剉一劑水煎溫服

按五噎各雖有五原其要在於氣弱血枯之人思慮勞慾而成者也氣弱則運化不開血枯則道路閉澁蓋心生血腎生氣任脉乃陰之母枯則精涸任脉不潤矣任脉循咽噬胸中胃之三腕一直而下腎虛則丹田清氣不升故中焦失順下之化脾雖思味而食因升降不前而成噎矣宜絕慾以復精血須節順志以和心脾用當歸酒洗血潤膈湯去白朮加人參一錢白豆蔻七分黃柏酒炒七分知母七分梔子炒一錢瓜蒌仁炒一錢遠志甘草湯去心八分

紅棗三枚水煎服



○一論膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃壅滯此能推陳致新治膈氣

之聖藥也

人參利膈丸

人參三小 富歸二小

藿香五分

厚朴姜汁炒 根實二兩 炒

大黃酒蒸 木香一兩

檳榔五分

甘草炙三小

右為末滴水為丸

如梧子大每服五十九溫水下

○一論噎食轉食宜

加減不換金正氣散

蒼米米湯浸 陳反去白

厚朴姜汁炒 藿香

半夏姜汁炒

枳實炒 白去芦

白茯苓去皮 白豆蔻去殼 甘草

黃連炒

右劉生薑三片水煎服

○一論噎膈番胃之

症皆由七情之氣太過鬱則生火生痰而致病病則耗氣

耗血以致虛氣虛

不能運化而生痰血虛不能滋潤而生火或朝食而暮吐



中醫藥大學圖書館版權所有

或暮食而朝吐或
長已即吐者日久不愈
煨投香燥攻剋之藥過多以致危
殆宜以

補中益氣湯方見內

湯依本方去柴胡升麻加半夏白茯苓白芍

酒炒枳實

神曲炒黃連姜炒

○一 番胃不食脾胃 虛弱不進飲食宜

人倉丸

丁香

破仁

白豆蔻去殼

陳倉米

黃土炒米熟去土不用

右為細末生薑自

太汁為丸如梧子大母服百丸食後用淡姜湯送下有怒

氣加香附子姜汁炒

○一 論五噎者氣憂

勞食思也

氣噎者心悸上

下不通噎噦不徹胸脇苦痛

憂噎者天際苦

厥逆心下悸動手足厥冷

勞噎者苦氣隔

脇下支滿胸中填塞令手足逆冷不能自溫

食噎者食無多

小胸中填塞常痛不得喘息



思噎者心悸動 喜思目視 驚皆憂 悲嗔怒寒氣上攻胸脇

五噎丸 治胸中虛寒日久咽逆七氣飲食不下結氣不消

人參 五分 白朮 四分 白茯苓 四分 陳皮 四分 細辛 四分

川椒 五分 吳茱萸 五分 桂心 五分 乾姜 五分 炒 大附子 四分 煨去破

右為末煉蜜為丸如梧子大每三九酒下日三次服

保和丸 治實執痞胃

陳皮 半夏 姜汁炒 白茯苓 去皮連翹 神曲 炒

山查肉 羅蔔子 炒 各 黃連 五分 姜炒

右為末稀米糊為丸胭脂為衣粟米大每服六七十丸人參煎湯入竹瀝

○一論胃反不受食食已即嘔吐出

人參 二兩 白朮 去芦 半夏 湯洗 三兩 生姜 二兩 白蜜 二碗

右五味咬咀以水五升和藥搗之二三百下者取一升半分三次服之

○一論反胃嘔吐無常滿飲入口即吐困弱無力垂死者

人參 二兩 咀片 水煎頓服立効再用人參汁稀粥與服



○一治番胃用六君子湯加炮姜白豆蔻黃連用吳茱萸酒拌過宿炒去茱萸

○一治轉食方

反翅雞一隻者 熟去骨入人參當歸鹽各五錢為末再煮取與食之勿令人其食

○一人年過五十得 噎症胃脘作痛食不下或食下良久復出大便結燥人坐

瘦甚診其脉右關 弦滑而洪悶後畧沉小三部俱沉弦帶芤此中氣不足

來侮土上焦濕熱 鬱結成痰下焦血少故大便結燥陰火上衝吸門故食不

下用四物湯以生 血四君子湯以補氣二陳湯以祛痰三合成劑加姜炒王

連麩炒枳實括萐 吞少加砂仁又間服潤腸丸百餘劑全安潤腸丸方見大便秘

○一治番胃

用大附子一個 最大者坐於磚上四面着火漸逼淨入生姜白然汁又依

前火逼乾復煎 之納生姜汁可盡牛碗許搗為末每服一不用粟米湯下

不過三服立效

○一治噎膈大便燥結

橘杏麻仁丸

陳皮為末

杏仁去皮

火麻仁

去穢各

郁李仁

去壳

右三仁俱搗為膏用棗肉和入石白

內杵為丸每服五十九丸枳實煎湯送下

飢逆

脉浮而緩者易治弦急而按之不鼓者

難治○脉結或促或微皆可治○脉代

者危○右關脉弦者木乘土位難治

發飢者無逆上衝而作聲也一名欬逆

因氣逆奔急上行作吃發聲有數者不

同不可不辨有胃虛膈熱者宜橘皮竹茹湯有胃虛寒者宜丁香柿蒂湯有

腎氣虛損陰火上衝者宜六未地黃丸有中氣不足脉虛數氣不相續而發

飢者宜補中益氣湯加生脉散黃柏以降虛火或少加附子服之立愈有陽

明內實失下而發呃者宜六一順氣湯下之有湯而飲水太過成水結胸而

又發呃者宜小陷胸湯或用小青龍湯去麻黃加附子治水寒相搏發呃大

妙有傳經傷寒熱症誤用薑桂等熱藥助起火邪痰火相搏而為呃逆者宜



黃連解毒湯白虎湯及竹瀝之類治之

○一論飢逆因吐利後胃虛膈熱而欬逆者

橘皮竹茹湯

陳皮去白 人參二小 甘草多 竹茹一不 加柿蒂一不

丁香五分

右剉一劑生姜五片棗二枚水煎溫服身熱發渴加柴胡黃芩去丁香

○一論吐利後大病後胃中虛寒欬逆至七八聲相連收氣不回者難治

丁香柿蒂湯

人參 白茯苓 陳皮 良薑 丁香 柿蒂各二 甘草五分

右剉一劑生姜五片水煎服

○一論欬逆而無脈者用

人參復脈散

人參 白朮去芦 麥門冬去心 白茯苓 蛙 五味子 陳皮 半夏姜炒

竹茹 甘草



右列生姜五片水煎服

○一論人因飽食後得氣發呃逆連舌不止者宜

飯氣消滯湯

陳皮

半夏姜炒

白茯苓皮去丁香

柿蒂

玉蓮姜炒 神曲炒

香附

白木

竹茹

甘草

右列生姜五片水煎服

○一論腎氣虛損虛火上衝而作欬逆者

自臍下上衝直出于口者上衝難治

六味地黃丸

方見補益

依本方作湯加

柿蒂沉香木香砂仁

○一論中氣不足脉虛微氣不相接續而作欬逆者宜

補中益氣湯方見內傷

依本方加麥門五味黃柏酒炒少加熟附子

補中益氣湯

方見內傷

依本方加麥門

五味黃柏酒炒少加熟附子

○一論傷寒陽明內實失下而發呃逆者用

六一順氣湯

方見傷寒

○一治傷寒發熱而呃逆者用黃荊子炒不拘多少水煎服

○一論傷寒發渴而飲水太過成結胸而發呃者用



小陷胸湯

黃連二小 半夏姜炒 瓜蒌實 三小

右剉一劑生姜三片水煎服

○一論傷寒表症未解心下有水氣乾嘔欬逆又治受寒喘嗽宜以

小青龍湯

桂枝 乾姜 細辛 半夏 芍藥 五味子 熟附子

甘草

右剉水煎服

○一論傷寒陽症呃逆潮熱小柴胡湯

生姜竹茹橘皮

○一論有傳經傷寒誤用姜桂等熱藥

起痰火而作呃逆者用

黃連解毒湯 方見感冒 白虎湯 方見傷

○一論因服攻病藥致傷胃氣下陷而元氣將立以致胃氣共丹田之氣疲斃

或久病人而至於呃者乃三焦元氣與胃氣備矣乃危惡之症也宜用

大補元湯



嫩黃芪

蜜水炒 去芦

白木

去芦炒

懷山藥

廣陳皮

七分 石斛七分

白薤仁

研六分 廣木香三分

沉香

二分 甘草七分

右對一劑生薑三片紅朮二枚粳米一撮水煎不拘時溫服

○一論一切呃逆用柿蒂燒存性為末酒調服立止一方每服用柿蒂七箇焙

為末黃酒調下

○一驗法治呃逆服藥無効名用硫黃乳香各等分為末以酒煎急令患人嚥

○一方用雄黃二錢酒一盞煎七分急令患人嚥其熱氣即止

○一灸呃逆法 見灸法

○一治噦逆欲死者其肺脉弱者不治用半夏生薑各一兩每服五錢水煎服

○一治咳逆連咳四五十聲者

生薑汁半合蜜一匙共煎令熟溫服如此三服瘥

噯氣



新加坡中醫藥大學圖書館版權所有

脉暖氣嘈雜審右寸關葉滑可治茲急則難兩寸弦滑留飲胸間脉橫在寸有

積上欄

夫暖氣者胃虛火鬱之所成也因胃中有火治療之法虛則補之熱則清之氣

則順之氣順則痰消也

○一論暖氣者胃中有火有痰也宜用

星半湯

南星 姜製

半夏 姜製

石膏

香附

炒梔子各等分

右判一劑生姜煎服或以姜汁糊作丸亦可蓋胃中有鬱火脰上有稠痰故

○一論暖氣聲聞於外因氣胸膈悶有痰舌黑乃痰之症也宜服

導痰湯

陳皮

半夏 姜炒

白茯苓 去皮

白朮 去芦

香附

青皮 去穢

黃芩 炒

黃連 姜炒

瓜蒌仁

砂仁

甘草

右判生姜三片水煎服



○一論婦人噯乳胸緊連噯十餘聲不盡噯出氣心頭昏竟不噯即緊宜

皮樹影丹

香附醋者四兩

梔子仁炒四兩

黃連姜汁炒二兩

枳實炒一兩

檳榔二兩

莪朮煨一兩

青皮去穢二兩

瓜蒌仁一兩

蘇子一兩

右共為末水丸如梧子大每服三十九食後滾水送下或以分心氣飲服之

立効

○一上舍飲食失宜胸膈鼓脹噯氣吞酸以自知醫用二味枳連蒼栝之類前症益甚更加足指腫痛指縫山小余用補中益氣加茯苓半夏治之而愈若腿足浮腫或癩腫寒熱嘔吐亦用前藥

吞酸

脉弦而滑兩手或浮而弦或浮而滑或沉而遲或緊而洪或洪而數或沉而遲胸中有寒痰洪數者痰熱在胸膈時吐酸水欲成番胃也

夫酸者肝木之味也由火盛制金不能平水則肝木自甚故為酸也如飲食熱



則易於酸矣或言吐酸為寒者誤也乃濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏食不得化故作吞酸如穀肉積滯在器濕則易為酸也必用吳茱萸順其性折之乃在活法

○論吞酸餽雜酸水刺心者乃痰火鬱氣也宜

清鬱三噴湯

陳皮

半夏姜炒

茯苓

香附

黃連姜炒

梔子炒各

蒼朮米泔炒

川芎

枳實炒各

神曲炒五不

白芍炒七分

甘草二分

右判一劑生薑煎服

○論鬱積吐酸者用

菜連丸

蒼朮米泔浸

陳皮一兩

半夏姜炒

白茯苓去皮

黃連兩半姜炒

吳茱萸月倍用

右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服三五十九食後白滾湯送下



○一論噫氣吞酸漕雜有痰有熱有氣有食胸膈不寬飲食不化以香蔻和中丸

白朮 去芦炒

山查肉

連翹 各四兩

白茯苓

去皮

半夏

姜汁炒

枳殼 大棧 炒

陳皮 去自

神曲 炒各

乾生姜 一兩

萊菔子 炒

白豆蔻 炒各

木香 二分

右為細末神曲糊為丸如梧子大每服百丸食後白湯送下

○一論婦人心酸乃痰飲積在脾胃間時時酸心或吐水

吳茱萸丸

大麥芽 炒五錢

肉桂 五錢

吳茱萸

一兩 鹽洗

蒼朮

一兩

陳皮 去自

神曲 炒五錢

右為細末水煮稀麪為丸如梧子大每服五七十九丸米飲送下

○一論醋心每醋氣上攻如釀醋不可當者用吳茱萸一合水一鍾煎七分頓

服縱濃亦須強飲曾有人心如螫破服此方効

○一治口吐清水用



蒼朮壁土白朮去芦陳皮

白茯苓 滑石 水煎服

○一儒者四時毒極熱飲食或不酸暖腐或大便不實足指縫濕痒此脾氣虛寒下陷用六君子加姜桂治之而愈稱為大正諸疾仍作用前藥更加附子錢許數劑不再發

○一婦人吞酸暖腐嘔吐痰涎而色純白或用二陳黃連枳實之類加發熱作渴肚腹脹滿子曰此脾胃虧損未傳寒中不信仍作火治肢體腫脹如蠶食以六君加附子木香治之胃氣漸醒飲食漸進虛火歸經又以和中益氣加炮姜木香茯苓半夏兼服全愈

○一治食後吐酸水用乾姜吳茱萸各二兩為末每服方寸匙酒調服日二服胃冷服之立効

饋雜

夫胃為水穀之海無物不受若夫濕麪魚腥水果生冷以及烹飪調和粘滑難化等物恣食無節朝傷暮損而成清痰稠飲滯于中宮故謂饋雜暖氣吞酸

痞滿甚則為沓胃膈噎如此之由也天饋雜之為症也似飢不飢似痛不痛而有懊懷不自寧之況者是也其症或兼噎氣或兼痞滿或兼惡心漸至胃脘作痛實痰火之為患也治法以南星半夏橘紅之類以消其痰芩連梔子石膏知母之類以降其火蒼朮白朮芍藥之類以健脾行濕壯其本元又當忌口節慾無有不妥者也

○一論饋雜乃痰因火動也宜

化痰清火湯

南星姜炒

半夏姜炒

陳皮

黃連

黃芩

梔子

知母

石膏

蒼朮水市

白朮去苦

芍藥炒

甘草

右剉生姜煎服

○一論饋雜因血虛而作者宜

養血四物湯

當歸

川芎

白芍炒

熟地黃姜炒

人參

白朮去苦

白茯苓炒

半夏姜炒

黃連姜炒

梔子炒

甘草



方去人參加香附貝母

右判生姜煎服

○一論婦人心胸膈雜多是痰症或云是血膈而用猪餘血炒食之則愈此以血導血歸原耳此方治中皖心腹冷痰心下膈雜口出清水脇肋急服滿痛不欲食此胃氣虛冷脉沉遲弦細宜此

旋覆花湯

陳皮

半夏姜炒

赤茯苓

旋覆花去

人參

白芍炒

細辛

桔梗

官桂

甘草

右判生姜七片水煎服

○一論婦人心胸膈雜用

茯苓補心湯

即四物湯合參蘇飲是也

○一治心中膈雜坐臥不寧

蔡完體傳

陳皮一錢

半夏八分

白茯苓

牛赤茯神人分

酸棗仁炒八分

益智仁二分

麥門冬去心

一錢

甘草二分



右判一劑生姜煎半空心温服

○一人多思慮以致血虛五更時體雜是也宜以

四物湯加香附山梔黃連貝母

○一肥人體雜宜用

二陳湯少加撫芎蒼白朮炒梔子水煎服

○一論體雜者痰水內動如粗食在膈令人不自安也用

痰火越鞠丸

海石研水飛膽星

瓜蒌仁

山梔炒黑

青黛水飛過

香附童便浸

蒼朮米泔浸透燒去馬皮切片炒

撫芎

右各等分爲細末湯泡蒸餅爲丸如豇豆大每服百丸臨臥白湯送下

○一論體雜屬鬱火者宜

加味三補丸

黃芩去朽酒炒

黃連去足姜炒

黃柏去皮童便炒

香附米醋浸透炒

蒼朮米泔浸透燒去黑皮切片炒

右各等分爲細末水打稀糊爲丸如豇豆大每服七八十九臨臥茶清送下



諸氣

脉下手脉沉便知是氣沉極則伏瀆弱難愈其或沉滑氣兼痰飲病也
 人稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其形一氣周流於其中以成其象形神
 俱備乃為全人故氣陽而血陰能溉周身而無一毫之間斷也血則隨氣如
 行氣載乎血者也有是氣必有是血有是血必乘乎是氣二者行則俱行
 息有間則病矣今之人不知忿怒驚恐悲哀而損其身不憇思慮以傷其氣
 故人之疾多從氣而生致有中滿腹脹積聚喘急五隔五噎皆由于氣也
 ○一論男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神或臨食憂戚或事不
 隨意使抑鬱之氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛
 脹噎塞不通憶氣不酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠而色痿黃口舌乾苦
 飲食減少日漸至瘦或大腸虛閉或內病之後胸中虛痞不思飲食並皆始
 分心氣飲

青皮 去穢 陳皮

半夏 姜炒 白

茯苓 去木 通

官桂

赤芍



皮 大腹皮 紫蘇 羌活 甘草

右剉作劑生姜三片棗二枚燈心十根水煎温服○性急加柴胡○多怒加

黃芩○食少加砂仁神曲○咳嗽加桔梗半夏○胸膈痞悶加枳實香附○

三焦不和加烏藥○氣閉加蘿蔔子 枳殼○氣滯腰疼加木瓜枳殼○上焦

熱加黃芩○下焦熱加梔子○吞胃加沉香磨服○水氣面目浮腫加茯苓

澤瀉車前木瓜葶藶麥門冬○氣塊加三稜莪朮○一方去赤芍羌活加枳

殼桔梗木香檳榔香附莪朮薑香治憂思鬱怒諸氣

○一論七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間畧不出燕不下

或中脘痞悶氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲惡心嘔吐嘔症

加味四七湯

半夏湯泡 白茯苓去皮 川厚朴姜炒 紫蘇二兩 桔梗二兩

枳實炒 甘草一兩

右剉作十劑生姜七片棗一枚水煎熱服一方治梅核氣加檳榔

○一論一切氣滯心腹飽悶皮痛脇曲脹滿難消嘔吐酸水痰涎不利頭目昏



眩并食積酒毒及米穀不化或下痢膿血大小便結滯不快風壅積熱口苦
煩燥涕唾稠粘此藥最能流濕潤燥推陳致新滋陰抑陽散鬱破結活血通
經治氣分之聖藥也宜此

利氣丸

大黃生川 六兩

黑丑頭末 六兩

木香一兩

枳榔一兩

枳殼炒 一兩

香附米炒 西 兩

青皮去穢 兩

陳皮一兩

莪木煨 兩

黃連一兩

黃柏三兩

石為細末水九梧子大每服五七十丸或百丸臨臥淡姜湯送下以利為度
如不利再加丸數通利則愈瑞竹堂加黃芩當歸各一兩

○一論脾胃不和過食生冷汕膩麵粉濕麵停滯不化胸膈滿悶嘔逆惡心腹
脇膨脹心脾疼痛增寒壯熱或面目四肢浮腫甚致臟腑闕滯上氣喘息睡
臥不安俱是有因氣所傷寒氣咽氣膈氣滯氣寒氣痞氣塊一切氣滯

治用此

沉香化氣丸



香附子一斤炒肉

陳皮五兩 山藥二兩

三稜兩煨 莪朮兩煨

丁香二兩 下皮二錢

良姜二兩 草果兩去壳

人參五錢 白茯苓兩去破

神曲炒二兩 山查去子

牽牛頭末

枳殼兩炒

紫蘇二兩

官桂五錢

白豆蔻兩去壳

榔一兩

蒼朮米泔浸

枳實兩炒

木香一兩

乾姜一兩

南星兩炮

石菖蒲二兩

青皮去穢炒

厚朴姜汁炒

沉香五分

砂仁一兩

半夏兩炮

蘿蔔子兩炒

右為細末醋糊為丸如梧子去毒服五十九丸臨臥淡姜湯送下膀胱痛氣空
心鹽湯下如要大便通利漸加至百丸仍看老幼盛衰增減丸數此藥蠲積
聚化滯氣逐利病原立見神効藥性温平不損元氣常服三五丸疎風順氣
和胃健脾消酒化食寬中快驅消磨痞塊孕婦不宜服
○一論男婦中風中氣牙關緊閉口眼喎斜不省人事并傳屍骨蒸勞瘵卒暴
心疾鬼魅瘴瘧小兒急慢驚搐婦人產後中風赤白痢疾一切急暴之症最
能順氣化痰神効



蘇合香丸

沉香 木香 丁香 白檀香 安息香 酒熬膏 麝香

香附米 白木 去苦 訶子肉 董橙 犀角 首屑 硃砂 酪 一片腦

蘇合油 內各五錢

右將各味咀成片為細末入腦麝安息香蘇合油同藥攪勻煉蜜為丸每丸

秤過一錢用蠟包裹每用大人一丸小兒半丸去蠟皮以生姜自然汗化開

擦牙關另煎姜湯少許調藥灌下

○一人飲酒大醉後氣往外仰頭出不盡有出氣無收氣此乃氣不歸元死在

須臾諸藥不効余以

葦葉根焙搗入陳醋炒熟絹包熨臍下此一包冷了又另換一包熨至

臍下溫暖氣漸降而歸元矣妙不可言

痞滿

脈來堅者順虛弱者逆



痞滿與脹 不同脹滿內脹而外亦形痞則內覺痞悶而外無脹急之形也益

由陰伏陽 氣血不運而成位心下之中腹滿痞塞皆上邪之所為耳有因

誤 裏氣虛 乘虛而入於心 之分野有因食痰積不能施行而作痞者有

濕熱 入甚上 心下而為痞者 治之用黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴生

姜生 辛以 之人參白朮之甘溫以補之茯苓澤瀉之鹹淡以瀉之夫

既與濕 治使 分消可也

一論按之 而軟 為痞多是痰氣鬱結或飲食停滯者

加 二陳湯

陳皮 夏 白茯苓去皮枳實 黃連 姜汁

山查 去子 香 青皮去棧 砂仁 甘草

右劉生薑煎服

○一論痞滿宜調中補氣血 清熱攻補兼施 節而當也

平補枳朮丸

白朮 去芦上 白芍 酒炒 陳皮 枳實 麵炒 黃連 酒炒 各

人參

木香錢五

右為細末荷葉煎湯打米糊為丸如梧子大每服五十九丸食遠米湯下漸加至六七十丸

○一論內傷元氣脾胃而作心下痞者宜大補元氣也服

加減補中益氣湯方治五

如脉緩有痰而痞加半夏黃連○脉弦四肢滿閉便難而心下痞加黃連柴

胡甘草○大便開燥黃連桃仁少加人黃歸身○心下痞臃悶加白芍黃連

○心下痞腹脹加白芍砂仁五味子○如天寒少加乾姜或中桂○心下痞

中寒者加附子黃連○心下痞嘔逆者加陳皮生姜黃連○冬月加黃連少

加丁香藿香○能食而心下痞加枳實三錢黃連五分○如不能食心下痞

者勿加之依本方食已心下痞則服前枳朮丸而愈

○一論一切心下痞及年久不愈者宜用

大消痞丸

黃連七錢炒

黃芩六錢土炒

枳實五錢炒

半夏四錢

陳皮四錢



厚朴姜炒

猪苓五分

澤瀉二分

葛黃

附

乾生姜二分

人參四分

神曲炒二分

砂仁三分

甘草一分

二

白朮去土炒一分

右為細末蒸餅為丸如梧子大每服五十九漸加至百丸空心白滾湯送下

○一男子胸膈作痞飲食難化服枳木丸久而形体消瘦發熱口乾脉浮大而

微用補中益氣加枳芻諸症悉退惟見脾胃虛寒遂用八味丸補命門相火

不月而飲食進三月而形体充此症若不用前丸多變腹脹喘促腿足浮腫

小便淋瀝等症急用加減腎氣丸亦有得生者

○一治痞悶氣積食積宜服

丙消丸

青皮

陳皮

三稜煨

莪朮煨

神曲炒

炒

麥芽炒

香附炒

右為細末醋糊為丸如梧子大每服三五十九清茶送下

○一腹中窄狹須用蒼朮若肥人自覺腹中窄狹乃是濕痰流灌臙腑氣不升

降燥飲用蒼朮香附行氣如瘦人自覺胸中窄狹乃是熱氣薰蒸臙腑宜黃

連蒼朮

○一論心下堅如盤者

枳實 麩炒 大白水 去其三次

右剉一劑水煎溫服

補中益氣湯 方見內傷 八味丸 方見補益

鼓脹

經云其脹大堅以瀉者脹也○閉上脉浮則內脹○遲而滑者脹○脉盛而緊

者脹○脹脉浮大者易治虛小者難治水病腹大如鼓脉實者生虛者死脉

洪者生微細者死○中惡腹大四肢滿脉大而緩者生浮而緊者死

丹溪云七情內傷六淫外感飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失

職胃雖受穀不能運化故陰陽不交清濁相混隧道雍塞鬱而為熱熱留為

濕濕熱相生遂成脹滿經云鼓脹者是也以其外雖堅滿中空無物有似於

鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若蠱侵蝕之義

陰陽愆伏榮衛凝滯三焦不能宣行脾胃不能傳布脹滿之所由生也口穀脹



曰水脹曰氣脹曰血脹謂之四病或寒或熱或虛或實又不可以無別也
久病瀰之卒病脹滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻數曰方調治未見
一愈者矣

胡寬暮急者為血虛暮寬朝急者為氣虛朝暮俱急者氣血俱虛

脈經曰胃中寒則脹滿此論內傷不足之邪乃久病也寒者非寒冷之寒乃

虛之義故用參朮以補脾為君蒼朮茯苓陳皮為臣黃芩麥門為使以制

木少加厚朴以消腹脹氣不運加木香氣下陷加升麻柴胡提之血虛加四

物湯有痰加半夏經云寒因寒用者是也病脹久脾胃虛者雖有大小便不

利之證乃氣不運血不潤也當大補氣血為主積不可用下藥也鼓脹為病

多端宜照後方加減調治毋得執泥以悞人也

○一論病人初起心腹脹滿因于食傷脾胃濕痰氣鬱食積而作脹也用此通

治之劑宜

香砂和中湯

藿香

砂仁

各一分

蒼朮

五分

厚朴

五分

廣陳皮

五分

去



半夏姜汁炒

白茯苓去皮

枳實麩炒

青皮去穢

神曲炒

山查肉各一

白朮去苳炒

甘草三分

右判一劑生薑煎服

○一論脾虛鼓脹手足倦怠短氣滯泄者此調治服滿王道之藥久病虛弱之

人宜服

六君子湯

人參

白朮

去苳炒

白茯苓

去皮

半夏

姜

陳皮

甘草

右判生薑煎服

一方加當歸白豆蔻蘇梗尤妙

○按經曰寒因寒用故用補劑以治脹初服則脹久服則通此惟精達

經肯者知之庸醫未足道也昔朝寬暮急為血虛加當歸川芎暮寬

朝急為氣虛依本方朝暮俱急亦加芎歸

○一論男婦因於氣惱而心腹脹滿或痰嗽喘急者予常見因氣而作脹滿者

甚多而用此方甚効

分心氣飲

方見諸氣



依本方加檳榔枳殼香附烏藥

木香消脹丸 治症同前

木香二分 枳殼五分

桑白皮 蘇子

香附子炒各一兩 蘿蔔子以二兩

陳皮 大腹皮 枳殼麩炒

右為細末水煮稀神曲糊為丸如梧子大每服五七十九淡姜湯送下

○一論腹脹發熱以陽并陰則陽實而陰虛陽勝則外熱陰虛生內熱脈必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宜導飲食如故固致脹滿者為之熱脹用

枳實分消湯

川厚朴去皮姜汁炒五分 枳實炒二分 大黃酒蒸一分 官桂一分 甘草炙一分

右剉一劑姜壅煎服嘔吐加半夏自利去大黃寒多加乾姜

○一論中滿鼓脹氣脹水脹熱脹宜

中滿分消丸

人參二分 白朮去片炒二分 姜黃一分 猪苓去黑皮一分 甘草炙一分

砂仁 乾生姜各二分 澤瀉 陳皮 知母去毛酒炒各三分



白茯苓去皮 枳實炒 半夏姜炒 黃連姜炒 黃芩酒炒

川厚朴姜炒

右為細末水浸蒸餅為丸如梧子大每服百丸焙熱食遠白湯送下

○一論老人虛人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脉浮遲而弱此名寒脹

朴香丸

川厚朴姜汁炒 大附子炮去皮臍 木香一分

右剉一劑生姜七片棗二枚水煎熱服

○一論中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下虎中

滿腹脹心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收宜

中滿分消湯

益智 半夏姜炒 升麻 茯苓 木香各三分

黃芪炒 吳茱萸炒 草豆蔻 川厚朴姜炒各五分 川烏炮

人參 澤瀉 青皮去壞 當歸 柴胡

黃連姜炒 澄茄 黃柏酒炒 乾姜 生姜各一分



右到一劑水煎服忌房勞酒濕麩生硬冷物

○一論中滿腹脹內有積聚如石堅硬令人坐臥不寧二便澀滯上氣喘促或

通身虛腫

廣茂潰堅湯

川厚朴

去皮姜炒

黃芩炒

黃連姜炒

益智仁

草豆蔻

當歸

各五分

半夏

姜炒七分

廣木

升麻

紅花

吳茱萸

各二分

生甘草

柴胡

澤瀉

神曲

青皮

去

陳皮

各二分

口乾加葛根

四分

右到一劑生姜煎食遠溫服忌酒醋濕麩

○一論獨氣在上則生脹脹清氣在下則生癢泄立

木香順氣湯

木香三分

厚朴

姜炒四分

青皮

去穢

益智

澤瀉

乾生姜

茯苓

半夏

姜炒

吳茱萸

當歸

蒼朮

米泔炒各五分

升麻

柴胡

各

草豆蔻三分



白朮 一各

右對一劑水煎溫服忌生冷硬物

○一治蠱脹

黑丑 頭末

木香

甘遂 各一各

右為末用猪腰一對俱分破將藥撒在二腰子內合在紙包灰火燒熟空心

或食一箇或食二箇大便秘行膿血見効

○一論血鼓腹如盆脹積聚痞塊宜

化蠱丸

三稜 煨

莪朮 煨

乾漆 炒盡烟

礪砂

蟲蟲 糯米炒

水蛭 石灰炒

琥珀

牛膝 酒洗

肉桂

大黃 各等分

右為末用生地黄自然汁和米醋調勻為丸如梧桐子大每服十九空心溫

酒下童便亦可

四炒枳殼丸

治脾胃不和氣血凝滯腹內蠱脹

枳殼 四兩去穢切作兩指

大塊分四指



一兩用芫蒿子一兩炒去子不用
 一兩用蒼朮四兩炒去蒼朮木不用
 一兩用乾漆一兩炒去乾漆不用
 一兩用小荷一兩炒去荷葉不用

右用原炒蒼朮四味用水二碗煎至一碗去渣煮糊為丸如梧子大每服五
 十九食後米湯下

水腫

水腫之症有陰有陽察脉觀色問症須詳陰脉沉遲其色青白不渴而瀉小便
 清澁脉或沉數色赤而黃燥冀赤溺兼渴為陽口水腫氣急而小便澁血
 腫氣滿而四肢寒

蠱症人要有二曰單腹脹曰雙腹脹喘急氣滿腫而不安四肢微腫此單腹脹
 因內傷七情所致取効微遲四肢浮腫壯大身重此雙腹脹因外感風濕所
 致取効甚速又有水腫氣腫之分以指腫處有陷隨起隨起者氣腫先須理



氣陷指起遲者水腫也只須導水立愈凡人年四十已上氣血壯盛者得効之後善自調攝終身不發五十以後氣血稍衰調攝不謹時或再復此藥尚能治之但慮復屢治而元氣耗則難為矣脈浮洪易治沉細難治浮洪者只用水不換木香丸沉細者兼用沉香快脾丸先服木香流氣飲

○一論諸氣痞滯不通胸膈脹口苦咽乾嘔吐不食或肩背腹脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大小便閉澀又治憂思太過怔忡鬱積腳氣風濕聚結腫痛喘滿脹急此藥調順榮衛流通血脉快利三焦安和五臟凡治蠱脹當先用此

木香流氣飲

- | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-----|------|----|------|----|----|
| 木香 | 七分 | 丁皮 | 七分 | 薑香 | 七分 | 半夏 | 湯泡二分 | 人參 | 五分 |
| 白木 | 五分 | 赤茯苓 | 五分 | 厚朴 | 姜炒五分 | 青皮 | 去穢二兩 | 陳皮 | 四兩 |
| 草果 | 五分 | 檳榔 | 七分 | 大腹皮 | 七分 | 香附 | 二兩 | 紫蘇 | 二兩 |
| 木瓜 | 五分 | 白花 | 五分 | 麥門冬 | 去心五分 | 莪朮 | 煨七分 | 肉桂 | 七分 |
| 木通 | 一兩 | 石昌蒲 | 五分 | 甘草 | 二兩 | | | | |

右對八錢生姜三片束三枚 水一碗半煎至七分去渣熟服本方加沉香枳
 殼大黃去蘆香石菖蒲各二 十四味流氣飲○蠱腫加白豆蔻○腫滿加黑
 牽牛○頭面腫加葱白○肚 腹腫加枳實倍青陳皮○臍至腳腫加桑白皮
 一論金不換木香丸治蠱腫 之神藥也先服木香流氣飲三五劑通加白豆
 蔻次用金不換木香丸收功 後用沉香化氣丸調理或心頭煩熱者竹葉石
 膏湯熱甚加黃芩前賢論蠱 腫之症有五不治者面黑如黧肚大青筋掌中
 無紋脚腫無坑臍中凸起此 五症亦能治之問有得生者如敗下黑水者不
 治陽事不舉者不治其餘青 黃紅紫皆能治之又一證或腫或消或作泄瀉
 知脾弱即瀉名曰洪水橫流 服此宜之其腫自消其瀉自止忌一切生冷毒
 物油鹽醬醋魚鮮鴨鵝房事 等件百日無有不効者

金不換木香丸

大戟 五不

芫花 炒五不

甘遂 五不

黑五 頭未

巴豆 去壳半生

大黃 生五不

青皮 去穢五不

陳皮 五不

南木香 五不

青木香 五不

胡椒 一不病

川椒 去目五不

益智仁 五不

板柳 五不

大腹皮 五不

苦苧藤五不射干三不桑白皮五不木通五不澤瀉五不

連翹五不砂仁五不

右二十二味為末醋煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸壯盛人加七八十

丸第一消頭面腫五更初用葱白酒送下第二消中脘胸腹腫五更初用陳

皮湯送下第三消脐已下脚腫五更初桑白皮湯送下

沉香快脾丸

青皮四不陳皮四不三稜四不莪朮四不蒼朮米泔浸

白朮去芎白茯苓四不砂仁四不草果仁四不木香四不

沉香二不丁香二不藿香四不軍薑三不肉桂三不

連翹四不商陸白黑丑頭末大腹皮二不僵蚕三不

神曲四不麥芽四不益智仁四不雄附子五不者不用

一右二十四味為末麵糊為丸如梧桐子大每服二四十九照前用之第一五

更葱白湯下第二五更陳皮湯下第三五更紫蘇湯下第四五更桑白皮湯下

氣丸 治蠱常服調理



青皮 去穢

白木 去片

三稜

我

小

人參

白木 去片

白茯苓

山藥

砂

仁

白豆蔻

丁香

水香

沉香

板

御

石菖蒲

官桂 一兩

羅制子 二兩

黑丑 虎 木 二兩

湯

下

石菖蒲 各六分

右為末醋糊為丸如梧子大每服五七十丸

一治前證服藥忌鹽醋一百日之後用藥開

指尋

澤瀉

白木

白

茯苓

肉桂

鹽烙

右每用七錢用鯽魚一箇破肚去淨將前藥

火焙黃色存性為末姜棗煎服

一論腹脹堅硬如石或陰囊腫大先用甘草

敷之

犬戟

芫花

甘遂

海

藻各等分

右為末醋糊和藥塗腫處一加椒目尤効

按右諸方治諸鼓脹腫滿殊効其中

有病人氣血虛不敢服者又有



服之而不效者此皆得病日久或誤
損之極宜服後諸方實有起死回生
之功也
投攻擊太過以致脾胃元氣虛

○一凡看蠱識症○一朝腫暮消是陽蠱○二
朝消暮腫是陰蠱○三腹上青

筋起氣喘潮熱是氣蠱○四四肢不收無肉
肚大是食蠱○五遍體肚不張

是勝油蠱○六遍身潮熱是脾蠱○七房室
過多是腎蠱○八泄瀉朝熱是

脾蠱○九動望上下大小不通是胃蠱
皆屬脾虛不能侖水氣虛不能

○一論水腫四肢頭面皆浮面腫或單腹鼓脹
清濕熱平肝木利水道以治其

運化治之補元氣養心血健脾胃以培其本

標此藥王之

行濕補氣養血湯

大揀參去芦 不油白木註 陳皮

白芍酒炒 白茯苓 蘇梗

藟當子炒 海金沙 木香

當歸 川芎

厚朴姜炒 大腹皮

木通 甘草

右劉蕪煎服○氣虛倍參苓水○血虛倍
芎歸芍○小便短少加猪苓澤

瀉滑石以消其腫也○服後腫脹俱退惟面足不消此陽明經氣虛倍用白
木茯苓

○一論單腹虛脹只宜補中行濕利小便切不可下宜用
行濕補中湯

人參 八分 白朮 楚炒 白茯苓 一个 蒼朮 米泔浸 陳皮 一

厚朴 姜炒 黃芩 八分 麥門冬 去心 澤瀉 五分

氣不運加木香木通氣下陷加柴胡升麻

朝竟暮急血虛加當歸川芎白芍炒香附 黃連 姜炒 去人參

朝急暮寬氣虛倍參朮

朝暮急者氣血俱虛宜雙補之

○一論腫脹之症因內傷而得者或誤服攻擊殺伐之過以致元氣脾胃虛損
之極腫脹尤甚于前此氣血兩虛腎水乾涸用此方以金匱腎氣丸兼進

加味補中益氣湯

黃芪 炒 二条 人參 一条 白朮 去蘆 炒 白茯苓 二条 陳皮 八分



當歸酒洗 白芍酒炒 柴胡四分 升麻三分 蘿蔔子炒

厚朴姜炒 甘草炙二分 枳實炒

右剉一劑生薑煎服

○一論脾腎虛腰痛脚腫小便不利或吐腹脹痛四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其効如神此症多因脾胃虛弱治失其不能救必以補中益氣湯早晚兼濟可收全功矣

金匱腎氣丸

懷熟地黃兩 白茯苓兩 牛膝酒洗 肉桂 澤瀉

車前子 山茱萸酒蒸 山藥 杜仲 丹皮各 附子地

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心米飲送下臨卧服補中益氣

○一論單腹脹及脚虛腫滿膈間閉塞或胃口作痛此補中有消之意也

調中健脾丸

黃芪蜜炙 人參二兩 白朮去芦 黃上六兩 白茯苓二兩

陳皮蜜水炒 半夏泡七次 蒼朮米泔 香附童便浸



白芍 畏三兩 五兩

蘇子 炒 五兩

蘿蔔子 炒一兩 五兩

黃連 去茶葉二兩半

山查 剉 炒三兩

意苡仁 炒 三兩

澤瀉 炒一兩 五兩

沉香 另研

五加皮 炒二兩

草豆蔻 酒拌炒 二兩

醋一孔每箇入用椒三入多年黃連

法製瓜蒌

兩 ○用大瓜 萋一

外用棉紙切完再用紙筋塗泥封固

炭火煨通紅 泥其黑色一井入藥

右為細末煎荷葉大腹皮湯打膏

米糊為丸如梧子大每服百丸口進三服

口湯送下

右方法製瓜蒌多不便製予每不用此味亦獲奇功如有更妙

○按右諸方治腫脹屬虛者宜用此王道之劑病者苦其脹腫難堪予

令朝服丸藥夕服湯藥或三朝五日間服蟠桃丸或右幹散一服謂

之下慎打劫而治病者暫聽一時之寬醫者一補一攻亦善治之良

法也

○一人脾胃虛弱肚腹鼓脹遍身腫披之成窠其脉沉細右寸為甚此脾肺虛

寒之症治以八味丸或金匱腎氣丸以補腎陰行生化之源至暮服之小便



通又數劑腫消即止前藥復與六君子湯加木香官桂炮薑以燥脾道氣而
 瘥後因不戒性病復作但有氣喘或飲食稍多即泄瀉仍用八味凡倍附子
 ○一儒者失於調養飲食難化胸膈不利或用行氣消滯藥咳嗽喘促服行氣
 化痰藥肚腹漸脹服行氣分利藥睡臥不能兩足浮腫小便不利人便不實
 脈浮大按之微細兩寸皆短此脾胃虧損朝用補中益氣加薑附夕用金匱
 腎氣加骨脂肉果各數劑諸症漸愈再佐以八味丸兩月乃能步履却服補
 中八味半載而康

補遺

蟠桃札

益國主秘傳

治男婦渾身頭面手足浮腫肚腹脹滿疼痛上氣喘急

千金不傳之妙

沉香 三小

木香 三小

乳香 三小 若

沒藥 三小 若

琥珀 一分

白丑 生用頭

黑丑 用牙皂煎

乳香 生用

沒藥 生用

檳榔 牙皂煎汁浸透焙乾

右為細末牙皂水打稀麵糊為丸如梧子大每服二錢七分五更後晨砂糖

煎湯送下

○張靜虛道人治蠱脹神方詳兵述序

石幹散

石幹 一分

黑丑 一分

沉香 五分

木香 五分

檳榔 錢

葶藶 八分

琥珀 五分

海金沙 一分

右共為末聽用患者先服五皮散一二帖然後服此末藥實者一錢虛者九分空心葱白湯下隔一日一服輕者二帖重者不過三帖全愈後服健脾胃之藥永不祭也服藥要忌 蠱 暈 腥 二 七 則腸胃清病根拔

○一治腫脹仙方名金壽兒

紅芽大戟一斤紅棗三斤水煮一日夜去大戟用棗晒乾食之立消

○一治水脹黑豆煮去皮焙乾為末每二錢米飲調服

○一治腫脹仙方名天命飲

白商陸根似人形者搗取汁一合生薑自然汁二合點黃酒一盞和服空心三日服一次元氣厚者服五次薄者三次止忌鹽醬凡人年五十以上



者可服五十以外者不必用

一治腫用

粟米藜豆各一抄猪肝一葉切碎三味煮作粥食之至重者不過五六其腫自消切忌氣惱生冷之物

○一治十腫水病不差垂死者

用青頭雄鴨一隻治如食法細切和米并五味煮極熟化粥食之

○一方用鯉魚一尾重一斤和冬瓜葱白煮食之

○一方用癩蝦蟇一箇入猪肚內煮熟去蝦蟇將肚一日俱食盡

○一治蠱肺

用田螺不拘多少水漂加香油一盞于水內其涎自然吐出取其涎曬乾為末每服不過三分酒調下其水自小便而下其氣自大便而出其腫即消即服養脾胃之藥為妙

○一治水氣腫滿腹脹者

用黑白葶牛頭末每服二錢太麥麵二錢水和為餅以火煨熟取去食之



茶湯送下

○一治十腫蠱服輕者服此効

苦丁香去梗微焙為末用棗肉為丸如梧子大每服二十九空心米湯下

行水日進二服

○一治十腫水氣五蠱服氣其効如神一人患腹脹陰囊腫大不一劑而病愈

真仙方也

甘遂

赤皮細花不鮮者不拘多少

用蕎麥麵水和作厚餅內摻神麵末將紙厚包甘遂

在內灰火中燒熟取

出晒乾為末每用一錢二分以細麵約一兩許合和

水調趕作麵片次用

商陸二錢半巴豆一箇去殼水一碗半砂鍋內煎至

一碗去渣再入鉄鍋

內入前麵片煮熟食之其商陸湯任其意服與不服

不在其限服不一二

時水從大便出如是血蠱即下血氣蠱即下氣當時

腫消若有喘嗽盡皆

安貼若腹中塊漸消散只一服見効忌鹽醬冬瓜香

汕葷腥之物半月後

用鹽亦須炒過用之若一症加胡椒一不與巴豆同

煮其巴豆須看虛實

加減其壯者加至二三箇無不効



積聚

脈來大強者生沉小者死。脈來肘臂者積也在寸口積在胸中在關上積在

臆傍在尸部積在氣冲。脈在左積在左脈在右積在右脈兩出積在中央。

脈來小沉而實者脾胃中有積聚不下食食則吐。

積者生於五臟之陰也其發有根其痛有常處脈必結伏聚者成於六腑之陽

也其發無根其痛無常處脈必浮結由陰陽不和臟腑虛弱四氣七情失常

所以為積聚也久則為癥瘕成塊不能移動者是癥或有或無或上或下或

左或右者是瘕氣不能成塊塊乃有形之物痰與食積死血此理曉然在中

為痰飲右為食積左為死血大法鹹以軟之堅以削之行氣開痰為要積塊

不可專用下藥徒損其氣病亦不去常消導使之銕化其死血塊去須大補

痞塊其皮裹膜外須用補藥宜六君子湯加香附枳實開之。

○一論五積六聚癥瘕癖痰飲食積死血成塊者

化堅湯



白木

白茯苓 去支 當歸

川芎

香附 炒

山查

枳實

陳皮

半夏 姜炒

槐仁 去皮尖

紅花

莪朮 煨

甘草

右劉劑生

片水煎溫服。肉積加黃連。麩積加神曲。左有塊倍用。

芎

○右有塊青皮。飽脹加蘿蔔子。壯人加三稜。○弱人加入人參。

○一論五積六聚痰積血積食積氣積一切積塊或中或左或右或上或下久

不愈者用此

消積保中丸

陳皮 去白 兩

半夏 湯泡切片 兩

白茯苓 去皮 兩

白朮 去苦 兩

香附 醋炒 兩

青皮 去穢 兩

木香 炮 兩

檳榔 七 兩

莪朮 醋炒 兩

三稜 醋炒 兩

萊菔子 炒 兩

砂仁 炒 兩

神曲 炒 兩

麥芽 炒 兩

白芥子 炒 兩

黃連 姜汁炒 兩

梔子 仁 姜汁炒 兩

桃仁 去皮尖 兩

紅花 五 兩

當歸 酒洗 兩

川芎 八 兩

真阿魏 醋浸 兩

乾漆 炒 兩

壽士 呆元

三 三

天



右爲細末姜汁酒打稀糊爲丸如梧子大每服八十丸食後白湯送下體虛人加人參一兩外宜化鐵膏貼之

○一論五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疼痛上氣壅塞小腹脹滿大小便不利宜以

大七氣湯

- 三稜
- 莪朮
- 青皮
- 陳皮
- 桔梗
- 藿香
- 益智

- 香附
- 肉桂
- 甘草

右剉劑生薑三片棗子一枚水煎溫服渣再煎服○心脾痛加烏藥枳殼
○一論心腹堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣癥瘕積塊化痰飲寬胸腹順

氣進食消脹軟堅用此

三稜煎丸

- 三稜生細剉半斤
- 青皮去穢
- 蘿蔔子炒二兩

- 神曲炒二兩
- 麥芽炒三兩
- 乾漆炒三兩
- 杏仁易淘去皮尖

- 礞石用礞蓋細研入水調坐于灰火上
- 水調坐于
- 取出爲末



右為細末三稜膏為丸如梧桐子大每服十五丸加至三十丸食遠來飲送
○一論男婦五積六聚七癆八瘕破一切血下一切氣宜

消癥破積丸

三稜煨

大黃煨

乾漆炒去烟

礪砂八醋煎乾

巴豆夫仙各一兩

石為末醋糊為丸如菜豆大每服三九至七九空心米湯送下量虛實加減
服之不可過服損人之真氣

○一論癥積心腹內結一塊如拳漸上撞心及腹脹痛

保安丸

大黃三兩酒浸乾薑炮一兩

大附子炮去皮

鼈甲醋煮一伏時炙

右為末陳米醋一升煮去四五合和藥為丸如梧桐子大每服二十九五更

醋湯下天明時再服五九取積如魚腸膿血爛泥而下

○一論虛弱之人腹中積聚癥塊脹滿疼痛面黃肌瘦肚大青筋不思飲食此

藥消痰利氣扶脾助胃開胸快膈消痞除脹清熱消食久服積塊漸消大効

加味保和丸



白朮去苦炒 枳實炒 陳皮去白 半夏河姜炒 白茯苓去皮

蒼朮炒 川厚朴姜炒 香附酒炒 神曲炒 山查肉三兩

蓮翹二兩 黃連酒炒 黃芩酒炒 麥芽炒

三稜醋炒 莪朮醋炒 木香五錢

右為細末薑汁糊為丸如梧子大每服五十九加至七八十九食後白湯送

一論五積六聚七癥八瘕或左或右或上或下或腹中有时攻作疼痛諸醫

誤治以攻擊太過以致面黃肌瘦四肢困倦不思飲食等症宜以此方久服

則元氣漸復脾胃漸壯益養正積自除譬如滿座皆君子縱有一小人自無

容地而出此潔古之言豈欺我哉

加減補中益氣湯

黃芪蜜水炒 人參一錢 白朮去苦炒 白茯苓去皮

陳皮七分 柴胡五分 當歸酒洗 半夏泡姜汁

山查肉五分 枳實炒 厚朴姜炒 甘草炙

右剉一剉生薑三片棗一枚水煎溫服與前加味保和丸兼而服之久則痊



根白拔

按右諸方虛弱人患積塊久不愈者宜

化鐵膏

肥皂四兩

生薑四兩

葱半斤

蒜半斤

皮硝半斤
化水

大黃末四兩入膏再熬貼塊上內服前保中丸

○一治痞塊心下堅硬狀若覆杯者服此一料即愈

三稜

莪木

檳榔

草果

陳皮

枳殼

山查各二兩

小回

甘草冬一兩

砂仁

木香

浮鐵皮各五

厚朴姜炒

蒼朮米泔浸

沉香三

枳實一兩

神曲酒炒

麥芽炒

青皮各二兩

右為末酒糊為丸如梧子大每服十五丸薑湯下

○一治痰塊痞塊血塊氣塊不拘冷熱諸塊皆効

莪木二兩

麥芽二兩

神曲二兩

鼈甲二兩

山查二兩

青皮三兩

砂仁一兩

枳實一兩

香附二兩

巴豆仁一兩
去油



右巴豆仁同莪米香附將水浸煮一晝夜去豆不用炒乾爲末醋打米糊爲丸如梧桐子大每服五十九空心酒送下如婦人腹內血塊氣塊作痛加紅花酒炒一兩當歸二兩荔枝核一兩烏藥一兩官桂五錢如瘰癧加煉皮兩半夏曲一兩

○治腹中痞氣兩脇痞積血塊痰積等症

琥珀 二兩
阿魏 二兩水浸爛乾爲度

青皮 四兩去穢
三稜 二兩取前青皮同二稜共一處炒乾

赤藥子 三兩便炒
黃連 二兩去菜黃用黃連肉一兩酒浸炒

片苓 三兩微炒
辰砂 三錢以紫爲度

陳皮 二兩去白
枳實 二兩
白豆蔻 二兩
甘草節 五錢

瓜蒌仁 三兩去油
沉香 八錢

○右爲末神曲一斤打糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸食遠白湯送下
○一治諸氣食積及噎膈痞滿胸脇刺痛癥瘕疝氣並治

神仙一塊氣



青皮

陳皮

三稜

莪朮

香附童便炒
各一兩

神曲

麥芽

蘿蔔子

白丑頭末

枳椇

鬱金

雲連各五錢

枳實三錢

皂角二錢半

百草霜二錢半

右為細末麩糊為丸如棗豆大每服三五十九視疾上下為食之先後熱酒

薑湯任下

○一中洲吳都泉夫人年五旬患腹中積塊如盤大腹脹年餘後漸卧不倒床腹響如雷愛氣不透口乾吐白沫下氣通則腹中稍寬五心煩熱不思飲食肌瘦如柴醫更八人並無寸効一家哭泣後事俱備束手待斃而已召余至診六剖臍數氣口緊盛余知是前醫悞以寒涼殺伐之過使真氣不運而瘀血不行子以八物湯加半夏陳皮木香厚朴蘿蔔子大腹皮海金沙服三劑後小便下血塊如雞肝狀服至十二劑打下黑血塊盆許腹中乃有數塊又以八物湯加枳實香附五劑而痊正是養正而積自除也信哉不誣

○一人腹中積塊面黃肌瘦腹大如鼓死在旦夕用端午日收下菖蒲陰乾切薄片放碗內用滾米湯泡熟蓋之待溫飲之



打下小蜈蚣百條內一大條長二尺餘病即愈

補遺

○一貼痞妙方

照磨陳招所集

甘草 五錢

甘遂 五錢

礞砂 五錢

沒藥 五錢

葱白 七寸

白蜜

小匙

右用焉齒莧同鼈肉搗成膏貼塊上効

○一千金貼痞膏

薛兵巡傳

黃丹

十兩水飛七次炒紫色

阿魏 三錢

乳香 三錢

沒藥 五錢

當歸 三錢

兩頭尖 五錢 白芷 五錢

川山甲 十片

木鼈子 十

麝香

錢

右俱爲細末用香油一斤槐桃柳桑榆各二尺四寸巴豆一百二十箇去油殼麻子一百二十箇去殼先將鐵鍋盛油炭火煎滾入巴豆草麻在內熬焦撈去渣次下前藥用桃柳等條不佳手攪均稠然後下丹滴水成珠爲度磁器收貯一男子腹內有痞者先以盪熱好醋將痞上洗淨量所患大小用



麩圈圈定用皮硝一升放入麩圈內鋪定用紙蓋硝上熨斗盛火不住手熨俟硝化盡再用湯醋洗去用紅絹攤膏貼於患處用舊布鞋底炙熱熨兩三時每七日換貼藥者不過三七腫血化去一小兒幼女患痞者醋醋蒸硝洗之用紅絹攤膏貼患處一人將小兒雙手抱住在肩上却用木鬚子搗爛搽於雙腎上後用膏貼炙鞋底熨之覺腹內大熱爲度

○一戴雷門夫人年近三旬患腹左有一大塊堅硬如石有時作痛肚腹膨悶經水不調或前或後或多或少或閉而不通白帶頻下夜間發熱脉急數好

千金化鐵丸

- 當歸 酒洗一兩 五錢
- 白朮 去苦炒一兩 五錢
- 半夏 姜汁炒一兩 五錢
- 桃仁 去皮尖五錢
- 琥珀 五錢
- 白芍 酒炒一兩 五錢
- 白茯苓 去皮一兩 五錢
- 枳實 麸炒七分 五錢
- 羅蔔子 炒五分 五錢
- 紅花 五錢
- 川芎 七分 五錢
- 陳皮 去白一兩 五錢
- 木香 五分 五錢
- 三稜 醋炒一兩 五錢
- 乾漆 炒盡烟五錢
- 懷生地黃 酒洗一兩 五錢
- 青皮 去穢七分 五錢
- 香附 炒一兩 五錢
- 莪木 醋炒一兩 五錢
- 礞砂 煨過五錢

右爲細末醋打麩糊爲丸如梧子大每服三錢白湯送下早晚各進一服服盡藥其塊潛消經卽調而後卽孕生一女也

五疸

脉經曰凡黃疸寸口脉近掌無脉口鼻黑色並不可治○大抵脉大者死微細者生無脉鼻氣冷者不治也沉渴欲飲水小便不利者必發黃也

內經曰諸濕腫滿皆屬脾士夫黃疸爲病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛母能令子虛母病子亦病是故有諸內者必形諸外其症有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五同是濕熱如盆曲相似故曰治濕不利小便非其治也又曰濕在上宜發汗在下宜利小便二法宜用使上下分消其濕則病無有不安者也

○一論治腎疸目黃甚至橫身俱黃小便赤腫者宜

腎疸湯



羌活

助風

藁本

獨治

柴胡各五分

白茯苓

二分澤瀉三分

猪苓四分

白木五分

蒼木一錢

黃柏二分

人參二分

葛根五分

神曲炒六分

甘草三分

升麻一錢

右剉一劑水煎稍熱服

○一論濕熱發黃汗黃尿赤及寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身自俱黃小便不利

不思飲食用

茯苓溲濕

猪苓

澤瀉

蒼木 泔浸

白茯苓

陳皮

枳實 麩炒

黃連 炒

黃芩

梔子

防已

茵陳

木通

右剉生薑三片水煎服○如飲食不思乃傷食加砂仁神曲炒麥芽炒各錢

○一論黃疸重屬濕熱合曲相似

陳五苓散

茵陳三錢

白木一錢五分

赤茯苓一錢

猪苓一錢

澤瀉一錢

澤瀉一錢



蒼木一錢 山梔二分 滑石一錢 官桂二分 甘草二分

右剉燈心水煎服

○一論五疸俱是脾胃濕熱相蒸以致遍身發黃如梔子水染者是也病延日久醫誤以寒涼之過損傷元氣脾胃以致身體黑瘦四肢沉困增寒發熱不思飲食等症宜以

加味益氣湯

黃芪蜜炒一分 人參一錢

白朮去苦炒二錢 陳皮八分 當歸一錢

柴胡五分 升麻五分

茵陳 蒼朮米泔浸 梔子炒

猪苓 澤瀉

赤茯苓 黃連 滑石各一錢

甘草炙四分

右剉生薑煎服以六味地黃丸加蒼朮白朮茵陳黃柏各二兩蜜丸相兼而進之

○一治發黃症身口俱發如金色小便如濃煮柏汁諸藥不効用加味解毒湯



黃芩 黃連 黃柏 梔子 柴胡 茵陳 龍膽草

木通 滑石 升麻 甘草

右剉燈心前服○大便實加大黃○目精黃倍龍膽草

○一治發黃脉沉細而遲體逆令腰已上自汗宜用

加味薑附湯

茵陳二兩 大附子一收麩去皮臍 乾薑五錢一兩 甘草炙一兩

右剉四劑水前服

○一治黃疸 安陵馬進齋傳極効

露珠飲

露珠即上豆形如薑搗爛取汁半碗温服立効

一治黃腫妙方 王少川傳

蒼朮一斤 廣陳皮半斤 川厚朴五兩 草果一兩

砂仁一兩 茵陳穗半斤 香附米一斤 青礬四兩

右青礬同附米炒燒過俱為細末醋打麵糊為丸如梧子大每空心酒下



湯亦可

○一治黃腫病最捷用此

綠礬丸

五倍子半斤

炒里

綠礬四兩

炒自

針砂四兩

炒紅

神曲半斤

黃

右為細末生薑汁煮紅棗肉為丸如梧子大每服六七十丸溫酒下不能飲酒米湯下終身忌食蕎麥

○一治黃胖飲食無味四肢無力行步倦怠脉澁而濡或腹有積塊脹滿加減胃苓湯

蒼朮米泔浸

陳皮

厚朴姜炒

猪苓

澤瀉

白朮去芦炒

白茯苓

藿香

半夏姜炒

大腹皮

山查

蘿蔔子

三稜

莪朮

青皮

甘草

右剉生薑三片棗二枚水煎溫服

○一治黃疸倦怠脾胃不和食少小便赤宜以



平胃散合五苓散加滑石

○一治黃腫腹中有積塊脹滿者用

山東李西嶺傳

退金丹

蒼朮 酒炒 八兩

香附 八兩

青皮 去穰 三兩

陳皮 四兩

良薑 一兩

厚朴 姜炒 二兩

烏藥 四兩

三稜 去穰 一兩

莪朮 一兩

青礬 入兩用百

右為細末醋糊為丸如梧子大每服五十九米湯送下

○一治酒疸食疸五積六聚七癥八瘕心腹疼痛潮熱等症不問大人小兒皆

可用此

紫金丸

血竭 二兩

沉香 一兩

青皮 去穰 二兩

陳皮 二兩

枳殼 去穰 二兩

厚朴 姜炒 二兩

百草霜 一兩

秦瓦 一兩

三稜 醋炒 三兩

黃石榴 二兩

蓬朮 醋炒 三兩

皂礬 四兩

香附 去毛 一兩

針砂 醋炒 一兩

乾漆 炒 二兩

板榔 二兩

甘草 五不

一方加仙木白木各一兩

右為細末用大棗煮爛去皮核打糊為丸如梧子大每服六七十丸溫酒送



下或米飲亦可

○一治遍身發黃妄言如狂苦於胸痛手不可近此中焦畜血為患宜用桃仁承氣湯打下瘀血即愈

○一治黃病愛吃茶者用

白朮

去芦炒

蒼朮

米泔浸軟各三兩

白芍

炒

黃芩

各二兩

薄荷葉

七錢

膽星

陳皮

各一兩

右為細末砂糖水調神曲糊為丸如梧子大每服五六十丸砂糖水下

○一治黃病愛吃壁泥者用

黃泥

一斤

砂糖

四兩和泥炒乾

右為細末黃連膏為丸如梧子大每服五六十丸空心糖湯下

○一治黃病愛吃生米者

陳皮

白芍

炒

神曲

炒

麥芽

炒

山楂

白茯苓

去皮

石膏

各一兩

厚朴

七分

蒼朮

一分

藿香

五分

白朮

一錢五分

甘草

三分



右到水煎熟入砂糖一蛤蜊殼食前服

○一治黃疸秘方

大蝦蟇一箇黑礬三錢猪肚一箇上二味裝入肚內煮爛蝦蟇去骨用煮湯洗令肚淨吃之即愈

○一治女勞瘵方

四苓散合四物湯去川芎加茵陳麥門冬滑石甘草

○一治諸黃疸口痰怔忡耳鳴脚軟微寒發熱小便白濁此爲虛症用

八味丸方見神益用四君子湯吞下

○一治黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消胃中脹熱牛糞并消胃中有乾糞

宜用

猪脂一小升溫熱頓服之日三次燥糞下去乃愈

