

續易簡方

南宋·施發撰

續易簡方

中醫古籍出版社

予非明醫者予正三本兼二道以
虞仲社取刊易簡續論示
予俾題其首披卷一門
可為王氏忠臣蓋無石中
其肯繁况德層晚年亦自
更定者不一則此固不嫌
於辨論也但取附諸方者
非世人取熟用者得是書
而用之非識脈明證不可

然有易簡方者不可無此
以相參錯則此書當易售
咸行兩巖老人書

續易簡方論目錄

第一卷

〔論三生飲〕

稀涎散

〔論姜附湯〕

姜附湯

〔論附子湯〕

〔論生料五積散〕

人參湯

桂心牡蠣湯

陽旦湯

竹葉防風湯

柴胡湯

黑神散

大調經散

石子湯

人參鼈甲散

〔論〕 兼胃湯

〔論〕 參蘇飲

礬石圓

竹茹湯

〔論〕 小柴胡湯

〔論〕 生姜瀉心湯

枳實梔子湯

〔論〕 真武湯

〔論〕 四逆湯

四逆散

黃香散

〔論〕温膽湯

蘇三姑

〔論〕理氣妙香散

人參竹葉湯

第二卷

順吐積滯散

〔論〕增損縮脾飲

〔論〕藿香正氣散 香薷散

〔論〕芩辛湯

和氣飲

玉真圓 天南星圓

白濁子散 備急圓

乳海全歌散 連髮瀆葱白湯

葛根葱白湯

〔論〕 滲濕湯

七味除濕湯

〔論〕 降氣湯

俞山人茱萸湯

又方

木瓜茱萸湯

〔論〕 杏子湯

小青龍湯

五嗽圓

人參飲子

白散子

藕豆散

大阿膠圓

理中湯

黃耆散

蓮心散

論理中湯

論四順理中圓

順味圓

溫中湯

論建中湯

良姜散

和氣飲

桂香圓

大承氣湯

救生丹

枳殼散

保安圓

集效圓

牡丹圓

斷弓弦散

一論四君子湯

十珍散

第三卷

一論平胃散

余知府平胃散 天下受拜平胃散

調脾散

一論二陳湯

一論四七湯

分清散

厚朴煎圓

至泉散

秘精圓

清心圓

金鎖丹

鎖精丹

猪苓圓

論四獸湯

吳茱萸散

白虎加桂湯

麻黃羌活散

小柴胡湯

大柴胡湯

木防湯

桂姜湯

十棗散

五積疔加飲

辟邪丹

大救人参散

大正氣散

五苓散

清脾湯

半夏湯

立效散

大柴胡蠶甲散

老瘡飲

草菓飲

常山飲

二姜散

朴附湯

第四卷

一論折下湯

駐車圓

黃連圓

桃花圓

朴附圓

三和湯

姜茶散

八 藜蘆圓

飲紅圓

地榆散

蓮阿膠圓

宿露湯

附子當飯圓

狼臍湯

大香連圓

擦斗子散

苦散子

萬應圓

油調散

倉廩湯

石蓮散

巴石圓

訶梨勒圓

朴連湯

聖麥子

六和湯

酒連圓

猪葉散

朱粉丹

苘若圓

栢連散

薤白餅

姜茶圓

麥通圓

〔論冒風湯〕

地仙散

柴胡散

稻根湯

〔論芳歸湯〕

清菟散

〔論積殼湯〕

益黃散

第五卷

〔論增損四物湯〕

四物湯

〔論逍遙散〕

加減十寶湯

通經圓

秦桂圓

〔論惺惺飲〕

消積圓

白餅子

化毒湯

犀角地黄湯

活血散

人薑散

紫草湯

消毒飲

龍坑餅

決明散

紫貝散

〔論白朮散〕

大青膏

觀音救命散

戊己圓

人參湯

參蘇飲子

史君子圓

六神散

鎮心圓

辰砂圓

抱龍圓

利驚圓

人參散

二神丹

了內湯

二神丹

芎活湯

論歌附散

第六卷

論兼正丹

論來復丹

論震靈丹

論蘇合香圓

論感應圓

論消暑圓

黃龍圓

龍鬚散

〔論紅圓子〕

八味竹茹湯

人參散

〔論青洲白圓子〕

玉液圓

金珠化痰圓

〔論如聖餅子〕

木香橘皮圓

白龍圓

〔論大己寒圓〕

附子理中圓

續易簡方論目錄

續易簡方論卷第一

王德唐作易簡方大槩多選於三因而
所以他方增損之今也

士夫孰不愛重皆治病捷要無逾此書
但其間有失點易未免大醇而小疵
予與德唐蚤咸有半面之好非敢求
多之也特以人命所關不容緘嘿於是
表而出之予豈好辯哉

永嘉施

發

政卿撰

〔三主欽〕

王氏去治卒中昏不知人痰氣上壅

咽喉作聲無問外感風寒內傷喜怒或六
脈沉伏或指下浮盛並宜服之其誤後學
多矣殊不知中風中寒中濕中氣與夫六
脈沉伏者固可附證增損用之若指下浮
盛其脈必浮而洪數此狹熱中風之候烏
可投以烏附大熱之劑如或用此是以火
益火耳須先以「稀涎散」微去其涎俟其
稍蘇然後以「加減小續命湯」發散之斯為
得矣今之為醫者所習多易簡凡見中者
不辨其冷熱遽投三生飲三生未效易以

三建湯三建後然其投止於重丹而已欲
僥倖萬一之中而有時足以害人皆王氏
啓之也更有中暑一證亦使人噎悶昏不
不知人其脈則虛弱而微遲或者不審以三
生飲治之禍不旋踵可不謹諸
稀涎散治中風忽然若醉狀躄昏闕四肢不
收風涎潮上瞞閉不通宜用救急

猪牙皂角

肆條肥美不
乾者去黑皮

白礬

光明者
一兩

右為細末輕者半錢重者三字以溫水調

便得惺惺次緩而調治不可便大改亦恐
過傷人

小續命湯治卒暴中風不省人事漸覺半身
不隨口眼喎斜手足攣掉語言蹇澁肢躄麻
痺神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣
不能屈伸骨節煩疼不得轉側及治諸風服
之皆驗治脚氣緩弱久服得差久病風人每
遇天色陰晦節候變更宜預服之以防暗瘧

三麻黃湯去節

人參

黃芩

白芍藥

芎藭

甘草炙

杏仁 去皮尖 炒黃

防己

桂 去屑 各一兩

防風 去蘆頭 一兩半

附子 均去皮 兩半兩

右剉散每服四錢水一盞半生姜五片麥

子一枚同煎至八分去滓濕服不拘時候

有熱者桂枝麻黃各用半兩黃芩加作煎

兩去附子不用

薑附湯千金方治卒中風痰壅盛生薑捌兩

附子減半並用生者自陳氏有中寒暈倒

方用炮熟姜附等分王氏因之改乾姜為

生者附子用熟者然既知其未穩當從古

方可也乃持兩端以嘗談未為切當其去
治中寒口噤與陰證傷寒豈知陰證傷寒
下利不渴手足逆冷小便反利汗出過多
脈微欲絕此將脫之證柔服炮姜炮附亦
未為過今中寒暈倒口吐涎沫而遠服熟
附烏知寒邪不用補而愈盛耶當先以生
姜附與之或未效徐投以半生半熟者人
或虛甚然後以熟姜附未晚也是雖陳氏
不審之故而王氏不能發明之安得不佳

其咎

姜附湯治卒中風痰壅盛

生薑

洗淨切片

附子

生去皮臍
一兩切片

右分爲二服每服水二大盞煎至七分去滓溫服不拘時候二滓併煎忌楮肉冷水附子湯治風寒濕合痺骨節疼痛固然其中芍藥一味極不利於失血虛寒之人服之反足增劇古人云減芍藥以避中寒誠不誣也此方所以用芍藥者以其能去風止痛耳然既有官桂減之亦無害不然以獨活代之獨活可以療風寒所擊手足牽痛

如此則無問失血之人凡有是病者皆可
服矣

主料五積散王氏云可以治婦人經候不調
產婦催生及胎死腹中產後發熱或往來
寒熱不問感冒風寒惡露為患均可治療
何不量虛實之甚也夫治產前產後之病
自是不同產前氣血充實如疎利發散之
劑因其所感而用之但不致於妨胎足其
產發氣血虛損當以滋養為本或感冒或
惡露而發發疎利之劑未免於用亦須且

戰且守而去其太甚者以防其損不足也
今欲以麻黃之藥施於產後之病豈所宜
哉產後亡血每至汗多乃復以麻黃而發
其汗則必有鬱冒之患况產後發熱與往
來寒熱非一種當隨其證而治之可也

血虛而發熱者〔人參湯逍遙散〕主之

頭疼而發熱者〔桂心牡蠣湯〕主之

傷風而發熱者〔陽旦湯竹葉防風湯〕主之
往來寒熱惡露不止者〔柴胡湯〕主之

敗血不散乍寒乍熱者〔黑神散大調經散

主之

虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗

咳嘔痰逆此名葶勞〔石子湯人參鼈甲湯〕

主之

尋常感冒惡寒發熱可於生料

五積散中去麻黃名〔和氣飲〕治之

人參湯治產後諸虛不足發熱盜汗

川當歸去頭尾

人參去蘆

右等分為細末先以猪腰一隻去脂膜切
作小片用水三升糯米半合葱白兩條糞
米熟取清汁一盞藥末二錢煎至八分溫

服不計時

桂心牡蠣湯治產後頭疼身熱發熱及腹內
急疼痛

桂心 參兩

白芍藥

乾地黄

牡蠣 各伍兩

黃芩 二兩

右剉散每服五錢水一盃半煎至一盃去

滓頭疼食後服腹痛食前服

湯且滿治產後傷風十數日不解頭微痛惡
寒時時有熱心下堅軋嘔汗出

桂枝去蘼皮

白芍藥 各三兩

甘草 兩

黃芩 一兩

右劉散每服五錢水一盞半生薑五片麥
子二枚煎至一盞去滓溫服須臾啜稀粥
一盞以助藥力溫覆令一時許遍身熱熱
微似有汗者佳此即桂枝湯加黃芩江淮
間唯冬及春可行桂枝春末至夏至已前
可服此

竹葉防風湯治產後傷風發熱面赤喘而頭
疼者

竹葉 半握

葛根 一兩半

防風 去蘆

桔梗 去蘆

桂枝 去皮

人參 去蘆

甘草 炙各半兩

右劉散每服四錢水一盞半生姜三片枣

子一枚煎至八分去滓溫服取汗如頸項

強加熟附一錢嘔者加熟半夏一錢同煎

紫胡湯治產後往來寒熱惡露不止

紫胡 去蘆

生薑

洗淨各糊兩

川當歸

去蘆

赤芍藥

黃耆

各三兩

桃仁

去尖伍拾箇

吳茱萸

肆兩

牡丹皮

卷兩

右劉散每服四錢水一盞半煎至八分去

滓食前溫服二滓併煎日進數服為佳

黑神散治敗血不散乍寒乍熱

桂心 厚者

當歸 頭一節硬實者

赤芍藥

甘草 炙

生乾地黄

乾姜 炮各一兩

熟附 羊兩

黑豆 炒去皮

右細末每服二錢空心食前溫酒調下

大調經散治產後血虛惡露未消氣為敗濁

凝滯采衛不調陰陽相乘憎寒發熱或自汗

或腫滿皆氣血未平之所為

大豆 炒去皮一兩半

茯神 一兩

真琥珀 一錢

右細末濃煎烏豆紫蘆湯調下

石子湯治產理不順疲極筋力憂勞心慮致
虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢躄倦怠咳
嗽痰逆腹中絞刺名曰葶勞

猪腎

一對去脂膜四破
每則以羊腎代之

香鼓

葱白

粳米

當飯

芍藥

各截兩

右剉散分為兩劑每一劑用水三升煮取

一小椀去滓分三暖任意服

人參鼈甲散治婦人產後葶勞皆由產內未

滿百日躄中虛損血氣尚弱失於將理或勞

動竹傷致成此疾其狀虛乏乍起乍卧飲食
不消時有咳嗽頭目昏痛突歇不常夜有盜
汗厥熱如瘧背膊拘急沉困在牀服此大效

人參

桂心

當飯

桃仁

去皮尖
熬炒

熟地黄洗

桑寄生

白茯苓

白芍藥

麥門冬 去心

甘草

炙
各半

鼈甲

洗淨
醋炙

黃耆

各一兩

牛膝 三分

續斷 一分

右為末每服先用猪腰子一對去筋膜洗
以水二大盞生姜半合麩子三枚煎至一

盪去腰子姜麥然後下藥末三錢入葱白
三寸烏梅一箇荆芥穗五七莖同煎至七
分去滓空心晚食前溫服

羶胃湯人皆知可以治感冒傷食而不知其
最能治痰飲嘔逆及霍亂吐瀉也大抵此
藥性溫若憎寒吐熱小便多赤淡茯苓當
用赤者綠白者補而赤者利也不可不知

參蘓散王氏云可以治痰飲發熱殊不可有
可以用此有不可此用此者難以一藥言
也如飲酒是多渴而飲水積成痰飲致陰

陽否隔身躰發熱此名熱瘕用此治之則
宜或自腰已上發熱熱極則汗汗已則涼
移時如故復加昏胃暖中膨亨其氣上攻
時時欬嗽引脇下牽痛眩中驚悸其脉
弦緊帶疾者此名寒飲宜礬石圓溫利之
非參蘇飲所能治也又云大治中脘痞滿
嘔逆惡心用胃進食每以踰此然嘔逆惡
心有寒熱二證胃熱者可用此如未效則
與竹茹湯一胃寒者當以二陳湯一或理中湯
加半夏丁香主之豈可仰用前胡乾葛輩

哉欲知胃熱手足心皆熱者是

礬石圓治外寒。客搏內冷相合氣收夜聚化
而成飲因服熱藥自腰已上復增客熱散而
為汗亡陽內虛眩中驚悸服此溫利

礬石

煨一宿
二兩

旋復花

桂

去屏皮

枳實

浸去穢
炒

人參

各伍分

乾姜

芍藥

白朮

各一兩半

茯苓

烏頭

炮去皮

細辛

去苗

大黃

濕帛
裏煨

厚朴

去皮
善制衣

吳茱萸

炒芫花

炒

橘皮

各一兩

耳遂

煨

右為未煉蜜丸如梧子大飲下五丸未

漸加

竹茹湯治胃熱嘔吐

乾葛 三四 半夏 三分姜汁半盞漿水一升

耳草 三分

右剉散每服五錢水二盞生姜三片竹茹

一彈子大棗一枚同煎至一盞去滓溫服

小柴胡湯一名黃胡湯本少陽經傷寒一解

表藥耳所主者胃腸痛耳聾口苦舌乾往

來寒熱而嘔其脈浮而弦細今王氏首云

治傷寒瘟疫病身熱惡風頭項強急脅滿脇
痛煩渴嘔噦小便不利大便秘硬此太陽
經傷風木解轉入少陽未可吐下其脈浮
而弦數者可以此治之然亦非正所主也
此藥傷寒論三數十證大要五證用之
的當一者身熱心中逆或嘔吐者可服若
因渴飲水而嘔者不可服身熱不濕熱者
不可服二者寒熱往來者可服三者發潮
熱者可服四者心煩脇下滿或渴或不渴
皆可服五者傷寒發後更發熱者可服此

五證但有一證便可服服之必差者有三
兩證已上更的當也此藥非惟可以治
傷風寒常時熱欬上壅痰突與夫瘧疾寒
少而熱多及中暑毒而成瀉者服之立效
又傷寒有方後食後二證此可以治方後
王氏謂食後難以治療未為通論生姜瀉
心湯枳實梔子湯加大黃皆治食後之要
劑可擬而用之

生姜瀉心湯治大病新差脾胃尚弱穀氣未復
強食過多停積不化心下痞鞭乾噫食臭

腸下有水腹中雷鳴下利矣熱名曰食後大
宜服之

黃芩

甘草炙

人參

各壹兩半

半夏

洗一兩一分

乾姜

黃連

各半兩

右剉散每服五錢水一盞半生姜七片煮

十二枚煎至一盞去滓溫服

枳實梔子湯治大病差後勞復

枳實

一箇

肥梔子

半枚

豉

一兩半

右剉散以清漿水二盞半空者退八分內

枳實梔子煎取九分下豉再煎五六沸去

濇濕服覆令汗出若有宿食內大黃如博
棊子伍陸枚同煎

真武湯按治人書云大陽病發汗汗出不解
其人仍發熱心下悸頭眩身暈動振々欬
擗地者真武湯主之少陰病二三日不已
至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛
自下利者此為水氣其人或利或小便利
或不利或嘔者真武湯主之由是而觀則
知此藥不極能治太陽病而少陰病亦治
之也王氏因其水氣之說乃去此由渴後

飲水停留中脘所致即此以明心悸頭暈
身熱胸動等證意以爲皆少陰病而不知
此證乃太陽傷風合行桂枝誤作傷寒證
治用麻黃以發汗汗出過多亡陽發熱而
致此不應泛引痰飲之證爲傷寒之證謬
矣然其加減雖本於治人書而附子一節
較之孫氏秘室則互相矛盾便後學無所
適從治人書云嘔者去附子加生姜三片
夫生姜嘔家聖藥治嘔用此固宜如寒嘔
則附子不當去秘室之不下利去附子加

生薑合煎作半斤使果不下利附子去亦
無害既不言治嘔則增生薑何義王氏於
此極加生薑而不去附子生薑固治嘔矣
而附子尚存以之治寒嘔則可若熱而嘔
者豈不敗迺事哉三家皆說未盡當作不
下利而嘔者去附子加生薑如此方可以
貫三家之說也

〔四逆湯〕此救裏之劑也治少陰傷寒膈上停
飲軋嘔及吐利汗出小便復利發熱惡寒
四肢拘急手足厥冷脈微欲絕或下利清

穀表熱裏寒脈浮而遲者太陰病眩寒自
利不渴者取陰病大汗出熱不去內拘急
四肢疼又下利取逆而惡寒者與夫傷寒
病本在表醫反下之續下利不止雖覺頭
痛躄疼表證悉具未可攻表宜先服此以
助陽救裏次服桂枝湯以解表此方陳氏
誤將小便後利為不利王氏因其不利之
言復改為或然人自疑其言之未穩再有
或利之說以僥倖其一中然證之未明何
以施治使小便而果泄豈善附之藥所可

療不知少陰病自有小便不利一證乃用
「四逆散」加茯苓治之初非四逆湯也著書
立言而不審若此何以垂後世哉

四逆散治少陰病四逆其人或欬或悸或小
便不利或腹中痛或泄利重者

甘草

枳實

去穢
欬炒

柴胡

芍藥各一兩

右細末米飲調下二錢日三服欬者加五

味子乾姜各半兩下利悸者加桂半兩小

便不利者加赤茯苓半兩腹中痛者加熟

附肆錢池利下重先濃煎薤白湯內藥末
三錢再煮一二沸溫服

溫膽湯有二方俱載於三因一方見肝膽虛
實寒熱門此方見虛煩門且去治大病後
虛煩不得眠此膽寒故也氣治驚悸然既
以膽寒欲溫之不應後因竹茹桂寒之藥
按本草竹茹微寒主噎膈嘔呃溫氣寒熱
吐血崩中止肺痿鼻衄及五疇初未嘗治
膽寒虛煩不得眠也先輩製方命名殊未
可曉王氏推廣三因驚悸之說以為心驚

膽怯氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證此方
既有茯苓以止驚悸又有枳實橘紅以理
氣半夏以治痰當去竹茹加炒熟酸枣仁
薑兩不然則局方「妙香散」極佳如虛煩而
發熱者却用「人參竹葉湯」。

妙香散治男子婦人心氣不足志意不定驚
悸恐怖悲憂慘感虛煩少睡喜怒不常夜多
盜汗飲食無味頭目昏睡常服補益氣血安
神鎮心

白茯苓

茯苓神去皮木

署蕪姜汁炙

遠志炒 黃耆各一兩 人參

桔梗

甘草炙 各半兩

木香

煨 貳錢半

辰砂

別研

麝香

別研

右細末每服二錢溫酒下

人參竹葉湯

治汗下後表裏虛煩不可攻者

孫子秘寶名竹葉湯活人書名竹葉石膏湯

治傷寒解後虛羸少氣嘔逆欲吐此出三因

方三方今兩不同

竹葉貳把

人參

甘草

炙 各二兩

半夏

洗 二兩

麥門冬去心

石膏

各伍兩

人參

六三

治諸寒解後氣弱

然必歸補益如某陽

水者行氣通

性溫味甘平每服

蓮汗氣弱頭暈

神鎮 諸症 其草 路 木香

參

參

參

續易簡方論卷第二

增損縮脾飲一 大治脾胃虛弱傷暑者此藥有

以守胃氣烏梅甘草乾葛以解

含極冷恐非年高虛怯人所宜

未以熟水調服最為穩當王氏

飲食生冷過多至霍亂吐瀉者亦

未敢信然夫因食生冷而致霍亂

其脾胃不當後以乾葛性冷之藥

如藿香正氣散加白朮極為切要或

中霍亂急可投以浸冷香需散人皆

疑香需散為冷藥非也。按本草厚朴性溫，香需性極冷，^十菹豆性微溫，况厚朴菹豆，但以姜汁製之，此乃正劑，烏得為冷可服之無疑。

藿香正氣散治傷寒陰證增寒惡風正氣逐冷，胃膈噎寒，脇助膨脹，心下堅痞，吐利嘔逆，怠惰嗜卧，不思飲食。

半夏

厚朴

各三兩

各三兩

藿香葉

陳皮

各一兩

甘草

七錢

右到散每服四錢水一盞半生姜七片棗

子一枚煎至七分去滓食前溫服霍亂吐
瀉加白朮卷兩

香薷散治藏府冷熱不調飲食不節或食腥
膾生冷過度或起居不節或露臥湿地或當
風取涼而風冷之氣客於三焦傳於脾胃脾
胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃
虛弱因飲食變亂於腸胃之間便致吐利心
腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛
而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛躄疼
而後吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或

轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脈欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能主之

香薷

去梗 伍兩

厚朴

去皮 薑汁炙香

白蘊豆

去汁製 各二兩半

右剉散每服三錢水一盞入酒一呷同煎豆七分去滓水中沉冷連進二服立有神效不拘時候

芎藭湯 王氏曰此與如聖餅子同治一切頭疼然頭疼非一種有風冷頭疼痰厥頭疼

腎厥頭疼積滯頭疼氣虛頭疼偏正頭疼
嗅毒頭疼傷寒頭疼暈痰風厥頭疼更有
夾腦風洗頭風治之各有方今欲以此藥
兼治之凡有風寒痰飲則可至若 腎厥
頭疼當服〔玉真圓〕積滯頭疼當服〔備急
圓〕氣虛頭疼則〔乳附全蠍散〕嗅毒頭
疼則食〔炒黑豆〕傷寒頭疼則連鬚葱白
湯葛根葱白湯 主之不可以一律齊也又
欲以鍾乳粉代石膏殊未可曉夫石膏性
寒能除時氣身熱頭痛本經即無墜痰飲

之說鍾乳性溫主欬逆上氣此物初非療
頭疼之劑二者所治大不相侔未審王氏
何所見而反此意其因蘇恭注五石時云
五石脂中又有石膏似骨如玉堅閤服之
勝鍾乳便以鍾乳與石膏性味主治相類
殊不知石膏之名雖同其實則異不可不
為之辨諸方言腎厥頭疼皆未詳而葉氏
病源亦無此證極王子享云若頭痛筋牽
骨重少氣噦噫欬嗽煩冤腹滿時驚不睿
臥其脈舉之則弦按之石堅由腎氣不足

而內著其氣逆而上行名為腎厥令服玉
真圓此言雖本於雷公黃帝之問荅當時
初不明言夫頭痛之證至陳氏作三因乃
於此方易半夏以南星謂之天南星圓云
治腎厥頭疼不可忍者亦未嘗言腎厥之
散張茂之作究原方後於天南星圓去治
厥逆頭痛及齒痛骨寒因腎虛犯寒所致
並無筋攣骨重等證及餽子亭再出白附
子散一證云治頭痛連齒時發時止連年
不已此由風寒留於骨髓髓者腦為主腦

逆故令頭痛而齒亦痛此正內經之奇病
即張氏天南星圖所主之意由是而論則
知腎主骨而齒者骨之餘腎經虛而感寒
陰氣上逆貫肝入肺而至於腦與陽氣相
搏故頭痛齒亦從而痛也如此說方分曉

玉真圖治腎厥頭疼

石膏

大煨
通赤

半夏

湯洗
七次

硫黃

研各
一兩

消石

一兩

右為末生姜汁煮糊丸如桐子大姜湯下

三十九

天南星圓治腎一候頭疼不可忍

硫黃

石膏

天南星炮

煆消 各等分

右為末糊圓如梧子大每服三十圓空心

食前温酒下

白附子散治腦逆頭痛齒亦痛

麻黃 不去莖

天南星炮

烏頭

炮去皮
各半兩

白附子

一炊
兩

朱砂研

麝香研

乾姜

炮
各一分

蝎 伍箇

右為細末酒調半錢服訖去枕卧少時

備急圓治積滯頭痛

大黃

乾姜

巴豆

去皮
出細

右等分為細末煉蜜丸如豌豆大每飲下

一丸羸人服半丸棗豆大以大便利為度

乳附全蠟散治氣虛頭疼

大附子一箇全蠟二箇

鐘乳一兩

右將附子剉去心入全蠟在內以所剉附

子末同鐘乳并麩少許水和裏炮熟以焦

黃為度都碾為末葱茶調下一錢或半錢

連鬚葱白湯治傷寒已發汗或未發汗頭疼

如破

生姜 二兩

連鬚葱白 小切半升

右以水二升煮減半去滓分三服服此湯

不差者服後湯

葛根葱白湯治頭疼不止

葛根

白芍藥

知母 各半兩

川芎

生姜

各一兩葱白 一把

右剉散以水三升煎取一升半去滓每服

一湯飲

滲濕湯 王氏錐本於三因以之治濕不若〔七

味除濕湯用藥之善而百一選方如白朮
附子白茯苓者亦不違焉夫去濕以朮為
主古方及本經止言朮未嘗有蒼朮之分
自陶隱居言朮有兩種後人以白者難得
故貴而用之殊不知白朮肉厚而味厚
入脾能緩而羶氣九養氣調中則相宜耳
蒼朮肉薄而味辛烈辛烈走氣而發外凡
於治風去濕則宜耳以此觀之相則白朮
治濕不如蒼朮明矣修濕湯既用蒼朮復
用白朮切力不專百一選方乃用白朮不

用蒼朮主治不切况七味除濕湯用藿香
厚朴最為有理然雖不及姜附之烈而建
脾暖胃使中別之土燥則濕氣不戰而自
屈古人云治濕不利小便非其治也利小
便者在茯苓諸方多用白者豈知白者性
平補而赤者性利也可易白者以赤者為良
七味除濕湯治寒濕所傷身重躄痛膝屈汗
出大便溏泄小便或澀或利腰脚酸疼腿膝
浮腫及胃寒嘔逆悉主之

半夏麴

川朴 姜製

蒼朮 各二兩

藿香葉

陳橘皮

茯苓 各一兩

右剉散每服四錢水一盞半生姜七片棗
一枚同煎至七分去滓食前溫服茯苓用
赤者

降氣湯王氏云專治脚氣上攻中滿喘急下
元虛冷然此方力輕不如局方真俞山人
降氣湯為效速也彼方加五加皮可以治
兩脚弱痛風濕虛痺如附子可以治風寒
濕氣腰脚冷痛加乾姜可以治脅滿上氣

逐風濕痺加羌活療風利五臟加桔梗療
奔促嗽逐加黃耆療虛喘客熱加人參止
煩悶喘急雖然附子當用生者較之前方
其功力豈不數倍哉况脚氣衰證甚多難
以枚舉如入腹衝心最為危急不如木瓜
茱萸湯之妙

俞山人降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛
下虛腸壅上痰實喘滿咽乾不利煩渴引飲頭
目昏眩腰脚無力四肢倦怠咳嗽兼治風濕
脚氣

紫蘇子

前胡

厚朴

姜汁製炒

甘草 炙

橘紅

當歸

半夏 麩

桂心

五加皮

薑汁炙

黃耆 各一兩

人參

附子

炮

桔梗

羌活

乾姜

炮各半兩

右剉散每服三錢水一盞半入此紫蘇三葉

生姜三片棗一枚同煎至七分去滓食後

服之如脚氣則食前服

木乳茱萸湯專治脚氣入腹困悶欲死腹脹

喘急

木仇

二枚

吳茱萸

湯洗

七次

右用水四碗煎至一碗去滓分兩服如人行十里久再進一服或汗或吐或瀉昂瘥不拘時候

方

木仇乾

大片者

檉柳

各二兩

吳茱萸

揀淨一兩以水煮三兩沸取出日乾炒令熟

右剉散每服四錢水一觔半煎至七分去

滓通口服食前

杏子湯 王氏云治一切咳嗽夫嗽非一種有

冷嗽邪嗽飲嗽鯨嗽上氣嗽此五者皆由
肺受風寒氣不宣通所致欲總治之則有
局方五嗽圓如欲專治寒嗽則杏子湯亦
可用嗽久不已小青龍湯主之甚者當
服白散子或肺經蘊熱或脾經熱氣衝
肺或氣盛之人厚衣作壅致肺系閉風寒
乘之而嗽者此各寒熱壅當服人參飲子
嗽多則加桑白皮痰多則加半夏麴又
有肺虛容熱咳嗽氣急咽乾口燥渴欲飲
冷者此名熱嗽宜與大阿膠圓已上諸證

豈杏子湯所能盡治哉王氏又云虛勞咯
血此藥亦可治夫虛勞咯血有數證大槩
輕則咯血重則吐血 有久嗽肺痿而咯
血者可服藕豆散 有中寒氣虛陰陽不
相守血乃妄行者經所謂陽虛陰必走是
也咯血吐血衄血便血皆有此證理中湯
加官桂治之人皆知此藥能理中脘不知
其有分利陰陽安定血脉之功也 有虛
熱而咯血者當服〔黃耆散〕 有勞心而咯
血者〔蓮心散〕主之又豈杏子湯所能治哉

王氏輕於措辭而不知其失良可惜夫

五嗽圓治五積痰嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽
三曰鱗嗽四曰冷嗽五日邪嗽皆由肺受風
寒氣不宣通所致無間久新輕重以至食飲
不下語聲不出坐卧不安晝夜不止面目浮
腫胃脘引痛並宜服之

皂莢

去皮子

乾姜

炮

桂

去麻皮

各二兩

右為細末煉蜜為丸梧子大每服五十丸

食後溫酒米飲任下

小青龍湯治因形寒飲冷內傷肺經欬嗽喘

急嘔吐涎沫不得安卧又治溢飲身躄疼重
及治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬
嗽微喘

麻黃去節

赤芍藥

細辛

乾姜

甘草炒

桂枝各三兩

五味子二兩半夏

湯洗七次

右剉散每服四錢水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

白散子治久年咳嗽不愈者

附子

一隻煨熟新水浸
時久去皮臍焙乾

右為末每服一錢白沙蜜二錢水一盞煎
至七分通口服

人參飲子治寒熱壅痰涎

人參

桔梗

五味子

赤茯苓

白朮

各一兩

枳殼麸炒

甘草

炙 各半兩

右到散每服四錢水一盞半薑五片煎七

分去滓空心食前溫服如嗽多加桑白皮

壹兩痰多加半夏菊一兩凡寒暑之夾氣

盛人衣厚作壅忽上痰盛微發熱此藥最宜

告作感冒癸其汁攻其邪必成大病此方
佳處乃在赤茯苓能導心熱枳殼能疎肺
壅故易作效

大阿膠圓治肺虛客熱咳嗽氣急胃中煩悸
肢躄倦疼咽乾口燥渴欲飲多冷唾涎沫或
有鮮血肌瘦癸熟減食嗜臥又或治因吐怒
或即房勞肺胃致傷吐血嘔血並宜服之

阿膠炒

白茯苓

熟乾地黄

五味子

山藥 各一兩 貝母炒

丹參

百部

栝子仁

杜仲 去麻皮 剉炒

麥門冬 去心

茯神 去木 各半兩

人參

防風 去蘆及 枝

遠志 去心 各一兩

右為末煉蜜和丸每一兩作二十四丸每

服一九水一中盞煎至六分和滓溫服少

少頻呻不拘時候

菡豆散治久嗽咯血成肺痿多吐白涎胃膈

滿悶不食

白菡豆

生姜 各半兩 枇杷葉 去毛

半夏 湯

人參 白朮 各一分

白茅根 三分

右剉散水三升煎至一升去滓下續搗末

一錢和勻分四服不拘時候

理中湯治中寒氣虛咯血吐血

人參

白朮

乾姜

炮各一兩

官桂

去粗皮

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半煎八分去滓不以

時服如傷胃吐血只煮乾姜耳草湯飲之

亦妙

黃耆散治心肺虛熱因嗽咯血成勞眼睛赤四

收倦脚無力

黃耆

白芍藥

熟地黄

麥門冬 去心

桔梗

各半兩

甘草

一分

右到散每服四錢水一盞半姜三片煎七

分去滓溫服日三

蓮心散治勞心咯血吐血

蓮子心 紫筒

糯米 二十一粒

右為末酒調後服

理中湯局方治療甚詳大抵以溫中去寒濕

為主如治霍亂須加藿香葉半夏麴可也

本方四味各一兩西北之人所食其淡而

脾胃強壯有病宜依方製服東南之人所
食鹹酸而脾胃脆弱耳草減作三錢婦人
產後腹痛於本方增耳草作一两半煉蜜
為圓名「四順理中圓」亦治傷寒時氣裏寒
外熱加五味子阿膠朮等分名「順味圓」治
寒邪作嘔甚妙老人吐瀉不止去耳草加
白茯苓一兩名溫中湯仍下米後卅此藥
隨證加減所治甚衆故今人多用之王氏
乃云一法治飲酒過多及啖炙燻熱食癸
為梟釵於本方加川芎一两服之不知內

有乾姜性大熱以熱投熱豈不謬哉

四順理中圓治新產氣血俱傷五臟暴虛敗
躰瘦弱少氣多汗絕產直至百辟常服
除餘疾

人參

乾姜炮

白朮各一兩

甘草

炙
一兩半

右細末煉蜜為圓如桐子大每服二十圓

空心溫酒下

順味圓治寒邪作嗽

人參

乾姜

白朮

耳草

五味子

阿膠 各等分

右為細末煉蜜為圓每一兩作八圓每服

一圓細嚼未飲噎下

溫中湯治老人吐瀉不止

棟參

白朮

乾姜

炮略

右為細末每服二錢鹽湯米飲調服空心

食前蓋乳姜溫中茯苓利水平三焦也

建中湯治腹中切痛然腹極多端有冷痞

熱痛積痛蟲痛血刺客忤常隨證以治之

診其關尺脉弦遲按之便痛重按不甚痛者為冷氣可服「良姜散小建中湯」如其脉微而瀉腸鳴泄利而痛者當於「和氣飲中加炒吳茱萸仍下」桂香圓「診其關尺脉數緊發熱小便赤而痛者為熱痛可服小柴胡湯去黃芩加白芍藥如其脉洪而實大便不通而痛甚者當以「大承氣湯下之而愈」若中虛氣弱飲食停積重按愈痛而堅者此為積痛其脉必弦緊而滑「救生丹枳殼散」主之或渴欲引飲胃中

痞塞大便祕結脈沈短而實者宜服〔保安
圓〕若往來行痛腹中煩熱口吐清水脈
緊實而滑者蛔動也宜服〔集效圓〕婦人
心腹疼痛脈沉而結者此血刺也〔牡丹圓
良方〕斲弓弦散〕主之 若心腹卒然而痛
其脈滑或長短小大不齊者此為客忤可
服〔蘇合香圓備急圓〕已上腹痛豈一藥所
能療哉王氏又謂建中湯用藥與桂枝湯
同但減芍藥如官桂之數如無汗不宜服
不知仲景桂枝湯不用厚桂而用桂枝者

蓋以桂枝薄而性緊有輕利便捷之義易於發散如厚桂則性緩重之以溫中止痛為上今建中湯合用厚桂而白芍藥倍之雖無汗服之無慮也

良姜散治停寒積冷心腹撮痛

高良姜

一斤用好油熬熟旋下細碎合赤色用殼反措去油細碎合

耳草

炙

丁香

各一兩

人參

二兩半

胡椒

一兩

萹揆

半兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服

食前

和氣飲治腹痛腸鳴泄利

蒼朮

一肆錢

桔梗

一兩二錢

枳殼

去穢炒

橘紅

各陸錢

白芍藥

白芷

川芎

當飯

赤茯苓

桂

去蘘皮

半夏

湯洗七次

甘草

炙各三錢

厚朴

去蘘皮姜製

乾姜

各肆錢

吳茱萸

炒兩

右剉散每服四錢水一盞半生姜三片煎

至八分去滓食前通口服二滓併煎

桂香圓元名芫附圓治腸胃虛弱由受風冷

水穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服

諸藥不效者此藥主之

附子

炮去
皮臍

白茯苓

肉苳蓉

炮各
肆兩

丁香

不見火
一兩

木香

不見火

肉桂

去蘇皮
不見火

乾姜

炒
各二兩

右細末姜汁麩糊為丸如梧桐子大每服

五十圓至一百圓生薑湯吞下米飲亦得

空心食前

大承氣湯治腹中滿痛大便不通

厚朴

去皮
肆兩 姜汁炙

芒消

二兩
以朴

如每
代

枳實

三枚
去穰炒

大黃

二兩
生用

錦紋
音

右劉散每服五錢水二盞煎至一盞去滓
入芒消再煎一二沸溫服以利為度未利
再服

救生丹消酒食化滯氣空利胃腸

丁香 木香 肉桂 各一分

白姜 辛兩 燒存性 巴薑 拾伍粒 去皮用油煎令黑色為度

大耳草 燒存性

右細末酒糊為丸如棗豆大每服七圓茶

酒任下

枳殼散治五種積氣三焦痞塞胃腸滿悶背

膈引疼心腹膨脹脇助刺痛食飲不下噎塞
不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短氣煩
悶常服順氣寬中消痞癖積聚散驚憂恚氣

枳殼

荆三稜

橘皮

益智仁

蓬莪朮

檳榔

肉桂

各一兩

乾姜

厚朴

身草

炙

青皮

肉苳蓉

麵煨

木香

各煨

右細末每服二錢水一盞生姜三片棗一

枚同煎至七分熱服鹽點亦得不拘時候

保安圓治酒食所傷積滯不化或渴欲引飲
胃中痞塞大便秘結腹痛不可忍者

巴豆

手兩去皮心後一向研細紙
裹去油了入衆菜肉同研

黃連

去毛

青皮

去白

蓬莪茂

乾姜

炮各一兩

右為末醋糊為圓如麻子大朱砂為衣每

服七圓食前熟水下霍亂吐瀉煨生姜湯

下小兒三圓心氣痛醋湯下白菊乾姜湯

下赤痢耳草湯下

集效圓治因臟腑虛弱或多食耳肥致蛇蟲

動作心腹絞痛癸則腫聚往來上下痛有休
止腹中煩熱口吐涎沫即是蛇咬宜服此藥
若積年不愈服之亦愈又治下部有瘰癧痔
瘡痛

大黃

剉炒
一兩
西半

鶴虱

炒

薑黃

炒

訶子

煨去核

附子

炮去
支

乾姜

炮

木香

檳榔

各柴錢半

右細末蜜圓如梧子大每服三十圓食前
橘皮湯下婦人醋湯下

牡丹圓治婦人月病血刺疼痛及寒疝心腹

刺痛体作無時

川烏頭

炮合焦黑
去皮尖

牡丹皮

各肆兩

桃仁

炒去皮尖兩

桂心

各伍兩

右末煉蜜圓梧子大每服五十圓醋湯下

寒疝温酒下

新弓弦散一名失笑散治婦人血刺心腹疼

痛及小腸氣煩

五靈脂

蒲黃

各等分

右二錢先用釀醋一合熬藥成膏以水一

小盞煎至七分熱服

四君子湯一雖病後平補良劑然味甜頗不利
於東南人如用之當損甘草可也又未若
十珍散之妙彼方加黃耆可以補虛損止
盜汗加山藥可以助五藏益氣力加菡豆
可以治脾胃虛弱困倦少力不思飲食加
宿沙可以溫脾胃消宿食加桔梗可以補
血氣除寒熱溫中消痰加五味子可以補
不足養五藏益精氣比之四君子湯此為
至勝若小兒病以四君子湯隨證增損用
之極驗

〔十珍散〕治大病之後氣不復常之力短氣神
情不樂口舌無味

揀參

白朮

白茯苓

黃耆蜜炙

白藕豆姜製

山藥各一兩

宿沙仁

桔梗

五味子

車草

各半兩

右細末每服三錢水一盞姜三片棗一枚
煎至七分食前服

五十年會合

此物本為三...

...

...

...

...

...

...

續易簡方論卷第三

平胃散乃常服之劑多是修製未工則為效亦淺今守光遠方製治極精但費工力耳而增加他藥治病甚衆陳總卿葦又錄經驗方以此藥入姜枣煮透使滋味相和與衆不同兼厚朴經煮油去又易料理名為「天不受拜平胃散」倉卒入鹽點服免再煎煮如泄瀉每服三錢生姜五片烏梅二箇鹽少許水一盞半煎八分服其效如神或耳草減半名「調脾散」凡脾胃女有

不和便再服之

余知府平胃散夫欲一身之安在於調氣進食而已氣不調則百脉俱滯食不進則榮衛日衰以致肢躄倦怠心腹膨脹精神不佳藏腑滑洩惡聞食味病皆由此二者古方中平胃散真妙劑有治百病之功世人時見其藥材易得名稱陳熟多不服餅間有服者又不得其修製之法而藥肆所合尤為鹵莽所以食之鮮效今具別法如後好事者請詳試之自見其功日能進數服一月之間能盡藥末

一料藥忌生冷則諸病自愈不可輕忽蓋和
合與常有異

川厚朴去蘆皮淨盡用紋刀剪作小塊
如豆大每朴一兩用生姜二兩研去
滓取自然汁用浸厚朴蓋至次日用
看攪轉如是姜汁已乾再取姜不

拘多少研汁拌又次日開看攪如前
丸浸三日撓起入鍋內乞以猛火炒
一飯久藥熟投入所餘姜汁內令參
乾了再用猛火炒一飯時不住手攪

不可焦然後取一塊擘開着心中油
盡蘇脆透心乾嚼之不粘齒即取出
用辣眼竹筍篩子篩去焦碎者不用
右科伍兩係修葺了者不同

陳皮一裹先去枳皮柚皮及青皮只用
一色黃者斲去塵土旋取二三四兩用
溫水逐片搗洗淨了換水浸將薄
刀起去內白只留外紅薄皮一重其
餘旋入水洗去白不可久浸恐爛即
用篩子盛曝乾煨火焙亦得

右秤五兩濕別成見者名橘紅

蒼朮先用溫水洗淨灰土用米泔水浸

三日候軟未軟更浸用力刮去烏皮

洗了薄切片子焙乾用燉火炒兩飯

時候油出盡方取出不住攪不要焦

用煎木尤妙

右秤捌兩

粉草碎破濕能裹煨令香熟不要焦取

出細剉

右秤一兩玖錢令用一兩半

已上藥材炒了乘燥便秤入研並不得停
放如木研亦未可炒仍將厚朴下研次下
木二藥取細末將及一半寬潤又入鍋微
炒再入研方下身草羅末一次了寬潤又
微炒方下橘皮同研取末此後更不可再
炒取未盡了方將藥衣同和合令勻再用
羅隔過一次了攤開出火氣一時辰歸入
新罐內密蓋收取每服二大錢生姜三片
棗二枚去核水一盞半煎八分熟服湯點

亦得

如寒氣壅塞入草荳蔻伍粒碎碎如前

法煎

傷寒不快尋用消風散二錢葱白兩頭

同煎

婦人覺血氣不快用當飯右藥各二錢

薄切同煎

頭風癢作入川芎荆芥白僵蚕各一錢

同煎

臟腑滑洩入炮乾姜二錢炮附子官桂

各半錢同煎

引飲過多痰飲留膈間切赤茯苓沃瀉

各一錢同煎

咳嗽入款冬花五味子各一錢同煎

壅熱入切大黃一錢煎微熱服

痢未止以熱茶服之

天下受拜平胃散治脾胃不和膈氣噎塞嘔
吐酸水氣刺氣悶脇助虛脹腹痛腸鳴胃膈
痞滯不美飲食常服溫糲脾元平和胃氣寬
中進食

川厚朴

去蘘皮
年三兩

陳皮

湯洗
不去核

茅山蒼朮

任兩 去皮

米泔浸

一宿到

生薑

肆兩 和皮薄切

甘草

參兩

南京小麥

二兩枚 去核切

右用水五升慢火煮乾搗作餅子日乾再

焙研為細末每二錢入鹽少許點如池瀉

每三錢生薑五片烏梅二箇鹽少許水一

盞半煎八分服此藥入人常服獨此方煮

透滋味相和而美與眾不同所以為佳也

調脾散治脾胃少有不和可常服

厚朴

去皮伍兩 薑汁製

陳橘紅

伍兩 焙乳

蒼朮 米泔浸一宿冬二宿剉焙乳炒赤
色秤捌兩西乃者秤半斤或秤一兩

乃足秤半斤
實捌兩是

甘草 炙
一兩半

右為細末每服二錢用燒鹽湯點七分盞

服或用水一盞姜三片棗一枚煎七分食

前服或作到散

二陳湯一治憂愁思慮氣鬱生痰頭疼心悸中

脘不快極為神驗王氏謂其可治疝疾加

草葉下紅圓子此治食癯則可餘則不知

也又謂可治妊婦阻病而古方茯苓半夏

湯服之病反增劇以其有熱地黃滯脾氣

欲及之而不知此方茯苓當用赤者蓋赤者性利而白者性補也欲去痰飲赤者用之為宜非惟服之穩當苟胃熱而嘔亦可以此利之雖然熱嘔又不若竹茹湯之要切也

四七湯即三因大七氣湯金匱要略半夏厚朴湯其治七氣最為有準王氏去以此下白圓子可治小便白濁似覺有理然二藥乃治氣理痰之劑未聞有療便濁之功及觀古方去心腎不交而成此疾則知王氏

之言為可用大抵便濁有二證皆腎氣寒
之所致有因憂思過度氣鬱生涎之閉心
經火不下降故腎水寒而便濁也有因飲
食減少脾氣虛弱脾土不能制腎水故腎
水盛而愈寒則便濁也巢元方作病源止
去胞冷腎損而致此不能悉明其土病之標
本使後學無所考據方書家多用寧心藥
如茯苓朱砂補腎藥如破故紙山茱萸澆
精藥如龍骨牡蠣之類是雖暫效於一時
而其疾終不可去四七湯白圓子能利其

痰涎痰利則心火下降腎水不至於寒便

濁當自止不然則服一分清散彼方有益智

却以主遺精虛漏小便餘瀝有草薺以上療陰

痿失溺補水藏益精有菖蒲以通心氣止

小便治白濁心氣既通自然便濁可去况

有餘藥佐之若夫脾虛而便濁者當服

合厚朴圓堂泉散因思遺精與便濁不同而

方當兼治者多米散信其必效有下元

虛憊精不禁者宜服〔秘精圓〕有餘酒多

心經熱及年壯氣盛久壽淫慾經絡壅滯

者宜服〔清心圓〕 有情慾動中經所謂所

願不得名曰白淫宜服〔金鎖丹〕 有腎氣

者宜服〔鎮精丹〕猪苓圓不可一槩論也

分清散治白濁

益智仁

川萆薢

石菖蒲

右等分爲末入鹽煎服

厚朴煎圓孫兆寧去補腎不若補脾胃既
壯則能飲食飲食既進能生榮衛榮衛既壯
滋液骨髓補益精血是以素問去精不足補

之以氣形不足補之以味宜服此温中下氣去

上痰進食

厚朴

極厚者去蘆皮剉如指而大片一升

生姜

一斤不去皮洗切作片用水五升同煎煮水盡去姜焙朴令乾

乾姜

肆兩坐如散子大

附子

二兩炮去皮臍

甘草

二兩剉半寸長同乾姜厚朴用水五升煮水盡去甘草不用

舶上茴香

肆兩炒

右細末生姜煮棗肉為圓如梧桐子大每

服三五十圓空心茶飲或酒吞下水

室泉散治心脾不調腎氣極盛便溺白濁

川厚朴 一兩 去皮生用 白茯苓 一錢

右剉散作一服用酒二椀如不能飲入水

酒各一椀燉火煎至一小椀分為二服

去滓食前溫服立效

秘精圓治元氣不固遺精夢泄

大附子 炮 去皮臍

龍骨 煨通赤

肉蓯蓉

牛膝 並酒浸 一宿焙

巴戟 去心 各一兩

右為末煉密為圓如梧桐子大空心鹽酒

鹽湯任下五十圓甚者日午再服

清心圓治經絡熱或年壯氣盛久節淫慾而致夢泄者宜服此

厚黃蘗皮今為耳草各等分

右生為末入腦子煉蜜為圓如梧桐子大

空心臨卧温熱水吞下三十圓濃煎麥門

冬湯下尤佳一方每身草每黃蘗一兩入

腦子一錢

金鎖丹治男子婦人遺精鬼交

堅白茯苓各二錢茯神各二錢

五色龍骨煨紅遠志各三錢

牡蠣

肆錢五頭者
炒赤黃色

右細末酒糊為圓如梧相子大鹽湯溫酒下
三十圓或四十圓空心食前服

龍骨 一兩

蓮心 二百箇

半夏

木猪苓 各二兩

鎖精丹治腎氣閉遺泄

右將龍骨蓮心為末半夏用湯浸以竹刀

分四方界之不可令折開木猪苓如半夏

燈切了槌遍同半夏炒黃色揀半夏研為末

前入龍骨蓮心內將粟米糊為圓如梧相子大

外別研木猪苓為末，糝此圓子，每服三十圓，空心食前，鹽湯下。

猪苓圓治同前

半夏 一兩

木猪苓

肆兩

右將半夏破如豆，大於猪苓內，秤貳兩，切片炒半夏黃色，不令焦，地上出火毒，半日。

取半夏為末，糊圓如梧子大，候乾，更用前。

猪苓末貳兩，炒微裂，同用，不泄沙，糝之。

空心溫酒鹽湯下，三四十圓，常服於申末。

間冷酒下

茱萸散主之。先熱後寒名曰溫瘧。白虎
加桂湯。麻黃羌活散主之。但熱不寒少
氣煩冤熱而欲嘔名曰瘧瘧。小柴胡湯主
之。如大便秘澀可服。大柴胡湯。寒熱身
重骨節煩疼脹滿善嘔噦。身自汗名曰濕
瘧。木附湯主之。寒多微熱或但寒不熱
名曰牝瘧。桂姜湯主之。熱多微寒或但
熱不寒名曰風瘧。白虎加桂湯十棗散主
之。身發寒熱一歲之間長幼相若或深
時行變成寒熱名曰疫瘧。五積丸加散主

之 寒熱時作夢寐不祥多生恐怖名曰
鬼瘧〔辟邪丹〕主之 乍寒乍熱作有乍無
名曰瘧瘧南方多此大救人參散大正氣
散〕主之如汗多煩渴小便赤澀及不伏水
土嘔吐甚者可服〕五苓散〕下〔消暑圓〕寒
熱善飢反不能食食而交滿腹大名曰食
瘧一名冒瘧〔清脾湯〕主之仍服〔紅圓玉
熱多寒少頭痛難忍額角胃前肌肉跳起
總食昂吐名曰痰瘧〔半夏湯〕主之 經年

不差者後復作名曰勞瘧〔去積散〕大柴胡

鼈甲散主之 數年不差結成上微上瘕在腹

腸中名曰老瘡一名母瘡一名上瘡母一老上瘡

飲主之 脾寒可服草菓飲凡瘡初欲

發時但服一五積丸加散自能痊除 寒熱

等者可與局方一常山飲久瘥不愈而寒

者一姜散主之 寒而虛甚者當服朴附

湯服藥可於未發前連進數服正發時不

可與之恐傷胃氣常見庸醫每以瘡疾為

難治非難也由其不識證故以為難也病

家每以瘡疾為易治非易也或見獸勝而

愈固以為易也一雖一易之心生其不至於

殆者鮮矣

吳茱萸散治寒之瘧臨發時先寒戰動相交發熱便頭痛不可勝忍熱極則汗出煩渴相次便醒宜服此

吳茱萸 一西

耳草

半夏

乾姜

川芎

細辛

麻黃

良姜

藥本

官桂

各一分

羌活

牽牛

炒各半兩

右細末每服三錢以水一盞煎至七分臨

發寒時和滓空心熱服若寒了及熱更不
請喫須只用初發寒時服也寒未定更進
一盞喫藥後不請卧須臾病減八分若是
大歲遇六壬己亥之年當上瘧未發常服暖

脾藥

白虎加桂湯治溫瘧先熱後寒惡風自汗

石膏 肆半兩 知母 一兩半 甘草 半兩

桂心 一兩 粳米 一合
粳米外切粳米也

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去

滓未發前進三服

麻黃羌活散治溫瘧初發渾身大熱頭痛不可忍臨醒時即寒慄戰動遂巡便醒宜服此方須是先熱後寒方可喫此藥

麻黃 去根

羌活

牡丹皮 去心

獨活

山梔

芫胡 去毛

桔梗 去蘆

升麻

荊芥穗

大黃

知母

黃芩 各一分

半夏 肆銖

牽牛 羊西

右細末每服三錢水一盞生姜二片同煎

至七分臨發吐熱時和滓喫須是用初發

熱時服仍是食後喫癸了已寒而更不喫
喫待第二癸熱時喫也

小柴胡湯治瘴瘧但熱不寒少氣煩冤欬嘔

柴胡 二兩

半夏

黃芩

人參

甘草

各半錢

右剉散每服五錢水一盞半姜五片棗一

枚煎七分去滓食前服

大柴胡湯治瘴瘧但熱不寒而嘔大便秘澀

柴胡 二兩

赤芍藥

黃芩 各三錢

半夏 湯

枳實

各半錢

大黃

半錢

右劉散每服五錢姜四片枣一枚水壹盞
半煎八分去滓食前溫服以利為度未利
再服

木附湯治濕瘧寒熱身重骨節煩疼目冒雨
濕著于肌膚與胃氣相并或腰開汗出目浴
得之

附子 炮去
皮脐

白朮 各一兩

甘草 炙

茯苓

桂心 各半兩

右劉散每服四大錢水一盞半姜五片枣
二枚煎七分去滓食前服

桂姜湯治北瘧寒多微熱或但寒不熱

紫胡 八兩 桂心 黃芩

牡蠣 煨 耳草 炙 乾姜 炮 各三兩

栝樓根 肆兩

右剉散每服四錢水二盞煎至七分去滓

空心服日三初服微煩汗出愈一法有半

夏三兩此方既言治寒多及但寒不熱却

多用紫胡黃芩栝樓根性寒之藥恐非所

宜諸方既皆取此如或用之當隨證增損

可也

十事散治但熱不寒瘡

穿山甲 一兩

乾枣 拾枚

右同燒灰留性研為細末每服二錢當癸

日日未出時井花水調下

五積文加散治疫瘡身癸寒熱

生科五積散

人參敗毒散

各肆錢

右和勻每服四錢水一盃半生姜五片東

子一枚同煎至八分去滓溫服不拘時候

辟邪丹治嵐瘴鬼瘡及疔疾等

朱砂

兩粒如

黃丹

一大錢留

菘菜豆 肆十粒

黑豆 三十粒

好砒霜 半錢

右同入乳鉢內滴冷水為丸作十粒每服

一粒以東南板桃葉心七枚取井花水研

令開向日吞服之醋水亦得其驗不具言

大經三五月患者亦只一粒服後大便者只

微寒若小可便絕去也孕婦不可服

大效人參散治山嵐瘴癘不以久近或寒或

熱或寒熱相兼或連日或間日或三四日一

癸並皆治之

人參 去蘆頭

常山

青蒿 各等分

右細末每服二錢半如明日當發今日午
時用酒一大盞調分作三服一更盡時一
服三更一服五更一服此方一錢半藥末
用酒一大盞調分作三服恐藥力太少只
作一服可也

大正氣散治山嵐瘴氣發作寒熱遂成瘧疾
宜服此

附子

炮去皮

厚朴

去蘇皮姜汁製

桂心

甘草

炙

乾姜

炮裂

橘紅

各一兩

茱萸

微炒

右細末每服三錢。水一盞半。姜五片。棗一枚。同煎至七分。熱服。不拘時。兼治霍亂吐瀉。一切氣疾。

五苓散治瘴瘧煩渴小便赤澀

沢瀉

猪苓

去皮

赤茯苓

白朮

各一兩半

官桂

去麋皮一兩

右細末每服二錢。熱湯調下。不拘時候服。

訖。多飲熱湯。有汗出即愈。

清脾湯治胃瘧發作有時。先覺伸欠。乃作寒。

慄鼓振顛。領中外皆寒。腰背俱痛。寒戰既已。

內外皆熱頭疼如破渴欲飲冷或上痰聚胃中
煩滿欬嘔或先熱後寒先寒後熱寒多熱少
寒少熱多或寒熱相半或但熱不寒但寒不
熱或隔日一發一日一發或三日五日一發者悉
主之

厚朴

肆兩
姜汁製

烏梅

汁去仁

半夏

洗去滑

青皮

良姜

各二兩

草薢

去皮
一兩

牙草

炙
半兩

右鈞散每服四錢水二盞姜三片棗一枚同

煎至七分去滓未發前併三服忌生冷油

臍時菓此菓温脾化痰治胃膈痞悶心腹
脹滿噫醋吞酸自可常服

半夏 湯

藿香

洗
去梗

羌活

川芎

各二錢半

黑牽牛

半兩

右半夏湯治痰瘰頭上痛繞食即嘔

右細末每服二錢半食後熟湯調下和滓

服以吐涎為度未吐更進一服

三效散治久患瘰疾不差

硫黃

辰砂

各等分
研細

右拌勻每服一錢人參湯調下

大柴胡鼈甲散治勞瘧及五勞

柴胡 去蘆

秦艽

常山

貝母

耳草

烏梅

山梔

豉心

鼈甲 醋炙

黃芩 各一兩

生姜

大黃 各半兩

桃板

柳枝

葱白

薤白 各一握

糯米 羊合

右剉散分作八貼每貼水一升酒一盞同煎

至八分升分作三服早午晚各一

老瘧飲治久瘧結成之微之癖有腹脇 諸藥

不去者

蒼朮

未得洗

草菓

去皮

桔梗

青皮

陳皮

良姜

各半兩

白芷

茯苓

半夏

湯

枳殼

麸炒

丹草

炙

桂心

乾姜

炮 各三錢

紫蘇

川芎

各二錢

右剉散每服五錢水二盞鹽少許煎七分

去滓空心服日三夜一仍下紅圓子

草菓子飲治脾寒等症

草菓

川芎

白芷

紫蘇葉

良姜

甘草

青皮

去白
谷等分炒

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓

服當癸日連進三服

常山飲治上癘疾凡上癘疾蓋目外邪客於風府
主冷之物內傷脾胃或先寒後熱或先熱後
寒或寒熱獨作連日併癸或間日一癸寒則
肢躄顫掉熱則本身如燒頭疼惡身煩渴引
飲氣息喘急口苦咽乾脊脅酸疼腸鳴腹上痛
諸藥不治漸成癘癘者此藥主之