

癩疹

真入論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發
又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則
熱淫也所以有風疹瘙痒皆由於此又有赤疹者忽
然起如蚊蟲咬煩痒極者重抓疹起瘙之逐手起又
有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱○夫風癩
疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則為癩疹若
赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則
極若冷則瘥也白疹者由風氣搏於肌中風冷結為
白疹也遇冷則極或風中亦極得精明則瘥着厚煖

衣亦瘥也。其脉浮而洪，浮則為風，洪則為氣。風氣相搏，則成癩疹，致身體為痒也。○丹溪云：疹屬熱，與痰在肺，清肺火降痰，或解散出汗，亦有可下者。○疹在表者，消毒飲子，防風通聖散在裏者，大柴胡湯。四順飲子，虛者補中益氣湯，皆同傷寒施治也。○朱院君三十餘，久患癩疹，身痺而紫色，可與防風通聖散，加牛蒡子為極細末，每貳錢，水盞半，入薑汁，令辣煎食前熱飲之。

或問斑疹何如？曰：方論皆謂緣肌中有濕，若涼熱之氣所折，熱結不散，則成赤疹。若因風邪所折，風熱相搏，則成白疹。赤疹得熱則劇，得冷則減，蓋熱氣鬱於內，故惡熱宜冷。白疹得陰雨則甚，得晴則消，蓋熱氣散釋於外，故惡冷宜熱。熱搏於血分，其邪因并發於表，則赤；若風濕搏於氣分，則氣液不行，因邪并發於表，則白。夫如是，然後與治法相應。邪熱者，故惡熱而喜涼；邪濕者，故惡雨而喜晴矣。方論中又有風痞癩者，即內經所謂汗出見濕，乃生痤痱。又曰：勞汗當風，寒薄為癩，乃痤痱，即癩疹屬也。被痞癩類也。此皆謂外邪鬱肌肉玄府之熱者矣。然則與內經言少陽少陰而君相二火客熱之勝為丹疹外發者，方論中則

無有也故人氣君相二火鬱發而變者宜乎未之及耳若此條是人氣所變之一者也故二火鬱發出血氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發痘瘡之外必有出疹二次亦是君相二火發出未盡之胎毒也初虞世治皮膚風熱遍身生癩疹牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下貳錢日二服

疥癢有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛膺腹及隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末壹兩皂角貳兩水壹升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如桐子大食後溫水服貳拾丸次日便愈

○**千金方**治法白疹宜者礬石汁拭之或者蒴藿和少酒以浴之良姓氏以治赤疹或者石南汁拭之良或水煮雞屎汁拭之餘一切如治丹方法俗呼為風屎亦名風尸盛者石南湯主之

○**石南湯**神方亦名石南根飲子治風癩疹瘙之則作瘡風尸身痒卒風面目腫起

石南葉神巧用根

乾薑炮

黃芩

細辛去苗

人參去蘆各壹兩

桂心

麻黃去節

當歸

芎藭各壹兩半

甘草炙貳兩

乾地黄半柴錢

食茱萸壹兩貳錢半

癩疹

小兒

七

右為吹咀每服肆大錢水壹大盞好酒貳合同煎
至捌分去粗熱服不拘時候衣蓋令出汗
加味羌活飲 治風寒暑濕外搏肌膚發為癩疹增
寒發熱遍身瘙痒隨臟氣虛實或赤或白心迷悶
亂口苦咽乾

羌活

前胡

並去蘆 各壹兩

人參

桔梗

並去蘆

甘草

炙

枳殼

去穰 炒

川芎

天麻

茯苓

去皮 各半兩

薄荷

蟬蛻

去頭 各叁錢

右為細末每服叁大錢水壹盞生薑叁片煎至柒
分去粗溫服無時

羚羊角散

治風癩疹遍身痒痛心胃滿悶

羚羊角屑

白鮮皮

白蒺藜

防風

去蘆

麻黃

去節

甘草

炙

羌活

去蘆 各壹兩

枳殼

炒去穰 半兩

人參

去蘆

杏仁

去皮尖 炒

黃芩

各柒錢半

生乾地黄

分壹兩

右為吹咀每服肆錢水一中盞煎至伍分去粗入
酒壹合更煎一兩沸溫服

樺皮散

治肺臟風毒遍身瘡疥及風癩疹

枳殼

去穰用炭火燒存性

樺皮

燒灰 各肆兩

甘草

炙半兩

應診

外科

七五

荆芥穗

杏仁 各貳兩 麩炒 去皮尖

右件除杏仁用水壹碗於銀器內熬去水一半已來放令乾另研令細次用諸藥末同研勻於瓷合內收之每服參錢食後溫酒調下

犀角散 治風癩疹心悶

犀角屑

川升麻

人參

玄參

沙參

防風 四味各 去蘆

白鮮皮

白蒺藜 各壹兩

甘草 炙

馬牙硝 各半兩 研

牛黃 貳錢半 研細

右為細末入牛黃末同研令勻每服貳錢用竹葉

湯調下不拘時

鬼箭羽散 治風癩疹累醫不效

鬼箭羽

白蒺藜

防風 去蘆

白歛

甘草 炙

白礬 各壹兩 枯

右為細末先用粟米粉伍合粉身了每服貳錢溫熟水調下不拘時

漏蘆丸 治風癩疹

漏蘆 壹兩

枳殼 麩炒 去穢

苦參 各參兩

防風 去蘆

川大黃 煨

烏蛇 久分量

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每

服參拾丸用温漿水送下食後服

楓香丸 治風癩疹痒不可忍

楓香

白鮮皮

白蒺藜

蛇床子

羚羊角屑

川烏頭

藁本 去蘆

仙靈脾

蔓荆子

莽草

赤箭 各半

右製服法同前

加味烏荆丸 治癩疹上攻頭面赤腫瘙痒抓之皮

脫落作瘡作痒或痛淫液走注有如蟲行

川烏頭

湯洗浸三五次 去皮尖焙乾

荆芥穗 各半

當歸

水浸二日洗 焙乾秤壹兩

薄荷

伍錢

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸

温酒或茶清送下

治風癩疹痒不可忍

赤土

不拘多 少細研

每服壹錢空心温酒調下

治遍體疹風

側子

作末

冷酒調服

治風癩疹痒不止

枳殼

麩炒去 穰叁兩

為細末每服叁錢水壹中盞煎至柒

分去滓温服無時 一方水煮枳殼為煎塗之

治風疹入腹身體腫舌强乾燥

蔓菁子參兩為每服貳錢温酒調下

又方

白蜜壹合酒貳合二味調和空心温服

又方

白僵蠶不拘多少右為細末用酒調服之立瘥

烏蛇膏 治風癩疹結腫攻衝遍身發熱痒痛及治筋脉攣急

烏蛇

當歸去蘆

木鼈子去殼

枳殼去穰

大黃各兩

天麻

附子

烏喙

天南星

桂心

細辛去苗

吳茱萸

羌活去蘆

蒼朮去粗皮

防風

牛膝

川椒

白芷

白僵蠶

乾蝎各半兩

右件藥並生用剉碎以頭醋半升拌浸一宿用臘月煉成豬脂貳斤於鐺中入藥以慢火煎看白芷變黃紫色下火濾去粗令淨入於甕合內盛之用摩塗於所患處立効

蒴藿膏 治風瘙癢疹皮膚中苦痒搔之血出

蒴藿根

薔薇根各貳兩

白蒺藜

附子

獨活 去蘆

白芷

防風 去蘆

苦參 去蘆

川升麻

漏蘆

漢防已

川椒

木香

蛇銜草

羌蔚子

枳殼 一方作枳實

莽草

犀角屑 各壹兩

右件並生用細剉以頭醋浸一宿明旦用銅石銀

鍋中盛慢火上以臘月煉成豬脂貳斤半與藥同

煎令白芷赤色膏成濾去粗盛甕合中每取塗摩

患處累用卽瘥一方無薔薇根

莽草膏 治身體大癩疹而痒瘙之隨手腫起

莽草 半 柴錢

當歸

芎藭

大戟

細辛

芍藥

芫花

川椒

躑躅花

附子

蒴藿根 各壹兩

苦參 貳兩

豬膏 成煉者 參斤

右件細剉用酒浸一宿豬膏煎之候附子色黃膏成去粗以敷病上日三用之

青羊脂膏 治風熱赤疹搔之逐手作瘡

青羊脂 肆兩

甘草

芍藥 各參兩

白芷

苦參

黃芩

防風 去蘆

黃耆

升麻

寒水石 各壹兩

石膏

竹葉 切各壹升

右為吹咀先用水捌升煮石膏竹葉取肆升去粗浸諸藥豬脂貳斤合煎膏成敷病處效

胡蘿蔔煎 治赤白風癩疹

胡蘿蔔根

白蒺藜

兔藿

細辛

虎杖 各叁兩

辛夷

白礬

鹽 各貳兩

右劉並生用拌勻每藥伍兩水壹斗煮取貳升去粗再煎至半升用綿蘸藥塗患處頻塗之即效

風腫及癩疹

白礬

石炭 各壹兩

右件為末用生薑自然汁調和如稀糊薄塗患處日用一上効

治風癩疹宜用楓香湯澆之

楓香 半斤

芫蕪

川大黃

黃芩

當歸

川升麻

甘草

射干 各貳兩

苦參 叁兩

蛇床子 壹兩

右件藥並生用吹咀每用伍兩水壹斗煮取伍升

去相看冷熱洗病上日三五度

治風身體生癩疹宜用蒴藿根湯洗之

蒴藿根

蒺藜苗

當歸

蛇床子

細辛

各伍兩

右件細剉用水壹斗伍升煮取壹斗去相看冷熱

洗患處日用三五度藥水冷再溫用之

地骨皮湯 治風癩疹

地骨皮

當歸

鹽

白礬末

壹兩

右件細剉每用藥伍兩水以升煎取貳升去且

煎至壹升收瓷器中用綿蘸拭患處五七度瘥

治風癩疹淋洗神效

蒴藿

白蒺藜

白礬

細研後入

茵芋

馬蘭子

芫蔚子

細辛

扁竹

各貳兩

右剉用醋漿水壹斗煮取伍升去相入白礬洗之

治風癩疹自治不瘥神效

白礬

伍兩

右為末用酒參合小便壹升煎如稀膏

以綿蘸藥於上輕手揩之令熱徹入皮膚其風疹

須臾消散

一方只用白礬末酒浸帛蘸染患處

治十種癩疹

右用石灰不拘多少研極細和醋漿水塗疹上隨手即減。千金方用石灰淋取汁洗之良。

又方 葫蘆煮湯和少酒塗之無不瘥亦可作湯浴。治癩疹痒 芫蔚子莖作湯浴之良。

治風疹痒不止 蕒蕒菜參握搗取汁於疹上熟揩時時取少藥揩令熱徹又續煎椒湯洗之。

又方

蛇蛻皮壹條水壹升煎取半升鷄翎蘸執藥湯塗

上即瘥

單方 治面目身體生癩或痒或癩子腫起甚殺人。右用羚羊魚燒為灰研令極細以鷄子清塗之。

極神驗無鷄子水和塗亦妙。癩疹入腹亦能殺人用蠶沙煎濃湯洗之。

風蚤癩疹成瘡 夫風邪客熱在於皮膚遇風寒則起癩疹熱多則色赤風多則色白甚者痒癩瘡之

則成瘡也。卷栢散 治風皮膚癩疹及風熱生毒瘡。

治風皮膚癩疹及風熱生毒瘡。

卷栢 枳殼去穢 麸炒 羌活去蘆

麻黃去節 五加皮各壹兩 赤箭

天竺黃 葉本去蘆 防風去毛

芎藭 黃芪 桑耳

犀角屑各壹兩 烏龍酒浸

右為細末每服錢前薄荷湯調下忌熱麵鷄

豬魚蒜等物

丹參散 治風瘙皮膚赤癩疹疥癢隨生瘡

丹參 人參 苦參並去蘆

雷丸 生除酒浸 防風去蘆

白附子炮 白花蛇酒浸

右為細末每服貳錢食前煎甘草酒放溫調下

升麻膏 治諸熱風毒氣攻衝皮膚搔生癩疹赤起

生瘡兼有黃水結為膿疱痛

川升麻 白欵 漏蘆

枳殼 連翹 藍葉

黃芩 梔子仁 菟藿根

玄參去蘆 大黃 蛇銜草

川芒硝 犀角屑各壹兩

右件細剉用竹瀝參升拌勻經一宿用成煉豬脂

貳斤同煎候白斂色焦黃絞去粗令凝用摩塗患處日六次瘥

治風瘙癢疹遍身皆痒搔之成瘡

茵陳

生用

苦參

各伍兩

右件細剉用水壹斗煮取貳升溫熱得所蘸綿拭之日五七度瘥

又方

蠶砂

壹升

右用水貳斗煮取壹斗貳升去粗溫熱得所洗之宜避風處

○疥癬

大疥癬者皆由脾經濕熱及肺氣風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之深沉者為癬蓋癬則發於肺之風毒而疥則蕪乎脾之濕熱而成也久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛其狀不一二者皆有細蟲而能傳染人也疥有五種一曰大疥癩赤痒痛作瘡有膿二曰馬疥隱起帶根搔不知痛三曰水疥痞爛含漿摘破出水四曰乾疥痒而搔之皮起乾痂五曰濕疥薄皮小瘡常常淫汁是也癬之狀起於肌膚癢疹或圓或斜或如莓苔走散內藏汁而

外有筐其名亦有六焉一曰乾癬搔則出白屑索然
彫枯二曰濕癬搔則多汁浸淫如蟲行三曰風癬搔
則痺頑不知痛痒四曰牛癬其狀如牛領之皮厚而
且堅五曰狗癬時時作微痒白點相連六曰刀癬則
輪郭全無縱橫不定是也治法當以殺蟲滲濕消毒
之藥敷之內服和脾清肺除風散濕之劑庶絕其根
又面上風癬初起瘡漏或漸成細瘡時作痛痒發於
春月名吹花癬女人多生之此皆肺經蘊積風熱陽
氣上升發於面部或在眉目之間久而不愈悲成風
疾治法當清心火散肺經之風熱然後以消毒散熱
藥敷之則自愈矣○戴院使云此雖皮膚小疾不
甚為害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥癩嗜膚尤為煩擾
甚至經年累月不能脫洒凡病此者不當專用外傳
藥須內宣其毒可也升麻和氣飲消毒飲四順清涼
飲犀角飲皆可用

通治疥癬方
升麻和氣飲

治瘡腫癩疥痒痛

升麻

桔梗

蒼朮

乾葛

甘草

大黃

陳皮

當歸

半夏

貳錢

煨各壹錢

服

疥癬

小科五

二百五

茯苓

白芷

乾薑

枳殼

各伍分

芍藥

壹錢半

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

當歸飲子

治瘡疥風癬濕毒燥痒

當歸

川芎

白芍藥

生地黄

防風

白蒺藜

荆芥

各壹錢半

何首烏

黃芪

甘州

各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服或為末亦可

濕散

大治一切風毒疥癬癩痒狀如風癩

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荆子

薄荷

各壹兩

白芷

天麻

川芎

防風

烏蛇

酒浸壹宿焙乾各半兩

右為細末每服參錢茶酒任調下無時日進三服

六日一浴令汗出血氣宣通六日膚澤如故

苦參丸

治遍身瘙痒癬疥瘡瘍

苦參

肆兩

玄參

黃連

去影頭

大黃

剉碎炒香

獨活

去蘆

枳殼

去穰

防風

去叉各貳兩

黃芩

去黑心

梔子

菊花

各壹兩

右為細末煉蜜和搗千餘下丸如梧桐子大每服
參拾丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得
四生散 治腎臟風疥癬等瘡及眼目昏花視物不

明

白附子

下注生瘡
用黑附子

黃芪

沙苑蒺藜

羌活

各貳兩

右為細末每服貳錢空心鹽酒調下若於豬腰子
切開夾藥在內合定拴住紙裏煨熟尤妙又有患
赤眼疳痛不可忍隨腫一服目灰大痛至一二鼓時

乃得睡更三四服大愈再有頑癬經年服藥貼藥
俱不効後得此藥三四服盡除此方治人腎臟風
及眼疾頑癬無不効

治面身瘙痒明目爽神

威靈甘艸石菖蒲苦參胡麻何首烏藥末貳錢酒
壹碗渾身瘙痒一時無

治

羌活散

治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者

羌活

獨活

明礬

白鮮皮

硫黃

狼毒

各壹兩

輕粉

貳錢半

白附子

黃丹

蛇床子

各半兩

右為細末油調成膏傅之

疥藥神効散

治乾濕膿窠諸種疥癬

檳榔

蛇床子

各壹兩

全蠍

半兩

倭硫黃

壹兩伍錢

右化開硫黃入荆芥末參錢滾數沸候冷加輕粉

貳錢冷再碾末加三柰半兩妙右為細末先將小

油滾過候冷調上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥

氣神効

疥藥

治風癬瘡黃水瘡疥瘡牛皮癬瘡

輕粉

水銀

樟腦

各參錢

大楓子

去殼

川椒

各肆拾玖粒

柏油燭

壹對

杏仁

少許

右為細末疥用絹包裹瘡上熨黃水瘡搽上此藥

功效如神

八仙散

治遊風腫痒疥癬瘡或因洗頭遊風瘙痒

生瘡

細辛

荆芥

白芷

黃芩

川芎

防風

地骨皮

甘艸

各等分共為粗末

疥癬 右每用藥貳兩水貳盞煎十沸去滓熱搗患處

一上散 治諸般疥癬必效

雄黃

通明手
可碎者

熟硫黃

黑狗脊

蛇床子

炒各
半兩

寒水石

陸錢

蟹螯

叁個去翅
足研碎

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入蟹螯和勻蛇床黑狗脊另為細末同研勻洗疥癬令湯透去痴油調手中擦熱鼻中嗅兩三次擦上可一上即愈如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜火炙湯盪者加硫黃只嗅不止亦可愈

効者

一切男子女人渾身疥癬一家染易經年搔痒

百部

半兩
碎切

亂髮

木香

碎切

檳榔

搥碎

苦參

碎切各
壹分

川椒

叁銖

鯽魚

壹箇不要見
水切成片

右以油伍兩煎前藥得所去藥却用麝香壹分膩粉拾錢硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更煎攪五七沸瀉出磁器盛之非時使也

五龍膏

治疥癬

硫黃

白礬

白芷

吳茱萸

川椒 各等分

右為細末煎油調塗之

楓實膏 治風瘡燥痒疥癬

大楓子肉 半兩 輕粉

枯礬 各些少

右搗為膏擦瘡上

百倍 藥性

獨異

木香 藥性

校皆

思仁也入軍良德一

疥

嚴子禮云夫痂疥之為病雖苦不害人然而至難可者多矣素問云諸痛痒瘡皆屬於心多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊於腸胃發見於皮膚古方有所謂馬疥水疥乾疥濕疥種類不一生於手足乃至遍體或痒或痛或焮或腫或皮肉隱鱗或抓之凸起或膿水浸淫治之內則當理心血祛散風熱外則加以敷洗理無不愈。夫痂疥者皆由風熱而生遍體搔痒搔之皮起或血出或水出結作乾痂其中有蟲人往往以針頭挑出狀如水內癩蟲此蓋由肌肉之間深

疥

外科五

百

受風邪熱氣之所致也。丹瘡在上多服通聖散。在下多以藏用丸下。脚腫出血加血分濕熱藥。瘡疥屬脾經濕毒積熱或肝經血熱風熱或腎經陰虛發熱其體倦食少為脾經濕熱用補中益氣湯飲冷作痛為脾經積熱用清熱消毒散搔痒發熱為脾虛風熱用人參消風散搔痒作痛為風熱用當歸飲子便秘作痛為熱毒用升麻和氣飲熱渴便利為脾肺虛熱用竹葉黃芪湯內熱晡熱或時寒熱屬肝經血虛風熱用加味道遙散六味丸體倦少食或盜汗少寢為肝氣鬱結用加味歸脾湯道遙散地黃丸若發熱盜汗或吐痰口乾者為腎經虛熱用六味丸料煎服。稽顛李龍岡遍身患此腿足為甚日晡益嗽口乾作渴小便頻赤此腎經虛熱用補中益氣湯六味丸而痊。一儒者善噫患痒余以為內有濕熱腠理不密外邪所搏也與補中益氣湯加白芷川芎治之不從自服荆防敗毒散盜汗發熱作渴嗽痛膿水淋漓仍用前湯倍加參芪五味而痊。一儒者患在臂脚日晡或痒或脹形體倦怠自服敗毒散痛處發腫小便赤澁此肺腎陰虛余用補中益氣湯加五味子麥門冬而愈。一儒者患此悞用攻伐之劑元

氣虛而不能愈用補中益氣湯加茯苓其瘡頓愈又因調養夫宜日晡益甚用八珍湯加五味麥門五十餘劑而愈。○一男子色黯作痒出黑血日晡益甚其腿日腫夜消余以為氣血虛而有熱朝用補中益氣湯夕用加味道遙散而愈。○一男子時疫愈後所患如之用前藥補養而愈有同患用砭法出血而死此因陰虛血熱色黑作痒也何乃反傷陰血哉。○一婦人久不愈食少體倦此肝脾虧損而虛熱先用補中益氣湯加川芎炒山梔元氣漸復更以道遙散而瘡漸愈若夜間譫語此熱入血分用小柴胡湯加生地

治之血虛者四物合小柴胡湯熱退却用道遙散以補脾胃生陰血亦有寒熱如瘧亦治以前藥

丸 川何小官生瘡小便黃用通聖散一錢半煎下黃精

防風通聖散治風熱瘡疥久不愈 方見腫瘍

麻黃飲 治上體生瘡或痒或痛黃水浸淫結痂推起蔓延於三陽之分根窠小帶紅腫此是濕熱症

麻黃 去根切節 防風 蒼朮 各半兩

陳皮 紫背萍 黍粘子 各柒錢半

黃芩 肆錢 滑石 壹兩 羌活

石膏錢半

縮砂

荊芥各貳錢半

蒼耳草

生甘草各叁錢半

薄荷葉壹錢半

右吹咀每服陸錢水壹鍾半猛火煎取陸分入好酒四五滴去滓熱服須得通身有汗其瘡自安甚者服至百服之後看汗出到何處若自上而下出過脚曲脉其瘡自愈

消毒散局

防風壹兩

甘艸貳兩

荊芥穗叁兩

黍粘子肆兩

為粗末每服壹錢水壹盞煎柒分去粗食後溫服

一和治類皰韓吉卿自解至足生濕蠶瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類蟲行袴襪愈而復生癩痕成凹十餘年不瘥戴人晒之曰此濕蠶瘡也由水濕而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃

升麻和氣飲

治瘡疥發於四肢醫髀痛痒不常甚

致增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫及癩風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛

蒼朮貳兩

桔梗去蘆

升麻

乾葛各壹兩

陳皮去白陸錢

甘艸炙

芍藥 各半

半夏 洗

當歸 去蘆

白芷

茯苓 去皮

枳殼 麸炒

厚朴 薑製

乾薑 炮

大黃 蒸

右為吹咀每服肆大錢水壹盞半生薑參片燈心拾伍莖煎至柒分去滓食前服

枳殼散 治痂疥瘙痒麻痺

枳殼 貳兩 麸炒去穰

白蒺藜 半升

苦參 去蘆

蔓荆子 各壹兩

右為細末每服參錢溫酒調下不拘時日進二服

枳殼丸 治一切風熱生瘡疥

枳殼 肆兩 麸炒去穰

苦參 去蘆 捌兩

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服參拾丸食後溫酒送下

苦參丸 治痂疥瘙痒

苦參 壹斤 為末

皂角 貳斤

右用皂角將水壹斗浸採濃汁瀝去粗用清汁熬成膏子和苦參末為丸如梧桐子大每服參伍拾丸煎荆芥酒送下或薄荷酒亦得不拘時候

赤小豆散 治乾濕疥

赤小豆 貳合 炒乾內醋中如此十次

升麻

薏苡仁

黃芪剉各半

人參

白欬

瞿麥穗

當歸切剉

黃芩去黑心

豬苓去黑皮

防風去叉

甘艸炙各半兩

右為細末每服參錢七空心粥飲調下日二夜一

脂調散

治疥瘡膿窠瘡神效

蛇床子貳兩

藺茹

草烏頭

荆芥

花椒

苦參各壹兩

雄黃

硫黃

明礬各半兩

右為細末豬脂調搽

疥散 治諸疥瘡熱瘡遍身瘡癬神效

大黃

蛇床子

黃連

金毛狗脊

黃檗

苦參已上六味各伍錢同

為極細末入後藥

硫黃

水銀茶末殺之各肆錢

雄黃

黃丹各貳錢五分

輕粉壹錢

大楓子去殼

木鼈子去殼各伍錢同前六味細末杵搗勻

右用生豬脂調洗浴後搽瘡上此藥宜晒合之不

見火塗瘡疥効如掃故名掃疥

秘傳一擦光 治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹

諸般惡瘡神効

疥

小

五

疥 外科五

蛇床子

苦參

蕪荑

各壹兩

雄黃

半兩

枯礬

壹兩

硫黃

錢

輕粉

樟腦

各貳錢

大楓子

取肉

川椒

伍錢

右為細末生豬油調傅

又方 治證如前 兼小兒癩頭瘡治之

蛇床子

硫黃

黃礬

各壹兩

大楓子

川椒

雄黃

各半兩

枯礬

貳兩

輕粉

另研入 貳錢

牛皮岸

薰牛皮 煙岸也

如無以香

黃丹

各壹兩

右為細末生豬油調傅

川一土散 治諸般疥瘡或痛或痒或喜湯火烘洗

者 又後百二回若男者

蛇床子

畧炒

雄黃

別研

黑狗脊

寒水石

別研

白膠香

銅銚熬溶過傾乾石頭 放冷研五味各壹兩

白礬

黃連

各半兩

吳茱萸

叁錢

硫黃

貳錢半 另研

蟹螯

拾肆枚 去翅足

右為細末香油調傅治疥瘡先用蒼耳草或羊不食草藤濃煎湯洗去瘡痂然後用前藥傅可一次

愈

外科五

百二

又諸般瘡疥加減法 腫多加白芷開鬱 痛多加

白芷方解石 痒多加枯礬 陰囊瘡加吳茱萸

濕多香油調 乾痒出血多加大黃黃連豬脂調

蟲多加蕪荑錫灰檳榔藜蘆蟹螯 紅色加黃

丹 青色加青黛

羅蘭茹散 治疥經年不瘥

水銀 壹錢 好茶 貳錢 蘭茹 叁錢

輕粉 少許

右為細末每用不拘多少麻油調塗之

本事治疥瘡不問新久方

白蕪荑 壹兩 檳榔 吳茱萸 各半

硫黃 另研 右為末麻油調抓破搯之

世治疥癬以臘月豬脂不拘多少同生白礬杏仁加

輕粉搗爛擦之 陳無擇云杏仁輕粉最殺蟲甚妙

丹疥癩瘡 春大發焦疥開鬱為主不宜抓破

白礬 吳茱萸 蛇床子 各貳錢

黃檗 大黃 硫黃 各壹錢

寒水石 半 樟腦 伍分 檳榔 壹个

輕粉 拾盒 右為末豬脂油調搽

丹砂膏 治一切惡瘡疥瘙痒不止宜用此藥殺蟲

殊砂

雄黃

雌黃 並研細

亂髮

白蠟

松脂 研末各壹兩

藺茹 為末貳兩

巴豆 拾粒

豬脂 貳斤

右件藥先以豬脂煎亂髮令消盡次下巴豆蠟松脂煎十餘沸用綿濾去粗候稠即入雄黃殊砂等末攪令勻瓷合內盛不拘時候用少許摩塗之以瘡為度

巴豆膏 治一切疥瘡有蟲時作瘙痒

巴豆 柒粒

蕪荑

硫黃 研細

白礬 枯各半兩

豬脂 叁兩

右為細末煉豬脂成油入前藥末調和令勻每用蓮子大於手掌內搓塗之

神異膏 治一切瘡疥

雄黃 細研

蛇床子 叁錢

巴豆 柒粒

皂角 壹定

輕粉 半字

全蝎 柒枚

黃蠟 半兩

清油 壹兩

右先用皂角全蝎巴豆煎油變色去了三味入黃蠟化開取出冷入雄黃蛇床子末輕粉和勻成膏先用苦參湯溫洗却以藥擦瘡疥上神效

白礬散 治一切疥

疥

外科

百七

白礬 枯

硫黃

雌黃 並細研

胡粉

黃連 各壹兩

蛇床子 柒錢

右為細末研令勻以豬膏和如稀麵糊每以鹽漿水洗拭乾塗之

苦參散 治一切疥及風瘙痒搔之成瘡

苦參

丹參 各肆兩

蛇床子 半斤

右為細末先以溫水洗瘡拭乾後敷之

治諸瘡着白痂復發

大蒜 另研

鼠糞

為細末以蒜研和如膏塗瘡上日二三次甚妙

參湯

苦參

蛇床子

荆芥穗

白礬 各等分

右為咬咀煎湯放溫洗

治瘡疥因風致腫

苦參

蛇床子

白礬 各貳兩

右以水參斗濃煮汁却入鹽壹把漬之淋洗其瘡腫日夜數次為妙

一笑散 治渾身疥癩搔痒生惡瘡

檳榔

藁本

硫黃

蛇床子

枯礬

五倍子

白膠香

各等分

右為細末濕者乾傅乾者香油調傅如頭上瘡便搽上不用刺甚者不過三五次平復如故

神捷散 治諸疥瘡

吳茱萸

白蒺藜

各壹兩

白蕪荑仁

輕粉

各半兩

赤小豆

肆拾粒

石硫黃

少許

右為細末研勻每用半錢匕生油調於手心內摩熱後徧揩周身有疥處便睡睡覺其疥自愈

殺疥藥

羊蹄根

生切壹兩

草烏頭

壹箇

硫黃

壹錢

白礬

半錢

生薑

壹分

右以米泔水淹一宿研極細入醞醋和勻入浴時抓破瘡傳之遲頃以溫湯洗去妙

治疥神効

狼毒

細辛

水銀

各壹錢

輕粉

半錢

右為細末油蠟和劑作兩丸綿裹兩手將於周身疥多處擦之

葛氏療疥瘡方

小字五

百七

右取棘根削去上皮切皂角去皮子等分熟搗下
篩脂膏和搔疥去痂以塗之護風勿使女人小兒
雞犬見

熏疥方

明信

雄黃

各半錢

椒目

壹錢

右研細用紙以方尺熟艾攤平摻勻捲成長錠丸
兩口合紙捲子火點慢慢烟熏被下緊擁衾被油
塗眼耳目鼻小兒只空衣蓋被卧亦効宜淨室溫
床牢擁衾被無令透烟以熏至其人口鼻為効

治癩疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘡後

後發取羊蹄根去皮細切孰熬以大醋和先洗淨傳
上一時再以冷水洗之日一傳瘡若為末傳尤妙

○治疥取羊蹄根和豬脂塗上或着鹽少許即焦

○治遍身風痒生瘡疥茵陳煎湯濃洗立安

衍有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸

而止粘著衣被曉夕不得睡痛不可忍有下俚教以
菖蒲三斗剉日乾之春羅為末布席上使病瘡人恣
卧其間仍以衣被覆之既不粘衣被又復得睡不五
七日其瘡如失應手神驗

疥

夕和五

乾疥乾疥者但搔之皮起作乾痂此風熱氣深在肌肉間故也

秦艽丸 治徧身生疥乾痒搔之皮起

秦艽 去蘆 土

黃耆

苦參 各去 蘆

大黃 各 兩

漏蘆

防風 各去 蘆

黃連 各 兩

烏蛇肉 脫分量

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧子大每服

參拾丸食後溫酒送下

皂角膏 治皮膚風熱生疥乾痒

諸牙皂角

巴豆 去皮

烏頭 生

吳茱萸

硫黃

膩粉

白礬 枯

黃蠟 已上各 貳錢半

右為細末研令勻先入清油參貳合以慢火消蠟

了攪和令勻日用二三次塗之

治疥瘡生乾痂癢痒不止

硫黃 貳錢半 為末

巴豆

黃蠟 各半兩

豬脂 壹斤

右先煎豬脂令沸入巴豆煎候黃次下蠟鎔開方

下硫黃末攪令勻盛於甕合內日三五度塗之

一上散 治風痒裂折燥瘡

疥乾疥

小斗

百三

苦參 壹兩

白芷

焰硝

枯礬 各半

荆芥穗 叁錢

寒水石 貳兩

白芨 叁錢

右為末 油調搽

濕疥 夫濕疥者起小瘡皮薄常有黃水出此風熱毒

氣入皮膚間故也

烏頭散 治濕疥常有黃水搔痒不絕

川烏頭

藜蘆

馬蘭根

石菖蒲

杏仁

苦參

硫黃 研細

膩粉

白礬 各半兩 枯用

右為細末研令勻用時先以桃湯洗拭乾後以油漿水和塗之三日一塗不過三兩上瘡

黃連散 治濕疥有黃水皮膚瘙痒

黃連 貳兩

蛇床子 半兩

赤小豆

糯米

胡粉 各壹兩

水銀 壹兩 半

右件為細末以生清油和研候水銀星盡如膏旋取塗之

治濕疥遍身

黃礬

綠礬

膩粉

硫黃 各等分 細研

右為細末研令勻用生油調塗之

又方皂角 硫黃各貳兩 共為細末以醋貳升熬為膏

塗之

暴疥 元希聲侍郎治卒發疥祕驗方用石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即減一法用石灰炒紅出火氣

香油調傳

又方 淋石灰汁洗之孫真

久疥 木香散賢 治多時不斂一切惡瘡此肉能生

肌肉止痛

木香

廣榔

黃連各半兩

白芷各錢

已上同為細末先洗淨每日一遍乾貼有水出勿怪未効又貼 又方同上加地骨皮為細末先於瘡口上用溫漿水洗濕挹乾後上藥治之効不可述暨治下疳瘡神効

丹 諸瘡疥久年者千年韭根炒存性末之豬油調傳三次經

多年惡瘡不瘥或痛痒生皰爛研馬糞并齒灰傳上不過三兩遍効武良相在蜀足脛有瘡痛不可忍得此方便瘥兵部集

疥久疥

外科五

百五

丹風瘡久不瘥燒菰蔣末傳之按本草菰蔣即野菱白

沙瘡丹溪云沙瘡殺蟲為主

蕪荑

寒水石

黃礬

各壹錢

蛇床子叁錢

白礬飛

明礬

剪草

吳茱萸

各壹錢

蒼朮

厚朴

雄黃

各半錢

輕粉

拾盞

世治沙瘡山蟻窠黃荊葉雉雞毛等分燒存性為末

香油調傳

又方用陳年船底灰搗細篩過桐油調

傳立効

又方治沙瘡用水蒿苳燒灰存性香油調

傳立愈水多者乾傳

水蒿苳如百合狀生水邊七八月結子又如野蘇狀

瘡夫瘡瘡者由腠理虛風濕之氣入於血氣結聚

所生也多著手足遞相對如新生茱萸子痛痒爬抓

成瘡黃汁出浸淫生長坼裂時差時發變化生蟲故

名瘡瘡也

漏蘆散 治風瘡熱腫

漏蘆去蘆

川升麻

木通

去皮

赤芍藥

甘草炙

防風

各壹兩

羌活去蘆

枳殼

麸炒去穢

川朴

各貳兩

右為呔咀每服伍錢水壹大盞煎至陸分去滓食

後温服

治熱毒風生癩疥

螺殼

陳腐者壹兩

亂髮

燒灰

龍膽艸末

胡粉

各半兩

右件為細末研令勻用清油脚調塗之

治濕癩瘡

胡燕窠

壹枚取最大者用抱兒于處餘處不用

右為細末先以水煎甘艸及入鹽少許淨洗乾便以窠末敷之三兩上便差若患惡刺以醋調成膏敷貼日用二度

又方

生韭

壹握切研

右用温醋五合浸良久以布絞取汁塗搯瘡上日三四度用之

治乾癩濕癩疥癬

右取連根生蔥白豬脂和搗塗之

夫癩瘡積久不瘥者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間生長則常痒痛故經久不差也

藜蘆膏 治諸癩瘡經久則生蟲

藜蘆

松脂

細研

苦參

雄黃

細研

白礬

枯各用貳兩研

右件先搗藜蘆苦參為麤末入豬脂壹斤相和煎
十餘沸綿濾去粗次入松脂雄黃白礬等末攪令
勻待冷收於甕合旋取塗之以差為度
治癩瘡經年久不差宜用之

薰陸香

杏仁各半

硫黃細研

膩粉各貳錢半

黃蠟壹兩

油貳合

右件細研如粉先熬清油沸下蠟令消次入諸藥
末同煎如稀膏候冷收於甕器中旋取塗之

苦參湯洗方

地榆

桃皮

苦參各伍兩

右件藥並細剉以水貳斗煮濾去粗稍温每日一
度洗之甚妙

匡手疥勞宮

太陵灸

世瘡疥頑癬

絕骨

三里各寸半

間使

解溪各伍

分血却瀉叁寸

集渾身生瘡疥 曲池 合谷 三里 絕骨 行

間委中

甲疥癬 陽谿主之

國交癩之則發主之

間獨委中身久不

藥戰良坐發衣 曲此 合谷 三里 蠶骨 行

血發熱

蠶骨 三里 蠶骨 行

王手衣 發宮 大突

更表之甚效

古抄藥並除淫以水瀉半煮獻去其淋豈每日

癩

原論云癩發之狀皮肉癢疹有如錢文漸漸長胤或圓或斜痒痛有匡闌癩內生蟲搔之有水此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏血氣閉澀則發此疾。○風癩者是惡風冷氣客於皮折於血氣所生亦作圓文匡闌但抓搔頑痺不知痛痒內亦有蟲。○又有逸風瘡生則遍體狀如癩疥而痒此由風氣逸於皮膚因名為逸風瘡也。○乾癩者但有匡闌皮枯索痒搔之白屑起是也亦是風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若風毒氣多濕氣少

鮮

小年五

行三二

故風沉入深故無水而為乾癬中亦有蟲○又有白
癬其狀白色而痒此由腠理虛而受風風與氣并血
澁而不能榮肌肉故也○濕癬者亦有匡闌如蟲行
浸淫赤濕遇痒搔之多水成瘡蓋風毒氣淺濕氣偏
多而為濕癬中亦生蟲

卅溪云癬瘡用防風通聖散去芒硝大黃加浮萍皂
角刺

又方治癬用

浮萍 壹兩

蒼耳

蒼朮

苦參 壹兩

黃芩 半兩

香附 貳兩

右為末酒調服或酒糊丸

何首烏散

治脾肺風毒攻腫遍身癬變成癩疹

搔之成瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足痠裂風氣

上攻頭面生瘡及治紫癩白癩頑麻等風並宜服

之

荆芥穗

蔓荊子

威靈仙

何首烏

甘草

防風

蚬蛻草 各等分

右搗羅為末每服壹錢食後 溫酒調下沸湯亦

得

白蒺藜散 治一切癬及疥風痒癩瘡等疾

白蒺藜

秦艽 去蘆

枳殼 麩炒

獨活

防風 並去蘆

人參

苦參

玄參

丹參

沙參

各去蘆

甘菊花

梔子仁

黃芩

茯神 去木

茱萸

細辛

去苗

麻黃 去節各

烏蛇 肆兩酒

右為細末每服貳錢食前溫酒調下

參丸 治肺毒邪熱生瘡疥癬並宜服之以苦參

一味為細末粟米飯丸如桐子大每服伍拾丸空

心溫水飲湯送下

苦參丸 治一切癬皮膚瘙痒

苦參

去蘆壹斤半剉

菖蒲 肆兩

烏蛇 捌兩酒

右為細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每

服叁拾丸熟水送下不拘時候

三神丸 治一切癬

蒺藜

炒

海桐皮 剉

草烏頭 鹽炒熟

用各壹兩

右為細末麩糊和丸如葶豆大每服拾丸加至拾

伍丸溫酒鹽湯送下

治胡粉散 治一切癬瘡瘙痒甚者

胡粉 別研

雄黃 別研

硫黃 別研各壹錢半

大草烏 叁錢生用

蟹螯 壹錢

砒 伍分

蠟稍 叁錢

麝香 叁分

右為細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

銀粉散 治一切頑癬

輕粉

黃丹

白膠香

瀝青 各等分

右為細末麻油調拭淨或抓破竹篦挑搽二次便乾數次剥去殼也治牛皮癬如神

八寶散 治風癩松皮頑癬久不愈者一鄉人患此疾數年不愈後得此方試用有效

藿香

破故紙

檳榔

大腹皮

雄黃

輕粉

硫黃

白礬 各壹兩

右為細末小油調擦日上三五次痒則擦之

五倍子

壹兩火燒烟盡

黃檗 剉

當歸 剉炒

膩粉

漏蘆

白礬 各壹分

右為細末先用鹽漿水洗拭乾敷之

丁香散 治一切癬

丁香 研

蝦蟆灰 各壹兩

麝香 研貳錢半

白礬 熬令汁枯研

五倍子 研

膩粉 研各半兩

右研勻乾傅癬上以瘡為度

水銀膏 治一切癬

水銀 貳錢半

燕萸仁 研末

薑黃 研末各半兩

酥 貳兩

右先將酥和水銀以柳椎研攪候水銀散即下燕萸薑黃末攪勻磁盆盛旋取塗癬上日三二次

定粉膏 治乾濕癬風癬不拘年月

定粉

水銀

燕萸

胭脂 各壹分

右同研勻用陳豬脂壹兩同研成膏先用湯洗後以膏子臨卧塗之一上便瘡本法豬脂須用三年以上者今若無但陳者亦可仍用後方淋洗

棟實 半升如無實以根皮代之

棟葉及嫩枝 細

凌霄花及藤 剉細各壹升

枳殼 去穰

蛇床子

地榆

丹參

皂莢

苦參 並細剉各叁兩

右同煎濃汁熱洗患處

黃連膏 治一切久癬積年不瘥四畔潛侵復變成瘡瘡疱赤黑痒不可忍搔之出血

黃連 去鬚

黃檗 去粗皮

豉 細研

蔓菁子

杏仁 湯浸去皮尖雙仁細研各半兩

水銀 壹錢

右先以水銀於掌中唾研如泥次入乳鉢內下生油壹合和勻次入藥末同研成膏磁盒盛日三五度塗瘡上

癬瘡方 槿樹皮不犯銅鐵每貳兩入蘆薈參錢白

艾參錢細研為末刮癬出血用好醋調傳雖痛却一傳可愈

一方用 蘆薈 大黃 輕粉 雄黃 蛇床子

槿樹皮 檳榔 右先刮破癬用醋調藥末塗之

頑癬用槿樹皮加巴豆斑蝥為細末又加生砒少許水調傳

治癬積年不瘥者

右用蟹螯壹個去頭翅足以針劄燈焰上燒米醋內淬如此三兩次就燒成存性黑灰研為細末用紅棗壹個湯泡剝去皮核與蟹螯一處同研爛先

以手抓或生布擦動癬然後搽藥不可侵好肉恐
有毒

治牛皮癬用清香油壹兩入全蝎柒枚巴豆貳拾枚
蟻螫拾枚同熬候色焦者先去之去了入黃蠟壹
錢候熔收起朝擦暮愈不損皮肉

又方

綠蘿根

不拘多少

花椒

壹兩

信

壹兩

防風

白芨

百部

白歛

各半兩

江干

拾伍粒

右各為末和綠蘿根搗熟成團將藥於癬處擦之

候痛過洗浴

又方一味綠蘿根去粗皮取細皮貼肉者搗爛用醋
調塗癬上立愈

治癬用藜蘆細搗為末生油調傅

治癬神效方

藜蘆根

半兩

輕粉

貳錢半

右為細末凉水調搽癬上

簡要濟衆治癬疥久不瘥羊蹄根搗絞取汁用膩粉
少許調如膏塗傅患處三五遍即瘥如乾即用豬脂
調和傅之

癬

小斗五

百部

取楮皮枝中白汁塗癬甚妙

治癬濕痒用楮葉半斤細切搗傳癬上

經驗方 治五種瘡癬以韭根炒存性旋搗末以豬

脂調傳之三五度瘡 又方患癬瘡搗山豆根末臘

月豬脂調塗之

半夏散 治一切癬

右以半夏參兩搗為末以陳醬汁調和如糊摩塗

癬上日兩三度即瘡

東坡先生家藏方

决明子 不以多少為細末

右用水銀輕粉少許與藥末同研為膏散以物擦

破癬上用藥傳之立瘡

鯽魚膏 治諸癬瘡或乾或濕痒痛不可忍

鯽魚 中者壹尾

亂髮 如雞子大貳枚

豬脂 半斤

雄黃 壹兩半

硫黃 壹兩

右件藥先煎豬脂令沸即下魚煎令烟盡次下髮

令銷濾去粗下雄黃硫黃末攪令勻於瓷器中不

拘時候塗之以瘡為度

凌霄花散 治風濕蒸熱生諸癬久不愈

凌霄花

黃連

白礬 各貳錢半

雄黃

天南星

羊蹄根各半兩

右為細末抓破用生薑汁調藥擦之如癬不痒只用清油調藥立効

昨葉荷草散 治一切癬無問風濕氣血與夫相染而生並宜用之

昨葉荷草即瓦上晒乾壹兩

枯白礬壹錢

雄黃半錢

右為細末用羊蹄菜根先蘸醋擦癬上令痒破即用藥末來濕塗敷不過兩三次即愈

是齋治諸癬

貫衆

吳茱萸

官桂各等分

右為細末先用手抓破用藥擦之米醋調敷亦得砒霜散 治諸癬不問乾濕積年不瘥

砒霜貳錢半研

硫黃研

蜜陀僧研

膩粉各柒錢半研

右件同研令勻如癬乾即用生油調塗若癬濕即用藥摻之

治癬疥瘡痒不可忍

皂角叁錠煨去皮子

黃連半兩為末

膩粉貳錢半

右將皂角為末用米醋貳大盞同煎如稀餒用綿

濾去粗入黃連末膩粉調令勻候癬發時惡水出便可先用構樹白皮搔破後塗藥三兩上便愈

治疥癬 用松膠香研細約入輕粉和勻凡疥癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度

治癬瘡 取蟾蜍燒灰為末用豬脂和敷之

戴院使云瘡如牛皮模樣痒甚不可忍者又疼用黃連木香黃檗皮杉木節貳個明礬少許以上各等分為末用好真香油調塗大効

烏蛇丸 治一切風癬多年不瘥者

烏蛇 酒浸去骨

白附子 炮

附子 小研浸

天麻 各貳兩

全蠶 炒

羌活

乳香

僵蠶 炒各壹兩半

苦參 拾兩

槐花 半斤

右為細末用生薑汁壹斤蜜壹斤二味同熬成膏入藥和丸如梧桐子大每服參肆拾丸空心用溫酒送下 夜晚荆芥湯送下

白花蛇丸 治風癬瘡皮膚瘙痒久不瘥

白花蛇 參兩酒浸

苦參 去蘆貳兩

麥門冬 壹兩半去心

黃芩

防風 去蘆

白鮮皮

甘草 炙

枳殼 剉炒去穰

梔子仁

赤芍藥

川大黃

蒼耳子

羌活 去蘆

黃芪 去蘆

白蒺藜 各壹兩

右件為細末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大每

服參拾丸食後薄荷酒送下

本事烏頭丸治風癬妙 方見紫白癩風

宣風換肌散治一切風癬疥瘡疔瘡風瘡

甘草 炙

黃芪

當歸 各壹兩

黃連

黃芩 各酒浸炒

大力子 炒

防風

白芷

荆芥穗

川芎

烏蛇肉 各半兩

羌活

蒼朮

何首烏 各參錢

全蝎 炒拾枚

右為細末酒調服茶清亦可每服貳錢

雄黃膏 治風毒疥癬

雄黃 細研

膩粉 研

白礬 枯

川椒

藜蘆 各貳錢半

附子 半兩炮去皮臍

右為細末入乳鉢內再研如粉用煉了臘月豬脂

半斤黃蠟貳兩淨鐺內慢火煎候蠟銷傾於瓷合

內入雄黃等末攪勻每日四五度取少許敷塗之

硫黃散 治風毒癩偏身皆生瘙痒

硫黃 研

雄黃 研

硃砂 細研

麝香

細研

吳茱萸

附子

生用各貳錢半

芭荳

去皮

川椒

各壹錢

右為細末同研令勻先用新布擦癬令水出便用醋調塗之不過三兩上即瘥

治風癬及寒熱瘡疥

韭根

次多年者

藜蘆

瓜蒂

白礬

雄黃

水銀

胡粉

各貳錢半

右先將雄黃白礬胡粉研極細却入水銀用柳木匙研勻用豬脂壹斤將韭根藜蘆瓜蒂煮數沸去

粗放溫調前藥塗瘡大有神效

祛風白芷散

見面部面瘡

丹參湯 治風癬瘙痒洗浴

丹參

去蘆

蛇床子

各叁兩

苦參

伍兩

白礬

貳兩研細

右除白礬外篩為籠散用水叁斗煎取貳斗濾去粗入白礬攪令勻乘熱於避風處洗浴用水冷為度拭乾了用藜蘆末粉之相次用之以瘥為度

乾癬 治乾癬痒痛不止

草烏頭

狼毒

各貳錢半

蟹螯

柒个去頭足翅

右件生用為細末用唾津調用竹篦子刮破塗藥
熱擦入肉候出黃水三兩日即瘥

又方 蟹螯五月五日取拾枚 麝香半錢 同研為細末醋調

塗癬上出少黃水瘥

又方 川烏頭貳枚生用 乾蝎伍箇 為細末面油調作膏

塗之

治乾癬積年生痂搔之黃水出每遇陰雨即痒

巴豆拾粒

石於炭火燒之令油出盡即於乳鉢內用少許酥

和研如膏薄塗之不過一兩度愈

又方 用狼毒醋磨塗之

又方 蟹螯半兩微炒研細末蜜調薄敷即瘥

羅氏柏脂膏 治乾癬

柏油壹斤 黃蠟半斤 杏仁肆拾伍粒剉碎

朴硝壹抄

右件相和於鐵器內用老生薑葱白參根一順攪

五七次煎沸濾過成膏於瘡上搽之

一抺散 治乾癬不瘥

天南星 草烏頭各壹枚生用

為細末用羊蹄根搗絞取汁調塗不過三上瘥

解 濕癬

小斗五

五

濕癬 癬在頸項間後延上至耳成濕癬他治不應以
蘆薈壹兩甘草末半兩和勻先用溫漿水洗癬拭乾
傳之神妙劉禹錫方一名蘆薈膏故

硫黃散 治濕癬痒痛不可忍

硫黃 半兩 膩粉 貳錢 龍腦 壹錢

蟹螯 半兩

右件藥同研細如粉用面油調如泥痒痛時抓破
後用藥擦之立瘥

又方

烏梅 拾肆枚 大蒜 拾肆顆 梁上塵 貳合

右件相和入鹽叁合熟搗用醎醋壹升浸一宿塗
於瘥上即瘥

黃連散 治癬濕痒不可忍

黃連 黃蘗 胡粉 各壹兩 研細

雄黃 半兩 研細

右為細末同研令勻先用溫漿水洗瘡然後取藥
敷之不過四五度即瘥

治濕癬白禿

右取馬齒莧膏塗之若燒灰敷之亦瘥

孟詵云蕪荑和蜜治濕癬

治濕癬方

黃連

明礬煨各半兩

胡粉

黃丹

水銀各貳錢

右為細末用豬脂油壹兩夾研令水銀星盡散磁盒收用

螺殼散 治濕癬痒不可忍

螺殼

壹兩

亂髮灰

龍腦

胡粉

研各半兩

右為細末研勻以油淀和塗之

荆芥散 治多年濕癬

荆芥穗

不拘多少以瓦礮盛塩泥固濟只留一塞了竅放冷取

出研細末半兩麝香壹錢

膩粉伍錢

右研勻先以口含鹽漿水抓洗瘡令破帛子搵乾了以生油調藥傅之

羅祛濕散 治多年濕癬大有神效

蠶沙

肆兩

薄荷

半兩

為細末每用不拘多少乾摻瘡上或用生油調搽

子和一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝

發痒時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流又痛不可

忍灸炳薰漂硫黃藺茹白蠶蠶羊蹄根之藥皆不効

其父母求療於戴人戴人曰從予言則瘥父母諾
之以鉋針磨尖快當其痒時於癬上各刺百餘針其
血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不盡
以告後人恐爲癬藥所誤濕淫於血不可不砭者矣
灸法日中時灸病處影上三炷灸之呪曰癬中蟲毛
成我若欲治待日中又法八月八日日出時令病
人面向東面戶內長跪平舉兩手持臂兩邊取肩頭
小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下各三壯若七壯
十日愈

○浸淫瘡

浸淫瘡者淺搔之蔓延長不止搔痒者初如疥搔之
轉生汁相連者是也仲景云從口流向四肢者可治
四肢流來入口者不可治○運氣浸淫皆屬火經云
歲火太過甚則身熱膚浸淫是也

升麻湯 治心有風熱生浸淫瘡徧體

升麻

大黃判微炒

黃芩去黑心

枳實麩炒

芍藥各壹兩

當歸切焙

甘草炙各半兩

右剉碎每服伍錢匕水壹盞半燈心壹握煎至壹

蓋去滓空心溫服

香瓣瘡方 治面上耳邊生浸淫瘡有黃水出久不愈

殺羊鬚

荆芥

乾棗

去核各貳錢

右燒灰存性研勻入臙粉半錢同研極細每用少許清油調搽先以溫湯淨洗拭乾塗藥三二次効亦治大人小兒兩吻生瘡

雞冠血塗方 治卒得浸淫瘡不早治則遶身周匝

能殺人外臺云浸淫瘡轉廣有汁多起於心

右以雄雞冠上刺血傳之日三五度

簡要濟衆方浸淫瘡痛不可忍者發寒熱刺薊末水

調傳瘡上乾即易之

又方鯽魚

壹尾長叁寸者

豆豉

壹合

右杵如膏塗之亦療馬鞍瘡

瘡

又方苦瓠

壹兩

蛇退

燒半兩

露蜂房

微炙半兩

梁上塵

右

為末油調塗

又方伏龍肝

柒錢半

亂髮

燒柒錢半

右為末豬脂和塗

又方以鷄冠血和黃連末塗

煎鯽魚膏塗

生切

鯽魚片和鹽貼

燒胡燕窠水和塗

山妻年五十舊患發頤之處腠理虛踈每食則汗出

成流一日忽成浸淫瘡膿汁所至輒皮破肉腐傳銀粉黃連黃丹枯礬之屬皆不驗用豬膽汁調蘆薈末塗之膿水即乾而瘡

天泡瘡 壓粉散

七寶散 並見熱瘡痂子

又文嘯魚 容七昔 豆豉 合 古林咬膏塗之亦熱

隨書卷之掉唱長文

簡要齊衆之氣到發敵不可忍皆發寒熱疎曠末水

天泡瘡

天泡瘡即丹毒之類而有泡者由天行少陽相火為病故名天泡為火熱客於皮膚間外不得泄怫熱血液結而成泡如豌豆瘡根赤頭白或頭亦赤隨處而起若自裏達於外發在春夏三焦俱熱則服通聖散若止從頭項兩手起者此上焦熱也則服涼膈散若從身半已下起者則服黃連解毒和四物湯若發於秋冬則宜升麻葛根犀角或加檉苓一二味外傳如馬齒莧吳藍赤小豆苧根之類皆解毒消腫可用於初起之時或蚶殼或龜甲水龍骨各煨存性則收濕

濕生肌可用於浸淫之後

天威齋
天威齋唱丹毒之醜而首威皆由天行少則臥火為
麻姑各天威為火熱容於文亂間夜不昏紫潤燕地
天威齋唱丹毒之醜而首威皆由天行少則臥火為
天威齋

瘰

瘰小瘡世謂之熱瘰是也王註云大如酸棗或如豆
色赤而內有膿血也

風濕

海藏云汗出見濕乃生瘰癧癧為瘡瘰也

勞汗當風寒薄為皴皴乃瘰瘰色赤臍內有膿血

旋覆花丸

旋覆花

參兩

防風

白芷

甘菊花

南星

半夏

石膏

川芎

陳皮

白附子

各半兩

蝎稍

僵蠶

炒各參錢

瘡

夕和五

百五十五

右細末薑汁糊丸梧桐子大薑湯下參伍拾丸
後服

黑末子 治癰毒

用羊角連內骨燒存性為末酒調參錢分上下服
之瘡可散

按此方未嘗用服蓋秘方也常治面上或身卒得
赤癩或痒或癩毒不治殺人以殺羊角燒存性研
令極細末以雞子清調塗之甚効本草亦云然

劉小澗世醫之辨謂其出王註云大或癩瘰如或豆
瘡

熱瘡癩子

千金云凡熱瘡起便生白膿即今俗名膿窠瘡是也
其初起即淺但出黃汁名肥瘡又名黃爛瘡初作亦
如肥瘡喜著手足常相對生隨月生死痛癢圻裂春
夏秋冬隨瘡劇者名癩瘡治法已見疥門
膿胞瘡治熱為主

黃芩

黃連

大黃

各參錢

蛇床子

寒水石

黃丹

伍分

白礬

壹錢

輕粉

白芷

無名異

各少許

木香

少許痛者加

本草綱目

小科五

百五十五

右為細末麻油調塗

又方 蕎麥麵壹兩 硫黃捌錢 水銀制鉛壹錢 或油

或豬膽汁調搽

白蒺藜散 治熱毒瘡瘙痒心神壅躁

白蒺藜炒去刺 白鮮皮 防風去蘆

川大黃剉炒 赤芍藥 梔子仁

子芩 麥門冬去心焙 玄參

桔梗去蘆 甘艸炙赤剉 前胡去蘆各壹兩

右為細末每服貳錢食後用薄荷湯調服

蜜陀僧散 治執毒惡瘡臭爛久不生肌

蜜陀僧 雄黃 雌黃

定粉各半兩 膩粉叁錢

右研為細末先用柳枝壹握生甘草壹兩槌碎以

漿貳升煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡淨拭乾傅之

白金散 治風毒攻注遍身及手足生熱瘡疼痛出

黃水

用桂府滑石為細末先用虎杖甘艸豌豆各等分

約半兩許水貳碗煎上項藥至壹碗去滓微熱淋

洗瘡水冷拭乾上摻滑石末令通身便睡至明決

愈

玉粉散 治熱汗浸漬成瘡腫痒焮痛

定粉 壹兩

蛤粉 玖兩半

白石脂

白龍骨

石膏 各半兩

滑石 捌兩半

寒水石 燒通赤放淨地上冷出火毒壹兩

粟米粉 貳兩

右為細末研勻每用些少乾擦患處

七寶散 治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪

當歸

防風

荆芥穗

地骨皮

木通 各貳兩

白礬 壹兩

右為麤末每用藥壹兩水叁大碗煎五六沸濾去

滓稍熱淋潔患處避風少時

赤石脂散 治癩子磨破成瘡用此止痛生肌

赤石脂 細研

黃檗 去粗皮剉

臘茶末 各半兩

白麩 貳兩

龍腦 半錢另研

右為細末研勻每用時綿搨撲之

龍腦粉方 治癩瘡痒痛

龍腦 壹錢研

粟米粉 伍兩

右研勻先用棗葉湯洗後用綿搨撲之

玉女英 治癩瘡痒痛

滑石 半兩細研

菜豆粉 肆兩微炒

右研勻以綿搵撲之。一方有棗葉壹兩。

棟花粉傳方。治癩子搔痒。

右用苦棟花不拘多少焙乾為末入蚌粉滑石末各少許研勻日頻傳之。

治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡。

右取臘雪水和蛤粉傳之。

戴院使治癩子用香撲粉入朴硝末如常撲使更入少許枯礬末。

治熱癩瘡遍身如蠶子用不灰木棗葉為末瘡上搽之即止。又法用茨菰葉陰乾為末傳之。又方用

臘雪以瓶收貯遇生癩時以所化水塗傳。又方用

黃瓜切斷擦癩子上即安。又方用棗葉煎湯浴之。

又方用蚌粉肆兩菉豆粉貳兩滑石壹兩為末乾擦之。

秦朮湯 治風熱毒氣客於皮膚遍身生瘡癩如麻豆

秦朮 去蘆 壹兩

防風 去蘆

黃芩

麻黃 去節

甘艸 炙

玄參 去蘆

犀角屑

牛蒡子 炒

枳殼 去穰 炒

川升麻 各柒錢半

右件咬咀每服伍錢水壹中盞煎至柒分去粗溫服不拘時候

當歸飲子 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或痒或痛或膿水浸淫或發赤疹瘡癩

當歸 去蘆

白芍藥

川芎

生地黃

白蒺藜

防風 去蘆

荆芥穗 各壹兩

何首烏 去蘆

黃芪 去蘆

甘草 炙 各半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半薑伍片煎至捌分去粗溫服不拘時候

烏蛇散 治風熱遍身生瘡癩痒

烏蛇肉 酒浸 貳兩

羌活 去蘆

白鮮皮

桂心

甘草 炙

枳殼 去穰 炒

蒲黃 炒

蔓荊子

芎藭

當歸 去蘆各半兩

天麻

麻黃 去節

秦艽 去蘆

牛蒡子 炒

藁本 去蘆

白殭蠶 炒各半錢半

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時

荆芥散 治風熱皮膚瘙痒生痞癩

荆芥

赤茯苓 去皮

苦參 去蘆各壹兩

蔓荆子

天麻

人參 去蘆

防風

獨活 各去蘆

枳殼 麸炒各半兩

牛蒡子 炒

黃芩 各半錢半

烏蛇肉 酒浸貳兩

右為細末每服同前法

防風散 治風痞癩

防風 去蘆

杏仁 麩炒另研為泥

白殭蠶 炒各貳兩

甘草 炙壹兩

右為細末每服叁錢空心蜜水調下或溫酒調服

亦得日進二服

牛膝散 治風痞癩

右用牛膝酒浸搗為末每服貳錢食前溫酒調下

兼治骨疽風癩皆効

疾藜丸 治風瘙痒生痞癩

白蒺藜

秦艽 去蘆

赤茯苓 去皮各壹兩

羌活

苦參

並去蘆

黃芩

細辛

去苗各半兩

枳殼

朱錢半去穰炒

烏蛇肉

參兩酒浸

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服參拾丸溫蜜湯送下不拘時候

黑龍丸 治風毒上攻頭面多生痞癩

羌活

去蘆

薄荷葉

蔓荊子

細松烟墨

獨活

去蘆各壹兩

川芎

甘艸

炙

白附子

炮

山梔子

白芷

防風

去蘆

荆芥穗

天南星

薑製

草烏頭

生

白殭蠶

炒

川烏頭

炮去皮臍各半兩

右為細末煉蜜和丸每壹兩作拾丸每服壹丸細嚼茶湯或溫酒送下食後服

莽草膏 治風瘙痒皮膚生痞癩體腫疼痛

莽草

壹兩

當歸

去蘆

芎藭

大戟

去皮

川椒

附子

細辛

去苗

赤芍藥

芫花

躑躅花

蒴藿

各貳兩

右細剉用醋參升浸壹宿用豬脂參斤同煎令附子色黃為度綿濾去粗每塗摩病處日三五上

治風瘙痒皮膚生瘡癩搔之成瘡宜用此粉身即愈

芎藭

麻黃根 剉

白芷 各叁兩

雷丸 伍兩

藿香 貳兩

藜蘆 壹兩半

右為細末入英粉伍兩相和令勻逐日粉身上

治風熱皮膚瘙痒搔之生瘡癩粉身

麻黃根 伍兩

蛇床子 肆兩

白蒺藜

白礬 各貳兩

白米粉 貳升

右為細末用踈生絹袋盛痒即粉身

治風瘙皮膚生瘡癩搔之腫痒柳枝湯洗之

柳枝

羌活

蒴藿

苦參 各伍兩

槐白皮 肆兩

茵陳

狼毒

青箱葉

麻黃 各叁兩

右細剉和勻每取壹斤用水伍斗煮取肆斗去粗

更入鹽及朴硝各貳兩攪勻看冷熱於溫室中洗

浴浴罷衣覆出汗瘡切慎外風

治風熱皮膚生瘡癩苦痒成疥丹參湯洗之

丹參

苦參 各肆兩

蛇床子 叁兩

右件藥用水壹斗伍升煎至柒升去粗乘熱洗之

治皮膚風熱生瘡癩或痒痛宜用垂柳湯洗之

垂楊柳 壹斤

杏仁 叁兩

白礬 生用 貳兩

右件用水壹斗伍升煎去柒升去相於無風處洗
浴極妙

風熱主發苦荬丸

谷谷羅不賢出玉囊

更人鹽艾林師各須兩對
白粉
香令熨於溫室中我
谷際性味曰每兩壹尺以木五寸
去其

射毒

青藤葉

和黃

苦參

各武兩

跌白丸

茵蘗

結核

獨形而小核者為結核

河間云結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核也不
須潰發但熱氣散則自消○丹溪云結核或在項在
頸在臂在身皮裏膜外不紅不痛不硬不作痛多是
痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散
核○結核在頸項方僵蠶炒大黃酒浸青黛膽星各等
分為末蜜丸噙化○結核在下頰陳湯加酒炒大
黃連翹桔梗柴胡○結核在臂陳湯加連翹防風
川芎酒本蒼朮皂角刺僵蠶麝香行太陰厥陰之積
痰使結核自消甚捷○風核以去風消核散常服消

之。○風熱結核以大連翹飲加殭蠶牛蒡子。○凡一切風核疼痛宜以大蕎麥根及金線釣葫蘆根磨半汁半醋煖塗之。

○儒者楊澤之缺盆間結一核余謂此肝火血燥而筋攣法當滋腎水生肝血彼反用行氣化痰外敷南星商陸益大如碗余用補中益氣湯六味地黃丸以滋腎水間用蘆薈丸以清肝火年餘元氣復而消。○一男子頸間結核大潰一婦人左眉及髮際結核並用抱子清肝散海藻散堅丸以清肝火養肝血益元氣而愈此症亦有大如升斗者亦治以前藥可愈。○一

婦年二十耳下結核經每過期午後頭痛服頭痛藥愈甚治以八珍湯加柴胡地骨皮二十餘貼愈。○一婦因怒結核腫痛祭其氣血俱實先以神効散下之更以益氣養榮湯三十餘劑而消。○常治此症虛者先用益氣養榮湯待其氣血完充乃取神効散去其毒仍進前藥無不効者。○一兒七歲項結二核時發寒熱日久不愈治以連翹丸而消若患在面臂等處尤宜此丸若潰而不斂兼以托裏之藥。○一兒項結一核堅硬如癰面色痿黃飲食不甘服托裏藥不應此無辜疔毒也以蟾蜍丸治之而愈若數服不消按

糸木

夕禾子

之轉動軟而不痛者內有蟲如粉急針出之若不速

去則蟲隨氣走內蝕藏府不治蟾蜍夏月溝渠中腹

糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶近上令乾使蛆不得

出將將蟾蜍撲死投蛆中任蛆食晝夜次以新布袋包

繫置水急處浸一宿取出瓦上焙為末入麝香一字

軟飲丸如麻子大每服二三十九丸空心米飲送下

○一婦因怒不思食發熱倦怠骨肉痠疼體瘦面黃

經漸不通頸間結核以逍遙散入珍湯治之少可彼

自誤服水蛭等藥血氣愈虛遂致不救

海藻連翹湯 治諸般結核瘰癧馬刀瘦溜痰核

白茯苓

陳皮 去白

連翹

半夏 薑製

黃芩 酒炒

黃連 酒炒

南星 薑製

牛蒡子 炒

柴胡

三稜 酒炒

莪茂 酒炒

殭蠶 炒去絲

昆布

海藻

羌活

防風

桔梗

夏枯草

川芎

升麻

右生薑薄荷煎食後服

連翹丸

連翹

防風 去蘆

黃檗

肉桂 去麋皮

桑白皮

香豉

獨活

秦艽

牡丹皮 各半兩

吉亥

小斗五

百五三

海藻 貳錢半

右為末煉蜜丸如棗豆大每服拾丸燈心湯下

五香散 治肉中忽有惡核生腫硬不消惡肉惡脉

瘰癧風毒腫氣

木香

鷄舌香

沉香 各壹兩

麝香 細研貳錢半

射干

薰陸香

乾葛 剉

川升麻

獨活

桑寄生

連翹

甘草 生各貳兩

川大黃 參兩剉碎微炒

石剉碎入麝香研勻每服參錢水壹中盞煎至伍

分去滓入竹瀝半盞更煎一二沸溫服日三

連翹散 治項上惡核焮腫

連翹

射干

獨活

川升麻

木香

沉香

木通 剉各壹兩

桑寄生

丁香 各半兩

川大黃 貳兩剉碎微炒

右為細末每服貳錢清粥飲調下日三服

獨活散 治惡核風結腫毒四肢煩熱拘急

獨活

木香

射干

桑寄生

連翹

升麻

結核

小料五

百五

沉香

川大黃 生用

甘草 生各壹兩

右剉碎每服肆錢水壹中盞煎至陸分去滓入竹瀝半合更煎一二沸放溫服日三得快利為度

清肝益榮湯 治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛或作痰子并一切肝火之症

山梔

當歸

木瓜 不犯鐵器

茯苓 各壹錢

柴胡

川芎

芍藥 炒各柒分

熟地黃 壹錢半

白朮 貳錢

龍膽草 捌分

炙甘草 伍分 右薑水煎服

○瘦瘤

靈樞云虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內着寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷骨為骨蝕有所疾前筋疾前二字衍文也筋當作筋屈不得伸邪氣居其間而不及發為筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得及津液又留合為腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居為昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日以益大則為骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而不去

有熱則化而為膿無熱則為肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也刺節真邪篇○此皆虛邪中人為病弗去而久留着故積歲累

月而成○三因云瘦多着於肩項瘰則隨氣凝結此

等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石瘰

皮色不變者名曰肉瘰筋脉露結者名曰筋瘰赤脉

交結者名曰血瘰隨憂愁消長者名曰氣瘰五瘰皆

不可妄決破決破則膿血崩潰多致天枉瘰則有六

骨瘤脂瘤氣瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉瘤尤

不可治治則殺人唯脂瘤破而去其脂粉則愈○丹

溪云服瘦瘰藥先須斷厚味

海藻丸 治瘦瘰通用

海藻 洗晒

川芎

當歸

官桂

白芷

細辛

藿香

白欵

昆布 洗晒

明礬 煨各壹兩

海蛤 煨

松蘿 各柒錢半

為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸食後含嚥下

守瘰丸 治瘦瘰結硬

通草 貳兩

杏仁 去皮尖研

牛蒡子 各壹合

昆布 洗

射干

訶梨勒

海藻 洗各肆兩

瘦瘰 外科五 百六十一

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食後噲化日三

海藻酒方 治頸下卒結核漸大欲成癭瘤

右用海藻洗去鹹壹斤酒貳升漬一宿取壹貳合飲之酒盡將海藻曝乾搗末酒調壹錢七日三卽瘡如浸用絹袋盛了浸春夏二日秋冬三日

白頭翁丸 治氣癭氣瘤

白頭翁 半兩

昆布

拾分洗

通草

海藻 洗各柒分

連翹

玄參

各捌分

桂心 叁分

白欽

陸分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服伍丸用酒送下忌蒜麵生葱豬魚

海藻散堅丸 治肝經癭瘤

海藻

昆布

各貳兩

小麥

肆兩醋煮沙乾

龍膽草 貳兩

右為末煉蜜丸桐子大每服貳叁拾丸臨卧白湯送下并噲化嚥之

嬰五癭在頸項間皮寬不急累累而垂者是也宜破結散消癭丸海藻丸昆布丸黃藥酒藻藥散兼以針灸法同施方有效及常服復元通氣散蠟磬丸自然縮

木通散 治頸下卒生結囊欲成瘻

木通

松蘿

桂心

蛤蚧

酥炙

白欬

琥珀

海藻

洗

昆布

洗各壹兩

右為細末每服貳錢不拘時溫酒調下

五癭丸

菖蒲

貳兩

海蛤

白欬

續斷

海藻

松蘿

桂心

倒掛草

蜀椒

半夏

各壹兩

神麴

參兩

羊靨

百枚 見後百五

右為細末以牛羊脂髓為丸如芡實大每服壹丸食後臨卧嚙化服

昆布丸

檳榔

昆布

海藻

各貳兩

右為末煉蜜丸彈子大每用壹丸含嚙化下

藻藥散 治氣癭

海藻

酒洗壹兩

黃藥子

貳兩 煎

右為末置掌中以舌時時舐以津嚙下消三分之

二止藥先須斷厚味戒酒色

按本草黃藥子主諸惡腫瘡癭斗門方以

浸酒療項下瘦氣醫學綱目及丹溪誤作黃檗蓋檗藥字相近又誤檗為連則其失愈遠矣

二海丸 治氣瘦

海藻

昆布

各酒洗晒乾

右等分為末煉蜜丸杏核大稍稍嚥汁又用海藻洗淨切碎油醋熟作常菜食之

消瘦散 治瘦氣

海藻

海帶

昆布

酒洗

酒洗

酒洗

海馬

酒炙

海紅蛤

石燕

各煨

海螵蛸

各壹兩

右為末清茶下兼服含化丸兼灸相濟以收全功

含化丸 治瘦氣

海藻

海蛤

海帶

煨

昆布

瓦龍子

煨

文蛤

即花蛤背有斑文

訶子

去核

五靈脂

各壹兩

豬臛

拾肆个焙乾另研

右為末煉蜜丸臨卧含化時時嚥下 兼灸法以

助丸功

通氣丸

治瘦氣

海藻

海帶

昆布

夏枯艸

木通

各壹兩

訶子

薄荷

各伍錢

杏仁

少許

瘦留

小科五

原卷

右為末煉蜜丸如芡實大每用壹丸噙化 兼灸
以泄癭氣方効

黃藥酒 治忽生癭疾及一二年者

右用萬州黃藥子叁斤須緊重者為上如輕虛即
是他州者力慢須加一倍以無灰酒壹斗投藥在
內固濟瓶口以糠火燒一伏時停待酒冷即令患
者時時飲壹盞勿令絕酒氣經三五日常把鏡自
照覺消則停飲不爾令人項細也用火時不可多
惟燒酒氣香出瓶頭有津即止火不待經宿也已
驗如神忌毒合

上布散 治癭氣去風火鬱滯散痰氣壅結

防風

荆芥

黃連

酒炒

昆布

海藻

海粉

羌活

升麻

連翹

青皮

膽星

貝母

牛蒡子

炒

夏枯草

沉香

香附子

撫芎

黃芩

酒炒
久分重量

右薄荷煎服或末或丸俱可痰多加南星半夏
又宜灸天突穴為妙

三因破結散

海藻洗

草龍膽

海蛤

通草

昆布

礬石拈

松蘿各參分

麥麵肆分

半夏

貝母各貳分

右為末酒服方寸匕日三忌鯽魚豬肉五辛生菜

諸雜毒物十日知二十日愈

玉壺散 治三種癭

海藻洗

海帶洗

昆布

雷丸各壹兩

青鹽

廣茂各半兩

右等分為細末陳米飲丸如榛子大噲化以煉蜜

丸亦好

子和人參化癭丹

海帶洗

海藻洗

海蛤

昆布已上四味皆焙

澤瀉炒

連翹已上各等分

豬靨

羊靨各拾枚豬羊靨即豬羊外腎乃囊中之卵也

右為末蜜丸如芡實大臨卧噲化壹貳丸忌油膩

物

羅氏寶金散 偏醫癭氣無不瘥

豬羊靨拾對煖水洗去脂膜後曬乾并為細末

海藻洗

海帶各貳兩洗

丁香

木香

琥珀 研

麝香 研各貳錢半

真珠 研半兩

右件先將丁香木香海藻海帶杵為細末入下項藥末合和再研細重羅過每服壹錢熱酒壹盞調服夜卧服垂頭而睡若在室男女十服必効如男子婦人患者一月見効有胎不可服

海帶丸 治瘦氣久不消

海藻 洗 貝母

青皮

陳皮 各等分

針砂方 治氣瘦 右件為細末煉蜜為丸彈子大食後化壹丸効

右用針砂浸於水缸中平日飲食皆用此水十日一換針砂服之半年自然消散

昆布散 治瘦氣結腫胸膈不利宜服

昆布 洗 海藻 洗 松蘿

半夏 湯泡 細辛 海蛤 細研

白欝 甘草 炙各壹兩 龍膽州

土瓜根 檳榔 各貳兩

右為細末每服貳錢食後温酒調下 治瘦氣曾膈壅塞頸項漸羸宜服此方

商陸 昆布 洗各貳兩 射干

羚羊角 鎊

木通

海藻 洗

杏仁 湯浸去皮尖大麸炒黃各壹兩

牛蒡子 壹兩半

右咬咀每服叁錢水壹中盞入生薑半分煎至陸分去滓不拘時溫服

治癭氣神驗方

琥珀

桔梗 各半兩

烏鰂魚骨

昆布 洗各壹兩

赤小豆 酒煮熱焙

小麥 酒煮各叁分

右為細末煉蜜丸如小彈大綿裹壹丸常噙嚥津

神効開結散 治癭疾不問年歲極驗

沉香

木香

橘紅 肆兩

豬鬃子 生於豚項下

珍珠 肆拾玖粒砂鍋內泥

封口煨過絲壹枚如棗大取肆拾玖

右為末每服壹錢臨卧冷酒調搽徐徐嚥下輕者

三五服重者一料全愈修合用除日効忌鹹酸油

膩瀋氣等物

公留

六瘤者隨氣凝結皮膚之中忽然腫起狀如梅李皮軟而光漸如杯卵若發腫都軟不痛者血瘤發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤氣結微腫久而不消後亦成膿諸癭瘤疣贅等至年衰皆自內潰治於壯年可無後憂按之推移得動者可用取法去之

癭瘤

外科五

百六

如推之不動者不可取也。瘤無大小不量可否而妄取之，必妨人命。俗云：瘤者留也，不可輕去，不為無理。
○治法：先以鐵罐膏點瘤頂上，令肉黑腐，不痛方可。以刀剪去黑腐，又以藥塗令肉腐潰，又可剪之。又塗之，又剪，瘤根去盡為度。若怕針刀者，却以井金散塗之，令肉黑極，十分腐爛，方可用刀剪之。刮之若稍有些肉不黑盡，恐肉未死，血亦未死，血未死則不可剪刮，恐血來多，致有昏暈之失。其肉十分黑極，十分腐爛，推得動者，此肌肉死也。肌死則血死，其血死乃可剪刮，無妨。雖血瘤肉瘤，取之亦無妨也。小瘤取之即愈。大瘤取之有半載，肌肉麻痺也。宜服養氣血藥，久之自愈。
○薛內經云：肝統筋而藏血，心裏血而主脉，脾主肉而統血，肺主氣而司腠理，腎統骨而主水。若怒動肝火，血涸而筋攣者，其自筋腫起，按之如筋，久而或有血縷，名曰筋癰。用六味地黃丸四物山梔木瓜之類。若勞役火動，陰血沸騰，外邪所搏而為腫者，其自肌肉腫起，久而有赤縷，或皮俱赤，名曰血瘤。用四物茯苓遠志之類。若鬱結傷脾，肌肉消薄，外邪所搏而為腫者，其自肌肉腫起，按之實軟，名曰肉瘤。用歸脾益氣二湯。若勞傷肺氣，腠理不密，外邪所

搏而壅腫者其自皮膚腫起按之浮軟名曰氣瘤用
補中益氣之類若勞傷腎水不能榮骨而為腫者其
自骨腫起按之堅硬名曰骨瘤用地黃丸及補中益
氣湯主之夫瘤者留也隨氣凝滯皆因臟腑受傷氣
血乖違當求其屬而治其本大凡屬肝膽二經結核
八珍加山梔膽草以養氣血清肝火六味丸以養肺
金生腎水若屬肝火血燥須生血涼血用四物二地
丹皮酒炒黑膽草山梔中氣虛者補中益氣兼服若
治失其法脾胃虧損營氣虛弱不能濡於患處或寒
氣凝於瘡口榮氣不能滋養於患處以致久不生肌
而成漏者悉調補脾胃則氣血壯而肌肉自生矣若
不慎飲食起居及六淫七情或用寒涼蝕藥蛛絲纏
芫花線等法以治其外則誤矣○長洲庠王天爵辛
丑春左腿近環跳患之狀如大桃按之濡軟恪服除
濕流氣化痰之劑惡寒發熱食少體倦形氣俱虛脉
洪大而虛氣瘤也肺主之蓋膽屬木肺屬金然發於
膽經部分乃肺金侮肝木元氣虧損而其膿已內潰
矣遂用十全大補湯數劑出清白稀膿甚多頓加寒
熱煩渴頭痛殊類傷寒狀余謂此因膿泄而血氣益
虛耳仍用前湯其勢益甚脉洪數大按之如無乃加

附子壹錢其勢愈甚而脉復如前此虛甚而藥未能及也更加附子貳錢三劑諸症頓退乃朝用補中益氣湯夕用十全大補湯各三十餘劑出腐骨五塊瘡口將完後因不慎起居患處復潰諸症更發咽間如焚口舌無皮用十全大補加附子壹錢服之諸症悉愈二日不服內病悉至患處復潰二年後又患脈厥藥不應診其尺脉微細如絲此屬命門火衰用八味丸為主佐以十全大補湯稍愈至乙巳仍患虛寒之症而歿。一男子左腿外側近醫腫一塊上有赤縷二年矣飲食起居如常觸破涌出血膿發熱惡寒此瞻經受證故發於腿外側診其脉左尺洪數右關弦洪此腎水不能生肝木用補中益氣湯六味地黃丸而痊。一男子小腹患之膿水淋漓此是三陰之症用補中益氣加麥門五味以培脾土用六味地黃丸以生腎水更用蘆薈丸以清肝火而斂。一老儒眉間患之二年其狀如紫桃下墜蓋目按之如水囊此肝脾之症膿瘀肉潰而然耳遂刺出血膿目即開以炒黑膽草山梔芩歸芍藥柴胡白朮茯苓之類而愈。嘉善周上舍兩耳下項間筋攣臃腫堅硬咳嗽氣喘內熱盜汗所服皆化痰散堅行氣之劑勢益甚予

瘦瘠

小科五

卷之六

診之左關弦澁左尺洪數此怒氣傷肝房勞損腎須
滋腎水生肝血慎調攝至水旺之際庶可愈矣彼欲
速効乃外敷商陸石灰等藥內服海藻蓬朮之類至
秋金旺之際元氣愈虛其腫愈甚而歿。鎮江孫上
舍缺盆間腫如覆甌堅硬色赤內熱晡熱自汗盜汗
就治於余曰賤疾皆以散堅行氣降火破血之劑欲
其內消而反甚其脉左尺洪數按之而弱左關洪數
按之而澁此怒氣傷肝血涸而筋攣也因其急於仕
進予辭不能治彼亦不信後果歿此症若補脾肺滋
肺腎則木得水而敷華筋得血而滋潤多有得生者

○張子和治新寨一婦人年四十餘有瘤三辨戴人
令以鹹吐之三涌三汗三下瘦已消半次服化瘦之
藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法
耳。又在西華衆人皆訕以為吐瀉而已一日魏壽
之與戴人入肆中見一夫病一瘤正當目上綱肉背
色如灰李下垂覆目睛不能視物戴人謂壽之曰吾
不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取
此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割
別有一術其人從之乃引入一小室中令俛卧一床
以繩束其脰刺委中大出血先令以手揉其目瘤上

瘦瘡
亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技
可盡窺乎。○郃城戴人之鄉也。一女子未嫁年十八
兩手背皆有瘤一類雞距一類羊角腕不能釧向明
望之如桃膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背者
為膠瘤在面者為粉瘤此膠瘤也以銚鍼十字刺破
按出黃膠膿三二匙立平瘤核更不再作婚事復成
非素明者不敢用此法耳
清上消鬱湯 治痰火氣血鬱結作核成瘤脉弦而
滑在上部者
昆布洗 玄明粉平四十翁 陳皮

半夏

薑製

黃連

海藻

莪朮

川芎

香附

青黛

白芥子

分量既

右薄荷煎服

解下除濕湯

治濕熱鬱結血氣凝滯作核成瘤在

下部者

海藻

洗

黃檗

三稜

香附

青皮

梔子炒

連翹

檳榔

木通

同煎

右薄荷煎服

南星散

治皮膚頸項面上瘤大者如拳小者如粟

瘦瘤 夕禾五

或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針灸多致不救

生南星 大者壹枚

右細研爛入好醋伍柒點杵如膏先以細針刺患處令氣透却以膏藥攤貼覺痒則頻換貼取效

枯溜膏 治六瘤瘰癧痔漏 如無此膏以鐵罐膏代之更捷

草烏 肆兩 川烏 貳兩 乾桑耳

桑朽木 各壹兩半 礦石灰 桑柴灰

蕎麥稽灰 各壹碗

右將川烏桑耳桑朽木共燒成灰和礦石灰

桑柴灰蕎麥稽灰一處裝入酒漏內以棕塞其漏竅用水二斗煎滾淋汁慢火熬濃以十碗取一碗為度以厚實磁器收貯密封固如用入礦石灰調勻為糊點瘤頂上以濕紙數重貼藥上如若未乾不須貼若留久藥乾以唾調塗直待十分黑腐以刀剪刮取之腐肉未盡又點又刮如怕剪刮者却用井金散點之以漸腐爛自去不用針刀後却以膏藥貼之去盡腐肉為度

井金散 治六瘤瘰癧大有神效

土黃 叁錢 硃砂 生晒乾 雄黃 各貳錢

癰疽 九卷五

輕粉

朱砂

乳香

沒藥

各壹錢

麝香

片腦

各少許

為末以唾調為稀糊塗瘡頂上唾濕紙兩重蓋之
後用黃龍膏貼紙上間日一度上藥次添藥徹的
周廻大如韭葉如此上之無復漸漸折之後根搖
自然有裂覺隨後自下來若腐肉未去盡者揆針
頸散於瘡口腐肉上貼膏藥一日一換直待腐肉
去盡為度

造土黃法

信石

生貳兩

礶砂

生貳錢

木鱉子肉

巴豆肉

各五錢

右以信礶研末以木鱉巴豆搗成膏入石腦油和
作一塊油紙數重包裹埋於土坑內四十九日取
出磁器收貯聽用如無石腦油亦可

黃龍膏

涼肌退腫

黃檗

黃芩

大黃

右末蜜水調為糊餅貼紙上

又枯瘤方

砒

礶砂

黃丹

雄黃

輕粉

各壹錢

硃砂

瘰癧

乳香

沒藥 各錢

蟹螯 生用 參拾箇

一右研為末糯米粥為丸捏作棋子樣爆乾先炙破
瘰癧頂三炷以藥餅蓋上用黃檗末以水調貼之數
日自然枯乾落下

一方以銅綠為末草刺瘰癧破摻上以膏藥塗之

世點瘰癧方神驗

桑柴灰

棗樹灰

黃荆灰

桐殼灰 各貳升半

右以沸湯淋汁五碗許澄清入蟹螯肆拾箇穿山
甲伍片乳香腦子不拘多少約伍碗煎作貳碗用

磁器盛之乳香腦子候冷入之後臨用時入新石
灰調成膏神妙傳瘰癧上乾以清水潤之其効如神

龍骨散 生肌肉

訶子肉

龍骨 生

細茶 各等分

右末乾揆

麻藥 入六卷方中無此

南星

半夏

川烏

川椒

石灰

草烏 各等分

右六味各生為末醋調塗瘰癧上用藥則不痛

止血藥

真經

小引

真經

瘦瘠

京墨

煨

百草霜

各等

右為末揆之即以手按住

桃紅散 止血大効

石灰

拾兩

麻油

大黃

伍錢水浸透取汁各

半

右將石灰炒紅入麻油大黃汁和勻慢火炒如桃

花色磁器收貯聽用

疔諸瘦惡氣

肩顛

男左灸拾捌壯右拾柒壯女右灸拾捌壯左拾柒壯

又法 天府

拾柒壯

衝陽

隨年

甲癭天窓

一作天窓并

及臙會主之

瘦瘤氣會主

之

本車治果報面生贅瘤方用艾炷灸拾壯即用醋磨

硫黃塗紙上剪如螺螄掩于大貼所灸處更用膏藥

重貼二日一換候痒擠出膿如菉豆粉即愈硫黃羅

謙甫作雄黃

補女醫

外科

卷五

瘦... 外... 身...

右為木揆之... 以手...

石灰... 麻油...

大黃... 取...

精甫... 黃

炒紅入麻油... 勻慢火炒如桃

重韻二日一... 對新... 齋出... 艷... 吸... 菜... 豆... 餅... 唱... 愈... 齋... 黃... 蠶

靈黃... 傘... 膝... 土... 奠... 吸... 神... 餅... 干... 大... 根... 酒... 灸... 誤... 更... 用... 音... 樂

本... 建... 心... 果... 游... 面... 土... 贊... 瀝... 衣... 用... 艾... 火... 灸... 合... 其... 用... 用... 韻... 聲

...

肱 肱音休俗呼雞眼子是也

手太陽之别名曰支正上腕五寸虛則生肱小者指

痂疥取之所別也 肘後方手足生肱目鹽傳之舌

舐之只三次瘥 初虞世方用雞胃中食指肱上指

餘者以石壓之驗 鬼饅頭尖上搗破有白汁出頻

拭之佳

薛肱屬肝膽少陽經風熱血燥或怒動肝火或肝客

淫氣所致蓋肝熱水涸腎氣不榮故精亡而筋攣也

宜以地黃丸滋腎水以生肝血為善若用蛛絲纏螳

螂蝕者艾灸必多致誤大抵此症與血燥結核相同

尤 外科

故外用腐蝕等法內服燥血消毒則精血愈虛肝筋受傷瘡口翻突開張卒成敗症。○府庠朱宏仕年二十右手背近中指患五朮中一大者如黃豆餘皆如聚黍拔之如絲長三四寸許此血燥筋縮用清肝益榮湯五十餘劑而愈。○府庠沈姬文幼嚙指甲及長不能自禁余曰此肝火血燥也又頸側常生小朮子屢散屢發又臂生一塊如菉豆大若觸碎如斷束縷扯之則長縱之則縮後兩鬚發白點求治余曰子素肝病此部亦屬肝膽經也夫爪為筋之餘膽行入身一側正與醫爪生朮等症相應須滋補腎水以生肝膽則諸病自愈矣乃與六味地黃丸服之二年白點自退朮亦不生。○一男子臉患朮初如赤椹雜用敷貼之藥翻張如菌又用腐蝕焮大如瘤此足三陰經虛症悉具治以補脾肺生肝腎等劑而尋愈。○一男子小腹中一塊不時攻痛或用行氣化痰等藥不應尤以為血鼈服行氣逐血之劑後手背結一朮子漸長寸許形如鼈狀肢節間如豆大者甚多彼泥鼈生子發於外亦用行血虛證悉至左尺洪數關脈洪數弦余以為腎水不能生肝木以致肝火血燥而筋攣用六味地黃丸生腎水滋肝血三月餘諸證悉愈。

一男子因勞役過度面色青黑發熱咳嗽面生疣子
 腹內一塊攻上攻下作痛口乾小便祕澀服消尅之
 藥愈甚察其脈左右關俱弦洪元氣弱甚此肝脾受
 病而筋攣也投以加味逍遙散合地黃丸料元氣遂
 復若誤以為血鼈之類消之必致不起。一男子素
 膏梁醇酒先便血便結驚悸少寐後肛門周生小顆
 如疣子如鼠乳大小不一用清熱消毒等藥半載之
 間腿內股亦然又用化痰之藥寒熱吐痰頸間俱作
 肝腎脈浮數按之而弱余以為是三陰經血虛火熾
 法當滋化源彼不信別假四物黃蘗知母之類諸症

蜂起此胃氣復傷各經俱病也先用補中益氣湯三
 十餘劑諸症漸愈乃朝用前湯夕用八珍湯又各五
 十餘劑諸症尋愈於是夕改用六味丸加五味子又
 半載諸症悉愈。一婦人左手背并次指患五六枚
 如熟棗內熱晡熱月經素不及期余曰此因肝脾血
 虛而有熱也當調補二經使陰血生而諸症自愈不
 信乃用艾灸手腫脹發熱手指皆攣兩脇項及胸乳
 間皆患疣經行無期余用加味逍遙散少加炒黑黃
 連數劑漸愈乃去黃連更佐以歸脾湯其患漸愈又
 百餘劑經行如期再用地黃丸三料而痊。一婦人

小腹內一塊或時上攻或時下墜寒熱胸痞小便淋瀝或用行氣化痰等劑前證愈甚月經兩月餘而一行或以為內有肉鼈啖飲其血而經不行服驅逐之劑下血甚多兩手背結一朮如大豆許兩月漸長寸許又兩月餘又患數枚疑以鼈子行於外仍行驅逐兩耳下各患腫又疑為瘡毒余曰此屬肝火血燥也加味道遙加味歸脾二藥兼服佐以六味丸三月而愈○一婦人患之用蛛絲纏花線蠶娘啖毒藥蝕着艾灸大潰腫痛發熱出血余曰此陰血虛也木信仍服降火之藥而歿

○痔

世取痔餅藥

糯米 百粒

石灰 拇指大

巴豆 參粒去殼研

右為末入磁瓶同窰三日每以竹簽挑粟許點上自然蝕落

潔取監

風化石灰

壹兩

花碱 半兩

右為細末上三次如天色冷濕用

衍石灰水調壹盞如稠粥揀好糯米全者半置灰中半置灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有

志

小斗五

百八十一

黑屬子及紋刺者微微以針頭撥動置藥少許於其上經半日許屬汁自出剔去藥不用且不得着水二三日愈又方用水蛭一條雞子一枚開雞子小頭內水蛭以皮兒蓋合封之直至水蛭食盡雞清乾盡自死乃用之

糯米

世所共知藥

○

手足皸裂

夫秋冬風寒燥烈人手足為之皸瘃者血少肌膚虛故易傷也外潤以膏澤內臟益氣和血之藥可也

東垣潤肌膏治手足皸澁皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀝青

肆兩

白黃蠟

捌錢

乳香

貳錢

右三味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鐺內隨手便下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青盡溶開微微熬動放大淨水一盆於其傍以攪藥用匙取一二滴滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿濾淨入水中折疊扯之以白為度

手足皸裂

小科五

百上

油當旋旋入勿令軟了以甕器內盛之或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上炙裂子口却捻合裂子藥亦火上炙軟塗於裂子上用紙少許貼之自然合矣

○東垣老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皴裂甚痛兩手不能執轅足不能履地而車上宿制此藥傳之即効明日遂行自後屢用屢効故錄於此

初虞世治手足皴裂春夏不愈者

生薑汁

紅糟

白鹽

豬膏 臘月者佳

右研爛炒熟擦入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合再用即安

用手足寒皴裂台椒三四合煮浸半食頃須臾再浸又傳以羊豬髓腦甚妙 梅師方

世治脚跟皴裂用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用百沸湯泡洗皴裂令軟傳其上即安一方加水粉

山脚裂爛蒸藕研成膏傳之

手足皴裂

下斗五

百八

世用五倍子為末同牛骨髓填縫內即好
又治脚指縫爛瘡搗鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒存性
為末濕則摻之 一方用生桐油塗之妙

黃蠟膏 治冬月手足坼裂

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎
熔入光粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以
熱湯洗火上烘乾即用藥傅以紙貼之其痛立止
入水亦不落若合藥入粉多則硬而成塊旋以火
灸動挑傅不妨一方無五倍子

○凍瘡

子和經曰寒瘡流水俗呼為凍瘡或經年不愈者用
野中淨土晒乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢
厚薄量瘡口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計
壯數以泥乾為度去乾餅子再換濕餅子灸不問多
少直至瘡痂覺痛痒是瘡可治也然後口含漿水洗
漬用雞翎二十莖縛作刷子於瘡上刷洗淨以此洗
刷不致肌肉損傷也以軟帛拭乾用木香檳榔散傅
之如夏月醫之更妙

世足跟紅腫凍瘡

足跟

左足指面後跟赤白肉際
骨下刺入三分彈針出血

可灸叁
朱壯

足跟凍瘡潰破用蔥椒湯洗刮去腐肉用三稜針出血將馬屁勃入生牛骨髓調和傅之效
禹錫取臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出粗再煎成膏塗凍瘡及拆破瘡

治凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之

丹治凍瘡用煎熟桐油調蜜佗僧傳

山用五倍子煎湯洗

痛如神散氏

治凍瘡皮爛痛不可忍用川大黃不拘多少為細末新水調掃凍破瘡上痛止立効

于和戴人女僮足有凍瘡戴人令服舟車丸濬川散大下之遂愈人或疑之戴人曰心火降則寒消何疑之有

雉腦膏 治凍瘡久不瘥年年發歇先痒後痛然後腫破出黃水及血出不止

雄雉腦

壹枚研爛

黃蠟

各等分

清油

減半

右同於慢火上熬成膏去滓入瓷器中盛每用塗瘡上

栢葉膏

治凍瘡手足指欲墮及耳欲落

栢葉

炙乾為末肆兩

杏仁

去皮研肆拾个

頭髮

壹拳大

東醫

小斗五

五

食鹽半兩

乳香貳錢

黃蠟壹兩

油壹升

右先煎油沸次下前五味藥待髮盡再下黃蠟攪勻磁盒收先以熱小便洗瘡以綿挹乾後以藥塗卽以軟帛裹勿令寒氣侵入每日一換如瘡漸差三四日一換

橄欖散 治脚凍瘡

右用橄欖核燒灰存性爲末入輕粉油調塗

一女人數歲嚴寒上京兩足受凍不仁用湯泡漬至春十指俱爛牽連未落予用托裏之劑助其陽氣自

潰脫得保其生此因寒邪遏絕運氣不至又加熱湯泡漬故歿而不痛也余嘗見人之嚴寒而出凍傷其耳不知痛痒若以手觸之其耳卽落當以煖處良久或熱手熨之無恙若以火烘湯泡其耳卽死至春必潰脫落矣北方寒氣損人若此可不察之

一方穀精草煎湯洗甚速効

又方用白礬煎湯浸洗

又方用杉木煎湯洗之効

又方用莽艸葉煎湯洗

又方用無名異末水調傅

又方用羊乳傅之愈亦治蜘蛛瘡飲之尤妙

治漆瘡凍瘡大咬瘡並用秣米嚼爛塗傅

治漆瘡久不差用漆草搗爛傅患處立効

發瘰

瘡瘍發瘰因氣血虧損外邪所搏或內虛鬱火所致其形牙關緊急四肢勁強或腰背反張肢體抽搐其有汗而不惡寒者曰柔瘰風能散氣故有汗也其無汗而惡寒者曰剛瘰寒能瀉血故無汗也皆由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多與潰瘍產後多患之乃敗症也若大補氣血多有復生者若作風治速其危矣。秋官張同野舊有流注因暴寒睡炕口目抽搐手足戰掉余以為氣血虛熱而然用參芪歸朮川芎山梔柴胡半夏天麻炙甘草治之愈。○吳瞻之

給事墜馬傷首出血過多發熱煩躁肉潤筋惕或作
 破傷風欲發汗驅風余曰此亡血火動也無風可驅
 無汗可發當峻補其血用聖愈湯二劑頓愈又用健
 脾胃養氣血而全愈○一儒者背瘡將愈發熱煩躁
 自用降火之劑項強口噤自汗惡寒此汗多內亡津
 血筋無所榮也用補氣血之劑及地黄丸而愈○一
 男子素勤苦早行遍身發瘡瘡口噤目直肌弦緊此
 勞傷氣血內熱外邪所搏也用補中益氣加山梔羌
 活川芎而瘡半載後遍身作痒搔破成瘡發熱作渴
 脉洪大而虛復以前湯加芍藥麥門熟地天麻而愈

○一儒者善怒患癩癰復因大怒跳躍忽仆地兩臂
 抽搐唇口喎斜左目緊小此肝火血虛內熱生風用
 八珍散加牡丹皮釣藤山梔而愈次年春前病復作
 兼小便自遺左關脉弦洪而數余謂肝火血燥用六
 味丸加釣藤五味麥門芎歸治之漸愈又用補中益
 氣加山梔釣藤牡丹皮而安○一癩婦因怒仆地瘡
 口出血語言謇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿或
 用驅風之劑六脉洪大肝脉尤甚此肝火熾盛也用
 加味逍遙散加釣藤及六味丸尋愈○一婦人患內
 痔因勞出血甚多不時發瘕飲食少思形體倦怠其

面色白。余謂此氣傷而不能統血也。用補中益氣湯。反寒熱出血。此陽氣虛寒也。仍以前湯加炮薑四劑。寒熱漸止。飲食漸進。又四劑而血頓止。後因勞役。或怒氣。脚硬。血或發瘰。投以補中益氣湯加釣藤而愈。

○一婦人素性急。患偏身瘙癢。或項間結核。常服搜風順氣之劑。後大怒吐血。唇口牽緊。小便頻數。或時自遺。此怒動肝火而血妄行也。用小柴胡湯加山梔牡丹皮而愈。

○一癩婦因勞。兼怒。四肢攣屈。頭痛。自汗。小便短少。畏見風寒。脉浮弦緩。此氣血虛而風寒濕熱相搏也。先用東垣清燥湯漸愈。再用加味道遙散及八珍湯加牡丹皮而痊。

○一婦人素有肝火。兩拘間或腫痛。或寒熱。忽然昏憤。瘰癧抽搐。善伸數欠。四肢筋攣。痰涎上升。此肺金燥甚而血液衰少也。用清燥丸六味丸兼服。尋愈。

○一婦人因大勞。患臙瘡。發疔瘡。搔碎成瘡。日晡熱甚。或口噤。發搐。或頭目眩暈。此肝脾氣血虛而內熱。以八珍散加柴胡山梔治之。諸症少愈。復因怒。前症復作。經行不止。此肝脾血熱。用加味道遙散漸愈。又用八珍散加柴胡山梔而痊。

○一婦人發疔瘡。日晡熱甚。月經先期。或頭目昏眩。或寒熱發熱。或四肢抽搐。此肝經風熱血燥。用加

味逍遙散治之尋愈後因怒前證復作口噤遺尿此
肝火血燥也用加味小柴胡湯治之漸愈又夜間發
熱譫語此血分有熱也用小柴胡湯加生地而愈更
用加味逍遙散調理而安。一婦人患繭唇月經先
期余以為肝火血熱不信乃汎用降火之劑反致月
經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不隨六脈洪大面
目赤色用八珍加五味山梔丹皮麥門數劑漸愈兼
用逍遙散六味丸料各三十餘劑全愈。一婦人經
行遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰涌抽
搦瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡加熟地黃山梔
子釣藤鈎而愈。一婦素陰虛患遍身搔痒誤服祛
風之藥口噤抽搐肝脈洪數余曰肝血為陰為水肝
氣為陽為火此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝
火遂用四物麥門五味柴胡山梔生草熟地頓止又
以八珍加黃芪麥門五味釣藤炙草調理而愈。一
婦人久患流注脾胃虛弱忽痰壅氣喘頭搖目劄手
揚足擲難以候脈視其面黃中見青此肝木乘脾土
也用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加
半夏茯苓而安。

此風六者以柴貼長和崇之而到更及前月五日
雖其病難以新和脈其面黃中其青此其木乘脾土
散入又患流主咽胃虛弱必寒寒麻痺煎餅日昏
以人參以黃芩麥門正和雜藥草隨地而愈○一
火滋用四妙麥門正和柴貼山洲坐草藥餅餅立又
涼益則為火此以和醫血虛火溫耳宜以全血此
風之藥口禁吐辭刊和共燧余曰刊血益創益水刊
干陰瀧陰而愈○一散素創盡患惡良餅藥餅餅餅

類破傷風

破傷風方論已載雜病第五此其似是而非者爾

薛大凡癰疽潰後筋縻肉爛膿血大泄陽隨陰散或
筋脉拘急惡寒惕搐甚者舌強口噤項背反張痰涎
壅盛便閉汗出不時發熱此氣血俱虛而傳變雖與
破傷風相類而主治之法當大補氣血若果係風症
亦須以大補氣血為本而兼以治風之藥設若不審
是非而妄藥之則誤矣○司徒邊華臬肩患癰潰而
發熱目直或睜殊類中風日晡熱甚脉益數此足三
陰氣血虧損虛火妄動用參芪歸朮炙草加酒炒黑

黃檗五味麥門肉桂四劑而愈。又數劑而斂。○陸大
 衍背瘡內潰出膿二盞許用托裏之劑痛止腫消停
 藥忽寒熱作渴頭痛自汗此元氣虛而未能復也用
 十全大補加麥門五味肉桂二劑益甚診其脉如故
 此藥力未及仍用前藥加附子一錢三劑諸症悉愈
 乃去附子加肉桂數劑而斂。○一儒者患腿癱深蓄
 於內肉色不變久不穿潰針出膿瘀五椀許惡症駢
 臻全類中風此脾胃虛而變症也用六君子加當歸
 炮薑及聖愈湯各四劑而安又勞心不寐用歸脾湯
 而愈。○一儒者傷寒後患流注腫痛潮熱用十宣散
 敗毒等劑出稀膿五六碗許發熱惡寒煩躁作渴殊
 類破傷風症而斂。○一男子背瘡未痊斂以膏藥剪
 孔貼之患破傷風症而斂此先失於內補外邪襲其
 虛耳余見此症貼膏藥剪孔欲其通氣而反患破傷
 風搽斂藥生肌欲其收口而反助其餘毒以致斂者
 多矣可不慎哉

致疼痛及驢馬屎糞一切毒水入瘡並治

糯米粉

砂糖

各參兩

甘艸

生末壹分

右為膏攤在絹上粘毒水出効

○馬汗入瘡

治馬汗入瘡毒氣攻腫痛方

右用馬鞭上手執處皮燒灰研細和豬膏塗瘡上

一方以馬鞭稍燒灰豬脂和塗瘡上

治驢涎馬汗入瘡

右用乾冬瓜燒灰洗淨瘡口擦藥在內一方用冬

文陰乾為末傅之

瘍醫準繩卷五

藥

元祐八年八月廿日午時採朱了

