

大德重校聖濟總錄卷第一百三十

癰疽門

癰疽潰後蝕惡肉 癰疽大小便不通

癰疽托裏法 癰疽等瘡內消法

一切癰疽諸瘡膏藥



總錄一百三十一

論癰疽潰後蝕惡肉就去率下極其藥

論曰癰疽已潰久而良肉不生者由氣血未平惡肉有以害之也惡肉雖得於風氣外搏亦以餘毒未盡故死肌敗壞侵蝕良肉治宜以藥蝕去之白藥

治發背癰疽及諸惡瘡生惡肉麝香膏方博

麝香研

雄黃研

真珠研各壹兩

治癰疽諸瘡惡肉黃粉

右四味研勻鎔豬脂調如糊塗傅惡肉上日再

治癰疽諸瘡惡肉對藜蘆散方治

藜蘆去蘆頭

蘭茹各半兩

馬齒礬研

石硫黃 研

雄黃 研

麝香 研各參

右六味除研者外搗羅為散再和勻每用少許傅瘡  
日三五次以惡肉盡為度

治癰疽瘡大黃蝕肉膏方

大黃

附子 炮裂去

茶草

芎藭

雄黃 研

雌黃 研

真珠 研

白欬

白礬 研

黃芩 研 黑錫 研 芎藭 各壹 豬脂 貳 木 各壹

右十二味除研者并豬脂外剉碎先熬脂令沸下  
諸藥煎候赤黑色綿濾去滓下研者藥攪勻傾出

器盛每日塗瘡日三五次以惡肉盡為度

治發背癰疽及惡瘡不生肌肉敗壞其色黑蝕惡肉白

礬散方

白礬 研半

蘭茹 末壹

膩粉 研壹

雄黃 研

當歸 末各壹兩

右五味合研勻取少許傅瘡日三次

治癰疽瘡蝕惡肉硫黃散方

硫黃 研

馬齒礬 研

蘭茹 末

丹砂 研各半兩

麝香 錢壹

雄黃 研

雌黃 研

白礬 研各半兩

右八味合研勻每用少許傳瘡日三兩次以惡肉盡

為度

治癰疽敗壞生肉生地黃膏方

生地黃兩肆

辛夷

獨活去蘆頭

當歸切

大黃

芎藭

黃耆

白芷

芍藥

黃芩去黑心各半兩

續斷兩壹

豬脂貳斤

薤白貳柴

右一十三味除豬脂外並剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色以綿絞去滓甕合盛塗瘡日三四

次

治癰疽始作便壞熱毒發瘡羊髓膏方

羊髓壹兩

甘草

胡粉各貳兩

大黃壹兩半

豬脂壹斤

右五味除羊髓豬脂胡粉外剉碎先熬羊髓豬脂令沸下甘草大黃煎令赤黑色綿濾去滓下胡粉攪令

勻甕合盛每用塗傳瘡日三四次

治癰疽敗壞生肉莽草膏方

莽草

當歸

薤白

黃芩去黑心

甘草

白芷



大黃

續斷各壹

豬脂貳斤

右九味除豬脂外剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色以綿絞去滓瓷合盛塗瘡日三次

治癰疽惡肉瘡蝕盡生肌芍藥膏方

芍藥

大黃

黃耆

獨活去蘆頭

白芷

當歸各壹兩

薤白參兩

生地黃壹兩半 豬脂壹斤半

右九味將八味剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷赤黑色綿濾去滓每取少許塗傳瘡日三五度

治癰疽發背後生肉膏方

生地黃斤壹

辛夷貳兩

獨活去蘆頭

當歸焙

大黃炒

黃耆剉

芎藭

白芷

芍藥

黃芩去黑心

續斷各壹兩

薤白伍兩

右一十二味咬咀以臘月豬脂煎膏傳瘡立差

治癰疽發背去惡肉麝香膏方

麝香研

雄黃研

白礬燒研

蘭茹各壹兩

右四味搗研細羅為末以豬蹄煎膏調如泥傳之惡

肉盡為止

癰疽大小便不通

論曰癰疽之人經絡壅闕氣血結聚榮衛津液因以虧燥邪熱內鼓流注於大小腸氣不疎通故大小便俱不通治法宜通其閉塞導去邪毒使勢無深入穿通府藏茲治之要也

治發背一切惡瘡及乳癰結聚腫靛熱痛藏府餘毒閉泄可服通泄調氣解毒木香丸方

木香壹兩

檳榔生剉參分

葶藶

羌活去蘆頭各半兩

大黃剉炒壹兩

附子炮裂去皮臍

人參各半兩

枳殼槩炒去麩參分

牽牛壹兩半炒半生

陳橘皮湯去白焙半兩

右一十味搗羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大以瓷合內盛之每日空心粥飲下三十九丸通利一兩行如不利加至四十九五十九丸以通疎為度甚者夜臥時更服二十五丸

治發背諸癰腫丹石藥毒頭痛壯熱大小便不利玄參丸方

玄參壹兩

升麻

梔子人

黃芩去黑心各半兩

黃耆細剉參分

大黃剉炒壹兩半

吳藍兩

犀角鎊屑參分

木通剉炙兩

連翹參分

朴消研壹兩半

右一十一味先以十味搗羅爲細末再同朴消研勻  
鍊蜜和九梧桐子大每日空心米飲下十五丸如不  
利加至二十九取快利三兩行爲度瀉下膿化爲黃  
水卽差

治年未及四十氣血強壯常苦癰疽無定大小便不通

五利大黃湯方

大黃剉後炒

升麻各兩

黃芩去黑心壹兩

梔子拾枚去皮

右四味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分

去滓下芒消一錢匕空心溫服快利三兩行爲度未

利再服

治癰疽瘡發大小便秘澀不通朴消丸方

朴消研

大黃剉

杏仁湯浸去皮尖雙入炒研

葶藶子微炒各貳兩

右四味先以三味搗羅爲細末入朴消和勻鍊蜜爲  
丸如梧桐子大每食後煎黃耆湯下二十九以通利  
爲度未利再服

治表裏俱熱三焦不通發背疽瘡及癰癩大小便不利

山梔子湯方

山梔子人

拾伍枚

大黃剉微炒

黃芩去黑心

知母焙

甘草炙剉各

右五味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓下芒消一錢匕空心溫服日再

治發背癰疽及乳癰毒氣攻臍府大小便不通木通湯

方

木通剉

黃芩去黑心

山梔子去皮

漏蘆根

土瓜根

大黃剉

甘草炙剉各

右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞

去滓下朴消一錢匕再煎三兩沸空心溫服未利再

服

治癰疽取利下後熱微退小便不利小麥湯方

小麥合

人參

甘草炙

芍藥

石膏碎

生乾地黄焙

黃耆剉

木通剉

升麻剉

黃芩去黑心

前胡去蘆頭

麥門冬去心焙

右一十二味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半入竹

葉七片大棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服

日晚再服

治發背癰疽排膿止痛利小便瞿麥散方

瞿麥穗

芍藥

桂去心

赤小豆

芎藭

白朮

黃耆剉

當歸切焙各

麥門冬去心

右九味搗羅為細散每服二錢匕溫酒調下空心日

晚各一服

諸癰疽托裏法

論曰癰疽諸瘡氣血虛微肌寒肉冷膿汁清稀毒氣不出瘡久不合或聚腫不赤結鞭無膿外證不見者並宜托裏邪氣外散膿汁早成毒有所泄而不內攻也

治癰疽諸瘡潰後膿出多內虛托裏黃耆湯方

黃耆剉

白茯苓去黑皮

桂去心

麥門冬焙

當歸切

人參

甘草炙

遠志去心各

五味子壹兩

右九味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎取一盞去

滓溫服不計時候日二

治發背癰疽久冷不差托裏生肌芎藭散方

芎藭剉

黃耆剉

白芷剉

赤芍藥壹兩

桂去心

人參

丁香

當歸切焙各



右八味搗羅爲細散每服二錢匕粥飲調下空心日  
晚再服以差爲度

治癰疽發背膿血穿潰疼痛托裏止痛當歸湯方

當歸焙切

黃耆細切

人參各壹兩

桂去麤皮

赤芍藥

甘草炙

生乾地黄焙各分

右七味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取一盞

去滓溫服不拘時候日二夜一

治發背癰疽一切瘡腫托裏排膿木香散方

木香

黃耆細切

白欬

木占斯

芍藥

當歸切

細辛去苗葉

桔梗炒

赤芍藥

檳榔銼生

敗醬

甘草炙

桂去麤皮

羌活去頭

白芷各壹兩

右六十五味搗羅爲細散每服二錢匕甘草煎酒調

下空心午時日晚各一服以差爲度

治一切瘡內托散方

甘草炒

人參

甘菊花壹半炒

玄參各壹兩

右四味搗羅爲細散每服二錢匕煎菘豆湯調下

治諸瘡熱退膿不止托裏內補防風散方

防風去

白茯苓去黑皮

白芷

桔梗炒

遠志去心

甘草炙

人參

芍藥

當歸切

黃耆剉各壹兩

附子炮裂去皮

厚朴去粗皮薑汁

赤小豆酒浸壹宿

桂去粗皮

右一十四味搗羅為細散每服一錢匕溫酒調下日

二夜一

治癰疽潰後膿血太多托裏除虛熱黃耆茯苓湯方

黃耆剉

麥門冬去心焙 芍藥

白茯苓去黑皮

桂去粗皮

五味子取兩

右六味搗搗每服三錢匕以水一盞入生薑棗煎

取七分去滓溫服不拘時候

治癰疽托裏六倍散方

黃耆剉壹兩

赤小豆參分

芍藥半兩 白朮參分 栝樓去皮參分

當歸切焙

丁香

右六味搗羅為細散溫酒服方寸匕日三夜

凡癰疽大堅者未有膿半堅半有膿當上薄皮都有膿便

可破之所破之法宜下逆上破之令膿易出膿深難

見上肉厚宜火針之若外不別有膿可當上按之內  
便隱痛中央堅者未有膿按之更疼於前者已熱也  
治癰疽內攻五藏煩悶不安排毒托裏五香散方

沉香剉 乳香研 丁香

木香

藿香略

右五味以四味搗羅為細散入乳香和勻先以清酒

五升黃耆五兩寸截餅內封閉浸一宿旋取一盞微

溫調下一錢匕日三夜三不可犯鐵器

治癰疽日漸焮長內塞散方

熟乾地黄焙

續斷

人參十斤

芍藥

附子炮裂去

枳殼去瓢

甘草炙

芎藭

細辛去苗

桂去蘊皮

檳榔剉壹

黃耆剉

當歸切焙各

蜀椒去目并合口者

肉從蓉酒浸切

右一十五味搗羅為散每服三錢匕空心溫酒調下

日再服

治諸癰疽踈轉後宜補虛助氣飲方

黃耆剉

人參

白茯苓去黑

甘草炙

五味子

芎藭

獨活去蘆頭

桂去鹽皮

青橘皮

湯浸去白焙各壹兩

麥門冬去心焙

當歸焙

杏仁去皮尖雙入炒黃

熟乾地黃

焙各壹兩半

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三

片大棗二枚去核煎至八分去滓不拘時溫服

治癰腫瘡癤排膿連翹飲方

連翹

防風去義

玄參

白芍藥

薺芎

黃芩

去黑心各貳兩

桑根白皮

剉炒貳兩半

前胡

去頭

人參

甘草炙

桔梗

剉炒

白茯苓

去黑皮各壹兩黃耆剉碎兩

牡子人

各半

右一十三味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取

八分去滓溫服日三服

癰疽等瘡內消法

黃芩去黑

論曰治病必先求其本而後治其標癰疽諸瘡雖發於

外而本乎中熱之所由始覺經絡壅滯氣血悶鬱有瘡

瘍之證則熱氣初作榮衛未礙肌肉未腫腫而未腐亦

時特可疎滌風熱通導而法之速其毒氣已結則不可

論內消法恐熱毒不出反以內攻適所以傷之先後遲

速之用不可不審詠苦不下惡苦內消者

治發背癰疽腫毒痛苦不可忍者內消散方

車螯壹枚背上一紫色光厚者是用黃泥定火煨通赤於布上去泥搗為末 吹於患

處右一味以柘樓一枚打碎用酒共挽於銀石鍋內慢

火熬及一盞濾去滓入膩粉一錢七圓以酒調晚後

服之取下如魚涎為驗壹錢 治發背癰腫腸癰乳癰一切毒腫內消化毒犀角丸方

犀角屑壹兩 升麻 黃芩去黑心

人大黃炒 防風去 人參

當歸切 黃耆切 藜蘆去蘆 半煎取

黃連去 甘草炙 梔子人各半兩

巴豆拾貳枚去皮心炒令黃細研

右一十三味除巴豆外搗羅為末入研了巴豆和勻

鍊蜜為丸如梧桐子大每日空心粥飲下五丸以利

為度未利加至七八九利下黃沫惡物為効

治瘡腫久不愈內消散方

皂莢刺皮壹兩 乳香研貳

右二味末和勻每服二錢匕酒一盞煎七分溫服其

毒內消或微利是効

治瘡癰腫內消漏蘆煮散方

漏蘆去綿 白欬 黃芩去黑心

黃芩去黑心

漏蘆去綿 白欬 黃芩去黑心



麻黃去根節

白薇洗

枳實炒

升麻

芍藥

大黃炒

甘草炙各

右一十味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分

溫服

治癰疽始發未變膿令內消花藥石散方

花藥石煨

黃蜀葵花

龍骨去土

烏賊魚骨甲去

梔子人

草龍膽去土

鬱金剉

胡粉

大黃剉各

右九味搗羅為散量多少以津唾調成稀膏傅之頻

以唾潤日一易

治諸癰腫初發及火灼乳癰令內消乳香散方

乳香半兩

水銀粉壹兩

黃蘗壹兩

白及壹兩

白歛

鉛丹

大黃各壹兩

右七味搗羅為細散水調貼之有膿時乾摻

治癰疽發背一切熱毒氣結腫疼痛府藏壅滯踈轉枳

殼丸方

枳殼去麩炒

青橘皮去白焙牽牛子壹半生壹半炒共參

木香壹兩

甘草炙

大黃剉炒各壹兩 皂莢不坤者參提推碎以酒壹升浸按取汁絹濾去滓

右七味除皂莢外搗羅為末先以皂莢汁於火上煎

成膏即入藥末按和為丸如梧桐子大空心服二十

丸葱茶下以利為度未利再服

治癰疽內消防風散方

防風又法 升麻 白欬

黃芩去黑心 豬苓去黑皮 黃耆剉

瞿麥穗各壹兩 薏苡人壹兩 當歸切

甘草炙各半兩 人參分 赤小豆壹合醋炒柒遍

右一十二味搗羅為散每服二錢七空心溫酒調下

日晚再服

治癰腫內消升麻湯方

升麻 大黃炒 黃芩去黑心

當歸切 枳殼去瓢麩炒各壹兩 甘草炙半兩

芍藥壹兩

右七味麤搗篩每服五錢七以水二盞煎至一盞去

滓空心溫服日晚再服

治癰疽已成膿水內消木古斯散方

木古斯 桂去黑皮 人參

細辛去苗葉 敗醬 乾薑炮

厚朴

去麩皮生

防風

去

桔梗

炒

甘草

炙各兩

右一十味搗羅爲散每服三錢匕溫酒調下食前服  
未成膿卽去敗醬一味

治癰疽始作赤焮熟長甚速木香搭方

黃連至一匙去

木香

犀角屑

大黃

升麻

黃芩

去黑心

梔子人

黃連

甘草

芒消

射干

黃蘗

去麩皮炙

紫檀香

羚羊角屑

白欬

各壹兩

地黃汁

伍合

麝香

壹分研入

右一十六味喫咀以水二升煮取一升用故帛兩重  
內湯中蘸搭腫上乾卽又蘸搭之日夜數百度

治腫毒癰疽未潰令內消已潰令速愈草烏頭散方

右取草烏頭末水調雞羽掃腫上有瘡者先以膏藥  
貼定無令藥着人初塗病人覺冷如水瘡乃不痛

治一切癰疽瘡癰焮腫未穴先踈通藏府牽牛子散方

牽牛子

貳兩壹半生壹半炒

木香

青橘皮

湯浸去白焙

陳麴

炒各半兩

右四味搗羅爲散每服三錢匕五更初以生薑茶調

下至天明通轉三兩行自止後以薤白粥補之

一切癰疽諸瘡膏藥

論曰諸瘡之證成腫或潰或鞭或久不差者皆藉以膏劑去殘腐排惡汁化死肌生良肉者正以此也附方于

後

治一切瘡腫及傷折雲母膏方

雲母

消石細研

甘草各肆兩

槐枝

栝葉

柳枝

桑根白皮各貳兩

桔梗

防風去叉

桂皮去麤

蒼朮

菖蒲

高良薑

黃芩去黑心

此胡去苗

厚朴去麤皮

松脂

蜀椒去目并閉口者

芍藥

龍膽

白芷

白及

白欬

黃耆

芎藭

白茯苓去黑皮

夜合花

附子去皮臍各半兩

鹽花

人參

當歸切

木香

麒麟竭

沒藥

麝香

乳香各半兩

橘皮去白

鉛丹壹拾肆兩

水銀貳兩

右三十九味依次第用各處到勿令太細免煎易焦

黑先以清油四十兩於鑊內鍊令香熟下雲母用柳  
篦不住手攪候十數沸卽以單籬漉出次下消石亦  
準前法次下柏葉焦黃色爲度亦漉出一味味煎相  
次下柳槐枝次下鹽花及人參諸藥候藥盡後提鑊  
離火候微冷以綿濾過再入鑊內便下鉛丹急以柳  
篦子攪須臾色變卽止却將鑊火上加火煎之色黑  
稠以柳篦取少許滴於水上凝結不黏手是藥已成  
先須炙一瓷器令熱卽傾藥在內候膏藥如人體溫  
方入麝香仍以絹袋子盛水銀以手彈膏藥上如鍼  
頭細再以柳篦攪勻此是養藥母也如人收此藥防

身以蠟紙裹不令風乾可三二十年並無損動若發  
背先以敗蒲二斤用水三升煮三五沸將蒲湯洗  
瘡拭乾貼藥又以藥一兩分爲三服溫酒下未成膿  
者立差乳癰瘰癧骨疽毒穿至骨者用藥一兩分作  
三服溫酒下甚者卽瀉出惡物兼外貼差腸癰以藥  
半兩分爲五服用甘草湯下未成膿者當時便消已  
成膿者膿隨藥下膿出後每日酒下五丸如梧桐子  
大膿止卽止風眼貼兩太陽穴一切惡蟲咬外貼留  
瘡口發腦發髭鬚發脊發耳臍癰牙疼並外貼腎癰  
馬墜傷筋骨疼不可忍者但以酒下半兩老少臨時



加減外更膏藥包裹當時痛止箭頭在內不出者外貼每日喫少爛豇豆箭頭自出虎豹所傷先以甘草湯洗然後貼膏每旦換不過三貼狗咬蛇咬外貼又以生油下十九如梧桐子大難產二日三日不分免者溫酒下一分血運欲死以薑汁和小便半升溫酒下十九死胎在腹以榆白皮湯下半兩小腸氣炒穰香子溫酒下婦人血氣當歸酒下中毒藥者洗穢酒下各一分許中毒之人即吐瀉出惡物差一切腫癰瘡贅藥利卽差只忌羊血

治一切瘡腫保安膏方

當歸切

附子去皮

芎藭

防風去

白欬

升麻

細辛去苗

側柏

萹藤各壹兩

桃人去

甘草

桑根白皮

垂柳枝

白及

黃耆

白芷

白僵蠶各半兩

鉛丹研伍兩

雄黃研

麝香研

硫黃研各半兩

杏人去皮

丹砂研壹分

右二十三味咬咀以麻油二斤於新瓷器內浸藥一宿次日內鑊中文武火鍊候稀稠得所以綿濾去滓

入雄黃鉛丹丹砂麝香硫黃等物再煎須臾息火別  
入黃蠟四兩凝藥候稍過傾入熱瓷罈內盛之勿令  
塵污發背酒調兩匙日兩服外貼二日一換瘰癧瘻  
瘡疽瘡風腫乾癬爛癬腎癬濕癬發鬚發腦發牙蛇  
蟲咬皆貼之折傷筋骨酒服半匙箭入骨貼之自出  
喉閉合之卽通難產并胎死腹中並酒化下半兩血  
氣衝心生薑自然汁加小便同前溫酒化下一匙但  
諸惡瘡數年不痊者以鹽湯先洗然後貼之

治一切惡瘡濕癩癰疽發背陰瘡灸瘡湯火瘡閃撲損  
烏犀膏方

白芷

板藍根

苦參

芎藭

并細剉各壹兩半

鉛丹

陸兩

清麻油

壹拾伍兩

右六味先將油并前四味藥用慢火同煎令藥焦黑  
用綿濾去滓再入鍋內亦用文武火煎沸下鉛丹在  
內用柳木篦子攪勻滴水內成珠爲度卽傾在瓷器  
內密收如用以無灰紙攤貼所患處

治一切瘡腫紫金膏方

皂莢

不艸者壹挺去皮

薤

伍莖去根貳味於清油內煎令魚黃以綿濾去滓

鉛丹

研肆兩

團粉

研肆兩

松脂

研貳兩

右五味用清油半斤先煎前二味去滓次下鉛丹又

下團粉松脂以柳木篦不住攪滴水成珠為度隨  
瘡大小貼之

治一切惡瘡腫烏金膏方

麻油斤

鉛丹肆兩冬月陸兩

蠟兩

頭髮雞子大壹團

右四味先炒鉛丹令黑卽下油及髮以柳木篦不住攪  
滴水中候可丸卽止便下蠟更煎蠟銷後卽盛瓷  
器內隨瘡大小貼之

治一切瘡腫傷損湯火燒摩風止痛痒用薄絹攤貼之  
口瘡含化一豆大風毒氣眼瞼赤爛疼痛不可忍者用

藥塗之口面風癬以藥塗擦熱徹為度耳鼻中肉鈴用  
紙捻點一豆大一月取下並不疼痛仍除癥痕退黥點  
等神應膏方

栝樓壹枚

零陵香

藿香

芍藥

甘草

黃耆

杏仁壹分

白芷壹分

龍腦

麝香壹錢

黃蠟壹兩

清油陸兩

右一十二味除龍腦麝香外並細剉於入臚日用油  
浸七日却出藥將油鍊令香熟放冷秤六兩却再入  
諸藥煎令黃用夾絹袋濾去滓再入鍋內旋旋下蠟

攪勻滴水中成珠卽止去火候溫入龍腦麝香打勻  
傾出熱卷合內依前病用之

治一切惡瘡三仙膏方

麻油兩

鉛丹

定粉各研  
壹兩

右三味先鍊油熟將鉛丹定粉同羅過同煎用槐枝  
攪勻候稀稠得所滴水內如珠卽止每用隨瘡大小

貼之

治一切癰腫瘡癩乳香膏方

清油斤

皂莢伍握去  
皮剉

葱白伍握

鉛丹

團粉各陸  
兩

松脂兩

乳香兩

當歸兩

桂心錢

右九味先將清油於銚子內慢火煎熟入皂莢葱白  
桂心以煎令黃赤色濾去滓後下松脂乳香沸下粉

鉛丹當歸同熬成膏滴在水碗中成珠子於瓷合內

盛以故帛上攤每日早晚換之

治一切癰疽發背疼痛不止木通膏方

木通兩

黃丹兩

細辛兩

茵陳兩

琥珀細研

朱砂壹兩  
細研

中清麻油兩

右七味先煎油令沸卽下細辛木通茵陳煎五七沸

去滓卽入琥珀朱砂末更煎用柳木篋攪候滴於水中成珠子膏成收於瓷合中每攤膏於故帛上貼日二易之

治一切癰疽發背疼痛不可忍丁香膏方

丁香半兩

麻油壹斤

黃丹柒兩

丈夫頭髮兩

蠟兩

桂心半兩

當歸半兩

水

合內

右七味先鍊油令香下髮煎令髮盡次下蠟以綿濾過却入罐中下黃丹不住手攪候色黑滴在水內如珠子卽下丁香桂心當歸等末攪令勻以瓷合盛用故帛上攤貼日二換之

治一切癰疽發背日夜發歇疼痛不止胡粉膏方

胡粉肆兩

油半斤

蠟貳兩

下膏

乳香半兩

麝香壹錢

沒藥半兩

入器

右六味以文火煎令油熟下胡粉後下蠟臨成下麝香乳香沒藥攪勿住手待似星花上來卽住以瓷器內盛於故帛上塗貼日二換之

治一切癰疽發背潰後肌肉不生宜用此排膿生肌神

効膏方

當歸貳兩

白芷壹兩

乳香參分

細研



松脂兩

芎藭兩

白欬兩

緋帛灰半兩  
細研

亂髮灰半兩  
細研

甘草壹兩  
半

黃丹拾兩

木鼈子參拾枚  
去殼 杏人壹兩湯浸去  
皮尖雙人

木香壹兩

黃蠟貳兩

麻油升

右十五味先取油安鑊內鍊令香熏將八味藥細剉下油中浸一宿以文火煎白芷色黑赤濾去滓入鑊脂蠟乳香緋帛髮灰等更煎令消以綿濾去滓入鑊內下黃丹不住手攪變黑光色滴在水中為珠子膏成用瓷器盛每用以故帛攤貼日二易之治一切癰腫潰後肌肉不生宜用此排膿生肌乳香膏

方

乾死鼠壹箇中  
形者

大黃壹兩

乳香半兩

杏仁半兩去  
皮尖

雞子黃兩

亂髮如雞子  
骨團

鉛丹兩

蠟兩

水銀半兩

油斤

右一十味先熬油令沸下亂髮並鼠大黃煎候鼠焦色綿布絞去滓再下鉛丹蠟杏仁煎以柳篋攪令黑色卽下雞子黃水銀乳香等攪令勻滴水成珠得所以瓷合盛用故帛攤貼治一切惡瘡發背毒腫烏金膏方

油斤

柳枝貳兩

鹽花壹兩

黃蠟貳兩

右四味先熬油令沸下柳枝煎候焦黃瀉出綿布絞去滓再煎下蠟鹽花以柳篋攪令稀稠得所以窅合盛用故帛上攤貼若三日內未成膿便消已成膿頭未破者即潰不須鍼灸其瘡變痛成痒是藥力也色如猶皮孔濺濺有黃水若是惡瘡發背用藥貼出膿血及黃水赤小豆汁貼膏令出盡以差為度

治一切瘡癰腫毒至聖膏方

夜合花白皮 蒴藿

大黃

當歸去尾 白欬根 槐白皮

白芷去木 細辛去苗 杏仁去心

天麻去根 芎藭去水 槐枝去根

心柳枝去根 敗龜去殼 虎骨去毛

附子去皮臍 乳香細研 麝香細研

砒霜細研 自然銅細研 膩粉細研

牛黃細研 定粉細研 鉛丹拾貳兩

清油貳斤

右二十五味除研藥丹粉外細剉先熬油令沸次下諸藥煎候白芷赤黑以綿絞去滓再煎下丹柳篋攪

候變黑色滴水中成珠輒得所次下乳香等研藥  
更攪令勻次瓷合盛發背魚臍癩癰並以膏貼日二  
上以差為度

治一切瘡毒無名異膏方

無名異

細研

騏驎

壹分

柳枝

剉參

蠟

壹兩

鉛丹

伍兩

油

拾貳兩

右六味先熬油令沸下柳枝煎候赤黑色以綿濾過  
再煎下丹蠟攪候變黑色滴水中成珠得所下騏驎  
竭無名異末更攪令勻瀉冷水中捻作挺子一切惡  
瘡發背諸毒瘡並宜塗貼以差為度

治諸瘡一切打損腫毒走馬膏方

皂莢

豬牙者拾挺  
去皮推碎

芫花

伍兩

生薑

伍兩取  
自然汁

生地黃

壹斤取  
自然汁

右四味先以米醋一斗入諸藥煎至三升絞去滓再  
煎以柳篋攪候稀稠得所如膏以瓷合盛埋地內五  
日取出以故帛上塗貼日二上以差為度

治一切瘡腫癰毒佛手膏方

清麻油

斤

鉛丹

參兩

柳白皮

貳兩

皂莢刺

肆拾玖  
枚剉

當歸

半兩

白及

壹分

黃蠟

半斤

朱紅

壹分

生緋帛

伍寸燒  
灰細研

右九味先熬油令沸下柳皮皂莢刺煎候赤黑色以綿濾過下丹煎以柳篋攪候變黑色卽下諸藥末攪令勻滴水中成珠得所以瓷合盛用故帛塗貼日二上以差爲度

治一切惡瘡癰毒如聖膏方

薔薇根剉

乳香研

阿魏壹兩

鉛丹兩

柳枝參兩剉長壹寸

清油壹斤

右六味先熬油令沸下柳枝薔薇根煎候黃黑色以綿濾過下丹煎攪候變黑色次下乳香阿魏更攪令勻一切瘡腫並用故帛上塗貼之如患赤眼頭痛眼

澁貼太陽兩穴驢傷馬墜婦人血氣並當歸酒下三丸如梧桐子大癬瘡先抓破取膏塗貼以差爲度治癰疽及諸種瘡腫應痛膏方

當歸

秦艽

何首烏

敗龜

白欽

白及

白朮

白芷

杏仁去皮

木鼈子去殼

芎藭

延胡索

蜜陀僧

煨研各半兩各用麻油捌兩熬前藥令杏仁黃黑色爲度濾出藥滓入後藥

乳香研

麒麟竭研

沒藥研

楓香脂

研各青分

鉛丹參兩

右一十八味先用油煎前十三味去滓入後五味再熬用柳枝子攪勻令黑色成膏為度如是發背加附子末一分同熬勻用紙花子貼瘡上

治癰疽惡瘡生肌引膿排毒氣蝕惡肉除死肌雄黃膏

方

雄黃細研半兩

巨勝油柒

丹砂細研

蜜陀僧煨研各半兩 鉛丹參兩

蠟壹兩

蛇黃半兩煨醋淬

牡蠣煨研參分

右八味研和令勻先熬油令沸下蠟鎔盡次下丹以柳篋攪候變黑色卽下諸藥末攪令勻滴水中成珠

子以瓷合盛故帛上塗貼日三上以差為度蒸熟膏

垂柳枝白皮貳兩

蒴藿根肆兩

丹砂壹分

燕雞子黃壹枚 熊膽半兩

故青帛柒寸燒灰研 蠟壹兩

鉛丹肆兩

清油壹斤

林林白文加兩木各壹斤

右九味先熬油令沸下柳皮蒴藿根煎候赤黑色澁出以綿濾去滓下丹蠟煎以柳篋攪候變黑色下四味研藥更攪令勻滴水中成珠子以瓷合盛用故帛上攤貼日二土腸癰以綿裹半棗許含化嚥津以差

為度眼暗捏作餅子以鍼刺作孔三五十箇貼眼上  
便差耳聾作挺子當中刺為孔塞耳中日一換即差  
打損取膏塗貼疼痛處以差為度

治發背瘡口未合大聖膏方

當歸切

柳根白皮切各桂到壹

槐實

白欬

白及到

沒藥

藥皮去麤皮到各壹兩用臘月豬

同熟藥焦色去滓再入後藥

蛤丹研

乳香研各半兩

麝香研壹分

盧會半兩

右一十二味先煎前八味去滓再入後四味熬成膏

以瓷瓶盛入地內七七取出將熟絹片留眼貼膏

在瘡口上去盡惡物瘡口自合

治發背癰腫惡瘡楸葉膏方

楸葉到拾斤

馬齒莧到壹斤

烏犀角末貳兩

沉香末兩

右四味先取馬齒莧楸葉以水五斗煎至一斗濾去

滓更煎至一升半下三味藥末以柳篋攪候稀稠得

所以故帛上塗貼日二上即差

治癰疽瘡癤能舒筋脉消腫毒止疼痛黃耆膏方

黃耆到半兩

零陵香壹分

赤芍藥到

芎藭剉

天麻剉

防風剉

生乾地黄

剉各壹錢

清油斤

右九味除蠟外都一處用銀石器內以油浸七日用文武火煎焦黃色以綿濾去滓下黃蠟再煎令蠟化盛於瓷器中每用以軟帛薄攤貼之如皮膚癢痒筋脉緊急用少許塗摩尤効

治癰瘡久不差百靈膏方

槐花子

炒焦為末

松柏各壹兩

乳香

膩粉各壹分

右四味細研拌勻用清油黃蠟各一兩瓷器內慢火

熬成膏貼之

治一切癰疽及上攻下注風毒瘦瘡疼痛焮腫等疾敗

毒膏方

巴豆

和殼推碎陸兩麻油拾貳兩

鉛丹參兩

右三味先將油煮巴豆慢火養一二日滴入水中成沫則止濾去滓却將其滓在一長餅內搗起餅一頭令高下以火燒逼得巴豆內膏油流下以器盛併入前藥油內同煎攪勻入鉛丹更熬令色紫去火令冷入瓷合內密封地孔藏七日出火毒並以故絹攤貼之



治一切癰疽惡瘡生肌長肉膏方

清油拾兩

龍骨研貳兩

木香各壹兩

檳榔

黃連去須各參分參味同為末取細

骨末各壹兩

右五味先將油入鍋內慢火熬滴水成珠子下龍骨

未更熬如稀膏則止去火候稍溫卽下三味藥末不

得住手攪候冷以瓷合內收隨瘡大小貼之

治癰疽發背及一切瘡腫乳香膏方

乳香貳兩

附子生用伍兩

烏頭生用壹兩

木鼈子去殼各貳兩

當歸各壹兩

秦艽各壹兩

紫草去苗參兩

蘇枋木剉伍兩

頭髮灰壹兩

清油

諸藥各細剉入油慢火熬候

楓香脂伍兩

松脂貳兩

黃蠟伍兩

鈴丹貳兩

沒藥壹兩

右一十五味先煎前九味候色黑去滓次下乳香等

六味依次等逐味下用慢火熬用柳木篦不住手攪

候熬成膏滴水中成珠為度攤紙花子上看瘡大小

用之

治瘡腫疼痛辟風欬瘡紫金挺方

當歸

續斷

骨碎補

桂皮去鹽

附子

澤蘭

芍藥

白及

牛膝

羌活

芎藭

木香

麒麟竭

生乾地黄

白僵蠶

白附子各壹兩

沉香

丁香各半兩

栝樓貳枚大者

烏蛇肉

白欬壹兩

白花

玄參貳拾參味壹兩

不封壹兩

杏仁

桃人貳味去皮細研各參分

香壹兩

右二十五味都一處入麻油四斤豬脂一斤半野馳

脂三兩用文武火鍋內煎黑去滓再入乳香末三兩

松脂六兩更煎烱後又瀘去滓細羅鉛丹三斤別炒

令紫色旋旋入藥油內煎柳杖子攪令紫色去火滴

水內成珠卽傾入瓷器內盛每使時看瘡大小用之

治一切瘡腫烏賊骨膏方

烏賊魚骨

去甲研末各參

又清油拾貳兩

右四味先熬油令沸下鉛丹以柳木篦攪候黑色卽

將前二味藥末再攪令勻滴水內成珠子得所以瓷

合盛故帛上攤貼日二上以差爲度

治一切癰疽瘡腫玄參散方

玄參

黃芩去黑心

羊蹄根

芍藥 白芷 丁香

木香 消石 半夏 湯洗 柴偏

白欬 木鼈子 去殼 莽草 各壹

右十二味搗羅為散醋調塗瘡上日三四次腫消

為度

又方

甜葶藶 木通 川大黃 生剉

莽草 兩

右四味搗羅為細散以水和如稀膏塗腫上乾即更

塗以差為度

治一切癰疽發背熱毒猛異攻肌肉赤色腫痛不可忍

欲成膿及已成膿并風毒熱在關節欲結成癰便令內

消寒水石膏方直至漸水肉盡殺之

寒水石 羊蹄根 消石

川大黃 白欬 木香

附子 黃連 丁香

榆白皮 莽草 赤小豆

漢防己 半夏 玄參

甘草 生剉

右十六味搗羅為細散每用時以生蜜一合地黃汁

一合旋調以成膏攤於生絹上貼乾即易腫消為度  
治一切瘡癩癰腫及癭瘡杖痕等並宜貼不發直至較  
白膏方

定粉參兩

清油肆兩鍊熟取參兩

鉛丹貳錢

商陸根參分暴乾

蠟肆兩

白柳枝半兩青白而葉大者

是二月採去麋皮取內白皮切作片子暴乾

右六味先以熟油熬商陸柳枝令色變後入粉蠟丹

攪之不住手直至滴水內為珠子成攤帛上貼之熬

時始則色微紅次微青乃熟也取出久而色白冬色

愈白愈白

治諸瘡腫四時可用若未成膿即消已成膿即破木通  
膏方

春用子

夏用子

秋用子

冬用子

木通貳兩

黃者貳兩

秋用子

本通貳兩

白花黃連細辛去苗

摩勒香各貳兩

續斷各參兩

白芷貳兩

芍藥各貳兩

黃者貳兩

薰陸香各參兩

白芷壹兩

冬用

木通

黃耆

木香各參

當歸貳兩

芎藭壹兩

摩勒香參

薰陸香兩

右各依四時並咬咀以清麻油二升煎候白芷黃色

即去滓絞取油放冷下黃蠟五兩候消盡更入鉛丹

十兩先下六七兩看鞭軟得所即止亦不須入盡十

兩以急火煎用柳篋攪勿令住手點物上其色如漆

即膏成欲用藥先嚼少鹽擦瘡上次貼之鳴始木版

治初患癰腫瘡瀰熱焮疼痛消腫毒清涼膏方

右搗大黃為末漿水調攤貼之醋摩亦得

又方

右取地龍屎以小便和塗貼之乾即易

又方

右取井底泥塗瘡上乾即易

又方

右搗惡實根貼之乾即易

又方

右搗地黃貼之日再易

又方

右搗馬齒菜貼之乾即易

又方

右搗龍葵菜貼之

又方

右搗車前葉貼之

又方

右搗蔓菁根貼之

又方

右搗雞腸草貼之

又方

右搗芭蕉根貼之



大德重校聖濟總錄卷第一百三十

大德重校聖濟總錄卷第一百三十一

癰疽門

發腦

發背

癰疽發背發渴

癰疽發背作寒熱

發背潰後



癰疽發腦統論

論曰癰疽者乳石之疾多發於陽部故在背則發府俞之間在頭則發腦以頭者諸陽所會而足太陽之經絡腦故也然腦為髓海精血之所湊而腦戶風府瘕門三穴不可妄行灸刺令人有瘖瘂之病灸刺猶不可况癰疽之所發乎古人謂五發之病背腦為重始發皮膚若黍米然赤腫傍焮耳項痛楚寒熱當急治之稍縱不治則毒氣深入銷鑠腦髓化為膿血不可及已故經曰癰疽不得頃時回

發腦

論曰發腦者六府不和經絡否滯氣血不行壅結所成也此皆藏府蘊積熱毒或乳石發動毒氣上攻於腦發於皮膚頭如黍米四畔焮赤腫靨徧於耳項寒熱疼痛若不急治毒氣傷于血肉血肉腐壞化為膿水從腦中出血肉既竭必致危殆

治發腦及一切熱毒氣結鞭腫痛通利藏府壅滯大黃

丸方

大黃

貳兩剉醋浸毒炒久慢火炒令熟

枳殼

去鹹炒壹兩

牽牛子

貳兩半微炒壹兩半生用壹兩

木香

生用壹兩

青橘皮

湯浸去白焙各半兩

皂莢

伍挺不神者推碎酒壹升

浸抄取汁  
攤濾過

甘草

黃耆

各壹兩

右六味搗羅五味爲末取皂莢汁於銀鍋內慢火煎

成膏入藥末和搗日餘杵丸如梧桐子大食前葱茶

送下二十九快利爲度因轉甚熱瘡中甚車以去便

治發腦成癰及熱毒瘡腫宜貼黃連餅子方

黃連

羅魚眼乳香  
藥水醋蒸陸香

餅子

雄雀糞

神拾玖粒  
尖細者是

根黃連

右四味搗羅爲細散用薄荷根二兩洗淨漉去水細

切搗如泥若腫甚卽更用蜀葵根二兩入前藥四味

合搗調勻卽取出於瓷器中貯之可腫頭於作餅子

厚二分許貼之乾即易之中視之可紙

治發腦結腫止痛散方良用置葵炒二兩人前葉四葉

木香各壹兩 紫葛壹兩 二檀香壹兩 蘇木壹兩

川朴消兩

右四味搗羅為細散以溫漿水調如麩糊塗在絹上

攤貼於腫痛處候乾即再貼以差即為度

治發腦已穴膿出後痛悶轉甚熱亂腦中若車馬走動

痛楚不可忍犀角散方良用取獸跡干大食同蔥茶

石石膏各壹兩 犀角壹兩 皂莢半升 升麻壹兩 內對火煎

芍藥各壹兩

甘草炙半兩

黃耆細切壹兩

木通兩壹

右七味搗篩每服五錢匕水二盞煎至七分下朴

消一錢匕濾去滓空心溫服日晚再服未愈更入玄

參三分去黃者

治發腦瘡腫焮赤疼痛煩躁沉香湯方良用

沉香壹兩

麥門冬去心

赤芍藥

玄參

甘草生

枳實炒

升麻

前胡去蘆

大黃炒

生乾地黄各壹兩 犀角各壹兩 麝香研壹分

黃耆細切各半兩

右一十四味除麝香外麝搗篩每服四錢匕水一大

盞煎至七分去滓入麝香少許溫服不拘時

治癰發腦拔去瘡中毒羊桃根散貼方黃

羊桃根 剉

消石 研

凝水石 研各

壹兩

天靈蓋

慢火燒煙絕

木香

白欬 各半

兩

右六味搗羅為散清水調如糊攤於故帛上貼之乾

即易痒則差

治發腦始結疼痛妨悶欲成癰疽瘡之令內消方入文

消石 研 貳

木通 剉

紫檀香 小 各 不 休

兩

甜葶藶 剉 紙

白欬

莽草 各 壹

兩

大黃 兩 參

右七味搗羅為末每用漿水旋調得所塗於腫上乾

即易

治腦疽初生如黃枳實破後如盞底深半寸許乳石散

方

花乳石 研

赤石脂 研

滑石 研

爐甘石 研

蜜陀僧 研 各 半 兩

乳香 研 壹 分

右六味搗研為細散未破者醋調傳之已破者即乾

貼

治癰疽腫疼發腦發背方

柳樹上白木耳 黃連須

乳香

杏人去皮尖  
各壹分

鹽花詩少

新蔓菁根得用隔

旬者如無以  
菸菜代之

蛇牀子詩少

右七味搗羅爲末似覺有腫以溫水調傅乾卽易之

發背

論曰發背者熱毒之氣發於背俞爲癰疽是也此內本於五臟外傳諸府故熱氣攻發必生於府俞之間得之乳石發動及肥甘滋味之過藏府壅熱經絡爲之不通毒氣凝滯必因俞穴而出是以服石之人於居處衣食嗜慾喜怒尤宜節慎一有過舉則毒氣乘隙而發初如

芥粟治之稍緩則盈尺寸而難圖故始覺熱搏於分肉痛傷於經絡宜速治之蓋其脉不通則腫毒增甚經所謂榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是也血敗肉腐爲患不一實則爲癰浮則爲腫深則爲疽然發於背者兩胛間初起甚微或痒或痛往往忽之數日遂致不救昔人治此始則度其腫之正中而灸之壯數逾百使惡氣外出次以藥踈利府藏決其邪毒則有可治之理治發背腫癰疽惡風結膿血連翹散方一

連翹子

獨活去蘆  
頭

木香

射干各分

甘草炙

桑寄生剉



升麻 雞舌香 沉香

乳香 研 大黃 剉炒各壹兩壹分 麝香 研壹分

右一十二味麝搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分入淡竹瀝半合去滓空心溫服快利三五行為度

未利再服

治發背癰腫消膿桔梗散方

桔梗 去蘆頭炒 木占斯 防風去

甘草 炙 敗醬 厚朴去蘆皮

桂 去皮 人參 細辛去苗

乾薑 炮各

右一十味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下日

三以差為度

治初發背上似琴絃抽痛有頭射干湯方

射干 犀角 鎊 升麻

玄參 黃芩 去黑心 麥門冬 去心

大黃 剉炒各壹兩 山梔子 人兩半

右八味麝搗篩每服五錢匕水一盞半淡竹葉二七片煎至八分入芒消末一錢匕去滓空心溫服快利

三兩行為度未利再服

治初發背上似琴絃抽痛有頭犀角湯方

犀角 鎊

人參

黃芩 去黑心

山梔子 八

木通 剉

連翹

升麻

芍藥 各半分

甘草 炙

大黃 剉炒各半兩

右一十味 鐵搗篩 每服五錢匕 水一盞 半煎至八分

去滓 空心溫服 日晚再服

治發背乳癰已服利湯後服此麥門冬湯方

麥門冬 去心焙

黃耆 剉

芍藥

生乾地黃 兩

前胡 去蘆頭

黃芩 去黑心

升麻

遠志 去心

栝樓 去皮各半分

當歸 半兩

小麥 壹合

右一十一味 麤搗篩 每服五錢匕 水一盞 半煎二枚

擘破生薑一棗 大拍碎 竹葉二十七片 同煎至八分去

滓 空心溫服 日晚再服

治發背人參當歸散方

人參

當歸

蜜陀僧

沒藥

雄黃 各半兩

丹砂 壹錢

栝樓 取子生用

右七味 搗研為散 每服二錢匕 用甘草煎酒放溫調

下日三



治五毒發背金星酒方

金星草

和根淨洗慢火焙乾肆兩

甘草壹錢

右二味搗羅為末分作四貼每貼用酒一升煎三兩沸後更以冷酒二升相和入瓶器中封却時取飲之治發背癰疽一切惡毒瘡腫去毒散方

車螯

紫唇光厚者壹箇以鹽泥固濟煨赤去泥

右一味為細末每服三錢匕入膩粉一錢匕甘草末二錢匕和勻別用栝樓一枚細剉以酒二盞慢火煎及一盞去滓於五更初溫前酒調下取下黏滑惡物卽是病根本也

治發背金鍼散方

金皂莢鍼

春時取壹斤青壹半黑者

右一味不拘多少暴乾搗羅為散先任意飲食訖用藥三錢匕酒調服之立差未退再服

治發背鉛酒方

甘草

炙剉參兩

右二味用酒一斗置一空瓶在傍先以甘草入酒中然後鎔鉛投之却濾出酒在空瓶內取鉛依前鎔投如此九度并甘草去之留酒恣飲醉寢卽愈治發背欲結不結四肢寒熱消毒散方

車螯膏筒可盛朴消貳兩消者

右二味以消入車螯內濕紙裏黃泥固濟麻皮纏之

煨赤候冷去泥同研如麩將絹鋪地薄攤藥末於上

盆蓋一食久入乳香地龍末各一分白殭蠶甘草末

各半分和勻每服半兩酒調去滓服能飲酒者多與

之其滓塗患處一食久即轉下惡物只兩服或消或

破別服補藥

治發背熱盛速用此止痛藥方

金櫻根洗去蘆皮剉搗一盞生甘草半兩同杵用水

三椀煎至一椀半入酒一椀或一盞更煎至一椀又

入童子小便一椀煎至八分椀去滓旋入銀盞內溫

服取盡如心中覺逆食少白梅則止次服後藥

大黃生

甘草生各

麝香研壹

木香壹

丹砂研壹

鬼腰帶根洗

金櫻根洗割各

右七味都用水五椀煎至兩椀半入酒一椀半更煎

至一椀去滓旋入銀盞內溫服令盡取下惡物如覺

差即去甘草大黃餘藥依前分兩入水四椀煎至兩

椀入酒一椀更煎至一椀去滓旋入銀盞內溫服令

盡如未差更依前方合一料服之無有不差者若瘡

已破用生肌膏藥貼及慘後藥斂瘡口龍骨散方

龍骨

煨赤地上去火毒研

赤芍藥

為末各半兩

鉛丹分內 磁石分

胡粉半錢

右四味同研勻細先以葱湯洗瘡後拭乾以藥摻之

治發背瘡如葡萄破後瘡孔無數狼毒膏方

狼毒

藍根

龍膽各半兩

定風草兩

乳香錢

水銀粉抄壹錢

右六味為末蜜調成膏攤帛上貼瘡

治背癰如鐵底又如蒲扇疼痛不止藍根膏方藥

板藍根

黃芩去黑心

黃連去須

大黃各壹兩

白及壹分

乳香半兩

右六味搗研為末用新汲水調成膏量大小貼之日

四夜一

治一切發背救生膏方

蜜陀僧碎

黃藥傍根

金州厚者用黃蠟一彈子大火炙盡為度各

兩

烏賊魚骨

白者去甲半兩以參味搗研極細

膩粉半錢

右四味和勻每用新汲水調攤紙上先令患人口溫

酸漿水洗瘡然後貼每日一換

治發背疼痛日夜不可忍塗傅大黃膏方

大黃剉

雄黃研

芎藭

黃連須去

白芷

檳榔剉

當歸切焙

木香

桂去麤皮

黃蘗去麤皮

芍藥

附子去皮

乳香研

麒麟竭各半

雞舌香

麝香各壹分

豬脂斤壹

右一十七味搗研十六味為末拌勻先於銀器內熬豬脂令沸去筋膜下諸藥末調成膏塗患處日三上以差為度

治發背瘡神金膏方

白及

蜜陀僧研

甘草

黃蘗去麤皮

黃連去麤皮

膩粉各半兩

麝香研壹字

右七味搗研為末用津唾調成膏以無灰白薄紙看瘡大小塗紙上貼之無力即換

治發背金線膏方

楸葉伍斤如無用楸白皮剉

馬齒莧貳斤去根切

右二味以水五升熬至一升去滓入鍋內以柳枝攪熬如錫盛在瓷器內先以荆芥湯洗瘡次用雞翎掃藥於瘡上令勻以薄紙貼之更用酒調二錢匕服之

治發背癰瘡化毒散方

白礬灰

研 鉛丹

研 蜜陀僧

木鼈子人

各壹兩

右四味同入瓷合煨赤放冷地上紙襯盆蓋一時辰

細研以菜子油調貼其冷如水

治發背瘡腫痛牛齒膏方

水牛牙齒

煨

太陰玄精石

各壹兩

乳香

壹錢

右三味搗研爲末每用緋絹量瘡大小剪以津唾調

藥攤絹上貼之

治發背瘡衝破疼痛不可忍麝香散方

麝香

研半

煨藥子

紫背荷葉

各半兩

右三味搗研爲散每量瘡大小臨時乾貼瘡上

治發背生肌肉止痛五倍子散方

五倍子

壹兩

地龍

壹兩

黃連

壹兩

乳香

壹錢

木香

壹錢

蜜陀僧

黃連

壹錢

右七味搗研爲散每用少許乾貼瘡上

治發背熱毒結聚焮赤疼痛消腫解毒金花散方

雌黃

研細

黃連

九節者

檳榔

壹兩

麝香各壹分

鬱金

大黃各半兩

右六味搗羅四味爲散入麝香雌黃同研勻細每取生油調如糊塗患處日二上卽差

治發背五靈脂散方

五靈脂兩

烏賊魚骨

去甲壹兩

右二味搗研爲散凡患者初覺時以水調掃腫處如已大作者入醋麪同調傅之

治發背瘡黃石散方

癩黃石如鷄卵大

右一味猛火煨赤投醋中因有屑落醋中再煨再投

石盡爲度取屑暴乾搗散以醋調傅背上無不愈

治發背成瘡龍葵根散方

龍葵根剉壹兩

麝香研分

右二味先將龍葵根搗羅爲末入麝香同研令勻水

調塗於瘡上

治發背癰疽瘡金粉膏方

錫肆兩用板瓦盛炭火安錫在上扇之候錫成灰研末

蜜陀僧肆兩入在罐子內以

盡子蓋口鹽泥固清勿令透氣用炭火煨不開藥氣爲度取出放冷

右二味同研極細量瘡大小臨時入膩粉少許以雞

子黃調如膏攤在瘡上以緋帛蓋

治發背癰疽已潰未潰鼓餅灸方

鼓

右一味研細入水和熟如溼量腫大小捻餅子厚三分蓋於腫上鼓餅已有孔穴勿覆之安艾炷於上灸令溫熱不可破肉痛急易之未潰者內消已潰者汁出差如不痛一日二日灸之

治發背已結成膿栝樓塗方

生栝樓根

右一味細剉搗研如糊塗之日三五度即差

治發背瘡癰疽桃花汁方

桃花不拘多少

右一味於平旦承露採取以醞醋研絞去滓取汁塗傳瘡上有蟲即出無花但桃葉亦得以臘月豬脂和塗亦佳

治發背瘡腫方

白麩

右一味取泥拌和圍腫四畔令童子七人尿圍中浸

腫處即差

又方

新馬糞



右一味厚塗腫上乾卽易之亦療發乳

又方

益母草

右一味爛搗絞汁三合服之滓傳瘡上熱卽易之

治發背乳香貼方

乳香

研黃蠟者

右二味等分同入銚子鑿化瀉入水內斟酌瘡大小取劑再於火上鑿化攤於帛上或紙上貼之不佳以手按令着肉爲此藥易乾故也一日三易腫消痛止如已有頭欲破者亦漸縮減

治發背麥餅方

大麥

炒熟

甘草

生用

右二味同爲末用如酥少許和勻微有酥氣仍以白沸湯拌和作餅劑方圓大小如瘡腫大熱傳之以油單并故紙密裏勿令通風冷卽換之常須喫葷者米粥甚妙

治發背赤焮疼痛消石搨方

消石

兩伍

右一味用湯一斗浸消待冷取故青布兩片更互浸搨日三五度

治發背神効薜荔散方

薜荔葉

右一味不拘多少陰乾搗羅爲散每服三錢匕水一盞煎五七沸溫服更用藥煎湯洗瘡甚妙

又方

茄種甘草等分爲末每服二錢匕溫酒調下立差

又方

糯米不拘多少炒熟細研以井華水調塗四面乾卽

易之

又方

木芙蓉葉自落者經霜然後收之碾末淡醋調於掌上如青苔色爲妙絹帛塗貼瘡上

治諸發背腦疽及一切惡瘡先須用托裏藥使毒氣皆出然後用藥上傳粗工不知便以冷藥傳貼起逐毒氣投歸于心十死八九世俗謂發背無生人殊不知初覺之時多服大黃甘草等藥踈轉藏府導其毒氣次以傳藥消之治發背內潰及諸惡毒衝心嘔痛托裏湯方

乳香通明者壹兩用水外浸以乳鉢研細

真菜豆粉研肆兩

右二味合研極細每服一錢匕新水調下水不可多要藥在胸膈上也次用一醉膏

一醉膏方

沒藥研壹分

栝樓大者去皮壹枚

甘草生為蟲末半兩

右三味用無灰酒三升熬至一升去滓放溫作一服飲之如一飲不盡分二三盡連續飲盡次用紫雪膏傳之以收其暈

紫雪膏方

蜀椒肆拾玖粒去目并閉口炒出汗為末

杏仁貳拾壹粒去皮尖雙人研

清麻油壹兩

酒蠟白者半兩

右四味先將清麻油并酒蠟於銚子內煎令勻沸次下蜀椒杏人用柳篋攪令黃赤色成膏滴在水椀中

不散盛菴器中每用以故帛上塗貼日再易

治發背初欲作腫宜服大黃散方

川大黃壹兩剉碎微炒

梔子人壹兩

川升麻壹兩

黃芩壹兩

甘草壹兩炙剉

玄參壹兩

右六味搗篩為散每服四錢匕水一中盞煎至六分去滓溫服不計時候

治發背腫如杏或如雞子者沉香散方

沉香壹兩

麥門冬壹兩去心

木香壹兩

川升麻壹兩

麻黃貳兩去根節

川大黃壹兩

右六味搗篩為散每服四錢匕水一中盞煎至六分

去滓溫服不計時候

治發背似瘻但是熱腫令內消皂莢膏方

皂莢膏槌揀肥長者刮去黑皮及子者

栗子壹拾枚大獨顆者去殼曝

乾桑根白皮壹兩

右三味同為細末用生油調成膏塗瘡上

治發背初欲發腫急服此升麻湯方

升麻剉

大黃剉

黃芩去黑心

甘草炙剉各壹兩

山梔子去皮壹佰枚

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分

去滓溫服取快利便止

治發背癰疽瘡瘦乳香膏方

油貳斤

桑枝

槐枝各肆兩慢火煎令黃熟去

下桑槐枝後諸藥

蜥蜴條

當歸

芍藥

白芷

細辛去苗

烏蛇肉各壹分

鬱金香

木香

沉香各半兩

桂去麤皮壹兩半

藥本去苗土壹兩味

剉碎入前油內煎令魚黃漉出澄濾取清油貳拾兩入銅中徐徐火煎次下後藥末

鉛丹捌兩

蠟陸兩

雄黃別研貳兩

乳香研末

沒藥研末

麒麟竭末各壹兩

麝香研分

水銀粉兩半

右二十二味次第煎熬用文武火再煎前項膏先下  
鉛丹蠟不住手攪次下諸藥末候成膏入合內盛封  
閉於井底出火毒七日應患一切毒瘡攤帛上貼三  
日一換次服連翹湯前第一方

治發背初覺腫恐不知定處以濕紙貼之先乾處即是  
若病根多速覓水蛭濕令入病處食血數易甚良治一  
切癰腫及發背疼痛不可忍但未成膿者犀角丸方

犀角鎔參

大黃剉

黃芩去黑心各壹兩壹分

升麻

防風去叉

人參

當歸焙切

黃耆剉

梔子人

甘草剉

黃連去須

乾藍各壹兩

巴豆貳拾壹枚去皮心熬

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空腹水  
飲下五丸取利即愈覺虛即減丸數

治癰疽發背一切毒腫宜服化膿為水犀角丸方

犀角鎔參兩

大黃剉壹兩壹分

巴豆去皮心膜炒黃研出油參

柴粒

升麻

蜀椒去目并合口炒出開

黃芩去黑心

防風去

人參

當歸焙切

黃耆剉

菝蘆

山梔子皮去

黃連去須

甘草炙剉各壹兩

右一十四味搗羅爲末鍊蜜九如梧桐子大每服三  
千丸米飲下食前服微利爲度

治癰疽發背虎牙散方

虎牙

乾薑炮

附子炮裂去  
皮臍

當歸切

防風去  
叉

王不留行

甘草炙

桂去  
皮

白茯苓去黑皮  
各壹兩

右九味搗羅爲散每服三錢匕米飲調下

治發背癰腫一切惡瘡膏方

生烏麻油

鉛丹研

黃蠟各肆  
兩

熊脂

松脂各壹  
兩

水銀

硫黃研

芒消研各  
半兩

右八味取五月四日早於淨室中用銀石器炭火上  
微煎至初五日早勿令息火膏成看瘡腫大小以故  
帛攤貼之未作膿便消無不差者合時忌婦人雞犬  
見臘月臘日合亦良其水銀熊脂於掌中研入諸藥  
治發背發鬢乳癰及諸毒腫神方

黃連去  
須

蛇牀子

乳香別搗各  
壹兩

杏仁參柴枚去皮  
尖雙入炒研

蔓菁子

鹽花各壹  
兩

人糞尖少  
許

右七味搗和作餅子厚如五錢麻布攤貼之每日三

四度易夜亦然每易時以甘草湯洗藥便撮作頭如  
已穴及膿水亦貼肌漸生膿自出

治發背癰疽一切膿腫還魂丸方

膩粉

水銀

硫黃各書分  
同研

巴豆人肆拾  
粒

右四味將巴豆單覆排銚底以三物按上巴豆令平  
以瓷蓋蓋之四面濕紙搭合勿令氣洩炭火四向緩  
燒之時於水中蘸銚底少頃又燒又薰其蓋上底內  
滴水一點如大豆乾則復滴以三滴乾爲度候冷研  
陳米飯丸作二十三丸每服一九熱水吞下踈下惡

物以日劑補之此藥一九活一人會無失者才取下  
即時不痛其瘡亦乾

治發背毒腫紫黑堅靱疼痛方發背百草集

蜈蚣伍寸 芸薹子貳斗 蜜中不着水搏末并

右三味搗羅爲末以醱醋和細細塗腫痛立定

治發背自內出外熱毒中膈上下不通蒸背上虛處先  
三五日癰疹妨悶積漸成腫出於皮膚結聚成膿三神

膏方藥譜

白麥飯石色黃白類麥飯會作磨刀  
者佳煨醋沖拾福爲末

白欬末各壹 鹿角參貳寸截之不用自脫者凡  
帶腦骨者卽非自脫炭火燒



令煙盡爲度  
研爲末貳兩

右三味再同研令勻細取多年米醋於鍋中煎令魚  
眼沸起卽下前藥末調如稀餈以篋子塗傳腫上只  
三當瘡頭留一指面大勿令合以出熱氣如未有膿當  
內消若已作頭當漸小若日久瘡甚肌肉損爛筋骨  
出露者卽於布上多塗藥貼之瘡上乾卽再換但以  
隔中不穴無不差瘡切忌手觸宜慎之

治發背癰疽一切瘡熱痛不可忍者百草霜膏方

百草霜

生蟻蟻等

右二味同研細貼之如水痛卽止

治發背初覺腫痛方

赤小豆

右一味搗羅爲末和豬膽汁塗之乾卽易

治發背及一切熱瘡腫方

芸薹

右一味切和酥炒熱傳瘡上冷卽易日三度

癰疽發背發渴

論曰癰疽煩渴之證由熱氣熏灼五藏津液不足於內  
也蓋榮衛氣血腐化爲膿血則津液不得不耗津液既  
耗熱氣復盛則心神內煩而引飲不止然或爲嘔膿下

利者以五藏虛熱飲水過度氣不足以勝之故氣逆於上則嘔噦腸胃不固則變下利也此屬癰疽惡證

治諸瘡腫發渴托裏黃耆湯方

綿黃耆拾兩

甘草壹兩

右二味並剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎五七沸

去滓溫熱隨意服不拘時候

治癰疽虛熱大渴地黃湯方

生地黃

芍藥

升麻

木通

甘草炙

大黃剉微

知母

赤茯苓去黑皮

人參

當歸焙各壹兩

黃芩去黑心

黃耆各壹兩半

小麥升

栝樓根貳兩

前胡去蘆頭壹兩半

右十五味咬咀如麻豆每服五錢匕用水一盞半

入竹葉七片煎至八分去滓空心溫服如小便利除

木通大熱加入參晚再服以差爲度

治癰疽熱盛口燥發渴除熱止渴黃耆湯方

黃耆

栝樓根

生乾地黃焙

升麻各壹兩

麥門冬去心焙壹兩半 梔子人壹兩

芍藥壹兩

黃芩去黑心壹兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓空心溫服日晚再服

治發背癰疽熱渴悶亂枸杞湯方

枸杞枝葉伍兩

石膏末

栝樓根

黃連伍兩

甘草炙各壹兩

右五味咬咀如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至

八分去滓空心溫服日晚再服

治發背乾嘔吐此因先患熱渴飲冷太過胃寒所致宜

服溫脾平胃陳粟湯方

陳粟米微炒壹合

乾薑炮裂半兩

甘草炙半兩

右三味咬咀如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至

八分去滓空心溫服日晚再服以差為度

治發背癰疽發大渴口乾不可止凝水石煎方

凝水石

石膏

蜜各半

右三味先搗二味石藥羅為末以水五升煎令稠即

下蜜更煎成煎用瓷合盛每日空心取一棗大含化

嚙津日五七服

治癰疽發背四肢虛熱大渴竹葉湯方

竹葉壹握淨洗剉煎取汁壹盞

生地黃兩

黃芩去黑心

人參

芍藥

知母

甘草炙

赤茯苓去黑皮各壹兩

升麻

黃耆

栝樓根

各壹兩

麥門冬去心焙各壹兩半

芍藥

各壹兩

右一十二味除竹葉外剉如麻豆每服三錢匕以竹

葉汁一盞入棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服一

日三服早晨午時夜臥各一

治癰疽發背兼渴竹葉黃耆湯方心單一棗大合升

淡竹葉搗

黃耆剉

甘草剉

煎令醇

麥門冬去心焙

黃芩去黑心

芍藥各參

當歸切

人參

石膏碎

芍藥

半夏湯洗柒編去滑焙各貳兩

芍藥

生地黃切焙

右一十二味蠶搗篩每服五錢匕以水一盞半入生

薑一分拍碎大棗五枚擘破竹葉七片煎取八分去

滓溫服日三夜一

治諸癰腫藏府壅滯口乾脚冷寒熱頭痛嘔逆不下食

煩渴引飲麥門冬湯方

生麥門冬去心焙貳兩

葛根剉

蘆根

石膏碎

生犀角鎔

菱糲

薺尾

芍藥

淡竹葉切

甘草炙剉各壹兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞入消石一錢匕去滓溫服不拘時

癰疽發背作寒熱

論曰癰疽發背病為急切然五藏胸皆在背發於何部宜精詳之其作也邪毒內鼓寒熱交攻氣血壅滯陰陽相干故令人身熱而惡寒也當以癩癰疽之法治之治癰疽發背時作寒熱疼痛不食解毒地黃丸方

生乾地黃兩焙黃耆剉

栝樓根

黃芩主黑心

麥門冬去心焙各

桑螵蛸拾伍枚剉炒大黃剉炒

人參

梔子人

肉苳蓉焙

前胡去蘆頭

升麻一

芍藥

知母焙

王不留行各壹遠志去心

敗醬

地脉草拾

乾棗拾伍枚湯浸去皮核以蜜壹升和蒸成膏

右一十九味搗羅十八味為末入棗膏和丸如梧桐子大每服三十九丸加至五十九丸空心米飲下日晚再服

服羊齒

治癰腫初結頭痛寒熱氣急木香湯方

木香壹丁香各壹沉香

薰陸香壹丁香各壹木香壹煎生八分去

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去  
滓空忒溫服取滓傅腫上日一

治癰疽始作便敗壞發寒熱疼痛羊髓膏方

羊髓

甘草劉搗各

胡粉研

干大黃劉搗各

豬脂斤

空小

右五味先熬脂髓令沸下甘草大黃煎候甘草黑色

綿漚去滓入胡粉以柳篋攪勻瓷合盛每日三五度

塗傅瘡上以差爲度

類

治發背癰疽一切瘡腫乳癰口乾脚冷發作寒熱頭痛  
嘔噦不下食葛根湯方

葛根劉

麥門冬去心焙犀角鎊半

萎蕤

薺芎

芍藥

甘草劉

蘆根劉各

石膏壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分下  
竹瀝半合紅雪一分更煎三兩沸去滓空心日晚溫

服

治癰疽始作堅靱皮色紫赤惡寒壯熱一二日未成膿

者升麻湯方

升麻

連翹

大黃劉

生地黃切

木香各壹

白欬



玄參各分

木香各分

白朮

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞入芒

消末半錢匕去滓空心溫服取利為度未利再服

治發背癰疽一切瘡腫未定時攻刺疼痛或發寒熱渴

躁不食解毒勻氣犀角散方

犀角鎊壹分

人參

大黃剉

栝樓實煨

甘草剉各半兩

葛根剉

赤茯苓去黑皮

檳榔剉

木香各分

芎藭剉

右一十味搗羅為散每服三錢匕空心晚間粥飲調

下以差為度

治發背未成膿身體寒熱人參散方

人參

當歸焙

蜜陀僧煨

沒藥研

雄黃研各半兩

丹砂研壹錢

栝樓實

貳枚去瓢取皮子生用

右七味搗研為細散每服二錢匕用甘草煎湯放溫

調下日三

治發背未潰身體寒熱黃蘗散方

黃蘗

煙熏壁土多年者各貳兩

右二味為細散每服二錢匕茅根煎湯調下仍用生

薑汁調藥傳之

治發背作寒熱車螯酒方

車螯

紫色光厚者以黃泥固濟賦粉壹錢  
破赤候冷為未取參錢匕

甘草末

貳錢 栝樓實壹枚

右四味先將前三味和勻次將栝樓用酒二盞煎至

一盞去滓調下前藥三錢匕取下惡物差

治發背未潰身體寒熱苦茄散方

苦茄種

甘草壹兩

右二味為細散每服二錢匕甘草湯調下

治熱毒癰腫血不散初覺憎寒乾渴四肢煩悶能令速

消此胡煎方

苳胡去苗壹兩

知母焙壹兩

木通壹兩

淡竹葉壹斤

瞿麥穗壹兩

連翹壹兩

防己貳兩

大黃生貳兩

生麥門冬湯成合

生藕汁

參合湯 甜消 脾兩湯 卒寒不蘇只取薄藥

右二十一味先將八味剉如麻豆大以水三升煮取

一升半去滓下甜消令散次入麥門冬藕汁等共分

為八服空腹兩服以溘利為度餘藥食後緩緩服之

治癰疽發腦發背腫焮寒熱疼痛忍冬飲方

忍冬嫩苗一握

葉尖圓蔓生莖葉皆有毛生田野  
籬落間多有之兩葉對生春夏新

葉稍尖而色嫩綠柔薄秋冬即堅厚色深而圓得霜則葉卷而名紫經冬不凋四月開花極芬芳香

數步初開色白則數日變黃每枝黃白相雜故名金銀花花開度葉數莖如絲故一名老翁須

名金釵股冬間葉圓厚似薛荔故名大薛荔可移植庭檻間以備急花氣可愛似茉莉瑞香輩

甘草半兩 生剉

右二味爛研忍冬同甘草入酒一升半沙餅中塞口

煮兩食頃溫服一日服盡若倉卒求不獲只用乾葉

為散每服三方寸匕甘草方寸匕酒煮服之亦可但

不及生者耳

發背潰後

論曰發背已潰毒氣外泄或有逆證難治者蓋以府藏

之傷也有白睛青黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚體項

中不便音嘶色敗者是為五逆其餘熱渴利嘔與膿潰

不愈皆以餘毒攻擊榮衛傷壞津液未復惟當隨證治

之

治發背已潰去濃汁理虛勞內補黃耆湯方

黃耆細剉 麥門冬去心焙 熟地黃焙

人參 白茯苓去黑皮 甘草炙剉各參分

當歸剉 芍藥 芎藭

桂去麤皮 遠志去心各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑半

分拍碎棗二枚擘破同煎至五分去滓空心溫服日

晚再服

治發背癰疽已潰排膿生肉當歸散方

當歸

剉焙

桂去

麝

人參

剉

防風

去叉各

芎藭

剉

厚朴

去麝皮生

甘草

剉

白芷

剉

桔梗

剉炒各

右九味搗羅爲細散每服二錢匕空心溫酒調下日

晚再服

治發背已潰痢下不住白油脂湯方

白油脂

炮

龍骨

炮各

當歸

剉

桔梗

剉炒各

女萎

剉

白頭翁

各壹錢煎

黃連

去須

乾薑

炮

甘草

炙到各

右九味搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

空心溫服日午晚後各一服

灸發背後服大黃湯方

大黃

剉

朴消

各參

右二味搗篩水一盞濃煎熱服即瀉出毒氣

治發背先穿破出膿水不住傷外風冷毒癩痢淋洗當

歸湯方

當歸

剉

甘草

剉

芍藥

剉

葛根剉 細辛去苗 黃蘗去皮

麻黃去節 苦參 白芷

桂去麤皮 蜀椒去目并閉口者炒 防風去叉各

右二十二味麤搗篩以水六升煎取三升濾去滓溫

洗瘡上日再

治發背癰疽已潰積毒惡肉未去豬蹄湯淋洗方

豬蹄雙 黃耆一兩 黃連去須

芍藥剉 補骨脂去黑心 狼牙根正公去

薔薇根各半 黃芩去黑心 各壹分

右七味剉碎先以水煮豬蹄令熟取汗五升下藥煎

至三升去滓放溫淋洗瘡候水冷即貼麤藥膏痛不

止加當歸半兩甘草半兩和煎洗瘡上兩

治發背癰疽已潰不生肉煖肌乾瘡花蓉膏方

肉苳蓉去餘皮 半夏生 熟乾地黃各壹兩

當歸剉 蜀椒去目并閉口 黃蘗去皮 不

細辛去苗 烏喙去皮 蛇蛻草全兩

白芷剉 甘草黃 桂去麤皮 白

薤白剉 豬脂斤 丸丸

右十三味除豬脂外剉碎以醋半升拌藥一宿先

熬脂令沸次下諸藥煎候白芷赤黑色漉出綿濾瓷

合盛取塗瘡上日三次立效

治發背潰後毒氣未散膿不絕露蜂房散方

露蜂房貳兩 燒灰 亂髮灰壹兩 蛇皮灰參分

赤小豆貳兩 炒熟 川大黃參兩半 研微炒

玄參壹兩 子苓貳兩 川芎參兩

右八味搗羅爲細散每服二錢匕煎黃耆湯調下不

計時候

治發背潰後膿水不絕托裏生肌散方

川芎貳兩 黃耆貳兩 白芷半兩

赤芍藥兩 桂心參分 人參半兩

丁香半兩 當歸兩

右八味搗篩爲散每二錢匕粥飲調下

治癰腫發背患瘡生肌後用力勞動努傷出血不止麒

麟竭散方

麒麟竭半兩 黃連分 檳榔半兩

黃蘗半兩 白及半兩 訶梨勒皮壹分

右六味搗羅爲細散雜子白調塗瘡口上以白薄紙

貼之藥草卽換忌用力勞動

治癰疽發背瘡腫或已潰或未潰連翹飲方

連翹 山梔子人 黃耆炒



防風

去義

升麻

羚羊角燒

漏蘆

去蘆頭

甘草炙剉

大黃炒剉

枸杞根皮

各壹兩

右一十味麤搗篩拌令勻每服五錢匕用水一盞半

煎取八分去滓空心溫服

治發背發腦疼痛侵潰黑錫煎方

黑錫一斤先鎔令浮乘熱研成泥以無灰酒一斗煎

錫至三升瓷瓶中盛每服一盞調生甘草末二錢匕

日三服甚者五七徧差

大德重校聖濟總錄卷第一百三十一

大德重校聖濟總錄卷第一百三十一

瘡腫門

諸瘡

諸惡瘡

反花瘡

諸瘡

論曰諸瘡皆緣風熱濕毒之氣種類甚多載之方書備矣然有俗名瘡方論未見收錄考之皆不離於邪氣逆肉理害肌膚者今各隨其證以治法附之雖田野下俚取而用之判然可曉不必泥於沿襲也

治一切風刺面上生無名瘡癩因飲酒食炙煇物得之  
劉混康先生當歸丸方

當歸肆兩

青鹽貳兩

右二味先以水洗當歸乘潤用青鹽糝徧閤在高處  
三日取下去鹽以當歸暴乾爲末滴水丸如棗豆大

每服二十九空心溫酒下

治面露瘡作膿窠如香瓣柳絮散方

柳絮搗末

膩粉

右二味等分研勻燈盞中油調塗之

治大人小兒頭面上無名瘡黃水不止露蜂房散方

露蜂房

蛇蛻各壹枚

右二味同於碗內燒過爲灰每看瘡口大小用膩粉少許和勻生油調雞翎掃之

治髭須瘡有膿窠金粉餅方

鬱金

菘豆粉各半兩

白欬壹分

右三味搗羅爲末用朴消水和作餅貼之

治肺風上攻脅額生瘡苦參散方

苦參

藍葉陰乾

威靈仙土去

蔓荊實皮去

何首烏

荊芥穗

胡麻子

烏藥剉

天麻

右九味等分搗羅爲散每服二錢匕食後溫酒調下

日三夜二

治大人小兒蝕透頰初生如米豆名金顯瘡二金散

方

雞內金

是肚內鬱金黃皮煇

右二味等分搗羅爲散先用鹽漿盥漱了貼之忌米食

治髮毛瘡在頭中初生如葡萄痛不止黃香餅方

黃蘗

兩壹

鬱金丹

乳香

分壹

右三味搗研爲末用槐花水調作餅於瘡口貼之

治髮際瘡初生如黃米大或痒或痛龍骨散方

龍骨

烏賊魚骨

去甲

胡粉

各半兩

鉛丹

壹錢炒紫色

右四味研細先用鹽湯洗了貼之日三五上

治咽漏瘡初生結喉上如癰腫破後有眼子雄黃散方

雄黃

蜜陀僧

膩粉

麝香

壹字

右四味研細如未破用白梅湯調塗已破搥去膿汁

乾貼

治緣脣瘡海帶散方

海帶

不拘多少

右一味爲散臨臥貼一兩宿差

治徹耳瘡井苔散方

井中苔

土馬驥

各半兩

右二味搗羅爲散燈盞中油調塗之

治緊屑面腫馬莧塗方

馬齒莧

不拘多少

右一味搗汁塗之冬用乾末水調塗

治鼻疳瘡侵蝕鼻柱麝香散方

麝香

草烏頭

燒灰

右二味等分研細貼之

治睛漏瘡目大皆出膿汁有孔子白龍散方

龍腦

馬牙消

各半錢

萊豆粉

錢

右三味同研極細用燈心蘸藥點之日四五上

治頤頰瘡一名獨骨瘡百合散方

百合

黃蘗

各壹兩

白及

壹錢

蓖麻子

伍拾粒研

右四味搗研爲散用朴消水和作餅貼之日三五上

治玉枕瘡生枕骨上如癰破後如筋頭石韋散方

石韋

原蠶蛾

炒

右二味等分搗羅爲散乾貼取差

治腮頰腫痛或破成瘡芙蓉傳方

芙蓉葉

不拘多少

右一味爛搗傅之以帛繫定日一換

治粉鈴瘡糖項亦爛多汁紅粉散方

蜜陀僧煨

龍骨各半

胡粉錢

鉛丹青錢炒  
紫色

右四味研細搗去膿汁用生油調塗日三夜一

治天柱瘡生脊大傾上如錢大赤色出黃汁不止敗蹄

散方

驢蹄削貳拾  
片燒灰

胡粉壹分  
熬

麝香少許  
研

右三味合研未破以醋煮麩糊和成膏塗入已破乾

糝

治吹乳葡萄酒方

葡萄壹  
枝

右一味於燈焰上燎過研細熟酒調服

治吹乳鮫鯉甲散方

又鮫鯉甲壹兩炙黃又  
名穿山甲

自然銅半錢  
生用

木通兩壹

右三味搗羅為散溫酒下一錢匕不拘時

治乳頭烈方

丁香香不以

右一味搗為末傅之立愈

治乳癰方

赤小豆末

蛇脫皮燒作



右二味以雞子白和之傅上少乾即易

治諸惡瘡疼痛不可忍上諸藥不効者宜塗黃蘗散方

黃蘗壹分  
微炙

黃丹壹分炒  
令紫色

蜜陀僧壹分

白狗糞半兩  
燒灰

膩粉半兩

麝香壹錢  
細切

騏驎竭壹錢

右七味搗羅為細散都研令勻先用甘草湯洗瘡口

後用津唾調塗之

又方

熊脂多少

右一味細研塗之長

治乳汁不時洩蓄積於內遂成癰名妬乳漏蘆散方

漏蘆壹兩

黃芩壹兩去  
黑心

米粉半兩

右三味搗為細散水調如膏塗於乳上

治吹乳癰腫疼痛寒熱發歇晝夜不可忍蛇蛻皮散方

蛇蛻皮燒灰  
半兩

麝香錢貳

右二味研令勻細每服一錢熱酒調下併三服不計

時候

治婦人乳癰汁不出蓄積內結成膿腫名妬乳方

露蜂房不以多少  
燒為灰

右一味研細每服二錢匕水一中盞煎至六分去滓

溫服

治婦人吹乳獨勝散方

白丁香兩半

右一味搗羅為細散每服一錢匕溫酒調下不計時

候

治乳癰黃連散方

黃連壹分  
去須

大黃壹分  
剉炒

鼠糞末  
分

右三味搗羅為細散煮黍米粥飲調和如膏於乳四

邊傅之

治瘡欲似蜂窠差而還發方

胡粉

朱砂各等分

右二味細研為末以蜜和合塗於瘡上日三換之即

愈

諸惡瘡

論曰內經云諸瘡瘍皆屬心諸濕腫皆屬脾蓋心主血脾主肉也由體虛受於風濕邪毒與氣血相搏故發瘡也甚者焮腫滿痛潰而多汁或形體為之壯熱稽緩不治則毒氣內攻固不可以常法治之

治一切惡瘡久不差者麝香散方

麝香論門子

丁香

木香

紫檀香各壹分

乳香

沒藥各半兩

右六味搗研為散用雞子清和入殼內飯上蒸熟暴乾再研分作六服每用蠟茶清調下

治惡瘡皂莢刺散方

皂莢刺兩壹

乳香壹分

右二味搗研為散每服二錢匕以酒一盞煎一兩沸服熱酒調下亦得

治遠年惡瘡乳香散方

乳香

膩粉各半錢

麝香壹字

龍骨

大黃剉

黃蘗去麩皮各參錢

右六味搗研為散先用苦竹瀝洗瘡次糝藥貼之

治諸惡瘡多出膿水不乾者龍葵散方

龍葵俗名天茄子

景天俗名俱火草

黃連去須

天靈蓋各壹兩

龍骨

乳香

木龍子

黃蜀葵花各半兩

右八味搗研為散看瘡大小入膩粉少許蜜調攤紙

上貼之

治無名惡毒瘡似魚眼者獺骨散方

獺骨

生張末壹兩

麝香壹字

右二味細研和勻用津唾調貼之

治惡瘡生好肉去膿水風毒氣腫烏蛇膏方

烏蛇去皮骨炙麻油斤

鉛丹貳兩

鼠壹箇臘月者蠟肆兩

右五味先用油煎鼠令消去滓次用鉛丹并烏蛇末

微火煎沸後下蠟更煎十沸膏成以瓷器收每用封

瘡日一易

治一切惡瘡金藥散方

黃藥生薑

黃連須去

白及去

五倍子各壹分

膩粉貳錢

麝香半字

右六味搗研為散冷水調傅瘡上紙花子貼之

治一切惡瘡蜜陀僧散方

蜜陀僧煨穀精草各壹雄黃兩

右三味搗研為散每用少許乾糝瘡上

治惡瘡烏頭散方

烏頭壹枚炮裂去

膩粉貳錢

右二味研勻先用白湯洗瘡數徧次用鹽湯洗數徧

後以唾調藥成膏傅瘡口

治惡瘡久不差者檳榔黃葵散方

檳榔壹箇木香壹斤黃蜀葵花壹斤

黃連貳

右四味將檳榔秤見分兩餘藥與檳榔等分搗羅爲細散先以溫漿水洗瘡淨看大小入膩粉少許蜜調塗於故帛上傳之二三日易之

治久患惡瘡不可者牛角散方

黃牛角壹分

燒灰

麋角屑壹分

白歛壹分

微薑煨

麝香半份

細研

蜜陀僧壹分

黃丹半份

微炒

蛻蝦壹分

燒灰

羌活兩

海桐皮壹兩

仙靈脾兩

壹

乾地龍壹兩

微炒

右十一味搗羅爲細散每服二錢七溫酒調下空心

食前服

治惡瘡人不識多年不可者赤小豆散方

赤小豆

熟炒

糯米壹

炒

吳茱萸壹

熟

黃連壹

須

黃蘗壹

剉

乾薑

蛇牀子半兩

已上各

右七味搗羅爲細散以生油和如面脂先煎槐枝湯洗瘡令淨然後塗藥日再換之

治惡瘡粉香散方

膩粉壹錢

乳香壹錢

葱壹根煨熟去魚皮

右三味同研如膏攤在帛上貼瘡三日一換

治惡瘡金黃散方

黃藥壹

蜜貳兩將蜜塗黃藥末蜜盡爲度

右二味搗羅爲散入麝香半字同研勻細乾糝瘡上

治諸般惡瘡通聖散方

穀精草炒

天南星炮

貫衆炒

黃藥各壹分

麝香半錢

右五味搗研爲散用少許乾糝瘡上

治惡瘡久不効寸金散方

雞子殼

拾箇生却于者檳榔壹枚

麝香研

膩粉各半錢

黃藥去塵皮

蜜陀僧各壹錢

右六味搗研爲散用溫鹽漿水洗瘡乾貼

治一切惡瘡熊膽膏方

熊膽研壹錢

膩粉半錢

雄黃研

麝香研各半錢

檳榔末壹錢

右五味研勻於臘日用豬膽一箇取汁和藥却入

藥在膽內用綿繩繫定揉勻以松明黑焰熏令徧黑

掛於陰處如惡瘡有指面大者用黍米許貼之如錢

大者用菜豆許貼之恐藥乾難貼薄以津唾調如稀

糊塗之仍用薄樺皮蓋貼以帛子繫之藥不宜多用

治一切惡瘡疼痛不可忍楓香散方

楓香脂

紙襯於地上食頃令脆研

膩粉各壹錢



右二味同研勻細每先含漿水令暖吐出血瘡淨後  
以藥末乾傅之以差爲度

治一切無名惡瘡硫黃膏方

硫黃

膩粉

吳茱萸

湯洗焙乾  
炒各香分

礬石

熱令  
汁粘

牡蠣

煨赤研  
各半兩

吳茱萸

湯洗焙乾  
炒各香分

右五味細研入小油半兩黃蠟一兩同熬成膏趁瘡  
大小攤於紙上以火炙鏝貼之一箇更貼一味藥入

治一切不測惡瘡年深不愈大効血竭散方

血竭

兩

鉛丹

半兩炒  
紫色

黃黃

散

右三味搗研爲散先用鹽湯洗瘡後貼之

治無名惡瘡年深不愈藥皮散方

黃蘗

蜜炙

榆蚰蟲

次乾各  
壹錢

麝香

少許

右三味搗研爲細末以鹽漿水洗瘡後唾調藥紙花

子貼之

治一切惡瘡三黃散方

大黃

黃連

去須

山梔子

人

麴蘗

白及

青黛

各壹兩

右六味搗羅爲散有膿乾貼無膿水調傅

又方

黃蘗

鬱金

黃蜀葵花

白歛

右四味等分搗羅為散百合水調貼之

治諸惡瘡木香散方

木香

檳榔 剉

黃連 去須

右三味等分搗羅為散乾糝瘡上如瘡口乾印用生

油調傅之

治諸惡瘡口不合牛齒散方

牛齒 兩

雞卵殼 兩

右二味燒研為散入膩粉少許生油調塗之立愈

治惡瘡黃連散方

黃連 去須

胡粉

黃蜀葵花 各等分

右三味搗羅為散用龍腦麝香膩粉各少許研細拌勻先以鹽漿水帛子搥乾糝之

治惡瘡瓜蒂散方

瓜蒂 肆拾枚

黃連 去須

杏仁 去皮尖雙入

膩粉 壹分

麝香 壹錢

右三味搗為細末用膩粉麝香同調和令勻以津唾調塗在瘡上更用紙麩糊屢在藥上貼三五日一度含鹽水洗過更貼是瘡只貼本丹子其餘自差

又方

樓葱

壹斤和須葉細切熬乾以慢火炒令黃色

硫黃

貳兩細研

鼻黃

壹兩細研

麝香

半兩細研

右四味細研爲散先以熱鹽漿水洗瘡拭乾以生油調貼逐日換之

又方

鈴丹

壹兩半炒令紫

松脂

肆分

麒麟竭

貳兩半細研

亂髮

壹分細研

緋帛

肆分細研

右五味先用油四兩於猛火上熬令烟出卽下松脂鈴丹等煎令色黑下亂髮緋帛灰麒麟竭末等攪令勻膏成塗故帛上貼日二易之

治毒惡瘡懷乾散方

蜜陀僧

壹分

黃藥

蜜炙半兩

右二味懷中懷乾搗羅爲散先用葱湯洗瘡候乾傅之

治積年惡瘡及透掌漏瘡外廉瘡金黃散方

大黃

炒

鬱金

炒

錢鯉甲

炙

穀精草

龍骨

山梔子

人

木鼈子

殼

獨角仙

皂莢株上黑蟲

烏賊魚骨

去甲

黃蘗

去皮

甘草

剉

鈴丹

白欬

不灰木

麒麟竭

研

黃芩各半

膩粉

麝蘆

去苗各壹分

右一十八味搗研爲散每看瘡大小糝之有膿水卽用溫鹽漿水洗淨傅之透掌漏瘡以津調絛於瘡內不過三五上

治一切惡瘡疼痛久不差者白香散方

楓香脂 研

膩粉

防風

各壹分

右三味細研令勻先以含漿水令煖吐出洗瘡令淨後以藥末乾傅之疼痛立止貼至令差卽易治一切惡瘡及瘦瘡等方

蛇牀子

末

硫黃

膩粉

各等分

右三味同研爲散以生麻油調如糊以鹽湯淨洗瘡拭乾卽先以日脂塗之然後傅藥不過三五度差治一切惡瘡疼痛不可忍宜傅黃連散方

黃連

貳兩去須

檳榔

壹兩

母丁香

半兩

麝香

半錢細研

右四味搗羅爲細散入麝香研令勻先用鹽漿水洗候乾以藥摻之

又方

枯樓

壹枚鹽作灰

右一味細研每用摻在瘡上

治諸惡瘡腫等病黑龍丸方

芎藭錢參

大黃分壹

甘草兩壹

益智皮去

藿香葉各肆錢

梔子陸各錢

防風去叉半錢

雄黃

雌黃各貳錢

麝香半錢

膩粉伍錢

水銀壹分  
沙子

乳香分肆

右一十三味除研外搗羅爲末先將水銀膩粉乳香同研入諸藥研細勻水浸炊餅和丸如小豆大每服五丸嚼破茶酒下此藥一半作丸子一半作散子每服酒調散子一字下丸子一方更入華撥一十箇乳

香少許作丸子每服五丸嚼破散子酒下若婦人吹妳用散子半錢蝸牛七枚熱瓦上焙熟令去殼黃色入龍腦麝香各少許同研酒調下合面臥若治頭面腋下赤瘤子以二藥相間服之半月軟爛自破出盡惡毒後以膏藥貼之外擊瘤子自落方

砒黃

砒霜

礪砂各半

巴豆伊拉去皮心

芫青去翅足柒枚

斑猫去頭尾翅柒枚

右六味研爲末先取蜘蛛網及絲共搓爲線子水濕塗藥末於上貼子中常以藥末養遇有患者以線繫

之留線頭如痒卽緊之如痛卽不用緊其痛自黑乾  
如胡桃大者三四日自落如茄子大者約半月落更  
大者不過二十八日如瓜者不過一月如血瘤繫之  
血出者服定血藥兼服藥治之

定血散方

栝樓大者壹枚去瓢

櫻櫚皮壹把

當歸切碎半兩

右二味入栝樓中泥固濟燒細研爲散每服一錢匕

茶酒任調下

治惡瘡神妙地骨皮散方

右以地骨皮一物先刮取浮皮別收之次取皮下膩

白粉爲細散其白粉下堅赤皮細剉與浮皮一處爲  
麤末每用麤末一合許煎濃汁乘熱洗瘡直候藥湯  
冷以軟帛裹乾乃用細散傅之每日洗貼一次以差  
爲期用之未差慎不可住但勤施之無不差者小可  
瘡腫疼痛只以枸杞生剉煎濃汁熱淋亦効  
治一切惡瘡六枝烏金膏方

桑枝

槐枝

榆枝

柳枝

桃枝

枸杞枝

右六味各長一尺麤如小指俱一寸截劈四破用油  
四兩炒令焦黑濾去滓入鉛丹半兩蠟一兩復熬令



黑色傾在瓷合內候冷以新汲水浸出火毒先以後  
法熏出蟲乃用此膏塗瘡

治惡瘡熏藥方

貓兒糞

豬糞

亂髮

粳米糠

右四味等分都置在一地坑內用火燒上以方塼覆  
之其塼心鑽一竅令煙出瘡就煙熏之有蟲及惡物  
出盡以溫漿水淨洗然後塗前六枝烏金膏用帛覆  
之  
治一切惡瘡痛不可忍者碧雲膏方

石綠研不以多少

乳香研

麒麟竭研

沒藥研各半錢

膩粉貳錢

黃蠟參兩

松脂壹兩

右七味先將石綠細研次下乳香麒麟竭沒藥膩粉  
同研細用瓷碗火上化黃蠟如油次入松脂亦化爲  
油入少熱油用柳枝攪滴在水上硬軟得所次入前  
藥末以柳篋子攪看顏色深淺得所爲度綿濾過瓷  
器中收於軟帛上攤貼口二換之  
治一切諸惡瘡烏膏方

雄黃半兩

雌黃半兩

芎藭半兩

川升麻兩半

杏人貳拾枚湯浸去皮尖雙入

胡粉壹分

巴豆貳拾枚去皮心

黃連半兩去須

黃蘗半兩剉

烏頭半兩剉

亂髮如雞子大

松脂子大

水銀半兩與胡粉入木同研星盡

蠟壹兩

竹灰半兩

右十五味以酒一盞拌一升時久安鑊於火上先取鍊了豬膏三升急煎髮令消下諸藥以文武火煎攪候杏人黃黑色以綿濾去滓入研了真珠末二錢唯黃胡粉等攪令相得收瓷合中每日二三上塗之

治一切惡瘡及沙蟲水弩甲疽疼痛不可忍者並皆治

之

蜣蜋

拾枚端午日收者佳

右一味搗羅爲細末以油調傅之即易

治三十種惡瘡及風瘡痔瘻等瘡疣子黑疵瘡腫鵝面

點脂瘡癩塗傅烏頭膏方

烏頭貳拾枚

巴豆參拾枚

藜蘆貳兩

大黃參兩

右四味同燒搗研爲末細羅石灰一升以染青汁和成膏看病大小傅之日二三易治一切惡瘡方

赤小豆

糯米各壹分

黃連去須貳兩

吳茱萸壹分

水銀壹兩半手內唾津研之

右五味各搗研為末和勻胡麻油調膏淨洗瘡塗之

反花瘡

論曰瘡生惡肉久則反出於瘡外故謂之反花瘡其初如飯粒破之血出餘毒尚熾惡肉隨生根深而膿潰此皆風熱毒氣之所作也

治反花瘡甘草塗傳方

甘草半生

礬石灰

人中白

蜜陀僧各半兩

右四味並搗羅為末入童子小便半盞以微灰火熬用竹篋攪成膏取塗瘡上日三五次

治反花瘡烟脂塗傳方

烟脂壹兩

胡粉壹兩

右二味相和研令勻先以鹽湯洗瘡淨帛搵乾用藥傳之日三五次

治反花瘡久不差方

鵝鴝糞貳兩

煨黃

右一味搗羅為散先以溫漿水洗瘡搵乾以藥傳之

治反花瘡菘蘆傳方

蒜蘆末

豬脂各貳兩

右二味相和調如糊塗瘡上日三五度

惡實根兩

豬脂參兩

右二味調和如糊塗瘡上日三四度

治反花瘡馬齒莧塗方

馬齒莧

右爛搗令細塗瘡上日五度一方燒灰以豬脂調塗之

治反花瘡方

右取蜘蛛膜貼瘡上乾卽易之

治反花瘡方

柳枝葉貳斤

右一味用水五升煎至二升去滓再煎如飴塗傳瘡上日三五度一方以清油單煎柳枝令焦黃去滓候冷旋旋塗之

治反花瘡方

鹽炒

右一味細研塗瘡上日三五度

治反花瘡方

蒼耳葉

右一味搗絞取汁服三合並塗瘡日三五次

治反花瘡方

鼠尾草根細切

右一味不拘多少熟搗和豬脂封貼瘡上

大德重校聖濟總錄卷第一百三十二